

**PENGARUH PEMBERIAN ANTIBIOTIK DAN PROBIOTIK
TERHADAP KUALITAS DAGING BROILER**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

ANDI FEBRI ASTUTI
60700114006

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

1. Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Febri Astuti

NIM : 60700114006

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gowa, Agustus 2018

Penyusun,



Andi Febri Astuti
NIM: 60700114006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi saudara **ANDI FEBRI ASTUTI**, NIM: 60700114006, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Pengaruh Pemberian Antibiotik dan Probiotik Terhadap Kualitas Daging Broiler**" memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 9 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II




Muh. Nur Hidayat S.Pt., MP.
Nip. 197509092009121



Irmawaty, S.Pt., M.P.

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan









Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si
Nip. 195907121986031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Antibiotik dan Probiotik Terhadap Kualitas Daging Broiler” yang disusun oleh **ANDI FEBRI ASTUTI**, **NIM: 60700114006**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Agustus 2018 M
Dzul-Hijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	 (.....)
Sekretaris	: drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si.	 (.....)
Munaqisy I	: Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.	 (.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.	 (.....)
Pembimbing I	: Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P.	 (.....)
Pembimbing II	: Irmawaty, S.Pt., M.P.	 (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 1969205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas berkat, rahmat, karunia serta bimbingannya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Pengaruh Pemberian Antibiotik Dan Probiotik Terhadap Kualitas Daging Broiler**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan serta telah membawa ummat dari kehancuran menuju alam yang terang benderang. Hambatan dan tantangan tidak lepas dari penulisan skripsi ini, namun petunjuk dan bimbingan selalu di berikan oleh berbagai pihak hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Ucapan syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua saya **Ayahanda tercinta Andi Arifin** dan **Ibunda tercinta Andi Murni** yang senantiasa mendoakan, membimbing dan merawat penulis sejak kecil hingga dapat menyelesaikan skripsi seperti sekarang. Tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada kedua orang tua atas semua dukungan yang diberikan baik dukungan materil maupun non materil hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah kurang lebih 4 tahun. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua saudara tercinta **Andi Arwan Afandi** dan **Andi Haeril Saputra** yang telah banyak membantu agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Terima kasih tak terhingga kepada Bapak **Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P** selaku pembimbing I dan kepada Ibu **Hj. Irmawaty, S.Pt., MP** selaku pembimbing II atas didikan, bimbingan serta waktu yang telah diluangkan untuk memberikan petunjuk, arahan dan ilmu mulai dari awal proposal, penelitian hingga penyelesaian skripsi.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, , **Dr. Wasilah, S.T, M.T** Selaku wakil dekan 1 bidang akademik Fakultas Sains, **Dr. M. Thahir Maloko, M.Th.I** Selaku wakil dekan 2 bidang administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan **Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si** selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. **Bapak Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan ibu **Astati, S.Pt., M. Si** selaku sekretaris jurusan Ilmu Peternakan.
4. **Bapak Dr. Ir. M. Basir Paly** dan **Bapak Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. **Ibu Drh. Aminah Thaja M.Si, Bapak Muh. Arsan Jamili S.Pt., M.Si** dan, **Ibu Hikmawati S.Pt** selaku Laboran Jurusan Ilmu Peternakan yang telah memberikan ilmunya selama menjadi asisten laboratorium sampai dengan proses selesainya penelitian.
7. Kak **Andi Afriana, S.E** selaku Staff Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari proposal hingga skripsi.
8. Sahabat saya **Rahmawati, Ismawati, Radhyah Ramdani** dan **Wahyuni** yang telah memberi dorongan dan semangat sampai skripsi ini selesai.
9. Tim penelitian Antibiotik dan Probiotik (**Rahmawati, Eka Fitriani, Wahyuni, Ismawati, Syarif Hidayatullah, Rustan, dan Sultan Akbar Wahidin**) atas kerja sama dan kerja kerasnya selama proses penelitian berlangsung

Buat teman-teman seangkatanku Ilmu Peternakan Angkatan 2014 **E14NG** yang dari awal penerimaan mahasiswa baru sampai sekarang masih solid dan tetap kompak (Suparman M, Muh Basri, Muhammar Ardilawa, Usman, Makmur, Mudzakkir, Supardi, Muh Rusli, Muh Rizal, Muh Awalauddin Said, Nur Hidayat Rifaldi, Redho Al-Fazrin, Rahmawati, Eka Fitriani, Ismawati, Wahyuni, Nurul Nadya Putri, Isra Nurfadilah Haris, Rezkiyanti Isnani, Muhklisani, Nurbaya, Hilmiati, Mutmainna, Musyrifah Alyah, Mirnawati,

Muslinah, Khaerullah, Rustan, Syarif Hidayuttallah, Sultan Akbar Wahidin, Arfah, Muh Arfah, salman, Rahman, Khaedar Ali, Chaerul Anwar, Satrina, Titin Aprilia Fani, Riskayanti, Ama Amelia Arianto, Andi Apriana Aziz, Rosita Rajak, A Nur Islamiah Hasbi, Riska Nurmayanti, Mutmainnah, Sri Irmawati, Dian Setiawati Mansur, Khusnul Khatimah Ahmad, Rini Angriani, Iswandi) terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin.

10. Tim **SC AN'AM** yang telah membantu dari awal penelitian hingga akhir penelitian.
11. Senior angkatan **2006-2013** dan adik-adik angkatan **2015-2017**.
12. Keluarga besar yang selama ini telah membantu dalam penyelesaian skripsi
13. Teman-teman **KKN Angkatan 58 Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kab. Soppeng** untuk semua dukungan dan masukan-masukannya.
14. **Andi Yuliana, Andi Batari dan Amelia Rosa** selaku sahabat saya dari SMA yang telah banyak membantu selama penulisan skripsi.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, Agustus 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line, positioned above the name.

Andi Febri Astuti

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Defenisi Operasional	5
F. Ruang Lingkup Penelitian	6
G. Hipotesis	6
H. Kajian Terdahulu.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Al-Qur'an.....	8
B. Broiler	10
C. Bakteri Asam Laktat (BAL).....	15
D. Probiotik	16
E. Antibiotik	25
F. Susut Masak	28
G. Ph daging.....	29
H. Keempukan	31
I. Daya Ikat Air.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Waktu dan Tempat	35
B. Alat dan Bahan Penelitian	35
C. Jenis Penelitian	37
D. Metode penelitian.....	38
E. Parameter yang Diamati.....	39
F. Rancangan penelitian	42
G. Analisis data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Pengamatan	44
B. Pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1. Beberapa Mikroorganisme yang Berperan Sebagai Probiotik	21
2. Antibiotic yang umum digunakan pada ternak	26
3. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian	37
4. Bahan Penyusun Ransum Penelitian	37
5. Rataan Nilai Susut Masak, Keempukan Dan Ph Daging Broiler Selama Pemeliharaan	44

ABSTRAK

Nama : Andi Febri Astuti
Nim : 60700114006
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Pengaruh Pemberian Antibiotik dan Probiotik Susut Masak,
Keempukan pH dan Daya Ikat Air Daging Broiler

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pemberian probiotik dan antibiotik terhadap susut masak, keempukan daging, pH dan daya ikat air daging broiler. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018. Bertempat di Kandang unggas Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. P0 (Ransum Basal + control), P1 (Ransum Basal + Probiotik multi Strain 1,5 ml/hari 1-35 hari), P2 (Ransum Basal + Antibiotik Zink Bacitracin 0,1 g/hari 1-35 hari), P3 (Ransum Basal + Antibiotik Zink Bacitracin 0,1 g/hari 1-21 hari + Probiotik multi strain 1,5 ml/hari 22-35 hari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan probiotik dan antibiotik pada level tertentu terhadap susut masak, keempukan pH dan daya ikat air daging broiler tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$).

Kata Kunci : *Broiler, Antibiotik, Probiotik, Susut Masak, Daya Ikat Air, pH dan Keempukan.*

ABSTRACT

Name : Andi Febri Astuti
Nim : 60700114006
Major : Animal Science
Title : Effect of Antibiotics and Probiotics on Cooking Shrinkage, pH Completeness and Meat Water Bondage Strength Broiler

This study aims to determine how the effects of probiotics and antibiotics on cooking losses, meat tenderness, pH and binding capacity of broiler meat. This research was carried out from December 2017 to January 2018. Located in the poultry house of the Department of Animal Husbandry, Faculty of Science and Technology, Alauddin State Islamic University Makassar This study used a Completely Randomized Design (CRD) consisting of 4 treatments and 3 replications. P0 (Basal Ration + control), P1 (Basal Ration + Multi Strain Probiotics 1.5 ml / day 1-35 days), P2 (Basal Ration + Zink Bacitracin Antibiotics 0.1 g / day 1-35 days), P3 (Basal Ration + Zink Antibiotics Bacitracin 0.1 g / day 1-21 days + Multi probiotics strain 1.5 ml / day 22-35 days). The results showed that the use of probiotics and antibiotics at certain levels of cooking shrinkage, pH tenderness and binding capacity of broiler meat were not significantly affected ($P < 0.05$).

Keywords: Broiler, Antibiotic, Probiotic, Cooking Shrink, Water Bondage, pH and tenderness..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan protein hewani di Indonesia saat ini sangat tinggi, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta kesadaran masyarakat bahwa protein hewani diperlukan dalam memenuhi kebutuhan gizi. Protein hewani menjadi sangat penting karena mengandung asam-asam amino yang mendekati susunan asam amino yang dibutuhkan manusia sehingga akan lebih mudah dicerna dan lebih efisien pemanfaatannya. Sebagian besar masyarakat Indonesia menyukai daging ayam karena daging ayam selain rasanya enak juga merupakan bahan pangan sumber protein yang memiliki kandungan gizi lengkap seperti air, energi, vitamin, dan mineral. Sebagai sumber pangan, daging ayam mempunyai beberapa kelebihan lainnya seperti harganya relatif terjangkau, dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat, dan cukup tersedia pasokan dipasaran karena dapat diproduksi dalam waktu relatif singkat. Kebutuhan daging ayam pada umumnya dipasok dari daging ayam broiler.

Ayam broiler merupakan unggas penghasil daging yang memiliki kecepatan tumbuh yang pesat dalam waktu yang singkat dan merupakan salah satu jenis ternak yang banyak di kembangkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan protein hewani. Produktivitas ayam broiler dipengaruhi oleh konsumsi pakan, penambahan berat badan, dan konversi pakan yang diberikan. Daging ayam broiler adalah bahan makanan yang mengandung gizi tinggi, memiliki rasa dan aroma yang khas, tekstur yang kenyal dan harga yang relatif murah dan terjangkau

sehingga disukai hampir setiap orang. Daging ayam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain berwarna keputih-putihan atau merah pucat, mempunyai serat daging yang halus dan panjang, di antara serat daging tidak ada lemak. Lemak daging ayam terdapat di bawah kulit dan berwarna kekuning-kuningan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas daging, baik kualitas fisik maupun kimia. Faktor-faktor tersebut antara lain umur, pakan, manajemen pemeliharaan, kebersihan kandang. Kualitas daging juga dipengaruhi oleh jumlah nutrisi konsumsi pakan.

Kualitas daging selain berdasarkan komposisi kimia daging (kadar air, protein, lemak, dan mineral) juga didasarkan parameter fisik, di antaranya adalah pH, daya ikat air (WHC), susut masak, keempukan, dan warna. Daging yang berkualitas tinggi adalah daging yang memiliki konsistensi kenyal, tekstur halus dan warna terang (Ratih, 2015).

Kualitas daging juga dipengaruhi oleh jumlah konsumsi pakan dan kandungan zat-zat pakan. Jumlah zat-zat pakan yang tersedia berbeda diantara pakan. Peningkatan atau penurunan konsumsi pakan berhubungan dengan kualitas pakan yang tersedia, sehingga dapat mempengaruhi karakteristik atau kualitas daging. Pengaruh dari pakan yang berbeda komposisi atau kualitasnya terhadap kualitas daging bervariasi karena adanya variasi dari faktor lain seperti umur, spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan aditif, berat potong atau berat karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak, dan perlakuan sebelum dan setelah pemotongan.

Pakan merupakan semua bahan yang dapat dimakan ternak, dicerna, diserap, dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Mutu pakan

yang baik harus memenuhi keseimbangan antara protein, energi, vitamin, mineral, dan air. Selain itu pakan yang baik harus memiliki tingkat pencernaan dan palatabilitas yang tinggi. Kebutuhan pakan ayam bergantung pada strain, umur, besar ayam, aktivitas, suhu, lingkungan, kesehatan, dan imbalan zat pakan. Perlu dilakukan pemilihan bahan pakan yang tepat sehingga menghasilkan pakan yang mempunyai kualitas yang mampu memenuhi kebutuhan ternak dengan efisiensi penggunaan pakannya yang tinggi dan bisa menekan biaya produksi. Salah satunya digunakan pakan fungsional. Pakan fungsional merupakan pakan yang terdiri dari minyak ikan lemuru, probiotik (*Lactobacillus* sp dan *Bacillus* sp) dan isolat anti alergen N3 (Soeparno, 1998).

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang ditambahkan dalam pakan ternak dengan tujuan untuk meningkatkan keseimbangan mikroorganisme usus yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai akan mengoptimalkan penyerapan sari-sari makanan (Kusumawati, 2003).

Penggunaan *Lactobacillus* sp dan *Bacillus* sp sebagai probiotik dapat meningkatkan imunitas, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas kesehatan ayam dan kualitas daging. Oleh karena itu pemberian pakan fungsional pada ayam broiler diharapkan mampu meningkatkan daya ikat air dan keempukan serta dapat menurunkan susut masak daging ayam broiler.

Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti jamur yang memiliki kemampuan dalam menekan mikroorganisme lain penyebab penyakit didalam tubuh ternak. Antibiotik selain digunakan sebagai

pengobatan juga digunakan dalam ransum sebagai inbuan pakan. Fungsi utama antibiotik dalam pakan unggas sebagai pemicu pertumbuhan ternak.

Berdasarkan pernyataan diatas maka perlu diadakannya suatu penelitian terhadap pemberian pakan dengan penggunaan probiotik dan antibiotik untuk mengetahui kualitas daging dengan uji fisik pH daging, keempukan daging, susut masak dan daya ikat air.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh terhadap pemberian probiotik dan antibiotik terhadap pH daging, keempukan daging, susut masak dan daya ikat air pada daging broiler?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh terhadap pemberian probiotik dan antibiotik terhadap pH daging, keempukan daging, susut masak dan daya ikat air pada daging broiler.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Dapat menjadi acuan atau referensi bagi peternak ketika ingin menggunakan probiotik untuk mendapatkan hasil daging yang berkualitas.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kekurangan dalam penggunaan probiotik dan antibiotik untuk ayam broiler.

3. Sebagai referensi, untuk peneliti atau lainnya untuk melakukan penelitian berkelanjutan tentang manfaat probiotik dan antibiotik untuk ayam broiler.

E. Defisi Operasional

Ayam pedaging atau ayam broiler adalah jenis ternak bersayap dari kelas aves yang telah didomestikasikan dan cara hidupnya diatur oleh manusia dengan tujuan untuk memberikan nilai ekonomis dalam bentuk daging.

Daging ayam adalah bahan pangan yang bernilai gizi tinggi karena kaya akan protein, lemak, mineral serta zat lainnya yang sangat dibutuhkan tubuh. Usaha untuk meningkatkan kualitas daging ayam dilakukan melalui pengolahan atau penanganan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi kerusakan atau kebusukan selama penyimpanan dan pemasaran.

Probiotik diartikan sebagai suplemen pakan yang berisi mikrobia hidup (*direct feed microbials*) baik bakteri, kapang dan khamir yang dapat menguntungkan bagi inangnya dengan jalan memperbaiki keseimbangan mikrobia dalam saluran pencernaan.

Antibiotika digunakan untuk pengobatan penyakit, juga digunakan untuk memacu pertumbuhan ternak, yang umumnya ditambahkan dalam pakan sebagai imbuhan.

Susut masak adalah berat yang hilang selama pemasakan, makin tinggi suhu pemasakan dan atau makin lama waktu pemasakan, makin besar pula kadar cairan daging yang hilang sampai mencapai tingkat yang konstan.

pH adalah salah parameter yang diukur untuk menentukan kualitas daging. Proses glikolisis setelah ternak dipotong berpengaruh pada nilai pH.

Keempukan dan tekstur daging adalah penentu yang paling penting pada kualitas daging. Faktor yang mempengaruhi keempukan daging digolongkan menjadi faktor antemortem seperti genetik, bangsa dan fisiologi, faktor umur, manajemen, jenis kelamin, dan spesies

Pengujian daya mengikat air merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar kemampuan daging dalam mengikat air bebas. Daging dengan daya ikat air rendah akan kehilangan banyak cairan, sehingga terjadi kehilangan berat.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemberian probiotik dan antibiotik terhadap susut masak, pH, keempukan dan daya ikat air pada daging broiler.

G. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian probiotik dan antibiotik dapat mempengaruhi susut masak, pH, keempukan dan daya ikat air pada daging broiler.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian Hartono dkk (2013), penelitian menunjukkan bahwa penggunaan level pakan fungsional terhadap daya ikat air, susut masak dan keempukan daging ayam broiler dalam pakan berpengaruh tidak nyata ($P > 0,05$). Kesimpulan penggunaan pakan fungsional sampai level 20% dalam pakan belum

meningkatkan daya ikat air, keempukan dan belum menurunkan susut masak daging ayam broiler umur 35 hari.

Adapun hasil penelitian Hartono dkk (2013), Keempukan dengan hasil penelitian memiliki rata-rata berkisar antara 0,06-0,07 yang relatif sama dikarenakan umur pemotongan pada ayam tersebut yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat (Soeparno, 1998) bahwa jumlah dan kekuatan kolagen dapat meningkat sesuai dengan umur, ikatan silang kovalen meningkat selama pertumbuhan dan perkembangan ternak dan kolagen menjadi lebih kuat.

Penelitian Febrisiantosa dkk., (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian aditif pakan yang diberikan Bakteri Asam Laktat (BAL) memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas daging ayam. BAL yang digunakan adalah produk simbiotik yang terdiri dari campuran BAL dan tepung *G. lucidum* diberikan pada ternak ayam dapat menurunkan kadar lemak dan kolesterol yang berkaitan dengan kualitas daging yang dihasilkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Al-Qur'an

1. Tinjauan Al-Qur'an tentang unggas

Hewan ternak adalah hewan yang sengaja di pelihara dan dirawat oleh manusia untuk di ambil manfaatnya. Diantaranya adalah hewan yang dapat di manfaatkan dagingnya yang halal untuk di konsumsi seperti ayam, sapi, kambing, dan unta. Allah swt menciptakan binatang ternak dengan sebagai manfaat yaitu dapat di ambil dagingnya untuk di konsumsi, air susunya untuk di minum, bulunya dapat dijadikan wol yang dapat menghangatkan tubuh dan dapat di gunakan sebagai alat transportasi. Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nahl/ 16:5 yang berbunyi:

وَاللَّائِمِمْ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan (Kementrian Agama, 2012).

Maksud dari ayat adalah bahwa Allah swt telah menciptakan segala sesuatu termaksud didalamnya binatang ternak serta hasil ikutannya dengan memiliki manfaat masing-masing dan memerintahkan agar sahnya kita menggunakan atau memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Allah swt telah menciptakan binatang ternak untuk manusia agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu dalam binatang ternak tersebut terdapat banyak keistimewaan

dagingnya yang lezat dan dapat dikonsumsi oleh manusia dan disukai setiap kalangan. Daging unggas juga memiliki banyak gizi didalamnya yang dapat membantu proses pertumbuhan manusia. Manfaat lainnya yaitu bulu unggas juga dapat dimanfaatkan di memiliki nilai jual yang mampu membantu perekonomian manusia.

2. Tinjauan Al-Qur'an tentang Mikroorganisme

Allah swt, berfirman dalam ayat yang lain yaitu QS. Al-Furqan/25:2 sebagai berikut:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya (Kementrian Agama, 2012).

Hanya Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak pula ada sekutu bagi-Nya dalam kepemilikan. Dia telah menciptakan segala sesuatu dan memberikan ukuran dan aturan yang sangat cermat kepada masing-masing berupa rahasia-rahasia yang dapat menjamin keberlangsungan tugasnya secara teratur (sistematis) (Shihab, 2002).

Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa semua makhluk, dari sisi kejadian dan perkembangan yang berbeda-beda, berjalan sesuai dengan sistem yang sangat teliti dan bersifat konstan. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah, Zat Yang Maha Pencipta dan Mahakuasa. Dari sisi kejadiannya, sudah jelas bahwa semua makhluk--terlepas dari perbedaan jenis dan bentuknya--

terdiri atas kesatuan unsur-unsur yang sangat terbatas jumlahnya, hampir seratus unsur. Dari jumlah itu, baru sembilan puluh unsur di antaranya sudah dikenal saat ini.

B. Broiler

Ayam jinak yang dipelihara manusia sekarang adalah berasal dari ayam liar. Keturunan ayam yang telah menjadi jinak kemudian disilang-silangkan atau dikawin-kawinkan oleh manusia. Menurut teorinya, ayam liar ini adalah ayam hutan atau *Gallus gallus* (Sarwono, 2003).

Menurut Sarwono (2003) , mengklasifikasikan ayam dalam hirarki sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Subkingdom	: Metazoa
Phylum	: Chordata
Subphylum	: Vertebrata
Divisi	: Carinathae
Kelas	: Aves
Ordo	: Galliformes
Family	: Phasianidae
Genus	: Gallus
Spesies	: <i>Gallus gallus domestica sp</i>

Ayam broiler merupakan jenis ras unggulan persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam pedaging atau ayam broiler adalah jenis ternak bersayap dari kelas aves yang telah didomestikasikan dan cara hidupnya diatur oleh manusia dengan tujuan untuk memberikan nilai ekonomis dalam bentuk daging (Yuwanta, 2004).

Menurut Suprijatna dkk (2005), ayam broiler adalah ayam yang mempunyai sifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat ke tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah. Ayam broiler adalah ayam jantan dan betina muda yang berumur di bawah 8 minggu, mempunyai pertumbuhan yang cepat serta mempunyai dada yang lebar dengan timbunan daging yang banyak. Di Indonesia, ayam broiler sudah dapat dipasarkan pada umur 5-6 minggu dengan bobot hidup antara 1,4-1,7 kg walaupun laju pertumbuhan belum mencapai maksimum, karena ayam *broiler* yang terlalu berat sulit dijual.

Menurut Rasyaf (2004), menyatakan bahwa ciri khas ayam broiler adalah sebagai berikut:

1. rasanya khas dan enak
2. dagingnya empuk dan banyak
3. pengolahannya mudah tetapi cepat hancur dalam perebusan yang terlalu lama.

Tahap atau periode pemeliharaan ayam pedaging ada dua yaitu periode *starter* (0-28 hari) dan periode *finisher* (di atas 4 minggu sampai umur dipasarkan). Masa *starter*, anak ayam membutuhkan induk buatan. Sebagai induk

buatan dapat digunakan lampu listrik. Setelah anak ayam berumur dua minggu penghangat dihidupkan pada malam hari agar ayam tetap bisa makan dan minum. Cahaya, disamping untuk menerangi dan memberi kehangatan juga merangsang agar anak ayam suka makan, sehingga mempercepat pertumbuhan (Abidin, 2002).

Sistem pemeliharaan ternak unggas digolongkan menjadi tiga. 1) sistem ekstensif, ayam dipelihara pada suatu padang umbaran yang luas, tempat ayam melakukan segala aktivitasnya. Kebutuhan pakan hampir seluruhnya diperoleh dari padang umbaran. Pakan tambahan hanya sebagian kecil diberikan oleh peternak. 2) sistem semi intensif, ayam dipelihara di padang umbaran yang terbatas, kandang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, berteduh dan bertelur. 3) sistem intensif, ayam dipelihara secara terbatas dalam kandang. Aktivitasnya sangat terbatas di dalam kandang, semua kebutuhan tergantung pada pengelola atau peternak (Suprijatna dkk, 2005).

Pertumbuhan dan perkembangan ayam broiler tergantung pada kualitas pakan yang diberikan. Pakan merupakan sumber energi utama untuk pertumbuhan ayam broiler. Sumber energi pakan dapat berasal dari karbohidrat, lemak dan protein. Energi yang dikonsumsi dari ransum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kerja, mampu diubah menjadi energi panas dan dapat disimpan sebagai lemak tubuh. Semakin tinggi energi ransum, semakin rendah konsumsinya, karena ayam makan untuk memenuhi kebutuhan energinya (Fadillah, 2004).

Ransum merupakan kumpulan bahan makanan yang layak dimakan oleh ayam dan telah disusun mengikuti aturan tertentu. Aturan itu meliputi nilai kebutuhan gizi bagi ayam dan nilai kandungan gizi dari bahan makanan yang

digunakan. Penyamaan nilai gizi yang ada di dalam bahan makanan yang digunakan dengan nilai gizi yang dibutuhkan ayam dinamakan teknik penyusunan ransum (Rasyaf, 2004).

Berapa persentase bahan dapat dimasukkan ke dalam ransum ditentukan oleh kandungan zat makanan dan zat anti nutrisinya. Sumber energi yang kaya dengan pati dan energi metabolismenya tinggi serta kandungan proteinnya mendekati 10% dapat dipakai dalam jumlah lebih banyak. Bahan lain setelah zat anti nutrisinya dihilangkan, pemakaiannya dapat ditingkatkan. Bahan ransum sumber energi umumnya dapat digunakan lebih dari 10% hingga 70%. Bahan sumber protein pemakaiannya dalam ransum tentu lebih rendah jika kebutuhan protein kurang dari 20% (Amrullah, 2003).

Energi metabolisme yang diperlukan ayam berbeda, sesuai tingkat umurnya, jenis kelamin dan cuaca. Semakin tua ayam membutuhkan energy metabolisme lebih tinggi. Kebutuhan energy untuk ayam broiler periode *starter* 3080 kkal/kg ransum pada tingkat protein 24%, sedangkan periode *finisher* 3190 kkal/kg ransum pada tingkat protein 21%. Kandungan protein dalam ransum untuk ayam broiler umur 1-14 hari adalah 24% dan untuk umur 14-39 hari adalah 21% (Fadilah, 2004).

Ternak ayam tidak dapat memanfaatkan serat kasar sebagai sumber energi. Serat kasar ini masih dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh unggas yang berperan sebagai *bulky*, yaitu untuk memperlancar pengeluaran feses (Rizal, 2006).

Daging ayam adalah bahan pangan yang bernilai gizi tinggi karena kaya akan protein, lemak, mineral serta zat lainnya yang sangat dibutuhkan tubuh. Usaha untuk meningkatkan kualitas daging ayam dilakukan melalui pengolahan atau penanganan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi kerusakan atau kebusukan selama penyimpanan dan pemasaran. Daging memiliki kandungan gizi yang tinggi, lengkap, dan seimbang. Namun, kandungan gizi yang tinggi pada daging merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroba, sehingga daging merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak atau *perishable*. Kerusakan pada daging dapat disebabkan karena adanya benturan fisik, perubahan kimia, dan aktivitas mikroba (Soeparno, 2005).

Daging ayam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain berwarna keputih-putihan atau merah pucat, mempunyai serat daging yang halus dan panjang, di antara serat daging tidak ada lemak. Lemak daging ayam terdapat di bawah kulit dan berwarna kekuning-kuningan. Kualitas daging selain berdasarkan komposisi kimia daging (kadar air, protein, lemak, dan mineral) juga didasarkan parameter fisik, di antaranya adalah pH, daya ikat air (WHC), susut masak, keempukan, warna, dan penyebaran lemak marbling. Daging yang berkualitas tinggi adalah daging yang memiliki konsistensi kenyal, tekstur halus, warna terang dan marbling yang cukup (Ratih eka dayawani dkk, 2015).

Kualitas daging juga dipengaruhi oleh jumlah konsumsi pakan dan kandungan zat-zat pakan. Jumlah zat-zat pakan yang tersedia berbeda diantara pakan. Peningkatan atau penurunan konsumsi pakan berhubungan dengan kualitas pakan yang tersedia, sehingga dapat mempengaruhi karakteristik atau kualitas

daging. Pengaruh dari pakan yang berbeda komposisi atau kualitasnya terhadap kualitas daging bervariasi karena adanya variasi dari faktor lain seperti umur, spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan aditif, berat potong atau berat karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak, dan perlakuan sebelum dan setelah pemotongan (Ratih eka dayawani dkk, 2015).

C. Bakteri Asam Laktat (BAL)

Bakteri asal laktat merupakan bakteri Gram positif yang berbentuk batang atau bulat, tidak membentuk spora, fermentasi fakultatif *anaeorob*, tidak mempunyai *sitokrom*, tidak memiliki kemampuan untuk mereduksi nitrat dan memanfaatkan laktat, oksidasi negatif, katalase negatif, motilitas negatif dan kemampuan memfermentasi glukosa menjadi asam laktat. Berdasarkan taksonomi, terdapat sekitar 20 genus bakteri yang termasuk BAL. Beberapa BAL yang sering digunakan dalam pengolahan pangan adalah *Aerococcus*, *Bifidobacterium*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Oenococcus*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Tetragenococcus*, *Vagococcus*, dan *Weissella* (Carr *et al.*, 2002).

Bakteri probiotik atau bakteri baik adalah bakteri asam laktat yang hidup di dalam usus, bersimbiosis dengan mikroflora usus yang mampu melawan bakteri patogen di dalam usus, oleh karena itu pemberian probiotik dapat berpengaruh menguntungkan bagi kesehatan. Sebagian besar jenis bakteri pada probiotik berasal dari *Lactobacillus* atau *Bifidobacterium* (Saxelin, 1997).

Karakterisasi Bakteri Asam Laktat (BAL) yang dapat digolongkan ke dalam bakteri probiotik adalah diketahui sebagai materi yang tidak berbahaya, dapat hidup selama dilakukan proses dan penyimpanan, memiliki efek antagonis terhadap bakteri patogen, toleran terhadap asam lambung, getah pankreas dan cairan empedu serta mampu melindungi epitelium inangnya (Velez, 2007). Genus bakteri yang tergolong kepada bakteri asam laktat adalah *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Propionibacterium* yang mempunyai potensi untuk digunakan sebagai probiotik (Nettles dan Barefoot, 1993).

D. Probiotik

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang ditambahkan dalam pakan ternak dengan tujuan untuk meningkatkan keseimbangan mikroflora usus yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai akan mengoptimalkan penyerapan sari-sari makanan. Probiotik adalah imbuhan pakan yang mengandung mikroba hidup yang keberadaannya memperbaiki keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Sementara itu, prebiotik merupakan substansi dari makanan yang tidak dicerna, dan secara selektif meningkatkan pembiakan dan aktivitas bakteri yang menguntungkan pada usus besar (Kusumawati, 2003).

Manfaat probiotik untuk ternak tidak hanya sebatas menjaga kesehatan saluran pencernaan saja, namun juga dapat mengendalikan infeksi bakteri seperti *Salmonella* yang bisa menular pada manusia. Pemberian probiotik juga bermanfaat sebagai bahan aditif alami pengganti antibiotik, sehingga daging yang dihasilkan menjadi lebih sehat karena bebas dari residu antibiotik. Suplementasi

probiotik ke dalam pakan ternak itik meningkatkan produksi daging dengan kadar lemak yang rendah. Hal ini dikarenakan probiotik menghasilkan asam laktat yang mampu menurunkan kadar trigliserida sehingga kadar lemak menurun (Saputri, 2012).

Sebagian besar probiotik yang digunakan sebagai aditif adalah bakteri dari species *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, serta jenis fungi seperti *Aspergillus niger* dan *Aspergillus oryzae*. Banyak produk probiotik komersil yang dijual di pasaran antara lain: Gallipro, probiotik produksi Agro Biofast, dan masih banyak lainnya, namun respon probiotik terhadap penampilan produksi ternak unggas bervariasi, khususnya ayam kampung, maka penting untuk mengetahui pengaruh produk ini terhadap penampilan produksi ayam (Jans, 2007).

Mikroorganisme probiotik dapat membantu meningkatkan penyerapan zat makanan dalam tubuh ternak dengan cara menghasilkan enzim-enzim pencernaan (laktase, lipase, amilase dan lainnya) serta menghasilkan produk metabolisme yang bermanfaat bagi tubuh ternak untuk membentuk atau menambah ukuran jaringan baru, sehingga dapat memperbaiki angka konversi ransum (Daud, 2005).

Probiotik sebagai pakan tambahan berupa mikroorganisme yang mempunyai pengaruh menguntungkan untuk induk semangnya melalui peningkatan keseimbangan mikroorganisme usus. Probiotik dapat mengandung satu atau beberapa *strain* mikroorganisme yang diberikan kepada ternak dalam bentuk tepung, tablet, butiran, atau pasta secara langsung (oral), dicampur dalam pakan atau air minum (Jin, 1996).

Mikroorganisme yang dapat bermanfaat sebagai probiotik harus memenuhi beberapa kriteria yaitu, tidak toksik, mampu bertahan pada suasana asam dan cairan empedu, dapat berkoloni dalam usus, dapat tumbuh lama dan mengurangi pertumbuhan mikroba patogen dan dapat hidup pada berbagai kondisi tubuh ternak. Keberhasilan suplementasi probiotik pada ransum ayam dipengaruhi oleh interaksi mikroorganisme yang terdapat dalam usus. Kemampuan mikroba yang terdapat pada probiotik akan berpengaruh bila manajemen pemeliharannya rendah atau merugikan, yang menyebabkan penampilan ayam rendah terutama adanya cekaman (Riley, 1996).

Lactobacillus merupakan kelompok bakteri asam laktat, yang memiliki karakteristik membentuk asam laktat sebagai produk akhir dari metabolisme karbohidrat. *Lactobacillus* adalah bakteri gram positif yang tidak membentuk spora, bersifat fermentatif, anaerob, asidofilik serta membutuhkan karbohidrat, asam amino, peptida, asam lemak dan vitamin untuk hidupnya (Casula, *et al.*, 2004).

Probiotik akan mempengaruhi fungsi fisiologi usus secara langsung maupun secara tidak langsung dengan cara memodulasi mikroflora usus dan sistem imun mukosa terutama mukosa saluran cerna. Saat ini telah beredar produk probiotik yang mengandung mikroba lipolayam pedaging, selulolayam pedaging, lignolayam pedaging, dan mikroba asam lambung. Suplemen berbagai biakan mikroba probiotik pada ayam seperti *Lactobacillus*, *Bacillus spp* mempunyai dampak positif terhadap penampilan ayam seperti pertumbuhan, produksi telur dan efisiensi penggunaan pakan. Probiotik mempunyai beberapa pengaruh yang

positif bagi kesehatan, diantaranya hipokolesterolemik, yaitu menurunkan konsentrasi kolesterol serum darah baik pada manusia maupun pada ternak (Farida Kusuma Astuti dkk, 2015).

Bakteri probiotik merupakan bakteri yang dalam keadaan hidup dikonsumsi oleh hewan dan manusia dan dapat menimbulkan efek kesehatan bagi inangnya. Probiotik diketahui mempunyai beberapa keunggulan, terutama adalah kemampuannya dalam menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Efektivitas antimikroba probiotik sangat spesifik tergantung dari strainnya (Farida Kusuma Astuti dkk, 2015).

1. Mekanisme Kerja Probiotik

Mekanisme kerja dari probiotik menurut Fuller (2001), antara lain adalah:

a. Menempel dan berkolonisasi dalam saluran pencernaan.

Kemampuan probiotika untuk bertahan hidup dalam saluran pencernaan dan menempel pada sel-sel usus adalah sesuatu yang diinginkan. Hal ini merupakan tahap pertama untuk berkolonisasi, dan selanjutnya dapat dimodifikasi untuk sistem imunisasi/kekebalan hewan inang. Kemampuan menempel yang kuat pada sel-sel usus ini akan menyebabkan mikroba-mikroba probiotik berkembang dengan baik dan mikroba-mikroba patogen tereduksi dari sel-sel usus hewan inang, sehingga perkembangan organisme-organisme patogen yang menyebabkan penyakit seperti *Eshericia coli*, *Salmonella thyphimurium* dalam saluran pencernaan akan mengalami hambatan. Sejumlah probiotik telah memperlihatkan kemampuan menempel yang kuat pada sel-sel usus manusia seperti *Lactobacillus*

casei, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum* dan sejumlah besar *bifidobacteria* (McNaught dan MacFie, 2000).

b. Berkompetisi terhadap makanan dan memproduksi zat anti *microbial* mikroba.

Probiotik menghambat organisme patogenik dengan berkompetisi untuk mendapatkan sejumlah terbatas substrat bahan makanan untuk difermentasi. Substrat bahan makanan tersebut diperlukan agar mikroba probiotika dapat berkembang dengan baik. Sejumlah probiotik menghasilkan senyawa/zat-zat yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan substrat bahan makanan tertentu dalam saluran pencernaan yaitu enzim. Mikroba-mikroba probiotik penghasil asam laktat dari spesies *Lactobacillus*, menghasilkan enzim selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu memecah komponen serat kasar yang merupakan komponen yang sulit dicerna dalam saluran pencernaan ternak unggas. Saat ini penggunaan bahan makanan ternak (pakan) untuk unggas kebanyakan berasal dari limbah industri atau limbah pertanian yang pada umumnya mengandung serat kasar tinggi (McNaught dan MacFie, 2000).

c. Menstimulasi mukosa dan meningkatkan sistem kekebalan hewan inang.

Mikroorganisme probiotika mampu mengatur beberapa aspek dari system kekebalan hewan inang. Kemampuan mikroba probiotik mengeluarkan toksin yang mereduksi/menghambat perkembangan mikroba-mikroba patogen dalam saluran pencernaan, merupakan suatu kondisi yang dapat meningkatkan kekebalan hewan inang. Penggunaan probiotik pada ternak unggas dilaporkan dapat menurunkan aktivitas urease, suatu enzim yang bekerja menghidrolisis urea menjadi amonia sehingga pembentukan amonia menjadi berkurang. Amonia

adalah suatu bahan yang dapat menyebabkan keracunan pada ternak unggas (Yeo dan Kim, 1997).

Menurut Citreksoko (1993) terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi pemberian probiotik pada ternak dan yang telah menunjukkan pengaruh positif pada ternak adalah :

- 1) Bahwa pada ternak yang bebas hama (*germfree*) kondisinya lebih rentan terhadap penyakit dibanding ternak normal.
- 2) Telah diketahui bahwa pemberian antibiotik pada ternak akan menurunkan resistensinya terhadap penyakit.
- 3) Resistensi terhadap penyakit pada ayam dapat diperbaiki, bahkan *Salmonella* dapat dihilangkan melalui pemberian larutan kotoran ayam dewasa pada anak ayam yang baru menetas.

Berdasarkan pernyataan diatas, jelas bahwa probiotik dikembangkan dengan tujuan untuk memperbaiki atau melengkapi mikroba pada saluran pencernaan dan sebagai perlindungan terhadap penyakit (Citreksoko, 1993)

Tabel 1. Beberapa Mikroorganisme yang Berperan Sebagai Probiotik

<i>Lactobacillus</i>	<i>Bifidobacteria</i>	<i>Enterococcu</i>	<i>Streptococcus</i>
<i>L. acidophilus</i>	<i>B. adolescentis</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>S. termhopilus</i>
<i>L. brevis</i>	<i>B. animalis</i>	<i>E. faecium</i>	
<i>L. casei</i>	<i>B. bifidum</i>		
<i>L. curvatus</i>	<i>B. breve</i>		
<i>L. fermentum</i>	<i>B. infantis</i>		
<i>L. gasseri</i>	<i>B. longum</i>		
<i>L. johnsonii</i>	<i>B. thermophilum</i>		
<i>L. reuteri</i>			
<i>L. rhamnosus</i>			
<i>L. salivarius</i>			
<i>Propionibacterium</i>	<i>Yeast</i>	<i>Other</i>	
<i>P. freudenreichii</i>	<i>Kluyveromyces lactis</i>	<i>Leumococcus mesenteroids</i>	
<i>P. freudenreichii subs. Thermanii</i>	<i>Saccharomyces boulardi</i>	<i>Pedeococcus acidilactici</i>	
<i>P. jensenii</i>	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>		

Sumber: (Baffoni dan Biavati, 2008 dalam Malago, 2011).

2. Jenis – Jenis Bakteri Probiotik

a. *Pediococcus*

Pediococcus adalah mikroba berbentuk *Coccus*, gram positif, tidak membentuk spora, tidak bergerak (non motil) dan dikategorikan sebagai bakteri asam laktat, karena produk akhir metabolisme adalah asam laktat (Osmanagaoglu *et al.*, 2011).

Pediococcus adalah genus bakteri yang termasuk bakteri asam laktat (BAL) dengan ciri non motil (tidak bergerak) dan memiliki bentuk sferis. Sel bakteri ini terbagi ke dalam dua bidang sehingga membentuk pasangan, tetrad

(tersusun empat), atau gumpalan sel sferis yang lebih besar. Genus *Pediococcus* termasuk golongan fakultatif anaerob dan untuk hidup memerlukan lingkungan yang kaya nutrisi serta mengandung faktor pertumbuhan dan gula yang dapat difermentasi. Bakteri ini termasuk homofermentatif (hanya menghasilkan asam laktat) dan tidak dapat menggunakan pentosa (karbohidrat beratom C5) (Victoria *et al.*, 2008).

b. *Lactobacillus* sp

Lactobacillus merupakan salah satu genus bakteri asam laktat yang paling banyak dijumpai pada saluran gastro intestinal baik pada manusia maupun hewan. Pada usus halus, jumlahnya dapat mencapai 10⁶-10⁷ sel/g sedangkan pada usus besar jumlahnya antara 10¹⁰-10¹¹ sel/g (Ray, 1996).

Beberapa spesies *Lactobacillus* telah banyak diisolasi dari saluran usus halus manusia dan hewan. Beberapa diantaranya adalah *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus casei* dan *Lactobacillus fermentum*. Dari beberapa spesies tersebut diatas, *Lactobacillus acidophilus* merupakan bakteri asam laktat yang paling dominan dan paling banyak dipelajari. Hingga kini, telah berhasil diperoleh 6 galur *Lactobacillus acidophilus*, yaitu *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus crispatus*, *Lactobacillus amylovarus*, *Lactobacillus gallinaru*, *Lactobacillus gasseri* dan *Lactobacillus johnsonii* (Ray, 1996).

Pemberian diet mikroba secara langsung seperti *Lactobacillus* dapat memberikan keuntungan bagi hewan inang melalui peningkatan nafsu makan, meningkatkan keseimbangan mikroba dalam usus, mensintesis vitamin dan

menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Selain itu, spesies *Lactobacillus* juga menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti laktase yang memanfaatkan karbohidrat yang tidak tercerna, menstimulasi produksi asam laktat dan asam lemak volatil serta menghasilkan senyawa antibakterial khusus seperti *Hidrogen peroksida* (Nahashon, 1996).

Lactobacillus, menghasilkan enzim selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu memecah komponen serat kasar yang merupakan komponen yang sulit dicerna dalam saluran pencernaan ternak unggas. Saat ini penggunaan bahan makanan ternak (pakan) untuk unggas kebanyakan berasal dari limbah industri atau limbah pertanian yang pada umumnya mengandung serat kasar tinggi. Penggunaan mikroba-mikroba probiotika yang menghasilkan enzim selulase mampu memanfaatkan makanan berserat kasar tinggi dari limbah industri dan pertanian tersebut dan mikroba probiotika membantu proses pencernaan sehingga serat kasar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan penambahan bobot badan. Mikroba probiotik juga mensekresikan produk anti mikrobal yang dikatakan *Bacteriocin*. Sebagai contoh *Lactobacillus acidophilus* menghasilkan dua komponen *Bacteriocin* yaitu *Bacteriocin lactacin B* dan *Acidolin*. *Bacteriocin lactacin B* dan *Acidolin* yang bekerja menghambat berkembangnya mikroorganisme patogen (McNaught dan MacFie, 2000).

c. *Bacillus* sp.

Bakteri *Bacillus* merupakan mikroba flora normal pada saluran pencernaan ayam (Green *et al.*, 2006). Bakteri ini adalah organisme *saprofitik*, berbentuk

batang, gram positif pembentuk spora non patogen yang biasanya ditemukan dalam air, udara, debu, tanah dan sedimen. Terdapat beberapa jenis bakteri yang bersifat *saprofit* pada tanah, air, udara dan tumbuhan, seperti *Bacillus cereus* dan *Bacillus subtilis* (Jawetz dan Adelberg's 2005).

Bacillus dapat menekan cendawan atau bakteri lain dengan antibiotik, kompetisi nutrien atau parasitisme langsung. Bakteri tersebut mempunyai siklus hidup yang kompleks meliputi sporulasi, dormansi, perkecambahan spora, sel berbentuk batang, berukuran $0,3-2,2 \times 1,2-7,0 \mu\text{m}$ dan mempunyai flagel peritrikus (Pelczar dan Chan, 1998).

E. Antibiotik (*Zinc Bacitracin*)

Antibiotik berasal dari kata Yunani tua, yang merupakan gabungan dari kata *anti* (lawan) dan *bios* (hidup). Kalau diterjemahkan bebas menjadi "melawan sesuatu yang hidup". Antibiotika di dunia kedokteran digunakan sebagai obat untuk memerangi infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau protozoa. Antibiotika adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi/jamur, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Banyak antibiotika saat ini dibuat secara semisintetik atau sintetik penuh. Namun dalam prakteknya antibiotika sintetik tidak diturunkan dari produk mikroba (Angulo *et. al.*, 2004).

Table 2. Antibiotik yang umum digunakan pada ternak

Tipe	Contoh	Sumber	Paling aktif melawan
	Penicillin G	<i>P. chrysogen</i>	Bakteri Gram +
Penicillin dan Cephalosporin	Ampicilin	Semisintetik	Bakteri Gram + dan beberapa Gram -
	Cephalexin	Semisintetik	Bakteri Gram + dan beberapa Gram -
Tetraciklin	Chlortetraciklin	<i>Streptomyces aureofaciens</i>	Bakteri Gram + dan Gram -
	Oxytetraciklin	<i>Streptomyces rimosus</i>	Rickettsiae
	Tetraciklin	<i>Streptomyces spp.</i>	Bakteri Gram + dan Gram -
Macrolides	Erythromycin	<i>Streptomyces erythreus</i>	Bakteri Gram +
Aminoglikosida	Streptomisin	<i>Streptomyces griseus</i>	Bakteri Gram + dan Gram - Tubercle bacillus
	Neomycin B	<i>Streptomyces fradiae</i>	Bakteri Gram + dan Gram -
Polipeptida lain	Bacitracin	<i>Bacillus licheniformis</i>	Bakteri Gram +
	Chloramphenicol	<i>Streptomyces venezuela</i> atau sintetik	Bakteri Gram + dan Gram - termasuk beberapa Salmonella rickettsiae
	Lincomycin	<i>Streptomyces lincolnensis</i>	Bakteri Gram +

Sumber : Ewing (2008)

Antibiotik banyak digunakan sebagai *Growth Promoter* dalam pakan ternak diseluruh dunia untuk memacu pertumbuhan ternak agar dapat tumbuh besar dan dalam waktu yang lebih cepat untuk mencegah terjadinya infeksi (Mitchell *et al.*, 1998). Beberapa antibiotika yang banyak digunakan sebagai *growth promoter* antara lain dari golongan tetracylin, penicillin, macrolida, lincomysin dan virginiamycin (Angulo *et. al.*, 2004).

Penggunaan antibiotika yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan dapat menimbulkan residu pada produk ternak. Residu antibiotika dapat menimbulkan alergi, keracunan, gagalnya pengobatan akibat resistensi, dan gangguan jumlah mikroflora dalam saluran pencernaan (Murdiati, 1997).

Rahayu (2014) menyatakan bahwa residu dapat ditemukan akibat penggunaan obat-obatan, termasuk antibiotika, pemberian *feed additive* ataupun hormon pemacu pertumbuhan hewan. Senyawa obat yang masuk kedalam tubuh ternak tidak dapat seluruhnya diekskresi dari jaringan dan akan tertahan dalam jaringan tubuh sebagai residu.

Pemakaian antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan dapat menimbulkan efek samping, antara lain residu pada produk akhir hasil ternak yang berupa telur, daging dan susu dalam penelitiannya menyatakan, pemberian *feed additive Oksitetrasiklin* dan *Spiramycin* selama 8 minggu akan meninggalkan residu di dalam hati dan daging ayam yang lebih besar dibanding dengan jika pemberian *feed additive* hanya 4 minggu (Indrawani, 1987).

Pemakaian antibiotik dalam bidang peternakan perlu diperhatikan waktu hentinya pemberian antibiotik tersebut, yaitu jarak antara pemberian antibiotik terakhir sampai dengan produk ternak tersebut (daging, telur dan susu) boleh dikonsumsi manusia (Kusumaningsih, dkk, 1996).

Dampak negatif dari pemakaian antibiotic secara luas yang tidak terkontrol dalam dunia peternakan adalah timbulnya residu yang dapat menyebabkan penurunan populasi mikroflora yang diperlukan oleh manusia dan resistensi terhadap antibiotika (Barton, 2000).

FAO/WHO (2010), menetapkan batas maksimum residu (BMR) spiramisin pada produk ternak asal ayam sebesar 0,6 ppm (600 µg/kg) (hati), 0,3 ppm (300 µg/kg) (lemak) dan 0,2 ppm (200 µg/kg) (daging). Nilai BMR tersebut diperhitungkan sebagai penjumlahan konsentrasi spiramisin dan neospiramisin untuk residu dalam daging sapi dan ayam. Adapun BMR yang diizinkan di Indonesia adalah 0,2 ppm (200 µg/kg) (Dewan Standarisasi Nasional, 2000).

F. Susut Masak

Susut masak adalah berat yang hilang selama pemasakan, makin tinggi suhu pemasakan dan atau makin lama waktu pemasakan, makin besar pula kadar cairan daging yang hilang sampai mencapai tingkat yang konstan. Susut masak merupakan indikator nilai nutrisi daging yang berhubungan dengan kadar jus daging, yaitu banyaknya air yang terikat di dalam dan di antara serabut otot. Daging dengan susut masak yang lebih rendah mempunyai kualitas yang relatif lebih baik daripada daging dengan susut masak yang lebih besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit (Soeparno, 1992).

Susut masak merupakan indikator nilai nutrisi daging sehubungan dengan jus daging yaitu banyaknya air yang berikatan didalam dan diantara serabut otot. Daging dengan susut masak lebih rendah mempunyai kualitas relatif lebih baik dibandingkan dengan susut masak lebih besar. Selain daya ikat air dan susut masak, faktor lain yang mempengaruhi kualitas fisik daging ayam adalah keempukan. Keempukan daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sebelum pemotongan (*antemortem*) meliputi genetik, manajemen, spesies, fisiologis ternak, dan umur. Faktor setelah pemotongan (*postmortem*) meliputi pelayuan, pembekuan, metode pengolahan, dan penambahan bahan pengempuk (Soeparno, 2009).

Susut masak atau kehilangan cairan pada waktu pemasakan dipengaruhi oleh pH, temperatur, dan lama pemasakan serta tipe otot. Selain itu juga dipengaruhi oleh bangsa, umur ternak dan pakan. Ada keselarasan antara susut masak yang menaik dengan pH dan dayas ikat air yang semakin menurun. Daging yang berkualitas mempunyai susut masak yang rendah (Lawrie, 1995).

G. pH daging

Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah pemotongan. Proses pemotongan sangat berpengaruh terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Setelah ternak dipotong akan terjadi perubahan secara fisik maupun kimia sampai dihasilkan daging. Proses glikolisis setelah ternak dipotong berpengaruh pada nilai pH. Semakin lama waktu postmortem akan terjadi penurunan pH yang semakin rendah akibat proses konversi otot menjadi daging pada jarak waktu postmortem tertentu. Nilai pH ultimat daging yang normal

berkisar antara 5,4 - 5,8 pada 6 jam postmortem dan warna daging akan menjadi merah cerah (Arbele *et al.*, 2001).

Derajat keasaman (pH) daging tidak dapat diukur segera setelah pemotongan (biasanya dalam waktu 45 menit) untuk mengetahui penurunan pH awal. Pengukuran selanjutnya biasanya dilakukan setidaknya-tidaknya setelah 24 jam untuk mengetahui pH akhir dari daging atau karkas. Daging ayam berserat halus dan warna sedikit pucat, sehingga dapat dikelompokkan dalam golongan daging putih. Serabut otot dengan konsentrasi mioglobin tinggi adalah aerobik atau mempunyai kemampuan aerobik-anaerobik. Otot pucat pada suatu karkas mengandung banyak serabut putih anaerobik dengan kandungan glikogen yang tinggi (Soeparno, 2005).

Penurunan pH akan mempengaruhi sifat fisik daging. Laju penurunan pH otot yang cepat akan mengakibatkan rendahnya kapasitas mengikat air, karena meningkatnya kontraksi aktomiosin yang terbentuk, dengan demikian akan memeras cairan keluar dari dalam daging. Suhu tinggi juga dapat mempercepat penurunan pH otot pascamortem dan menurunkan kapasitas mengikat air karena meningkatnya denaturasi protein otot dan meningkatnya perpindahan air ke ruang ekstraseluler (Lawrie, 1996).

Penurunan kapasitas mengikat air ini dapat diketahui dengan mengukur eksudasi cairan pada daging mentah atau kerut pada daging masak, sebaliknya pada pH akhir yang tinggi dapat menyebabkan daging berwarna gelap dan permukaan daging menjadi sangat kering karena cairan daging terikat secara erat dengan protein (Lawrie, 1996).

H. Keempukan

Keempukan dan tekstur daging adalah penentu yang paling penting pada kualitas daging. Faktor yang mempengaruhi keempukan daging digolongkan menjadi faktor antemortem seperti genetik, bangsa dan fisiologi, faktor umur, manajemen, jenis kelamin, dan spesies. Faktor postmortem di antaranya meliputi proses *chilling*, refrigerasi, pelayuan, dan pembekuan termasuk lama dan temperatur penyimpanan, dan metode pengolahan, termasuk metode pemasakan dan penambahan bahan pengempuk. Keempukan bisa bervariasi di antara spesies, bangsa ternak dalam spesies yang sama, potongan karkas, dan di antara otot, serta pada otot yang sama (Soeparno, 1998).

Keempukan adalah satu pelengkap sensoris yang penting pada daging. Keempukan adalah salah satu kriteria mutu yang melibatkan mekanisme degradasi protein-protein daging. Pakan yang digunakan mengandung protein yang relatif sama berkisar antara 21,27 – 21,56 sehingga menghasilkan keempukan yang relatif sama. Degradasi protein dapat disebabkan oleh enzim yang ada pada sel-sel daging itu sendiri maupun enzim-enzim protease yang sengaja ditambahkan dari luar. Otot daging mengandung kolagen yang merupakan protein struktural pokok pada jaringan ikat dan mempunyai pengaruh besar terhadap keempukan daging. Distribusi kolagen pada otot skeletal tidak merata tergantung pada aktivitas fisik dari masing-masing otot. Jumlah dan kekuatan kolagen dapat meningkat sesuai dengan umur, ikatan silang kovalen meningkat selama pertumbuhan dan perkembangan ternak dan kolagen menjadi lebih kuat (Soeparno, 1998).

Komponen utama daging yang andil terhadap keempukan atau kealotan, yaitu jaringan ikat, serabut-serabut otot, dan jaringan adipose. Jaringan ikat lebih sedikit adalah lebih empuk daripada otot yang mengandung jaringan ikat dalam jumlah yang lebih besar (Soeparno, 1992) dan semakin tinggi lemak marbling akan membuat daging semakin empuk. Daging yang empuk adalah hal yang paling dicari konsumen (Komariah *et al.*, 2004). Semakin menurun nilai daya putus daging maka semakin empuk daging tersebut (Maruddin, 2004). Hoffman *et al.*, (2003) melaporkan bahwa nilai pH daging mempunyai hubungan negatif dengan daya putus daging. Daging dengan nilai pH tinggi cenderung memiliki nilai daya putus daging yang rendah.

Keempukan dengan hasil penelitian memiliki rata-rata berkisar antara 0,06 - 0,07 yang relatif sama dikarenakan umur pemotongan pada ayam tersebut yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat (Soeparno, 1998) bahwa jumlah dan kekuatan kolagen dapat meningkat sesuai dengan umur, ikatan silang kovalen meningkat selama pertumbuhan dan perkembangan ternak dan kolagen menjadi lebih kuat. Berdasarkan hasil penelitian nilai keempukan daging rendah menunjukkan bahwa daging yang dihasilkan semakin padat dan tidak berlemak. Hal ini disebabkan karena daging yang dihasilkan dari kelima perlakuan ransum mempunyai kandungan lemak daging yang relatif sama sehingga menghasilkan nilai keempukan yang tidak nyata. Secara teori semakin tinggi tingkat energi maka lemak yang dihasilkan semakin banyak sehingga keempukan daging meningkat (Soeparno, 1998).

H. Daya Ikat Air

Pengujian daya mengikat air merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar kemampuan daging dalam mengikat air bebas. Daging dengan daya ikat air rendah akan kehilangan banyak cairan, sehingga terjadi kehilangan berat. Semakin kecil nilai daya ikat air, maka susut masak daging semakin besar, sehingga kualitas daging semakin rendah karena banyak komponen-komponen terdegradasi. Selain daya ikat air dan susut masak, faktor lain yang mempengaruhi kualitas fisik daging ayam adalah keempukan. Keempukan daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sebelum pemotongan (antemortem) meliputi genetik, manajemen, spesies, fisiologis ternak, dan umur. Faktor setelah pemotongan (postmortem) meliputi pelayuan, pembekuan, metode pengolahan, dan penambahan bahan pengempuk (Soeparno, 1998).

Menurut Soeparno (1998) menyatakan bahwa daya ikat air dipengaruhi oleh umur, spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan aditif, berat potong atau berat karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak, dan perlakuan sebelum dan setelah pemotongan dan lemak intramuskuler, serta fungsi otot (Lawrie, 1995).

Oktaviana (2009) menyatakan bahwa semakin meningkatkan kadar protein daging ayam broiler, sehingga DIA daging semakin meningkat karena kemampuan protein untuk mengikat air secara kimiawi, dan semakin menurun kadar lemak daging. Daging yang mempunyai kadar lemak tinggi mempunyai nilai DIA lebih tinggi daripada daging yang kandungan lemaknya rendah. Kandungan serat kasar yang terlalu tinggi di dalam pakan menyebabkan pakan tidak dapat dicerna sehingga dapat membawa zat makanan yang dapat dicerna ikut

keluar dengan feses (Wahju, 1997). Selain itu menurut Parakkasi (1990) menyatakan bahwa kandungan serat kasar dalam pakan yang meningkat dapat menyebabkan daya cerna menurun sehingga ayam pedaging kurang mampu memanfaatkan zat makanan. Hal tersebut menyebabkan kadar lemak turun, sehingga DIA turun. Otot dengan kadar lemak tinggi akan mempunyai DIA yang tinggi, demikian pula sebaliknya apabila kadar lemak daging tersebut rendah maka DIA yang dihasilkan akan rendah pula (Soeparno, 1998).

Lawrie (2003) menyatakan bahwa daya mengikat air daging sangat dipengaruhi oleh pH, semakin tinggi pH akhir semakin tinggi daya mengikat air atau nilai mgH_2O rendah. Tingkat penurunan pH postmortem berpengaruh terhadap daya mengikat air. Soeparno (2005) menambahkan daya ikat air menurun dari pH tinggi sekitar 7 – 10 sampai pada pH titik isoelektrik protein-protein daging antara 5,0 – 5,1. Pada pH isoelektrik ini protein daging tidak bermuatan dan solubilitasnya minimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018. Bertempat di Kandang unggas Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat

a. Kandang

Kandang yang digunakan adalah sistem “litter” dengan ukuran kandang adalah 75 x 100 cm, masing-masing dilengkapi dengan tempat pakan dan minum serta lampu pijar berdaya 60 watt digunakan sebagai pemanas. Lampu dinaikkan sedikit demi sedikit sesuai dengan bertambahnya umur ayam. Lampu digunakan sebagai alat pemanas sampai umur 3 minggu. Setelah 3 minggu sampai penelitian selesai lampu digunakan sebagai alat penerang. Persiapan broiler dipelihara dari dari DOC sampai umur 35 hari dengan kandang yang diberi serbuk gergaji dengan ketebalan 7 cm dan diganti setiap 1 kali seminggu.

b. Peralatan yang digunakan

Timbangan analitik digital 5 kg untuk menimbang DOC dan menimbang bobot badan ayam setiap akhir minggu, timbangan manual kapasitas 10 kg untuk menimbang ransum dan sisa ransum, plat aluminium digunakan untuk penimbangan broiler, tempat makan kapasitas 1 kg dan minum kapasitas 1 liter, gelas ukur untuk mengukur air minum dan peralatan kebersihan.

2. Bahan

a. Ayam Percobaan

Ayam yang digunakan starin cob 500 sebanyak 36 ekor anak ayam dengan umur 1 (satu) hari dengan tidak membedakan jenis kelamin (Unsexed), ayam mendapatkan satu perlakuan ransum dengan 4 perlakuan 3 kali ulangan dan setiap ulangan terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam.

b. Bahan Penyusun Ransum

Bahan penyusun ransum terdiri dari jagung, dedak, kacang kedelai, Meat Bone Meal (MBM), minyak, kapur, mineral, vitamix dan garam. Ransum penelitian memiliki kandungan protein ransum 22%.

c. Kandungan zat-zat makanan dan susunan ransum penelitian

Tabel 3. Kandungan Zat-Zat Makanan Ransum Penelitian

No	Kandungan Nutrisi	Jumlah
1	Protein (%)	22,98
2	Lemak kasar (%)	9,07
3	Serat kasar (%)	7,61
4	BETN (%)	54,52
5	Abu(%)	5,81
6	Air	13,06

Sumber: Hasil Analisis Bahan Ransum Dilaboratorium Kimia Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, 2018.

Tabel 4. Susunan Ransum Penelitian

No	Bahan pakan	Komposisi
1	Jagung	53
2	Dedak	6
3	Kacang kedelai	28
4	Meat Bone Meal (MBM)	8
5	Minyak	3
6	Kapur	0,8
7	Mineral	0,3
8	Vitamix	0,5
9	Garam	0,4
Total		100

3. Vaksin dan Obat-obatan

Untuk pencegahan tetelo (New Castle Disease) dilakukan melalui vaksinasi. Jenis vaksin yang digunakan adalah medivac *ND-IB* yang pemberiannya dilakukan 1 kali selama penelitian pada umur 4 hari melalui tetes mata.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. Metode Penelitian

1. Tahap Persiapan

Kandang yang digunakan pada penelitian ini terlebih dahulu dibersihkan dengan memakai air yang ditambahkan karbol anti kuman, tujuannya yakni memutuskan rantai kehidupan mikroorganisme yang merugikan. Tirai dipasang pada sisi kandang, sedangkan bagian atas dibiarkan terbuka. Peralatan listrik, tempat pakan dan tempat air minum disiapkan. Sehari sebelum anak ayam dimasukkan ke dalam kandang seluruh peralatan listrik dan perlengkapan kandang diperiksa kembali sehingga pada saat anak ayam masuk seluruhnya dapat berfungsi dengan baik.

Perlakuan diberikan pada ayam sejak umur 1 hari sampai panen. Jumlah ayam perlakuan sebanyak 36 ekor dipilih secara acak dan dimasukkan ke dalam kandang yang telah disekat-sekat dengan bambu masing-masing 3 ekor. Setiap sekat-sekat kandang dilengkapi dengan lampu pijar 60 watt sebanyak 1 buah.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pengelompokan ayam

Anak ayam yang baru tiba diberi air gula dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan semula. Selanjutnya DOC umur satu hari tersebut ditimbang bobot badan awalnya. Setiap unit kadang diberi nomor sesuai dengan pengacakan perlakuan dan ulangan dengan cara menggunakan potongan kertas yang telah di tulisi kemudian diambil secara acak. Penempatan ayam kedalam unit kandang dilakukan secara acak pula.

b. Pemberian Ransum, antibiotik dan probiotik

Pemberian ransum dan air minum diberikan secara adlibitum. Ransum tersebut telah dicampurkan dengan antibiotik *Zink bacitracin* sebanyak 0,1 gram sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Probiotik probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) sebanyak $(1,5 \times 10^9)$ cfu/ml/hari), juga diberikan dengan cara mencampurkan pada air minum ayam sesuai dengan perlakuan yang diberikan.

E. Parameter yang Diamati

Setelah proses pemeliharaan, pada akhir penelitian dilakukan pengukuran susut masak daging, mengamati pH daging, pengukuran daya ikat air dan kemampuan daging pada tiap objek penelitian (broiler) untuk diamati :

a. Susut Masak

Pengambilan sampel dilakukan diakhir penelitian yaitu dengan cara pemotongan broiler umur 35 Hari. Kemudian lakukan penyayatan dibagian media ventral daerah abdomen sehingga otot dada dapat dilepas. Seluruh organ pencernaan dikeluarkan lalu daging diambil pada bagian dada dengan terlebih dahulu mencabut bulu lalu daging dipisahkan antara tulang dan daging (Murtidjo, 2003).

Sampel daging yang digunakan pada pengujian susut masak adalah daging bagian dada. Sampel daging ditimbang seberat ± 20 g berbentuk balok ukuran penampang kira-kira 2 x 3 cm dengan arah serabut otot sejajar dengan ujung sampel, kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip lalu diberi label dan ditutup rapat agar pada saat perebusan air tidak dapat masuk ke dalam kantong plastik,

kemudian sampel direbus dalam *Waterbath* pada suhu 80°C selama satu jam. Setelah perebusan, sample daging diangkat dari *Waterbath* lalu didinginkan dengan memasukan ke dalam gelas piala yang berisi air dingin dengan temperature 10°C selama 15 menit, kemudian sample dikeluarkan dari plastik klip dan dikeringkan dengan kertas tissue, dan dilakukan penimbangan kembali pada neraca analitik (Soeparno, 2005).

Susut masak (SM) dihitung menggunakan rumus :

$$CL = \frac{B1 - B2}{B1} \times 100\%$$

Keterangan:

B1 = berat awal sampel

B2 = kehilangan berat

CL = Nilai Susut Masak (*Cooking Loss*) % (Soeparno, 1992).

b. Keempukan Daging

Uji ini menggunakan sampel hasil pengukuran pada uji susut masak, sampel dibentuk sesuai dengan model lubang (silinder) pada alat pemutus serat daging (*CD-Shear Force*). Sampel daging dimasukkan pada lubang dengan arah sejajar pada serat daging. Kemudian tuas alat ditarik kebawah memotong tegak lurus terhadap serat daging. Hasil beban tarikan akan terbaca pada skala dengan satuan kilogram (Kg). Keempukan daging dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{DPD}(\text{kg}/\text{cm}^2) = \frac{A}{L}$$

Keterangan :

DPD = Nilai Daya Putus Daging (Kg/Cm²)

A = Beban Tarikan (Kg)

L = Luas Penampang Sampel ($\pi.R^2 = 3,14 \times 0,635^2 = 1,27 \text{ cm}^2$)

$\pi = 3,14$

R = Jari-jari lubang sampel (0,635 Cm) (Soeparno, 2005).

c. pH Daging

Pengukuran nilai pH karkas dilakukan dengan menggunakan pH meter distandarisasi pada pH tertentu. Sampel yang digunakan adalah daging dada. Ujung elektroda ditekan pada permukaan daging di beberapa tempat. Ujung elektroda pH meter dilepas dari permukaan daging bila hasil pembacaan nilai pH telah konstan. Pengukuran pH diambil 3 kali pada daging broiler secara acak (Soeparno, 2005).

d. Daya Ikat Air

Pengukuran daya ikat air menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Kadar Air} = \frac{\text{MgH}_2\text{O (kandungan air bebas)}}{300 \text{ mg}} \times 100\%$$

Pengukuran Daya Ikat Air (Honikel dan Hamm, 1994), Daya ikat air (WHC) diatas diukur dengan menggunakan metode FPPM (the Filter Paper Press Method), untuk mencari rumus diatas maka dioerlukan pengukuran sebagai berikut :

1) Pengukuran Kandungan Air Bebas

Sampel daging bagian dada seberat 0,3 gram diletakan pada kertas saring Watman 41 dan dipress diantara dua palt kaca dan dibebani dengan pemberat 35 kg selama 5 menit. Setelah 5 menit kertas saring beserta sampel diambil. Pengukuran area basah menggunakan kertas milimeter blok, dan kandungan air bebas dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Kandungan air bebas} = \frac{\text{Area basah}}{0.0968}$$

F. *Rancangan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 3 ekor broiler sehingga terdapat 12 unit percobaan dengan perlakuan (P) yaitu:

P_0 = Ransum basal + kontrol

P_1 = Ransum basal + Probiotik multi strain 1,5 ml/hari (1-35 hari).

P_2 = Ransum Basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 gram/hari (1-35 hari).

P_3 = Ransum Basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 gram/hari (1-21 hari) +
Probiotik multi strain 1,5 ml/hari (22-35 hari).

G. *Analisis Data*

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran dianalisis dengan analisis varians berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4x3 yaitu 4 perlakuan dan 3 ulangan. Apabila perlakuan berpengaruh nyata dilanjutkan dengan Uji Duncan. Data dianalisis dengan menggunakan model matematika yaitu:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke- i dari pemberian antibiotik dan probiotik

ke- j

μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke- i

ϵ_{ij} = Galat

i = P0, P1, P2, P3, (Perlakuan)

j = 1,2,3, (Ulangan)

Adapun bagan Analisis Ragam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel. 5 Analisis Sidik Ragam

Sumber Keragaman	Umalah Kuadrat	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	F Hitung
				0,05/0,01
Perlakuan	JKP	Dbp-1	JKP/dbp	KTP/KTG
Galat	JK	Dbt-dbp	JKG/dbG	

Bila hasil Sidik Ragam menunjukkan perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT (Steel dan Torrie, 1991).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

Hasil penelitian selama 35 hari yang mencakup pemberian antibiotik dan probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) terhadap susut masak, keempukan daging, pH dan daya ikat air pada daging broiler yang di sajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rataan susut masak, keempukan daging, pH dan daya ikat air pada broiler.

Parameter Yang diukur	Perlakuan				p-value
	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃	
Susut Masak (%)	27.75±3.65	26.7±4.78	29.97±0.99	28.02±2.11	0.67
Keempukan daging (kg/cm ²)	1.36±0.43	1.36±0.36	1.73±0.88	2.49±0.95	0.24
pH Daging	6.3±0.68	6.1± 0.08	6.3±0.45	6.9±0.31	0.23
Daya Ikat Air%	23.44±7.32	48.05±35.92	32.82±10.74	39.85±38.73	0.73

Keterangan: P₀ = Ransum basal (Kontrol), P₁ = Ransum basal + Probiotik multi strain 1,5 ml/hari, (1-35 hari), P₂ = Ransum basal + Antibiotik *Zink* Bacitracin 0,1 g/hari, (1-35 hari), P₃ = Ransum basal + Antibiotik *Zink* Bacitracin 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik multi strain 1,5 ml/hari, (1-35 hari)

B. Pembahasan

1. Susut Masak

Berdasarkan analisis sidik ragam, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai susut masak pada daging ayam broiler yang diberikan pakan dengan penambahan antibiotik dan air minum dengan penambahan probiotik menunjukkan perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap susut masak daging broiler.

Berdasarkan Tabel 6 Rata-rata hasil penelitian terhadap susut masak berkisar antara 26,7-29,97 menunjukkan bahwa P₁ dengan pemberian Probiotik pada air minum sebanyak 1,5 ml/hari selama 35 hari cenderung berpengaruh lebih baik terhadap susut masak dibandingkan dengan perlakuan lainnya pada daging broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno (2009), yang menyatakan bahwa daging dalam jumlah susut masak rendah mempunyai kualitas yang lebih baik karena kehilangan nutrisi saat perebusan akan lebih sedikit. Lawrie (2003), juga menyatakan bahwa daging yang mempunyai susut masak yang rendah mempunyai kualitas fisik yang relatif lebih baik dari pada daging dengan susut masak yang lebih besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan lebih sedikit.

Pemberian probiotik akan membantu proses pencernaan serat kasar dalam usus ayam broiler. Serat kasar yang dikonsumsi ayam broiler akan menjerat lemak sehingga zat makanan yang akan diserap menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutardi (1997), yang menyatakan bahwa serat kasar dalam saluran pencernaan unggas dapat menjerat lemak. Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap susut masak karena lemak intramuskuler menghambat atau mengurangi cairan daging yang keluar selama pemanasan, meskipun pada daging yang mengandung lemak intramuskuler yang lebih besar akan kehilangan lemak yang lebih besar. Kandungan lemak yang lebih besar akan meningkatkan kemampuan menahan air oleh protein daging, karena adanya lemak intramuskuler yang menutup jaringan mikrostruktur daging, disamping itu lemak di permukaan daging akan meleleh saat dimasak dan menyelimuti daging sehingga susut masak lebih rendah. Hal

tersebut yang menyebabkan perlakuan pemberian probiotik pada daging broiler terhadap susut masak lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

Pengaruh tidak nyata pemberian antibiotik dan probiotik terhadap susut masak ($P < 0,05$) diduga disebabkan karena nilai pH dan daya ikat air yang juga tidak berpengaruh nyata. Susut masak juga dipengaruhi oleh daya ikat air ayam broiler, semakin tinggi daging mengikat air maka susut masak juga akan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Lawrie (2003), yang menyatakan bahwa daya mengikat air daging mempengaruhi susut masak daging, apabila daya mengikat air meningkat maka akan mengurangi penyusutan daging selama dimasak. Berdasarkan perlakuan nilai susut masak yang diperoleh dalam penelitian juga bervariasi antara 26,7%-29,97%. Tingginya nilai susut masak dalam penelitian juga dipengaruhi oleh pH, panjang sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut otot, ukuran dan berat sampel daging serta penampang lintang daging. Besarnya susut masak dipengaruhi oleh banyaknya kerusakan membran seluler, banyaknya air yang keluar dari daging, umur simpan daging, degradasi protein dan kemampuan daging untuk mengikat air.

Tinggi rendahnya Susut masak juga dipengaruhi oleh temperatur dan lama pemasakan. Lama pemasakan daging yaitu 1 jam dengan temperature 80°C , semakin tinggi temperatur pemasakan maka semakin besar kadar cairan daging yang hilang. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno (1998), yang menyatakan bahwa pada umumnya nilai susut masak daging ayam bervariasi antara 23.80%-29.44% dengan kisaran 15–40%. Didukung dengan pernyataan Lawrie (1995),

yang menyatakan bahwa susut pada waktu pemasakan dipengaruhi oleh pH, temperatur, dan lama pemasakan serta tipe otot.

2. Keempukan Daging

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian antibiotik pada pakan dan probiotik cair pada air minum tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap keempukan daging broiler. Berdasarkan Tabel 6. hasil penelitian pada penelitian ini nilai tertinggi pada keempukan daging broiler yaitu P3 ($2,49 \text{ Kg/Cm}^2$) yang diberikan perlakuan antibiotik 0,1 gram 1-7 hari dan probiotik 1,5 ml/hari 8-35 hari. Sedangkan nilai keempukan daging broiler paling rendah yaitu Pada perlakuan P0 dan P1 yaitu mempunyai nilai keempukan yang sama yaitu P0 ($1,36 \text{ Kg/Cm}^2$) dengan tanpa perlakuan (control) atau tanpa diberikan antibiotik dan probiotik dan P1 ($1,36 \text{ Kg/Cm}^2$) dengan penambahan probiotik pada air minum ayam broiler. Sedangkan nilai keempukan daging ayam pada penelitian yang paling tinggi adalah P3 ($2,49 \text{ Kg/Cm}^2$) dengan perlakuan pemberian antibiotic 1-21 hari dan probiotik 22-35 hari.

Berdasarkan Tabel 6. di atas menunjukkan bahwa nilai P1 mempunyai keempukan yang lebih bagus dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Karena, semakin tinggi nilai keempukan maka daging tersebut akan semakin alot atau keras dan sebaliknya apabila nilai keempukan semakin rendah maka itu menunjukkan daging semakin empuk atau berkualitas baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Maruddin (2004) yang menyatakan bahwa, semakin menurun nilai daya putus daging maka semakin empuk daging tersebut.

Daya putus daging atau keempukan daging sangat berkaitan dengan nilai pH daging. Berdasarkan pada Tabel 6 nilai pH yang paling rendah terdapat pada P1 dibanding dengan perlakuan lainnya. Hal ini menandakan bahwa semakin rendah nilai pH maka daya putus daging semakin bagus. Hal ini sesuai dengan pendapat Hoffman *et al.*, (2003), melaporkan bahwa nilai pH daging mempunyai hubungan negatif dengan daya putus daging. Daging dengan nilai pH tinggi cenderung memiliki nilai daya putus daging yang rendah.

Penambahan probiotik dalam air minum broiler dapat meningkatkan protein dalam usus ayam dan berdampak pada daging broiler tersebut. Pada penelitian ini semua daging yang digunakan adalah daging dada. Otot dada diduga tidak banyak melakukan aktifitas, mengingat ayam broiler termasuk spesies unggas yang jarang bergerak, sehingga otot dada lebih sedikit tersusun myofibril dan kurang mengandung protein daging yang menyebabkan kapasitas menahan air lebih rendah sehingga keempukan daging akan lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat lawrie (1995), yang menyatakan bahwa otot yang banyak melakukan aktivitas memiliki serabut myofibril yang lebih banyak dan protein daging sebagai penghubung didalam otot mempunyai pengaruh penting terhadap nilai keempukan daging. Makin tinggi kandungan protein daging maka nilai keempukan daging makin rendah.

Faktor yang juga dapat mempengaruhi keempukan daging broiler kurang baik yaitu pada saat ayam terlalu banyak bergerak pada proses pemotongan karena pemotongan dilakukan secara bergantian sehingga ayam lainnya terlalu banyak bergerak. Soerparno (1998), menyatakan bahwa ternak yang banyak

bergerak pada saat pemotongan, perkembangan proses rigormortisnya akan menghasilkan fase penundaan dan fase cepat yang singkat, dan pada saat temperature tubuh kekakuan akan diikuti dengan pemendekan otot. Otot yang berkontraksi atau memendek menjelang rigormortis akan menghasilkan daging dengan panjang sarkomer yang pendek, lebih banyak mengandung kompleks aktomiosin atau ikatan antar filamen. Sehingga daging menjadi kurang empuk dan mempunyai daya ikat air yang rendah (Soeparno, 1998).

Proses perebusan daging adalah salah satu cara untuk mengempukan daging dengan pemasakan yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein, hal ini juga dapat mempengaruhi keempukan pada daging broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno (2009), yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keempukan daging yaitu faktor postmortem, salah satunya yaitu metode pemasakan dengan cara perebusan.

3. pH daging

Berdasarkan hasil penelitian nilai pH yang diberikan antibiotik pada pakan ternak dan probiotik pada air minum tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap pH daging ayam broiler. Berdasarkan Tabel 6. pH yang paling tinggi yaitu P3 ($6,9 \pm 0,31$) yaitu pemberian antibiotik 1-21 hari dan probiotik 22-35 hari. Sedangkan nilai pH yang paling rendah yaitu P1 ($6,1 \pm 0,08$) yaitu pemberian probiotik 1-35 hari.

Berdasarkan nilai pH diatas, nilai pH P3 mempunyai nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan 3 perlakuan lainnya dan nilai tersebut juga dapat dikatakan sangat tinggi karena kisaran pH normal yaitu 5,10-6,10. Hal ini dapat

terjadi karena pada jangka waktu proses pemotongan dan pengambilan sampel memakan waktu yang agak lama hingga akhirnya dilakukan pengujian dilaboratorium. Sehingga ini dapat menyebabkan kenaikan pH yang relative tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Buckle *et, al* (1987) yang menyatakan bahwa, pH akhir daging ditentukan oleh besar kecilnya kandungan glikogen otot, jaringan otot hewan pada saat masih hidup mengandung glikogen yang berfungsi sebagai sumber energy pada saat pemotongan, cadangan glikogen berhubungan dengan isitrahahat dan ketengan ternak. Dalam hal ini ternak banyak melakukan aktivitas gerak sehinggaa cadangan glikogen dalam otot daging sedikit. Setelah ternak dipotong, proses glikolisis akan menghasilkan asam laktat dalam jumlah yang lebih sedikit, Karena cadangan glikogennya sedikit. Dengan produksi asam laktat yang rendah tersebut maka secara perlahan pH daging akan naik.

4. Daya Ikat Air

Kemampuan menahan air menjadi faktor penting terutama pada daging yang akan digunakan dalam industri pangan. Daya ikat air daging adalah kemampuan protein daging mengikat air di dalam daging, sehingga daya ikat air ini dapat menggambarkan tingkat kerusakan protein daging. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian antibiotik pada pakan dan probiotik cair pada air minum tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap daya ikat air daging broiler. Berdasarkan Tabel 6. nilai daya ikat air terendah yaitu P0 ($23,44\% \pm 7,32$) yang tanpa perlakuan atau control. Sedangkan nilai daya ikat paling tinggi yaitu P1 ($48,05\% \pm 35,92$) yaitu menggunakan probiotik pada air minum 1-35 hari. Daya ikat air pada penelitian ini berada dalam kisaran normal. Berdasarkan Tabel 6.

Nilai daya ikat air paling bagus yaitu pada P1 (48,05%) Karena semakin tinggi daya ikat air maka kualitas daging semakin bagus. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno (2009), daya ikat air daging sekitar 20% - 60%, kemampuan daging untuk menahan air merupakan suatu sifat penting karena dengan daya ikat air yang tinggi, maka daging mempunyai kualitas yang baik.

Daya ikat air juga dipengaruhi oleh pH daging dipengaruhi oleh pH, semakin tinggi pH akhir semakin tinggi daya mengikat air atau nilai mgH₂O rendah. Tingkat penurunan pH postmortem berpengaruh terhadap daya mengikat air. Nilai WHC (Water Holding Capacity) cenderung menurun, ini bisa disebabkan karena jumlah nutrisi yang tersedia berbeda di antara pakan. Peningkatan atau penurunan konsumsi pakan berhubungan dengan kualitas pakan yang tersedia, sehingga dapat mempengaruhi karakteristik atau kualitas daging. Nilai pH yang tinggi dapat memperbaiki daya ikat air (Buckle, 1985). Saat pH daging meningkat, maka daya ikat air juga akan ikut meningkat. Rendahnya nilai pH daging mengakibatkan struktur daging terbuka sehingga menurunkan daya ikat air, dan tingginya nilai pH daging mengakibatkan struktur daging tertutup sehingga daya ikat air tinggi. Sesuai dengan pendapat Pedersen, 1971 di dalam Soeparno (2005) yang menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi daya ikat air daging, diantaranya pH, bangsa, pembentukan aktomiosin (rigormortis), temperatur dan kelembaban, pelayuan karkas, tipe daging dan lokasi otot, fungsi otot, umur, pakan, dan lemak intramuskuler.

Daya ikat air (WHC) daging adalah kemampuan protein daging dalam mengikat air di dalam daging, sehingga WHC ini dapat menggambarkan tingkat

kerusakan protein daging. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lawrie (2003) yang menyatakan bahwa Protein daging berperan dalam pengikatan air daging. Kadar protein daging yang tinggi menyebabkan meningkatnya kemampuan menahan air daging sehingga menurunkan kandungan air bebas, dan begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi jumlah air yang keluar, maka daya mengikat airnya semakin rendah. Menurut Ockerman (1978), juga berpendapat bahwa perbedaan nilai daya mengikat air daging dipengaruhi oleh kandungan protein dan karbohidrat daging, kandungan protein daging yang tinggi akan diikuti dengan semakin tingginya daya mengikat air.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sidik ragam pemberian antibiotik pada pakan ternak dan probiotik pada air minum berpengaruh tidak nyata ($P < 0,05$) terhadap susut masak, keempukan, pH dan daya ikat air pada daging broiler. Walaupun demikian, dari ke4 perlakuan tersebut pemberian probiotik 2ml/liter air minum/hari selama 1-35 hari cenderung lebih baik terhadap nilai susut masak, keempukan, pH dan daya ikat air pada daging broiler.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan probiotik cair pada level yang lebih tinggi agar dapat memperbaiki nilai dan kualitas susut masak, ph, keempukan dan daya ikat air pada broiler.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2002. *Meningkatkan Produktifitas Ayam Ras Pedaging*. Agromedia: Jakarta.
- Amrullah, I. K. 2003. *Nutrisi Ayam Broiler*. Bogor. Lembaga Satu Gunungbudi.
- Aberle, E.D., J.C. Forrest, H.B. Hendrick, M.D. Judge dan R.A. Merkel. 2001. *Principles of Meat Science*. W.H. Freeman and Co., San Fransisco.
- Barton , M.D. 2000. *Antibiotic Use in Animal Feed and its Impact on Human Health*. Nutr. Res. Rev. 13: 279 – 299.
- Buckle, K.A., R.A. Edwards, G.A. Fleet, dan M. Wooton. 1987. *Ilmu Pangan Terjemahan Hari P. dan Adiono*. Universitas Indonesia Press. Yogyakarta
- Carr E.G, Dunlap G, Horner R.H, Koegel R.L, Turnbull A.P, Sailor W. 2002. *Positive Behavior Support: Evolution Of An Applied Science*. *Journal of Positive Behavior Interven*
- Casula, G., and S.M. Cutting. 2004. *Why are Probiotics Important Today*. *Appl Environ Microbiol*. June; 70(6): 3189- 3194
- Daud, M. 2005. *Performan dan Kualitas Karkas Ayam Pedaging yang diberi Probiotik dan Prebiotik dalam Ransum*. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Fadilah, R. 2004. *Ayam Broiler Komersial*. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Farida Kusuma Astuti, dkk. 2015. *Ilmu Ternak*. Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya; Malang
- FAO/WHO, 2010. *Maximum Residue Limits For Spiramycin*. Updated up to 32nd session of the Codex Allimentarius Commision 2009.
- Hoffman, L.C., M. Muller, S.W.P. Cloete, and D. Schmidt. 2003. *Comparison of Six Crossbred Lamb Types: Sensory, Physical and Nutritional Meat Quality Characteristics*. *Meat Science*. 65: 1265-1274.
- Jawetz, M. dan Adelberg's. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran*. Salemba Medika, Jakarta.
- Jans, D. 2007. *Probiotics For Animal Nutrition*. FEFANA, EU Association of Feed Additives Producers.

- Jin, L. Z., Y. W. Ho., N. Abdullah and S. Jalaluddin. 1996. *Influence of Dried Lactobacillus Subtilis and Lactobacillus Cultures on Intestinal Microflora and Performance in Broilers*. Asian-Australian Journal Animal Science. 9 (4) : 397- 403.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012.*AL-Qur'an dan Terjemahannya* <https://kemenang.go.id/> (Diakses Tanggal 12 september 2017)
- Komariah, I.I. Arief dan Y. Wiguna. 2004. *Kualitas Fisik dan Mikrobial Daging Sapi yang Ditambah Jahe (Zinger Officinale Roecoe) Pada Konsentrasi dan Lama Penyimpanan yang Berbeda*. Media Peternakan Vol. 28(2):38-87.
- Kusumaningsih A., T. B. Murdiati, and S. Bahri. 1996. *Pengetahuan Peternak Tentang Waktu Henti Obat dan Hubungannya dengan Residu Antibiotika Pada Susu*. Media Kedokteran Hewan, FKH. Universitas Airlangga, Surabaya. 12: 260-267.
- Kusumawati N, Bettysri L.J, Siswa S, Ratihdewanti dan Hariadi. 2003. *Seleksi Bakteri Asam Laktat Indigenus sebagai Galur Probiotik dengan Kemampuan Menurunkan Kolesterol*. Journal Mikrobiologi Indonesia. Vol. 8(2): 39-43.
- Lawrie, R.A. 1995. *Meat Science Third Edition*. The Avi Publishing Company, Inc. Westport. Connecticut.
- _____1996. *Ilmu Daging Terjemahan Aminuddin P*. Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- _____2003. *Meat Science. The 6th ed. Terjemahan*. A. Paraksi dan A. Yudha. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maruddin, F. 2004. *Kualitas Daging Sapi Asap Pada Lama Pengasapan dan Penyimpanan*. Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 4(2):83-90.
- McNaught, C.E. dan MacFie. 2000. *Probiotics in Clinical Practice: a Critical Review of the Evidence*. *Nutr. Research* 21 : 343-353.
- Nahashon, S.N. 1996. *Animal Feed Science Technology*. Elsevier, USA.
- Nettles, C.G. and Barefoot. 1993. *Biochemical and Genetic Characteristics of Bacteriocin of Food-Associated Lactic Acid Bakteria*. *J. Food Prot.* Vol. 56: 338-356.

- Osmanagaoglu, O., Kiran. and Nes. 2011. *A Probiotic Bacterium, Pediococcus pentosaceus OZF Isolated from Human Breast Milk Produces Pediocin AcH/PA-1*. *African Journal of Biotechnology*. Vol. 10 (11): 2070-2079.
- Ratih Eka Dewayani dkk. *Mahasiswa Bagian Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Bagian Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya* .Diterima 7 Februari 2015; diterima pasca revisi 27 Februari 2015
- Rasyaf, M. 2004. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya, Jakarta..
- Rizal. 2006. *Ilmu Nutrien Unggas*. Andalas University Press. Padang.
- Ray, B. 1996. *Probiotics of Lactic Acid Bacteria: Science or Myth in Lactic Acid Bacteria: Current Advance in Metabolism, Genetics and Application*. NATO ASI Series, H 98. Springer-Verlag, Germany.
- Riley W. 1996. Probiotics : *Using and Microorganism of Concern*. In Ray, B dan M. Daesebul. *Food Biopreservatives of Microbial Origin*. CRC Press, London, Tokyo.
- Rahayu, I. 2014. *Prinsip Pengobatan. Husbandry Corner*. <http://imbang.staff.umm.ac.id/?p=81>. Diakses 6 September 2014.
- Saxelin, M .1997. *Lactobacillus GG – a Human Probiotic Strain with Thorough Clinical Documentation*. *Food Rev Int*. Vol. 13: 293–313.
- Suprijatna, E., Atmomarsono. dan Kartasudjana. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Shihab, M. Q. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati, Jakarta.
- Saputri F. 2012. *Pengaruh Pemberian Probiotik Bakteri Asam Laktat (BAL) Pediococcus Pentosaceus terhadap Keseimbangan Mikroflora Usus dan Triglicerida Daging Itik Pitalah*. *Skripsi*. Universitas Andalas. Padang.
- Standar Nasional Indonesia. 2000. *Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Batas Maksimum Residu dalam Bahan Makanan Asal Hewan*. Halaman 10.
- Soeparno. 1992. *Komposisi Tubuh dan Evaluasi Daging Dada sebagai Pedoman Penilaian Kualitas Produk Ayam Kampung Jantan*. *Buletin Peternakan* Vol. 16. Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- _____1992. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta

- _____1998. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Cetakan Ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____2005. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Edisi keempat. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____2009. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 6; 152-156; 289-290; 297-299.
- Steel, R. dan Torrie, J. 1991. *Prinsip dan Prosedur Statistika : Suatu Pendekatan Biometrik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sutardi, T. 1997. *Peluang dan Tantangan Pengembangan Ilmu-Ilmu Nutrisi Ternak*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Nutrisi. Fapet IPB. Bogor.
- Tensiska, 2008. *Serat Makanan*. (Online) www.pustaka.unpad.ac.id/14006/ (Diakses 03 Juli 2017).
- Victoria, M.A., Carmen. and María. 2008. *Wine Chemistry and Biochemistry*. Springer.
- Yuwanta, Tri. 2004. *Dasar Ternak Unggas*. Kanisius. Yogyakarta
- Yeo, J. dan K. Kim, 1997. *Effect of Feeding Diets Containing an Antibiotic, a Probiotic, or Yucca Extract on Growth and Intestinal Urease Activity in Broiler Chicks*. *Poultry Science*. 76: 381-385

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

Analisis Sidik Ragam Pengaruh Pemberian Antibiotik dan Probiotik terhadap Susut Masak, Keempukan Daging, Ph dan Daya Ikat Air Daging Broiler

Rataan Pemberian Antibiotik dan Probiotik Susut Masak Daging Broiler

ulangan	perlakuan				jumlah
	P0	P1	P2	P3	
1	27,85	21,2	29,25	27,6	105,9
2	31,35	29,05	31,1	26,15	117,65
3	24,05	29,85	29,55	30,3	113,72
Jumlah	83,25	80,1	89,9	84,05	337,3
rata-rata	27,75	26,7	29,97	28,02	
Standar deviasi	3,65	4,78	0,99	2,11	

Perhitungan:

1. Faktor Koreksi = $\frac{(337,3)^2}{12}$
= 9480,94
2. JK Total = $(27,87)^2 + (31,35)^2 + \dots\dots\dots(30,3)^2 - FK$
= 99,92
3. JK Perlakuan = $\frac{(83,25)^2 + (80,1)^2 + (89,9)^2 + (84,05)^2}{3} - FK$
= 16,72
4. JK Galat = $99,92 - 16,72$
= 83,20

Tabel Anova

sumber keragaman	DB	JK	KT	F hitung		F tabel	
						5%	1%
Perlakuan	3	16,72	5,57	0,54	tn	4,07	7,59
Galat	8	83,20	10,40				
Total	11	99,92					

Rataan Pemberian Antibiotik dan Probiotik Keempukan Daging Broiler

Ulangan	perlakuan				jumlah
	P0	P1	P2	P3	
1	0.87	1.57	0.94	2.44	5.83
2	1.57	0.94	2.68	1.57	6.77
3	1.65	1.57	1.57	3.46	8.27
Jumlah	4.09	4.09	5.20	7.48	20.87
rata-rata	1.36	1.36	1.73	2.49	1.74
Standar defiasi	0,43	0,36	0,88	0,95	

Perhitungan:

1. Faktor Koreksi = $\frac{(20,87)^2}{12}$
= 36.28
2. JK Total = $(0,87)^2 + (1,27)^2 + \dots\dots\dots,(7,48)^2 - FK$
= 6.52
3. JK Perlakuan = $\frac{(4,09)^2 + (4,09)^2 + (5,20)^2 + (7,48)^2}{3} - FK$
= 2.55
4. JK Galat = $6,52 - 2,55$
= 3.97

Tabel Anova

Sumber keragaman	DB	JK	KT	Fhitung	F tabel		
					5%	1%	
Perlakuan	3	2.55	0.85	1.71	4.07	7.59	tn
Galat	8	3.97	0.50				
Total	11	6.52					

Rataan Pemberian Antibiotik dan Probiotik pH Daging Broiler

Ulangan	Perlakuan				jumlah
	P0	P1	P2	P3	
1	6.8	6.2	6.4	7.2	26.6
2	6.6	6.1	5.8	6.6	25.0
3	5.5	6.1	6.7	6.9	25.2
jumlah	18.9	18.4	18.9	20.7	76.8
rata-rata	6.3	6.1	6.3	6.9	
Standar Deviasi	0,68	0.08	0,45	0,31	

Perhitungan:

1. Faktor Koreksi = $\frac{(76,8)^2}{12}$
= 492,03
2. JK Total = $(6,8)^2 + (6,6)^2 + \dots\dots\dots,(6,9)^2 - FK$
= 2,56
3. JK Perlakuan = $\frac{(18,9)^2 + (18,4)^2 + (18,9)^2 + (20,7)^2}{3} - FK$
= 1,02
4. JK Galat = $2,56 - 1,02$
= 1,54

Tabel Anova

sumber keragaman	DB	JK	KT	F hitung	tn	f tabel	
						5%	1%
Perlakuan	3	1.02	0.34	1.77	tn	4.07	7.59
Galat	8	1.54	0.19				
Total	11	2.56					

Rataan Pemberian Antibiotik dan Probiotik Daya Ikat Air Daging Broiler

Ulangan	Perlakuan				jumlah
	P0	P1	P2	P3	
1	21.10	7.03	21.10	14.06	63.29
2	31.65	73.84	35.16	21.10	161.74
3	17.58	63.29	42.19	84.39	207.45
Jumlah	70.32	144.16	98.45	119.55	432.49
rata-rata	23.44	48.05	32.82	39.85	
Standar Deviasi	7,32	35,92	10,74	38,73	

Perhitungan:

1. Faktor Koreksi = $\frac{(432,49)^2}{12}$
= 15587.26
2. JK Total = $(21,10)^2 + (7,03)^2 + \dots\dots\dots(84,39)^2 - FK$
= 6901.91
3. JK Perlakuan = $\frac{(70,32)^2 + (114,16)^2 + (98,45)^2 + (119,55)^2}{3} - FK$
= 983.93
4. JK Galat = $6901,91 - 983,93$
= 5917.99

Tabel Anova

sumber keragaman	DB	JK	KT	F hitung		F tabel	
						5%	1%
Perlakuan	3	983.93	327.98	0.44	tn	4.07	7.59
Galat	8	5917.99	739.75				
Total	11	6901.91					

Lampiran 2

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 1. Persiapan kandang penelitian



Gambar 2. Penimbangan Antibiotik



Gambar 3. Probiotik yang digunakan



Gambar 4. Vaksin yang digunakan



Gambar 5. Pencampuran air minum dan probiotik



Gambar 6. Penimbangan daging broiler yang akan digunakan



Gambar 7. Pengukuran Keempukan daging broiler



Gambar. 8 Pengepresan daging broiler untuk pengukuran daya ikat air



Gambar 9. Perhitungan kotak kertas untuk menentukan daya ikat air



Gambar 10. Perebusan daging broiler pada *waterbath* untuk mengukur susut masak

BIOGRAFI PENULIS



Andi Febri Astuti Biasa di sapa Febri lahir di Bone 25 Oktober 1996. Lahir dari keluarga yang sederhana, anak kedua dari tiga bersaudara yakni dari pasangan suami istri Andi Arifin dan Andi Murni. Sekarang tinggal di Jl. Bontotangga Paccinongang, kecamatan Somba Opu, Kab Gowa. Penulis pernah belajar di SD INP

12/79 Pitumpidange, selama 6 Tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 4 Bone, Kab. Bone. Pada tahun 2011 penulis mengecap pendidikan di SMA Negeri 11 Bone dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Peternakan melalui jalur SNMPTN pada tahun 2014.

Penulis bersyukur atas karunia Allah SWT sehingga dapat mengenyam pendidikan yang merupakan bekal untuk masa depan dan juga berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama ,keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Penulis memiliki prinsip untuk selalu memotivasi diri “ tidak ada yang tidak mungkin ketika kita terus berusaha dan berdoa, tidak ada usaha yang menghianati hasil”

Wassalamualaikum wr.wb.....