

**PENGARUH PEMBERIAN ANTIBIOTIK DAN PROBIOTIK DALAM
PENINGKATAN PERSENTASE KARKAS, PERSENTASE LEMAK
ABDOMINAL DAN PROTEIN DAGING DADA PADA BROILER**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh :

**WAHYUNI
60700114017**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

ABSTRAK

Nama : Wahyuni
Nim : 60700114017
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul skripsi : Pengaruh Pemberian Antibiotik Dan Probiotik Dalam Peningkatan Persentase Karkas, Persentase Lemak Abdominal Dan Protein Daging Dada Pada Broiler

Tujuan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Mengetahui pengaruh pemberian probiotik multi strain dan antibiotik *Zink Bacitracin* terhadap persentase karkas broiler (2) Mengetahui pengaruh penambahan probiotik multi strain dan antibiotik *Zink Bacitracin* terhadap persentase lemak abdominal karkas broiler dan (3) Mengetahui pengaruh pemberian probiotik multi strain dan antibiotik *Zink Bacitracin* terhadap protein daging dada broiler yang digunakan selama 35 hari. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan 3 ulangan yaitu P₀ (Ransum basal), P₁ (Ransum basal + Probiotik multi strain 1,5 ml/hari (1-35 hari), P₂ = Ransum basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-35 hari), P₃ = Ransum basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + probiotik multi strain 1,5 ml/hari, (1-35 hari). Hasil sidik ragam persentase karkas, persentase lemak abdominal dan protein daging dada yang menunjukkan perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$). Nilai rata-rata persentase karkas yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berkisar antara P₀ (67.68%±4.88), P₁ (67.82%±12.07), P₂ (67.53%±1.33), P₃ (65.06%±13.81). Nilai rata-rata persentase lemak abdominal berkisar P₀ (2.05%±0.74), P₁ (1.74%±0.54), P₂ (2.04%±0.50), P₃ (1.59%±0.16). Nilai rata-rata protein daging dada yang diperoleh dalam penelitian ini berkisar P₀ (23.34%±65), P₁ (22.94%±0.65), P₂ (23.84%±0.45), P₃ (22.49%±0.57).

Kata kunci : Broiler, Antibiotik, Probiotik, Persentase karkas, Persentase lemak abdominal dan protein daging dada.

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Wahyuni

Nim : 60700114017

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Karya Skripsi yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya

Gowa, Juli 2018




Wahyuni
60700114017


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Antibiotik dan Probiotik dalam Peningkatan Persentase Karkas, Persentase Lemak Abdominal, Protein Daging Dada pada Broiler” yang disusun oleh **WAHYUNI, NIM: 60700114017**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata-Gowa, Agustus 2018 M
Dzul-Hijjah 1439 H


DEWAN PENGUJI


Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. 

Sekretaris : Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si. 

Munaqisy I : Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si. 


Munaqisy II : Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag. 

Pembimbing I : Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P. 

Pembimbing II : Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si. 



Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 1969205 199303 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **Wahyuni**, NIM: 60700114017, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Pengaruh Pemberian Antibiotik dan Probiotik dalam Peningkatan Persentase karkas, Persentase Lemak abdominal dan Protein Daging Dada pada Broiler”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengajukan Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.


Gowa, Juli 2018

Pembimbing I




Muh. Nur Hidayat S.Pt., MP.
NIP. 197509092009121

Pembimbing II




Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.
NIP. 19590712 1986031 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.
NIP. 19590712 1986031 002

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas berkat dan bimbingannya serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Pengaruh Pemberian Antibiotik Dan Probiotik Dalam Peningkatan Persentase Karkas, Persentase Lemak Abdominal Dan Protein Daging Dada Pada Broiler**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda tercinta **Syaifuddin** dan Ibunda tercinta **Husni** karena mereka saya bisa sampai ketahap ini yang pastinya tidak

lepas dari doa dan dukungan tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini. Satu hal yang memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi karena saya dan saudara saya adalah harapan mereka yang bisa membahagiakan mereka kelak dihari tua, Amin.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, , **Dr. Wasilah, S.T, M.T** Selaku wakil dekan 1 bidang akademik Fakultas Sains, **Dr. M. Thahir Maloko, M.Th.I** Selaku wakil dekan 2 bidang administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan **Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si** selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. **Bapak Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dan ibu **Astati, S.Pt., M. Si** selaku sekretaris jurusan Ilmu Peternakan.
4. **Bapak Muh. Nur Hidayat S.Pt., MP** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan selaku **Bapak Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si** Dosen Pembimbing kedua,

atas bimbingan dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.

5. **Ibu Rasyida Mappanganro S.Pt.,M.Si dan Bapak Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
7. **Ibu Drh. Aminah Thaja M.Si, Bapak Muh. Arsan Jamili S.Pt., M.Si** dan, **Ibu Hikmawati S.Pt** selaku Laboran Jurusan Ilmu Peternakan yang telah memberikan ilmunya selama menjadi asisten laboratorium sampai dengan proses selesainya penelitian.
8. Kak **Andi Afriana, S.E** selaku Staff Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari proposal hingga skripsi.
9. Sahabat saya **Ismawati, Andi Febri Astuti, Rahmawati dan Radhiyah Ramdani** yang selama ini telah hadir dalam suka dan duka mulai dari awal perkuliahan sampai proses selesainya skripsi ini.
10. Tim penelitian Antibiotik dan Probiotik (**Rahmawati, Andi Febri Astuti, Eka Fitriani, Ismawati, Syarif Hidayatullah, Rustan, dan Sultan Akbar Wahidin**) atas kerja sama dan kerja kerasnya selama proses penelitian berlangsung

11. Buat teman-teman seangkatanku “E14NG” Ilmu Peternakan Angkatan 2014 terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin.
12. Senior, Adik-adik sejurusan Ilmu Peternakan dan SC Al-An’Am.
13. Keluarga (adek) Aenil Maksurah dan teman Fidayanti, yang selama ini telah membantu dalam penyelesaian skripsi
14. Teman-teman KKN Angkatan 58 Desa Padang Lambe, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu .
15. Teman-teman KPY Squad dan sahabat Confused (Sri Reski Lestari, Nuni parwati dan Masrurah syuaib).
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Gowa, Agustus 2018



WAHYUNI

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Defenisi Operasional	4
F. Ruang Lingkup Penelitian	6
G. Hipotesis	6
H. Kajian Terdahulu	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Broiler	8
B. Tinjauan Al-Qur'an	12
1. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Unggas	12
2. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Mikroorganisme	12
C. Bakteri Asam Laktat (BAL)	14
D. Probiotik	17
E. Antibiotik	27
F. Persentase Karkas Broiler	32
G. Persentase Lemak Abdominal Pada Broiler	33
H. Protein	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat	36
B. Alat dan Bahan Penelitian	36
C. Jenis penelitian	37

D. Metode Penelitian	37
E. Parameter yang Diukur	39
F. Analisis Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiv

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1. Beberapa Mikroorganisme yang Berperan Sebagai Probiotik	15
2. Rataan persentase karkas, lemak abdominal dan protein karkas pada broiler yang dipelihara selama 35 hari	42

ABSTRAK

Nama : Wahyuni
Nim : 60700114017
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul skripsi : Pengaruh Pemberian Antibiotik Dan Probiotik Dalam Peningkatan Persentase Karkas, Persentase Lemak Abdominal Dan Protein Daging Dada Pada Broiler

Tujuan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Mengetahui pengaruh pemberian probiotik multi strain dan antibiotik *Zink Bacitracin* terhadap persentase karkas broiler (2) Mengetahui pengaruh penambahan probiotik multi strain dan antibiotik *Zink Bacitracin* terhadap persentase lemak abdominal karkas broiler dan (3) Mengetahui pengaruh pemberian probiotik multi strain dan antibiotik *Zink Bacitracin* terhadap protein daging dada broiler yang digunakan selama 35 hari. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan 3 ulangan yaitu P₀ (Ransum basal), P₁ (Ransum basal + Probiotik multi strain 1,5 ml/hari (1-35 hari), P₂ = Ransum basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-35 hari), P₃ = Ransum basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + probiotik multi strain 1,5 ml/hari, (1-35 hari). Hasil sidik ragam persentase karkas, persentase lemak abdominal dan protein daging dada yang menunjukkan perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$). Nilai rata-rata persentase karkas yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berkisar antara P₀ (67.68%±4.88), P₁ (67.82%±12.07), P₂ (67.53%±1.33), P₃ (65.06%±13.81). Nilai rata-rata persentase lemak abdominal berkisar P₀ (2.05%±0.74), P₁ (1.74%±0.54), P₂ (2.04%±0.50), P₃ (1.59%±0.16). Nilai rata-rata protein daging dada yang diperoleh dalam penelitian ini berkisar P₀ (23.34%±65), P₁ (22.94%±0.65), P₂ (23.84%±0.45), P₃ (22.49%±0.57).

Kata kunci : Broiler, Antibiotik, Probiotik, Persentase karkas, Persentase lemak abdominal dan protein daging dada.

ABSTRACT

Name : Wahyuni
Nim : 60700114017
Department : Animal Husbandry Science
Title of Research : The Influence of Antibiotics And Probiotics In Increasing Percentage Of Carcass, Abdominal Lemk And Carcle Protein In Broiler

Objectives contained in this study are as follows (1) Knowing the effect of probiotics and antibiotics on the percentage of broiler carcasses (2) To determine the effect of probiotic and antibiotic increase on abdominal fat percentage of broiler carcass and (3) to know the effect of probiotics and antibiotics on carcass protein broiler used for 35 days. This study used a Completely Randomized Design (RAL) design consisting of 4 treatments of 3 replications: P0 (Basal ration), P1 (Basal ration + Probiotic multi strain 1.5 ml / day (1-35 days), P2 = Basal ration + Antibiotic Zink Bacitracin 0.1 g / day, (1-35 days), P3 = Basal ration + Antibiotic Zinc Bacitracin 0.1 g / day, (1-21 days) + multi-strain probiotics 1.5 ml / day, (1-35 days) .The result of the percentage of carcass, the percentage of abdominal fat and carcass protein is presented in Table 2, which showed no significant effect ($P > 0,05$) The mean value of carcass percentage obtained in this research is between P0 ($67.82\% \pm 12.07$), P2 ($67.53\% \pm 1.33$), P3 ($65.06\% \pm 13.81$) The mean abdominal fat percentage ranges from P0 ($2.05\% \pm 0.74$), P1 ($P = 1.4\% \pm 0.54$), P2 ($2.04\% \pm 0.50$), P3 ($1.59\% \pm 0.16$), the average value of carcass protein obtained in this study ranged from P0 ($23.34\% \pm 65$), P1 ($22.94\% \pm 0.65$) P2 ($23.84\% \pm 0.45$), P3 ($22.49\% \pm 0.57$) .

Keywords: Broiler, Antibiotics, Probiotics, Percentage of carcass, Percentage of abdominal fat and carcass protein.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha perunggasan dalam hal ini usaha ayam broiler di Indonesia telah menjadi sebuah industri yang memiliki komponen lengkap dari sektor hulu sampai ke hilir, perkembangan usaha ayam broiler ini memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian. Maka dapat dipastikan permintaan atas daging ayam broiler akan meningkat, sehingga banyak investor-investor yang mulai melirik peluang usaha peternakan ayam broiler. Produk peternakan yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan utama dan dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya terdiri atas tiga komoditas, yaitu: daging, susu dan telur. Bahan pangan hewani merupakan sumber protein yang berguna untuk kecerdasan, memelihara stamina tubuh, mempercepat regenerasi sel dan berperan untuk membentuk masyarakat yang sehat, cerdas dan berkualitas.

Mengingat tingginya kewaspadaan masyarakat terhadap keamanan pangan, menuntut produsen bahan pangan termasuk pengusaha peternakan untuk meningkatkan kualitas produknya. Walaupun kualitas karkas tergantung pada preferensi konsumen namun ada standar khusus yang dijadikan acuan. Karkas yang layak konsumsi harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) mulai dari cara penanganan, cara pemotongan karkas, ukuran dan mutu, persyaratan yang

meliputi bahan asal, penyiapan karkas, pengolahan pascapanen, bahan pembantu, bahan tambahan, mutu produk akhir hingga pengemasan.

Tujuan produksi pada peternakan ayam broiler adalah karkas (daging), sedangkan lemak yang ada pada karkas merupakan hasil sampingan dan merupakan limbah dari suatu rumah potong ayam (RPA). Karkas adalah ayam yang sudah dipotong bersih tanpa kepala, cakar dan jeroan (hati, jantung, ginjal, rempela, usus). Berat karkas merupakan gambaran dari produksi daging dari seekor ternak dan pengukuran berat karkas mengevaluasi hasil produksi ternak. Dengan semakin beratnya karkas, maka keuntungan peternak akan semakin bertambah.

Faktor yang penting dalam Kualitas karkas dapat dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas karkas salah satunya adalah pakan yang termasuk bahan aditif (hormon, antibiotic atau mineral). Faktor tersebut akan memberikan hasil akhir yang kurang baik terhadap kualitas karkas. Sehingga perlu dilakukan pemilihan bahan pakan yang tepat. Salah satu alternatif, yaitu dengan cara pemberian probiotik. Probiotik merupakan produk yang mengandung mikroorganisme hidup nonpatogen yang ditambahkan ke dalam pakan, yang dapat memengaruhi laju pertumbuhan, meningkatkan produksi daging, efisiensi penggunaan ransum, pencernaan bahan pakan dan kesehatan ternak melalui perbaikan keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan (Soeparno, 1994).

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakannya suatu penelitian terhadap penggunaan pakan aditif dalam penelitian ini berupa probiotik dan antibiotik pada broiler untuk mengetahui pengaruhnya terhadap persentase lemak abdominal, persentase karkas, lemak karkas dan protein karkas.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemberian probiotik multi strain dan antibiotik (*Zink Bacitracin*) terhadap persentase karkas broiler?
2. Bagaimana pengaruh pemberian probiotik multi strain dan antibiotik (*Zink Bacitracin*) terhadap persentase lemak abdominal karkas broiler ?
3. Bagaimana pengaruh pemberian probiotik multi strain dan antibiotik (*Zink Bacitracin*) terhadap protein daging dada pada broiler?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pemberian probiotik multi strain dan antibiotik (*Zink Bacitracin*) terhadap persentase karkas broiler.
2. Mengetahui pengaruh penambahan probiotik multi strain dan antibiotik (*Zink Bacitracin*) terhadap persentase lemak abdominal karkas broiler.
3. Mengetahui pengaruh pemberian probiotik multi strain dan antibiotik (*Zink Bacitracin*) terhadap protein daging dada pada broiler.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk menunjang penelitian lain dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan bagi perusahaan peternakan broiler di perusahaan sehingga dapat menerapkan tambahan pakan probiotik dan antibiotik bagi broiler agar kualitas daging yang dijual semakin meningkat.
3. Pemerintah dapat mengembangkan dan melakukan penyuluhan kepada para peternak untuk meningkatkan pengetahuan bagi peternak sehingga peternak dapat menghasilkan produk yang lebih unggul dan berkualitas.

E. Definisi Operasional

1. Probiotik

Probiotik merupakan imbuhan pakan dalam bentuk mikroba hidup yang menguntungkan, melalui perbaikan keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan (Fuller 1997). Probiotik tergolong dalam makanan fungsional, dimana bahan makanan ini mengandung komponen-komponen yang dapat meningkatkan kesehatan ternak dengan cara memanipulasi komposisi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan ternak. Pemberian probiotik memiliki beberapa tujuan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan pencernaan pakan, meningkatkan daya

tahan tubuh, meningkatkan produksi telur dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang menguntungkan (Fuller 1992).

2. Antibiotik

Imbuan pakan yang sangat umum digunakan adalah antibiotik. Antibiotik yang diberikan pada dosis subtherapeutik diharapkan dapat mengurangi populasi mikroorganisme pengganggu (patogen) di dalam saluran pencernaan, sehingga ternak lebih sehat dan dapat memanfaatkan gizi pakan lebih baik untuk pertumbuhan atau produksi (Walton, 1977).

3. Karkas broiler

Karkas broiler adalah daging bersama tulang ayam setelah dipisahkan dari kepala sampai batas pangkal leher, dari kaki sampai lutut, yang telah dicabuti bulunya serta isi rongga perutnya telah dikeluarkan.

4. Lemak karkas

Lemak karkas adalah lemak yang berada dibagian karkas dalam hal ini dapat berupa lemak abdominal maupun lemak paha.

5. Lemak Abdominal

Lemak abdominal adalah lemak yang terletak diantara proventriculus, gizzard, duodenum dan disekitar kloaka. Persentase lemak abdominal diperoleh berdasarkan hasil pembagian bobot lemak abdominal dengan bobot hidup dikalikan 100 persen.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh probiotik multi strain dan antibiotik (*Zink Bacitracin*) terhadap persentase karkas dan persentase lemak karkas dalam hal ini lemak abdominal dan protein daging dada pada broiler.

G. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini, yaitu diduga bahwa pemberian probiotik multi strain dan antibiotik (*Zink Bacitracin*) dapat mempengaruhi persentase karkas, lemak karkas dan protein daging dada pada broiler.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian Ronstarci dkk (2007), tentang pengaruh penggunaan probiotik selulolitik (*Cellulomonas sp*) didalam pakan terhadap rataan persentase karkas, persentase lemak abdominal (%), dan bobot organ dalam (g/100g BB) ayam pedaging menunjukkan bahwa penggunaan probiotik selulolitik dalam pakan berpengaruh tidak nyata ($P>0,05$). Kesimpulan Penambahan probiotik selulolitik (*Cellulomonas sp*) dalam pakan ayam pedaging tidak meningkatkan kualitas karkas, lemak abdominal dan berat organ dalam ayam pedaging.

Penelitian Daud dkk (2007), hasil uji statistik menunjukkan bahwa persentase karkas dan persentase lemak abdominal tidak dipengaruhi oleh probiotik, prebiotik dibandingkan dengan antibiotik, maupun kombinasi keduanya dalam ransum. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilaporkan Afriani (2002), bahwa penambahan probiotik dalam ransum ayam pedaging tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kadar lemak daging yang diperoleh. Sebelumnya juga Owings *et*

al., (1990), melaporkan bahwa beberapa penelitian tentang probiotik tidak selalu mendapatkan hasil yang positif.

Penelitian Astuti F. K. dkk., (2015), tentang pengaruh penambahan probiotik cair dalam pakan terhadap penampilan produksi pada ayam pedaging bertujuan mengetahui pengaruh penambahan probiotik cair dalam pakan ayam pedaging terhadap penampilan produksi ayam pedaging. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan probiotik cair dalam pakan dapat menurunkan konsumsi pakan, konsumsi protein, konversi pakan, mortalitas dan meningkatkan pertambahan berat badan, berat dan presentase karkas ayam pedaging.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 80% penggunaan antibiotika pada ternak unggas (Crawford and Franco, 1994). Industri broiler umumnya menggunakan *feed additive* berupa antibiotika dengan tujuan meningkatkan produktivitas produk mereka (Bahri dkk., 2005). Antibiotika dipakai secara luas dalam industri peternakan dengan tujuan untuk pengobatan, tujuan lain pemakaian antibiotika adalah sebagai imbuhan pakan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ternak. Salah satu antibiotika yang digunakan dalam pakan broiler adalah antibiotika golongan peptida yaitu *Zinc bacitracin*. Antibiotika digunakan oleh industri broiler yang terdapat dalam pakan broiler fase starter dan finisher. Setelah pemberian bacitracin pada hewan secara parenteral, bacitracin akan ditemukan di dalam urine, ginjal, darah, empedu, paru-paru, sumsum tulang, kulit, otot, otot jantung, hati, limpa, cairan cerebrospinal dan otak (Wilson and Schild, 1961).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Broiler

Ayam pedaging masih menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan protein hewani manusia. Mengingat sifat-sifat unggulnya yaitu tidak memerlukan tempat luas dalam pemeliharaan, bergizi tinggi, pertumbuhan cepat dan efisien mengkonversikan makanan menjadi daging sehingga cepat mencapai usia berat jual dengan bobot badan yang tinggi (Setiawan dan Nugraha, 2009).

Broiler merupakan hasil persilangan yang dihasilkan dari jantan strain *Cornish* dengan betina yang besar yaitu *Plymouth Rocks* yang merupakan strain bertulang tinggi putih. Broiler mempunyai kemampuan tinggi dalam mengubah bahan makanan menjadi daging, dalam waktu pemeliharaan sekitar 4-5 minggu dan siap dipanen. Pertumbuhannya sangat cepat sejak usia 1-5 minggu. Tetapi di Indonesia ayam broiler umumnya dipasarkan dengan bobot hidup antara 1,3-1,6 kg (Rasyaf, 1995).

Secara fisik ayam broiler biasanya mempunyai warna dominan putih, telah diseleksi untuk pertumbuhannya yang cepat, mempunyai karakteristik daging yang baik seperti bagian dada yang lebar, bentuk badan yang dalam, hasil daging yang banyak. Dalam kaitan ini efisiensi pertumbuhan biasanya diukur dari berat badan dewasa, konversi ransum dan umur yang dicapai pada berat yang diinginkan.

Produktivitas ayam broiler dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genetik, iklim, nutrisi dan faktor penyakit. Keunggulan ayam broiler akan terbentuk bila didukung oleh lingkungan, karena sifat genetis saja tidak menjamin keunggulan tersebut dapat timbul. Ayam broiler akan nyaman hidup dan memproduksi pada suhu lingkungan 18-21°C. Namun kita ketahui bahwa suhu di Indonesia lebih panas sehingga memungkinkan ayam mengurangi konsumsi ransum dan lebih banyak minum. Dengan demikian, faktor ransum menyangkut kualitas dan kuantitasnya sangat menentukan terhadap produktivitas ternak. Pertumbuhan yang cepat tidak akan timbul bila tidak didukung dengan ransum yang mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang (asam amino, asam lemak, mineral dan vitamin) sesuai dengan kebutuhan ayam. Bila faktor suhu dan ransum sudah teratasi maka faktor manajemen perlu diperhatikan pula. Ayam broiler perlu dipelihara dengan teknologi yang dianjurkan oleh pembibit untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan (Abun, dkk. 2006).

Ditinjau dari genetik, ayam broiler sengaja diciptakan agar dalam waktu singkat dapat segera dimanfaatkan hasilnya. Oleh karena itu, istilah broiler adalah untuk menyebut strain ayam hasil budidaya rekayasa genetika yang memiliki karakteristik ekonomis, memiliki pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan sangat irit, siap dipotong pada umur muda, serta mampu menghasilkan kualitas daging yang bersih, berserat lunak dengan kandungan protein yang tinggi. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan jumlah ataupun ukuran sel, bentuk dan berat jaringan-jaringan tubuh seperti tulang, urat daging,

jantung, otak serta semua jaringan tubuh lainnya kecuali jaringan lemak dan pertumbuhan terjadi dengan cara yang teratur (Murtidjo, 2003).

Penggunaan lemak tinggi pada industri broiler sudah menjadi praktek sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan energi bagi ayam broiler, sebab tanpa pemberian lemak tinggi kebutuhan energi tidak akan terpenuhi. Namun, pemberian lemak tinggi pada pakan broiler menghasilkan daging dengan kualitas yang rendah yang ditandai oleh tingginya kadar lemak dalam daging. Selain itu, daging broiler yang dihasilkan masih belum bebas dari cemaran mikroba patogen dan belum bebas antibiotik (Santoso, 2010).

Industri broiler dituntut untuk menghasilkan daging rendah lemak, karena lemak mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatan konsumen. Kandungan lemak yang paling banyak adalah di daerah perut, dan inilah yang menyebabkan kualitas karkas menjadi rendah, serta mempunyai nilai jual yang rendah pula. Menurut Suprijatna dan Kartasudjana (2005), ayam akan mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhannya, sebelum kebutuhannya terpenuhi ayam akan terus makan. Jika ayam diberi makan dengan kandungan energi rendah maka ayam akan makan lebih banyak, dibandingkan ransum dengan kandungan energi tinggi, maka semakin rendah konsumsi ransumnya karena ayam makan untuk memenuhi kebutuhannya selanjutnya dinyatakan bahwa kelebihan energi dapat diubah menjadi lemak tubuh. Dalam Parakkasi (1995), bila energi dalam bahan makanan berlebihan dari metabolisme normal maka akan terjadi penimbunan lemak, salah satu tempat penimbunan lemak ini terbentuk di daerah abdomen.

Pertumbuhan broiler yang cepat harus diimbangi dengan pemberian ransum dengan kandungan nutrisi yang memenuhi kebutuhan pada masa pertumbuhan, aktivitas dan produksi. Kandungan protein yang tinggi dalam ransum komersial menyebabkan harga ransum relatif mahal. Hal ini merupakan masalah dalam usaha peternakan. Upaya untuk meningkatkan produktivitas ayam broiler, faktor kualitas dan efisiensi penggunaan ransum sangat menentukan, karena biaya ransum untuk ternak unggas merupakan biaya produksi terbesar, yaitu sekitar 60-70% (Murtidjo, 1993).

Menurut Neto *et al.* (2000), menyatakan bahwa dengan pemberian energi sebesar 3.000 kkal dan protein 24% sangat nyata memberikan pertambahan bobot badan dan konversi ransum yang paling baik pada umur 0-21 hari. Temim *et al.* (1999), berpendapat bahwa dengan peningkatan pemberian kadar protein dari 20 sampai 25% dapat memperbaiki pertumbuhan dan efisiensi ransum pada umur 4-6 minggu. Hal ini erat kaitannya dengan efisiensi ransum karena semakin dewasa ayam maka nilai efisiensi ransum akan semakin besar. Situasi ini terjadi karena ayam yang semakin berat akan makan lebih banyak ransum untuk menjaga ukuran berat badan, maka dari itu penggunaan protein sebesar 80% untuk menjaga berat badannya yang besar dan 20% untuk pertumbuhan sehingga efisiensi ransumnya menjadi kurang baik.

B. Tinjauan Al-Qur'an

1. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Unggas

Allah telah menciptakan binatang ternak bukan tanpa maksud dan tujuan. Hal ini semata-mata untuk kepentingan umat manusia karena pada binatang ternak terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dan digunakan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia (Departemen Agama, 2002).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/ 16:5 yang berbunyi:

وَاللّٰهُمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan (Kementrian Agama RI, 2012).

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa dalam pandangan islam seluruh makhluk Allah adalah hidup karena dia telah disentuh oleh sang Maha hidup itu Allah. Maka islam menolak kategori benda mati atau benda hidup dalam fisika modern (Departemen Agama, 2002).

2. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Mikroorganisme

Mikroorganisme merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan dibumi. Salah satu produknya adalah probiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak tanpa mengakibatkan terjadinya proses penyerapan komponen probiotik dalam tubuh ternak (Departemen Agama, 2002).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-nuur/24: 45 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ تَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Terjemahannya:

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S An-nuur:45).

Menurut Shihab (2002), dalam kitabnya yang berjudul *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa tafsir ayat di atas yaitu, ayat di atas menegaskan bahwa dan di samping bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya, Allah juga telah menciptakan semua jenis hewan dari air yang memancar sebagaimana Dia menciptakan tumbuhan dari air tercurah. Lalu Allah menjadikan hewan-hewan itu beraneka ragam jenis, potensi dan fungsinya, termasuk bakteri.

Menurut tafsir Departemen Agama RI (2002), ayat di atas Allah mengarahkan perhatian manusia supaya memperhatikan binatang-binatang termasuk bakteri yang bermacam-macam jenis dan bentuknya. Dia telah menciptakan semua jenis binatang itu dari air. Ternyata memang air itulah yang menjadi pokok bagi kehidupan binatang dan sebagian besar dari unsur-unsur yang ada dalam tubuhnya adalah air dan tidak akan dapat bertahan dalam hidupnya tanpa air. Allah menerangkan bahwa Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya bukan saja

binatang-binatang yang berkaki banyak tetapi mencakup semua binatang dengan berbagai macam bentuk termasuk bakteri.

C. Bakteri Asam Laktat (BAL)

Bakteri probiotik atau bakteri baik adalah bakteri asam laktat yang hidup di dalam usus, bersimbiosis dengan mikroflora usus yang mampu melawan bakteri patogen di dalam usus, oleh karena itu pemberian probiotik dapat berpengaruh menguntungkan bagi kesehatan. Sebagian besar jenis bakteri pada probiotik berasal dari *Lactobacillus* atau *Bifidobacterium* (Saxelin, 1997).

Pemberian probiotik pada unggas sudah mulai dikembangkan sebagai suatu cara untuk membantu meningkatkan performa produksi ternak unggas. Probiotik yang banyak digunakan adalah bakteri dari golongan *Lactobacillus* sp. “Probiolac” (produksi Intervet, Salem India) terdiri dari *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*, *Bifidobacterium bifidum*, *Aspergillus oryzae*, *Streptococcus faecium* dan *Torulopsis spp.* (Panda *et al.*, 2003). “Protexin” (produksi Novartis probiotics international, UK) terdiri dari *Lactobacillus plantarum*, *L. delbruecki subspecies bulgaricus*, *L. acidophilus*, *L. rhamnosus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus salivarius subspecies thermophilus*, *Enterococcus faecium*, *Aspergillus oryzae* dan *Candida pentolepsi* (Balevi *et al.*, 2001), serta masih banyak lagi jenis probiotik komersial yang lain.

Tabel 1. Beberapa Mikroorganisme yang Berperan Sebagai Probiotik

<i>Lactobacillus</i>	<i>Bifidobacteria</i>	<i>Enterococcus</i>	<i>Streptococcus</i>
<i>L. acidophilus</i>	<i>B. adolescentis</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>S. termhopilus</i>

<i>L. brevis</i>	<i>B. animalis</i>	<i>E. faecium</i>
<i>L. casei</i>	<i>B. bifidum</i>	
<i>L. curvatus</i>	<i>B. breve</i>	
<i>L. fermentum</i>	<i>B. infantis</i>	
<i>L. gasseri</i>	<i>B. longum</i>	
<i>L. johnsonii</i>	<i>B. thermophilum</i>	
<i>L. reuteri</i>		
<i>L. rhamnosus</i>		
<i>L. salivarius</i>		
<i>Propionibacterium</i>	<i>Yeast</i>	<i>Other</i>
<i>P. freudenreichii</i>	<i>Kluyveromyces</i>	<i>Leunococcus</i>
<i>P. freudenreichii</i>	<i>Lactis</i>	<i>mesenteroides</i>
<i>subs. Thermanii</i>	<i>Saccharomyces</i>	<i>Pediococcus</i>
<i>P. jensenii</i>	<i>Boulardii</i>	<i>acidilactici</i>
	<i>Saccharomyces</i>	
	<i>Cerevisiae</i>	

Sumber: (Baffoni dan Biavati, 2008 dalam Malago, 2011).

Produk fermentasi BAL salah satunya adalah asam organik. Asam organik ini dihasilkan selama proses fermentasi terkait spesies organisme, gabungan kultur dan kondisi pertumbuhan (Lindgren dan Dobrogosz, 1990). Asam organik mampu menurunkan pH dan berfungsi untuk tidak memutus beberapa ikatan molekul sehingga memiliki kemampuan aktivitas mikroba. Lebih lanjut Lindgren dan Dobrogosz (1990), melaporkan bahwa penurunan pH mampu menghasilkan *Minimum Inhibitory Concentration* (MIC), sehingga asam laktat dapat menghambat kerja *Clostridium tyrobutyricum*, *E. coli*, *Enterobacter sp.* dan *Propionibacterium freudenreichii sp.* Menurut *Food and Agriculture Organization/World Health Organization* (FAO/WHO) (2001), idealnya strain probiotik seharusnya tidak hanya mampu bertahan melewati saluran pencernaan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam saluran pencernaan, tahan terhadap cairan lambung

dan cairan empedu dalam jalur makanan yang memungkinkan untuk bertahan hidup melintasi saluran pencernaan dan terkena paparan empedu. Selain itu probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel usus, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat anti mikroba (bakteriosin) dan memberikan pengaruh yang menguntungkan inangnya. Syarat lainnya adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, dan tahan terhadap proses psikokimia pada makanan (Prado *et al.*, 2008).

Probiotik yang efektif harus memiliki kriteria antara lain, memberikan efek menguntungkan bagi induk semangnya, tidak menyebabkan penyakit dan tidak beracun atau tidak toksik, mengandung sel hidup lebih dari 10^6 , mampu bertahan pada suasana asam dan melakukan aktivitas metabolisme dalam saluran pencernaan, tetap hidup dalam selama penyimpanan dan tidak terjadi kekebalan terhadap keberadaan probiotik baru. Pemberian probiotik memberikan efek menguntungkan seperti pengurangan kemampuan mikroorganisme patogen dalam memproduksi toksin, menstimulir enzim pencernaan serta dihasilkannya vitamin dan substansi antimicrobial sehingga meningkatkan status kesehatan inang. Keuntungan lain penggunaan probiotik adalah dapat mengurangi tekanan negatif yang diakibatkan adanya hambatan pakan (berupa anti nutrisi) pada pakan karena probiotik mampu menstimulasi peningkatan ketersediaan zat gizi bagi induk semang (Fuller, 1992).

Menurut Fuller (1992), bahwa probiotik digunakan pada pemberian pakan ternak yang disuplementasi dengan mikroba pada tahun 1960 untuk membantu hewan ternak khususnya dalam saluran pencernaannya. Sejalan dengan perkembangan zaman maka banyak dilakukan penelitian mengenai mekanisme probiotik yang menggunakan hewan percobaan untuk diekstrapolasikan pada manusia.

D. Probiotik

Probiotik adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang dapat memacu pertumbuhan mikroorganisme lainnya, jadi merupakan kebalikan dari antibiotik (Lilly dan Stillwell 1965). Probiotik adalah ekstrak dari jaringan yang dapat menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme (Sperti, 1971). Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi oleh inang akan memberikan pengaruh yang menguntungkan baginya dengan memperbaiki lingkungan mikrobiota yang ada dalam sistem pencernaan (Fuller 1989).

Probiotik sebagai mikroba hidup atau sporanya yang dapat hidup atau berkembang dalam usus dan dapat menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil metabolitnya. Substrat dapat mengubah mikroekologi usus sedemikian rupa sehingga mikroba yang menguntungkan dapat berkembang dengan baik. Akhir-akhir ini, probiotik diberi istilah prebiotik dan kombinasi antara probiotik dan prebiotik diberi nama sinbiont. Probiotik, mikroba yang menguntungkan adalah mikroba yang dapat memperbaiki mikroekologi usus yang berdampak positif terhadap kesehatan inang. Dalam rumen ternak ruminansia, dijumpai berbagai jenis mikroba yang membantu pencernaan. Dengan lain kata,

ternak secara alami telah memanfaatkan bantuan mikroba dalam pencernaannya dan oleh karenanya mereka telah menggunakan probiotik. Ternak mampu memanfaatkan serat kasar karena adanya mikroba dalam rumen yang mampu memecahnya menjadi senyawa sederhana yang kemudian diserap tubuh. Pada ternak nonruminansia seperti unggas, dalam ususnya juga dijumpai berbagai mikroba, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan atau pathogen (Smith, 1965).

Penggunaan probiotik yang sama kemungkinan akan memberi hasil yang berbeda pada lokasi yang berlainan bila cara pemberiannya berbeda, seperti diberikan secara terus-menerus atau dengan menggunakan dosis tunggal. Sampai saat ini belum diketahui dosis probiotik minimal yang efektif. Beberapa percobaan menunjukkan bahwa pengaruh probiotik biasanya akan cepat atau lambat hilang setelah pemberiannya dihentikan. Dalam percobaan pada tikus dan manusia, pengaruh probiotik segera hilang setelah pemberian probiotik dihentikan (Cole dan Fuller 1984). Pada babi dan ayam, mikroorganisme probiotik tidak dapat lagi diisolasi dari perutnya setelah 7 hari pemberian probiotik dihentikan (Johnson 1986).

Pengembangan probiotik pada unggas tahun 1999-2000, Balai Penelitian Ternak mulai mengembangkan probiotik untuk unggas (ayam). Untuk memperoleh kandidat probiotik, dilakukan isolasi mikroba dari ayam ras yang mendapat pakan komersial yang kemungkinan besar mengandung AGP dan ayam kampung yang kemungkinan besar tidak memperoleh AGP. Mikroba dari dalam usus ayam dipilih dengan harapan mikroba tersebut merupakan mikroba *Indigenous*, sehingga berpeluang dapat tumbuh dan berkembang dalam usus ayam. Dari isolat yang

diperoleh, perhatian difokuskan pada *Bacillus sp.* karena bakteri tersebut memiliki beberapa sifat sebagai berikut:

1. Bersifat aerob fakultatif sehingga diharapkan mampu hidup dan berkembang dalam usus ternak, dan untuk memproduksinya memerlukan peralatan yang sederhana.
2. Berspora sehingga penyimpanannya lebih sederhana dan tetap viable pada saat proses pembuatan pakan.
3. Menghasilkan enzim pencernaan seperti protease dan amilase yang dapat membantu pencernaan, serta memproduksi asam-asam lemak rantai pendek yang mempunyai sifat antimikroba.

Probiotik merupakan imbuhan pakan dalam bentuk mikroba hidup yang menguntungkan, melalui perbaikan keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan (Fuller 1997). Probiotik tergolong dalam makanan fungsional, dimana bahan makanan ini mengandung komponen-komponen yang dapat meningkatkan kesehatan ternak dengan cara memanipulasi komposisi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan ternak. Pemberian probiotik memiliki beberapa tujuan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan kecernaan pakan, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan produksi telur dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang menguntungkan (Fuller 1992). Penambahan probiotik kedalam ransum kontrol, akan membantu pencernaan zat-zat makanan di usus halus dan menurunkan populasi bakteri pathogen (Diaz 2008). Penambahan probiotik ke dalam ransum ayam dapat meningkatkan produksi Enzim *B-glukanase* di semua segmen saluran pencernaan,

menurunkan *Vikosikosis digesta* dan dapat meningkatkan pertambahan bobot badan (Yu *et al.* 2008).

Menurut Wahyono (2002), bahwa penambahan kultur bakteri yang berperan sebagai probiotik dapat menstimulasi sintesis enzim pencernaan sehingga meningkatkan utilisasi nutrisi. Penggunaan probiotik Starbio sebanyak 2,5 gram/kg ransum memberikan performa yang lebih baik dan efisien pada ayam broiler (Tami dkk, 2002). Penggunaan dosis prebiotik yang berasal dari daun katuk sebesar 0,5% sebagai media, mampu menumbuhkan bakteri *Bacillus spp.* dua kali lipat dalam tiga jam (Kompang, 2003). Dinyatakan pula oleh Mangisah dkk (2009), bahwa pemakaian probiotik (starbio), pada ransum itik berserat kasar tinggi (10% dan 15%), dapat meningkatkan konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan menurunkan konversi ransum.

Adapun jenis-jenis bakteri adalah sebagai berikut:

a. Enterococcus sp.

Probiotik strain *Enterococcus faecalis* merupakan bakteri dengan karakteristik gram positif dan berbentuk kokus genus bakteri ini kurang dikenal karena hanya memiliki kurang dari 20 spesies. Bakteri gram positif dengan sel berbentuk seperti telur dalam bentuk tunggal, berpasangan atau rantai pendek dan tidak membentuk spora. Strain bakteri yang paling sering digunakan adalah *Enterococcus faecalis*. Pertumbuhan optimal pada suhu 35-37°C dan kebanyakan spesies dapat tumbuh pada suhu 42-45°C. bakteri ini bersifat homofermentatif yang mengubah glukosa seluruhnya menjadi asam laktat. Genus *Enterococcus* termasuk

dalam kelompok mikroorganisme dikenal sebagai Bakteri Asam laktat (BAL) (De Vos, *et al.*, 2009).

Strain yang digunakan sebagai probiotik untuk manusia telah terisolasi dari saluran pencernaan manusia dan biasanya termasuk spesies genera *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Namun, strain milik spesies BAL lainnya, di antaranya *Enterococci*, telah digunakan di masa lalu sebagai probiotik juga, seperti *E. faecium*, *E. faecalis*, *S. thermophilus*, *Leuconostoc mesenteroides*, *Propionibacterium freudenreichii*, *Pediococcus acidilactici*, *Sporolactobacillus inulinus*, *Bacillus cereus* dan ragi *Saccharomyces cerevisiae*. Meskipun jenis *E. faecium* dan *E. faecalis* telah diaplikasikan pada manusia, suplemen probiotik, strain *E. faecalis* juga ada dan telah banyak digunakan sebagai suplemen pakan hewan (Fuller, 1989).

Strain *Enterococci* kebanyakan digunakan sebagai nutrisi untuk babi dan unggas. Namun, tersedia pula produk farmasi yang mengandung *Enterococcus* sebagai probiotik bagi manusia dalam terapi klinis. Genus *Enterococcus* memiliki spesies yang berbeda-beda tetapi hanya dua dari mereka yang penting sebagai probiotik yaitu *Enterococcus faecium* diaplikasikan pada manusia dan hewan sementara *Enterococcus faecalis* terutama digunakan sebagai probiotik untuk manusia (Batrinon, 2010).

b. Bacillus sp.

Bacillus merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, beberapa spesies bersifat aerob obligat dan bersifat anaerobik fakultatif, dan memiliki endospora sebagai struktur bertahan saat kondisi lingkungan tidak mendukung (Backman *et al.*, 1994). Menurut Fardiaz (1992), bentuk spora (endospora) *Bacillus* bervariasi bergantung pada spesiesnya. Endospora ada yang lebih kecil dan ada juga yang lebih besar dari pada diameter sel induknya. Pada umumnya sporulasi terjadi bila keadaan medium memburuk, zat-zat yang timbul sebagai pertukaran zat yang terakumulasi dan faktor luar lainnya yang merugikan. Menurut *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology*, 8 th editions dalam Hadioetomo (1985), yang menyatakan bahwa klasifikasi *Bacillus sp.* adalah sebagai berikut:

Kingdom : Procaryotae
 Divisi : Bacteria
 Kelas : Schizomycetes
 Bangsa : Eubacteriales
 Suku : Bacillaceae
 Marga : Bacillus
 Jenis : *Bacillus sp.*

Bacillus mempunyai sifat yang lebih menguntungkan dari pada mikroorganisme lain karena dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhannya (Wong, 1994). Spesies dari jenis *Bacillus* juga berbeda dalam sifat pertumbuhannya. Beberapa

bersifat mesofilik misalnya *Bacillus subtilis* yang lainnya bersifat termofilik fakultatif misalnya *Bacillus coagulans* atau termofilik pada *Bacillus stearothermophilus* sering menyebabkan kerusakan pada makanan kaleng. Sebanyak 22 spesies *Bacillus* telah diidentifikasi diantaranya banyak ditemukan pada makanan. Beberapa kelompok bakteri ini menghasilkan metabolit sekunder yang dapat menekan pertumbuhan patogen (Backman et al., 1994).

Bakteri *Bacillus* merupakan mikroba flora normal pada saluran pencernaan ayam. Bakteri ini adalah organisme saprofitik, berbentuk batang, gram positif pembentuk spora nonpatogen yang biasanya ditemukan dalam air, udara, debu, tanah dan sedimen. Terdapat beberapa jenis bakteri yang bersifat saprofit pada tanah, air, udara dan tumbuhan, seperti *Bacillus cereus* dan *Bacillus subtilis*. Jenis-jenis *Bacillus* yang ditemukan pada saluran pencernaan ayam yaitu *Bacillus subtilis*, *Bacillus pumilus*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus clausii*, *Bacillus megaterium*, *Bacillus firmus*, kelompok *Bacillus cereus* (Jawetz dan Adelberg, 2005).

Bacillus memiliki beberapa sifat yaitu, bersifat aerob fakultatif sehingga diharapkan mampu hidup dan berkembang dalam usus ternak, berspora sehingga penyimpanannya lebih sederhana dan tetap viable pada saat proses pembuatan pakan, menghasilkan enzim pencernaan seperti protease dan amilase yang dapat membantu pencernaan, serta memproduksi asam-asam lemak rantai pendek yang mempunyai sifat anti mikroba (Kompiang, 2009).

c. *Lactobacillus* sp.

Lactobacillus adalah golongan bakteri penghasil asam laktat, termasuk bakteri gram positif, fakultatif anaerob dan mikroaerofil. Keberadaan bakteri *Lactobacillus* merupakan indikasi lingkungan yang sehat, karena bakteri ini merupakan mikroflora normal dalam lingkungan dan saluran pencernaan makhluk hidup baik di darat maupun di air. Kemampuan metabolisme *Lactobacillus* untuk menghasilkan asam laktat dan peroksidase merupakan cara efektif bakteri ini dalam menghambat berbagai macam mikroba patogen penyebab penyakit. Sehingga bakteri *Lactobacillus* banyak dimanfaatkan sebagai probiotik yang dapat diaplikasikan langsung pada lingkungan maupun sebagai campuran pada pakan (Hadioetomo, 1985).

Menurut Hadioetomo (1985), yang menyatakan bahwa klasifikasi dari *Lactobacillus* yaitu sebagai berikut:

Kerajaan : Bacteria
Divisi : Firmicutes
Kelas : Bacilli
Ordo : Lactobacillales
Famili : Lactobacillaceae
Genus : *Lactobacillus*

Kebanyakan dari bakteri ini umum dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Dalam manusia, bakteri ini dapat ditemukan di dalam vagina dan sistem pencernaan, di mana mereka bersimbiosis dan merupakan sebagian kecil dari flora usus. Banyak

spesies dari *Lactobacillus* memiliki kemampuan membusukkan materi tanaman yang sangat baik. Produksi asam laktatnya membuat lingkungannya bersifat asam dan mengganggu pertumbuhan beberapa bakteri merugikan. Beberapa anggota genus ini telah memiliki genom sendiri. *Lactobacillus* termasuk golongan bakteri asam laktat yang sering dijumpai pada makanan fermentasi, produk olahan ikan, daging, susu dan buah-buahan (Napitupulu dkk, 1997).

Secara umum manfaat penambahan probiotik adalah membantu sistem pencernaan unggas, agar lebih mudah mencerna dan meningkatkan kapasitas daya cerna sehingga diperoleh zat pakan yang lebih banyak untuk pertumbuhan maupun produksi. Pada dasarnya ada dua tujuan utama dari penggunaan probiotik pada unggas, yaitu untuk manipulasi mikroorganisme saluran pencernaan bagian anterior (crop, gizzard, dan usus halus) dengan menempatkan mikroflora dari strain *Lactobacillus sp.* untuk meningkatkan daya tahan ternak dari infeksi *Salmonella* (Barrow, 1992). Menurut Bidura dan Suastina (2002), bahwa mekanisme kerja probiotik pada saluran pencernaan ternak unggas adalah menetralkan racun, menekan populasi bakteri tertentu yang tidak dikehendaki sebagai anti bakteri atau berkompetisi di dalam saluran pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh.

Suplementasi probiotik dalam ransum ternyata dapat meningkatkan berat karkas dan persentase daging karkas serta dapat menurunkan jumlah lemak subkutan termasuk kulit (Sterling *et al.*, 1998). Penggunaan probiotik dalam ransum meningkatkan kandungan *Lysine analogue* dan *Aminoethyl cysteine* dalam saluran pencernaan yang diubah menjadi asam amino lisin dan sistein dan dapat

meningkatkan retensi protein yang berperan dalam pembentukan daging (Candrasih dan Bidura, 2001). Soeharsono (2010), menyatakan bahwa penambahan probiotik dalam ransum yang diberikan pada ternak dapat menurunkan kadar lemak dan kolesterol.

Bakteri asam laktat (BAL) termasuk *Lactobacillus* merupakan salah satu genus bakteri asam laktat yang paling banyak dijumpai pada saluran gastrointestinal baik pada manusia maupun pada hewan. Salah satu jenis bakteri ini adalah gram positif yang tidak berspora dan berbentuk bulat atau batang yang mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam laktat dapat memberikan efek bakterisidal untuk bakteri lain karena pH lingkungan dapat turun menjadi 3-4,5. Bakteri asam laktat ini bermanfaat bagi kesehatan dan produksi ternak, beberapa diantaranya adalah meningkatkan nilai nutrisi pakan, mengontrol infeksi pada usus dan meningkatkan pencernaan dengan menghalangi bakteri patogen dalam saluran pencernaan. *Lactobacillus brevis* mampu menghasilkan lebih banyak asam organik, khususnya asam asetat dan etanol. *Lactobacillus fermentum* memiliki toleransi pH yang kuat dan mampu mengurangi kadar kolesterol. *Lactobacillus plantarum* terutama berguna untuk pembentukan asam laktat, penghasil hidrogen peroksida tertinggi dibandingkan bakteri asam laktat lainnya dan juga menghasilkan bakteriosin yang merupakan senyawa protein yang bersifat. Penambahan bakteri asam laktat dalam pakan akan mendukung peningkatan produktivitas pada pemeliharaan ternak dan bukan hanya itu bakteri asam laktat ini juga akan membantu proses pertumbuhan pada broiler mulai dari starter sampai finisher, asam laktat tersebut

berasal dari probiotik yang akan dicampurkan kedalam pakan ataupun air minum selama pemeliharaan 35 hari, sebab bakteri asam laktat ini akan bekerja didalam pencernaan selama broiler tersebut memakan pakan yang telah dicampurkan antibiotik dan probiotik didalam pakan (Kusmiati dan Malik, 2002).

E. Antibiotik

Pemeliharaan broiler dengan menggunakan antibiotik dalam campuran pakan dapat menyebabkan residu dalam daging ayam. Hal tersebut disebabkan antibiotik yang diberikan tidak disekresikan dengan sempurna sehingga masih terdapat residu yang disimpan dalam daging broiler. Antibiotik yang sering dicampur ke dalam pakan adalah *Bacitracin*, *Kuramicin*, *Higromicin*, *Kolistin*, *Kiamisin*, *Spiramisin*, *Tiamulin*, *Virginiamisin*, *Aviamisin*, *Flavomisin* dan *Tetrasiklin* (Direktorat Jenderal Peternakan, 1991).

Antibiotik adalah komponen kimia yang diproduksi secara biologi oleh organisme seperti jamur atau fungi, bakteri dan tumbuhan yang mempunyai sifat bakteriostatik atau bakteriosidal (Scanes *et al.*, 2004). Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup secara sintesis kimia dengan konsentrasi rendah mempunyai kemampuan menghambat bahkan membunuh mikroorganisme lain (Cheeke, 2003).

Antibiotik adalah komponen kimia yang diproduksi secara biologis oleh tumbuhan atau mikroorganisme terutama fungi, mempunyai sifat bakteriostatik atau bakteriosidal (Leeson dan Summer, 2001). Tempat utama aktivitas antibiotika adalah dalam bagian gastrointestinal. Beberapa macam antibiotik yang dapat dicampurkan

ke dalam ransum antara lain *Bacitracin*, *Colistin*, *Oxytetracycline*, *Kitasamycin* dan *Spiramycin*. Antibiotik umumnya digunakan sebagai pengobatan terhadap infeksi bakteri, namun demikian penggunaan antibiotik dalam dosis rendah dapat menimbulkan pengaruh pemacu pertumbuhan (growth promotor). Antibiotik dengan dosis rendah juga digunakan untuk meningkatkan performa dan kesehatan saluran pencernaan misalnya *Bambermycin* atau *Flavophospholipol*, sedangkan antibiotik dengan konsentrasi tinggi digunakan untuk pengobatan suatu penyakit atau beberapa penyakit (Bolder *et al.* , 1999).

Menurut Siswandono dan Soekardjo (1995), bahwa cara kerja antibiotik adalah sebagai berikut:

1. Menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang memproduksi toksin diantaranya menghalangi atau membunuh mikroorganisme yang menimbulkan infeksi subklinis dan yang bersaing dengan induk semang dalam menyediakan nutrien.
2. Meningkatkan kapasitas daya serap usus, hal tersebut berdasarkan pada pengamatan bahwa pemberian antibiotik menyebabkan dinding usus menjadi tipis sehingga daya serap usus akan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh semakin 22 meningkat. Penggunaan antibiotik memiliki efek antara lain:
 - (1) Antibiotik dapat mencegah penyakit terutama dalam saluran pencernaan.
 - (2) Antibiotik dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menghasilkan amonia dalam jumlah besar.

3. Antibiotik dapat meningkatkan penyerapan nutrisi (kalsium, fosfor dan magnesium) dan menghambat kerusakan nutrisi (vitamin dan asam amino) oleh mikroorganisme.
4. Antibiotik dapat meningkatkan kemampuan absorpsi zat makanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum.

Beberapa efek yang mungkin timbul pada manusia akibat residu antibiotik, antara lain alergi, menyebabkan gangguan kulit, kardiovaskuler, traktus gastrointestinalis, berupa diare dan sakit perut serta urtikaria dan hipotensi. Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah kesehatan baru bagi manusia juga menyebabkan keresahan terhadap konsumsi produk daging ayam. Bukan hanya masalah kadar kolesterol yang tinggi dalam kandungan daging ayam tetapi juga akan timbul masalah jika manusia mengonsumsi daging ayam yang mengandung residu antibiotik. Oleh karena itu, dewasa ini masyarakat terutama di negara Eropa, mulai menghindari penggunaan antibiotika sebagai imbuhan pakan (Leeson dan Summers, 2001).

Salah satu bahan yang banyak diteliti sebagai pengganti antibiotika adalah bioaktif yang terdapat dalam tanaman berkhasiat. Tanaman berkhasiat mengandung zat aktif seperti alkaloid, "bitters", flavonoids, glikosida, saponin, terpenoid dan tanin yang dapat meningkatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit (Sreenivas, 1999). Sebagian dari zat aktif di dalam tanaman sudah diteliti berikut fungsinya (Taylor dan Towers, 1998).

Golongan antibiotika yang positif terdeteksi kemudian ditelusuri jenis senyawa antibiotiknya berdasarkan obat yang diberikan saat budidaya dan diuji secara kuantitatif melalui uji konfirmasi. Tahapan uji ini yaitu ekstraksi, pemurnian, identifikasi dan kuantifikasi sebagai berikut:

1) Golongan tetrasiklin

Sampel ditimbang 5 g, dihomogenkan lalu ditambah 2 ml TCA 20% dan 15 ml dapar *Mcllvaine*. Selanjutnya dikocok lalu sentrifugasi selama 10 menit pada kecepatan 4000 rpm. Ulangi tahapan tersebut pada endapan hasil sentrifugasi. Supernatan yang diperoleh dimasukkan dalam mini kolom C-18 yang telah diaktifasi lalu dialirkan 3 ml metanol 5% dan 3 ml metanol p.a. Eluet yang diperoleh dievaporasi lalu ditambah larutan fase gerak dan disaring. Larutan lalu diinjeksikan ke dalam HPLC dengan kondisi kecepatan alir 1.2 ml/menit, kolom C-18, detektor UV-Vis 365 nm dan menggunakan fase gerak berupa asam oksalat 0,01 M dan campuran ACN-metanol (70:30).

2) Golongan makrolida

Sampel ditimbang 2 g, ditambah 5 ml ACN lalu dihomogenkan. Selanjutnya disentrifugasi pada suhu 5°C selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Ulangi tahapan tersebut pada endapan hasil sentrifugasi. Supernatan ditambahkan 5 ml heksan lalu vortex selama 10 menit. Lapisan atas dibuang kemudian larutan dievaporasi. Ekstrak kering ditambah larutan fase gerak lalu disaring. Larutan lalu diinjeksikan kedalam HPLC dengan kondisi kecepatan alir 0,8 ml/menit, kolom C-18,

detektor UV-Vis 280 nm dan menggunakan fase gerak berupa campuran amonium asetat 0,01 M dan ACN (20:80).

Pemakaian antibiotika dosis kecil dalam pakan untuk memacu pertumbuhan ternak telah dilakukan lebih dari setengah abad yang lalu. Kenyataan menunjukkan bahwa antibiotika dalam dosis yang sangat kecil dapat mempercepat pertumbuhan ternak, sehingga menyebabkan timbulnya kelonggaran dalam memperoleh antibiotika untuk dipergunakan dalam bidang peternakan. Akan tetapi timbulnya kasus resistensi *Salmonella* pada tahun 1960 telah mendorong untuk berpikir tentang kerugian dan keuntungan pemakaian antibiotika dalam bidang peternakan. Pada bulan Juli 1968 dibentuk suatu komisi di Inggris, yang diberi nama *Swann Committe*, yang bertugas membahas pemakaian antibiotika dalam bidang peternakan (Bell, 1986). Dari komisi tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi penting yang diadopsi oleh banyak negara, yang antara lain menyatakan bahwa Antibiotika dapat dipergunakan sebagai imbuhan pakan, akan tetapi sebaiknya yang secara ekonomi memang menguntungkan. Antibiotika yang dipergunakan sebagai imbuhan pakan bukan yang dipergunakan untuk pengobatan baik pada hewan maupun manusia. Pemakaian antibiotika sebagai imbuhan pakan hendaknya tidak menimbulkan resistensi silang atau resistensi berganda terhadap obat yang dipergunakan untuk pengobatan manusia maupun ternak. Antibiotika yang digunakan sebagai imbuhan pakan sebaiknya bisa diperoleh tanpa resep dokter.

F. Persentase Karkas Broiler

Karkas ayam merupakan ayam yang telah dikeluarkan jeroannya, kepala dipisahkan dengan leher hingga batas pemotongan dan kaki. Karkas ayam dibuat klasifikasinya berdasarkan bagian-bagian tubuh (Rasyaf, 1992).

Selama proses pengolahan yaitu dari bentuk ayam yang hidup hingga terwujud daging ayam yang siap masak akan terjadi kehilangan berat hidup kurang lebih 1/3 bagian (berat daging siap masak itu nantinya kurang lebih 2/3 dari berat hidupnya) karena bulu, kaki, cakar, leher, kepala, jeroan atau isi dalam dan ekor dipisah dari bagian daging tubuh dengan demikian daging hanya tinggal 75% dari berat hidup (Resnawati, 2004).

Produksi karkas berhubungan erat dengan bobot badan dan besarnya karkas ayam pedaging cukup bervariasi. Perbedaan ini disebabkan oleh ukuran tubuh, tingkat kegemukan dan tingkat perdagingan yang melekat pada dada. Besarnya persentase karkas dari bobot hidup sekitar 75%. Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain adalah genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk bahan ajektif dan stress. Faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara lain meliputi metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, pH karkas dan daging, bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, hormon dan antibiotik (Nurhayati, 2008).

G. Persentase Lemak Abdominal pada Broiler

Lemak pada tubuh ternak terbagi atas subkutan (bawah kulit), bawah perut, dalam otot (intramuskuler), Lemak abdominal: jantan lebih banyak dan semakin bertambah umur semakin tinggi jumlahnya dan lemak subkutan 13,25% umur 3 minggu, 33,87% pada umur 9 minggu (Resnawati, 2004). Salah satu dari beberapa bagian tubuh yang digunakan untuk menyimpan lemak pada ayam pedaging adalah bagian di sekitar perut yang disebut lemak abdomen. Rataan persentase bobot lemak abdomen berkisar 1,50–2,11% sedangkan dilaporkan Bilgili, bahwa persentase lemak abdomen ayam pedaging 2,6–3,6%. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan strain dan kandungan nutrisi ransum, tingkat energi dan asam amino pada ransum nyata mempengaruhi lemak abdomen. Bertambahnya umur ayam pedaging dan meningkatnya energi dalam ransum makin meningkatkan lemak abdomen. Perbedaan strain nyata mempengaruhi bobot lemak abdomen (Resnawati, 2004).

Kelebihan energi dalam tubuh ayam akan disimpan dalam bentuk lemak, sedangkan metabolisme pembentukan lemak tersebut membutuhkan banyak energi, maka secara tidak langsung terjadi pemborosan energi ransum. Sedangkan penimbunan lemak abdomen termasuk kedalam hasil ikutan, merupakan penghamburan energi dan pengurangan berat karkas, karena lemak tersebut dibuang pada waktu pengolahan. Lemak abdomen merupakan salah satu komponen lemak tubuh, yang terdapat dalam rongga perut (Yusmaini, 2008).

Ayam broiler cenderung menyimpan lemak bila penggunaan energi tidak efisien dan dalam waktu lama. Pemeliharaan broiler di daerah tropis akan

menghasilkan lemak abdomen 2,85% dari berat hidup umur 6 minggu. Kelebihan energi akan menghasilkan lemak, lemak disimpan dalam tubuh sehingga ayam broiler akan terlihat gemuk, penimbunan lemak akan semakin meningkat setelah ayam broiler memasuki masa akhir, karena setelah puncak pertambahan bobot badan di usia 4 minggu pertambahan lemak semakin meningkat, penimbunan lemak ini akan semakin intensif kalau ayam broiler kurang bergerak (Yusmaini, 2008).

Pemeliharaan intensif memungkinkan pergerakan ternak terkontrol, sehingga tidak banyak energi yang terbuang, akibatnya ternak mengalami over energi dan disimpan dalam bentuk lemak lemak abdomen. Adapun fungsi lemak abdomen yaitu sebagai cadangan energi untuk menjamin homeostatis kalori, sebagai bantalan terhadap benturan, dan sebagai penahan dingin waktu suhu lingkungan menurun (Mahfudz, 1999).

H. Protein

Protein merupakan zat nutrisi yang sangat penting, karena yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan (Sediaoetama, 1991). Protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai berat molekul tinggi. Selain itu protein mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur dan fosfor (Anggorodi, 1994). Protein adalah komponen bahan kering yang terbesar dari daging (Soeparno, 1992). Protein di dalam jaringan otot terdiri dari tiga macam bentuk yaitu miofibril, sarkoplasma dan tenunan pengikat. Protein daging ayam disebut berkualitas tinggi, karena mudah dicerna, mudah diserap dan mengandung asam-asam amino esensial

yang lengkap dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan hewan lain di luar unggas (Muchtadi dan Sugiyono, 1992).

Lesson dan Summers (1997), mengemukakan bahwa umur berpengaruh juga pada persentase protein daging. Menurut Santoso dan Tanaka (2000), ayam broiler yang dipelihara pada umur 27 hari mempunyai protein daging sebesar 14,2%, pada umur 42 hari sebesar 14% dan pada umur 56 hari sebesar 13,9%, dan menyimpulkan bahwa semakin bertambah umur ayam maka persentase protein dagingnya akan berkurang. Coetzee dan Hoffman (2002), menyebutkan bahwa penggunaan jenis asam lemak yang berbeda tidak mempengaruhi kadar protein daging. Mutu protein ditentukan dari perbandingan asam-asam amino yang terkandung dalam protein tersebut. Protein hewani menyediakan asam-asam amino esensial dalam jumlah yang lengkap sehingga disebut protein dengan mutu tinggi (Winarno, 1997).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan 27 Januari 2018. Bertempat di kandang unggas dan Laboratorium Ilmu Peternakan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dilanjutkan di Laboratorium Kimia Makanan Ternak Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat-alat yaitu gasolek, kandang litter, lampu pijar 60 watt, tempat pakan gantung, tempat air minum 800 ml, talenan dan timbangan analitik. Sedangkan alat yang digunakan untuk menghitung persentase karkas, persentase lemak abdominal dan protein karkas yaitu cutter, ember, labu khjedhal, labu destilasi, labu ukur 100 ml, lemari asam, erlenmeyer dan timbangan digital.

Bahan yang digunakan pada saat pemeliharaan yaitu antibiotik *Zink Bacitracin*, probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) sebanyak $(1,5 \times 10^6$ cfu/ml), broiler umur satu hari atau *Day old chick* (DOC) sebanyak 36 ekor dengan jenis kelamin campuran (*unsexed*), gula merah, tali rafia, kantong plastik. Sedangkan bahan yang digunakan untuk menghitung persentase kasar yaitu sampel (karkas), menghitung persentase lemak yaitu sampel (lemak abdominal) dan menghitung protein daging yaitu sampel

(daging dada) \pm 0,5 gram, H₂SO₄ pekat 25 ml, air suling 100 ml, H₃BO₃ 2% 10 ml, larutan indicator 4 tetes dan NaOH 30% 10 ml.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 3 ekor broiler sehingga terdapat 36 unit percobaan dengan perlakuan (P) yaitu:

P₀ = Ransum basal (Kontrol).

P₁ = Ransum basal + Probiotik multi strain 1,5 ml/hari, (1-35 hari).

P₂ = Ransum basal + Antibiotik *Zink bacitracin* 0,1 g/hari, (1-35 hari).

P₃ = Ransum basal + Antibiotik *Zink bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik Multi strain 1,5 ml/hari, (22-35 hari).

2. Persiapan dan Pemeliharaan Broiler

Persiapan yang dilakukan sebelum pemeliharaan broiler yaitu:

a. Kandang

Kandang terlebih dahulu disiapkan sebelum DOC (*Day Old Chick*) di masukkan, persiapan kandang dilakukan secara matang dan dilakukan pemasangan tirai serta pembersihan dan *sterilisasi* disekitar kandang dengan cara penyemprotan

desinfektan atau deterjen dan alat-alat yang akan digunakan dan tunggu sampai kering. Setelah itu ditaburi sekam dengan ketebalan 7 cm, tempat pakan dan luas unit kandang yang digunakan 75 x 100 cm. Persiapan dipelihara dari DOC sampai umur diberikan pada ayam sejak umur 1 hari sampai panen. Jumlah ayam perlakuan sebanyak 36 ekor dipilih secara acak dan dimasukkan ke dalam kandang yang telah disekat-sekat dengan bambu masing-masing 3 ekor. Setiap sekat-sekat kandang dilengkapi dengan lampu pijar 60 watt sebanyak 15 buah.

b. Ransum dan Air minum

Pemberian pakan dilakukan beberapa jam setelah DOC minum (3-4 jam setelah DOC minum) pemberian pakan dan air minum dilakukan secara *ad libitum* (terus-menerus) dan dalam pemberiannya itu harus dalam keadaan bersih dan segar dan ransum tersebut telah dicampurkan dengan antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari dan probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) 1,5 ml/hari yang diberikan setiap harinya mulai dari DOC sampai umur 35 hari dan pemberiannya itu dilakukan sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Adapun bahan penyusun ransum yang digunakan pada penelitian ini yaitu jagung 53%, bungkil kedelai 28%, dedak 6%, MBM 8%, minyak 3%, kapur 0,8%, mineral mix 0,3%, vitamix 0,5% dan NaCl (garam) 0,4%. Kandungan nutrisi ransum pada penelitian ini yaitu protein 22,98%, energi metabolisme 3100 kkal/kg, lemak kasar 9.07%, serat kasar 7.61%, kalsium 0.94% dan posfor 0.5% (SNI, 2006).

E. Parameter yang Diukur

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah persentase karkas, persentase lemak abdominal dan protein daging dada. Pengambilan sampel dilakukan pada akhir penelitian akan dilakukan penimbangan bobot karkas dan mengamati lemak abdominal serta protein daging dada pada tiap objek penelitian (broiler), adapun yang diamati yaitu:

1. Persentase Karkas

Menurut Bundy dan Diggins (1960), persentase karkas dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase karkas (\%)} = \frac{\text{Bobot karkas (g)}}{\text{BB hidup ayam (g)}} \times 100\%$$

2. Persentase Lemak Abdominal

Persentase lemak abdominal dilakukan dengan cara menimbang lemak yang didapat dari lemak yang berada pada sekeliling gizzard dan lapisan yang menempel antara otot abdomen serta usus dan selanjutnya ditimbang (Salam dkk, 2013).

Menurut Waskito (1981), persentase lemak abdominal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase lemak abdominal (\%)} = \frac{\text{Bobot lemak abdomen (g)}}{\text{Berat karkas (g)}} \times 100\% \text{ BB}$$

3. Protein Daging Dada

Penentuan kadar protein di analisis menggunakan metode kjedahl (AOAC, 1990). Dilakukan dengan cara menimbang dengan teliti $\pm 0,5$ gram sampel kemudian dimasukan kedalam labu mikro kjedahl 100 ml ditambahkan sebanyak ± 1 gram dan 25 ml H_2SO_4 pekat. Kemudian labu Khjedal bersama isinya di goyangkan sampai semua sampel terbasahi dengan H_2SO_4 . Destruksi di dalam lemari asam sampai berwarna hijau jernih kemudian di dinginkan sampai suhu kamar. Lalu dituangkan kedalam labu ukur 100 ml dan dibilas dengan air suling dan biarkan dingin selanjutnya di impitkan hingga tanda garis dengar air suling lalu di kocok hingga homogen. Menyiapkan penampung yang terdiri dari 10 ml H_3BO_3 2% + 4 tetes larutan indicator campuran dalam Erlenmeyer. Memipet 5 ml larutan sampel ke dalam labu destilasi. Lalu menambahkan 10 ml NaOH 30% dan 100 ml air suling. Kemudian di suling hingga volume penampung menjadi ± 50 ml. Selanjutnya dibilas ujung penyuling dengan air suling kemudian penampung bersama isinya di titrasi dengan larutan H_2SO_4 0,0171 N (Laboratorium Kimia Makanan Ternak, 2017).

Perhitungan :

$$\% \text{ Protein Kasar} = \frac{V \times N \times 14 \times 6,25 \times P}{\text{Berat sampel (mgr)}} \times 100\%$$

Keterangan :

V = Volume Titrasi contoh

N = Normalitas Larutan H_2SO_4

P = Faktor Pengenceran

F. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisa sidik ragam. Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan uji wilayah berganda Duncan untuk melihat perbedaan terhadap setiap sampel perlakuan. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).

Menurut Steel (1991) model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dari pemberian antibiotik dan probiotik ke-j

μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke-i

ϵ_{ij} = Galat

i = P0, P1, P2, P3 (Perlakuan)

j = 1,2,3, (Ulangan)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil pengamatan

Hasil penelitian selama 35 hari yang mencakup pemberian antibiotik (*Zink Bacitracin*) dan probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) terhadap persentase karkas, persentase lemak abdominal dan protein daging dada pada broiler yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rataan persentase karkas, persentase lemak abdominal dan protein daging dada pada broiler yang dipelihara selama 35 hari.

Parameter yang Diukur	Perlakuan				P-value
	P0	P1	P2	P3	
Persentase karkas (%)	67.68±4.88	67.82±12.07	67.53±1.33	65.06±13.81	0.98
Persentase Lemak Abdominal (%)	2.05±0.74	1.74±0.54	2.04±0.50	1.59±0.16	0.64
Protein Daging Dada (%)	23.34±65	22.94±0.65	23.84±0.45	22.49±0.57	0.06

Keterangan: Supeskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ($P < 0,05$).

Hasil sidik ragam persentase karkas, persentase lemak abdominal dan protein karkas disajikan pada Tabel 2 yang menunjukkan perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$). Nilai rata-rata persentase karkas yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berkisar antara P₀ (67.68%±4.88), P₁ (67.82%±12.07), P₂

(67.53%±1.33), P₃ (65.06%±13.81). Nilai rata-rata persentase lemak abdominal berkisar P₀ (2.05%±0.74), P₁ (1.74%±0.54), P₂ (2.04%±0.50), P₃ (1.59%±0.16). nilai rata-rata protein daging dada yang diperoleh dalam penelitian ini berkisar P₀ (23.34%±65), P₁ (22.94%±0.65), P₂ (23.84%±0.45), P₃ (22.49%±0.57).

B. Pembahasan

1. Persentase karkas

Karkas adalah tubuh ayam tanpa bulu, darah, kepala, leher, organ dalam dan *shank*. Rataan persentase karkas ayam broiler dapat dilihat Tabel 2. Rataan persentase karkas ayam bloiler yang pelihara selama lima minggu berkisar antara P₀ (67.68%±4.88), P₁ (67.82%±12.07), P₂ (67.53%±1.33), P₃ (65.06%±13.81). Hasil tersebut lebih tinggi dari hasil penelitian Syukron (2006), yang melaporkan bahwa persentase karkas ayam broiler berkisar antara 56,64-60,02% bobot hidup. Ini sejalan dengan pendapat North and Bell (1990), yang menyatakan bahwa persentase karkas broiler yang normal berkisar antara 65-75% dari bobot hidup, semakin berat ayam yang dipotong, maka karkasnya semakin tinggi pula. Persentase karkas broiler berkisar 65,35% sampai 66,56% (Daud., dkk, 2007).

Hasil sidik ragam seperti yang terlihat pada Tabel 2, menunjukkan bahwa pemberian probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) 1,5 ml/hari selama 1-35 hari dan Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 gr selama 1-35 hari tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas broiler serta tidak mampu mengubah persentase karkas ayam broiler secara signifikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Ronstarci dkk (2007), bahwa penggunaan probiotik (*Cellulomonas* sp) dalam pakan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap persentase karkas, karena dosis yang digunakan yaitu P0 (0 ml/kg), P1 (0,4 ml/kg), P2 (0,8 ml/kg), P3 (1,2 ml/kg) dan P4 (1,6 ml/kg) pakan. Sejalannya hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemberian probiotik dalam bentuk cair maupun padat sama-sama tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap persentase karkas.

Bobot karkas dipengaruhi dengan bobot hidup, oleh karena itu bobot hidup yang besar akan diikuti pula oleh bobot karkas yang besar pula dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahju (1992), bahwa tingginya bobot karkas ditunjang oleh bobot hidup akhir sebagai akibat penambahan bobot hidup ternak bersangkutan. Menurut Hayse dan Merion (1973) dalam Resnawati (2004), menyatakan bahwa bobot karkas yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, jenis kelamin, bobot potong, besar dan konformasi tubuh, perlemakan, kualitas dan kuantitas ransum serta strain yang dipelihara.

Secara statistik P₀ (Kontrol), P₁ (Antibiotik), P₂ (Probiotik) dan P₃ (Antibiotik dan Probiotik) tidak berpengaruh nyata pada persentase karkas akan tetapi dilihat pada semua perlakuan P₁ (67.82%±12.07) cenderung lebih baik dari perlakuan lainnya, semakin berat karkas broiler itu di pengaruhi oleh ransum yang di konsumsi kualitas baik. Hal ini sesuai pendapat Cakra (1986), menyatakan bahwa Kualitas dan kuantitas ransum mempengaruhi berat karkas, makin baik kualitas dan makin banyak konsumsi ransum maka berat karkasnya semakin tinggi. Untuk organ

tubuh seperti kepala, kaki, bulu dan organ dalam dapat mempengaruhi berat karkas, semakin tinggi berat organ tersebut maka berat karkasnya semakin rendah.

Persentase karkas dan lemak abdominal sangat erat kaitannya karena apabila umur dan bobot badan tinggi maka karkas juga semakin meningkat. Meningkatnya berat badan diikuti pula dengan menurunnya kandungan lemak abdominal pada broiler. Hal ini sejalan dengan pendapat Brake *et al* (1993), persentase karkas berhubungan dengan jenis kelamin, umur dan bobot badan. Hal yang sama dilaporkan oleh Tillman *et al* (1998), bahwa pada umumnya meningkatnya bobot badan ayam diikuti oleh menurunnya kandungan lemak abdominal yang menghasilkan produksi daging yang tinggi.

2. Persentase lemak abdominal (LA)

Lemak abdominal adalah lemak yang ada disekitar rongga perut, organ pencernaan, ginjal dan bursa fabricius. Penimbunan lemak dalam rongga perut dapat disebabkan oleh konsumsi energi secara berlebihan sehingga melebihi kebutuhan untuk metabolisme normal. Sedangkan yang termasuk didalam organ dalam adalah hati, jantung, rempela dan seka ayam broiler. Hasil sidik ragam seperti yang terlihat pada Tabel 2, menunjukkan bahwa pemberian probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) dan antibiotik (*Zink Bacitracin*) tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap persentase lemak abdominal. Rata-rata persentase lemak abdominal yang diperoleh dalam penelitian ini berkisar P_0 ($2.05\% \pm 0.74$), P_1 ($1.74\% \pm 0.54$), P_2 ($2.04\% \pm 0.50$), P_3 ($1.59\% \pm 0.16$).

Persentase lemak abdominal karkas broiler berkisar antara 0,73% sampai 3,78%. Lemak abdominal mempunyai hubungan korelasi dengan total lemak karkas, semakin tinggi kandungan lemak abdominal maka semakin tinggi kandungan lemak karkas pada broiler (Salam dkk., 2013). Jika lemak abdominal broiler persentasinya semakin meningkat, dapat menurunkan kuantitas dan kualitas daging yang dikonsumsi dan dianggap terjadi penghamburan energi pakan broiler. Penimbunan lemak abdominal dipengaruhi beberapa faktor, antara lain tingkat energi dalam ransum, umur dan jenis kelamin (Al-Sultan., 2003).

Menurut Poendjiadi (2005) bahwa serat kasar yang berasal dari pakan setelah dikonsumsi akan mengikat asam empedu sesampainya di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan fungsi empedu untuk membantu penyerapan lemak akan terhambat. Selanjutnya asam empedu yang sudah terikat oleh serat kasar akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses sehingga mengakibatkan penurunan deposisi lemak abdominal. Hal ini sejalan dengan Sutardi (1992) bahwa serat dapat mengurangi absorpsi lemak sehingga deposisi lemak ke dalam tubuh ayam dapat ditekan. Selanjutnya, Mahfudz dkk (2000) menambahkan untuk mencerna serat kasar dibutuhkan energi yang banyak sehingga ayam tidak memiliki energi yang berlebih untuk disimpan dalam bentuk lemak.

Semakin rendah persentase lemak abdominal yang telah dihasilkan cenderung lebih baik, sehingga diketahui bahwa lemak abdominal itu memiliki hasil ikutan yang dapat mempengaruhi kualitas karkas. Sebagaimana yang telah diketahui semakin rendah persentase lemak abdominal maka semakin baik karkas yang

diperoleh. Hal ini sesuai dengan Yuniastuti (2002) Tinggi rendahnya kualitas karkas broiler ditentukan dari jumlah lemak abdominal yang terdapat dari broiler tersebut. Karkas yang baik harus mengandung daging yang banyak mengandung kadar lemak yang rendah.

3. Protein Daging Dada

Protein merupakan salah satu nutrisi yang terkandung dalam bahan pangan yang berguna untuk mencukupi kebutuhan nutrisi manusia. Kadar protein daging adalah presentase protein dalam daging yang di ukur dengan metode kjedhal yang di hitung dari BK sampel. Hasil sidik ragam seperti yang terlihat pada Tabel 2, menunjukkan bahwa pemberian probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) dan antibiotik (*Zink Bacitracin*) tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap protein karkas. Rata-rata protein karkas yang diperoleh dalam penelitian ini berkisar P_0 ($23.34\% \pm 0.65$), P_1 ($22.94\% \pm 0.65$), P_2 ($23.84\% \pm 0.45$), P_3 ($22.49\% \pm 0.57$). Dari hasil penelitian ini protein daging ayam broiler P_2 ($23.84\% \pm 0.45$) lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian Pastariati *et al.* (2003) bahwa kadar protein daging ayam segar 19,20% dan Hardini *et al.* (2010) bahwa kadar protein daging ayam broiler sebesar 20,42%, tetapi masih rendah dari hasil penelitian Winedar *et al.* (2004) kandungan protein daging sebesar 21,8% sampai 23,2%.

Secara statistik P_0 (Kontrol), P_1 (Antibiotik), P_2 (Probiotik) dan P_3 (Antibiotik dan Probiotik) tidak berpengaruh nyata, hasil penelitian menunjukkan kadar protein tertinggi terdapat pada perlakuan P_2 (23,84%), sedangkan rata-rata kadar

protein terendah pada perlakuan P3 (22,49%). Pada kontrol P0 (tanpa perlakuan) kadar protein daging sebesar (23,34%). Akan tetapi terjadi peningkatan kadar protein pada P2 kemudian turun pada perlakuan P1 dan P3. Hal tersebut yang mengakibatkan tinggi rendahnya protein daging berpengaruh pada pakan. Hal ini sesuai pendapat Soeparno (1998), yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas protein dalam pakan akan meningkatkan protein dalam tubuh broiler.

Kadar protein daging erat kaitanya dengan pakan dengan nilai nutrisi yang cukup serta sistem pencernaan yang baik. Jin *et al.* (1997) bahwa pemberian probiotik dalam pakan dapat mempertahankan mikroflora usus agar seimbang. Hardini *et al.* (2010) bahwa pemberian *Bacillus sp.* dalam ransum sangat potensial untuk menyediakan kebutuhan protein dalam pakan ayam broiler. Sjojfan (2003) melaporkan bahwa pencernaan protein meningkat dari 65,7% menjadi 71,5% dan kandungan energi termetabolis pakan meningkat dari 2.558 kkal/kg menjadi 2.601 kkal/kg pada ayam yang memperoleh probiotik *Bacillus sp.* Winedar *et al.* (2004) menyatakan bahwa pakan yang difermentasi oleh mikroorganisme mengalami perombakan yang lebih sederhana sehingga bahan pakan organik yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Winarno dan Fardiaz (1980), menyatakan hal ini disebabkan fermentasi menghasilkan enzim-enzim tertentu yang dapat menguraikan protein menjadi asam amino sehingga lebih mudah diserap tubuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian antibiotik (*Zink Bacitracin*) dan probiotik multi strain tidak memberikan berpengaruh yang nyata ($P>0,05$) terhadap persentase karkas. Walaupun demikian, dari perlakuan P_1 ($67.82\% \pm 12.07$) yang diberikan ransum basal + Probiotik multi strain 1,5 ml/hari (1-35), cenderung lebih baik terhadap persentase karkas dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
2. Pemberian antibiotik (*Zink Bacitracin*) dan probiotik multi strain tidak memberikan berpengaruh yang nyata ($P>0,05$) terhadap persentase lemak abdominal (LA). Walaupun demikian, perlakuan P_3 ($1.59\% \pm 0.16$) yang diberikan ransum basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik multi strain 1,5 ml/hari (22-35 hari), cenderung lebih baik dari perlakuan lainnya.
3. Pemberian antibiotik (*Zink Bacitracin*) dan probiotik multi strain tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P>0,05$) terhadap protein daging dada. Walaupun demikian, dari perlakuan P_2 ($2.04\% \pm 0.50$) yang diberikan ransum basal + antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari (1-35 hari), cenderung lebih baik dari perlakuan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai level pemberian antibiotik dan probiotik cair yang tepat agar diketahui konsentrasi yang optimal dalam meningkatkan persentase karkas, menurunkan persentase lemak abdominal (LA) dan meningkatkan protein daging dada pada broiler.

DAFTAR PUSTAKA

- Abun, Aisyah dan Saefulhadjar. 2006. Pemanfaatan Limbah Cair Ekstraksi Kitin dari Kulit Udang Produk Proses Kimiawi dan Biologis Sebagai Imbuhan Pakan dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ayam Broiler. *//http: pemanfaatan_limbah_cair_ekstraksi_kitin.pdf*.
- Afriani, H. 2002. *Pengaruh Dosis Kultur Bacillus Sp dan Saccharomyces Cerevisiae Sebagai Probiotik Terhadap Performan, Kadar Lemak dan Kolesterol Karkas Ayam Broiler*. Tesis Program Pasca sarjana Universitas Pajajaran, Bandung.
- AOAC. 1990. *Official Method of Analysis* (13 ed). *Association of Official Analytical Chemist*, Washington, DC.
- Anggorodi, R. 1994. *Ilmu Makanan Ternak Umum*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Alkalin, A.S., S. Gonc and S. Duzel. 1997. Influence of Yoghurt and Acidophilus Yoghurt on Serum Cholesterol Level in Mice. *J. Dairy Sci.* 80: 2721-2725.
- Al-Sultan, S. I. 2003. The Effect of Curcuma Longa (Tumeric) on Overall Performance of Broiler Chickens. *International Journal of Poultry Science*, 2 (5): 351-353.
- Astuti, F. K. Busono dan Sjojfan. 2015. *Pengaruh Penambahan Probiotik Cair dalam Pakan Terhadap Penampilan Produksi pada Ayam Pedaging*. Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya: Malang.
- Backman, P. A., Brannen, P. M dan Mahaffe, W. F. 1994. Plant Respon and Disease Control Following Seed Inoculation With Bacillus Sp. Di dalam: Ryder, M. H., Stephens, P. M., Bowen, G. P. editor. *Improving Plant Productivity Wih Rhizosphere Bacteria. Pruc Third Int Work PGPR Souh*, Australia.
- Barrow, P. A. 1992. *Probiotics for Chickens*. Chapman and Hall, London.
- Batrinon, A. 2010. The Use of Lactic Acid Bacteria in Probiotic Bacteria. *Thei of Athena*.

- Balevi, T., U.S.U. AN, B. Cokun, V. Kurtolu and S. Etingul. 2001. Effect of Dietary Probiotic on Performance and Humoral Immune Response. *Br Poult Sci.* 42: 456 – 461.
- Bahri, S, E. Masbulan dan A.Kusumaningsih. 2005. Proses Praproduksi Sebagai Faktor Penting dalam Menghasilkan Produk Ternak yang Aman untuk Manusia. *Jurnal Litbang Pertanian* 24 (1).
- Bell, I. 1986. Rational chemotherapeutics Australian Veterinary Poultry Association. Proceedings no. 92, *Poultry Health.* :429-467 .
- Bidura, I.G.N.G dan Suastina, I.G.P.B. 2002. Pengaruh Suplementasi Ragi Tape dalam Ransum Terhadap Efisiensi Penggunaan Ransum. *Majalah Ilmiah Peternakan. Vol 5 (1):* 06-11.
- Bolder, N., J.A. 1999. The Effect of Flavophospholipol (Flavomycin) and Salinomycin Sodium (Sacox) on The Excretion of Clostridium Perfringens, Salmoella Enteritis and Campylobacter Jejuni in Broiler After Experimental Infection. *Journal Poultry Sci.* 78 : 1681-1689.
- Brake, J., G.B. Havenstein., S.E. Schidelet., P.R. Ferket and D.V. River. 1993. Relationship of Sex, Age and Body Weight to Broiler Carcass Yield and Offal Production. *Poultry Science.* 70: 680-688.
- Brander, G.C. 1977 . The use of Antibiotics in The Veterinary Field in The 1970's. in Antibiotics and Antibiosis in Agriculture. *Butterworths London* : 199-209.
- Candrasih, N. N. K dan I.G.N.G. Bidura. 2001. Pengaruh Penggunaan Cangkang Kakao yang Disuplementasi Ragi Tape dalam Ransum Terhadap Penampilan Itik Bali. *Majalah Ilmiah Peternakan. Vol 4 (3):* 67.
- Cakra, I. G. L. O. 1986. Pengaruh Pemberian Hijauan Versus Top Mix Terhadap Karkas dan Bagian Tubuh Lainnya pada Ayam Pedaging. *Skripsi Fakultas Peternakan, Denpasar.*
- Coetzee, G. J. M and L. C. Hoffman. 2002. Effect of Various Dietary n-3/n-6 Fatty Acid Ratios on The Performance and Body Composition of Broilers. *South African J. Animal Sci.* 32 (3): 175-184.
- Cheeke, P.R. 2003. Applied Animal Nutrition, Feeds and Feeding. *3rd ed, Pearson Prentice Hall, New Jersey.*

- Cole, C.B and R. Fuller. 1984. A note on The Effect of Host Specific Fermented Milk on The Coliform Population of The Neonatal Rat Gut. *J. App. Bacteriol.* 56: 495-498.
- Crawford, L and Franco., D.D. 1994. Animal Drug and Human Health. *Technomic Publishing Co. Inc. USA.*
- Daud, M., W. G. Piliang dan P. Kompiang. 2007. Persentase dan Kualitas Karkas Ayam Pedaging yang Diberi Probiotik dan Prebiotik dalam Ransum. *JITV*, 12 (3): 167-174.
- Departemen Agama RI. 2002. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Dirjen Kelembagaan Islam, Jakarta.
- De Vos P., Garrity, Jones, Krieg, Ludwig, Rainey, Sclifer and Witman. 2009. Bergey's Manual of Systematic Bacteria Second Edition. *Springer Dordrecht Heidelberg, London, New York.*
- Diaz, D. 2008. Safety and Efficacy of Ecobiol as Feed Additive for Chickens for Fattening. *The European Food Safety Authority (EFSA) Journal* 773 : 2-13.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 1991. *Ringkasan Imbuhan Pakan (Feed Additive) untuk Hewan. Edisi II*. Direktorat Binaan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta.
- FAO/WHO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. 2001. Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. *Amerian Córdoba Park Hotel, Córdoba, Argentina.*
- Fuller, M. F. 1989. Probiotics in Man and Animal. *J. Appl Bacteriol* 66 : 365-378
- _____. 1992. *Probiotics the Scientific Basis*. Chapman and Hall, London.
- _____. 1997. *Probiotic 2. Application and Practical Aspects*. 1st. Ed. Chapman and Hall, London.
- Fardiaz, S. 1992. *Analisis Mikrobiologi Pangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Goldin, B.R and S.L. Gorbach. 1984. The Effect of Milk and Lactobacillus Feed Ing on Human Intestinal Bacterialenzyme Activity. *Amer. J. Glin. Nutr.* 39 756-761.

- Hadioetomo, R. S. 1985. *Mikrobiologi Dasar-Dasar Praktik*. Gramedia, Jakarta.
- Hardini, D and Irfan H.Djunaidi. 2010. Influence of Dietary bacillus Sp. Fermented Shrimp Waste on Broiler Meat Quality. *International Journal of Poultry Science*, 9(5):455-458.
- Hayse, P. L dan W.W., Merion. 1973. Eviscerated Yield Components Part and Meat Skin Bone Ration in Chicken Broiler. *Poultry Science* 52;718-721.
- Jawetz, M dan Adelberg"s. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran*. Salemba Medika, Jakarta.
- Jin, J. Z., Abdullah, N., Ali, M. A dan Jalaludin S. 1998. Effect of Adherent Lactobacillus Cultures on Growth, Weight of Organs and Intestinal Microflora and Volatile Fatty Acids in Broiler. *Anim Feed Sci*. Vol 70 (3): 197-209.
- .1997. Probiotic in Poultry. Modes of Action. *World`s Poultry Science Journal*, 53 : 351-368.
- Johnson, E. 1986. Persistence of Lactobacillus Strain in The Gut of Suckling Piglet and Its Influence on Performance and Health. *Swed. J. Agric. Res*. 6:43-47.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Dirjen Kelembagaan Islam, Jakarta.
- Kompiang, I P. 2000. Pengaruh Suplementasi Kultur *Bacillus spp*. Melalui Pakan atau Air Minum Terhadap Kinerja Ayam Petelur. *Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner* 5(4): 205-209.
- . 2003. *Peningkatan Efisiensi Penggunaan Pakan pada Unggas dengan Pemberian Feed Supplement (Laporan Akhir Tahun 2003)*. Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor.
- . 2009. Pemanfaatan Mikroorganisme Sebagai Probiotik untuk Meningkatkan Produksi Ternak Unggas di Indonesia. *J. Pengembangan Inovasi Pertanian*. Vol 2 (3): 177-191.
- Kusmiati dan Malik, A. 2002. Aktivitas Bakteriosin dari Bakteri *Leuconostoc Mesenteroides* Pb ac1 pada Berbagai Media. *Makara Kesehatan*. 6 (1): 1-6.

- Kartasudjana, R dan E. Suprijatna. 2006. *Manajemen Ternak Unggas*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Leeson, S and J. D. Summers. 1997. *Commercial Poultry Nutrition 2nd Edition*, University Books, Canada.
- . 2001. Feeding System for Poultry. in: Theodorou, M. K. and J. France (Eds.). *Feeding System and Feed Evaluation Models*. CAB International, Wallingford.
- Lindgren, S.E dan W.J. Dobrogosz. 1990. Antagonistic Activities of Lactic Acid Bacteria in Food and Fermentation FEMS Microbial. *Journal of Science*. Vol 87 : 149.
- Malago, J.J. 2011. *Probiotic Bacteria and Enteric Infections-Cytoprotection by Probiotic Bacteria*. Springer, New York.
- Mangisah, I., N. Suthama dan H.I. Wahyuni. 2009. *Pengaruh Penambahan Starbio dalam Ransum Berserat Kasar Tinggi terhadap Performan Itik*. Fapet Undip. Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan, 20 Mei 2009, Semarang.
- Murtidjo, B. A. 1993. *Pedoman Peternakan Ayam Broiler*. Yayasan Kanisium, Yogyakarta
- . 2003. *Pedoman Beternak Ayam Broiler*. Kanisius, Yogyakarta.
- Muchtadi, T. R dan Sugiyono. 1992. *Petunjuk Laboratorium: Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Mahfudz. 2009. Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler yang Diberi Ampas Bir dalam Ransum. *Jurnal Ilmiah*. Semarang.
- Mahfudz, L. D., W. Sarengat dan B. Srigandono. 2000. *Penggunaan ampas tahu sebagai bahan penyusun ransum ayam broiler*. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Peternakan Lokal, Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto.
- Napitupulu, N. R. A., Kanti, T., Yuliner, Y. R., Hardiningsih dan Julistiono, H. 1997. DNA Plasmid *Lactobacillus* Asal Makanan Fermentasi Tradisional yang Berpotensi dalam Pengembangan Sistem Inang Vektor untuk Bioteknologi Pangan. *Jurnal Mikrobiologi Tropis*. Hal 91-96.

- Nurhayati, 2008. Pengaruh Tingkat Penggunaan Campuran Bungkil Inti Sawit dan Onggok yang Difermentasi dengan *Aspergillus niger* dalam Pakan terhadap Bobot dan Bagian-bagian Karkas Broiloeer. *J Anim Prod.* 10:55-59.
- North, M. O and Bell, D. D. 1990. *Commercial Chicken Production Manual*. 4th Edition. Van Nostrand. Reinhold, New York.
- Neto, M. G., G. M. Pesti and R. I. Bakali. 2000. Influence of Dietary Protein Level on The Broiler Chicken's Response to Methionine and Betaine Supplements. *Poultry Science.* 79: 1478-1484.
- Owings, W. J., Reynolds, D.L., Hasiak, R. J. and Ferket, R. 1990. Influence of Dietary Supplementation With *Streptococcus Faecium* M-74 on Broiler Body Weight, Feed Conversion, Carcass Characteristics and Intestinal Microbial Colonization. *Poult. Sci.* Hal 1257-1264.
- Parakkasi, A. 1995. *Ilmu Gizi dan Makanan Ternak Monogastrik*. Angkasa, Bandung.
- Panda, A.K., M.R. Reddy, S.V. Rama Rao and N.K. Praharaj. 2003. Production Performance, Serum/Yolk Cholesterol and Immune Competence of White Leghorn Layers as Influenced by Dietary Supplementation with Probiotic. *Trop. Anim. Health Prod.* 35(1): 85 – 94.
- Pestariati, E. B. Wasito & D. Handijatno. 2003. *Pengaruh lama penyimpanan daging ayam pada suhu refrigerator terhadap jumlah total kuman, Salmonella Sp., kadar protein dan derajat keasaman*. JBP. 5(2) : 49-53.
- Prado, F. C., J. L. Parada, A. Pandey, C. R. Soccol. 2008. Trends in Non-Dairy Probiotic Beverages. *Food Research Internaional.* 41(2):111-123.
- Rasyaf, M., 1992. *Beternak Ayam Pedaging*. Penerbit Swadaya, Jakarta.
- . 1995. *Menajemen beternak ayam broiler*. Penerbit Swadaya. Jakarta.
- Ronstarci, T., Osfar, S. dan Irfan, H. D. 2007. *Pengaruh Penambahan Probiotik Selulolitik (Cellulomonas Sp.) dalam Pakan Terhadap Kualitas Karkas, Lemak Abdominal dan Berat Organ dalam Ayam Pedaging*. S2 Thesis. Universitas Brawijaya, Malang.
- Resnawati, H., 2004. Bobot Potongan Karkas Dan Lemak Abdomen Ayam Ras Pedaging yang Diberi Ransum Mengandung Tepung Cacing Tanah. *Pros. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.

- Santoso, 2010. Pengaruh Suplementasi Ekstrak Daun Katuk Plus Kunyit pada Pakan Berlemak Tinggi terhadap Kualitas Karkas Broiler.//[http: /Pengaruh Suplem entasi Ekstrak Daun Katuk Plus Kunyit pada Pakan Berlemak Tinggi terhadap Kualitas Karkas Broiler « *jurnal urip santoso.htm*//](http://PengaruhSuplementasiEkstrakDaunKatukPlusKunyitpadaPakanBerlemakTinggi terhadapKualitasKarkasBroiler«jurnaluripsantoso.htm/).
- Salam, S., A. Fatahilah., D. Sunarti dan Isroli. 2013. Bobot karkas dan lemak abdominal broiler yang diberi tepung jintan hitam (*Nigella sativa*) dalam ransum selama musim panas. *Jurnal Sains Peternakan*, 11 (2): 84-89.
- Saxelin, M .1997. Lactobacillus GG – a Human Probiotic Strain with Thorough Clinical Documentation. *Food Rev Int. Vol. 13*: 293–313.
- Scanes, C. G., G. Brant & M. E. Ensminger. 2004. *Poultry Science. 4th Ed. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.*
- Sperti, G.S. 1971. *Probiotics. AVI PublishingCo., West Point, Connecticut.*
- Shihab. M. Q. 2002. *Tafsir. Lentera Hati, Jakarta.*
- Setiawan, I dan E. Sujana. 2009. *Bobot akhir, Persentase Karkas dan Lemak Abdominal Ayam Broiler yang Dipanen pada Umur yang berbeda.* Seminar Nasional Fakultas Peternakan Unuversitas Padjajaran, Bandung.
- Soeparno. 1992. *Ilmu dan Teknologi Daging.* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____. 1994. *Ilmu Teknologi Daging.* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____.1998. *Ilmu dan Teknologi Daging.* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soeharsono, 2010. *Probiotik Basis Ilmiah, Aplikasi, dan Aspek Praktis.* Widya Padjajaran, Bandung.
- Santoso, U dan K. Tanaka. 2000. Pengaruh Umur Terhadap Aktivitas Enzim Lipogenik di Hati dan Akumulasi Lemak pada Ayam Broiler. *Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner.* 6: 89-93.
- Sediaoetama, A.d. 1991. *Ilmu Gizi untuk Profesi dan Mahasiswa.* Cetakan ke-2 Dian Rakyat, Jakarta.
- Smith, H.W. 1965. The Development of The Flora of The Alimentary Tract in Young Animals. *J. Pathol. Bacteriol.* 90: 495-513.

- Sterling, K. G., Harter, J. M., Estienne, M. J and Mcelwain, K. V. 1998. Effect of Enzyme Addition in Pelleted Vs. Mash Barley Based Diets For Broilers. *Abstract American society of animal science northeast section*. Hal 76-81.
- Standarisasi Nasional Indonesia. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging (Broiler Starter)*. SNI 01-3930-2006.
- _____. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging (Broiler Finisher)*. SNI 01-3931-2006.
- Suprijatna, E. U., Atmomarsono dan Kartasudjana, R. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Siswandono & B. Soekardjo. 1995. *Kimia Medisinal*. Universitas Airlangga Press. Surabaya.
- Sjofjan, O, 2003. *Kajian Probiotik (Aspergillusniger dan Bacillus sp.) Sebagai Imbuhan Ransum dan Implikasinya terhadap Mikroflora Usus serta Penampilan Produksi Ayam Petelur*. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Syukron, M. 2006. Kandungan Lemak dan Kolesterol Daging serta Persentase Organ dalam Ayam Broiler yang Diberi Ransum Finisher dengan Penambahan Kepala Udang. *Skripsi*. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tami, D., S.A. Latief dan A. Handayani. 2002. *Pemakaian Probiotik Starbio dalam Ransum yang berkualitas Rendah terhadap Performa Ayam Broiler*. Seminar Pengembangan Peternakan Berbasis Sumberdaya Lokal, Fapet Univ. Andalas, Padang.
- Taylor, R.S.L. And G.H.N. Towers. 1998. Antibacterial Constituents of The Nepaleseherb, Centipeda Minima. *Phytochem*. 47: 631-634.
- Temim, S., A. M. Chagneau, S. Guillaumin, J. Michel, R. Pereson, P.A. Geraert, S. Tesseraud. 1999. Effect of Chronic Heat-Exposed and Protein Intake on Growth Performance, Nitrogen Retention and Muscle Development in Broiler Chickens. *Reproduction Nutrition Development*.
- Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo dan S. Lebdosoekojo. 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Cetakan ke-5. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- _____. 1998. *Ilmu Makanan Ternak Dasar. Edisi Keenam*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Winedar., Hanifiasti, Shanti Listyawati and Sutarno. 2004. Daya Cerna Protein Pakan, Kandungan Protein Daging dan Pertambahan Berat Badan Ayam Broiler Setelah Pemberian Pakan yang Difermentasi dengan Effective Microorganisms-4 (EM-4). *Bioteknologi* 3.(1):14-19.
- Wong, P. T. W. 1994. *Bio-Control of Wheat Take-All in The Field Using Soil Bacteria and Fungi. Di dalam: Ryder, M. H., Stephens, P. M., Bowen, G. P. editor. Improving Plant Productivity Wih Rhizosphere Bacteria. Pruc Third Int Work PGPR Souh, Australia.*
- Walton, J.R. 1977. A Mechanism of Growth promotion: Non-lethal Feed Antibiotic Induced Cell Wall Lesions in Enteric Bacteria. In: Antibiotics and Antibiosis. *Woodbine, M. (Ed). Butterworths, London. pp. 259-264.*
- Wahyono, F. 2002. The Influence of Probiotic on Feed Consumption, Body Weight and Blood Cholesterol Level in Broiler Fed on High Saturated or Unsaturated Fat Ration. *J. Trop. Anim. Dev* 27 : 36-44
- Wahju, J. 1992. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Cetakan Ketiga. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Winarno, F. G. 1997. *Kimia Pangan dan Gizi*. Gramedia, Jakarta.
- Winarno, F.G., S. Fardiaz, dan D. Fardiaz. 1980. *Pengantar Teknologi Pangan*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Wilson and Schild. 1961. *Aplied Pharmacology. Tenth Edition. Little Brown Company-Boston. p.591-592.*
- Yusmaini, 2008. Pengaruh Suhu Panas dan Umur Pematangan Terhadap Bobot Relatif, Lemak Abdominal Kandungan Lemak Daging Paha dan Kolesterol Total Plasma Darah Ayam Broiler. *//IMG.pdf//*.
- Yuniastuti, A. 2002. Efek Pakan Berserat pada Ransum Ayam Terhadap Kadar Lemak dan Kolesterol Daging Broiler. *JITV. Vol 9 (3) : 175 - 183.*
- Yu, J.R. 2008. Evaluation of *Lactobacillus Reuteri* Pg4 Strain Expressing Heterologous B-glucanase as a Probiotic in Poultry Diets Based on Barley. *Anim Feed Sci.*

Yeo, J and K. Kim. 1997. Effect of Feeding Diets Containing an Antibiotic, a Probiotic, or Yucca Extract on Growth and Intestinal Urease Activity in Broiler Chicks. *Poultry Sci.* 76: 381-385.



Lampiran 1. Uji SPSS Versi 16 Pengaruh Pemberian antibiotik dan probiotik dalam peningkatkan persentase karkas, persentase lemak abdominal dan protein daging dada pada broiler.


Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Persentas Karkas P0	3	67.0833	4.87996	2.81745	54.9608	79.2058	61.62	71.01
P1	3	67.8233	12.07479	6.97138	37.8279	97.8188	55.14	79.18
P2	3	66.8633	.44377	.25621	65.7609	67.9657	66.37	67.23
P3	3	65.0600	13.80614	7.97098	30.7636	99.3564	49.30	75.02
Total	12	66.7075	8.16432	2.35684	61.5201	71.8949	49.30	79.18
Persentase Lemak Abdominal P0	3	2.0500	.73980	.42712	.2122	3.8878	1.46	2.88
P1	3	1.7367	.53575	.30932	.4058	3.0676	1.36	2.35
P2	3	2.0433	.49813	.28760	.8059	3.2808	1.47	2.37
P3	3	1.5867	.15567	.08988	1.2000	1.9734	1.44	1.75
Total	12	1.8542	.49469	.14280	1.5399	2.1685	1.36	2.88
Protein Daging Dada P0	3	23.3367	.65363	.37737	21.7130	24.9604	22.62	23.90
P1	3	22.9367	.45081	.26028	21.8168	24.0566	22.45	23.34
P2	3	23.8367	.38175	.22040	22.8883	24.7850	23.55	24.27
P3	3	22.4933	.57012	.32916	21.0771	23.9096	22.03	23.13
Total	12	23.1508	.68435	.19755	22.7160	23.5856	22.03	24.27

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Persentase_karkas					
Between Groups	12.375	3	4.125	.046	.986
Within Groups	720.842	8	90.105		
Total	733.217	11			
Lemak_Abdominal					
Between Groups	.478	3	.159	.576	.646
Within Groups	2.213	8	.277		
Total	2.692	11			
Protein_Daging_Dada					
Between Groups	2.949	3	.983	3.571	.067
Within Groups	2.202	8	.275		
Total	5.152	11			





Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Ket: Proses Pembersihan Kandang



Ket: Proses Pembuatan Sekat-sekat Kandang



Ket: Antibiotik dan Probiotik yang digunakan



Ket: Vaksin Yang Digunakan



Ket: Pencampuran Probiotik di Air Minum



Ket: Pemberian Vaksinasi



Ket: Penimbangan dan pencampuran pakan



Ket: Penimbangan karkas broiler



Ket: Penimbangan dan perhitungan persentase lemak abdominal



Ket: Uji Analisis Laboratorium

RIWAYAT HIDUP



Wahyuni Biasa di sapa Uni lahir di Bulukumba 02 Januari 1996. Lahir dari keluarga yang sederhana, anak pertama dari dua bersaudara yakni dari pasangan suami istri Syaifuddin dan Husni. Sekarang tinggal di Pondok Afiqa Jln. Mustafa Dg. Bunga-Romang polong. Penulis pernah belajar di SD. NO. 44 Dampang selama 6 Tahun. Dan melanjutkannya di SMPN 05 Bulukumba Kec Gantarang Kab. Bulukumba. Pada tahun 2011 penulis mengecap di MA Negeri 1 Bulukumba dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Peternakan melalui jalur SPAN_PTKIN pada tahun 2014.

Penulis bersyukur atas karunia Allah SWT sehingga dapat mengenyam pendidikan yang merupakan bekal untuk masa depan dan juga berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama ,keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Penulis memiliki prinsip untuk selalu memotivasi diri “ Orang yang ingin sukses adalah orang yang tak pernah mau menyerah, walaupun jatuh beberapa kali tetap selalu bangkit dan berusaha”

Wassalamualaikum wr.wb.....