

**PEMANFAATAN TUMBUHAN AZOLLA (*Azolla pinnata*)  
SEBAGAI PUPUK ORGANIK CAIR DAN KOMPOS PADA  
PERTUMBUHAN TANAMAN CABAI BESAR (*Capsicum  
annum L.*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddun Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
**AKHMAD NUR**  
NIM: 60300112087  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Nur  
NIM : 60300112087  
Tempat /Tgl.Lahir : Labuang Mangatti/27 September 1993  
Jurusan/Prodi : Biologi/S1  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Alamat : Jln. H.M. Yasin Limpo Samata Gowa.  
Judul : Pemanfaatan Tumbuhan *Azolla (Azolla pinnata)* Sebagai Pupuk Organik Cair dan Kompos Pada Pertumbuhan Tanaman Cabai Besar (*Capsicum annum L.*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Maret 2018

Penyusun



**Akhmad Nur**

NIM: 60300112087




## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pemanfaatan Tumbuhan *Azolla pinnata*) Sebagai Pupuk Organik Cair dan Kompos Pada Pertumbuhan Tanaman Cabai Besar (*Capsicum annum L.*) ”, yang disusun oleh Akhmad Nur, NIM: 60300112087, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis, 29 Maret 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Makassar, 29 maret 2018 M


12 Rajab 1438 H

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag. (.....)	
Sekretaris	: Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd. (.....)	
Munaqisy I	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si. (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Shuhufi Abdullah, M.Ag. (.....)	
Pembimbing I	: Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si. (.....)	
Pembimbing II	: Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P. (.....)	

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

  
Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag  
NIP. 19691205199303 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Akhmad Nur**, NIM: 60300112087, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Tumbuhan Azolla (*Azolla pinnata*) Sebagai Pupuk Organik Cair dan Kompos Pada Pertumbuhan Tanaman Cabai Besar (*Capsicum annum L.*)”, memandang bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 29 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si  
NIP.19750222 20912 2 002



Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P  
NIP. 2020097802

UNIVERSITAS ALAUDDIN  
MAKASSAR

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemanfaatan Tumbuhan Azolla (*Azolla pinnata*) Sebagai Pupuk Organik Cair Dan Kompos Pada Pertumbuhan Tanaman Cabai Besar (*Capsicum annum L.*) ”** Shalawat dan salam tidak lupa penulis hanturkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai sekarang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Muhammad Jasman dan ibunda St. Salma tercinta dan tersayang, yang tak henti-hentinya mendoakan, memberi limpahan kasih sayang sejak penulis lahir hingga sekarang dan motivasi baik secara moril maupun materil, semoga Allah Swt memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat atas seluruh perjuangan yang ayah dan ibunda lakukan sehingga saya mampu menyelesaikan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak hal-hal yang perlu di koreksi dan penulis juga meyakini bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hal yang mudah sehingga peran dan partisipasi dari berbagai pihak sangat berarti dan

berguna bagi penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini dan penulis juga menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sejawarannya.
2. Prof. Dr. A.Qadir Gassing HT.,MS., selaku Rektor periode 2011-2015 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sejawarannya.
4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Hasyimuddin, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
6. Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing I dan Nurlailah Mappanganro S.p, M.P. selaku Dosen Pembimbing II penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan telah meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Hasyimuddin, S.Si., M.Si dan Dr. Shuhufi Abdulla, M.Ag selaku Dosen Penguji I dan II terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran, dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.

8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Pengajar yang selama ini telah menjadi inspirator, mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah kepada penulis kampus ini, serta kepada seluruh staf jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islma Negeri Alauddin Makassar penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kk Ati selaku operator jurusan Biologi yang telah membantu dalam pengurusan surat baik saat kuliah sampai penulis menyelesaikan study.
9. Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si, selaku kepala Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya.
10. Kak Zulkarnain S.Si., M.Kes, selaku Laboran Laboratorium Botani, yang sudah membantu dan membimbing penulis selama penelitian, dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Irwan, S.Si dan Asrul S.IP dan Sitti Fatima, S.Si yang telah membantu penulis saat penelitian
11. Kepala Perpustakaan beserta jajarannya, penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi selama ini.
12. Terkhusus buat teman-teman pengurus HMJ Biologi periode 2014/2015 yang memberikan kenangan dan kebersamaan yang sangat berarti selama masa kepengurusan
13. Spesial buat keluarga besar Biologi 2012 (Ranvier) terima kasih banyak atas segala kenangan, dukungan, kebersamaan dan bantuannya, kalian tidak akan terlupakan.

14. Teman-teman yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi, keluarga besar Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi angkatan 2013, terkhusus buat Elma Rahmawati, Firdawati, 2014, 2015, terkhusus buat Nurbianti, 2016 dan 2017 terima kasih atas segala kenangan selama masa perkuliahan.
15. Seluruh keluarga KKN Angkatan ke-51 Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang khususnya Posko Kelurahan Betteng yaitu Bapak dan Ibu posko sekeluarga, dan teman-teman posko penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas kenangan yang telah di berikan masa KKN.
16. Spesial juga buat teman-teman yang sudah seperti saudara penghuni pondok Kanal Indah, kanda Abu bakar, Hasrullah, Nur Alim, Idris, Andi rifal, Moh. Fahmi, Salim dan Rijal penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuan, motivasi, dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga segala bantuan yang di berikan kepada penulis baik berupa moril maupun materi mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amin.

Makassar, 29 Maret 2018  
Penulis

**Akhmad Nur**  
**NIM: 60300112087**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1-9
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Kajian pustaka .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN TEORITIS</b> .....	10-27
A. Ayat yang Relevan.....	10
B. Tanaman Cabai .....	11
C. <i>Azolla pinnata</i> .....	15
D. Pupuk Organik.....	17
E. Fermentasi .....	20
F. Unsur Hara Esensial Tumbuhan.....	21
G. Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan .....	20
H. Kerangka fikir .....	26
I. Hipotesis .....	27
<b>BAB III</b> <b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	28-35
A. Jenis dan pendekatan Penelitian .....	28
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	28
C. Variabel Penelitian .....	28
D. Definisi Operasional Variabel .....	29
E. Metode Pengumpulan Data .....	30

	F. Alat dan Bahan .....	31
	G. Prosedur Kerja .....	31
	H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36-59
	A. Hasil Penelitian.....	36
	B. Pembahasan .....	50
BAB V	PENUTUP .....	60
	A. Kesimpulan .....	60
	B. Implikasi Penelitian (Saran) .....	60
KEPUSTAKAAN	.....	61-65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	.....	66-80



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kandungan gizi buah cabai ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	13
Tabel 2.2. Kandungan kompos azolla ( <i>Azolla pinnata</i> ) .....	16
Tabel 4.1. Hasil uji BNT arah horizontal pertambahan tinggi tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	36
Tabel 4.2. Hasil uji BNT arah vertical pertambahan tinggi tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	38
Tabel 4.3. Hasil uji lanjut Duncan pertambahan tinggi tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	39
Tabel 4.4. Hasil uji BNT horizontal pertambahan diameter batang tanaman cabai ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	41
Tabel 4.5. Hasil uji BNT arah vertikal pertambahan diameter batang tanaman Cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	42
Tabel 4.6. Hasil uji lanjut Duncan pertambahan diameter batang tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	44
Tabel 4.7. Hasil uji BNT horizontal pertambahan jumlah daun tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	46
Tabel 4.8. Hasil uji BNT vertikal pertambahan jumlah daun tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	47
Tabel 4.9. Hasil uji lanjut Duncan pertambahan jumlah daun tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	49

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Morfologi Tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.).....	12
Gambar 2.2. Tanaman azolla ( <i>Azolla pinnata</i> ). .....	16
Gambar 4.1. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	40
Gambar 4.2. Rata-rata pertambahan diameter batang tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.).....	45
Gambar 4.3. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman cabai besar ( <i>Capsicum annum</i> L.) .....	50

**ABSTRAK**

**Nama** : Akhmad Nur  
**Nim** : 60300112087  
**Judul Skripsi** : **Pemanfaatan Tumbuhan Azolla (*Azolla pinnata*) Sebagai Pupuk Organik Cair dan Kompos Pada Pertumbuhan Tanaman Cabai (*Capsicum annum L.*)**

---

Cabai besar (*Capsicum annum L.*) adalah salah satu tanaman hortikultura yang menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Setiap tahun permintaan pasar semakin meningkat, dikarenakan jumlah penduduk bertambah, sedangkan luas lahan berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dan kompos azolla terhadap pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan eksperimental laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktor dengan 16 perlakuan 3 kali ulangan sehingga terdapat 48 unit percobaan. Perlakuan faktor pertama terdiri atas 0 ml/l air (P0), 5 ml/l air (P1), 10 ml/l air (P2), dan 15 ml/l air (P3) faktor kedua tanpa kompos azolla 0% (K0), kompos 10% (K1), kompos 20% (K2) dan kompos 30% (K3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi P1K3 yang terbaik pada tinggi tanaman dengan rata-rata 7.70 cm, kombinasi P3K3 yang terbaik pada diameter batang dengan rata-rata 0.68 cm dan pada kombinasi P1K3 yang terbaik pada jumlah daun dengan rata-rata 9.33 helai.

Kata Kunci : Poc, Kompos azolla, (*Capsicum annum L.*) dan Pertumbuhan.

**ABSTRAK**

**Nama** : Akhamd Nur  
**Nim** : 60300112087  
**Judul Skripsi** : **Utilization of Azolla Plants (*Azolla pinnata*) As Liquid Organic Fertilizer and Compost on Chilli Plant Growth (*Capsicum annum L.*)**

---

Big chili (*Capsicum annum L.*) is one of the horticultural crops that become the leading in. Every year, Market demand increases, as the number of population (people) increase, while the land area is reduced. This research aims to find out the effect of the liquid organic fertilizer and azolla compost for the growth of large chili plants (*Capsicum annum L.*). The research is quantitative research using experimental laboratory approach with Randomized Complete Design (RAL) of 2 Factor with 16 treatments 3 times of repetition that there are 48 experimental units. The first factor treatment consisted of 0 ml / 1 water (P0), 5 ml / 1 water (P1), 10 ml / 1 water (P2), and 15 ml / 1 water (P3) second factor without azolla 0% (K0), compost 10% (K1), compost 20% (K2) and compost 30% (K3). The results showed that the best combination of P1K3 at plant height with an average of 7.70 cm, the best combination of P3K3 in stem diameter with an average of 0.68 cm and in the best combination of P1K3 on the number of leaves with an average of 9, 33 strands.

Keywords: Poc, Compost azolla, (*Capsicum annum L.*) and Growth

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang***

Al-Qur'an telah mengajarkan kepada umat manusia bahwasanya Allah swt telah menciptakan seluruh isi bumi ini dengan berbagai fungsi dan manfaat untuk umat manusia serta dianjurkan untuk menjaga dan melestarikannya.

Allah berfirman dalam QS. Luqman/31:10, yang berbunyi:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ ۱۰

Terjemahnya:

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang, dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala tumbuhan yang baik”. (Departemen Agama RI, 1989).

Menurut Shihab (2004), dari ayat tersebut menyifati Allah dengan dua dari asma-Nya yaitu Maha Perkasa dan Maha Bijaksana dalam rangka membuktikan kebenaran janji-Nya. Kini dilanjutkan dengan memaparkan kekuasaan dan kehebatan ciptaan-Nya sekaligus sebagai bukti keperkasaanNya. Ayat tersebut menyatakan: Dia menciptakan langit yang demikian tinggi dan besar tanpa tiang yang kamu melihatnya dengan mata kepala seperti itu, dan Dia meletakkan di permukaan bumi yang merupakan hunian kamu gunung-gunung yang sangat kukuh sehingga tertancap

kuat supaya ia yakni bumi ini tidak goncang bersama kamu, kendati ia lonjong dan terus berputar, dan Dia mengembangbiakkan di sana segala jenis binatang yang berakal, menyusui, bertelur, melalat dan lain-lain, dan Kami turunkan air hujan dari langit, baik yang cair maupun yang membeku, lalu Kami tumbuhkan padanya setelah percampuran tanah dengan air yang turun itu segala macam pasang tumbuh-tumbuhan yang baik.

Dari ayat tersebut telah menjelaskan kepada manusia untuk selalu mengingat, mempelajari serta mengkaji seluruh ciptaan Allah swt. Ilmu pengetahuan telah memberikan informasi bahwa tidak akan terjadi stabilitas di permukaan muka bumi tanpa gunung dan manusia selalu dianjurkan untuk selalu menjaga dan melestarikan segala ciptaan Allah swt. Salah satu yang perlu kita lestarikan di bumi untuk menjaga stabilitas adalah tumbuhan perlu diketahui bahwa tumbuhan *Azolla* memberikan pengaruh baik untuk pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya serta merupakan pakan binatang untuk kelangsungan hidupnya. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari kita telah menyaksikan akan manfaat dari tanaman yang selalu menjadi bahan konsumsi manusia salah satunya adalah tanaman cabai (*Capsicum annum* L.) yang mempunyai nilai gizi tinggi. Itulah satu bukti nyata bahwa seluruh ciptaan Allah swt memberikan pengaruh baik untuk kelangsungan hidup di muka bumi ini.

Sayuran merupakan salah satu komponen dalam menu makanan yang dapat meningkatkan nafsu makan. Pada dasarnya sayuran dari tanaman memiliki nilai gizi yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia selain itu tanaman juga

menjadi prioritas dalam bisnis di dunia khususnya di Indonesia salah satunya adalah tanaman cabai (*Capsicum annum* L.)

Cabai merah (*Capsicum annum* L.) adalah salah satu sayuran yang sangat digemari baik di Indonesia maupun di luar negeri serta mempunyai nilai gizi yang tinggi dan salah satu peluang bisnis yang sangat baik. Cabai merah adalah bahan baku yang biasa dijadikan sebagai bumbu untuk makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Cabai (*Capsicum annum* L.) merupakan tanaman sayuran buah semusim yang telah dikenal dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain dapat dikonsumsi segar, cabai dapat dikonsumsi kering sebagai bumbu masakan dan juga sebagai bahan baku industri pangan, dan farmasi. Tanaman cabai mengandung zat-zat gizi antara lain protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin (A, C, dan B1), dan senyawa alkaloid seperti *capsaicin*, flavonoid, dan minyak esensial (Setiadi, 2008).

Menurut Arfani (2013) seiring dengan berkembangnya industri pangan nasional, cabai merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan secara berkesinambungan, karena merupakan bahan pangan yang dikonsumsi setiap saat, maka cabai akan terus dibutuhkan dengan jumlah yang semakin meningkat. Kebutuhan cabai merah di Indonesia setiap tahun meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Produksi cabai besar mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 1.045.587 ton dibandingkan dengan tahun 2015 dengan produksi 1.045.182 ton.

Kenaikan produksi disebabkan karena bertambahnya jumlah luas panen sebesar 2.557 hektar. Produktivitas tahun 2016 sebesar 8.47 ton/ha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 (BPS Dirjen Hortikultura, 2017).

Produksi cabai besar di Sulawesi Selatan antara tahun 2011-2014 yang cenderung meningkat. Produksi cabai besar tahun 2014 sebesar 28,01 ribu ton atau meningkat sebesar 6,64 ribu ton (31,10 persen) dibandingkan tahun 2011. Sehingga rata-rata peningkatan produksi cabai besar selama 4 tahun terakhir adalah sekitar 7 persen. Dari tahun 2013 ke 2014 produksi cabai besar juga mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2013, produksi cabai besar Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 879 ton (3,24 persen). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan produktivitas sebesar 0,38 ton per hektar (5,14 persen). Sedangkan untuk luas panen mengalami penurunan relatif kecil sebesar 66 hektar (-1,82 persen) (BPS Dirjen Hortikultura, 2015).

Setelah kita mengetahui akan rendahnya tingkat produksi cabai di Indonesia dan jumlah penduduk semakin bertambah serta kebutuhan cabai (*Capsicum annum* L.) semakin meningkat maka perlu ada inovasi terbaru yang dapat menanggulangi akan krisisnya kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Maka dari itu kita harus peka melihat dari berbagai aspek serta mengavaluasi apa yang menjadi kendala akan rendahnya produksi cabai di Indonesia. Mahalnya pupuk anorganik merupakan salah satu kendala bagi petani kelas menengah ke bawah serta dapat mengurangi kesuburan tanah jika digunakan secara berkelanjutan dan menekan populasi mikroorganisme yang dapat bermutualisme dengan tumbuhan maka dari itu pupuk organik salah satu

solusi yang tepat untuk peningkatan produksi tanaman cabai. Pupuk organik dapat mengemburkan lapisan permukaan tanah, meningkatkan populasi jasad renik, mempertinggi daya serap dan daya simpan air pada tanah serta harga terjangkau dari semua kalangan. Pupuk organik dapat dibedakan atas pupuk organik cair dan padat.

Pupuk organik cair dapat berasal dari bahan-bahan organik seperti kotoran ternak, limbah padat pertanian, tumbuhan air dan lain sebagainya. Salah satu tumbuhan air yang dapat digunakan sebagai pupuk organik adalah azolla (*Azolla pinnata*). Azolla merupakan jenis tumbuhan pakuan air yang hidup mengapung di lingkungan perairan dan mempunyai sebaran yang cukup luas serta mampu menambat N<sub>2</sub> dari udara sebagai sumber hara nitrogen (Suryati, 2014).

Kompos merupakan pupuk organik yang berasal dari sisa tanaman, hewan dan limbah organik yang telah mengalami proses dekomposisi atau fermentasi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hara bagi tanaman (Parnata, 2010).

Dekomposisi bahan organik mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Pengaruh langsung seperti menyediakan unsur hara, sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu penyediaan bahan organik tanah yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan unsur hara. Pupuk kompos azolla dapat dipilih untuk mempertahankan kesuburan tanah melalui bahan organik. Azolla adalah tanaman pakuan yang hidup di air yang memegang peranan penting memfiksasi nitrogen bebas dari udara. Selain berperan sebagai bahan organik, azolla yang tumbuh pada tanaman padi dapat menekan pertumbuhan gulma (Sebayang, 1996).

Keunggulan kompos azolla yaitu kandungan unsur hara kompos azolla lebih tinggi dari kompos lain. Kompos azolla tidak tercemar logam berat yang merugikan tanaman dan dapat meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik (Djojosoewito, 2000).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan tanaman azolla sebagai pupuk organik cair dan kompos pada pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*).

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pupuk organik cair dan kompos azolla terhadap pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*)?
2. Interaksi antara pupuk organik cair dan kompos azolla manakah yang memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*)?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini menggunakan tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) yang diperoleh dengan cara membibitkan benih cabai. Benih cabai yang digunakan adalah benih berlabel dengan no. lot: 160104. Kemudian tanaman dibudidayakan di dalam polybag serta pengambilan tanaman azolla (*Azolla pinna*) di danau tanralili kabupaten gowa. Parameter pengamatan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang. Penelitian dilaksanakan di *green house*

jurusan biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### **D. Kajian Pustaka**

1. Putra (2013), Pengaruh Pemberian Berbagai Bentuk Azolla dan Pupuk N Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Manis (*Zea mays* var. saccharata), dari ketiga bentuk pengaplikasian azolla, bentuk azolla kering dan kompos azolla memberikan pengaruh positif terhadap parameter jumlah daun pertanaman, bobot kering per tanaman dan kadar gula jagung dibandingkan aplikasi azolla segar. Namun dengan aplikasi ketiga bentuk azolla tersebut secara umum memberikan perbaikan kesuburan tanah pada aspek kimia tanah antara lain persentase C-Organik, persentase N-total, C/N ratio, persentase bahan organik tanah dan nilai KTK tanah. Kombinasi perlakuan dosis aplikasi pupuk N tertinggi dengan aplikasi azolla yang memiliki kandungan N tertinggi tidak selalu memberikan hasil yang tertinggi pula. Kombinasi perlakuan pupuk N 75% + kompos azolla dan perlakuan aplikasi pupuk N 25% + azolla kering dapat menjadi pilihan untuk mencapai produksi yang optimal namun dapat mengefisiensikan penggunaan pupuk N anorganik dan meningkatkan kesuburan tanah.
2. Ismoyo (2012) Pengaruh Dosis Kompos Azolla dan Kalium Organik Terhadap Ketersediaan Kalium dan Hasil Kacang Tanah Pada Alfisofil memberikan pengaruh nyata terhadap K tertukar, kadar bahan organik, N total tanah, kapasitas

tukar kation, berat segar brangkas dan berat kering brangkas tanaman kacang tanah pada tanah alfisol namun tidak berpengaruh terhadap kadar pH, berat segar polong, berat kering polong, jumlah polong, tinggi tanaman, berat biji dan jumlah biji kacang tanah di tanah alfisol.

3. Gatot (2012), Kajian Aplikasi Kompos Azolla dan Pupuk Anorganik Untuk Meningkatkan Hasil Padi Sawah (*Oryza sativa* L) pada perlakuan dosis organik kompos azolla 6 t.ha<sup>-1</sup> menunjukkan hasil gabah per hektar yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan dosis pupuk organik kompos azolla yang lain yaitu sebesar 8,67 t.ha<sup>-1</sup> dengan presentasi gabah isi 89,62 persen. Perlakuan dosis pupuk anorganik 100 persen menunjukkan hasil gabah per hektar yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan dosis pupuk anorganik yang lain yaitu sebesar 8,09 t.ha<sup>-1</sup> dengan presentasi gabah isi 86 persen.
4. Aksan (2014), Kajian Pemanfaatan Kompos Azolla Guna Mereduksi Dosis Pupuk Nitrogen Anorganik Pada Budidaya Sawi (*Brassica juncea* L.), Perlakuan pemupukan 120 kg N kompos *Azolla pinnata*/hektar (P7) menghasilkan panjang akar dan berat segar tanaman paling optimal dan kompos *Azolla pinnata* mampu menggantikan pupuk N anorganik Urea yang setara dengan 120 kg N /hektar, Perlakuan pemupukan 20 kg N Urea + 100 kg N kompos *Azolla pinnata*./hektar (P6) menghasilkan nilai Laju Asimilasi Bersih (LAB) , Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) , dan berat kering daun tanaman yang paling optimal, dan biomassa kompos *Azolla pinnata* mampu mereduksi pupuk N anorganik yang setara

dengan 100 kg N /hektar, Pupuk *Azolla pinnata* bisa menggantikan sebagian atau keseluruhan kebutuhan nitrogen tanaman sawi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dan kompos azaolla terhadap pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*).
2. Untuk mengetahui interaksi yang terbaik antara pupuk organik cair dan kompos azolla terhadap pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*)

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan azolla sebagai pupuk organik cair dan kompos dalam pengembangan budidaya tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*).
2. Mengkaji secara mendalam tentang pengaruh pupuk organik cair dan kompos azolla terhadap pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*)
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Ayat yang Relevan

Al-Qur'an Surah, Al-Imran/3: 190-191, Allah swt berfirman:


 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ   
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Departemen Agama RI, 1989).

Menurut Shihab (2002), ayat ini menjelaskan sebagian ciri-ciri siapa dinamai *Ulul albab* yang disebut pada ayat sebelumnya. Mereka adalah orang-orang baik laki-laki ataupun perempuan yang terus menerus mengingat Allah swt dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat kerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring atau bagaimanapun dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan alam raya

dan segala isinya dengan sia-sia, tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami, atau lihat, atau dengar, dari keburukan atau kekurangan. Maha suci Engkau dari semua itu.

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat manusia, tentang bagaimana melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan alam. Salah satu contoh pelestarian lingkungan dalam agama islam adalah adanya perhatian akan penghijauan lahan dengan cara menanam dan bertani. Salah satu hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

مِمَّنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا  
كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/ tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Imam Bukhari dan muslim dari Anas)

Imam al-Qurtubi, mengatakan di dalam tafsirnya ; “bertani bagian dari fardhu kifayah, maka pemerintah harus menganjurkan manusia untuk melakukannya, salah satu bentuk usaha itu adalah dengan menanam pohon”

## **B. Tanaman Cabai**

### **1. Morfologi Tanaman Cabai**

Cabai termasuk tanaman dikotil berbentuk semak, batangnya berkayu, tipe percabangannya tegak atau menyebar dengan karakter yang berbeda-beda tergantung spesiesnya. Struktur perakarannya diawali dari akar tunggang yang sangat kuat, yang bercabang-cabang ke samping dengan akar rambut. Pola pertumbuhannya vegetatif berupa percabangan-percabangan dikotomi dari batang utama dan tunas-tunas lateralnya. Daun cabai merupakan daun tunggal dengan helai daun berbentuk bulat telur lebar atau lanset. Daun berwarna hijau atau hijau tua, tumbuh pada tunas-tunas samping berurutan, pada batang utama dan tunggal tersusun secara spiral (Rubatzky dan Yamaguchi, 1990).



Gambar 2.1. Morfologi tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.)

Tanaman cabai tergolong berumah satu. Artinya dalam satu bunga terdiri dari satu alat kelamin jantan dan betina. Sebab berumah satu tanaman cabai dapat melakukan penyerbukan sendiri (*open polination*). Umumnya bunga cabai tersusun di atas tangkai bunga dan terdiri atas dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Letak bunga menggantung dengan panjang 1-1,5 cm. Panjang tangkai bunga berkisar

1-2 cm. Bakal buah tampak kelabu dengan pangkal putik. Putik sepanjang 0,5 cm terlihat putih bening dengan warna kepala putik hijau. Cabai tergolong buah buni berbentuk kerucut memanjang, lurus atau bengkok, meruncing pada bagian ujungnya, menggantung, permukaan licin mengkilap, diameter 1-2 cm, panjang 4-17 cm, bertangkai pendek, rasanya pedas. Buah muda berwarna hijau tua, setelah masak menjadi merah cerah. Sedangkan untuk bijinya biji yang masih muda berwarna kuning, setelah tua menjadi cokelat, berbentuk pipih (Redaksi Trubus, 2014).

## 2. Taksonomi Tanaman Cabai

Menurut Tjitrosoepomo (1994) taksonomi tanaman cabai (*Capsicum annum* L.) sebagai berikut

Regnum : Plantae  
Divisio : Spermatophyta  
Subdivisio : Angiospermae  
Classis : Dicotyledonae  
Ordo : Solanales  
Familia : Solanaceae  
Genus : *Capsicum*  
Species : *Capsicum annum* L.

## 3. Kandungan Gizi Tanaman Cabai

Adapun menurut Redaksi Trubus (2014) mengenai kandungan gizi buah cabai per 100 gr yaitu:

Tabel 2.1. Kandungan gizi buah cabai per 100 gr (Redaksi trubus, 2014)

Komposisi Gizi	Jenis Cabai			
	Hijau besar	Merah besar kering	Merah besar segar	Rawit segar
Kalori (kal)	23,0	311,0	31,0	103,0
Protein (g)	0,7	15,9	1,0	4,7
Lemak (g)	0,3	6,2	0,3	2,4
Karbohidrat (g)	5,2	61,8	7,3	19,9
Kalsium (g)	14,0	160,0	29,0	45,0
Fosfor (mg)	23,0	370,0	24,0	85,0
Zat besi (mg)	0,4	2,3	0,5	2,5
Vitamin A ( S.I.)	260,0	576,0	470,0	11.050,0
Vitamin B1 (mg)	0,1	0,4	0,1	0,2
Vitamin C (mg)	84,0	50,0	18,0	70,0
Air (g)	93,4	10,0	90,9	71,2

Selain sebagai pembangkit selera makan, cabai dengan rasa pedasnya telah lama diyakini berkhasiat bagi kesehatan. Rasa pedas pada cabai ditimbulkan oleh zat *capsaicin*. *Capsaicin* terdapat pada biji cabai dan pada plasenta, yakni kulit cabai bagian dalam yang berwarna putih tempat melekatnya biji. Rasa pedas tersebut bermanfaat untuk mengatur peredaran darah, memperkuat jantung, nadi dan syaraf, mencegah flu dan demam, membangkitkan semangat dalam tubuh (tanpa efek narkotik), serta mengurangi nyeri encok dan rematik (Prajnanta, 1999).

#### 4. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai

##### 1. Keadaan Iklim

Pada umumnya cabai dapat ditanam di dataran rendah sampai pegunungan (dataran tinggi), saat ini produsen benih sudah dapat menghasilkan benih cabai yang bisa tumbuh di dataran rendah, menengah sampai dataran tinggi sekitar 2500 meter dpl (Wiryanto, 2006). Cabai merah merupakan jenis tanaman yang dapat ditanam dengan kisaran suhu antara 21°C – 27 °C (Setiadi, 2008),

## 2. Keadaan Tanah

Hampir semua jenis tanah yang cocok untuk budidaya tanaman pertanian, cocok pula bagi tanaman cabai. Untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas hasil yang tinggi, cabai menghendaki tanah yang subur, gembur, kaya akan organik, tidak mudah becek (menggenang), bebas cacing (nematoda) dan penyakit tular tanah. Kisaran pH tanah yang ideal adalah antara 5.5 - 6.8, bila pH kurang dari 5 tanaman akan tumbuh kerdil karena kekurangan unsur hara Ca dan Mg atau keracunan Al dan Mn, sedangkan bila pH lebih dari 7 tanaman akan menunjukkan gejala klorosis, tanaman kerdil dan daun menguning karena kekurangan unsur hara Fe (Rukmana dan Oesmana, 2006).

### **C. *Azolla pinnata***

*Azolla* merupakan tumbuhan kecil yang mengapung di air, terlihat berbentuk segitiga atau segiempat, berukuran 2-4 cm x 1 cm, terdiri atas 3 bagian, (yaitu akar, rhizome, dan daun yang terapung), Akar soliter, menggantung di air, berbulu. 1-5 cm, dengan membentuk kelompok 3-6 rambut akar. Rhizoma merupakan

sporofit, daun kecil, membentuk 2 barisan, menyirip bervariasi, duduk melekat, cuping dengan cuping dorsal berpegang di atas permukaan air dan cuping ventral mengapung. Daun berongga di dalamnya hidup *Anabaena azolloen* (Heddy, 2003).

*Azolla* sangat peka terhadap kekeringan, sehingga habitat yang berair merupakan kebutuhan utama untuk tetap bertahan hidup. Tumbuhan ini akan mati dalam beberapa jam jika berada pada kondisi kering. Penyebarannya secara luas pada daerah sedang (*temperate*), dan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu di daerah tropis. Kondisi lingkungan yang baik adalah suhu antara 20°- 25°C (Yunus, 1987).

*Azolla* merupakan sumber nitrogen, karena *azolla* mampu bersimbiosis dengan *Annabaena sp.* *Annabaena sp.* adalah salah satu jenis *Blue-Green Algae* yang mampu berasosiasi di dalam ruangan daun paku air *azolla*, dan salah satu yang menarik adalah kemampuannya memfiksasi kandungan N dalam udara (Gunawan Budiyanto, 2014).

Tabel 2.2. Kandungan kompos *azolla* (*Azolla pinnata*) (Suryati, dkk., 2015).

Unsur hara makro	Kandungan	Unsur hara mikro	Kandungan
Nitrogen (N)	4,5%	Calcium (Ca)	0.4-1%
Phospor (P)	0.5-0.9%	Magnesium (Mg)	0.5-0.6%
Kalium (K)	2-4.5%	Ferum (Fe)	0.06-0.26%
		Mangan (mn)	0.11-0.16%



Gambar 2.2. Tanaman azolla (*Azolla pinnata*)

Menurut Khan (1988), bahwa klasifikasi ilmiah dari azolla adalah sebagai

berikut:

- Regnum : Plantae  
Divisio : Pteridophyta  
Classis : Pteridopsida  
Ordo : Salviniales  
Famili : Salviniaceae  
Genus : *Azolla*  
Species : *Azolla pinnata*

#### ***D. Pupuk Organik***

Pupuk dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang diberikan pada tanaman langsung maupun tidak langsung dapat menambah zat-zat makanan yang tersedia dalam tanah, disamping itu untuk memperbaiki keadaan fisik, kimia maupun biologis tanah. Pemupukan dilakukan karena media tanam tidak mampu menyediakan satu atau beberapa unsur hara yang diperlukan tanaman untuk menjamin suatu tingkat tertentu (Sutedjo, 1999).

Pupuk hijau cair adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan azolla yang masih segar yang difermentasi kemudian diberikan atau disemprotkan ke dalam tanah atau pada bagian tanaman. Bagian yang sering digunakan untuk pupuk hijau cair adalah daun, tangkai, dan batang yang masih muda. Umumnya, semua jenis tanaman bisa dijadikan sebagai pupuk hijau cair. Namun, jenis tanaman yang paling bagus untuk pupuk hijau cair adalah tanaman yang akarnya bersimbiosis dengan mikroorganisme pengikat nitrogen (Hadisuwito, 2007)

Penggunaan pupuk organik yang lebih efektif dan efisien adalah dalam bentuk pupuk cair. Pupuk cair lebih mudah terserap oleh tanaman karena unsur-unsur di dalamnya sudah terurai. Tanaman tidak hanya menyerap hara melalui akar tapi juga bisa melalui daun-daun tanaman. Penggunaan pupuk cair lebih mudah pekerjaan dan penggunaannya, dalam sekali pemberian pupuk organik cair melakukan 3 macam proses sekaligus, yaitu: memupuk tanaman, menyiram tanaman dan mengobati tanaman (Pratama, 2008).

Pupuk hijau cair mempunyai beberapa manfaat diantaranya dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, cekaman cuaca dan serangan hama dan penyakit, merangsang pertumbuhan cabang produksi, serta meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah, serta mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah (Isnaini 2015).

Nitrogen adalah unsur yang diperlukan oleh rumput secara terus menerus. Fungsi nitrogen adalah: 1) untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, 2) menyehatkan pertumbuhan daun dan biji dan tanaman lebih hijau, dan 3) meningkatkan perkembangan mikroorganisme dalam tanah (Susetyo, 1980).

Pemberian pupuk nitrogen pada tanaman mempunyai peranan dalam merangsang pertumbuhan jaringan tanaman, jumlah anakan (*tiller*) dan lebar daun (Setyamdjaja, 1986).

Pemberian unsur nitrogen dengan dosis yang tepat menyebabkan pertumbuhan vegetatif berlangsung cepat dan daun menjadi lebih hijau (Tisdale and Nelson, 1975). Kekurangan unsur hara nitrogen dalam tanah akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan akar terbatas, daun kekuningan-kuningan atau menjadi kering, sedangkan kelebihan nitrogen akan memperlambat kematangan tanaman (terlalu banyak pertumbuhan vegetatif), batangnya lemah, mudah rebah dan mengurangi daya tahan tanaman terhadap penyakit (Soepardi, 1983).

Kompos adalah hasil pembusukan dari tumbuhan azolla yang disebabkan oleh aktivitas mikroba pengurai. Pengomposan didefinisikan sebagai proses

biokimiawi yang melibatkan mikroba sebagai agen (perantara) yang merombak bahan organik menjadi bahan yang mirip dengan humus. Hasil perombakan tersebut disebut kompos (Novizan, 2007).

Kompos memiliki keunggulan-keunggulan lain yang tidak dapat digantikan oleh pupuk kimiawi, yaitu kompos mampu:

- a. Mengurangi kepadatan tanah, sehingga memudahkan perkembangan akar dan kemampuannya dalam penyerapan hara.
- b. Meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air, sehingga tanah dapat menyimpan air lebih lama dan mencegah terjadinya kekeringan pada tanah.
- c. Menahan erosi tanah, sehingga mengurangi pencucian hara.
- d. Menciptakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan jasad penghuni tanah seperti cacing dan mikroba tanah yang sangat berguna bagi kesuburan tanah (Aminah, 2003).

#### **E. Fermentasi**

Fermentasi adalah proses dasar untuk mengubah suatu bahan menjadi suatu bahan lain dengan cara sederhana dan dibantu oleh mikroba. Proses fermentasi ini merupakan bioteknologi sederhana. Fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Proses fermentasi dapat meningkatkan ketersediaan zat-zat makanan seperti protein dan energi metabolisme serta mampu memecah komponen kompleks menjadi komponen sederhana (Zakariah, 2012).

Fermentasi juga merupakan proses pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anaerobik, yaitu tanpa memerlukan oksigen. Senyawa yang dapat dipecah dalam proses fermentasi terutama karbohidrat, sedangkan asam amino hanya dapat difermentasi oleh beberapa jenis bakteri tertentu. Fermentasi sebagai suatu proses dimana komponen-komponen kimiawi dihasilkan sebagai akibat adanya pertumbuhan maupun metabolisme mikroba (Fardiaz, 1992).

#### **F. *Pertumbuhan dan Perkembangan***

Pertumbuhan adalah suatu peningkatan ukuran sel-sel tunggal, atau peningkatan jumlah sel atau keduanya. Pertumbuhan umumnya terjadi pada berbagai bagian organisme, atau mungkin lebih besar pada beberapa bagian dibanding bagian lainnya. Berbagai organisme contohnya kebanyakan pohon terus tumbuh tanpa berhenti (Hala, 2006).

Proses pertumbuhan ditandai dengan terbentuknya suatu organ pada tanaman yang mengalami perubahan antara lain terbentuknya daun, batang, biji dan buah. Semua bagian tubuh-tumbuhan yang secara langsung maupun tidak langsung berguna untuk menegakkan kehidupan tumbuhan, yaitu yang terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat (Tjitrosoepomo, 2007).

Di dalam biji terdapat embrio yang dilindungi oleh kulit biji, embrio tersebut mendapatkan pasokan makanan. Embrio sumbu dengan dua buah kutub yaitu calon akar dan batang. Pada kondisi baik biji akan berkecambah menjadi tumbuhan muda. Pertumbuhan akar menuju ke tanah dan pertumbuhan batang menuju atas,

pertumbuhan akar dan batang ini, dengan pembentukan sel baru yang dilakukan oleh jaringan meristem pada titik tumbuh, diikuti dengan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Tumbuhan dewasa akan membentuk bunga setelah bunga masak akan terjadi penyerbukan dan pembuahan sehingga terbentuklah buah yang berisi biji. Biji ini nantinya dapat tumbuh sehingga lengkaplah daur hidupnya ( Mulyani, 2006).

### **G. Unsur Hara Esensial Tumbuhan**

Beraneka ragam unsur dapat ditemukan di dalam tubuh tumbuhan, tetapi tidak berarti bahwa seluruh unsur-unsur tersebut dibutuhkan tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Beberapa unsur yang ditemukan di dalam tubuh tumbuhan malah dapat mengganggu metabolisme atau meracuni tumbuhan, sebagai contoh adalah beberapa jenis logam berat seperti Al, Ag, dan Pb. Suatu unsur dikatakan esensial bagi tumbuhan adalah jika tumbuhan tidak dapat melengkapi daur hidupnya (sampai menghasilkan biji yang dapat tumbuh) apabila unsur tersebut tidak tersedia. Unsur tersebut merupakan penyusun suatu molekul atau bagian tumbuhan yang esensial bagi kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Misalnya N sebagai penyusun protein dan Mg sebagai penyusun klorofil (Lakitan, 2011).

Nutrisi yang diberikan pada tanaman harus mampu memenuhi semua unsur hara yang dibutuhkan tanaman, yang meliputi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro meliputi Karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Belerang (S), Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg). Unsur hara mikro meliputi Boron (B), Klor (Cl), Tembaga (Cu), Besi (Fe), Mangan (Mn),

Molibdenum (Mo) dan Seng (Zn). Tanaman membutuhkan unsur hara esensial karena bila salah satu saja diantaranya tidak tersedia maka tanamannya akan mati atau minimal tanaman tidak mampu menyelesaikan siklus hidupnya (Sukawati, 2010).

Dalam jaringan tumbuhan nitrogen merupakan komponen penyusun dari banyak senyawa esensial bagi tumbuhan, misalnya asam-asam amino. Karena setiap molekul protein tersusun dari asam-asam amino dan setiap enzim adalah protein dan enzim. Selain itu nitrogen juga merupakan unsur penyusun protein dan enzim. Selain itu nitrogen juga terkandung dalam klorofil, hormon sitokinin, dan auksin (Lakitan, 2011).

Fosfor umumnya ada dalam konsentrasi yang sangat rendah dalam larutan tanah. P merupakan komponen penting penyusun senyawa untuk transfer energi (ATP dan *nucleoprotein* lain), untuk sistem informasi genetik (DNA dan RNA), untuk membran sel (Fosfolipid), dan fosfoprotein. Fosfor itu bergerak dan diretribusi dari jaringan tua ke jaringan muda, sehingga gejala defisiensi pertama kali ditunjukkan oleh daun-daun tua (Gardner, 2008).

Tanaman menyerap P dalam bentuk ortofosfat primer ( $H_2PO_4$ ) dan sebagian kecil dalam bentuk ortofosfat sekunder ( $HPO_4$ ) (Barker and Pilbeam, 2007). Bentuk P dalam tanah dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu organik dan anorganik. Proporsi kedua bentuk P tersebut sangat bervariasi. Nilai P-organik dilaporkan antara 5-80% (Richardson *et al*, 2005; Hao *et al*, 2008).

Nitrogen (N) dan Fosfor (P) merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Nitrogen merupakan unsur penting dalam pembentukan klorofil, protoplasma, protein, dan asam-asam nukleat. Unsur ini mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan semua jaringan hidup (Brady and Weil, 2002). Fosfor merupakan komponen penting penyusun senyawa untuk transfer energi (ATP dan nukleoprotein lain), untuk sistem informasi genetik (DNA dan RNA), untuk membran sel (fosfolipid), dan fosfoprotein (Gardner *et al.*, 1991; Lambers *etal*, 2008).

Nitrogen pada umumnya diserap tanaman dalam bentuk  $\text{NH}_4^+$  atau  $\text{NO}_3^-$ , yang dipengaruhi oleh sifat tanah, jenis tanaman dan tahapan dalam pertumbuhan tanaman. Pada tanah dengan pengaliran yang baik N diserap tanaman dalam bentuk ion nitrat, karena sudah terjadi perubahan bentuk  $\text{NH}_4^+$  menjadi  $\text{NO}_3^-$ , sebaliknya pada tanah tergenang tanaman cenderung menyerap  $\text{NH}_4^+$  (Havlin *et al.*, 2005). N adalah unsur yang mobil, mudah sekali terlindi dan mudah menguap, sehingga tanaman seringkali mengalami defisiensi.

Kalium berasal dari mineral-mineral primer dan mineral sekunder seperti misalnya tanah liat. Kalium berfungsi membantu memelihara potensial osmosis dan pengambilan air. Tanaman yang cukup kalium hanya kehilangan sedikit air karena K meningkatkan potensial osmotik dan mempunyai pengaruh positif juga terhadap penutupan stomata. Kalium dapat juga berfungsi untuk menyeimbangkan muatan-muatan anion dan mempengaruhi pengambilan dan transport anion tersebut kalium juga dapat mengurangi berjangkitnya penyakit-penyakit tertentu. Kalium berperan

penting dalam fotosintesis karena secara langsung meningkatkan pertumbuhan dan indeks luas daun (Lakitan, 2011).

Menurut Wang *et al.* (2007) dan Homer (2008) bahwa kondisi pertumbuhan tanaman yang baik akibat tercukupinya hara N akan menyebabkan tanaman mampu menyerap P lebih efektif.

Sebagian besar belerang dalam tumbuhan terdapat sebagai penyusun asam amino sistein (*cysteine*) dan methionin (*methionine*). Senyawa lain yang mengandung belerang adalah vitamin thiamin (*thiamine*) dan biotin. Belerang juga terkandung dalam koenzim A, yakni suatu senyawa esensial untuk respirasi dan sintesis serta penguraian asam-asam lemak (*fatty acid*) (Lakitan, 2011).


Magnesium merupakan bagian dari molekul klorofil suatu aktivator enzim-enzim fotosintesis serta respirasi dan diperlukan untuk sintesis protein. Magnesium dapat didistribusikan kembali dalam tanaman, sehingga gejala defisiensi pertama kali tampak pada daun-daun tua sebagai klorosis antar urat daun (Gardner, 2008).

Magnesium diserap oleh tanaman dalam bentuk  $Mg^{2+}$  dan berfungsi dalam pembentukan klorofil dan system enzim. Tanaman yang kekurangan magnesium, daunnya akan menguning karena pembentukan klorofil terganggu. Dibandingkan dengan hara lain, magnesium mempunyai peranan terbanyak sebagai aktivator maupun kofaktor enzim terutama yang terlibat dalam reaksi dengan substrat yang mengandung fosfor. Kekurangan magnesium menyebabkan terjadinya klorosis, diikuti dengan merosotnya laju fotosintesis dan asimilasi (Hardjowigeno, 1987).

Ketersediaan dan penyerapan magnesium oleh tanaman akan menurun pada kondisi tanah yang masam karena pengaruh pH. Peningkatan pH tanah akan meningkatkan penyerapan magnesium oleh tanaman (Mortvedt dan Cox, 1985). Magnesium hilang dari tanah melalui tiga cara yaitu erosi, diangkut tanaman dan melalui pencucian (Soepardi, 1983).

Perang penting unsur kalsium adalah sebagai pengikat antara molekul-molekul fosfolipida atau antara fosfolipida dengan protein penyusun membran, hal ini menyebabkan membran dapat berfungsi secara normal pada semua sel. Kalsium juga dapat memacu aktivitas beberapa enzim, sekaligus dapat menghambat aktivitas enzim (Lakitan, 2011).

## H. Kerangka Pikir



## I. *Hipotesis*

Hipotesis dalam penelian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pupuk organik cair dan kompos azolla terhadap pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.).
2. Terdapat pengaruh interaksi antara pupuk organik cair dan kompos azolla dengan konsentrasi tertentu terhadap pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.).



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental. Penelitian eksperimental menerapkan prinsip-prinsip laboratorium, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen.

Metode ini bersifat validation atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lainnya. Variabel yang memberi pengaruh di kelompokkan sebagai variabel bebas (*independent variables*) dan variabel yang dipengaruhi yaitu sebagai variabel terikat (*dependent variables*). Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni.

##### ***B. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Desember di *Green House* Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### ***C. Variabel Penelitian***

Variabel penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah pupuk organik cair dan kompos azolla.

Sedangkan variabel terikat adalah pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.).

#### **D. Definisi Operasional Variabel**

Adapun defenisi operasional variabel antara lain:

1. Pupuk organik cair merupakan pupuk organik berbentuk cair yang dihasilkan dari bahan dasar tumbuhan azolla (*Azolla pinnata*) dan mengandung unsur hara yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) dengan berbagai konsentrasi. Adapun konsentrasi yang diberikan yaitu 5 ml/l air, 10 ml/l air dan 15 ml/l air.
2. Pupuk kompos merupakan pupuk organik berbentuk padat yang dihasilkan dari bahan dasar tumbuhan azolla (*Azolla pinnata*) yang dijadikan sebagai media tumbuh untuk pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) dengan berbagai takaran. Adapun takaran yang diberikan yaitu 10% kompos, 20% kompos dan 30% kompos.
3. Pertumbuhan tanaman merupakan suatu peningkatan ukuran sel-sel tunggal, atau peningkatan jumlah sel atau keduanya yang ditandai dengan bertambahnya tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang pada tanaman cabai besar (*capsicum annum* L.).

### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dan pengukuran langsung dengan menggunakan alat ukur. Pencatatan hasil dilakukan dengan alat tulis menulis. Parameter yang diamati meliputi :

#### **a. Tinggi tanaman (cm)**

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur batang utama tanaman dari atas permukaan media tanam sampai titik tumbuh tertinggi, dengan pengamatan pertama 7 hari setelah tanam dan dilanjutkan seminggu sekali sampai tanaman umur 7 minggu. Data tinggi tanaman merupakan data penambahan dimana pengukuran minggu terakhir (minggu ke VII) dikurangi data pengukuran sebelumnya (minggu ke VI).

#### **b. Jumlah daun (helai)**

Menghitung jumlah daun dengan cara menghitung daun yang membuka sempurna. Data jumlah daun merupakan data penambahan dimana pengukuran minggu terakhir (minggu ke VII) dikurangi data pengukuran sebelumnya (minggu ke VI).

#### **c. Diameter batang (cm)**

Mengukur diameter batang dengan cara mengukur diameter batang yang utama tanaman menggunakan jangka sorong. Data diameter batang merupakan data penambahan dimana pengukuran minggu terakhir (minggu ke VII) dikurangi data pengukuran sebelumnya (minggu ke VI).

## **F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)**

### **1. Alat**

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sekop, ember, meteran, terpal, wadah persemaian, timbangan duduk berskala, alat tulis, jangka sorong, mistar, kamera, *handsprayer*, gelas ukur, ayakan, kayu pengaduk, jirigen.

### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah benih cabai besar, *Azolla pinnata*, *polybag* 20×30 cm, label, EM4, gula merah, air, sabun krim, tanah, pupuk kandang dan pasir.

## **G. Prosedur Kerja**

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktor. Faktor pertama adalah pupuk organik cair yang terdiri dari 4 taraf perlakuan yaitu:

- P0 = Tanpa POC
- P1 = POC 5 ml/l air
- P2 = POC 10 ml/l air
- P3 = POC 15 ml/l air

Faktor kedua adalah kompos azolla yang terdiri dari 4 taraf perlakuan yaitu:

- K0 = Tanpa kompos azolla
- K1 = Kompos azolla 10%
- K2 = Kompos azolla 20%

K3 = Kompos azolla 30%

Sehingga diperoleh 16 kombinasi perlakuan yaitu:

P0K0	P1K0	P2K0	P3K0
P0K1	P1K1	P2K1	P3K1
P0K2	P1K2	P2K2	P3K2
P0K3	P1K3	P2K3	P3K3

Setiap perlakuan di ulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 48 unit tanaman.

Langkah kerja yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pembuatan poc azolla

Tanaman azolla yang akan difermentasi di keringanginkan selama 3 hari dengan tujuan megurangi air yang menetes kemudian ditimbang sebanyak 5 kg, selanjutnya membuat larutan dengan mencampurkan air bersih sebanyak 5 liter, gula merah 5 ons kemudian dihaluskan menggunakan pisau agar mempercepat larut di dalam air dan cairan mikroorganisme EM4 (bioaktivator) 50 ml ke dalam ember. Selanjutnya mencampurkan azolla dengan larutan yang sudah dibuat dan diaduk sampai merata, mengoles permukaan mulut ember dengan sabun krim untuk mencegah lalat tidak masuk dan bertelur. Menutup ember dengan rapat sehingga udara tidak masuk. Menyimpan ember di tempat teduh, terhindar dari sinar matahari selama 14 hari dan dilakukan pengadukan setiap hari, proses fermentasi yang berhasil ditandai dengan adanya bercak-bercak putih pada permukaan cairan. Setelah nantinya proses fermentasi berhasil ampas dan cairan di pisahkan dengan cara menyaring

larutan. Cairan merupakan pupuk organik cair (poc) yang telah jadi. (Modifikasi dari Nadiyah, 2016).

## **2. Pengomposan azolla**

Azolla dikeringanginkan selama 5 hari dengan tujuan mungurangi air yang menetes kemudian ditimbang sebanyak 13 kg dan ditata di atas terpal setebal 10 cm, kemudian bekatul 650 gr dan arang sekam 1300 gr ditaburkan diatasnya secara merata, disemprotkan larutan EM4 5,2 ml, gula merah 3,25 gr dan air 1 liter, secara merata kemudian metumpuk kembali azolla dan metutup rapat serta difermentasikan selama 14 hari dan dilakukan pembalikan 1 kali dalam 2 hari. (Modifikasi dari Nadiyah, 2016).

## **3. Media Tanam**

Media tanam ditimbang sesuai perlakuan dan dicampur dengan tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1 serta kompos azolla sesuai dengan takaran setiap perlakuan kemudian dimasukkan ke dalam polybag dengan berat total 1 kg per polybag.

## **4. Penyemaian**

Benih yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah benih cabai besar. Sebelum disemai benih direndam dengan menggunakan air hangat dengan suhu kurang lebih 50°C selama 1 jam dengan menggunakan air hangat dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan cabai kemudian air rendaman dibuang. Media persemaian yang digunakan adalah pupuk kandang sapi, pasir, tanah diayak dengan perbandingan 1 : 1: 1 dicampur merata dan dimasukkan ke dalam wadah persemaian. Kemudian

benih disebarakan menurut deretan secara merata, setelah benih sudah disebarakan kemudian ditutup dengan pupuk kandang, pasir dan tanah yang halus, kemudian disiram sampai merata, dan waktu yang digunakan dalam meyebarakan benih adalah sore hari, (Aak, 1992).

### **5. Penanaman**

Penanaman dilakukan 2 minggu setelah persemaian atau bibit tanaman cabai rata-rata mempunyai jumlah daun 2 helai. Penanaman dilakukan dengan membuat lubang tanam kurang lebih 2 cm. Penanaman dilakukan pada sore hari dengan cara mengambil tanaman satu persatu di wadah semai dan dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat (Modifikasi Dermawan, 2010).

### **6. Pemeliharaan**

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyiraman secara rutin pada seluruh media, melakukan pemeriksaan secara kontinyu, pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara mekanik yaitu bila dijumpai ada hama, mengambil dan mematikan hama tersebut dengan cara dipijit. Bila ada tanaman yang terserang penyakit layu, mencabut tanaman dan segera membuang medianya, wadah penanaman dapat digunakan lagi dengan media dan tanaman yang baru dan sehat (Pracaya., 2011). Melakukan penyiangan jika terdapat gulma dan membuat catatan terhadap perubahan tanaman yang terjadi seperti tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang.

### **H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis data menggunakan sidik ragam dan bila hasil sidik ragam berbeda nyata ( $F_{hitung} > F_{tabel 5\%}$ ) maka untuk membandingkan dua rata-rata perlakuan dilakukan uji lanjutan dengan uji beda nyata terkecil BNT (LSD) dan Duncan. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS 24.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Tinggi Tanaman

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata antara perlakuan kompos terhadap pertambahan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) maka dilanjutkan dengan uji interaksi dua arah dengan menggunakan uji BNT (LSD) dan Duncan.

Tabel 4.1. Hasil uji BNT arah horizontal pertambahan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) ke VI

Variabel dependen	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Perbedaan rata-rata	Kesalahan baku	P	Interval kepercayaan 95%		
						Batas bawah	Batas atas	
Intens_P0k012 3	BNT	1	2	-2.00	1.94	.332	-6.46	2.46
			3	-1.43	1.94	0.48	-5.90	3.03
			4	-2.67	1.94	.206	-7.13	1.80
		2	1	2.00	1.94	.332	-2.46	6.46
			3	0.57	1.94	.777	-3.90	5.03
			4	-0.67	1.94	.739	-5.13	3.80
	3	1	2	1.43	1.94	.480	-3.03	5.90
			3	-0.57	1.94	.777	-5.03	3.90
			4	-1.23	1.94	.542	-5.70	3.23
		4	1	2.67	1.94	.206	-1.80	7.13
			2	0.67	1.94	.739	-3.80	5.13
			3	1.23	1.94	.542	-3.23	5.70
Intens_P1K01 23	BNT	1	2	0.13	3.04	.966	-6.87	7.14

			3	-4.30	3.04	.195	-11.30	2.70
			4	-7.37*	3.04	.041	-14.37	-0.36
	2		1	-0.13	3.04	.966	-7.14	6.87
			3	-4.43	3.04	.182	-11.44	2.57
			4	-7.50*	3.04	.039	-14.50	-0.50
	3		1	4.30	3.04	.195	-2.70	11.30
			2	4.43	3.04	.182	-2.57	11.44
			4	-3.07	3.04	.342	-10.07	3.94
	4		1	7.37*	3.04	.041	0.36	14.37
			2	7.50*	3.04	.039	0.50	14.50
			3	3.07	3.04	.342	-3.94	10.07
Intens_P2K01								
23	BNT	1	2	-0.50	1.29	.709	-3.48	2.48
			3	-2.83	1.29	.059	-5.81	0.14
			4	-0.33	1.29	.803	-3.31	2.64
	2		1	0.50	1.29	.709	-2.48	3.48
			3	-2.33	1.29	.108	-5.31	0.64
			4	0.17	1.29	.900	-2.81	3.14
	3		1	2.83	1.29	.059	-0.14	5.81
			2	2.33	1.29	.108	-0.64	5.31
			4	2.50	1.29	.089	-0.48	5.48
	4		1	0.33	1.29	.803	-2.64	3.31
			2	-0.17	1.29	.900	-3.14	2.81
			3	-2.50	1.29	.089	-5.48	0.48
Intens_P3K01								
23	BNT	1	2	-1.10	2.79	.703	-7.52	5.32
			3	-5.10	2.79	.104	-11.52	1.32
			4	-5.40	2.79	.088	-11.82	1.02
	2		1	1.10	2.79	.703	-5.32	7.52
			3	-4.00	2.79	.189	-10.42	2.42
			4	-4.30	2.79	.161	-10.72	2.12
	3		1	5.10	2.79	.104	-1.32	11.52
			2	4.00	2.79	.189	-2.42	10.42
			4	-0.30	2.79	.917	-6.72	6.12
	4		1	5.40	2.79	.088	-1.02	11.82
			2	4.30	2.79	.161	-2.12	10.72
			3	0.30	2.79	.917	-6.12	6.72

\* Perbedaan rata-rata signifikan pada tingkat 0.05

Tabel 4.2. Hasil uji BNT arah vertikal pertambahan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) ke VI

Variabel Dependen	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Perbedaan rata-rata	Kesalahan baku	P	Interval kepercayaan 95%			
						Batas bawah	Batas atas		
Intens_KOP01 23	BN T	1	2	-0.17	0.15	.290	-0.51	0.17	
			3	0.00	0.15	1.00	-0.34	0.34	
		2	1	0.17	0.15	.290	-0.17	0.51	
			3	0.17	0.15	.290	-0.17	0.51	
	3	1	2	0.00	0.15	1.00	-0.34	0.34	
			4	-0.17	0.15	.290	-0.51	0.17	
		2	1	-0.17	0.15	.290	-0.51	0.17	
			3	-0.17	0.15	.290	-0.51	0.17	
	Intens_K1P01 23	BN T	1	2	1.97	1.43	.205	-1.32	5.26
				3	1.50	1.43	.324	-1.79	4.79
			2	1	-1.97	1.43	.205	-5.26	1.32
				3	-0.47	1.43	.752	-3.76	2.82
3		1	2	-1.50	1.43	.324	-4.79	1.79	
			3	0.47	1.43	.752	-2.82	3.76	
		2	1	-1.07	1.43	.476	-4.36	2.22	
			3	0.43	1.43	.769	-2.86	3.72	
Intens_K2P01 23		BN T	1	2	-3.03	2.88	.323	-9.67	3.60
				3	-1.40	2.88	.640	-8.04	5.24
			2	1	3.03	2.88	.323	-3.60	9.67
				3	1.63	2.88	.586	-5.00	8.27

			4	-0.47	2.88	.875	-7.10	6.17
		3	1	1.40	2.88	.640	-5.24	8.04
			2	-1.63	2.88	.586	-8.27	5.00
			4	-2.10	2.88	.486	-8.74	4.54
		4	1	3.50	2.88	.259	-3.14	10.14
			2	0.47	2.88	.875	-6.17	7.10
			3	2.10	2.88	.486	-4.54	8.74
Intens_K3P01 23	BN T	1	2	-4.87	3.47	.199	-12.87	3.14
			3	2.33	3.47	.520	-5.67	10.34
			4	-2.57	3.47	.481	-10.57	5.44
		2	1	4.87	3.47	.199	-3.14	12.87
			3	7.20	3.47	.072	-0.81	15.21
			4	2.30	3.47	.526	-5.71	10.31
		3	1	-2.33	3.47	.520	-10.34	5.67
			2	-7.20	3.47	.072	-15.21	0.81
			4	-4.90	3.47	.196	-12.91	3.11
		4	1	2.57	3.47	.481	-5.44	10.57
			2	-2.30	3.47	.526	-10.31	5.71
			3	4.90	3.47	.196	-3.11	12.91

\* Perbedaan rata-rata signifikan pada tingkat 0.05

Tabel 4.3. Hasil uji lanjut Duncan pertambahan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) ke VI

POC Azolla	Pertambahan Tinggi Tanaman (cm)			
	Kompos 0%	Kompos 10%	Kompos 20%	Kompos 30%
POC 0 ml/l air	0.17 a A	2.17 a A	1.60 a A	2.83 a A
POC 5 ml/l air	0.33 a B	0.20 a B	4.63 a AB	7.70 a A
POC 10 ml/l air	0.17 a A	0.67 a A	3.00 a A	0.50 a A
POC 15 ml/l air	0.00 a A	1.10 a A	5.10 a A	5.40 a A

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf 5%. Huruf kapital dibaca horizontal (baris) dan huruf kecil dibaca arah vertikal (kolom)

Hasil uji lanjut Duncan pada Tabel 4.3. menunjukkan bahwa perlakuan POC 5 ml/l air dan kompos azolla 30 % (P1K3) menghasilkan pertambahan tinggi tanaman tertinggi (7.70) dan berbeda nyata dengan perlakuan POC 5 ml/l air dan kompos azolla 0 % (P1K0) dan perlakuan 5 ml/l air dan kompos azolla 10% (P1K1) serta tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Perbandingan rata-rata pertambahan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) ke VI

Perlakuan POC 5 ml/l air dan kompos azolla 30% (P1K3) menghasilkan tinggi tanaman tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

## 2. Diameter Batang

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata antara perlakuan kompos terhadap pertambahan diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) maka dilanjutkan dengan uji interaksi dua arah dengan menggunakan uji BNT (LSD) dan Duncan.

Tabel 4.4. Hasil uji BNT arah horizontal pertambahan diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) ke VI

Variabel Dependen	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Perbedaan rata-rata	Kesalahan baku	P	Interval kepercayaan 95%			
						Batas bawah	Batas atas		
Intens_P0k012 3	BN T	1	2	0.10	0.18	.599	-0.32	0.52	
			3	-0.35	0.18	.092	-0.77	0.07	
			4	-0.42	0.18	.052	-0.84	0.00	
		2	1	-0.10	0.18	.599	-0.52	0.32	
	3		-0.45*	0.18	.039	-0.87	-0.03		
	4		-0.52*	0.18	.022	-0.94	-0.10		
	3	1	2	0.35	0.18	.092	-0.07	0.77	
			3	0.45*	0.18	.039	0.03	0.87	
		4	1	-0.07	0.18	.724	-0.49	0.35	
			2	0.42	0.18	.052	0.00	0.84	
	Intens_P1k012 3	BNT	1	2	-0.10	0.31	.753	-0.81	0.61
				3	-0.40	0.31	.229	-1.11	0.31
4				-0.50	0.31	.142	-1.21	0.21	
2			1	0.10	0.31	.753	-0.61	0.81	
		3	-0.30	0.31	.357	-1.01	0.41		
		4	-0.40	0.31	.229	-1.11	0.31		
3		1	2	0.40	0.31	.229	-0.31	1.11	
			3	0.30	0.31	.357	-0.41	1.01	
	4	-0.10	0.31	.753	-0.81	0.61			

		4	1	0.50	0.31	.142	-0.21	1.21
			2	0.40	0.31	.229	-0.31	1.11
			3	0.10	0.31	.753	-0.61	0.81
Intens_P2K012	BNT	1	2	0.07	0.18	.724	-0.35	0.49
			3	-0.25	0.18	.208	-0.67	0.17
			4	0.03	0.18	.860	-0.39	0.45
		2	1	-0.07	0.18	.724	-0.49	0.35
			3	-0.32	0.18	.121	-0.74	0.10
			4	-0.03	0.18	.860	-0.45	0.39
		3	1	0.25	0.18	.208	-0.17	0.67
			2	0.32	0.18	.121	-0.10	0.74
			4	0.28	0.18	.159	-0.14	0.70
		4	1	-0.03	0.18	.860	-0.45	0.39
			2	0.03	0.18	.860	-0.39	0.45
			3	-0.28	0.18	.159	-0.70	0.14
Intens_P3K012	BNT	1	2	-0.03	0.27	.905	-0.66	0.59
			3	-0.37	0.27	.213	-0.99	0.26
			4	-0.65*	0.27	.043	-1.27	-0.03
		2	1	0.03	0.27	.905	-0.59	0.66
			3	-0.33	0.27	.253	-0.96	0.29
			4	-0.62	0.27	.052	-1.24	0.01
		3	1	0.37	0.27	.213	-0.26	0.99
			2	0.33	0.27	.253	-0.29	0.96
			4	-0.28	0.27	.326	-0.91	0.34
		4	1	0.65*	0.27	.043	0.03	1.27
			2	0.62	0.27	.052	-0.01	1.24
			3	0.28	0.27	.326	-0.34	0.91

\* Perbedaan rata-rata signifikan pada tingkat 0.05

Tabel 4.5. Hasil uji BNT arah vertikal pertambahan diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) ke VI

Variabel Dependen	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Perbedaan rata-rata	Kesalahan baku	P	Interval kepercayaan 95%		
						Batas bawah	Batas atas	
Intens_KOP01	BN	1	2	0.17	0.16	.331	-0.20	0.54

23		T						
			3	0.05	0.16	.764	-0.32	0.42
			4	0.15	0.16	.379	-0.22	0.52
		2	1	-0.17	0.16	.331	-0.54	0.20
			3	-0.12	0.16	.490	-0.49	0.25
			4	-0.02	0.16	.920	-0.39	0.35
		3	1	-0.05	0.16	.764	-0.42	0.32
			2	0.12	0.16	.490	-0.25	0.49
			4	0.10	0.16	.552	-0.27	0.47
		4	1	-0.15	0.16	.379	-0.52	0.22
			2	0.02	0.16	.920	-0.35	0.39
			3	-0.10	0.16	.552	-0.47	0.27
Intens_K1P01	BN	1	2	-0.03	0.07	.625	-0.18	0.12
23	T		3	0.02	0.07	.806	-0.13	0.17
			4	0.02	0.07	.806	-0.13	0.17
		2	1	0.03	0.07	.625	-0.12	0.18
			3	0.05	0.07	.468	-0.10	0.20
			4	0.05	0.07	.468	-0.10	0.20
		3	1	-0.02	0.07	.806	-0.17	0.13
			2	-0.05	0.07	.468	-0.20	0.10
			4	0.00	0.07	1.00	-0.15	0.15
		4	1	-0.02	0.07	.806	-0.17	0.13
			2	-0.05	0.07	.468	-0.20	0.10
			3	0.00	0.07	1.00	-0.15	0.15
			4	0.00	0.07	1.00	-0.15	0.15
Intens_K2P01	BN	1	2	0.12	0.34	.737	-0.66	0.89
23	T		3	0.15	0.34	.667	-0.62	0.92
			4	0.13	0.34	.701	-0.64	0.91
		2	1	-0.12	0.34	.737	-0.89	0.66
			3	0.03	0.34	.923	-0.74	0.81
			4	0.02	0.34	.962	-0.76	0.79
		3	1	-0.15	0.34	.667	-0.92	0.62
			2	-0.03	0.34	.923	-0.81	0.74
			4	-0.02	0.34	.962	-0.79	0.76
		4	1	-0.13	0.34	.701	-0.91	0.64
			2	-0.02	0.34	.962	-0.79	0.76
			3	0.02	0.34	.962	-0.76	0.79

Intens_K3P01 23	BN	1	2	0.08	0.30	.790	-0.61	0.78
			3	0.50	0.30	.137	-0.20	1.20
			4	-0.08	0.30	.790	-0.78	0.61
	T	2	1	-0.08	0.30	.790	-0.78	0.61
			3	0.42	0.30	.206	-0.28	1.11
			4	-0.17	0.30	.597	-0.86	0.53
	3	3	1	-0.50	0.30	.137	-1.20	0.20
			2	-0.42	0.30	.206	-1.11	0.28
			4	-0.58	0.30	.090	-1.28	0.11
	4	4	1	0.08	0.30	.790	-0.61	0.78
			2	0.17	0.30	.597	-0.53	0.86
			3	0.58	0.30	.090	-0.11	1.28

\* Perbedaan rata-rata signifikan pada tingkat 0.05

Tabel 4.6. Hasil uji lanjut Duncan pertambahan diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) ke VI


POC Azolla	Pertambahan diameter batang (cm)			
	Kompos 0%	Kompos 10%	Kompos 20%	Kompos 30%
POC 0 ml/l air	0.18 a AB	0.08 a B	0.53 a A	0.60 a A
POC 5 ml/l air	0.02 a A	0.12 a A	0.42 a A	0.52 a A
POC 10 ml/l air	0.13 a A	0.07 a A	0.38 a A	0.10 a A
POC 15 ml/l air	0.03 a A	0.07 a A	0.40 a A	0.68 a A

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf 5%. Huruf kapital dibaca horizontal (baris) dan huruf kecil dibaca arah vertikal (kolom)

Hasil uji lanjut Duncan pada tabel 4.6. menunjukkan bahwa perlakuan POC 15 ml/l air dan kompos azolla 30% (P3K3) menghasilkan pertambahan diameter

batang (0.68) dan berbeda nyata dengan perlakuan POC 0 ml/l air dan kompos azolla 10% (P0K1) dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Perbandingan rata-rata pertambahan diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2. Rata-rata pertambahan diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) ke VI

Perlakuan POC 15 ml/l air dan Kompos azolla 30% (P3K3) menghasilkan diameter batang terbesar dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

### 3. Jumlah Daun

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata antara perlakuan kompos terhadap pertambahan jumlah daun cabai besar (*Capsicum annum L.*) maka dilanjutkan dengan uji interaksi dua arah dengan menggunakan uji BNT (LSD) dan Duncan.

Tabel 4.7. Hasil uji BNT arah horizontal penambahan jumlah daun tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) ke VI

Variabel Dependen	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Perbedaan rata- rata	Kesalahan baku	P	Interval kepercayaan 95%	
						Batas bawah	Batas atas
Intens_P0k012 3	1	2	-0.33	1.63	.843	-4.10	3.43
		3	-1.33	1.63	.438	-5.10	2.43
		4	-3.67	1.63	.055	-7.43	0.10
	2	1	0.33	1.63	.843	-3.43	4.10
		3	-1.00	1.63	.557	-4.77	2.77
		4	-3.33	1.63	.076	-7.10	0.43
	3	1	1.33	1.63	.438	-2.43	5.10
		2	1.00	1.63	.557	-2.77	4.77
		4	-2.33	1.63	.191	-6.10	1.43
	4	1	3.67	1.63	.055	-0.10	7.43
		2	3.33	1.63	.076	-0.43	7.10
		3	2.33	1.63	.191	-1.43	6.10
Intens_P1K012 3	1	2	-0.67	4.30	.880	-10.57	9.24
		3	0.00	4.30	1.00	-9.90	9.90
		4	-8.33	4.30	.088	-18.24	1.57
	2	1	0.67	4.30	.880	-9.24	10.57
		3	0.67	4.30	.880	-9.24	10.57
		4	-7.67	4.30	.112	-17.57	2.24
	3	1	0.00	4.30	1.00	-9.90	9.90
		2	-0.67	4.30	.880	-10.57	9.24
		4	-8.33	4.30	.088	-18.24	1.57
	4	1	8.33	4.30	.088	-1.57	18.24
		2	7.67	4.30	.112	-2.24	17.57
		3	8.33	4.30	.088	-1.57	18.4
Intens_P2K012 3	1	2	-1.00	2.47	.696	-6.70	4.70
		3	-2.67	2.47	.312	-8.37	3.03
		4	-4.67	2.47	.096	-10.37	1.03
	2	1	1.00	2.47	.696	-4.70	6.70

			3	-1.67	2.47	.519	-7.37	4.03
			4	-3.67	2.47	.176	-9.37	2.03
	3		1	2.67	2.47	.312	-3.03	8.37
			2	1.67	2.47	.519	-4.03	7.37
			4	-2.00	2.47	.442	-7.70	3.70
	4		1	4.67	2.47	.096	-1.03	10.37
			2	3.67	2.47	.176	-2.03	9.37
			3	2.00	2.47	.442	-3.70	7.70
Intens_P3K012	BNT	1	2	-1.00	2.53	.703	-6.83	4.83
3			3	-4.00	2.53	.152	-9.83	1.83
			4	-3.33	2.53	.224	-9.16	2.50
	2		1	1.00	2.53	.703	-4.83	6.83
			3	-3.00	2.53	.269	-8.83	2.83
			4	-2.33	2.53	.383	-8.16	3.50
	3		1	4.00	2.53	.152	-1.83	9.83
			2	3.00	2.53	.269	-2.83	8.83
			4	0.67	2.53	.799	-5.16	6.50
	4		1	3.33	2.53	.224	-2.50	9.16
			2	2.33	2.53	.383	-3.50	8.16
			3	-0.67	2.53	.799	-6.50	5.16

\* Perbedaan rata-rata signifikan pada tingkat 0.05

Tabel 4.8. Hasil uji BNT arah vertikal pertambahan jumlah daun tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) ke VI

Variabel Dependen	(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Perbedaan rata-rata	Kesalahan baku	P	Interval kepercayaan 95%			
						Batas bawah	Batas atas		
Intens_KOP01 23	BNT	1	2	-0.67	0.53	.242	-1.88	0.55	
			3	0.33	0.53	.545	-0.88	1.55	
			4	0.00	0.53	1.00	-1.22	1.22	
						0			
		2	1	0.67	0.53	.242	-0.55	1.88	
			3	1.00	0.53	.094	-0.22	2.22	
			4	0.67	0.53	.242	-0.55	1.88	
		3	1	-0.33	0.53	.545	-1.55	0.88	
			2	-1.00	0.53	.094	-2.22	0.22	

			4	-0.33	0.53	.545	-1.55	0.88
		4	1	0.00	0.53	1.00	-1.22	1.22
						0		
			2	-0.67	0.53	.242	-1.88	0.55
			3	0.33	0.53	.545	-0.88	1.55
Intens_K1P01	BNT	1	2	-1.00	0.91	.305	-3.11	1.11
23			3	-0.33	0.91	.724	-2.44	1.77
			4	-0.67	0.91	.486	-2.77	1.44
		2	1	1.00	0.91	.305	-1.11	3.11
			3	0.67	0.91	.486	-1.44	2.77
			4	0.33	0.91	.724	-1.77	2.44
		3	1	0.33	0.91	.724	-1.77	2.44
			2	-0.67	0.91	.486	-2.77	1.44
			4	-0.33	0.91	.724	-2.44	1.77
		4	1	0.67	0.91	.486	-1.44	2.77
			2	-0.33	0.91	.724	-2.44	1.77
			3	0.33	0.91	.724	-1.77	2.44
Intens_K2P01	BNT	1	2	0.67	1.87	.731	-3.65	4.98
23			3	-1.00	1.87	.608	-5.31	3.31
			4	-2.67	1.87	.192	-6.98	1.65
		2	1	-0.67	1.87	.731	-4.98	3.65
			3	-1.67	1.87	.399	-5.98	2.65
			4	-3.33	1.87	.113	-7.65	0.98
		3	1	1.00	1.87	.608	-3.31	5.31
			2	1.67	1.87	.399	-2.65	5.98
			4	-1.67	1.87	.399	-5.98	2.65
		4	1	2.67	1.87	.192	-1.65	6.98
			2	3.33	1.87	.113	-0.98	7.65
			3	1.67	1.87	.399	-2.65	5.98
Intens_K3P01	BNT	1	2	-5.33	5.39	.351	-17.75	7.08
23			3	-0.67	5.39	.905	-13.08	11.75
			4	0.33	5.39	.952	-12.08	12.75
		2	1	5.33	5.39	.351	-7.08	17.75
			3	4.67	5.39	.411	-7.75	17.08
			4	5.67	5.39	.323	-6.75	18.08
		3	1	0.67	5.39	.905	-11.75	13.08
			2	-4.67	5.39	.411	-17.08	7.75

	4	1.00	5.39	.857	-11.42	13.42
4	1	-0.33	5.39	.952	-12.75	12.08
	2	-5.67	5.39	.323	-18.08	6.75
	3	-1.00	5.39	.857	-13.42	11.42

\* Perbedaan rata-rata signifikan pada tingkat 0.05


Tabel 4.9. Hasil uji lanjut Duncan pertambahan jumlah daun tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) ke VI

POC Azolla	Pertambahan Jumlah Daun (helai)			
	Kompos 0%	Kompos 10%	Kompos 20%	Kompos 30%
POC 0 ml/l air	0.33 a A	0.67 a A	1.67 a A	4.00 a A
POC 5 ml/l air	1.00 a A	1.67 a A	1.00 a A	9.33 a A
POC 10 ml/air	0.00 a A	1.00 a A	2.67 a A	4.67 a A
POC 15 ml/l air	0.33 a A	1.33 a A	4.33 a A	3.67 a A

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf 5%. Huruf kapital dibaca horizontal (baris) dan huruf kecil dibaca arah vertikal (kolom)

Hasil uji lanjut Duncan pada Tabel 4.9. menunjukkan perlakuan POC 5 ml/l air dan kompos azolla 30% (P1K3) menghasilkan pertambahan jumlah daun terbanyak (9.33) dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Perbandingan rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman cabai (*Capsicum annum L.*) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) ke VI

Perlakuan POC 5 ml/l air dan kompos azolla 30% (P1K3) menghasilkan pertambahan jumlah daun terbanyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terjadinya pertumbuhan pada tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.). Pertumbuhan tanaman cabai dapat dilihat dari perubahan ukuran dan bentuk dari segi organ tanaman, seperti bertambahnya tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang. Seperti yang dikemukakan oleh Trenggono (2011), Pertumbuhan merupakan suatu proses dalam kehidupan tanaman, dari proses tersebut akan terjadi perubahan ukuran yaitu tanaman akan tumbuh semakin besar dan akan berkolerasi positif dalam menentukan hasil tanaman. Pertambahan ukuran tersebut secara keseluruhan dikendalikan oleh sifat genetik disamping faktor-faktor lainnya seperti lingkungan.

Pertumbuhan tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*) terjadi karena adanya pemberian pupuk organik cair yang dapat menyuplai unsur hara pada tanaman cabai tersebut dan meningkatkan aktivitas biologi pada tanah sehingga membantu proses pertumbuhan vegetative dan generatif pada tanaman cabai. Hal ini sesuai pendapat Indriani (2004), yang mengatakan bahwa pupuk organik merupakan pupuk yang berperan meningkatkan aktifitas biologi, kimia, dan fisik tanah sehingga tanah menjadi subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman.

Unsur hara yang terkandung pada pupuk organik cair berdasarkan hasil analisis di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar N-total sebanyak 462.38mg/l, Kalium (K) 446.96mg/l, Fosfor (F) 165.71mg/l, besi (Fe) 185,52mg/l dan Seng (Zn) 1.30mg/l. adanya unsur hara makro dan mikro pada pupuk organik cair yang diberikan pada tanaman cabai akan mempercepat proses pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang. Seperti yang dikemukakan oleh Akhda (2009), menyatakan bahwa tersedianya unsur hara dalam jumlah yang seimbang untuk pertumbuhan tanaman menyebabkan proses pembelahan, pembesaran dan pemanjangan sel akan berlangsung cepat yang mengakibatkan beberapa organ tanaman tumbuh cepat.

Pada penelitian ini media tumbuh yang digunakan adalah kompos azolla, pasir dan tanah sebagai komponen utama yang membantu dalam proses pertumbuhan pada tanaman cabai besar (*Capsicum annum L.*). adanya pencampuran kompos azolla pada media tumbuh dapat mengurangi kepadatan pada tanah dan meningkatkan kemampuan dalam mengikat air sehingga proses pertumbuhan pada

akar dan batang tidak terhambat serta mampu menyediakan unsur hara yang cukup sehingga dapat memacu pertumbuhan baik akar maupun batang pada tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.). Hal ini sesuai penelitian Suryati dkk (2015), yang menyatakan bahwa kandungan unsur hara kompos azolla Nitrogen (N) 4,5%, Phospor (P) 0.5-0.9%, dan Kalium (K) 2-4.5%, dan unsur hara mikronya Calcium (Ca) 0.4-1%, Magnesium (Mg) 0.5-0.6%, Besi (Fe) 0.06-0.26 dan mangan (Mn) 0.11-0.16%. Dengan adanya kandungan unsur N yang tinggi pada media tumbuh dapat merangsang pertumbuhan jaringan tanaman seperti jumlah anakan, lebar daun, dan diameter batang. Hal ini sesuai pendapat Ria (2012), yang menyatakan bahwa nitrogen (N) yang memacu pertumbuhan daun dan batang serta membantu pertumbuhan akar.

Kombinasi antara POC dan kompos azolla pada penelitian ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai besar (*capsicum annum* L.) Hasil analisis statistik uji F menunjukkan bahwa pada kombinasi perlakuan yang berbeda-beda (P0K0, P0K1, P0K2, P0K3, P1K0, P1K1, P1K2, P1K3, P2K0, P2K1, P2K2, P2K3, P3K0, P3K1, P3K2, dan P3K3) menunjukkan pengaruh yang nyata/signifikan pada parameter tinggi tanaman (cm), diameter batang (cm) dan jumlah daun (helai).

### **1. Tinggi Tanaman**

Hasil pengamatan terhadap tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) setelah dilakukan analisis varians menunjukkan bahwa kombinasi POC dan kompos azolla berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Rata-rata hasil

pengamatan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) dapat dilihat pada grafik 4.1.

Pemberian pupuk organik cair 5 ml/l air dan kompos azolla 30% (P1K3) menghasilkan pertambahan tanaman tertinggi yaitu 7,70 cm. Hal ini menunjukkan bahwa media tanam pencampuran tanah, pupuk kompos azolla dan pasir mempunyai kemampuan yang baik untuk menahan dan mengikat air dan larutan hara, menciptakan aerasi dan drainase yang baik, sehingga unsur hara dapat diserap oleh akar tanaman dan dimanfaatkan untuk metabolismenya. Pemberian pupuk organik cair 5 ml/l air memberikan unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan, karena pupuk organik cair mengandung unsur hara makro dan mikro serta ketersediaan air yang cukup, maka pertumbuhan tanaman akan semakin baik bagi tanaman. Lingga (2003) menyatakan bahwa hara yang diserap tanaman akan dimanfaatkan dalam metabolisme, sehingga pertumbuhan menjadi lebih baik.

Prasetya, Kurniawan dan Febrianingsih (2009) menjelaskan bahwa unsur nitrogen bermanfaat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu pembentukan sel-sel baru seperti daun, cabang, dan mengganti sel-sel yang rusak. Setyamidjaja (1986) mengemukakan bahwa apabila tanaman kekurangan unsur N tanaman akan memperlihatkan pertumbuhan yang kerdil. Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa ternyata tinggi tanaman yang paling rendah adalah POC 15 ml/l air dan 0% kompos azolla (P3K0). Hal ini diduga karena unsur hara yang diberikan belum tepat atau adanya kelebihan kebutuhan unsur hara terutama N yang berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman dan konsentrasi yang lebih tinggi menyebabkan

pertumbuhan cabai cenderung terhambat, hal ini dikarena terjadinya peningkatan jumlah unsur hara yang mengakibatkan tekanan osmosis di sekitar perakaran tanaman lebih tinggi sehingga akar mengalami kekeringan fisiologis, yang mengakibatkan penyerapan unsur hara semakin rendah. Selain faktor diatas adanya interaksi berbagai faktor internal pertumbuhan (yaitu atas kendali genetik) dan unsur-unsur iklim, tanah dan biologis juga berpengaruh terhadap tidak terdapatnya pertambahan tinggi tanaman. Hal ini disebabkan bahwa tinggi tanaman cabai juga dipengaruhi oleh lingkungan meliputi: cahaya, suhu udara, kelembapan udara, curah hujan dan ketinggian tempat. Sesuai dengan pendapat Gardner, Piarre dan Mitchell (1991) menyatakan bahwa tinggi tanaman lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, iklim dan CO<sub>2</sub>.

Pada pengamatan terlihat proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman cabai, hal ini sesuai menurut Hill (1982) menyatakan morfogenesis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan bentuk, diferensiasi suatu organisme. Embrio yang terbentuk di dalam biji memiliki kotiledon dan akar serta tunas rudimeter. Sesudah berkecambah, akar dan tunas rudimeter tersebut akan berkembang membentuk sistem akar dan tunas tumbuhan. Proses ini yang dinamakan morfogenesis.

Pertumbuhan pertambahan tinggi yang baik bagi tanaman cabai pada umur 7 MST adalah kombinasi POC 5 ml/l air dan kompos azolla 30% (P1K3), hal ini karena terdapat unsur hara makro pada pupuk organik cair yang mendukung pertumbuhan tinggi tanaman. Sesuai dengan pendapat (Campbell, 2012) menyatakan

pertumbuhan tinggi tanaman dapat didukung pula oleh ketersediaan makronutrien lainnya, seperti karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan sulfur yang dibutuhkan untuk siklus hidup tanaman dan menghasilkan generasi yang lain.

## **2. Diameter Batang**

Hasil pengamatan terhadap diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) setelah dilakukan analisis varians menunjukkan bahwa kombinasi POC dan kompos azolla berpengaruh nyata terhadap diameter tanaman. Rata-rata hasil pengamatan diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) dapat dilihat pada grafik 4.2.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi yang terbaik terdapat pada perlakuan P3K3 dimana POC 15 ml dan kompos azolla 30% yang merupakan hasil tertinggi diameter batang tanaman cabai dengan rata-rata 0.68 mm. Hal ini karena pada pupuk organik cair terpadat unsur hara N, P, K yang dapat menyuplai dalam proses pertumbuhan tanaman cabai hal ini sesuai pendapat Soegiman (1982) menyatakan, suatu tanaman akan tumbuh dan mencapai tingkat produksi tinggi apabila unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam keadaan cukup dan berimbang dalam tanah. Meningkatnya unsur hara nitrogen dalam tanah akan meningkatkan unsur hara yang lainnya juga, sehingga ketersediaan karbohidrat akan meningkat yang dapat digunakan untuk bertambahnya diameter batang pada tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.).

Pemberian POC 15 ml/l air merupakan konsentrasi paling banyak sehingga menghasilkan diameter terbesar karena kandungan dari POC memiliki kadar nitrogen yang cukup tinggi sangat berpengaruh pada pertumbuhan vegetatif untuk pertumbuhan tanaman sehingga mempengaruhi besarnya diameter batang pada tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.). Lakitan (2007), mengemukakan bahwa unsur hara yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan batang adalah Nitrogen (N). Konsentrasi Nitrogen (N) yang tinggi menghasilkan batang yang lebih besar.

Pemberian kompos azolla yang terbaik terdapat pada perlakuan K3 yaitu sebanyak 30%. Pemberian kompos azolla yang merupakan salah satu jenis pupuk organik dapat meningkatkan kandungan bahan organik yang ada didalam tanah. Menurut Hanafiah (2005) pemberian pupuk organik sebagai tambahan bagi bahan organik akan meningkatkan C-organik yang ada didalam tanah, sehingga semakin tinggi dosis pupuk organik yang diberikan maka akan meningkatkan kadar bahan organik tanah. Hal ini dikarenakan pemberian kompos azolla juga dapat meningkatkan kandungan N total yang ada didalam tanah sehingga pertumbuhan pada diameter batang lebih cepat, Novizan (2002) menyatakan bahwa N merupakan unsur hara utama yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetatif seperti akar, batang, dan daun.

kompos azolla sebagai salah satu media tanam yang dapat mengurangi kepadatan pada tanah dan meningkatkan kemampuan dalam mengikat air sehingga proses pertumbuhan pada akar dan batang tidak terhambat serta mampu

menyediakan unsur hara yang cukup sehingga dapat memacu pertumbuhan baik akar maupun batang pada tanaman tersebut hal ini sesuai penelitian Suryati (2015) yang menyatakan bahwa kandungan unsur hara kompos azolla Nitrogen (N) 4,5%, Fosfor (P) 0.5-0.9%, dan Kalium (K) 2-4.5%, dan unsur hara mikronya Calcium (Ca) 0.4-1%, Magnesium (Mg) 0.5-0.6%, Besi (Fe) 0.06-0.26 dan mangan (Mn) 0.11-0.16%. Dengan adanya kandungan unsur N yang tinggi pada media tanam dapat merangsang pertumbuhan jaringan tanaman seperti jumlah anakan, lebar daun, dan diameter batang. Hal ini sesuai pendapat Ria (2012), yang menyatakan bahwa nitrogen (N) yang memacu pertumbuhan daun dan batang serta membantu pertumbuhan akar.

Pertambahan diameter terendah terdapat pada perlakuan kombinasi POC 5 ml/l air dan kompos azolla 0% (P1K0), hal ini diduga karena kurang unsur hara yang tersedia pada media tumbuh pada fase pertumbuhan vegetatif dan terjadinya kepadatan pada media tumbuh serta kurangnya konsentrasi POC yang diberikan pada tanaman cabai sehingga pertumbuhan pada diameter batang terhambat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Oviyanti (2016) yang menyatakan kekurangan dan kelebihan nitrogen menyebabkan pertumbuhan batang dan daun terhambat karena pembelahan dan pembesaran sel terhambat, sehingga bisa menyebabkan tanaman kerdil dan kekurangan klorofil.

### **3. Jumlah Daun**

Daun secara umum merupakan organ penghasil fotosintat utama. Pengamatan jumlah daun sangat diperlukan sebagai salah satu indikator pertumbuhan

yang dapat menjelaskan proses pertumbuhan tanaman. Pengamatan daun dapat berdasarkan atas fungsi daun sebagai penerima cahaya dan alat fotosintesis. Fungsi daun adalah penghasil fotosintat yang sangat diperlukan tanaman sebagai sumber energi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan (Sukawati, 2011).

Hasil pengamatan terhadap jumlah daun tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) setelah dilakukan analisis varians menunjukkan bahwa kombinasi POC dan kompos azolla berpengaruh nyata terhadap jumlah daun. Rata-rata hasil pengamatan jumlah daun tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.) dapat dilihat pada grafik 4.3.

Berdasarkan grafik jumlah daun tertinggi pada tanaman terpadat pada perlakuan pupuk organik cair 5 ml/l air dan kompos azolla 30% (P1K3) hal ini terjadi karena pemberian kompos azolla pada media tanam menyebabkan aerasi tanah lebih besar sehingga supply unsur hara N, P, K pada pupuk organik cair yang diaplikasikan ke tanaman cabai dapat terserap dengan baik oleh tanaman untuk membentuk bagian-bagian vegetatif seperti akar, batang dan daun. Hal ini didukung oleh pendapat Soewito (1991) bahwa N terkandung dalam protein dan berguna untuk pertumbuhan pucuk daun, selain itu juga untuk menyuburkan bagian-bagian batang daun. Pupuk yang mengandung unsur N, P, K yang cukup memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Sedangkan jumlah daun terendah terjadi pada perlakuan pupuk organik cair 10 ml/l air dan 0% kompos tanpa kompos (P2K0) hal ini diguna karena terjadinya kepadatan pada media tanam menyebabkan pertumbuhan pada akar

terhambat begitupun dengan daun dan batang pada tanaman cabai tersebut, kepadatan yang terjadi pada media tanam menyebabkan pemberian pupuk organik cair tidak terserap secara optimal pada tanaman cabai sehingga ketersediaan unsur hara cukup sedikit. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Oviyanti (2016) yang menyatakan kekurangan dan kelebihan Nitrogen menyebabkan pertumbuhan batang dan daun terhambat karena pembelahan dan pembesaran sel terhambat, sehingga bisa menyebabkan tanaman kerdil dan kekurangan klorofil.

Perlakuan P1K3 memberikan jumlah daun terbanyak. Hal ini dikarenakan kompos mengurangi kepadatan pada media tanam selain itu kompos azolla juga memiliki kandungan N yang tinggi sehingga membantu pertumbuhan awal vegetatif pada tanaman cabai, gemburnya media tanam akan mempercepat penyerapan pada saat pemberian pupuk organik cair sehingga unsur hara cukup untuk memenuhi proses pertumbuhan pada tanaman. Hal ini didukung pendapat Sarief (1985), dengan semakin meningkatnya ketersediaan nitrogen akan semakin meningkat pula sintesa karbohidrat yang dirubah menjadi protein, sehingga jumlah daun yang terbentuk semakin banyak. Jumlah daun terkait erat dengan komposisi nitrogen dari unsur hara yang diserap melalui kompos atau pupuk organik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. POC tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman (cm), diameter batang (cm) dan jumlah daun (helai), tanaman cabai besar (*Capsicum annul* L.).
2. Kompos azolla pada takaran 30% (K3) memberikan berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman (cm), diameter batang dan jumlah daun (helai) pada tanaman cabai besar (*Capsicum annum* L.)
3. Kombinasi POC 5 ml/l air dan kompos azolla 30% (P1K3), memberikan pengaruh terbaik terhadap tinggi tanaman (7.70 cm), kombinasi pupuk organik cair 15 ml/l air dan kompos azolla 30% (P3K3), memberikan pengaruh terbaik terhadap diameter tanaman (0,68), dan kombinasi pupuk organik cair 5 ml/l air dan kompos azolla 30% (P1K3), memberikan pengaruh terbaik terhadap pertambahan jumlah daun (9,33), terhadap tanaman cabai besar (*Capsicum annul* L.).

#### **B. Saran**

Adapun saran yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi pupuk pada pertumbuhan generatif sampai masa panen sehingga data yang dibutuhkan untuk membuktikan adanya pengaruh perlakuan semakin valid.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan konsentrasi poc yang lebih tinggi untuk mengetahui adanya pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman cabai (*Capsicum annum* L.)



## KEPUSTAKAAN

- Adikasari, R. *Pemanfaatan ampas teh dan kopi sebagai penambah nutrisi pada pertumbuhan tanaman tomat (Solanum lycopersicum) dengan media hidroponik*. Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2012.
- Akhda, D. K. *Pengaruh Dosis dan Waktu Aplikasi Kompos Azolla sp. Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Merah (Alternanthera amoena Voss)* Malang: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2009
- Aksan., Budiyanto, M.G., Isnawan, B.H. *Kajian Pemanfaatan Kompos Azolla pinnata Guna Mereduksi Dosis Pupuk Nitrogen Anorganik Pada Budidaya Sawi (Brassica juncea L.)*. Yogyakarta: Program Study Agroteknologi Fakultas Pertanian UMY, 2014.
- Aak. *Petunjuk Praktis Bertanam Sayur*. Kanisius, Yogyakarta: 1992
- Arfani, 2013. "Nilai Ekonomi Cabai Merah" (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38737/5/Chapter%20I.pdf>). Diakses tanggal 29 April 2015).
- Badan Pusat Statistik. *Produksi cabai besar, cabe rawit, bawang merah*. Jakarta: Berita Resmi Statisti, 2015.
- Budiyanto, G. *Manajemen Sumberdaya Lahan. Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2014.
- Campbell. *Buku Ajar Biologi*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012.
- Fardiaz, S. *Polusi Air and Udara. Edisi ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Gardner FP, RB Pearce and RL Mitchell. *Fisiologi Tanaman Budidaya - (Physiology of Crop Plants)*. Jakarta: UI-Press, 1991.
- Hadisuwito. *Membuat pupuk kompos cair*. Jakarta: Agromedia, 2007.
- Hala Y, Khalifah M. Abubakar. *Biologi Umum 1*. Makassar: CV. Berkah Utami, 2006.

- Hao X, F Godlinski and C Chang. *Distribution of phosphorus forms in soil following long-term continuous and discontinuous cattle manure applications*. *So/7 Science Society of America Journal* 72, 90-97, 2008.
- Havlin JL, JD Beaton, SL Tisdale and WL Nelson. *Soil Fertility and Fertilizers. An introduction to nutrient management. Seventh Edition*. Pearson Education Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 2005.
- Heddy, S. *Pemberian Pupuk N dan Interval Defoliiasi terhadap Produksi Bahan Kering Rumput Signal*. Jakarta: PT. Rajagraffindo, 2003.
- Homer ER. *The effect of nitrogen application timing on plant available phosphorus. Thesis*. Graduate School of The Ohio State University. USA, 2008).
- Imran, A. N. I. *Pemanfaatan Ampas The (Camelia sinensis) Sebagai Tambahan Media Tanam Pada Pertumbuhan Tanaman Cabai Besar (Capsicum annun L.)*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2016.
- Inaini, R. *Pengaruh Penggunaan Pupuk Hijau Cair Azolla dan Kihujan Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Rumput Signal (Brachiaria decumbens) Pada Lahan Marginal*. Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, 2015.
- Indriani. *Membuat Kompos Secara Kilat*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Ismoyo, L., Sumorno., Sudadi., “Pengaruh Dosis Kompos Azolla Dan Kalium Organik Terhadap Ketersediaan Kalium Dan Hasil Kacang Tanah Pada Alfisol”. Surakarta: Study ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, UNS 2013.
- Khan, MM. *A Primer on Azolla Production & Utilization in Agriculture*. Institute of Biological Sciences of the University of the Phillippines, 1988.
- Kustiono, G., Idrawati, Herawati, J. “*Kajian aplikasi kompos azolla dan pupuk anorganik untuk meningkatkan hasil padi sawah (Oryza sativa L)*”. Balai pengkajian teknologi pertanian mojekerto : prodi Agroteknologi, fakultas Pertanian, universitas wijaya kusuma Surabaya, 2012..
- Lakitan B. *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*. Jakarta: PT raja grafindo persada, 2011.
- Mulyani, S.E.S. *Anatomi Tumbuhan*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

- Nadiah. A. *Prospek Azolla Sebagai Pupuk Hijau Penghasil Nitrogen*. Surabaya: Balai Besar Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, 2016.
- Novizan . *Petunjuk Pemupukan Yang Efektif*. Jakarta: Agro Media Pustaka, 2002
- Hanafiah. K.A. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005
- Harpenas, Asep & R. Dermawan. *Budidaya Cabai Unggul*. Penebar Swadaya. Jakarta: 2010.
- Oviyanti, F *Pengaruh pemberian pupuk organik cair daun (Gliricidia sepium (jacq) kunth ex walp) terhadap pertumbuhan tanaman sawi (Brassica juncea L.)* UIN Raden Fatah. Palembang. 2016
- Parnata AS. *Meningkatkan Hasil Panen dengan Pupuk Organik*. Jakarta: Agromedia. 2010.
- Putra, D.F., Soenaryo, Tyasmoro, S.Y.,”*Pengaruh pemberian berbagai bentuk azolla dan pupuk N terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis Zea mays var. saccharata*”. malang:budidaya pertanian, fakultas pertanian universitas brawijaya 2013.
- Pracaya. *Bertanam Sayuran Organik*. Makassar: Penebar Swadaya. Makassar. 2011.
- Prajnanta, F. *Kiat Sukses Bertanam cabai*. Jakarta Indonesia: Penerbit Penebar Swadaya, 1991.
- Prasetya, B., S, Kurniawan, dan Febrianingsih. *Pengaruh Dosis dan Frekuensi Pupuk Cair Terhadap Serapan dan Pertumbuhan Sawi (Brassica juncea L.) Pada Entisol*. Univ. Brawijaya. Malang. 2009.
- Pratama,Y.S. *Pembuatan Pupuk Organik Dan Anorganik Cair Dari Limbah-Sayuran* 2008.
- Redaksi Trubus. *My Potensial Business Cabai*. Jakarta: PT. Trubus Swadaya, 2014.
- Rizki, D. *Budidaya Tanaman Cabai Merah (Capsicum annum L.)*. Surakarta: Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Rubatzky VE., Yamaguchi M. *World Vegetables Principles, Production and Nutritive Value*. Ed. ke-2. USA: Chapman & Hall, 1997.

- Rukmana, Y., Oesmana, Y. *Bertanam Cabai Dalam Pot*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sebayang, H.T. *Azolla, Suatu kajian produksi dan potensinya dalam bidang pertanian habitat*. 1996 Djojosoewito, S. *Azolla, pertanian organik dan multiguna*. Yogyakarta: kanisius, 2000..
- Setiadi. *Bertanam Cabai*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Setyamadjaja. *Pupuk Dan Pemupukan*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1986.
- Shihab, H. M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Ilmu, 2008.
- Soegiman. *Ilmu Tanah* Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Soewito, M. *Memfaatkan Lahan-Bercocoktanam Wortel*. CV. Titik Terang. Jakarta. 1991.
- Soepardi. *Sifat Dan Ciri Tanah*. Jakarta: Pt. Melton Putra, 1983.
- Sukawati I. *Pengaruh kepekaan larutan nutrisi terhadap pertumbuhan dan basil baby kalian (Brassica oleranceae.VAR-alba-glabra) pada berbagai komposisi media tanaman dengan system hidroponik*. Fakultas pertanian Universitas sebelas maret Surakarta. 2010.
- Sumarni, N dan A, Muharam. *Budidaya Tanaman Cabai Merah*. Panduan Teknis PTT Cabai Merah, 2005.
- Suryati., Sampurno., Anom. *Uji Beberapa Konsentrasi Pupuk Cair Azolla (Azolla Pinnata) Pada Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) Di Pembibitan Utama: Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau*, 2015.
- Susetyo. *Hijauan Makanan Ternak*. Bogor : Dir. Jen. Peternakan Deptan,Jakarta.,1980.Padang Pengembalaan. Penataran Manager Ranch. Direktorat JenderalPeternakan. Deptan Bogor, 1969.
- Sutedjo. *Pupuk dan Cara Pemupukan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Syefani dan Lilia A. *Pelatihan Pertanian Organik*. Malang: Fakultas Pertanian Unibraw, 2003.

- Tisdale, G. L. and M. G. Nelson. *Soil Fertility And Fertiliser*. The Mac.Milan Publishing Co, Inc., New York, 1975.
- Tjitrosoepomo, G. *Taksonomi tumbuhan obat-obat*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1994.
- Tjitrosoepomo, G. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Trenggono A Dan Ni Made A Wi. *Induksi Pembungaan Secara In Viro Pada Tanaman Anggrek Cymbidium Varietas Lovely Angel (In Vitro Flower Induction Of Orchid Cymbidium Var. Lovely Angel)*. Makalah Seminar Program Studi Hortikultura. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Wiryanto, B.T.W. *Bertanam Cabai Pada Musi Hujan*. Depok: Egromedia Pustaka, 2006 .
- Yunus. M. *Hijauan Makanan Ternak*. Malang: Universitas Brawijaya, 1987.
- Zakariah, M .A. *Fermentasi Asam Laktat Pada Silase*. Fakultas Peternakan. Universits Gajah Mada. Yogyakarta. 2012.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1.

Tabel Lampiran 1a. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum Annum L*) Ke VI

Perlakuan	Ulangan			Total	Rata-Rata
	I	II	III		
P0K0	0.00	0.50	0.00	0.50	0.17
P0K1	0.50	0.00	6.00	6.50	2.17
P0K2	3.30	1.00	0.50	4.80	1.60
P0K3	0.00	2.50	6.00	8.50	2.83
P1K0	0.20	0.50	0.30	1.00	0.33
P1K1	0.10	0.00	0.50	0.60	0.20
P1K2	0.60	3.80	9.50	13.90	4.63
P1K3	9.50	12.50	1.10	23.10	7.70
P2K0	0.00	0.20	0.30	0.50	0.17
P2K1	1.50	0.00	0.50	2.00	0.67
P2K2	6.00	3.00	0.00	9.00	3.00
P2K3	0.00	0.30	1.20	1.50	0.50
P3K0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P3K1	0.30	1.50	1.50	3.30	1.10
P3K2	4.80	1.00	9.50	15.30	5.10
P3K3	2.20	2.50	11.50	16.20	5.40

Tabel Lampiran 1b. Analisis Sidik ragam pertambahan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum Annum L*)

<b>Tests of Between-Subjects Effects</b>					
Dependent Variable: Tinggi tanaman					
Source	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	249.778a	15	16.652	1.983	.051
Intercept	237.185	1	237.185	28.246	.000
POC	36.322	3	12.107	1.442	.249
KOMPOS	132.586	3	44.195	5.263	.005
POC * KOMPOS	80.87	9	8.986	1.07	.410

Error	268.707	32	8.397
Total	755.67	48	
Corrected Total	518.485	47	

a R Squared = .482 (Adjusted R Squared = .239)

Tabel Lampiran 1c. ANOVA arah horizontal pada penambahan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum annul L.*)

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intens_P0k0123	Between Groups	11.589	3	3.863	0.687	.585
	Within Groups	44.960	8	5.620		
	Total	56.549	11			
Intens_P1K0123	Between Groups	118.563	3	39.521	2.857	.105
	Within Groups	110.673	8	13.834		
	Total	229.237	11			
Intens_P2K0123	Between Groups	15.083	3	5.028	2.012	.191
	Within Groups	19.993	8	2.499		
	Total	35.077	11			
Intens_P3K0123	Between Groups	68.220	3	22.740	1.954	.200
	Within Groups	93.080	8	11.635		
	Total	161.300	11			

Tabel Lampiran 1d. ANOVA arah vertikal pada penambahan tinggi tanaman cabai besar (*Capsicum annul L.*)

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intens_K0P0123	Between Groups	.167	3	.056	1.709	.242
	Within Groups	.260	8	.033		
	Total	.427	11			
Intens_K1P0123	Between Groups	6.353	3	2.118	0.693	.581
	Within Groups	24.433	8	3.054		
	Total	30.787	11			
Intens_K2P0123	Between Groups	23.03	3	7.677	0.618	.623
	Within Groups	99.367	8	12.421		
	Total	122.397	11			
Intens_K3P0123	Between Groups	87.643	3	29.214	1.616	.261

Within Groups	144.647	8	18.081
Total	232.289	11	

Tabel Lampiran 2a. Rata-rata pertambahan diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum Annum* L) Ke VI

Perlakuan	Ulangan			Total	Rata-Rata
	I	II	III		
P0K0	0.00	0.00	0.55	0.55	0.18
P0K1	0.10	0.10	0.05	0.25	0.08
P0K2	0.60	0.75	0.25	1.60	0.53
P0K3	0.55	0.45	0.80	1.80	0.60
P1K0	0.00	0.05	0.00	0.05	0.02
P1K1	0.05	0.10	0.20	0.35	0.12
P1K2	0.00	0.15	1.10	1.25	0.42
P1K3	0.55	0.95	0.05	1.55	0.52
P2K0	0.00	0.40	0.00	0.40	0.13
P2K1	0.00	0.00	0.20	0.20	0.07
P2K2	0.75	0.05	0.35	1.15	0.38
P2K3	0.00	0.10	0.20	0.30	0.10
P3K0	0.00	0.05	0.05	0.10	0.03
P3K1	0.00	0.15	0.05	0.20	0.07
P3K2	0.30	0.10	0.80	1.20	0.40
P3K3	0.15	0.65	1.25	2.05	0.68

Tabel Lampiran 2b. Analisis Sidik ragam pertambahan diameter batang tanaman Cabai besar (*Capsicum Annul* L)

Tests of Between-Subjects Effects						
Dependent Variable: diameter batang						
Source	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
Corrected Model	2.333a	15	0.156	1.77	.086	
Intercept	3.521	1	3.521	40.071	.000	
POC	0.203	3	0.068	0.77	.519	
KOMPOS	1.624	3	0.541	6.162	.002	
POC * KOMPOS	0.505	9	0.056	0.639	.755	
Error	2.812	32	0.088			

Total	8.665	48
Corrected Total	5.144	47

a R Squared = .453 (Adjusted R Squared = .197)

Tabel Lampiran 2c. ANOVA arah horizontal pada penambahan diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum annul L.*)

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intens_P0k0123	Between Groups	.585	3	.195	3.9	.055
	Within Groups	.400	8	.050		
	Total	.985	11			
Intens_P1K0123	Between Groups	.510	3	.170	1.202	.369
	Within Groups	1.132	8	.141		
	Total	1.642	11			
Intens_P2K0123	Between Groups	.187	3	.062	1.249	.355
	Within Groups	.400	8	.050		
	Total	.587	11			
Intens_P3K0123	Between Groups	.847	3	.282	2.568	.127
	Within Groups	.880	8	.110		
	Total	1.727	11			

Tabel Lampiran 2d. ANOVA arah vertikal pada penambahan diameter batang tanaman cabai besar (*Capsicum annul L.*)

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intens_K0P0123	Between Groups	.058	3	.019	.492	.698
	Within Groups	.312	8	.039		
	Total	.369	11			
Intens_K1P0123	Between Groups	.005	3	.002	.258	.854
	Within Groups	.052	8	.006		
	Total	.057	11			
Intens_K2P0123	Between Groups	.042	3	.014	.082	.968
	Within Groups	1.35	8	.169		

	Total	1.392	11			
Intens_K3P0123	Between Groups	.604	3	.201	1.467	.295
	Within Groups	1.098	8	.137		
	Total	1.703	11			

Tabel Lampiran 3a. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman cabai besar (*Capsicum Annum L*) Ke VI

Perlakuan	Ulangan			Total	Rata-Rata
	I	II	III		
P0K0	0.00	1.00	0.00	1.00	0.33
P0K1	0.00	0.00	2.00	2.00	0.67
P0K2	3.00	1.00	1.00	5.00	1.67
P0K3	0.00	7.00	5.00	12.00	4.00
P1K0	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00
P1K1	1.00	3.00	1.00	5.00	1.67
P1K2	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
P1K3	6.00	21.00	1.00	28.00	9.33
P2K0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2K1	2.00	0.00	1.00	3.00	1.00
P2K2	4.00	4.00	0.00	8.00	2.67
P2K3	1.00	2.00	11.00	14.00	4.67
P3K0	0.00	1.00	0.00	1.00	0.33
P3K1	0.00	2.00	2.00	4.00	1.33
P3K2	6.00	0.00	7.00	13.00	4.33
P3K3	0.00	2.00	9.00	11.00	3.67

Tabel Lampiran 3b. Analisis Sidik ragam pertambahan jumlah daun tanaman cabai besar (*Capsicum Annul L*)

<b>Tests of Between-Subjects Effects</b>					
Dependent Variable: jumlah daun					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	259.646a	15	17.31	1.373	.219
Intercept	266.021	1	266.021	21.106	.000
POC	16.229	3	5.41	0.429	.733
KOMPOS	174.563	3	58.188	4.617	.009

POC * KOMPOS	68.854	9	7.65	0.607	.782
Error	403.333	32	12.604		
Total	929	48			
Corrected Total	662.979	47			

a R Squared = .392 (Adjusted R Squared = .106)

Tabel Lampiran 3c. ANOVA arah horizontal pada penambahan jumlah daun tanaman cabai besar (*Capsicum annul L.*)

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intens_P0k0123	Between Groups	24.667	3	8.222	2.056	.185
	Within Groups	32.0000	8	4.000		
	Total	56.667	11			
Intens_P1K0123	Between Groups	148.917	3	49.639	1.794	.226
	Within Groups	221.333	8	27.667		
	Total	370.250	11			
Intens_P2K0123	Between Groups	37.583	3	12.528	1.367	.321
	Within Groups	73.333	8	9.167		
	Total	110.917	11			
Intens_P3K0123	Between Groups	32.250	3	10.750	1.122	.396
	Within Groups	76.667	8	9.583		
	Total	108.917	11			

Tabel Lampiran 3d. ANOVA arah vertikal pada penambahan jumlah daun tanaman cabai besar (*Capsicum annul L.*)

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intens_K0P0123	Between Groups	1.583	3	.528	1.267	.349
	Within Groups	3.333	8	.417		
	Total	4.917	11			
Intens_K1P0123	Between Groups	1.667	3	.556	.444	0.728
	Within Groups	10.000	8	1.250		
	Total	11.667	11			
Intens_K2P0123	Between Groups	18.917	3	6.306	1.201	.370
	Within Groups	42.000	8	5.25		
	Total	60.917	11			

Intens_K3P0123	Between Groups	62.917	3	20.972	.482	.704
	Within Groups	348.000	8	43.500		
	Total	410.917	11			

---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN II

### 1. Alat dan Bahan

#### a. Alat



Timbagan



wadah penyemaian



saringan



Gelas ukur 50 ml




mistar dan jangka sorong



ember



Jerigen



gelas ukur 500 ml



tenda

## b. Bahan



Benih cabai



azolla



M4



polibag



tanah dan pasir



air



Label



bekatul



gula

UNIVERSITAS NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR


## LAMPIRAN III

### a. Pembuatan POC dan Kompos Azolla

#### 1. Pembuatan POC



## 2. Pembuatan Kompos




keterangan:

- Mongering anginkan tanaman Azolla
- Menimbang tanaman azolla
- Azolla siap dicampur bekatul
- Menimbang bekatul
- Mencampur azolla dengan bekatul
- Menata bahan kompos untuk di fermentasi
- Sudah jadi kompos

## LAMPIRAN IV

### A. Penyemaian dan penanaman tanaman cabai

#### 1. penyemaian



#### 2. Persiapan Media tanam



### 3. Penanaman dan pemeliharaan tanaman cabai



### 4. Pengukuran tanaman cabai



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ABDULLAH

KASSAR

## LAMPIRAN V

## a. Hasil Analisis pupuk organik cair


**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
 DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR**  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11 Tamalanrea Makassar 90245

**LAPORAN HASIL UJI**  
*Report of Analysis*  
 No : 18000801 /LHU / BBLK-MKS / I / 2018

Nama Customer : AKHMAD NUR  
 Customer Name :  
 Alamat : Samata Gowa  
 Address :  
 Jenis Sampel : Pupuk Organik Cair  
 Type of Sample (S) :  
 No. Sampel : 18000801  
 No. Sample :  
 Tanggal Penerimaan : 18 Januari 2018  
 Received Date : Januari 18, 2018

**HASIL PEMERIKSAAN**

No No	Parameter Parameters	Satuan Units	Hasil Pemeriksaan Test Result	Spesifikasi Metode Method Specification
1	Besi / Iron (Fe)	mg/l	185.52	Atomisasi
2	Fospor	mg/l	165.71	Spektrofotometrik
3	Kalium (K)	mg/l	446.96	Atomisasi
4	Nitrogen (N)	mg/l	462.38	Titrimetrik
5	pH	-	3.38	SNI 06 - 6989.11 - 2004*
6	Seng / Zinc (Zn)	mg/l	1.30	Atomisasi

Catatan : 1 Hasil uji ini berlaku untuk sampel yang diuji  
 Note : The analytical result are only valid for the tested sample  
 2 Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 halaman  
 The report of analysis consists of 1 page  
 3 Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Laboratorium Penguji  
 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar  
 This report of analysis shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with their written permission  
 of the testing Laboratory Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.

  
**ALAUD**  
**MAKASSAR**

Makassar, 6 Februari 2018  
 BALAI BESAR TEKNIK BIDANG LINGKUNGAN,  
 LABKES MAKASSAR  
 ICHMARSAL S. Farm  
 NIP. 196802061980031002

DP/5.10.3KLBBLK - Mks; Rev 1; 15 Oktober 2012

**Gambar. Tata letak acakan tanaman cabai (*Capsicum annum* L.)**

<b>P3K3.1</b>	<b>P3K1.2</b>	<b>P0K1.2</b>	<b>P1K3.3</b>	<b>P0K1.3</b>	<b>P0K2.1</b>
<b>P1K0.2</b>	<b>P2K0.1</b>	<b>P1K1.1</b>	<b>P2K3.1</b>	<b>P2K0.3</b>	<b>P3K1.1</b>
<b>P3K2.3</b>	<b>P2K3.3</b>	<b>P1K2.1</b>	<b>P3K0.3</b>	<b>P1K3.1</b>	<b>P1K2.2</b>
<b>P2K2.3</b>	<b>P1K0.1</b>	<b>P1K1.3</b>	<b>P3K3.2</b>	<b>P3K1.3</b>	<b>P0K3.1</b>
<b>P2K0.2</b>	<b>P3K0.1</b>	<b>P3K2.2</b>	<b>P0K0.1</b>	<b>P0K1.1</b>	<b>P2K1.3</b>
<b>P1K1.2</b>	<b>P2K1.1</b>	<b>P3K3.3</b>	<b>P0K0.3</b>	<b>P2K3.2</b>	<b>P2K1.2</b>
<b>P1K0.3</b>	<b>P1K3.2</b>	<b>P2K2.1</b>	<b>P3K2.1</b>	<b>P3K0.2</b>	<b>P0K3.3</b>
<b>P0K0.2</b>	<b>P2K2.2</b>	<b>P0K3.2</b>	<b>P0K2.3</b>	<b>P0K2.2</b>	<b>P1K2.3</b>

