

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI ASAP CAIR DAN MIKROKAPSUL ASAP
CAIR TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (*E. guineensis* Jacq.)
DAN APLIKASINYA SEBAGAI PENGAWET ALAMI PADA
IKAN NILA (*Oreochromis niloticus*)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Kimia Pada Jurusan
Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

FITRIANI

NIM: 60500114029

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani
NIM : 60500114029
Tempat/Tgl Lahir : Batulanteang/ 12 Februari 1994
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Samata
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair Tandan Kosong Kelapa Sawit (*E. gueneensis* Jacq.) dan Aplikasinya Sebagai Pengawet Alami Pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain. Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Agustus 2018

Penyusun

Fitriani
Nim: 60500114029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Uji Aktivitas Antibakteri Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair Tandan Kosong Kelapa Sawit (*E. guineensis* Jacq.) dan Aplikasinya sebagai Pengawet Alami pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)" yang disusun oleh FITRIANI, NIM: 60500114029, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 09 Agustus 2018 bertepatan pada 27 Dzulhaidah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 09 Agustus 2018
27 Dzulhaidah 1439

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Tasmin Tanggareng, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Sappewall, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan puji syukur kehadiran Allah swt karena berkat nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Antibakteri Asap Cair dan Mikroenkapsul Asap Cair Tandan Kosong Kelapa Sawit (*E. guineensis* Jacq.) dan Aplikasinya Sebagai Pengawet Alami Pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)” dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw pembawa kebenaran bagi umat manusia.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orangtuaku ayahanda Mustari dg Tiro dan ibunda Bayang Tina yang tak pernah berhenti mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil.

Penulis menyadari masih begitu banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta jajarannya.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D, selaku ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekaligus sebagai

penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Rismawati Sikanna, S.Si., M.Si, selaku sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Sappewali, S.Pd., M.Si, yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan dari awal penelitian sampai akhir penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag, selaku penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen, Laboran dan staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan penelitian.
8. Sahabat sekaligus rekan penelitian saya, Riskawati dan Nurul Magfirah, yang selalu menemani, saling mendukung dan mendoakan dalam segala situasi yang dihadapi dalam penyelesaian skripsi ini. Serta seluruh pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian skripsi

Akhir kata mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pada diri saya pribadi dan bernilai ibadah disisi Allah swt, Aamiin ya Robbal Alaamiin.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Makassar, Agustus 2018

Penulis,

Fitriani



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1-5
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kelapa Sawit (<i>E. guineensis</i> Jacq)	7-11
B. Asap Cair.....	11-13
C. Enkapsulasi.....	13-15
D. Pengawet Alami	15-16
E. Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>).....	17-20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat	21
B. Alat dan Bahan	21
C. Prosedur Kerja.....	21

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Uji Aktivitas Antibakteri dengan Metode Difusi Cakram	30
2. Aplikasi Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair Sebagai Pengawet Alami pada Ikan Nila.....	31
B. Pembahasan	
1. Uji Aktivitas Antibakteri dengan Metode Difusi Cakram	35
2. Aplikasi Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair Sebagai Pengawet Alami pada Ikan Nila.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA	52-55
----------------------	-------

LAMPIRAN.....	x
---------------	---

BIOGRAFI	64
----------------	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kelapa Sawit dan Tandan Kosong Kelapa Sawit (<i>E. guineensis</i> Jacq.).....	7
Gambar 2.2. Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	17
Gambar 4.1. Diameter Zona Hambat Asap Cair TKKS terhadap Bakteri <i>E. coli</i>	35
Gambar 4.2. Diameter Zona Hambat Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap Bakteri <i>E. coli</i>	36
Gambar 4.3. Hubungan Antara Diameter Zona Hambat Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap Bakteri <i>E.coli</i>	37
Gambar 4.4. Diameter Zona Hambat Asap Cair TKKS terhadap Bakteri <i>S. aureus</i>	38
Gambar 4.5. Diameter Zona Hambat Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap Bakteri <i>S. aureus</i>	39
Gambar 4.6. Hubungan Antara Diameter Zona Hambat Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap Bakteri <i>S.aureus</i>	40
Gambar 4.7. Hasil Pengukuran pH Daging Ikan Nila Yang Ditambahkan dengan Asap cair	42
Gambar 4.8. Hasil Pengukuran pH Daging Ikan Nila Yang Ditambahkan dengan Mikrokapsul Asap cair	43
Gambar 4.9. Hasil Uji TPC Daging Ikan Nila Yang Ditambahkan dengan Asap cair	45
Gambar 4.10. Hasil Uji TPC Daging Ikan Nila Yang Ditambahkan dengan Mikrokapsul Asap cai	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Uji Daya Hambat Asap Cair Asap Cair Dan Mikrokapsul Asap Cair TKKS Terhadap Bakteri <i>E. Coli</i>	29
Tabel 4.2. Uji Daya Hambat Asap Cair Asap Cair Dan Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap bakteri <i>S. aureus</i>	29
Tabel 4.3. Hasil Uji pH Pada Daging Ikan Nila Yang Ditambah Asap Cair.	30
Tabel 4.4. Hasil Uji pH Pada Daging Ikan Nila Yang Ditambah Mikrokapsul Asap Cair	30
Tabel 4.5. Hasil Uji TPC Pada Daging Ikan Nila Yang Ditambah Asap Cair	31
Tabel 4.6. Hasil Uji TPC Pada Daging Ikan Nila Yang Ditambah Mikrokapsul Asap Cair	31
Tabel 4.7. Hasil Uji Organoleptik Pada Daging Ikan Nila Yang Ditambah Asap Cair	32
Tabel 4.8. Hasil Uji Organoleptik Pada Daging Ikan Nila Yang Ditambah Mikrokapsul Asap Cair	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian	55
Lampiran 2. Analisis Data.....	64-93
Lampiran 3. Dokumentasi Hasil Penelitian	94-98



ABSTRAK

Nama : Fitriani
Nim : 60500114029
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair Tandan Kosong Kelapa Sawit (*Elais guineensis* Jacq) dan Aplikasinya Sebagai Pengawet Alami pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Asap cair Tandan kosong Kelapa Sawit (TKKS) merupakan senyawa kimia yang diperoleh dari hasil pirolisis dan beberapa tahap pemurnian yang mengandung senyawa fenol, karbonil dan asam organik yang dapat berperan sebagai antibakteri. Bakteri sering menyerang ikan nila sehingga dapat merusak kualitas ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktifitas antibakteri dari asap cair dan mikrokapsul asap cair pada bakteri *E.coli* dan *S.aureus* serta aplikasinya sebagai pengawet alami pada ikan nila dengan analisis TPC, pH dan uji organoleptik pada hari ke- 0, 3, 6 dan 9 dengan konsentrasi 0; 0,5%; 1%; 1,5%; 2% dan 2,5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asap cair dan mikrokapsul asap cair mempunyai aktivitas antibakteri pada *E. coli* dan *S. aureus* dengan luas zona hambat terbaik yaitu pada asap cair konsentrasi 1,5% dengan luas diameter 7,28 mm pada bakteri *S. aureus*. Serta semakin lama waktu penyimpanan kualitas ikan semakin menurun dan ikan dengan penambahan asap cair dan mikrokapsul asap cair dapat bertahan sampai hari ke-6.

Kata kunci: Asap Cair, antibakteri, *Escherchia coli* dan *Staphylococcus aureus* dan Fenol.

ABSTRACT

Name : Fitriani
Nim : 60500114029
Title : *Activity of Antibacterial Liquid Smoke And Microcapsule Liquid Smoke Bunches Empty Palm Oil (Elais guineensis Jacq) And Its Application As Natural Preservative On Tilapia (Oreochromis niloticus)*

Liquid Smoke Oil palm empty bunches (TKKS) are chemical compounds obtained from pyrolysis and some purification steps containing phenol, carbonyl and organic acids that can act as antibacterials. This study aims to determine the antibacterial activity of liquid smoke and liquid smoke microcapsules in bacteria E.coli and S.aureus and its application as a natural preservative in tilapia with analysis of TPC, pH and organoleptic test on days 0, 3, 6, and 9 with concentrations of 0; 0,5%; 1%; 1,5%; 2% and 2,5%. The results showed that liquid smoke and liquid smoke microcapsule had antibacterial activity on E. coli and S. aureus with a constricted resistive zone of 1,5% 7,28 mm. As well as the longer the quality of fish storage time decreases and fish with the addition of liquid smoke and liquid smoke can survive until day-6.

Keywords: *Antibacterial, Escherchia coli ,Staphylococcus aureus, Liquid Smoke and Phenol.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia dan merupakan tanaman potensial yang menjadi andalan di sektor perkebunan. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit Indonesia sebesar 17,54 juta ton pada tahun 2008 menjadi 23,52 juta ton pada tahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,7% per tahun pada periode 2008-2012 (Ermawati dan Yeni, 2013: 130). Umumnya pemanfaatan kelapa sawit hanya pada buahnya yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan CPO (*crude palm oil*). Data sementara dari indexmundi menunjukkan bahwa pada tahun 2012 produksi minyak sawit Indonesia adalah sebesar 28,5 juta ton dengan ekspor 20,1 juta ton, jauh di atas produksi dan ekspor Malaysia yang masing-masing berjumlah 19 juta ton dan 17,2 juta ton (Riskayanto, 2013: 21). Peningkatan produksi minyak sawit berbanding lurus dengan peningkatan jumlah limbah kelapa sawit yang dihasilkan baik berupa limbah cair maupun limbah padat, limbah padat kelapa sawit meliputi cangkang, serabut dan tandang kosong (Haji, 2013: 109).

Tandan kosong kelapa sawit merupakan kerangka antar buah yang mengandung selulosa 41,3%-46,5%, hemiselulosa 25,3%-32,5% dan lignin 27,6%-32,5% (Kamal, 2015: 63). Umumnya tandang kosong dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk kompos. Mengingat komponen kimia yang dikandungnya berbagai penelitian dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai ekonomis dari tandang

kosong kelapa sawit tersebut, salah satu diantaranya adalah diolah menjadi asap cair (Khaldun dan Abdul, 2010: 548).

Asap cair merupakan senyawa kimia yang berbentuk cair yang diperoleh dari hasil kondensasi uap hasil pembakaran baik secara langsung maupun tidak langsung dari bahan yang mengandung lignin, selulosa, hemiselulosa serta senyawa karbon (Basri, 2010: 1). Dalam asap cair terkandung tiga kelompok senyawa organik yaitu fenol, karbonil dan asam. Senyawa fenol dapat berperan sebagai pembentukan flavor pada produk pengasapan serta mempunyai efek sebagai antioksidan dan antibakteri yang dapat memperpanjang daya simpan suatu produk selain itu juga berperan dalam pewarnaan produk pengasapan (Darmadji, dkk., 2010: 62-63). Sedangkan senyawa karbonil dan senyawa asam berperan dalam pemberian cita rasa, pewarnaan produk pengasapan serta dapat pula berperan sebagai pengawet karena dapat menghambat aktifitas mikroba (Yunus, 2011: 56).

Penelitian pemanfaatan asap cair masih terus dikembangkan karena dianggap penggunaan asap cair masih kurang praktis dan mudah mengalami kerusakan. Menurut penelitian yang dilakukan (Ariestya, dkk., 2016) salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi komponen kimia yang terdapat dalam asap cair yaitu dengan membuat produk mikroenkapsul. Mikroenkapsulasi adalah proses pengubahan bentuk produk dari cair menjadi padatan berukuran mikro dengan menggunakan enkapsulan yang dapat melindungi inti dari kerusakan (Ariestya, dkk., 2016: 20).

Kandungan senyawa fenol, karbonil dan asam dalam asap cair dapat dimanfaatkan sebagai pengawet bahan pangan yang bersifat alami. Senyawa tersebut dilaporkan dapat berperan sebagai antibakteri sebagaimana penelitian yang dilakukan

oleh (Annisa, 2014) yang melaporkan bahwa senyawa bioaktif dalam asap cair menunjukkan hasil yang positif terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus* namun pada penelitian ini menggunakan cangkang kelapa sawit dan hanya sampai pada asap cairnya belum dijadikan mikrokapsul. Antimikroba pada ikan nila (Ariesty, dkk., 2016) yang menggunakan mikrokapsul asap cair dari tempurung kelapa namun pemanfaatan tempurung kelapa sudah umum digunakan. Asap cair juga dilaporkan dapat memberikan aroma, tekstur dan cita rasa khas pada tahu (Ginayati, dkk., 2015). Berdasarkan hasil penelitian tersebut mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit dapat dijadikan sebagai pengawet pangan alami karena dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri. Selain itu penggunaan mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit sebagai pengawet pangan juga tidak menimbulkan efek samping. Sehingga dapat diaplikasikan sebagai pengawet pada ikan air tawar seperti ikan Nila.

Ikan merupakan bahan pangan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan protein harian karena ikan mengandung semua jenis asam amino esensial serta asam-asam amino lisin, metionin dan histidin yang sangat sedikit ditemukan pada sumber pangan yang lain. Umumnya semua jenis ikan mengandung 17-25% protein (Susanti, 2008: 38). Ikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nahl/16: 14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar

padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur” (Dapertemen Agama RI, 2014).

Ayat ini mentayakan bahwa: *Dan Dia*, yakni Allah swt., yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang seras pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian agar kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam disana sehingga kamu dapat memakan darinya daging yang segar yakni binatang-binatang laut itu (Shihab, 2002: 201-202).

Dalam tafsir Fi Zhilalil-Qur’an dijelaskan bahwa nikmat lautan dan kehidupan dilaut merupakan hajat dan keinginan yang sangat *daruri* (niscaya). Diantara yang disebutkan adalah daging yang segar dari jenis ikan dan lainnya untuk dimakan. Selain itu ada lagi nikmat lain dari jenis perhiasan seperti *lu’lu* dan *marjan* dari jenis kerang dan siput yang biasa digunakan manusia hingga sekarang (Quth, 2003: 168).

Ayat diatas menjelaskan bahwa penundukan lautan dan sungai sebagai tempat hidup binatang air yang beraneka ragam jenis dan manfaatnya salah satu binatang yang paling banyak dimanfaatkan manusia adalah ikan yang dijadikan sebagai bahan pangan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian, ayat diatas juga menyebutkan tentang ikan yang segar artinya hanya ikan yang segarlah yang baik dikonsumsi bukan ikan yang telah busuk sehingga itu diperlukan suatu bahan tambahan yang dapat mempertahankan kesegaran ikan agar tetap aman dikonsumsi.

Ikan nila merupakan ikan jenis budidaya air tawar yang mempunyai potensi yang besa untuk dikembangkan mengingat ikan nila mudah hidup dalam berbagai macam kondisi. Ikan nila mempunyai daging yang tebal dengan rasa yang enak dan gurih serta kandungan protein yang tinggi jika dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya, oleh karena itu ikan nila sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Seperti halnya dengan jenis ikan yang lainnya ikan nila juga sangat mudah mengalami kerusakan dan pembusukan. Ikan nila akan mengalami kemunduran mutu setelah 2 jam pasca kematian (Leksono dan Syahrul, 2001 dalam Devi, 2012:5). Terjadinya penurunan mutu dari ikan nila disebabkan karena kandungan protein dan kadar airnya yang tinggi sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas metabolisme dari bakteri dan mempercepat proses degradasi protein (Aulawi, 2016:1). Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam mempertahankan mutu dari ikan nila adalah dengan penambahan pengawet alami seperti penggunaan mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian untuk memanfaatkan limbah padat tandan kosong kelapa sawit yang dijadikan mikrokapsulasi asap cair dan diuji aktivitas antibakterinya pada bakteri *Esherchia coli* dan *Staphylococcus aureus* serta aplikasinya sebagai pengawet pangan alami pada ikan nila.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana aktivitas antibakteri asap cair dan mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit (*E. guineensis* Jacq) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Esherchia coli* dengan variasi konsentrasi?
2. Bagaimana pengaruh penambahan asap cair dan mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit (*E. guineensis* Jacq) terhadap masa simpan ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) dengan variasi konsentrasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri asap cair dan mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit (*E. guineensis* Jacq) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Esherchia coli* dengan variasi konsentrasi?
2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan asap cair dan mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit (*E. guineensis* Jacq) terhadap masa simpan ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) dengan variasi konsentrasi?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat menjadi solusi terhadap permasalahan limbah padat perkebunan kelapa sawit.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi yang dimiliki limbah padat tandan kosong kelapa sawit.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai antibakteri dan pengawet pangan alami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

A. Kelapa Sawit (*E. guineensis* Jacq.)

Kelapa sawit (Gambar 2.1) merupakan tanaman yang berasal dari Afrika dan Amerika Selatan tepatnya Brasilia, di Negara asalnya tanaman ini ditemukan tumbuh secara liar disepanjang tepi aliran sungai. Kelapa sawit kemudian tersebar keseluruh dunia termaksud ke Asia fasifik dan tenggara hingga ke Indonesia. Di Indonesia Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang menjadi andalan untuk mendatangkan devisa setiap tahun. Kelapa sawit termasuk kedalam famili *Arecaceae*, sub famili *Cocoideae* dan genus *Elaies* jenis yang yang sering dibudidayakan adalah jenis *E. guineensis* Jacq.

Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis tahunan dan termasuk kedalam golongan palma. Dikenal ada tiga jenis kelapa sawit yaitu dura, psifera dan tenera. Ketiganya dapat dibedakan berdasarkan penampang irisan buah dimana untuk jenis dura memiliki tempurung yang tebal, psifera dengan tempurung yang kecil dan tenera yang merupakan hasil persilangan dari keduanya yang memiliki buah yang bertempurung tipis (Khair, dkk., 2014: 251).



Gambar 2.1. Tandan kosong kelapa sawit
(Sumber: Kamal, 2015: 63)

Menurut (Menurut Allorerung, 2010 dalam Annisa 2014: 5), tingkatan taksonomi kelapa sawit adalah sebagai berikut:

Divisi : Embryophyta siphonagama
Kelas : Angiospermae
Ordo : Monocotyledonae
Famili : Aracaceae (dahulu Palmae)
Sub-famili : Cocoideae
Genus : *Elaeis*
Spesies : *E. guineensis* Jacq.

Kelapa sawit (Gambar 2.1) merupakan tanaman berkeping satu (monokotil). Batang yang menjulai dengan ketinggian mencapai 15-20 meter, tidak berkambium dan tidak bercabang. Tanaman ini termasuk tanaman yang berumah satu dimana bunga jantan dan betina berada dalam satu pohon. Bagian vegetatif terdiri atas akar, batang dan daun sedangkan bagian generativnya yaitu bunga dan buah (Mangoengsoekarjo dan Semangun, 2008 dalam Rosa, 2012: 3).

Akar kelapa sawit yang baru muncul saat berkecambah disebut radikula yang panjangnya dapat mencapai 15 cm dan bertahan selama 6 bulan. Kemudian akan muncul akar primer yang tumbuh dari batangnya dengan jumlah yang ribuan dengan diameter antara 8-10 mm dengan panjang 18 cm. Selanjutnya dari akar primer ini akan tumbuh akar sekunder dengan diameter 2-4 mm dan dari akar sekunder akan tumbuh akar tersier dengan diameter 0,7-1,5 mm dengan panjang dapat mencapai 15 cm. Batang kelapa sawit membesar pada bagian pangkal, pangkal ini akan memperkokoh posisi batang agar dapat berdiri tegak. Dalam waktu 1-2 tahun pertumbuhan batang lebih mengarah ke samping, diameter batang dapat mencapai

60 cm. Setelah itu pertumbuhan keatas dengan panjang 10-11 meter. Kelapa sawit akan berbunga pada umur 12-14 bulan tetapi belum ekonomis, setelah umur 2,5 tahun baru dapat dipanen. Bunga kelapa sawit merupakan bunga *monoecius* artinya bunga jantan dan bunga betina berada dalam satu pohon. Penyerbukan yang umum terjadi adalah penyerbukan silang namun kadang juga terjadi penyerbukan sendiri. Kelapa sawit yang telah dewasa dapat menghasilkan 40-60 daun dengan laju dua daun setiap bulan dan satu helai fungsional setiap dua tahun. Ukuran daun dapat mencapai 5-7 meter yang terdiri dari satu tulang daun (*rachis*), 100-160 pasang anak daun linear dan satu tangkai daun (*petiole*) yang berduri. Buah kelapa sawit adalah buah batu yang *sessile*, menempel dan bergerombol pada tandan buah. Jumlah buah pertandan dapat mencapai 1600 buah, berbentuk lonjong membulat, panjang buah sekitar 2-3 cm, beratnya mencapai dapat 30 gram. Bagian buah terdiri dari kulit buah (eksokarp), sabut dan biji (mesokarp). Biji terdiri atas *endocarp* (cangkang) dan inti (*kernel*), sedangkan inti tersebut terdiri endosperma dan embrio (Mangoengsoekarjo dan Semangun, 2008 dalam Rosa, 2012: 4-5).

Bagian kelapa sawit yang paling banyak dimanfaatkan adalah bagian bijinya yang diolah menjadi minyak. Sejak tahun 2006, Indonesia berhasil menggeser posisi Malaysia sebagai Negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kinerja industri minyak sawit Indonesia kemudian berlanjut ketika pada tahun 2009 kembali menggeser posisi Malaysia sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Data sementara dari *indexmundi* menunjukkan bahwa pada tahun 2012 produksi minyak sawit Indonesia adalah sebesar 28,5 juta ton dengan ekspor 20,1 juta ton, jauh di atas produksi dan ekspor Malaysia yang masing-masing berjumlah 19 juta ton dan 17,2 juta ton (Riskayanto, 2012:21).. Minyak sawit digunakan sebagai bahan baku

dalam pengolahan minyak makan, margarin, sabun, kosmetik, industri baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi. Minyak sawit memiliki kelebihan dibandingkan dengan minyak jenis lainnya karena tahan terhadap oksidasi dengan tekanan tinggi serta dapat melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh pelarut lainnya, selain itu juga mempunyai daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit sehingga aman digunakan dalam bidang kosmetik (Khair, dkk., 2014: 250-251). Seiring dengan meningkatnya jumlah produksi minyak kelapa sawit juga meningkatkan jumlah limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit tersebut merupakan hasil samping dan tidak termasuk dalam produk utama, limbah tersebut dapat berupa limbah cair maupun limbah padat. Limbah padat kelapa sawit berupa tandang kosong, janjang dan sabut. Umumnya limbah ini dapat mencemari lingkungan apabila tidak diolah dengan baik (Khaldun dan Abdul, 2010: 549).

Salah satu limbah padat kelapa sawit yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah tandan kosong. Tandan kosong merupakan kerangka antar buah. Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) mengandung Selulosa 41,3%-46,5%, HemiSelulosa 25,3%-32,5% dan mengandung lignin 27,6%-32,5% (Kamal, 2015: 63). Sebuah pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 100 ribu ton tandan buah segar per tahun akan menghasilkan sekitar 6 ribu ton cangkang, 12 ribu ton serabut dan 23 ribu ton tandan buah kosong (Haji, 2013: 109). Menurut Asmawit (2010: 7), hasil survei menunjukkan bahwa tandan kosong kelapa sawit belum dimanfaatkan secara optimal, hanya sebahagian kecil yang dimanfaatkan untuk dijadikan kompos dengan menimbun kembali lahan perkebunan kelapa sawit dan selebihnya terbuang secara percuma.

Limbah padat kelapa sawit khususnya tandan kosong kelapa sawit dimanfaatkan sebagai pupuk kompos karena kandungan unsur haranya yang tinggi seperti unsur nitrogen, posfor, kalium dan magnesium. Selain itu dimanfaatkan pula sebagai sumber energi terbaru seperti pembuatan bioetanol (kamal, 2015).

Berdasarkan komponen kimia yang terkandung dalam limbah padat berupa tandan kosong kelapa sawit dapat diolah dengan memanfaatkan teknologi yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi salah satunya diolah menjadi asap cair.

B. Asap Cair

Asap cair merupakan senyawa berbentuk cairan yang diperoleh dari proses pirolisis kayu kemudian dikondensasi dan dimurnikan dari senyawa tar dan senyawa lainnya (Darmajdji, dkk., 2012: 62). Asap cair adalah hasil pembakaran yang tidak sempurna yang melibatkan terjadinya reaksi dekomposisi karena pengaruh suhu, polimerisasi dan kondensasi (Asmawit, dkk., 2011: 8). Asap cair merupakan hasil samping dari proses pirolisis. Asap cair memiliki warna coklat dan bau yang khas yang dapat dijadikan sebagai penambah aroma dan tekstur pada bidang pangan (Ginayati, dkk., 2015: 7).

Asap cair diperoleh dari hasil pirolisis bahan yang mempunyai tekstur yang keras (Oramahi, dkk., 2011: 8). Pirolisis merupakan suatu metode pemanasan yang tidak melibatkan oksigen untuk mendegradasi biomassa menjadi arang, tar dan gas. Produk utama yang dihasilkan dari pirolisis adalah arang sedangkan asap cair merupakan produk samping (Khaldun dan Abdul, 2010: 549). Selama proses pirolisis berlangsung, komponen utama dari bahan baku asap cair yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin akan mengalami pirolisa menghasilkan bermacam-macam senyawa. Proses

pirolisa melibatkan berbagai proses reaksi yaitu, dekomposisi, oksidasi, polimerisasi, dan kondensasi. Reaksi-reaksi yang terjadi selama pirolisa adalah: pelepasan air dari bahan baku pada suhu 25–200°C, pirolisa hemiselulosa pada suhu 200–250°C, pirolisa selulosa pada suhu 280–320°C dan pirolisa lignin pada suhu 400°C. Asap cair yang dihasilkan dari proses pirolisis dapat difraksinasi untuk untuk memisahkan senyawa yang tidak diinginkan yaitu senyawa tar dan hidrokarbon polisiklis aromatik (Sari, dkk., 2009: 44).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Haji, 2013), kandungan kimia yang paling banyak terdapat dalam asap cair adalah asam asetat dan fenol. Hasil ini dari komponen penyusun asap cair tidak jauh berbeda dengan yang diperoleh dengan hasil pirolisis bahan kayu yang memperoleh air (11-92%), senyawa fenolik (0,2-2,9%), asam-asam organik (2,8-4,5%) dan karbonil (2,6-4,6%). Lebih lanjut, sudah didapatkan tujuh komponen kimia utama dalam asap cair tempurung kelapa, yaitu senyawaan fenolik, 2-metoksifenol, 2,5-dimetoksifenol dan 3-metil-1,2-siklo-pentadien, yang larut dalam ester.

Adanya kandungan fenol dalam asap cair dapat memberikan efek pembentukan flavor dan efek antimikroba serta antioksidan yang dapat memperpanjang daya simpan suatu produk (Darmadji, 2012: 63). Selain itu senyawa fenol dapat memberikan aroma, warna dan rasa yang khas pada tahu (Ginayati, dkk., 2015). Senyawa dari golongan fenolik mempunyai efektivitas antibakteri karena adanya interaksi absorpsi antara sel bakteri dengan melibatkan ikatan hidrogen, mengganggu aktivitas membran sitoplasma termasuk mengganggu transport aktif serta kekuatan proton (Putri, dkk., 2014: 184). Mempunyai efektivitas antimikroba dan memperpanjang daya simpan ikan nila pada penyimpanan dingin (Ariestya, dkk.,

2016). Senyawa karbonil yang terdapat dalam asap cair meliputi formaldehid, glikoaldehid, metil glioksal, diasetil, furfural, aseton dan hidroksiasetan yang dapat berperan sebagai pemberi warna dan aktivitas antimikroba. Asam-asam yang terkandung dalam asap cair meliputi asam format, asam propinoat, asetat, velerat dan isokaproat, senyawa asam asetat pada konsentrasi tertentu mempunyai efektivitas sebagai antimikroba dan bakteriasidal (Darmadji, dkk., 2012: 64). Lebih lanjut Menurut (Darmadji, 1996 dalam Rasyid, 2010: 9) keasaman mempunyai peranan penting dalam menghambat aktivitas antimikroba, dimana pH 4,0 dapat menekan aktivitas bakteri pembusuk.

Asap cair memang telah lama digunakan dalam kehidupan masyarakat sebagai pengawet alami pada produk olahan ikan. Namun penggunaannya masih dianggap kurang praktis dan senyawa biokatif yang dikandungnya mudah mengalami kerusakan oleh karena itu beberapa penelitian menyarankan untuk pengembangan fungsional dari asap cair yaitu dengan melindunginya dengan cara mengkapsulasi asap cair tersebut.

C. Enkapsulasi

Enkapsulasi merupakan proses yang memanfaatkan enkapsulan sebagai pelindung inti dari suatu bahan baik berupa padatan maupun cairan sehingga membuat partikel-partikel inti mempunyai sifat fisikokimia yang diinginkan. Disebut mikroenkapsulasi karena berukuran mikro (Ali, dkk., 2014: 23). Mikroenkapsulasi adalah proses perubahan bentuk dari produk cair ke bentuk bubuk dengan ukuran mikro, mikroenkapsulasi bertujuan untuk melindungi inti dengan memberikan pelindung berupa lapisan tipis sehingga senyawa aktif dalam suatu bahan dapat terjaga dan dapat dikontrol senyawa yang hilang (Ariesty, dkk., 2016: 20).

Mikroenkapsulasi merupakan teknologi penyalutan atau memberikan perlindungan dari pengaruh lingkungan luar serta mencegah perubahan warna, bau dan komponen kimia yang terdapat dalam suatu padatan, cairan dan gas oleh bahan penyalut dimana bahan penyalut ini harus mempunyai daya kelarutan yang tinggi dapat membentuk film serta menghasilkan larutan berkonsentrasi tinggi dengan viskositas yang rendah (Aulawi, 2016: 3). Dapat memberikan lapisan tipis yang bersifat kohesif dengan bahan inti, stabilitas pada bahan inti, tidak higroskopis dan tidak bereaksi dengan bahan inti, mampu melapisi bahan inti secara kuat, keras dan fleksibel, mampu terlepas dibawah kondisi tertentu, dan ekonomis. Bahan-bahan pelapis sudah banyak digunakan yaitu: gum, karbohidrat (pati, dekstrin, sukrosa), selulosa (metilselulosa, karbonsimetilselulosa), lemak (parafin, asam stearat, pospolipid) dan protein (gelatin, albumin) (Nurhidayah, 2016: 144).

Keberhasilan dalam melakukan proses mikroenkapsulasi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya bentuk bahan yang hendak dikapsul (padat, cair atau gas), stabilitas terhadap suhu dan pH, jenis enkapsulan yang digunakan, sifat fisikokimia (solubilitas, hidrofobik atau hidrifilik), medium mikroenkapsulasi yang digunakan (pelarut aair atau lainnya) prinsip mikroenkapsulasi yang digunakan (Hidayah, 2016: 144).

Mikroenkapsulasi sangat banyak dimanfaatkan dalam industri terutama industri pangan dan farmasi karena penanganan unggul, karena bentuknya yang bubuk sehingga mempermudah proses penakaran, pencampuran kedalam produk makanan atau minuman, adanya pembukus atau pelapis bahan inti sehingga mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh proses oksidasi, hidrolisis,

penguapan atau degradasi panas. Sehingga bahan inti mempunyai daya simpan yang tinggi (Iqbal dan Hidayanto, 2016: 4).

Penelitian dan aplikasi dari mikroenkapsulasi dari asap cair terus dikembangkan saat ini. Darmadji, dkk., (2012) menggunakan mikroenkapsulasi dari asap cair sebagai pengawet pangan alami. Aulawi (2016) menggunakan mikroenkapsulasi dari daun sirih sebagai pengawet daging. Ariestya, dkk., (2016) menggunakan mikroenkapsulasi asap cair tempurung kelapa sebagai antimikroba dan pengawet alami pada ikan nila selama penyimpanan dingin.

D. Pengawet Alami

Terkontaminasinya makanan maupun minuman yang kita makan oleh suatu kontaminan baik berupa penyakit bawaan dari makanan itu sendiri maupun kontaminasi dari luar dapat menimbulkan suatu penyakit (Yulia dan Bambang, 2016: 285). Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari kontaminasi bakteri patogen dan menjaga mutu pada bahan makanan adalah dengan menggunakan bahan pengawet. Pengawetan dapat dilakukan dengan penambahan senyawa kimia tertentu seperti antifungi, antioksidan dan antimikroba. Namun penggunaan antioksidan sintetik dilaporkan oleh beberapa penelitian menimbulkan efek seperti pembengkakan organ hati dan mempunyai efek karsinogenik (Aulawi, 2016: 2). Penggunaan bahan alami pada pengawetan bahan pangan sedang banyak diteliti (Wikanta, dkk., 2012: 4).

Definisi umum dari pengawet yaitu suatu senyawa tambahan yang diperuntukan untuk menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba sehingga dapat mencegah terjadinya kebusukan dan keracunan pangan oleh mikroba patogen. Komponen yang terdapat dalam bahan pengawet merupakan suatu komponen yang memiliki sifat mampu menghambat pertumbuhan bakteri atau kapang (bakteriostatik

atau fungistatik) atau membunuh bakteri atau kapang (bakterisidal atau fungisidal). Beberapa zat aktif yang terdapat dalam pengawet yang bersifat alami baik yang diperoleh dari tumbuhan, mikroorganisme maupun hewan yaitu: senyawa fenol, asam-asam organik, asam lemak rantai medium dan esternya (Koswara, 2009: 7).

Pengawet alami mempunyai beberapa kelebihan diantaranya tidak mengandung senyawa yang bersifat karsinogenik sehingga aman digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu golongan senyawa yang dapat menjadi bahan pengawet alami adalah golongan senyawa fenolik karena dapat menangkal radikal bebas (Barus, 2009: 4) dan dapat berperan sebagai antibakteri karena dapat menembus membran sel bakteri (Darmadji, dkk., 2012). Bahan pengawet dan antioksidan alami ini hampir terdapat pada semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebar di seluruh tanah air salah satu diantaranya adalah pada asap cair dari tandan kosong kelapa sawit.

Adanya kandungan senyawa fenolik, karbonil dan asam dalam mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit sehingga dapat diaplikasikan sebagai pengawet pangan alami karena senyawa tersebut mampu menghambat pembentukan spora dan pertumbuhan beberapa jenis jamur dan bakteri serta memperpanjang fase lag. Selain itu juga dapat menghambat degradasi protein, efek antioksidan juga dapat menghindarkan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak yang ada dalam bahan pangan dari degradasi oksidasi (Rasyid, 2010: 9). Salah satu bahan pangan yang paling mudah mengalami kerusakan adalah ikan jenis air tawar seperti ikan nila.

E. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Ikan nila (Gambar 2.2) merupakan ikan yang berasal dari lembah perairan sungai Nil (Afrika). Nila diintroduksi pertama kali ke Indonesia tepatnya di kota Bogor pada tahun 1969 sehingga dikenal dengan sebutan Nila 69 (Hardyanto 2007 dalam Ningrum, 2012: 21).



Gambar 2.2. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)
(Sumber: Arifin (2016: 161))

Klasifikasi ikan Nila menurut Nelson (1984 dalam Ningrum, 2012: 20) adalah sebagai berikut:

Filum	: Chordata
Sub filum	: Vertebrata
Kelas	: Osteichtyes
Ordo	: Perciformes
Sub ordo	: Percoides
Family	: Chiclidae
Genus	: <i>Oreochromis</i>
Spesies	: <i>Oreochromis niloticus</i>

Ikan nila (Gambar 2.2) merupakan ikan perairan air tawar yang mudah untuk di budidayakan. Ikan nila mampu hidup baik pada dataran rendah maupun dataran

tinggi, perairan dalam maupun dangkal serta dapat hidup di rawah-rawah, waduk, sungai, sawah dan kerambah (Ningrum, 2012: 20).

Ikan nila memiliki ciri-ciri seperti panjang tubuh dapat mencapai 30 cm, dengan bentuk tubuh yang panjang dan ramping serta sisik yang berukuran besar. Memiliki mata yang besar, dan menonjol bagian tepinya berwarna putih. Gurat sisi (linea lateralis) terputus dibagian tengah badan kemudian berlanjut dengan letak yang lebih ke bawah dibandingkan dengan garis yang memanjang di atas sirip dad. Jumlah sisik pada gurat sisi yaitu 34 lembar. Sirip punggung, sirip perut, dan sirip dubur mempunyai jari-jari lemah tapi keras dan tajam seperti duri. Bagian pinggir dan sirip punggung serta dadanya berwarna hitam (Khairuman dan Amri, 2013 dalam Ramlah dkk., 2012: 2).

Ikan nila merupakan jenis ikan yang cukup populer dikalangan masyarakat baik lokal maupun mancanegara karena mempunyai daging yang tebal serta rasa yang enak dan gurih. Selain itu juga ikan nila mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi yaitu sebesar 43,76%; lemak 7,01%, kadar abu 6,80% per 100 gram berat ikan, lebih tinggi bila dibandingkan dengan ikan tawar lainnya (Leksiono dan Syahrul, 2001 dalam Devi, 2015: 5).

Secara umum proses terjadinya kemunduran mutu ikan terdiri dari tiga tahap, yaitu pre-rigor, rigor mortis dan post-rigor.

1. Perubahan pre-rigor

Fase pre-rigor atau dikenal juga dengan istilah hiperaemia adalah fase yang terjadi sesaat setelah ikan mengalami kematian, peristiwa ini ditandai dengan terlepasnya lendir dari kelenjar yang berada di bawah permukaan kulit ikan. Kelenjar ini terdiri atas glukoprotein dan musin, lendir yang terlepas ini akan

membentuk lapisan bening yang tebal di sekeliling tubuh ikan, jumlahnya dapat mencapai 1-2,5% dari berat tubuhnya. Kelenjar ini merupakan media yang sangat cocok untuk pertumbuhan bakteri (Zakaria, 2008: 22).

2. Perubahan rigor mortis

Setelah mengalami kematian maka dalam tubuh ikan terjadi perubahan kimia yang kompleks. Setelah ikan mati maka sirkulasi darah akan berhenti akibatnya pasokan oksigen berkurang sehingga terjadi perubahan glikogen menjadi asam laktat, sehingga mengakibatkan pH tubuh ikan menurun menjadi 6,2-6,6 dari mula-mula pH 6,9-7,2, serta jumlah adenosine tripospat (ATP) yang menurun dan ketidakmampuan ikan dalam mempertahankan kekenyalannya. Peristiwa ini dikenal dengan rigor mortis. Rigor mortis menjadi penting untuk diketahui terutama dalam industri perikanan karena dapat dilakukan tindakan untuk mencegah pembusukan oleh mikroba dan juga dapat dijadikan sebagai petunjuk kesegaan ikan (Eskin 1990, dalam Zakaria, 2008: 22).

Setelah fase rigor mortis berakhir dan pembusukan bakteri berlangsung maka pH daging ikan naik mendekati netral hingga 7,5-8,0 atau lebih tinggi jika pembusukan telah sangat parah. Tingkat keparahan pembusukan disebabkan oleh kadar senyawa-senyawa yang bersifat basa. Pada kondisi ini, pH ikan naik dengan perlahan-lahan dengan semakin banyaknya senyawa basa purin dan pirimidin yang terbentuk maka semakin mempercepat kenaikan pH ikan (Junianto 2003 dalam Zakaria, 2008: 23).

3. Proses perubahan karena aktivitas enzim (autolysis)

Autolisis adalah proses penguraian organ-organ tubuh ikan oleh enzim-enzim yang terdapat didalam tubuh ikan sendiri. Proses ini biasanya berlangsung setelah

ikan melewati fase rigor motis. Setelah ikan mati, enzim masih mempunyai kemampuan untuk bekerja secara aktif. Namun, sistem kerja enzim menjadi tidak terkontrol karena organ pengontrol tidak berfungsi lagi. Akibatnya, enzim dapat merusak organ tubuh ikan lainnya, seperti dinding usus, otot daging dan insang. Ciri perubahan secara autolisis adalah mula-mula, protein dipecah menjadi molekul-molekul makro yang menyebabkan peningkatan dehidrasi protein dan molekul-molekulnya pecah menjadi pepton, polipeptida dan akhirnya menjadi asam amino. Di samping itu dihasilkan pula sejumlah kecil pirimidin dan basa purin yang dibebaskan pada waktu asam nukleat memecah. Bersamaan dengan itu, hidrolisis lemak menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol (Murniyati dan Sunarman 2000 dalam Zakaria, 2008: 23). Dengan dihasilkannya amoniak sebagai hasil akhir. Penguraian protein hidrogen dan lemak dalam autolisis menyebabkan perubahan rasa, tekstur, dan penampilan ikan. Fase autolisis dimulai jam ke-12 warna insang agak kusam, dengan sedikit lendir, Bola mata agak cekung, daging Lunak, bekas jari terlihat bila ditekan dan daging mudah disobek serta bau amoniak mulai tercium (Riyantono, dkk., 2009: 5).

4. Proses perubahan karena aktivitas bakteri

Fase pembusukan berikutnya ialah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, terutama bakteri. Dalam keadaan hidup bakteri tidak bisa memasuki organ-organ penting tubuh ikan. Hal ini disebabkan organ-organ penting tubuh ikan tersebut mempunyai batas pencegah terhadap penyerangan bakteri. Setelah ikan mati, kemampuan bertahan terhadap bakteri hilang sehingga bakteri segera masuk kedalam organ-organ penting tubuh ikan melalui insang, kulit dan saluran pencernaan. Akibat serangan bakteri, ikan mengalami berbagai perubahan yaitu lendir menjadi pekat,

bergetah, amis, mata terbenam dan warnanya memudar, serta insang berubah warna dengan susunan tidak teratur dan bau menusuk (Riyantono, dkk., 2009: 5). Jumlah bakteri yang terdapat pada tubuh ikan ada hubungannya dengan kondisi perairan tempat ikan tersebut hidup. Bakteri yang umumnya ditemukan pada ikan adalah bakteri *Pseudomonas*, *Alcaligenes*, *Sarcina*, *Vibrio*, *Flavobacterium*, *Serratia* dan *Bacillus* (Zakaria, 2008: 23).

Kemunduran mutu dari ikan akan terus berlangsung apabila tidak dihambat. Proses penghambatan laju kerusakan pada ikan bermacam-macam mulai dari pendinginan, pembekuan dan penambahan pengawet. Pengawet yang dapat digunakan adalah pengawet yang bersifat alami seperti penggunaan asap cair tandan kosong kelapa sawit.

F. Parameter Uji Kesegaran Ikan

Ada beberapa parameter yang sering digunakan dalam penentuan kesegaran ikan, yaitu sebagai berikut:

1. Total *Volatil Base Nitrogen* (TVBN)

Prinsip penetapannya adalah menguapkan senyawa-senyawa volatil yang terbentuk karena adanya proses penguraian protein pada ikan menjadi asam-asam amino yang lebih lanjut diurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Menurut Direktorat Jendral Perikanan 2007, nilai TVBN maksimum ikan segar adalah 30 mgN/100 gr (Zakaria, 2008: 14). Nilai TVBN dapat ditentukan menggunakan formulasi berikut:

$$\text{TVBN (mg N\%)} = \frac{\text{contoh sampel titirasi (mL)} - \text{blanko (mL)} \times N \text{ HCl} \times 14,007}{\text{berat sampel (g)}} \times 100$$

2. Uji *Total Plate Count* (TPC)

TPC merupakan uji yang bersifat *bacterial*. Semakin busuk ikan maka semakin banyak pula koloni bakterinya. Daging ikan yang sehat dan segar umumnya tidak mengandung bakteri (Jaya dan Dewi, 2006: 4). Prinsip kerja dari uji ini adalah penghitungan jumlah koloni bakteri yang ada dalam dengan pengenceran sesuai keperluan dan dilakukan secara duplo. Pembuatan larutan contoh dilakukan dengan mencampurkan 10 gram sampel dan larutan garam fisiologis sebanyak 90 ml sampai homogen (Fardiaz 1984 dalam Zakaria, 2008: 24). Menurut SNI 01-4103.1-2006 (BSN, 2006 b), jumlah bakteri pada fillet ikan beku maksimal $5,0 \times 10^5$ cfu/g (Husni, dkk., 2014: 242).

3. Uji pH

Kesegaran ikan juga dapat ditentukan dengan mengukur pH daging ikan. Produksi asam laktat dari hasil proses glikolisis secara anerob setelah ikan mati akan menentukan perubahan pH pada daging ikan. Perubahan nilai pH pada ikan bergantung pada berbagai faktor seperti jenis ikan, cara menangkap, pemberian pakan dan kondisi lainnya (Sakaguchi 1990 dalam Zakaria, 2008: 49). Pada dasarnya energi pada jaringan otot ikan setelah mati diperoleh secara anerobik dari pemecahan glikogen menjadi glukosa dan produk-produk turunannya. Selanjutnya penguraian glukosa melalui proses glikolisis akan menghasilkan ATP dan asam laktat. Akumulasi asam laktat inilah yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan pH daging ikan dan dapat menekan aktivitas mikroba sehingga memperlambat proses deteriorasi. Besarnya penurunan pH ini tergantung pada jumlah glikogen awal yang terdapat dalam otot ikan (Jiang 1998 dalam Zakaria, 2008: 49).

4. Uji Organoleptik

Penilaian organoleptik merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam menentukan tanda-tanda kesegaran ikan karena lebih mudah dan lebih cepat dikerjakan, tidak memerlukan banyak peralatan, serta tidak memerlukan laboratorium. Penetapan kemunduran mutu ikan secara subjektif (organoleptik) dilakukan menggunakan *score sheet* yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional SNI 01-2346-2006 (BSN 2006) serta menggunakan 15 orang panelis. Parameter yang diamati, yakni keadaan mata, insang, lendir permukaan badan, daging, bau, dan tekstur (Zakaria, 2008: 51). Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif (Ariestya, dkk., 2016: 22).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Oktober 2017 sampai bulan Mei 2018 bertempat di Laboratorium Biokimia dan Laboratorium Analitik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah neraca analitik (*Kern*), laminar air flow (*Heidolph*), Mikropipet (*Biorad*) inkubator, autoklaf (*Astel*), oven (*Mammert*), lemari asam, pH meter, blender, kompor listrik, jangka sorong dan peralatan gelas.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah amoxicillin 1%, mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit, biakan murni *E. coli* dan *S. aureus*, daging ikan nila, media *nutrient agar* (NA), water steril, kertas cakram, aquadest dan NaCl fisiologis 0,9%.

C. Prosedur kerja

Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu:

1. Uji Daya Hambat dengan Metode Difusi Cakram

a. Peremajaan Bakteri

Kultur bakteri dilakukan untuk meremajaan dan menambah stok bakteri. Kultur bakteri dilakukan dengan mengambil satu ose bulat biakan bakteri (*E.coli* dan

S. aureus) kemudian ditanam pada media NA yang telah memadat. Selanjutnya diinkubasi dengan suhu 37°C selama 24 jam.

b. Uji aktivitas Antibakteri

Bakteri uji (*E.coli* dan *S.aureus*) masing-masing diambil sebanyak 1 ose bulat kemudian diencerkan kedalam 10 mL NaCl Fisiologis 0.9 % hingga homogen. Setelah itu ambil 1 mL menggunakan mikropipet dan masukkan kedalam cawan petri yang telah disterilisasi sebelumnya. Kedalam cawan petri tambahkan sebanyak 15 mL media nutriet agar tunggu hingga memadat. Kertas cakram yang akan digunakan direndam dengan larutan sampel yaitu asap cair dan mikrokapsul asap cair dengan konsentrasi 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0% dan 2,5 %, kontrol positif (amoxicillin 1%) dan kontrol negatif (water steril). Setelah media memadat, cakram diletakkan diatas media. Selanjutnya di inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Aktivitas antibakteri terbesar ditunjukkan oleh luas zona bening yang terbentuk (Prayoga, 2013: 16). Konsentrasi terkecil dari sampel yang mampu menghambat bakteri yang diinokulasikan dengan terbentuknya zona bening merupakan nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dari sampel tersebut.

2. Preparasi sampel

Ikan nila yang masih segar dicuci kemudian dibersihkan isi perut, insang dipisahkan dari kulit dan durinya. Setelah itu daging ikan nila yang telah bersih dicincang hingga halus. Kemudian ditambahkan dengan asap cair dan mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit dengan beberapa variasi konsentrasi 0, 0,5%, 1% 1,5%, 2% dan 2,5% pada 50 gram daging ikan nila yang telah dihaluskan dengan waktu perendaman selama 30 menit. Daging yang telah ditambahkan dengan asap cair dan mikrokapsul asap cair tandan kosong kelapa sawit dimasukkan dalam plastik

segel dan diberi label. Kemudian disimpan pada suhu 4°C. Selama penyimpanan diuji Total Plate Count (TPC), pH dan uji organoleptik pada hari ke-0, 3, 6, dan 9 (Ariestya, dkk., 2016: 21).

3. Total Plate Count (TPC)

Prosedur persiapan pada sampel adalah melarutkan sampel kasar dengan larutan NaCl Fisiologis 0.9% dengan perbandingan antara 1:9 dalam wadah steril. Kemudian lakukan pengenceran dalam sampel dari pengenceran 10^{-1} - 10^{-7} . Pengenceran ini dilakukan untuk mendapatkan hasil jumlah koloni dalam sampel. Tuang 1 mL hasil pengenceran terakhir kedalam cawan petri. Selanjutnya media nutrient agar yang telah disterilisasi dituangkan sekitar 15 mL pada cawan petri. Inkubasi Media pada suhu inkubator 37° C selama 24 jam dalam posisi terbalik (Harigen 1986 dalam Soloko dkk., 2014:3).

4. Uji pH

Pengujian pH dilakukan dengan mengkalibrasi terlebih dahulu pada alat pH meter dengan larutan buffer sesuai dengan instruksi kerja alat setiap kali melakukan pengujian. Berikutnya mencoba solusi pH aquadest sampai pH meter perangkat dapat membaca nilai dengan bacaan yang tetap. Sebanyak 5 gram sampel dihomogenkan dengan 10 mL aquadest kemudian memasukkan elektroda yang telah dikalibrasi sebelumnya pada sampel setelah menunggu sampai angka pH meter berhenti dan menunjukkan angka yang tetap, maka diperoleh nilai pH mikroenkapsulasi (Ariestya, dkk., 2016: 21).

5. Uji Organoleptik

Menyediakan sampel daging ikan nila yang telah diberi mikrokapsul dengan konsentrasi 0, 0,5%, 1% 1,5%, 2% dan 2,5%, kemudian diberikan kepada 15 orang

panelis untuk mengamati warna, aroma dan tekstur. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif (Ariesty, dkk., 2016: 22).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

Komponen utama yang terkandung dalam asap cair yaitu kelompok senyawa organik seperti fenol, karbonil dan asam. Senyawa fenol dapat berperan sebagai pembentukan flavor pada produk pengasapan serta mempunyai efek sebagai antioksidan dan antibakteri yang dapat memperpanjang daya simpan suatu produk selain itu juga berperan dalam pewarnaan produk pengasapan (Darmadji, dkk., 2010: 62-63). Sedangkan senyawa karbonil dan senyawa asam berperan dalam pemberian cita rasa, pewarnaan produk pengasapan serta dapat pula berperan sebagai pengawet karena dapat menghambat aktifitas mikroba (Yunus, 2011: 56).

1. Uji Aktivitas Antibakteri Dengan Metode Difusi Cakram

Uji aktivitas antibakteri asap cair dan mikrokapsul asap cair terhadap bakteri *E.coli* dan *S. aureus* dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang ditandai dengan terbentuknya zona bening disekitar kertas cakram.

a. Aktivitas Antibakteri Terhadap *E.Coli*

Aktivitas antibakteri dari asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap bakteri *E. coli* dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dari tabel tersebut dapat dilihat adanya aktivitas antibakteri dari asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS.

Tabel 4.1. Uji Daya Hambat Asap Cair dan Mikro kapsul asap cair terhadap bakteri *E. coli*

Konsentrasi (%)	Diameter Zona Hambat (mm)	
	Asap Cair	Mikro kapsul
0,5	5,92 ± 0,66	6,50 ± 1,55
1,0	6,74 ± 1,36	5,78 ± 0,61
1,5	6,40 ± 1,30	5,87 ± 0,32
2,0	6,55 ± 0,45	5,80 ± 0,42
2,5	6,36 ± 0,23	6,18 ± 0,18
+	11,74 ± 1,51	12,52 ± 2,56
-	6,53 ± 2,48	5,12 ± 0,06

b. Aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus*

Aktivitas antibakteri dari asap cair dan mikro kapsul asap cair TKKS dapat dilihat pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut dapat dilihat adanya aktivitas antibakteri dari asap cair dan mikro kapsul asap cair TKKS.

Tabel 4.2. Uji Daya Hambat Asap Cair dan Mikro kapsul asap cair terhadap bakteri *S. aureus*

Konsentrasi (%)	Diameter Zona Hambat (mm)	
	Asap Cair	Mikro kapsul
0,5	6,42 ± 1,05	5,85 ± 2,88
10	6,79 ± 0,60	6,46 ± 0,52
1,5	7,28 ± 0,98	6,49 ± 0,61
2,0	6,73 ± 0,49	6,16 ± 0,55
2,5	6,78 ± 0,28	5,90 ± 1,11
+	12,90 ± 2,19	11,83 ± 0,93
-	6,31 ± 1,13	5,13 ± 0,55

2. Aplikasi Asap Cair Dan Mikro kapsul Asap Cair Sebagai Pengawet Alami Pada Ikan Nila

a. Uji pH

pH merupakan salah satu parameter kelayakan suatu produk pangan. Nilai pH ikan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan lama penyimpanan. Semakin lama ikan disimpan maka akan menyebabkan kenaikan pH. Nilai pH dari ikan nila yang telah ditambahkan dengan asap cair dan mikro kapsul asap cair TKKS dari hari ke-0 sampai hari ke-9 dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan 4.4.

1. Asap cair

Nilai pH dari ikan nila yang telah ditambahkan dengan asap cair dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Uji pH pada daging ikan nila yang telah ditambahkan dengan asap cair

Konsentrasi (%)	Hari ke-			
	0	3	6	9
Tanpa perlakuan	6,70 ± 0,00	6,90 ± 0,14	7,60 ± 0,00	8,00 ± 1,14
0,5	6,70 ± 0,00	7,05 ± 0,07	7,50 ± 0,00	7,85 ± 0,07
1,0	6,80 ± 0,14	7,15 ± 0,07	7,40 ± 0,00	8,00 ± 0,00
1,5	6,85 ± 0,07	7,15 ± 0,07	7,20 ± 0,00	7,70 ± 0,14
2,0	6,80 ± 0,07	6,95 ± 0,07	7,40 ± 0,00	7,80 ± 0,14
2,5	6,75 ± 0,07	7,10 ± 0,00	7,20 ± 0,007	7,95 ± 0,07

2. Mikrokapsul

Nilai pH dari ikan nila yang telah ditambahkan dengan mikrokapsul asap cair dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Uji pH pada daging ikan nila yang telah ditambahkan dengan asap cair

Konsentrasi (%)	Hari Ke-			
	0	3	6	9
Tanpa perlakuan	6,70 ± 0,00	6,90 ± 0,14	7,60 ± 0,00	8,00 ± 0,14
0,5	6,80 ± 0,00	6,80 ± 0,00	7,50 ± 0,00	8,00 ± 0,00
1,0	6,80 ± 0,41	6,75 ± 0,07	7,40 ± 0,14	7,85 ± 0,07
1,5	6,85 ± 0,07	6,15 ± 0,07	7,45 ± 0,21	7,90 ± 0,14
2,0	6,70 ± 0,00	6,25 ± 0,21	7,75 ± 0,21	7,80 ± 0,14
2,5	6,75 ± 0,07	6,75 ± 0,21	7,40 ± 0,00	8,00 ± 0,00

b. Uji Total Plate Count (TPC)

Nilai TPC digunakan sebagai parameter karena salah satu penyebab kemunduran kualitas ikan adalah karena aktivitas bakteri. Nilai TPC dari ikan nila yang telah ditambahkan dengan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS dari hari ke-0 sampai hari ke-9 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

1. Asap cair

Jumlah koloni bakteri dari ikan nila yang telah ditambahkan dengan asap cair dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Hasil Uji TPC pada daging ikan nila yang telah ditambahkan dengan asap cair

Konsentrasi (%)	Hari Ke-			
	0 (10^7)	3 (10^7)	6 (10^7)	9 (10^7)
-	64,5 ± 0,70	29,5 ± 40,30	41,5 ± 12,02	77,5 ± 7,77
0,5	34,5 ± 13,43	47,5 ± 47,37	56 ± 25,45	59 ± 8,48
1	18 ± 9,89	11 ± 5,65	156 ± 183,14	11,5 ± 0,70
1,5	17,5 ± 0,70	20 ± 1,41	18,5 ± 2,12	323 ± 1,81
2,0	32 ± 18,38	16 ± 7,07	20,5 ± 4,94	12,5 ± 13,43
2,5	99,5 ± 74,95	27,5 ± 17,67	11,5 ± 6,36	7,5 ± 3,53

2. Mikrokapsul

Jumlah koloni bakteri dari ikan nila yang telah ditambahkan dengan mikrokapsul asap cair dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6. Hasil Uji TPC pada daging ikan nila yang telah ditambahkan dengan mikrokapsul asap cair

Konsentrasi (%)	Hari ke-			
	0 (10^7)	3 (10^7)	6 (10^7)	9 (10^7)
-	64,5 ± 0,70	29,5 ± 40,30	41,5 ± 12,02	77,5 ± 7,77
0,5	121,5 ± 118,08	16,5 ± 6,36	16,5 ± 6,36	18,5 ± 16,26
1	74,5 ± 72,83	15 ± 7,07	27 ± 29,69	22 ± 2,82
1,5	22,5 ± 10,60	27,5 ± 10,60	6 ± 5,65	26,5 ± 12,02
2,0	12 ± 2,82	8,5 ± 9,19	3,5 ± 2,12	44 ± 12,72
2,5	38,5 ± 16,26	37,5 ± 37,47	11,5 ± 7,77	37 ± 9,89

c. Uji Organoleptik

Pengujian sifat organoleptik merupakan metode uji yang sangat penting bagi setiap produk makanan karena berkaitan dengan penerimaan konsumen. Penetapan kemunduran mutu ikan secara subjektif (organoleptik) dilakukan menggunakan *score sheet* yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional SNI 01-2346-2006 (BSN 2006) serta menggunakan 15 orang panelis. (Zakaria, 2008: 51). Uji

organoleptik (uji skor) dilakukan pada penelitian ini yaitu dari segi warna, aroma, dan tekstur yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesukaan panelis terhadap produk ikan. Hasil uji Organoleptik dari ikan nila dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 4.8.

1. Asap Cair

Hasil uji organoleptik ikan nila dengan asap cair dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Hasil Uji Organoleptik pada daging ikan nila yang telah ditambahkan dengan asap cair

Waktu Penyimpanan	Perlakuan	Parameter Uji		
		Warna	Aroma	Tekstur
0 Hari	Tanpa Perlakuan	7.13 ± 0.00	7.40 ± 0.00	8.86 ± 0.00
	0,5%	7.13 ± 0.00	7.60 ± 0.00	8.86 ± 0.00
	1,0%	8.33 ± 0.00	9.00 ± 0.00	8.86 ± 0.00
	1,5%	8.33 ± 0.00	9.00 ± 0.00	8.86 ± 0.00
	2,0%	8.33 ± 0.00	9.00 ± 0.00	8.86 ± 0.00
	2,5%	9.20 ± 0.00	9.00 ± 0.00	8.86 ± 0.00
3 Hari	Tanpa Perlakuan	5.53 ± 0.00	5.53 ± 0.07	5.13 ± 0.18
	0,5%	6.20 ± 0.00	6.19 ± 0.19	5.73 ± 0.98
	1,0%	6.86 ± 0.00	6.79 ± 0.91	6.46 ± 0.19
	1,5%	6.86 ± 0.00	6.73 ± 0.00	6.70 ± 0.14
	2,0%	6.93 ± 0.09	6.93 ± 0.28	6.73 ± 0.00
	2,5%	7.13 ± 0.09	7.26 ± 0.09	7.40 ± 0.00
6 Hari	Tanpa Perlakuan	2.80 ± 0.28	3.19 ± 0.09	2.13 ± 0.09
	0,5%	3.53 ± 0.18	3.63 ± 0.04	2.86 ± 0.00
	1,0%	3.80 ± 0.00	4.73 ± 0.38	3.26 ± 0.09
	1,5%	4.53 ± 0.98	4.93 ± 0.09	4.13 ± 0.28
	2,0%	5.00 ± 0.00	5.27 ± 0.38	3.99 ± 0.47
	2,5%	5.66 ± 0.00	5.79 ± 0.19	4.59 ± 0.37
9 Hari	Tanpa Perlakuan	1.00 ± 0.00	1.00 ± 0.00	1.00 ± 0.00
	0,5%	1.53 ± 0.00	1.13 ± 0.00	1.13 ± 0.00
	1,0%	1.93 ± 0.18	1.99 ± 0.09	1.63 ± 0.14
	1,5%	2.63 ± 0.04	2.33 ± 0.00	2.13 ± 0.09
	2,0%	3.00 ± 0.00	2.59 ± 0.37	2.53 ± 0.18
	2,5%	3.33 ± 0.09	3.63 ± 0.24	3.33 ± 0.09

2. Mikrokapsul

Hasil uji organoleptik ikan nila dengan mikrokapsul asap cair dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Uji Organoleptik pada daging ikan nila yang telah ditambahkan dengan mikrokapsul asap cair

Waktu Penyimpanan	Perlakuan	Parameter Uji		
		Warna	Aroma	Tekstur
0 Hari	Tanpa Perlakuan	7.13 ± 0.00	7.40 ± 0.00	8.86 ± 0.00
	0,5%	7.49 ± 0.51	8.86 ± 0.00	8.86 ± 0.00
	1,0%	8.53 ± 0.00	8.79 ± 0.91	8.86 ± 0.00
	1,5%	8.39 ± 0.09	9.00 ± 0.00	8.86 ± 0.00
	2,0%	8.73 ± 0.00	9.00 ± 0.00	8.86 ± 0.00
	2,5%	8.86 ± 0.00	9.00 ± 0.00	8.86 ± 0.00
3 Hari	Tanpa Perlakuan	5.53 ± 0.00	5.53 ± 0.00	5.13 ± 0.18
	0.5%	6.33 ± 0.00	6.59 ± 0.37	5.66 ± 0.00
	1.0%	6.39 ± 0.09	6.33 ± 0.00	5.80 ± 0.00
	1.5%	6.73 ± 0.18	6.80 ± 0.28	6.23 ± 0.32
	2.0%	7.73 ± 0.09	8.86 ± 0.00	7.57 ± 0.12
	2.5%	7.33 ± 0.00	8.86 ± 0.00	7.39 ± 0.09
6 Hari	Tanpa Perlakuan	2.80 ± 0.28	3.19 ± 0.09	2.13 ± 0.09
	0.5%	3.73 ± 0.09	4.33 ± 0.18	2.79 ± 0.09
	1.0%	3.99 ± 0.09	4.46 ± 0.19	3.33 ± 0.28
	1.5%	4.53 ± 0.28	5.06 ± 0.28	3.66 ± 0.19
	2.0%	5.66 ± 0.00	5.86 ± 0.28	4.79 ± 0.65
	2.5%	5.66 ± 0.19	6.10 ± 0.14	4.93 ± 0.09
9 Hari	Tanpa Perlakuan	1.00 ± 0.00	1.00 ± 0.00	1.00 ± 0.00
	0.5%	1.59 ± 0.09	1.66 ± 0.00	1.66 ± 0.00
	1.0%	2.19 ± 0.19	2.10 ± 0.42	2.06 ± 0.00
	1.5%	2.73 ± 0.18	2.59 ± 0.19	2.59 ± 0.37
	2.0%	3.86 ± 0.28	3.53 ± 0.28	4.03 ± 0.24
	2.5%	4.46 ± 0.00	3.93 ± 0.00	5.00 ± 0.00

B. Pembahasan


1. Uji Aktivitas Antibakteri

Uji aktivitas antibakteri dari asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap *E.coli* dan *S. aureus* dilakukan dengan menumbuhkan terlebih dahulu kedua jenis bakteri tersebut. Seperti jenis bakteri pada umumnya *E.coli* dan *S.aureus* dapat tumbuh pada suhu 37°C pada media *nutrient agar* (NA). *Nutrient agar* (NA) merupakan media pertumbuhan yang umum digunakan untuk menumbuhkan beberapa jenis bakteri. Media yang telah disiapkan selanjutnya disterilkan dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Tujuan dari sterilisasi adalah untuk mematikan semua kontaminan yang terdapat pada media hingga bakteri yang akan diremajakan merupakan bakteri biakan yang murni. Selanjutnya bakteri diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C. Biakan bakteri tersebut diinkubasi dengan posisi cawan petri yang dibalik hal tersebut bertujuan agar uap air yang terdapat pada bagian penutup cawan petri tidak mengganggu proses pertumbuhan bakteri. Hasil peremajaan bakteri tersebut selanjutnya disuspensikan kedalam NaCl 0,9%, setelah itu dihomogenkan hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi keruh. Warna keruh tersebut menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan bakteri. Suspensi tersebut kemudian digunakan sebagai bakteri uji untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS.

Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan metode difusi cakram. Metode difusi cakram merupakan satu dari tiga jenis metode difusi, metode ini sering digunakan dalam penentuan aktivitas antibakteri karena mudah dilakukan serta relatif ekonomis. Aktivitas antibakteri asap cair dan mikrokapsul asap cair

ditandai dengan adanya zona bening di sekitar area cakram. Zona bening selanjutnya diukur diameternya dengan menggunakan jangka sorong.


Pada penelitian ini digunakan dua jenis bakteri yaitu *E. coli* (yang mewakili gram negatif) dan *S.aureus* (yang mewakili gram positif). Penggunaan dua jenis bakteri yang berbeda bertujuan untuk mengetahui spektrum zona hambat dari suatu antibakteri. Suatu antibakteri dikatakan memiliki spektrum luas apabila mempunyai daya hambat yang besar terhadap bakteri dari gram positif maupun negatif, mempunyai spektrum kecil apabila hanya mampu menghambat bakteri dari salah satu gram (Pelezer 1997 dalam Annisa 2014). Untuk hasil pengamatan perhatikan Gambar 4.1 dan 4.2.



Gambar 4.1. Diameter Zona Hambat Asap Cair TKKS terhadap bakteri *E.coli*

Gambar 4.1 menunjukkan diameter zona hambat asap cair terhadap bakteri *E.coli*. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara variasi konsentrasi terhadap diameter zona hambat. Hasil pengukuran diameter zona hambat asap cair terhadap *E.coli* menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0.5% sebesar 5.92 mm kemudian mengalami kenaikan pada konsentrasi 1% yaitu sebesar 6,74 mm dan pada konsentrasi 1,5% mengalami sedikit penurunan menjadi 6,40 mm, untuk

konsentrasi 2% kembali mengalami kenaikan yaitu 6,55 mm dan pada konsentrasi 2,5% kembali mengalami penurunan. Adanya fluktuasi diameter zona hambat tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor seperti tingkat resistensi mikroorganisme, lama penyimpanan dan temperatur (Harlis dan Wahyuni, 2008 dalam Marsono dkk., 2017: 52). Selain itu menurut Norrel dan Messley (1996) penggunaan antibakteri yang melebihi ambang batas (over dosis) maka akan menyebabkan bakteri menjadi kebal (Saraswati, 2011: 337) sehingga diameter zona hambat berukuran kecil.



Gambar: 4.2. Diameter Zona Hambat Mikro kapsul Asap Cair TKKS terhadap bakteri *E.coli*


Gambar 4.2. menunjukkan diameter zona hambat dari mikro kapsul asap cair TKKS terhadap bakteri *E.coli* berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas daya hambat tidak hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Hasil pengukuran diameter zona hambat mikro kapsul asap cair terhadap *E.coli* menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0.5 % sebesar 6,50 mm kemudian mengalami penurunan pada konsentrasi 1% yaitu sebesar 5,78 mm dan pada konsentrasi 1,5% mengalami kenaikan menjadi 5,87 mm, untuk konsentrasi 2% kembali mengalami penurunan yaitu 5,80 mm dan pada konsentrasi 2,5% kembali mengalami kenaikan yaitu 6,18 mm.

Selain pengaruh konsentrasi luas zona hambat suatu antibakteri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepadatan inokulum, jika inokulum terlalu

sedikit akan mengakibatkan diameter zona hambat menjadi besar begutupun sebaliknya jika inokulum terlalu tebal akan menyebabkan diameter zona hambat berukuran kecil meskipun kepekaan mikroorganismte tidak berubah (Saraswati, 2011: 333).

Data dari diameter zona hambat baik asap cair maupun mikrokapsul asap cair TKKS terhadap bakteri *E.coli* diolah lebih lanjut dengan SPSS21 menggunakan uji ANOVA one way untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata variasi konsentrasi terhadap diameter zona hambat tersebut dan dari hasil analilis tersebut diperoleh hasil bahwa variasi konsentrasi berpengaruh nyata terhadap diameter zona hambat hal tersebut terlihat dari nilai signifikan yang diperoleh ($>0,05$) yaitu untuk *E. coli* 0,398 dan *S. aureus* 0,597.


Hubungan antara penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap zona hambat pada pada bakteri *E.coli* ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3: Hubungan Antara Diameter Zona Hambat Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap Bakteri *E.coli*.

Gambar 4.3. menunjukkan hubungan antara penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair terhadap daya hambat pada bakteri *E.coli*. Dari grafik tersebut dapat dilihat aktivitas antibakteri asap cair lebih baik dibandingkan dengan mikrokapsul asap cair. Hal tersebut dapat dikaitkan pada saat proses homogenisasi, dimana masih terdapat senyawa inti yang belum terlapisi oleh enkapsulan sehingga saat proses *spray drying* dilakukan senyawa tersebut terlepas (Hidayah, 2016: 146).

Adapun hasil uji aktivitas antibakteri dari asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS pada bakteri *S.aureus* ditunjukkan pada Gambar 4.4 dan 4.5.




Gambar 4.4: Diameter Zona Hambat Asap Cair TKKS terhadap bakteri *S.aureus*

Gambar 4.4 menunjukkan diameter zona hambat asap cair terhadap bakteri *S.aureus*. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara variasi konsentrasi terhadap diameter zona hambat. Hasil pengukuran diameter zona hambat asap cair terhadap *S.aureus* menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0.5 % sebesar 6,42 mm kemudian mengalami kenaikan pada konsentrasi 1% yaitu sebesar 6,79 mm dan pada konsentrasi 1,5% mengalami peningkatan menjadi 7,29 mm, untuk konsentrasi 2% mengalami penurunan yaitu 6,73 mm dan pada konsentrasi 2,5% kembali mengalami kenaikan yaitu 6,78 mm.

Diameter zona hambat pada Gambar 4.4 menunjukkan regresi yang tidak linear antara konsentrasi dan luas diameter zona hambat, faktor lain yang dapat

mempengaruhi luas zona hambat waktu dari penggunaan cakram, jika penyemaian bakteri yang akan diuji pada cawan petri terlalu lama disimpan pada suhu kamar atau melebihi waktu standarnya, akan menyebabkan kemungkinan terjadinya perkembangbiakan inokulum sebelum cakram digunakan sehingga luas zona hambat berkurang (Saraswati, 2011: 333). Selain itu menurut Norrel dan Messley (1996) penggunaan antibakteri yang melebihi ambang batas (over dosis) maka akan menyebabkan bakteri menjadi kebal (Saraswati, 2011: 337).




Gambar 4.5: Diameter Zona Hambat Asap Cair TKKS terhadap bakteri *S.aureus*

Hasil pengukuran diameter zona hambat mikrokapsul asap cair terhadap *S.aureus* menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0.5% sebesar 5,85 mm kemudian mengalami kenaikan pada konsentrasi 1% yaitu sebesar 6,46 mm dan pada konsentrasi 1,5% mengalami peningkatan menjadi 6,49 mm, untuk konsentrasi 2% mengalami penurunan yaitu 6,16 mm dan pada konsentrasi 2,5% kembali mengalami penurunan yaitu 5,90 mm. Faktor lain yang dapat pula mempengaruhi diameter zona hambat adalah ukuran petri, kedalaman medium agar, pemberian jarak pada cakram antibiotik, ukuran petri yang tidak seragam maka akan mempengaruhi diameter zona

hambat, serta pemberian jarak pada cakram juga dapat mempengaruhi zona hambat (Saraswati, 2011: 333).

Adapun hubungan antara penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap diameter zona hambat bakteri *S.aureus* dapat dilihat pada gambar 4.6.



Gambar 4.6: Hubungan Antara Diameter Zona Hambat Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap Bakteri *S.aureus*.

Gambar 4.6. menunjukkan hubungan antara penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair terhadap daya hambat pada bakteri *S.aureus* dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa adanya perbedaan diameter zona hambat dari asap cair dan mikrokapsul, diameter zona hambat asap cair lebih besar daripada penggunaan mikrokapsul. Hal tersebut dikaitkan saat proses homogenisasi, masih terdapat senyawa inti yang belum terlapisi oleh enkapsulan sehingga saat proses *spray drying* senyawa tersebut terlepas (Hidayah, 2016: 146).

Adanya zona hambat yang dihasilkan baik oleh asap cair maupun mikrokapsul asap cair TKKS ini di sebabkan oleh komponen kimia yang terkandung dalam asap cair yaitu senyawa fenol, karbonil dan asam organik. Ketiga senyawa tersebut dapat berperan sebagai antibakteri sebagaimana penelitian yang dilakukan

oleh Darmadji, dkk., (2012). Selain itu senyawa fenolik mempunyai aktivitas antibakteri karena adanya interaksi absorpsi antara sel bakteri dengan melibatkan ikatan hidrogen, mengganggu aktivitas membran sitoplasma termasuk mengganggu transport aktif serta kekuatan proton (Putri, dkk., 2014: 184). Karbonil menghambat pertumbuhan mikroba dengan menembus dinding sel dan menonaktifkan enzim yang terletak di sitoplasma dan membran sitoplasma. Karbonil bertindak dengan kondensasi bebas, kelompok amino primer dalam rantai polipeptida, terutama di sisi rantai dasar asam amino. Kelompok-kelompok amino dapat menjadi bagian penting dari situs aktif enzim, atau berfungsi untuk mengikat substrat dengan ikatan hidrogen. Bahkan jika karbonil tidak dapat mengakses interior sel mikroba, senyawa tersebut masih dapat menghambat pertumbuhan dengan mengganggu penyerapan nutrisi (Lingbeck, dkk., 2014: 199).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa baik asap cair maupun mikrokapsul asap cair lebih efektif terhadap bakteri *S. aureus* di bandingkan dengan *E. coli* hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2014) yang menggunakan asap cair dari cangkang kelapa sawit, asap cair tersebut lebih efektif terhadap bakteri gram positif. Hal tersebut dikarenakan peptidoglikan bakteri gram positif bersifat polar sehingga lebih mudah ditembus oleh senyawa zat antibakteri dari asap cair yang bersifat polar seperti senyawa fenol (Marsono dkk., 2017: 53).


Berdasarkan hasil yang di peroleh maka aktivitas antibakteri dari asap cair dan mikrokapsul asap cair bersifat sedang, sebagaimana yang dikatakan oleh Davis dan Stout (1971) bahwa apabila zona hambat yang terbentuk pada uji difusi agar berukuran kurang dari 5 mm, maka aktivitas penghambatannya dikategorikan lemah. Apabila zona hambat berukuran 5-10 mm dikategorikan sedang, 10-19 mm

dikategorikan kuat dan lebih dari 20 mm dikategorikan sangat kuat (Annisa, 2014: 46).


2. Aplikasi Asap Cair dan Mikro kapsul Asap Cair sebagai Pengawet Alami Pada Ikan Nila

a. Uji pH

Pengujian pH dilakukan dengan mengkalibrasi terlebih dahulu pada alat pH meter dengan larutan buffer sesuai dengan instruksi kerja alat setiap kali melakukan pengujian. Berikutnya mencoba solusi pH aquadest sampai pH meter perangkat dapat membaca nilai dengan bacaan yang tetap. Sebanyak 3 gram sampel dihomogenkan dengan 6 mL aquadest kemudian memasukkan elektroda yang telah dikalibrasi sebelumnya pada sampel setelah menunggu sampai angka pH meter berhenti dan menunjukkan angka yang tetap. Hasil pengujian nilai pH dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan 4.8.



Gambar 4.7. Hasil Pengukuran pH Daging Ikan Nila yang Ditambahkan Asap Cair.



Gambar 4.8: Hasil Pengukuran pH Daging Ikan Nila yang Ditambahkan Mikrokapsul Asap Cair

Berdasarkan Gambar 4.7 nilai pH ikan nila dengan penambahan asap cair pada hari ke-0 berkisar 6,70-6,85 pada hari tersebut keadaan ikan masih segar. Setelah hari ke-3 pH ikan berada pada kisaran 6,90-7,90, pada hari ke-6 pH berkisar 7,20-7,60 dan pada hari ke-9 berda pada 7,85-8,00. Gambar 4.8 menunjukkan nilai pH ikan nila dengan penambahan mikrokapsul asap cair, pH yang diperoleh yaitu pada hari ke-0 6,70-6,85, hari ke-3 6,15-6,90, hari ke-6 7,40-7,75 dan pada hari ke-9 7,85-8,00.

Kesegaran ikan dapat di lihat dari nilai pH-nya. Ikan segar akan memiliki pH 6,7-7,0. Setelah ikan mati akan terjadi proses glikolisis secara anaerob yang mengakibatkan meningkatnya kandungan asam laktat. Selanjutnya untuk menghasilkan energi pada otot ikan maka akan terjadi reaksi glikolisis yang memecah glikogen menjadi glukosa dan senyawa turunannya, glukosa lebih lanjut akan diurai menjadi ATP dan asam laktat. Akibatnya terjadilah penurunan pH pada ikan (Zakaria, 2008: 62). Setelah fase rigor mortis mulai berakhir maka pH ikan akan naik perlahan hingga menjadi basa. Hal tersebut dikarenakan adanya penguraian senyawa dalam tubuh ikan akibat menurunnya kekuatan peyangga (Riyantono, dkk., 2009: 71).


Selain karena kekuatan penyangga yang menurun penyebab lainnya meningkatnya nilai pH diakibatkan karena adanya degradasi protein ikan menjadi senyawa amonia dan turunannya (Ariestya, dkk., 2016: 21).

Berdasarkan nilai yang diperoleh dapat dilihat bahwa semakin lama penyimpanan ikan maka nilai pH akan semakin meningkat. Dari hasil analisis statistik baik konsentrasi asap cair maupun mikrokapsul memiliki pengaruh yang nyata terhadap nilai pH ikan nila selama proses penyimpanan hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikan yang diperoleh yaitu $>0,05$, untuk asap cair nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,999 dan untuk mikrokapsul 0,997. Penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair dapat mempertahankan nilai pH pada ikan nila dan konsentrasi terbaik yaitu pada 2%. Hal tersebut diakibatkan karena kandungan senyawa asam organik dan fenol yang mempunyai efek antibakteri sehingga dapat menekan aktifitas bakteri pembusuk sehingga proses degradasi protein oleh enzim proteolitik yang mengubah protein menjadi senyawa amonia, trimetilamin dan senyawa yang mudah menguap lainnya menjadi lambat (Zuraida dkk., 2011: 46)


b. Uji TPC

Nilai TPC digunakan sebagai parameter karena salah satu penyebab kemunduran kualitas ikan adalah karena aktivitas bakteri. Pengukuran ini menggunakan metode TPC yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah bakteri yang ditumbuhkan pada suatu media pertumbuhan (media agar) dan diinkubasi selama 24 jam (Fardiaz 1984 dalam Zakaria, 2008: 59). Aktivitas bakteri kadang-kadang dapat dihentikan dengan menggunakan suhu dingin, namun pada suhu 0°C sampai 5°C bakteri *psycotropic* masih bisa tumbuh dan daging ikan juga merupakan media yang tepat untuk perkembangan bakteri. Untuk nilai TPC dari asap

cair dan mikrokapsul asap cair perhatikan Gambar 4.9 dan 4.10.



Gambar 4.9: Hasil Uji TPC Daging Ikan Nila yang Ditambahkan Dengan Asap Cair.



Gambar 4.10: Hasil Uji TPC Daging Ikan Nila yang Ditambahkan Dengan Asap Cair.

Berdasarkan gambar 4.9. nilai TPC ikan nila dengan penambahan asap cair pada hari ke-0 yaitu 18×10^7 - $99,5 \times 10^7$, pada hari ke-3 11×10^7 - $47,5 \times 10^7$ pada hari ke-6 $18,5 \times 10^7$ - 156×10^7 dan hari ke-9 $7,5 \times 10^7$ - 323×10^7 . Nilai pH ikan

dengan penambahan mikrokapsul asap cair dapat dilihat pada gambar 4.10. hasil yang diperoleh adalah pada hari ke-0 yaitu 12×10^7 - $121,5 \times 10^7$, pada hari ke-3 yaitu $8,5 \times 10^7$ - $37,5 \times 10^7$, pada hari ke-6 yaitu $3,5 \times 10^7$ - $41,5 \times 10^7$ dan pada hari ke-9 yaitu $18,5 \times 10^7$ - $77,5 \times 10^7$.

Daging ikan yang baru ditangkap masih steril karena memiliki sistem kekebalan yang mencegah bakteri tumbuh pada daging ikan. Setelah ikan mati, sistem kekebalan tersebut tidak berfungsi lagi dan bakteri dapat berkembang biak dengan bebas. Pada permukaan kulit, bakteri bergerak ke seluruh tubuh dan selama penyimpanan, bakteri menyerang daging dan bergerak diantara serat otot. Jumlah mikroorganisme yang menyerang sangat terbatas dan pertumbuhan bakteri sebagian besar berlangsung di permukaan. Proses deteriorasi terjadi akibat adanya enzim yang dihasilkan bakteri yang merusak bahan gizi pada daging ikan (FAO 1995 dalam Zakaria, 2008: 60).

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa konsentrasi asap cair dan mikrokapsul mempunyai pengaruh yang nyata hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikan yang diperoleh yaitu untuk asap cair nilai signifikan yaitu 0,768 dan untuk mikrokapsul yaitu 0,454. Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair dapat menekan pertumbuhan bakteri hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Riyantono dkk., (2009) yang menyatakan bahwa penggunaan asap cair dapat mengurangi pertumbuhan bakteri pada ikan Mas hal tersebut diakibatkan oleh senyawa fenol yang terdapat dalam asap cair. Fenol merupakan senyawa aromatik yang mudah mengalami reaksi oksidasi sehingga mudah bereaksi membentuk senyawa alkohol yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri.

c. Uji Organoleptik

Pengujian sifat organoleptik merupakan metode uji yang sangat penting bagi setiap produk makanan karena berkaitan dengan penerimaan konsumen. Uji organoleptik (uji skor) dilakukan pada penelitian ini yaitu dari segi warna, aroma, dan tekstur yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerimaan panelis terhadap produk ikan. Metode uji yang digunakan adalah skala angka 1 sebagai nilai terendah dan angka 9 sebagai nilai tertinggi. Batas penolakan untuk produk ikan adalah 7 artinya jika produk yang diuji memperoleh nilai dibawah angka 7 maka produk tersebut tidak memenuhi standar mutu (ditolak). Pengujian organoleptik dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada 15 orang panelis (umum) yang akan menilai produk ikan yang direndam dengan variasi konsentrasi asap cair dan mikrokapsul asap cair.

1. Warna

Warna didefinisikan sebagai atribut mutu yang ditangkap oleh mata konsumen sebelum penilaian atribut mutu yang lain dari produk. Warna dapat memberikan petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan sehingga dapat dijadikan salah indikator penting dalam penerimaan produk makanan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai rata-rata organoleptik (warna) ikan nila yang ditambah dengan asap cair selama penyimpanan yaitu pada hari ke-0 berada pada kisaran 7,13-9,20. Pada hari ke-3 5,53-7,13, untuk hari ke-6 yaitu 2,80-5,66 dan hari ke-9 1,00-3,33. Sedangkan nilai organoleptik dari ikan nila yang ditambah dengan mikrokapsul asap cair yaitu pada hari ke-0 berkisar 7,13-8,86, pada hari ke-3 5,53-7,73, hari ke-6 2,80-5,66 dan hari ke-9 1,00-4,46. Data diolah lebih lanjut dengan analisis statistik yang menunjukkan bahwa baik penggunaan asap cair

dan mikrokapsul mempunyai pengaruh yang nyata hal itu ditandai dengan nilai signifikan yang $>0,05$. Nilai signifikan asap cair yaitu 0,846 dan mikrokapsul yaitu 0,679. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan ikan maka semakin menurun nilai organoleptik yang diperoleh. Hal ini diakibatkan oleh tingginya kandungan air dalam tubuh ikan yang menguapkan senyawa asap cair selama disimpan selain itu diakibatkan oleh aktivitas mikroba yang tubuh diseluruh permukaan daging ikan sehingga warna daging ikan menjadi pucat. Menurut SNI batas penerimaan nilai organoleptik warna ikan asap adalah 7.

2. Bau

Bau atau aroma merupakan hasil respon dari hidung yang diakibatkan oleh menguapnya zat-zat larut yang terkandung pada suatu produk makanan ke udara sehingga dikenali sebagai aroma tertentu. Pengujian rasa dan aroma sangat penting dalam industri makanan, karena dapat memberikan hasil penilaian langsung tentang produk makanan yang lebih diminati oleh konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai rata-rata organoleptik (bau) ikan nila yang ditambah dengan asap cair selama penyimpanan yaitu pada hari ke-0 berada pada kisaran 7,40-9,00. Pada hari ke-3 5,53-7,26, untuk hari ke-6 yaitu 3,19-5,79 dan hari ke-9 1,00-3,63. Sedangkan nilai organoleptik dengan penambahan mikrokapsul asap cair pada hari ke-0 yaitu 7,40-9,00, pada hari ke-3 5,53-7,73, pada hari ke-6 3,19-6,10 dan pada hari ke-9 1,00-3,93. Data diolah lebih lanjut dengan analisis statistik yang menunjukkan bahwa penggunaan asap cair dan mikrokapsul berpengaruh nyata terhadap parameter bau untuk uji organoleptik, nilai signifikan yang diperoleh yaitu $>0,05$ untuk asap cair yaitu 0,873 dan mikrokapsul 0,852. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan ikan maka


semakin menurun nilai organoleptik yang diperoleh. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas mikroba yang tumbuh diseluruh permukaan daging ikan sehingga ikan berbau tengik. Selain itu menurut (Wiasuti 2007 dalam Anggela dkk., 2015:37) kehadiran mikroba pada ikan akan mengakibatkan perubahan bau, bau tersebut timbul karena adanya degradasi protein yang mengakibatkan munculnya senyawa ammonia (NH_3) dan gas H_2S . Menurut SNI batas penerimaan nilai organoleptik bau ikan asap adalah 7.

3. Tekstur

Pengujian tekstur dilakukan dengan menggunakan mulut dan bisa juga dengan tangan. Uji ini bertujuan untuk merasakan tekstur suatu produk makanan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai rata-rata organoleptik (tekstur) ikan nila yang ditambah dengan asap cair selama penyimpanan yaitu pada hari ke-0 berada pada kisaran 8,86. Pada hari ke-3 5,13-7,40, untuk hari ke-6 yaitu 2,13-4,59 dan hari ke-9 1,00-3,53. Sedangkan nilai organoleptik dari ikan nila dengan penambahan mikrokapsul asap cair yaitu pada hari ke-0 yaitu 8,80, pada hari ke-3 5,13-7,39, pada hari ke-6 2,13-4,93 dan pada hari ke-9 1,00-5,00. Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa asap cair dan mikrokapsul berpengaruh nyata terhadap parameter tekstur dari ikan Nila selama penyimpanan hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikan yang diperoleh yaitu >0.05 untuk asap cair yaitu 0,970 dan mikrokapsul 0,846. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin lama penyimpan ikan maka semakin menurun nilai organoleptik yang diperoleh. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas mikroba yang tumbuh diseluruh permukaan daging ikan. Aktivitas bakteri dan enzim menurut Bustan dkk., (1982) dan Tribono (1985) dalam Anggela dkk., (2015: 38) mengakibatkan degradasi jaringan pengikat sehingga menyebabkan

menurunnya nilai tekstur akibatnya ikan menjadi lunak. Menurut SNI batas penerimaan nilai organoleptik tekstur ikan asap adalah 7.

Berdasarkan hasil uji organoleptik baik dari segi warna, bau maupun tekstur ikan yang tidak ditambahkan dengan asap cair (kontrol) hanya bertahan hingga hari ketiga sedangkan untuk ikan yang diberi asap cair dengan konsentrasi 2% dan 2,5% bertahan hingga hari ke-6.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Asap cair dan mikrokapsul asap cair dapat menghambat aktivitas bakteri *E.coli* dan *S. aureus* serta konsentrasi berpengaruh nyata terhadap diameter zona hambat yang terbentuk. Konsentrasi terbaik yaitu 1,5% dengan luas zona hambat 7,28 mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asap cair dan mikrokapsul mempunyai aktivitas antibakteri dalam kategori penghambatan yang sedang yaitu 5-9 mm.
2. Asap cair dan mikrokapsul asap cair mampu mempertahankan kesegaran ikan selama 3-6 hari. Konsentrasi terbaik adalah 2%. Penggunaan mikrokapsul asap cair tidak berpengaruh nyata dalam mempertahankan tingkat kesegaran ikan nila selama penyimpanan dingin.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian adalah sebaiknya ikan yang telah diberi asap cair diuji lebih lanjut untuk mengetahui kadar protein, lemak, air dan abu. Untuk mengetahui apakah ada perubahan setelah penambahan asap cair.

DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Qarim

Ali, Dego Yusa dkk., “Optimasi Nanoenkapsulasi Asap Cair Tempurung Kelapa dengan *Response Surface Methodology* Dan Karakterisasi Nanokapsul”. *Teknologi dan Industri Pangan* 25, no. 1 (2014): h. 23-29.

Al-Qur'an, Departemen Agama RI, 2014.

Annisa, Kurnia. “Analisa Komponen Kimia dan Uji Antibakteri Asap Cair Tempurung Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) pada Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Angela, Gabriella Christy dkk., “Kajian Mutu Ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis* L.) Asap dari Tempat Pengasapan Desa Girian Atas Yang Dikemas Vakum dan Nonvakum Selama Penyimpanan Dingin”. *Media Teknologi Hasil Perikanan* 3, no. 2 (2015): h. 29-40.

Ariestya, Dennis Indah dkk., “Antimicrobial Activity of Microencapsulation Liquid Smoke on Tilapia [*Oreochromis niloticus* (Linnaeus, 1758)] Meat for Preservatives in Cold Storage ($\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$)”. *Aquatic Procedia* 7 (016): h. 19–27.

Asmawit, dkk., “Pemanfaatan Asap Cair dari Tandan Kosong Kelapa Sawit pada Pengolahan Karet Mentah”. *Biopral Industri* 02, no. 01 (2011): h. 7-12.

Aulawi, Rifqi Mizan. Pengaruh Penambahan Mikro kapsul Daun Sirih (*Piper betle* L.) terhadap Kualitas Daging Sapi”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Barus, Pina. “Pemanfaatan Bahan Pengawet Dan Antioksidan Alami Pada Industri Bahan Makanan”. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Kimia*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.

Basri, AB. “Manfaat Asap Cair untuk Tanaman”. *Serambi Pertanian* IV, no. 5 (2010): h. 1-2.

Darmadji, Purnama dkk., “Inovasi Prototipe Produk Nanoenkapsulasi Biopreservatif Asap Cair Sebagai Pengawet Pangan Alami”. *Prosiding InSINas*, (2012): h. 62-68.

Ermawati, Tuti dan Yeni Saptia. “Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia”. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*7, no .2 (2013): h. 129-146.


Ginayati, Lisa dkk., “Pemanfaatan Asap Cair Dari Pirolisis Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Pengawet Alami Tahu” . *Teknik Kimia USU*, 4, no. 3 (2015): h.7-12.

- Haji, Abdul Gani. "Komponen Kimia Asap Cair Hasil Pirolisis Limbah Padat Kelapa Sawit". *Rekayasa Kimia dan Lingkungan* 9, no. 3 (2013): h.109-116.
- Hidayah, Nur. "Perbandingan Berbagai Teknik Mikroenkapsulasi Pakan Dalam Menghasilkan Daging Sapi Sehat". *Senaspro*. (2016): h. 143-150.
- Husni, Amir dkk., "Penggunaan Ekstrak Rumput Laut *Padina* Sp. Untuk Peningkatan Daya Simpan Filet Nila Merah Yang Disimpan Pada Suhu Dingin". *Agritech*, 34, no. 3 (2014): 239-245.
- Iqbal, Muhammad Nasyarudin dan Hadiyanto. "Pembuatan Mikro kapsul *Phycocyanin* Menggunakan Maltodekstrin sebagai Bahan Pelapis dengan Metode *Spray Drying*". Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia. (2016): h. 1-6.
- Jaya, Indra dan Dewi Kartika Ramadhan. "Aplikasi Metode Akustik Untuk Uji Kesegaran Ikan". *Buletin Teknologi Hasil Perikanan* IX, no. 2, (2006): 1-12
- Kamal, Netty. "Karakterisasi dan Potensi Pemanfaatan Limbah Sawit". *Itenas Library* (2015): h. 61-67.
- Khair, Hadriman dkk., "Uji Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Dura dan Varietas Unggul DXP Simalungun (*Elaeis guinensis* Jacq.) Terhadap Pupuk Organik Cair di Main Nursery". *Agrium* 18, no.3 (2014): h. 250-258.
- Khaldun, Ibnu dan Abdul Gani Haji. "Potensi Asap Cair Hasil Pirolisis Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Biopestisida Antifeedant". *Prosiding: Seminar Nasional Sains & Teknologi III* (2010): h. 547-556.
- Koswora, Sutrisno. *Pengawet Alami Untuk Produk dan Bahan Pangan*. E-book Pangan.com, 2009.
- Lingbeck, Jodi M. dkk., "Functionality of Liquid Smoke As An All-Natural Antimicrobial In Food Preservation". *Meat Science* 97, (2014): h.197-206.
- Marsono, Oki Selfiana dkk., "Pengaruh Lama Penyimpanan Dekok daun Sirih Hijau (*Piper betle* L.) Terhadap Aktivitas dan Daya Hambat bakteri *Streptococcus agalatae* Penyebab Matitis Pada sapi Perah". *Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak* 12, no. 1, (2017): h.47-60.
- Ningrum, Noor Indah Pramudyaning Hastuti Harding. "Keragaman Pertumbuhan Ikan Nila Best (*Oreochromis niloticus*) Hasil Seleksi F3, F4 dan Nila Lokal. *Skrripsi*, Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2012.
- Oramahi, H.A. dkk., "Aktivitas Antijamur Asap Cair dari Sebuk Gergaji Kayu Akasia (*Acacia mangium* WILLD) dan Kayu Laban (*Vitex pubescens* VAHL)". *Ilmu-ilmu Hayati dan Fisik* 13, no. 1 (2011): h.79 -84.

- Oramahi, H.A. "Penggunaan Asap Cair dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dalam Penekanan Perkembangan Jamur *Schizopyllum Commune*".
- Pertiwi, Titisari Dian dkk., "Pemanfaatan Limbah Kulit Kacang Tanah (*Arachis Hypogea*) Sebagai Bahan Asap Cair (*Liquid Smoke*) Antioksidan dan Aplikasinya dalam Pengasapan Ikan Bandeng (*Chanos chanos* F.)". *PKMP 2*, no. 6 (2010): h. 1-11.
- Prayoga, Eko. "Perbandingan Efek Ekstrak Daun Sirih Hijau (*Piper bitlle* L.) dengan Metode Difusi Disk dan Sumuran Terhadap pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Putri, Dwi Desmiyeni. "Kandungan Total Fenol dan Aktivitas Antibakteri Kelopak Buah Rosela Merah dan Ungu Sebagai Kandidat Feed Additive Alami Pada Broiler". *Pertanian Terapan 14*, no. 3 (2014): h. 174-180.
- Qutbh, Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur'an*. Terj: As'ad Yasin dkk., Tafsir-Al-Qur'an. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Ramlah dkk., "Perbandingan kandungan Gizi Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) Asal Danau Mawang Kabupaten Gowa dan Danau Universitas Hasanuddin Kota Makassar". *Jurnal Biologi Makassar (BIOMA) 1*, no.1 (2016): h. 39-45.
- Rasyid, Harun Al. "Pemanfaatan Asap Cair Tempurung Kelapa sebagai Bahan Pengawet Ikan Teri Nasi (*Stolephorus commersonii*, Lac.) Segar untuk Tujuan Transportasi". *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Riskayanto. "Model Penentuan Harga Komoditas Minyak Sawit (CPO) Di Pasar Indonesia" *UG Jurnal 7*, no. 07 (2013): h. 21-25.
- Riyantono ,dkk., "Tingkat Ketahanan Kesegaran Ikan Mas (*Cyprinus carpio*) Menggunakan Asap Cair". *Kelautan 2*, no.1 (2009): h. 66-72.
- Rosa, Rahayu Novrina. "Pengelolaan Pembibitan Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) Di Kebun Bangun Bandar PT. Socfindo Medan, Sumatera Utara". *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012
- Saloko, Satrijo. "Antioxidative And antimicrobial Activities Of Liquid Smoke Nanocapsules Using Chitosan And Maltodextrin And Its Application On Tuna Fish Preservation". *Food Bioscience 7*, (2014): h.71-79.
- Sari, Tuti Indah dkk., "Proses Pembuatan Asap Cair (*Liquid Smoke*) dari Limbah Industri". *Teknik Kimia 16*, no. 2 (2009): h. 44-47.
- Saraswari, Dian. "Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Sirih Terhadap Daya Hambat *Escherchia coli*". *Health & Sport3*, no. 2 (2011): h. 331-338.


- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Susanti, Margaretha Tuti. "Mikroenkapsulasi Oleoresin Daun Sirih (*Piper betle* L) Untuk Produksi Bandeng (*Chanos-chanos* forsk) Tinggi Lisin Pada Proses Pengasapan Cair. *Litbang* 6, no. 1 (2008): h. 38-50.
- Susanto dan Fahmi. "Senyawa Fungsional dari Ikan: Aplikasinya dalam pangan". *Aplikasi Pangan 1*, no. 4. (2012): h. 94-102.
- Wikanta, dkk., "Kemampuan Asap Cair Pada Pengawetan Ikan Bandeng (*Chanos-Chanos Forsk*) Disertai Perendaman Prapengasapan dalam Larutan Mikrokapsul Oleoresin Daun Sirih (*Piper betle* L)". *Proceeding Seminar Nasional Kimia III*, (2012): h. 1-12.
- Yulia, dan Bambang Prayitno. "Efektifitas Konsentrasi Asap Cair (*Liquid Smoke*) dari Tempurung Kelapa Terhadap Angka Kuman pada Tahu". *Vokasi Kesehatan II*, no. 2 (2016): h. 385-389.
- Yunus, M. "Teknologi Pembuatan Asap Cair dari Tempurung Kelapa Sebagai Pengawet Makanan". *Sains dan Inovasi* 7, no. 1 (2011): h. 53– 61.
- Zakaria, Rijan. *Kemunduran Mutu Ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*) Pasca Panen Pada Penyimpanan Suhu Chilling*. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Zuraida, dkk., "Antibacterial Activity Of Coconut Shell Liquid Smoke (CS-LS) And Its Application On Fish Ball Preservation". *International Food Research Journal* 18, (2011): h. 405-410.

LAMPIRAN I
SKEMA PENELITIAN



LAMPIRAN III

DOKUMENTASI PENELITIAN



LAMPIRAN II
ANALISIS DATA

1. Pembuatan Larutan

a. Padatan

$$\% = \frac{\text{Bobot (gram)}}{\text{volume (mL)}}$$

$$\frac{1 \text{ gram}}{100 \text{ mL}} = \frac{x}{10 \text{ mL}}$$

$$x = 0,1 \text{ gram}$$

b. Larutan

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1100\% = 50 \text{ mL} \cdot 50\%$$

$$V_1 = 2,5 \text{ mL}$$

2. Perhitungan Jumlah Koloni

$$\text{Jumlah Koloni (CFU)} = \frac{1}{\text{faktor pengenceran}} \times \text{jumlah koloni}$$

$$= \frac{1}{10^{-7}} \times 50$$

$$= 50 \times 10^{-7}$$

3. Penentuan Standar Deviasi

No.	X_i	X_i^2
1.	6,06	36,7236
2.	5,20	27,04
3.	6.50	42,25
Σ	17,76	106,0136

$$\begin{aligned}
 (\sum_{i=1}^n Xi)^2 &= (17,76)^2 \\
 &= 315,4176 \\
 S^2 &= \frac{(3)(106,0136) - (315,4176)}{(3)(2)} \\
 &= \frac{2,6232}{6} \\
 &= 0,4372 \\
 &= 0,66121
 \end{aligned}$$

Penentuan Standar Deviasi

E coli Asap Cair

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	3	10.30	13.32	11.7400	1.51486
VAR00002	3	5.10	9.40	6.5333	2.48261
VAR00003	3	5.20	6.50	5.9200	.66121
VAR00004	3	5.50	8.20	6.7400	1.36338
VAR00005	3	5.10	7.70	6.4467	1.30251
VAR00006	3	6.20	7.06	6.5533	.45004
VAR00007	3	6.10	6.50	6.3667	.23094
Valid N (listwise)	3				

Uji Statistik Anova Satu Jalan

Asap cair *E. coli*

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.576	4	.144	1.248	.398
Within Groups	.577	5	.115		
Total	1.153	9			

Asap cair *s. aureus*

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.649	4	.162	.753	.597
Within Groups	1.079	5	.216		
Total	1.728	9			

pH Asap Cair

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.036	5	.007	.029	.999
Within Groups	4.384	18	.244		
Total	4.420	23			

pH Mikrokapsul

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.138	5	.028	.066	.997
Within Groups	7.554	18	.420		
Total	7.692	23			

TPC asap cair

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	12320.552	5	2464.110	.481	.786
Within Groups	92237.688	18	5124.316		
Total	104558.240	23			

TPC mikrokapsul

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3719.344	5	743.869	.985	.454
Within Groups	13598.563	18	755.476		
Total	17317.906	23			

Warna Asap cair

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	13.235	5	2.647	.395	.846
Within Groups	120.746	18	6.708		
Total	133.981	23			

Aroma asap cair

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	13.349	5	2.670	.353	.873
Within Groups	135.959	18	7.553		
Total	149.308	23			

Tekstur asap cair

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	8.225	5	1.645	.172	.970
Within Groups	172.074	18	9.560		
Total	180.298	23			

Warna mikro kapsul

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	18.544	5	3.709	.605	.697
Within Groups	110.262	18	6.126		
Total	128.806	23			

Aroma mikrokapsul

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	16.105	5	3.221	.385	.852
Within Groups	150.463	18	8.359		
Total	166.568	23			

Tekstur mikrokapsul

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	15.919	5	3.184	.394	.846
Within Groups	145.396	18	8.078		
Total	161.315	23			

E. Skoring Uji organoleptik

1. Asap Cair Hari ke-0

a. warna

Panelis	Tanpa Perlakuan	0.50%	1%	1.50%	2%	2.50%
1	7	7	7	7	7	7
2	7	7	7	7	7	7
3	5	4	5	7	7	5
4	7	7	7	7	7	7
5	7	7	9	9	9	9
6	7	7	9	9	9	9
7	7	7	9	9	9	9
8	7	7	9	9	9	9
9	7	7	9	9	9	9
10	7	7	9	9	9	9
11	7	7	9	9	9	9
12	7	7	7	7	7	9
13	7	7	7	7	7	9
14	7	7	9	9	9	9
15	7	7	9	9	9	9
Rata-rata	6.86	6.8	8.06	8.2	8.2	8.33

b. Aroma

Panelis	Tanpa Perlakuan	0.50%	1%	1.50%	2%	2.50%
1	7	9	9	9	9	9
2	9	9	9	9	9	9
3	7	7	8	9	9	8
4	9	9	9	9	9	9
5	7	7	9	9	9	9
6	7	7	9	9	9	9
7	7	7	9	9	9	9
8	7	7	9	9	9	9
9	7	7	9	9	9	9
10	7	7	9	9	9	9
11	7	7	9	9	9	9
12	7	7	9	9	9	9
13	7	7	9	9	9	9
14	7	9	9	9	9	9
15	7	7	9	9	9	9
Rata-rata	7.26	7.53	8.93	9	9	8.93


c. Tekstur

Panelis	Tanpa Perlakuan	0.50%	1%	1.50%	2%	2.50%
1	9	9	9	9	9	9
2	7	7	7	7	7	7
3	3	7	6	8	7	8
4	9	9	9	9	9	9
5	9	9	9	9	9	9
6	9	9	9	9	9	9
7	9	9	9	9	9	9
8	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9
10	9	9	9	9	9	9
11	9	9	9	9	9	9
12	9	9	9	9	9	9
13	9	9	9	9	9	9
14	9	9	9	9	9	9
15	9	9	9	9	9	9
Rata-rata	8.46	8.73	8.66	8.8	8.73	8.8



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN
PROFIL SENYAWA ASAP CAIR



No. puncak	Nama Senyawa	Konsentrasi (%)
1	8,9,9,10,10,11-HEXAFLUORO-4,4-DIMETHYL-3,5-DIOXATETRACYCLO[5.4.1	1.12
2	1-PROPANOL, 2-ETHOXY	1.45
3	PYRIDINE	3.44
4	2-Furanol, tetrahydro-	2.46
5	Pyridine, 2-methyl-	4.42
6	2-FURANMETHANOL	0.22
7	3-HEXYN-1-OL	2.4
8	Pyridine, 3-methyl	1.91
9	Pyridine, 2,6-dimethyl-	1.06
10	Oxime-, methoxy-phenyl-	1.82
11	Pyridine, 2-ethyl-	0.61
12	Butanoic acid, 4-hydroxy-	1.31
13	Pyridine, 3,5-dimethyl-	1.8
14	Pyridine, 2,3-dimethyl-	0.95
15	PHENOL	68.15
16	PYRIDINE, 2-ETHYL-6-METHYL-	0.34
17	PYRIDINE, 2-ETHYL-6-METHYL-	0.41
18	PHENOL, 2-METHYL-	2.41
19	Cyclotrisiloxane, hexamethyl-	0.38
20	PHENOL, 4-METHYL-	0.9
21	Phenol, 2-methoxy-	1.9
22	1-Methoxy-2-methyl-4-(methylthio)benzene	0.23
23	TETRADECANOIC ACID, METHYL ESTER	0.49
24	HEXADECANOIC ACID, METHYL ESTER	0.89
25	9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester	0.38



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BIOGRAFI



Fitriani atau biasa dipanggil Fitri lahir di Takalar, pada 12 Februari 1994. Lahir sebagai anak bungsu dari 2 bersaudara, dari pasangan Mustari Tiro dan Bayang Tina.

Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah dasar pada Tahun 2002-2008 di SD Inp. Cikoang. Tahun 2008-2011 lanjut pada jenjang lebih tinggi yaitu di SMPN 3 Mangarabombang. Tahun 2011-2014 lanjut di SMAN 1 Mangarabombang. Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R