

**UJI AKTIVITAS ANTIJAMUR ASAP CAIR DAN MIKROKAPSUL
ASAP CAIR TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (*Elaeis
guineensis* Jacq.) DAN APLIKASINYA PADA JAGUNG
PULUT (*Zea mays ceratina*)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kimia Sains
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURUL MAGFIRAH

NIM: 60500114006

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Magfirah
NIM : 60500114006
Tempat/Tgl Lahir : Mala'lang/ 16 Mei 1996
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Samata
Judul : Uji Aktivitas Antijamur Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair Tandan Kosong Kelapa Sawit (*E. gueneensis* Jacq.) dan Aplikasinya pada Jagung Pulut (*Zea mays ceratina*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain. Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Agustus 2018

Penyusun

Nurul Magfirah
Nim: 60500114006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Uji Aktivitas Antijamur Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair Tandan Kosong Kelapa Sawit (*E. gueneensis* Jacq.) dan Aplikasinya pada Jagung Pulut (*Zea mays ceratlna*)" yang disusun oleh **NURUL MAGFIRAH**, NIM: 60500114006, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 09 Agustus 2018 bertepatan pada 27 Dzulkhaidah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 09 Agustus 2018
27 Dzulkhaidah 1439

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Wasilah, S.T., M.T.

Sekretaris : Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si.

Munaqisy I : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.

Munaqisy II : Dr. Tasmln Tangngareng, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.

Pembimbing II : Sappewall, S.Pd., M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum wr. Wb

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji bagi Allah swt atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antijamur Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair Tandan Kelapa Sawit (*E. gueneensis* Jacq.) dan Aplikasinya pada Jagung Pulut (*Zea mays ceratina*)” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu, meskipun penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan karena penulis hanyalah manusia biasa yang terbatas akan kesempurnaan. Skripsi ini dibuat sebagai syarat tertulis untuk untuk memperoleh gelar sarjana Sains Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat atas junjungan nabi besar Muhammad saw, nabi yang membawa ummat Islam dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan seperti sekarang ini, beserta para orang-orang yang tetap istiqamah dijalannya. Penulis menyadari sepenuhnya dari awal penulisan skripsi ini sampai skripsi ini selesai banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi, namun atas izin Allah dan dengan kerja keras serta dukungan dari kedua orang tua ayahanda Madi dan ibunda Hamdana. Terimakasih penulis juga ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor, bapak Prof. Dr. Mardan M.Ag selaku wakil Rektor I, bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. selaku wakil Rektor II dan ibu Prof. Sitti Aisyah, M.A., Ph.D. selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan, ibu Dr. Wasilah, ST, MT. selaku wakil dekan I, bapak Dr. M. Tahir Maloko, M.H. selaku wakil dekan II

dan bapak Dr. A.M. Suarda, S.Pt, M.Si. selaku wakil dekan III Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D, selaku ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekaligus sebagai penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Rismawati Sikanna, S.Si., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Sappewali, S.Pd., M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan dari awal penelitian sampai akhir penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag, selaku penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Musyawirah Baharuddin, S.Pdi, selaku Staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu dalam persuratan demi terlaksanannya rangkaian dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para Laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terkhusus untuk Fitriia Azis, S.Si., S.Pd, yang telah memberikan begitu banyak bantuan serta dukungan dan senantiasa mendampingi dan memberikan saran demi terselesaikannya penelitian ini.
9. Sahabat sekaligus rekan penelitian saya, Riskawati dan Fitriani, yang selalu menemani, saling mendukung dan mendoakan dalam segala situasi yang dihadapi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata mudah-mudahan skripsi ni dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pada diri saya pribadi dan bernilai ibadah disisi Allah swt, Aamiin ya Robbal Alaamiin.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Makassar, Agustus 2018

Penulis,

Nurul Magfirah

DAFTAR ISI

	halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-5
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6-21
A. Kelapa Sawit.....	6
B. Asap Cair.....	9
C. Jagung.....	11
D. Jamur.....	13
E. <i>Aspergillus flavus</i>	15
F. <i>Aspergillus niger</i>	16
G. Antijamur.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	21-24
A. Waktu dan Tempat.....	21

B. Alat dan Bahan	21
C. Prosedur Penelitian	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25-49
A. Hasil Pengamatan	25
1. Uji Daya Hambat	25
2. Aplikasi pada Jagung	26
B. Pembahasan	29
1. Uji Daya Hambat	30
2. Aplikasi pada Jagung	40
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR LAMPIRAN	52- 63
BIOGRAFI	xiv

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Struktur Morfologi Tandang Kosong Kelapa Sawit	9
Tabel 2.2 Komponen Kimia Tandan Kosong Kelapa Sawit	9
Tabel 4.1 Hasil Uji Daya Hambat Asap Cair dan Mikroenkapsulan TKKS pada <i>Aspergillus flavus</i>	27
Tabel 4.2 Hasil Uji Daya Hambat Asap Cair dan Mikroenkapsulan TKKS pada <i>Aspergillus niger</i>	27
Tabel 4.3 Hasil Uji Asap Cair TKKS pada Pengukuran pH.....	28
Tabel 4.4 Hasil Uji Mikroenkapsulan TKKS pada Pengukuran pH.....	28
Tabel 4.5 Hasil Uji Asap Cair TKKS pada Pengukuran TPC.....	29
Tabel 4.6 Hasil Uji Mikroenkapsulan TKKS pada Pengukuran TPC.....	29
Tabel 4.7 Hasil Uji Asap Cair TKKS pada Pengujian Organoleptik.....	30
Tabel 4.8 Hasil Uji Mikroenkapsulan TKKS pada Pengujian Organoleptik....	31

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Tandan Kosong Kelapa Sawit	9
Gambar 2.2 Jagung Pulut	13
Gambar 2.3 <i>Aspergillus niger</i>	18
Gambar 4.1 Diameter Daya Hambat Asap Cair TKKS terhadap <i>Aspergillus flavus</i>	34
Gambar 4.2 Diameter Daya Hambat Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap <i>Aspergillus flavus</i>	35
Gambar 4.3 Hubungan Antara Diameter Daya Hambat Asap Cair dan mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap <i>Aspergillus flavus</i>	36
Gambar 4.4 Diameter Daya Hambat Asap Cair TKKS terhadap <i>Aspergillus niger</i>	37
Gambar 4.5 Diameter Daya Hambat Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap <i>Aspergillus niger</i>	39
Gambar 4.6 Hubungan Antara Diameter Daya Hambat Asap Cair dan mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap <i>Aspergillus niger</i>	40
Gambar 4.7 Nilai Pengukuran pH pada Penggunaan Asap Cair TKKS	41
Gambar 4.8 Nilai Pengukuran pH pada Penggunaan Mikrokapsul Asap Cair TKKS	42
Gambar 4.9 Nilai Pengukuran TPC pada Penggunaan Asap Cair TKKS.....	43
Gambar 4.10 Nilai Pengukuran TPC pada Penggunaan Mikrokapsul Asap Cair TKKS	44

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Skema Penelitian	52
Lampiran 2 Analisis SPSS	53-56
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	57-59

ABSTRAK

Nama : Nurul Magfirah
Nim : 6050011406
Judul : Uji Aktivitas Antijamur Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair Tandan Kosong Kelapa Sawit (*E. gueneensis* Jacq.) dan Aplikasinya pada Jagung Pulut (*Zea mays ceratina*)

Asap cair tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan hasil dari proses pirolisis yang memiliki komponen senyawa fenol dan asam organik yang berpotensi sebagai antijamur. Jamur sering menyerang biji jagung pulut yang dapat merusak kualitas produksi jagung, diantaranya yaitu *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antijamur asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS dan aplikasinya pada pengawetan jagung pulut (*Zea mays ceratina*). Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode uji aktivitas daya hambat dan pengaplikasian langsung pada jagung dengan parameter penilaian yaitu pH, *total plate count* (TPC) dan uji organoleptik dengan variasi yang digunakan yaitu 1, 2 dan 3%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa konsentrasi asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS pada uji daya hambat berbanding lurus dengan aktivitas antijamurnya, yaitu semakin tinggi konsentrasi asap cair semakin tinggi pula aktivitas antijamurnya. Dengan nilai daya hambat paling besar yaitu pada konsentrasi 3% pada kedua jenis jamur. Sedangkan pada pengaplikasiannya, konsentrasi berpengaruh nyata pada parameter penilaian pH, TPC dan organoleptik. Pada penyimpanan semakin hari mutu dari jagung semakin berkurang dilihat dari ketiga parameter tersebut.

Kata Kunci: Antijamur, asap cair TKKS, *Aspergillus flavus*, *Aspergillus niger* dan mikrokapsul.

ABSTRACT

Name : Nurul Magfirah
Nim : 6050011406
Title : *Activity Antifungal of Liquid Smoke and Microcapsule Liquid Smoke Empty Palm Fruit Bunches (E. gueneensis Jacq.) and its Application on Corn Pulut (Zea mays ceratina).*

Liquid smoke empty palm fruit bunches (TKKS) is the result of a pyrolysis process that has components of phenol compounds and organic acids that have the potential as an antifungal. Fungal often attack corn kernels of pulut which can damage the quality of corn production, such as Aspergillus flavus and Aspergillus niger. This study aims to determine the activity of liquid smoke antifungal and liquid smoke microcapsule TKKS and its application on the preservation of corn pulut (Zea mays ceratina). The method used is the method of inhibitory power activity test and direct application in corn with the assessment parameters of pH, total plate count (TPC) and organoleptic test with variations used are 1% 2% and 3%. The results showed that the concentration of liquid smoke and TKKS liquid smoke microcapsules in the inhibitory power test is directly proportional to its antifungal activity, the higher the smoke smoke concentration the higher the antifungal activity. With the greatest resistance value is at concentrations of 3% in both types of fungi. While on the application, concentration significantly affect the parameters of pH, TPC and organoleptic assessment. In the storage of the quality of the day the quality of corn is more deficient seen from these three parameters.

Key Word: *Antifungal, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, liquid smoke (TKKS), microcapsulas.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia salah satunya yaitu kelapa sawit, yang mana jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia menempati urutan ke dua setelah Malaysia. Banyaknya industri kelapa sawit menyebabkan semakin meningkat pula limbah yang dihasilkan. Limbah kelapa sawit tersebut dapat berupa limbah padat seperti batang, cangkang, pelepah dan tandan kosong yang pemanfaatannya belum banyak dikembangkan dengan baik sehingga dapat mengganggu lingkungan.

Limbah kelapa sawit yang jumlahnya paling banyak dihasilkan yaitu tandan kosong kepala sawit berkisar 126.317,54 ton/tahun (Mandiri, 2012 dalam Haryanti, dkk, 2014: 21). Tandan Kosong Kepala Sawit (TKKS) bersifat organik yang pemanfaatannya berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan bakar nabati (BBN), bioetanol dan bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga biomasa (PLT Biomassa) (Permata, 2005: 1). Sedangkan menurut (Asmawit, dkk, 2011: 7), mengemukakan bahwa di beberapa daerah hasil dari beberapa survei tandan kosong kelapa sawit belum dimanfaatkan secara maksimal, sebagian hanya dijadikan kompos yang ditimbun di lahan dan sebagian lainnya diolah menjadi asap cair. Pengolahan tandan kosong kelapa sawit menjadi asap cair dapat meningkatkan nilai ekonomis dari tandan kosong tersebut.

Asap cair merupakan hasil kondensat uap yang diperoleh dari proses pirolisis dengan menggunakan suhu yang tinggi. Dimana komponen senyawa yang terkandung akan berbeda-beda tergantung pada bahan dasar dan suhu yang

digunakan pada proses pirolisis (Asmawit, dkk, 2011: 7). Asap cair banyak digunakan pada berbagai bidang, seperti pada bidang pengawetan ikan Tilapia (*Oreochromis niloticus*) dengan menggunakan proses mikroenpsulasi (Ariestya, dkk., 2016: 1) dan pengawetan makanan seperti tahu (Ginayati, dkk, 2015), serta sebagai antijamur pada jagung (Oramahi, 2011: 1). Kandungan fenol dan asam-asam organik yang terdapat dalam asap cair mampu dijadikan sebagai bahan pengawet makanan. Sebagai sumber kebutuhan dasar pada manusia makanan yang dikonsumsi sebaiknya haruslah bersifat halal dan toyyib, sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah SWT QS An-Nahl/16: 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah (beriman)”

Ketika Allah memaparkan perumpamaan ini, dapat dibayangkan nikmat dan rezeki sebagaimana pula darapt dirasakan larangan dan cegahan. Allah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang baik-baik untuk mereka dan mensyukuri segala nikmat-Nya. Hal itu jika mereka mau tetap istiqomah (komitmen) dengan keimanan yang benar kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah, ikhlas beribadah kepada-Nya dan jauh dari kesyirikan yang telah diperintahkan kepada mereka dengan diharamkannya sebagian *thayyibat* dengan mengatasnamakan tuhan-tuhan yang mereka klaim itu (Qutbh, Sayyid, 2001: 220).

Ayat di atas menjelaskan tentang makanan yang Allah swt ciptakan ada yang dapat dikonsumsi dan ada yang tidak dapat dikonsumsi, hal ini karena adanya pembagian antara yang halal dan haram. Larangan yang dijelaskan oleh Allah ini

bukan karena tanpa alasan, karena makanan yang halal akan mendatangkan manfaat dalam tubuh, sedangkan makanan yang haram tidak akan memberikan manfaat dalam tubuh apabila dikonsumsi.

Jagung merupakan salah jenis tanaman sereal yang memiliki banyak manfaat, di antaranya pada beberapa daerah jagung dijadikan sebagai makanan pokok dan juga sebagai pakan ternak. Berbagai mineral esensial yang terdapat pada tanaman jagung yaitu seperti Ca, Mg, K, Na, P, Ca dan Fe (Suarni, 2011: 50). Namun, pada proses pemanenan jagung disini menghasilkan masalah yang ditandai dengan tingginya kadar kontaminasi aflatoxin. Aflatoxin merupakan salah satu jenis senyawa karsinogenik yang mampu menyebabkan terjadinya kanker hati pada manusia dan hewan ternak apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan (Miskiyah dan Widyaningrum, 2008: 1). Jagung yang telah terkontaminasi senyawa tersebut sebaiknya tidak dikonsumsi lagi, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Abasa/80: 24-27.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ

Terjemahnya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu”

Ayat di atas menjelaskan bahwa makanan adalah sesuatu yang paling lekat dan selalu ada pada manusia, sehingga manusia hendaklah memperhatikan makanannya dan Allah menurunkan air hujan lalu Allah menumbuhkan biji-bijian yang meliputi semua biji-bijian yang dimakan oleh manusia dalam semua wujudnya dan dimakan oleh binatang dalam semua keadaannya (Qutbh, Sayyid, 2001: 181-182).

Kontaminasi aflatoksin akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada biji jagung (*Zea mays*) pada masa penyimpanan. Sumber autoflaksin tersebut dapat berasal dari berbagai jenis jamur seperti *A. flavus*, *A. niger*, *A. wentii*, *A. melleus* dan *Penicillium citrinum* (Hanjani, 2003 dalam Budiarti, dkk., 2013: 482). Gejala adanya *Aspergillus* pada biji, ditandai dengan perubahan warna pada biji, tergantung jenis patogennya. Warna hitam dapat disebabkan oleh *Aspergillus niger* dan warna kehijauan disebabkan *Aspergillus flavus* (Surtikanti, 2011: 505). Jamur yang paling banyak menyerang pada biji jagung (*Zea mays*) dan kacang tanah adalah jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger* (Budiarti, dkk., 2013: 482).

Dari uraian di atas jika dilihat dari penelitian sebelumnya asap cair dijadikan sebagai mikrokapsul sehingga senyawa yang terdapat dalam asap cair dapat terlindungi sebelum digunakan sebagai bahan pengawet pangan (Ariestya, dkk, 2016: 1), oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antijamur pada biji pulut (*Zea mays ceratina*) dengan menggunakan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS, yang mengacu pada penelitian (Oramahi, 2011: 1) yang menyatakan bahwa asap cair dapat digunakan sebagai antijamur pada jagung. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode difusi cakram dan pengapikasian langsung pada biji jagung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, telah dilakukan penelitian uji aktivitas antijamur dari asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS dan aplikasinya pada jagung pulut (*Zea mays ceratina*).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh aktivitas antijamur asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger*?
2. Bagaimana pengaruh asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap biji jagung pulut (*Zea mays ceratina*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas antijamur asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger*.
2. Untuk mengetahui pengaruh asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap biji jagung pulut (*Zea mays ceratina*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini, yaitu:

1. Dapat menjadi solusi dalam permasalahan penanganan jamur patogen yang menyerang jagung pulut (*Zea mays ceratina*) pasca panen.
2. Menyajikan informasi mengenai pemanfaatan asap cair tandan kosong kelapa sawit sebagai pengawet alami pangan (antijamur).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kelapa Sawit (Elaeis guenensis Jacq.)

Kelapa Sawit (*Elaeis guinensis* Jacq.) merupakan salah satu jenis tanaman dari famili Arecaceae yang memproduksi minyak nabati yang dapat dikonsumsi. Kelapa sawit sangat diminati untuk dikelola dan ditanam. Daya Tarik dari penanaman kelapa sawit yaitu merupakan satu komoditi dari hasil perkebunan yang mendatangkan keuntungan bagi Indonesia dalam peningkatan devisa setiap tahunnya dalam sumber minyak nabati dan bahan agroindustri (Sukamto, 2008 dalam Rosa, 2012: 1). Klasifikasi dari kelapa sawit yaitu (Rosa, 2012: 3), sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta
Sub divisi : Angiospermae
Kelas : Angiospermae
Ordo : Monocotyledoneae
Keluarga : Arecaceae
Sub keluarga : Cocoideae
Genus : *Elaeis*
Spesies : *Elaeis guineensis* Jacq.

Kelapa sawit termasuk dalam jenis tanaman monokotil yang memiliki bentuk batang yang lurus, tidak bercabang serta tidak berkambium yang tingginya dapat mencapai 15 - 20 m. Bagian vegetatif terdiri dari akar yang terdiri dari akar primer dan akar sekunder, batang yang diameter dapat mencapai 60 cm dan daun yang panjangnya bias mencapai 5-7 meter, sedangkan bagian generatifnya terdiri dari bunga yang muncul pada umur 12-14 bulan setelah tanam dan buah yang panjangnya

2-3 cm yang beratnya 30 gram. Bagian buah ini terdiri dari beberapa bagian yaitu, eksokarp (kulit buah) dan mesokarp (sabut dan biji). Eksokarp dan mesokarp termasuk dalam pericarp, sedangkan biji tersusun atas endocarp (cangkang) dan inti (kernel) yang terdiri dari endosperma dan embrio (Rosa, 2012: 3).

Potensi yang dihasilkan dari industri kelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya yang dapat terlihat dari rata-rata laju pertumbuhan dan luas areal perkebunan kelapa sawit selama 2004–2014 yakni sekitar 7,67%. Sehingga dari luas area yang dapat mencapai 10,9 juta hektar akan menghasilkan produksi minyak sawit mentah atau CPO sekitar 29,3 juta ton. Pemanfaatan kelapa sawit dalam bidang industri minyak ini juga menghasilkan sejumlah produk samping yang berupa limbah padat dan cair. Sekitar 25 juta ton limbah TKKS dihasilkan oleh Indonesia pada tahun 2013 karena itu dapat diperkirakan akan terjadi peningkatan dari produksi limbah padat yang salah satunya adalah tandan kosong kelapa sawit (Herawan dan Rivani, 2013 dalam Erwinsyah, 2015: 80).

Tandan kosong kelapa sawit (Gambar 2.1) adalah limbah padat dari hasil pengolahan kelapa sawit yang merupakan salah satu sumber bahan baku yang banyak mengandung material senyawa organik. Tandan kosong kelapa sawit, sama seperti pada kayu ataupun tanaman lainnya mengandung beberapa unsur lemak, selulosa, lignin dan hemiselulosa (Erwinsyah, dkk., 2015: 79). Tandan kosong sawit juga mempunyai kandungan kadar air sekitar 60%, kadar minyak 2,5% (maksimum) dan serat 23-25% (Herawan dan Rivani, 2013 dalam Erwinsyah, dkk., 2015: 81).



Gambar 2.1. Tandan Kosong Kelapa Sawit
(Sumber: Erwinsyah, 2015: 80)

Tabel 2.1 Struktur Morfologi Tandan Kosong Kelapa Sawit

No.	Parameter	TKS bagian pangkal	TKS bagian ujung
1.	Panjang serat (mm)		
	- Minimum	0,63	0,46
	- Maksimum	1,81	1,27
	- Rata-rata	1,20	0,76
2.	Diameter serat (D), μm	16,89	14,34
3.	Diameter lumen (l), μm	8,04	6,99
4.	Tebal dinding (w), μm	3,49	3,68
5.	Bilangan Rungkel 2w/1)	0,87	1,05
6.	Kelangsingan (L/D)	79,95	53,0
7.	Kelemasan (l/D)	0,54	0,49
8.	Kadar serat (%)	72,67	62,47
9.	Bukan serat (%)	27,33	37,53
10.	Rapat massa tumpukan serpih, kg/M^2	177,98	

(Sumber: Darnoko dkk., 1995; Erwinsyah dkk., 2012 dalam Erwinsyah, dkk., 2015: 82)

Tabel 2.2. Komponen Kimia Tandan Kosong Kelapa Sawit

No.	Parameter	Nilai (%)	
		Herawan dan Rivani (2010)	Erwinsyah, dkk (2012)
1.	Sari/ekstraktif (%)	7,78	5,22
2.	Kadar abu (%)	6,23	2,00
3.	Selulosa (%)	37,50	41,09
4.	Hemiselulosa (%)	28,57	-
5.	Holyselulosa (%)	-	69,33
6.	Pentosa (%)	26,69	29,37
7.	Kelarutan dalam 1% NaOH (%)	29,96	24,69

(Sumber: Erwinsyah, dkk., 2015: 82)

Seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi limbah tandan kelapa sawit dapat di manfaatkan bahan bakar pembangkit listrik tenaga biomasa (PLT Biomassa) dan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol dengan berbagai proses (Haryanti, dkk., 2014: 1). Pemanfaatan tandan kelapa sawit ini tergantung proses pengolahan yang dilakukan, karena proses yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Salah satu proses pengolahan tandan kelapa sawit yaitu dengan menggunakan proses pembakaran sehingga menghasilkan arang aktif. Pengolahan tandan kelapa sawit juga dapat diolah menjadi asap cair dengan menggunakan metode pirolisis, asap cair yang dihasilkan dapat digunakan pada berbagai pegawetan pangan dan biopestisida antifeedant (Khaldun dan Abdul, 2010: 1). Asap cair yang dihasilkan dari tandan kosong kelapa sawit mengandung berbagai jenis senyawa organik yang terdiri dari 5 komponen yaitu fenol 11,68%, 4-metilfenol 4,74%, asam dodekanoat 30,02%, metil ester 5,16%, asam tetradekanoat 4,78% dan 2-metoksi-4-metilfenol sebanyak 3,20% (Khor, 2009 dalam Haji, 2013: 110).

B. Asap Cair

Asap cair merupakan hasil diperoleh dari proses pengembunan asap hasil penguraian senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam suatu sampel yang mengandung lignin, selulosa, hemiselulosa serta senyawa karbon lainnya (Basri, 2010: 1) dengan menggunakan metode pirolisa. Pirolisa adalah proses penguraian yang tidak teratur dari bahan-bahan organik atau senyawa kompleks menjadi zat dalam tiga bentuk yaitu padatan, cairan dan gas yang disebabkan karena adanya pemanasan tanpa berhubungan dengan udara luar pada suhu yang cukup tinggi dan pada waktu tertentu, proses pirolisa menggunakan peralatan seperti pirolisator, pemanas, pipa penyalur asap, kolom kondensasi dan penampung asap cair (Ningsih, 2011: 3). Senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam asap cair sangat

mempengaruhi dari kualitas asap cair. Sehingga proses pirolisis yang tidak sempurna mengakibatkan komponen senyawa yang terkandung dalam asap cair kurang lengkap (Haji, 2013: 112). Asap cair dari hasil pirolisis kemudian dilakukan proses fraksinasi untuk memisahkan senyawa tar dan hidrokarbon polisiklik aromatik yang tidak diinginkan karena jenis senyawa tersebut bersifat toksik, sehingga perlu dilakukan pemisahan sebelum digunakan sebagai bahan pengawet pangan (Sari, dkk., 2009: 4).

Asap cair dapat digunakan sebagai bahan pengawet alami pada makanan karena adanya senyawa asam, fenol dan karbonil yang terkandung di dalamnya. Kandungan senyawa yang terdapat dalam asap cair lebih terjaga dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang langsung menggunakan asap untuk pengawetan makanan, karena penggunaan metode konvensional untuk proses pengawetan akan mengurangi mutu, cita rasa dan aroma. Sedangkan menurut Basri (2010: 1), pada bidang pertanian asap cair dapat dimanfaatkan untuk menggantikan fungsi pestisida kimia karena dapat meningkatkan kualitas tanah dan menetralkan asam tanah, membunuh hama tanaman dan mengontrol pertumbuhan tanaman, pengusir serangga, mempercepat pertumbuhan pada akar, batang, umbi, daun, bunga dan buah. Asap cair juga banyak digunakan sebagai anti mikrobia yang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Oramahi, dkk (2011), memperoleh hasil yang menyatakan bahwa asap cair dari serbuk gergaji campuran kayu akasia dan kayu laban berperan sebagai antijamur. Hal tersebut juga diperjelas oleh (Darmadji (1999) dalam Norsamsi, dkk., 2014: 23) yang mengatakan bahwa kandungan asap cair yang diperoleh dari hasil pirolisis yaitu mengandung senyawa fenol sebesar 4,13%, karbonil 11,3% dan asam 10,2% yang mana senyawa tersebut memiliki sifat antimikroba yang dapat mengawetkan makanan.

Komponen dari asap cair yaitu mampu memberi cita rasa dan warna yang sesuai pada produk asapan dan berperan dalam pengawetan yang bertindak sebagai antibakteri dan antioksidan (Rahayu, dkk.,2008: 108). Pemanfaatan asap cair pada dasarnya hanya menggunakan asap cairnya secara langsung, namun berdasarkan penelitian Ariessya, dkk (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan asap cair dapat dijadikan mikroenkapsulasi sebelum digunakan pada suatu bahan. Karena pembuatan mikro kapsul diharapkan dapat melindungi zat aktif dan mengontrol kondisi senyawa yang hilang.

Mikroenkapsulasi merupakan suatu teknik perlindungan komponen aktif yang berbentuk padat, cair, ataupun gas dengan dibungkus menggunakan suatu bahan penyalut yang memiliki fungsi untuk melindungi komponen aktif terhadap lingkungan sekitar (Rasyid, 2010: 11). Senyawa aktif yang dibungkus disebut sebagai bahan inti, sedangkan bahan yang digunakan untuk menyelimuti bahan inti disebut dinding, film pelindung atau pengkapsul yang berfungsi untuk melindungi inti dari kerusakan yang berasal dari luar (Young et al., 1993 dalam Rasyid, 2010: 11). Proses mikroenkapsulasi ini dapat menggunakan bahan penyalut seperti maltodekstrin yang komponen penyusunnya berasal dari pati.

C. Jagung Pulut (Zea mays ceratina)

Tanaman jagung (*Zea mays* L.) adalah jenis dari tanaman biji-bijian yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan (Apriani, 2009: 3). Jagung termasuk tanaman pangan yang menduduki urutan kedua setelah padi (AAK, 1993 dalam Apriani 2009: 3). Sehingga di beberapa daerah banyak menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Klasifikasi jagung pulut secara umum (Apriani 2009: 3) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)
Sub Divisi : Angiospermae (berbiji tertutup)
Kelas : Monocotyledone (berkeping satu)
Ordo : Graminae
Famili : Graminaceae
Genus : *Zea*
Spesies : *Zea mays ceratina*.



Gambar 2.2. Jagung pulut

Biji jagung memiliki jenis warna yang beragam, mulai dari putih, kuning, merah, jingga, ungu, hingga hitam. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekayaan senyawa pigmen antosianin (antosianidin, aglikon, glukosida) dan karotenoid pada biji jagung. Asam lemak yang terdapat pada jagung terdiri dari asam lemak jenuh (palmitat dan stearat), asam lemak tidak jenuh (oleat, linoleat dan pada QPM terdapat linolenat). Linoleat dan linolenat adalah jenis asam lemak esensial. Lemak pada jagung terdapat pada lembaga, sehingga mengkonsumsi jagung dalam keadaan utuh lebih baik daripada mengonsumsi jagung yang telah dihilangkan lembaganya (Suarni dan Yasin, 2011: 45).

Menurut penelitian Warisno, 1998 dalam Kastanja (2007: 27), kandungan yang terdapat pada buah jagung yang masih muda dan yang sudah tua adalah sama, yaitu, mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral. Kandungan gizi yang terdapat dalam per 100 gram jagung yaitu, kalori 355,0 mg, protein 9,2 g, lemak 3,9 g, karbohidrat 73,7 g, air 12,0 g, kalium 10,0 mg, fosfor 2560 mg, besi 2,4 mg, vitamin A 510,0 mg dan vitamin B 0,38 mg. Menurut Suarni dan Yasin (2011: 47), kandungan yang terdapat pada jagung pulut yaitu, kadar air 11,12%, kadar abu 1,99%, kadar protein 9,11%, serat kasar 3,02%, lemak 4,97% dan karbohidrat 72,8%.

Kualitas produksi jagung dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu praktek budidaya dan penanganan pasca panen. Praktek budidaya dan pasca panen yang kurang baik akan menyebabkan penurunan mutu dan kerusakan biji pada jagung. Kerusakan tersebut dapat berupa kerusakan fisik, kimia dan kerusakan mikrobiologis yang disebabkan karena adanya kontaminasi jamur pada jagung. Jamur paling umum ditemukan dalam menginfeksi jagung di Indonesia yaitu *Aspergillus flavus*, *Fusarium miniformae*, *Aspergillus niger* dan *Eurotium rubrum*. Kontaminasi jamur tersebut dapat menginfeksi pada proses sebelum dan sesudah panen, proses distribusi dan proses penyimpanan (Pitt and Hocking, 1985). Jamur yang menginfeksi biji jagung, beberapa diantaranya mampu menghasilkan senyawa yang bersifat toksik bagi manusia dan hewan apabila dikonsumsi tanpa penanganan yang tepat pada jagung yang telah terinfeksi jamur.

D. Jamur

Jamur merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang termasuk ke dalam jenis sel eukariotik dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Jamur memiliki benang atau hifa sehingga penampakan jamur mudah untuk diidentifikasi. Jamur memiliki waktu tumbuh lebih lama dibandingkan dengan bakteri yaitu sekitar

3-7 hari dan berdiameter 10-100 mm. Jamur atau cendawan memiliki kemampuan untuk mengubah makhluk hidup dan benda mati menjadi sesuatu yang menguntungkan atau merugikan (Handjani dan Ratnasetyaningsih, 206: 212). Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS Al-Furqan/25: 2 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi dengan beraneka ragam jenisnya dengan sifat masing-masing, baik yang mampu dilihat oleh kasat mata maupun tidak. Sesuai dengan firman Allah swt sebagai berikut:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Yang memiliki kerajaan dilangit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran dengan tepat”

Menurut Tafsir Al-Misbah (2002), yang menjelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dan Allah swt juga membuat variasi atas ciptaannya. Sehingga tercipta makhluk dengan karakter yang berbeda-beda.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan ukuran tertentu dan dengan manfaat tertentu. Ada yang Allah ciptakan dengan berbagai manfaat dan ada pula yang memberikan kerusakan. Seperti halnya dengan jamur yang memiliki ukuran berbeda-beda dan manfaat yang berbeda-beda pula. Seperti jamur yang merugikan pada berbagai jenis biji-bijian, yang akan menyebabkan potensi penyakit bagi manusia apabila masuk ke dalam tubuh.

Jamur memiliki potensi bahaya bagi kesehatan manusia atau hewan karena dapat menghasilkan berbagai jenis toksin yang disebut mikotoksin, yang tergantung pada jenis jamurnya. Makanan akan mengalami kerusakan apabila terkontaminasi

dengan jamur patogen, khususnya pada biji-bijian yang telah terkontaminasi dengan jamur. Salah satu jenis jamur yang paling umum ditemukan pada biji-bijian yaitu *Aspergillus* (Budiarti, dkk., 2013: 484).

E. Aspergillus flavus

Cendawan *Aspergillus* pada biji-bijian yang telah melalui proses penyimpanan dapat mengakibatkan penurunan daya kecambah dari biji, perubahan warna dan perubahan berat dan volume, kenaikan suhu dan kelembaban, perubahan komponen penyusun kimia dan menyebabkan terjadinya akumulasi dari senyawa mikotoksin (Sutiaji dan Senong, 2002: 81). Mikotoksin merupakan senyawa metabolik yang bersifat toksik. Aflatoksin merupakan jenis dari senyawa yang termasuk mikotoksin, bersifat sangat toksik yang dihasilkan dari jamur *Aspergillus flavus* pada tanaman jagung (Budiarti, dkk., 2013: 483). Berdasarkan aturan dari UNICEF, WHO dan FAO menetapkan bahwa kandungan aflatoksin yang terdapat dalam makanan tidak lebih dari 30 ppb (Baiton, et al, 1980 dalam Miskiyah dan Widyaningrum, 2008: 1). Bahkan menurut *European Commission* menetapkan bahwa kadar aflatoksin pada tanaman serealia harus lebih rendah dari 4 ppb (Visconti, 1998 dalam Miskiyah dan Widyaningrum, 2008: 1).

Infeksi *Aspergillus flavus* pada biji jagung dapat terjadi pada saat jagung masih dalam proses penanaman maupun pada proses penyimpanan. Kontaminasi ini akan menyebabkan berkurangnya kualitas dan nilai gizi pada jagung (Zulkifli dan Latifah, 2017: 26). Proses infeksi jamur tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor dari suhu lingkungan dan kandungan air pada biji. *Aspergillus flavus* mampu tumbuh optimum dan menghasilkan senyawa aflatoksin dengan kandungan air biji lebih dari

18% sedang suhu yang optimum pada perkembangan jamur *Aspergillus flavus* adalah 25-35°C (Talanca dan Mas'ud, 2009: 446).

Kandungan aflatoksin dapat dikurangi dengan melakukan pencegahan lebih dini terhadap infeksi *Aspergillus flavus* di lapangan dan dengan menggunakan varietas yang tahan terhadap infeksi jamur. Infeksi jamur tersebut dapat diatasi dengan penggunaan pendekatan HACCP yang berfungsi untuk mencegah dan mengontrol penyakit (Miskiyah dan Widyaningrum, 2008: 1). Sedangkan menurut penelitian dari (Oramahi, dkk., 2011: 1) menyatakan bahwa penanganan jamur pada biji jagung pasca panen juga dapat ditangani dengan menggunakan asap cair dari serbuk kayu akasia dan kayu laban hasil pirolisis. Secara tradisional dikalangan petani pengawetan untuk mencegah tumbuhnya jamur pada jagung dilakukan dengan menggunakan metode pengasapan tongkol jagung di atas dapur mereka yang kemudian dipipil dan dikeringkan lagi hingga kadar airnya mencapai 12% dan dikarungkan lalu disimpan (Talanca dan Mas'ud, 2007: 448).

F. *Aspergillus niger*

Aspergillus niger (Gambar 2.3) adalah salah satu jenis kapang dari golongan *Aspergillus* yang mampu untuk menghasilkan enzim selulase. *Aspergillus niger* merupakan jenis kapang yang memiliki bentuk yang berfilamen, memiliki hifa, bercabang-cabang serta bersekat dan banyak ditemukan melimpah di alam. Jamur ini dapat diisolasi dari tumbuhan, udara, tanah dan juga dalam ruangan. *Aspergillus niger* dapat tumbuh dengan optimum pada suhu antara 35-37°C, pada suhu maksimum 45-47°C dan pada suhu minimum 6-8°C (Oktariani, 2017: 16).

Aspergillus niger dapat tumbuh secara aerobik yaitu memerlukan oksigen, yang memiliki warna putih dan memiliki lapisan konidiospora yang tebal dengan warna coklat gelap. Klasifikasi *Aspergillus niger* yaitu, sebagai berikut:

Domain : Eukariota
Kingdom : Fungi
Filum : Ascomicota
Kelas : Eurotiomycetes
Ordo : Eurotiales
Famili : Trichocomaceae
Genus : *Aspergillus*
Spesies : *Aspergillus niger*

Pada media *Potato Dextro Agar* (PDA) *Aspergillus niger* memiliki warna koloni yaitu berwarna putih dan akan berubah menjadi warna hitam ketika terbentuk konoida (Dwidjoseputro, 1984 dalam Oktariani, 2017: 16).



Gambar 2.3. *Aspergillus niger*

(Sumber: Oktariani, 2017: 18)

Disisi lain dengan berbagai manfaat dari jamur *Aspergillus niger* ada pula dampak negatif dari keberadaan *Aspergillus niger*, yaitu *Aspergillus niger* merupakan jamur yang dapat menimbulkan kerusakan pada bahan makanan yang disimpan (Oramahi, 2010: 146), selain itu pula *Aspergillus niger* dapat menyebabkan berkurangnya hasil panen yang cukup besar (Oramahi, 2010: 146). *Aspergillus niger*

juga mampu mengkontaminasi biji-bijian seperti jagung saat pasca panen, yang hal ini mampu menjadikan jagung mengalami kontaminasi akan mengalami kerusakan.

G. Antijamur

Antijamur merupakan senyawa yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit infeksi yang mampu menghambat dan membunuh pertumbuhan jamur. Adapun tujuan utama dari penggunaan antijamur adalah untuk mencegah penyebab penyakit dan infeksi, membasmi jamur pada inangnya serta mampu mencegah pembusukan dan perusakan oleh jamur-jamur patogen.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja suatu zat antimikroba dalam proses penghambatan atau pembasmian suatu organisme patogen, yaitu (1) Konsentrasi, dimana semakin tinggi konsentrasi maka semakin tinggi pula daya hambat terhadap mikroba, artinya mikroba akan lebih cepat terbunuh apabila konsentrasi zat antimikroba juga tinggi, (2) Jumlah mikroorganisme, yaitu apabila jumlah mikroorganisme semakin banyak maka waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikroba tersebut akan semakin lama pula. (3) suhu, semakin tinggi suhu maka semakin tinggi pula keaktifan suatu zat antimikroba. (4) Spesies mikroorganisme, yang menunjukkan ketahanan setiap jenis mikroorganisme terhadap suatu bahan kimia berbeda-beda. (5) Nilai pH, yang mana mikroorganisme yang hidup pada suasana asam akan lebih mudah untuk dimatikan pada suhu rendah dibandingkan yang hidup pada pH yang basa (Munawwaroh, 2016: 26-27).

Penggunaan asap cair sebagai senyawa antijamur dikarenakan di dalam asap cair terkandung senyawa yang mampu menghambat pertumbuhan jamur yaitu senyawa fenol dan asam-asam organik. Fenol adalah senyawa hidrokarbon aromatik monosubstitusi yang memiliki sifat toksik terhadap jamur dan bakteri, sehingga fenol banyak dimanfaatkan sebagai desinfektan (Hartono, 2007: 12). Senyawa yang berasal

dari golongan fenol memiliki kemampuan dalam membentuk kompleks dengan protein karena adanya ikatan hidrogen yang mampu menghambat pembentukan protein dan asam nukleat (Fitriani, 2013: 128). Senyawa fenol juga dapat melarutkan lipid karena adanya gugus $-OH$ yang dapat mengganggu dan mempengaruhi integritas dari membran sitoplasma serta menghambat ikatan ATP-ase yang terdapat pada membran sel sehingga menyebabkan terjadinya lisis pada sel (Harbone, 1987 dalam Fitriani, 2013: 128).

Komponen senyawa fenol dapat berfungsi dalam proses denaturasi enzim yang terlibat pada proses germinasi spora, karena senyawa fenolik memiliki molekul besar yang mampu menginaktifkan enzim esensial di dalam sel meskipun pada konsentrasi yang sangat rendah sehingga dapat mengganggu proses germinasi spora (Rahmawati, 2004 dalam Fitriani, dkk, 2013: 128). Adapun Senyawa fenol dapat berikatan dengan ergosterol yang merupakan penyusun dari membran sel jamur sehingga dapat menyebabkan terbentuknya suatu pori pada membran sel. Terbentuknya pori tersebut akan menyebabkan komponen penyusun sel jamur seperti asam amino, asam karboksilat, fosfat anorganik dan ester fosfat dapat keluar dari sel yang dapat menyebabkan kematian pada sel jamur (Suryana, 2004 dalam Wahyuni, 2014: 278).

Selain karena terdapatnya senyawa fenol dalam asap cair TKKS, menurut Oramahi (2010), menyatakan bahwa dalam asap cair TKKS terkandung senyawa-senyawa asam seperti asam format, asam etanoat, asam asetat dan asam karbonil. Dimana jenis asam-asam tersebut mampu menghambat pertumbuhan jamur. Sifat antijamur dari asam asetat dalam asap cair terkait dengan kondisi pH, hal tersebut disebabkan karena pada pH 6-7 asam asetat tidak mampu untuk berpenetrasi ke dalam membran sel jamur. Nilai pH yang tinggi menyebabkan

kemampuan asam asetat dalam menghambat pertumbuhan jamur semakin berkurang. Hal tersebut Sedangkan untuk asam format dan propionat dapat menghambat pertumbuhan jamur dengan cara memblok sistem metabolisme sel melalui proses penghambatan aktivitas enzim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2017 sampai bulan Mei 2018 di Laboratorium Biokimia dan Laboratorium Analitik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu, neraca analitik (*kern*), pH meter, laminar air flow (*heidolph*), mikropipet (*biorad*), inkubator, *autoclave* (*astell*), oven (*mammert*), lemari asam, kompor listrik, lemari pendingin, Erlenmeyer 50 dan 250 mL, gelas kimia 10, 50, 100 dan 500 mL, gelas ukur 50 mL, pipet skala 5 dan 10 mL, jangka sorong, tabung reaksi, cawan petri, kawat ose, pipet tetes, pinset, spatula, gunting, batang pengaduk, rak tabung, bulp, corong, botol vial dan penggaris.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu, asap cair TKKS, aluminium foil, aquadest (H₂O), biakan murni jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger*, buffer fosfat, media *potato dekstro agar* (PDA), jagung pulut (*Zea mayz ceratina*), kertas cakram, ketokonazole 10%, larutan natrium klorida (NaCl) fisiologis, mikrokapsul asap cair TKKS (*E. geineensis* Jacq.) dan tisu.

C. Prosedur kerja

1. Uji Daya Hambat

a. Pembuatan Media PDA

Media PDA ditimbang sebanyak 4.0000 g dan dilarutkan ke dalam aquadest 200 mL kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Peremajaan *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger*

Diambil satu koloni jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger* dengan menggunakan jarum ose steril, lalu dioleskan secara merata pada media PDA, setelah itu diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam

c. Pembuatan Suspensi *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger*

Diambil dua ose penuh *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger* menggunakan ose steril dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan natrium klorida (NaCl) 0,9% sebanyak 10 mL, kemudian dicampur hingga homogen yang ditandai dengan cairan berubah menjadi keruh.

d. Pembuatan Konsentrasi Uji Asap cair

Variasi konsentrasi yang digunakan adalah 1% (v/v), 2% (v/v) dan 3% (v/v) dalam volume 10 mL water steril. Konsentrasi dibuat dengan cara 0,1 mL, 0,2 mL dan 0,3 mL asap cair dipipet dan masing-masing dihomogenkan dengan water steril sampai volume 10 mL. Masing-masing larutan uji diteteskan pada kertas cakram sebanyak 50 μ L.

e. Pembuatan Konsentrasi Uji Mikro kapsul

Variasi konsentrasi yang digunakan adalah 1% (b/v), 2% (b/v) dan 3% (b/v) dalam volume 10 mL water steril. Konsentrasi dibuat dengan cara 0,1 g, 0,2 g dan 0,3 g mikroenkapsulan ditimbang dan masing-masing dilarutkan dan dihomogenkan

dengan water steril sampai volume 10 mL. Masing-masing larutan uji dijenuhkan pada kertas cakram sebanyak 50 μ L.

f. Kontrol Positif dan Kontrol Negatif

Kontrol positif yang digunakan adalah antibiotik ketokenazol dengan konsentrasi 1%, sedangkan kontrol negatif yang digunakan adalah *water steril*.

g. Uji Aktivitas Antijamur

Media PDA yang telah disterilisasi kemudian dituang ke dalam cawan petri steril dan 1 mL inokulum uji dituang ke dalam cawan petri dan digoyang-goyangkan dan dibiarkan hingga memadat. Kertas cakram yang telah ditetesi dengan asap cair dan mikroenkapsulan dengan konsentrasi 1, 2, dan 3% serta dengan kontrol positif (Ketokonazole 10%) dan kontrol negatif (*water steril*), diletakkan pada media yang telah padat. Setelah itu media disimpan pada suhu kamar dan diamati diameter pertumbuhannya pada hari ke 1, 2 dan 3 (Oramahi, 2011: 81).

2. Aplikasi Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair TKKS

a. Preparasi Sampel

Jagung pulut yang diambil dari hasil panen dipipil kemudian ditambahkan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS dengan konsentrasi tanpa perlakuan, 1%, 2% dan 3% dan direndam selama 30 menit, lalu dimasukkan ke dalam segel plastik. Jagung yang telah diberi perlakuan dimasukkan ke dalam lemari dan disimpan pada suhu ruang (Oramahi, 2011: 80). Selama penyimpanan sampel diuji jumlah *total plate count* (TPC), pH dan organoleptiknya pada 0, 3, 6, 9 dan 12 hari (Ariesty, dkk., 2016: 21).

b. Uji *Total Plate Count* (TPC)

Prosedur yang dilakukan adalah sampel dilarutkan kasar dalam *Butterfield Phosphate Buffered* (BFP) dengan perbandingan antara 1:9 sampel dan BFP dalam wadah steril. Pengenceran sampel dimulai dari pengenceran 10^{-1} sampai pengenceran 10^{-7} , Media *potato dekstro agar* (PDA) yang telah dilarutkan dengan aquadest dan telah disterilisasi, kemudian dituangkan sekitar 10 mL pada cawan petri dan pengenceran sampel sebanyak 1 mL, kemudian media di simpan pada suhu ruang (Ariestya, 2016: 21).

c. Pengujian pH

Pengujian pH pada sampel mikroenkapsulasi dengan menggunakan pH meter. Pengujian pH dilakukan dengan cara pH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan *water one* sesuai dengan instruksi kerja alat setiap kali melakukan pengujian. kemudian 5 g sampel dihomogenkan dengan aquadest 10 ml dan memasukkan elektroda yang telah dikalibrasi sebelumnya pada sampel, setelah itu menunggu sampai angka pH meter berhenti dan menunjukkan angka tetap, maka diperoleh nilai pH mikroenkapsulasi (Ariestya, 2016: 21).

d. Uji Organoleptik

Jagung pipil yang sudah ditambahkan mikroenkapsulasi 1%, 2% dan 3% dilakukan pengujian sensorik dengan parameter bau, rasa dan penampakan pada hari ke-0, 3, 6, 9 dan 12. Pengujian dilakukan dengan nilai 1 sampai 9 dengan 15 panelis yang berasal dari mahasiswa jurusan kimia. Panelis melakukan proses ini dengan mengamati jagung pipil yang sudah diberi kode, selanjutnya panelis dapat menilai dan dilakukan pengujian secara deskriptif (Ariestya, 2016: 22).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Uji Daya Hambat

Hasil pengujian aktivitas antijamur asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap pertumbuhan jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger*, dibuktikan dengan terbentuknya zona bening disekitar kertas cakram. Hasil uji daya hambat pada jamur *Aspergillus flavus* yang diperoleh dengan perlakuan menggunakan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS pada konsentrasi 1% 2% dan 3% dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Uji Daya Hambat Asap Cair dan mikrokapsul asap cair TKKS pada *Aspergillus flavus*

Kontrol	Daya Hambat	
	Asap Cair (mm)	Mikrokapsul (mm)
3%	6.31 ± 0.70	6.37 ± 0.87
2%	5.98 ± 0.51	5.85 ± 0.39
1%	5.78 ± 0.37	5.49 ± 0.16
+	6.40 ± 0.78	6.27 ± 0.29
-	5.70 ± 0.36	5.49 ± 0.63

Hasil uji daya hambat pada jamur *Aspergillus niger* yang diperoleh dengan perlakuan menggunakan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS pada konsentrasi 1, 2 dan 3% dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Uji Daya Hambat Asap Cair dan mikrokapsul asap cair TKKS pada *Aspergillus niger*

Kontrol	Daya Hambat	
	Asap Cair (mm)	Mikrokapsul (mm)
3%	8.30 ± 0.40	6.50 ± 0.94
2%	7.52 ± 0.50	6.40 ± 0.71
1%	6.40 ± 0.50	5.20 ± 0.62
+	6.50 ± 0.62	6.40 ± 0.10
-	5.40 ± 0.67	5.10 ± 0.17

3. Aplikasi pada Jagung

Pengaplikasian asap cair dan enkapsulan TKKS dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter, diantaranya pengaruh pH, *total plate count* (TPC) dan uji organoleptik.

a. Pengukuran pH

Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui pengaruh pH dalam penambahan asap cair dan mikokapsul asap cair TKKS dengan berbagai variasi konsentrasi dan pengaruh lama penyimpanan. Hasil pengujian pH pada penambahan asap cair dengan variasi konsentrasi 1, 2 dan 3% serta lama penyimpanan 0, 3, 6, 9 dan 12 hari dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Uji Asap Cair TKKS pada Pengukuran pH

Konsentrasi	Hari Ke-				
	0	3	6	9	12
Tanpa Perlakuan	6.80 ± 0.00	6.35 ± 0.07	6.25 ± 0.07	6.35 ± 0.07	6.40 ± 0.00
Asap Cair 1%	6.80 ± 0.00	6.05 ± 0.07	6.35 ± 0.07	6.30 ± 0.14	6.40 ± 0.00
Asap Cair 2%	6.85 ± 0.07	6.00 ± 0.00	6.10 ± 0.14	6.05 ± 0.07	6.50 ± 0.14
Asap Cair 3%	6.85 ± 0.07	6.05 ± 0.07	5.95 ± 0.07	5.80 ± 0.14	6.50 ± 0.14

Hasil pengujian pH pada penambahan mikrokapsul asap cair TKKS dengan variasi konsentrasi 1, 2 dan 3% serta lama penyimpanan 0, 3, 6, 9 dan 12 hari dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Uji mikrokapsul asap cair TKKS pada Pengukuran pH

Konsentrasi	Hari Ke-				
	0	3	6	9	12
Tanpa Perlakuan	6.80 ± 0.00	6.35 ± 0.07	6.25 ± 0.07	6.35 ± 0.07	6.40 ± 0.00
Mikrokapsul 1%	6.85 ± 0.07	6.00 ± 0.00	6.30 ± 0.00	6.35 ± 0.07	6.30 ± 0.14
Mikrokapsul 2%	6.80 ± 0.00	5.95 ± 0.07	6.25 ± 0.07	6.45 ± 0.21	6.10 ± 0.14
Mikrokapsul 3%	6.80 ± 0.00	6.00 ± 0.00	6.15 ± 0.07	6.50 ± 0.00	6.55 ± 0.07

b. Uji *Total Plate Count* (TPC)

Uji TPC dilakukan untuk mengetahui jumlah koloni yang tumbuh pada penambahan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS dengan menggunakan variasi konsentrasi 1, 2 dan 3% dan lama penyimpanan 0, 3, 6, 9 dan 12, yang ditandai dengan munculnya koloni jamur pada media PDA yang telah disimpan selama 24 jam pada suhu ruang.

Hasil uji TPC dengan penambahan asap cair TKKS dengan menggunakan variasi konsentrasi 1, 2 dan 3% dan lama penyimpanan 0, 3, 6, 9 dan 12 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Hasil Uji Asap Cair TKKS pada Pengukuran TPC

Konsentrasi	Hari Ke-				
	0 ($\times 10^7$)	3 ($\times 10^7$)	6 ($\times 10^7$)	9 ($\times 10^7$)	12 ($\times 10^7$)
Tanpa Perlakuan	6.50 \pm 6.36	21.50 \pm 0.07	46.00 \pm 4.14	39.00 \pm 1.41	51.50 \pm 4.94
Asap Cair 1%	3.50 \pm 6.36	22.00 \pm 2.82	34.50 \pm 0.70	34.50 \pm 2.12	44.00 \pm 1.41
Asap Cair 2%	2.95 \pm 2.12	20.50 \pm 4.94	33.50 \pm 3.53	32.50 \pm 0.70	40.00 \pm 0.00
Asap Cair 3%	2.20 \pm 2.82	25.50 \pm 2.12	25.50 \pm 6.36	31.50 \pm 2.12	39.50 \pm 0.70

Hasil uji TPC dengan penambahan mikrokapsul asap cair TKKS dengan menggunakan variasi konsentrasi 1, 2 dan 3% dan lama penyimpanan 0, 3, 6, 9 dan 12 dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil Uji mikrokapsul asap cair TKKS pada Pengukuran TPC

Konsentrasi	Hari Ke-				
	0 ($\times 10^7$)	3 ($\times 10^7$)	6 ($\times 10^7$)	9 ($\times 10^7$)	12 ($\times 10^7$)
Tanpa Perlakuan	6.50 \pm 6.36	21.50 \pm 0.07	46.00 \pm 4.14	39.00 \pm 1.41	51.50 \pm 4.94
Mikrokapsul 1%	4.20 \pm 8.48	32.00 \pm 0.70	32.00 \pm 4.24	32.50 \pm 4.94	39.50 \pm 4.94
Mikrokapsul 2%	2.60 \pm 5.65	29.50 \pm 7.77	29.50 \pm 2.12	31.50 \pm 3.53	35.00 \pm 1.41
Mikrokapsul 3%	2.00 \pm 9.19	24.50 \pm 4.94	24.50 \pm 2.12	27.50 \pm 0.70	31.00 \pm 1.41

c. Uji Organoleptik

Pengujian organoleptik dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter uji yaitu parameter warna, aroma dan tekstur. Konsentrasi yang digunakan yaitu 1%, 2% dan 3% dengan lama penyimpanan 0, 3, 6, 9 dan 12 hari. Pengujian organoleptik dilakukan dengan menggunakan 15 orang panelis. Berikut hasil uji organoleptik dengan penggunaan asap cair pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Hasil Uji Asap Cair TKKS pada Pengujian Organoleptik

Waktu Penyimpanan	Perlakuan	Parameter Uji		
		Warna	Aroma	Tekstur
0 Hari	Tanpa Perlakuan	9.00 ± 0.00	7.00 ± 0.00	8.30 ± 0.00
	1%	7.00 ± 0.00	3.30 ± 0.42	7.65 ± 0.91
	2%	3.30 ± 0.42	3.00 ± 0.00	6.65 ± 0.49
	3%	3.00 ± 0.00	2.65 ± 0.49	5.60 ± 0.00
3 Hari	Tanpa Perlakuan	7.95 ± 0.49	5.30 ± 0.42	9.00 ± 0.00
	1%	7.00 ± 0.00	4.30 ± 0.00	9.00 ± 0.00
	2%	7.00 ± 0.00	4.65 ± 0.49	9.00 ± 0.00
	3%	6.30 ± 0.98	4.30 ± 0.00	8.30 ± 0.00
6 Hari	Tanpa Perlakuan	7.00 ± 0.00	5.00 ± 0.00	9.00 ± 0.00
	1%	7.00 ± 0.00	5.30 ± 0.42	9.00 ± 0.00
	2%	7.00 ± 0.00	4.30 ± 0.00	8.60 ± 0.56
	3%	7.00 ± 0.00	3.00 ± 0.00	9.00 ± 0.00
9 Hari	Tanpa Perlakuan	7.00 ± 0.00	5.00 ± 0.00	8.30 ± 0.00
	1%	5.30 ± 0.42	4.65 ± 0.49	8.00 ± 1.41
	2%	5.65 ± 1.90	4.65 ± 0.49	7.65 ± 0.91
	3%	3.95 ± 0.49	4.30 ± 0.00	7.60 ± 0.00
12 Hari	Tanpa Perlakuan	5.80 ± 1.13	4.65 ± 0.49	6.95 ± 0.91
	1%	5.60 ± 0.00	3.60 ± 0.00	7.00 ± 0.00
	2%	2.65 ± 0.49	3.30 ± 0.42	6.65 ± 0.49
	3%	3.60 ± 0.00	3.60 ± 0.00	7.65 ± 0.91

Pengujian organoleptik dengan menggunakan mikrokapsul asap cair TKKS dengan menggunakan beberapa parameter yaitu warna, aroma dan tekstur. Dilihat dari hasil pengujian waktu penyimpanan berpengaruh nyata pada parameter uji yang digunakan, yang dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Hasil Uji mikrokapsul asap cair TKKS pada Pengujian Organoleptik

Waktu Penyimpanan	Perlakuan	Parameter Uji		
		Warna	Aroma	Tekstur
0 Hari	Tanpa Perlakuan	9.00 ± 0.00	7.00 ± 0.00	8.30 ± 0.00
	1%	8.65 ± 0.49	4.30 ± 0.00	7.30 ± 0.42
	2%	8.30 ± 0.98	3.95 ± 0.49	7.30 ± 0.42
	3%	7.60 ± 0.00	3.30 ± 0.00	6.65 ± 0.49
3 Hari	Tanpa Perlakuan	7.00 ± 0.00	5.30 ± 0.42	9.00 ± 0.00
	1%	7.00 ± 0.00	3.60 ± 0.00	9.00 ± 0.00
	2%	7.00 ± 0.00	3.60 ± 0.00	9.00 ± 0.00
	3%	7.00 ± 0.00	3.60 ± 0.00	9.00 ± 0.00
6 Hari	Tanpa Perlakuan	7.00 ± 0.00	5.00 ± 0.00	9.00 ± 0.00
	1%	7.00 ± 0.00	4.65 ± 0.49	8.65 ± 0.49
	2%	6.30 ± 0.98	3.30 ± 0.42	9.00 ± 0.00
	3%	6.30 ± 0.00	4.30 ± 0.98	8.30 ± 0.00
9 Hari	Tanpa Perlakuan	7.00 ± 0.00	5.00 ± 0.00	8.30 ± 0.00
	1%	4.65 ± 0.49	4.30 ± 0.98	7.95 ± 0.49
	2%	5.65 ± 0.91	4.65 ± 0.49	8.30 ± 0.00
	3%	3.60 ± 0.00	3.95 ± 0.49	8.30 ± 0.00
12 Hari	Tanpa Perlakuan	5.65 ± 0.91	4.65 ± 0.49	7.60 ± 0.00
	1%	4.30 ± 0.98	3.65 ± 0.91	7.65 ± 0.91
	2%	4.95 ± 1.90	3.60 ± 0.00	7.95 ± 0.49
	3%	4.30 ± 0.00	3.95 ± 0.49	7.95 ± 0.49

B. Pembahasan

Asap cair merupakan hasil kondensasi dari asap menjadi cair pada suhu tertentu, asap cair banyak dibuat dari bahan yang banyak mengandung senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa dan senyawa organik lainnya. Salah satu bahan pembuatan asap cair yaitu tandan kosong kelapa sawit, yang mana pemanfaatannya belum terlalu maksimal serta karena terdapatnya komponen senyawa lignin yang tinggi di dalamnya, dimana senyawa lignin tersebut yang akan terurai menjadi senyawa fenol dan asam-asam organik saat dilakukan proses pirolisis dengan suhu tertentu.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan instrumen GC-MS, diperoleh hasil pada Gambar 4.1 yang menunjukkan jumlah senyawa fenol dalam asap cair TKKS yaitu 68.15% dan selebihnya merupakan senyawa organik

dengan jumlah masing-masing tidak sampai 10%. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Oramahi, et al (2010), yang menyatakan bahwa dalam asap cair TKKS terkandung beberapa senyawa seperti fenol dan asam organik, namun pada penelitiannya menyatakan bahwa senyawa asam jumlahnya paling tinggi dibandingkan jumlah senyawa fenol. Hal tersebut dikarenakan perbedaan letak pengambilan sampel TKKS dan suhu pirolisis serta ukuran TKKS saat proses pirolisis.

Terdapatnya senyawa fenol yang tinggi dalam asap cair TKKS menjadikan asap cair TKKS dapat digunakan sebagai antimikroba. Salah satunya dapat digunakan sebagai anti jamur. Namun, pada penelitian ini asap cair juga terlebih dahulu dilakukan proses mikrokapsulasi sehingga senyawa yang terkandung di dalamnya dapat bertahan. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap daya hambat asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS dengan menggunakan dua jenis jamur yaitu *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger* dan dilakukan pengaplikasian pada jagung pulut (*Zea mays ceratina*).

1. Uji Daya Hambat

Penelitian ini menggunakan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS sebagai agen antijamur. Uji daya hambat asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger* terlebih dahulu dilakukan dengan meremajakan dua jenis jamur tersebut. Jamur *Aspergillus* yang mengkontaminasi pada biji-bijian yang telah melalui proses penyimpanan dapat mengakibatkan penurunan daya kecambah dari biji, perubahan warna dan perubahan berat dan volume, kenaikan suhu dan kelembaban, perubahan komponen penyusun

kimia dan menyebabkan terjadinya akumulasi dari senyawa mikotoksin pada biji-bijian (Sutiaji dan Senong, 2002: 81).

Uji daya hambat ini, digunakan dua jenis jamur sebagai jamur uji, hal ini dikarenakan karena kedua jamur tersebut adalah jamur yang sering mengkontaminasi jagung pasca panen. Adapun kedua jenis jamur tersebut adalah jamur yang bertindak sebagai jamur patogen pada jagung, karena dapat merusak kualitas jagung. Pada jagung yang terinfeksi jamur ditandai dengan perubahan warna pada biji, tergantung jenis patogennya. Warna hitam dapat disebabkan oleh *Aspergillus niger* dan warna kehijauan disebabkan *Aspergillus flavus* (Surtikanti, 2011: 505). *Aspergillus flavus* juga merupakan jamur yang bersifat toksik karena jamur tersebut mampu menghasilkan senyawa toksik seperti aflatoksin yang merupakan senyawa yang mampu menyebabkan penyakit kanker apabila sering terkontaminasi ke dalam tubuh. Jamur ini mampu hidup pada kondisi pH 4-6 dan dengan kelembapan 18% dengan suhu 25-37°C (Talanca dan Mas'ud, 2009: 446). Media yang paling baik untuk pertumbuhan jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger* adalah media PDA, yang mana media tersebut mengandung kentang yang dapat membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bagi jamur (Aini dan Triastuti, 2015: 861).


Media PDA yang digunakan disiapkan dengan melakukan sterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan autoclaf pada suhu 121°C selama 15 menit, fungsi sterilisasi media ini untuk menghentikan pertumbuhan mikroba yang lain saat menumbuhkan *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger* saat dilakukan pengujian. Proses peremajaan terlebih dahulu dilakukan untuk memperoleh biakan yang baru dalam kondisi yang masih aktif dan baik untuk digunakan. Media selanjutnya

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C dalam posisi dibalik agar uap air yang dihasilkan selama proses inkubasi tidak mempengaruhi proses pertumbuhan mikroba.

Hasil peremajaan mikroba yang dihasilkan kemudian disuspensikan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan NaCl 0,9% dan dihomogenkan sampai keruh, yang menandakan adanya pertumbuhan mikroba sehingga dapat digunakan dalam pengujian antijamur. Adapun metode yang digunakan untuk mengetahui daya hambat asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS, yaitu menggunakan metode difusi cakram. Parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur pengamatan yaitu adanya zona bening yang muncul disekitar kertas cakram yang menandakan adanya daya hambat pada pengujian. Semakin besar zona bening yang dihasilkan maka semakin besar pula nilai daya hambat dari sampel yang diujikan.

Penggunaan variasi konsentrasi dilakukan agar dapat diketahui pada konsentrasi berapa mikrokapsul asap cair TKKS dapat menghambat pertumbuhan jamur. Variasi yang digunakan yaitu 0, 1, 2 dan 3 %, sesuai dengan penelitian Oramahi (2011), menyatakan bahwa konsentrasi tersebut dapat dijadikan parameter karena telah dilakukan penelitian dengan menggunakan asap cair dari serbuk kayu, dimana konsentrasi yang menghambat jamur paling tinggi adalah 3 %.

Hasil pengukuran diameter daya hambat asap cair TKKS pada *Aspergillus flavus* dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa asap cair dengan konsentrasi 3% memiliki zona bening atau daya hambat terbesar terhadap pertumbuhan jamur *Aspergillus flavus*.




Gambar 4.1 Diameter Daya Hambat Asap Cair TKKS terhadap *Aspergillus flavus*

Gambar 4.1 menunjukkan diameter daya hambat asap cair TKKS terhadap jamur *Aspergillus flavus*. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa adanya kenaikan dari setiap konsentrasi, terutama pada konsentrasi 3%. Dari grafik tersebut konsentrasi 3% menghasilkan daya hambat yang paling tinggi dibandingkan konsentrasi lainnya. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi konsentrasi asap cair maka semakin tinggi zona hambat yang dihasilkan terhadap pertumbuhan jamur *Aspergillus flavus*.

Hasil pengukuran daya hambat asap cair TKKS menunjukkan bahwa daya hambat paling tinggi yaitu pada konsentrasi 3% dengan nilai 6,31 mm, sedangkan pada konsentrasi 2% dengan nilai 5.98 mm dan 1% dengan nilai 5.78 mm. Hal ini dikarenakan pada konsentrasi yang semakin rendah maka semakin rendah pula kandungan senyawa fenol dan asam yang terdapat dalam asap cair. Sehingga asap cair TKKS pada konsentrasi rendah kemampuan asap cair TKKS akan semakin rendah dalam menghambat pertumbuhan *Aspergillus flavus*. Senyawa fenol yang terdapat dalam asap cair ini yang mendenaturasi enzim yang terlibat dalam proses


germinasi spora sehingga proses germinasi spora akan terhambat (Rahmawati, 2004 dalam Fitriani, dkk, 2013: 128). Terhambatnya proses germinasi spora ini akan mengakibatkan berkurangnya jamur yang tumbuh yang sehingga daya hambat yang dihasilkan semakin besar.



Gambar 4.2. Diameter Daya Hambat mikro kapsul asap cair TKKS Terhadap *Aspergillus flavus*

Gambar 4.2 menunjukkan hasil uji daya hambat mikro kapsul asap cair TKKS terhadap pertumbuhan jamur *Aspergillus flavus*. Dapat dilihat dari gambar bahwa terjadi kenaikan daya hambat dari mikro kapsul asap cair TKKS pada setiap kenaikan konsentrasi. Konsentrasi mikro kapsul asap cair TKKS yang memiliki nilai daya hambat yang paling tinggi yaitu pada konsentrasi 3% dengan nilai 6.37 mm, sedangkan pada konsentrasi 2% dengan nilai 5,85 mm dan 1% dengan nilai 5,49 mm. Daya hambat yang tinggi pada konsentrasi 3% dikarenakan jumlah senyawa fenol pada konsentrasi 3% juga semakin banyak sehingga pertumbuhan jamur akan lebih berkurang (Munawaroh, 2016: 26). Hal ini sesuai dengan The apparatus, dkk (2016) yang menyatakan bahwa senyawa fenol memainkan peranan yang paling penting dalam penghambatan pertumbuhan jamur pada beberapa jenis jamur

pembusuk pada kayu. Senyawa fenol adalah senyawa hidrokarbon aromatik monosubstitusi yang memiliki sifat toksik terhadap jamur dan bakteri, sehingga fenol banyak dimanfaatkan sebagai desinfektan. Selain itu pada penelitian Jothiyangkoon, dkk (2015), menyatakan bahwa asap cair hasil pirolisis mampu menghambat pertumbuhan jamur *Aspergillus flavus* yang menyerang kacang tanah.




Gambar 4.3. Hubungan Antara Diameter Zona Hambat Asap Cair dan mikrokapsul asap cair TKKS Terhadap *Aspergillus flavus*

Gambar 4.3 menunjukkan hubungan antara pengaruh penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS pada pengujian daya hambat jamur *Aspergillus flavus*. Hal ini dapat dilihat dari daya hambat yang dihasilkan dari kedua antijamur tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan asap cair dengan mikrokapsul asap cair TKKS. Pada penggunaan asap cair nilai daya hambat lebih tinggi pada konsentrasi 1% dan 2%, sedangkan pada konsentrasi 3% nilai daya hambat asap cair TKKS lebih rendah dari nilai mikrokapsul asap cair TKKS.

Dari hasil analisis perhitungan nilai menggunakan ANOVA, nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,05 yang menandakan bahwa dari hasil tersebut terdapat

perbedaan yang nyata antara asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap penekanan pertumbuhan jamur *Aspergillus flavus*. Hal ini dapat disebabkan karena pada saat dilakukan proses homogenisasi masih ada senyawa inti yang belum terlapisi dengan enkapsulan sehingga saat proses mikrokapsulasi, senyawa inti tersebut ikut terbuang. Sesuai dengan penelitian Hidayah (2016), yang menyatakan bahwa pada proses mikrokapsulasi dengan menggunakan alat *spray drayer* senyawa inti mudah untuk lepas apabila tidak adanya bahan penyalut yang mengikat, terutama penyalut yang terbuat dari bahan dengan kelarutan air yang tinggi. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan mikrokapsul asap cair TKKS mempengaruhi komponen senyawa kimia yang terdapat di dalam asap cair sekaligus berperan sebagai pelindung agar senyawa yang terdapat di dalamnya dapat terlindungi (Rasyid, 2010: 11).

Adapun hasil uji daya hambat asap cair TKKS pada jamur *Aspergillus niger* ditunjukkan pada gambar 4.4 berikut.




Gambar 4.4 Diameter Daya Hambat Asap Cair TKKS Terhadap *Aspergillus niger*

Gambar 4.4 menunjukkan daya hambat dari asap cair TKKS terhadap pertumbuhan dari jamur *Aspergillus niger*, dari gambar di atas terlihat bahwa


perbedaan pengaruh konsentrasi mempengaruhi diameter daya hambat terhadap pertumbuhan jamur *Aspergillus flavus*. Konsentrasi 3% memiliki ukuran diameter yang paling tinggi dengan luas daya hambat yaitu 8,30 mm kemudian diikuti dengan konsentrasi 2% dengan nilai daya hambat 7,52 mm dan yang paling rendah adalah konsentrasi 1% dengan nilai daya hambat 6,40 mm. Hal ini sesuai dengan penelitian Oramahi, et al (2010), yang menyatakan bahwa asap cair TKKS dengan suhu pirolisis 400 dan 450°C memiliki daya hambat terhadap *Aspergillus niger* pada konsentrasi 3% mampu menghasilkan indeks antijamur tertinggi. Semakin tinggi konsentrasi asap cair TKKS maka semakin tinggi pula aktivitas antijamurnya. Hal tersebut disebabkan karena pada konsentrasi yang tinggi kandungan bahan aktif di dalam asap cair juga tinggi sehingga lebih banyak bahan aktif yang dapat mengganggu proses metabolisme di dalam jamur (Oramahi, et al, 2010: 151).

Selain karena terdapatnya senyawa fenol dalam asap cair TKKS yang mampu menghambat pertumbuhan jamur *Aspergillus niger*, terdapat pula senyawa asam yang memiliki peranan sebagai antijamur. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian dari Oramahi (2010: 152), yang menyatakan bahwa dalam asap cair TKKS terdapat senyawa-senyawa asam seperti asam format, asam etanoat, asam asetat dan asam karbonil. Nilai pH asam asetat yang tinggi menyebabkan kemampuan asam asetat dalam menghambat pertumbuhan jamur semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan karena pada pH 6-7 asam asetat tidak mampu untuk berpenetrasi ke dalam membran sel jamur. Sedangkan untuk asam format dan propionat menghambat pertumbuhan jamur dengan cara memblok system metabolisme sel melalui proses penghambatan aktivitas enzim.



Gambar 4.5. Diamater Daya Hambat Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap *Aspergillus niger*

Gambar 4.5 menunjukkan diameter daya hambat dari penggunaan mikrokapsul asap cair TKKS sebagai agen penghambat pertumbuhan jamur *Aspergillus niger*. Dari gambar tersebut dilihat pengaruh diameter daya hambat dengan penggunaan konsentrasi mikrokapsul asap cair TKKS, yaitu semakin tinggi konsentrasi maka semakin tinggi pula diameter daya hambatnya. Konsentrasi mikrokapsul asap cair TKKS yang paling tinggi diameter daya hambatnya yaitu pada konsentrasi 3% dengan nilai daya hambat 6,50 mm, diikuti dengan konsentrasi 2% dengan nilai 6,40 mm dan konsentrasi paling rendah yaitu 5,20 mm. Adapun hubungan antara penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6. Hubungan Antara Diameter Daya Hambat Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair TKKS terhadap *Aspergillus niger*

Dari gambar 4.6 dapat dilihat hubungan antara penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap *Aspergillus niger*, yang mana dari gambar tersebut terlihat bahwa diameter daya hambat dari penggunaan asap cair TKKS lebih tinggi dari diameter daya hambat dengan menggunakan mikrokapsul asap cair TKKS. Dari hasil analisis perhitungan nilai menggunakan ANOVA, nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,173 yang menandakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap penekanan pertumbuhan jamur *Aspergillus niger*. Hal ini dapat disebabkan karena pada saat dilakukan proses homogenisasi masih ada senyawa inti yang belum terlapsi dengan enkapsulan sehingga saat proses mikrokapsulasi, senyawa inti tersebut ikut terbang. Sesuai


dengan penelitian Hidayah (2016), yang menyatakan bahwa pada proses mikrokapsulasi dengan menggunakan alat *spray drayer* senyawa inti mudah untuk lepas apabila tidak adanya bahan penyalut yang mengikat, terutama penyalut yang terbuat dari bahan dengan kelarutan air yang tinggi.

Dari kedua hasil tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS, semakin tinggi pula daya hambat terhadap jamur *Aspergillus flavus* dan *Asperillus niger*. Rabbi, dkk (2017), menyatakan bahwa kandungan fenol asap cair mampu menghambat pertumbuhan dari *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger*. Namun, nilai daya hambat penggunaan asap cair pada kedua jenis jamur lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan mikrokapsul asap cair. Dilihat dari kemampuannya menghambat kedua jenis jamur tersebut maka asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS mampu diaplikasikan pada biji jagung pasca panen untuk mengurangi jamur yang sering mengkontaminasi jagung.

3. Pengaplikasian pada Jagung

a. Pengukuran pH


Nilai pH merupakan salah satu parameter dalam menentukan kelayakan suatu bahan makanan dan pH tumbuhanya jamur patogen. Pengukuran pH pada uji ini dilakukan dengan menggunakan pH meter yang dicelupkan langsung ke dalam wadah yang telah berisi sampel yang sudah dihaluskan. Proses penghalusan ini dilakukan dengan ditambahkan *water one* dengan perbandingan 1:2 hal ini bertujuan agar sampel dapat homogen dengan sempurna setelah adanya penambahan *water one*. Adapun nilai pH yang diperoleh digambarkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7. Nilai pengukuran pH pada Penggunaan Asap Cair TKKS

Gambar 4.7 menunjukkan hasil pengukuran pH pada jagung pulut (*Zea mays ceratina*) dengan penggunaan asap cair TKKS. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa nilai pH pada hari pertama atau hari ke-nol masih pada nilai pH mendekati netral (7), hal ini dikarenakan karena asap cair TKKS belum meresap ke dalam komponen jagung pulut (*Zea mays ceratina*), namun pada penyimpanan hari berikutnya yaitu hari ke 3, 6 dan 9 terjadi penurunan nilai pH, karena asap cair telah meresap ke dalam jagung. Hal tersebut dikarenakan karena nilai pH asap cair TKKS yaitu berkisar pada nilai pH 4. Sehingga akan mempengaruhi pH pada jagung yang telah ditambahkan dengan asap cair. Namun nilai pH kembali meningkat pada hari

terakhir yaitu pada hari ke- 12. Dari nilai pH yang dihasilkan pada tiap konsentrasi dan pengaruh penyimpanan pH tersebut memungkinkan untuk tumbuhnya jamur. Dari hasil analisis menggunakan ANOVA nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,788 yang menandakan terdapatnya perbedaan yang nyata nilai pH dari perbedaan lama penyimpanan.




Gambar 4.8. Nilai pengukuran pH pada Penggunaan Mikokapsul Asap Cair TKKS

Gambar 4.8 menunjukkan nilai dari hasil pengukuran pH pada jagung pulut (*Zea mays ceratina*) dengan penggunaan mikrokapsul asap cair TKKS. Adapun dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai pH pada hari ke-0 berkisar 6.8 sedangkan pada hari ke 3 terjadi penurunan nilai pH dan pada hari ke 6, 9 dan 12. Nilai pH pada bahan pangan selama penyimpanan dapat berubah karena adanya penguraian protein oleh enzim proteolitik dan dengan bantuan bakteri atau jamur terurai menjadi asam karboksilat, asam sulfide dan asam amoniak (Bawinto, dkk., 2015). Dari hasil analisis menggunakan ANOVA nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,430 yang

menandakan terdapatnya perbedaan yang nyata nilai pH dari perbedaan lama penyimpanan. Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman dan untuk mengetahui kemungkinan tumbuhnya jamur. Jamur *Aspergillus* dapat tumbuh pada pH 4-6 dengan kelembapan 80% 37°C (Talanca dan Mas'ud, 2009: 446).


b. Uji TPC

Pengujian *Total Plate Count* bertujuan untuk mengetahui jumlah koloni jamur, yang mana semakin banyak jumlah koloni yang terdapat pada pengujian maka kualitas dari suatu bahan pangan akan semakin menurun. Pengujian TPC ini dilakukan dengan menggunakan media *Potato Dekstro Agar* (PDA) yang merupakan media yang baik untuk dapat ditumbuhi oleh jamur. Adapun nilai hasil pengukuran TPC dengan menggunakan asap cair TKKS pada jagung pulut (*Zea mays ceratina*) dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Nilai Pengukuran TPC dengan Menggunakan Asap Cair TKKS

Gambar 4.9 menunjukkan hasil pengukuran nilai TPC pada jagung pulut (*Zea mays ceratina*) dengan penggunaan asap cair TKKS. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa waktu dan konsentrasi mempengaruhi nilai TPC. Yang mana dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada hari ke-0 nilai TPC masih sangat rendah, hal tersebut menandakan bahwa jumlah koloni jamur pada sampel masih sangat sedikit. Begitupun dengan konsentrasi asap cair yang digunakan, yaitu semakin tinggi nilai konsentrasi asap cair maka semakin rendah nilai TPC yang dihasilkan. Namun pada variasi penyimpanan semakin lama penyimpanan dari hari ke 3, 6, 9 dan 12 setiap hari mengalami peningkatan, dimana nilai TPC yang paling tinggi terdapat pada hari ke-12. Hal ini terjadi karena jumlah jamur yang tumbuh pada jagung pulut pada hari ke-12 semakin banyak sehingga jumlah TPC juga akan semakin meningkat. Dari analisis menggunakan ANOVA nilai signifikan yang diperoleh yaitu 0,855 yang menandakan adanya perbedaan yang nyata dari lama penyimpanan terhadap nilai TPC. Semakin lama penyimpanan suatu bahan pangan maka jumlah mikroba yang tumbuh akan semakin banyak (Ariestya, 2016).



Gambar 4.10. Nilai Pengukuran TPC dengan Menggunakan Mikrokapsul Asap Cair TKKS

Gambar 4.10 menunjukkan nilai dari pengukuran TPC pada jagung pulut (*Zea mays ceratina*) setelah penambahan mikrokapsul asap cair TKKS. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi mikrokapsul asap cair TKKS maka jumlah TPC semakin berkurang. Namun pada pengaruh penyimpanannya semakin lama penyimpanan maka semakin tinggi nilai TPC yang diperoleh. Dari Gambar 4.10 dapat dilihat bahwa pada hari ke-0 nilai TPC masih sangat sedikit namun, setelah bertambahnya waktu dari hari ke 3, 6, 9 dan 12 nilai TPC semakin meningkat dan nilai TPC pada hari ke-12 paling tinggi. Jumlah jamur semakin hari semakin meningkat pada jagung pulut. Dari hasil analisis menggunakan ANOVA diperoleh nilai signifikan yaitu 0,682 yang menandakan adanya perbedaan yang nyata dari lama penyimpanan terhadap nilai TPC.

c. Uji Organoleptik

Pengujian organoleptik adalah uji yang dipengaruhi atau didasarkan dengan penggunaan alat indra. Alat indra yang biasa atau sering digunakan dalam pengujian organoleptik adalah lidah (pengecap rasa), mata (melihat warna) dan hidung (penguji bau) (Ginayati, 2015: 10). Pengujian sifat organoleptik merupakan metode uji yang sangat penting bagi setiap produk makanan karena berkaitan dengan penerimaan konsumen. Pada penelitian ini dilakukan uji skor, yaitu dari segi warna, aroma dan tekstur yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesukaan panelis terhadap sampel dengan melakukan pemberian nilai. Pengujian organoleptik dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada 15 orang panelis (Mahasiswa kimia) kemudian menilai sampel yang telah direndam dengan variasi konsentrasi asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS dengan nilai tertinggi yaitu 9.

Dari Tabel 4.7 dan 4.8 menunjukkan nilai organoleptik yang telah diperoleh dari 15 orang panelis terhadap penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai organoleptik dari masa penyimpanan semakin hari nilai yang diberikan panelis semakin rendah yang menandakan bahwa mutu dari jagung semakin berkurang, baik dari parameter warna, bau dan tekstur jagung.

1. Warna

Parameter penilaian warna diperoleh hasil dari hari ke-0 pada penggunaan asap cair TKKS nilai yang diberikan panelis pada variasi konsentrasi berkisar 7.00 - 3.00 yang menandakan kualitas biji jagung dari segi warna setelah penambahan asap cair namun pada jagung tanpa perlakuan nilai yang diberikan masih 9, yang menandakan kualitas jagung dari segi warna masih bagus. Sedangkan pada hari ke 3, 6, 9 dan 12 nilai jagung tanpa perlakuan semakin menurun, hal tersebut dapat disebabkan karena jagung yang disimpan dalam keadaan kadar air yang tinggi akan dengan mudah mengalami penurunan kualitas mutu (Budiarti, 2013). Namun pada penggunaan konsentrasi asap cair bertahan di angka 7.00-6.30 pada hari ke 3 dan 6, sedangkan pada hari ke 9 dan 12 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya senyawa fenol yang berperan sebagai antijamur yang terdapat dalam asap cair yang mampu menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme patogen pada jagung. Hal ini diperkuat pada penelitian Talanca (2009), yang menyatakan bahwa senyawa fenol, asam propionat dan amonia merupakan senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai penghambat pertumbuhan jamur yang mengkontaminasi jagung. Begitupun halnya pada penggunaan mikrokapsul asap cair TKKS, parameter pengujian warna bertahan hanya pada hari

ke 3 dan 6. Dari hasil analisis dengan menggunakan ANOVA nilai signifikan yang diperoleh dari penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair yaitu 0,063 dan 0,581 yang menandakan terdapat perbedaan yang nyata dari lama penyimpanan sampel.

2. Aroma

Parameter penilaian aroma dapat dilihat dari hari ke-0, pada jagung tanpa perlakuan dengan nilai 7 yang berarti jagung masih dalam keadaan segar, sedangkan pada variasi konsentrasi nilai yang diperoleh berkisar 2,65-3,00 yang menandakan bahwa jagung memiliki bau yang panelis tidak suka, hal tersebut dapat disebabkan karena dalam asap cair mengandung senyawa yang menghasilkan bau yang khas. Sesuai dengan penelitian Bawinto, dkk (2015), yang menyatakan bahwa bau yang ditimbulkan merupakan gabungan bau yang terdapat dalam asap cair berupa senyawa formaldehid yang mempunyai fungsi penghilang bau dan senyawa fenol yang memiliki sifat sebagai senyawa aromatis, sehingga jika terjadi interaksi senyawa-senyawa tersebut akan memberikan bau yang khas. Hari ke 3, 6, 9 dan 12 pada jagung tanpa perlakuan mengalami penurunan nilai dan pada variasi konsentrasi asap cair juga mengalami penurunan nilai. Begitupun halnya pada penggunaan mikrokapsul asap cair TKKS nilai yang diberikan panelis semakin menurun dengan bertambahnya masa simpan. Dari hasil analisis menggunakan ANOVA nilai signifikan yang diperoleh pada penambahan asap cair dan mikrokapsul asap cair yaitu 0,017 dan 0,002 yang menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada penggunaan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS terhadap lama penyimpanan dengan parameter uji aroma.

3. Tekstur

Parameter penilaian tekstur dapat dilihat dari hari ke-0 nilai yang diberikan panelis pada jagung tanpa perlakuan yaitu 8.30 yang berarti jagung masih dalam kondisi yang baik, sedangkan pada variasi penggunaan asap cair berkisar dari 5.60-7.65. Namun pada hari ke 3, 6, 9 dan 12 pada jagung tanpa perlakuan nilai yang diberikan panelis semakin berkurang, sedangkan pada variasi konsentrasi asap cair nilai yang diberikan pada hari ke-3 dan 6 mengalami peningkatan dan menurun pada hari ke 9 dan 12. Begitupun halnya pada penggunaan konsentrasi mikrokapsul asap cair TKKS dimana pada penggunaan variasi konsentrasi nilai yang diberikan panelis pada hari ke 3 dan 6 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada hari ke 9 dan 12. Dari hasil analisis dengan menggunakan ANOVA nilai signifikan yang diperoleh pada penambahan asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS yaitu 0,684 dan 0,812 yang menandakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata nilai yang diberikan panelis dengan parameter uji tekstur dengan lama penyimpanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Aktivitas antijamur dari asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS dapat menghambat pertumbuhan dari dua jenis jamur uji yang digunakan yaitu *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus niger*, semakin tinggi konsentrasi maka semakin tinggi pula daya hambat terhadap jamur. Dengan penggunaan konsentrasi asap cair TKKS yang paling tinggi yaitu 3% dengan nilai 8,30 mm terhadap jamur *Aspergillus niger*.
2. Asap cair dan mikrokapsul asap cair TKKS mampu dijadikan sebagai antijamur atau pengawet alami pada jagung pulut (*Zea mays ceratina*) dengan masa penyimpanan yang bertahan pada hari ke 3 dan 6.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut jenis jamur yang dihambat pada jagung pulut (*Zea mays ceratina*).

DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'anul Karim

- Aprianie, Venty, "Pengaruh Kadar Air dan Metode Penyimpanan Tongkol Jagung (*Zea Mays*, L.) Terhadap Pertumbuhan *Aspergillus Flavus* dan Pembentukan Aflatoksin", *Skripsi*, Bogor, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Ariesty, dkk, "Antimicrobial Activity of Microencapsulation Liquid Smoke [*Oreochromis niloticus* (Linnaeus, 1758)] Meat for Preservatives in Cold Storage ($\pm 5^{\circ}\text{C}$)", *Aquatic Peocedia* no. 7 (2016): 19-27.
- Asmawit, dkk., "Pemanfaatan Asap Cair dari Tandan Kosong Kelapa Sawit pada Pengolahan Karet Mentah", *Biopropal Industri* 2, no. 1 (2011): h. 7-11.
- Basri AB, "Manfaat Asap Cair untuk Tanaman", *Serambi Pertanian* IV, no. 5 (2010): h. 1-2.
- Bawinto, dkk., "Analisis Kadar Air, pH, Organoleptik dan Kapang pada Produk Ikan Tuna (*Thunnus* Sp) Asap Di Kelurahan Girian Bawah, Kota Bitung, Sulawesi Utara", *Media Teknologi Hasil Pangan* 3, no. 2 (2015): h. 55-65.
- Budiarti Sri Wahyuni, dkk, "Kontaminasi Fungi *Aspergillus* Sp. Pada Biji Jagung Ditempat Penyimpanan dengan Kadar Air yang Berbeda" *Seminar Nasional Serealia* (2013): h. 482-487.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: CV Al-Hanan, 2009.
- Ermayanti, Tuti dan Yeni Saptia, "kinerja ekspor minyak kelapa sawit indonesia", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 7, no. 2 (2013): h. 129-147.
- Erwinsyah, dkk, "Potensi Dan Peluang Tandan Kosong Sawit Sebagai Bahan Baku Pulp Dan Kertas: Studi Kasus Di Indonesia", *Selulosa* 5, no. 2 (2015): h. 79 – 88.
- Fitriani, dkk, "Aktivitas Antifungi Ekstrak Daun Kedondong (*Spondias pinnata*) dalam Menghambat Pertumbuhan *Aspergillus flavus*", *LenteraBio* 2, no. 2 (2013): h.125–129.
- Ginayati, dkk, "Pemanfaatan Asap Cair dari Pirolisis Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Pengawet Alami Tahu", *Teknik Kimia USU* 4, no. 3 (2015): h. 7-11.
- Haji, Abdul Gani, "Komponen Kimia Asap Cair Hasil Pirolisis Limbah Padat Kelapa Sawit", *Rekayasa Kimia dan Lingkungan*. 9, no. 3 (2013): h. 109 – 116.
- Handjani, Noor Soesanti dan Ratnasetyaningsih, "Identifikasi Jamur dan Deteksi Aflatoksin B1 terhadap Petis Udang Komersial", *Biodiversitas* 7, no. 3 (2006): h. 212-215.
- Hartono, 2007, "Penetapan Kadar Senyawa Fenolik Total dalam Asap Cair (*Liquid Smoke*) Dihitung Sebagai Fenol dengan Metode Bromatometr", *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Darma, 2007.

- Haryanti, dkk, "Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit", *Konversi* 3, no. 2 (2014): h. 20-22.
- Hidayah, Nur, "Perbandingan Berbagai Teknik Mikrokapsulasi Pakan dalam Menghasilkan Daging Sapi Sehat". *Senaspro* (2016): h. 143-150.
- Hu, dkk, "Mechanisms of Antifungal and Anti-aflatoxigenic Properties of Essential Oil Derived from Turmeric (*Curcuma longa* L.) on *Aspergillus flavus*", *Food Chemistry* (2017): h. 1-8.
- Jothityangkoon, dkk, "Using Wood Vinegar in Enhancing Peanut Yield and in Controlling the Contamination of Aflatoxin Producing Fungus". (2015): h. 1-5.
- Kastanja, Arianca, "Identifikasi Kadar Air Biji Jagung dan Tingkat Kerusakannya Pada Tempat Penyimpanan", *Jurnal Agroforestri* 2,no. 1 (2007): h. 27-32.
- Khaldun, Ibnu dan Abdul Gani Haji, "Potensi Asap Cair Hasil Pirolisis Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Biopestisida Antifeedant", *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi II*, (2010): h. 547-557.
- Miskiyah dan Widyaningrum, "Pengendalian Aflatoksin pada Pasca Panen Jagung Melalui Penenrapan HACCP", *Standarisasi* 10, no. 1 (2008): h. 1-10.
- Munawaroh, Risalatul, "Uji Aktivitas Jamu Madura "Empot Super" terhadap Jamur *Candida Albicans*". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malik Malang, 2016.
- Ningsih, Lisa Silvia, "Pembuatan Asap Cair Dari Sekam Padi Dengan Proses Pirolisa Untuk Menghasilkan Insektisida Organik", *Skripsi*, Padang, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, 2011.
- Oktariani, "Amobilisasi Enzim Selulase dari Jamur *Aspergillus niger* L-51 Menggunakan Zeolit". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, 2017.
- Oramahi, dkk, "Aktivitas Antijamur Asap Cair dari Sebuk Gergaji Kayu Akasia (*Acacia Mangium Willd*) dan Kayu Laban (*Vitex Pubescens Vahl*)", *Ilmu-ilmu Hayati dan Fisik* 13, no. 1 (2011): h. 79 -84.
- Oramahi, dkk., "Efikasi Asap Cair dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dalam Penekanan Perkembangan Jamur *Aspergillus niger*". *Jurnal HPT Tropika* 10, no. 2 (2010): h. 146-153.
- Oramahi dan Farah, "Maximizing the Production of Liquid Smoke from Bark of Durio by Studying Its Potential Compounds". *Environmental Sciences* 17, (2013): h. 60 – 69.
- Oramahi, Hasan, "Antifungal and Antitermitic Activities of wood vinegar from *Vitex pubescens Vahl*" *Journal Wood Sci* (2013): h. 344–350.
- Pakki, Syahrir dan Nursiah Najmuddin, "Dinamika Patogen Terbawa Benih *Aspergillus flavus* pada Beberapa Varietas Jagung Komposit dan Hibrida". *Seminar Nasional Serealia* (2013): h. 403-410.
- Qutbh, Sayyid, "Tafsir Fi Zilalil Qur'an", Gema Insani: Jakarta, 2001.

- Rabbi, dkk, "Chemical Composition and Antifungal Activity of Sugarcane Bagasse and Banana Stem Based Wood Vinegar", *Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences* 7, no. 4 (2017): h. 898-904.
- Rahayu, dkk, "Pengaruh Pemberian Asap Cair dan Metode Pengemasan Terhadap Kualitas dan Tingkat Kesukaan Dendeng Sapi Selama Penyimpanan", *Aplikasi Teknologi Pangan* 1, no. 4 (2008): h. 108-114.
- Rasyid, Harin Al, "Pemanfaatan Asap Cair Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Pengawet Ikan Teri Nasi (*Stolephorus Commersonii*, Lac.) Segar Untuk Tujuan Transportasi", *Skripsi*, Bogor, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Rosa, Rahayu Novrina, "Pengelolaan Pembibitan Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq.) Di Kebun Bangun Bandar Pt.Socfindo Medan, Sumatera Utara", *Skripsi*, Bogor, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Sari, Tuti Indah, dkk., "Proses Pembuatan Asap Cair (*Liquid Smoke*) dari Limbah Industri". *Teknik Kimia* 16, no. 2 (2009): h. 44-47.
- Suarni dan Yasin, "Jagung sebagai Sumber Pangan Fungsional", *Iptek Tanaman Pangan* 6, no. 1 (2011): h. 41-56.
- Sutiaji, dkk, "Infeksi Cendawan *Aspergillus* sp pada Beberapa Varieas/Galur Jagung Hibrida Umur Dalam", *Prosinding Ilmiah dan Pertemuan Tahunan PEI, FPI dan HPTI XV SULSEL*, (2002): h. 81-83.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesa dan Keserasian Al Qur'an*. Volume 6. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Talanca dan Mas'ud, "Pengelolaan Cendawan *Aspergillus flavus* pada Jagung", *Prosinding Seminar Nasional*, (2009): h. 445-449.
- Theapparat, dkk, "Pyroligneous Acids from Carbonisation of Wood And Bamboo: Their Components and Antifungal Activity" *Journal of Tropical Forest Science* 27, no.4 (2015): h. 517-526.
- Wahyuni, dkk., "Aktivitas Antifungi Ekstrak Metanol Daun Buas-Buas (*Premna serratifolia*) Terhadap Jamur *Diplodia* sp. pada Jeruk Siam (*Citrus nobilis* var. *microcarpa*)", *Jurnal Protobion* 3, no. 2 (2014): h. 274-279.
- Zulkifli dan Lattifah, "Morphological and Molecular Diversity of *Aspergillus* From Corn Grain Used as Livestock Feed", *HAYATI Journal of Biosciences* 24 (2017): 26-34.

LAMPIRAN 1
SKEMA PENELITIAN



LAMPIRAN II
ANALISIS DATA

A. Pembuatan Larutan

a. Padatan

$$\% = \frac{\text{Bobot (gram)}}{\text{volume (mL)}}$$

$$\frac{1 \text{ gram}}{100 \text{ mL}} = \frac{x}{10 \text{ mL}}$$

$$x = 0,1 \text{ gram}$$

b. Larutan

$$V_1 M_1 = V_2 M_2$$

$$V_1 \cdot 100\% = 50 \text{ mL} \cdot 50\%$$

$$V_1 = 2,5 \text{ mL}$$

2. Perhitungan Jumlah Koloni

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Koloni (CFU)} &= \frac{1}{\text{faktor pengenceran}} \times \text{jumlah koloni} \\ &= \frac{1}{10^{-7}} \times 50 \\ &= 50 \times 10^{-7} \end{aligned}$$

B. Uji Statistika Perbedaan Antara Asap Cair dan Mikrokapsul Asap Cair TKKS

1. *Aspergillus flavus*

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.052	4	.263	15.876	.005
Within Groups	.083	5	.017		
Total	1.134	9			

2. *Aspergillus niger*

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.989	4	1.497	4.481	.173
Within Groups	3.017	5	.603		
Total	9.007	9			

C. Hasil Statistik Uji pH

1. Asap Cair TKKS

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.117	3	.039	.352	.788
Within Groups	1.764	16	.110		
Total	1.881	19			

2. Mikrokapsul Asap Cair TKKS

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	6.183	3	2.061	.972	.430
Within Groups	33.920	16	2.120		
Total	40.103	19			

D. Hasil Statistik Uji TPC

1. Asap Cair TKKS

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	192.127	3	64.042	.257	.855
Within Groups	3986.704	16	249.169		
Total	4178.831	19			

2. Mikrokapsul Asap Cair TKKS

ANOVA

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	318.766	3	106.255	.509	.682
Within Groups	3338.920	16	208.683		
Total	3657.686	19			

E. Hasil Statistik Uji Organoleptik

1. Asap Cair TKKS

Warna

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	21.091	3	7.030	2.967	.063
Within Groups	37.909	16	2.369		
Total	59.000	19			

Aroma

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	9.140	3	3.047	4.556	.017
Within Groups	10.701	16	.669		
Total	19.841	19			

Tekstur

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.610	3	.537	.505	.684
Within Groups	16.995	16	1.062		
Total	18.605	19			

2. Mikrokapsul Asap Cair TKKS

Warna

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	4.749	3	1.583	.673	.581
Within Groups	37.610	16	2.351		
Total	42.359	19			

Aroma

VAR00002

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	8.438	3	2.813	7.573	.002
Within Groups	5.943	16	.371		
Total	14.381	19			

Tekstur

VAR00002


	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.505	3	.168	.318	.812
Within Groups	8.448	16	.528		
Total	8.953	19			

LAMPIRAN III
DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Pembuatan Asap Cair dan Mikroenkapsulan TKKS



Proses Pirolisis TKKS




Asap Cair TKKS




Mikroenkapsulasi

B. Pengujian Daya Hambat

1. Preparasi Sampel



Proses pembuatan konsentrasi asap cair TKKS



Proses pembuatan konsentrasi mikrokapsul asap cair TKKS

2. Pembuatan Media PDA



Media PDA

3. Pembuatan Suspensi



Suspensi *A. flavus*



Suspensi *A. niger*

4. Uji Aktivitas Antijamur Terhadap *A. flavus* dan *A. niger*




A. niger Asap Cair TKKS



A. niger Mikroenkapsulan TKKS



A. flavus Asap Cair TKKS



A. flavus Mikroenkapsulan TKKS

C. Aplikasi Asap Cair dan Mikroenkapsulan TKK



Pengambilan Sampel



Jagung Pipil




Perendaman Jagung



Pengukuran Jumlah Koloni Jamur

LAMPIRAN
PROFIL SENYAWA ASAP CAIR



No. puncak	Nama Senyawa	Konsentrasi (%)
1	8,9,9,10,10,11-HEXAFLUORO-4,4-DIMETHYL-3,5-DIOXATETRACYCLO[5.4.1	1.12
2	1-PROPANOL, 2-ETHOXY	1.45
3	PYRIDINE	3.44
4	2-Furanol, tetrahydro-	2.46
5	Pyridine, 2-methyl-	4.42
6	2-FURANMETHANOL	0.22
7	3-HEXYN-1-OL	2.4
8	Pyridine, 3-methyl	1.91
9	Pyridine, 2,6-dimethyl-	1.06
10	Oxime-, methoxy-phenyl-	1.82
11	Pyridine, 2-ethyl-	0.61
12	Butanoic acid, 4-hydroxy-	1.31
13	Pyridine, 3,5-dimethyl-	1.8
14	Pyridine, 2,3-dimethyl-	0.95
15	PHENOL	68.15
16	PYRIDINE, 2-ETHYL-6-METHYL-	0.34
17	PYRIDINE, 2-ETHYL-6-METHYL-	0.41
18	PHENOL, 2-METHYL-	2.41
19	Cyclotrisiloxane, hexamethyl-	0.38
20	PHENOL, 4-METHYL-	0.9
21	Phenol, 2-methoxy-	1.9
22	1-Methoxy-2-methyl-4-(methylthio)benzene	0.23
23	TETRADECANOIC ACID, METHYL ESTER	0.49
24	HEXADECANOIC ACID, METHYL ESTER	0.89
25	9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester	0.38

BIOGRAFI PENULIS



NURUL MAGFIRAH atau biasa dipanggil NURUL, lahir di Mala'lang, 16 Mei 1996. Lahir sebagai anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan ayah yang bernama, MADI dan ibu yang bernama HAMDANA. Hobby yang paling saya senangi adalah membaca dan memiliki cita-cita yaitu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yaitu menjadi seorang guru. Saya mulai menginjak bangku SD sejak tahun 2002 tepatnya di SD Inpres Samata dan tamat di SD pada tahun 2008. Setelah lulus di saya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP tepatnya di SMPN I Barombong. Setelah lulus SMP saya lanjut di SMA tepatnya SMAN I Bajeng. Saat awal masuk SMA saya mulai masuk Organisasi yaitu IPM dan sampai sekarang masih aktif di organisasi tersebut. Setelah tamat SMA tahun 2014 saya lanjut ke perguruan tinggi Negeri yang ada di Gowa yaitu UIN Alauddin Makassar. Saya masuk disini dengan memilih tiga jurusan namun saya lulus pada jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi.