

**PERFORMA BROILER YANG DIBERIKAN ANTIBIOTIK DAN
PROBIOTIK**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

SYARIF HIDAYATULLAH

60700114053

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Hidayatullah
NIM : 60700114053
Tempat/Tgl. Lahir : Tombolo /24 Juni 1996
Jurusan : Ilmu Peternakan
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Mawar II No. 27 singguminasa
Judul : Performa Broiler yang diberikan Antibiotik dan Probiotik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 Agustus 2018

Penyusun,


Syarif Hidayatullah
NIM: 60700114053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **SYARIF HIDAYATULLAH**, NIM: 60700114053, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi penulisan skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Performa Broiler yang diberikan Antibiotik Dan Probiotik**", memandang bahwa penulisan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh. Nurhidayat S.Pt., MP.
NIP. 197509092009121001


Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si.
NIP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.
NIP. 19590712 1986031 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Performa Broiler yang diberikan Antibiotik dan Probiotik" yang disusun oleh **SYARIF HIDAYATULLAH, NIM: 60700114053**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Gowa, 20 Agustus 2018

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. Ir. A. Suarda, M.Si**

Sekretaris : **drh. Aminah Hajah Thaha, M. Si**

Munaqisyi I : **Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si**

Munaqisyi II : **Dr. Muh. Thahir Maloko, M.H.**

Pembimbing I : **Muh Nurhidayat, S.Pt., M.P.**

Pembimbing II : **Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si.**



Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kepada Allah SWT karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul “**Performa Broiler Yang diberikan Antibiotik Dan Probiotik**” yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa terucapkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya insyaAllah. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberi dukungan, do’a, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menggingjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do’a, serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada ayahanda **Abd. Razak** dan ibunda tercinta **Hadawiah** yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang menbesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini

Terselesainya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala

kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.** selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Ir. Basir Paly, M.Si** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak **Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P** selaku dosen pembimbing pertama, dan ibu **Rasyidah Mappangnganro, S.Pt., M.P** selaku dosen pembimbing kedua, atas bimbingannya dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis penyusun proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingannya dalam kegiatan perkuliahan, baik didalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. Bapak **Dr. Ir. Basir Paly, M.Si**, dan **Thahir Maloko M.Hi.** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulis dan penyusunan skripsi ini
7. Teman-teman penelitian **Bacitracin Skuad, Rustan, Sultan, rahma, uni, febri, isma dan eka.** Penulis sangat berterima kasih atas kerja sama dan kebersamaan dalam proses berjalannya penelitian selama 35 hari lamanya, banyak hal yang tidak bisa di lupakan dari awal hingga berakhirnya penelitian

dan banyak pula cerita yang menarik yang akan tersimpan dalam memori masing-masing.

8. Teman-teman seperjuangan **E14NG B** di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. **Adli Ismirandy, Ulil Albab Syamsur, Abdul Rahman, Dadang Kurniawan, Arfah, Rustan, Sultan Akbar wahidin, Khaerullah, Hedar Ali, Zulfikar T, Khaerul Anwar, Muh Arfah, Iswandi R, Bahtiar, Dian, Nur Mutmainnah, Riskayanti, Khusnul Khatimah, Andi Apriana Azis, Ama Amelia Arianto, Titin Aprilia Fani, Riska Nurmayanti, Sri Irmawati, Rosita Rajak, dan Satrina.**
9. Teman-teman **E14NG** dari maba sampai sekarang terima kasih sudah menerima penulis untuk menjadi bagian dari **E14NG**. Canda dan tawa serta kebersamaan yang tidak akan di lupakan juga kepada para kakanda dewan senior **2011-2013** dan adinda **2015-2017**.
10. Kakanda yang teristimewa **Muh. Arsan Jamili S.Pt M.P**, dan sang istri **Hikmawati S.Pt.** yang telah banyak memberikan saran-saran dan membantu di dalam laboratorium terkhusus dalam proses penelitian.
11. Buat teman-teman KKN 58 Desa Kale ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar. **Husni, Aksan Syafrisal, Askar Nur, Elma Ariyana Hamzah, Nurjannah, Anis Mawarni, Jumriani Dan Annisa f. Assakhirah.** Juga teman-teman yang berada di desa kale ko'mara Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah memeberikan support sehingga terselesainya skirpsi ini.

mungucapkan banyak terima kasih karena telah memeberikan support sehingga terselesainya skirpsi ini.

12. Teman-teman **Amitater** yang memberikan kebersamaan yang luar biasa bagi penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin


Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Samata-Gowa Agustus 2018

Penulis



SYARIF HIDAYATULAAH
NIM: 60700114053



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRAC.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat penelitian.....	3
E. Defenisi Operasional.....	4
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
G. Hipotesis.....	5
H. Kajian Terdahulu.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Alqur'an.....	8
1. Tinjauan Al-Quran Tentang Hewan Ternak.....	8
2. Tinjauan Alquran Tentang Mikroorganisme.....	9
B. Broiler.....	12
C. Antibiotik.....	15
D. Probiotik.....	20

E. Performa Broiler.....	23
1. Konsumsi Ransum.....	23
2. Pertambahan Bobot Badan.....	27
3. Konversi Ransum.....	29
4. Mortalitas.....	31
5. Konsumsi Air Minum.....	33
6. Bobot Badan Akhir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Waktu dan Tempat.....	35
B. Alat Dan Bahan.....	35
C. Jenis Penelitian.....	35
D. Metode Penelitian.....	36
1. Rancangan Penelitian.....	36
2. Persiapan dan Pemeliharaan Broiler.....	36
E. Parameter Yang Diukur.....	38
1. Perhitungan Konsumsi Ransum.....	38
2. Pertambahan Bobot Badan.....	39
3. Konversi Ransum.....	39
4. Mortalitas.....	40
5. Konsumsi Air Minum.....	40
6. Bobot Badan Akhir.....	40
F. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42

A. Hasil.....	42
B. Pembahasan.....	43
1. Konsumsi Ransum.....	43
2. Pertambahan Bobot Badan.....	45
3. Konversi Ransum.....	47
4. Mortalitas.....	48
5. Konsumsi Air Minum.....	49
6. Bobot Badan Akhir.....	50
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	60
RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Rata-Rata Suhu Lingkungan Yang Di Rekomendasikan Untuk Pertumbuhan.....	15
2.	Daftar Imbuan Pakan Yang Diizinkan Beredar Di Indonesia.....	20
3.	Kebutuhan Nutrisi Broiler Periode Starter.....	26
4.	Kebutuhan Nutrisi Broiler Periode Finisher.....	27
5.	Bahan Penyusun Ransum Penelitian.....	39
6.	Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian.....	39
7.	Rataan Konsumsi Ransum, Pertambahan Berat Badan, Konversi Ransum, Konsumsi Air Minum, Berat Badan Akhir Dan Mortalitas.....	43



DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Persiapan Kandang	68
2.	DOC (Day Old Chick).....	68
3.	Penimbangan DOC (Day Old Chick).....	69
4.	Vaksinasi.....	69
5.	Bahan Ransum.....	70
6.	Pakan Di Gantung Di Setiap Sekat.....	70
7.	Antibiotik Zinc Bacitracin.....	71
8.	Probiotik.....	71
9.	Penimbangan Ayam.....	72
10.	Pengukuran Sisa Air Minum.....	72
11.	Penimbangan Sisa Ransum.....	73

ABSTRAK

Nama : Syarif Hidayatullah
Nim : 60700114053
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : **Performa Broiler yang diberikan Antibiotik dan Probiotik**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian antibiotik dan probiotik terhadap performa broiler. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan, parameter yang diukur yaitu konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konversi ransum, konsumsi air minum, mortalitas dan berat badan akhir. Perlakuan dalam penelitian ini yaitu, (P₀) Ransum basal (kontrol), (P₁) Ransum basal + Probiotik 1,5 ml/hari, (1-35 hari), (P₂) Ransum basal + Antibiotik 0,1 g/hari, (1-35 hari), (P₃) Ransum basal + Antibiotik 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik 1,5 ml/hari, (22-35 hari). Hasil penelitian pemberian antibiotik dan probiotik tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P > 0,05$) terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konversi ransum, konsumsi air minum, mortalitas dan bobot badan akhir.

Kata Kunci : *Antibiotik, Probiotik, Performa, Broiler*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Syarif Hidayatullah
Nim : 60700114053
Department : Animal Husbandry
Title Thesis : Broiler Performance Antibiotics and Probiotics.

This study aims to determine the administration of antibiotics and probiotics to the performance of broilers. The method used in this study is an experimental method, this study used a completely randomized design (CRD) consisting of 4 treatments and 3 replications, the parameters measured were feed consumption, body weight gain, feed conversion, drinking water consumption, mortality and weight end. The treatments in this study were, (P₀) Basal ration (control), (P₁) Basal ration + Probiotics 1.5 ml / day, (1-35 days), (P₂) Basal ration + Antibiotics 0.1 g / day, (1-35 days), (P₃) Basal ration + Antibiotics 0.1 g / day, (1-21 days) + Probiotics 1.5 ml / day, (22-35 days). The results of the study of antibiotics and probiotics did not give a significant effect ($P > 0.05$) on feed consumption, body weight gain, feed conversion, drinking water consumption, mortality and final body weight.

Keywords: *Antibiotics, Probiotics, Performance, Broilers*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Broiler merupakan ayam ras pedaging yang waktu pemeliharaannya relatif singkat, dari 3 sampai 4 minggu sudah dapat dipanen. Populasi *broiler* perlu ditingkatkan karena *broiler* merupakan salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan masyarakat sehingga dengan meningkatnya populasi *broiler* konsumsi protein hewani dimasyarakat dapat terpenuhi.

Broiler adalah unggas hasil rekayasa genetika yang memiliki karakteristik pertumbuhan cepat per satuan waktu serta menghasilkan kualitas daging dengan serat yang lunak. Menurut kecepatan pertumbuhannya, maka periode pemeliharaan broiler dapat dibagi menjadi dua yaitu periode *starter* dan *finisher*. Periode *starter* dimulai umur 1--21 hari dan periode *finisher* dimulai umur 22--35 atau sesuai umur dan bobot potong yang diinginkan (Murwarni, 2010).

Penggunaan imbuhan pakan (*Feed additive*) dalam ransum bertujuan untuk meningkatkan daya guna pakan. Imbuhan pakan yang sering dipakai selama ini adalah antibiotik yang berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan (growth promotor) agar dapat meningkatkan performa dan efisiensi ransum. Penggunaan antibiotik pada ternak di beberapa negara di Eropa seperti golongan *Virgiamycin*, *Avopracin*, *Bacitracin*, *Tylocin* dan *Spiramycin* sudah dilarang karena adanya residu pada hasil ternak yang dapat membahayakan konsumen (Barton dan Hart, 2001).

Akhir-akhir ini penggunaan senyawa antibiotik dalam ransum telah menjadi perdebatan sengit oleh para ilmuwan akibat efek buruk yang di timbulkan tidak hanya bagi ternak berupa resistensi terhadap antibiotik tetapi juga bagi konsumen yang mengkonsumsi produk ternak tersebut melalui residu yang di tinggalkan pada produk daging, susu maupun telur (Salmadi, 2004).

Perhatian terhadap resistensi anti mikrobia sebenarnya telah lama di lakukan, namun saat ini perhatian tersebut meningkat berkaitan dengan meningkatnya prevalensi infeksi mikrobia yang resisten terhadap antibiotik pada manusia (Revington, 2002).

Kesadaran masyarakat akan produk peternakan yang aman dan sehat yaitu produk peternakan yang bebas dari residu obat-obatan dan bebas dari patogen menyebabkan perlunya dicari bahan alternatif pengganti obat-obatan tersebut. broiler merupakan ayam yang ditujukan untuk menghasilkan daging, penggunaan pakan lebih efisien dan dapat tumbuh dengan cepat, sehingga dapat dijual dalam waktu singkat (Scanes *et al.*, 2004). Produksi broiler tidak terlepas dari penggunaan antibiotik sebagai obat maupun sebagai pemacu pertumbuhan Karena broiler sangat rentan terhadap patogen akibat kepadatan kandang tinggi yang menyebabkan ternak menjadi stress, padahal penggunaan antibiotik yang kurang terkontrol akan meninggalkan residu dan menyebabkan mikroba patogen menjadi resisten terhadap antibiotik. Hal ini tentu saja sangat membahayakan kesehatan manusia sebagai konsumen produk peternakan. Selain sebagai *growth promotor*, antibiotik juga digunakan sebagai obat yang diberikan dalam ransum ayam broiler untuk mengatasi masalah kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri *E. coli*.

Kolibasilosis dapat terjadi pada semua umur ayam. Pada anak broiler sampai umur 3 minggu, *Kolibasilosis* menyebabkan kematian dengan gejala omphalitis. broiler yang pernah terinfeksi *E. coli* dapat menjadi pembawa (carrier) sehingga penyakit ini mudah kambuh di kemudian hari. Kolibasilosis dapat menyebabkan kematian yang terjadi selama periode pemeliharaan dan perolehan berat badan saat panen yang rendah. Antibiotik yang biasa digunakan dalam ransum ayam broiler untuk mencegah *Kolibasilosis* adalah *Bambermycin*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pemberian antibiotik dan probiotik terhadap performa broiler.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian antibiotik dan probiotik terhadap performa broiler.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai pengetahuan tambahan bagi masyarakat mengenai manfaat antibiotik dan probiotik sebagai pakan aditif yang dapat meningkatkan performa pada broiler.
2. Sebagai sumber referensi, bagi mahasiswa peneliti dan lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan tentang manfaat antibiotik dan probiotik.
3. Menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan bagi perusahaan peternakan broiler di perusahaan sehingga dapat menerapkan tambahan pakan

antibiotik dan probiotik bagi broiler agar kualitas daging yang dijual semakin meningkat.

E. Defenisi Operasional

1. Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup secara sintesis kimia dengan konsentrasi rendah mempunyai kemampuan menghambat bahkan membunuh mikroorganisme lain.
2. Probiotik adalah mikroba hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan dengan tujuan memperbaiki kesehatan dan perkembangan mikroba, Penggunaan probiotik di kalangan peternak ayam telah banyak dilakukan karena mempunyai berbagai fungsi, antara lain mampu meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, mencegah radang usus dan diare, meningkatkan produksi telur dan memperbaiki kualitas telur.
3. Performa broiler merupakan parameter yang penting untuk di ketahui dalam mencapai produksi pada pemeliharaan ayam dalam satu periode pemeliharaan. Faktor-faktor yang memepengaruhi perfoma pada broiler meliputi komsumsi pakan, penambahan bobot badan ayam, serta konversi pakan.
4. Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu. Konsumsi pakan merupakan kegiatan masuknya sejumlah unsur nutrisi yang ada di dalam ransum yang telah tersusun dari berbagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi broiler.
5. Pertambahan bobot badan adalah pertambahan dalam bentuk dan bobot jaringan-jaringan tubuh seperti urat daging, tulang, jantung, otak, dan

semua jaringan-jaringan tubuh lainnya (kecuali lemak). Pertambahan bobot badan merupakan salah satu kriteria yang di gunakan untuk mengukur pertumbuhan.

6. Konversi pakan merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang di konsumsi (gram) dengan produksi daging yang di dihasilkan.
7. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan.
8. Air minum adalah elemen yang paling penting bagi makhluk hidup yang berfungsi yaitu sebagai cairan tubuh, mengangkat zat-zat makanan, membuang sisa-sisa metabolisme melalui air kencing dan kotoran serta pengaturan suhu tubuh ternak.
9. Bobot badan akhir dihitung dengan menimbang berat hidup broiler pada akhir penelitian.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh antibiotik dan probiotik terhadap performa broiler.

G. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian antibiotik dan probiotik memberikan pengaruh nyata terhadap performa broiler.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian Astuti *et al.*, (2015), tentang pengaruh penambahan probiotik cair dalam pakan terhadap penampilan produksi pada broiler bertujuan mengetahui pengaruh penambahan probiotik cair dalam pakan broiler terhadap penampilan produksi broiler. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan probiotik cair dalam pakan dapat menurunkan konsumsi pakan, konsumsi protein, konversi pakan, mortalitas dan meningkatkan pertambahan bobot badan, dan presentase karkas ayam pedaging.

Penelitian Agustina *et al.*, (2007). Penggunaan probiotik (*Lactobaccillus s.p*) sebagai imbuhan pakan broiler. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa tidak ada perbedaan performans antara perlakuan pemberian probiotik dan tanpa diberi probiotik, walaupun terdapat kecenderungan perlakuan P1 (2,5 cc/l air minum) lebih baik secara biologis. Namun demikian manfaat penggunaan probiotik dapat menekan jumlah kematian broiler.

Penelitian Ardianto *et al.*, (2012). Pengaruh penambahan probiotik dalam air minum terhadap penampilan produksi broiler. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa Penggunaan probiotik *Probiss* dalam air minum dapat meningkatkan konsumsi air minum, tetapi tidak dapat meningkatkan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi pakan pada broiler. Penambahan probiotik *probiss* yang terbaik dalam air minum sebesar 15 ml/L.

Penelitian Nuraini (2010). Performa broiler yang diberi ransum dengan penambahan prebiotik dari tongkol jagung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Penambahan prebiotik memiliki peranan dalam mengurangi penggunaan

antibiotik dan efektif digunakan dalam ransum ayam broiler untuk menekan tingkat mortalitas ayam broiler. Penambahan prebiotik dari tongkol jagung dalam ransum broiler tidak memberikan pengaruh terhadap performa, persentase karkas.

Penelitian Prawitya *et al.*, (2014). Pengaruh penambahan probiotik *lactobacillus* sp. bentuk tepung dalam pakan terhadap kualitas telur ayam petelur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Penambahan probiotik *Lactobacillus* sp. bentuk tepung dalam pakan mampu meningkatkan penampilan produksi ayam petelur. Level penggunaan probiotik *Lactobacillus* sp. bentuk tepung sebesar 0,2% merupakan hasil terbaik terhadap performa ayam petelur akan tetapi pengamatan menunjukkan bahwa penambahan probiotik *Lactobacillus* sp. bentuk tepung dalam pakan tidak berpengaruh nyata pada konsumsi pakan diduga karena tidak terlalu merubah kandungan zat makanan sehingga masih bisa ditoleransi oleh ayam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Al-Qur'an

1. Tinjauan Al-Qur'an Tentang hewan ternak

Allah swt berfirman dalam QS An- Nahl/16:5 mengenai ternak yang berbunyi

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan hewan ternak telah di ciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan. (An-Nahl: 5)

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu termaksud didalamnya binatang ternak serta hasil ikutannya dengan memiliki manfaat masing-masing dan memerintahkan agar sahnya kita menggunakan atau memanfaatkannya dengan sebaik mungkin (Kementrian Agama RI, 2002).

Allah swt berfirman dalam QS Gafir/40: 79 mengenai ternak yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ ٧٩

Terjemahnya:

Allahlah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan (QS Gafir: 79)

Ayat di atas menjelaskan tentang manfaat binatang ternak untuk manusia yaitu sebagai kendaraan dan sebagai makanan. Produk daging yang dikonsumsi

masyarakat adalah ayam broiler ayam broiler adalah salah satu komoditas penghasil daging yang cukup potensial dari golongan unggas yang mengalami perkembangan yang cukup baik (Kementerian Agama RI, 2002).

Allah swt juga berfirman dalam QS Asy-Syura /42:11 mengenai ternak yang berbunyi:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya

Allah Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasang-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasang-pasangan (juga). Di jadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada susuatupun yang serupa dengan Dia. Dan Dia maha mendengar, maha melihat. (As-Syurah:11)

Maksud ayat tersebut adalah menjelaskan bagaimana Allah swt telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan dengan proses berkembangbiakan melalui proses reproduksi. Reproduksi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ternak karena keberhasilan peternakan sebagian besar tergantung pada keberhasilan reproduksi. Betapa pentingnya proses reproduksi bagi usaha peternakan bila mengingat bahwa tanpa adanya reproduksi, mustahil produksi ternak dapat diharapkan mencapai maksimal. Selain itu, juga dijelaskan bahwa binatang ternak dipelihara dengan baik kemudian dalam memeliharanya ternak tersebut tidak siksa (Shihab, 2015)

2. Tinjauan Al-Quran tentang mikroorganisme

Mikroorganisme merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah swt yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Salah satu produknya

adalah probiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak tanpa mengakibatkan terjadinya proses penyerapan komponen probiotik dalam tubuh ternak (Kementrian Agama, 2002).

Sebagaimana firman Allah swt dal Q.S. An-Nuur ayat 45 surat 24 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



Terjemahan:

Dan Allah Telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Menegaskan bahwa disamping bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugrah-Nya, Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air yang memancar sebagaimana dia menciptakan tumbuhan dari air tercurah. Lalu Allah menjadikan hewan-hewan itu beraneka ragam jenis, potensi dan fungsinya, termasuk bakteri.

Allah mengerahkan perhatian manusia supaya memperhatikan binatang-binatang termasuk bakteri yang bermacam-macam jenis dan bentuknya. Dia telah menciptakan semua jenis binatang itu dari air. Ternyata memang air itulah yang menjadi pokok bagi kehidupan binatang dan sebagian besar dari unsur-unsur yang ada dalam tubuhnya dalam air, dan tidak akan dapat bertahan dalam hidupnya tanpa air. Allah menerangkan bahwa dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya

bukan saja binatang-binatang yang berkaki banyak tetapi mencakup semua binatang dengan berbagai macam bentuk termasuk bakteri (Kementerian Agama RI, 2002).

Allah SWT, berfirman dalam surah Al-Baqarah/1:26 mengenai mikroorganisme/ bakteri yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata “Apa maksud Allah dari perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang di biarkannya sesat, dan dengan itu banyak (pula) orang yang di beri-Nya petunjuk. Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik.

Maksud ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT kuasa untuk menciptakan apa saja, yaitu penciptaan apapun dengan onyek apa saja, baik yang besar maupun yang lebih kecil. Allah SWT tidak pernah menganggap remeh sesuatupun yang Dia ciptakan meskipun hal itu kecil. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dalam perumpamaan penciptaan yang di lakukan oleh Allah SWT memiliki manfaat bagi kehidupan manusia (Al-Mubarak, 2006). Sebagaimana Allah SWT menciptakan bakteri meskipun memiliki ukuran yang sangat kecil tetapi memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan.

B. Broiler

Broiler merupakan ayam yang ditujukan untuk menghasilkan daging, penggunaan pakan lebih efisien dan dapat tumbuh dengan cepat, sehingga dapat dijual dalam waktu singkat (Scanes *et al.*, 2004). Broiler merupakan *strain* ayam hibrida modern yang berjenis kelamin jantan dan betina yang dikembangkan oleh perusahaan pembibitan khusus (Gordon dan Charles, 2002). Menurut Amrullah (2004), broiler yang dipelihara sekarang ini termasuk ke dalam *Gallus domesticus*. Pada akhir masa pemeliharaan selama 6 minggu, seharusnya broiler memiliki bobot hidup 2,3 kg, dengan nilai konversi ransum sekitar 1,75 dan tingkat mortalitas selama pemeliharaan di bawah 3% (Scanes *et al.*, 2004).

Broiler termasuk ke dalam ordo *Galliformes*, famili *Phasianidae* dan spesies *Gallus domesticus* yang dihasilkan dari bangsa ayam tipe berat *Cornish*. Broiler merupakan ayam tipe berat pedaging yang lebih muda dan berukuran lebih kecil, dapat tumbuh sangat cepat sehingga dapat dipanen pada umur 4 minggu yang ditujukan untuk menghasilkan daging dan menguntungkan secara ekonomis jika dibesarkan (Amrullah, 2004). Broiler dipasarkan pada bobot hidup antara 1,3-1,6 kg per ekor ayam dan dilakukan pada umur 5-6 minggu karena broiler yang terlalu berat sulit dijual (Rasyaf, 2003). Pertumbuhan broiler dimulai sejak menetas sampai umur 8 minggu, setelah itu pertumbuhan akan menurun (Bell dan Weaver, 2002).

Broiler memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi,

efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan penambahan bobot badan sangat cepat. Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit dan sulit beradaptasi (Murtidjo, 1993). Broiler 10 mampu memproduksi daging secara optimal dengan hanya mengonsumsi pakan dalam jumlah relatif sedikit. Ciri-ciri ayam broiler antara lain: ukuran 10 badan relatif besar, padat, kompak, berdaging penuh, produksi telur rendah, bergerak lamban, dan tenang serta lambat dewasa kelamin. Broiler baru dikenal menjelang periode 1980-an, sekalipun galur murninya sudah diketahui pada tahun 1960-an ketika peternak mulai memeliharanya. Akan tetapi, broiler komersial seperti sekarang ini memang baru populer pada periode 1980-an. Sebelum ayam yang dipotong adalah ayam petelur seperti ayam *White leghorn* jengger tunggal. Pada akhir periode 1980-an pemegang kekuasaan mencanangkan penggalakan konsumsi daging ayam untuk menggantikan atau membantu konsumsi daging ruminansia yang saat itu semakin sulit keberadaannya. Dari sinilah broiler komersial atau broiler final stock mulai dikenal dan secara perlahan mulai diterima orang (Rasyaf, 2006).

Poultry Indonesia (2003) menyebutkan bahwa saat ini ada beberapa *strain* ayam pedaging yang banyak terdapat di Indonesia diantaranya *Cobb*, *Hubbard*, *New Lohmann*, *Ross* dan *Hybro*. *Strain Cobb* merupakan bibit broiler yang paling populer saat ini di dunia, *strain* ini adalah produk hasil riset dalam jangka waktu yang cukup 24 lama dengan menggunakan teknologi modern yang telah dikembangkan lebih dari 15 tahun. Mulyantono (2003) mengungkapkan

keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh *strain Cobb*. Keunggulan yang dimiliki oleh *strain Cobb* adalah daya hidup mencapai 98%, bobot badan (38 hari) mencapai 1,7 kg, konversi pakan mencapai 1,8, manajemen pemeliharaan relatif mudah, kualitas sepanjang tahun relatif stabil dan manajemen transportasi DOC bagus. Kelemahan *strain Cobb* adalah jumlah produksi masih terbatas, pertumbuhan bobot badan sampai umur empat minggu cenderung lambat, sedangkan keunggulan *strain Cobb* menurut Cobb-Vantress (2007) antara lain tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, kualitas daging yang baik, nilai konversi pakan yang rendah dan dapat meminimalkan biaya produksi sehingga meningkatkan pendapatan peternak.

Amrullah (2004) mengatakan bahwa performa ayam broiler akan berbeda menurut tempat ayam broiler itu dipelihara. Perbedaan ini muncul karena perbedaan ketinggian atau suhu lingkungan sekitar kandang. North dan Bell (1990) melaporkan bahwa ayam broiler mulai *panting* pada kondisi lingkungan 29oC atau ketika suhu tubuh ayam mencapai 42oC. Suhu lingkungan yang nyaman sesuai kebutuhan ternak untuk menghasilkan produksi optimum sesuai umur ayam broiler disajikan pada Tabel 1.

Suhu lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan kesehatan ternak terganggu karena mengganggu proses homeostasis (Scott *et al.*, 1982). Selain faktor suhu, status penyakit suatu wilayah juga mempengaruhi performa terutama angka mortalitas. Daerah yang suhunya tinggi lebih cocok jika menggunakan ransum dengan kandungan energi yang lebih rendah. Wilayah yang endemik

dengan penyakit tertentu akan mendapat perhatian dalam program vaksinasi, jenis vaksin, dan obat yang digunakan.

Tabel 1. Rata-rata Suhu Lingkungan yang Direkomendasikan untuk Pertumbuhan

Umur (minggu)	Suhu rekomendasi ($^{\circ}\text{C}$)
1	30
2	30
3	27,2
≥ 4	23,9

Sumber: North dan Bell (1990)

C. Antibiotik

Antibiotik adalah komponen kimia yang diproduksi secara biologi oleh organisme seperti jamur atau fungi, bakteri dan tumbuhan yang mempunyai sifat bakteristatik atau bakteriosidal (Scanes *et al.*, 2004). Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup secara sintesis kimia dengan konsentrasi rendah mempunyai kemampuan menghambat bahkan membunuh mikroorganisme lain (Cheeke, 2003).

Antibiotik adalah komponen kimia yang diproduksi secara biologis oleh tumbuhan atau mikroorganisme terutama fungi, mempunyai sifat bakteristatik atau bakteriosidal (Leeson dan Summer, 2001).

Sifat kerja antibiotik secara umum menurut Brander *et al.*, (1991) di bagi dua yaitu:

1. Bakteristatik


Termasuk dalam kelompok ini adalah sulfanilamide, tetrasiklin, kloramfenikol dan eritromisin. Dalam hal ini sifat kerja antibiotik menghambat pertumbuhan bakteri sehingga perlawanan terhadap bakteri dilakukan oleh

perlawanan mekanisme pertahanan tubuh. Cara kerja seperti ini tergantung dari ketahanan tubuh ternak dan jika berhasil dengan baik maka di harapkan tubuh telah mempunyai system tangkap kebal terhadap mikroba tersebut. Cara kerja ini kurang begitu berhasil jika di terapkan pada ternak yang sangat tua, sangat muda, sangat lemah atau dilemahkan penyakit yan dideritanya.

2. Sifat bakteriasidal

Termasuk di dalamnya adalah penisilin dan derifatnya, streptomisin, flavomisin, kolostin, kanamisin, basitrasin dan sepalosporin. Dalam hal ini sifat kerja antibiotik selain menghambat pertumbuhan bakteri sekaligus membunuh bakteri penyebab penyakit sehingga banyak di pakai untuk terapi.

Bacitracin merupakan antibiotik polipeptida yang diproduksi dari bakteri gram positif (Johnson *et al.*, 1945). Menurut Subronto dan Tjahajati (2001), bacitracin pertama kali diisolasi dari *Bacillus subtilis* dan tersusun dari polipeptida kompleks. Bacitracin bersifat *bakterisidal* terhadap bakteri Gram positif dan tidak aktif terhadap bakteri Gram negatif. Bakteri Gram negatif terdiri dari *Escherichia coli* penyebab *colibacillosis*, *Salmonella pullorum* penyebab *pullorum* (berak kapur), *Salmonella gallinarum* penyebab *fowl typhoid (typhus)*, *Pasteurella gallinarum* penyebab kolera dan *Haemophilus paragallinarum* penyebab *coryza*, sedangkan bakteri gram positif terdiri dari *Mycobacterium tuberculosis* penyebab *avian tuberculosis*, *Staphylococcus aureus* penyebab *staphylococcosis* dan *Streptococcus faecalis* penyebab *streptococcosis* (Retno *et al.*, 1998). Struktur Bacitracin dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Bacitracin (Johnson *et al.*, 1945)

Tempat utama aktivitas antibiotika adalah dalam bagian *gastrointestinal*. Beberapa macam antibiotik yang dapat dicampurkan ke dalam ransum antara lain *Bacitracin*, *Colistin*, *Oxytetracycline*, *Kitasamycin* dan *Spiramycin*. Antibiotik umumnya digunakan sebagai pengobatan terhadap infeksi bakteri, namun demikian penggunaan antibiotik dalam dosis rendah dapat menimbulkan pengaruh pemacu pertumbuhan (growth promotor). Antibiotik dengan dosis rendah juga digunakan untuk meningkatkan performa dan kesehatan saluran pencernaan misalnya bambermycin atau flavophospholipol, sedangkan antibiotik dengan konsentrasi tinggi digunakan untuk pengobatan suatu penyakit atau beberapa penyakit (Bolder *et al.*, 1999).

Menurut Siswandono dan Soekardjo (1995) cara kerja antibiotik adalah sebagai berikut: (1) Menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang memproduksi toksin diantaranya menghalangi atau membunuh mikroorganisme yang menimbulkan infeksi subklinis dan yang bersaing dengan induk semang dalam menyediakan nutrien. (2) Meningkatkan kapasitas daya serap usus, hal tersebut berdasarkan pada pengamatan bahwa pemberian antibiotik menyebabkan

dinding usus menjadi tipis sehingga daya serap usus akan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh semakin meningkat. Penggunaan antibiotik memiliki efek antara lain: (1) Antibiotik dapat mencegah penyakit terutama dalam saluran pencernaan. (2) Antibiotik dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menghasilkan amonia dalam jumlah besar. (3) Antibiotik dapat meningkatkan penyerapan nutrisi (kalsium, fosfor dan magnesium) dan menghambat kerusakan nutrisi (vitamin dan asam amino) oleh mikroorganisme. (4) Antibiotik dapat meningkatkan kemampuan absorpsi zat makanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum (Leeson dan Summers, 2001)

Pemakaian antibiotika dosis kecil dalam pakan untuk memacu pertumbuhan ternak telah dilakukan lebih dari setengah abad yang lalu. Kenyataan menunjukkan bahwa antibiotika dalam dosis yang sangat kecil dapat mempercepat pertumbuhan ternak, sehingga menyebabkan timbulnya kelonggaran dalam memperoleh antibiotika untuk dipergunakan dalam bidang peternakan . Akan tetapi timbulnya kasus resistensi Salmonella pada tahun 1960 telah mendorong untuk berpikir tentang kerugian dan keuntungan pemakaian antibiotika dalam bidang peternakan . Pada bulan Juli 1968 dibentuk suatu komisi di Inggris, yang diberi nama Swann Committee, yang bertugas membahas pemakaian antibiotika dalam bidang peternakan (Phillips, *et. al.* 2005) .

Perkembangan genetik broiler semakin pesat, sehingga broiler tidak lagi dipotong pada umur 35 hari tetapi menjadi lebih cepat yaitu 29 hari. Pertumbuhan yang cepat tersebut diikuti oleh menurunnya daya tahan tubuh broiler, sehingga diperlukan *feed additive* kedalam ransum untuk meningkatkan pertumbuhan dan

daya tahan tubuh broiler (Keirs *et al.*, 2002). Industri peternakan broiler saat ini senantiasa meningkatkan mutu produksinya dengan mengadopsi ilmu dan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 80% penggunaan antibiotika pada ternak unggas. Industri broiler umumnya menggunakan *feed additive* berupa antibiotika dengan tujuan meningkatkan produktivitas produk mereka (Bahri dkk., 2005).

Imbuan pakan yang telah diizinkan beredar di Indonesia dibedakan atas kelompok antibiotika dan kelompok non antibiotika . Dari kelompok antibiotika berdasarkan SK Dirjen Peternakan tertanggal 23 Juli 1991, telah terdaftar sebanyak 19 jenis dan dari kelompok non antibiotika terdaftar sebanyak 25 jenis, seperti yang terlihat pada tabel 2. (Wattimena, *et. al.* 1991).

Tabel 2 : Daftar imbuan pakan yang diizinkan beredar di Indonesia

Golongan Non Antibiotika	Golongan antibiotika
Aklomide	Zink Basitrasin
Amprolium	Virginiamisin
Butinorat	Flavomisin
Klopidol	Higromisin
Dequinate	Monensin
Etopabate	Salinomisin
Levamisole	Spiramisin
Piperasin basa	Kitasamisin
Tetramisol	Tiamulin hidrogen fumarat
Robenidin	Tilosin
Roksarson	Lasalosid
Sulfaklopirasin	Avilamisin
Sulfadimetoksin	Avoparsin
Sulfanitran	Envamisin
Sulfaquinoksaline	Kolistin sulfat
Buquinolate	Linkomisin hidroklorida
Nitrofurason	Maduramisin
Furasolidon	Narasin
Phenotiasin	Nastatin
Halquinol	
Pirantel tatra	

Olaquindoks
Alumunium silikat
Nitrovina
Piperasin sitrat

Sumber: Invovet, 2004

D. Probiotik

Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang diaplikasikan secara oral dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ternak dengan cara memanipulasi komposisi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan ternak. Alternatif penggunaan probiotik yang dilakukan oleh para peternak karena beberapa negara telah melakukan pelarangan penggunaan antibiotika sebagai *Growth promotor* serta kecenderungan terjadinya resistensi bakteri-bakteri patogen terhadap antibiotika tertentu (Revolledo *et al.*, 2006).

Probiotik dapat berperan dalam membantu mengoptimalkan fungsi saluran pencernaan untuk mencerna dan menyerap nutrisi pakan. Bakteri Asam Laktat (BAL) dalam kondisi asam menghasilkan produk metabolit yang dapat menurunkan pH daging (Wiryawan, 2003).

Pemberian probiotik pada ternak unggas biasanya diberikan dalam bentuk campuran ransum atau diberikan melalui air minum, atau dalam bentuk probiotik yang hanya mengandung satu macam mikroba saja atau dalam bentuk campuran terdiri dari beberapa mikroba seperti *Probiolac* atau *Protexin*. Beberapa keuntungan dari penggunaan probiotik pada hewan atau ternak antara lain adalah dapat memacu pertumbuhan, memperbaiki konversi ransum, mengontrol kesehatan. Saat ini telah beredar produk probiotik yang mengandung mikroba *Lipolitik*, *Selulolitik*, *Lignolitik*, dan mikroba asam lambung. Beberapa penelitian

pada broiler menunjukkan bahwa penambahan probiotik dalam ransum dapat meningkatkan pertumbuhan bobot badan, menurunkan konversi pakan dan mortalitas. Probiotik dapat mengubah pergerakan pada populasi mikroba di dalam usus halus ayam, sehingga keberadaannya dapat meningkatkan fungsi dan kesehatan usus, memperbaiki mikroflora pada sekum, serta meningkatkan penyerapan zat makanan (Mountzouris *et al.*, 2010).

Di dalam saluran pencernaan baik hewan, ternak atau manusia terdapat sekitar 100 sampai 400 jenis mikroba, yang secara sederhana dikelompokkan dalam mikroba menguntungkan dan mikroba yang merugikan dan dapat menyebabkan penyakit atau mikroba patogen. Semua mikroba hidup dalam keseimbangan. Jika keseimbangan terganggu, misalnya mikroba tidak menguntungkan lebih banyak dibandingkan dengan mikroba menguntungkan, maka timbulah penyakit. Pemberian probiotik telah dikemukakan dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki keseimbangan populasi mikroba didalam saluran pencernaan hewan, dimana mikroba-mikroba yang menguntungkan populasinya lebih tinggi dari populasi mikroba yang merugikan. Pada manusia, perbandingan persentase jumlah mikroba yang baik yang dianjurkan adalah sekitar 85:15. Perbandingan tersebut tentu saja dapat dicapai dengan pemberian atau penggunaan probiotik dan prebiotika (Budiansyah, 2004).

Keseimbangan mikroorganisme usus di capai apabila perbandingan antara mikroorganisme yang menguntungkan dan mikroorganisme yang merugikan sebesar 80% : 20% Manap (1998), atau 85% : 15% (Philip, 1993).

Menurut Citreksoko (1993), terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi pemberian probiotik pada ternak dan yang telah menunjukkan pengaruh positif pada ternak adalah: 1. Bahwa pada ternak yang bebas hama (*Germfree*) kondisinya lebih rentan terhadap penyakit dibanding ternak normal. 2. Telah diketahui bahwa pemberian antibiotik pada ternak akan menurunkan resistensinya terhadap penyakit. 3. Resistensi terhadap penyakit pada ayam dapat diperbaiki, bahkan *Salmonella* dapat dihilangkan melalui pemberian larutan kotoran ayam dewasa pada anak ayam yang baru menetas.

Menurut Riley (1996), mikroorganisme yang dapat di manfaatkan sebagai probiotik harus memenuhi kriteria, yaitu tidak toksik, mampu bertahan pada suasana asam dan cairan empedu, dapat berkoloni di dalam usus, dapat tumbuh lama dan menghambat mikroba patogen dan dapat hidup pada berbagai kondisi dalam tubuh ternak.

Prinsip kerja probiotik yaitu dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia maupun hewan. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi yang diperoleh dari hasil perombakan molekul kompleks (Medicinus, 2009).

Sjofjan (2003) menyatakan bahwa pemberian probiotik berguna dalam meningkatkan produktivitas, mencegah penyakit dan mengurangi penggunaan

antibiotik bahkan dapat mengurangi bau amonia didalam kandang. Probiotik bekerja menstimulasi mukosa dan meningkatkan sistem kekebalan hewan inang. Kemampuan mikroorganismen probiotik dalam meningkatkan kekebalan hewan inang adalah dengan cara mengeluarkan toksin yang menghambat pertumbuhan mikroorganismen patogen dalam saluran pencernaan. Toksin – toksin yang dihasilkan tersebut merupakan antibiotik bagi mikroorganismen patogen, sehingga penyakit yang ditimbulkan oleh mikroorganismen tersebut dapat hilang. Hal ini memberikan keuntungan terhadap kesehatan inang sehingga tahan terhadap serangan penyakit (Budiansyah, 2004).

Penelitian tentang pemberian antibiotik di bandingkan dengan antibiotik dalam ransum ayam broiler telah di lakukan oleh yeo dan kim (1997), yaitu dengan menggunakan perlakuan ransum 0,1% antibiotik *Chloroxytetracyline*, 0,1% probiotik *Lactobacillus casei* dan 0,2% ekstrak *Yucca* terhadap pertumbuhan dan aktivitas urase dalam usus ayam broiler. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian probiotik *Lactobacillus casei* 0,1% berpengaruh nyata meningkatkan pertambahan bobot ayam pada saat ayam umur 0 – 3 minggu. Aktivitas urase pada usus halus nyata menurun pada pemberian probiotik *Lactobacillus casei* 0,1% dan 0,2% Ekstrak *Yucca* tidak memberikan pengaruh nyata baik terhadap pertambahan bobot badan maupun aktivitas urase.

E. Performa Broiler

1. Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum merupakan jumlah ransum yang dimakan dalam jumlah waktu tertentu yang akan digunakan oleh ternak untuk memenuhi

kebutuhan hidup dan zat makanan lain (Wahju, 2004). Menurut Bell dan Weaver (2002), konsumsi pakan tiap ekor ternak berbeda, hal ini dipengaruhi oleh bobot badan, tingkat produksi, tingkat cekaman, aktivitas ternak, mortalitas, kandungan energi dalam pakan dan suhu lingkungan. Menurut Murtijo (1987) pada temperatur yang dingin konsumsi pakan broiler akan meningkat sebesar 20-30% dari konsumsi pakan pada *temperature* biasa. Selain itu konsumsi pakan dipengaruhi oleh bentuk pakan, pemberian pakan dalam bentuk pellet dapat meningkatkan konsumsi pakan (Parakkasi, 1990).

Wahju (2004) menyatakan bahwa faktor genetik juga sangat berpengaruh terhadap konsumsi ransum. Secara umum, konsumsi meningkat dengan peningkatan bobot badan broiler karena broiler berbobot badan besar mempunyai kemampuan menampung makanan lebih banyak. National Research Council (1994) menyatakan bahwa konsumsi ransum setiap ekor ternak berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh bobot tubuh broiler, jenis kelamin, aktivitas sehari-hari, suhu lingkungan, kualitas dan kuantitas ransum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi pakan antara lain besar dan berat badan, kondisi fisiologis ternak serta gerak laju dari makanan tersebut di dalam alat pencernaan ternak. Laju makanan dalam alat pencernaan dapat mempengaruhi jumlah makanan yang dikonsumsi, yakni makin cepat aliran makanan dalam alat pencernaan makin banyak pula jumlah makanan yang dikonsumsi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah palatabilitas dan selera. Palatabilitas dipengaruhi oleh bau, rasa, tekstur, dan suhu makanan yang diberikan. Selera merupakan faktor internal yang merangsang rasa lapar.

Faktor lain yang juga mempengaruhi konsumsi adalah ternak, lingkungan dan stres karena penyakit (Wahju, 2004).

Konsumsi ayam dapat pula dipengaruhi oleh kapasitas tembolok. Meskipun kebutuhan energinya belum terpenuhi, namun ayam akan berhenti makan apabila temboloknya sudah penuh (Tilman, dkk, 1991). Rasyaf (2003), menyatakan bahwa tembolok merupakan alat pencernaan pertama sebelum masuk ke proses berikutnya. Sebagai alat pencernaan pertama yang sifatnya sebagai penampung, kapasitas tembolok tidak banyak atau terbatas. Jumlah yang dikonsumsi dipengaruhi oleh kandungan protein dan kalori, tingkat energi dalam ransum menentukan banyaknya ransum yang dikonsumsi ternak. Banyaknya konsumsi pakan bukan jaminan mutlak, tetapi keserasian nutrisi dalam ransum yang sesuai kebutuhan nutrisi broiler dan kualitas bahan pakan merupakan faktor terpenting untuk mencapai puncak produksi (Wahju, 2004).

Cahyono (2001) menyatakan bahwa ransum yang baik harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah berimbang. Selain memperhatikan kualitas pemberian ransum juga harus sesuai dengan umur ayam karena nilai gizi dan jumlah ransum yang diperlukan pada setiap pertumbuhan berbeda. Selanjutnya dinyatakan bahwa fungsi makanan yang diberikan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, membentuk jaringan tubuh, mengganti bagian-bagian yang rusak dan selanjutnya untuk keperluan produksi.

Bahan makanan yang tersedia dan terbanyak dimakan oleh bangsa unggas berasal dari biji-bijian, limbah pertanian, dan sedikit dari hasil hewani serta perikanan. Oleh karena itu, bahan makanan yang digunakan hendaknya tidak

bersaing dengan kebutuhan manusia dan mudah didapatkan serta harganya relatif murah (Rasyaf, 2004).

Kebutuhan nutrisi broiler periode starter dan finisher sesuai Standar Nasional Indonesia (2006) dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3, sebagai berikut :

Tabel 3. Kebutuhan Nutrisi Broiler Periode Starter

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar air	%	Maks. 14,0
2.	Protein kasar	%	Min. 19,0
3.	Lemak kasar	%	Maks. 7,4
4.	Serat kasar	%	Maks. 6,0
5.	Abu	%	Maks. 8,0
6.	Kalsium (Ca)	%	0,90 – 1,20
7.	Fosfor (P) total	%	0,60 – 1,00
8.	Energi Metabolisme (EM)	Kkal/Kg	Min. 2900

Sumber : Standar Nasional Indonesia (2006)^a

Tabel 4. Kebutuhan Nutrisi Broiler Periode Finisher

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar air	%	Maks. 14,0
2.	Protein kasar	%	Min. 18,0
3.	Lemak kasar	%	Maks. 8,0
4.	Serat kasar	%	Maks. 6,0
5.	Abu	%	Maks. 8,0
6.	Kalsium (Ca)	%	0,90 – 1,20
7.	Fosfor (P) total	%	0,60 – 1,00
8.	Energi Metabolisme (EM)	Kkal/Kg	Min. 2900

Sumber : Standar Nasional Indonesia (2006)^b

2. Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan mempunyai definisi yang sangat sederhana yaitu peningkatan ukuran tubuh. Pertambahan bobot badan juga dapat diartikan sebagai perubahan ukuran yang meliputi pertambahan bobot hidup, bentuk dimensi linier dan komposisi tubuh termasuk komponen-komponen tubuh seperti otak, lemak, tulang, dan organ-organ serta komponen-komponen kimia terutama air dan abu pada karkas (Hunton, 1995). Pertambahan bobot badan diperoleh melalui pengukuran kenaikan bobot badan dengan melakukan penimbangan berulang-ulang dalam waktu tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan (Tillman dkk, 1991).

Pertumbuhan ternak dapat diidentifikasi dengan adanya peningkatan ukuran dan berat. Pertumbuhan dapat diukur dari bobot bagian-bagian tubuh, jaringan dan organ (Mc Donald *et al.*, 2002). Pertumbuhan ditandai dengan adanya pertambahan bobot badan. Menurut Leeson dan Summers (2001), pertumbuhan ayam pedaging sangat cepat dan pertumbuhan dimulai sejak menetas sampai umur 8 minggu, setelah itu kecepatan pertumbuhan akan menurun. Tillman *et al.* (1991) menyatakan bahwa pertumbuhan mempunyai tahap-tahap cepat dan lambat. Tahap cepat terjadi pada saat lahir sampai pubertas dan tahap lambat terjadi pada saat kedewasaan tubuh telah tercapai. Tahap-tahap pertumbuhan hewan membentuk gambaran singkat sigmoideal pada grafik pertumbuhan.

Pertumbuhan murni, mencakup pertumbuhan dalam bentuk berat jaringan-jaringan pembangun seperti tulang, jantung, otak, dan semua jaringan

tubuh lainnya (kecuali jaringan lemak) dan alat-alat tubuh. Selanjutnya dinyatakan oleh Anggorodi (1996) bahwa pertumbuhan murni adalah suatu penambahan jumlah protein dan zat-zat mineral yang tertimbun dalam tubuh, sedangkan penambahan lemak atau penambahan air bukanlah pertumbuhan murni.

Pada masa pertumbuhan, broiler harus memperoleh makanan yang banyak mengandung protein, zat ini berfungsi sebagai zat pembangun, pengganti sel yang rusak dan berguna untuk pembentukan telur (Wibowo, 1996). Sedangkan Wahyu (1992) menyatakan bahwa, kebutuhan protein per hari untuk broiler yang sedang bertumbuh dibagi menjadi tiga bagian yaitu protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan, protein untuk hidup pokok dan protein untuk pertumbuhan bulu.

Pertumbuhan sangat erat hubungannya dengan konsumsi, dan diperkirakan 63% dari penurunan pertumbuhan disebabkan karena menurunnya konsumsi ransum dari ayam. Temperatur tinggi dan saat ayam dalam keadaan stress, akan menurunkan pertumbuhannya karena konsumsi ransum yang menurun (Leeson dan Summer, 1991).

Waksito (1983) mengemukakan bahwa ransum merupakan salah satu faktor yang menentukan kecepatan pertumbuhan, oleh karena itu untuk mencapai pertumbuhan yang optimal sesuai dengan potensi genetik diperlukan suatu ransum yang mengandung cukup unsur gizi secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian ada hubungan antara pertumbuhan dengan konsumsi ransum. Sejalan dengan itu Tilman, dkk (1986) menyatakan bahwa makanan merupakan suatu masalah yang penting dalam suatu usaha peternakan, sebab untuk mencapai

perkembangan dan pertumbuhan dibutuhkan sejumlah zat makanan yang bermutu, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Kecepatan pertumbuhan mempunyai variasi yang cukup besar, keadaan ini bergantung pada tipe ayam, jenis kelamin, galur, tata laksana, temperatur lingkungan, tempat ayam tersebut dipelihara, kualitas dan kuantitas ransum (Anggorodi, 1985). Pada masa pertumbuhan, ayam harus memperoleh ransum yang banyak mengandung protein, zat ini berfungsi sebagai pembangun, pengganti sel yang rusak dan berguna untuk pembentukan telur. Kebutuhan protein perhari ayam sedang bertumbuh dibagi menjadi tiga bentuk kebutuhan yaitu protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan, protein untuk hidup pokok dan protein untuk pertumbuhan bulu (Wahju, 2004).

3. Konversi Ransum

Konversi ransum adalah perbandingan jumlah konsumsi ransum pada satu minggu dengan penambahan berat tubuh yang dicapai pada minggu itu, bila rasio kecil berarti penambahan berat tubuh ayam memuaskan atau ayam makan dengan efisien. Hal ini dipengaruhi oleh besar ayam dan bangsa ayam, tahap produksi, kadar energi dalam ransum dan suhu lingkungan (Rasyaf, 2003). Konversi ransum adalah perbandingan antara jumlah ransum yang dikonsumsi (g) dengan berat hidup (g) sampai ayam terjual (Siregar *et al.*, (1990).

Faktor utama yang mempengaruhi konversi ransum menurut Lacy dan Vest (2004) adalah genetik, ventilasi, sanitasi, kualitas pakan, jenis ransum, penggunaan zat aditif, kualitas air, penyakit dan pengobatan serta manajemen pemeliharaan, selain itu meliputi faktor pemberian pakan, penerangan dan faktor

sosial. Scanes *et al.* (2004). menyatakan bahwa pemberian ransum unggas dalam bentuk *Crumble* dan *Pellet* memiliki nilai konversi ransum yang lebih baik dibandingkan dengan pakan berbentuk *Mash*, karena dapat mengurangi jumlah kehilangan pakan dalam *Litter*.

Semakin dewasa ayam maka nilai konversi ransum akan semakin besar. Ayam yang semakin besar akan makan lebih banyak untuk menjaga ukuran bobot badan. Sebesar 80% protein digunakan untuk menjaga bobot badan dan 20% untuk 34 pertumbuhan sehingga efisiensi pakan menjadi berkurang. Bila nilai konversi pakan sudah jauh di atas angka dua, maka pemeliharaannya sudah kurang menguntungkan lagi. Oleh karena itu, broiler biasanya dipasarkan maksimal pada umur enam minggu (Lesson, 2000)

Tinggi rendahnya angka konversi ransum disebabkan oleh adanya selisih yang semakin besar atau kecil pada perbandingan antara ransum yang dikonsumsi dengan penambahan bobot tubuh yang dicapai. Tingginya konversi ransum menunjukkan bahwa penambahan bobot tubuh yang rendah akan menurunkan nilai efisiensi penggunaan ransum Wijayanti, (2011).

Konversi ransum sebaiknya rata-rata 2 kg pakan per kg daging atau bila kurang dari 2 kg lebih baik. Beberapa contoh telah mencatat konversi 1,8 meskipun hal ini tidak terlalu umum (Blakely dan Bade, 1992). Sementara Rasyaf (2004), menyatakan bahwa bila hendak memperbaiki sudut konversi, sebaiknya dipilih angka konversi yang terendah. Akan tetapi, angka itu berada dari masa awal ke masa akhir 35 karena di masa akhir pertumbuhan broiler menjadi lambat atau mulai menurun setelah usia 4 minggu sedangkan ransumnya bertambah terus.

Nilai konversi ransum berhubungan dengan biaya produksi, khususnya biaya ransum, karena semakin tinggi konversi ransum maka biaya ransum akan meningkat karena jumlah ransum yang dikonsumsi untuk menghasilkan bobot badan dalam jangka waktu tertentu semakin tinggi. Nilai konversi ransum yang tinggi menunjukkan jumlah ransum yang dibutuhkan untuk menaikkan bobot badan semakin meningkat dan efisiensi ransum semakin rendah (Card dan Nesheim, 1982).

Angka konversi ransum ayam broiler umur lima minggu yang normal menurut Pond *et al.* (1995) berkisar antara 1,5-1,6. Perbaikan genetik selama kurun waktu 20 tahun telah berhasil memperbaiki efisiensi ransum yaitu pada tahun 1984 untuk menghasilkan bobot badan 1345 g/ekor/hari memerlukan waktu lima minggu dengan konversi ransum sebesar 1,76, sedangkan tahun 2004 untuk pemeliharaan pada umur yang sama akan mendapatkan bobot badan 1882 g/ekor dengan konversi ransum 1,59 (World Poultry, 2004).

4. Mortalitas

Mortalitas atau angka kematian merupakan perbandingan antara jumlah keseluruhan ayam yang mati selama pemeliharaan dengan jumlah total ayam yang dipelihara. Mortalitas merupakan tolak ukur atau indikator kematian yang diukur dengan persentase. Scanes *et al.* (2004) menyatakan bahwa tingkat mortalitas ayam broiler pada manajemen pemeliharaan yang baik dapat ditoleransi hingga 3%. Kondisi lingkungan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan ternak dapat menurunkan angka mortalitas (Blakely dan Bade, 1991).

Mortalitas adalah kematian pada ayam broiler yang senantiasa terjadi dan sulit dihindari. Menurut Wiharto (1999) angka mortalitas untuk ayam broiler adalah kurang dari 5% dan ada banyak hal yang berpengaruh terhadap mortalitas dalam pemeliharaan unggas, seperti terserang penyakit, kekurangan ransum, kekurangan minum, temperatur, sanitasi, dan lain sebagainya (Wiharto, 1999). Hal yang perlu diperhatikan dalam menekan angka kematian adalah mengontrol kesehatan broiler, mengontrol kebersihan tempat ransum dan minum serta kandang, melakukan vaksinasi secara teratur, memisahkan ayam yang terkena penyakit dengan ayam yang sehat, dan memberikan ransum dan minum pada waktunya (Lacy dan Vest, 2000).

Kondisi lingkungan dikatakan baik jika memiliki suhu dan kelembaban yang sesuai. Kelembaban ruangan kandang yang optimal berkisar 60-70%. Manajemen pemeliharaan yang kurang baik dimana kelembaban 45% atau lebih rendah dengan temperatur ruang 16- 21°C dapat mengakibatkan *Stress* pada ayam broiler (Scanes *et al.*, 2004).

Mortalitas erat hubungannya dengan program vaksinasi dan kejelian dalam mendeteksi adanya penyakit sejak dini. Minggu ketiga dan keempat merupakan periode dimana peluang terjadinya kematian lebih tinggi karena pada periode tersebut antibodi hewan telah berkurang. Kematian ayam broiler selama pemeliharaan lebih banyak disebabkan oleh penyakit (Amrullah, 2004).

Usaha pencegahan dan usaha pemberantasan penyakit yang dilakukan secara teratur merupakan suatu cara untuk mengurangi tingkat kematian. Lacy dan Vest (2004) mengatakan bahwa mortalitas merupakan faktor penting dan harus

diperhatikan dalam usaha pengembangan peternakan. Tingkat mortalitas pada ayam masih dapat dikatakan normal pada tingkat kematian sebesar 4% (Lacy dan Vest, 2004). Menurut North dan Bell (1990), pemeliharaan ayam broiler secara komersial dinyatakan berhasil jika angka kematian secara keseluruhan kurang dari 5%. Penggunaan antibiotik seperti zinc bacitracin dapat menurunkan tingkat kematian ayam broiler sebesar 2,5% (Mujasih, 2001). Menurut Dewi (2007), penambahan *herbal medicine* berupa tepung daun pepaya dan tepung kunyit dapat menurunkan tingkat kematian ayam broiler sebesar 5%. Luvianti (2006) melaporkan bahwa penambahan herbal berupa tepung daun salam menurunkan tingkat kematian sebesar 3,3%.

5. Konsumsi Air Minum

Menurut Scott *et al.* (1982), air mempunyai fungsi sebagai berikut : (1) zat dasar dari darah, cairan interseluler dan intraseluler yang bekerja aktif dalam transformasi zat-zat makanan, (2) penting dalam mengatur suhu tubuh karena air mempunyai sifat menguap dan *specific heat*, (3) membantu mempertahankan homeostatis dengan ikut dalam reaksi dan perubahan fisiologis yang mengontrol pH, tekanan osmotis, dan konsentrasi elektrolit. Wahyu (2004) menambahkan bahwa kehilangan air tubuh sebanyak 10% dapat menyebabkan kerusakan yang sangat hebat dan kehilangan air tubuh 29% akan menyebabkan kematian.

Kebutuhan air pada ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ransum yang diberikan, faktor lingkungan, kesanggupan menahan air, aktivitas ternak, dan kondisi fisiologis ternak (Chruch dan Pond, 1998).

6. Bobot Badan Akhir.

Pertambahan bobot badan dihitung dengan cara mengukur bobot badan dalam waktu satu minggu (Rasyaf, 1985). Tiap akhir minggu ayam ditimbang dan hasil penimbangannya dikurangi dengan bobot hidup minggu lalu maka hasil pengurangan itulah yang dinamakan pertumbuhan bobot hidup mingguan (Rasyaf, 1995).

Pemberian pakan yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan akhir pada ayam broiler di keranakan kadar protein yang relative sama yaitu 21,06 % , 21,13 % dan 19,24%. Sementara energi metabolismenya 3151-3221 kkal/kg, 2906-2941 kkal/kg dan 3011-3116 kkal/kg demikian juga dengan kandungan asam-asam amino yang terdapat dalam protein ransum cukup berimbang dengan kandungan energi metabolismenya dalam menunjang pertumbuhan broiler terutama asam-asam amino esensial yang sering defisien dalam ransum, meskipun dalam hal ini tidak diketahui berapa prosentase asam-asam amino tersebut secara tepat (Khaerani, 2011).

Bobot hidup yang dicapai pada umur yang sama antara berbagai strain akan berbeda dan hal ini disebabkan selain adanya perbedaan mutu genetik juga disebabkan oleh factor lingkungan yang mendukung potensi genetik tersebut (North, 1984).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada 8 Desember 2017 sampai dengan 27 Januari 2017. Bertempat di kandang unggas, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat-alat seperti cutter, ember, gelas ukur, kandang litter, lampu pijar 60 watt, tempat pakan gantung, tempat air minum manual, talenan untuk pemeliharaan broiler, timbangan analitik dan timbangan manual.

Bahan yang digunakan yaitu antibiotik *Zink Bacitracin*, Probiotik *Lactobacillus*, broiler umur satu hari atau *Day old chick* (DOC) sebanyak 36 ekor dengan jenis kelamin campuran (*unsexed*), gula merah, tali rafia, kantong plastik dan probiotik.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 3 ekor broiler sehingga terdapat 36 unit percobaan dengan perlakuan (P) yaitu:

P₀ = Ransum basal (kontrol)

P₁ = Ransum basal + Probiotik 1,5 ml/hari, (1-35 hari).

P₂ = Ransum basal + Antibiotik 0,1 g/hari, (1-35 hari).

P₃ = Ransum basal + Antibiotik 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik 1,5 ml/hari, (22-35 hari).

Antibiotik yang di gunakan dalam penelitaian ini adalah antibiotik jenis Zinc-Bacitracin dan Probiotik yang di gunakan yaitu probiotik multi strain yang setiap volume 1 (satu) liter mengandung jenis *Lactobacillus casei* ($1,5 \times 10^6$), *Saccharomyces cerevisiae* ($1,5 \times 10^6$), dan *Rhodopseudomonas palustris* (1.0×10^6)

2. Persiapan dan Pemeliharaan Broiler

Persiapan yang dilakukan sebelum pemeliharaan broiler yaitu:

a. Kandang

Kandang terlebih dahulu disiapkan sebelum DOC (*Day Old Chick*) di masukkan, persiapan kandang dilakukan secara matang dan dilakukan pemasangan tirai serta pembersihan dan *sterilisasi* disekitar kandang dengan cara penyemprotan desinfektan atau deterjen dan alat-alat yang akan digunakan dan tunggu sampai kering. Setelah itu ditaburi sekam dengan ketebalan 7 cm, tempat

pakan dan luas unit kandang yang digunakan 75 x 100 cm. Persiapan dipelihara dari DOC sampai umur 35 hari dengan kandang yang beri alas sekam. Perlakuan diberikan pada ayam sejak umur 1 hari sampai panen. Jumlah ayam perlakuan sebanyak 36 ekor dipilih secara acak dan dimasukkan ke dalam kandang yang telah disekat-sekat dengan bambu masing-masing 3 ekor. Setiap sekat-sekat kandang dilengkapi dengan lampu pijar 60 watt sebanyak 12 buah.

b. Ransum dan Air minum

Pemberian pakan dilakukan beberapa jam setelah DOC minum (3-4 jam setelah DOC minum) pemberian pakan dan air minum dilakukan secara *ad libitum* (terus-menerus) dan dalam pemberiannya itu harus dalam keadaan bersih dan segar dan ransum tersebut telah dicampurkan dengan antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari dan probiotik *Lactobacillus* 2 ml/hari yang pemberiannya dilakukan sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan.

Adapun bahan penyusun dan kandungan nutrisi ransum yang digunakan pada penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 5: Bahan Penyusun Ransum Penelitian

Bahan pakan	Komposisi (%)
Jagung	53
Dedak	6
Bungkil Kedelai	28
MBM	53
Minyak Kelapa	3
Kapur	0,8
Mineral mix/ DPO	0,3
Vitamix	0,5
Nacl / Garam	0,4

Sumber: Data Primer

Tabel 6. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian

Kandungan Nutrisi	Jumlah (%)
Air	13,06
Protein Kasar	22,98
Lemak Kasar	9,07
Serat Kasar	7,61
BETN*	54,52
Abu	5,81

Keterangan: kecuali air, semua fraksi di nyatakan dalam bahan kering

* Bahan ekstrak tanpa nitrogen

E. Parameter yang Diukur

Selama proses pemeliharaan maka dilakukan perhitungan konsumsi pakan, penambahan bobot badan, konversi pakan, konsumsi air minum, bobot badan akhir, serta mortalitas tiap objek penelitian (broiler) yang di amati:

1. Perhitungan Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum dihitung dalam waktu satu minggu juga. Konsumsi ransum dalam satu minggu didapat dari jumlah ransum yang diberi dikurangi dengan sisa ransum yang tidak dimakan selama satu minggu. Kemudian konsumsi rata-rata tersebut dihitung setiap minggunya dari penjumlahan dengan minggu sebelumnya. Penghitungan Konsumsi ransum menurut Rasyaf (1994) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Konsumsi Ransum (g/ekor)} = \frac{\text{ransum yang diberikan} - \text{ransum yang disisa (g)}}{\text{jumlah ayam}}$$

2. Pertambahan Bobot Badan

Penimbangan bobot badan dilakukan setiap minggu sebelum diberi pakan selama penelitian berlangsung, cara penimbangan terhadap ayam tersebut dari mulai sebelum perlakuan sampai dengan minggu kelima. Kemudian pada masa

panen 40 dilakukan penghitungan rata-rata pertambahan bobot badan. Menurut Bagenal (1978) dengan menggunakan rumus:

$$PBB = BB_t - BB_{t-1}$$

Keterangan: PBB = Pertambahan Bobot Badan.

BB_t = Berat Badan Waktu t

BB_{t-1} = Bobot Badan Pada waktu Yang lalu.

t = Dalam Peternakan Ayam Biasanya Dalam Kurun Waktu Satu Minggu.

3. Konversi Ransum

Konversi ransum merupakan hasil pembagian antara rata-rata konsumsi pakan dalam satu minggu dengan rata-rata pertambahan bobot badan minggu itu pula, menurut Bagenal (1978) FCR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$FCR = \frac{KR}{PBB}$$

Keterangan:

FCR = Konversi ransum

KR = rata-rata konsumsi ransum (gr/ekor)

PBB = rata-rata pertambahan bobot badan (gr/ekor).

4. Mortalitas

Menurut Nuraini (2010), mortalitas dihitung dengan cara membagi jumlah ayam yang mati dengan total ayam masing-masing perlakuan dikalikan 100%.

$$\text{Mortalitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah ayam mati (ekor)}}{\text{Jumlah total ayam perlakuan (ekor)}} \times 100\%$$

5. Konsumsi Air Minum

Perhitungan Konsumsi Air Minum (Rasyaf, 2008) Konsumsi air kumulatif diukur dengan cara menghitung jumlah air yang diberikan dikurangi sisa air yang dikonsumsi. Konsumsi air minum broiler dapat diketahui berdasarkan rumus

$$\text{Konsumsi air} = \frac{\text{pakan yang diberikan} - \text{pakan yang disisa (g)}}{\text{jumlah ayam}}$$

6. Bobot Badan Akhir

Bobot badan akhir dihitung dengan menimbang berat hidup ayam pada akhir penelitian.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisa sidik ragam. Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan uji wilayah berganda Duncan untuk melihat perbedaan terhadap setiap sampel perlakuan. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).

Menurut Steel (1991) model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dari pemberian antibiotik dan probiotik ke-j

μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke-i

ϵ_{ij} = Galat

i = P1, P2, P3, P4, P5 (Perlakuan)

j = 1,2,3, (Ulangan)



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian selama 35 hari yang mencakup pemberian antibiotik dan probiotik multi strain (*Lactobacillus casei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konversi ransum, konsumsi air minum, bobot badan akhir dan mortalitas pada broiler disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Rataan Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot Badan, Konversi Ransum, Konsumsi Air minum, Bobot Badan Akhir dan Mortalitas Broiler selama pemeliharaan.

Parameter	Perlakuan				P-Value
	P0	P1	P2	P3	
Konsumsi Ransum (g/ekor/minggu)	573,38 ±3,60	601,49 ± 44,81	635,00 ± 20,30	598,44 ± 20,88	0,11
Pertambahan Bobot Badan (g/ekor/minggu)	336.67 ± 18.00	350.00 ± 106.40	435.33 ± 109.43	403.33 ± 130.06	0.61
Konversi Ransum	1.71 ± 0.08	1.85 ± 0.69	1.53 ±0.42	1.60 ± 0.52	0.86
Konsumsi Air minum, ml/ekor/minggu	515.44 ± 53.29	617.09 ± 77.55	643.40 ± 68.46	582.89 ± 89.00	0.24
Bobot Badan Akhir g/ekor/minggu	383.67 ± 18.00	414.50 ± 108.13	484.33 ± 109.43	448.67 ± 128.20	0.65
Mortalitas (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	1

Keterangan:

P0 = Ransum basal (kontrol). P₁ = Ransum basal + Probiotik 2 ml/hari, (1-35 hari). P₂ = Ransum basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-35 hari). P₃ = Ransum basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik 2 ml/hari, (22-35 hari). Standar diviasi (±).

B. Pembahasan

1. Konsumsi Ransum

Berdasarkan analisis sidik ragam, pemberian antibiotik dan probiotik tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P > 0,05$) terhadap konsumsi ransum ayam broiler. Hal ini diduga karena kualitas ransum antar perlakuan sama, yaitu kandungan serat kasar, protein kasar dan energi yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Leeson dan Summers (2001) yang menyatakan bahwa konsumsi ransum dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: energi ransum, kecepatan pertumbuhan, kondisi lingkungan, zat-zat nutrien, bentuk ransum dan stress. Rataan konsumsi ransum (gram/ekor/minggu) tertinggi diperoleh dari P2 (635.00 gram), kemudian diikuti berturut-turut perlakuan P1 (601.49 gram), P3 (598.44 gram), dan P0 (573.38 gram).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ransum yang tertinggi adalah perlakuan P2 yang dapat dilihat dari rata-ratanya (635.00 gram). Hal ini diduga karena dengan pemberian antibiotik *Zinc bacitracin* dapat menekan tumbuhnya mikroba patogen dalam tubuh ternak tepatnya di saluran pencernaan sehingga akan meningkatkan konsumsi ransum. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartini (2008) bahwa salah satu cara memodifikasi keseimbangan bakteri di dalam saluran pencernaan dengan pemberian antibiotik. Antibiotik dipercaya dapat menekan pertumbuhan bakteri-bakteri patogen yang berakibat melambungnya populasi bakteri menguntungkan dalam saluran pencernaan. Tingginya mikroflora menguntungkan tersebut dapat merangsang terbentuknya

senyawa-senyawa antimikrobia, asam lemak bebas dan zat-zat asam sehingga terciptanya lingkungan kurang nyaman bagi pertumbuhan bakteri patogen

Hasil sidik ragam tidak memberikan pengaruh yang nyata akan tetapi dilihat dari angka, maka perlakuan P3 yang menggunakan antibiotik *zink bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik Probiotik *Lactobacillus casei* ($1,5 \times 10^6$), *Saccharomyces cerevisiae* ($1,5 \times 10^6$), *Rhodopseudomonas palustris* (1.0×10^6) 2 ml/hari, (22-35 hari) menghasilkan konsumsi ransum yang rendah. Rendahnya konsumsi ransum berarti bahwa penambahan antibiotik *zink bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik *Lactobacillus* 2 ml/hari, (22-35 hari) memberikan pengaruh positif dengan meningkatkan efisiensi pakan apabila di bandingkan dengan perlakuan (antibiotik) 1-35 hari. Hal ini di duga dengan pemberian antibiotik selama 1-21 hari dapat menghambat bakteri patogen yang ada dalam tubuh broiler dan dengan pemberian probiotik 22-35 hari dapat memperbaiki sistem pencernaan pada broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswandono dan Soekardjo (1995) yang menyatakan bahwa sifat kerja antibiotik dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme yang memproduksi racun diantaranya membunuh mikroorganisme yang menimbulkan infeksi, dan pendapat Scott et al., (1982). yang menyatakan bahwa probiotik menghasilkan enzim yang dapat meningkatkan kecernaan pakan dan memperbaiki saluran pencernaan.

Konsumsi ransum ayam broiler selama lima minggu pemeliharaan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan bobot badan pada setiap minggunya, hal tersebut disebabkan kapasitas saluran pencernaan meningkat seiring dengan peningkatan bobot badan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyu

(1985) yang menyatakan bahwa konsumsi ransum meningkat seiring dengan peningkatan bobot badan ayam karena ayam yang berbobot badan besar mempunyai kemampuan menampung makanan yang lebih banyak.

2. Pertambahan Bobot Badan

Berdasarkan hasil Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian antibiotik dan probiotik tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P > 0,05$) terhadap pertambahan bobot badan selama lima minggu pemeliharaan. Rataan pertambahan bobot badan (gram/ekor/minggu) paling tinggi diperoleh pada perlakuan P2 (435,33) kemudian di ikuti berturut-turut P3 (403,33 gram), P1 (350,00 gram) dan P0 (336,67 gram).

Hasil Analisis sidik ragam tidak memberikan pengaruh yang nyata akan tetapi rataan pertambahan berat badan tertinggi diperoleh dari perlakuan P2 (435,33 gram), hal ini diduga karena pemberian antibiotik *Zinc bacitracin* dapat meningkatkan penyerapan zat makanan dalam tubuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswandono dan Soekardjo (1995) yang menyatakan bahwa salah satu cara kerja antibiotik yaitu dapat meningkatkan kapasitas daya serap usus yang menyebabkan dinding usus menjadi tipis sehingga daya serap usus akan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh semakin meningkat, sehingga konsumsi ransumnya pun meningkat dan menghasilkan bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan prebiotik pada periode starter karena saluran pencernaan ayam broiler belum berfungsi sempurna pada periode starter. Selain itu, Leeson dan Summer, (2001) menyatakan bahwa antibiotik juga dapat meningkatkan

kemampuan absorpsi zat makanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum.

Selain penggunaan antibiotik, pemberian probiotik yang dicampurkan ke dalam air minum juga memberikan hasil positif terhadap penambahan bobot badan hal ini bisa di lihat dari perbandingan perlakuan pemberian probiotik, kombinasi antibiotik probiotik dengan perlakuan kontrol yaitu berturut-turut P1 (350,00 gram), P3 (403,33 gram) dengan P0 (336,67 gram). Hal ini diduga karena pemberian probiotik dapat meningkatkan pertumbuhan ayam. Hal ini sesuai dengan pendapat Yeo dan Kim, (1997) yang menyatakan bahwa penambahan kultur probiotik pada air minum mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan, dan efisiensi penggunaan pakan. Probiotik meningkatkan aktivitas enzim pencernaan sehingga penguraian dan penyerapan makanan menjadi lebih sempurna sehingga makanan yang diserap dengan baik tersebut dapat dimanfaatkan oleh ayam untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan berat badan.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa penambahan berat badan pada perlakuan P2 meningkat di karenakan dengan meningkatnya konsumsi ransum. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasyaf (2004), bahwa pertumbuhan yang cepat adakalanya didukung dengan konsumsi ransum yang banyak pula. Hal ini didukung juga oleh pendapat Jull (1978), bahwa untuk mencapai tingkat pertumbuhan optimal sesuai dengan potensi genetik, diperlukan makanan yang mengandung unsur gizi secara kualitatif dan kuantitatif, dengan demikian ada hubungan kecepatan pertumbuhan dengan jumlah konsumsi makanan.

3. Konversi ransum

Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap konversi ransum ayam broiler selama lima minggu pemeliharaan. Rataan konversi ransum (gram/ekor/minggu) yang baik diperoleh dari P2 (1,53 gram) kemudian diikuti berturut-turut perlakuan P3 (1,60 gram), P0 (1,71 gram) dan P1 (1,85 gram).

Secara angka perlakuan P2 (1,53 gram) yang menggunakan Antibiotik *zink bacitracin* 0,1 g/hari, (1-35 hari) dan P3 (1,60 gram) yang menggunakan Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik *Lactobacillus* 2 ml/hari, (22-35 hari), yang paling rendah dari pada perlakuan P0 (1,71 gram) (kontrol). Menurut Pond *et al.* (1995) angka konversi ransum pada umur lima minggu berkisar antara 1,5-1,6. Nilai konversi ransum dalam penelitian ini hampir sama dengan pernyataan Pond *et al.*, (1995) yakni berkisar antara 1,5- 1,85.

Semakin baik mutu ransum, maka semakin kecil pula konversi ransumnya. Baik tidaknya mutu ransum ditentukan oleh seimbang tidaknya zat gizi pada ransum itu dengan yang diperlukan. Hal ini didukung oleh pendapat Anggorodi (1994) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya konversi ransum sangat ditentukan oleh keseimbangan antara energi metabolisme dengan zat-zat nutrisi terutama protein dan asam-asam amino. Menurut Card dan Neisheim (1972) nilai konversi ransum yang tinggi menunjukkan jumlah ransum yang dibutuhkan untuk menaikkan bobot badan semakin meningkat dan efisiensi ransum semakin rendah.

4. Mortalitas

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian antibiotik dan probiotik tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap mortalitas broiler. Jumlah ayam yang mati selama penelitian tidak ada dari 36 ekor ayam keseluruhan. Tingkat kematian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu P0 (0,00%), P1 (0,00%), P2 (0,00%) dan P3 (0,00%). Hal ini secara keseluruhan tingkat mortalitas selama penelitian adalah 0%, dan dapat dikatakan bahwa penelitian ini berhasil karena tingkat kematiannya berada pada batas normal. Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Lacy dan Vest (2000), yang menyatakan bahwa mortalitas yang normal pada ayam pedaging sekitar 4%.

Mortalitas atau angka kematian yaitu angka yang menunjukkan jumlah ayam yang mati selama pemeliharaan. Nilai mortalitas diukur melalui perbandingan antara jumlah seluruh ternak yang mati dengan jumlah total ternak yang dipelihara. Tingkat kematian sebesar 5% tidak terlalu mempengaruhi biaya produksi, tetapi untuk kematian sebesar 20-30% pengaruhnya besar sekali terhadap biaya produksi (Clayton, 1967). Mortalitas di pengaruhi oleh bebarapa faktor diantaranya berat badan, bangsa, tipe ayam, iklim, kebersihan lingkungan, sanitasi perlatan dan kandang serta penyakit (North dan Belt, 1990).

Hasil penelitian ini dapat diperoleh informasi bahwa penambahan antibiotik dan probiotik maupun perlakuan kontrol tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap mortalitas akan tetapi dengan penambahan antibiotik dan probiotik dalam setiap perlakuan dapat menekan mortalitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Astuti (2015), yang menyatakan bawa fungsi probiotik sama dengan

antibiotik yaitu meningkatkan kekebalan. Perbedaanya adalah antibiotika merupakan zat kimia yang di serap dalam usus, yang dapat menimbulkan residu dalam jaringan dan dapat menyebabkan adanya mutase mikroorganisme. Sedangkan probiotik merupakan mikroorganisme hidup, tanpa menyebabkan residu dan mutasi, karena kerjanya hanya mendesak mikroorganisme patogen keluar dari dalam tubuh.

5. Konsumsi air minum

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian antibiotik dan probiotik tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap konsumsi air minum. Secara berturut-turut konsumsi air minum mulai dari yang terendah hingga tertinggi adalah P0 (515.44 ml/ekor/ minggu), P3 (582.89 ml/ekor/ minggu), P1 (617.09 ml/ekor/ minggu) dan P2 (643.40 ml/ekor/ minggu). Dari hasil yang didapatkan konsumsi air minum paling tinggi didapat dari perlakuan P2 (643.40 ml,ekor/minggu).

Berdasarkan Tabel 7 rata-rata konsumsi air minum terendah yaitu, P0, (515.44 ml/ekor/ minggu) pemberian Ransum basal (kontrol) sedangkan konsumsi air minum tertinggi P2 (643.40 ml/ekor/ minggu) dengan pemberian ransum basal + antibiotik 0,1 g/hari, (1-35 hari). Secara umum, konsumsi air minum P2 dengan penambahan ransum basal + antibiotik 0,1 g/hari, (1-35 hari) memberikan hasil dibawah batas normal yaitu berkisar 643.40 ml/ekor/minggu jika dibandingkan dengan kebutuhan air minum normal ayam pedaging yaitu dengan mengkonsumsi 225-1250 ml/ekor/minggu (NRC, 1994).

Konsumsi air pada ayam broiler memiliki standar tertentu dan ayam broiler tidak akan mengonsumsi air secara berlebihan bila tidak dalam keadaan stress karena suhu yang terlalu tinggi. Menurut Achmad, et al. (2012) konsumsi air minum yang berlebih pada broiler akan mengurangi konsumsi ransum sehingga akan berdampak pada penambahan berat badan.

Menurut Risnajati, (2011) pada umumnya ayam mengonsumsi air 2 kali lebih besar dari bobot pakan yang di konsumsinya hal ini sebabkan karena air berfungsi sebagai pelarut dan alat transportasi bagi zat-zat nutrisi untuk disebarkan ke seluruh tubuh sehingga air dibutuhkan lebih banyak dari pada ransumnya.

6. Bobot Badan Akhir

Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap Bobot badan akhir ayam broiler selama lima minggu pemeliharaan. Rataan berat badan ayam broiler yang tinggi diperoleh dari P2 (643.40 ± 68.80 Gram), kemudian diikuti berturut-turut perlakuan P3 (448.67 ± 28.20 Gram), P1 (414.50 ± 107.85 Gram) dan P0 (383.67 ± 18.00 Gram).

Hasil penelitian tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat badan akhir akan tetapi berat badan akhir tertinggi di capai oleh perlakuan yang diberikan antibiotik. Hal ini diduga karena dengan pemberian antibiotik disebut sebagai pemacu pertumbuhan dan dapat menekan bakteri patogen yang ada dalam usus. Hal ini sesuai dengan pendapat Park (2006), bahwa ekosistem gastrointestinal unggas merupakan aspek yang sangat penting dalam memperbaiki performans dan kesehatan. Antibiotik meningkatkan performans dengan

modifikasi mikroflora saluran cerna, meskipun penggunaannya harus dibatasi. Selain itu, pemberian antibiotik dapat memperbaiki penampilan dari vili-vili usus yang memiliki peranan penting dalam pencernaan yang berfungsi untuk mengabsorpsi zat zat nutrisi bahan pakan. Dan dilanjutkan dengan pernyataan Fuller (1992), yang mengemukakan bahwa probiotik didefinisikan sebagai mikrobia hidup berupa kultur tunggal atau campuran yang diberikan untuk menjaga keseimbangan mikrobia di dalam saluran pencernaan dan memperbaiki sifat dari mikrobia indigenous yang bermanfaat bagi inang.

Bobot badan ayam broiler strain Cobb umur 5 minggu adalah 1513,30 Gram/ekor (An-nisa, 2003). Semua perlakuan pada penelitian ini berada di bawah angka normal yaitu berkisar antara 383.67 - 484.33 Gram/ekor. Suhu kandang yang tinggi selama pemeliharaan berkisar antara 25⁰C-31,7⁰C dapat menyebabkan *Stress* pada ayam sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Selain suhu lingkungan, kualitas ransum pun mempengaruhi bobot badan. Kandungan zat makanan yang tidak mencukupi kebutuhan dapat menghambat pertumbuhan ayam broiler.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pemberian antibiotik dan probiotik tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) terhadap konsumsi ransum, penambahan bobot badan, konversi ransum, konsumsi air minum, bobot badan akhir dan mortalitas. Walaupun demikian, dilihat dari tiap perlakuan pemberian Antibiotik Zink–Bacitrazin 0,1 gram/ hari (1-35 hari), Probiotik 1,5 ml/ liter air minum(1-35 hari) dan Antibiotik Zink Bacitracin 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik *Lactobacillus* 1,5 ml/hari, (22-35 hari) cenderung lebih baik daripada perlakuan tanpa pemberian antibiotik dan probiotik pada penambahan bobot badan, konversi ransum, konsumsi air minum dan bobot badan akhir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan dosis antibiotik dan probiotik dan dengan jadwal pemberian yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad N, faizal H, Abbasi BH, Farooq S, Ali M, Khan MA. 2012. *Biological Role of piper nigrum L.* (Black pepper): A review. *Asian Pac J Trop Biomed.* 2(3): 1945-1953
- Al-Mubarak AZ, 2006. *Pendekatan strukturalisme linguistik dalam tafsir Al-Quran kontemporer "ala' M. Sharur.* Elsaq. Yogyakarta.
- Amrullah, I. K. 2004. *Nutrisi Ayam Broiler.* Cetakan ke-2. Lembaga Satu Gunungbudi, Bogor.
- An-Nisa, Y. 2003. *Pengamatan performa beberapa strain ayam broiler di peternakan cipinang farm, kecamatan cimaung kabupaten bandung.* Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Anjarsari, B. 2010. *Pangan Hewani Fisiologi Pasca Mortem Dan Teknologi* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anggorodi, H, R. 1985. *Kemajuan Mutakhir Ilmu Makanan Ternak Unggas.* Cetakan Pertama. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- _____. 1995. *Nutrisi Aneka Ternak Unggas.* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____. 1994. *Ilmu Makanan Ternak Umum.* Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Astuti, 2015, *Analisis Pengaruh Bahan Tambah Kapur Terhadap Karakteristik RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), Tugas Akhir, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.*
- Barton, M. D. & W. S. Hart. 2001. *Public health risks: antibiotic resistance – reviewAsian-Australia.* *J. Anim. Sci.* 14 (3): 414-422.
- Bell, D. D. and W. D. Weaver Jr. 2002. *Commercial Chicken Meat and Egg Production. 5 th Ed.* Springer Science+Business Media, Inc. Spring Street. New York.
- Blakely, J. & D. H. Bade. 1991. *Ilmu Peternakan. Edisi Keempat.* Terjemahan: M. Srigandono. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____. 1992. *Ilmu Peternakan.* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Bolder, N., J. A. Wagenaar, F. F. Putiluran, K. T. Veldman & M. Sommer. 1999. *The effect of flavophospholipol (flavomycin) and salinomycin sodium (Sacox) on the excretion of Clostridium perfringens, Salmoella enteritis and campylobacter jejuni in broiler after experimental infection*. Journal Poultry Sci. 78 : 1681-1689.
- Budiansyah, 2004 *Pemanfaatan Probiotik dalam Meningkatkan Penampilan Produksi Ternak Unggas*. Prog. Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Cahyono, B. 2001. *Ayam Buras Pedaging*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Card, L. E. and M. C. Nesheim. 1972. *Poultry Production*. 11th Ed. Lea and Febiger. Philadelphia. California
- Cheeke, P. R. 2003. *Contemporary Issues in Animal Agriculture*. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
- Church & Pond. 1988. *Basic Animal Nutrition dan Feeding*. 4th Edition. John Wiley and Sons Inc, New York, USA.
- Citroreksoko. 1993. *Warta Biotek*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi LIPI: Bogor. Departemen
- Clayton , E. S. 1967. *The Economics Of The Poultry Industry*. Longmans, green and co ltd, London
- Cobb Vantress. 2007. *What is the cobb 500 and cobb 700?*. <http://www.cobbvantress.com/>. [Oktober 2017]
- Departemen agama RI 2002. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Dirjen Kelembagaan Islam: Jakarta.
- Dewi, F. K. 2007. *Pengaruh pemberian tepung kunyit dan tepung daun pepaya dalam ransum terhadap performa, persentase karkas, dan lemak abdominal ayam broiler yang mengalami cekaman panas*. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Fontana, A. A., D. Weaver Jr., D. M. Denbaow & B. A. Watkins. 1993. *Early feed restriction of broiler: Effect on abdominal fat pad, liver, and gizzard weight, fat deposition and carcass composition*. Poultry Sci. 72: 243-250.
- Fuller, R. 1992. History and defelopment of probiotics. In probiotics the scientific basis. Fuller. (Ed). Chapman and hall. London, New York, Tokyo, Melbourne, madras.

- Gordon, S. H. & D. R. Charles. 2002. *Niche and Organic Chicken Product: Their Technology and Scientific Principles*. Nottingham University Press, UK
- Hunton, P. 1995. *Poultry Production. Enviromental Factor Involved in Growth and Develompment*. Amsterdam. Elsevier.
- Infovet. 1994. *Kronologi ketentuan penggunaan feed additive di Indonesia*. Infovet. 014:12
- Johnson, B., Anker and Meleney . 1945. *Bacitracin: a new antibiotic produced by a member of the B. Subtilis Group*. <http://en.wikipedia.org/wiki/Bacitracin>. [30 April 2007].
- Jull, M.A. 1978. *Poultry Husbandry*. 3rd Ed. McGraw-hill Publishing Co., Ltd., New Delhi, India.
- Kartini, 2008. *Pengaruh pemberian antibiotic terhadap konsumsi pakan, penambahan berat badan, dan konversi pakan*. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar.
- Keirs, R.W, E. D. Peebles, S.A. Hubbard and S.K. Whitmarsih. 2002. Effect of supportive gluconeogenic substance on the early performance of broiler under adequate brooding contitions. *College of Veterinary Medicine and Poultry Sci.* 7 (12):38-40.
- Kementrian Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Utara. CV Darus Sunnah.
- Khaerani, K. 2011. *Berat badan akhir, konversi ransum dan income over feed and chick cost ayam broiler dengan pemberian ransum komersial*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Lacy & L. R. Vest. 2000. *Improving Feed Conversion in Broiler: A Guide for Growers*. <http://www.ces.uga.edu/pubcd.c:793-w.html> [oktober 2017]
- Lesson, S. and J. D. Summers 1991. *Commercial Poultry Nutrition*. University Books. Guelph. Canada.
- _____. 2000. *Pengaruh Penggunaan Ampas Tahu Terhadap Efesiensi Penggunaan Protein oleh Ayam Pedaging*. *Jurnal Ilmiah*. Semarang. Mc Nitt, J.L. 1983. *Livestock Husbandry techniques*. Granada Publishing.
- _____. 2001. *Nutrition of the Chicken. 4th Edition*. University Books, Guelph, Ontarion, Canada.

- Luvianti, S. 2006. *Performa ayam broiler yang diberi tepung daun salam (Syzygium polyanthum (Wight) Walp) dalam ransum sebagai antibakteri Escherichia coli*. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Manap, M.Y. 1998. *Seminar bioplus*. CNI News 12 (6) juni.
- McDonald, P., R. A. Edwards, J. F. D. Greenhalgh & C. A. Morgan. 2002. *Animal Nutrition*. 6th Ed. Longman Singapore Publisher Ltd, Singapore.
- Medicinus. 2009. *Bakteri probiotik Meningkatkan Imunitas Tubuh*. Vol.22, No.3: Bandung
- Mountzouris, K. C., P. Tsirtsikos, I. Palamidi, A. Arvaniti, M. Mohnl, G. Schatzmayr and K. Fegeros. 2010. *Effects Of Probiotic Inclusion Levels In Broiler Nutrition On Growth Performance, Nutrient Digestibility, Plasma Immunoglobulins, and Caecal Microflora Composition*. *Poult. Sci.* 89:58-67.
- Mujiasih. 2001. *Performa Ayam Broiler yang Diberi Antibiotik Zinc bacitracin, Probiotik Bacillus Sp dan Berbagai Level Saccharomyces Cerevisiae Dalam Ransumnya*. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mulyantono. 2003. *Sulitnya Mencari Bibit Favorit*. *Majalah Poultry Indonesia*. Edisi Agustus: 25-27.
- Murtidjo. A. 1987. *Turunkan Cholesterol Ayam Kampong dengan Lisin*. *Poultry Indonesia*, ad Semptember.68-69.
- _____. 1993. *Memelihara Domba*. Kanisius, Yogyakarta
- National Research Council. 1994. *Nutrient Requirement of Poultry*. 9th Revised Edition. National Academy Press Washington.
- North, M. O. & D. D. Bell. 1990. *Commercial Chicken Production Manual*. 4th Ed. Van Nostrand Reinhold, New York.
- Nuraini, 2010. *Performa, Persentase Karkas, Lemak Abdominal, dan Organ Dalam Ayam Broiler yang Diberi Ransum dengan Penambahan Prebiotik dari Tongkol Jagung*. Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.
- Parakkasi, A. 1990. *Ilmu Gizi dan Makanan Ternak Monogastrik*. Cetakan Pertama. UIP: Jakarta.

- Park Y. W. 2006. Goat Milk-Chemistry and Nutrition. Di dalam Park YW, Haenlien GF, editor, Handbook of milk of non-bovine mammals. Oxford, UK (GB): Blackwell Publishing Profesional. Hal: 34-58.
- Phillip, K. 1993. *Development of lactic acid bacteria as health food supplement or probiotic*. OMX International. Malaysia.
- Phillips, I., M. Casewall, T. Cox, B. Groot, C. Friis, R. Jones. 2004. Does the use antibiotics in food animals pose a risk to human health?. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 53;28-52 (<http://www.oxfordjournals.org>) (diakses Sepetmber).
- Piliang, W. G. & S. Djojoseobagio, Al Haj. 2002. *Fisiologi Nutrisi*. Vol. I. Edisi ke-4. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.
- Poultry Indonesia. 2003. *Menelusuri jejak strain-strain ayam ras terpilih*. <http://www.poultryindonesia.com/modules.php?name=News&file=print&sid=235>. [Oktober 2017]
- Pond, W.G., D.C. Church, and K.R. Pond, 1995. Basic Animal Nutrition And Feeding. Fourth edition. Jon wiley and sons, New York.
- Rasyaf, M. 2003. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- _____. 2004. *Manajemen Ternak Unggas*. Alfabeta: Bandung.
- _____. 2006. *Beternak Ayam Broiler*. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.
- _____. 1993. *Mengelola Itik Komersial*. Kanisius. Yogyakarta.
- Retno, F. D., J. Jahja., dan T. Suryani. 1998. *Penyakit-penyakit Penting pada Ayam*. Edisi ke-4. Bandung.
- Revington, B. 2002. *Feeding Poultry in The PostAntibiotic Era*. Multi-State Poultry Meeting, *Saccharomyces cereviceae as an Antibiotic Alternative* (Mulyono et al.) 151 Cambridge, Ontario. May 14 -16, 2002.
- Revolledo L , A. J. P. Ferreira , & G. C. Mead. 2006. *Prospects in salmonella control: competitive excluion, probiotics, and enhancement of avian intestinal immunity*. J Appl Poult Res. 15 : 341—351
- Riley, W. 1996. Probiuotics: *Using and microorganism of concern*. In ray, B dan M. Daesebul. *Food Biopreservatives of Microbial Origin*. CRC Press, London, Tokyo.

- Risnajati, D. 2011. *Pengaruh Jenis Alat Pemanas Kandang Indukan Terhadap Performan Layer Periode Starter*. Jurusan Produksi Ternak. Universitas Bandung Raya. Bandung.
- Samadi. 2004. *Feed quality for food safety*, kapankah di Indonesia. J. Inovasi 2(16) : 33 - 35.
- Scanes, C. G., G. Brant & M. E. Ensminger. 2004. *Poultry Science*. 4th Ed. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
- Scott, M. L. M. C. Nesheim, & R. J. Young. 1982. *Nutrition of The Chicken*. 3th Editions. Published by M. L. Scott Associates. Itacha. New York.
- Siregar.A.P.,M.H. Togatorof, dan M. Sabrani.1980. *Teknis Beternak Ayam Pedaging di Indonesia*. Margie Group. Jakarta.
- Siswandono dan Soekardjo. (1995). *Kimia Medisinal*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press. Halaman 3.
- Sjofjan, O. 2003. Kajian Probiotik (*Aspergillus niger* dan *Bacillus* sp.) sebagai Imbuhan Ransum dan Implikasinya terhadap Mikroflora Usus serta Penampilan Produksi Ayam Petelur. *Disertasi*. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Soeparno. 1994. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Stell, R. dan Torrie, J. 1991 *Prinsip Dan Prosedur Statistika : Suatu Pendekatan Biometrik*. Gramedia pustaka utama. Jakarta.
- Standarisasi Nasional Indonesia. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging (Broiler-Starter)*. SNI 01-3930-2006.
- Subronto dan Tjahajati. 2001. *Ilmu Penyakit Ternak*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Syukron, M. 2006. *Kandungan lemak dan kolesterol daging serta persentase organ dalam ayam broiler yang diberi ransum finisher dengan penambahan kepala udang*. Skripsi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprojo, S. Prawirokusumo dan S. Lebdoesoekojo. 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

- Wattimena J.R., Sugiarto, N.C, Widiyanto, M.B., Sukandar, E.Y. dan Soemardji, A.A 1991. *Fermako dinamika dan terapi antibiotik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____. 1986. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Wahju, J. 2004. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Cetakan ke-5. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____. 1992. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____. 1985. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Waskito, M.W. 1983. *Pengaruh Berbagai Faktor Lingkungan Terhadap Gula Tumbuhan Ayam Broiler*. Disertasi. Universitas Padjajaran, Bandung.
- Wibowo, S. 1996. *Petunjuk Beternak Ayam Buras*. Gramedia Press, Yogyakarta.
- Wijayanti, R. P. 2011. *Pengaruh Suhu Kandang yang Berbeda terhadap Performans Ayam Pedaging Periode Starter*. Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Winarno, F. G. 1997. *Kimia pangan dan Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiryanan, A. 2003. *Fungsi Probiotik Terhadap Dunia Peternakan*. GajahMada University Press, Yogyakarta.
- World Poultry. 2004. *Twenty Years of Production Enchancement*. Feed Business Information. 20 : 42-43
- Yeo, J and Kim. 1997. *Effect of feeding diets containing an antibiotic, a probiotic, or yucca extract on growth and intestinal urease activity in broiler chicks*. *Poult. Sci.* 76(2): 381- 385.

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1. Uji SPSS Performa Broiler Yang Diberikan Antibiotik Dan Probiotik.

Descriptives

Konsumsi Ransum

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
1	3	5.7300E2	3.60555	2.08167	564.0433	581.9567	569.00	576.00	
2	3	6.0133E2	44.81443	25.87362	490.0081	712.6586	573.00	653.00	
3	3	6.3467E2	20.30599	11.72367	584.2238	685.1095	621.00	658.00	
4	3	5.9800E2	20.88061	12.05543	546.1297	649.8703	584.00	622.00	
Total	12	6.0175E2	32.35071	9.33884	581.1953	622.3047	569.00	658.00	

Descriptives

Pertambahan Berat Badan

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
1	3	3.3667E2	18.00926	10.39765	291.9292	381.4041	319.00	355.00	
2	3	3.4967E2	106.40175	61.43108	85.3501	613.9833	249.00	461.00	
3	3	4.3533E2	109.43644	63.18316	163.4782	707.1885	309.00	501.00	
4	3	4.0333E2	130.06665	75.09402	80.2299	726.4368	262.00	518.00	
Total	12	3.8125E2	95.47596	27.56154	320.5875	441.9125	249.00	518.00	

M A K A S S A R

Descriptives

Konversi Ransum

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
1	3	1.0000	.00000	.00000	1.0000	1.0000	1.00	1.00	
2	3	1.3333	.57735	.33333	-.1009	2.7676	1.00	2.00	
3	3	1.3333	.57735	.33333	-.1009	2.7676	1.00	2.00	
4	3	1.3333	.57735	.33333	-.1009	2.7676	1.00	2.00	
Total	12	1.25000	.45227	.13056	-.9626	1.5374	1.00	2.00	

Descriptives

Konsumsi Air Minum

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
1	3	5.1467E2	53.29478	30.76975	382.2751	647.0582	474.00	575.00	
2	3	6.1667E2	77.55213	44.77474	424.0165	809.3168	545.00	699.00	
3	3	6.4300E2	68.46167	39.52636	472.9318	813.0682	564.00	685.00	
4	3	5.8267E2	89.00749	51.38850	361.5598	803.7735	493.00	671.00	
Total	12	5.8925E2	80.15227	23.13797	538.3237	640.1763	474.00	699.00	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Descriptives

Berat Badan Akhir

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum	Between-Component Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
1	3	3.8367E2	18.00926	10.39765	338.9292	428.4041	366.00	402.00	
2	3	4.1433E2	108.13109	62.42952	145.7208	682.9459	296.00	508.00	
3	3	4.8433E2	109.43644	63.18316	212.4782	756.1885	358.00	550.00	
4	3	4.4867E2	128.20426	74.01877	130.1896	767.1437	309.00	561.00	
Total	12	4.3275E2	94.31391	27.22608	372.8258	492.6742	296.00	561.00	

ANOVA

Konsumsi Air Minum

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	27740.250	3	9246.750	1.723	.239
Within Groups	42928.000	8	5366.000		
Total	70668.250	11			

ANOVA

Pertambahan Berat Badan

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	19193.583	3	6397.861	.631	.615
Within Groups	81078.667	8	10134.833		
Total	100272.250	11			

M A K A S S A R

ANOVA

Konversi Ransum

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.250	3	.083	.333	.802
Within Groups	2.000	8	.250		
Total	2.250	11			

ANOVA



Konsumsi Air Minum



	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	27740.250	3	9246.750	1.723	.239
Within Groups	42928.000	8	5366.000		
Total	70668.250	11			


ANOVA

Berat Badan Akhir

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	16987.583	3	5662.528	.560	.656
Within Groups	80858.667	8	10107.333		
Total	97846.250	11			







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2. Dokumentasi kegiatan penelitian

1. Persiapan Kandang



2. DOC (Day Old Chick)



M A K A S S A R

3. Penimbangan DOC



4. Vaksinasi



5. Bahan Ransum



6. Ransum digantung disetiap Sekat



7. Antibiotik *Zinc bacitracin*



8. Probiotik



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

9. Penimbangan Bobot Ayam



10. Pengukuran sisa air minum



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



11. Penimbangan Sisa Ransum



RIWAYAT HIDUP



Nama **Syarif Hidayatullah**, biasa dipanggil “Syarif”, penulis di dilahirkan di Tombolo, kecamatan tombolo pao, kelurahan Tamaona, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Lahir pada tanggal 24 Juni 1996. Anak ke 4 dari 4 bersaudara oleh pasangan Abd Razak dan Hadawiah. Pendidikan pertama penulis yakni, pada tahun 2002-2008 di Sekolah Dasar Negeri Tombolo Pao, Kemudian pada tahun 2008-2011, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Smp Negeri 1 Tombolo Pao, setelah itu pada tahun 2011-2014, Penulis melanjutkan pendidikan di Sma Negeri 1 Sinjai Barat. Dengan segala kerja keras, optimis dalam menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi, penerimaan mahasiswa baru 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya dan diterima disalah satu Universitas Negeri Makassar tepatnya Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains Dan Teknologi, Jurusan Ilmu Peternakan.

Berkat Rahmat Allah Subehanahu wa ta’ala dan doa orang tua, saudara, sahabat seperjuangan penulis dan menempuh pendidikan strata-1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Performa Broiler Yang diberikan Antibiotik Dan Probiotik”**.