

**PENGARUH MUROTTAL AL-QUR'AN PADA SAAT INKUBASI  
TERHADAP BOBOT TETAS DAN VIABILITAS PADA PUYUH**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Melulusi Meraih Gelar  
Sarjana Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan pada  
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas  
Islam Negeri Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

OLEH :

**MUSRIFA ALIAH**  
(60700114012)

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN****1. Yang bertandatangan dibawah ini:**

Nama : Musrifa Aliah

Nim : 60700114012

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli
  - b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka saya bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar, 27 Agustus 2018



Musrifa Aliah  
60700114012

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi Saudari **Musrifa Aliah** NIM 60700114012, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi penelitian yang bersangkutan dengan judul **"Pengaruh Murottal Al-Qur'an pada saat Inkubasi Terhadap Bobot Tetas dan Viabilitas Pada Puyuh"** Memandang bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Gowa, 6 Agustus 2018

Pembimbing I



**Khaerani Kiramang, S.Pt, M.P**  
NIP: 19730828 200604 2001

Pembimbing II



**Dr. Muh. Thahir Maloko, M.Hi**  
NIP: 19631731 199503 1 006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



**Dr. F. Basir Palv, M.Si**  
NIP: 195907121986031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul, "Pengaruh Murottal Al-Qur'an pada saat Inkubasi terhadap Bobot Tetas dan Viabilitas pada Puyuh " yang disusun oleh **MUSRIFA ALIAH**, NIM: 60700114012, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan, Jurusan Ilmu Peternakan.

Samata-Gowa, 27 Agustus 2018  
Dzul Hijjah, 1439 H

**DEWAN PENGUJI:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Ketua : Dr. Ir. Andi Suarda, S. Pt., M. Si

Sekretaris : drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si

Munaqasyah I : Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si

Munaqasyah II: Dr. Hamzah Hasan, M.Hi

Pembimbing I : Khacerani Kiramang, S.Pt., M.P

Pembimbing II : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,  
**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**  
NIP. 19691105199303 1 001

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt, pemilik alam semesta dengan pujian tidak pernah henti dan tak pernah hilang. Sebagai zat yang Maha pengasih dan Maha penyayang yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur dalam mengawasi setiap perilaku hambanya sungguh Dia lah zat yang Maha sempurna. Semoga salam dan lawat tetap terlimpahkan kepada sang manusia sempurna sebagai Rahmatan lilalamin yang sampai akhir hayat beliau tetap mengkhawatirkan nasib para pengikutnya hingga akhir zaman, Nabi Muhammad saw sang Nabi dan Rasul terakhir, pembawa wahyu-Nya, pemberi cahaya dari kegelapan dan belunggu kebodohan sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Murottal Al-Qur’an pada saat Inkubasi Terhadap Bobot Tetas Dan Viabilitas Puyuh” dapat dirampungkan.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih dan rasa hormat yang tiada hentinya kepada dua orang terkasih dalam hidup penulis yaitu **Ayahanda Hamzah** dan **Ibunda tercinta Naisa**. Terima kasih atas segala doa, motivasi dan materi yang telah diberikan untuk keberhasilan penulis hingga sekarang. Selama penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi, namun semuanya dapat dilalui berkat pertolongan Allah swt serta bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tak langsung yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi bagi penulis dengan rasa penuh keikhlasan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. Arifuddin., M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. **Ibu Dr. Wasila, S.T, M.T.** selaku wakil dekan 1 bidang akademik Fakultas Sains dan Teknologi, **Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi,** selaku wakil dekan 2 bidang administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan **Bapak Dr. Ir. Suarda, M.Si** selaku wakil dekan 3 bidang mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi.
3. **Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly** selaku ketua Jurusan Ilmu Peternakan, dan **Ibu Astaty, S. Pt., M.P** selaku sekretaris jurusan Ilmu Peternakan.
4. Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Khaerani Kiramang, S. Pt. M.P** yang telah memberikan banyak saran, bimbingan, arahan, dan pengalaman selama melaksanakan penelitian. Tidak lupa pula kepada **Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi** sekaligus sebagai pembimbing II yang telah senang hati meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly** dan **Bapak Dr. Hamsah Hasan, M.Hi** selaku penguji dalam proses penyusunan skripsi.
6. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Ilmu Peternakan** yang telah mengajar dan membagikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan.

7. Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Wijiono**, yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian di Djiyom Puyuh Makassar serta bimbingan, arahan, dan pengalaman selama melaksanakan penelitian dilapangan.
8. **Kakak Andi Afriana, S.E** selaku staf jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari proposal hingga skripsi.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Muslinah, Mutmainnah, Mirnawati, Radhyah Ramdani, Nur Baya dan Khaedar** yang telah membantu dalam penelitian.
10. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Angkatan 2014, dari semester awal sampai sekarang ini telah bersedia berbagi pengalaman, memberikan motivasi sehingga penulis bersemangat mengerjakan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada **senior Angkatan** dan **junior** jurusan Ilmu Peternakan UIN Alauddin Makassar.
12. Teman-teman **KKN Angkatan 57 Desa Mata Allo, kecamatan Alla, kabupaten Enrekang**.
13. Terima kasih kepada saudara dan saudariku yaitu **Rusdia, Ruhania, Rahmawati, Syamsu Duha, Raodatul Jannah dan Fatahillah** yang telah bersedia meluangkan waktu, motivasi dan dukungan secara materi maupun nonmateri kepada penulis.

14. Terima kasih kepada teman-teman kost yaitu **Khaerani. T, Nur Wahidah, Aslinda, Siti Amelia, Nur Anisa, dan Nur Aminah** yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang belum sempat penulis tuliskan dan telah memberikan kontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian studi, penulis mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya sebagai seorang manusia yang tidak luput dari keterbatasan, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan senang hati dan dengan segala kerendahan hati menerima segala kritikan dan masukan yang bersifat membangun guna memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta manfaat bagi masyarakat, juga para pembaca dan khususnya bagi pribadi penulis sendiri. Semoga segala dukungan moral dan doa dari segala pihak mendapat balasan dari sang maha pencipta 'Aamiin Ya Rabbal Alamin'.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Makassar, Agustus 2018  
Penulis

Musrifa Aliah

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Hipotesis .....	5
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
G. Defenisi Operasional.....	5
H. Kajian Terdahulu.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	9
A. Tinjauan Al-Qur'an.....	9
B. Golombang Bunyi .....	14
C. Murottal Al-Qur'an.....	15
1. Pengertian Murottal Al-Qur'an .....	15
2. Manfaat Murottal Al-Qur'an .....	18
D. Burung Puyuh.....	22
E. Penetasan Telur.....	25
F. Telur Tetas .....	26
1. Telur Fertil dan Infertil .....	27
2. Kualitas Telur.....	28
G. Pemilihan Telur Tetas.....	35
H. Inkubasi Telur Tetas .....	36
1. Suhu Mesin Tetas.....	37
2. Kelembapan Mesin Tetas.....	38
3. Sirkulasi Udara.....	39

4. Pemutaran Telur .....	40
I. Perkembangan Embrio Saat Inkubasi .....	41
J. Bobot Tetas DOQ .....	41
K. Viabilitas DOQ .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Waktu dan Tempat .....	48
B. Materi Penelitian .....	48
C. Jenis Penelitian .....	48
D. Metode Penelitian .....	48
E. Prosedur Penelitian .....	49
1. Penyiapan Telur .....	49
2. Persiapan Mesin Tetas .....	49
3. Peletakan Telur dalam Mesin Tetas .....	50
4. Pemutaran Murottal al-Qur'an .....	50
5. Inkubasi Telur .....	51
6. Diagram Alir .....	51
F. Parameter yang Diukur .....	52
1. Bobot tetas .....	52
2. Viabilitas .....	52
G. Analisa Data .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Hasil .....	54
B. Pembahasan .....	54
1. Bobot Tetas .....	54
2. Viabilitas DOQ .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

No.	Teks	Halaman
1.	Puyuh <i>Coturnix-coturnix japonica</i> .....	24
2.	Mesin Tetas.....	26
3.	Perbedaan Telur fertil dan infertil, a. Blastoderm dan b. Blastodisc .....	28
4.	Kualitas Telur Berdasarkan Bentuk Telur.....	30
5.	Sruktur Telur.....	31
6.	Telur Puyuh.....	36
7.	Diagram Alir Tahapan Penelitian.....	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**DAFTAR TABEL**

1. Kadar MDA Induk Mencit, Panjang, Berat Badan dan Jumlah Fetus .....	7
2. Komposisi Zat Makanan Putih Telur, Kuning Telur dan Telur Utuh .....	31
3. Komposisi perubahan berat telur selama perkembangan embrio.....	41
4. Pengaturan temperatur dan waktu pembalihan pada inkubasi telur puyuh.....	51
5. Bobot DOQ pada kelompok kontrol dan kelompok murottal tanpa pemberian perlakuan dan pemberian paparan murottal al-Qur'an.....	54
6. Viabilitas DOQ pada kelompok kontrol dan kelompok murottal tanpa diberi perlakuan dan pemberian paparan murottal al-Qur'an .....	54

**ABSTRAK**

**Nama** : Musrifa Aliah  
**Nim** : 60700114012  
**Jurusan** : Ilmu Peternakan  
**Judul Skripsi** : Pengaruh Murottal Al-Qur'an Pada Saat Inkubasi Terhadap Bobot Tetas dan Viabilitas Puyuh

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Murottal Al-Qur'an pada saat Inkubasi terhadap Bobot tetas dan Viabilitas Puyuh. Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Djiyon Puyuh Makassar Macanda kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 55 hari. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis statistik uji *independent samples test-T*, membandingkan 2 kelompok perlakuan yaitu kelompok kontrol (tanpa ada perlakuan) dan kelompok murottal (pemutaran murottal) dengan setiap kelompok 3 kali ulangan, Penelitian ini menggunakan murottal al-Qur'an surah ar-Rahman oleh qori' Muhammad Taha Al Junaid. Parameter yang diukur yaitu bobot tetas dan viabilitas DOQ. Hasil yang diperoleh murottal al-Qur'an berpengaruh nyata terhadap bobot tetas DOQ dan viabilitas DOQ.

***Kata kunci*** : Murottal al-Quran, Bobot tetas, Viabilitas, DOQ.

## ABSTRACT

**Name** : Musrifa Aliah  
**Nim** : 60700114012  
**Department** : Animal Husbandry  
**Thesis Title** : The Effect of Murottal Al-Qur'an When Incubation on Hatching weights and Viability of Quail

---

This study aims to determine the effect of Murottal Al-Qur'an when incubation on hatching weights and Viability of Quail. This research was carried out at the Djiyon Puyuh Makassar Macanda Farm in Gowa district, South Sulawesi province for 55 days. The research used in this study is statistical analysis *independent samples test-T*, comparing 2 treatment groups, namely the control group (without treatment), murottal (murottal playback) with each group 3 times repetition, this study uses murottal al-Qur'an surah ar-Rahman by qori 'Muhammad Taha Al Junaid. The parameters measured are hatching weights and viability of quail. And the results obtained were that there was a murottal significantly effect of the Qur'an on DOQ hatching weight and DOQ viability.

**Keyword**: *Murottal al-Qur'an, Hatching Weights, Viability, DOQ.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Penetasan merupakan proses perkembangan embrio dalam telur sampai menetas. Penetasan dapat dilakukan secara alami oleh induk atau secara buatan dengan menggunakan inkubator (mesin tetas). Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penetasan yaitu tatalaksana pengaturan temperatur yang tepat, kelembapan dan ventilasi.

Elsayed (2009), menyatakan bahwa embrio sangat sensitif terhadap suhu penetasan yang lebih rendah atau lebih tinggi, suhu penetasan yang lebih rendah akan memperlambat dan semakin tinggi suhu inkubasi akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Sehingga sangat perlu diperhatikan tatalaksana inkubasi yang akan diterapkan pada saat penetasan karena berpengaruh penting untuk perkembangan embrio menjadi seekor ayam yang normal. Salah satu parameter yang dilihat dari keberhasilan penetasan yaitu bobot tetas dan viabilitas yang sangat dipengaruhi lingkungan pada saat ditetaskan. Menurut Barri (2008) menyatakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kualitas pada masa inkubasi yaitu berdampak pada fisiologi perkembangan embrio.

Masa inkubasi pada telur tetas ayam yaitu selama 21 hari, perkembangan embrio ayam dalam telur selama proses penetasan, penting untuk diketahui. Pada hari pertama, selama inkubasi selama 16 jam, tanda pertama

diketahui adalah embrio ayam dan setelah 24 jam sudah terbentuk mata. Pada hari ke-2 selama inkubasi satu jam, mulai terbentuk jantung. Pada hari ke-3 masa inkubasi 8 jam, mulai terbentuk amnion, 6 jam kemudian terbentuk alantois, dan seterusnya sampai hari ke-21 (Murtidjo,1992).

Semua sel akan membentuk menjadi embrio yang berasal dari epiblas, beberapa penelitian tentang pengaruh suara terhadap sel telah dilaporkan diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Lestard (2013) bahwa suara dapat mengubah siklus sel dan selanjutnya akan mempengaruhi lipid dan proteinnya. Weinberger (1972) melaporkan suara dapat beresonansi dengan organel sel, sehingga dapat meningkatkan getaran sitoplasma didalam sel. Hal ini diperkuat oleh Jones (2000) yang menjelaskan bahwa suara mampu meningkatkan proliferasi sel *gingiva* manusia, berdasarkan hasil penelitian tersebut, suara terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan sel. Hal ini dimungkinkan juga terjadi pada suara murottal yang sama-sama terbentuk dari gelombang dan frekuensi, namun murottal memiliki keunikan yang lebih dibandingkan dengan suara lainnya yaitu pada makna dan sisi spiritualnya, sehingga lebih menarik.

Setiap suara termasuk murottal terbentuk dari getaran-getaran atau gelombang yang bergerak di udara. Jumlah getaran atau banyaknya gelombang yang dihasilkan per detiknya disebut dengan frekuensi. Frekuensi yang dihasilkan dari sebuah suara dapat menggetarkan sel-sel tubuh sehingga keseimbangan tubuh dapat terjaga (Anwar, 2010).

Menurut Remolda (2009), karena adanya sisi spiritual tersebut murottal mampu memberikan efek positif terhadap sel-sel tubuh begitupun sebaliknya

seperti penelitian yang dilakukan Yuliati (2005) yang melaporkan kebisingan dapat menyebabkan terganggunya metabolisme induk yang nantinya mengakibatkan kerusakan sejumlah sel pada fetus tikus putih, hal ini membuktikan bahwa bunyi memiliki pengaruh terhadap perkembangan sel termasuk pada perkembangan sel embrio.

Menurut Silaturrohmi (2016) al-Qur'an merupakan firman Allah swt. yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw, sebagai petunjuk kehidupan bagi seluruh manusia. Petunjuk yang ada didalamnya meliputi segala aspek kehidupan, sebagai acuan tindakan dan perilaku baik di dunia yang menjelaskan keimanan, akhlak, dan ilmu pengetahuan, maupun di akhirat yang mengenai gambaran kehidupan setelah kematian dan adanya balasan selama hidup di dunia. Keselarasan bahasanya terlihat dari susunan rangkaian kalimatnya, sehingga menjadikan makna al-Qur'an menjadi beralur dan mampu mengungkapkan maksud atau makna yang jelas.

Terapi musik umum dilakukan untuk minimalisasi stres selama kehamilan. Seni melantunkan ayat-ayat al-Qur'an dengan nada tertentu atau disebut murottal termasuk salah satu suara yang memiliki efek positif dan menenangkan bagi pendengarnya (Widayarti, 2011). Mendengarkan musik maupun suara yang tenang diketahui dapat menstabilkan kondisi fisik dan psikologis ibu selama kehamilan, membantu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi janin, serta meningkatkan ikatan batin antara ibu dan janin (Campbell, 2001).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh murottal al-Qur'an semuanya memberikan pengaruh positif. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2013) terhadap manusia yaitu "Perbedaan Pengaruh stimulasi antara musik klasik dan murottal terhadap denyut jantung janin dan gerakan janin pada ibu hamil trimester II serta III", dan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2017) terhadap hewan yaitu fetus mencit dimana perlakuan pemberian murottal yaitu fetus memiliki struktur dan morfologis yang normal dengan panjang dan bobot badan yang relatif proporsional. Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang "pengaruh murottal al-Qur'an pada saat inkubasi terhadap bobot tetas dan viabilitas pada puyuh".

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh murottal al-Qur'an pada saat inkubasi terhadap bobot tetas dan viabilitas pada puyuh.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui adanya pengaruh murottal al-Qur'an pada saat inkubasi terhadap bobot tetas dan viabilitas pada puyuh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh paparan murottal al-Qur'an terhadap bobot tetas dan viabilitasnya pada puyuh.
2. Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek positif khususnya bagi peternak yang ingin menggunakan metode murottal al-Qur'an saat menetas telur tetas.

### E. *Hipotesis*

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga paparan murottal al-Qur'an pada saat inkubasi mempengaruhi terhadap bobot tetas dan viabilitas pada puyuh.

### F. *Ruang Lingkup Penelitian*

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh paparan murottal al-Qur'an terhadap bobot tetas dan viabilitas pada puyuh.

### G. *Defenisi Operasional*

1. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang paling istimewa. Betapa tidak, al-Qur'an adalah firman Allah swt. Al-Qur'an mengandung banyak kemukjizatan yang tidak dapat tertandingi. Al-Qur'an diturunkan kepada seorang Nabi yang juga istimewa, Muhammad saw. Al-Qur'an menjadi penyempurna kitab suci yang datang sebelumnya. Dan al-Qur'an dapat menjadi obat bagi penyakit *dzahir* dan batin manusia.
2. Murottal al-Qur'an adalah rekaman suara al-Qur'an yang digunakan oleh seorang *qori* (pembaca al-Qur'an). Murottal al-Qur'an juga dapat diartikan sebagai lantunan ayat-ayat suci al-Qur'an yang dilagukan oleh seorang *qori* (pembaca al-Qur'an), direkam dan diperdengarkan dengan tempo yang lambat serta harmonis.
3. Bobot tetas merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha penetasan. Untuk mendapatkan bobot tetas yang baik perlu dilakukan seleksi telur yang baik seperti memilih telur dari induk yang sehat.

4. Viabilitas merupakan kemampuan anak puyuh untuk bertahan hidup setelah menetas (maksimal 48 jam setelah menetas dan kondisi bulu kering).

#### H. *Kajian Terdahulu*

1. Penelitian Kurniasari dkk (2017) dengan judul penelitian “Kadar *Malondialdehyde* Induk dan Struktur Morfologis *Fetus* Mencit (*Mus musculus*) yang Diperdengarkan Murottal dan Musik Rock pada Periode Gestasi”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa induk mencit yang diperdengarkan musik rock (R) pada periode gestasi memiliki rerata kadar MDA yang lebih tinggi dibandingkan dengan induk mencit dari kelompok kontrol (K) dan kelompok yang diperdengarkan murottal (M). Induk mencit pada kelompok K, M dan R masing-masing memiliki rerata kadar MDA sebesar  $1,52 \pm 0,85$  nmol/mL;  $0,42 \pm 0,21$  nmol/mL; dan  $2,99 \pm 0,66$  nmol/mL (Tabel).

Tabel 1. Kadar MDA Induk Mencit, Panjang, Berat Badan dan Jumlah Fetus.


Kelompok Perlakuan	Kadar MDA (nmol/mL)	Panjang Fetus (mm)**	Berat Badan Fetus (g)**	Jumlah Fetus		
				* Hidup	Abnormal	Mati
Kontrol (K)	$1,52 \pm 0,85^a$	$18,54 \pm 0,70^a$	$0,66 \pm 0,05^a$	50	-	1
Murottal (M)	$0,42 \pm 0,21^b$	$18,72 \pm 0,90^a$	$0,74 \pm 0,05^b$	47	-	-
Rock (R)	$2,99 \pm 0,66^a$	$17,59 \pm 1,20^b$	$0,69 \pm 0,08^c$	44	2	1

2. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Qudsi dan (2015) dengan judul “Pengaruh Radiasi EMF Smartphone Terhadap Perkembangan Anomali

dan Mortalitas Embrio anak ayam. Penelitian ini menggunakan telur hibrida telur *Rhode island red* dibagi menjadi kelompok kontrol (Kelompok A = 18) dan kelompok eksperimen (Kelompok B = 18). Kedua kelompok diinkubasi pada inkubator terpisah pada suhu 37 °C. Kelompok eksperimen telah dipapar dengan ponsel aktif saat inkubasi. Ponsel itu tetap dalam mode dering diam dan berdering selama 15 menit setiap empat kali sehari. Embrio kontrol dan juga percobaan diekstraksi pada hari ke-7 dan ke-14 hari inkubasi. Anomali perkembangan dan tingkat kelangsungan hidup kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Tingkat pertumbuhan kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol. Juga *deformitas* terlihat pada perkembangan anggota tubuh, pembentukan mata, kelengkungan leher dan kelainan pada paruh, terlihat pada kelompok eksperimen. Disimpulkan bahwa *eksposur* EMF dapat menyebabkan anomali perkembangan, peningkatan berat badan, panjang dan tingkat kematian yang meningkat pada embrio anak ayam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Qudsi dan (2012) dengan judul “Pengaruh Radiasi Elektromagnetik ponsel pada perkembangan embrio anak ayam” yang mengelompokkan embrio ayam menjadi dua kelompok dan diinkubasi pada suhu 37,5 °C. Kelompok ini diberi paparan radiasi dari smartphone yang aktif (900MHz-1800MHz) dan diinkubasi. Smartphone tersebut berdering 4 kali sehari selama 15 menit setiap kali. Cacat bawaan yang terlihat pada embrio adalah ukuran embrio lebih

besar, adanya perdarahan subkutan, dan *malformasi* otak kemudian dibandingkan dengan kontrol. Juga terjadi peningkatan pertumbuhan mata pada hari ke 7-10, yaitu penebalan saraf retina di usia dini. Dari penelitian ini di dapatkan hasil kesimpulan bahwa smartphone dengan gelombang elektromagnetik (900MHz-1800MHz) dapat menyebabkan pertumbuhan mata embrio sampai hari 10 selama masa inkubasi, dan terlihat kemungkinan dapat menyebabkan kelainan otak.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Tinjauan Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada manusia dan alam semesta. Al-Qur'an diturunkan kepada manusia dengan berbagai kemujizatan salah satunya yaitu dengan adanya fenomena-fenomena alam semesta yang menjadi bukti kebesaran Allah. Pada penelitian ini menggunakan murottal al-Qur'an pada saat melakukan penetasan pada telur ayam, diharapkan memberikan pengaruh terhadap perkembangan embrio pada telur ayam, khususnya sel-sel dalam telur yang kemudian akan mengalami pertumbuhan dan berkembang menjadi embrio selama 17 hari. Dengan adanya paparan murottal al-Qur'an terhadap sel tersebut diharapkan mampu direspon positif oleh sel, hal ini dapat terjadi karena seluruh komponen alam bertasbih kepada Allah swt. tidak terkecuali juga sel yang berperan sebagai penyusun terkecil pada makhluk hidup. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Isra' 17/ 44 yaitu:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ  
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

Terjemahnya:

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun (Kementrian Agama, 2015).

Makna ayat tersebut mengisyaratkan bahwa alam semesta dan seluruh komponen didalamnya hanya bertasbih kepada Allah swt. Hal ini dapat diartikan

tunduk dan patuh kepadanya (Alif, 2010). Tasbih kepada Allah swt. adalah sikap tunduk kepada-Nya dan melakukan apa yang Dia perintah, baik dengan lisan, niat tindakan, atau ketaatan. Semua makhluk memuliakan Allah swt., tidak hanya manusia tetapi juga langit, bumi, dan seluruh alam semesta juga, mereka semua tunduk kepada Allah swt. sebagai ekspresi mereka terhadap tasbih kepada-Nya (Hamka, 1999).

Shihab (2012) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para ulama berkesimpulan tidaklah tepat memahami *tasbih* yang dimaksud ayat ini dalam arti *majaazi*, hanya ditempuh bila maknanya tidak lurus dengan pengertian *hakiki*. Tidak juga wajar ayat ini dipahami dalam arti bahwa sebagian dari yang *maujud* yaitu seperti manusia dan malaikat bertasbih dengan ucapan, sedang sebagian lainnya yakni benda-benda tak bernyawa bertasbih dalam pengertian *majaazi*, yakni melalui wujudnya yang membuktikan wujud Allah Yang Maha Esa. Yang benar adalah *lafadz tasbih* di sini adalah *hakiki* dan dalam bentuk *ucapan* baik bagi manusia, malaikat, maupun benda-benda yang dinamai tidak bernyawa, hanya saja yang dimaksud dengan ucapan tasbih benda-benda itu tidak harus dengan *lafadz* tertentu atau suara yang terdengar sebagaimana makna *kalam* dan *ucapan* yang telah diuraikan pada awal bahasan ini. Sehingga *Thabathaba'i* menegaskan firman Allah di atas, menetapkan adanya tasbih bagi ketujuh langit dan bumi serta isinya dalam bentuk tasbih *hakiki*.

Keterkaitan dengan itu bahwa setiap titik pasir, setiap bongkah batu, setiap lembar daun, setiap batang pohon, setiap kuntum bunga, setiap butir buah, setiap binatang melata di muka bumi, setiap burung di angkasa, dan setiap

binatang yang berenang di air, dari sebutir atom hingga gugusan galaksi semuanya shalat dan bertasbih kepada Allah swt. akan tetapi tasbih itu tidak didengar dan dipahami oleh manusia, sedangkan tasbih yang kita ketahui adalah *subhanallah*. Jagat raya tak pernah diam, senantiasa bergerak menuju Allah melalui shalat dan tasbih. Bertasbih adalah fitrah seluruh makhluk. Semua diciptakan dengan naluri bertasbih, menyucikan dan memuji Sang Pencipta. tiada waktu tanpa alunan tasbih (Syawqi, 2006).

Fenomena kehidupan ini merupakan sesuatu yang membingungkan manusia. Dari situlah sulit baginya untuk mengenali yang berkenaan dengan kehidupan ini, meskipun kita paham akan proses-proses biologi seperti proses pencernaan makanan, pertumbuhan, reproduksi, adaptasi dan proses-proses lain yang sebenarnya dapat digunakan untuk membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Akan tetapi jika tahu bahwa benda-benda mati bisa melakukan sebagian proses-proses itu, maka batasan yang diletakkan oleh manusia antara makhluk hidup dan benda mati semakin misterius, sehingga pembeda ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipikul oleh kemampuan manusia (An-Najjar, 2007).

Bukti lain dari kemurnian al-Qur'an adalah, semakin majunya zaman, al-Qur'an masih tetap bisa dibuat pedoman, bahkan dibidang embriologi modern, sehingga tidak heran banyak ilmuwan yang masuk Islam, Keith Moore misalnya, Keith Moore adalah ilmuwan dalam bidang embriologi yang masuk Islam karena meneliti ayat al-Qur'an yang membahas tentang embriologi, Keith Moore takjub

tentang kebenaran ayat-ayat yang menjelaskan embriologi dalam al-Qur'an (Yusuf, 2013).

Tentang proses pertumbuhan dan kejadian manusia dalam rahim, dijelaskan dalam surah al-Mu'minun 23/ 12-14.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ<sup>٧٨</sup>

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami menjadikannya dia makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik (Kementrian Agama, 2015).

Melalui proses metabolisme, saripati tadi berubah menjadi *nutfah*. Kata *nutfah* diterjemahkan sejumlah amat kecil bagian dari total volume suatu zat. Kata ini terdapat sebelas kali dalam al-Quran. Kata tersebut berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti jatuh bertitik atau menetes yang berasal dari akar kata yang berarti mengalir. Arti utamanya merujuk kepada jejak cairan yang tertinggal di dasar suatu ember setelah ember tersebut dikosongkan. *Nutfah* dalam bahasa Arab berarti sejumlah kecil (sperma). Dengan kata lain sejumlah sangat kecil cairan yang merupakan arti kedua kata tersebut yaitu setetes air. *Nutfah* dalam arti yang lain berarti setetes yang dapat membasahi. Dari sini

dapat dipahami bahwasanya *nutfah* adalah bagian terkecil sel reproduksi laki-laki dan perempuan, bukan seluruhnya (Shihab, 2012).

Jika proses ini berjalan mulus, maka akan terbentuklah campuran cairan sperma (*spermatozoa* dan *ovum*), yang disebut *zigot*. *Zigot* melakukan proses pembelahan *mitosis* menjadi beberapa sel kecil, kemudian terbelah lagi menjadi sel-sel kecil, dengan sebuah proses yang disebut proses pembelahan (*deavege*) hingga menjadi sebuah bola yang sarat dengan sel-sel kecil yang disebut *morula*. Kemudian *morula* tersebut mencekung untuk menjadi *blastula (uraimah)* yang tertanam di lapisan bagian dalam dinding rahim, membentuk sebuah fase yang disebut *gastrula*, atau dalam bahasa al-Qur'an fase *alaqah* (gumpalan darah milik lintah), dan istilah terakhir ini jelas lebih mendalam (An-Najjar, 2007).

Selanjutnya, gumpalan mirip darah lintah (*alaqah*) tumbuh menjadi gumpalan daging yang terkunyah, *mudhgah*. Proses selanjutnya adalah tahap penciptaan tulang dan pembungkusannya dengan daging (otot dan kulit). Kemudian berlangsung fase pembentukan janin menjadi makhluk lain (An-Najjar, 2007).

Bukan hanya manusia bertasbih kepada Allah tapi semua alam semesta ini bertasbih kepada Allah yaitu dengan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah melalui tanda-tanda kekuasaan Allah. Salah satunya yaitu membuktikan melalui penelitian yang dilakukan manusia. Salah satunya yaitu al-Qur'an ketika dibaca akan berpengaruh positif bagi pembacanya maupun yang mendengar serta alam ikut merespon dengan mengepresikan dalam bentuk dan cara yang bermacam-macam.

## **B. *Gelombang Bunyi***

Gelombang merupakan rambatan energi getaran yang merambat melalui medium atau tanpa melalui medium (Halliday, 2010). Berdasarkan mediumnya gelombang dibedakan menjadi dua yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang arah rambatannya memerlukan medium perantara sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang arah rambatannya tanpa menggunakan medium. Berdasarkan rambatannya gelombang dibagi menjadi dua yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang rambatan sejajar dengan getaran dan mediumnya sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang rambatannya sejajar dengan getaran dan mediumnya (Bambang, 2008).

Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa sel-sel tubuh dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk gelombang cahaya, gelombang radio dan gelombang suara (Elzaky, 2014). Gelombang suara merupakan getaran molekul-molekul zat yang saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi, tetapi tidak pernah terjadi perpindahan partikel. Dengan kata lain bunyi mempunyai energi, karena bunyi merupakan salah satu bentuk gelombang yang memiliki kemampuan untuk menggetarkan partikel-partikel yang dilalui (Resnick dan Halliday, 1992).

Pada 1960, ilmuwan Swiss Hans Jenny menemukan bahwa suara mempengaruhi berbagai material dan memperbaiki partikular-partikularnya, dan bahwa setiap sel tubuh memiliki suaranya sendiri dan akan terpengaruh oleh

pembaruan suara serta material di dalamnya. Pada 1974, para peneliti Fabien Maman dan Sternheimer mengumumkan penemuan yang sangat mengejutkan. Mereka menemukan bahwa setiap bagian dari tubuh memiliki sistem getaran sendiri, sesuai dengan hukum fisika. Beberapa tahun kemudian, Fabien dan Grimal, peneliti lainnya, menemukan bahwa suara mempengaruhi sel-sel terutama sel-sel kanker, dan bahwa suara-suara tertentu memiliki pengaruh yang kuat hal yang ajaib yang ditemukan oleh kedua peneliti tersebut adalah suara yang memiliki efek yang paling kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara manusia itu sendiri (Al-Kaheel, 2010).

Lantunan ayat suci al-Qur'an menciptakan sekelompok frekuensi yang mencapai telinga kemudian bergerak ke sel-sel otak dan mempengaruhinya 34 melalui medan-medan elektromagnetik. Frekuensi ini yang dihasilkan dalam sel-sel ini. Sel-sel itu akan merespon medan-medan tersebut dan memodifikasi getaran-getarannya, perubahan pada getaran ini adalah apa yang manusia rasakan dan pahami setelah mengalami dan mengulang. Hal ini adalah sistem alami yang Allah ciptakan pada sel-sel otak dan merupakan sistem keseimbangan alami (Hadi, 2010).

### C. *Murottal Al-Qur'an*

#### 1. Pengertian Murottal Al-Qur'an

Murottal berasal dari bahasa Arab yaitu *ro-ta-la* yang artinya tersusun rapi (Munawwir, 1997). Sedangkan *rottala* dengan tambahan *tadh'if* atau penggandaan huruf "t/ta" di tengah, artinya menyusun rapi secara pelan-pelan. Murottal artinya sesuatu yang dibaca pelan dan disusun rapi, merupakan kata

berbentuk objek atau *maf'ul* (objek) dari *rottala*. Dan ini terkait dengan ketentuan ilmu tajwid. Didalamnya diatur teknis ketetapan, kesahihan pengucapan kata dan kalimat al-Qur'an berupa panjang, pendek dan dengung-dengungnya (Ustman, 1994).

Defenisi al-Murottal berasal dari kata Ratlu As-syaghiri (tumbuhan yang bagus dengan masaknyanya dan merekah) sedangkan menurut istilah adalah bacaan yang tenang, keluaranya huruf dari *makhroj* sesuai dengan semestinya yang disertai dengan renungan makna. Jadi al-Murottal yaitu pelestarian al-Qur'an dengan cara merekam dalam pita suara dengan memperhatikan hukum-hukum bacaan, menjaga keluaranya huruf-huruf serta memperhatikan waqaf-waqaf (tanda berhenti) (Anwar, 2008).

Murottal al-Qur'an adalah salah satu musik dengan intensitas 50 desibel yang membawa pengaruh positif. Intensitas suara yang rendah merupakan intensitas suara kurang dari 60 desibel sehingga menimbulkan kenyamanan dan tidak nyeri. Terapi murottal al-Qur'an dapat menstimulasi gelombang alpha yang 13 akan menyebabkan pendengarnya mendapat keadaan yang tenang, tentram dan damai (Andraini, 2015).

Untuk menguatkan (*tahqiq*) kelestarian al-Qur'an maka digunakanlah media rekaman. Pada masa sekarang, media dan alat perekam suara telah ditemukan sehingga media tersebut bisa dimanfaatkan untuk merekam bacaan al-Qur'an dan rekaman bacaan tersebut bisa diulang kembali. Hal ini juga sangat berguna dalam rangka menyebarkan al-Qur'an dan mengembangkannya di dunia islam terutama di negeri-negeri yang kekurangan pakar (Awad, 2010).

Keterikatan bunyi bacaan al-Qur'an dengan sistem tajwid menunjukkan keserasian rangkaian kalimatnya yang memiliki kelebihan dari sisi musikalitas, dimana struktur internal musikalitas dengan karakter fonologi al-Qur'an, pola penyusunan kalimat yang puitis dan prosaik, keberadaan fitur rima akhir, coda, serta refrain. Semua unsur ini dikategorikan sebagai musikalitas internal karena unsur-unsur tersebut berada satu paket di dalam al-Qur'an (Akbar, 2009). Membaca al-Qur'an adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Seperti yang telah disebutkan dalam surah al-Muzammil 73/ 4 yaitu:

وَرَتِّلِ الْفُرَّانَ تَرْتِيلًا ۝

Terjemahnya:

Dan bacalah al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan (Kementrian Agama, 2015).

Kata *rattil* dan *tartil* terambil dari kata *ratala* yang antara lain berarti serasi dan indah. Kamus-kamus bahasa merumuskan bahwa segala sesuatu yang baik dan indah dinamai *ratl* seperti gigi yang putih dan tersusun rapi, demikian pula benteng yang kuat dan kokoh. Ucapan-ucapan yang disusun secara rapi dan diucapkan dengan baik dan benar dilukiskan dengan kata-kata *tartil al-kalam* (Shihab, 2002).

*Tartil* al-Qur'an adalah membaca dengan perlahan-lahan sambil memperjelas huruf-huruf berhenti dan memulai (*ibtida'*), sehingga pembaca dan pendengarnya dapat memahami dan menghayati kandungan pesan-pesannya (Shihab, 2002).

## 2. Manfaat Murottal Al-Qur'an

Mendengarkan al-Qur'an memiliki efek yang sangat baik untuk tubuh, seperti memberikan efek menenangkan, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kemampuan konsentrasi, menyembuhkan berbagai penyakit, menciptakan suasana damai dan meredakan ketegangan saraf otak, meredakan kegelisahan, mengatasi rasa takut, memperkuat kepribadian, dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Hal ini dikarenakan setiap suara termasuk murottal terbentuk dari getaran-getaran atau gelombang yang bergerak di udara (Anwar, 2010).

Setiap suara atau sumber bunyi memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Bacaan al-Qur'an yang dibaca dengan tartil yang bagus dan sesuai dengan tajwid memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang mampu mempengaruhi otak secara positif dan mengembalikan keseimbangan dalam tubuh (Chendy, 2016). Berbeda dengan murottal, musik akan terdengar indah karena tercipta dari alat atau suara manusia yang penataan bunyinya secara cermat dapat membentuk pola yang teratur (Elzaky, 2014).

Suara yang didengar manusia terdiri dari getaran mekanik yang mencapai telinga kemudian sel-sel otak yang terhubung dengan getaran-getaran itu dan mengubah getaran-getarannya sendiri. Dengan demikian, suara dianggap sebuah kekuatan penyembuhan yang efektif, tergantung pada sifat suara dan frekuensinya. Manusia bisa menemukan kekuatan penyembuhan itu di dalam al-Qur'an karena itu kitab Allah (Nirwana, 2014). Fakta menarik jika al-Qur'an dibaca dengan menggunakan aturan yang benar maka akan hadir sebuah alunan

musikal yang indah, sehingga menimbulkan satuan suara yang harmonis (Muhaya, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad al-Qadiy tentang pengaruh al-Qur'an bagi organ tubuh, penelitian berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an, seorang muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar. Penurunan depresi, kecemasan, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, menangkal berbagai macam penyakit merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek penelitiannya (Al-Kaheel, 2011).

Mendengarkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an dengan *tartil* akan mendapatkan ketenangan jiwa. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surah al-A'raf 7/203-204 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٦٥

Terjemahnya:

Dan apabila engkau (Muhammad) tidak membawa suatu ayat al-Qur'an kepada mereka, mereka berkata, "Mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu?". Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. (al-Qur'an) ini adalah bukti-bukti yang nyata Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat (Kementrian Agama, 2015).

Ayat tersebut memerintahkan untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan al-Qur'an dan berdzikir mengingat Allah swt. terus-menerus. Selanjutnya Allah swt. menyuruh nabi Muhammad saw agar menjelaskan bahwa al-Quran itu

wahyu yang diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai bukti yang nyata, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman (Nirwana, 2014).

Karena itu sangat wajar jika ayat ini memerintahkan agar percaya dan mengangungkan wahyu ilahi *dan* karena itu *apabila dibacakan al-Qur'an* oleh siapapun, maka bersopan santunlah terhadapnya karena ia merupakan firman-firman Allah swt. serta petunjuk untuk kamu semua dan karena itu pula *dengarkanlah ia dengan tekun* lagi bersungguh-sungguh, *dan perhatikanlah dengan tenang* tuntunan-tuntunannya *agar kamu mendapat rahmat*. Mendengarkan dan memperhatikan al-Qur'an merupakan sesuatu yang sangat penting. Namun demikian, para ulama sepakat memahami perintah tersebut bukan dalam arti mengharuskan setiap yang mendengar ayat al-Qur'an harus benar-benar tekun mendengarnya (Shihab, 2002).

Pengaruh mendengarkan murotal al-Qur'an terhadap aspek fisiologis dan psikologis, juga telah dibuktikan oleh al-Qadi di Amerika Serikat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bacaan al-Qur'an memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam membuat efek relaksasi pada ketegangan urat-urat saraf. Diketahui bahwa ketegangan saraf dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga secara tidak langsung, hal ini dapat membantu meningkatkan status imunitas seseorang, yang pada insomnia derajat ringan sampai sedang dapat mengalami penurunan imunitas, sehingga efek relaksasi ini menjaga agar tidak jatuh pada kondisi sakit. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa al-Qur'an berpengaruh

besar hingga 97% dalam memberikan ketenangan dan menyembuhkan penyakit (Siti dan Zulkhah, 2015).

Dalam konferensi tahunan ke XVII Ikatan Dokter Amerika, wilayah Missouri, Ahmad Al-Kahdi melakukan presentasi tentang hasil penelitiannya dengan tema pengaruh al-Qur'an pada manusia dalam perspektif fisiologis dan psikologis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil positif bahwa mendengarkan ayat suci al-Qur'an memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif dan hasil ini tercatat dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh sebuah alat berbasis komputer (Remolda, 2009). Dengan tempo yang lambat serta harmonisasi al-Qur'an dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon *endorfin* alami, meningkatkan peralasan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung, dan aktivitas gelombang otak (Heru, 2008).

Lantunan al-Qur'an secara fisik mengandung unsur suara manusia. Suara dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon *endorfin* alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah (Heru, 2008).

Mendengarkan murotal al-Qur'an merupakan suatu bentuk kegiatan yang memberi efek relaksasi dan ketenangan dalam tubuh. Al-Qur'an sendiri

mempunyai unsur meditasi, *autosugesti* dan relaksasi baik dibaca ataupun didengarkan (Anwar, 2010).

#### **D. *Burung Puyuh***

Masyarakat awan umumnya mengenal puyuh dari telur yang dihasilkannya. Namun, tidak semua orang mengetahui atau pernah melihat puyuh secara langsung. Di habitat aslinya puyuh hidup liar dan berpindah-pindah di hutan. Puyuh pertama kali ditenakkan pada tahun 1870 di Amerika. Di Indonesia, puyuh mulai ditenakkan secara komersial pada tahun 1987 dengan mengimpor bibit dari luar negeri. Secara fisik, unggas ini berukuran pendek, kecil, gemuk, dan bulat dengan kaki kuat dan pendek. Layaknya unggas, tubuhnya dipenuhi bulu berwarna coklat dengan bercak abu-abu dan hitam (Wuryadi, 2013).

Jenis burung Puyuh yang biasa ditenakkan berasal dari jenis *Coturnix coturnix japonica*. Produktifitas telur burung Puyuh ini mencapai 250-300 butir/tahun dengan rata-rata 10 gram/butir. Betinanya mulai bertelur pada umur 6 minggu. Burung puyuh sangat baik untuk ditenakkan karena dapat menghasilkan lebih dari 4 generasi per tahun. Telurnya berwarna coklat tua, biru dan putih dengan bintik-bintik hitam, coklat dan biru. Faktor makanan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Bila makanan yang diberikan tidak baik kualitasnya atau jumlah yang diberikan tidak cukup, maka hampir dapat dipastikan burung puyuh tidak akan bertelur banyak (Rasyaf, 1991).

Menurut Wuryadi (2013) secara ilmiah puyuh diklarifikasikan (*Coturnix-coturnix japonica*) adalah sebagai berikut:

Kingdom	: <i>Animalia</i>
Filum	: <i>Chordata</i>
Class	: <i>Aves</i>
Ordo	: <i>Galliformes</i>
Subordo	: <i>Phasianoidea</i>
Famili	: <i>Phasianidae</i>
Sub-famili	: <i>Perdicinae</i>
Genus	: <i>Coturnix</i>
Spesies	: <i>Coturnix coturnix japonica</i>
Asal negara	: Jepang
Potensi regenerasi	: 3-4 generasi/tahun
Lama pengeraman	: 16-17 hari

Kandungan protein dan lemak telur buyung uyuh cukup baik bila dibandingkan dengan telur unggas lainnya. Kandungan proteinnya tinggi, tetapi kadar lemaknya rendah sehingga sangat baik untuk kesehatan. Anak burung Puyuh yang baru menetas dari telur disebut (*Day Old Quail*) DOQ. *Day old quail* ini besarnya seukuran jari dengan berat 8-10 gram dan berbulu jarum halus. *Day old quail* yang sehat berbulu kuning mengembang, gerakan lincah, biasanya seragam dan aktif mencari makan atau minum. Dalam dunia peternakan, periode pembesaran DOQ disebut dengan masa *stater-grower (stagro)* hingga anak burung Puyuh berumur 8 minggu (Sugiharto, 2005).



Gambar 2.1. Puyuh *Coturnix-coturnix japonica* (Wikipedia, 2018).

Karakteristik yang mencirikan puyuh Jepang menurut Wheindrata (2014) adalah:

1. Paruh pendek dan kuat, badan lebih besar dibanding puyuh jenis lain, panjang badan 18-19 cm, berbentuk bulat dengan ekor pendek.
2. jari kaki empat buah, tiga jari ke arah depan satu jari ke arah belakang, warna kaki kekuningkuningan.
3. Pada kepala puyuh jantan dewasa, diatas mata dan bagian alis mata belakang terdapat bulu putih berbentuk garis melengkung yang tebal, bulu dada merah sawo matang polos tanpa ada bercak-bercak coklat kehitaman, suara puyuh jantan lebih keras dibanding yang betina.
4. Warna bulu puyuh betina dewasa hampir sama dengan warna bulu puyuh jantan berbeda hanya pada dada yang warna dasarnya agak pucat, bergaris-garis, atau berbecak kehitam-hitaman,.
5. Puyuh mencapai dewasa kelamin sekitar umur 40-42 hari.

6. Berat badan puyuh betina dewasa 142-144 gram/ekor, sedangkan puyuh jantan 115-117 gram/ekor.
7. Puyuh betina dapat bertelur 200-300 butir/tahun dengan berat telur 9-10 gram/butir.


#### ***E. Penetasan Telur***

Menetasakan telur dengan induk umumnya disebut pengeraman secara alami. Cara ini sejak awal diterapkan pada saat unggas didomestikasi. Hanya saja, tidak semua unggas dapat melakukan pengeraman sendiri karena tergantung sifat mengeramnya. Penetasan secara alami hanya terjadi pada ayam dan walet. Sementara itu, penetasan telur itik dan puyuh tidak dilakukan oleh induknya (Paimin, 2011).

Berbeda dengan cara pertama, maka pada cara kedua ini 100% aktivitas penetasan itu membutuhkan campur tangan manusia dan sang induk tidak tahu masalah penetasan. Induk unggas itu hanya bertelur dan tidak punya tugas untuk menetasakan telur tetas melalui aktivitas pengeraman (Rasyaf, 1990).

Menetasakan telur dengan alat tetas buatan dilakukan bila ingin memperoleh anak-anak ayam, puyuh, maupun walet dalam jumlah banyak. Inilah salah satu kelebihan cara penetasan buatan dibandingkan dengan penetasan secara alami. Kelebihan lainnya adalah anak-anaknya dapat dipelihara tanpa induk sehingga kegiatan produksi telur (ayam) dan sarang (walet) tidak akan terhenti. Pada itik dan puyuh, penetasan dengan alat tetas buatan ini merupakan pilihan utama karena induk unggas tersebut tidak pernah mau mengerami telurnya (Paimin, 2011).

Paada prinsipnya, penetasan telur memerlukan panas tertentu. Oleh karena itu, alat tetas buatan harus dapat menimbulkan panas tertentu. Oleh karena itu, alat tetas buatan harus dapat menimbulkan panas yang dibutuhkan agar telur menetas. Panas ini diperoleh dari sumber panas seperti matahari, lampu minyak, dan listrik (Paimin, 2011). Alat -alat ini sederhana, bahkan dapat kita buat sendiri. Dari kedua jenis ini pun terdapat bermacam-macam jenis alat tetas yang prinsip kerjanya sama, karena umumnya menggunakan tenaga panas, baik panas matahari maupun panas listrik atau lampu teplok (Paimin, 2000).



Gambar 2.2. Mesin Tetas (Anonim, 2013).

#### F. Telur Tetas

Menurut Rasyaf (1990), telur merupakan kumpulan makanan yang disediakan induk unggas untuk perkembangan embrio menjadi anak ayam didalam suatu wadah. Isi dari telur akan semakin habis begitu telur telah menetas.

Terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur didalam *ovarium*. Sel telur yang dihasilkan didalam *ovarium* ini jumlahnya mencapai


ribuan dalam berbagai ukuran, diantaranya 4 buah besar dan 1 buah paling besar. Sel telur yang paling besar berwarna keputihan, disebut *folikel*. *Folikel* sebagai sel telur yang sudah dewasa tersebut kemudian dilepas secara berurutan. Kuning telur yang dilepaskan *ovarium* diterima oleh *infundibulum*. Didalam *infundibulum*, kuning telur tinggal selama 15 menit saja, tanpa adanya penambahan unsur lain. Pada saat kuning telur berada didalam *magnum*, terjadi penambahan unsur lain, berupa putih telur yang terdiri atas 88% air dan 11% protein. Didalam *magnum*, kuning telur tinggal selama 3 jam. Didalam *isthmus*, telur dibungkus 2 buah selaput tipis. Telur tinggal didalam *isthmus* selama kurang lebih 1,25 jam. Telur yang tinggal didalam uterus selama 20-21 jam. Didalam uterus inilah telur disempurnakan, hingga mendapat cairan putih yang tipis melalui membran secara difusi dan terbungkus oleh bahan keras yang disebut kerabang. Telur yang sudah sempurna, dikeluarkan melalui kloaka. Rongga udara telur terbentuk diluar tubuh unggas, yakni 1-2 jam setelah telur tersebut dikeluarkan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan temperatur (Islam dkk., 2001).

### 1. Telur Fertil dan Infertil

Telur dapat dibedakan sebagai telur komersial dan telur bibit. Telur komersial yaitu telur yang dihasilkan dari peternakan unggas petelur komersial dengan tujuan untuk konsumsi manusia, dan telur ini tidak mengandung embrio (*infertil*). Telur bibit yang dikenal dengan telur tetas adalah telur yang dihasilkan dari peternakan pembibitan unggas dan telur berasal dari induk yang dikawinkan oleh pejantan dengan tujuan telurnya untuk ditetaskan (Kurtini, 2011).

Telur *infertil* adalah telur yang tidak dibuahi oleh pejantan. Selain itu, telur *infertil* bisa juga disebabkan telur mengalami *transpertas* yang jauh (terjadi guncangan diluar toleransi) atau terlalu lama rentang waktu dari proses peneluran hingga dimasukkan ke dalam mesin tetas, sehingga tali pengikat kuning telur menjadi putus. Hal ini menyebabkan embrio mati sebelum berkembang lebih jauh (Hartono, 2013).

Fenomena biologis ini telah dimanfaatkan manusia secara menguntungkan dalam memproduksi telur *infertil* untuk konsumsi manusia. Telur tetas merupakan telur *fertil*, yaitu telur yang telah dibuahi oleh sel kelamin jantan atau telur yang telah mengalami proses *fertilisasi* (Mulyantini, 2010).



Gambar 2.3. Perbedaan Telur fertil dan infertil, a. Blastoderm dan b. Blastodisc (Cobb Vantress, 2000).

## 2. Kualitas Telur

Penentuan dan pengukuran kualitas telur mencakup dua hal yaitu kualitas *eksterior* dan *interior*. Kualitas *eksterior* meliputi berat telur, tebal kerabang, warna kerabang, kebersihan, bentuk serta ukuran telur (indeks telur). Sedangkan kualitas interior meliputi nilai *haugh unit (HU)*, indeks putih telur, indeks kuning telur dan warna kuning telur (Stadelman dan Cotteril, 1995).

Kualitas fisik dan kimia telur tergantung pada kualitas isi telur dan kulit telur. Faktor kualitas telur dibagi menjadi dua yaitu faktor kualitas *eksterior* dan *interior*. Faktor kualitas *eksterior* meliputi kebersihan telur, bentuk telur, berat telur, indeks bentuk telur, dan kedalaman kantung udara. Faktor kualitas *interior* antarlain ketebalan kerabang, berat kerabang, dan kandungan nutrisi telur. Karakteristik kimia telur secara keseluruhan meliputi kandungan air, abu, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral (United States Department of Agriculture, 2002).

a. Kualitas Fisik

1) Kerabang telur

Semakin tua umur ayam maka semakin tipis kerabang telurnya, hal ini terjadi karena ayam tidak mampu untuk memproduksi kalsium yang cukup guna memenuhi kebutuhan kalsium dalam pembentukan kerabang telur (Yuwanta, 2010).

2) Kebersihan Telur


Kebersihan kerabang merupakan salah satu faktor penentu kualitas telur tetas. Kotoran yang menempel pada kerabang dapat bersumber dari beberapa hal, namun sumber kotoran yang paling beresiko adalah ekskreta ayam. Kontaminasi ekskreta ayam pada kerabang telur membuat telur kotor, selain itu dapat mengakibatkan perubahan warna kerabang dan timbul bau (Sondak, 2011).

### 3) Ketebalan Cangkang

Kerabang telur unggas terdiri atas beberapa lapisan. Bagian-bagian tersebut secara berurutan dari lapisan terluar adalah kutikula, lapisan bunga karang, lapisan mamilaris, dan membran telur (Stadelman dan Cotterill, 1995). Kualitas kulit telur juga bergantung pada ketebalan kulit telur. Telur yang berkulit tipis atau pekapuran yang kurang merata, umumnya daya tetasnya rendah. Ketebalan kulit telur yang baik yaitu 0,33-0,35 mm (Kartasudjana dan Suprijatna, 2010).

### 4) Bentuk Telur


Menurut Rasyaf (1991) dari sejumlah telur yang dihasilkan selalu diperoleh telur yang normal dan telur yang tidak normal. Telur yang fisiknya normal jika dilihat dari luar adalah telur yang kulitnya tidak tercemar, tidak tipis, tidak berkeriput, tidak bercak-bercak, dan ukuran serta bentuk pada ujung-ujungnya harus tertentu. Telur yang normal selain itu dapat dari ukuran indeks bentuk telur. Indeks bentuk telur yang dimasukkan disini adalah perbandingan antara lebar telur dibagi dengan panjang telur dikalikan 100%.



Gambar 2.4. Kualitas Telur Berdasarkan Bentuk Telur (Robert, 2008).

a. Kualitas Kimia

Telur unggas merupakan suatu material yang terbentuk dari komposisi bahan-bahan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nilai nutrisi telur sangat bervariasi tergantung dari nilai nutrisinya. Dilihat dari keseluruhan telur termasuk kerabang, telur mempunyai kandungan air yang tinggi. Telur puyuh juga mengandung bahan-bahan organik, seperti protein, lemak, dan karbohidrat, serta bahan anorganik, yaitu mineral. Bahan-bahan tersebut terkandung dalam telur melalui proses sintesis, transportasi, dan deposisi yang terutama terjadi pada kuning telur (Stadelman dan Cotterill, 1995).



Gambar 2.5. Struktur Telur (Romanoff dan Romanoff, 1963).

Komposisi zat makanan putih telur, kuning telur, dan telur utuh disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Zat Makanan Putih Telur, Kuning Telur dan Telur Utuh

Komponen Telur	Protein	Lemak	Karbohidrat	Abu
	Bobot (%)			
Putih Telur	9,7-10,6	0,03	0,4-0,6	0,5-0,6
Kuning Telur	15,7-16,6	31,8-35,5	0,2-1,0	1,1
Telur Utuh	12,8-13,4	10,5-11,8	0,3-1,0	0,8-1,0

Sumber: Stadelman dan Cotterill (1995).

#### 1) Putih Telur (*Albumen*)

Putih telur (*albumen*) disekresikan pada *magnum*, bagian dari saluran reproduksi unggas. Sebutir telur mengandung 57% putih telur kental, 17,3% putih telur encer bagian dalam, dan 23% putih telur bagian luar (Suprijatna, 2002). Bagian putih telur terdiri dari 4 lapisan yang berbeda kekentalannya, yaitu lapisan encer luar (*outer thin white*), lapisan encer dalam (*firm/thick white*), lapisan kental (*inner thin white*), dan lapisan kental dalam (*inner thick white/ chalaziferous*). Perbedaan kekentalan ini disebabkan oleh perbedaan dalam kandungan airnya. Bagian ini banyak mengandung air sehingga selama penyimpanan bagian ini pula yang paling mudah rusak. Kerusakan terjadi terutama disebabkan oleh keluarnya air dari jala-jala *ovomucin* yang berfungsi sebagai pembentuk struktur putih telur (Kurtini dkk., 2011).

Penyimpanan telur yang terlalu lama pada suhu lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan kualitas putih telur menurun sebagai akibat kandungan air di dalam telur yang mudah menguap (Sondak, 2011).

## 2) Blastoderm

Telur tetas merupakan telur yang terbuahi oleh sel kelamin jantan. Pembuahan terjadi di *infundibulum* sesaat setelah sel telur dilepaskan (*ovulasi*), setelah itu terbentuk *zygote* dan perkembangan embrio dimulai. Pembelahan sel terus berlangsung hingga terbentuk 256 sel yang disebut *blastoderm* setelah beberapa jam dalam uterus. Blastoderm menyebar ke seluruh *yolk* dan berdiferensiasi menjadi dua lapisan, proses ini disebut *gastrulasi*. Lapisan pertama merupakan *ektodermis* yang akan berkembang lebih lanjut membentuk kulit, bulu, paruh, kuku, sistem syaraf, lensa dan retina, serta lapisan mulut. Lapisan kedua merupakan *endodermis* yang akan membentuk lapisan pada organ saluran pencernaan dan respirasi serta *sekretori*. Kedua lapisan tersebut akan tampak sebagai lingkaran berwarna keputihan pada permukaan *yolk*, sedangkan pada telur konsumsi lingkaran tersebut tidak nampak jika telur dipecah (Suprijatna, 2002).

## 3) Kuning Telur (*Yolk*)

Kuning telur adalah bagian terdalam dari telur yang terdiri dari membran *vitelin*, saluran *latebra*, lapisan kuning telur gelap, dan lapisan kuning telur terang. Lemak kuning telur sebagian besar terdiri dari *trigliserida*, yaitu sekitar 65,5%. Komponen lain dari lemak kuning telur adalah 28,3% fosfolipida dan 5,2% kolesterol. Asam lemak yang terdapat dalam kuning telur sebagian besar terdiri dari asam oleat (*oleic acid*). Migrasi air dari bagian putih telur ke kuning telur selama

penyimpanan akan mengakibatkan penurunan persentase bahan padat (Stadelman dan Cotterill, 1995).

*Yolk* merupakan material bahan makanan yang dipergunakan untuk pertumbuhan embrio. Pada saat ayam mulai bertelur, *ovari* dan *oviduct* umumnya mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini disebabkan adanya aktifitas hormon yang telah mulai berperan sekitar 11 hari sebelum bertelur. Hormon FSH diproduksi oleh kelenjar pituitari yang menyebabkan *folicle* bertambah ukurannya. Dengan aktifnya *ovari*, dipihak lain dihasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dengan tingginya level estrogen dalam darah, menyebabkan muda terjadinya pembentukan *medullary bone*, menstimulasi pembentukan protein telur, pembentukan lemak hati, bertambah besarnya *oviduct* yang memungkinkan dibentuknya putih telur, kulit telur,  $\text{CaCo}_3$  untuk kulit telur dan *cuticle* (Runny, 2016).

*Yolk* yang terbentuk dalam *ovari*, sebagian besar dibuat di dalam hati dan diangkat oleh darah langsung. Berhentinya penimbunan *yolk* di *ovari* ini sekitar 5 jam sebelum 29 diovulasikan. Setiap hari *yolk* ini membesar 4 mm dan setelah mencapai diameter  $\pm 40$  mm *yolk* tersebut sudah matang yang nantinya akan terjadi *ovulasi*. Pembentukan *yolk* ini secara beruntun dan bertahap, sehingga pada saat telur pertama dikeluarkan, sudah ada 5 sampai dengan 10 kuning telur yang berada dalam proses pertumbuhan. Umumnya setelah mencapai umur 10 hari tiap *yolk* ini akan matang. Terjadinya warna kuning dari *yolk*,

disebabkan oleh *xantophyll* dan *Carotenoid pigmen* yang berasal dari makanan yang ditimbun pada kuning telur. Oleh karena itu warna kuning gelap atau terang tergantung kepada banyaknya pigmen yang tersedia dalam ransum. *Yolk* yang terbentuk ini terdiri dari beberapa lapisan, pada satu butir telur terdiri dari 7 sampai dengan 11 lapisan. Kuning telur komposisinya terdiri dari lemak dan protein, yang terikat dalam bentuk *lipoprotein* yang disintesiskan oleh hati dengan aktifitas *estrogen*. Besar *yolk* dipengaruhi oleh faktor keturunan, oleh karena itu variasi besar *yolk* dipengaruhi oleh variasi individu ayam yang ada dalam *flock*. Juga besar *yolk* dipengaruhi oleh lamanya *yolk* menjadi matang dalam *ovari*. Makin lama, makin besar *yolk* tersebut. Bila *yolk* yang dihasilkan cukup besar, maka telur yang dihasilkan juga besar. Dengan perkataan lain, besar *yolk* mempunyai korelasi positif dengan besar telur yang dihasilkan. Menurut beberapa penelitian. Besar *yolk* juga akan meningkat bila dalam ransumnya ditingkatkan protein dan lemak (Runny, 2016).

#### **G. Pemilihan Telur Tetas**

Seleksi telur tetas dilakukan untuk memilih telur yang memenuhi persyaratan untuk ditetaskan, karena telur yang tidak lolos seleksi dapat mengganggu jalannya penetasan dan tidak jarang dapat mengakibatkan kegagalan inkubasi. Seleksi telur tetas meliputi strain, umur telur, dan kualitas eksterior telur tetas (Maya, 2013).

Agromedia (2002) menyatakan bahwa telur tetas adalah suatu bentuk penimbunan zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, energi, vitamin, mineral dan air yang diperlukan untuk pertumbuhan embrio selama pengeraman untuk dapat ditetaskan telur-telur burung puyuh harus diseleksi. Memilih telur burung puyuh yang akan ditetaskan harus teliti, beberapa cara memilih telur burung puyuh yang baik untuk ditetaskan yaitu:

1. Memilih telur yang bersih, halus dan rata
2. Memilih telur yang warnanya tidak terlalu pekat
3. Bintik kulit telur harus jelas
4. Kulit telur tidak retak
5. Memilih telur yang baru, bukan telur yang sudah disimpan lebih dari 7 hari
6. Jika mau dijadikan khusus sebagai telur setelah keluar dari burung puyuh, telur segera diambil dan dibersihkan.



Gambar 2.6. Telur Puyuh (Wikipedia, 2018).

Sebaiknya telur yang ditetaskan berukuran normal yang beratnya 11-13 gram per butir. Ukuran normal tersebut dapat dicapai setelah induknya berumur 2,5 bulan. Dengan demikian pengambilan telur tetas burung Puyuh dilaksanakan sejak induk berumur 2,5-8 bulan (Sugiharto, 2005).

#### **H. *Inkubasi Telur Tetas***

Sistem inkubasi telur terdapat enam faktor penting pada inkubasi telur yaitu suhu, kelembaban, ventilasi, posisi telur, peneropongan, dan waktu inkubasi. Suhu merupakan hal yang paling kritis untuk menentukan keberhasilan penetasan. Pada pengeraman alami, telur tetas memanfaatkan panas dari tubuh induknya untuk proses inkubasi (Ensminger et al., 2004).

##### **1. Suhu Mesin Tetas**

Menurut Ar (1991) temperatur sangat mempengaruhi kelembaban relatif dan keduanya berkontribusi terhadap penguapan air telur selama inkubasi, korelasi temperatur dan kelembaban harus dilakukan pengawasan secara kontinyu selama proses inkubasi berlangsung, dikarenakan penguapan kadar air didalam embrio tidak mampu di awasi.

Embrio di dalam telur unggas akan cepat berkembang selama telur berada pada kondisi yang sesuai dan akan berhenti berkembang jika suhunya kurang dari yang dibutuhkan. Suhu untuk penetasan telur setiap jenis unggas berbeda-beda suhu untuk perkembangan embrio dalam telur ayam antara 101<sup>0</sup>-105<sup>0</sup> F (38,33<sup>0</sup>-40,55<sup>0</sup> C) (Paimin, 2011). Menurut Nugroho dan Mayun (1986), menyatakan menetas telur burung puyuh tidak berbeda dengan telur ayam. Minggu pertama 38,3<sup>0</sup> C (101<sup>0</sup> F). Minggu kedua sampai menetas suhu 39<sup>0</sup> C

(103 °F). Suhu ini diusahakan jangan lebih dari 39,4 °C (103 °F). Termometer yang mengukur suhu mesin tetas, supaya diletakkan sejajar dengan ujung telur, dengan maksud supaya termometer tersebut menunjukkan suhu telur-telur yang ditetaskan.

Setelah telur dalam alat penetasan atau mesin tetas, pembelahan sel segera berlangsung dan embrio akan terus berkembang selama suhunya tetap. Dengan kondisi ini embrio akan berkembang sempurna dan akan menetas (Paimin, 2011). Embrio tidak toleran terhadap perubahan suhu yang drastis. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan kematian embrio ataupun abnormalitas embrio. Jika suhu terlalu rendah maka perkembangan organ-organ embrio tidak berkembang secara proposional (Susila, 1997).

## **2. Kelembapan Mesin Tetas**

Menurut Kurtini dkk. (2014), kelembapan berfungsi untuk mengurangi kehilangan cairan dari dalam telur selama proses penetasan, membantu pelapukan kulit telur pada saat akan menetas sehingga anak unggas mudah memecahkan kerabang telurnya.

Priyono (2009) menyatakan bahwa kelembapan relatif di dalam penetasan merupakan hal yang penting untuk menjaga kandungan air di dalam telur. Kelembapan relatif ditujukan untuk menjaga air di dalam telur tidak menguap terlalu banyak melalui pori-pori telur. Jasa (2006) menyatakan bahwa kelembapan yang baik di dalam penetasan adalah berkisar antara 60% untuk menetas telur ayam atau 5-10% lebih tinggi untuk menetas telur itik atau

saat akan menetas kelembapan dinaikkan menjadi 70% untuk menetas telur itik.

Kelembapan yang terlalu tinggi menyebabkan DOC yang ditetaskan menetas terlalu dini dan akan lengket pada kerabang telur, sedangkan kelembapan yang terlalu rendah menyebabkan laju penguapan terlalu cepat sehingga embrio kekurangan air dan terlambat untuk menetas (Nuryati dkk., 2002). Rahayu (2011) menyatakan kelembapan pada proses penetasan harus diperhatikan agar embrio dalam telur terhindar dari dehidrasi akibat kelembapan yang rendah. Kelembapan juga perlu dinaikkan pada saat persiapan penetasan agar DOC tidak dehidrasi.

Kelembapan relatif juga mempengaruhi proses metabolisme kalsium (Ca) pada embrio. Saat kelembabannya tinggi, perpindahan Ca dari kerabang telur ke tulang-tulangnya dalam perkembangan embrio akan lebih banyak. Pertumbuhan embrio dapat diperlambat oleh keadaan kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, selanjutnya pertumbuhan embrio optimum akan diperoleh pada kelembapan relatif mendekati maksimum (Parry, 2011).

Menurut Sudjarwo (2012) bahwa jika selama proses penetasan telur suhu dalam keadaan normal, maka waktu tetas telur puyuh akan tepat yaitu selama 17 hari. Selain itu, dengan suhu yang tepat pula daya tetasnya akan tinggi, karena proses perkembangan embrio dapat berjalan baik sebagai akibat organ vitalnya dapat terbentuk dan berkembang secara optimum dan normal. Sebaliknya jika selama proses penetasan suhu dibawah atau diatas normal, maka masa inkubasi akan lebih tinggi namun embrio akan mati.

### 3. Sirkulasi Udara

Ketersediaan oksigen dapat dicapai dengan pengaturan sirkulasi udara yang baik. Selama proses penetasan embrio membutuhkan oksigen untuk perkembangannya dan mengeluarkan karbondioksida melalui pori-pori kerabang telur sehingga di dalam mesin tetas harus tersedia cukup oksigen. Kebutuhan karbondioksida dalam proses penetasan tidak lebih dari 0,5% dan kebutuhan oksigen tidak kurang dari 21% (Paimin, 2003).

Kebutuhan karbondioksida dalam proses penetasan tidak lebih, ventilasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan embrio juga dapat menurunkan daya tetas telur, hal ini dikarenakan embrio memerlukan  $O_2$  dan mengeluarkan  $CO_2$  selama perkembangannya. Apabila gas  $CO_2$  ini terlalu banyak, mortalitas embrio akan tinggi dan menyebabkan daya tetas telurnya rendah (Kartasudjana dan Suprijatna, 2010).

Kandungan  $CO_2$  terlalu tinggi. Aktifnya metabolisme embrio menyebabkan akumulasi  $CO_2$  di dalam ruang penetasan. Selain dapat menyebabkan kematian embrio, jumlah  $CO_2$  yang terlalu banyak dapat menyebabkan DOC yang berhasil menetas menjadi lemas dan lemah. Ventilasi atau aliran udara yang tidak baik menjadi faktor utama penumpukan asam arang (Hardianto, 2013).

Pada mesin tetas sederhana, ventilasi yang buruk bisa disebabkan lubang ventilasi yang kotor atau jumlahnya yang kurang. Karena itu, pelaku penetasan harus rajin membersihkan ventilasi. Sementara itu, kurangnya jumlah ventilasi biasanya disebabkan pelaku penetasan yang ingin menghemat biaya

listrik untuk pemanas. Sebab semakin banyak ventilasi akan banyak pula energi listrik atau sumber panas lain yang digunakan (Hardianto, 2013).

#### 4. Pemutaran Telur

Kurtini (2014) menyatakan bahwa tujuan dari pemutaran telur yaitu agar embrio dapat memanfaatkan seluruh *albumen* protein yang tersedia dan mencegah menempelnya embrio pada sel membran, khususnya pada minggu pertama inkubasi. Dengan pemutaran telur yang baik akan membantu mengoptimalkan pertumbuhan embrio.

Pemutaran sebaiknya dilaksanakan 1 kali setiap jam sehingga dalam sehari terdapat 24 putaran dengan kemiringan  $45^{\circ}$ . Dengan pemutaran yang lebih sering maka telur akan lebih cepat menetas (daya tetas) sehingga kandungan air didalamnya tidak akan banyak hilang yang dapat membuat bobot badan DOC meningkat, dan sebaliknya pemutaran yang tidak sering akan membuat telur tidak cepat menetas (daya tetas) dengan baik, sehingga terjadi penguapan yang berlebihan dan kadar air didalam telur akan berkurang yang dapat membuat bobot badan DOC akan berkurang (North, 1990).

Pemutaran telur tetas yang baik dapat menghindarkan dari terjadinya penempelan embrio pada kerabang yang diakibatkan oleh temperatur yang tidak merata, pemutaran dilakukan sampai umur 18 hari selama proses pengeraman (Kartasudjana dan Suprijatna, 2010).

#### J. *Perkembangan Embrio Saat Inkubasi*

Menurut Runny (2016) menyatakan selama masa inkubasi, bagian-bagian yang berbeda dari telur utuh membentuk lapisan baru. Perubahan berat

pada bagian yang berbeda dari telur terjadi seperti tabel di bawah ini (berat dalam gram):

Tabel 3. Komposisi perubahan berat telur selama perkembangan embrio.

Bagian Telur	Telur Segar	Telur Setelah 1 mg inkub	Telur Setelah 20 mg Inkub	Setelah 1 mg inkub
Yolk	18,4	20,2	18,0	7,0
Albumen	34,6	13,4	6,8	-
Eggshell	7,0	7,0	7,0	6,9
Amnion	-	15,0	6,0	2,0
Allanrois	-	0,5	5,5	2,0
Embrio	-	0,6	9,7	32,0
(Tanpa yolk)				
Total	60,0	56,7	53,0	49,9

Sumber: Runny (2016).

Perkembangan embrional dimulai setelah terjadi pembuahan atau pembentukan *zigot*. Sekitar lima jam setelah *ovulasi* dan telur berada dalam *isthmus*, dan terjadi pembelahan sel pertama. Pembelahan sel selanjutnya terjadi sekitar 20 menit kemudian. Setelah itu, telur meninggalkan *isthmus* satu jam kemudian dan berlangsung perkembangan embrional dengan membentuk 16 sel. 23 Setelah sekitar empat jam berada di uterus, telah terbentuk 256 sel sebagai *blastoderm*. Proses penetasan tidak terlepas dari perkembangan embrio yang tumbuh di dalam telur yang telah mengalami fertilisasi (Asmawati, 2013).

Perkembangan embrio ayam terjadi diluar tubuh induknya. Selama berkembang, embrio memperoleh makanan dan perlindungan yang dari telur berupa kuning telur, albumen, dan kerabang telur. Dalam perkembangannya, embrio dibantu oleh kantung kuning telur, *amnion*, dan *alantois*. Kantung kuning

telur yang dindingnya dapat menghasilkan enzim yang mengubah kandungan kuning telur menjadi suatu bahan makanan yang larut dan mudah diserap. Amnion berfungsi sebagai bantal, sedangkan *alantois* berfungsi pembawa sebagai ke oksigen embrio, menyerap zat asam dari embrio, mengambil yang sisa-sisa pencernaan yang terdapat dalam ginjal dan menyimpannya dalam *alantois*, serta membantu *alantois*, serta membantu mencerna *albumen* (Surjono, 2001). Perkembangan embrio pada hari ke 7 inkubasi sudah mulai terbentuk mata dan lidah, pembuluh darah untuk menyuplai nutrisi.

Menurut Agromedia (2005) secara garis besar, perkembangan embrio selama 21 hari pengeraman sebagai berikut:

1. Hari pertama, sejumlah proses pembentukan sel permulaan mulai terjadi. Sel permulaan untuk sistem pencernaan mulai terbentuk pada jam ke-18. Pada jam-jam berikutnya, secara berturut-turut sampai dengan jam ke-24, mulai terbentuk untuk sel permulaan untuk jaringan otak, sel hubungan antara jaringan otak dan syaraf, formasi bagian kepala, sel permulaan untuk darah, dan formasi awal syaraf mata.
2. Hari kedua, embrio mulai bergeser ke sisi kiri, dan saluran darah mulai terlihat pada bagian kuning telur. Perkembangan sel dari jam ke-25 sampai jam ke-48 secara berurutan adalah pembentukan formasi pembuluh darah halus dan jantung, seluruh jaringan otak mulai terbentuk dan jaringan mulai berdetak, jaringan pendengaran mulai terbentuk, selaput cairan mulai terlihat, dan mulai juga terbentuk formasi tenggorokan.

3. Hari ke-3, mulainya pembentukan formasi hidung, sayap, kaki, dan jaringan pernapasan. Pada masa ini, selaput cairan juga sudah menutup seluruh bagian embrio.
4. Hari ke-4, sel permulaan untuk lidah mulai terbentuk. Pada masa ini, embrio terpisah seluruhnya kuning telur dan berputar ke kiri. Sementara itu, jaringan saluran pernapasan terlihat mulai menembus selaput cairan.
5. Hari ke-5, saluran pencernaan dan tembolok mulai terbentuk. Pada masa ini terbentuk pula jaringan reproduksi. Karenanya sudah mulai dapat juga ditentukan jenis kelaminnya.
6. Hari ke-6, pembentukan paruh dimulai. Begitu juga dengan kaki dan sayap. Selain itu, embrio mulai melakukan gerakan-gerakan.
7. Hari ke-7 dan ke-8 dan ke-9, jari kaki dan sayap terlihat mulai terbentuk. Selain itu, perut mulai menonjol karena jeroannya mulai berkembang. Pembentukan buku juga dimulai. Pada masa-masa ini, embrio sudah seperti burung dan mulutnya terlihat mulai terbuka.
8. Hari ke-10 dan ke-11, paruh mulai mengeras, jari-jari kaki sudah sepenuhnya terpisah, dan pori-pori kulit tubuh mulai tampak.
9. Hari ke-12, jari-jari kaki sudah terbentuk sepenuhnya dan bulu pertama mulai muncul.
10. Hari ke-13 dan ke-14, sisik dan kuku jari kaki mulai terbentuk. Tubuh sudah sepenuhnya ditumbuhi bulu. Pada hari ke-14, embrio berputar sehingga kepalanya tepat berada di bagian tumpulnya telur.
11. Hari ke-15, jaringan usus mulai terbentuk di dalam badan embrio.

12. Hari ke-16 dan ke-17, sisi kaki, kuku dan paruh semakin mengeras. Tubuh embrio sudah sepenuhnya tertutupi oleh bulu yang tumbuh. Putih telur sudah tidak ada lagi, dan kuning telur meningkat fungsinya sebagai bahan makanan yang sangat penting bagi embrio. Selain itu, paruh sudah mengarah ke rongga kantung udara, selaput cairan mulai berkurang, dan embrio mulai melakukan persiapan untuk bernapas.
13. Hari ke-18 dan ke-19, pertumbuhan embrio sudah mendekati sempurna. Kuning telur mulai masuk ke dalam rongga perut melalui saluran tali pusat. Embrio juga semakin besar sehingga sudah memenuhi saluran rongga telur kecuali rongga kantung udara.
14. Hari ke-20 dan ke-21, kuning telur sudah masuk sepenuhnya ke dalam tubuh embrio. Embrio yang hampir menjadi anak ayam ini menembus selaput cairan, dan mulai bernapas menggunakan udara di kantung udara. Saluran pernapasan mulai berfungsi dan bekerja sempurna. Hari ke-21 anak ayam menembus lapisan kulit telur dan menetas.

#### ***K. Bobot Tetes DOQ***

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menetas telur dengan mesin tetas adalah bobot tetas, karena bobot telur tidak hanya berpengaruh terhadap daya tetas saja tetapi juga sangat berpengaruh terhadap bobot tetas. Bobot telur yang baik untuk burung puyuh berkisar antara 9-10 gram (Butcher dan Richard, 2004).

Sudaryani dan Santoso (1994) menyatakan bahwa bobot telur tetas merupakan faktor utama yang memengaruhi bobot tetas, selanjutnya dinyatakan

bobot tetas yang normal adalah 70% dari bobot telur dan apabila bobot tetas 26 kurang dari hasil perhitungan tersebut maka proses penetasan bisa dikatakan belum berhasil.

Bobot tetas berkorelasi positif dengan bobot telur tetas. Semakin besar bobot telur tetas maka semakin besar pula bobot tetas yang dihasilkan. Perbedaan yang nyata ini diduga disebabkan oleh perbedaan jumlah kuning telur dan putih telur sebagai sumber nutrisi selama perkembangan embrio. Bobot telur tinggi mengandung jumlah kuning telur dan putih telur tinggi. Semakin banyak kuning telur dan putih telur maka ketersediaan nutrisi untuk perkembangan embrio semakin banyak, sehingga bobot tetas yang dihasilkan akan lebih besar. A

dapun faktor yang berpengaruh terhadap bobot DOC diantaranya, pakan dan kualitas telur (Hassan et al, 2005). Menurut Septiawan, 2007), berat tetas sangat dipengaruhi oleh berat telur. Semakin tua induk ayam san semakin besar telur yang ditetaskan, maka berat tetas yang dihasilkan besar pula. Berat tetas dapat dipengaruhi oleh genetik dan pakan induk ayam.

#### L. *Viabilitas DOQ*

Viabilitas adalah kemampuan anak ayam untuk bertahan hidup setelah menetas. Viabilitas dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap anak ayam yang baru menetas. Ciri-ciri DOC normal dan sehat meliputi kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, paruh normal, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, sekitar pusar dan dubur kering dan pusar tertutup, warna bulu seragam sesuai dengan

warna galur (strain), serta kondisi bulu kering dan berkembang (Tona, 2004 dalam Maya, 2013).

Anak burung puyuh yang baru menetas dari telur disebut (*Day Old Quail*) DOQ. *Day old quail* ini besarnya seukuran jari dengan berat 8-10 gram dan berbulu jarum halus. *Day old quail* yang sehat berbulu kuning mengembang, gerakan lincah, biasanya seragam dan aktif mencari makan atau minum. (Sugiharto, 2005 dalam Maya, 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas DOC antara lain kualitas sperma, pakan, dan manajemen penetasan (Ensminger, 1992 dalam Maya, 2013).

Peningkatan teknologi penetasan dalam hal ini tidak hanya menggunakan teknologi yang modern namun juga memperbaiki manajemen penetasan yang diterapkan yaitu dengan meminimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas DOC, salah satunya adalah umur induk. Umur induk mempengaruhi kualitas DOC yang dihasilkan karena umur induk yang berbeda menghasilkan telur tetas dengan kandungan nutrisi yang berbeda (Peebles, 2001 dalam Maya, 2013), sehingga dapat mempengaruhi proses perkembangan embrio selama proses inkubasi. Perkembangan embrio yang terganggu akan berpengaruh pada daya tetas dan daya hidup DOC selanjutnya (viabilitas) (Maya, 2013).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### ***A. Waktu dan Tempat***

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 15 Maret-9 Mei 2018 di Peternakan Djiyon Puyuh Makassar, Macanda Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

#### ***B. Materi Penelitian***

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu speaker aktif, 2 unit mesin tetas dengan kapasitas sekitar 50 butir telur puyuh, *akrometer analog* untuk mengukur temperatur mesin tetas dan kelembapan mesin tetas, timbangan digital untuk mengukur bobot telur dan nampan untuk wadah air yang diletakkan di dalam mesin tetas. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu air untuk mengatur kelembapan telur saat inkubasi, formalin 70% untuk bahan fumigasi dalam mesin tetas, dan 140 butir telur puyuh yang ditetaskan yang menetas sebanyak 118 butir .

#### ***C. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

#### ***D. Metode Penelitian***

Penelitian ini untuk membandingkan 2 perlakuan yaitu kelompok kontrol tanpa perlakuan dan kelompok perlakuan murottal al-Qur'an dengan

masing-masing kelompok kontrol dan kelompok murottal 3 kali pengulangan, sehingga metode yang digunakan adalah analisis statistik uji *t dependent* yaitu 2 kelompok yang berbeda dengan masing-masing kelompok 3 kali ulangan.

Kontrol = tanpa ada perlakuan.

Murottal = kelompok pemutaran murottal al-Qur'an.

### **E. *Prosedur Penelitian***

#### **1. *Penyiapan Telur Tetas***

Telur tetas yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari puyuh produktif yang dipelihara secara intensif dengan sex ratio 1:4 dan umur telur 1 hari. Telur berasal dari induk betina berumur 5 bulan yang dipelihara secara intensif dengan pemberian pakan secara adlibitum. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin tetas, telur diseleksi dengan memilih telur yang bersih, halus dan rata, bentuk oval dan memiliki ukuran normal 10 gram per butir. Penimbangan dilakukan untuk mengetahui bobot tetas pada saat menyeleksi telur dan menimbang bobot DOQ saat menetas.

#### **2. *Persiapan Mesin Tetas***

Sebelum digunakan, mesin tetas terlebih dahulu dibersihkan dan difumigasi dengan menyemprotkan larutan formalin. Mesin dijalankan selama 2 jam untuk mendapatkan temperatur yang stabil sebelum telur dimasukkan ke dalam mesin tetas. Pengaturan kelembaban dilakukan dengan meletakkan nampan berisi air pada bagian bawah tempat telur untuk mendapatkan kelembaban sekitar 60-65%

### 3. Peletakan Telur dalam Mesin Tetas

Mesin tetas diletakkan di dalam ruangan yang berbeda sehingga mesin tetas tidak berdampingan untuk mencegah adanya paparan gelombang bunyi dari kelompok perlakuan murottal al-Qur'an terhadap kelompok kontrol. Mesin tetas yang digunakan ada dua, peletakan telur pada kelompok perlakuan murottal al-Qur'an yaitu di masukkan kedalam mesin tetas yang terdapat speaker aktif kemudian dinyalakan selama masa inkubasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kelompok kontrol telur dimasukkan ke dalam mesin tetas yang berbeda.

### 5. Pemutaran Murottal Al-Qur'an

Pemutaran murottal al-Qur'an dilaksanakan pada hari pertama inkubasi telur sampai hari ke-18, karena embrio mulai berkembang pada hari pertama inkubasi sampai hari terakhir. Durasi pemutaran murottal al-Qur'an yaitu 4 jam per hari yaitu speaker dinyalakan 4 kali sehari selama 1 jam setiap kali pemutaran, waktu pemutaran yaitu pada jam 09.00, 11.00, 13.00 dan 15.00 WITA, karena menurut penelitian Silaturrohim (2016), menyatakan semakin lama paparan durasi murottal al-Qur'an dapat meningkatkan viabilitas sel dan semakin dapat menekan kematian kultur sel saraf otak tikus. Surah yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat ar-Rahman oleh qori' Muhammad Taha al Junaid. Ar-Rahman yang berarti Yang Maha Pemurah merupakan surat ke-55 di dalam al-Qur'an terdiri dari 78 ayat. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa surat ar-Rahman merupakan surat kasih sayang. Semua ayat dalam surat ar-Rahman merupakan surah Makiyyah yang mempunyai karakter ayat pendek sehingga ayat

ini nyaman didengarkan dan dapat menimbulkan efek relaksasi (Srihartono, 2007).


## 6. Inkubasi Telur

Telur yang dimasukkan kedalam mesin tetas kemudian diinkubasi selama 18 hari. Pembalikan dan pengaturan temperatur dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Pengaturan temperatur dan waktu pembalikan pada inkubasi telur puyuh.

Umur pengeraman (hari)	Temperatur (°F)		Pembalikan Telur
	Pagi	Sore	
1 sampai 3	100	100	Telur tidak dibalik
4 sampai 14	100	100	Telur dibalik telur
1 sampai 17	100	100	Telur tidak dibalik

## 7. Diagram Alir



Gambar 3.7. Diagram Alir Tahapan Penelitian

## F. *Parameter yang Diukur*

### 1. Bobot tetas

Saat DOQ (*Day Old Quail*) tidak langsung dipindahkan, tetapi dibiarkan terlebih dahulu dimesin tetas sampai bulunya kering. Setelah bulunya kering dilakukan penimbangan satu persatu dengan menggunakan timbangan digital untuk mengetahui bobot tetas. kemudian mencatat data pengukuran dan mencari nilai rata-rata bobot tetas dari setiap kelompok.

### 2. Viabilitas

Viabilitas merupakan kemampuan anak puyuh untuk bertahan hidup setelah menetas (maksimal 48 jam setelah menetas dan kondisi bulu kering). Nilai viabilitas dinyatakan dalam satuan persen dengan cara membandingkan antara anak ayam yang normal/sehat setelah menetas dengan jumlah seluruh anak ayam yang menetas. Anak puyuh yang normal/sehat memiliki ciri-ciri: kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk, tidak cacat fisik, sekitar pusar dan dubur kering, dan pusar tertutup berdasarkan SNI 01-4868.1-2005. Nilai viabilitas dihitung untuk setiap kelompok. Menurut Maya (2013), bahwa rumus perhitungan viabilitas DOC yaitu:

$$\text{Viabilitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah DOQ norma}}{\text{Jumlah seluruh DOQ}} \times 100 \%$$

## G. *Analisa Data*

Data yang di peroleh di analisa dengan analisis statistik uji *independent samples test-T* (Sujana, 1996) dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{x_1 - x_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Keterangan:

t = Parameter yang di ukur

$x^1$  = Nilai rata-rata mortalitas embrio dan viabilitas kontrol

$x^2$  = Nilai rata-rata mortalitas embrio dan viabilitas dengan pemutaran murottal al-Qur'an

$n^1$  = banyaknya jumlah telur yang ditetaskan kontrol

$n^2$  = banyaknya jumlah telur yang ditetaskan dengan pemutaran murottal al-Qur'an

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil**

Hasil penelitian selama 55 hari yang mencakup bobot tetas DOQ dan viabilitas DOQ yang disajikan pada tabel 5 dan tabel 6.

Tabel 5. Bobot DOQ pada kelompok kontrol dan kelompok murottal tanpa pemberian perlakuan dan pemberian paparan murottal al-Qur'an

Kelompok	N	Mean	P value	Signifikasi
Murottal	3	6,61	0,002 < 0,05	Berpengaruh nyata
Kontrol	3	5,95		

Sumber: Data Primer (2018).

Tabel 6. Viabilitas DOQ pada kelompok kontrol dan kelompok murottal tanpa diberi perlakuan dan pemberian paparan murottal al-Qur'an.

Kelompok	N	Mean	P value	Signifikasi
Murottal	3	100	0,002 < 0,05	Berpengaruh nyata
Kontrol	3	79		

Sumber: Data Primer (2018).

**B. Pembahasan**

**3. Bobot Tetas**

Melalui uji *independent samples t-Test*, terbukti ada perbedaan nilai bobot tetas pada kelompok kontrol yaitu inkubasi tanpa perlakuan dengan kelompok murottal dengan pemaparan murottal al-Qur'an saat inkubasi telur

puyuh,  $t(4) = -6,81$ ;  $p < 0,05$ . Nilai pada Sig. (2-tailed) pada tabel 2 yaitu 0,002 yang mana nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai bobot tetas yang pada kelompok kontrol dengan kelompok murottal al-Qur'an.

Bobot tetas DOQ kelompok murottal yang dipaparkan al-Qur'an ( $Mean = 6,61$ ) memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol tanpa perlakuan saat inkubasi telur puyuh ( $Mean = 5,95$ ). Secara umum rata-rata berat tetas pada penelitian kelompok murottal al-Qur'an rata-rata bobot tetas sebesar 6,61 g, lebih tinggi dan kelompok kontrol rata-rata bobot tetas sebesar 5,95 g lebih rendah dibandingkan dengan hasil penelitian Adeyanju et al., (2014) dengan rata-rata sebesar 6,35 gram. Berdasarkan perhitungan statistik uji *independent samples t-Test*, disimpulkan bahwa adanya pengaruh nyata murottal al-Qur'an terhadap bobot tetas, atau mengalami perbedaan yang signifikan.

Adanya pengaruh murottal al-Qur'an pada bobot tetas DOQ diduga disebabkan karena pada saat telur puyuh diinkubasi dan diberikan paparan murottal al-Qur'an, maka sel yang terdapat dalam telur yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibandingkan inkubasi tanpa pemberian paparan murottal al-Qur'an menjadi DOQ atau anak puyuh, getaran-getaran atau gelombang yang diakibatkan oleh murottal al-Qur'an pada surat ar-Rahman dapat mempengaruhi aktivitas membran sel. Diduga pada saat inkubasi sel-sel terdapat didalam telur mengalami proses metabolisme lebih baik sehingga sel-sel yang dihasilkan lebih sehat sehingga jaringan-jaringan yang membentuk organ diduga akan lebih sehat yang secara tidak langsung fungsi organ lebih

bagus akan membuat tubuh DOQ lebih sehat dibandingkan dengan sel-sel telur yang diinkubasi tidak dipapari murottal al-Qur'an. Menurut Syamsuri (2003) menjelaskan bahwa sitoplasma tersusun atas air dan beberapa bahan kimia terlarut, sehingga ketika getaran suara mengenai sitoplasma akan menyebabkan adanya *microbubbles* (gelembung-gelembung) yang beresonansi dengan organel-organel sel. Hasil resonansi tersebut dapat mentransmisikan energi yang selanjutnya akan dimanfaatkan pada proses regulasi siklus sel, sehingga sel-sel yang dihasilkan lebih sehat. Menurut Ibrahim (2005), pada saat sel mendapat rangsangan, baik kimia, mekanik, atau rangsangan yang lain, kanal ion  $\text{Na}^+$  masuk ke dalam sel, sehingga sel mengalami *depolarasi*. Hal tersebut mengakibatkan makin banyak ion  $\text{Na}^+$  masuk ke dalam sel. Proses selanjutnya sel akan dalam kondisi repolarisasi, dimana ion  $\text{Na}^+$  dari dalam sel akan keluar dan pemasukan kembali ion  $\text{K}^+$  ke dalam sel dan sel dalam keadaan stabil. Oleh karena itu pada penelitian oleh Laneng (2016) yaitu paparan murottal al-Qur'an pada sel granulosa kambing membuktikan bahwa sel *granulosa* kambing yang dipapari murottal mempunyai daya hidup yang lebih tinggi dan viabilitas sel granulosa semakin tinggi, sel yang dipapari murottal memiliki waktu yang lebih lama melakukan perubahan fisiologis menuju *homeostatis*. Kondisi *homeostatis* terjadi karena getaran murottal yang merambat pada membran sel mampu menurunkan tingkat stres osmotik pada membran sel. Sehingga mampu meningkatkan dan semakin dapat menekan kematian kultur sel *granulosa*.

Menurut Lestard (2013), menyatakan bahwa suara dapat mengubah siklus sel dan selanjutnya akan mempengaruhi lipid dan proteinnya. Weinberger

(1972) melaporkan suara dapat beresonansi dengan organel sel, sehingga dapat meningkatkan getaran sitoplasma didalam sel. Musik adalah komponen yang dinamis yang bisa mempengaruhi baik psikologis maupun fisiologis bagi seseorang. Musik adalah panduan rangsang suara yang membentuk getaran yang dapat memberikan rangsang pada penginderaan, organ tubuh dan juga emosi pendengarnya (Wilgram, 2002). Sedangkan murottal al-Qur'an adalah suara murottal yang sama-sama terbentuk dari gelombang dan frekuensi, namun murottal memiliki keunikan yang lebih dibandingkan dengan suara lainnya yaitu pada makna dan sisi spiritualnya. Hal ini diperkuat oleh penelitian dilakukan Silvia (2017) menunjukkan kelompok murottal mempunyai skor perkembangan kognitif yang lebih baik dibandingkan pada kelompok musik klasik yaitu adanya perbedaan efektifitas antara kelompok terapi musik klasik dan terapi musik murottal terhadap perkembangan kognitif anak autis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniasari (2017) menjelaskan bahwa penggunaan murottal al-Qur'an lebih bagus dibandingkan menggunakan musik rock dimana penggunaan murottal al-Qur'an yaitu fetus menciit lebih panjang serta tidak didapati bentuk *festus* abnormal, *fetus* memiliki struktur morfologis yang normal dengan panjang dan berat badan yang relatif proporsional. Sehingga murottal al-Qur'an lebih baik dibandingkan dengan musik karena efek mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an baik yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar.

#### 4. Viabilitas DOQ

Melalui uji *independent samples t-Test*, Melalui uji *independent samples t-Test*, terbukti ada perbedaan nilai viabilitas DOQ pada kelompok kontrol yaitu inkubasi telur puyuh tanpa perlakuan dengan kelompok murottal dengan pemaparan murottal al-Qur'an saat inkubasi telur puyuh,  $t(4) = -6,874$ ;  $p < 0,05$ . Nilai pada sig. (2-tailed) pada tabel 3 yaitu nilai  $p \text{ value} = 0,002$  yang mana nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ( $p \text{ value viabilitas} < 0,05$ ), sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai viabilitas kelompok murottal al-Qur'an terhadap kelompok kontrol tanpa ada perlakuan.

Viabilitas kelompok murottal yang dipaparkan al-Qur'an ( $Mean = 100,00$ ) memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol tanpa perlakuan saat inkubasi telur puyuh ( $Mean = 79,00$ ). Berdasarkan perhitungan statistik uji *independent samples t-Test*, disimpulkan bahwa adanya pengaruh nyata murottal al-Qur'an terhadap bobot tetas, atau mengalami perbedaan yang signifikan. Viabilitas anak ayam merupakan kemampuan anak ayam untuk bertahan hidup yang dicirikan dengan kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, paruh normal, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk, tidak cacat fisik, sekitar pusar dan dubur kering, pusar tertutup, kondisi bulu kering dan berkembang (Tona, 2004 dalam Maya, 2013).

Adanya pengaruh murottal al-Qur'an pada viabilitas DOQ diduga disebabkan karena pada saat telur puyuh diinkubasi dan diberikan paparan murottal al-Qur'an, maka sel yang terdapat dalam telur yang mengalami proses

pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibandingkan inkubasi tanpa pemberian paparan murottal al-Qur'an menjadi DOQ atau anak puyuh, getaran-getaran atau gelombang yang diakibatkan oleh murottal al-Qur'an pada surat ar-Rahman dapat mempengaruhi aktivitas membran sel.

Keseimbangan penciptaan Allah swt. tidak hanya dalam bentuknya saja, melainkan juga fungsi-fungsi fisiologis organ-organ tubuh yang rumit seperti proses metabolisme di dalam sel seimbang, maka proses proliferasi pertumbuhan sel yang meliputi pembelahan sel secara aktif dan memerlukan suatu pengaturan (Trenggono, 2009).

Setelah telur dalam alat penetasan atau mesin tetas, pembelahan sel segera berlangsung dan embrio akan terus berkembang selama suhunya tetap. Dengan kondisi ini embrio akan berkembang sempurna dan akan menetas (Paimin, 2011). Ketidakseimbangan sel dalam melakukan metabolisme sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada disekitarnya, baik yang berasal dari dalam sel itu sendiri (*endogenous*) misalnya proses transfortasi sel yang tidak normal, maupun yang berasal dari luar sel (*eksogenous*) misalnya radiasi, hiperoksia dan bahan kimia. Ketidakseimbangan karena faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan suatu penyakit (Olson dan Seidel, 2000). Mendengarkan al-Qur'an memiliki efek yang sangat baik untuk tubuh, seperti memberikan efek menenangkan, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kemampuan konsentrasi, menyembuhkan berbagai penyakit, menciptakan suasana damai dan meredakan ketegangan saraf otak, meredakan kegelisahan, mengatasi rasa takut, memperkuat kepribadian, dan meningkatkan

kemampuan berbahasa. Hal ini dikarenakan setiap suara termasuk murottal terbentuk dari getaran-getaran atau gelombang yang bergerak di udara (Anwar, 2010).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan analisis uji *independent samples t-Test*, pemberian murottal al-Qur'an pada saat inkubasi terhadap bobot tetas puyuh (DOQ) berpengaruh nyata dan viabilitas puyuh (DOQ) berpengaruh nyata. Pemberian murottal al-Quran pada kelompok murottal menunjukkan nilai rata-rata bobot tetas dan viabilitas lebih tinggi dari pada kelompok kontrol .

#### B. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh murottal al-Qur'an terhadap bobot tetas dan viabilitas DOQ dan proses perkembangan embrio pada telur untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal serta membandingkan murottal seperti penambahan durasi pemutaran murottal al-Qu'an atau perbandingan musik seperti musik klasik karena murottal dan musik memiliki gelombang suara yang dapat memberikan pengaruh pada metabolisme sel-sel pada tubuh.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya.

Adeyanu, T.M., S.S. Abiola, J.A. Adegbite, and S.A. Adeyanju. 2014. Effect of egg size on hatchability of Japanese quail (*Coturnix-Coturnix Japonica*) of japanese quail. *Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences (JETEAS)* 5(7): 133-135.

Awad. 2010. The Miracle of Qur'an. <http://www.islamichouse.com>. Diakses 19 oktober 2017.

Anwar, Rosihon. 2008. *Ulum al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anonim. 2011. Ternak Itik Intensif. <https://far71wordpress.com/2011/03/https://far71wordpress.com/2011/03/30mesin-tetas/>. Diakses 10 Juli 2018.

Agromedia. 2002. *Puyuh Si Mungil Yang Penuh Potensi*. Jakarta: Agromedia Pustaka.

Agromedia. 2005. *Kiat Sukses Menetaskan Telur Ayam*. Jakarta: Agromedia Pustaka.

Akbar, A, H. 2009. *Musikalitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Alif, N. 2010. *Mujizat Al-Qur'an*. Jakarta: RA Press.

Al-Kaheel, A. 2011. *Al-Qur'an The Healing Book*. Jakarta: Tarbawi Press.

Al-Qudsi, F, dan Solafa, A. 2012. Effect of Electromagnetic Mobile Radiation on Chick Embryo Development. *Artikel Life Science Journal*. Saudi Arabia: King Abdulaziz University.

Al-Qudsi, F, dan Solafa, A. 2012. Effect Of EMF Radiations Generated By Mobile Phones On Developmental Anomalies And Mortality Of Chick Embryo. Vol 4, No 3.

An-Najjar, Z. 2007. *Pembuktian Sains dalam Sunnah. Jilid 3*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Anwar SR. 2010. *Sembuh dengan Al Quran kitab kedokteran paling lengkap dan menakjubkan*. Yogyakarta: Sabil.
- Ar A. 1991. *Egg Water Movement During Incubation, In: S.G Tullet* (editor). London: Avian Incubation.
- Asmawati. 2013. The Effect of In Ovo Feeding on Hatching Weight and Small Intestinal Tissue Development of Native Chicken. *Disertasi*. Makassar: Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.
- Bambang, M, & Prihambodo, T. 2009. Fisika Dasar untuk Mahasiswa Ilmu Komputer dan Informatika. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Barri, Adriana. Effects Incubation Temperature and Transportation Stress on Yolk Utilization Small Intestine Development, And Post-Hatch Performance Of High-Yield Broiler Chicks. Virginia: The Faculty Of The Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Buctcher, Garry, Richard, Mile. Egg Specific-Designing a Monitorinf Program University of Florida. <http://edis.ifas.ufl.edu/pdf/VM/VM4400.pdf>. Diakses 20 oktober 2017.
- Campbell, D. 2001. *Efek Mozart, Memanfaatkan Kekuatan Musik*. Jakarta: Erlangga.
- Chendy, Y, R. Pengaruh Terapi Murottal Surat Al-Mulk Terhadap Respon Kognitif Pada Anak Autis Di Sekolah Luar Biasa Negeri 01 Bantul Yogyakarta. *Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah.
- CobbVantress. 2011. Chick embryo development. [http://www.poultryhub.org/blog/wpcontent/uploads/2011/10/Poster\\_Chick\\_Embryo\\_Dev\\_English.pdf](http://www.poultryhub.org/blog/wpcontent/uploads/2011/10/Poster_Chick_Embryo_Dev_English.pdf). Diakses 14 oktober 2017.
- El-zaky, Jamal Muhammad.2014. Buku Saku Terapi Baca Al-Qur'an. Jakarta: Zaman.
- Elsayed, N.A.M, Allan E.E., Amina S.E., dan Effet Y Hassan. 2009. New Suggested Schemes for Incubation Temperature and Their Effect on Embryonic Development and hatching Power. *Poultry Science*, 3(1) 19-29.
- Ensminger, M. E., G. Brant & G. S. Colin. 2004. Poultry Science. 4th ed. Pearson Prentice Hall. America: United States America.

- Fatmawati, E. 2013. Perbedaan Pengaruh stimulasi antara musik klasik dan murottal terhadap denyut jantung janin dan gerakan janin pada ibu hamil trimester II serta III. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Halliday, Resnick, dan Walker. 2010. *Fisika Dasar Edisi ke 7*. Jakarta: Erlangga.
- Hamka. 1999. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Hadi.2010. The Power of Sound of Qur'an. <http://www.soundislamic.com>. Diakses 19 oktober 2017.
- Hassan, S. M., A. A. Siam, M. E. Mady and A. L. Cartwright. 2005. Egg storage period and weight effect on hatchability of Ostrich (*Struthio camelus*) eggs. *Poult. Sci.* 84: 1908- 1912.
- Heru. 2008. Ruqyah syari'i berlandaskan kearifan lokal. <http://trainermuslim.com/feed/rss>. Diakses 13 Oktober 2017.
- Ibrahim, Nurhadi. 2005. *Fisiologi Komunikasi Antar Sel dan Inter Sel*. Jakarta: Departemen Ilmu Faal FKUH.
- Jasa, L. 2006. Pemanfaatan Mikrokontroler Atmega 163 Pada Prototipe Mesin Penetasan Telur Ayam. *Jurnal Teknologi Elektro.* 5 (1): 30-36.
- Jones, F. 2000. Acoustic Energy Affects Gingival Fibroblast Proliferation But Leaves Protein Production Unchanged. *J Clin Peridontol. Jurnal.* 27 (11):832-8.
- Kartasudjana, R., dan E. Suprijatna. 2010. *Manajemen Ternak Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Kaheel. 2010. Kekuatan Penyembuhan dengan Al-Qur'an. <http://www.kaheel7.com/Kekuatan-penyembuhan-dengan-al-Qur'an>. Diakses 19 oktober 2017. Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Kurniasari, S, dkk. 2017. Kadar Malondialdehyde Induk dan Struktur Morfologis Fetus Mencit (*Mus musculus*) yang Diperdengarkan Murottal dan Musik Rock pada Periode Gestasi. *Jurnal Protobiont.* Vol. 6 (3): 89 – 97.
- Kurtini, T., K. Nova, dan D. Septinova. 2014. *Produksi Ternak Unggas., Edisi Revisi*. Bandar Lampung: Aura.
- Kurtini, T., K. Nova., dan D. Septinova. 2011. *Produksi Ternak Unggas*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.


- Laneng, Susi Waeh. 2016. Pengaruh Paparan Murottal Surat al-Fatihah Terhadap Proliferasi Sel Granulosa Kambing (*Capra aegagrus hircus*) Secara In Vitro. *Skripsi*. Malang: Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Lestard, N dos rei,. Raphael, C, V., 2013. *Direct Effects of Music in no-auditory Cell in culture*. Brazil: Institute of Biophysics Carlos Chagas Filho, Rio De Janeiro, RJ.
- Maya, D. S. 2013. Perkembangan Embrio Dan Daya Tetas Serta Viabilitas Anak Ayam Arab Dari Umur Induk Yang Berbeda. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Muhaya, A. 2003. *Bersufi Melalui Musik pembelaan Musik Sufi oleh Ahmad Al-Ghazali*. Yogyakarta: Gama Media.
- Munawwir, A, W. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Murtidjo, B. A.1992. *Mengelola Ayam Buras*. Kanisius: Yogyakarta.
- Nirwana. 2014. Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap PerubahanTingkat Kecemasan Pasien Diabetes Melitus Di RUSD Labuang Baji Makassar. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- North, M. & D. D. Bell. 1990. *Commercial Chicken Production Manual*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Nugroho., I.G.T. Manyun.1986. *Beternak Burung Puyuh*. Semarang: Eka Offest.
- Nuryati, T. dkk. 1998. *Sukses Menetaskan Telur*. Jakarta: PT Penebar.
- Olso,. Seidel. 2000. Culture of In Vitro-Produced Bovined Embryos with Vitamin E Improves Development In Vitro and After Transfer to Recipients. *Biology of Reproduction* 62, 248-252.
- Paimin, Farry. 2000. *Membuat Dan Mengelola Mesin Tetas*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Paimin. B. Parry. 2011. *Mesin Tetas*. Jakarta: Swadaya.
- Priyono. 2009. Pengelolaan Mesin Tetas Pada Usaha Penetasan Telur Itik Komersial.[http://www.ilmupeternakan.com/2009/07/pengelolaanmesintetas-pada-usaha\\_17.html](http://www.ilmupeternakan.com/2009/07/pengelolaanmesintetas-pada-usaha_17.html). Diakses 15 oktober 2017.

- Rahayu, I. H. S., I. Suherlan, dan I. Supriatna. 2005. Kualitas telur tetas ayam Merawang Dengan Waktu Pengulangan Insiminsi Buatan Yang Berbeda. *J. Indo. Trop. Anim. Agric.* 30. (3).
- Rasyaf, M. 1991. *Memelihara Burung Burung Puyuh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Runny, Jein Leke. 2016. *Penerapan IPTEKS Ternak Ayam Buras Melalui Penetasan Telur*. Unsrat Pres: Manado.
- Remolda, P. 2009. Pengaruh Al-quran pada Manusia dalam Perspektif Fisiologi dan Psikologi. <http://www.theedc.com>. Diakses 15 September 2017.
- Resnick, Halliday. 1992. *Fisika Jilid 2 (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Robert, V. 2008. *British Poultry Standards. 6th ed.* United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Romanoff, A. I., A. J. Romanoff. 1963. *The Avian Egg*. New York: Jhon Willey and Sons. Inc.
- Septiawan, R. 2007. Respon produktivitas dan Reproduksi ayam kampung dengan umur yang berbeda. *Sikripsi*. Bogor: Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.
- Shihab, M, Quraish. 2012. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Q. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Silaturrohim, S. 2016. Pengaruh Durasi Paparan Murottal Surat Al-Fatihah Terhadap Foliferasi Sel Saraf Otak Tikus (*Rattus norvegicus*) Secara In Vitro. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Siti, F. F, Zulkhah, N. 2015. Efektivitas Mendengarkan Murottal Al-Qur'an terhadap Derajat Insomnia pada Lansia di Selter Dongkelsari Sleman Yogyakarta. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*. Vol. 3, No. 1.
- Silvia, Rizka., Monique. 2017. Efektifitas Terapi Musik Klasik Dan Murottal Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Autis Di Sekolah Khusus Autis Garegeh Bukittinggi Tahun 2016. *Jurnal* . Jilid 1 2017: 1-14.

- Sondak, J. F. 2011. Karakteristik fisik dan kimia telur ayam Arab pada dua peternakan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Stadelman, W.J.Cotteril, O.J. 1995. Egg Science and Technology. The Avi Publishing, Westport, Connecticut.
- Sudaryani, T., Santoso, H. 1994. Pembibitan Ayam Ras. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sudjarwo, Edhy. (2012). Pengaruh bobot telur dan umur induk terhadap performans pada burung puyuh (*Coturnix coturnix japonica*). *Artikel Seminar*. <http://edhysudjarwounggas.lecture.ub.ac.id/>. Diakses 19 Oktober 2017.
- Sugiharto, R.E. 2005. *Meningkatkan Keuntungan Beternak Puyuh*. Jakarta Agromedia Pustaka.
- Suprijatna, E., U. Atmomarsono, Kartasudjana. 2002. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Surjono. 2001. Proses Perkembangan Embrio. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Susila, A.B. 1997. Pengaruh Frekuensi Pemutaran Telur dan Berat Telur Terhadap Fertilitas, Daya Tetas, Mortalitas, dan Berat DOD Itik Tegal. *Skripsi*. Medan: Fakultas Peternakan Universitas Sumatera Utara.
- Syamsuri. 2003. *Metode Dasar Kultur Jaringan Hewan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Syawqi, A, I. 2006. *Bahkan Jagat Raya Pun Bertasbih Ilustrasi Alunan Tasbeih Dari Gerak Atom Hingga Rotasi galaksi, terj. A. Koshla Asy'ari Khatib*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Trenggono, B.S. 2009. *Metode Dasar Kultur Jaringan Hewan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- United States Department of Agriculture (USDA). 2000. Egg Grading Manual. Washington, D.C: Agricultural Handbook, No. 75.
- Ustman. 1994. *Memperkaya Pengetahuan Tentang Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Qalami.
- Weinberger, N.M, Iming. 1972. Modification of Unit dischargers in the medical geniculate nucleus by chick-shock pairing. *Experimental neurology*. 36 (1), 45-58.

- Wheindrata, H.S. 2014. *Panduan Lengkap Beternak Burung Puyuh Petelur*. Yogyakarta: Lily Publisher.
- Widayarti, 2011, Pengaruh Murottal Al-Quran terhadap Intensitas Kecemasan Pasien Sindroma Koroner Akut di RS Hasan Sadikin. *Tesis*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Wikipedia. 2018. Burung Puyuh. [http://commons.wikimedia.org/wiki/Burung\\_Puyuh](http://commons.wikimedia.org/wiki/Burung_Puyuh). Diakses 5 Juli 2018.
- Wilgram, A.,L. 2002. *The Effects Of Vibroacoustic Therapy On Clinical and Non Clinical Population*. St. Georges Hospital Medical School: London: London University. (Unpublisged Dissertation Paper).
- Wuryadi, Slamet. 2013. *Beternak Puyuh*. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka.
- Yuliati, S. R. Tetri, W. 2005. Pertumbuhan dan Perkembangan Embrio Tikus Putih (*Rattus norvegicus* L.) Setelah Perlakuan Kebisingan. *Jurnal*. Vol 7, Nomor 1.
- Yusuf, M. 2013. *Keajaiban Sains*. Diva Press: Yogyakarta.
- Yuwanta, T. 2010. *Telur dan Kualitas Telur*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

**L**



**A**

**M**

**P**

**I**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**R**  
**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

**A**  
**N**

**LAMPIRAN 1**  
**Analisis Uji Independent Sampel Test**

**Bobot Tetas DOQ**

**Group Statistics**

Hasil Penetasan	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Bobot Tetas Kontrol	3	5,9555	,08412	,04857
Murottal	3	6,5105	,11333	,06543

**Independent Samples Test**

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means	
	F	Sig.	t	df
Bobot Tetas Equal variances assumed	,362	,580	-6,811	4
Equal variances not assumed			-6,811	3,691

**Independent Samples Test**

		t-test for Equality of Means		
		Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Bobot	Equal variances assumed	,002	-,55497	,08148
Tetas	Equal variances not assumed	,003	-,55497	,08148

**Independent Samples Test**

		t-test for Equality of Means	
		95% Confidence Interval of the Difference	
		Lower	Upper
Bobot Tetas	Equal variances assumed	-,78120	-,32873
	Equal variances not assumed	-,78888	-,32105

## Viabilitas DOQ

### Group Statistics

	Viabilitas	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Hasil viabilitas DOQ	Perlakuan murottal	3	100,0000	,00000	,00000
	Perlakuan Kontrol	3	79,0000	5,29150	3,05505

### Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means
		F	Sig.	t
Hasil viabilitas DOQ	Equal variances assumed	12,000	,026	6,874
	Equal variances not assumed			6,874

### Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means		
		Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
Hasil viabilitas DOQ	Equal variances assumed	4	,002	21,00000
	Equal variances not assumed	2,000	,021	21,00000

### Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means		
		Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
			Lower	Upper
Hasil viabilitas DOQ	Equal variances assumed	3,05505	12,51782	29,48218
	Equal variances not assumed	3,05505	7,85518	34,14482



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**LAMPIRAN 2**  
**Dokumentasi Kegiatan Penelitian**



Gambar 1. Ruang persiapan mesin tetas



Gambar 2. Mesin tetas yang digunakan



Gambar 3. Persiapan mesin tetas



Gambar 4. Indukan puyuh



Gambar 5. Telur puyuh yang digunakan



Gambar 6. Pemilihan telur untuk inkubasi



Gambar 7. Seleksi Telur puyuh yang digunakan



Gambar 8. DOQ yang telah menetas perlakuan murottal



Gambar 9. DOQ yang telah menetas perlakuan control



Gambar 9. Penimbangan DOQ yang sudah menetas

## RIWAYAT HIDUP



MUSRIFA ALIAH, dilahirkan di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di desa Bala, Kecamatan Balanipa pada tanggal 16 Desember 1995. Anak ke-6 dari delapan bersaudara pasangan dari Hamzah dengan Naisa. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN No. 005 Pambusuang di desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di MTS Nuhiyah Pambusuang dan tamat pada tahun 2011 kemudian pada tahun itu melanjutkan pendidikan di MAN Majene dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi pada program studi Ilmu Peternakan. Berkat kerja keras dan kegigihannya penulis menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R