

**DETEKSI CEMARAN BAKTERI PATOGEN *Staphylococcus aureus* PADA
AYAM GORENG KRISPI YANG DI JUAL DI MALL PANAKUKANG**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Pada
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

MAWAR

NIM. 60300113041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawar
NIM : 60300113041
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang 23 Agustus 1994
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : jl. Arif Rahman Hakim Ir 32 No 16 Makassar Sul-sel
Judul : “Deteksi Cemaran Bakteri *Staphylococcus aureus* pada Ayam Goren Krispi yang di Jual di Mall Panakukng Makassar”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 30 Agustus 2018

Penyusun



Mawar

60300113041

UNIVERSITAS ISLAM
ALA UDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Deteksi Cemaran Bakteri *Staphylococcus aureus* Pada Ayam Goreng Krispi yang di Jual di Mall Panakukang Makassar ”, yang disusun oleh Mawar NIM: 60300113041, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa Samata, 30 Agustus 2018 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag. (.....)

Sekretaris : St. Aisyah Sijid, S. pd., M. Kes (.....)

Penguji I : Dr. Fatmawati Nur S. Si., M. Si (.....)

Penguji II : Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi (.....)

Pembimbing I : Dr. Hafsah, S. Si., M. Pd (.....)

Pembimbing II : Eka Sukmawaty, S. Si., M. Si (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag

NIP. 19691205 199303 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi Saudari, **Mawar** NIM: 60300113041, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi berjudul, “Deteksi Cemaran Bakteri Patogen *Staphylococcus aureus* pada Ayam Goreng Krispi yang di Jual di Mall Panakukang Makassar”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 29 Agustus 2018



Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si.

Pembimbing II



Dr. Hafsan, S.Si., M.Si.

Pembimbing I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Deteksi Cemaran Bakteri *Staphylococcus aureus* Pada Ayam goreng krispi yang di Jual di Mall Panakukang Makassar**”. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Besar Nabiullah Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya, Nabi diutus sebagai khalifah kepermukaan bumi ini dan untuk menuntun manusia dari lembah kebiadaban menjadi kebaikan seperti sekarang ini yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.) pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penyusunan skripsi tidak terlepas dari hambatan dan tantangan, namun berkat kerja keras, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada Suami saya A. Rahmat Al Ramarh Apdy dan kedua orang tua tercinta Ayahanda H.Abd. Rahim, Ibu Hj. Aminah atas doa dan dukungannya. Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih secara mendalam, tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sejarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sejarannya.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

5. Ibu Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd sebagai Dosen Pembimbing I dan ibu Eka Sukmawaty, S.Si.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan telah meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dr. Fatmawati Nur, S.Si.,M.Si dan Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.HI. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian dan penulisan skripsi.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah selama kuliah di kampus ini serta seluruh Staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
8. Kepala Laboratorium dan seluruh Laboran Laboratorium Jurusan Biologi FST UIN Alauddin Makassar yang memberikan ilmu, arahan, dan membantu selama penelitian ini.
9. Kepala Perpustakaan beserta jajarannya, terima kasih bantuannya selama ini.
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan “BRACHIALIS” angkatan 2013 jurusan biologi yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta banyak kenangan yang tak terlupakan selama ini.
11. Adik-adik angkatan 2014, 2015, dan 2016 jurusan biologi, terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini.
12. Serta terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan Satu persatu atas doa, semangat, dukungan, saran dan pemikiran yang diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka hanya kepada Allah swt. jualah menyerahkan segalanya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, semoga kita semua mendapat curahan & Rihdo dari-Nya, Amin yaarabbal alamin...

Makassar, 29 Agustus 2017

Penulis

Mawar

NIM: 60300113041



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v-vii
DAFTAR ISI	viii-ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang Masalah.....	1-5
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5-6
D. Kajian Pustaka.....	6-7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-47
A. Ayat dan Hadist yang Relevan.....	9-10
B. Cemaran Bakteri Pada Pangan Secara Umum	10-16
C. Cemaran Bakteri Pada Ayam	16-21
D. Ayam	21-27
E. Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	27-46
F. Kerangka Pikir	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48-65
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Waktu dan Lokasi	48
C. Variabel Penelitian.....	48
D. Devenisi Operasional Penelitian	49
E. Alat dan Bahan	49
F. Prosedur Kerja.....	50-54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55-65
A. Hasil	55-57
B. Pembahasan.....	58-65
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67-71

LAMPIRAN-LAMPIRAN	72-81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Mawar
Nim : 60300113041
Judul Skripsi : **Deteksi Cemaran Bakteri *Staphylococcus aureus* Pada Ayam Goreng Krispi yang di jual di Mall Panakukang Makassar.**

Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri yang ada di mana-mana, seperti udara, debu, air buangan, air, susu, makanan dan peralatan makan, lingkungan, tubuh manusia dan hewan seperti kulit, rambut/bulu dan saluran pernafasan. Manusia dan hewan merupakan sumber utama infeksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat cemaran bakteri *Staphylococcus aureus* pada ayam goreng krispi yang di jual di mall panakukang makassar. adapun hasil penelitian yang di lakukan dengan 2 metode secara bersamaan menurut (siti, 2009) yaitu, Pada metode A, sampel yang di temukan paling tinggi cemarannya ($>BMCM$) yaitu pada sampel brand B pengambilan 1 sebanyak TBUD, sedangkan sampel yang paling rendah cemarannya ($<BMCM$) di temukan pada sampel brand E pengambilan 2 yaitu TSUD. Sedangkan Pada metode B sampel yang di temukan paling tinggi cemarannya ($>BMCM$) yaitu pada sampel brand A pengambilan 1 sebanyak $2,8 \times 10^3$ koloni/g, sedangkan sampel yang paling rendah cemarannya ($<BMCM$) di temukan pada sampel brand E pengambilan 2 yaitu $1,3 \times 10^2$ koloni/g. Dengan demikian tingkat cemaran bakteri dapat dinyatakan sebagian besar tingkat cemarannya sudah melampaui ambang batas Standar Nasional 7388: 2009 (1×10^2 koloni/g).

Kata kunci: *Staphylococcus aureus*, Ayam goreng krispi

ABSTRACT

Name : Mawar

Student ID Number : 60300113041

Title : Detection of *Staphylococcus aureus* Bacteris Contamination on Krispi fried Chicken Sold at Makassar Panakukang Mall

Staphylococcus aureus bacteria are bacteria that are always everywhere, such as air, dust, waste water, water, milk, food and eating utensils, the environment, the human body and animals such as skin, hair / hair and respiratory tract. Humans and animals are the main source of infection. This research is a qualitative research which aims to determine the level of contamination of Staphylococcus aureus bacteria on krispi fried chicken sold at Panakukang Makassar mall. As for the results of the research conducted with 2 methods simultaneously according to (Siti, 2009) namely, in the A method of sample found the highest contamination ($> \text{BMCM}$) that is in the first brand B sample taken as much as TBUD, while the lowest contamination sample ($< \text{BMCM}$) was found in the second sample taken brand E, TSUD. Whereas in method B sample found the highest contamination ($> \text{BMCM}$) that is in the sample of the first take A brand as much as 2.8×10^3 colony / g, while the lowest contamination sample ($< \text{BMCM}$) was found in the sample taken brand 2 E that is 1.3×10^2 colony / g. thus the level of bacterial contamination can be stated most of the level of contamination has exceeded the threshold of National Standard 7388: 2009 (1×10^2 colony / g).

Keyword: *Staphylococcus aureus*, Krispi Fried Chicken

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia yang diturunkan oleh Allah swt. kepada nabi Muhammad saw. Sebagai seorang ilmuwan muslim yang baik sebaiknya dapat menjadikan al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun ayat yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian yakni sebagai berikut:

(QS Ar-Rum 30.41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Kementrian Agama R1, 2012).

Yakni telah tampak kerusakan di darat dan di lautan seperti rusaknya kehidupan mereka, turunnya musibah, dan turunnya penyakit yang menimpa diri mereka, dan lain-lain di sebabkan perbuatan buruk (maksiat) yang mereka lakukan. telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan

ketertenggelaman yang di sebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang di perbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbutan mereka agar mereka bertobat dari kemaksiatan (Shihab, 2002).

dalam QS Al-maidah 5.88)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ۝٨٨

Tejemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya” (Kementrian agama R1, 2012).

Disini di tegaskannya perintah memakan yang halal dan, dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. dengan perintah ini tercegah pula lah praktik-praktik keberagaman yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap nya adalah mu'minin, yakni orang-orang yang mantap keimanannya yang di maksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, disamping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas.

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Penulis antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, ia makruh atau sangat tidak di sukai oleh Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi ada yang halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan yang halal lagi baik. Makanan yang baik harus mencakup nutrisi yang baik dan keadaan makanan bebas dari cemaran bakteri patogen yang membahayakan kesehatan (Shihab, 2002).

Sehingga sebagai seorang peneliti informasi tersebut di jadikan acuan untuk melakukan penelitian dengan judul “Deteksi cemaran bakteri patogen *Staphylococcus aureus* pada ayam goreng krispi yang dijual di mall panakukang”.

Ayam merupakan sumber protein hewani yang sangat populer dimasyarakat dan harganya pun lebih terjangkau dibandingkan dengan daging sapi dan lainnya. Daging ayam adalah produk dari peternakan unggas yang sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Permintaan konsumen terhadap daging ayam dan juga produk olahan semakin tinggi karena harganya yang terjangkau, kandungan lemak yang rendah, serta tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk pengolahannya (Pakaya 2014).

Salah satu olahan ayam yang sangat populer di masyarakat dan banyak di gemari yaitu ayam goreng krispi karena rasa yang enak, cara mengelolanya sangat gampang, dan sudah banyak tersedia di beberapa rumah makan, baik itu di pasar, di pinggir jalan, mall dan tempat makan lainnya.

Namun demikian proses penyediaan daging ayam atau pengolahan pascapanen yang dilakukan para penyembelih/pedagang daging ayam terutama skala usaha kecil sampai menengah masih sangat kurang dalam menjaga sanitasi dan hygiene produknya, sehingga sangat wajar apabila kasus-kasus keracunan makanan masih sering terjadi. Terlebih diikuti dengan cara memasak/mengolah yang juga kurang matang dan higienis. Hal ini dapat mengakibatkan daging ayam tersebut mudah terinfeksi bakteri patogen khususnya bakteri *Staphylococcus aureus*.

Bakteri tersebut merupakan bakteri yang selalu ada di mana-mana, seperti udara, debu, air buangan, air, susu, makanan dan peralatan makan, lingkungan, tubuh manusia dan hewan seperti kulit, rambut/bulu dan saluran pernafasan. Manusia dan hewan merupakan sumber utama infeksi. Tingkat keberadaan bakteri ini bahkan lebih tinggi pada mereka yang berhubungan dengan individu yang sakit dan lingkungan rumah sakit (Chotiah, 2009).

Staphylococcus aureus merupakan bakteri penyebab *food poisoning* yang dapat menimbulkan terjadinya gastroenteritis akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung satu atau lebih enterotoksin yang dihasilkannya. Toksin yang dihasilkan bersifat tahan dalam suhu tinggi, meskipun bakteri mati dengan pemanasan namun

toksin yang dihasilkan tidak akan rusak dan masih dapat bertahan meskipun dengan pendinginan ataupun pembekuan (Stehulak, 1998).

Berdasarkan hasil penelitian (Cotiah, 2009) tingkat cemaran bakteri *Staphylococcus aureus* lebih tinggi pada ayam yang sudah diolah di bandingkan dengan ayam yang belum diolah (mentah). Tingkat pencemarannya melebihi batas maksimal cemaran mikroba menurut SNI No. 01-3020-1995.

Berdasarkan hasil observasi di Mall Panakukang Makassar teradapat 5 tempat makan yang menjual menu makanan ayam krispi di mall panakukang makassar, maka akan dilakukan penelitian tentang cemaran bakteri *Staphylococcus aureus* pada daging ayam dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi tingkat cemarannya. Sehingga konsumen akan lebih teliti dalam memilih ayam yang di jual di supermarket, rumah makan pinggir jalan maupun rumah makan yang berada di dalam mall, begitu pula dengan pedagang agar lebih berhati hati dalam menangani dagangannya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana tingkat cemaran bakteri patogen *Staphylococcus aureus* pada ayam goreng krispi yang dijual di mall panakukang makassar?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu, Sample dari penelitian ini diambil di 5 brand yang ada di mall panakukang makassar, mengambil potongan pada bagian ayam secara acak (Dada, paha). Kemudian menimbang sampel potongan ayam tanpa memisahkan daging dan krispi pada ayam, setelah di lakukan penimbangan, selanjutnya melakukan proses isolasi, deteksi dan penghitungan jumlah cemaran *Staphylococcus aureus* dengan menggunakan 2 metode secara bersamaan menurut (Siti, 2009).

D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka pada penelitian ini adalah sabagai baerikut:

1. Siti 2009 Telah melakukan penelitian tentang cemaran *Staphylococcus aureus* pada daging ayam dan olahannya. Sebanyak 94 sampel bahan pangan asal ayam dan olahannya yang terdiri dari 67 sampel karkas ayam (potongan dada, punggung, paha dan sayap), 13 sampel bahan pangan olahan asal daging ayam (sosis dan ayam goreng), 10 sampel air cucian karkas ayam utuh dari Rumah Potong ayam (RPA), 4 ulas meja tempat ayam diproses di RPA diambil secara aseptis. Sampel diambil secara *random* dari masing-masing dua pasar tradisional dan pasar swalayan di Bandung dan masing-masing satu pasar tradisional dan pasar swalayan di Bekasi, serta dari rumah potong ayam (RPA) di Bogor. dengan hasil yaitu Sebanyak 41, 33,3 dan 0% sampel karkas ayam masing-masing berurutan berasal dari pasar tradisional di Bandung dan Bekasi, pasar swalayan di Bandung dan Bekasi dan RPA di Bogor tercemar bakteri *S. aureus*. Tingkat

cemaran di pasar tradisional lebih tinggi dibanding dengan di pasar swalayan dan sebagian besar tingkat cemaran sudah melampaui ambang batas Standar Nasional. Sedangkan pada produk olahan yang diperiksa ayam goreng merupakan produk yang paling tinggi cemarannya.

2. Jumriani 2017 telah melakukan penelitian dengan judul “tingkat cemaran bakteri *staphylococcus aureus* pada daging ayam yang dijual di pasar tradisional makassar” Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa daging ayam yang diperoleh dari pasar tradisional Makassar ditemukan adanya bakteri *Staphylococcus aureus*. Sebanyak 18 dari 24 sampel daging ayam (65,8%) tercemar mikroba melebihi 1×10^2 dengan demikian tingkat cemaran bakteri dapat dinyatakan sebagian besar tingkat cemaran sudah melampaui ambang batas Standar Nasional 7388: 2009.
3. Aven 2011 telah melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi mikrobiologi (*Staphylococcus* dan *Coliform*) pada susu dan daging serta olahannya di kota jogjakarta. Dari hasil pemeriksaan di laboratorium Kesmavet didapatkan bahwa terdapat kontaminan bakteri *Coliform* dan *Staphylococcus* sp pada sampel daging dan susu serta olahannya. Jumlah bakteri *Staphylococcus* sp pada media *Vogel-Johnson* menunjukkan hasil yang tinggi pada susu segar sedangkan *Coliform* pada media *Violet Red Bile* ditemukan pada susu segar dan daging ayam mentah. Memang jumlah hasil perhitungan yang didapat melebihi dari standar yang ditetapkan SNI-01-6366-2000 dan SNI-7388-2009, maka untuk bisa

mengonsumsi bahan makanan tersebut harus diperhatikan persiapan dan cara pengolahannya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat cemaran bakteri *Staphylococcus aureus* pada ayam goreng krispi yang dijual di mall panakukang makassar.

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumber informasi untuk konsumen dan pedagang agar hati-hati dalam memilih olahan ayam untuk dikonsumsi.
2. Dapat dijadikan sebagai sumber acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat dan Hadist yang relevan

Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dikonsumsi oleh manusia, tapi tidak semua baik untuk dikonsumsi, Sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah swt. dalam QS Abasa (80:24) yang berbunyi:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٤

Terjemahnya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” (Kementrian Agama R1, 2012).

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa (maka hendaklah manusia itu memperhatikan) dengan memasang akalnya (kepada makanannya) bagaimanakah makanan itu diciptakan dan diatur untuknya?

Manusia harus memperhatikan makanan yang akan dia makan, seperti daging ayam yang akan dia makan sebaiknya harus diperhatikan dengan baik dari segi kulit dagingnya apakah layak untuk dikonsumsi, sehingga tidak dapat merusak kesehatan. Proses keamanan dan kelayakan daging ayam ini harus dilakukan sedini mungkin yakni mulai dari peternakan hingga daging ayam dikonsumsi (dimeja makan). Meskipun ayam tersebut dinyatakan sehat dari peternakan, jika

dipemotongan dan penjualan daging ayam tidak memenuhi kriteria pemotongan yang baik maka kecenderungan menimbulkan penyakit akan semakin besar. Sehingga untuk menjaga kualitas daging sebaiknya disimpan dalam lemari pendingin agar kualitas dagingnya dapat terjaga dengan baik dan proses pemasakannya juga harus di perhatikan dengan baik (Shihab, 2002).

B. Cemaran Bakteri pada pangan Secara umum

Tabel 2.1 Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan Produk olahan daging unggas dan daging hewan buruan, utuh / potongan menurut SNI 2009.

Kategori pangan	Jenis cemaran mikroba	Batas maksimum
Produk daging kering (termasuk abon) kerupuk kulit, kerupuk paru, keripik usus ayam	ALT (30°C, 72 jam)	1 x 10 ⁵ koloni/g
	APM <i>Escherichia coli</i>	< 3/g
	<i>Salmonella sp</i>	Negatif/25 g
	<i>Staphylococcus aureus</i>	1 x 10 ² koloni/g
Produk olahan daging unggas dan daging hewan buruan, dihaluskan		
Daging ayam olahan (bakso, sosis, nugget, burger)	ALT (30°C, 72 jam)	1 x 10 ⁵ koloni/g
	APM <i>Coliform</i>	10/g
	APM <i>Escherichia coli</i>	< 3/g
	<i>Salmonella sp</i>	Negatif/25 g
	<i>Staphylococcus aureus</i>	1 x 10 ² koloni/g
	<i>Clostridium perfringens</i>	1 x 10 ² koloni/g

Sosis masak (tidak di kalengkan, siap konsumsi)	ALT (30°C, 72 jam)	1 x 10 ⁴ koloni/g
	<i>APM Coliform</i>	< 3/g
	<i>Salmonella sp</i>	Negatif/25 g
	<i>Staphylococcus aureus</i>	1 x 10 ² koloni/g
	<i>Clostridium perfringens</i>	10 koloni/g
	<i>Listeria monocytogenes</i>	Negatif 25/g
Sosis dalam kaleng	ALT (30°C, 72 jam)	1 x 10 ² koloni/g
	<i>Clostridium perfringens</i>	Negatif/g

Sumber: SNI 2009

Produksi pangan di negara-negara sedang berkembang meningkat. sekalipun demikian, tiap tahun penduduk yang tidak cukup makan makin besar jumlahnya. Dengan demikian masalah kurang gizi juga bertambah. Perencanaan untuk meningkatkan pengadaan pangan pada tingkat masyarakat yang tinggal di daerah pertanian adalah penting, baik untuk pembangunan nasional maupun untuk kesejahteraan manusia. Sehubungan dengan itu, salah satu prioritas utama dari pendidikan pertanian adalah keharusan membekali para mahasiswa dengan sarana belajar yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut, sebelum masalah kelaparan makin membengkak.

Adanya mikroorganisme dalam makanan dan minuman dapat merusak atau mengubah komposisi bahan makanan dan minuman tersebut. Makanan yang telah tercemar oleh mikroorganisme dapat menimbulkan gejala keracunan, yang disebabkan oleh salah satu mikroorganisme. Kontaminasi dapat terjadi sejak

pengolahan bahan baku, proses bahan, peralatan, pengemasan, karyawan, air yang digunakan dan jenis wadah atau kemasan yang digunakan. Hidrolisa protein, lemak dan polisakarida dapat menyebabkan terjadinya perubahan tekstur dari makanan tersebut. Metabolisme asam amino dan asam lemak yang tidak sempurna serta fermentasi gula sederhana dapat menyebabkan perubahan citarasa. Makanan dengan komposisi campuran, seringkali menyebabkan beberapa perubahan bau, rasa dan tekstur secara simultan (Djide,2003).

Produk olahan unggas seperti sate ayam, ayam panggang maupun ayam opor yang diproduksi oleh industri jasa boga juga memiliki resiko cemaran mikroba yang tinggi. Pengolahan sate ayam yang memerlukan waktu penyiapan panjang menyebabkan produk ini sangat rentan terhadap cemaran mikroba. (Harmayani, 1996) menyebutkan bahwa karkas ayam mentah yang digunakan sebagai bahan dasar sate pada suatu industri jasa boga telah tercemar dengan *Staphylococcus aureus* sebesar $1,6 \times 10^6$ koloni/g. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat *Staphylococcus aureus* memiliki kemampuan memproduksi enterotoksin yang tahan terhadap pemanasan (Titiek, 2013).

Daging ayam adalah bahan pangan yang bergizi tinggi karena kaya akan protein, lemak, mineral serta zat lainnya yang sangat dibutuhkan tubuh. Daging ayam juga mengandung asam amino esensial diantaranya arginin, sistin, histidin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, tirosin, dan valin. Pencemaran daging oleh mikroorganisme dapat terjadi sebelum dan setelah hewan dipotong. Pada saat pemotongan darah masih bersirkulasi ke seluruh anggota tubuh hewan sehingga

penggunaan pisau yang tidak bersih dapat menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam darah. Pencemaran daging dapat dicegah dengan melakukan proses pemotongan secara higienis (Erni 2009).

Susu merupakan minuman sumber protein yang diperoleh dari hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya, yang dapat langsung diminum atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan makanan yang aman dan sehat. Susu merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroba sehingga apabila penanganannya kurang baik dapat tercemar mikroba yang dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Susu yang baik apabila tidak mengandung mikroba patogen (Hadiwiyoto, 1983).

Susu dapat tercemar mikroba karena beberapa faktor, antara lain (1) sapi telah terinfeksi oleh *Brucella*, *Micobacterium bovis*, *Coxiella burnetii*, (2) sapi telah terinfeksi oleh *staphylococci* baik secara langsung maupun tidak langsung dari manusia yang memerah dan (3) susu dapat terkontaminasi oleh *S. typhi*, *C. diphtheriae* atau *S. pyogenes* setelah diperah (Reiman dan Briyan, 1979).

Sayuran-sayuran dan buah-buahan, Bagian sebelah dalam jaringan tanaman yang sehat biasanya bebas mikroorganisme, tetapi permukaannya dapat tercemari berbagai mikroorganisme. Taraf (dan macam) pencemaran oleh mikroba itu ditentukan oleh lingkungan tempat diambilnya sayuran atau buah-buahan tersebut, kondisi (kesegaran), metode penanganan, serta waktu dan kondisi penyimpanan. Buah-buahan dan sayur biasanya rentan terhadap infeksi oleh bakteri, cendawan, dan virus. Serbuan mikroorganisme ke dalam jaringan tanaman dapat terjadi pada

berbagai stadium perkembangan buah dan sayuran tersebut, dan bergantung kepada luasnya jaringan yang terserang, maka kemungkinan terjadinya perusakan akan bertambah. Faktor kedua yang memungkinkan terjadinya pencemaran oleh mikroba ialah penanganannya selepas panen. Penanganan mekanis mungkin sekali menyebabkan terlukanya jaringan sehingga memudahkan penyerangan oleh mikroorganisme. pH buah-buahan relatif asam, berkisar dari 2,3 untuk jeruk sampai 5,0 untuk pisang. Hal ini membatasi pertumbuhan cendawan. Kisaran pH sayuran agak lebih tinggi, yaitu 5,0 sampai 7,0 karena itu lebih rentan terhadap serangan bakteri.

Daging unggas segar mempunyai flora bakteri pada kulitnya yang berasal dari bakteri yang biasanya terdapat pada unggas hidup dan dari pencemaran yang terjadi pada waktu penyembelihan, pengulitan, dan pembersihan isi perutnya. Pada keadaan yang bersih dan sehat, hitungan bakteri menurut laporan berkisar dari 100 sampai 1000 bakteri per sentimeter persegi permukaan kulit, sedangkan pada keadaan kurang bersih hitungan tersebut dapat bertambah 100 kali lipat atau lebih tipe pseudomonas merupakan kontaminan utama pada kulit daging unggas segar.

Telur, Bagian sebelah dalam telur yang baru keluar biasanya bebas dari mikroorganisme, banyaknya mikroba yang kemudian dikandungnya ditentukan oleh kebersihan selama penyimpanan, disamping juga kondisi penyimpanannya, seperti suhu dan kelembapan. Mikroorganisme terutama bakteri dan kapang, dapat memasuki telur melalui kulit yang retak atau menembus atau menembus kulit ketika

lapisan tipis protein yang menutupi kulit telur telah rusak. Tipe mikroorganisme yang terlibat adalah yang terdapat dilingkungan sekitarnya.

Makanan laut, Flora mikroba pada tiram, remis ikan dan makhluk akuatik lain yang baru ditangkap sebagian besar mencerminkan kualitas mikrobial perairan tempat ditangkapnya hewan-hewan itu, Yang terutama penting ialah mutu kebersihan air tersebut apakah tercemar? bakteri *Vibrio parahaemolyticus* merupakan penyebab epidermis sejumlah gastroenteritis asal makanan laut di amerika serikat. Organisme ini banyak diperairan atlantik, pasifik, dan pantai teluk meksiko dan telah di isolasi dari contoh-contoh makanan laut termasuk ikan, kersng-kerangan dan udang-udangan *Vibrio colerae*, penyebab kolera, juga ditemukan diperairan pantai amerika serikat. Produk

Pangan terbuat dari kerang-keranagan yang dari perairan yang tercemar oleh organisme ini bila pengolahannya kurang sempurna dapat meyebabkan infeksi bila di makan. Kerang-kerangn yang tumbuh dalam air yang tercemar dapat mengumpulkan virus, dan dapat merupakan sumber infeksi hepatitis. Tiram dan remis mentah yang di ambil dari persairan yang tercemar telah menyebabkan epidemi diberbagai bagian dunia.

Daging, bangkai hewan yang disembelih untuk diambil dagingnya dan disimpan dalam kamar pendingin mungkin sekali mendapat kontaminasi permukaan oleh berbagai organisme dari berbagai sumber seperti udara, petugas dan peralatan jaringan bagian dalam hewan yang sehat biasanya steril. Setiap perkaan irisan daging segar yang dipotong dari bangkai yang didinginkan akan

terkontaminasi oleh mikroorganisme yang khas bagi lingkungan sekitarnya dan peralatan (gergaji atau pisau) yang digunakan untuk memotong daging tersebut. Proses yang paling banyak menyediakan permukaan baru bagi terjadinya pencemaran daging ialah penggilingan (pencincangan) daging. Untuk memperbaiki mutu mikrobiologis daging dan produk yang terbuat dari daging, perlu ada persyaratan standar mikrobiologis bagi produk-produk ini yang harus dipenuhi pada penjualannya. Spesies bakteri yang umum terdapat pada daging segar ialah *Pseudomonas*, *Stafilococcus*, *Mikrococcus*, *Enterococcus* dan koliform. Suhu rendah yang digunakan untuk menyimpan daging segar memungkinkan pertumbuhan hanya mikroorganisme psikrofilik.

C. Cemaran bakteri pada daging ayam

Keberadaan *Staphylococcus aureus* dalam bahan pangan erat kaitannya dengan sanitasi pekerjaan serta kebersihan lingkungan dan peralatan pengolahan (Hidayati, 2012). Lingkungan yang kotor memudahkan perkembangan mikroorganisme dalam produk unggas (Djaafar, 2017). Infeksi mikroorganisme pada ayam dipeternakan dapat terkandung di dalam daging segar dan dapat pula bertahan selama proses pengolahan. Proses pemotongan unggas secara kontinyu dan higienitas yang tidak terjaga juga dapat menjadi sumber penularan mikroorganisme dari karkas yang satu ke karkas yang lainnya (Siagian, 2002).

Proses penanganan ayam mulai dari pascapanen hingga ke konsumen di Indonesia masih banyak yang tidak dijaga sanitasi Higene produknya. Kondisi

demikian memudahkan bakteri *Staphylococcus aureus* yang selalu berada dilingkungan pada tubuh manusia untuk mengkontaminasi daging ayam (Chotiah, 2009).

Kontaminasi *Staphylococcus aureus* pada daging ayam segar, beku dan cincang maksimum 1×10^2 koloni/g. *Staphylococcus aureus* dapat rusak dengan pemasakan produk pangan yang benar, namun toksin yang dihasilkan dapat tahan terhadap pemanasan, pendinginan, dan pembekuan (BSN, 2009).

Daging adalah bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dikonsumsi manusia, termasuk otak serta isi rongga dada dan rongga perut. Hewan ternak yang dimaksud adalah ternak ruminansia (sapi, kerbau, domba, kambing, kuda) dan unggas (ayam, itik, entok, burung dara, kalkun, angsa, burung puyu dan belibis) (Gustiani, 2009).

Pencemaran daging oleh mikroba dapat terjadi sebelum dan setelah hewan di potong. Sesaat setelah dipotong, darah masih masih bersirkulasi ke seluruh anggota tubuh hewan sehingga penggunaan pisau yang tidak bersih dapat menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam darah. Pencemaran daging dapat dicegah jika proses pemotongan dilakukan secara higienis. Pencemaran mikroba terjadi sejak di peternakan sampai ke meja makan (Gustiani, 2009).

Daging merupakan bahan pangan yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba karena: 1) memiliki kadar air yang tinggi (68,75%), 2) kaya akan zat yang mengandung nitrogen, 3) kaya akan mineral untuk pertumbuhan mikroba, dan 4) mengandung mikroba yang menguntungkan bagi mikroba lain. Ternak yang baru

diangkut dari tempat lain hendaknya tidak dipotong sebelum cukup istirahat, karena akan meningkatkan jumlah bakteri dalam daging dibandingkan jumlah bakteri dalam daging dibandingkan dengan ternak yang masa istirahatnya cukup (Betty dan Yendri, 2007).

Daging yang tercemar mikroba melebihi ambang batas akan menjadi berlendir, berjamur, daya simpannya menurun, berbau busuk, rasa tidak enak dan menyebabkan gangguan kesehatan bila dikonsumsi. Mikroba yang dapat mencemari daging antara lain adalah *Salmonella* sp, *E. Coli*, *Coliform*, *Staphylococcus* sp, dan *Pseudomonas* (Djaafar dan Rahayu 2007).

Daging sangat memenuhi persyaratan untuk perkembangan mikroorganisme, termasuk mikroorganisme perusak atau pembusuk. Hal ini disebabkan daging mempunyai kadar air yang tinggi antara 68-75%, kaya zat yang mengandung nitrogen dengan kompleksitas yang berbeda, mengandung sejumlah karbohidrat yang dapat difermentasi, kaya mineral dan kelengkapan faktor untuk pertumbuhan mikroorganisme, mempunyai pH yang menguntungkan bagi sejumlah mikroorganisme sekitar 5,3-6,5 (Soeparno, 1994).

Awal kontaminasi pada daging berasal dari mikroorganisme yang memasuki peredaran darah pada saat penyembelihan, jika alat-alat yang digunakan untuk pengeluaran tidak steril. Pisau, sarung tangan, alat potong, alat cacah, talenan, timbangan bahkan penjualnya juga merupakan sumber mikroorganisme kontaminan (Frazier dan Westhoff, 1988). Untuk mengurangi kontaminasi, diperlukan penanganan yang higienis dengan sistem sanitasi yang baik. Besarnya kontaminasi

mikroorganisme pada daging akan menentukan kualitas dan masa simpan daging proses (Soeparno, 2005).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme pada daging ada dua macam, yaitu (a). Faktor intrinsik termasuk nilai nutrisi daging, keadaan air, pH, potensi oksidasi-reduksi dan ada tidaknya substansi penghalang atau penghambat; (b). Faktor ekstrinsik, misalnya temperatur, kelembaban relatif, ada tidaknya oksigen dan bentuk atau kondisi daging (Fardiaz, 1992).

Kontaminasi mikroba pada daging dimulai sejak berhentinya peredaran darah pada saat penyembelihan, terutama apabila alat-alat yang dipergunakan untuk pengeluaran darah tidak steril. Kontaminasi dapat terjadi melalui permukaan daging selama operasi persiapan daging beku, pemotongan karkas atau daging, pembuatan produk daging olahan, preservasi, pengepakan, penyimpanan, dan distribusi. Jadi, segala sesuatu yang dapat kontak dengan secara langsung atau tidak langsung, biasa merupakan sumber kontaminasi mikroba (Soeparno, 2009).

Keadaan fisik daging dan kondisi lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Jika kelembaban relatif terlalu tinggi, cairan akan berkondensasi pada permukaan daging sehingga permukaan daging menjadi basah dan sangat kondusif untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jika kelembaban relatif terlalu rendah, cairan permukaan daging akan banyak yang menguap sehingga pertumbuhan mikroba terhambat oleh dehidrasi dan permukaan daging menjadi gelap (Soeparno, 1994).

Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan sesudah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dipengaruhi kualitas daging antara lain adalah genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk bahan aditif (hormon, antibiotik, dan mineral) dan stres (Soeparno, 1998). Jaringan hewan sehat bebas dari bakteri pada saat dipotong, tetapi ketika diperiksa daging segar pada tingkat penjualan retail selalu ditemukan berbagai jenis dan jumlah mikroorganisme. Sumber kontaminasi mikroorganisme pada daging segar berasal dari pisau pemotong, bagian yang tersembunyi dari daging, saluran pencernaan, tangan manusia, wadah, penanganan dan penyimpanan. Kemampuan pertumbuhan mikroorganisme pada daging dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi ketersediaan nutrisi, pH, aktivitas air yang terdapat dalam daging, potensi oksidasi-reduksi dan ada tidaknya substansi penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi suhu ruang penyimpanan, kelembaban relatif, dan kondisi oksigen atmosfer (Jay, dkk., 2005).

Selama ini diketahui terdapat beberapa jenis unggas yang sering dikonsumsi manusia antara lain ayam, burung dara dan itik. Namun yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari adalah ayam, baik ayam ras maupun ayam broiler atau ayam kampung. Karkas unggas merupakan tempat yang baik untuk perkembangan mikroba, sebab hewan unggas memang dalam kehidupannya selalu bersentuhan dengan lingkungan yang kotor. Karkas ayam mentah paling sering dikaitkan dengan cemaran *Salmonella* dan *Campylobacter* yang dapat menginfeksi manusia (Raharjo, 1999).

Tabel 2.2 Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan Daging unggas dan daging hewan buruan mentah menurut SNI 2009

Kategori pangan	Jenis cemaran mikroba	Batas maksimum
Daging ayam segar, beku (karkas dan tanpa tulang) dan cincang	ALT (30°C, 72 jam)	1 x 10 ⁶ koloni/g
	<i>Koliform</i>	1 x 10 ² koloni/g
	<i>Escherichia coli</i>	1 x 10 ¹ koloni/g
	<i>Salmonella sp</i>	Negatif/25g
	<i>Staphylococcus aureus</i>	1 x 10 ² koloni/g
	<i>Campylobacter sp</i>	Negatif/25g

Sumber: SNI 2009

D. Ayam

Daging ayam adalah bahan pangan yang bergizi tinggi karena kaya akan protein, lemak, mineral serta zat lainnya yang sangat dibutuhkan tubuh. Daging ayam juga mengandung asam amino esensial diantaranya arginin, sistin, histidin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, tirosin, dan valin. Pencemaran daging oleh mikroorganisme dapat terjadi sebelum dan setelah hewan dipotong. Pada saat pemotongan darah masih bersirkulasi ke seluruh anggota tubuh hewan sehingga penggunaan pisau yang tidak bersih dapat menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam darah. Pencemaran daging dapat dicegah dengan melakukan proses pemotongan secara higienis (Erni 2009).

Penanganan daging yang higienis dapat dilakukan dengan menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Hygienic Practices (GHP). Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Hygienic Practices (GHP) merupakan peraturan tentang penanganan atau penyediaan daging yang aman dan layak. Salah satu penanganan daging yang baik adalah sistem rantai dingin yang dilakukan dengan menjaga suhu tetap dingin selama produksi, penyimpanan dan distribusi daging. Sistem rantai dingin ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

Bergdoll (1990) menyatakan jumlah *Staphylococcus aureus* mencapai 10^5 koloni/gram dapat dijadikan indikasi kerawanan adanya toksin tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian, enterotoksin belum dapat terdeteksi pada total *Staphylococcus aureus* $>10^6$ koloni/gram. Pada kasus-kasus keracunan makanan biasanya jumlah *Staphylococcus aureus* mencapai jumlah total 10^8 koloni/gram atau lebih (Harmayani dkk. 1996). Pemanasan dapat menurunkan jumlah total *Staphylococcus aureus* menjadi 2.6×10^3 koloni/gram. Oleh karena itu, dalam pengolahan pada karkas mentah ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan sebagai titik kendali kritis untuk mencegah terjadinya pertumbuhan mikroorganisme.

Broiler merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan pertumbuhan/produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat atau sekitar 4 - 5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi (Murtidjo, 2003).

Ayam pedaging atau yang lebih dikenal dengan ayam potong menempati posisi teratas sebagai ayam yang ketersediaannya cukup banyak, disusul ayam kampung, kemudian petelur afkir (Nuroso, 2009). Daging broiler merupakan salah satu jenis karkas ayam yang menjadi pilihan masyarakat selain karena nilai gizi yang tinggi, rasanya yang enak, serta mudah ditemukan, masyarakatnya dapat membelinya di pasar-pasar tradisional atau modern. Hal yang membedakan antara pasar tradisional dan modern salah satunya adalah kondisi pasar. Penjualan daging di pasar tradisional dijual dengan keadaan terbuka (tanpa penutup) serta diletakkan bebas di meja jualannya tanpa adanya pengaturan suhu serta tidak memperdulikan aspek kebersihan produk yang dijualnya. Daging di pasar modern dijual dalam keadaan tertutup dengan menggunakan pengemas serta dijajakan dengan memperhatikan suhu rak pemajangan (Utari, 2016).

Menurut Risnajati (2010), menyatakan bahwa daging broiler merupakan bahan makanan bergizi tinggi, memiliki rasa dan aroma enak, tekstur lunak serta harga relatif murah, sehingga disukai oleh banyak orang. Namun demikian, daging broiler tidak terlepas dari adanya beberapa kelemahan, terutama sifatnya mudah rusak (Perishable), sebagian besar kerusakan diakibatkan oleh penanganannya kurang baik sehingga memberikan peluang bagi pertumbuhan mikroba.

Daging ayam biasanya dijual kepada konsumen dalam bentuk karkas utuh, belahan karkas kiri dan kanan, seperempat karkas, atau potongan-potongan. Potongan komersial ayam broiler meliputi kaki, paha, paha atas, dada, punggung dan sayap.

Komposisi nutrisi daging ayam dapat dilihat pada tabel 2.3

Komposisi Nutrisi Daging Broiler	Komponen Nutrisi Jumlah (%)
Air	75
Protein	21
Lemak	3
Mineral	1
Vitamin	Kurang dari 1
Karbohidrat	Kurang dari 1

Sumber : Risnajati 2010

Proses pemotongan unggas harus diperhatikan dengan baik agar karkas yang dihasilkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3924-2009. Adapun proses pemotongan karkas unggas dimulai dengan mengistirahatkan unggas selama 12-24 jam. Hal ini untuk menghindari stres pada ayam yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan glikogen menjadi asam laktat, sehingga pH daging turun menjadi 5-6. Hal ini memberikan peluang bagi mikroba lain tumbuh. Teknik penyembelihan ayam yang baik adalah memotong arteri karotis, vena jugularis, dan esofagus, sehingga darah keluar secara keseluruhan dan berlangsung cepat sekitar 60-120 detik yang berdampak terhadap kebersihan dan kesehatan karkas ayam. Pada proses pencabutan bulu dilakukan perendaman air panas bersuhu 50-54°C selama 30-45 detik agar memudahkan pencabutan bulu, kulit karkas bersih dan cerah sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri. Namun yang diperhatikan adalah saat mengeluarkan organ dalam dimulai dari pengambilan tembolok, trakea, hati,

empedu, empedal, jantung, paru-paru, ginjal, usus dan ovarium. Organ dalam ayam (Viscera) merupakan tempat kotoran, sehingga harus dikeluarkan sesempurna mungkin (Badan Standarisasi Nasional, 2009).

Daging adalah bahan pangan yang bernilai gizi tinggi karena kaya akan protein, lemak, mineral serta zat lainnya yang sangat dibutuhkan tubuh. Daging juga merupakan bahan pangan yang sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme sehingga dapat menurunkan kualitas daging. Daging mudah sekali mengalami kerusakan mikrobiologi karena kandungan gizi dan kadar air yang tinggi. Kerusakan pada daging ditandai dengan timbulnya lendir yang terjadi pada daging tersebut. Oleh sebab itu diperlukan uji fisik sebelum daging di konsumsi. Daging sangat penting untuk kehidupan manusia, karena merupakan salah satu sumber protein hewani yang mengandung asam amino esensial yang lengkap untuk tubuh. Protein merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh, penyusunan jaringan, pengganti bagian-bagian tubuh yang rusak dan pengatur kegiatan tubuh, serta dapat pula sebagai penghasil tenaga atau kalori (Lawrie, 1979).

Daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang dapat dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Organ-organ misalnya hati, paru-paru, limpa, pankreas, otot, jantung, ginjal dan jaringan otot (Soeparno, 2005).

Menurut Lawrie (1998), yang menyatakan bahwa daging dalam arti khusus sebagai bagian dari hewan yang digunakan sebagai makan. Kualitas daging diartikan sebagai sejumlah sifat yang menentukan daging itu yang berpengaruh terhadap

penerimaan konsumen. Warna, daya mengikat air, dan beberapa aroma daging yang dapat dideteksi baik sebelum maupun sesudah pemasakan dan akan memberikan sensasi yang lebih lama terhadap konsumen dibandingkan dengan tekstur, keempukan, rasa dan kebanyakan aroma yang terdeteksi saat pengunyahan.

Kualitas daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan sesudah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain adalah genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan, termasuk aditif dan stress. Faktor setelah pemotongan antara lain meliputi proses pemotongan, pelayanan, pembersihan sampai dengan pemasakan (Soeparno, 1998).

Ciri-ciri daging segar dan dapat dikonsumsi oleh konsumen untuk bahan makan yaitu: daging yang mempunyai kenampakan yang mengkilat, warnanya cerah dan tidak pucat, tidak ada bau asam apalagi busuk, daging masih elastis, tidak kaku, apalagi dipegang daging tidak terasa lengket pada tangan dan masih terasa kebasahannya (Hadiwiyoto, 1930).

Jaminan keamanan pangan atau bahan pangan telah menjadi tuntutan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian telah menetapkan kebijakan penyediaan pangan asal hewan “Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)” guna melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Aman, daging tidak tercemar bahaya biologi (mikroorganisme, serangga, tikus), kimiawi (pestisida dan gas beracun) dan fisik (kemasan tidak sempurna bentuknya karena benturan) serta tidak tercemar benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Sehat, daging

memiliki zat-zat yang dibutuhkan, berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh manusia. Zat gizi meliputi unsur makro seperti karbohidrat, protein dan lemak serta unsur makro seperti vitamin dan mineral. Utuh, daging tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian bagian dari hewan lain. Halal, hewan maupun dagingnya disembelih dan ditangani sesuai syariat agama Islam. Kehalalan menjadi Hak Asasi Manusia yang diakui keberadaannya sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak secara bertanggung jawab. Sertifikat halal mutlak dibutuhkan untuk menghilangkan keraguan masyarakat akan kemungkinan adanya bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong yang tidak halal dalam suatu produk yang dijual (Widowati, dkk., 2003).

E. Bakteri Staphylococcus aureus

Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik (tidak memiliki selubung inti). Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus (nukleus) dan tidak ada membran inti. Bentuk DNA bakteri adalah sirkuler, panjang dan biasa disebut nukleoi. Pada DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas akson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstrakromosomal yang tergabung menjadi plasmid yang berbentuk kecil dan sirkuler (Jawetz dkk, 2004) .

Kata bakteri, berasal dari bahasa Yunani yaitu Bacterium yang memiliki arti jamak, atau banyak. Bakteri adalah sekelompok organisme hidup dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan bentuk bakteri yang sangat kecil, menyebabkan bakteri hanya

dapat dilihat menggunakan alat bantu mikroskop. Bakteri kebanyakan bersel tunggal atau uniseluler, dengan struktur sel yang relatif sederhana tanpa nukleus/inti sel, sitoskeleton, dan organel lain seperti mitokondria dan kloroplas (Destrianasri, 2016).

Asal mula munculnya perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif adalah untuk memudahkan identifikasi dalam penelitian bakteri. Perbedaan gram positif dan gram negatif dalam dunia bakteriologi, tentu bukan karena alasan, pasti ada sebab yang mendasari penamaan tersebut. Istilah gram positif dan negatif pada bakteri di karenakan ada perbedaan penampilan yang khas saat pertumbuhan pada berbagai jenis bakteri. Klasifikasi bakteri di dasarkan pada dua metode pewarnaan gram pada saat bakteri mengalami pertumbuhan. Yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses perwarnaan gram sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Sedangkan bakteri gram positif akan berwarna ungu (Destrianasri, 2016).

Menurut Jawetz dkk (2004), yang menyatakan bahwa untuk memahami beberapa kelompok organisme, diperlukan klasifikasi. Tes biokimia, pewarnaan gram, merupakan kriteria yang efektif untuk klasifikasi. Hasil pewarnaan mencerminkan perbedaan dasar dan kompleks pada sel bakteri (struktur dinding sel), sehingga dapat membagi bakteri menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri Gram-positif dan bakteri Gram-negatif.

1. Bakteri Gram-negatif

- a. Bakteri Gram Negatif Berbentuk Batang (*Enterobacteriaceae*). Bakteri gram negatif berbentuk batang habitatnya adalah usus manusia dan binatang. *Enterobacteriaceae* meliputi (*Escherichia*, *Shigella*, *Salmonella*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Serratia*, *Proteus*). Beberapa organisme seperti *Escherichia coli* merupakan flora normal dan dapat menyebabkan penyakit, sedangkan yang lain seperti *salmonella* dan *shigella* merupakan patogen yang umum bagi manusia.
- b. *Pseudomonas*, *Acinobacter* dan Bakteri Gram Negatif Lain. *Pseudomonas aeruginosa* bersifat invasif dan toksigenik, mengakibatkan infeksi pada pasien dengan penurunan daya tahan tubuh dan merupakan patogen nosokomial yang penting.
- c. *Vibrio Campylobacter*, *Helicobacter*, dan Bakteri lain yang berhubungan. Mikroorganisme ini merupakan spesies berbentuk batang Gram-negatif yang tersebar luas di alam. *Vibrio* ditemukan didaerah perairan dan permukaan air. *Aeromonas* banyak ditemukan di air segar dan terkadang pada hewan berdarah dingin.
- d. *Haemophilus*, *Bordetella*, dan *Brucella* Gram negatif *Hemophilis influenza* tipe b merupakan patogen bagi manusia yang penting.
- e. *Yersinia*, *Franscisella* dan *Pasteurella*. Berbentuk batang pendek Gram-negatif yang pleomorfik. Organisme ini bersifat katalase positif, oksidase positif, dan merupakan bakteri anaerob fakultatif.

2. Bakteri Gram-positif

a. Bakteri gram positif pembentuk spora: Spesies *Bacillus* dan *Clostridium*. Kedua spesies ini terdapat dimana-mana, membentuk spora, sehingga dapat hidup di lingkungan selama bertahun-tahun. Spesies *Bacillus* bersifat aerob, sedangkan *Clostridium* bersifat anaerob obligat.

b. Bakteri Gram-positif Tidak Membentuk Spora: Spesies *Corynebacterium*, *Listeria*, *Propionibacterium*, *Actinomycetes*. Beberapa anggota genus *Corynebacterium* dan kelompok *Propionibacterium* merupakan flora normal pada kulit dan selaput lender manusia.

c. *Staphylococcus* berbentuk bulat, biasanya tersusun bergerombol yang tidak teratur seperti anggur. Beberapa spesies merupakan anggota flora normal pada kulit dan selaput lendir, yang lain menyebabkan supurasi dan bahkan septikemia fatal. *Staphylococcus* yang patogen sering menghemolisis darah, mengkoagulasi plasma dan menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler. Tipe *Staphylococcus* yang berkaitan dengan medis adalah *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* dan *Staphylococcus saprophyticus*.

d. *Streptococcus* merupakan bakteri gram-positif berbentuk bulat yang mempunyai pasangan atau rantai pada pertumbuhannya. Beberapa *streptococcus* merupakan flora normal manusia tetapi lainnya bisa bersifat patogen pada manusia. Ada 20 spesies diantaranya ; *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*, dan jenis *Enterococcus*

Bakteri *Staphylococcus aureus* pertama kali diamati dan dibiakkan oleh Pasteur dan Koch, kemudian diteliti lebih lanjut oleh Ogston dan Rosenbach pada tahun 1880-an. Namun genus *Staphylococcus* diberikan kepada Ogston karena jika diamatai dengan mikroskop bakteri ini terlihat seperti setangkai buah anggur. Namun spesies aureus diberikan oleh Rosenbach karena pada biakan murni, koloni bakteri ini terlihat berwarna kuning-keemasan (Yuwono, 2012).

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat berdiameter 0,7-1,2 mm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak berbentuk spora, dan tidak bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37°C, tetapi membentuk pingmen paling baik pada suhu kamar (20-25°C). koloni pada perbenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan berkilau (Jawetz, 2005). Menurut Todar (2005), klasifikasi *Staphylococcus aureus* adalah sebagai berikut:

Kingdom : *Bacteria*

Filum : *Firmicutes* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kelas : *Cocci* ALAUDDIN

Ordo : *Bacillales* M A K A S S A R

Famili : *Satphylococcaceae*

Genus : *Staphylococcus*

Spesies : *Staphylococcus aureus* (Todar, 2005).

Secara klinis, *Staphylococcus. aureus* merupakan genus paling penting dari family *Micrococcaceae*. genus ini di bagi menjadi dua kelompok besar *aureus* dan

non-aureus. *Staphylococcus aureus* dikenal sebagai penyebab infeksi jaringan lunak, seperti *toxic shock syndrome* (TSS) dan *scalded skin syndrome* (SSS), yang dapat diketahui dari spesies *Staphylococcus* yang memberikan hasil positif pada tes koagulase. Beberapa strain mampu menghasilkan protein toksin yang sangat stabil terhadap panas yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia (SNI, 2009).

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning, bersifat aerob fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil, umumnya tumbuh berpasangan maupun berkelompok, dengan diameter sekitar 0,8-1,0 mm. *Staphylococcus aureus* tumbuh dengan optimum pada suhu 37°C dengan waktu pembelahan 0,47 jam. *Staphylococcus aureus* merupakan mikroflora normal manusia. Bakteri ini terdapat pada saluran pernafasan atas dan kulit. Keberadaan *Staphylococcus aureus* pada saluran pernafasan atas dan kulit pada individu jarang menyebabkan penyakit, individu sehat biasanya hanya berperan sebagai karier. Infeksi serius akan terjadi ketika resistensi inang melemah karena adanya perubahan hormon, adanya penyakit, luka, atau perlakuan menggunakan steroid atau obat lain yang memengaruhi imunitas sehingga terjadi pelemahan inang. Infeksi *Staphylococcus aureus* diasosiasikan dengan beberapa kondisi patogen, diantaranya bisul, jerawat, pneumonia, meningitis dan arthritis (Todar, 2005).

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat berdiameter 0,7-1,2 mm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37°C, tetapi membentuk pigmen paling baik

pada suhu kamar (20-25°C). Koloni pada pembenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan *Staphylococcus aureus* yang mempunyai kapsul polisakarida atau selaput tipis yang berperan dalam virulensi bakteri (Jawetz dkk., 1995).

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk kokus, berdiameter 1 mm dan tersusun atas kelompok-kelompok yang tak beraturan, tidak membentuk spora, dan dapat lisis oleh obat-obatan seperti penisilin dapat bertahan hidup tanpa oksigen (Jawetz dkk, 2001). Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu optimum 37°C tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25°C) (Tolan, 2008).

Staphylococcus aureus adalah bakteri yang berbentuk bola berpasangan atau berkelompok seperti buah anggur dengan diameter 0,8 mikron – 1,0 mikron, non motil, tidak berspora dan bersifat gram positif. namun kadang-kadang ada yang bersifat gram negatif yaitu pada bakteri yang telah difagositosis atau pada biakan tua yang hampir mati. Koloni *Staphylococcus aureus* mempunyai ciri khas bundar, licin dan halus, cembung, diameter 2 mm sampai dengan 3 mm, berwarna abu-abu sampai hitam pekat, dikelilingi zona opak, dengan atau tanpa zona luar yang terang (*Clear zone*). Tepi koloni putih dan dikelilingi daerah yang terang (Jumriani, 2017).

Bakteri *Staphylococcus aureus* sering di temukan sebagai mikroflora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia dapat menjadi penyebab infeksi baik pada

manusia maupun pada hewan. Jenis bakteri ini dapat memproduksi enterotoksin yang menyebabkan pangan tercemar dan mengakibatkan keracunan pada manusia. Bakteri ini dapat diisolasi dari bahan-bahan klinik, carries, pangan dan lingkungan. Bakteri ini tumbuh dengan baik pada suhu tubuh manusia dan juga pada pangan yang disimpan pada suhu kamar serta menghasilkan toksin pada suhu tersebut. toksin ini disebut enterotoxin karena dapat menyebabkan gastroenteritis atau radang lapisan saluran usus (SNI, 2009).

Staphylococcus aureus ada di udara, debu, limbah, air, susu, pangan, peralatan makan, lingkungan, manusia dan hewan. Bakteri ini tumbuh dengan baik dalam pangan yang mengandung protein tinggi, gula tinggi dan garam. Manusia dan hewan adalah tempat pertumbuhan yang utama. *Staphylococcus aureus* ada dalam saluran hidung dan kerongkongan serta pada kulit dan rambut pada 50% atau lebih individu yang sehat. Resiko lebih tinggi terjadi pada mereka yang sering berhubungan dengan individu yang sakit atau kontak dengan lingkungan rumah sakit. Walaupun pengolahan pangan merupakan sumber pencemaran pangan yang utama, peralatan dan lingkungan dapat juga menjadi sumber pencemaran *Staphylococcus aureus* (SNI, 2009).

Koloni *Staphylococcus aureus* pada perbenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan berkilau, menghasilkan toksin yang bersifat tahan panas. *Staphylococcus aureus* merupakan flora normal pada manusia dan hewan terutama ditemukan pada saluran pernafasan

bagian atas, kulit, dan mukosa. Bakteri ini bersifat anaerob fakultatif, katalase positif, koagulase positif, dan menghasilkan asam laktat (Yusmari, 2006).

Koloni *Staphylococcus aureus* pada media Baird Parked mempunyai ciri khas bundar, licin, dan halus, cembung, diameter 2 mm sampai dengan 3 mm, berwarna abu-abu sampai hitam pekat, dikelilingi zona opak, dengan atau tanpa zona luar yang terang (Clear zone). Konsistensi koloni seperti mentega atau lemak jika di sentuh oleh ose (BSN, 2008).

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang memiliki bentuk Coccus (bulat), berwarna ungu dan bergerombol (Lowy 1998). Bakteri ini tidak bergerak, tidak berspora, berkapsul dan bersifat aerob-anaerob fakultatif. *Staphylococcus* sp. dapat memfermentasi manitol, menghasilkan koagulase, dan mampu menghasilkan enterotoksin dan Heat-Stable Endonuklease. Koloni *Staphylococcus* sp. memiliki warna emas dan membentuk zona pucat tembus pandang pada media Baird Parked Agar (BPA) (L.G Harris et al. 2002). *Staphylococcus aureus* dapat ditemukan di lingkungan seperti udara, debu, kotoran, air, susu, makanan dan minuman dan peralatan makan serta pada hewan. Sedangkan pada manusia normal *Staphylococcus aureus* terdapat pada hidung dan kulit dengan proporsi yang berbeda (Salasia dkk. 2009).

Menurut Jay (1996) terdapat kurang lebih 18 spesies dan sub spesies yang dapat menimbulkan masalah pada makanan salah satunya *Staphylococcus aureus*. Stafilocokal Enterotoksin (SE) adalah toksin yang dihasilkan *Staphylococcus aureus* yang dapat menyebabkan pencemaran pada makanan. Stafilocokal Enterotoksin (SE)

tahan terhadap pemanasan dan tahan terhadap enzim protease seperti pepsin yang terdapat dalam saluran pencernaan. Stabilitas Stafilocokal Enterotoksin (SE) terhadap pemanasan dan enzim pencernaan merupakan salah satu sifat yang berkaitan dengan keamanan pangan, karena toksin tetap bertahan meskipun sudah dimasak atau dipanaskan. Stafilocokal Enterotoksin (SE) yang dikonsumsi secara tidak sengaja akan tahan terhadap enzim yang ada dalam saluran pencernaan (Balaban dan Rasooly, 2000).

Uji yang dapat dilakukan untuk membedakan *Staphylococcus aureus* dengan stafilocokus lainnya antara lain melihat pertumbuhan koloni pada media BPA, uji katalase untuk membedakan dari streptokokus, adanya produksi enzim koagulase serta adanya fermentasi mannitol pada media MSA (Cappucino and Sherman, 2005).

Patogenitas pada *Staphylococcus aureus* dapat dilihat dengan ada atau tidaknya produksi enzim koagulase yang membedakan dengan stafilocokus lainnya. *Staphylococcus aureus* juga dapat diisolasi dengan media selektif seperti Baird Parker Agar (BPA), Lipase Salt Mannitol Agar, DNase Test (Bello and Qahtani 2004). Media BPA adalah media yang cukup selektif untuk mengisolasi dan menghitung koloni *Staphylococcus aureus*. BPA mengandung karbon dan nitrogen yang dijadikan sebagai sumber pertumbuhan. Glisin, lithium klorida dan pottasium berperan sebagai agen selektif. Kuning telur sebagai substrat untuk mendeteksi produksi Lecithinase dan aktivitas dari lipase. Koloni *Staphylococcus aureus* pada BPA akan menunjukkan warna abu-abu gelap atau hitam akibat pengurangan Tellurite, *Staphylococcus aureus* akan memproduksi Lecithinase untuk memecah

kuning telur dan menyebabkan zona jernih disekitar koloni. Zona gelap yang muncul dapat disebabkan oleh aktivitas lipase (Instructions for use-ready-to-use plate media: Baird-Parked Agar. 2006).

Tabel 2.4 Tipe Pertumbuhan Bakteri Pada Media BPA.

Strains	Growth Results
Staphylococcus aureus ATCC™ 25923	Koloni tumbuh baik, gelap kelabu sampai hitam, mengkilat, koloni sedang-kecil, zona terang mengelilingi koloni.
Staphylococcus aureus ATCC 6538	Koloni tumbuh baik, gelap kelabu sampai hitam, mengkilat, koloni sedang-kecil, zona terang mengelilingi koloni.
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	Tidak ada pertumbuhan-kecil, tidak bewarna-cokelat, tidak ad zona terang.
Escherichia coli ATCC 25922	Tidak dapat tumbuh.
Proteus mirabilis ATCC 12453	Tidak tumbuh, koloni cokelat gelap.
Uninoculated	Kuning-cokelat terang, opaque.

Sumber: (Instructions for use-ready-to-use plate media: Baird-Parked Agar. 2006).

Penggunaan media selektif (BPA) sangat berguna untuk mengisolasi *S. aureus* dari sampel yang terkontaminasi, namun menjadi tidak ekonomis dikarenakan tidak bisa mendeteksi bakteri lain (Patrick 2003). Pada pengujian katalase dilakukan untuk membedakan *Staphylococcus aureus* dengan *Streptococcus* sp. dimana *Streptococcus* sp. akan menunjukkan katalase negatif sedangkan *Staphylococcus* sp. akan menunjukkan hasil katalase positif dengan terbentuknya gelembung-gelembung gas karena *Staphylococcus aureus* mampu memproduksi enzim katalase (Todar 2005).

Uji fermentasi glukosa dan mannitol dilakukan untuk membedakan *Staphylococcus* patogen dan non-patogen dengan mengamati perubahan warna dari media glukosa dan mannitol menjadi bewarna kuning. Hal ini disebabkan bakteri *Staphylococcus aureus* menghasilkan asam sebagai hasil dari memfermentasikan zat gula pada media. Barid Parker Agar (BPA) adalah media selektif dan diferensial untuk mengisolasi dan memperbanyak *Staphylococcus aureus* yang terdapat dalam makanan, lingkungan, dan bahan klinis. BPA secara umum digunakan dan dimasukkan ke dalam banyak prosedur standar untuk menguji makanan, kosmetik, atau air kolam renang yang terdapat *Staphylococcus aureus*. Media ini tidak digunakan untuk mengisolasi *Staphylococcus* lain kecuali *Staphylococcus aureus*. Barid Parker Agar (BPA) mengandung karbon dan nitrogen sumber kebutuhan pertumbuhan *Staphylococcus aureus*. Glisin, lithium klorida, dan potassium tellurit berperan untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme lain selain *Staphylococcus*, *Staphylococcus aureus* memproduksi koloni abu-abu gelap hampir hitam karena

mereduksi potassium tellurite. *Staphylococcus aureus* yang mengandung lesitinase memecah egg yolk dan menyebabkan zona bening disekitar koloni. Sebuah zona opak mungkin jugaterbentuk karena aktivitas lipase. Barid Parker Agar (BPA) berbahaya bagi kesehatan apabila tertelan, terhirup, ataupun terkena kulit (Acumedia, 2012).

Staphylococcus merupakan sel sferis gram positif berbentuk bulat, berdiameter 1mm tersusun dalam kelompok seperti anggur yang tidak teratur. *Staphylococcus* tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi dibawah suasana aerobik atau mikroaerofilik. Tumbuh dengan cepat pada temperature 37°C tetapi, pada pembentukan pigmen yang terbaik adalah pada temperature kamar (20-35°C). koloni pada media yang padat berbentuk bulat, lembut, dan mengkilat. *Staphylococcus aureus* biasanya membentuk koloni abu-abu hingga kuning emas (Jawetz, 2008). Pada lempeng agar, koloninya berbentuk bulat, diameter 1-2 mm, cembung, buram, mengkilat dan konsistensinya lunak. Pada lempeng agar darah umumnya koloni lebih besar dan pada varietas tertentu koloninya di kelilingi oleh zona hemolisis (syahrurahman dkk., 2010).

Secara umum *Staphylococcus aureus* tidak tahan panas. Namun, toksin yang dihasilkannya tahan panas, sehingga tidak dapat dihancurkan dengan pemanasan yang biasa digunakan pada pemasakan. Toksin tersebut tidak menyebabkan perubahan tekstur, warna, bau atau rasa makanan. Sehingga tidak dapat terlihat secara fisik. Kondisi seperti inilah yang sering kali mengecohkan konsumen dan menyebabkan terjadinya *Staphylococcus* food poisoning (SFP) (Palupi, dkk., 2010).

Berdasarkan bakteri yang tidak membentuk spora, maka *Staphylococcus aureus* termasuk jenis bakteri yang paling kuat daya tahannya. Pada agar miring dapat tetap hidup sampai berbulan-bulan, baik dalam lemari es maupun pada suhu kamar. Dalam keadaan kering pada benang, kertas, kain dan dalam nanah dapat tetap hidup selama 6-14 minggu (Syahrurahman dkk., 2010).

Suhu optimum untuk pertumbuhan *Staphylococcus aureus* adalah 35°C-37°C dengan suhu minimum 6,7°C dan suhu maksimum 45,4°C. Bakteri ini dapat tumbuh pada pH 4,0-9,8 dengan pH optimum 7,0-7,5. Pertumbuhan pada pH mendekati 9,8 hanya mungkin bila substratnya mempunyai komposisi yang baik untuk pertumbuhannya. Bakteri ini membutuhkan asam nikotinat untuk tumbuh dan akan distimulir pertumbuhannya dengan adanya thiamin. Bakteri ini tidak dapat tumbuh pada media sintetik yang tidak mengandung asam amino atau protein (Supardi dan Sukanto, 1999).

Tingkat kontaminasi *Staphylococcus aureus* merupakan salah satu persyaratan mutu mikrobiologis daging ayam. Batas kontaminasi *Staphylococcus aureus* pada daging ayam adalah 1×10^2 koloni/g (BSN, 2009). Selain kontaminasi dari lingkungan yang kurang bersih, keberadaan *Staphylococcus aureus* pada daging ayam dapat terjadi karena ayam yang dipotong sudah terinfeksi *Staphylococcus*. Infeksi *Staphylococcus* pada daging ayam disebut juga stafilokokosis. Penyakit ini tersebar secara luas pada peternakan ayam diberbagai negara di Amerika, Eropa, Australia, dan Asia. Di Indonesia stafilokokosis dapat ditemukan di berbagai

peternakan ayam di daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Penanganan penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik (Tabbu, 2000).

Keberadaan bakteri *Staphylococcus aureus* dan enterotoksinya pada daging ayam tentunya akan memberikan dampak negatif yang besar pula. Pencemaran oleh *Staphylococcus aureus* pada daging ayam dapat terjadi pada berbagai tahap pemrosesan karkas ayam. Kehadiran *Staphylococcus aureus* merupakan indikator yang baik untuk mengetahui tingkat higienis personal karyawan di RPU (Palupi, dkk., 2010).

Stafilokokosis adalah penyakit bakterial yang disebabkan infeksi *Staphylococcus* pada daging ayam maupun unggas lainnya. Setidaknya terdapat 20 spesies bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan spesies yang paling sering menimbulkan penyakit di peternakan ayam. Infeksi *Staphylococcus* pada ayam dapat menimbulkan berbagai penyakit antara lain, arthritis, tenosinovitis, dermatitis gangrenosa, infeksi yolk sac, bumble foot (abses subdermal), spondilitis, dan osteomielitis, bursitis sternalis, blefaritis, dan granuloma pada hati, limpa dan paru (Tabbu, 2000).

Keberadaan *Staphylococcus aureus* dalam makanan harus diinterpretasikan secara hati-hati. Adanya bakteri tersebut dalam jumlah besar dimakan tidak cukup untuk menjadikan makan tersebut sebagai wahana keracunan makanan karena tidak semua galur *Staphylococcus aureus* memproduksi enterotoksin. Potensi intoksikasi oleh *Staphylococcus aureus* tidak dapat dipastikan tanpa pengujian enterotoksigenisitas dari isolat *Staphylococcus aureus* atau membuktikan

keberadaan enterotoksin *Staphylococcus aureus* dalam makanan. Ketidak beradaan *Staphylococcus aureus* dan atau jumlah *Staphylococcus aureus* yang sedikit menjamin makanan aman (Lancette dan Bennet, 2001).

Stafilokokosis dapat diobati dengan pemberian antibiotik, namun uji sensitifitas terhadap antibiotik yang diberikan harus sering dilakukan mengingat marak terjadi resistensi antibiotik. Antibiotik yang sering diberikan untuk menangani infeksi *Staphylococcus aureus* antara lain eritromisin, linkomisin, dan spektinomisin (Andreasen, 2013).

1. Patogenisitas

Sebagian bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan flora normal pada kulit, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan makanan pada manusia. Bakteri ini juga ditemukan di udara dan lingkungan sekitar *Staphylococcus aureus* yang patogen bersifat invasif, menyebabkan hemolisis, membentuk koagulase, dan mampu meragikan manitol (Warsa, 1994).

Infeksi oleh *Staphylococcus aureus* ditandai dengan kerusakan jaringan yang ditandai dengan abses bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, phlebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomilelitis, dan endokarditis. *Staphylococcus aureus* juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan sindroma syok toksik (Ryan dkk., 1994).

Bisul atau abses setempat, seperti jerawat dan borok merupakan infeksi kulit di daerah folikel rambut, kelenjar sebacea, atau kelenjar keringat. Mula-mula terjadi nekrosis jaringan setempat, lalu terjadi koagulasi fibrin di sekitar lesi dan pembuluh getah bening, sehingga terbentuk dinding yang membatasi proses nekrosis. Infeksi dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui pembuluh getah bening dan pembuluh darah, sehingga terjadi peradangan pada vena. Trombosis, bahkan bakterimia. Bakterimia dapat menyebabkan terjadinya endokarotis, osteomielitis akut hematogen, meningitis atau infeksi paru-paru (Warsa, 1994).

Kontaminasi langsung *Staphylococcus aureus* pada luka terbuka (seperti luka pascabedah) atau infeksi setelah trauma (seperti osteomielitis setelah fraktur terbuka) dan meningitis setelah fraktur tengkorak, merupakan penyebab infeksi nosokomial (Jawetz dkk., 1995).

Keracunan makanan dapat disebabkan kontaminasi enterotoksin dari *Staphylococcus aureus*. Waktu onset dari gejala keracunan biasanya cepat dan akut, tergantung pada daya tahan tubuh dan banyaknya toksin yang termakan. Jumlah toksin yang dapat menyebabkan keracunan adalah 1,0 mg/gr makanan. Gejala keracunan ditandai oleh rasa mual, muntah-muntah, dan diare yang hebat tanpa disertai demam (Ryan dkk., 1994).

Sindroma syok toksik (SST) pada infeksi *Staphylococcus aureus* timbul secara tiba-tiba dengan gejala demam tinggi, muntah, diare, mialgia, ruam, dan hipotensi, dengan gagal jantung dan ginjal pada kasus yang berat. SST sering terjadi dalam lima hari permulaan haid pada wanita muda yang menggunakan tampon, atau

pada anak-anak dan pria dengan luka yang terinfeksi *Staphylococcus*. *Staphylococcus aureus* dapat diisolasi dengan vagina, tempon, luka atau infeksi lokasi lainnya, tetapi praktis tidak ditemukan dalam aliran darah (Jawetz dkk., 1995).

2. Faktor Virulensi *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus dapat menimbulkan penyakit melalui kemampuannya tersebar luas dalam jaringan dan melalui pembentukan berbagai zat ekstraseluler. Berbagai zat yang berperan sebagai faktor virulensi dapat berupa protein, termasuk enzim dan toksin, contohnya:

a. Katalase

Katalase adalah enzim yang berperan pada daya tahan bakteri terhadap proses fagositosis. Tes adanya aktivitas katalase menjadi pembeda genus *Staphylococcus* dari *Streptococcus* (Ryan dkk., 1994).

b. Koagulase

Enzim ini dapat menggumpalkan plasma oksalat atau plasma sitrat, karena adanya faktor koagulase reaktif dalam serum yang bereaksi dengan enzim tersebut. Esterase yang dihasilkan dapat meningkatkan aktivitas penggumpulan, sehingga terbentuk deposit fibrin pada permukaan sel bakteri yang dapat menghambat fagositosis (Warsa, 1994).

c. Hemolisin

Hemolisin merupakan toksin yang dapat membentuk suatu zona hemolisis di sekitar koloni bakteri. Hemolisin pada *Staphylococcus aureus* terdiri dari alfa hemolisin, beta hemolisin, dan delta hemolisin. Alfa hemolisin adalah toksin yang

bertanggung jawab terhadap pembentukan zona hemolisin disekitar koloni *Staphylococcus aureus* pada medium agar darah. Toksin ini dapat menyebabkan nekrosis pada kulit hewan dan manusia. Beta hemolisin adalah toksin yang terutama dihasilkan *Staphylococcus* yang di isolasi dari hewan, yang menyebabkan lisis pada sel darah merah domba dan sapi. Sedangkan delta hemolisin adalah toksin yang dapat melisiskan sel darah merah manusi dan kunci, tetapi efek lisisnya kurang terhadap sel darah merah domba (Warsa, 1994).

d. Leukosidin

Toksin ini dapat mematikan sel darah putih pada beberapa hewan. Tetapi perannya dalam pathogenesis pada manusia tidak jelas, karena *Staphylococcus* patogen tidak dapat mematikan sel-sel darah putih manusia dan dapat difagositosis (Jawet dkk., 1995).

e. Toksin Eksfoliatif

Toksin ini mempunyai aktivitas proteolitik dan dapat melarutkan matriks mukopolisakarida epidermis, sehingga menyebabkan pemisahan intraepithelial pada ikatan sel di stratum granulosum. Toksin eksfoliatif merupakan penyebab Staphylococcal Scalded Skin Syndrome, yang ditandai dengan meletupnya kulit (Warsa, 1994).

f. Toksin Sindrom Syok Toksin (TSST)

Sebagian besar *Staphylococcus aureus* yang diisolasi dari penderitaan sindrom syok toksin menghasilkan eksotoksin pirogenik. Pada manusia, toksin ini

menyebabkan demam, syok, ruam kulit, dan gangguan multisystem organ dalam tubuh (Ryan, et al., 1994).


g. Enterotoksin

Enterotoksin adalah enzim yang tahan panas dan tahan terhadap suasana basa di dalam dalam usus, enzim ini merupakan penyebab utama dan keracunan makanan, terutama pada makanan yang mengandung karbohidrat dan protein (Jawetz dkk., 1995).

3. Pengobatan

Pengobatan terdapat infeksi *Staphylococcus aureus* dilakukan melalui pemberian antibiotik, yang disertai dengan tindakan bedah, baik berupa pengeringan abses maupun nekrotomi. Pemberian anti septik lokal sangat dibutuhkan untuk menagani furunkulosis (bisul) yang berulang. Pada infeksi yang cukup berat, diperlukan pemberian antibiotik secara oral atau intravena, seperti penisilin, metisillin, sefalosporin, eritomisin, linkomisin, vankomish dan rifampisin. Sebagian besar galur *Staphylococcus* sudah resisten terhadap berbagai antibiotik tersebut, sehingga perlu diberikan antibiotik berspektumlebih luas seperti kloramfenikol, amoksilin, dan tetrasiklin (Ryan dkk., 1994).

F. Kerangka Fikir



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan penelitian yaitu deskriptif karena metode penelitian ini yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung saat ini atau saat lampau.

B. Waktu dan Lokasi

Adapun waktu dan lokasinya yaitu, Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2018 di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

C. Variable Penelitian

Adapun variabelnya yaitu, Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu cemaran bakteri *Staphylococcus aureus* pada ayam goreng krispi yang di jual di mall panakukang makassar.

D. Defenisi Operasional Penelitian

Adapun defenisi operasional penelitian adalah sebagai berikut

1. Deteksi cemaran adalah suatu cara yang digunakan untuk melihat tingkat pencemaran yang dilihat dari banyaknya bakteri patogen yang ada pada suatu sampel.
2. Bakteri patogen adalah bakteri yang bersifat merugikan yang terdapat pada lingkungan sekitar.
3. Ayam goreng krispi merupakan makanan yang banyak di jual di pasaran dan di gemari oleh banyak orang selain murah rasanya juga enak.
4. Mall Panakukang merupakan salah satu pusat perbelanjaan besar yang berada di kota makassar.

E. Alat dan bahan

Adapun alat dan bahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Alat

Mortar & pastle, vortex, Autoclave, colony counter, neraca analitik, tabung reaksi, cawan petri, gelas ukur, kaca preparat, pipet tetes, inkubator, batang pengaduk, hot plate & steerer, laminar air flow, gelas kimia, labu erlenemeyer, plastik buah,gunting, botol UC. lampu spiritus, ose, rak tabung, mikro pipet, tip, pipet tetes, corong.

2. Bahan

Ayam goreng krispi, media baird parker agar, H₂O₂, media buffer pepton water, aquadest steril, media BHI broth, media trypticas soy broth, media TSA miring Nacl, alkohol, kapas, tisu, aluminium foil, silk

F. Prosedur kerja

Adapun prosedur kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sterilisasi alat

Semua alat-alat gelas yang akan digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu disterilkan dalam oven dengan suhu 180°C selama 2 jam.

2. Pengumpulan sampel

Sebanyak 15 sampel potongan ayam goreng krispi (3x pengulangan pengambilan dalam waktu 14 hari. hari 1, 7, 14), diambil secara aseptis oleh 5 orang pada 5 brand ayam goreng krispi yang ada di Mall Panakukang Makassar. masing-masing 1 orang 1 brand, dan berkumpul pada 1 titik setelah pengambilan sample dan membawa sample tersebut ke laboratorium mikrobiologi fakultas sanis dan teknologi. melakukan cara yang sama pada pengulangan pengambilan sample pada hari ke 7 dan 14.

3. Pembuatan media

a. Media Buffer Peptone Water (BPW)

Mula-mula menimbang media sebanyak 25,5gr kemudian di larutkan aquades sebanyak 1L dengan menggunakan hot plate dan stereer. Setelah larut kemudian di sterilkan dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121°C.

b. Media BHI Broth

Mula-mula menimbang media sebanyak 7,4gr kemudian di larutkan aqudes sebanyak 200ml dengan menggunakan hot plate dan stereer. Setelah larut kemudian di sterilkan dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121°C.

c. Media Trypticase Soy Broth (TSB)

Mula-mula menimbang media sebanyak 9,9gr kemudian di larutkan aqudes sebanyak 330ml dengan menggunakan hot plate dan stereer. Setelah larut kemudian di sterilkan dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121°C.

d. Media TSA miring

Mula-mula menimbang media sebanyak 8,4gr kemudian di larutkan aqudes sebanyak 210ml dengan menggunakan hot plate dan stereer. Setelah larut kemudian di sterilkan dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121°C, kemudian memidahkan ke tabung reaksi sebnayak 7ml dan meletakkan tabung reaksi tersebut dalam posisi miring agar media tersebut dalam keadaan posisi miring.

e. Media Baird Parker Agar

Mula-mula menimbang media sebanyak 30,52gr kemudian di larutkan aquades sebanyak 500ml dengan menggunakan hot plate dan stereer. Setelah larut kemudian di sterilkan dengan menggunakan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121°C kemududian di tuang kedalam cawan petri sebanyak 10ml.

4. Isolasi, deteksi dan penghitungan jumlah cemaran *Staphylococcus aureus*

Mula-mula sampel secara aseptis ditimbang sebanyak 10 gram, dihaluskan dengan mortar & pastle dan membuat suspensi dengan penambahan *buffered peptone water* sebanyak 90 ml sehingga konsentrasi menjadi 10^{-1} . Sedangkan Suspensi tersebut kemudian diencerkan sampai 7 kali pengenceran. Pada penelitian ini untuk mendeteksi dan menentukan jumlah bakteri *S. aureus* digunakan 2 metode yang di lakukan secara bersamaan menurut (Siti, 2009).

a. Menyiapkan untuk masing-masing pengenceran, tabung yang berisikan 1 ml medium kaldu *Trypticase Soy* ditambahkan 10% NaCl. Menambahkan 1 ml sampel yang telah diencerkan kedalam tabung diatas, dan diinkubasikan selama 48 jam pada suhu 35°C. Memindahkan 1ml dari setiap tabung yang menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri kedalam masing-masing cawan petri yang berisikan medium baird parker agar dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 35°C. Sebelum dipindahkan isi tabung di *vortex* terlebih dahulu. Setiap cawan petri yang menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri *S. aureus*, diambil beberapa

koloni dan dilakukan uji katalase dan koagulase, Tabung yang menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri *S. aureus* di catat dan dihitung dengan menggunakan Standard Plate count (SPC).

b. Pada saat yang bersamaan sebanyak 1ml masing-masing pengenceran 10^{-3} 10^{-4} dan 10^{-5} disebarakan diseluruh permukaan medium agar *Baird Parker* dan dinkubasikan selama 48 jam pada suhu 35°C . Sebelum dipindahkan isi tabung di *vortex* terlebih dahulu. Setiap cawan petri yang menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri *S. aureus*, diambil beberapa koloni dan dilakukan uji katalase, koagulase. Tabung yang menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri *S. aureus* di catat dan dihitung dengan menggunakan Standard Plate count (SPC).

4. Uji Koagulase

1. Menginokulasi koloni terduga *S. aureus* kedalam 2ml BHI broth dan menginkubasi selama 18-24 jam.
2. Memindahkan 0,2ml-0,3ml inokulum tersebut kedalam tabung steril dan menambahkan 0,5ml koagulasi plasma kemudian aduk. Menginkubasi dan mengamati setiap jam, untuk 4 jam pertama dan lanjutkan hingga 24 jam untuk melihat terbentuknya koagulan.
3. Koagulan yang terbentuk secara padat/solid tidak jatuh apabila tabung dibalik, dinyatakan positif

5. Uji Katalase (Uji tambahan)

1. mengambil 1 ose inokulum dari BHI Broth dan menggoreskan kedalam media TSA miring dan menginkubasi selama 18-24 jam.
2. Setelah diinkubasi, mengambil 1 ose inokulum dan meletakkan di atas gelas preparat, lalu teteskan H₂O₂ untuk melihat pembentukan gelembung-gelembung gas.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Adapun hasil penghitungan jumlah koloni dengan menggunakan metode spc pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode A



Brand	Nama Sampel	Tingkat kontaminasi	Standar SNI	Keterangan
A	Pengambilan 1	7 koloni/g	1 x 10 ² koloni/g	<BMCM
	Penagambilan 2	3 koloni/g		<BMCM
	Pengambilan 3	2 koloni/g		<BMCM
B	Pengambilan 1	TBUD	1 x 10 ² koloni/g	>BMCM
	Penagambilan 2	1,2 x 10 ² koloni/g		>BMCM
	Pengambilan 3	3 koloni/g		<BMCM
C	Pengambilan 1	3,2 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ² koloni/g	>BMCM
	Penagambilan 2	5,7 x 10 koloni/g		<BMCM
	Pengambilan 3	3,5 x 10 koloni/g		<BMCM
D	Pengambilan 1	1,5 x 10 koloni/g	1 x 10 ² koloni/g	<BMCM
	Penagambilan 2	2 x 10 ² koloni/g		BMCM
	Pengambilan 3	1,3x10 koloni/g		<BMCM
E	Pengambilan 1	5 koloni/g	1 x 10 ² koloni/g	<BMCM
	Penagambilan 2	TSUD		<BMCM
	Pengambilan 3	3 Koloni/g		<BMCM

Ket: TBUD (Terlalu Banyak Untuk Di hitung)
 TSUD (Terlalu Sedikit Untuk Di hitung)
 >BMCM (Lebih dari Batas Maksimum Cemaran Mikroba)
 < BMCM (Kurang dari Batas Maksimum Cemaran Mikroba)

2. Metode B

Brand	Nama Sapel	Tingkat kontaminasi	SNI	Keterangan
A	Pengambilan 1	$2,8 \times 10^3$ koloni/g	1×10^2 koloni/g	>BMCM
	Pengambilan 2	$3,4 \times 10^2$ koloni/g		>BMCM
	Pengambilan 3	$4,5 \times 10^2$ koloni/g		>BMCM
B	Pengambilan 1	$5,1 \times 10^2$ koloni/g	1×10^2 koloni/g	>BMCM
	Pengambilan 2	$1,3 \times 10^2$ koloni/g		>BMCM
	Pengambilan 3	$6,5 \times 10^2$ koloni/g		>BMCM
C	Pengambilan 1	$1,6 \times 10^3$ koloni/g	1×10^2 koloni/g	>BMCM
	Pengambilan 2	$7,5 \times 10^2$ koloni/g		>BMCM
	Pengambilan 3	$7,9 \times 10^2$ koloni/g		>BMCM
D	Pengambilan 1	$2,6 \times 10^2$ koloni/g	1×10^2 koloni/g	>BMCM
	Pengambilan 2	$4,8 \times 10^2$ koloni/g		>BMCM
	Pengambilan 3	$2,7 \times 10^2$ koloni/g		>BMCM
E	Pengambilan 1	$8,1 \times 10^2$ koloni/g	1×10^2 koloni/g	>BMCM
	Pengambilan 2	$4,5 \times 10^2$ koloni/g		>BMCM
	Pengambilan 3	$1,3 \times 10^2$ koloni/g		>BMCM

Ket: TBUD (Terlalu Banyak Untuk Di hitung)
 TSUD (Terlalu Sedikit Untuk Di hitung)
 >BMCM (Lebih dari Batas Maksimum Cemaran Mikroba)
 < BMCM (Kurang dari Batas Maksimum Cemaran Mikroba)

Uji Koagulase	Uji Katalase
 <p data-bbox="302 1073 824 1332">Keterangan: Koagulan yang terbentuk secara padat pada permukaan dan dasar tabung yang berarti positif</p>	 <p data-bbox="846 1073 1369 1256">Keterangan: Terbentuk gelembung-gelembung gas yang berarti positif.</p>

B. Pembahasan

Allah swt. dalam QS Abasa (80:24) yang berbunyi:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ٢٤

Terjemahnya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” (Kementrian Agama RI, 2012)

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa (maka hendaklah manusia itu memperhatikan) dengan memasang akalnya (kepada makanannya) bagaimanakah makanan itu diciptakan dan diatur untuknya?

Manusia harus memperhatikan makanan yang akan dia makan, seperti daging ayam yang akan dia makan sebaiknya harus diperhatikan dengan baik dari segi kualitas dagingnya apakah layak untuk dikonsumsi, sehingga tidak dapat merusak kesehatan. Proses keamanan dan kelayakan daging ayam ini harus dilakukan sedini mungkin yakni mulai dari peternakan hingga daging ayam dikonsumsi (dimeja makan). Meskipun ayam tersebut dinyatakan sehat dari peternakan, jika dipotong dan penjualan daging ayam tidak memenuhi kriteria pemotongan yang baik maka kecenderungan menimbulkan penyakit akan semakin besar. Sehingga untuk menjaga kualitas daging sebaiknya disimpan dalam lemari pendingin agar kualitas dagingnya dapat terjaga dengan baik dan proses pemasakannya juga harus diperhatikan dengan baik (Shihab, 2002).

Hasil pengujian bakteri *Staphylococcus aureus* yang dilakukan di Laboratorium mikrobiologi fakultas sains dan teknologi Universitas Islam Negeri Makassar menunjukkan bahwa dari ke 15 sampel yang di ambil di Mall panakukang Makassar. Ditemukan adanya bakteri *Staphylococcus aureus* yang melabih batas maksimum SNI, pada sampel metode A yaitu pada brand B pengambilan 1 dan ke 2, brand C pada pengambilan 1, Brand D Pengambilan ke 2. Adapun pada metode B yaitu terdapat pada semua brand A, B, C, D, dan E. sehingga sampel tersebut dapat dinyatakan positif tercemar bakteri *Staphylococcus aureus*. Dapat ditunjukkan selama proses inkubasi kurang lebih 45-48 jam pada media *Baird Parket Agar* (BPA) terlihat adanya bakteri yang mempunyai ciri khas bundar, licin dan halus, cembung, diameter 2-3 mm dan berwarna crem, putih keabu-abuan. Hal ini sesuai dengan pendapat SNI 2897 (2008), yang menyatakan bahwa Koloni *S. aureus* mempunyai ciri khas bundar, licin dan halus, cembung, diameter 2 mm sampai dengan 3 mm, berwarna abu-abu sampai hitam pekat, dikelilingi zona opak, dengan atau tanpa zona luar yang terang (*clear zone*). Tepi koloni putih dan dikelilingi daerah yang terang. pada uji koagulase yang membentuk padatan pada permukaan media dan juga terdapat padatan pada dasar media yang berarti positif. dan juga di tunjukkan pada uji katalase yang menghasilkan gelembung pada saat di tetesi H₂O₂ yang berarti positif. Sedangkan pada sampel metode A yaitu, Brand A pengambilan 1, 2 dan 3, brand B pengambilan 1 dan 3, brand C pengambilan 2 dan 3, brand D pengambilan 1, 2, dan 3, brand D pengambilan 1 dan 3, brand E pengambilan 1, 2, dan 3.

ditemukan tanda-tanda pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* di bawah batas maksimum SNI.

Media *Baird Parket Agar Base* (BPA) merupakan media agar yang cocok untuk pertumbuhan jenis bakteri *Staphylococcus aureus*. Hal ini sesuai dengan pendapat Acumedia (2012), yang menyatakan bahwa media BPA adalah media selektif untuk mengisolasi dan menghitung koloni *Staphylococcus aureus*. Jika ditinjau dari segi lokasi pengambilan sampel di Mall Panakukang Makassar, beberapa brand rumah makan mendapatkan ayam dalam keadaan utuh (belum terpotong) dari produsen, dan ada juga brand rumah makan yang mendapatkan ayam dalam keadaan tidak utuh (telah terpotong) dari produsen. Cara penyajiannya pun berbede-beda, ada yang di goreng kemudian disimpan lalu di panaskan setelah konsumen memesan, dan ada juga proses penggorengan di lakukan setelah konsumen memesan. Pencemaran dapat terjadi karena cara penanganan yang kurang memperhatikan sanitasi, misalnya pada saat penerimaan dan pengangkutan ayam, penyembelihan, perendaman air panas dan pencabutan bulu, pendinginan, pengeluaran jeroan dan pemotongan.

Jika ditinjau dari kontaminasi bakteri *Staphylococcus aureus* tidak dapat dilihat dari satu segi saja tapi dapat dilihat dari faktor dari dalam maupun dari lingkungan. Adanya cemaran yang bersifat dari dalam dapat terjadi apabila ayam yang dipotong sebelumnya telah terinfeksi oleh bakteri, apakah itu mulai terinfeksi dari ternaknya sendiri atau kandangnya yang kurang baik sanitasinya atau dari

makanan yang di makan oleh ayam itu sendiri dan dari bahan pangan yang di campurkan saat di olah menjadi ayam krispi. Sedangkan, cemaran yang bersifat lingkungan dapat terjadi pada proses penyembelihan, penanganan, udara, penyimpanan yang lama dan penyimpanan daging ayam tidak dijaga higienitasnya. Terlebih diikuti dengan cara memasak atau mengolah yang juga kurang matang dan higienis dan penyebab terinfeksi juga bisa di sebabkan oleh pengunjung yang berdatangan. Hal ini dapat mengakibatkan daging ayam tersebut mudah terinfeksi baktri patogen khususnya bakteri *Staphylococcus aureus*.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno (2005), yang menyatakan bahwa untuk mengurangi kontaminasi, diperlukan penanganan yang higienis dengan sistem sanitasi yang baik. Besarnya kontaminasi mikroorganisme pada daging akan menentukan kualitas dan masa simpan daging proses. Pengambilan sampel yang di lakukan oleh 5 orang pada pagi hari pada 5 brand di mall panakukang makassar setiap orang mengambil 1 potong ayam goreng krispi pada 1 brand dan di bungkus dengan kemasan brand masing-masin untuk meminimalisir pertumbuhan bakteri pada saat dibawa ke laboratorium untuk di uji. Pada saat selesai pengambilan sampel harus seger di lakukan pengerjaan secara aseptik untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi oleh bakteri. suhu pertumbuhan untuk bakteri *Staphylococcus aureus* yaitu pada 35°C - 37°C. Hal ini sesuai dengan pendapat Caldwell (2011), menyatakan bahwa bakteri gram positif cenderung hidup pada kelembapan udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Hidayati (2012), menyatakan bahwa keberadaan *Staphylococcus aureus* dalam bahan pangan erat

kaitannya dengan sanitasi pekerjaan serta kebersihan lingkungan dan peralatan pengolahan. Tingginya jumlah koloni *Staphylococcus aureus* yang telah di uji menunjukkan bahwa higienitas daging ayam goreng krispi yang dijual di mall panakukang Makassar masih rendah. Mikroba dapat ditemukan ditubuh manusia, hewan, dan lingkungan terutama di lingkungan dengan kondisi sanitasi yang kurang baik.

Sampel daging ayam goreng krispi yang diambil adalah sebelumnya telah selesai di goreng beberapa menit yang lalu terbukti pada saat pembelian ayam goreng krispi tersebut masih hangat dan di simpan di dalam lemari tertutup, ada pula ayam goreng krispi yang baru-baru selesai di goreng dan di tiriskan di tempat penirisan dalam keadaan wadah terbuka, ada ayam goreng yang sudah beberapa jam yang lalu sudah di goreng, nanti ada pembeli lalu di panaskan, dan ada ayam goreng krispi yang di goreng ketika ada yang pesan ditiriskan sebentar kemudian di simpan di dalam kemasan. Harusnya ayam yang masih mentah di simpan di lemari pendingin dan tertutup, nanti ada yang mau beli baru di gorengkan, kemudian di tirisakan di tempat penirisan tertutup, dan di kemas dengan rapi dan tertutup, namun ada yang hanya meletakkan pada wadah terbuka dan bahkan ada sebagian pembeli yang sempat memegang ayam goreng krispi tersebut kemudian menyimpannya kembali, dan kemungkinan besar alat bisa hinggap ke ayam goreng krispi tersebut. Kondisi demikian memungkinkan bakteri dapat berasal dari tangan pembeli, pembuat, bahan pangan lain yang di campurkan, alat bahkan dari udara dengan mudah dapat mencemari daging ayam. Selain itu, juga dapat berasal dari peralatan masak,

peralatan potong, dan air yang digunakan untuk mencuci daging ayam. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati (2012), menyatakan bahwa keberadaan *Staphylococcus aureus* dalam bahan pangan erat kaitannya dengan sanitasi pekerjaan serta kebersihan lingkungan dan peralatan pengolahan.

Tingginya jumlah koloni *Staphylococcus aureus* yang telah di uji menunjukkan bahwa higienitas daging ayam goreng krispi yang dijual di rumah makan mall panakukang makassar masih rendah. Mikroba dapat ditemukan ditubuh manusia, hewan, dan lingkungan terutama di lingkungan dengan kondisi sanitasi yang kurang baik.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 7388 tahun 2009 mengenai batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan, ditetapkan bahwa batas maksimum cemaran mikroba (BMCM) pada daging ayam segar dan beku serta olahannya adalah sebesar 1×10^2 koloni/g. Pada metode A Sebanyak 4 sampel dari 15 sampel ayam goreng krispi tercemar bakteri *Staphylococcus aureus* melebihi BMCM 1×10^2 koloni/g, sedangkan pada metode B sebanyak 15 (Semua) sampel ayam goreng krispi tercemar bakteri *Staphylococcus aureus* melebihi 1×10^2 koloni/g. Sehingga sampel yang tertinggi cemarannya pada metode A yaitu terdapat pada sampel brand C pada pengambilan pertama sebanyak $3,2 \times 10^2$ koloni/g. Pada metode B yaitu terdapat pada sampel brand A pengambilan pertama sebanyak $2,8 \times 10^3$ koloni/g. Hal ini sesuai dengan pendapat SNI 7388 (2009), yang menyatakan bahwa sesuai dengan batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan untuk *Staphylococcus aureus* baik itu daging segar, daging beku dan daging olahan adalah 1×10^2 koloni/g. Pangan asal

hewan seperti daging, susu dan telur serta hasil olahannya umumnya bersifat mudah rusak (perishable) dan memiliki potensi mengandung bahaya biologik, kimiawi dan atau fisik. Oleh sebab itu, penanganan produk tersebut harus higienis dan setiap negara membutuhkan program keamanan pangan yang efektif untuk melindungi kesehatan masyarakatnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Todar (2005), yang menyatakan bahwa berkaitan dengan pengaturan pangan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-undang tersebut merupakan landasam hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan. Undang-undang ini juga merupakan acuan dari berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pangan. Agar Undang-undang Pangan ini dapat diterapkan dengan mantap, maka pemerintah melengkapinya dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu peraturan pemerintah yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan asal hewan di Indonesia didasarkan atas pangan yang aman, sehat, utuh dan halal atau dikenal dengan ASUH. Hal tersebut sejalan dengan keamanan dan kelayakan pangan untuk dikonsumsi manusia yang telah ditetapkan oleh UU. Akan tetapi jika di tinjau dari pengambilan sampel yang diperoleh dari rumah makan yang berada di mall panakukang makassar ternyata belum terjaga higienitasnya apakah ini disebabkan karena faktor kesadaran pedagang

yang kurangnya memperhatikan program pemerintah dalam menjaga keamanan pangan yang layak untuk di konsumsi masyarakat atau kurangnya pengawasan dan pemeriksaan. Sehingga diperlukan perhatian atau pengawasan rutin oleh pemerintah Provinsi khususnya Dinas Peternakan terkait aspek aman, sehat, utuh dan halal. Dan perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga higienitas baik dipeternakan ayam maupun di rumah makan yang telah menyediakan menu yang berbahan dasar daging ayam.

Hal ini sesuai dengan pendapat Wuryaningsih (2013), yang menyatakan bahwa masalah ASUH yang terkait dengan sistem penyediaan antara lain higiene sanitasi, tidak ada pengawasan dan pemeriksaan yang konsisten (misalnya pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan daging di RPH/RPU), belum adanya penegakan hukum, serta belum adanya sistem kesehatan masyarakat veteriner yang bertanggung jawab terhadap keamanan, kesehatan dan kelayakan pangan asal hewan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa daging ayam krispi yang diperoleh dari rumah makan yang berada di Mall Panakukang Makassar ditemukan adanya bakteri *Staphylococcus aureus*. Pada metode A, Sebanyak 4 sampel dari 15 sampel ayam goreng krispi tercemar mikroba melebihi 1×10^2 koloni/g, dan pada metode B sebanyak 15 (Semua) sampel ayam goreng krispi tercemar bakteri *Staphylococcus aureus* melebihi 1×10^2 koloni/g. dengan demikian tingkat cemaran bakteri dapat dinyatakan sebagian besar tingkat cemarannya sudah melampaui ambang batas Standar Nasional 7388: 2009 (1×10^2 koloni/g).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperlukan perhatian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Dinas Peternakan untuk melakukan program survei cemaran mikroorganisme lebih lanjut dan secara teratur dalam hal melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Diharapkan dapat dilakukan pendekatan kepada pedagang pasar tradisional dan pedagang daging ayam olahan, serta masyarakat berupa pemberian informasi tentang pentingnya menjaga sanitasi saat penanganan pangan akan adanya bakteri *Staphylococcus aureus*.

KEPUSTAKAAN

- Acumedia. *Baird Parker Agar 7112*. Neogen Corporation. 2012.
- Adriani, dan M,Y, Lasti. “Identifikasi keberadaan *Staphylococcus sp* pada santan kelapa kemasan yang di perdagangkan di kota makassar”. *Teknosains Vol 2 No 1* (2014): h. 31.
- Andreasen CB. 2013. Overview of Staphylococcosis in Poultry. http://www.merckmanuals.com/vet/poultry/staphylococcosis/overview_of_staphylococcosis_in_poultry.html (akses tanggal 29 Maret 2014).
- Albrecht, J. A, Summer, S. S. *Staphylococcus aureus*. Cooperative Extension. Institute Of Agriculture and Natural Resources. *Lincoln: University Of Nebraska* : 1995. 683
- Aoac. Changes in methods *Staphylococcus aureus* in foods. *J. Assn. off. Anal. . of Analysis* 70: 393. 1987.
- Barrow G.I. and R.K.A. Feltham. Cowan and Steel’S Manual for Identification of medical bacteria 3rd Ed. *Cambridge University pers. pp.* 2003. 145-168.
- Badan Standarisasi Nasional SNI 3924:2009, *Mutu Karkas dan Daging Ayam*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. . 2009.
- BSN. 2008. SNI 2897:2008, *Metode Pengujian Cemaran Mikroba Dalam Daging, Telur dan Susu Serta Hasil Olahannya*. 2008.
- BSN. 2009. SNI 7388:2009, *Batas Maksimum Cemaran Mikroba Dalam Pangan*. 2009.
- Balaban, N, Rasooly, A. Review of *Staphylococcus enterotoxin*. *J. Food Microbiol.* 2000. (61): p., 1-10.
- Betty, Yendri. *Cemaran Mikroba terhadap Telur dan Daging Ayam*. Padang: Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. 2007.
- Bergdoll M.S. *Staphylococcus sp*. Food Poisoning In. *Foodborne Disease. Academic Press, San Diego*. 1990 :145–168.
- Cappucino J. G, N. Sherman. *Microbiology: A Laboratory Manual. 7th ed. Pearson Education Inc. USA*. 2005

- Caldwell A. 2011. *The Effects of Ultraviolet Light on Bacterial Growth*. http://www.ehow.com/facts_5871403_effects-ultraviolet-light-bacterial-growth.html. Diakses pada tanggal 8 Juni 2017.
- Chotiah, Siti. Cemaran *Staphylococcus aureus* pada Daging Ayam dan Olahannya. *Balai Besar Penilitin Veteriner*. Bogor: 2009.
- Dejaafar, T. F, Rahayu.. Cemaran Mikroba pada Produk Pertanian, Penyakit yang Ditimbulkan dan Pencegahannya. *Jurnal penelitian dan pengembangan pertanian*. 2007 (2) 26: 67-75.
- Djide, M, Natsir. *Mikrobiologi farmasi*. Makassar, Jurusan farmasi universitas Hasanuddin. 2003.
- Destrianasri Nydia Venny. *Perbedaan Bakteri Gram Psitif dan Gram Negatif*: program Studi DIV Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Semarang. 2016.
- Erni Gustiani. Pengendalian Cemaran Mikroba pada Bahan Pangan Asal Ternak (Daging dan Susu) Mulai dari Peternakan Sampai Dihidangkan. *Jurnal Litbang Pertanian*. 2009. (3) 28. h., 96-99 .
- E, Harmayani. Santoso E, T Uatami dan S Raharjo. "Identifikasi bahaya kontaminasi *S. Aureus* dan titik kendali kritis pada pengolahan produk daging ayam dalam usaha jasa boga" *Teknosains*. 1996 Vol 3 No 16.
- Fardiaz, S. Mikrobiologi Pengelolaan Pangan. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi*. 1992.
- Hadiwiyoto, S. *Hasil –hasil olahan susu, ikan, daging, dan telur*. Yogyakarta, Liberty, 1983.
- Hidayati DYN, A Ruhana, RD Cahyani. *Studi Mutu Mikrobiologi Staphylococcus aureus dan Mutu Organolektip antara Ayam Potong pada Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan di Kota Malang*. <http://old.fk.ub.ac.id/artikel/id/file-download/gizi/majalah%20dwi%20cahyani.pdf>. (akses tanggal 22 Januari 2014).
- Jawetz, Melnick, Adelberg's. *Mikrobiologi Kedokteran*, ED 23. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004. 233, 235.
- Jawetz, Melnick, Adelberg's. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Salemba Medika
- Jawetz, Melnick, Adelbergs. 2008. *Mikrobiologi Kedokteran*. (H. Hartanto, C. Rachman, A. Dimanti, A. Diani). Jakarta: EGC.p. 199-200: 233.

- Jawetz, E, J. L. Melnick, E. A. Adelberg, G. F. Brooks, J. S. Butel, L. N. Ornston. *Mikrobiologi Kedokteran*. Edisi ke-20 (Alih bahasa: Nugroho & R.F.Maulany). Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 1995. 211,213,215.
- Jawetz, E, J. L. Melnick, E. A. Adelberg. *Medical Mikrobiology*. 22nd edition. McGraw Hill Companies Inc. USA. 2001. 223-233, 317-326.
- Jay J. M. *Modern Food Microbiology*, Ed ke-6. Chapman & Hall. 1996 : 429 – 450.
- Jay J. M. M. J. Loessner, D. A. Golden. *Modern Food Microbiology Seventh Edition*. Springer Science and Bussiness Media Inc., USA. 2005.
- Jumriani Ibrahim. “tingkat cemaran bakteri *staphylococcus aureus* pada daging ayam yang dijual di pasar tradisional makassar”. Makassar. *Universitas UIN Aalauddin Makassar*. 2016
- Kementrian Agama RI. Mushaf, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012.
- Kementrian Kesehatan RI. Infodatin. Jakarta: Pusatdatin, 2015.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/Mengkes/SK/VI/2008. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.
- Lancette GA, Bennet Rw.. *Staphylococcus aureus and Staphylococcal Enterotoxin*, Dalam Downes FP, Ito K, editor, Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. Ed Ke-4. Washington: American Public Health Association. 2001
- Lawrie, R. A. Lawrie's Meat Science. 6th Edition. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd. 1998.
- Lawrie, R. A. Meat Science. 3rd ed. Oxford: Pergamon Press. 1979.
- Lowy F. D. Staphylococcus aureus Infections. The New England Journal of Medicine. [Internet]. [diunduh 9 Jul 2013]; Tersedia pada: www.nejm.org/medical-articles. 1998.
- Nuroso. *Panen Ayam Pedaging dengan Produksi 2x Lipat*. Jakarta: Cetakan ke-1. Penebar Swadaya. Gramedia. 2009.

- Murtidjo, Bambang Agus. *Pemotongan dan Penanganan Daging Ayam*. Yogyakarta: Kanisius. 2003
- Palupi K. T. Pengujian *Staphylococcus aureus* pada Daging Ayam Beku yang Dilalulintasakan Melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak. Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.: 2010.
- Patrick Boerlin. Methods for Identification of *Staphylococcus aureus* Isolates In Cases of Bovine Mastitis. *Journal of Clinical Microbiology*. 2003 41(2):767-771. [Internet]. [diunduh 9 Jul 2013]; Tersedia pada: www.ncbi.nih.gov
- Pakaya, siti fitriana “Identifikasi cemaran *Staphylococcus aureus* pada daging ayam goreng tepung”. (2014): 2-4.
- Ryan, K. J, J. J. Champoux, S. Falkow, J. J. Plonde, W. L. Drew, F. C. Neidhardt, C.G. Roy.. *Medical Microbiology An Introduction to Infectious Diseases*. 3rd ed. Connecticut: Appleton & Lange 1994. P.254.
- Raharjo, S, *Teknik dokumentasi cemaran bakteri pada karkas dan daging*. Yogyakarta. Gramedia. 1999.
- Reiman, H. and F.L. Bryan, *Food-born infections and intoxication*. London. Academic press, 1979.
- Sri ni yuliani dan Aven B.Oematan. “Identifikasi Mikrobiologi (*Staphylococcus* dan *Coliform*) Pada Susu dan Daging serta olahannya di kota yogyakarta” *Teknosains*, 2011. No 1: Hal 29-30.
- Salasia, S.I.O, Khusnan, Sugiyono Distribusi Gen *Enterotoksin Staphylococcus aureus* dari Susu Segar dan Pangan Asal Hewan. *Jurnal Veteriner*. . 2009. 10(3):111-117.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siagian A. *Mikroba Patogen pada Makanan dan Sumber Pencemarannya*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 2002.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 7388-2009. “Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam pangan ”. Badan Standar Nasional (BSN). (2009).
- [SNI]. Standar Nasional Indonesia. *Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Batas Maksimum Residu dalam Bahan Makanan Asal Hewan*. 2000.
- Soeparno. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1994.
- . *Ilmu dan Teknologi Daging*. Yogyakarta: Gajah Madah University Press. 1998.

- . *Ilmu dan Teknologi Daging*. Edisi Ke-4. Yogyakarta: Gajah Madah University Press. 2005.
- . *Ilmu dan Teknologi Daging*. Edisi Ke-5. Yogyakarta: Gajah Madah University Press. 2009.
- Syahrurahman, A, Assani, S. *Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Binarupa aksara publisher. 2010.
- Tabbu CR. *Penyakit Ayam dan Penaggulangannya-*. Yongyakarta: Penerbit Kanisius. 2000. Volume 1
- Titik, F,D, Endang, S,R, Siti, R. “Cemaran mikroba pada susu dan produk unggas”. *Lokakarya nasional keamanan pangan produk peternakan*. 2009.
- Todar K. *Todar’s Online Textbook of Bacteriology Staphylococcus*. University of Wisconsin-Madison Department of Bacteriology. [Internet]. 2005.
- Tolan, R. W. 2008. *Staphylococcus aureus* Infection. <http://www.emedicine.com/ped/topic2704.htm>. (akses tanggal 6 November 2014).
- Utari Ken Lasmi. *Status Mikrobiologis Daging Broiler Di pasar Tradisional Kabupaten Pringsewu*. (Skripsi) Lampung: Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. . 2016.
- Warsa, U. C. *Staphylococcus dalam Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara. 1994. hal. 103-110.
- Widowati, S, Y. Fitrial, E. Aritonong, Z. Lubis, Razali. *Aspek Halal Produk Pangan Dalam Menjaga Ketentraman bathin Masyarakat*. Makalah Pengantar Falsafah Sains. Bogor: Makalah Pengantar Falsafaat. Program Falsafat Sains. IPB Bogor. 2003.
- Wuryaningsih, E. *Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Pangan Asal Hewan*. Lokakarya Nasional Keamanan Pangan Produk Peternakan. 2013.
- Yuwono. *Staphylococcus aureus dan Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)*. Palembang: Depertemen Mikrobiologi FK Unsri. 2012.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Alat**autoclave****coloni counter****Timbangan analitik****Oven**

Inkubator**Mikro pipet****Hot plate****Lampu spiritus**

Kaca preparat



Mortar & Pastle



Tip



Corong



Steerer



Cawan petri




Tabung reaksi




Rak tabung




Bahan**Silk****Kapas****Tisu****Alkohol**


H_2O_2




$NaCl$



Media Baird Parker Agar



Menimbang Media



Pengenceran dan penanaman pada media baird parker agar




Uji koagulase & katalase



Hasil uji koagulasi & Katalase


in yang terbentuk secara padat/sond an tidak jatuh apabila
an positif (reaksi 4+) Staphylococcus aureus. Koagulan yang m
+ dan 3+ harus dilakukan uji tambahan.



bahan
Katalase



Coloni yang tumbuh pada media bair parker agar



RIWAYAT HIDUP



Mawar lahir pada tanggal 23 Agustus 1994 di ujung pandang provinsi sulawesi-selatan. penulis merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara dari pasangan bapak H.Abd Rahim dan Ibu Hj. Aminah. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SDN Pongtiku Makassar dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Makassar dan tamat

pada thun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Makassar dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.