

**UJI DAYA CERNA LEMAK PADA BROILER YANG
DIBERIKAN ANTIBIOTIK DAN PROBIOTIK**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R**

**ISMAWATI
60700114020**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

1. Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismawati

Nim : 60700114020

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gowa, Agustus 2018

Penyusun,



Ismawati
60700114020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi Penelitian saudara ISMAWATI, Nim: 60700114020, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi Skripsi penelitian yang bersangkutan dengan judul, "Uji Daya Cerna Lemak pada Broiler yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik", memandang bahwa skripsi penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Juli 2018


Pembimbing I


Muh. Nur Hidayat S.Pt., MP.
NIP. 197509092009121001

Pembimbing II


Astati, S.Pt., M.Si.
NIP. 197608212009122002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.
NIP. 19590712 1986031 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Daya Cerna Lemak pada Broiler yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik” yang disusun oleh **ISMAWATI, NIM: 60700114020**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, _____ Agustus 2018 M
Dzul-Hijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P.	(.....)
Pembimbing II	: Astaty, S.Pt., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 1969205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas berkat dan bimbingannya serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Uji Daya Cerna Lemak pada Broiler yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda tercinta Andarias dan Ibunda tercinta Lija karena mereka saya bisa sampai ketahap ini yang pastinya tidak lepas dari doa dan dukungan tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Satu hal yang memotvasi saya untuk menyelesaikan skripsi karna saya adalah satu-satunya harapan mereka yang bisa membahagiakan mereka kelak dihari tua, Amin.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dr. Wasilah, S.T, M.T. Selaku wakil dekan 1 bidang akademik Fakultas Sains, Dr. M. Thahir Maloko, M.Th.I. Selaku wakil dekan 2 bidang administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si. selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si. sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dan ibu Astaty, S.Pt., M.Si. selaku sekretaris jurusan Ilmu Peternakan.
4. Bapak Muh. Nur Hidayat S.Pt., M.P. selaku Dosen Pembimbing pertama, dan Ibunda Astaty S.Pt., M.Si. selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan waktu

untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly dan Bapak Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag. selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
7. Ibu drh. Aminah Thaja M.Si, Bapak Muh. Arsan Jamili S.Pt., M.Si dan, Ibu Hikmawati S.Pt. selaku Laboran Jurusan Ilmu Peternakan yang telah memberikan ilmunya selama menjadi asisten laboratorium sampai dengan proses selesainya penelitian.
8. Kak Andi Afriana, S.E. selaku Staff Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari proposal hingga skripsi.
9. Sahabat saya Wahyuni, Andi Febri Astuti, Rahmawati, Radiah Ramdani yang selama ini telah hadir dalam suka dan duka mulai dari awal perkuliahan sampai proses selesainya skripsi ini.
10. Tim penelitian Antibiotik dan Probiotik (Rahmawati, Andi Febri Astuti, Wahyuni, Eka Fitriani, Syarif Hidayatullah, Rustan, dan Sultan Akbar Wahidin) atas kerja sama dan kerja kerasnya selama proses penelitian berlangsung

11. Buat teman-teman seangkatan Ilmu Peternakan Angkatan 2014 terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin.
12. Jusman, Fifi Alfirah dan Puspita Hamka terimakasih untuk semangat dan dukungannya dan segala bantuannya hingga penulis meraih gelar Sarjana peternakan.
13. Senior dan Adik-adik sejurusan Ilmu Peternakan.
14. Keluarga dan teman kost yang selama ini telah membantu dalam penyelesaian skripsi
15. Teman-teman KKN Angkatan 58 Desa Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Ismawati
NIM.60700114020

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRACT	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Defenisi Operasional	5
F. Hipotesis	5
G. Kajian Terdahulu	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Broiler	7
B. Tinjauan Al-Qur'an	14
C. Lemak	17
D. Daya Cerna	21
E. Probiotik	25
F. Antibiotik	41
G. <i>Bakteri Asam Laktat (BAL)</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	48
B. Alat dan Bahan Penelitian	48

C. Jenis Penelitian	48
D. Metode Penelitian	49
E. Parameter yang Diukur	51
F. Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	
a. Kesimpulan	59
b. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Beberapa Mikroorganisme yang Berperan Sebagai Probiotik.....46



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Daya Cerna Lemak Kasar.....54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Ismawati

Nim : 60700114020

Major : Animal Science

Title : Test the Digestibility of Fat in Broilers Given Antibiotics and Probiotics

This study aims to determine the effect of antibiotics and probiotics on the fat digestibility of the broiler. This research was conducted at poultry of Alauddin State Islamic University of Makassar and continued at Hasanuddin University's Animal Chemistry Laboratory. This research was carried out for 35 days. The experiments were performed using a Complete Randomized Design (CRD), which contained 4 treatments namely P0 (Control), P1 (Probiotics 1.5 ml / day, 1-35 days), P2 (Antibiotics 0.1 g / day, 1-35 days), P3 (Antibiotics 0.1 g / day, 1-21 days + Probiotic 1.5 ml / day, 22-35 days) with 3 replications. This study used Zink Bacitracin antibiotics and multi-strain probiotics ((Lactobacillus cesei, Saccharomyces cerevisiae and Rhodopseudomonas palustris) which contained 1.5×10^6 cfu / ml. The parameters measured were fat digestibility. significant effect ($P > 0.05$) on fat digestibility in broilers The average fat digestibility obtained in this study is P0 (93.43) P1 (79.52) P2 (94.59) and P3 (87.60).

Keywords: *Antibiotics, Broiler, Digestibility, Fat, Probiotics.*

ABSTRAK

Nama : Ismawati
Nim : 60700114020
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Uji Daya Cerna Lemak Pada Broiler Yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian antibiotik dan probiotik terhadap daya cerna lemak pada broiler. Penelitian ini dilakukan di kandang unggas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dilanjutkan di Laboratorium Kimia Pakan Ternak Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari. Percobaan dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), yang terdapat 4 perlakuan yaitu P₀ (Ransum Basal + Kontrol), P₁ (Ransum Basal + Probiotik 1,5 ml/hari, 1-35 hari), P₂ (Ransum Basal + Antibiotik 0,1 g/hari, 1-35 hari), P₃ (Ransum Basal + Antibiotik 0,1 g/hari, 1-21 hari + Probiotik 1,5 ml/hari, 22-35 hari) dengan 3 kali ulangan. Penelitian ini menggunakan antibiotik *Zink Bacitracin* dan probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) yang mengandung $1,5 \times 10^6$ cfu/ml. Parameter yang diukur yaitu daya cerna lemak. Berdasarkan hasil sidik ragam dari penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) terhadap daya cerna lemak pada broiler. Rata-rata daya cerna lemak yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu P₀ (93.43) P₁ (79.52) P₂ (94.59) dan P₃ (87.60).

Kata Kunci: Antibiotik, Broiler, Daya cerna, Lemak, Probiotik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha peternakan broiler merupakan salah satu usaha yang potensial untuk menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi masyarakat. Broiler tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu yang singkat. Keunggulan genetik yang dimiliki broiler dan pemberian ransum yang baik mampu menampilkan performa produksi yang maksimal. Selain faktor genetik dan pakan, lingkungan kandang mempunyai peran yang besar dalam menentukan performa broiler dan keuntungan yang diperoleh peternak.

Broiler ini baru populer di Indonesia sejak tahun 1980-an dimana pemegang kekuasaan mencanangkan pengalangan konsumsi daging ruminansia yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya. Hingga kini ayam broiler telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihanannya. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia.

Menurut Suprijatna *et al.* (2005), broiler adalah ayam yang mempunyai sifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat ke tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Siregar *et al.* (1980) bahwa broiler dalam klasifikasi ekonomi memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu

ukuran badan besar, penuh daging yang berlemak, temperamen tenang, pertumbuhan badan cepat serta efisiensi penggunaan ransum tinggi.

Peningkatan produktivitas yaitu dengan cara melalui pemberian pakan yang berkualitas. Pakan yang berkualitas harganya relatif lebih mahal, sehingga diperlukan manipulasi untuk mengoptimalkan biaya pakan untuk memaksimalkan produksi. Salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas ayam yaitu dengan menambahkan bahan pakan aditif berupa suplemen antibiotik dan probiotik (Siregar, 1980).

Penggunaan antibiotik atau antimikrobia sebagai bahan aditif dalam pakan ternak telah berlangsung lebih dari 40 tahun silam. Senyawa antibiotik tersebut digunakan sebagai growth promotor dalam jumlah yang relatif kecil namun dapat meningkatkan efisiensi pakan (*feed efficiency*) dan reproduksi ternak sehingga dengan penggunaan bahan aditif tersebut peternak dapat memperoleh keuntungan lebih. Awal tahun 2006 penggunaan antibiotik dilarang oleh Uni Eropa sebagai pencegah penyakit (*disease prophylactic*) atau dikenal pemicu pertumbuhan (*Antimicrobial Growth Promoters*) di dalam pakan ternak (Ahmad dan Elfawati, 2006).

Antibiotik adalah golongan senyawa, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotika khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi, meskipun dalam bioteknologi dan rekayasa genetika juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap mutan atau transforman. Antibiotika bekerja seperti pestisida dengan menekan

atau memutus satumata rantai metabolisme, hanya saja targetnya adalah bakteri. Antibiotika berbeda dengan desinfektan karena cara kerjanya (Soeharsono, 2010).

Pemberian antibiotik pada ternak digunakan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kontaminasi mikroba penyebab penyakit (mikroba patogenik) terhadap produk-produk hasil unggas. Sehingga produk yang dihasilkan tetap higienis. Pemberian probiotik pada ayam broiler dapat juga dapat memperbaiki pertumbuhan, angka konversi serta meningkatkan ketersediaan vitamin dan zat makanan lain. Dengan demikian pemberian probiotik pada ternak unggas diharapkan akan mampu memperbaiki penampilan produksinya baik kuantitas yaitu jumlah ternak, daging atau telur yang dihasilkan lebih banyak, maupun kualitasnya yaitu produk yang sehat dan aman untuk dikonsumsi (Budiansyah, 2004).

Penggunaan probiotik dalam ransum dapat menambah jumlah populasi mikroba yang menguntungkan bagi ternak, mencegah berkembangnya mikroba yang merugikan dalam saluran pencernaan sehingga dapat meningkatkan pencernaan makanan dengan demikian pemberian probiotik dapat mengefisienkan konsumsi pakan (Murtidjo, 2003).

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai kegunaan ransum adalah melalui pemberian *feed additive*. *Feed additive* dalam unggas terdiri dari vitamin, mineral, antibiotik, kontrabiotik, dan faktor lain seperti pertumbuhan yang digunakan untuk meningkatkan performans unggas dan meningkatkan nutrisi bahan baku lokal yang digunakan (Rasyaf, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu diadakannya suatu penelitian terhadap penggunaan pakan aditif dalam penelitian ini berupa antibiotik dan probiotik untuk mengetahui pengaruh imbuhan pakan yang telah ditambahkan antibiotik dan probiotik terhadap daya cerna lemak pada broiler.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh antibiotik dan probiotik terhadap daya cerna lemak pada broiler?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antibiotik dan probiotik terhadap daya cerna lemak pada broiler.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan masyarakat mengenai manfaat antibiotik dan probiotik sebagai pakan aditif yang dapat menekan laju pertumbuhan pada broiler.
2. Sebagai data dasar atau referensi bagi mahasiswa peneliti dan lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan tentang manfaat antibiotik dan probiotik.
3. Menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan bagi perusahaan peternakan broiler di perusahaan sehingga dapat merapkan tambahan pakan antibiotik dan probiotik bagi broiler agar kualitas daging yang di jual semakin meningkat.

E. Defenisi Operasional

1. Broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging (broiler) adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam.
2. Antibiotik merupakan zat kimia khusus yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti ragi, jamur dan bakteri atau segolongan senyawa, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri.
3. Probiotik merupakan *feed additive* berupa mikroorganisme hidup yang diberikan kepada ternak yang mempunyai efek positif bagi ternak yang mengkonsumsinya.
4. Lemak adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh.

F. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga bahwa pemberian antibiotik dan probiotik dapat mempengaruhi daya cerna lemak pada broiler.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian Barton dan Hart (2001), penggunaan imbuhan pakan (*feed additive*) dalam ransum bertujuan untuk meningkatkan daya guna pakan. Penggunaan antibiotik pada ternak di beberapa negara di Eropa seperti golongan

virgiamycin, *avopracin*, *bacitracin*, *tylocin* dan *spiramycin* sudah dilarang karena adanya residu pada hasil ternak yang dapat membahayakan konsumen.

Penelitian Candinegara (2006), Penggunaan probiotik difokuskan pada peningkatan status ekologi sistem pencernaan, sehingga menguntungkan yaitu meningkatkan produktivitas, kesehatan dan perkembangan sistem pencernaan. Penggunaan probiotik diatas 2,5 cc/l air minum cenderung menurunkan performans, diduga bahwa kelebihan jumlah mikroorganisme dalam saluran pencernaan mungkin malah akan menggunakan zat nutrisi inang.

Penelitian KOMPIANG (2009), menjelaskan bahwa probiotik dapat mempengaruhi densitas dan panjang villi pada usus, luas permukaan usus untuk menyerap nutrisi lebih luas sehingga meningkatkan jumlah konsumsi ransum. Konsumsi yang meningkat berarti meningkat pula konsumsi lemak, hal ini berarti lemak yang terabsorpsi lebih banyak sehingga pencernaan lemak yang semakin meningkat.

Penelitian Tillman (2005), Lemak dalam pakan ayam broiler digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi pakan, mempertinggi palatabilitas, mencegah pemisahan bahan baku pakan, menaikkan penyerapan vitamin A dan karoten, mengangkut zat nutrisi non lemak tertentu, seperti vitamin A, D, E, dan K dan membantu penyerapan mineral-mineral tertentu, seperti kalsium. Keberadaan lemak juga dapat menyebabkan pakan menjadi cepat tengik, untuk itu perlu ditambahkan antioksidan ke dalam pakan ayam broiler.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Broiler

Broiler merupakan hasil teknologi yaitu persilangan antara ayam *Cornish* dengan *Plymouth Rock*. Karakteristik ekonomis, pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan rendah, dipanen cepat karena pertumbuhannya yang cepat, dan sebagai penghasil daging dengan serat lunak (Murtidjo, 2003). Menurut North dan Bell (1990), penambahan berat badan yang ideal 400 gram per minggu untuk jantan dan untuk betina 300 gram per minggu.

Menurut Suprijatna (2005), Broiler adalah ayam yang mempunyai sifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat ke tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Siregar *et al.* (1980) bahwa Broiler dalam klasifikasi ekonomi memiliki sifat-sifat diantaranya ukuran badan besar, penuh daging yang berlemak, temperamen tenang, pertumbuhan badan cepat serta efisiensi penggunaan ransum tinggi.

Broiler adalah ayam tipe pedaging yang telah dikembangbiakan secara khusus untuk pemasaran secara dini. Ayam pedaging ini biasanya dijual dengan bobot rata-rata 1,4 kg tergantung pada efisiensinya perusahaan. Menurut Rasyaf (2006) ayam pedaging adalah ayam jantan dan ayam betina muda yang berumur dibawah 6 minggu ketika dijual dengan bobot badan tertentu, mempunyai pertumbuhan yang cepat, serta dada yang lebar dengan timbunan daging yang banyak. Broiler merupakan jenis ayam

jantan atau betina yang berumur 6 sampai 8 minggu yang dipelihara secara intensif untuk mendapatkan produksi daging yang optimal. Broiler dipasarkan pada umur 6 sampai 7 minggu untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan permintaan daging. Broiler terutama unggas yang pertumbuhannya cepat pada fase hidup awal, setelah itu pertumbuhan menurun dan akhirnya berhenti akibat pertumbuhan jaringan yang membentuk tubuh. Broiler mempunyai kelebihan dalam pertumbuhan dibandingkan dengan jenis ayam piaraan dalam klasifikasinya, karena Broiler mempunyai kecepatan yang sangat tinggi dalam pertumbuhannya. Hanya dalam tujuh atau delapan minggu saja, ayam tersebut sudah dapat dikonsumsi dan dipasarkan padahal ayam jenis lainnya masih sangat kecil, bahkan apabila ayam broiler dikelola secara intensif sudah dapat diproduksi hasilnya pada umur enam minggu dengan berat badan mencapai 2 kilogram per ekor (Arifien, 2005).

Broiler ini baru populer di Indonesia sejak tahun 1980-an dimana pemegang kekuasaan mencanangkan penggalakan konsumsi daging ruminansia yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya. Hingga kini broiler telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia.

Broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu pertumbuhan yang cepat, konversi pakan yang baik dan dapat dipotong pada usia yang relatif muda

sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan efisien serta menghasilkan daging yang berkualitas baik (Murtidjo, 2003).

Selanjutnya Murtidjo (2003), menjelaskan bahwa ditinjau dari genetika, ayam broiler sengaja diciptakan agar dalam waktu singkat dapat segera dimanfaatkan hasilnya. Oleh karena itu, istilah broiler adalah untuk menyebut strain ayam hasil budidaya rekayasa genetika yang memiliki karakteristik ekonomis, memiliki pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan sangat irit, siap dipotong pada umur muda, serta mampu menghasilkan kualitas daging yang bersih, berserat lunak dengan kandungan protein yang tinggi. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan jumlah ataupun ukuran sel, bentuk dan berat jaringan-jaringan tubuh seperti tulang, urat daging, jantung, otak serta semua jaringan tubuh lainnya kecuali jaringan lemak dan pertumbuhan terjadi dengan cara yang teratur.

Dengan berbagai macam strain ayam ras pedaging yang telah beredar dipasaran, peternak tidak perlu risau dalam menentukan pilihannya. Sebab semua jenis strain yang telah beredar memiliki daya produktifitas relatif sama. Artinya, seandainya terdapat perbedaan, perbedaannya tidak begitu mencolok atau sangat kecil sekali. Dalam menentukan pilihan strain apa yang akan dipelihara, peternak dapat meminta daftar produktifitas atau prestasi bibit yang dijual di *poultry shop*. Adapun jenis strain ayam ras pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah super 77, tegel *hubbard*, *shaver starbro*, *pilch*, *yabro*, *goto*, *cobb 500*, *arbor arcres*, tatum, indian river, CP 707, A.A 70 dan masih banyak lagi (Nasin dan Tjetjep, 2008).

Menurut Mulyantono (2003), keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh strain Cobb adalah keunggulannya daya hidup mencapai 98 %, bobot badan mencapai 1,7 kg dalam waktu 35 hari dan konversi pakan mencapai 1,8 kg. Kelemahannya antara lain, jumlah produksi masih terbatas, penambahan bobot badan sampai umur empat minggu cenderung lambat. Broiler memiliki beberapa kelebihan yakni dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan penambahan bobot badan sangat cepat. Namun demikian, memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit, dan sulit beradaptasi (Rahmanto, 2012).

Faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai pertumbuhan broiler yang optimal adalah suhu lingkungan dan kelembaban udara yang tinggi merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya heat stress (cekaman panas). Hampir setengah dari terlambatnya pertumbuhan pada daerah dengan iklim panas, disebabkan oleh pengaruh langsung dari suhu dan kelembaban udara yang tinggi (May and Lott, 2001).

Pengembangan usaha peternakan broiler di Indonesia umumnya memiliki beberapa hambatan yang dapat berpengaruh terhadap performance diantaranya suhu lingkungan dan kelembaban yang cukup tinggi dan ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan harus sangat diperhatikan terutama dalam efisiensi penggunaan pakan yang akan berdampak terhadap nilai ekonomis dalam usaha peternakan tersebut, sedangkan suhu dan kelembaban yang relatif tinggi menyebabkan broiler menjadi sangat rawan

terhadap cekaman panas. Pada umumnya ayam akan berproduksi optimal pada zona nyamannya (comfort zone), apabila kondisi lingkungan berada di bawah atau di atas zona nyamannya, ayam akan mengalami stress (Kusnadi, 2008).

Produktivitas ayam broiler dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genetik, iklim, nutrisi dan faktor penyakit. Keunggulan ayam broiler akan terbentuk bila didukung oleh lingkungan, karena sifat genetik saja tidak menjamin keunggulan tersebut dapat timbul. Ayam broiler akan nyaman hidup dan berproduksi pada suhu lingkungan 18-21 °C. Namun kita ketahui bahwa suhu di Indonesia lebih panas sehingga memungkinkan ayam mengurangi konsumsi ransum dan lebih banyak minum. Dengan demikian, faktor ransum menyangkut kualitas dan kuantitasnya sangat menentukan terhadap produktivitas ternak. Pertumbuhan yang cepat tidak akan timbul bila tidak didukung dengan ransum yang mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang (asam amino, asam lemak, mineral dan vitamin) sesuai dengan kebutuhan ayam. Bila faktor suhu dan ransum sudah teratasi maka faktor manajemen perlu diperhatikan pula. Ayam broiler perlu dipelihara dengan teknologi yang dianjurkan oleh pembibit untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan (Abun, 2006).

Energi yang umum digunakan dalam pakan unggas adalah energi metabolisme. Tinggi rendahnya energi metabolisme dalam pakan ternak unggas akan mempengaruhi banyak sedikitnya ayam mengkonsumsi pakan. Pakan yang energinya semakin tinggi semakin sedikit dikonsumsi demikian sebaliknya bila energi pakan

rendah akan dikonsumsi semakin banyak untuk memenuhi kebutuhannya (Murtidjo, 2003).

Broiler memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan penambahan bobot badan sangat cepat. Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit dan sulit beradaptasi (Barrow, 1992).

Broiler mampu memproduksi daging secara optimal dengan hanya mengkonsumsi pakan dalam jumlah relatif sedikit. Ciri-ciri ayam broiler antara lain: ukuran 10 badan relatif besar, padat, kompak, berdaging penuh, produksi telur rendah, bergerak lamban, dan tenang serta lambat dewasa kelamin. Broiler baru dikenal menjelang periode 1980-an, sekalipun galur murninya sudah diketahui pada tahun 1960-an ketika peternak mulai memeliharanya. Akan tetapi, broiler komersial seperti sekarang ini memang baru populer pada periode 1980-an. Sebelum ayam yang dipotong adalah ayam petelur seperti ayam White leghorn jengger tunggal. Pada akhir periode 1980-an pemegang kekuasaan mencanangkan penggalakan konsumsi daging ayam untuk menggantikan atau membantu konsumsi daging ruminansia yang saat itu semakin sulit keberadaannya. Dari sinilah broiler komersial atau broiler final stock mulai dikenal dan secara perlahan mulai diterima orang (Rasyaf, 2006).

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada keberhasilan pemeliharaan broiler adalah faktor lingkungan. Lingkungan pemeliharaan yang nyaman akan mengurangi level stres pada broiler. Daya tahan tubuh broiler akan lebih baik dalam lingkungan yang tidak berdebu, cukup oksigen, temperatur dan kelembaban sesuai, dan tidak terlalu padat. Kepadatan kandang yang ideal untuk daerah tropis adalah 8-10 ekor/m², lebih dari angka tersebut, suhu kandang cepat meningkat terutama siang hari pada umur dewasa yang menyebabkan konsumsi pakan menurun, ayam cenderung banyak minum, stres, pertumbuhan terhambat dan mudah terserang penyakit. Sanitasi adalah usaha pemeliharaan dan pengawasan kebersihan secara menyeluruh yang meliputi kandang, alat, karyawan, dan bahkan ternak (Arifien, 2005).

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan broiler adalah pakan. Pakan merupakan 60-70% biaya pemeliharaan. Pakan yang diberikan harus memberikan zat pakan (nutrisi) yang dibutuhkan ayam, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, sehingga pertambahan berat badan perhari (Average Daily Gain/ADG) tinggi. Pemberian pakan dengan sistem adlibitum (selalu tersedia/tidak dibatasi). Apabila menggunakan pakan dari pabrik, maka jenis pakan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ayam, yang dibedakan menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama disebut tahap pembesaran (umur 1 sampai 20 hari), yang harus mengandung kadar protein minimal 23%. Tahap kedua disebut penggemukan (umur diatas 20 hari), yang memakai pakan berkadar protein 20%. Efisiensi pakan dinyatakan dalam perhitungan FCR (*Feed Conversion Ratio*). Cara menghitungnya

adalah, jumlah pakan selama pemeliharaan dibagi total bobot ayam yang dipanen (El-Kabumaini dan Ranuatmaja, 2008).

B. Tinjauan Al-Qur'an

1. Tinjauan Al-Qur'an tentang Unggas

Unggas adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang merupakan hewan dari keluarga burung dengan ciri memiliki sayap, berbulu, berkaki dua, memiliki paruh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Unggas merupakan hewan yang bisa diternakkan untuk diambil manfaatnya (Lopez, 2000).

Sebagaimana di jelaskan pada firman Allah swt. dalam QS Al-An'am/ 6:38 sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (Kementerian Agama RI, 2012).

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa setiap makhluk yang ada di bumi ini, termasuk makhluk jenis burung adalah ciptaan Allah seperti halnya dengan manusia. Hewan jenis burung atau unggas dapat dijadikan sebagai hewan yang di ternakkan dan dikembangbiakkan untuk diambil manfaatnya. Misalnya, telurnya, dagingnya,

bulunya, dan sebagainya. Oleh karena itu berwiraswasta dalam bidang peternakan unggas merupakan usaha yang dibenarkan oleh islam (Shihab, 2002).

Allah swt juga berfirman dalam QS Al-An'am/ 6:142 sebagai berikut:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih, makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (Kementrian Agama RI, 2012).

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa sedikitnya ada dua fungsi pada binatang ternak yaitu pertama binatang ternak sebagai alat transportasi dan alat angkut seperti kuda, sapi, dan keledai. Fungsi yang kedua yaitu binatang ternak sebagai bahan makanan (farsya). Kata farsya yang dimaknai sebagai ternak-ternak kecil karena tubuhnya hampir menyentuh dengan tanah, dan dapat disembelih yaitu seperti kambing, domba, sapi dan sebagainya (Shihab, 2002).

Sejalan dengan penafsiran yang dikemukakan dalam penjelasan di atas, maka ayam termasuk dalam kategori farsya karena dapat disembelih dan dagingnya dapat dimakan.

2. Tinjauan Al-Qur'an tentang Mikroorganisme

Mikroorganisme merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memberikan manfaat bagi makhluk lainnya. Diantara sekian banyak manfaatnya

salah satu manfaat mikroorganisme dalam bidang peternakan yaitu dijadikan sebagai campuran pakan guna meningkatkan kualitas dari hasil peternakan. Salah satu produk yang berasal dari mikroorganisme adalah probiotik. Probiotik didefinisikan sebagai suplemen makanan yang terdiri atas mikrobia hidup yang mempunyai efek menguntungkan pada inang melalui peningkatan keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan (Fuller, 1992). Hal ini di jelaskan pada firman Allah swt dalam QS An-Nahl/16:8 sebagai berikut:

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرَ لَتَرَكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya (Kementrian Agama RI, 2012).

Pada ayat ini disebutkan “dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui” menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan keberadaan bentuk-bentuk kehidupan yang manusia sebelumnya tidak ketahui. Manusia masih mengungkap ayat Al-Qur’an tentang keberadaan adanya kehidupan itu, baru kemudian setelah alat mikroskop ditemukan, manusia mulai dapat melihat dengan mata penglihatannya tentang makhluk hidup yang terkecil (Shihab, 2002).

Ayat diatas menjelaskan bahwa makhluk terkecil yang tidak kasat mata itulah yang sering disebut mikroorganisme. Tersebar diseluruh bumi, penghuni bumi ini 20 kali lebih banyak dibandingkan spesies yang masih dalam kategori binatang. Mikroorganisme ini terdiri atas bakteri, virus, jamur, alga, dan akarina (tungau dan

pinjal). Keberadaan mereka pada jajaran penghuni bumi tidak serta merta kosong tanpa jasa. Mereka termasuk unsur penting dalam kesinambungan kehidupan di bumi. Beberapa manfaat mikroorganisme misalnya dapat diambil contoh dalam bidang sains: Pertama, siklus nitrogen salah satu komponen dasar pembentukan kehidupan di bumi, peran ini dimiliki oleh bakteri. Kedua, jamur akar merupakan unsur penting dalam penyerapan mineral tanah oleh tumbuhan. Ketiga, bakteri pada lidah kita mencegah keracunan makanan yang mengandung nitrat, bahan-bahan selada, dan daging. Keempat, bakteri dan alga merupakan unsur terpenting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Dari beberapa contoh yang telah disebutkan diatas menguatkan peran serta makhluk mikroorganisme dalam kesinambungan kehidupan di bumi. Penemuan berkat hasil penelitian yang dilakukan manusia merupakan sebagian kecil ilmu Allah yang telah diberikan kepada manusia (Shihab, 2002).

C. Lemak

Lemak adalah nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi sejumlah senyawa yang terdapat di alam yang semuanya dapat larut dalam pelarut-pelarut organik tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Suatu lemak didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat dalam alam serta tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti suatu hidrokarbon atau dietil eter. Lemak adalah ester asam lemak. Biasanya zat tersebut tidak larut dalam air akan tetapi larut dalam pelarut lemak. Pelarut lemak adalah eter, chloroform, benzena, carbontetrachlorida, xylena, alkohol panas, dan aseton panas (Carr *et al.*, 2002).

Lemak disebut sebagai penyedia energi ke-2 setelah karbohidrat, oksidasi lemak akan berlangsung jika ketersediaan karbohidrat telah menipis akibat asupan karbohidrat yang rendah. Lemak juga disebut sebagai *protein sparer* karena dapat menghemat fungsi protein, hal ini terjadi karena persediaan energi telah dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak sehingga protein tetap dapat digunakan untuk fungsi utamanya sebagai zat pembangun. Lemak dianggap oleh banyak orang sebagai komponen diet yang harus dikurangi sebanyak mungkin. Akan tetapi, hal ini tidak menguntungkan bagi kesehatan karena lemak dalam jumlah tertentu, biasanya sekitar 30% dari energi total diperlukan untuk menjalankan fungsinya dalam tubuh dengan baik (Prado *et al.*, 2008).

Lemak yang terdapat dalam tubuh dapat diklasifikasikan menurut struktur kimianya ke dalam 5 grup, seperti pada tabel di bawah. Asam lemak, kelas pertama, berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Selain itu, asam lemak adalah blok pembangun dari asam lemak ini kompleks-kompleks lipid disintesis. Prostaglandin, yang dibentuk dari asam lemak tidak jenuh ganda tertentu, adalah substansi pengatur intrasel yang mengubah tanggapan-tanggapan sel terhadap rangsangan luar. Karena prostaglandin berperan dalam kerja hormon. Kelas lipid kedua terdiri dari ester-ester gliseril. Ester-ester ini termasuk pula *asilgliserol*, yang selain merupakan senyawa antara atau pengangkut metabolik dan bentuk penyimpanan asam lemak, dan *fosfolipid* yang merupakan komponen utama lipid dari membran sel *Sfingolipid*. Kelas ketiga, juga merupakan komponen membran. Mereka berasal dari alkohol lemak *sfinosin*. Sterol mencakup kelas ke empat

lipid. Derivat sterol, termasuk kolesterol, asam empedu, hormon steroid, dan vitamin D sangat penting dari segi kesehatan. Aspek-aspek metabolisme ester kolesterol yang berkaitan dengan bagian-bagian asam lemaknya. Terpen, kelas terakhir lipid, mencakup dolikol dan vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak. Derivat-derivat isoprene ini terdapat dalam jumlah kecil, tetapi mempunyai fungsi metabolik yang sangat penting dan terpisah (Tensiska, 2008).

Lemak yang di peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral, yaitu *trigliserid* (ester antara gliserol dengan 3 asam lemak). Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol, selain itu ada juga yang masih berupa *monogliserid*. Karena larut dalam air, gliserol masuk sirkulasi portal (vena porta) menuju hati. Asam-asam lemak rantai pendek juga dapat melalui jalur ini. Sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air, maka diangkut oleh miselus (dalam bentuk besar disebut emulsi) dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus (*enterosit*). Di dalam sel ini asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi *trigliserida* (lipid) dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfe dan bermuara pada vena kava, sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adipose (Mountzouris *et al.*, 2010).

Di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya asam-asam lemak dan gliserol tersebut, dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Proses pembentukan *trigliserida* ini

dinamakan *esterifikasi*. Sewaktu-waktu jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan dan disebut sebagai asam lemak bebas (*free fatty acid/FFA*). Secara ringkas, hasil akhir dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari diet maupun jika harus memecah cadangan trigliserida jaringan. Proses pemecahan trigliserida ini dinamakan lipolysis (Kompiang, 2009).

Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil KoA. Selanjutnya sebagaimana asetil KoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil KoA dari jalur inipun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Di sisi lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil KoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. Beberapa lipid non gliserida disintesis dari asetil KoA. Asetil KoA mengalami kolesterologenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya kolesterol mengalami steroidogenesis membentuk steroid. Asetil KoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi menghasilkan badan-badan keton (aseto asetat, hidroksi butirat dan aseton). Proses ini dinamakan ketogenesis. Badan-badan keton dapat

menyebabkan gangguan keseimbangan asam-basa yang dinamakan asidosis metabolik. Keadaan ini dapat menyebabkan kematian (Abrar dan Raudhati, 2006).

D. Daya Cerna

Daya cerna dapat diartikan sebagai jumlah zat makanan dari suatu bahan pakan yang diserap dalam traktus gastrointestinal. Hal tersebut menyangkut proses pencernaan yaitu hidrolisa untuk membebaskan zat-zat makanan dalam suatu bentuk tertentu sehingga dapat diserap usus. Daya cerna dapat ditentukan dengan mengukur secara teliti bahan pakan yang dikonsumsi dan feses yang dikeluarkan. Dari pengukuran yang didukung dengan analisis kimiawi zat makanan, maka dapat dihitung daya cernanya (Lindgren dan Dobrogosz, 1990).

Menurut Widyasti (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna makanan adalah:

1. Komposisi makanan, daya cerna makanan berhubungan erat dengan komposisi kimiawi, salah satunya serat kasar yang mempunyai pengaruh yang terbesar. Penambahan serat kasar dalam bahan pakan dapat menurunkan daya cerna.
2. Keseimbangan protein, jika imbang protein dalam pakan menurun akan menyebabkan bahan makanan cepat melewati saluran pencernaan, sehingga menyebabkan turunya daya cerna dari bahan pakan tersebut.
3. Perlakuan terhadap pakan, misalnya pemotongan, penggilingan dan pemanasan mempengaruhi daya cerna. Bahan yang digiling untuk pakan unggas memberikan permukaan yang lebih luas terhadap getah pencernaan, sehingga dapat mempengaruhi daya cerna pakan.

4. Jenis hewan, bahan pakan yang rendah serat kasarnya dapat dicerna dengan baik oleh hewan non-ruminansia dan hewan ruminansia. Tetapi bahan pakan yang tinggi serat kasarnya dicerna lebih baik oleh hewan ruminansia, dibandingkan dengan hewan non-ruminansia.
5. Jumlah makanan, penambahan jumlah makanan yang dimakan mempercepat arus makanan dalam usus, sehingga mempengaruhi daya cerna.

Jumlah air dalam tembolok juga mempengaruhi Bergeraknya makanan dan daya cerna pakan. Pada keadaan kekurangan air, akan terjadi penurunan kecepatan pencernaan disebabkan makanan yang berada di tembolok akan mengalami penurunan kecepatan untuk mencapai usus halus (Simon, 2005).

Kecernaan bahan pakan memiliki hubungan negatif dengan kandungan serat kasar dari bahan pakan tersebut. Semakin rendah serat kasar maka semakin tinggi kecernaan ransum (Despal, 2000). Tillman (2005), menyatakan bahwa kecernaan serat kasar tergantung pada kandungan serat kasar dalam ransum dan jumlah serat kasar yang dikonsumsi. Kadar serat kasar terlalu tinggi dapat mengganggu pencernaan zat lain. Daya cerna serat kasar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kadar serat dalam pakan, komposisi penyusun serat kasar dan aktivitas mikroorganisme (Maynard *et al.*, 2005).

Berbagai macam cara dapat dilakukan untuk meningkatkan kecernaan bahan pakan ternak, baik sebelum dikonsumsi maupun selama dalam saluran pencernaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan probiotik (Hafsah, 2003). *Effective*

Microorganisms-4 (EM-4) adalah salah satu jenis probiotik yang merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman dan ternak yang dapat digunakan sebagai inokulan untuk meningkatkan keragaman dan populasi mikroorganisme (Anggorodi, 1995).

Ransum merupakan campuran bahan ransum yang disusun untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak selama 24 jam untuk mendapatkan produksi yang optimal (Suprijatna et al., 2005). Komponen nutrisi yang harus diperhatikan untuk pemenuhan kebutuhan ayam Arab antara lain energi metabolis (EM), karbohidrat, protein kasar (PK), serat kasar (SK), lemak kasar (LK), vitamin, mineral dan air (Amrullah, 2003). Nutrisi yang dibutuhkan ternak tergantung pada variasi genetik, umur, bobot badan, aktivitas, kandungan energi ransum dan temperatur lingkungan (Wahju, 2004). Kecernaan ransum dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai suatu bahan ransum (Edey (1983) disitasi oleh Abun, 2007). Kecernaan ransum dipengaruhi oleh jenis ternak, jenis bahan ransum, jumlah ransum dan kandungan nutrisi (Lubis, 1992). Faktor lain yang mempengaruhi kecernaan adalah suhu, laju perjalanan ransum melalui pencernaan, bentuk fisik dari bahan ransum dan komposisi ransumnya (Anggorodi, 1985).

Pengukuran kecernaan dapat dilakukan secara *in vitro* dan *in vivo*. Pengukuran kecernaan secara *in vitro* dilakukan dengan membuat suasana seperti yang terjadi dalam saluran pencernaan ternak di laboratorium (Williamson dan Payne, 1993). Pengukuran secara *in vivo* terdiri dari 2 periode yaitu periode pendahuluan dan periode total koleksi. Periode pendahuluan digunakan untuk membiasakan

ternak dengan ransum perlakuan dan kondisi lingkungan yang baru serta menghilangkan sisa ransum waktu sebelumnya. Periode total koleksi adalah periode pengumpulan ekskreta sampai akhir percobaan yang kemudian dikeringkan dan dianalisis (Tillman, 1998). Jalur pengeluaran feses dan urin pada unggas menjadi satu sehingga koleksi feses dan urin dilakukan secara bersamaan sebagai koleksi ekskreta. Pengukuran pencernaan pada unggas dapat ditambahkan suatu indikator ke dalam ransum. Metode indikator merupakan pengukuran pencernaan dengan menggunakan senyawa yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan unggas seperti krom oksida, methylene blue, karmine dan barium sulfat yang ditambah ke dalam ransum (Wahju, 2004).

Laju digesta merupakan aliran digesta melalui saluran pencernaan. Laju digesta pada unggas relatif lebih cepat karena saluran pencernaan unggas pendek (Anggorodi, 1994). Laju digesta dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis ternak, umur ternak, temperatur lingkungan dan serat kasar ransum. Lama ransum berada dalam saluran pencernaan ternak unggas berlangsung ± 4 jam (Agus, 2007).

Komposisi ransum terutama kandungan serat kasar berpengaruh terhadap laju digesta (Amerah, 2007). Semakin tinggi kandungan serat kasar akan mempercepat laju digesta, semakin cepat laju digesta maka semakin singkat proses pencernaan dalam saluran pencernaan. Laju ransum terlalu singkat mengakibatkan kurangnya waktu tersedia bagi enzim pencernaan untuk mendegradasi nutrisi secara menyeluruh, sehingga menyebabkan pencernaan protein menurun (Tillman, 1998).

D. Probiotik

Probiotik berasal dari bahasa Yunani yang artinya “untuk hidup”. Probiotik didefinisikan sebagai kultur spesifik dari mikroorganisme hidup seperti *Lactobacillus* yang memberikan pengaruh menguntungkan pada ternak serta dapat berfungsi untuk memperbaiki keseimbangan mikroba di dalam saluran pencernaan ternak (Ritonga, 1992). Lebih lanjut Jin *et al.* (1998), melaporkan bahwa manfaat probiotik pada unggas adalah menempatkan mikroorganisme yang menguntungkan dan menekan mikroorganisme yang merugikan, meningkatkan aktifitas enzim-enzim pencernaan dan menekan aktifitas enzim-enzim bakteri yang merugikan, memperbaiki sistem pencernaan, menekan produksi gas amonia, dan merangsang sistem pertahanan tubuh. Probiotik didefinisikan sebagai suplemen makanan yang terdiri atas mikrobia hidup yang mempunyai efek menguntungkan pada inang melalui peningkatan keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan. Probiotik pada prinsipnya adalah memasukkan mikrobia menguntungkan kedalam saluran pencernaan, dan apabila probiotik diberikan sejak dini maka diharapkan dapat berkolonisasi pada saluran pencernaan sejak dini pula (Fuller, 1992).

Istilah probiotik pertama kali diperkenalkan oleh Parker pada tahun 1974, yang menggambarkan tentang keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan. Pada saat ternak mengalami stres, keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan terganggu, mengakibatkan sistem pertahanan tubuh menurun dan bakteri-bakteri patogen berkembang dengan cepat. Pemberian probiotik akan memberikan keseimbangan mikrobiota dalam saluran pencernaan yang mengalami perubahan

karena masuknya bakteri patogen, sehingga bakteri patogen tidak dapat ditekan populasinya melalui pengaruh antibakteri probiotik dan pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dari pakan dan menjaga kesehatan ternak (Samadi, 2002).

Sampai sekarang konsep tentang probiotik didasarkan pada terbentuknya kolonisasi mikroba yang menguntungkan yang masuk ke dalam saluran pencernaan, mencegah perkembangan bakteri patogen, netralisasi racun pada saluran pencernaan, mengatur aktivitas enzim bakteri tertentu dan menguatkan pengaruh substansi yang merangsang sintesis antibodi pada sistem kekebalan (Cruywagen *et al.*, 1996).

Pemberian mikroba hidup dalam jumlah yang cukup dapat mempengaruhi komposisi dan ekosistem mikroflora pencernaannya. Kondisi ekosistem mikroflora dalam saluran pencernaan unggas mempengaruhi untuk kinerja dan kesehatan ternak. Ketidakseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan karena terjadinya kolonisasi bakteri patogen atau mikroflora yang dapat mengganggu kinerja ternak. Sebagai bahan alternatif untuk pemacu tumbuh, probiotik dalam penggunaannya pada ternak dapat meningkatkan kinerja ternak. Hal demikian terjadi karena adanya variasi respon yang tinggi dari individual ternak terhadap jenis pakan imbuhan. Probiotik bukan bertindak sebagai nutrisi esensial dimana tidak ada dosis respon, tetapi hanya ada level batas pemakaian (Seifert dan Gessler, 1997).

Cara kerja probiotik terutama melalui modifikasi populasi bakteri usus dan efektivitasnya tergantung atas status mikroba pada satu kelompok ternak dan pada individu ternak. Dengan demikian, dapat dimengerti jika efek yang terjadi

mempunyai variasi yang tinggi. Perbedaan cara kerja dari strain probiotik sejauh ini belum dipahami, tetapi metabolit bakteri yang dihasilkan seperti asam organik khususnya pada bakteri asam laktat yang dapat menurunkan pH atau juga peroksida dan bakteriosin diperkirakan bertanggung jawab atas sifat antagonis terhadap bakteri patogen Gram positif seperti *Salmonella*. Beberapa probiotik diketahui dapat menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, protease dan lipase yang dapat meningkatkan konsentrasi enzim pencernaan pada saluran pencernaan inang sehingga dapat meningkatkan perombakan nutrisi. Terdapat beberapa mekanisme respon probiotik yaitu meliputi produksi bahan penghambat secara langsung, penurunan pH luminal melalui produksi asam lemak terbagi rantai pendek, kompetisi terhadap nutrisi dan tempat pelekatan pada dinding usus, interaksi bakterial, resistensi kolonisasi contohnya *Lactobacilli* dengan bakteri patogen, merubah respon imun, dan mengatur ekspresi gen *Colonocyte* (Fooks dan Gibson, 2002).

Probiotik memberikan efek fisiologis terhadap kesehatan di dalam pencegahan dan terapi penyakit seperti antikolesterol, antihipertensi, intoleransi laktosa, anti karsinogenik, gangguan saluran pencernaan serta alergi. Dengan memperhatikan kesehatan inangnya penambahan probiotik harus memperhatikan konsentrasi antara 10^7 - 10^{11} cfu/g per hari untuk manusia dan 10^7 - 10^9 cfu/g per hari untuk binatang, sehingga dapat berperan untuk menurunkan kadar kolesterol (Ooi dan Min-Tze, 2010).

Beberapa penelitian tentang probiotik tidak selalu mendapatkan hasil yang positif, tetapi ada yang mendapatkan hasil negatif. Perbedaan hasil penelitian tersebut

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya jenis atau strain bakteri dalam probiotik tersebut, dosis pemberian pada ternak, tingkat ketahanan bakteri terhadap kondisi yang ekstrim baik dalam saluran pencernaan ternak maupun lingkungan penyimpanan (Owings *et al.*, 1990).

Didalam saluran pencernaan baik hewan, ternak atau manusia terdapat sekitar 100 sampai 400 jenis mikroba, yang secara sederhana dikelompokkan dalam mikroba menguntungkan dan mikroba yang merugikan dan dapat menyebabkan penyakit atau mikroba patogen. Semua mikroba hidup dalam keseimbangan. Jika keseimbangan terganggu, misalnya mikroba tidak menguntungkan lebih banyak dibandingkan dengan mikroba menguntungkan, maka timbullah penyakit. Pemberian probiotik telah dikemukakan dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki keseimbangan populasi mikroba dalam saluran pencernaan hewan, dimana mikroba-mikroba yang menguntungkan populasinya lebih tinggi dari populasi mikroba yang merugikan. Pada manusia, perbandingan persentase jumlah mikroba yang baik yang dianjurkan adalah sekitar 85:15. Perbandingan tersebut tentu saja dapat dicapai dengan pemberian atau penggunaan probiotik dan prebiotik (Budiansyah, 2004).

Satu dari alasan penggunaan probiotik yaitu untuk menstabilkan mikroflora pencernaan dan berkompetisi dengan bakteri patogen, dengan demikian strain probiotik harus mencapai usus dalam keadaan hidup dalam jumlah yang cukup. Secara umum, ada beberapa karakteristik dan kriteria keamanan yang harus dimiliki oleh probiotik (Lee dan Salminen, 2009).

Bakteri yang umum digunakan sebagai probiotik yaitu *Lactobacillus* dan *Bifidobacteria*, kedua jenis bakteri ini dapat mempengaruhi peningkatan kesehatan karena dapat menstimulasi respon imun dan menghambat patogen. Satu faktor kunci dalam seleksi starter probiotik yang baik yaitu kemampuannya untuk bertahan dalam lingkungan asam pada produk akhir fermentasi secara in vitro dan kondisi buruk dalam saluran pencernaan atau in vivo. Ketahanan probiotik pada kondisi in vitro dapat dipengaruhi oleh pembentukan metabolit oleh starter seperti asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida dan bakteriosin (Saarela *et al.*, 2000).

Berbagai jenis mikroorganisme yang digunakan sebagai probiotik diisolasi dari isi usus pencernaan, mulut, dan kotoran ternak atau manusia. Pada saat ini, mikroorganisme yang banyak digunakan sebagai probiotik yaitu *strain Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Bacillus* sp, *Streptococcus*, *yeast* dan *Saccharomyces cereviceae*. Mikroorganisme tersebut harus nonpatogen. Gram positif, strain yang spesifik, anti *E. coli*, tahan terhadap cairan empedu, hidup, melekat pada mukosa usus, dan minimal mengandung 30×10^9 cfu/g (Pal *et al.*, 2006).

Lebih dari 21 bahan probiotik diijinkan penggunaannya sebagai pakan imbuhan di Uni Eropa, 13 diantaranya disahkan digunakan untuk anak babi dan hanya beberapa diantaranya untuk induk dan penggemukan babi. Tujuh dari bahan probiotik tersebut diseleksi dari strain *E. faecium* (penghuni usus pencernaan), dua strain *S. cereviceae* (dari buah-buahan) dan hanya satu produk mengandung *L. farciminis* dan *Pediococcus acidilactici* yang masing-masing penghuni usus

pencernaan dan produk susu. Konsentrasi yang direkomendasi untuk hampir semua probiotik yaitu kira-kira 10⁸ cfu/kg pakan (Simon, 2005).

Beberapa laporan menunjukkan bahwa penggunaan probiotik dapat meningkatkan laju pertumbuhan yang berhubungan dengan manfaat probiotik dapat meningkatkan nafsu makan dan menghasilkan vitamin serta enzim-enzim pencernaan. Memungkinkan probiotik tersebut dapat berperan sebagai stimulasi pertumbuhan, sehingga dapat meningkatkan pertambahan bobot badan sekaligus bobot karkas broiler (Abrar dan Raudhati, 2006).

1. Jenis-jenis Mikroba Probiotik.

a. Enterococcus sp.

Probiotik strain *Enterococcus faecalis* merupakan bakteri dengan karakteristik gram positif dan berbentuk kokus genus bakteri ini kurang dikenal karena hanya memiliki kurang dari 20 spesies. Bakteri gram positif dengan sel berbentuk seperti telur dalam bentuk tunggal, berpasangan atau rantai pendek dan tidak membentuk spora. Strain bakteri yang paling sering digunakan adalah *Enterococcus faecalis*. Pertumbuhan optimal pada suhu 35-37°C dan kebanyakan spesies dapat tumbuh pada suhu 42-45°C. bakteri ini bersifat homofermentatif yang mengubah glukosa seluruhnya menjadi asam laktat. Genus *Enterococcus* termasuk dalam kelompok mikroorganisme dikenal sebagai Bakteri Asam laktat (BAL) (De Vos, *et al.*, 2009).

Strain yang digunakan sebagai probiotik untuk manusia telah terisolasi dari saluran pencernaan manusia dan biasanya termasuk spesies *genera Lactobacillus* dan

Bifidobacterium. Namun, strain milik spesies BAL lainnya, di antaranya *Enterococci*, telah digunakan di masa lalu sebagai probiotik juga, seperti *E. faecium*, *E. faecalis*, *S. thermophilus*, *Leuconostoc mesenteroides*, *Propionibacterium freudenreichii*, *Pediococcus acidilactici*, *Sporolactobacillus inulinus*, *Bacillus cereus* dan ragi *Saccharomyces cerevisiae*. Meskipun jenis *E. faecium* dan *E. faecalis* telah diaplikasikan pada manusia, suplemen probiotik, strain *E. faecalis* juga ada dan telah banyak digunakan sebagai suplemen pakan hewan (Fuller, 1992).

Strain *Enterococci* kebanyakan digunakan sebagai nutrisi untuk babi dan unggas. Namun, tersedia pula produk farmasi yang mengandung *Enterococcus* sebagai probiotik bagi manusia dalam terapi klinis. Genus *Enterococcus* memiliki spesies yang berbeda-beda tetapi hanya dua dari mereka yang penting sebagai probiotik yaitu *Enterococcus faecium* diaplikasikan pada manusia dan hewan sementara *Enterococcus faecalis* terutama digunakan sebagai probiotik untuk manusia (Badrinon, 2010).

Enterococci terdistribusikan secara luas pada lingkungan, terutama pada sistem saluran pencernaan manusia dan hewan. *E. faecalis* sering mendominasi spesies di usus manusia, meski pada beberapa individu dan di beberapa negara *E. faecium* melebihi *E. Faecalis*. Namun, kehadiran umum *E. faecalis* pada banyak produk makanan tidak selalu berhubungan dengan kontaminasi feses (tinja) secara langsung. Pada tahun 1992, Uni Eropa menetapkan tingkat maksimum untuk kehadiran *Coliform* dan *Escherichia coli*, keduanya dianggap sebagai indikator kebersihan, sementara tidak ada batas yang ditetapkan untuk *enterococci*.

Selanjutnya, telah ditunjukkan bahwa *Enterococci* memiliki nilai yang kecil sebagai indikator kesehatan dalam industri pengolahan makanan (Ritonga, 1992).

b. Bacillus sp.

Bacillus merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, beberapa spesies bersifat *aerob obligat* dan bersifat *anaerobik fakultatif*, dan memiliki endospora sebagai struktur bertahan saat kondisi lingkungan tidak mendukung (Backman *et al.*, 1994). Menurut Fardiaz (1992), bentuk spora (endospora) *Bacillus* bervariasi bergantung pada spesiesnya. Endospora ada yang lebih kecil dan ada juga yang lebih besar dari pada diameter sel induknya. Pada umumnya sporulasi terjadi bila keadaan medium memburuk, zat-zat yang timbul sebagai pertukaran zat yang terakumulasi dan faktor luar lainnya yang merugikan.

Menurut Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, 8 th editions dalam Hadioetomo (1985), yang menyatakan bahwa klasifikasi *Bacillus* sp. adalah sebagai berikut:

Kingdom : Procaryotae

Divisi : Bacteria

Kelas : Schizomycetes

Bangsa : Eubacteriales

Suku : Bacillaceae

Marga : Bacillus

Jenis : *Bacillus* sp.

Bacillus mempunyai sifat yang lebih menguntungkan dari pada mikroorganisme lain karena dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhannya (Wong, 1994).

Spesies dari jenis *Bacillus* juga berbeda dalam sifat pertumbuhannya. Beberapa bersifat *mesofilik* misalnya *Bacillus subtilis* yang lainnya bersifat termofilik fakultatif misalnya *Bacillus coagulans* atau termofilik pada *Bacillus stearothermophilus* sering menyebabkan kerusakan pada makanan kaleng. Sebanyak 22 spesies *Bacillus* telah diidentifikasi diantaranya banyak ditemukan pada makanan. Beberapa kelompok bakteri ini menghasilkan metabolit sekunder yang dapat menekan pertumbuhan patogen (Backman *et al.*, 1994).

Bakteri *Bacillus* merupakan mikroba flora normal pada saluran pencernaan ayam. Bakteri ini adalah organisme saprofitik, berbentuk batang, Gram positif pembentuk spora nonpatogen yang biasanya ditemukan dalam air, udara, debu, tanah dan sedimen. Terdapat beberapa jenis bakteri yang bersifat *saprofit* pada tanah, air, udara dan tumbuhan, seperti *Bacillus cereus* dan *Bacillus subtilis*. Jenis-jenis *Bacillus* yang ditemukan pada saluran pencernaan ayam yaitu *Bacillus subtilis*, *Bacillus pumilus*, *Bacillus lincheniformis*, *Bacillus clausii*, *Bacillus megaterium*, *Bacillus firmus*, kelompok *Bacillus cereus* (Jawetz dan Adelberg, 2005).

Bacillus memiliki beberapa sifat yaitu, bersifat aerob fakultatif sehingga diharapkan mampu hidup dan berkembang dalam usus ternak, berspora sehingga penyimpanannya lebih sederhana, dan tetap viable pada saat proses pembuatan pakan, menghasilkan enzim pencernaan seperti protease dan amilase yang dapat membantu

pencernaan, serta memproduksi asam-asam lemak rantai pendek yang mempunyai sifat anti mikroba (Kompiang, 2009).

Genus Bacillus digunakan sebagai agen biokontrol secara luas, menghasilkan zat antimikroba berupa bakteriosin. Bakteriosin adalah zat antimikroba polipeptida atau protein yang diproduksi oleh mikroorganisme yang bersifat bakterisida. Bakteriosin membunuh sel targetnya dengan menyisip pada membran target dan mengakibatkan fungsi membran sel menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan sel lisis. *Bacillus* sp. juga diketahui menghasilkan spora dan enzim kitinase yang mampu menghambat pertumbuhan jamur patogen yaitu *Aspergillus* sp. *Bacillus* juga menghasilkan enzim yang banyak digunakan dalam industri (Batrinon, 2010). Widyasti (2003), melaporkan *Bacillus* sp. penghasil enzim α -amilase yang banyak digunakan dalam industri untuk menghidrolisis ikatan α -1,4 glikosidik pati, glikogen dan substrat sejenisnya. *Bacillus thermoglucosidasius* AF-01 memproduksi parsial protease alkali yang memiliki sifat *proteolitik* yang cukup tinggi banyak digunakan pada industri detergen dan makananan.

Berdasarkan penelitian Sofyan (2003), jumlah *Bacillus* dalam tembolok mencapai $3,2 \times 10^8$ *coloni forming unit* (cfu)/ml, dalam *ampela* menurun menjadi $2,8 \times 10^7$ *coloni forming unit* (cfu)/ml, kemudian dalam *usus halus* meningkat menjadi $8,2 \times 10^9$ *coloni forming unit* (cfu)/ml, dalam *cloaca* menurun menjadi $5,7 \times 10^7$ *coloni forming unit* (cfu)/ml, dan dalam *feses* menurun lagi menjadi $2,4 \times 10^4$ *coloni forming unit* (cfu)/ml. Dari observasi ini dapat diketahui bahwa *Bacillus* mampu

berkembang dalam saluran pencernaan ayam sehingga memenuhi salah satu kriteria sebagai probiotik

c. Lactobacillus sp.

Lactobacillus adalah golongan bakteri penghasil asam laktat, termasuk bakteri gram positif, fakultatif anaerob dan mikroaerofil. Keberadaan bakteri *Lactobacillus* merupakan indikasi lingkungan yang sehat, karena bakteri ini merupakan mikroflora normal dalam lingkungan dan saluran pencernaan makhluk hidup baik di darat maupun di air. Kemampuan metabolisme *Lactobacillus* untuk menghasilkan asam laktat dan peroksidase merupakan cara efektif bakteri ini dalam menghambat berbagai macam mikroba patogen penyebab penyakit. Sehingga bakteri *Lactobacillus* banyak dimanfaatkan sebagai probiotik yang dapat diaplikasikan langsung pada lingkungan maupun sebagai campuran pada pakan (Gaggia *et al.*, 2010).

Secara umum manfaat penambahan probiotik adalah membantu sistem pencernaan unggas, agar lebih mudah mencerna dan meningkatkan kapasitas daya cerna sehingga diperoleh zat pakan yang lebih banyak untuk pertumbuhan maupun produksi. Pada dasarnya ada dua tujuan utama dari penggunaan probiotik pada unggas, yaitu untuk manipulasi mikroorganisme saluran pencernaan bagian anterior (*crop*, *gizzard*, dan *usus halus*) dengan menempatkan mikroflora dari strain *Lactobacillus* sp. untuk meningkatkan daya tahan ternak dari infeksi *Salmonella* (Barrow, 1992). Menurut Candrasih (2001), mekanisme kerja probiotik pada saluran pencernaan ternak unggas adalah menetralkan racun, menekan populasi bakteri

tertentu yang tidak dikehendaki sebagai anti bakteri atau berkompetisi di dalam saluran pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Suplementasi probiotik dalam ransum ternyata dapat meningkatkan berat karkas dan persentase daging karkas serta dapat menurunkan jumlah lemak subkutan termasuk kulit (Sterling *et al.*, 1998).

2. Mekanisme Kerja Probiotik

Mekanisme kerja dari probiotik antara lain adalah menghasilkan asam, menurunkan pH dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, berproliferasi di dalam saluran pencernaan dan bersaing dengan bakteri patogen, dalam hal ini bersaing untuk mendapatkan nutrisi seperti karbohidrat dan bersaing untuk memperoleh tempat pelekatan pada dinding usus, mempunyai aktivitas antimikrobal. Mikroba dalam probiotik juga dapat mengatur pergerakan isi perut, menghentikan diare dan mempertinggi sistem ketahanan tubuh (Lopez, 2000).

Menurut Budiansyah (2004), mekanisme kerja dari probiotik ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melekat atau menempel dan berkolonisasi dalam saluran pencernaan Kemampuan probiotik untuk bertahan hidup dalam saluran pencernaan dan menempel pada sel-sel usus merupakan tahap pertama untuk kolonisasi dan selanjutnya memodifikasi sistem kekebalan hewan inang. Kemampuan menempel yang kuat pada sel-sel usus ini akan menyebabkan mikroba probiotik berkembang dengan baik dan mikroba patogen tereduksi dari sel-sel usus inang sehingga pertumbuhan dari mikroba patogen dapat terhambat.

- b. Kompetisi untuk memperoleh makanan dan memproduksi zat antimikroba Mikroba probiotik menghambat organisme patogen dengan berkompetisi untuk mendapatkan sejumlah substrat bahan makanan untuk difermentasi. Substrat makanan tersebut diperlukan agar mikroba probiotik dapat berkembang dengan baik. Substrat bahan makanan yang mendukung perkembangan mikroba probiotik dalam saluran pencernaan disebut prebiotik. Prebiotik ini adalah terdiri dari bahan-bahan makanan yang pada umumnya banyak mengandung serat. Sejumlah mikroba probiotik menghasilkan senyawa atau zat-zat yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan substrat bahan makanan tertentu dalam saluran pencernaan yaitu enzim. Mikroba probiotik penghasil asam laktat menghasilkan enzim selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu memecah serat kasar yang merupakan komponen yang sulit dicerna dalam saluran pencernaan unggas. Pakan ternak unggas umumnya mengandung serat kasar tinggi. Penggunaan probiotik menghasilkan enzim selulase mampu memanfaatkan makanan berserat kasar tinggi dalam proses pencernaan sehingga serat kasar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan berat badan ternak unggas.
- c. Stimulasi mukosa dan meningkatkan sistem kekebalan hewan inang Kemampuan mikroba probiotik mengeluarkan toksin yang menghambat perkembangan mikroba patogen dalam saluran pencernaan, merupakan suatu kondisi yang dapat meningkatkan kekebalan hewan inang. Toksin-toksin yang dihasilkan tersebut merupakan antibiotika bagi mikroba-mikroba patogen, sehingga penyakit yang

ditimbulkan oleh mikroba patogen tersebut berkurang atau dapat hilang atau sembuh dengan sendirinya. Hal ini dapat memberikan keuntungan terhadap kesehatan hewan inang sehingga tahan terhadap penyakit. Meski jumlah bakteri probiotik melimpah dalam saluran pencernaan, probiotik tidak membahayakan, bahkan sebaliknya. Karena probiotik tidak memakan sel-sel dinding pencernaan, baik yang masih hidup maupun sel yang sudah mati. Probiotik hanya memakan zat makanan yang tidak bisa dicerna seperti inulin. Tidak hanya sekedar tidak mengganggu, keberadaan probiotik ternyata menghadirkan manfaat besar bagi manusia maupun hewan. Pasalnya, probiotik mampu mencegah munculnya infeksi pada saluran pencernaan, terutama yang disebabkan bakteri jahat. Tidak seperti probiotik, bakteri jahat memang potensial merugikan manusia maupun hewan. Ini disebabkan bakteri jahat hidupnya dengan cara memakan sel dinding pencernaan yang mati maupun masih hidup. Akibatnya, dinding saluran pencernaan bisa terinfeksi dan bocor (Siregar, 1980).

Prinsip kerja probiotik yaitu memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia maupun hewan. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi dari hasil perombakan molekul kompleks (Medicinus, 2009).

Ashayerizadeh *et al.*, (2009), menyatakan bahwa *Lactobacillus* merupakan salah satu spesies probiotik yang banyak digunakan pada ayam broiler selain *Streptococcus*, *Bacillus*, *Bifidobacterium*, *Enterococcus*, *Aspergillus*, *Candida*, dan *Saccharomyces*. Zhang *et al.*, (2003), menambahkan bahwa *Lactobacillus* yang dinonaktifkan dengan panas dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan imunitas sel tubuh ayam broiler.

Menurut Sari, (2013), *Lactobacillus* merupakan mikroba utama yang terdapat dalam saluran pencernaan ayam broiler. Didalam saluran pencernaan, mikroba tersebut mampu menghasilkan asam laktat dan asam asetat yang membuat pH di sekitarnya berkisar antara 4-5. Namun, bakteri asam laktat tersebut mampu tumbuh pada suasana asam tanpa adanya oksigen. Bakteri asam laktat, terutama *Lactobacillus*, sangat bervariasi (lebih dari 150 spesies) dengan aktifitas katabolik yang berbeda. Boguta *et al.*, (2014), mengingat pentingnya peranan bakteri asam laktat ini, isolasi telah dilakukan dari berbagai sumber baik dari saluran pencernaan manusia sampai tanah maupun sisa-sisa hasil pembusukan tanaman.

Jenis ragi seperti *Saccharomyces cereviceae* (Sc) adalah probiotik yang telah diproduksi secara komersial. Efek nutrisi Sc sebagai probiotik yaitu dengan dihasilkannya enzim protease dan amilase serta sumber vitamin B. *Saccharomyces cereviceae* selain berfungsi sebagai probiotik juga dapat berperan mengikat Zn anorganik menjadi Zn organik. Mineral seng (Zn) merupakan mineral esensial untuk semua ternak termasuk manusia dan berperan penting dalam proses fisiologi. Mineral seng terdistribusi 75–85% di eritrosit, 12–22% di plasma dan 3% di lekosit. Sepertiga

Zn plasma berikatan dengan albumin serum, berikatan dengan globulin dan fraksi kecil dengan kompleks histidin dan sistein (Samadi, 2004).

Meski jumlah bakteri probiotik melimpah dalam saluran pencernaan, probiotik tidak membahayakan, bahkan sebaliknya. Karena probiotik tidak memakan sel-sel dinding pencernaan, baik yang masih hidup maupun sel yang sudah mati. Probiotik hanya memakan zat makanan yang tidak bisa dicerna seperti inulin. Tidak hanya sekedar tidak mengganggu, keberadaan probiotik ternyata menghadirkan manfaat besar bagi manusia maupun hewan. Peralnya, probiotik mampu mencegah munculnya infeksi pada saluran pencernaan, terutama yang disebabkan bakteri jahat. Tidak seperti probiotik, bakteri jahat memang potensial merugikan manusia maupun hewan. Ini disebabkan bakteri jahat hidupnya dengan cara memakan sel dinding pencernaan yang mati maupun masih hidup. Akibatnya, dinding saluran pencernaan bisa terinfeksi dan bocor (Siswono, 2002).

Seng berhubungan dengan beberapa sistem enzim, sebagai metaloenzim, aktivator enzim juga dalam struktur biologis, berfungsi sebagai kofaktor lebih dari 100 enzim dalam tubuh yang berperan dalam metabolisme protein, karbohidrat dan lemak. Mineral Zn juga esensial untuk sintesis protein, integritas membran sel, pemeliharaan DNA dan RNA, perbaikan dan pertumbuhan jaringan, penyembuhan luka, produksi prostaglandin, mineralisasi tulang, fungsi tiroid, dan pembekuan darah. defisiensi Zn menyebabkan kegagalan sintesis DNA (Soesanto, 2002).

Sejumlah mikroba probiotik menghasilkan senyawa atau zat-zat yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan substrat bahan makanan tertentu

dalam saluran pencernaan yaitu enzim. Mikroba probiotik penghasil asam laktat menghasilkan enzim selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu memecah serat kasar yang merupakan komponen yang sulit dicerna dalam saluran pencernaan unggas. Pakan ternak unggas umumnya mengandung serat kasar tinggi. Penggunaan probiotik menghasilkan enzim selulase mampu memanfaatkan makanan berserat kasar tinggi dalam proses pencernaan sehingga serat kasar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan berat badan ternak unggas. Peran probiotik Sc dan mineral Zn dalam pakan secara bersama-sama diharapkan dapat menekan mikroorganisme patogen, meningkatkan laju metabolisme dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan utilitas nutrisi untuk pertumbuhan ayam broiler yang lebih baik (Fuller, 2015).

E. Antibiotik

Pemeliharaan broiler dengan menggunakan antibiotik dalam campuran pakan dapat menyebabkan residu dalam daging ayam. Hal tersebut disebabkan antibiotik yang diberikan tidak disekresikan dengan sempurna sehingga masih terdapat residu yang disimpan dalam daging broiler. Antibiotik yang sering dicampur ke dalam pakan adalah *Bacitracin*, *kuramicin*, *higromicin*, *kolistin*, *kiamisin*, *spiramisin*, *tiamulin*, *virginiamisin*, *aviamisin*, *flavomisin* dan *tetrasiklin* (Lindgren dan Dobrogosz, 1990).

Antibiotik adalah komponen kimia yang diproduksi secara biologis oleh tumbuhan atau mikroorganisme terutama fungi, mempunyai sifat bakterostatik atau bakteriosidal (Leeson dan John, 2000). Tempat utama aktivitas antibiotika adalah

dalam bagian gastrointestinal. Beberapa macam antibiotik yang dapat dicampurkan ke dalam ransum antara lain *bacitracin*, *colistin*, *oxytetracycline*, *kitasamycin* dan *spiramycin*. Antibiotik umumnya digunakan sebagai pengobatan terhadap infeksi bakteri, namun demikian penggunaan antibiotik dalam dosis rendah dapat menimbulkan pengaruh pemacu pertumbuhan (*growth promotor*). Antibiotik dengan dosis rendah juga digunakan untuk meningkatkan performa dan kesehatan saluran pencernaan misalnya *bambermycin* atau *flavophospholipol*. Sedangkan antibiotik dengan konsentrasi tinggi digunakan untuk pengobatan suatu penyakit atau beberapa penyakit (Napitulu *et al.*, 1997).

Menurut Budiansyah (2004) cara kerja antibiotik adalah sebagai berikut:

1. Menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang memproduksi toksin diantaranya menghalangi atau membunuh mikroorganisme yang menimbulkan infeksi subklinis dan yang bersaing dengan induk semang dalam menyediakan nutrisi.
2. Meningkatkan kapasitas daya serap usus, hal tersebut berdasarkan pada pengamatan bahwa pemberian antibiotik menyebabkan dinding usus menjadi tipis sehingga daya serap usus akan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh semakin 22 meningkat. Penggunaan antibiotik memiliki efek antara lain Antibiotik dapat mencegah penyakit terutama dalam saluran pencernaan, Antibiotik dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menghasilkan amonia dalam jumlah besar.

3. Antibiotik dapat meningkatkan penyerapan nutrisi (kalsium, fosfor dan magnesium) dan menghambat kerusakan nutrisi (vitamin dan asam amino) oleh mikroorganisme.
4. Antibiotik dapat meningkatkan kemampuan absorpsi zat makanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum (Leeson dan John, 2000).

Beberapa efek yang mungkin timbul pada manusia akibat residu antibiotik, antara lain alergi, menyebabkan gangguan kulit, kardiovaskuler, traktus gastrointestinalis, berupa diare dan sakit perut serta urtikaria dan hipotensi. Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah kesehatan baru bagi manusia juga menyebabkan keresahan terhadap konsumsi produk daging ayam. Bukan hanya masalah kadar kolesterol yang tinggi dalam kandungan daging ayam tetapi juga akan timbul masalah jika manusia mengonsumsi daging ayam yang mengandung residu antibiotik. Oleh karena itu, dewasa ini masyarakat terutama di negara Eropa, mulai menghindari penggunaan antibiotika sebagai imbuhan pakan (Mountzouris *et al.*, 2010)

F. Bakteri Asam Laktat (BAL)

Bakteri asam laktat berperan meningkatkan kadar keasaman dalam usus halus (ileum), oleh karena itu dapat meningkatkan absorpsi kalsium. Kalsium dalam ransum pada anak ayam yang sedang tumbuh sebagian dipergunakan untuk pembentukan tulang, sedangkan pada ayam dewasa dipergunakan untuk kulit telur, pembentukan kulit telur memerlukan pemasukan ion-ion kalsium dan ion-ion

karbonat dengan jumlah yang cukup dalam uterus untuk membentuk kalsium karbonat (Anggorodi, 1995).

Pembentukan kulit telur memerlukan ion kalsium yang cukup ke kelenjar kulit telur/kerabang dan adanya ion karbonat dalam cairan kelenjar kerabang untuk membentuk kalsium karbonat. Pada unggas yang mulai memproduksi telur estrogen dilepaskan dari ovarium dalam jumlah besar dan dapat meningkatkan kadar kalsium dalam darah, kemudian kalsium disimpan dalam sumsum tulang kemudian akan dikeluarkan kembali untuk pembentukan telur. Jumlah kalsium yang disimpan tidak ada hubungannya dengan jumlah kalsium yang diberikan pada unggas selama periode pertumbuhan. Kekurangan kalsium pada hewan unggas akan menyebabkan pertumbuhan terhambat, nafsu makan hilang dan secara bertahap terjadi penurunan produksi baik produksi ayam pedaging maupun produksi telur (Tilman, dkk, 2001).

Phosphor dibutuhkan dalam jumlah besar dan mempunyai fungsi lebih banyak dibandingkan dengan mineral lainnya dalam tubuh unggas antara lain dipergunakan untuk pembentukan tulang, keseimbangan asam-basa tubuh, metabolisme protein, karbohidrat, lemak, pengaturan asam basa, pertumbuhan kerangka, aktivitas vitamin dan enzim serta untuk pengangkutan kalsium dalam pembentukan telur (Sumadi, 2004).

Bakteri asam laktat adalah bakteri yang pada metabolisme karbohidrat dapat membentuk asam laktat. Bakteri ini bersifat gram positif, tidak berspora, katalase negatif, tidak membentuk sitokrom, anaerob tetapi aerotolerans, toleran terhadap asam serta mempunyai kemampuan fermentasi sempurna. Bakteri asam laktat

mempunyai enzim β -galactosidase, glycolase dan lactat dehydrogenase (LDH) yang menghasilkan asam laktat dari laktosa (Ooi *et al.*, 2010).

Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan bakteri Gram positif yang berbentuk batang atau bulat, tidak membentuk spora, fermentasi fakultatif anaerob, tidak mempunyai sitokrom, tidak memiliki kemampuan untuk mereduksi nitrat dan memanfaatkan laktat, oksidasi negatif, katalase negatif, motilitas negatif dan kemampuan memfermentasi glukosa menjadi asam laktat Berdasarkan taksonomi, terdapat sekitar 20 genus bakteri yang termasuk BAL. Beberapa BAL yang sering digunakan dalam pengolahan pangan adalah *Aerococcus*, *Bifidobacterium*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Oenococcus*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Tetragenococcus*, *Vagococcus*, dan *Weissella* (Carr *et al.*, 2002).

Bakteri probiotik atau bakteri baik adalah Bakteri Asam Laktat (BAL) yang hidup di dalam usus, bersimbiosis dengan mikroflora usus yang mampu melawan bakteri patogen di dalam usus, oleh karena itu pemberian probiotik dapat berpengaruh menguntungkan bagi kesehatan. Sebagian besar jenis bakteri pada probiotik berasal dari *Lactobacillus* atau *Bifidobacterium* (Zhang *et al.*, 2003).

Penambahan probiotik harus memperhatikan konsentrasi antara 10^7 - 10^9 cfu/g per hari untuk binatang. Karakterisasi Bakteri Asam Laktat (BAL) yang dapat digolongkan kedalam bakteri probiotik adalah diketahui sebagai materi yang tidak berbahaya, dapat hidup selama dilakukan proses dan penyimpanan, memiliki

efek antagonis terhadap bakteri patogen, toleran terhadap asam lambung, getah pankreas dan cairan empedu serta mampu melindungi epitelium inangnya (Velez, 2007).

Genus bakteri yang tergolong kepada bakteri asam laktat adalah *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Propionibacterium* yang mempunyai potensi untuk digunakan sebagai probiotik (Nettles dan Barefoot, 2007).

Tabel 1. Beberapa Mikroorganisme yang Berperan sebagai Probiotik

<i>Lactobacillus</i>	<i>Bifidobacteria</i>	<i>Enterococcus</i>	<i>Streptococcus</i>
<i>L. acidophilus</i>	<i>B. adolescentis</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>S. termhopilus</i>
<i>L. brevis</i>	<i>B. animalis</i>	<i>E. faecium</i>	
<i>L. casei</i>	<i>B. bifidum</i>		
<i>L. curvatus</i>	<i>B. breve</i>		
<i>L. fermentum</i>	<i>B. infantis</i>		
<i>L. gasseri</i>	<i>B. longum</i>		
<i>L. johnsonii</i>	<i>B. thermophilum</i>		
<i>L. reuteri</i>			
<i>L. rhamnosus</i>			
<i>L. salivarius</i>			
<i>Propionibacterium</i>	<i>Yeast</i>	<i>Other</i>	
<i>P. freudenreichii</i>	<i>Kluyveromyces</i>	<i>Leunococcus</i>	
<i>P. freudenreichii</i>	<i>Lactis</i>	<i>Mesenteroides</i>	
<i>Subs. thermanii</i>	<i>Saccharomyces</i>	<i>Pediococcus</i>	
<i>P. jensenii</i>	<i>Boulardii</i>	<i>Acidilactici</i>	
	<i>Saccharomyces</i>		

Cerevisiae

Sumber: Baffoni et., al. (2010)

Produk fermentasi BAL salah satunya adalah asam organik. Asam organik ini dihasilkan selama proses fermentasi terkait spesies organisme, gabungan kultur dan kondisi pertumbuhan. Asam organik mampu menurunkan pH dan berfungsi untuk tidak memutus beberapa ikatan molekul sehingga memiliki kemampuan aktivitas mikroba. Penurunan pH mampu menghasilkan Minimum Inhibitory Concentration (MIC), sehingga asam laktat dapat menghambat kerja *Clostridium tyrobutyricum*, *E. coli*, *Enterobacter sp* dan *Propionibacterium freudenreichii sp* (Lindgren dan Dobrogosz, 1990).

Menurut Food and Agriculture Organization/World Health Organization (FAO/WHO) (2001), idealnya strain probiotik seharusnya tidak hanya mampu bertahan melewati saluran pencernaan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam saluran pencernaan, tahan terhadap cairan lambung dan cairan empedu dalam jalur makanan yang memungkinkan untuk bertahan hidup melintasi saluran pencernaan dan terkena paparan empedu. Selain itu probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel usus, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat anti mikroba (bakteriosin Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, dan tahan terhadap proses psikokimia pada makanan (Piva *et al.*, 2004).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada 8 Desember 2017 sampai dengan 27 Januari tahun 2018, bertempat di kandang unggas, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dilanjutkan di Laboratorium Ilmu Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat-alat seperti cutter, cawan, ember, gelas ukur, kandang litter, lampu pijar 60 watt, oven, tabung reaksi, tempat pakan gantung, tempat air minum manual, talenan untuk pemeliharaan broiler, timbangan analitik dan timbangan manual.

Bahan yang digunakan yaitu antibiotik *Zink Bacitracin*, Probiotik multi strain, broiler umur satu hari atau *Day old chick* (DOC) sebanyak 36 ekor dengan jenis kelamin campuran (*unsexed*), gula merah, tali rafia, kantong plastik dan probiotik.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 3 ekor broiler sehingga terdapat 36 unit percobaan dengan perlakuan (P) yaitu:

$P_0 =$ Ransum basal + kontrol

$P_1 =$ Ransum basal + Probiotik 1,5 ml/hari (1-35 hari).

$P_2 =$ Ransum Basal + Antibiotik 0,1 g/hari (1-35 hari).

$P_3 =$ Ransum Basal + Antibiotik 0.1 g/hari (1-21 hari) + Probiotik 1,5 ml/hari (22-35 hari).

2. Persiapan dan Pemeliharaan Broiler

Persiapan yang dilakukan sebelum pemeliharaan broiler yaitu:

a. Kandang

Kandang terlebih dahulu disiapkan sebelum DOC (*Day Old Chick*) di masukkan, persiapan kandang dilakukan secara matang dan dilakukan pemasangan tirai serta pembersihan dan *sterilisasi* disekitar kandang dengan cara penyemprotan desinfektan atau deterjen dan alat-alat yang akan digunakan dan tunggu sampai kering. Setelah itu ditaburi sekam dengan ketebalan 7 cm, tempat pakan dan luas unit kandang yang digunakan 75 x 100 cm. Persiapan dipelihara dari DOC sampai umur 35 hari dengan kandang yang beri alas sekam. Perlakuan diberikan pada ayam sejak umur 1 hari sampai panen. Jumlah ayam perlakuan sebanyak 36 ekor dipilih secara acak dan dimasukkan ke dalam kandang yang

telah disekat-sekat dengan bambu masing-masing 3 ekor. Setiap sekat-sekat kandang dilengkapi dengan lampu pijar 60 watt sebanyak 15 buah.

b. Ransum dan Air minum

Pemberian pakan dilakukan beberapa jam setelah DOC minum (3-4 jam setelah DOC minum) pemberian pakan dan air minum dilakukan secara *ad libitum* (terus-menerus) dan dalam pemberiannya itu harus dalam keadaan bersih dan segar dan ransum tersebut telah dicampurkan dengan antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 gr/hari dan probiotik multi strain 2 ml/hari yang pemberiannya dilakukan sesuai dengan perlakuan yang dilakukan selama 35 hari.

Adapun bahan penyusun ransum yang digunakan pada penelitian ini yaitu jagung 58%, polard 6%, tepung ikan 10%, kacang kedelai 9%, dedak 4%, bungkil kelapa 3%, MBM 9% dan premix 1%. Kandungan nutrisi ransum pada penelitian ini yaitu protein 20.2724%, energi metabolisme 3026.46 kkal/kg, lemak kasar 6.8991%, serat kasar 3.4895%, kalsium 1.6518% dan posfor 1.0532% (SNI, 2006).

3. Proses Perhitungan Daya Cerna Lemak

Setelah proses pemeliharaan, pada akhir penelitian dilakukan pengambilan sampel tiap perlakuan berupa feses tiap objek penelitian (broiler) untuk diamati di laboratorium dengan metode perhitungan pencernaan sebagai berikut:

- a. Timbang \pm 1 gram sampel
- b. Masukkan kedalam tabung reaksi berskala 15 ml
- c. Tambahkan chloroform mendekati skala 10 ml

- d. Tutup rapat kemudian kocok dan biarkan bermalam
- e. Himpitkan hingga skala 10 ml dengan chloroform
- f. Lalu kocok kembali
- g. Saring dengan kertas saring kedalam tabung reaksi
- h. Pipit 5 ml kedalam cawan yang telah diketahui beratnya (a gram)
- i. Ovenkan pada suhu 100oC selama 4 jam
- j. Keluarkan lalu masukkan ke dalam eksikator ½ jam
- k. Kemudian timbang (b gram)

Perhitungan :

$$\% \text{ Kadar Lemak} = \frac{P \times (b - a)}{\text{Berat Sampel}} \times 100\%$$

P = Pengenceran (10/5)

E. Parameter yang Diukur

Daya cerna lemak yang dilakukan setelah proses pemeliharaan, pada akhir penelitian dilakukan pengujian daya cerna lemak pada tiap objek penelitian (broiler). Pengamatan terhadap daya cerna lemak dengan cara mengetahui data konsumsi pakan yang telah ditambahkan antibiotik dan probiotik dan menimbang feses yang dikeluarkan.

Metode untuk pengukuran kecernaan nutrisi tergantung dari prosedur teknik pengumpulan sampel. Metode yang paling sederhana untuk koleksi isi ileal dengan membunuh unggas atau alternatif lain dengan membuat *cannula ileal* (Kim, 2010). Metode cannulation dilakukan dengan menyisipkan cannula pada terminal ileum, cara ini lebih sulit dibandingkan menyembelih ayam dan

mengambil seluruh isi ileum. Metode koleksi digesta ileum dengan cara pemuaasaan ayam selama 14 jam, pemberian pakan uji selama 8 jam, setelah itu ayam disembelih. Digesta diambil dari usus halus bagian ileum, yaitu setelah 1 cm dari *Meckel's diverticulum* hingga batas 1 cm sebelum *ileo-cecal junction*. Digesta ileum dikumpulkan, dibekukan, dan disimpan pada suhu -20 °C sampai siap dianalisis (Adedokun *et al.*, 2008).

Menurut Anggorodi (1990) mengenai metode perhitungan daya cerna lemak yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Daya Cerna Lemak} = \frac{(\sum A \times \% B) - (\sum C \times \% D)}{(\sum A \times \% B)} \times 100$$

Keterangan:

A = Konsumsi ransum

B = % Zat makanan dalam ransum (Lemak)

C = Jumlah feses

D = % Zat makanan dalam feses (Lemak)

Rumus ini digunakan untuk mengukur daya cerna lemak pada broiler mulai dari konsumsi ransum, zat makanan dan penimbangan akhir feses sehingga dapat mengetahui nilai daya cerna lemak yang ada pada broiler tersebut. Pengukuran pencernaan lemak atau nilai cerna suatu bahan pakan dapat menentukan jumlah nutrien dari suatu bahan pakan yang didegradasi dan diserap dalam saluran pencernaan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisa sidik ragam. Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan uji wilayah berganda Duncan untuk melihat perbedaan terhadap setiap sampel perlakuan. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).

Menurut Steel (1991) model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dari pemberian antibiotik dan probiotik ke-j

μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke-i

ϵ_{ij} = Galat

i = P0, P1, P2, P3, P4, P5 (Perlakuan)


j = 1,2,3, (Ulangan)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian selama 35 hari yang mencakup pemberian antibiotik dan probiotik terhadap daya cerna lemak pada broiler yang di sajikan pada Gambar 1 dibawah ini.



Keterangan: P0 = Ransum basal (Kontrol), P1 = Ransum basal + Probiotik 1,5 ml/hari, (1-35 hari), P2 = Ransum basal + Antibiotik 0,1 g/hari, (1-35 hari), P3 = Ransum basal + Antibiotik 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik 1,5 ml/hari, (22-35 hari)

Gambar 1: Daya Cerna Lemak Kasar

Hasil sidik ragam daya cerna lemak kasar disajikan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata ($P > 0.05$) terhadap daya cerna lemak pada broiler. Rata-rata daya cerna lemak yang diperoleh dalam

penelitian ini yaitu P_0 (93.43 ± 3.17) P_1 (79.52 ± 10.43) P_2 (94.59 ± 2.75) dan (P_3 87.60 ± 6.86).

B. Pembahasan

Secara statistik antibiotik dan probiotik tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$) pada daya cerna lemak namun dilihat dari setiap perlakuan P_1 cenderung lebih baik dari perlakuan lainnya hal ini disebabkan karena level pemberian probiotik sebanyak 1,5 ml/hari dari umur 1-35 hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Piliang (1990), yang menyatakan bahwa nilai pencernaan normal pada ayam broiler untuk lemak kasar adalah 75-80%. Dari data tersebut nilai rata-rata dari P_2 (94,59%) yang diberikan Ransum basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-35 hari) menunjukkan bahwa nilai daya cerna lemak yang paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Sedangkan nilai rata-rata daya cerna lemak yang terendah adalah P_1 (79,51%) dari semua perlakuan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Soeparno (1998), yang menyatakan bahwa penggunaan *feed additiv* antibiotik (bahan pakan tambahan) Mempunyai daya cerna lemak yang tinggi disebabkan karena lemak digunakan sebagai sumber energi utama dan meningkatnya lemak sebagai sumber energi pada broiler yang mendapat beban kerja mencerna serat akan menyebabkan meningkatnya air metabolik yang dihasilkan karena oksidasi lemak yang menghasilkan air metabolik yang lebih tinggi ketimbang karbohidrat.

Pengaruh yang tidak nyata pada pemberian antibiotik dan probiotik terhadap daya cerna lemak ($P > 0,05$). Hal ini mungkin disebabkan oleh penyediaan ransum, bentuk pakan, yang diberikan pada broiler serta dosis pemberian antibiotik dan probiotik. Hal ini sesuai dengan pendapat Donald (2002),

menyatakan bahwa tinggi rendahnya pencernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis ternak, bentuk pakan, macam bahan pakan dalam ransum, dan cara penyediaan ransum.

Penggunaan probiotik dalam ransum ternyata dapat meningkatkan daya cerna sehingga nutrisi lebih banyak diserap oleh tubuh untuk pertumbuhan maupun produksi. Hal ini dapat mengurangi pembuangan nutrisi yang tidak tercerna dalam ekskreta. Pemberian probiotik menyebabkan penurunan pH pada saluran pencernaan, sehingga bakteri patogen berkurang dan bakteri baik akan bertambah. Pemberian protein kasar ransum yang tepat jika dikombinasikan dengan penambahan probiotik diharapkan dapat meningkatkan pencernaan nutrisi (protein, lemak dan serat kasar) dan meningkatkan pemanfaatan nutrisi dalam tubuh. Meningkatnya pencernaan serat kasar, lemak kasar dan protein kasar dapat meningkatkan energi metabolis, karena nutrisi tersebut merupakan penghasil energi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kompang (2009) yang menjelaskan bahwa probiotik sebagai mikroba hidup atau spora yang dapat hidup atau berkembang dalam usus, dan dapat menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil metabolitnya. Probiotik dapat mempengaruhi densitas dan panjang villi pada usus, luas permukaan usus untuk menyerap nutrisi lebih luas sehingga meningkatkan jumlah konsumsi ransum.

Penentuan pencernaan dilakukan juga untuk mengetahui seberapa besar zat-zat yang terkandung dalam makanan ternak yang dapat diserap untuk kebutuhan pokok, pertumbuhan dan produksi. Menurut Tillman (2005), pencernaan dapat diartikan banyaknya atau jumlah proporsional zat-zat makanan yang ditahan atau diserap

oleh tubuh. Zat makanan yang terdapat di dalam feses dianggap zat makanan yang tidak tercerna dan tidak diperlukan kembali. Kecernaan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemberian pakan, spesies hewan, kandungan lignin bahan pakan, defisiensi zat makanan, pengolahan bahan pakan, pengaruh gabungan bahan pakan, dan gangguan saluran pencernaan. Daya cerna dipengaruhi juga oleh suhu, laju perjalanan makanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan makanan, komposisi ransum, dan pengaruh terhadap perbandingan dari zat makanan lainnya.

Daya cerna adalah bagian nutrisi pakan yang tidak diekskresikan dalam feses. Daya cerna didasarkan atas suatu asumsi bahwa nutrisi yang tidak terdapat di dalam feses adalah habis dicerna dan diabsorpsi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukaryana dkk (2011), yang menyatakan bahwa kecernaan dapat diartikan banyaknya atau jumlah proporsional zat-zat makanan yang ditahan atau diserap oleh tubuh. Zat makanan yang terdapat dalam feses dianggap zat makanan yang tidak tercerna dan tidak diperlukan kembali. Kecernaan suatu bahan pakan merupakan pencerminan dari tinggi rendahnya nilai manfaat dari bahan pakan tersebut. Apabila kecernaannya rendah maka nilai manfaatnya rendah pula ataupun sebaliknya apabila kecernaannya tinggi maka nilai manfaatnya tinggi pula.

Persentase kecernaan dalam penelitian ini yang tinggi menunjukkan mekanisme kerja antibiotik dan probiotik lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeharsono (2010), yang menyatakan pemberian probiotik juga dapat berdampak positif pada berat badan dan konversi pakan ayam pedaging. Konversi

pakan dapat menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran terhadap efisiensi penggunaan pakan.

Penggunaan dosis antibiotik dan probiotik juga sangat berpengaruh pada daya cerna lemak. Dosis yang digunakan pada penelitian dari perlakuan P1, P2 dan P3 yaitu antibiotik 0,1 g/hari dan probiotik multi strain 1,5 ml/1 liter air. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Halimnatsir (2006), yang menggunakan probiotik cair dengan dosis yaitu sebanyak 0,2%/1 liter air perhari dan ada pengaruh. Hal ini juga didukung oleh pendapat Dhika (2005), yang dalam penelitiannya menggunakan probiotik dan prebiotik dengan dosis 2 ml dapat meningkatkan daya cerna dan akhirnya dapat meningkatkan pertambahan bobot badan ayam pedaging.

Penggunaan antibiotik diatas 13 hari dan probiotik dosis 1,5cc/1 liter air minum cenderung menurunkan daya cerna dan peformans, diduga bahwa lamanya penggunaan antibiotik dan dosis probiotik yang hanya 1,5cc/1 liter air dalam saluran pencernaan mungkin malah akan menggunakan zat nutrisi inang. Hal ini sesuai pendapat Mulyantini (2010), menyatakan bahwa pemberian antibiotik sebaiknya dihentikan 13 hari sebelum ayam dipotong

Dalam penelitian tersebut bentuk pakan yang digunakan adalah dengan melalui pencampuran secara manual. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Nawawi (2011), yang menyatakan bahwa bentuk pakan yang baik untuk broiler yaitu bentuk pellet dan crambel sebab broiler memiliki palatabilitas yang tinggi dalam memilih makanannya sehingga meningkatkan kecernaannya.

Dalam saluran pencernaan lemak dan minyak akan lebih lama berada didalam lambung dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, demikian juga proses penyerapan lemak yang lebih lambat dibandingkan unsur lainnya. Oleh karena itu makanan yang mengandung lemak mampu memberikan rasa kenyang yang lebih lama dibandingkan dengan makanan yang kurang atau tidak mengandung lemak. Hal ini sejalan dengan penelitian Mahardika (1996), yang menyatakan bahwa lemak digunakan sebagai sumber energi utama terutama pada periode kerja yang lama dan protein akan segera digunakan bila beban kerja terus ditingkatkan dan meningkatnya lemak sebagai sumber energi pada broiler yang mendapat beban kerja mencerna serat akan menyebabkan meningkatnya air metabolik yang dihasilkan karena oksidasi lemak menghasilkan air metabolik lebih tinggi ketimbang karbohidrat.

Pemberian probiotik menyebabkan penurunan pH pada saluran pencernaan, sehingga bakteri patogen berkurang dan bakteri baik akan bertambah. Pemberian protein kasar ransum yang tepat jika dikombinasikan dengan penambahan probiotik diharapkan dapat meningkatkan pencernaan nutrisi (protein, lemak dan serat kasar) dan meningkatkan pemanfaatan nutrisi dalam tubuh. Meningkatnya pencernaan serat kasar, lemak kasar dan protein kasar dapat meningkatkan energi metabolis, karena nutrisi tersebut merupakan penghasil energi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kompang (2009) yang menjelaskan bahwa probiotik sebagai mikroba hidup atau spora yang dapat hidup atau berkembang dalam usus, dan dapat menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil metabolitnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan antibiotik dan probiotik tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap daya cerna lemak kasar pada broiler yang dipelihara selama 35 hari. Walaupun demikian, pemberian antibiotik dan probiotik dari perlakuan P_1 (79,52%) yang diberikan Ransum basal + Probiotik 1,5 ml/hari, (1-35 hari), cenderung lebih baik terhadap nilai daya cerna lemak pada broiler.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai level pemberian antibiotik dan probiotik yang tepat agar diketahui konsentrasi yang optimal dalam meningkatkan daya cerna lemak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifien, M. 2005. *Rahasia Sukses Memelihara Ayam Broiler di Daerah Tropis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Abun. 2006. *Nutrisi Ternak Unggas dan Monogastrik*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Adedokun. 2008. *Analisis Kecernaan Unggas*. Yogyakarta: Tesis. FPS. UGM.
- Abrar, A. dan Raudhati, E. 2006. *Produktivitas dan Aktivitas Mikroba Saluran Pencernaan Ayam Broiler yang Diberi Probiotik*. Palembang: Penelitian DIK-S. Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
- Ahmad dan Elfawati. 2006. *Performans Ayam Broiler yang Diberi Sari Buah Mengkudu (*Morinda citrifolia*)*. Jurnal Peternakan, Vol. 5 (1) Februari 2008 (10-13). Pekanbaru-Riau: Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Agus, A. 2007. *Membuat Pakan Ternak Secara Mandiri*. Yogyakarta: PT Aji Parama.
- Amerah, A. M., V. Ravindran, R. G., Lentle and D. G. Thomas. 2007. Feed Particle Size : Implication On The Digestion and Performance of Poultry. *J. World's Poultry. Sci.* 63 : 439-453.
- Amrullah, I. K. 2003. *Nutrisi Ayam Broiler*. Bogor: Lembaga Satu Gunung budi.
- Ashayerizadeh, A., N. Dabiri, O. Ashayerizadeh, K.H. Mirzadeh, H. Roshanfekar and M. Mamooee. 2009. Effect of Dietary Antibiotic, Probiotic and Prebiotic As Growth Promoters, On Growth Performance, Carcass Characteristics and Hematological Indices of Broiler Chickens. *Pakistan Journal of Biological Science.* 12: 52- 57.
- Anggorodi, H. R. 1995. *Nutrisi Aneka Ternak Unggas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 1985. *Ilmu Makanan Ternak Unggas*. Jakarta: Kemajuan Mutakhir. Universitas Indonesia Press.
- Backman, P. A., Brannen, P. M. dan Mahaffe, W. F. 1994. Plant Response and Disease Control Following Seed Inoculation With *Bacillus* Sp. In: Ryder,

- M. H., Stephens, P. M., Bowen, G. P. editor. Improving Plant Productivity Wih Rhizosphere Bacteria. Australia: Pruc Third Int Work PGPR Souh.
- Boguta, A.M., Bringel, F., Martinussen, J., and P.R. Jensen. 2014. Screening of Lactic Acid Bacteria For Their Potential As Microbial Cell Factories For Bioconversion Of Lignocellulosic Feedstock. *Microbial Cell Factories*, 13: 97. Cole, D.J.A. 1991. The Role of The Nutritionist in Designing Feed For The Future in Feed Industry. T.P. Lyons (ed). Proceeding of Altech's. Seventh Annual Symposium. Altech Technical Publication. Nicholasville Kentucky:1-2.
- Barrow, P. A. 1992. Probiotics for Chickens. London: Chapman and Hall.
- Batrinon, A. 2010. The Use of Lactic Acid Bacteria in Probiotic Bacteria. Thei of Athena.
- Barton, M. D. & W. S. Hart. 2001. Public Health Risks: Antibiotic Resistance– Review- Asian-Australia. *J. Anim. Sci.* 14 (3): 414-422.
- Budiansyah, A. 2004. *Pemanfaatan Probiotik dalam Meningkatkan Penampilan Produksi Ternak Unggas*. Bogor: Program Pascasarjana IPB.
- Candrasih, N. N. K. dan I.G.N.G. Bidura. 2001. *Pengaruh Penggunaan Cangkang Kakao yang Disuplementasi Ragi Tape dalam Ransum terhadap Penampilan Itik Bali*. *Majalah Ilmiah Peternakan*. Vol 4 (3): 67-72.
- Carr E.G, Dunlap G, Horner R.H, Koegel R.L, Turnbull A.P, Sailor W. 2002. Positive Behavior Support: Evolution Of An Applied Science. *Journal of Positive Behavior Interventions*. 4:4–16.
- Cruywagen, C.W., Jordaan. and Venter. 1996. Effect of *Lactobacillus Acidophilus* Suplementation of Milk Replacer on Prewaning Performance of Calves. *J. Dairy Science*. 79: 483-486.
- Despal. 2000. *Kemampuan Komposisi Kimia dan Kecernaan In vitro dalam Mengestimasi Kecernaan In vivo*. *Media Peternakan*. 23 (3): 84 – 88).
- De Vos P., Garrity, Jones, Krieg, Ludwig, Rainey, Scleifer. dan Witman. 2009. *Bergey's Manual of Systematic Bacteria Second Edition*. London: New York Springer Dordrecht Heidelberg.
- Dhika. 2005. *Feed Addiktive pada Unggas*. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- El-Kabumaini, N. dan Ranuatmaja. T.S. 2008. *Yuk, Beternak Ayam Pedaging dan Petelur*. Bandung: PT. Puri Pustaka.
- Fardiaz, S. 1992. *Mikrobiologi Pangan 1*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fooks, L.J. and Ghibson, G.R. 2002. In-Vitroinvestigation of the Effect of Probiotics and Prebiotics on Selectedhuman Intestinal Pathogens. *Fems Microbiol. Ecol* 39:67–75.
- Fuller, R.1992. *Probiotics the Scientific Basis*. London: Chapman and Hall.
- Gaggia, F., Attarelli, M. and Iavati, B. 2010. Probiotic and Prebiotics in Animal Feeding for Safe Food Production. *Intl. J. Food Microbiol* .14: 515–528.
- Hadioetomo, R. S. 1985. *Mikrobiologi Dasar-Dasar Praktik*. Jakarta: Gramedia.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam.
- Halimnatsir. 2006. *Antibiotik dan Probiotik*. IPB Bogor: Program Pasca Sarjana.
- Jawetz, M. dan Adelberg, S. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran*. Edisi 1. Salemba Medika, Jakarta: Hal 205-212.
- Jin, J. Z., Abdullah, N., Ali, M. A. dan Jalaludin S. 1998. Effect of Adherent Lactobacillus Cultures on Growth, Weight of Organs and Intestinal Micloflora and Volatile Fatty Acids in Broiler. *Anim Feed Sci*. Vol 70 (3): 197-209.
- Kompiang, I P. 2009. *Pemanfaatan Mikroorganisme Sebagai Probiotik untuk Meningkatkan Produksi Ternak Unggas di Indonesia*. *J. Pengembangan Inovasi Pertanian*. Vol 2 (3): 177-191.
- Kim. 2010. *Metode Untuk Pengukuran Kecernaan Nutrien Pada Unggas*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Kusnadi, R. 2008. *Jenis-jenis Tanah Indonesia*.<http://zahiosofie.wordpress.com>, (Diakses 14 Oktober 2016).
- Kementrian Agama RI. 2012. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam.
- Lubis, D. A. 1992. *Ilmu Makanan Ternak*. Jakarta: PT Pembangunan.

- Lindgren, S.E. dan W.J. Dobrogosz. 1990. Antagonistic Activities Of Lactic Acid Bacteria In Food And Fermentation FEMS Microbial. *Journal of Science*. 87 : 149
- Lesson, S and John. D. 2000. *Pengaruh Penggunaan Ampas Tahu Terhadap Efisiensi Penggunaan Protein oleh Ayam Pedaging*. Jurnal Ilmiah. Semarang. Mc Nitt, J.L. 1983. *Livestock Husbandry techniques*. Granada Publishing.
- Lee, Yuan Kun, Salminen S. 2009. *Handbook of Probiotics and Prebiotics*. Second Edition. John Wiley and Sons Inc. Canada: Hoboken New Jersey.
- Lindgren, S.E. dan W.J. Dobrogosz. 1990. Antagonistic Activities Of Lactic Acid Bacteria In Food And Fermentation FEMS Microbial. *Journal of Science*. Vol 87 : 149.
- Lopez, J. 2000. Probiotics in Animal Nutrition. Dept. De zootecnia, Universidia de Federal RGS. Brazil : Porto Alergre 9000 1-970.
- May, J.D. dan Lott, B. D. 2001. Relating Weight Gain and Feed: Gain of Male and Female Broilers to Rearing Temperature. *Poultry Sci*. Vol 80 (44): 581-584.
- Medicinus. 2009. *Bakteri Probiotik Meningkatkan Imunitas Tubuh*. Bandung. Vol.22, No.3.
- Murtidjo, B.A. 2003. *Pedoman Beternak Ayam Broiler*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyantono, 2003. Sulitnya Mencari Bibit Favorit. *Majalah Poultry Indonesia*. Hal: 25-27.
- Mulyantini, I.M. 2010. *Kajian Terhadap Beberapa Antibiotika Sebagai Feed Additive Dalam Ransum Ayam Broiler*. Tesis. FPS. UGM: Yogyakarta.
- Mountzouris, K. C., P. Tsirtsikos, I. Palamidi, A. Arvaniti, M. Mohnl, G. Schatzmayr and K. Fegeros. 2010. Effects Of Probiotic Inclusion Levels In Broiler Nutrition On Growth Performance, Nutrient
- Napitupulu, N. R. A., Kanti, T., Yuliner, Y. R., Hardiningsih. dan Julistiono, H. 1997. DNA Plasmid Lactobacillus Asal Makanan Fermentasi Tradisional yang Berpotensi dalam Pengembangan Sistem Inang Vektor untuk Bioteknologi Pangan. *Jurnal Mikrobiologi Tropis*. Hal 91-96.
- Nasin, L dan Tjetjep, S. 2008. *Yuk Beternak Ayam Pedaging dan Petelur*. Bandung: PT. Puri Pustaka.

- Nettles, C.G and Barefoot. 2007. Biochemical and Genetic Characteristic of Lactic Acid Bakteria, *J. Food Prot.* Vol 56 : 338-356
- Nawawi. 20011. *Ilmu Nutrien Unggas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- North, M. O. and Bell, D. D. 1990. Commercial Chicken Production Manual. 4th Edition. Van Nostrand. Reinhold, New York.
- Ooi, L.G. and Min-Tze. 2010. Cholesterol-Lowering Effects of Probiotics and Prebiotics: A Review of in Vivo and in Vitro Findings. *Int. J. Mol. Sci.* Vol. 11: 2499-2522.
- Owings, W. J., Reynolds, D.L., Hasiak, R. J. and Ferket, R. 1990. Influence of Dietary Supplementation With Streptococcus Faecium M-74 on Broiler Body Weight, Feed Conversion, Carcass Characteristics and Intestinal Microbial Colonization. *Poult. Sci.* Hal 1257-1264.
- Pal, A., Ray, L. and Chattopadhyay, P. 2006. Purification and Immobilization of an Aspergillus Terreus Xylanase: Use of continuous fluidized column reactor. *Ind. J. Biotechnol.* 5: 163–168.
- Piva, G. and F. Rossi. 2004. Possible alternatives to the use of antibiotics as growth promotors. *New Addit ives. CIHEAM-Opt ion Mediterraneennes.* p:83-106.
- Prado, F. C., J. L. Parada, A. Pandey, and C. R. Soccol. 2008. Trends In NonDairy Probiotic Beverages. *Food Res. Int.*41:111-123
- Piliang, W. G. Djojosebagio, S. 1990. *Metabolisme Lemak, Protein dan Serat Kasar*. Bogor: Fisiologi Nutrisi I. Institut Pertanian Bogor Press.
- Rasyaf, M. 2006. *Beternak Ayam Broiler*. Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya.
- Ritonga, H. 1992. *Beberapa Cara Menghilangkan Mikroorganisme Patogen*. *Majalah Ayam dan Telur.* Hal 24-26.
- Rahmanto, 2012. *Sruktur Histologik Usus Halus dan Efisiensi Pakan Ayam Kampung dan Ayam Broiler*. S2 Thesis. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Samadi, 2002. *Penggunaan Probiotik Sebagai Pengganti Antibiotika dalam Pakan Ternak*. (Online). <http://www.google.co.id>. Diakses 14 Oktober 2016.

- Suprijatna, E., Atmomarsono dan Kartasudjana. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Soesanto, I. R. H. 2002. *Pemilihan Bibit DOC*. Bogor: Fakultas Politeknik Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Saxelin, M .1997. Lactobacillus GG – a Human Probiotic Strain with Thorough Clinical Documentation. *Food Rev Int*. Vol. 13: 293–313.
- Seifert, H.S.H. and F. Gessler. 1997. Continous oral application of probiotic *B.cereus* an alternative to prevention of enteroxamia. *Anim. Research and Develop*. 46: 30-38.
- Simon, O. 2005. *Micro-organism as feed additives probiotics*. *Advances in Pork Production* 16: 161–167.
- Soeharsono, 2010. *Probiotik Basis Ilmiah, Aplikasi, dan Aspek Praktis*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Sukaryana Y, Atmomarsono U, Yuniyanto VD, Supriyatna E. 2011. *Peningkatan Nilai Kecernaan Protein Kasar dan Lemak Kasar Produk Fermentasi Campuran Bungkil Inti Sawit dan Dedak Padi Pada Broiler*. *JITP*. 1(3):167-172.
- Soeparno. 1998. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sofyan, O. 2003. *Kajian Probiotik AB (Aspergillus niger dan Bacillus sp) Sebagai Imbuhan Ransum dan Implikasi Efeknya Terhadap Mikroflora Usus Serta Penampilan Produksi Ayam Petelur*. Disertasi. Bandung: Program pascasarjana UNPAD.
- Sterling, K. G., Harter, J. M., Estienne, M. J. and Mcelwain, K. V. 1998. Effect of Enzyme Addition In Pelleted Vs. Mash Barley Based Diets For Broilers. *Abstract American Society of Animal Science Northeast Section*. Hal 76-81.
- Suprijatna, E. U., Atmomarsono. dan Kartasudjana, R. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Saarela, M., Mogensen, R., Fonde , J. Matto and Sandholm, T.M. 2000. Probiotic Bacteria: Safety, Functional and Technological Properties. *J Biotechnol* .84(2000):197 –215

- Shihab, M. Q. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sari, M.L., Abrar, A., dan Merint. 2013. *Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Pada Usus Ayam Broiler*. *Agripet*: 1: 43-48.
- Samadi. 2004. Feed Quality for food Safety, kapankah di Indonesia. *J. Inovasi* 2(16) : 33 - 35.
- Siregar, A. P. 1980. *Tehnik Berternak Ayam Pedaging di Indonesia*. Jakarta : Merdie Group.
- Tensiska, 2008. *Serat Makanan*. www.pustaka.unpad.ac.id/14006/ (Diakses 03 Juli 2017).
- Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusuma & S. Lebdosoekojo. 2001. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tillman, A. D., S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo dan S. Lebdosoekojo. 2005. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Velez, M.P. 2007. Identification and Characterization of starter Lactic Acid Bacteria and Probiotics from Columbian Dairy Products. *Journal of Applied Microbiology*, ISSN 1364-5072 Wick, M., and Marriot, N.G., 1999. The Relationship of The Sarcomeric Architecture to Meat Tenderness. The Ohio State University. Columbus.
- Wahju, J. 2004. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Widyasti, E. 2003. Isolasi Bacillus spp. *Penghasil α -Amilase Ekstraseluler dan Penentuan Suhu Serta pH Optimum Pertumbuhan*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Wong, P. T. W. 1994. Bio-Control of Wheat Take-All In The Field Using Soil Bacteria and Fungi. in: Ryder, M. H., Stephens, P. M., Bowen, G. P. editor. *Improving Plant Productivity Wih Rhizosphere Bacteria*. Pruc Third Int Work PGPR Souh, Australia.
- Zhang, H.H., Cao, Y.C., Bi, Y.Z., Hu, W.F., and X. Fang. 2003. The effects of heat-killed Lactobacillus preparation on the immunity of broiler chickens. *Veterinary Medicine*. 35:14–15. (In Chinese, abstract in English).

Lampiran 1: : Uji anova: Single Factor Pengaruh Pemberian Antibiotik dan Probiotik Terhadap Daya Cerna Lemak Pada Broiler


Descriptives

Daya_cerna _Lemak	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Mini mum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
					0	3		
1	3	79.52 00	10.4307 0	6.022 17	53.6087	105.431 3	69.16	90.02
2	3	94.59 33	2.75348	1.589 72	87.7533	101.433 3	91.47	96.67
5	3	87.60 33	6.85537	3.957 95	70.5736	104.633 0	79.73	92.25
Total	12	88.78 75	8.39097	2.422 27	83.4561	94.1189	69.16	96.67
Mo Fixed del Effects			6.58362	1.900 53	84.4049	93.1701		
Rando m Effects				3.446 98	77.8177	99.7573		

ANOVA

Daya_cerna_Lemak

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	427.741	3	142.580	3.290	.079
Within Groups	346.752	8	43.344		
Total	774.493	11			




Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Ket: Proses Pembersihan Kandang



Ket: Proses Pembuatan Sekat-sekat Kandang



Ket: Antibiotik dan Probiotik yang digunakan



Ket: Vaksin Yang Digunakan



Ket: Pencampuran Probiotik di Air Minum



Ket: Pemberian Vaksinasi



Ket: Penimbangan dan pencampuran pakan



Ket: Pemotongan dan pengambilan feses



Ket: Uji Analisis Laboratorium

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ismawati biasa dipanggil ismha, di lahirkan di Dusun To'uwe Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang pada tanggal 12 Desember 1996. Penulis Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, hasil buah cinta dari pasangan Sonda dan Hasmawati. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN No 167 Buntu Dama' Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Alla, lulus pada tahun 2011. Selanjutnya melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah atas di SMAN 1 Alla, lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan dan diterima di UIN Alauddin Makassar dengan jalur SPAN PTKIN untuk program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar pada tahun 2014.