

**ANALISIS KANDUNGAN ZAT GIZI BISKUIT CRACKERS TULANG IKAN
TUNA (*Thunnus sp*) SEBAGAI ALTERNATIF PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

OLEH :

**KARLINDA
70200113084**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
UIN MAKASSAR**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Kandungan Zat Gizi Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna (*Thunnus sp*) sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat", yang disusun oleh Karlinda, NIM: 70200113084, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 M, bertepatan pada 20 Ramadhan 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata- Gowa, 4 Juni 2018 M
20 Ramadhan 1439 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Azriful, SKM., M.Kes.	(.....)
Pembimbing I	: Syarfaini, SKM., M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: Emmi Bujawati, SKM., M.kes.	(.....)
Penguji I	: A.Syamsiah Adha, S.Gz. M.PH.	(.....)
Penguji II	: Dr. Wahyuddin, G., M.Ag.	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karlinda
NIM : 70200113084
Tempat/Tgl.Lahir : Bilonga / 29 Agustus 1994
Jurusan/ Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Gizi
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Strata 1 (S1)
Alamat : Taman Zarindah Tamarunang Blok F No 16
Judul Penelitian : Analisis Kandungan Zat Gizi Biskuit Crackers Tulang ikan Tuna (*Thunnus Sp*) Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 03 April 2018

Penyusun

Karlinda
70200113084

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *subhanahu Wa Ta'ala* karena atas nikmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan teladan umat manusia.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, kesempurnaan sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. Berbagai keterbatasan dan kekurangan yang hadir dalam skripsi ini merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis memberanikan diri mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, banyak hambatan yang penulis hadapi. Namun berkat doa dan dorongan dari orang-orang terdekat khususnya kedua orang tua tercinta, Bapak H. Zainuddin dan Ibu Hj. Hasnah, serta adik yang tersayang yang telah menjadikan jalan panjang yang penulis lalui terasa lebih lapang dan mudah.

Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Dr. dr. Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Azriful, SKM., M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
4. Emmi Bujawati, SKM, selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Pembimbing I yang tercinta Hj. Syarfaini, SKM., M.Kes dan Ibu Emmi Bujawati, SKM., M.Kes. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu A.Syamsiah Adha, S. Gz. M.PH selaku Penguji Akademik, dan Bapak Dr. Wahyudin, G. M.Ag selaku Penguji Keislaman, yang telah memberikan saran dan kritik yang sangat bermanfaat demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan

di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Para staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang juga sangat membantu.

8. Para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi, serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh petugas Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, Laboratorium Kimia Uin Alauddin Makassar, Balai Besar Hasil Industri perkebunan dan para dosen jurusan tata boga UNM yang senantiasa membimbing dan bersedia meluangkan waktu bersama peneliti.
10. Teman-teman Dimension 2013, khususnya Jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat.
11. Teman-teman terdekat yang selama ini membantu.
12. Seluruh Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, kakak-kakak senior maupun adik-adik junior, terima kasih atas persaudaraannya.
13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini mempunyai banyak kekurangan. Olehnya itu segala kritik dan saran penyusun nantikan demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Akhirnya, penyusun berharap semoga hasil penelitian ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan dapat member manfaat bagikita semua.

Makassar, 31 Maret 2018

Penyusun

Karlinda
NIM : 70200113084



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL/ILUSTRASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional dan RuangLingkup Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Zat Gizi	21
B. Tinjauan Umum Tentang Ikan Tuna	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tulang Ikan Tuna	45
D. Tinjauan Umum Tentang Kandungan Gizi Tulang Ikan Tuna.....	46
E. Tinjauan Umum Tentang Biskuit	47
F. Tinjauan Umum Tentang Uji Organoleptik	51
G. Kerangka Konsep	56
H. Rancangan Penelitian	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	67
B. Pendekatan Penelitian.....	67

C. Objek Penelitian	69
D. Metode Pengumpulan Data	70
E. Instrumen Penelitian.....	70
F. Organoleptik	80
G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen	85
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	86
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	87
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL/ILUSTRASI

Gambar 2.1	Tuna Madidihan (Thunnus Albacores)	37
Gambar 2.2	Tuna Mata Besar (Thunnus Obesus).....	38
Gambar 2.3	Albakora (Thunnus Alalunga)	39
Gambar 2.4	Tuna Sirip Biru	40
Gambar 2.5	Ikan Cakalang	42
Gambar 2.6	Skema Proses Pembuatan Tepung Tulang Ikan Tuna.....	48
Gambar 2.7	Skema Proses Pembuatan Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna	58
Gambar 2.8	Kerangka Konsep.....	63
Gambar 2.9	Rancangan Penelitian.....	64
Gambar 4.1	Histogram Uji Kadar Abu Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna.....	86
Gambar 4.2	Histogram Uji Kadar Karbohidrat Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna	86
Gambar 4.3	Histogram Uji Kadar Protein Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna.....	87
Gambar 4.4	Histogram Uji Kadar Lemak Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna	87
Gambar 4.5	Histogram Uji Kadar Kalsium Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna... ..	88
Gambar 4.6	Histogram Uji Kadar Zat Besi Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna... ..	88
Gambar 4.7	Histogram Uji Kadar Vitamin A Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna	89
Gambar 4.8	Histogram Uji Kadar Zat Gizi Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna	90
Tabel 1.1	Keterangan Penilaian Mutu Hedonik Terhadap Warna, Aroma, Tekstur dan Rasa.....	12
Tabel 1.2	Interval Presentase dan Kriterion Kesukaan	12
Tabel 2.1	Daftar kebutuhan Karbohidrat dalam tubuh manusia Kelompok Umur Kebutuhan Karbohidrat	24

tabel

Tabel 2.2	Daftar kebutuhan Protein dalam tubuh manusia Kelompok Umur Kebutuhan Protein.....	26
Tabel 2.3	Daftar kebutuhan Lemak dalam tubuh manusia Kelompok Umur Kebutuhan Lemak	28
Tabel 2.4	Daftar kebutuhan kalsium dalam tubuh manusia Kelompok Umur Kebutuhan kalsium.....	31
Tabel 2.5	Daftar kebutuhan Zat Besi dalam tubuh manusia Kelompok Umur Kebutuhan Zat Besi	33
Tabel 2.6	Daftar kebutuhan Vitamin A dalam tubuh manusia Kelompok Umur Kebutuhan Vitamin A	35
Tabel 2.2.1	Klasifikasi Ikan Tuna (Thunnus Albacores)	36
Tabel 2.4.2	Komposisi Nilai Gizi Ikan Tuna	46
Tabel 2.6.3	Syarat Mutu Biskuit	50
Tabel 2.6.4	Kandungan Gzi Tepung Terigu.....	51
Tabel 2.4.5	Komposisi Margarin Kandungan Gizi	53
Tabel 2.6.6	Komposisi Gula Kandungan Gizi	54
Tabel 2.6.7	Komposisi Garam Kandungan Gizi	55
Tabel 3.1	Keterangan Penilaian Mutu Hedonik Terhadap Warna, Aroma, Tekstur dan Rasa	79
Tabel 3.2	Tingkat Penilaian Mutu Hedonik	79
Tabel 3.3	Tingkat Penerimaan Mutu Konsumen	80
Tabel 3.4	Interval Persentase dan Kriteria Kesukaan	83
Tabel 4.1	Keterangan Penilaian Mutu Hedonik Terhadap Warna, Aroma, Tekstur, dan Rasa	91

Tabel 4.2	Uji Mutu Hedonik Dalam Biskuit Crackers Tulang ikan Tuna (Thunus sp).....	91
Tabel 4.3	Uji Over All Mutu Hedonik Dalam Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna	92
Tabel 4.4	Uji Hedonik Dalam Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna.....	93



DAFTAR LAMPIRAN

1. Resep Formulasi Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna
2. Lembar Score Sheet Mutu Hedonik
3. Lembar Score Sheet Hedonik
4. Master Tabel SPSS
5. Hasil Pengolahan Data SPSS
6. Hasil Uji Laboratorium
7. Dokumentasi Penelitian
8. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
9. Surat Izin Penelitian dari BKPMU UPT-PPT Provinsi Sulawesi Selatan
10. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Balai Laboratorium Kesehatan Makassar
11. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar
12. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar

**ANALISIS KANDUNGAN ZAT GIZI BISKUIT CRACKERS TULANG
IKAN TUNA (*Thunnus Sp*) SEBAGAI ALTERNATIF
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**

¹Karlinda ²Syarfaini ³Emmi Bujawati

^{1,2}Bagian Gizi Jurusan Kesehatan Masyarakat, UIN Alauddin Makassar

²Bagian Epidemiologi Jurusan Kesehatan Masyarakat, UIN Alauddin Makassar
(karlindalynda@gmail.com)

ABSTRAK

Biskuit crackers tulang ikan tuna merupakan salah satu produk diversifikasi pangan lokal akan potensi sumber daya alam khususnya pemanfaatan tulang ikan tuna. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui kandungan zat gizi (Abu, Karbohidrat, Protein, Lemak, Kalsium, Zat Besi (fe) dan Vitamin A) pada biskuit crackers tulang ikan tuna dan uji organoleptik biskuit tersebut. Jenis rancangan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dan pendekatan penelitian eksperimentatif dengan desain true-eksperimen. Metode yang digunakan untuk perlakuan tulang ikan tuna dengan perbandingan kelompok kontrol 1:0, kelompok eksperimen 0:1, 1:1, 1:3 dan 3:1. Hasil penelitian biskuit crackers tulang ikan tuna formulasi 1:0, 0:1, 1:1, 1:3 dan 3:1 berturut-turut yaitu abu (1,12%, 43,24%, 16,71%, 6,8%, 42,67%), karbohidrat (43,87%, 13,71%, 28,35%, 39,85%, 14,05), protein (8,55%, 4,04%, 8,54%, 9,25%, 4,38%), lemak (30,27%, 21,87%, 27,07%, 18,06%, 27,25%), kalsium (1,49%, 17,82%, 7,04%, 2,22%, 17,35%), zat besi (1,180ug/g, 1,717ug/g, 1,495ug/g, 1,275ug/g, 1,316), dan vitamin A (0,79ug/g, 0,77ug/g, 0,85ug/g, 1,13ug/g, 0,93ug/g). Uji hedonik terbaik terdapat pada formulasi 1:0, 1:1, 1:3 dan 3:1 sedangkan uji mutu hedonik dengan kriteria agak baik pada formulasi 1:0. Uji Friedman $p < 0,05$ terhadap warna, aroma, tekstur, rasa dan mutu *overall*. Jadi disarankan bagi masyarakat agar dapat membuat biskuit crackers tulang ikan tuna untuk menjadi makanan layak konsumsi sebagai makanan tambahan guna memenuhi kebutuhan zat gizi perharinya.

Kata Kunci : Biskuit Crackers, Tulang ikan tuna, Kandungan gizi biskuit crackers tulang ikan tuna, Uji organoleptik

**THE ANALYSIS OF NUTRITIONAL CONTENT OF TUNA FISH BONE
(*Thunnus Sp*) CRACKERS AS AN ALTERNATIVE FOR THE
COMMUNITY NUTRITIONAL IMPROVEMENT**

¹Karlinda²Syarfaini³Emmi Bujawati

^{1,2}Nutrient Division of Public Health Department, UIN Alauddin Makassar

²Epidemiology Division of Public Health Department, UIN Alauddin Makassar
(karlindalynda@gmail.com)

ABSTRACT

The tuna fish bone crackers is one of the local food diversification products which is the potential of natural resources, particularly the utilization of tuna fish bones. The study is aimed at identifying the nutrient contents (Ash, Carbohydrate, Protein, Fat, Calcium, Iron (Fe) and Vitamin A) of the tuna fish bone crackers and the organoleptic test of the crackers. It is a complete randomized design (RAL) research using an experimentative research approach with true-experimental design. The method applied for treating the tuna fish bone is with a ratio of 1:0 controlled group, experimental group 0:1, 1:1, 1:3 and 3:1. The results of the study on tuna fish bone crackers are the formulation of: 1:0, 0:1, 1:1, 1:3, and 3:1 respectively namely ash (1.12%, 43.24%, 16.71%, 6.8%, 42.67%), carbohydrates (43.87%, 13.71%, 28.35%, 39.85%, 14.05%), protein (8.55%, 4.04%, 8.54%, 9.25%, 4.38%), fat (30.27%, 21.87%, 27.07%, 18.06%, 27.25%), calcium (1.49%, 17.82%, 7.04%, 2.22%, 17.35%), iron (1.180ug/g, 1.717ug/g, 1.495ug/g, 1.275ug/g, 1.316ug/g), and vitamin A (0.79ug/g, 0.77ug g, 0.85ug/g, 1.13ug/g, 0.93ug/g). The best hedonic test is in the formulation of 1:0, 1:1, 1:3 and 3:1, while the hedonic quality test with the rather good criteria is in the 1:0 formulations. The Friedman test is $p < 0.05$ on color, flavour, texture, taste and overall quality. It is, therefore, recommended for people to make the tuna fish bone crackers be the food worthy of consumption as an additional food to meet the nutrient needs per day.

Keywords : *Crackers Biscuit, Tuna Fish Bone, Nutritional Content of Tuna Fish Bone Crackers, Organoleptic Test*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produksi perikanan Indonesia hingga triwulan III tahun 2015 mencapai 14,79 juta ton. Produksi tersebut merupakan kontribusi dari produksi perikanan tangkap mencapai 4,72 juta ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 10,07 juta ton. Produksi perikanan tangkap dihasilkan dari produksi perikanan tangkap di laut mencapai 4,39 juta ton dan produksi perikanan tangkap umum mencapai 325 ribu ton. Apabila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014, produksi perikanan Indonesia hingga triwulan III tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,36%, dengan perincian produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 0,94% dan produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan sebesar 3,98% (Krisna Fery Rahmantya dkk, 2015:35-36).

Untuk komoditas perikanan tangkap ikan tuna mengalami pertumbuhan produksi dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2015 sebesar 27,22% dengan rata-rata produksi sebesar 79 ribu ton. Pertumbuhan yang paling signifikan untuk komoditas ikan tuna adalah tuna albakor, mendidihang, tuna sirip biru dan tuna mata besar. Albakor mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari triwulan I hingga triwulan III, hal tersebut ditunjukkan melalui perbandingan nilai standar deviasi produksi dengan nilai rata-rata produksi masing-masing 68,58% dan 18,38% (Krisna Fery Rahmantya, dkk, 2015:36).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, (2014) mengenai produksi perikanan laut yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa ikan tuna pada triwulan I sebesar 250 kw, triwulan II sebesar 288 kw, triwulan III sebesar 416 kw, dan triwulan IV sebesar 3.376 kw, jadi jumlah keseluruhan produksi perikanan laut yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sulawesi Selatan adalah 4.730 kw.

Ikan merupakan sumber protein hewani dimana protein ikan mempunyai nilai biologis tinggi dan meskipun tiap jenis ikan angka biologisnya berbeda. Tingkat penerimaan seseorang terhadap ikan sangat tinggi, karena ikan memberikan rasa yang khas yaitu gurih, warna dagingnya kebanyakan putih, jaringan pengikatnya halus sehingga enak dimakan (Hadiwiyoto, 1993 dalam Yogi, 2012).

Ikan tuna merupakan salah satu ikan ekonomis penting. Ikan tuna pada umumnya dimanfaatkan untuk produksi pengalengan dan pembekuan. Produk beku dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk *loin* beku. Produk ikan tuna beku sebagian besar hanya memanfaatkan daging ikannya saja, sedangkan sisa-sisa pemanfaatan lain berupa kepala, sirip dan tulang belum dimanfaatkan secara optimal. Saat ini kepala, sirip dan tulang hanya dibuat tepung ikan (Nurilmala, 2006 dalam wardani, 2012).

Tulang ikan merupakan salah satu bentuk limbah dari industri pengolahan ikan yang memiliki kandungan kalsium terbanyak diantara bagian tubuh ikan, karena unsur utama dari tulang ikan adalah kalsium, fosfor dan karbonat. Pemanfaatan

limbah tulang ikan salah satunya adalah dibuat tepung. Tepung ikan dapat ditambahkan pada produk ekstrusi, roti, biskuit dan kue kering (Wardani, dkk 2012).

Tulang ikan tuna yang merupakan salah satu limbah hasil industri perikanan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Dilihat dari sudut pandang pangan dan gizi, tulang ikan sangat kaya akan kalsium yang dibutuhkan bagi manusia bahkan unsur utama dari tulang ikan adalah kalsium, fosfor dan fosfat. Limbah tulang ikan mengandung kalsium sebesar 12,9 – 39,24% (Arsini dan Retno, 2011 dalam Yogi, dkk 2012).

Alasan memilih tulang bukan daging, pada umumnya daging ikan tuna sering digunakan dalam penelitian pembuatan produk olahan, produksi ikan tuna sebagian besar hanya memanfaatkan dagingnya saja sedangkan tulang hanya dibuang belum dimanfaatkan, tulang ikan tuna ternyata memiliki kandungan gizi yang tak kalah banyaknya dengan tulang lainnya. Tulang ikan memiliki kandungan kalsium terbanyak diantara bagian tubuh ikan, karena unsur utama dari tulang ikan adalah kalsium, forfor dan karbonat.

Kandungan gizi dalam 100 gram tulang ikan tuna mendidihang terdiri dari energi 105,0 kal, protein 24,1 g, abu 1,2 g, lemak 0,1 g, abu 1,2 g, kalsium 9,0 mg, fosfor 220,0 mg, besi 1,1 mg, sodium 78,0 mg, retinol 5,0 mg, thiamin 0,1 mg, riboflavin 0,1 mg, dan niasin 12,0 mg. tulang ikan memiliki proporsi 10% dari total susunan tubuh ikan yang merupakan salah satu limbah yang memiliki kandungan kalsium tinggi (Ahmad Thalib, 2015:12).

Tubuh memiliki banyak unsur makromineral seperti kalsium dan fosfor yang digunakan untuk hidup, kesehatan dan pertumbuhan tulang. Kalsium dan fosfor merupakan makromineral yang paling banyak terdapat di semua jaringan tubuh dan terlibat dalam proses biologi dan metabolisme tubuh (Suarsana, 2011). Sekitar 99% kalsium dalam tubuh ditemukan pada tulang dan gigi dan sekitar 1% terdapat pada cairan ekstra sel (Nabil, 2005 dalam Zobda, dkk). Fosfor merupakan makromineral terbanyak kedua yang ada di dalam tubuh setelah kalsium, 85% fosfor terdapat dalam tulang. Kalsium dan fosfor membentuk kalsium fosfat atau kristal kalsium hidroksiapatit $[3Ca_3(PO_4)_2Ca(OH)_2]$ sebagai penyusun utama pembentuk tulang (Sabri, 2011).

Menurut Nurul Asyifa Hafsiyah kandungan zat gizi yang terdapat dalam tepung tulang ikan tuna (*Thunnus sp*) yaitu kadar abu 68,86%, kadar karbohidrat 1,50%, protein 7,64%, lemak 3,83%, kalsium 14,48%, zat besi 1,105 ug/g dan vitamin A 2,499 ug/g.

Kandungan kalsium dalam tulang ikan lainnya yakni pada tulang ikan sidat 24,61-28,55%, tulang ikan bandeng 4%, tulang ikan lele 13,48%, tulang ikan belida 26,70 -29,68 %, tulang ikan mas 0,65%, tulang ikan gabus 21,60% dan tulang ikan tuna sirip kuning 39-40%.

Menurut Wahyuni dalam Marta'ati, 2012 kandungan kalsium dalam tepung tulang ikan tuna lebih tinggi dibanding kandungan kalsium pada tepung tulang ikan

lainnya yakni pada tepung tulang ikan lele 13,48%, tepung tulang ikan patin 30,95% dan pada tepung tulang ikan tuna berkisar 39-40%.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Asyifa, 2017 yang menyatakan bahwa kandungan zat gizi dari tepung tulang ikan tuna yang memiliki kandungan gizi tertinggi terdapat pada suhu 60 °C yang dimana menghasilkan karbohidrat 1,50%, protein 7,64%, lemak 3,83%, kalsium 14,48%, zat besi 1,105 ug/g dan vitamin A 2,499 ug/g.

Dilihat dari sudut pandang pangan dan gizi, tulang ikan sangat kaya akan kalsium yang dibutuhkan bagi manusia bahkan unsur utama dari tulang ikan adalah kalsium, fosfor dan karbonat. Manusia anak-anak membutuhkan kalsium 500-700 mg/hari dan dewasa membutuhkan asupan kalsium 750-1000 mg/hari (Widya Karya Pangan dan Gizi LIPI, 2004 dalam Almatsier, 2010). Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat, bengkok dan rapuh, yang dinamakan osteoporosis. Konsumsi kalsium hendaknya tidak melebihi 2500 mg sehari. Kelebihan kalsium dapat menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal. Di samping itu, dapat menyebabkan konstipasi (susah buang air besar). Kelebihan kalsium bisa terjadi bila menggunakan suplemen kalsium berupa tablet atau bentuk lain (Sunita Almatsier, 2010:242-243).

Biskuit merupakan salah satu makanan ringan atau snack yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Produk ini merupakan produk kering yang memiliki kadar air rendah. Menurut SNI 01-2973-1992 biskuit adalah produk yang diperoleh

dengan memanggang adonan dari tepung terigu dengan penambahan makanan lain dan dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan (Rohimah, 2014). Syarat mutu biskuit biskuit yaitu Air Maksimum 5%, Protein Minimum 6%, Lemak Minimum 9,5%, Karbohidrat Minimum 70%, Abu Maksimum 2%, Logam berbahaya Negatif, Serat kasar Maksimum 0,5%, Energi (Kal/100 g) Minimum 400, Jenis tepung Terigu, Bau dan rasa Normal tidak tengik, dan Warna Normal (Nurul Mualida, 2005).

Biasanya biskuit terbuat dari bahan-bahan seperti tepung terigu, margarin, air, gula, garam, telur dan susu bubuk. Karena biskuit ini sangat digemari oleh masyarakat dari segala lapisan maka penting artinya memberikan suplemen lain berupa tepung tulang ikan tuna ke dalam makanan tersebut untuk memberikan manfaat terhadap kelengkapan asupan mineral ke dalam tubuh.

Hal ini berkaitan dengan QS Al-Baqarah 2/172 tentang agar manusia memakan makanan yang halal dan baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ ءِیَّاهُ تَعْبُدُونَ ۗ ۱۷۲

Terjemahnya : “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah*”(Depertemen Agama RI, 2013: 38).

Dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Makanan yang baik-baik itu senantiasa disediakan oleh tuhan asal kamu mengusahakannya. Asal kamu berusaha mencari dan memilih mana yang baik-baik itu, pastikan kamu tidak akan kekurangan makanan. *“Dan beryukurlah kepada Allah.”* Karena segala sesuatunya telah lengkap disediakan buat kamu. Dan menurut penyelidikan ahli-ahli gizi, berbagai makanan itu mengandung beberapa macam vitamin zat putih telur, zat besi, zat asam, kalori dan hormon dan sebagainya, yang semuanya itu akan memperkuat tubuh manusia. Sebab itu bersyukur kepada Allah, *“jikalau memang hanya kepadaNya kamu menyembah.”*(Dr. Hamka, 1982:56).

Alasan pemilihan produk tersebut karena saat ini biskuit sudah menjadi salah satu makanan cemilan praktis di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan pada anak-anak biskuit menjadi makanan favorit yang sehat untuk dikonsumsi setiap hari sebagai makanan cemilan ataupun makanan pendamping.

Oleh karena itu, saat ini banyak dilakukan usaha menyubstitusikan tepung terigu dengan berbagai tepung dari sumberdaya lokal seperti tepung gandum, umbi-umbian dan ikan, salah satunya tulang ikan tuna. Produk pangan lokal olahan tulang ikan tuna dengan bahan baku tepung tulang yaitu donat dan biskuit.

Dalam hal ini, melihat uraian diatas akan potensi sumberdaya alam khususnya pemanfaatan tulang ikan tuna, maka pada penelitian ini peneliti akan membuat diversifikasi pangan lokal yaitu biskuit crackers tulang ikan tuna dengan menganalisis kandungan zat gizi karbohidrat, protein, lemak, kalsium (Ca), vitamin

A, besi (Fe) dan uji organoleptik guna memberikan alternatif perbaikan gizi pada masyarakat.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah yaitu bagaimanakah mengidentifikasi zat gizi biskuit crackers tepung tulang ikan tuna sebagai alternatif perbaikan gizi masyarakat?

Adapun pokok masalah tersebut dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kadar abu biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*)?
2. Bagaimanakah kadar karbohidrat biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*)?
3. Bagaimanakah kadar protein crackers tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*)?
4. Bagaimanakah kadar lemak biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*)?
5. Bagaimanakah kadar kalsium biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*)?
6. Bagaimanakah kadar vitamin A biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*)?

7. Bagaimanakah kadar zat besi (Fe) biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*)?
8. Bagaimanakah daya terima panelis terhadap biskuit crackers tepung tulang ikan tuna ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi tulang ikan tuna

Tulang ikan yang dimaksud pada penelitian ini adalah organ keras yang merupakan bentuk bagian pada endoskeleton vertebrata, tulang ikan sesuatu yang merupakan sisa dari suatu proses produksi.

2. Definisi Tepung tulang ikan tuna

Tepung tulang ikan tuna yang dimaksud pada penelitian ini adalah tulang yang dihancurkan berbentuk bubuk halus berwarna putih kekuningan hingga kuning.

3. Definisi biskuit Crackers

Biskuit Crackers adalah kue kering yang renyah, manis dan gurih terbuat dari adonan tepung terigu dengan substitusi tepung tulang ikan tuna ditambahkan margarin, garam, dan gula halus.

Kriteria objektif: pada penelitian ini dibuat 5 komposisi bahan pada biskuit Crackers tulang ikan tuna, yaitu:

- a. 1:0 = pada perlakuan ini, yang dimaksud 1:0 yaitu tepung terigu 100 gram tanpa substitusi tepung tulang ikan tuna.

- b. 1:1 = pada perlakuan ini, yang dimaksud 1:1 yaitu tepung terigu 50 gram dan 50 gram tepung tulang ikan tuna.
- c. 0:1 = pada perlakuan ini, yang dimaksud 0:1 yaitu tepung tulang ikan tuna 100 gram tanpa substitusi tepung terigu.
- d. 1:3 = pada perlakuan ini, yang dimaksud 1:3 yaitu tepung tulang ikan tuna 25 gram dan 75 gram tepung terigu.
- e. 3:1 = pada perlakuan ini, yang dimaksud 3:1 yaitu tepung tulang ikan tuna 75 gram dan 25 gram tepung terigu.

4. Definisi zat gizi

Zat gizi adalah zat pada makanan yang dibutuhkan oleh organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan yang dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh meliputi karbohidrat, protein, lemak, mineral dan air.

Ruang lingkup penelitian :

- a. Kadar Abu yang dimaksud adalah jumlah abu dalam tepung tulang ikan tuna yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dengan menggunakan metode *Tanur*.
- b. Kadar kalsium adalah jumlah kadar kalsium dalam biskuit tulang ikan tuna yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dengan prinsip kerja yaitu metode titrasi kompleksometri.
- c. Kadar Karbohidrat adalah jumlah kadar karbohidrat dalam biskuit tepung tulang ikan yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dengan

- menggunakan metode *luff schoorl* didasarkan pada pengurangan ion tembaga (II) di media alkaline oleh gula dan kemudian kembali menjadi sisa tembaga.
- d. Kadar Protein adalah jumlah kadar protein dalam biskuit tepung tulang ikan tuna yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dengan menggunakan metode *kjehdal* dengan prinsip kerja yaitu protein dan komponen organik dalam sampel didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil destruksi dinetralkan dengan menggunakan larutan alkali dan melalui destilasi. Destilat ditampung dalam larutan asam borat. Selanjutnya ion- ion borat yang terbentuk dititrasi dengan menggunakan larutan HCl.
- e. Kadar Lemak yang dimaksud adalah jumlah kadar lemak dalam biskuit tepung tulang ikan yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dengan menggunakan metode *soxhlet* dengan prinsip kerja yaitu dengan mengekstraksi sampel pada alat *soxhlet*.
- f. Kadar vitamin A merupakan jumlah vitamin A total pada biskuit tulang ikan tuna, yang dianalisis dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-VIS.
- g. Kadar Zat besi (Fe) yang dimaksud adalah kandungan zat besi (Fe) dalam biskuit tulang ikan tuna yang di peroleh dari hasil pengukuran kuantitatif dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).

5. Definisi kualitas biskuit tepung tulang ikan

Kualitas tepung yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dilihat dari uji organoleptik.

6. Uji organoleptik

Definisi operasional: Uji Organoleptik dalam penelitian ini terbagi dua yang pertama uji daya terima (uji hedonik) yang menyatakan kesan suka dan tidak terhadap sampel yang diteliti dan kedua uji mutu hedonik yang menyatakan baik buruk terhadap sampel yang diteliti. Rentangan tingkat skala bervariasi tergantung dari rentangan mutu yang diinginkan dan sensitivitas antar skala.

a. Kriteria objektif uji mutu hedonik

Tabel 1.1
Keterangan Penilaian Mutu Hedonik Terhadap Warna, Aroma, Tekstur dan Rasa

Mutu Hedonik							
Warna		Aroma		Tekstur		Rasa	
1	Sangat Gelap	1	Sangat Tidak Harum	1	Sangat Tidak Keras	1	Sangat Tidak Enak
2	Gelap	2	Tidak Harum	2	Tidak Keras	2	Tidak Enak
3	Agak Gelap	3	Agak Tidak Harum	3	Agak Tidak Keras	3	Agak Tidak Enak
4	Biasa/Netral	4	Biasa	4	Biasa	4	Biasa
5	Agak Terang	5	Agak Harum	5	Agak Keras	5	Agak Enak
6	Terang	6	Harum	6	Keras	6	Enak
7	Sangat Terang	7	Sangat Harum	7	Sangat Keras	7	Sangat Enak

b. Kriteria objektif uji hedonik

Tabel 1.2 Interval Presentase dan Kriterion Kesukaan

Persentase	Kriteria Kesukaan
92-100	Sangat-sangat suka sekali
83-91	Sangat-sangat suka
74-82	Sangat suka
65-73	Suka
56-64	Agak suka
47-55	Biasa
38-46	Agak tidak suka
29-37	Tidak suka
20-28	Sangat tidak suka
11-19	Sangat-sangat tidak suka
2-10	Sangat-sangat tidak suka sekali

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian ini adalah :

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Marisa Marta'ati dan Sri Handajati 2015	Pengaruh penambahan tepung tulang ikan tuna (Thunnussp.) dan proporsi jenis shortening terhadap sifat organoleptik rich biscuit	Tepung tulang ikan tuna, proporsi jenis shortening, organoleptik	Ada pengaruh penambahan tepung tulang ikan tuna terhadap warna, aroma, dan rasa; ada pengaruh proporsi jenis <i>shortening</i> terhadap warna bentuk dan kerenyahan; dan ada pengaruh interaksi penambahan tepung tulang ikan tuna dan penggunaan proporsi jenis <i>shortening</i> terhadap warna, bentuk, dan kerenyahan; Produk terbaik dalam penelitian <i>rich biscuit</i> tepung tulang ikan tuna yakni A1B3 Dengan kandungan kadar air 4,86, protein 1,76, karbohidrat 8,67, lemak 3,28, kalsium 18,90, Fosfor 1,89, besi 33,08, magnesium 6,22, serta vitamin D 0,394.
2	M.Ryo Andika Putra, dkk 2015	Fortifikasi tepung tulang ikan gabus (channa striata) pada kerupuk sebagai sumber kalsium	Tepung tulang ikan gabus, kerupuk, kalsium	Perlakuan dalam penelitian berpengaruh nyata terhadap analisis kimia yaitu kadar abu, protein, lemak, karbohidrat, dan kalsium sedangkan analisis fisik yaitu kekerasan, volume mengembang, <i>lightness</i> serta <i>chroma</i> dan analisis sensoris yaitu kekerasan dan rasa. Tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air, <i>hue</i>

				<p>dan analisis sensoris yaitu warna dan aroma. Kadar abu kerupuk yang dihasilkan berkisar antara 2,85%-19,19%, protein berkisar 1,96%-6,14%, lemak berkisar antara 14,75%-19,39%, karbohidrat berkisar antara 56,05%-72,00%, dan kalsium berkisar antara 21,60 mg/100g-572,51 mg/100 g. Kekerasan kerupuk yang dihasilkan berkisar antara 229,23 gf - 558,92 gf, volume mengembang berkisar antara 45,58%-97,03%, lightness berkisar antara 60,93%-71,03%, chroma berkisar antara 6,33%-18,70% dan kekerasan dari analisis sensoris berkisar antara 1,96-3,13 dan rasa 2,01-3,24. Kerupuk yang ditambahkan dengan tepung tulang ikan gabus memiliki pengaruh nyata terhadap kekerasan kerupuk.</p>
3	<p>Agnes T. Agustin, Meity Sompie 2015</p>	<p>Kajian gelatin kulit ikan tuna (<i>Thunnus albacares</i>) yang diproses menggunakan asam asetat</p>	<p>Gelatin kulit ikan tuna, asam asetat, organoleptik</p>	<p>Hasil penilaian organoleptik menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi asam asetat memberikan pengaruh yang sama terhadap warna, tekstur dan bau gelatin. Warna gelatin cerah sampai kekuningan, tekstur agak kasar tidak beraturan dan tidak berbau. Apabila dibandingkan dengan produk gelatin komersial, tampak bahwa gelatin yang diperoleh dari kulit ikan tuna memenuhi penampilan warna hampir sama dengan gelatin komersial. Kesimpulan</p>

				yang diperoleh pada penelitian ini adalah gelatin kulit ikan tuna yang diproduksi menggunakan konsentrasi larutan asam asetat 3%, 6% dan 9% menghasilkan karakteristik gelatin dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan SNI.
4	Dini Puspita, dkk 2012	Fortifikasi tepung tulang tuna sebagai sumber kalsium terhadap tingkat kesukaan donat	Tepung tulang tuna, kalsium, donat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fortifikasi tepung tulang tuna sebesar 2,5% dan 5% lebih disukai dari semua perlakuan, namun untuk mendapatkan kandungan yang lebih tinggi, maka perlakuan yang lebih baik adalah perlakuan 5% dengan kadar kalsium 475 mg/50g dan nilai rata-rata terhadap kenampakan, aroma, tekstur, dan rasa adalah masing-masing sebesar 7.5, 7.1, 7.2 dan 6.9. uji hedonic pada perlakuan fortifikasi tepung tulang sebesar 0%, 2.5%, 5%, 7.5% masih dapat diterima atau disukai oleh penelis, namun pada perlakuan fortifikasi tepung tulang tuna sebesar 10% dan 12,5% netral/biasa sampai tidak dapat diterima atau tidak disukai oleh penelis.

5	Yogi Hadi Putra, dkk 2012	Pengaruh pencampuran fillet dan tulang tuna (<i>thunnus sp.</i>) Terhadap karakteristik nugget yang dihasilkan	Fillet, tulang tuna, nugget	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencampuran fillet dengan tulang secara signifikan mempengaruhi tingkat lipid sebelum dan sesudah penggorengan, kadar abu, kadar kalsium dan warna. produk yang dihasilkan terbaik didasarkan pada produk uji organoleptik C (pencampuran fillet dan tulang 60: 40) dengan hasil analisis protein 15,76%, 3,99% lemak sebelum menggoreng; 22,40% lemak setelah menggoreng; minyak serap 18,41%, abu 4,13%, kalsium 1,26%, air 54,30%; kekerasan sebelum digoreng 3.70 N / m ² ; kekerasan setelah goreng 2,77 kontaminasi N / m ² dan mikroba 4,8 x 10 ³ koloni / g.
---	------------------------------	--	-----------------------------	--

Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sebelum peneliti melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian biskuit tulang ikan tuna sebelumnya sudah ada tetapi penelitian tersebut hanya sebagai bahan fortifikasi tepung tulang tuna sebagai sumber kalsium terhadap kesukaan donat, dan pengaruh penambahan tepung tulang ikan tuna dan proporsi jenis shortening terhadap sifat organoleptik rich biskuit, peneliti ini berfokus pada adakah pengaruh terhadap penambahan tepung tulang dengan proporsi jenis shortening terhadap rich biskuit.

Dalam proposal penelitian ini, peneliti secara signifikan lebih memfokuskan pada identifikasi zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, kalsium, vitamin A dan zat besi (Fe) serta kualitas organoleptik biskuit tulang ikan tuna sebagai alternatif perbaikan gizi di masyarakat.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk menganalisis kandungan gizi biskuit tepung tulang ikan sebagai alternatif perbaikan gizi masyarakat

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui kadar abu biskuit crackers tepung tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*).
- 2) Untuk mengetahui kadar karbohidrat biskuit crackers tepung tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*).

- 3) Untuk mengetahui kadar protein biskuit crackers tepung tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*).
- 4) Untuk mengetahui kadar lemak biskuit crackers tepung tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*).
- 5) Untuk mengetahui kadar kalsium biskuit crackers tepung tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*).
- 6) Untuk mengetahui kadar vitamin A biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*).
- 7) Untuk mengetahui kadar zat besi (Fe) biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus albacares*).
- 8) Untuk mengetahui daya terima panelis terhadap biskuit crackers tepung tulang ikan tuna.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kandungan gizi biskuit crackers tepung tulang ikan tuna sebagai alternatif perbaikan gizi masyarakat. Selain itu juga dapat dikonsumsi sebagai alternatif perbaikan gizi yang ada di masyarakat.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan perbaikan gizi masyarakat dalam hal ini kandungan gizi biskuit crackers tepung tulang ikan tuna.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum zat Gizi

1. Ilmu Gizi

Ilmu Gizi adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan seluk beluk makanan dalam hubungannya dengan kesehatan tubuh manusia. Menurut kamus Gizi yang dikeluarkan oleh persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), 2009 Ilmu Gizi adalah ilmu pengetahuan yang membahas sifat-sifat gizi yang terkandung dalam makanan, pengaruh metabolismenya serta akibat yang timbul bila terdapat kekurangan atau kekurangan zat gizi (Ibnu Fajar, dkk 2013 :1).

Istilah gizi dan ilmu gizi mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1950-an, sebagai terjemahan dari kata Inggris nutrition. Kata gizi sendiri berasal dari bahasa Arab ghidza yang berarti makanan. Kata ghidza dalam dialek Mesir dibaca ghizi. Sedangkan ada juga menerjemahkan nutrition menjadi nutrisi. Terjemahan ini terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia Badudu-Zain tahun 1994 (Syarfaini, 2012:1) .

Gizi adalah zat-zat makanan yang terkandung dalam suatu bahan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Gizi adalah makanan dalam hubungannya dengan kesehatan dan proses dimana organisme menggunakan makanan untuk pemeliharaan kehidupan, pertumbuhan, bekerjanya anggota dan jaringan tubuh secara normal dan dan produksi tenaga (Hardiana, 2014:6)

Zat gizi (Nutrients) adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan (Sunita Almatsier, 2010:1).

Mengenai kandungan zat gizi di dalam makanan, al-Qur'an memberi kita petunjuk untuk mengkaji atau memperhatikan tentang kandungan zat gizi dalam makanan, selain memperhatikan dari segi kehalalannya, kita juga harus memperhatikan dari segi manfaatnya dalam tubuh kita agar makanan yang kita makan nantinya tidak menjadi mudharat ataupun membahayakan untuk tubuh kita karena Allah swt menciptakan seluruh isi bumi agar mampu dimanfaatkan oleh manusia dalam bertahan hidup.

Q.S Al-Maidah 5:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانفُوا إِلَىٰ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Terjemahnya: *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”* (Depertemen Agama RI, 2013: 172).

Dalam surah Al-Maidah ayat 88, Allah swt memerintahkan kita untuk memakan segala sesuatu yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktik-praktik keberagaman yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap-Nya adalah mu'minin, yakni orang-orang yang mantap keimanannya.

2. Makronutrien (zat gizi makro)

Zat gizi makro merupakan komponen terbesar dari susunan diet yang berfungsi untuk menyuplai energi dan zat-zat esensial (pertumbuhan sel/jaringan), pemeliharaan aktivitas tubuh. Yang termasuk zat gizi makro adalah karbohidrat (hidrat arang), lemak, protein (zat putih telur), makromineral dan air. Zat gizi makro sebagai sumber energi dapat diuraikan secara timbale balik, dalam hal ini karbohidrat menghasilkan 4 Kkal/ g, lemak 9 Kkal/g dan protein 4 Kkal/g (Syarfaini, 2012:11).

a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi selain lemak dan protein. Karbohidrat menyumbangkan energi sebagai 4 kalori/gram dan merupakan senyawa organik yang terdiri dari Carbon (C) Hidrogen (H) dan Oksigen (O) yang disimpan dalam otot dan hati. Karbohidrat dibentuk melalui fotosintesis proses penggunaan energi matahari bagi tanaman berklorofil untuk mengambil karbondioksida (CO_2) dan melepaskan oksigen ke dalam udara. Karbon yang tersisa dalam tanaman membentuk karbohidrat.

Karbohidrat dapat dikelompokkan menurut sakarida yang membentuk strukturnya yaitu:

- 1) Monosakarida yaitu yang terdiri dari 1 sakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang mudah diserap melalui usus halus ke dalam darah kemudian menuju hati, dan tidak dipecah dalam proses pencernaan. Contoh dari monosakarida ini adalah glukosa, fruktosa dan galaktosa.

- 2) Disakarida yaitu terdiri dari 2 sakarida dan 2 monosakarida yang salah satunya berbentuk glukosa. Disakarida ini sebelum diserap harus dicerna dulu menjadi komponen monosakarida contoh dai disakarida ini adalah sukros, laktosa dan maltose.
- 3) Polisakarida atau karbohidrat kompleks. Sebelum diserap polisakarida harus dipecah dulu menjadi monosakarida. Contoh dari polisakarida adalah tepung, glikogen dan serat (Ibnu Fajar, dkk, 2013:5-6).

Fungsi penting karbohidrat yaitu sebagai penyedia energi utama. Karbohidrat yang sudah dicerna, antara lain menjadi monosakarida, yaitu glukosa jika dioksidasi atau mengalami pembakaran didalam tubuh akan menghasilkan energi atau tenaga (tejasari, 2005).

**Tabel 2.1 Daftar kebutuhan karbohidrat dalam tubuh manusia
Kelompok Umur Kebutuhan Karbohidrat (g/hari)**

Kelompok umur	Energi (kkal)	Kebutuhan Karbohidrat (g/hari)
Bayi (Bulan)		
0-6	550	58
7-11	725	82
Anak (thn)		
1-3	1.125	155
4-6	1.600	220
7-9	1.850	254
Pria (thn)		
10-12	2.100	289
13-15	2.475	340
16-18	2.675	368
19-29	2.725	375
30-49	2.625	394
50-64	2.325	349
65+	1.900	309
Wanita (thn)		
10-12	2.000	275
13-15	2.125	292
16-18	2.125	292
19-29	2.250	309
30-49	2.150	323
50-64	1.900	285
65+	1.550	253
Hamil		
Trimester 1	+180	+25
Trimester 2	+300	+40
Trimester 3	+300	+40
Menyusui		
6 bulan pertama	+330	+45
6 bulan pertama	+400	+55

Sumber : Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013

b. Protein

Protein merupakan sumber energi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan dan menghasilkan 4 kalori pergram sama dengan karbohidrat. Protein merupakan senyawa organik yang atom Carbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O) dan Nitrogen (N) dan disimpan dalam otot, tulang, darah, kulit, kartilagodan limfe. Protein ini akan dipecah menjadi sumber energi apabila Zat gizi Karbohidrat dan Lemak tidak mencukupi (Ibnu fajar, dkk, 2013).

Fungsi utama protein atau zat pembangun yaitu dalam pertumbuhan jaringan. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dimungkinkan bila tersedia susunan asam amino tertentu yang sesuai. Misalnya, jaringan pada rambut, kuku dan kulit memerlukan asam amino bersulfur, sedangkan urat otot dan jaringan ikat memerlukan protein kolagen. Protein fibrin dan myosin diperlukan dalam pembentukan otot (tejasari, 2005).

**Tabel 2.2 Daftar kebutuhan protein dalam tubuh manusia
Kelompok Umur Kebutuhan Protein (g/hari)**

Kelompok umur	Energi (kkal)	Kebutuhan Protein (g/hari)
Bayi (Bulan)		
0-6	550	12
7-11	725	18
Anak (thn)		
1-3	1.125	26
4-6	1.600	35
7-9	1.850	49
Pria (thn)		
10-12	2.100	56
13-15	2.475	72
16-18	2.675	66
19-29	2.725	62
30-49	2.625	65
50-64	2.325	65
65+	1.900	62
Wanita (thn)		
10-12	2.000	60
13-15	2.125	69
16-18	2.125	59
19-29	2.250	56
30-49	2.150	57
50-64	1.900	57
65+	1.550	55
Hamil		
Trimester 1	+180	+20
Trimester 2	+300	+20
Trimester 3	+300	+20
Menyusui		
6 bulan pertama	+330	+20
6 bulan pertama	+400	+20

Sumber : Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013

c. Lemak

Lemak lemak adalah sumber energi lain di samping karbohidrat dan protein. Setiap gram lemak menghasilkan 9 kalori lebih besar dari karbohidrat dan protein. Lemak adalah senyawa organik yang mengandung Carbon (C), Hidrogen (H) dan Oksigen (O) dan larut dalam alcohol dan larut organic lainnya, akan tetapi tidak larut dalam air (Ibnu Fajar, dkk, 2013).

Lemak berfungsi sebagai penyedia energi ke-2 setelah karbohidrat. Oksigen lemak akan berlangsung jika ketersediaan karbohidrat telah menipis akibat asupan karbohidrat yang rendah. Walaupun energi yang dihasilkan dari oksidasi satu molekul lemak lebih tinggi (sekitar 9 kalori) dari energi hasil oksidasi karbohidrat, lemak disebut sebagai sumber energi kedua setelah karbohidrat. Seperti halnya karbohidrat, lemak berfungsi sebagai protein sparer karena dapat menghemat fungsi protein. Hal ini terjadi karena persediaan energi telah dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak, sehingga protein tetap dapat digunakan untuk fungsi utamanya sebagai zat pembangun (tejasari, 2005).

**Tabel 2.3 Daftar kebutuhan lemak dalam tubuh manusia
Kelompok Umur Kebutuhan Lemak (g/hari)**

Kelompok umur	Energi (kkal)	Kebutuhan Lemak (g/hari)
Bayi (Bulan)		
0-6	550	34
7-11	725	36
Anak (thn)		
1-3	1.125	44
4-6	1.600	62
7-9	1.850	72
Pria (thn)		
10-12	2.100	70
13-15	2.475	83
16-18	2.675	89
19-29	2.725	91
30-49	2.625	73
50-64	2.325	65
65+	1.900	53
Wanita (thn)		
10-12	2.000	67
13-15	2.125	71
16-18	2.125	71
19-29	2.250	75
30-49	2.150	60
50-64	1.900	53
65+	1.550	40
Hamil		
Trimester 1	+180	+6
Trimester 2	+300	+10
Trimester 3	+300	+10
Menyusui		
6 bulan pertama	+330	+11
6 bulan pertama	+400	+13

Sumber : Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013

3. Mikronutrien (zat gizi mikro)

Zat gizi mikro (*micronutrient*) adalah zat yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit oleh tubuh, biasanya diukur kisaran milligram atau mikrogram. Beberapa klasifikasi juga memasukkan nutrisi ultramikro (*ultrace nutrient*), yang terdapat dalam diet dengan jumlah yang kurang dari 1 $\mu\text{g/g}$ dari diet kering, banyak di antara zat-zat ini yang tidak diketahui perannya (Barasi, 2009).

Pada penelitian ini zat gizi mikro yang akan diteliti pada biskuit crackers substitusi tepung tulang ikan tuna sebagai berikut :

a. Kadar Abu

Kadar abu dikenal sebagai unsur mineral atau zat anorganik. Abu merupakan salah satu komponen dalam bahan makanan. Komponen ini terdiri dari mineral-mineral seperti kalium, fosfor, natrium, magnesium, kalsium, besi, mangan, dan tembaga (Winarno, 2004 dalam Litaay dan Santoso, 2013). Mineral merupakan salah satu zat gizi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. Kandungan abu dalam bahan pangan menunjukkan jumlah bahan anorganik yang tersisa setelah bahan organik didestruksi.

Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar tetapi komponen anorganiknya tidak, karena itulah disebut sebagai kadar abu (Astuni, 2011).

Abu merupakan residu anorganik dari hasil pengabuan. Kadar abu ditentukan dengan cara mengukur residu setelah sampel dioksidasi pada suhu 500-600°C dan mengalami volatilisasi. Untuk pengabuan yang sempurna, pemanasan dilakukan

sampai warna sampel menjadi seragam dan berwarna abu-abu sampai putih, serta bebas dari sisa sampel yang tidak terbakar (Estiasi, 2012).

Kadar mineral dalam bahan pangan mempengaruhi sifat fisik bahan pangan serta keberadaannya dalam jumlah tertentu mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme jenis tertentu (Suhartini, 2012).

b. Kalsium

Tubuh kita mengandung kalsium yang lebih banyak dibandingkan mineral lain. Diperkirakan, 2% berat badan orang dewasa atau sekitar 1,0-1,4 kg terdiri dari kalsium. Namun, pada bayi hanya terkandung sedikit kalsium (25-30 gram). Setelah usia 20 tahun, secara normal akan terjadi penambahan sekitar 1.200 gram kalsium di dalam tulang rawan dan gigi, sisanya terdapat dalam cairan tubuh dan jaringan lunak.

Secara garis besar, peranan kalsium di dalam di dalam tubuh dapat di bagi dua, yakni membantu membentuk tulang gigi dan mengatur proses biologis di dalam tubuh. Keperluan kalsium terbesar adalah ketika masa pertumbuhan. Dan, keperluan terhadap asupan kalsium masi diteruskan, meskipun sudah mencapai usia dewasa. Pada pembentukan tulang, bila tulang baru dibentuk, maka tulang yang tua akan dihancurkan secara simultan (sitiatava, 2013).

**Tabel 2.4 Daftar kebutuhan kalsium dalam tubuh manusia
Kelompok Umur Kebutuhan Ca (mg/hari)**

Kelompok umur	Kebutuhan Ca (mg/hari)
Bayi (Bulan)	
0-6	200
7-11	250
Anak (thn)	
1-3	650
4-6	1000
7-9	1000
Pria (thn)	
10-12	1200
13-15	1200
16-18	1200
19-29	1100
30-49	1000
50-64	1000
65+	1000
Wanita (thn)	
10-12	1200
13-15	1200
16-18	1200
19-29	1000
30-49	1000
50-64	1000
65+	1000
Hamil	
Trimester 1	+200
Trimester 2	+200
Trimester 3	+200
Menyusui	
6 bulan pertama	+200
6 bulan pertama	+200

Sumber : Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013

c. Zat Besi

Zat Besi (Fe) merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat didalam tubuh manusia dan hewan, yaitu sebanyak 3-5 g di dalam tubuh manusia dewasa. Besi mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh, yaitu sebagai alat angkut

oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, dan sebagai bagian terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh (Almatsier, 2010).

Dalam tubuh sebagian besar Fe dapat terkonjugasi dengan protein, dan terdapat dalam bentuk ferro atau ferri. Bentuk aktif zat besi biasanya terdapat sebagai ferro, sedangkan bentuk inaktif adalah sebagai ferri (misalnya bentuk *storage*) (Sedioetama, 2010).

Peran zat besi dalam sistem imun bersifat kompleks. Status besi yang rendah mengganggu kemampuan neutrofil untuk membunuh patogen dan proliferasi limfosit. Tubuh sangat efisien dalam penggunaan besi. Sebelum diabsorpsi, di lambung besi dibebaskan dari ikatan organik seperti protein. Sebagian besar besi di dalam bentuk ferri direduksi menjadi bentuk ferro. Hal ini terjadi dalam suasana asam di dalam lambung dengan adanya HCl dan vitamin C yang terdapat dalam makanan (Barasi, 2009).

Ada dua jenis zat besi dalam makanan, yaitu zat besi yang berasal dari hem dan non-hem. Walaupun kandungan zat besi hem dalam makanan hanya antara 5-10% tetapi penyerapannya hanya 5%. Makanan hewani seperti daging, ikan dan ayam merupakan sumber utama zat besi hem. Zat besi yang berasal dari hem merupakan hemoglobin dan mioglobin. Zat besi non-hem terdapat dalam pangan nabati, seperti sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan.

**Tabel 2.5 Daftar kebutuhan zat besi dalam tubuh manusia
Kelompok Umur Kebutuhan Fe (mg/hari)**

Kelompok umur	Kebutuhan Fe (mg/hari)
Bayi (Bulan)	
0-6	-
7-11	7
Anak (thn)	
1-3	8
4-6	9
7-9	10
Pria (thn)	
10-12	13
13-15	19
16-18	15
19-29	13
30-49	13
50-64	13
65+	13
Wanita (thn)	
10-12	20
13-15	26
16-18	26
19-29	26
30-49	26
50-64	12
65+	12
Hamil	
Trimester 1	+0
Trimester 2	+9
Trimester 3	+13
Menyusui	
6 bulan pertama	+6
6 bulan pertama	+8

Sumber : Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013

d. Vitamin A

Vitamin A merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup. Untuk kekebalan terhadap infeksi, pertumbuhan tulang, perkembangan sistem saraf, metabolisme dan struktur membrane sel. Kekurangan vitamin A akan mengakibatkan meningkatnya resiko anak terhadap penyakit infeksi seperti penyakit saluran pernafasan dan diare. Bahan makanan sumber Vitamin A seperti hati, kuning telur, produk susu, mentega, ikan, buah dan sayuran berwarna hijau dan kuning (Ayu Bulan Febry, dkk 2013).



**Tabel 2.6 Daftar kebutuhan vitamin A dalam tubuh manusia
Kelompok Umur Kebutuhan Vitamin A (mcg/hari)**

Kelompok umur	Kebutuhan Vit A (mcg/hari)
Bayi (Bulan)	
0-6	375
7-11	400
Anak (thn)	
1-3	400
4-6	450
7-9	500
Pria (thn)	
10-12	600
13-15	600
16-18	600
19-29	600
30-49	600
50-64	600
65+	600
Wanita (thn)	
10-12	600
13-15	600
16-18	600
19-29	500
30-49	500
50-64	500
65+	500
Hamil	
Trimester 1	+300
Trimester 2	+300
Trimester 3	+300
Menyusui	
6 bulan pertama	+350
6 bulan pertama	+350

Sumber : Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013

B. Tinjauan Umum Ikan Tuna

1. Deskripsi Ikan tuna

Potensi perikanan di perairan Indonesia cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal di seluruh perairan di Wilayah Indonesia. Hasil olahan yang diperoleh dari berbagai industri dapat menghasilkan berbagai limbah yang jika tidak diolah dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan (Ahmad Talib, 2015).

Ikan tuna adalah penyumbang devisa negara dari sektor perikanan yang tinggi. Ikan tuna (*Thunnus albacares*) termasuk dalam keluarga *Scombridae*, dengan tubuh seperti cerutu, mempunyai kulit yang licin dengan sirip dada melengkung dengan ujung yang lurus dan pangkal yang lebar (Bykov, 1983 dalam Musfiq Amiruldin, 2007).

Tabel 2.2.1 Klasifikasi ikan tuna (*Thunnus albacares*)

Klasifikasi Ikan Tuna (<i>Thunnus albacares</i>)	
Kingdom	Animalia
Filum	Chordata
Sub Filum	Vertebrata
Kelas	Teleostei
Sub Kelas	Actinopterygi
Ordo	Parciformes
Sub Ordo	Scombridae
Genus	<i>Thunnus sp</i>
Spesies	<i>Thunnus albacores</i>

Genus *Thunnus* terdiri atas beberapa spesies antara lain *Thunnus albacares* yang paling banyak didapati di perairan Indonesia. Jenis di atas dikenal dengan sebutan madidihang atau *yellow fin* tuna. *Thunnus albacores* memiliki ciri-ciri: badan

memanjang, bulat seperti cerutu, panjang tubuhnya mencapai 195 cm, namun umumnya 50-150 cm, memiliki dua sirip punggung, sirip depan biasanya pendek dan terpisah dari sirip belakang, pada bagian punggung berwarna biru kehitaman dan berwarna keputih-putihan pada bagian perut. Spesies ini termasuk jenis ikan buas, bersifat *predator*, hidup bergerombol kecil pada waktu mencari makan. Ikan tuna adalah jenis ikan dengan kandungan protein yang tinggi dan kandungan lemak yang rendah. Ikan tuna mengandung protein antara 22,6-26,2%. Disamping itu ikan tuna mengandung mineral (kalsium, fosfor, besi, sodium), vitamin A dan vitamin B (Bykov, 1983 dalam Musfiq Amiruldin, 2007).

2. Jenis-jenis ikan tuna

Jenis Ikan Tuna yang hidup di perairan laut Indonesia yaitu tuna madidihang (*Thunnus albacares*), tuna mata besar (*Thunnus obesus*), tuna albakora (*Thunnus alalunga*) dan tuna sirip biru (*Thunnus maccoyii*).

a) Tuna madidihang (*thunnus albacores*)



Gambar 2.1 Tuna madidihang (*thunnus albacores*).

Madidihang dewasa memiliki tubuh yang berukuran besar, dengan panjang dari ujung moncong hingga ujung percabangan sirip ekor (FL, fork length) mencapai

195 cm; namun umumnya hingga 150 cm. Bentuknya gilig panjang serupa torpedo (fusiform), agak memipih dari sisi ke sisi. Punggungnya berwarna biru gelap metalik, berangsur-angsur berubah menjadi kekuningan atau keperakan di bagian perut. Sirip-sirip punggung kedua dan anal, serta finlet-finlet yang mengikutinya, berwarna kuning cerah, yang menjadi asal namanya. Bagian perut kadang-kadang dihiasi oleh sekitar 20 garis putus-putus yang hampir vertikal arahnya (M. Arman Ahmad, 2012).

b) Tuna mata besar (*thunnus obesus*)



Gambar 2.2 Tuna mata besar (*thunnus obesus*)

Tuna mata besar (*Thunnus obesus*) atau dikenal dengan sebutan Bigeye tuna termasuk jenis tuna besar, sirip dada cukup panjang pada individu yang besar dan menjadi sangat panjang pada individu yang sangat kecil. Warna bagian bawah dan perut putih, garis sisi pada ikan yang hidup seperti sabuk berwarna biru membujur sepanjang badan, sirip punggung pertama berwarna kuning terang, sirip punggung kedua dan sirip dubur berwarna kuning muda, jari-jari sirip tambahan (*finlet*) berwarna kuning terang, dan hitam pada ujungnya. Menurut Reiner, 1996 dalam Arsenal Arsal 2014, spesies ini mencapai panjang total maksimum (*total length/TL*)

250 cm dengan panjang cagak (*Fork Length/FL*) rata-rata per individunya lebih dari 180 cm.

Ikan tuna mata besar mempunyai ciri-ciri luar yaitu sirip ekor mempunyai lekukan yang dangkal pada pusat celah sirip ekor; pada ikan dewasa matanya relatif besar dibandingkan dengan tuna-tuna yang lain; profil badan seluruh bagian dorsal dan ventral melengkung secara merata; sirip dada pada ikan dewasa, $1/4-1/3$ kali *fork length* (FL); sirip dada pada anak ikan tuna (juwana) lebih panjang dan selalu melewati belakang sebuah garis yang digambar di antara tepi-tepi anterior sirip punggung kedua dan sirip anal; Ikan-ikan tuna mata besar dengan ukuran <75 cm (10 kg) mempunyai sirip dada yang lebih panjang dari pada ikan tuna sirip kuning dari ukuran-ukuran yang sebanding (Arsal Arsenal, 2014)

c) albakora (*Thunnus alalunga*)



Gambar 2.3 albakora (*Thunnus alalunga*)

Albakora (*Thunnus alalunga*) mempunyai ciri-ciri yaitu badan memanjang seperti torpedo, mata agak besar, tergolong tuna besar. Lapisan insang 25-31 pada bujur insang pertama. Sirip dada memanjang seperti pedang dapat mencapai jari-jari lepas kedua dari sirip punggungnya. Lunas kuat pada batang ekor diapit oleh dua lunas kecil pada ujungnya. Terdapat dua cuping di antara sirip perut. Sisik-sisik kecil,

halus; Pada korselet tumbuh sisik besar tetapi tidak nyata. Sirip punggung pertama berjari-jari keras 13-14, dan 14 jari-jari lemah pada sirip punggung kedua, diikuti 7-8 jari-jari sirip lepas. Termasuk ikan buas, karnivora, predator. Jenis-jenis yang kecil hidup bergerombol. Hidup diperairan lepas pantai lautan terbuka. Warna bagian atas hitam kebiruan, mengkilat, putih perak bagian bawah. Sirip punggung pertama sedikit keabuan dengan warna kuning yang terpendam, pinggiran atas kegelapan. Sirip punggung kedua, dan dubur gelap kekuningan. Batas belakang sirip ekor keputihan. Ukuran dapat mencapai panjang 137 cm, umumnya 40–100 cm (Wikipedia, 2016).

d) Tuna sirip biru (*Thunnus maccoyii*).



Gambar 2.4 Tuna sirip biru (*Thunnus maccoyii*).

Tuna sirip biru Atlantik adalah salah satu yang terbesar, tercepat, dan berwarna paling cantik dari semua jenis ikan di dunia. Berbentuk torpedo, tubuh ramping yang dibangun untuk kecepatan dan daya tahan. Mereka berwarna biru logam di bagian atas dan berkilauan putih keperakan di bagian bawah yang membantu menyamarkan mereka dari atas dan bawah. Dan nafsu rakus dengan variasi makanan membuat ukuran mereka memiliki panjang rata-rata 6,5 kaki (2 meter) dan berat 550 pon (250 kilogram).

Tuna sirip biru memiliki bentuk tubuh yang sedikit banyak mirip dengan torpedo, disebut fusiform, sedikit memipih di sisinya dan dengan moncong meruncing. Sirip punggung (dorsal) dua berkas, sirip punggung pertama berukuran relatif kecil dan terpisah dari sirip punggung kedua. Di belakang sirip punggung dan sirip dubur (anal) terdapat sederetan sirip-sirip kecil tambahan yang disebut *finlet*. Sirip ekor bercabang dalam (bercagak) dengan jari-jari penyokong menutup seluruh ujung hipural. Di kedua sisi batang ekor masing-masing terdapat dua lunas samping berukuran kecil; yang pada beberapa spesiesnya mengapit satu lunas samping yang lebih besar. Tubuh kebanyakan dengan wilayah barut badan (*corselet*), yakni bagian di belakang kepala dan di sekitar sirip dada yang ditutupi oleh sisik yang tebal dan agak besar. Bagian tubuh sisanya bersisik kecil atau tanpa sisik. Tulang-tulang belakang (*vertebrae*) antara 31–66 buah (Cakrawala, 2012).

e) Ikan Cakalang (*Katsuwonus Pelamis*)



Gambar 2.5 Ikan Cakalang (*Katsuwonus Pelamis*).

Ikan cakalang merupakan salah satu jenis ikan laut yang memiliki pergerakan yang lebih cepat dan juga memiliki sifat yang rakus (*varancius*). Ikan ini termasuk

kedalam famili scomridae dengan genus kastuwonus. Selain itu, ikan cakalang ini hidup dengan bergerombol dan berkolompok dalam ukuran besar. Bentuk tubuh ini ternasuk kedalam bentuk torpedo dengan bentuk badan fusiform, bagian kelapa tebal, bentuk ramping dan ekor kuat serta sedikit pipih dari bagian samping.

Ukuran ikan cakalang di berbagai perairan dunia pada saat pertama kali memijah/ matang gonad adalah berbeda. Dalam perkembangannya, cakalang akan mencapai tingkat dewasa pada tahap ke empat. Pada tahap ini cakalang dapat mencapai panjang 39.1 cm untuk jantan dan 40.7 untuk yang betina. Ikan cakalang mulai memijah ketika panjang sekitar 40 cm dan setiap kali memijah dapat menghasilkan 1.000.000 – 2.000.000 telur. Cakalang memijah sepanjang tahun di perairan ekuator atau antara musim semi sampai awal musim gugur untuk daerah subtropis. Masa pemijahan akan menjadi semakin pendek dengan semakin jauh dari ekuator. Cakalang umumnya berukuran 40-80 cm dengan ukuran maksimum 100 cm (Hasan Sitorus, 2013).

Salah satu sumber makanan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan yang bergizi dan halal adalah makanan yang ada di laut. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S.an-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ١٤

Terjemahnya : “Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari

(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”(
Depertemen Agama RI, 2013: 395).

Ayat ini menyatakan bahwa: Dan Dia, yakni Allah swt, yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian agar kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam disana hingga kamu dapat memakan darinya daging yang segar yakni binatang-binatang laut itu dan kamu dapat mengeluarkan dariya yakni dari laut dan sungai. Allah menundukkan itu agar kalian memanfaatkannya untuk mencari rezeki yang dikaruniakan-Nya dengan cara berniaga dan cara-cara lainnya. Dan juga agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukkan untuk melayani kepentingan kalian.

Diterangkan dalam ayat tersebut bahwa supaya kalian mencari keuntungan dari karunianya dan supaya kalian bersyukur yakni mensyukuri nikmat-nikmatnya, kalian dapat menangkap ikan-ikan dan menyantap dagingnya yang segar.

C. Tinjauan Umum Tulang Ikan

Tulang adalah organ keras yang merupakan bentuk bagian pada endoskeleton vertebrata. Menurut (Lagler, 1977 dalam Amiruldin Musfiq, 2007) tulang berfungsi sebagai berikut :

1. Melindungi tubuh, dimana tulang dapat melindungi organ-organ internal dari pengaruh luar tubuh.
2. Membentuk tubuh.

3. Memproduksi sel darah.
4. Tempat penyimpanan mineral.
5. Untuk pergerakan tubuh.
6. Pada beberapa ikan, tulang bermodifikasi menjadi sirip mempercepat penempatan sperma pada saluran reproduksi pada ikan betina.

Skleton pada ikan terdiri dari : *notochord*, jaringan penghubung, tulang, kartilago, sisik, dan gigi (termasuk enamel dan dentin), neuralgia, dan sirip. Ikan memiliki rangka dalam yang terdiri dari tulang sejati (tulang keras), dan tulang rawan (kartilago). Dari kenampakan fisik, secara mudah terlihat bahwa tulang rawan lebih transparan (bening, tembus cahaya) dan lentur dibandingkan dengan tulang sejati (Lagler, 1977 dalam Amiruldin Musfiq, 2007).

Perkembangan dari embrio pada tulang adalah kartilago dihasilkan oleh sel-sel mesenkim, sesudah kartilago terbentuk rongga yang ada didalamnya akan terisi oleh osteoblast, yaitu sel-sel pembentuk tulang. Osteoblast juga menempati jaringan pengikat disekelilingnya dan membentuk sel-sel tulang. Jaringan utama pada tulang jaringan osseous relative keras dan terdapat mineral, dimana yang terbesar adalah kalsium fosfat sehingga menyebabkan tulang bersifat keras. Tulang umumnya memiliki matriks berupa hialin yang homogen dan jernih. Matriks yang berserabut lebih banyak mengandung kolagen yaitu semacam zat perekat tulang, dimana didalam tulang, kolagen memberikan elastisitas dan juga berkontribusi dalam resistensi fraktur (Wikipedia, 2007).

D. Kandungan Gizi Tulang Ikan Tuna

Ikan tuna adalah jenis ikan dengan kandungan protein yang tinggi dan lemak yang rendah. Tulang ikan merupakan salah satu limbah hasil pengolahan perikanan yang dapat dimanfaatkan sebagai tepung untuk bahan pangan. Kandungan zat gizi meliputi karbohidrat, protein, lemak, Vitamin D, kalsium, fosfor, magnesium dan besi tulang ikan tuna (Marta'ati, 2012).

Komposisi nilai gizi mendidihang terdiri dari energi 105,0 kal, protein 24,1 g, abu 1,2 g, lemak 0,1 g, abu 1,2 g, kalsium 9,0 mg, fosfor 220,0 mg, besi 1,1 mg, sodium 78,0 mg, retinol 5,0 mg, thiamin 0,1 mg, riboflavin 0,1 mg, dan niasin 12,0 mg. tulang ikan memiliki proporsi 10% dari total susunan tubuh ikan yang merupakan salah satu limbah yang memiliki kandungan kalsium tinggi. Tulang ikan banyak mengandung kalsium fosfat sebanyak 14% dari total susunan tulang, sisanya merupakan unsur lain seperti magnesium, natrium dan flourida. Kalsium fosfat merupakan kompleks kalsium yang biasa digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan asupan kalsium tubuh (Ahmad Thalib, 2015:12)



Table. 2.4.2 Komposisi nilai gizi Ikan Tuna (100 g)

Komponen kimia	Komposisi kimia	Satuan
Energi	105,0	Kal
Karbohidrat	109	Kcal
Protein	24,1	G
Lemak	0,1	G
Abu	1,2	G
Kalsium	9,0	Mg
Fosfor	220,0	Mg
Besi	1,1	Mg
Sodium	78,0	Mg
Retinol	5,0	Mg
Thiamin	0,1	Mg
Riboflavin	0,1	Mg
Niasin	12,2	Mg

Sumber: (Departement of Health, Education and Walfare 1972).

E. Tinjauan Umum Tepung Tulang Ikan Tuna

Tepung ikan yang dihasilkan berbentuk bubuk halus berwarna putih kekuningan hingga kuning, tergantung pada pada waktu autoclaving dan frekuensi perebusan yang dilakukan. Tepung tulang ikan sebagian besar tersusun atas mineral (kalsium dan fosfor) yang memiliki nilai porositas yang kecil, yang ditunjukkan dengan besarnya nilai densitas kamba yang diperoleh (Ahmad Talib, 2015).

Tepung tulang yang diperoleh dengan cara pemasakan dengan tekanan dan pengeringan atau disebut *steam bone meal* rata-rata mengandung 30,14 % kalsium dan 14,53 % fosfor. Menurut Ismanadji *et al* (2000) pengolahan tepung tulang ikan tuna dapat dilakukan dengan cara direbus dalam larutan asam pH 4, konsentrasi 1 % pada suhu 100°C selama 2 jam, lalu dikeringkan dan ditepung. Hasil yang telah diuji cobakan menunjukkan bahwa tepung tulang ikan tuna memiliki penampakan butiran halus merata, warna coklat muda kusem dan bau seperti ikan kering. Tepung tulang

yang dibuat dari tulang ikan tuna memiliki kandungan kalsium 13,19 %, fosfor 0,81 %, natrium 0,36 %, dan zat besi 0,03 %.


Menurut Nurul Asyifa Hafsiyah kandungan zat gizi yang terdapat dalam tepung tulang ikan tuna (*Thunnus sp*) yaitu kadar abu 68,86%, kadar karbohidrat 1,50%, protein 7,64%, lemak 3,83%, kalsium 14,48%, zat besi 1,105 ug/g dan vitamin A 2,499 ug/g.

Daya awet tepung tulang ikan tuna cukup lama, selama tiga bulan penyimpanan pada suhu kamar yang dikemas dalam kantong plastik dan divakum, secara umum belum menunjukkan penurunan mutu.

Proses pembuatan tepung tulang adalah sebagai berikut:

1. Tulang ikan dicuci untuk dibersihkan dari keturunan, darah dan daging yang menempel pada tulang
2. Perebusan 80°C 30 menit perebusan pertama
3. Pencucian air mengalir
4. Waktu perendaman 0, 2 dan 4 jam perendaman air jeruk lemon
5. Pencucian dengan air
6. Perebusan 100°C (perlakuan lamanya autoclaving : 2 jam, perebusan 3 kali)
7. Ekstraksi basa NaOH (1,5 N, 60°C, 2 jam)
8. Pencucian dengan air
9. Pengeringan matahari
10. Penggilingan dengan hammer mill
11. Pengayakan dengan ayakan berukuran 100 mesh

Skema Proses Pembuatan Tepung Tulang Ikan Tuna



Gambar 2.6 Skema Proses Pembuatan Tepung Tulang Ikan Tuna

F. Tinjauan Umum Tentang Biskuit

Biskuit merupakan produk makanan yang dibuat dari bahan dasar terigu yang dipanggang hingga kadar air kurang dari 5%. Biskuit adalah produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau substitusinya, minyak atau lemak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan (Badan Standardisasi Nasional, 2011).

Biskuit diklasifikasikan dalam empat jenis yaitu biskuit keras, *crackers*, *cookies* dan *wafer*. Biskuit keras adalah jenis biskuit yang dibuat dengan adonan berbentuk pipih, bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur padat dan dapat berkadar lemak tinggi atau rendah. *Crackers* adalah jenis biskuit yang dibuat adonan keras melalui proses fermentasi atau pemeraman. *Cookies* adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi dan bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang padat, sedangkan *wafer* adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan cair, berpori-pori kasar, renyah dan bila dipatahkan penampang potongannya berongga-rongga (Badan Standardisasi Nasional, 2011).

Tabel 2.6.3 Syarat Mutu Biskuit

Kriteria	Persyaratan
Air	Maksimum 5%
Protein	Minimum 6%
Lemak	Minimum 9,5%
Karbohidrat	Minimum 70%
Abu	Maksimum 2%
Logam berbahaya	Negative
Serat kasar	Maksimum 0,5%
Energi (Kal/100g)	Minimum 400
Jenis tepung	Terigu
Bau dan rasa	Normal, tidak tengik
Warna	Normal

Sumber : SNI 01-2973-1992

Penelitian ini biskuit yang dibuat adalah biskuit dari tulang ikan tuna yang dibuat menjadi tepung terlebih dahulu. Hasil penepungan atau tepung tulang ikan tuna dijadikan sebagai bahan baku pembuatan biskuit, adapun warna dari biskuit ini berwarna putih kekuningan hingga kuning dan rasa biskuit yang manis dengan penambahan gula dan teksturnya yang kering dan renyah seperti biskuit pada umumnya.

Untuk menghasilkan biskuit tulang ikan tuna bahan-bahan yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:

1. Tepung terigu

Tepung terigu relatif lebih mudah terdispersi dan tidak mempunyai daya serap yang terlalu tinggi. Tepung merupakan komponen paling banyak dalam pembuatan makanan. Tepung terigu berfungsi sebagai bahan dasar untuk pembentukan adonan pada makanan. Berdasarkan kandungan proteinnya tepung dapat dibedakan menjadi tiga jenis, terigu keras kadar protein minimal 12% yang biasa digunakan untuk roti, donat dan mie contohnya merk Cakra Kembar, Kereta Kencana, Cakra Kembar Emas (Bogasari) dan Tali Emas, terigu sedang kadar protein sebesar 10-11% yang biasanya

digunakan untuk membuat aneka makanan, seperti kue pukis, pisang goreng, martabak manis, bakwan, bolu kukus, cake merk Segitiga Biru & Gunung Bromo (Bogasari), Beruang Biru dan terigu lunak kadar protein sebesar 7-9%. Umumnya digunakan utk membuat kue kering (cookies), pie dan cake. Komponen terbesar tepung terigu adalah pati. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut dengan amilopektin (Winarno 1997 dalam Anita 2010).

Tabel 2.6.4 Kandungan Gizi Tepung Terigu dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
Kalori	365 kal
Protein	8.9 g
Lemak	1.3 g
Karbohidrat	77.3 g
Kalsium	16 mg
Fosfor	106 mg
Besi	1.2 mg
Vitamin B1	0.12 mg
Air	12 mg

Sumber : Prawiranegara (1989) dalam Anita 2010

2. Margarin

Margarin adalah produk yang mengandung lemak jenuh. Lemak sebagai salah satu komponen utama makanan memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kesehatan. Lemak tidak hanya menyumbangkan energy sebanyak 30% atau lebih dari total energi yang diperlukan tubuh, tetapi juga merupakan sumber asam lemak esensial linolenat, serta berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K sehingga dapat diserat dalam tubuh. Selain itu, lemak memberikan cita rasa dan aroma yang spesifik pada makanan dan sulit diganti oleh komponen pangan lainnya. Akan tetapi, konsumsi lebih dari 30% dari total energy yang diperlukan ternyata dapat memicu munculnya berbagai penyakit antara lain obesitas (kegemukan),

beberapa jenis kanker, peningkatan kolesterol yang merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner (PJK), dan stroke.

Konsumsi lemak minimal belum diketahui dengan pasti, namun World Health Organization (WHO) menganjurkan konsumsi lemak minimum 20% dari total energi (sekitar 60 gram per hari untuk orang dewasa). Konsumsi lemak perkapital disuatu Negara ditentukan oleh Gross Domestic Product (GDP). Makin tinggi GDP, makin tinggi pula konsumsi lemak per capital, tetapi rasio konsumsi minyak nabati/ minyak hewani relatif tetap dan spesifik karena pola menu makan spesifik. Berdasarkan rasio konsumsi minyak nabati/hewani dan konsumsi per capital, Negara-negara konsumsi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok.

Rasio konsumsi minyak nabati/hewani 1-2 dengan konsumsi per capital 50,2 kg terdapat di Amerika, Eropa, dan Australia. Rasio konsumsi minyak nabati/hewani 2-3 dan konsumsi per capital 21,7 kg adalah Jepang. Rasio konsumsi minyak nabati/hewani 21-30 dengan konsumsi per capital 22,5 kg adalah Negara-negara Afrika selatan. Sementara, di Indonesia rasio konsumsi minyak nabati/hewani >50 konsumsi per capital 15 kg.

Lemak hewani, kecuali ikan, umumnya tergolong lemak jenuh. Lemak hewani mengandung kolesterol, dan pada suhu kamar biasanya berwujud setengah padat. Sebaiknya, lemak tak jenuh biasanya berasal dari tanaman dan berbentuk cair pada suhu kamar sehingga disebut minyak, serta tidak mengandung kolesterol (dapat diabaikan). Konsumsi lemak yang berlebihan, yakni di atas 30% dari energi total, dan terutama lemak jenuh seperti margarine, biasanya dapat menaikkan kolesterol darah di atas normal (150-200 mg/100 ml). Lemak cair atau minyak nabati (minyak dari tanaman) biasanya termasuk lemak tak jenuh, umumnya tidak akan meninggalkan kolesterol jika jumlah yang dikonsumsi tidak terlalu tinggi.

Margarin adalah salah satu produk makanan berupa lemak setengah padat untuk dioleskan pada makanan, terutama roti, atau juga untuk menggoreng. Margarin merupakan emulsi air dalam lemak, yang terdiri atas 85% lemak dan 15% air. Kedalam emulsi ini ditambah zat-zat tambahan maka seperti penemulsi lesiten, pemberian cita rasa, aroma, garam, zat warna, vitamin dan lain-lain (kanisius, 2010 139:141).

Tabel 2.6.5 Komposisi Margarin Kandungan Gizi dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
Energi	720 kkal
Protein	0,6 kg
Lemak	81 gr
Karbohidrat	0,4 gr
Kalsium	20 mg
Fosfor	16 mg
Vitamin A	200 IU

Sumber : Kementerian Kesehatan RI dalam Candra, 2015

3. Gula pasir

Gula adalah suatu karbohidrat yang sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi utama gula paling banyak diperdagangan dalam bentuk Kristal sukrosa padat. Gula digunakan mengubah rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana, seperti glukosa (yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam), menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel (Santoso, 1999 dalam Romlah Nurlaeli, 2011)

Gula pasir atau sukrosa adalah disakarida terdiri atas 1 gugus glukosa dan 1 gugus fruktosa. Gula adalah karbohidrat murni karena tidak mengandung nutrient lainnya seperti protein, lemak, vitamin dan mineral. Gula ditambahkan pada jenis roti tertentu untuk melengkapi karbohidrat yang ada untuk fermentasi dan untuk

memberikan rasa yang lebih manis. Tapi gula lebih banyak dipakai untuk pembuatan kue dan biskuit dimana selain rasa manis gula juga mempengaruhi tekstur. Jadi jumlah gula yang tunggu membuat remah kue lebih lunak dan lebih basah dan pada biskuit juga bersifat melunakkan (Buckle dkk, 1985 dalam Nurlaeli Romlah, 2011).

Tabel 2.6.6 Komposisi Gula Kandungan Gizi dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
Energi	364
Karbohidrat	94
Kalsium	5 mg
zat besi	0,1 mg
Fosfor	1 mg

Sumber : Kementerian Kesehatan RI dalam Candra, 2015

4. Garam

Garam adalah benda padatan bewarna putih berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan sebahagian besar terdiri dari Natrium Chlorida (>80%), serta senyawa-senyawa lain seperti Magnesium Chlorida, Magnesium Sulfat, Calcium Chlorida. Garam mempunyai sifat karakteristik hidroskopis yang berarti mudah menyerap air, tingkat kepadatan sebesar 0,8 – 0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 801oC (Subiyantoro. S, 2001). Garam merupakan salah satu bahan kimiawi untuk stabilisasi tanah lempung, struktur garam (NaCl) meliputi anion ditengah dan kation menempati pada rongga octahedral (Herman. willy joetral, 2015).

Tabel 2.6.7 Komposisi Garam Kandungan Gizi dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
Kilojoule	0 kj
Kalori	0 kkal
Lemak	0 g
Lemak Jenuh	0 g
Lemak Tak Jenuh Ganda	0 g
Lemak Tak Jenuh Tunggal	0 g
Kolesterol	0 mg
Protein	0 g
Karbohidrat	0 g
Serat	0 g
Gula	0 g
Sodium	38758 mg
Kalium	8 mg

Sumber : Berdasarkan AKG dari 2000 kalori

Proses pembuatan biskuit dimulai dengan seleksi bahan yaitu pemilihan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan, pengovenan, dan pengemasan. Tahap-tahap dalam pembuatan biskuit crackers adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
 - a. Menyiapkan peralatan yang dipergunakan dalam pembuatan biskuit crackers substitusi tepung tulang ikan tuna yang dikondisikan bersih dan higienis.
 - b. Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan biskuit crackers tepung tulang ikan tuna.
 - c. Menimbang bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan ukuran.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pembuatan biskuit crackers tepung tulang ikan tuna sebagai berikut:

- a. Pencampuran bahan

Pencampuran bahan adalah suatu proses penyatuan semua bahan biskuit crackers tepung tulang ikan tuna menjadi satu adonan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Air dan garam diaduk merata adonan 1.
- 2) Tepung terigu, margarine, tepung tulang ikan mendidihang dan gula halus dicampur dan aduk rata adonan 2.
- 3) Pencampuran adonan 1 dan 2 lalu di aduk dengan tangan hingga licin.
- 4) Pemeraman adonan (aging) selama 30 menit
- 5) Pencetakan adonan sesuai selera
- 6) Pemanggaan (oven) bersuhu 100°C selama 20 menit.

b. Pengovenan

Adonan yang sudah dicetak, kemudian dipanggang dalam oven sampai matang dengan waktu ± 20 menit.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian dari proses pembuatan biskuit crackers substitusi tulang ikan tuna adalah sebagai berikut:

1) Pendinginan


Pendinginan bertujuan untuk menghilangkan uap panas sebelum dilakukan pengemasan.

2) Pengemasan

Pengemasan menggunakan toples atau plastik tebal yang tertutup rapat agar biskuit crackers dapat bertahan lama dalam kerenyahannya dan menjaga bentuk dari biskuit crackers.



Skema Pembuatan Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna



Gambar 2.7 Skema Proses Pembuatan Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna

G. Tinjauan Umum Uji Organoleptik

Organoleptik merupakan suatu metode yang digunakan untuk menguji kualitas suatu bahan atau produk menggunakan panca indra manusia. Jadi dalam hal ini aspek yang diuji dapat berupa warna, rasa, bau, dan tekstur. Organoleptik merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menganalisis kualitas dan mutu produk.

Uji hedonik atau uji kesukaan merupakan salah satu jenis uji penerimaan. Uji hedonik merupakan suatu kegiatan pengujian yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang panelis yang mana memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan atau ketidaksukaan konsumen tersebut terhadap suatu produk tertentu. Panelis diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan. Maka dari itu, produk yang tidak dipilih dapat menunjukkan bahwa produk tersebut disukai atau tidak disukai. Panelis diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya (ketidaksukaan). Disamping panelis mengemukakan tanggapan senang, suka atau kebalikannya, mereka juga mengemukakan tingkat kesukaannya. Tingkat-tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik. Skala hedonik dapat juga direntangkan atau dialirkan menurut rentangan skala yang akan dikehendakinya. Skala hedonik juga dapat diubah menjadi skala numerik dengan angka mutu menurut tingkat kesukaan. Dengan data numerik dapat dilakukan analisis secara parameterik (Soekarto, 1985 dalam Wasil, 2016).

Berbeda dengan uji kesukaan, uji mutu hedonik tidak menyatakan suka atau tidak suka melainkan menyatakan kesan tentang baik atau buruk. Kesan baik atau buruk ini disebut kesan mutu hedonik. Oleh karena itu beberapa ahli memasukkan uji

mutu hedonik ini kedalam uji hedonik. Kesan mutu hedonik lebih spesifik dari pada sekedar kesan suka atau tidak suka. Mutu hedonik dapat bersifat umum, yaitu baik atau buruk dan bersifat empuk-keras untuk daging. Pulen-keras untuk nasi dan renyah untuk mentimun. Rentang skala hedonik berkisar dari sangat buruk sampai sangat baik. Skala hedonik pada uji mutu hedonik sampai dengan tingkat mutu hedonik. Jumlah tingkat skala juga tergantung dari rentangan mutu yang diinginkan dari sensitifitas antar skala. Prinsip uji mutu hedonik ini mencoba suatu produk tanpa membandingkan dengan sampel lain (Nuraini, 2013 dalam wasil, 2016).

Dalam penilaian organoleptik dikenal tujuh macam panel, yaitu panel perseorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel tidak terlatih, panel konsumen dan panel anak-anak. Perbedaan ketujuh panel tersebut didasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik (Muji Rahayu, 2013)

1. Panel Perseorangan

Panel perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. Panel perseorangan sangat mengenal sifat, peranan, dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai dan menguasai metoda-metoda analisis organoleptik dengan sangat baik. Keuntungan menggunakan panelis ini adalah Kepekaan tinggi, bias dapat dihindari, penilaian cepat, efisien, dan tidak cepat *fatik*. Panel perseorangan biasanya digunakan untuk mendeteksi penyimpangan yang tidak terlalu banyak dan mengenali penyebabnya. Keputusan yang dihasilkan sepenuhnya hanya seorang saja.

2. Panel Terbatas

Panel terbatas adalah terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi. Panelis ini mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan dapat mengetahui cara pengolahan serta pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir. Keputusan diambil setelah berdiskusi diantara anggota-anggotanya.

3. Panel Terlatih

Panel terlatih adalah terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik. Untuk menjadi panelis terlatih perlu didahului dengan seleksi dan latihan-latihan. Panelis ini dapat menilai beberapa sifat rangsangan, sehingga tidak terlampaui spesifik. Keputusan diambil setelah data dianalisis secara statistik.

4. Panel Agak Terlatih

Panel agak terlatih adalah terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat sensorik tertentu. Panel agak terlatih dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji kepekaannya terlebih dahulu.

5. Panel Tidak Terlatih


Panel tidak terlatih adalah terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, tingkat sosial, dan pendidikan.

6. Panel Konsumen

Panel konsumen adalah terdiri dari 30 hingga 100 orang tergantung pada target pemasaran suatu komoditi. Mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan daerah atau kelompok tertentu.


7. Panel Anak-anak

Panel anak-anak menggunakan anak-anak berusia 3-10 tahun. Panelis anak-anak ini dilakukan secara bertahap, yaitu dengan pemberitahuan atau undangan bermain bersama, kemudian dipanggil untuk diminta responnya terhadap produk yang dinilai dengan alat bantu gambar seperti boneka, *snoopy* yang sedang sedih, biasa dan tertawa.



H. Kerangka Konsep


Adapun kerangka konsep variabel yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.8 Kerangka Konsep

I. Rancangan Penelitian

Adapun rancangan penelitian berdasarkan uji yang dilakukan pada biskuit Tulang Ikan Tuna, yaitu:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian kuantitatif lapangan. Disebut sebagai kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian pembuatan biskuit crackers tulang ikan tuna dilakukan di rumah. Untuk penelitian penentuan kandungan kadar abu, karbohidrat, protein, dan lemak, dilakukan di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, penentuan kandungan kalsium dan zat besi dilakukan di Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar, penentuan kandungan vitamin A dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, sedangkan uji organoleptik untuk biskuit crackers tulang ikan tuna dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar.

B. *Pendekatan Penelitian*

Jenis rancangan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) karena diterapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan homogen (atau dapat dianggap homogen), misalnya percobaan-percobaan yang dilaksanakan di laboratorium dimana pengaruh lingkungan secara nisbi lebih mudah dikendalikan.

Perlu dijelaskan disini bahwa yang disebut "lingkungan" adalah faktor-faktor lain diluar faktor yang sedang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimentatif dengan menggunakan desain true-eksperimen, Dikatakan true-eksperimen karena mengikuti seluruh prosedur dan syarat eksperimen terutama dalam kontrol variabel, pemberian manipulasi (perlakuan) dan pengujian hasil. Semua variabel dikontrol, kecuali variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus (variabel yang akan diuji akibatnya), sedang kelompok kontrol diberi perlakuan lain (yang biasa dilakukan) dan hasilnya dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Pengukuran/pengujian menggunakan instrumen baku (tes standar). Setelah menentukan metode yang baik, selanjutnya dilakukan perlakuan atau pengkomposisian tepung terigu dan tepung tulang ikan tuna dengan perbandingan kelompok kontrol 1:0, kelompok eksperimen 0:1, 1:1, 1:3 dan 3:1. Perlakuan terhadap kedua bahan tersebut dilakukan dengan *food processor* sehingga dihasilkan *biskuit crackers* yang homogen.

Model true-eksperimen yang digunakan yaitu *Posttest Only Control Group Design*. Dalam rancangan ini, memungkinkan peneliti mengukur pengaruh perlakuan (intervensi) pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkan kelompok tersebut dengan kelompok kontrol. Tetapi rancangan ini tidak memungkinkan peneliti untuk menentukan sejauh mana atau seberapa besar perubahan itu terjadi, sebab *pretest* tidak dilakukan untuk menentukan data awal (Notoatmodjo, 2010).

Bentuk rancangan ini sebagai berikut:

	Perlakuan	Posttest
R (Kelompok Eksperimen)	X	02
R (Kelompok Kontrol)		02

Pada penelitian ini dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar total kandungan zat gizi (abu, karbohidrat, lemak, protein, kalsium, zat besi (Fe), dan vitamin A, serta uji mutu hedonik dan uji hedonik melalui uji organoleptik dalam biskuit crackers tulang ikan tuna.

C. Objek penelitian

Adapun objek yang diteliti pada penelitian ini adalah biskuit crackers tepung tulang ikan tuna dengan perbandingan 1:0 (Tepung terigu 100 gram), 0:1 (Tepung tulang ikan tuna 100 gram), 1:1 (Tepung terigu 50 gram dan tepung tulang ikan tuna 50 gram), 1:3 (Tepung tulang 25 gram dan tepung terigu 75 gram) dan 3:1 (Tepung tulang ikan tuna 75 gram dan tepung terigu 25 gram).

D. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan sebagainya. Dan pendokumentasian juga dilakukan lewat dokumentasi foto.

2. Uji Laboratorium

Uji laboratorium atau riset laboratorium adalah melakukan eksperimen melalui percobaan tertentu dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang tersedia

di laboratorium penelitian. Uji laboratorium pada penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data tentang kadar zat gizi (kalsium, vitamin A, zat besi (Fe), Karbohidrat, protein dan lemak) yang terdapat dalam biskuit tepung tulang ikan tuna. Uji laboratorium ini dilakukan menggunakan prosedur kerja yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) yang kemudian dihitung menggunakan rumus sesuai dengan parameter yang akan diteliti oleh peneliti.

E. Instrumen Penelitian

1. Instrumen yang digunakan untuk pembuatan sampel

- a. Alat yang digunakan untuk membuat sampel yaitu, pisau, oven, talenan, piring, baskom, sendok, dan timbangan.
- b. Bahan
 - 1) Tepung tulang ikan tuna (1:0=100 gram, 1:1=50 gram, 1:3=25 gram, dan 3:1=75 gram)
 - 2) Tepung terigu (0:1=100 gram, 1:1=50 gram, 3:1=25 gram, dan 1:3=75 gram)
 - 3) Air 45 gram
 - 4) Garam 0,3 gram
 - 5) Margarine 30 gram
 - 6) Gula 3 gram
- c. Pencampuran bahan

Pencampuran bahan adalah suatu proses penyatuan semua bahan biskuit crackers tepung tulang ikan tuna menjadi satu adonan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Air dan garam diaduk merata (adonan 1)

- 2) Tepung terigu, margaring, tepung tulang ikan mendidihang dan gula halus aduk rata (adonan 2)
- 3) Pencampuran bahan 1 dan 2 lalu diaduk dengan tangan hingga licin
- 4) Pemeraman adonan (anging) selama 30 menit
- 5) Cetak adonan dengan sesuai selera
- 6) Pemanggaan (oven) bersuhu 100⁰C selama 20 menit.

2. Kadar Abu

Prosedur kerja dalam penentuan kadar abu sebagai berikut:

a. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan porselen atau platina, tanur listrik, dan neraca analitik.

b. Prosedur Kerja

- 1) Timbang dengan seksama 2 gram contoh ke dalam sebuah cawan porselen (atau platina) yang telah diketahui bobotnya, untuk contoh cairan uapkan di atas penangas air sampai kering.
- 2) Arangkan di atas nyala pembakar, lalu abukan dalam tanur listrik pada suhu maksimum 550⁰C sampai pengabuan sempurna (sekali-kali pintu tanur dibuka sedikit, agar oksigen bias masuk).
- 3) Dinginkan dalam oksikator, lalu timbang sampai bobot tetap.

c. Perhitungan

$$\text{Kadar abu} = \frac{w_1 - w_2}{W} \times 100\%$$

Dimana :

W = Bobot contoh sebelum diabukan, dalam gram

W_1 = Bobot contoh + cawan sesudah diabukan, dalam gram

W_2 = Bobot cawan kosong, dalam gram

3. Kadar Karbohidrat metode *Luff Scrool*

Prosedur kerja dalam penentuan kadar karbohidrat sebagai berikut :

- a. Sampel ditimbang dengan seksama kurang lebih 5 g ke dalam Erlenmeyer 500 mL.
- b. Tambahkan HCL3% sebanyak 200 mL.
- c. Hubungkan dengan kondensor dan didihkan selama 3 jam menggunakan pendingin tegak setelah itu dinginkan.
- d. Larutkan dengan NaOH 30 % sebanyak 15 mL, hingga pH 5,5 atau dengan lakmus.
- e. Tambahkan CH_3COOH 3% hingga suasana asam
- f. Pindahkan isi karbohidrat ke labu 500 mL dan himpitkan dengan aquades kemudian homogenkan dan saring menggunakan kertas saring..
- g. Pipet 10 mL ke dalam labu erlenmeyer 300 mL, tambahkan 25 mL larutan luff, masukkan batu didih dan 15 mL aquades.
- h. Panaskan hingga mendidih, usahakan agar larutan dapat mendidih dalam waktu 3 menit (menggunakan stopwatch) didihkan terus sampai 10 menit, dinginkan diatas air.
- i. Setelah dingin ditambahkan 15 mL KI 20%, 25 mL H_2SO_4 25%, titrasi dengan tio hingga kuning muda.

- j. Teteskan amilun 1-2 tetes, titrasi kembali dengan tio secara perlahan hingga warna putih susu.
- k. Hasil yang diperoleh dimasukkan kedalam rumus :

$$\text{Kadar Glukosa} = \frac{\text{Glukosa dari tabel (mg)} \times \text{fp}}{\text{Bobot sampel (mg)}} \times 100\%$$

$$\text{Kadar Karbohidrat} = 0,95 \times \text{Kadar glukosa}$$

Keterangan : Fp (Faktor Pengencer) = 100

4. Kadar Protein metode *Kjedahl*

Prosedur kerja dalam penentuan kadar protein sebagai berikut:

- a. Timbang sampel kira-kira 0,5 g, bahan tersebut dimasukkan ke dalam labu kjehdal.
- b. Tambahkan 2 g campuran selen dan 25 mL H₂SO₄ pekat serta batu didih.
- c. Panaskan mula-mula dengan api kecil, kemudian besarkan sampai mendidih dan larutan menjadi berwarna jernih kehijauan dan uap SO₂ hilang.
- d. Biarkan dingin dan pindahkan ke dalam labu ukur 100 mL dan impitkan sampai tandai tera.
- e. Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu destilasi dan tambahkan 5 mL NaOH 30% dan beberapa tetes indikator PP.
- f. Sulingkan selama lebih kurang 10 menit. Destilat ditampung dalam 10 mL larutan asam borat 2%. Lakukan destilasi sampai uap destilat tidak bereaksi basa lagi (uji dengan kertas pH). Setelah selesai destilasi, bilas ujung kondensor dengan air suling.
- g. Larutan asam borat dititrasi dengan HCL standar dengan menggunakan metal merah sebagai indikator.

h. Hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam rumus:

$$\text{Kadar Protein} = \frac{(V_1 - V_2) \times N \times 0,014 \times f.k \times f.p}{W}$$

Keterangan :

W = Berat sampel

V₁ = Volume HCl 0,01 N yang dipergunakan penitaran contoh/sampel

V₂ = Volume HCl yang digunakan penitaran blanko

N = Normalitas HCl

f.k = Faktor konversi untuk protein dari makanan secara umum 6,25

f.p = Faktor pengenceran = 20

5. Kadar Lemak metode *Gravimetri*

Prosedur kerja dalam penentuan kadar lemak sebagai berikut:

a. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca analitik, corong, gelas kimia, oven, labu alas bulat, alat soxhlet.

b. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah n-heksan, *waterbath*, kertas saring, kapas bebas lemak dan aluminium foil.

c. Prosedur Kerja

- 1) Timbang sampel 2 g, lalumasukkan dalam selongsong kertas saring yang dialasi dengan kapas.
- 2) Sumbat selongsong kertas yang berisi sampel tersebut dengan kapas, keringkan dalam oven pada suhu tidak lebih dari 80°C selama lebih kurang 1 jam.

- 3) Masukkan sampel ke dalam alat soxhlet yang telah dihubungkan dengan labu lemak berisi batu didih dan 250 mL n-heksana yang telah diketahui bobotnya.
- 4) Panaskan dengan hotplate sementara proses ekstrak dengan n-heksana selama lebih kurang 4 jam.
- 5) Tampung ekstrak pada labu alas bulat, kemudian sulingkan heksana dengan alat rotavapor untuk memisahkan pelarut dengan lemak.
- 6) Keringkan ekstrak lemak dalam oven selama 1 jam.
- 7) Dinginkan di desikator.
- 8) Timbang wadah lemak dan wadah tanpa lemak

d. Perhitungan:

$$\% \text{ Lemak} = \frac{B-A}{\text{Berat Sampel}} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Labu Lemak Kosong

B = Labu Lemak + Lemak Setelah Ekstraksi

e. Ketelitian

Kisaran hasil dua kali ulangan maksimal 5% dari nilai rata-rata hasil kadar lemak. Jika kisaran lebih besar dari 5% analisis harus diulang kembali.

6. Kadar Kalsium metode ASS

a. Pembuatan Larutan Standar Ca^{2+}

- 1) Mengambil sebanyak 1 mL larutan induk Ca^{2+} 1000 ppm menggunakan pipet volume.
- 2) Lalu mengencerkannya ke dalam labu ukur 10 mL menggunakan akuades menjadi larutan Ca^{2+} 100 ppm.
- 3) Mengambil sebanyak 5 mL larutan Ca^{2+} 100 ppm, lalu mengencerkannya dalam labu ukur 50 mL menggunakan akuades menjadi larutan Ca^{2+} 10 ppm.
- 4) Membuat larutan standar Ca^{2+} berbagai konsentrasi dengan menggunakan perhitungan: $N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$.

- 5) Lalu ditambahkan larutan SrCl_2 sebanyak 1 mL pada masing-masing labu ukur, selanjutnya diencerkan dengan menggunakan aquades sampai tanda batas 10 mL.

b. Preparasi Sampel

- 1) Memipet larutan sampel dengan menggunakan pipet volume 5 mL. Lalu dilarutkan dalam air raja 10 mL (7,5 HCl pekat : 2,5 mL HNO_3 pekat).
- 2) Lalu dipanaskan di atas *hotplate* dan menutup gelas beker dengan menggunakan kaca arloji.
- 3) Lalu dipanaskan hingga volume tinggal setengahnya lalu hasil campuran tersebut disaring menggunakan kertas saring
- 4) Dimasukkan dalam labu ukur 100 mL dan ditambahkan larutan SrCl_2 1 mL lalu diencerkan dengan aquades sampai tanda batas.
- 5) Kemudian diambil 1 mL dan diencerkan dengan aquades hingga volume 10 mL.

c. Persiapan alat

- 1) Menyalakan kompresor dan gas
- 2) Menyalakan AAS
- 3) Memeriksa spektrum AAS
- 4) Melengkapi parameter
- 5) Memilih lampu katoda Ca

d. Pengukuran absorbansi sampel dengan AAS

- 1) Awalnya dilakukan pengukuran dengan blanko terlebih dahulu.
- 2) Kemudian baru dilakukan pengukuran larutan standar dari konsentrasi terendah ke konsentrasi tertinggi.

7. Analisis kadar vitamin A metode Spektrofotometri UV-Vis.

- a. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat spektrofotometer UV-Vis, neraca analitik, sendok tanduk, gelas kimia 250 mL, gelas ukur 20 mL dan 100 mL, labu ukur 50 mL dan 100 mL, batang pengaduk, kertas saring, pipet ukur 10 mL, pipet tetes, corong, corong pisah, penyangga sarigan.
- b. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel, beta carotene p.a, aceton, potroleum benzene, KOH 15%, alcohol, aluminium foil.
- c. Prosedur kerja sebagai berikut:
 - 1) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu cuci bersih alat dan bahan yang digunakan agar tidak ada kontaminasi dari bahan-bahan lain yang tidak diinginkan yang akan mempengaruhi hasil akhir.
 - 2) Gerus sampel dan homogenkan
 - 3) Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 10 gr.
 - 4) Maserasi dengan aceton 100 mL, tutup dengan aluminium foil dan diamkan selama 1 jam.
 - 5) Saring dengan kertas saring, kemudian ekstrak aceton di evaporator.
 - 6) Hasil ekstrak kemudian ditambahkan KOH 15% sebanyak 5 mL.
 - 7) Diamkan selama 24 jam.
 - 8) Ekstraksi dengan potroleum benzene (pengocokan pelan) secara berulang sampai ekstrak potroleum benzene tidak berwarna.
 - 9) Impitkan pada labu takar 100 mL.
- d. Pembuatan larutan baku beta carotene 100 mg/L
 - 1) Beta karoten 1000 mg/L
Timbang standar beta karoten 0,1 gram larutkan dalam labu ukur 100 mL dengan 15 mL aceton, tepatkan volume dengan petroleum benzene.

2) Beta karoten 100 mg/L

Pipet 5 mL standar beta karoten 1000 mg/L ke labu ukur 50 mL, tepatkan volume dengan petroleum benzene.

3) Beta karoten 10 mg/L

Pipet 5 mL standar beta karoten 100 mg/L ke labu ukur 50 mL, tepatkan volume dengan petroleum benzene.

4) Buat konsentrasi 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mg/L dengan cara memipet masing-masing 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mL beta karoten 10 mg/L ke labu ukur 10 mL, tepatkan volume dengan petroleum benzene.

5) Pembuatan kurva benzene.

e. Cara uji sampel

- 1) Optimalkan spektrofotometer sesuai petunjuk penggunaan alat
- 2) Ukur serapan sampel pada panjang gelombang 450 nm
- 3) Lakukan pengenceran jika konsentrasi sampel lebih besar dari konsentrasi larutan kerja tertinggi

f. Perhitungan

$$\text{Beta karoten } (\mu\text{g/g}) = \frac{\text{Konsentrasi sampel } (\mu\text{g/mL}) \times \text{Volume akhir sampel (mL)}}{\text{Bobot sampel (g)}}$$

7. Kadar Zat Besi metode Spektrofotometri Absorpsi Atom Serapan (AAS).

a. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas ukur, erlenmeyer, pipet volume, corong, kertas saring, labu ukur 50 ml, lemari asam, Spektrofotometri AAS, neraca analitik.

b. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nitric Acid 10 ml, dan Aquadest.

c. Prosedur Kerja

- 1) Gerus sampel 5 gr
- 2) Tambahkan dengan Nitric Acid 10 ml
- 3) Panaskan dalam lemari asam
- 4) Tambahkan aquadest 25 ml
- 5) Saring hingga volume sampel 50 ml
- 6) Encerkan sebanyak 20 kali dalam labu ukur 50 ml

Uji menggunakan Spektrofotometri Absorpsi Atom Serapan.

8. Organoleptik

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses pengindraan. Pengindraan diartikan sebagai suatu proses fisio-psikologis, yaitu kesadaran atau pengenalan alat indra akan sifat-sifat benda karena adanya rangsangan yang diterima alat indra yang berasal dari benda tersebut. Pengindraan dapat juga berarti reaksi mental (sensation) jika alat indra mendapat rangsangan (stimulus). Reaksi atau kesan yang ditimbulkan karena adanya rangsangan dapat berupa sikap untuk mendekati atau menjauhi, menyukai atau tidak menyukai akan benda penyebab rangsangan. Kesadaran, kesan dan sikap terhadap rangsangan adalah reaksi psikologis atau reaksi subyektif. Pengukuran terhadap nilai / tingkat kesan, kesadaran dan sikap disebut pengukuran subyektif atau penilaian subyektif. Disebut penilaian subyektif karena hasil penilaian atau pengukuran sangat ditentukan oleh pelaku atau yang melakukan pengukuran (Anonim, 2013).

Tabel 3.1
Keterangan Penilaian Mutu Hedonik Terhadap Warna, Aroma, Tekstur
Dan Rasa

Mutu Hedonik							
Warna		Aroma		Tekstur		Rasa	
1	Sangat Gelap	1	Sangat Tidak Harum	1	Sangat Tidak Keras	1	Sangat Tidak Enak
2	Gelap	2	Tidak Harum	2	Tidak Keras	2	Tidak Enak
3	Agak Gelap	3	Agak Tidak Harum	3	Agak Tidak Keras	3	Agak Tidak Enak
4	Biasa/netral	4	Biasa	4	Biasa	4	Biasa
5	Agak terang	5	Agak Harum	5	Agak Keras	5	Agak Enak
6	Terang	6	Harum	6	Keras	6	Enak
7	Sangat Terang	7	Sangat Harum	7	Sangat Keras	7	Sangat Enak

Pada tabel 3.1, untuk skala penilai mutu hedonik terhadap warna, aroma, tekstur dan rasa memiliki range skor 1-7. Untuk skor 1 adalah nilai terendah dan skor 7 adalah nilai tertinggi. Nilai tengah atau median skor 4, digunakan untuk mengelompokkan nilai mutu hedonik, dimana skor <4 dikatakan buruk, dan >4 dikatakan baik.

Tabel 3.2
Tingkat Penilaian Mutu Hedonik

Mutu Hedonik	
Skor	Kriteria
1	Sangat Tidak Baik
2	Tidak Baik
3	Agak Tidak Baik
4	Biasa
5	Agak Baik
6	Baik
7	Sangat Baik

Pada tabel 3.2 penilaian over All mutu hedonik, digunakan untuk melihat secara keseluruhan mutu produk yang di teliti. Memiliki range skor 1-7. Untuk skor 1 adalah nilai terendah dan skor 7 adalah nilai tertinggi. Nilai tengah atau median skor 4, digunakan untuk mengelompokkan nilai mutu hedonik, dimana skor <4 dinyatakan buruk, dan >4 dinyatakan baik.

Terdapat 11 tingkatan nilai untuk mengukur tingkat kesukaan konsumen dengan skor yang paling rendah adalah 1 dan skor yang paling tinggi adalah 11. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Tingkat Penerimaan Konsumen

Hedonik	
1	Sangat-Sangat Tidak Suka Sekali
2	Sangat-Sangat Tidak Suka
3	Sangat Tidak Suka
4	Tidak Suka
5	Agak Tidak Suka
6	Biasa
7	Agak Suka
8	Suka
9	Sangat Suka
10	Sangat Sangat Suka
11	Sangat-Sangat Suka Sekali

Untuk penilaian kesukaan atau analisis sifat sensoris suatu komoditi diperlukan alat instrumen, alat yang digunakan terdiri dari orang atau kelompok orang yang disebut panel, orang yang bertugas sebagai panel disebut panelis.

a. Panelis

Kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak membedakan jenis kelamin.
- 2) Sehat (tidak sakit).
- 3) Tidak buta warna.
- 4) Tidak dalam keadaan lapar (pukul 09.00-11.00 WITA).

b. Pelaksanaan penilaian

- 1) Waktu dan tempat

Dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar.

- 2) Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah biskuit tulang ikan tuna dengan lima perlakuan.

Sedangkan alat yang digunakan adalah formulir penilaian dan alat tulis.

c. Langkah-langkah pada uji daya terima

- 1) Mempersilahkan Panelis untuk duduk di ruangan yang telah disediakan.
- 2) Membagikan sampel dengan kode sesuai variasi, formulir penilaian dan alat tulis.
- 3) Memberikan penjelasan singkat kepada panelis tentang cara memulai dan cara pengisian formulir.
- 4) Memberikan kesempatan kepada panelis untuk memulai dan menuliskan penilaian pada lembar fomulir penilaian.
- 5) Mengumpulkan formulir yang telah diisi oleh panelis.

d. Analisis Data

Untuk mengetahui daya terima dari panelis dilakukan analisis deskriptif kualitatif persentase yaitu kualitatif yang diperoleh dari panelis harus dianalisis dahulu untuk dijadikan data kuantitatif yang diolah menggunakan SPSS.

Skor nilai untuk mendapatkan persentase dilakukan berdasarkan kriteria penilain tiap uji hedonik. Skor nilai untuk mendapatkan persentase dirumuskan sebagai berikut (Ali, 1993:86) :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

% = Skor persentase

n = Jumlah skor yang diperoleh

N = Skor ideal (skor tertinggi x jumlah panelis)

Untuk mengubah data skor persentase menjadi nilai kesukaan konsumen, analisisnya sama dengan analisis dengan analisis kualitatif dengan nilai yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- Nilai tertinggi = 11 (sangat suka)
 Nilai terendah = 1 (tidak suka)
 Jumlah kriteria yang ditentukan = 11 kriteria
 Jumlah panelis = 5 orang
- 1) Skor maximum = Jumlah panelis x nilai tertinggi
 $= 5 \times 11 = 55$
 - 2) Skor minimum = Jumlah panelis x nilai terendah
 $= 5 \times 1 = 5$
 - 3) Persentase maximum = $(\text{Skor Max})/(\text{Skor Max}) \times 100\%$
 $= (55)/(55) \times 100\% = 100\%$
 - 4) Persentase minimum = $(\text{Skor Min})/(\text{Skor Max}) \times 100\%$
 $= (5)/(55) \times 100\% = 9\%$
 - 5) Rentangan = Persentase max–Persentase min
 $= 100\% - 9\% = 91\%$
 - 6) Interval presentase = Rentangan : Jumlah kriteria
 $= 91 : 11 = 8,27\% = 8\%$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat dibuat interval persentase dan kriteria kesukaan sebagai berikut.

Tabel 3.4 Interval Persentase dan Kriteria Kesukaan

Persentase	Kriteria Kesukaan
92-100	Sangat-sangat suka sekali
83-91	Sangat-sangat suka
74-82	Sangat suka
65-73	Suka
56-64	Agak suka
47-55	Biasa
38-46	Agak tidak suka
29-37	Tidak suka
20-28	Sangat tidak suka
11-19	Sangat-sangat tidak suka
2-10	Sangat-sangat tidak suka sekali

7) *Validasi Data dan Reliabilitas Instrumen*

1. Validasi

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Pada penelitian ini, alat-alat yang digunakan khususnya dalam melakukan berbagai analisis kandungan zat gizi menggunakan peralatan laboratorium yang sudah sesuai standar serta metode yang digunakan merupakan metode yang telah baku. Sedangkan pengukur dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang telah ahli dalam melakukan percobaan, khususnya dalam analisis kandungan zat gizi.

2. Realiabilitis

Reliabilitas dalam penelitian ini sesuai dengan prosedur kerja, termasuk alat yang digunakan, sehingga konsentrasi dari bahan yang digunakan sesuai dengan metode yang ada. Selain itu, sebelum melakukan uji laboratorium, peneliti melakukan beberapa kali percobaan dalam pembuatan biskuit, sehingga diperoleh takaran-takaran pembuatan biskuit yang tepat. Untuk menguji reliabilitasnya maka dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali untuk menunjukkan bahwa instrument yang digunakan secara berulang menghasilkan hasil yang sama.

8) Teknik Pengambilan dan Analisis Data

1. Teknik Pengambilan Data

Data dapat diperoleh setelah melakukan uji laboratorium. Uji laboratorium atau riset laboratorium adalah melakukan eksperimen melalui percobaan tertentu dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang tersedia di laboratorium penelitian. Uji ini untuk mengetahui kadar zat gizi (Kalsium, vitamin A, zat besi, Karbohidrat, Protein, Lemak dan Abu).

2. Teknik Analisis Data

Data dianalisis berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan laboratorium. Data-data kemudian diolah dengan uji beda anova sehingga dari data-data tersebut dapat menjawab tujuan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Penelitian analisis kandungan gizi biskuit crackers tulang ikan tuna dilaksanakan pada beberapa laboratorium, untuk penelitian penentuan kandungan kadar abu, karbohidrat, protein, dan lemak, dilakukan di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, penentuan kandungan kalsium dan zat besi dilakukan di Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar, penentuan kandungan vitamin A dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan SNI 01-2891-1992 dan ditunjang dengan alat-alat laboratorium yang memadai. Sedangkan uji organoleptik untuk tepung tulang ikan tuna dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar dengan bantuan 36 panelis ahli dengan beberapa parameter dan kriteria penilaian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan gizi pada biskuit crackers tulang ikan tuna dan daya terima tepung tulang ikan tuna tersebut.

Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


1. Zat Gizi Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna

Berdasarkan hasil uji laboratorium, zat gizi biskuit crackers tulang ikan tuna dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:




Gambar 4.1 Hasil Pemeriksaan Kadar Abu dalam 100 gram Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna Tahun 2017

Data Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kadar abu tertinggi terdapat pada 0:1 yaitu 43,24%, dan pada biskuit crackers tulang ikan tuna terdapat formulasi 3:1 sebanyak 42,67% selanjutnya formulasi 1:1 sebanyak 16,71%, selanjutnya formulasi 1:3 sebanyak 6,8% dan formulasi 1:0 sebanyak 1,12%.




Gambar 4.2 Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Karbohidrat dalam 100 gram Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna Tahun 2017

Data gambar 4.2 menunjukkan bahwa kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada 1:0 yaitu 43,87%, dan pada biskuit crackers tulang ikan tuna terdapat formulasi 1:3 sebanyak 39,85% selanjutnya formulasi 1:1 sebanyak 28,35%, selanjutnya formulasi 3:1 sebanyak 14,05% dan formulasi 0:1 sebanyak 13,71%.




Gambar 4.3 Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Protein dalam 100 gram Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna Tahun 2017

Data gambar 4.3 menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada 1:3 yaitu 9,25%, dan pada biskuit Crackers tulang ikan tuna terdapat formulasi 1:0 sebanyak 8,55% selanjutnya formulasi 1:1 sebanyak 8,54%, selanjutnya formulasi 3:1 sebanyak 4,38% dan formulasi 0:1 sebanyak 4,04%.




Gambar 4.4 Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Lemak dalam 100 gram Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna Tahun 2017

Data Gambar 4.4 menunjukkan bahwa kadar lemak tertinggi terdapat pada 1:0 yaitu 30,27%, dan pada biskuit crackers tulang ikan tuna terdapat formulasi 3:1 sebanyak 27,25% selanjutnya formulasi 1:1 sebanyak 27,07%, selanjutnya formulasi 0:1 sebanyak 21,87% dan formulasi 1:3 sebanyak 18,06%.




Gambar 4.5 Hasil Pemeriksaan Kadar Kalsium (Ca) dalam 100 gram Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna Tahun 2017

Data Gambar 4.5 menunjukkan bahwa kadar kalsium tertinggi terdapat pada formulasi 0:1 yaitu 27,82%, dan pada biskuit Crackers tulang ikan tuna terdapat formulasi 3:1 sebanyak 17,35% selanjutnya formulasi 1:1 sebanyak 7,04%, selanjutnya formulasi 1:3 sebanyak 2,22% dan formulasi 1:0 sebanyak 1,49%.




Gambar 4.6 Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Besi (Fe) dalam 100 gram Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna Tahun 2017

Data gambar 4.6 menunjukkan bahwa kadar zat besi tertinggi terdapat pada 0:1 yaitu 1,717 ug/g, dan pada biskuit crackers tulang ikan tuna terdapat formulasi 1:1 sebanyak 1,495 ug/g selanjutnya formulasi 3:1 sebanyak 1,316 ug/g, selanjutnya formulasi 1:3 sebanyak 1,275 ug/g dan formulasi 1:0 sebanyak 1,180 ug/g.



Gambar 4.7 Hasil Pemeriksaan Kadar Vitamin A dalam 100 gram Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna Tahun 2017

Data gambar 4.7 menunjukkan bahwa kadar vitamin A tertinggi terdapat pada 1:3 yaitu 1,13 ug/g, dan pada biskuit crackers tulang ikan tuna terdapat formulasi 3:1 sebanyak 0,93 ug/g selanjutnya formulasi 1:1 sebanyak 0,85 ug/g, selanjutnya formulasi 1:0 sebanyak 0,79 ug/g dan formulasi 0:1 sebanyak 0,77 ug/g.



Gambar 4.8 Zat Gizi Dalam Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna (*Thunnus Sp*)

Data gambar 4.8 menunjukkan bahwa zat gizi tertinggi terdapat zat gizi tertinggi terdapat pada zat gizi Abu berada pada formulasi 0:1 yaitu 43,24% karbohidrat tertinggi formulasi 1:0 sebanyak 43,87%, zat gizi protein tertinggi formulasi 1:3 sebanyak 9,25%, zat gizi lemak tertinggi formulasi 30,27%, zat gizi kalsium tertinggi formulasi 0:1 sebanyak 17,82, zat besi tertinggi formulasi 0:1 sebanyak 1,717 ug/g dan zat gizi vitamin A tertinggi formulasi 1:3 sebanyak 1,13 ug/g.

c. Uji Daya Terima Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna

Tabel 4.1
Keterangan Penilaian Mutu Hedonik Terhadap
Warna, Aroma, dan Tekstur

Mutu Hedonik							
Warna		Aroma		Tekstur		Rasa	
1	Sangat Gelap	1	Sangat Tidak Harum	1	Sangat Tidak Keras	1	Sangat Tidak Enak
2	Gelap	2	Tidak Harum	2	Tidak Keras	2	Tidak Enak
3	Agak Gelap	3	Agak Tidak Harum	3	Agak Keras	3	Agak Tidak Enak
4	Biasa	4	Biasa	4	Biasa/Netral	4	Biasa
5	Agak Terang	5	Agak Harum	5	Agak Keras	5	Agak Enak
6	Terang	6	Harum	6	Keras	6	Enak
7	Sangat Terang	7	Sangat Harum	7	Sangat Keras	7	Sangat Enak

Pada tabel 4.1, untuk skala penilai mutu hedonik terhadap warna, aroma dan tekstur memiliki range skor 1-7. Untuk skor 1 adalah nilai terendah dan skor 7 adalah nilai tertinggi. Nilai tengah atau median skor 4, digunakan untuk mengelompokkan nilai mutu hedonik, dimana skor <4 dikatakan buruk, dan >4 dikatakan baik.

Tabel 4.2
Uji Mutu Hedonik dalam Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna
(*Thunnus sp*)

Formulasi	Mutu Hedonik							
	Warna		Aroma		Tekstur		Rasa	
	S	K	S	K	S	K	S	K
1:0	4,3	Biasa	4,9	Biasa	5,5	Agak Keras	4,9	Biasa
0:1	3,8	Agak Gelap	4,4	Biasa	3,5	Agak Tidak Keras	2,9	Tidak Enak
1:1	4	Biasa	4,2	Biasa	4,3	Biasa	3,8	Agak Tidak Enak
1:3	3,3	Agak Gelap	4,2	Biasa	4,6	Biasa	4,4	Biasa
3:1	3,4	Agak Gelap	4,7	Biasa	4,6	Biasa	4,1	Biasa

Sumber: Data Primer, 2018

Keterangan : K : Kriteria

S : Skor

< 4 : Kurang Baik

> 4 : Baik

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa mutu hedonik yang baik dengan skor >4 dalam Biskuit Crackers tulang ikan tuna (*Thunnus sp*) terdapat pada formulasi 1:0 yaitu 4,3 dengan kriteria biasa, pada aroma terdapat pada formulai 1:0 yaitu 4,9 dengan kriteria biasa, pada tekstur terdapat pada formulasi 1:0 yaitu 5,5 dengan kriteria Agak Keras, dan pada rasater dapat pada formulasi 1:0 yaitu 4,9 dengan kriteria biasa.

Tabel 4.3
Uji *Over All* Mutu Hedonik dalam Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna (*Thunnus sp*)

Formulasi	Uji <i>Over All</i> Mutu Hedonik	
	Skor	Kriteria
1:0	5	Agak Baik
0:1	3,3	Agak Tidak Baik
1:1	4,0	Biasa
1:3	4,3	Biasa
3:1	4,6	Biasa

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa uji *over all* mutu hedonik dalam biskuit krackers Tulang ikan tuna (*Thunnus sp*) dari 5 formulasi memiliki skor >4 dengan Kriteria Agak baik dimana pada uji over all mutu hedonik paling tinggi pada formulasi 1:0 dengan skor 5.

Tabel 4.4
Uji Hedonik dalam Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna (Thunnus sp)

Formulasi	Uji Hedonik		
	Skor (n 36)	%	Kriteria
1:0	253	63	Agak Suka
0:1	178	47	Biasa
1:1	214	57	Agak Suka
1:3	222	57	Agak Suka
3:1	226	59	Agak Suka

Sumber: Data Primer, 2018

Keterangan : P : Panelis

S : Skor

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa total skor tertinggi dalam biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus sp*) terdapat pada formulasi 1:0 dengan total skor 253 (63%) dengan kriteria agak suka, dan terendah pada formulasi 0:1 dengan total skor 178 (47%) dengan kriteria biasa.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Zat Gizi Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna

a. Kadar Abu

Abu merupakan salah satu komponen dalam bahan makanan. Komponen ini terdiri dari mineral mineral seperti kalium, fosfor, natrium, magnesium, kalsium, besi, mangan, dan tembaga. Mineral merupakan salah satu zat gizi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil (Nurul Mulida, 2005).

Berdasarkan hasil analisis kadar abu pada sampel biskuit crackers tulang ikan tuna, diketahui yang memiliki kandungan kadar abu paling tinggi adalah pada biskuit tulang ikan tuna dengan formulasi 0:1 yaitu dengan kadar abu sebanyak 43,24%, dan pada biskuit Crackers tulang ikan tuna terdapat formulasi 3:1 sebanyak 42,67% selanjutnya formulasi 1:1 sebanyak 16,71%, selanjutnya formulasi 1:3 sebanyak 6,8% dan yang memiliki kadar abu yang paling rendah adalah formulasi 1:0 sebanyak 1,12%.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kadar abu rata-rata pada biskuit crackers tulang ikan tuna menunjukkan nilai yang relatif rendah yaitu berkisar 1,12–43,24%. Jika dibandingkan dengan kadar abu menurut SNI No 01-2973 (1992) yaitu maksimal 1,5 %, dan Nurul (2005) sebesar 2,37–19,74 %. Tingginya kadar abu biskuit (*crackers*) karena penambahan konsentrasi tepung tulang ikan madidihang yang berbeda dan adanya pengaruh penambahan bahan tambahan pada biskuit (*crackers*) itu.

proses evaporasi sari jeruk yang mempunyai total padatan tertinggi berlangsung lebih cepat sehingga kandungan air dalam tulang ikan tuna mengalami banyak penguapan yang mengakibatkan kadar abu meningkat (Adil, 1997 dalam Nurul Maulida, 2005). Kadar abu yang tinggi dalam biskuit (*crackers*) tepung tulang ikan tuna menguntungkan ditinjau dari segi nutrisi karena sebagian besar tepung tulang ikan mengandung unsur kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh (Sulaeman *et al*, 1995 dalam Nurul Maulida, 2005).

Peningkatan waktu dan frekuensi hidrolisis cenderung akan meningkatkan kadar abu. Meningkatnya kadar abu ini disebabkan karena semakin lama waktu

hidrolisis yang digunakan maka kontak antara larutan pengekstrak dengan bahan akan semakin lama pula. Sehingga kesempatan untuk melarutkan komponen non mineral dalam bahan semakin besar.

b. Kadar Karbohidrat

Sumber utama karbohidrat didalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan sumber energi utama terdapat dalam bentuk zat tepung (*amylum*) dan zat gula (mono dan disakarida).

Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Nutrient ini mencakup pati dan gula dalam berbagai bentuknya. Tanaman memiliki kemampuan untuk menghasilkan gula serta pati dari karbon dioksida dalam udara dan air dalam tanah. Manusia memperoleh karbohidrat dari sumber makanan nabatinya (Mary, 2011).

Berdasarkan hasil analisis karbohidrat pada sampel biskuit crackers tulang ikan tuna, diketahui yang memiliki kandungan kadar karbohidrat paling tinggi adalah pada biskuit tepung terigu dengan formulasi 1:0 yaitu dengan kadar karbohidrat sebanyak 43,87% sedangkan yang memiliki kadar karbohidrat paling rendah adalah pada formulasi 0:1 yaitu dengan kadar karbohidrat sebanyak 13,71%..

Rendahnya kandungan kadar karbohidrat pada formulasi 0:1 dikarenakan komposisi tepung tulang ikan tuna yang mendominasi yaitu sebanyak 100 gram tulang ikan tuna tanpa ada tambahan tepung terigu, sehingga sumber karbohidrat hanya berasal dari tepung tulang ikan. Sedangkan komposisi pada formulasi 3:1 75 gram tepung tulang ikan tuna dan 25 gram tepung terigu memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 14,5%, formulasi 1:1 50 gram tepung ikan tuna dan 50 gram

tepung terigu sebanyak 28,35%, formulasi 1:3 25 gram tepung tulang ikan tuna dan 75 gram tepung terigu sebanyak 39,85%, dan formulasi 1:0 dikarenakan komposisi tepung terigu yang mendominasi yaitu sebanyak 100 gram tepung terigu tanpa ada tambahan tulang ikan tuna, keempat formulasi biskuit tulang ikan tuna tersebut memiliki kandungan kadar karbohidrat yang tinggi dikarenakan sumber karbohidrat didapatkan dari bahan baku tersebut yaitu tepung terigu.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kadar karbohidrat rata-rata pada formulasi biskuit crackers tulang ikan tuna menunjukkan nilai yang relatif rendah yaitu berkisar 13,71-43,87%. Kadar karbohidrat biskuit crackers tulang ikan pada penelitian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan (Marisa Marta'ati, dkk, 2015) kandungan karbohidrat pada biskuit crackers tulang ikan tuna berkisar 7,27-8,67%.

Jenis karbohidrat pada tulang ikan tuna adalah glikogen. Glikogen adalah polisakarida dalam tubuh hewan yang mudah larut dalam air dan berfungsi sebagai sumber energi (Risnoyatiningsih, 2011). Polisakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas banyak monomer (molekul gula), dan umumnya tidak berasa manis.

Glikogen disintesis dari glukosa (Mary, 2011). Enzim glukoamilase memisahkan glukosa dari terminal gula non-produksi substrat pati (Winarno, 1995 dalam Risnoyatiningsih, 2011). Hidrolisis enzim dilakukan menggunakan bantuan enzim glukoamilase. Hidrolisis dengan enzim glukoamilase pada glikogen (Risnoyatiningsih, 2011). Hal ini yang menyebabkan hidrolisis yang terjadi pada saat proses pembuatan tepung tulang ikan tuna yang menyebabkan kandungan karbohidrat berkurang.

Rendahnya kandungan karbohidrat pada biskuit crackers tulang ikan tuna disebabkan karena unsur utama karbohidrat berasal dari tanaman. Selain itu tahap perebusan dan autoklafing yang dilakukan dalam pembuatan tepung tulang ikan tuna merupakan proses hidrolisis yang berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan kandungan makro nutrien dalam tulang.

c. Kadar Protein

protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan, sumber protein berasal pada hewani dan nabati. Protein berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein menghasilkan jaringan yang baru. Protein juga diperlukan dalam pembuatan protein-protein yang baru dengan fungsi khusus di dalam tubuh, yaitu enzim, hormon, dan hemoglobin.

Berdasarkan hasil analisis protein dari sampel biskuit crackers tulang ikan, diketahui bahwa yang memiliki kandungan kadar protein tertinggi adalah formulasi 1:3 dengan komposisi 25 gram tepung ikan tuna dan 74 gram tepung tulang ikan tuna, mengandung kadar protein sebanyak 9,22% sedangkan kandungan protein terendah terdapat pada formulasi 0:1 dengan komposisi 100 gram tepung tulang ikan tanpa penambahan tepung terigu yaitu sebanyak 4,04%.

Tingginya kadar protein pada formulasi 1:3 yaitu sebanyak 9,22% dengan komposisi tepung tulang ikan 25 gram dan tepung terigu 75 gram, formulasi 1:0 kadar proteinnya sebanyak 8,55% dengan komposisi tepung terigu 100 gram tanpa penambahan tepung tulang ikan tuna, dan formulasi 1:1 yaitu sebanyak 8,54% dengan komposisi tepung tulang ikan tuna 50 gram dan tepung terigu 50 gram,

dikarenakan pada formulasi tersebut komposisi tepung terigu yang lebih mendominasi.

Rendahnya zat gizi protein pada formulasi 3:1 dan formulasi 0:1 dikarenakan komposisi tulang ikan tuna yang mendominasi. Pada formulasi 3:1 dengan komposisi 75 gram tepung tulang ikan tuna dan 25 gram tepung terigu yang kadar proteinnya hanya sebanyak 4,38% dan formulasi 0:1 dengan komposisi 100 gram tulang ikan tuna tanpa penambahan tepung terigu kadar proteinnya sebanyak 4,04%.

Rendahnya kadar protein yang dimiliki biskuit tepung tulang ikan tuna dalam penelitian ini disebabkan adanya proses hidrolisis protein yang dilakukan secara berulang selama proses pembuatan tepung tulang ikan tuna dan teknik pengolahan biskuit. Proses hidrolisis protein terjadi pada tahap perebusan, autoklafing, ekstraksi dengan NaOH dan pengovenan. Damayanthi (1994) dalam Nabil (2005) menyatakan bahwa protein sangat peka terhadap panas dan akan mengalami perubahan struktur kimia (denaturasi) akibat adanya pemanasan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Harrow dan Mazur (1961) dalam Nabil (2005) bahwa semakin tinggi suhu hidrolisis, semakin banyak molekul protein menjadi tidak stabil. Pemanasan yang tinggi akan mempengaruhi ikatan-ikatan kovalen protein sehingga menyebabkan terjadinya degradasi pada molekul-molekul protein. Hasil degradasi dari molekul tersebut banyak menghasilkan turunan protein yang larut dalam air (Winarno 1986). Selain itu semakin tinggi suhu dan tekanan yang digunakan selama proses pemasakan akan membuat bahan baku yang digunakan semakin lunak dan hancur, ini disebabkan oleh semakin banyaknya protein yang terhidrolisis sehingga ikatan sekunder protein rapuh. Kondisi ini memudahkan protein

yang tertinggal atau belum larut pada proses hidrolisis akan ikut terbuang pada saat pencucian.

Dari hasil analisis kandungan protein pada seluruh formulasi terjadi penurunan kandungan protein hal ini didasari pada teknik pengolahan setelah menjadi produk biskuit. Protein bila dipanaskan akan mengalami denaturasi.

d. Kadar Lemak

Lemak terbentuk dari 95% asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan sumber energi, selain karbohidrat dan protein. Dengan mengonsumsi lemak secara berlebih, maka dapat disimpan oleh tubuh sebagai cadangan energi. Lemak memiliki beberapa fungsi yakni sebagai menghasilkan energi, penghasil asam lemak esensial, pelarut vitamin, memberi rasa kenyang, dan menghemat protein. Sumber lemak berbagai bahan pangan, seperti daging, ikan, telur, susu, avokad, kacang tanah, dan beberapa jenis sayuran mengandung lemak dan minyak (Sitiatava Rizema, 2013).

Berdasarkan hasil analisis lemak dari beberapa sampel biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus sp*)), diketahui yang memiliki kadar lemak tertinggi yaitu pada formulasi 1:0 dengan jumlah kadar lemak sebanyak 30,27% sedangkan kandungan lemak terendah pada formulasi 1:3 yaitu 18,06%.

Tingginya kadar lemak pada formulasi 1:0 dikarenakan komposisi tepung terigu yang mendominasi pada formulasi ini yaitu 100 gram tepung terigu tanpa ada tambahan tulang ikan tuna. Rendahnya kadar lemak pada formulasi 1:3 dikarenakan komposisi tepung terigu yang mendominasi pada formulasi ini yaitu 75 gram tepung terigu dan 25 gram tulang ikan tuna.

Dogerskog (1977) dalam Nabil (2005) menyatakan bahwa selama proses perebusan atau pengolahan, bahan makanan terpengaruh dalam banyak hal termasuk perubahan protein, lemak dan karbohidrat yang dapat menyebabkan perubahan baik positif maupun negatif terhadap kualitas dan status gizinya. Winarno (1986) dalam Nabil (2005) menyatakan bahwa pemanasan pada suhu tinggi akan mempercepat gerakan-gerakan molekul lemak sehingga jarak antara molekul menjadi besar, dengan demikian akan memudahkan pengeluaran lemak dari bahan.

Akan tetapi yang menyebabkan meningkatnya kadar lemak pada biskuit tulang ikan tuna dipengaruhi oleh komposisi bahan lain diluar bahan baku, yaitu margarin. Dalam 100 gram margarin memiliki kadar lemak yaitu sebanyak 8 gram.

Pada formulasi 1:0, formulasi 0:1 dan 1:1 terjadi perbedaan di masing-masing percobaan hal ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengontrol pengaruh-pengaruh dari luar pada saat melakukan penelitian misalnya penggunaan regent baru dan pada saat menghomogenkan sampel.

Berdasarkan Angka Kecukupan Lemak yang dianjurkan untuk orang Indonesia (perorang perhari) bayi/anak-anak yaitu 34-72 gram. Dengan adanya kandungan protein pada biskuit crackers tulang ikantuna, maka biskuit tersebut dapat digunakan sebagai alternatif dan makanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Konsumsi lemak sebanyak 15-30 % kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi

sehari-hari dianjurkan paling banyak 10% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh, dan 3-7% dari lemak tidak jenuh ganda (Syarfaini, 2012).

e. Kadar Kalsium

Hasil penelitian para pakar menunjukkan bahwa tubuh manusia ber kandungan sekitar 22 gram kalsium perkilogram berat badannya tanpa lemak. Daripadanya (jumlah itu) sekitar 99% kalsium terdapat dalam tulang dan gigi.

Tubuh kita mengandung kalsium yang lebih banyak dibandingkan mineral lain. Diperkirakan, 2% berat badan orang dewasa atau sekitar 1,2-1,4 kg terdiri kalsium. Namun, pada bayi hana terkandung sedikit kalsium (25-30 gram). Setelah usia 20 tahun, secara normal akan terjadi penambahan sekitar 1,200 gram kalsium di dalam tulang rawan dan gigi, sisanya terdapat dalam cairan tubuh dan jaringan lunak (Setiatava Rizema, 2013). Penentuan kadar kalsium pada penelitian ini menggunakan alat *Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)*.

Berdasarkan hasil analisis kalsium pada sampel biskuit crackers tulang ikan tuna, diketahui yang memiliki kandungan kadar kalsium Ca paling tinggi adalah pada biskuit tepung tulang ikan tuna dengan formulasi 0:1 yaitu dengan kadar kalsium Ca sebanyak 17,82% sedangkan yang memiliki kadar kalsium Ca paling rendah adalah pada formulasi 1:0 yaitu dengan kadar kalsium Ca tanpa penambahan tepung tulang ikan tuna sebanyak 1,49%..

Rendahnya kandungan kadar kalsium pada formulasi 1:0 dikarenakan komposisi tepung terigu yang mendominasi yaitu sebanyak 100 gram tepung terigu tanpa ada tambahan tulang ikan tuna, sehingga sumber kalsium Ca hanya berasal dari tepung terigu. Sedangkan komposisi pada formulasi 1:3 25 gram tepung tulang ikan

tuna dan 75 gram tepung terigu memiliki kandungan kalsium Ca sebanyak 2,22%, formulasi 1:1 50 gram tepung ikan tuna dan 50 gram tepung terigu sebanyak 7,04%, formulasi 3:1 75 gram tepung tulang ikan tuna dan 25 gram tepung terigu sebanyak 17,35%, dan formulasi 0:1 dikarenakan komposisi tepung tulang ikan tuna yang mendominasi yaitu sebanyak 100 gram tepung tulang ikan tuna tanpa ada tambahan tepung terigu sebanyak 17,82%, keempat formulasi biskuit crackers tulang ikan tuna tersebut memiliki kandungan kadar kalsium Ca yang tinggi dikarenakan sumber kalsium didapatkan dari bahan baku tersebut yaitu tepung tulang ikan tuna.

Dibandingkan dengan penelitian Nurul Maulidia (2005), nilai kadar kalsiumnya adalah 2,42-2,53% lebih kecil dari penelitian ini. Peran kalsium bagi kesehatan tulang dan gigi itu sangat penting, karena jika kebutuhan harian kalsium tubuh tidak tercukup, maka mekanisme tubuh akan mengambil kalsium yang terdapat pada jaringan keras tubuh seperti tulang dan gigi. Karena jaringan keras tersebut merupakan cadangan kalsium di dalam tubuh. Apabila kurang asupan gizi kalsium setiap harinya akan menyebabkan berkurangnya kandungan kalsium dalam jaringan keras yang bisa menyebabkan osteoporosis atau tulang yang keropos. Kalsium juga mengatur pekerjaan hormon-hormon dan faktor pertumbuhan (Almatsier, 2004).

Dengan begitu pentingnya peran kalsium di dalam tubuh maka perlu memperhatikan jenis makanan yang memiliki kandungan kalsium yang tinggi.

Mengenai kandungan zat gizi di dalam makanan, al-Qur'an memberi kita petunjuk untuk mengkaji atau memperhatikan tentang kandungan zat gizi dalam makanan, Allah berfirman dalam QS 'Abasa/80 : 24.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٤

Terjemahnya :

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Kemenag RI, 2010: 585).

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendaknya manusia mau memikirkan tentang kejadian dirinya dan makanan yang dimakannya. Bagaimana hal itu diciptakan dan disediakan untuknya sehingga bisa dijadikan makanan yang menunjang kelangsungan hidupnya. Disamping itu ia pun bisa merasakan kelezatan makanan yang menunjang kekuatan tubuhnya agar tetap terjaga sampai batas umur yang telah ditentukan untuknya (Al-Maraghi, 1985: 79).

Diterangkan dalam ayat tersebut bahwa hendaknya manusia merenungkan, bagaimana Allah swt mengatur dan menyediakan makanan yang mereka butuhkan sehari-hari. Selain itu ayat tersebut juga mengajak manusia memerhatikan dirinya, mengajak untuk memerhatikan bahan makanannya dengan mata kepala dan mata hati. Allah swt mengatakan kalau manusia hendak melaksanakan tugasnya dengan baik maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya, memerhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan.

f. Kadar Zat Besi

Zat besi (Fe) merupakan microelement esensial bagi tubuh. Zat ini terutama diperlukan dalam hemopobesis (pembentuk darah), yaitu dalam sintesa hemoglobin (Hb). Di samping itu berbagai jenis enzim memerlukan Fe sebagai faktor penggiat. Penentuan kadar zat besi pada penelitian ini menggunakan alat *Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)*.

Berdasarkan hasil analisis kadar zat besi dari beberapa sampel biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus sp*), bahwa yang memiliki kandungan zat besi tertinggi pada formulasi 0:1 yaitu 1,717 ug/g, sedangkan biskuit tulang ikan tuna yang memiliki kandungan zat besi terendah pada formulasi 1:0 yaitu 1,180 ug/g.

Tingginya kandungan zat besi pada formulasi 0:1 dengan komposisi 100 gram tulang ikan tuna tambah penambahan tepung terigu yaitu 1,717 ug/g dikarenakan komposisi tulang ikan tuna yang mendominasi.

Rendahnya kandungan zat besi pada formulasi 1:0 dengan komposisi tepung terigu 100 gram tanpa ada tambahan tulang ikan tuna yaitu sebanyak 1,180ug/g, dikarenakan tepung terigu yang mendominasi sebanyak 100 gram tanpa ada tambahan tulang ikan tuna.

Faktor yang menyebabkan rendahnya kandungan zat besi pada tepung tulang ikan tuna dikarenakan proses pemanasan dapat mendegradasi heme sehingga bioavailabilitas heme iron akan menjadi rendah. Semakin lama proses pemanasan akan menyebabkan *solubility* zat besi semakin rendah.

Berdasarkan Angka Kecukupan Mineral yang dianjurkan untuk orang Indonesia (perorang perhari) kebutuhan mineral besi (*Fe*) bayi/anak-anak sebesar 7-20 mg perhari sedangkan kebutuhan zat besi anak usia 7-9 tahun sebesar 10 mg perhari dan usia 10-12 tahun sebesar 20 mg. Dengan adanya kandungan zat besi dari tepung tulang ikan tuna setidaknya memberikan kontribusi terhadap anak yang mengalami gizi kurang dengan mengolah atau melakukan fortifikasi tepung tulang ikan tuna dengan bahan makanan lain.

Kebutuhan tubuh akan zat besi ialah untuk mengimbangi sejumlah kecil zat besi yang secara konstan dikeluarkan tubuh, terutama lewat urine. Juga untuk menggantikan kehilangan zat besi lewat darah haid. Selain itu untuk pembentukan hemoglobin baru pada kehamilan, masa kanak-kanak dan remaja. Pada laktasi, berfungsi untuk untuk sekresi air susu. Serta untuk mengimbangi kehilangan zat besi akibat pendarahan (Mary, 2011).

Menurut Muchtadi (2009) peranan zat besi sangat penting bagi pertumbuhan anak. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia, yang dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan mudah marah. Zat besi juga dapat mempengaruhi perkembangan otak pada anak, anemia dapat menyebabkan masalah perkembangan kognitif jangka panjang.

h. Kadar Vitamin A

Vitamin A adalah salah satu jenis vitamin yang aktif dimana sangat mudah sekali larut ke dalam jaringan lemak yang kemudian akan di teruskan pada hati untuk di simpan. Vitamin A sering juga di kenal sebagai Retinol yang mana fungsinya sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan mata dan juga membuat tubuh anda sehat dan juga dapat di jadikan bahan kecantikan yang alami. Untuk itulah sangat penting sekali mengkonsumsi vitamin A agar anda lebih sehat (Ma'ruf, 2014). Penentuan kadar vitamin A pada penelitian ini menggunakan alat *Spektrofotometri UV-VIS*.

Berdasarkan hasil analisis kadar vitamin A dari beberapa sampel biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus sp*), diketahui kadar vitamin A pada beberapa sampel biskuit crackers, formulasi 1:0 mengandung vitamin A sebesar 0,79 ug/g,

dengan bahan yang digunakan pada formulasi ini adalah 100 gram tepung terigu tanpa tambahan tulang ikan tuna, formulasi 0:1 mengandung kadar vitamin A sebesar 0,77 ug/g, dengan bahan yang digunakan pada formulasi ini adalah 100 gram tulang ikan tuna tanpa penambahan tepung terigu, formulasi 1:1 mengandung kadar vitamin A sebesar 0,85 mg, dengan komposisi 50 gram tepung terigu dan 50 gram tulang ikan tuna, formulasi 1:3 mengandung kadar vitamin A sebesar 1,13 ug/g, dengan komposisi 25 gram tulang ikan tuna dan 75 gram tepung terigu dan formulasi 3:1 mengandung kadar vitamin A sebesar 0,93 ug/g, dengan komposisi 75 gram tulang ikan tuna dan 25 gram tepung terigu.

Kandungan kadar vitamin A biskuit tulang ikan tuna (*Thunnus sp*), paling tinggi terdapat pada formulasi 1:3 hal ini dikarenakan komposisi tepung terigu yang mendominasi. Rendahnya kadar vitamin A pada formulasi 0:1 dikarenakan komposisi tulang ikan tuna yang mendominasi yaitu dengan komposisi tulang ikan tuna sebanyak 100 gram tanpa ada tepung terigu.

Terjadi perbedaan di masing-masing percobaan hal ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengontrol pengaruh-pengaruh dari luar pada saat melakukan penelitian misalnya penggunaan reagent (cairan reaksi kimia) dan pada saat menghomogenkan sampel.

Menurut Amaya (2004) apapun metode proses pengolahan yang dilakukan, kadar vitamin A akan mengalami penurunan terutama dengan waktu proses yang lebih lama, temperature proses yang lebih tinggi dan adanya pemotongan atau penghancuran. Proses penghancuran ini membuat luas permukaan bahan yang lebih

luas dari semula, sehingga makin luas permukaan makan kontak dengan udara juga lebih besar.

Menurut Mary (2011), vitamin A dan karoten tidak akan rusak oleh sebagian besar cara memasak, namun sebagian diantaranya hilang kalau dimasak dengan suhu yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian ini dimana kandungan vitamin A pada biskuit crackers tulang ikan tuna hanya berkisar 0,77-1,13 ug/g, hal ini disebabkan karena dalam proses pembuatannya dilakukan perebusan berulang dengan suhu 100⁰C, presto, autoclaving, pengeringan selama 8 jam dan pemanggangan oven selama 15 menit dalam 100⁰C. Sehingga kandungan vitamin A pada biskuit crackers tulang ikan tuna ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin A pada anak, kecukupan konsumsi Vitamin A yang dianjurkan untuk anak berkisar 1.200-2.400ug.

2. Uji Organoleptik Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna

Daya terima atau preferensi makanan dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaan atau ketidak sukaan individu terhadap suatu jenis makanan. Diduga tingkat kesukaan ini sangat beragam pada setiap individu. sehingga akan berpengaruh terhadap konsumsi pangan.

a. Uji Daya Terima Warna Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna

Penampakan warna suatu bahan pangan merupakan faktor utama yang dinilai sebelum pertimbangan lain, seperti rasa dan nilai gizi. Menurut Winarno (1997) dalam Zuhriana (2011: 29), suatu bahan yang dinilai bergizi, enak, dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang atau memberi kesan telah menyimpang dari warna yang seharusnya. Warna makanan yang menarik dan tampak alamiah dapat meningkatkan cita rasa.

Berdasarkan penilaian panelis terhadap biskuit crackers tulang ikan tuna kriteria warna biasa untuk formulasi 1:0 dengan total skor 4,3, untuk formulasi 0:1 berwarna agak gelap dengan total skor 3,8, untuk formulasi 1:1 berwarna biasa dengan total skor 4, untuk formulasi 1:3 berwarna agak gelap dengan total skor 3,3 serta formulasi 3:1 berwarna agak gelap dengan total skor 3,4.

Penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria warna skornya 4,0. Mengacu pada hal itu warna yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap biskuit crackers adalah formulasi 1:0 dan formulasi 1:1, namun yang lebih tinggi skornya adalah formulasi 1:0.

Warna merupakan elemen yang sangat penting dalam seni lukis, karena warna sebagai efek cahaya yang memberi kesan pada mata, sehingga dapat menghadirkan karakter dari suatu bentuk yang secara psikologis mempengaruhi perasaan. Hal ini tidak jauh berbeda dalam proses membuat makanan, warna mampu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi konsumen (Gulendra, 2010 dalam Amriani, 2017).

Mutu bahan pangan pada umumnya tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain cita rasa, tekstur, nilai gizi, mikrobiologis, dan warna. Sebelum faktor lain dipertimbangkan, secara visual faktor warna akan tampil lebih dulu (Winarno, 1997 dalam Nurul, 2005). Faktor warna tersebut akan menjadi pertimbangan pertama ketika bahan makanan itu dipilih. Suatu bahan pangan yang dinilai bergizi dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna yang seharusnya (Soekarto, 1985 dalam Nurul, 2005).

b. Uji Mutu Hedonik Kriteria Aroma Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna

Aroma/bau merupakan salah satu parameter yang menentukan rasa enak suatu makanan. Dalam banyak hal, aroma/bau memiliki daya tarik tersendiri untuk menentukan rasa enak dari produk makanan itu sendiri. Dalam industri pangan, uji terhadap aroma dianggap penting karena cepat dapat memberikan penilaian terhadap hasil produksinya, apakah produksinya disukai atau tidak disukai oleh konsumen (Soekarto, 1990 dalam Hidayat, 2014).

Aroma yang disebarkan oleh makanan merupakan daya tarik yang sangat kuat dan mampu merangsang indera penciuman sehingga membangkitkan selera. Timbulnya aroma makanan disebabkan oleh terbentuknya senyawa yang mudah menguap sebagai akibat atau reaksi karena pekerjaan enzim atau dapat juga terbentuk tanpa bantuan reaksi enzim (Zuhrina, 2011).

Berdasarkan penilaian panelis terhadap aroma biskuit crackers tulang ikan tuna untuk semua formulasi memiliki kriteria aroma biasa. Untuk formulasi 1:0 dengan skor 4,9 formulasi 0:1 dengan skor 4,4, formulasi 1:1 dengan skor 4,2, formulasi 1:3 dengan skor 4,2, dan formulasi 3:1 dengan skor 4,7. Berdasarkan penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria aroma skornya 4,0. Mengacu pada hal itu aroma yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap biskuit adalah semua formulasi namun yang lebih tinggi skornya adalah formulasi 1:0. Komposisi dengan 100 gram tepung terigu.

Aroma makanan dalam banyak hal menentukan enak atau tidaknya makanan bahkan aroma atau bau-bauan lebih kompleks dari pada rasa dan kepekaan indera pembauan biasanya lebih tinggi dari indera pencicipan bahkan industri pangan

menganggap sangat penting terhadap uji bau karena dapat dengan cepat memberikan hasil penilaian apakah produk disukai atau tidak (Winarno, 2004 dalam Putra 2015).

c. Uji Mutu Hedonik Kriteria Tekstur Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna

Tekstur suatu bahan akan mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan pangan tersebut. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa perubahan tekstur bahan dapat mengubah rasa dan bau yang timbul karena dapat mempengaruhi kecepatan timbulnya rangsangan terhadap sel olfaktori dan kelenjar air (Winarno, 1997 dalam Nurul 2015).

Tekstur adalah nilai raba pada suatu permukaan, baik itu nyata maupun semu. Suatu permukaan mungkin kasar, halus, keras atau lunak, kasar atau licin. Konsistensi atau tekstur makanan juga merupakan komponen yang turut menentukan cita rasa makanan karena sensitifitas indera cita rasa dipengaruhi oleh konsistensi makanan. Makanan yang berkonsistensi padat atau kental akan memberikan rangsangan lebih lambat terhadap indera manusia.

Berdasarkan penilaian panelis terhadap tekstur biskuit crackers tulang ikan tuna untuk formulasi 1:0 bertekstur agak keras dengan skor 5,5, formulasi 0:1 bertekstur agak tidak keras dengan skor 3,5, formulasi 1:1 bertekstur biasa dengan skor 4,3, formulasi 1:3 bertekstur biasa dengan skor 4,6 dan formulasi 3:1 bertekstur biasa dengan skor 4,6.

Berdasarkan penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria tekstur skornya 4,0. Mengacu pada hal tersebut tekstur yang tidak sesuai dengan kriteria penelis terhadap biskuit crackers yaitu 0:1, sedangkan formulasi 1:0,1:1, 1:3 dan 3:1 telah sesuai dengan kriteria penelis terhadap biskuit tulang ikan tuna.

Tekstur biskuit crackers terbuat dari tepung tulang ikan tuna kurang disukai kinsmen karena memiliki tekstur yang mudah rapuh. Banyak hal yang mempengaruhi tekstur pada bahan pangan antara lain: rasio kandungan protein, lemak, jenis protein, suhu pengolahan, kadar air dan aktivitas air.

Tekstur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen terhadap suatu produk pangan. Tekstur merupakan sekelompok sifat fisik yang ditimbulkan oleh elemen struktural bahan pangan yang dapat dirasakan (Purnomo, 1995).

Umumnya konsumen menyukai makanan yang mempunyai tekstur yang tinggi. Alasannya karena konsumen menyukai bahan pangan yang agak basah serta mudah dikunyah. Jadi kebasahan, empuk, mudah dikunyah, merupakan faktor tekstur yang dikehendaki (Purnomo 1995).

d. Uji Mutu Hedonik Kriteria Rasa Biskuit Crackers Tulang Ikan Tuna

Rasa merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keputusan konsumen dalam menerima atau menolak suatu produk makanan adalah parameter rasa. Rasa dimulai melalui tanggapan rangsangan kimiawi oleh indera pencicip (lidah), sampai akhirnya terjadi keseluruhan interaksi antara sifat-sifat aroma, rasa, dan tekstur sebagai keseluruhan rasa makanan.

Agar suatu senyawa dapat dikenali rasanya, senyawa tersebut harus larut dalam air liur sehingga dapat mengadakan hubungan mikrovillus dan impuls yang terbentuk dikirim melalui syaraf ke pusat syaraf.

Dengan rasa tersebut, konsumen dapat memutuskan menerima atau menolak produk tersebut. Ada 4 jenis rasa dasar yang dikenali yaitu: manis, asin, asam, dan pahit. Sedangkan rasa lainnya merupakan perpaduan dari rasa dasar (Soekarto, 1985).

Berdasarkan penilaian panelis terhadap rasa biskuit crackers biskuit tulang ikan tuna untuk formulasi 1:0, 1:3 dan 3:1 memiliki kriteria rasa biasa dengan skor masing-masing 5,5, 4,4 dan 4,1, formulasi 0:1 memiliki kriteria rasa tidak enak skor 2,9, sedangkan formulasi 1:1 memiliki kriteria rasa agak tidak enak dengan skor 3,8.

Penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria rasa skornya 4,0. Mengacu pada hal itu rasa yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap biskuit adalah semua formulasi, dengan total skor tertinggi pada formulasi 1:0 dengan skor 4,9, formulasi 1:3 dengan skor 4,4, formulasi 3:1 dengan skor 4,1, kemudian formulasi 1:1 dengan skor 3,8 dan formulasi 0:1 dengan skor 2,9.

Menurut Mega (2006) menyatakan bahwa rasa merupakan faktor yang sangat menentukan keputusan akhir konsumen untuk menerima atau menolak suatu produk. Meskipun warna dan aroma suatu produk baik tetapi rasanya tidak enak maka makanan tersebut akan ditolak.

e. Uji Mutu Hedonik Over All Biskuit Crackers

Adapun uji *over all* mutu hedonik berfungsi untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai baik tidaknya produk biskuit crackers tersebut. Berdasarkan uji mutu hedonik secara keseluruhan dapat dilihat penilaian panelis pada biskuit crackers tulang ikan tuna (*Thunnus sp*).

Untuk semua formulasi pada pengujian ini memiliki kriteria agak baik yaitu formulasi 1:0 memiliki skor 5, formulasi 1:1, 1:3 dan 3:1 memiliki kriteria biasa

dengan skor masing-masing 4,0, 4,3, dan 4,6. Dan formulasi 0:1 memiliki kriteria agak tidak baik dengan skor 3,3.

Peningkatan kesukaan panelis terhadap keseluruhan *biskuit crackers* sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penggunaan tepung terigu dan tepung tulang ikan tuna. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan *biskuit crackers* yang terbuat dari tepung terigu memberikan karakteristik sensori yang paling disukai konsumen. Peningkatan jumlah tepung tulang ikan memberikan warna coklat, aroma tulang yang kuat, dan tekstur *biskuit crackers* yang agak mudah rapuh sehingga cukup berbeda dengan karakteristik *biskuit crackers* dari terigu yang umum dikonsumsi masyarakat.

f. Uji Hedonik dalam Biskuit Crackers

Uji hedonik digunakan untuk menilai tingkat kesukaan panelis terhadap produk biskuit crackers tulang ikan tuna. Berdasarkan uji hedonik dapat dilihat penilaian panelis pada biskuit crackers tulang ikan tuna untuk formulasi 1:0 memiliki skor sebanyak 253 (63%) dengan kategori agak suka, formulasi 0:1 dengan total skor 178 (46) dengan kategori agak tidak suka, formulasi 1:1 dengan total skor 214 (57%) dengan kategori agak suka, formulasi 1:3 dengan total skor 222 (57%) dengan kategori suka dan formulasi 3:1 dengan skor 226 (59%) dengan kategori agak suka, pada data tersebut dapat diketahui uji hedonik dalam biskuit crackers tulang ikan tuna terdapat pada formulasi 1:0 dengan total skor sama yaitu 253 (63%) dengan kriteria suka, dan terendah pada formulasi 0:1 dengan total skor 178 (46%) dengan biasa.

g. Uji Statistik

Perhitungan statistika dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian substitusi terhadap mutu dari biskuit crackers, jenis uji yang digunakan komperatif berpasangan karena penelitian lebih dari dua kelompok, karena data tidak terdistribusi normal ($P < 0,05$) maka menggunakan uji *friedman*. Kriteria kemaknaan dari uji *friedman* ($P < 0,05$) bermakna, dan ($P > 0,05$) tidak bermakna.

Hasil penelitian kriteria warna menunjukkan nilai $P = 0,002$ pemberian tulang ikan tuna pada biskuit crackers tulang ikan tuna bermakna ($P < 0,05$) terhadap warna, artinya pemberian tulang ikan tuna pada olahan biskuit crackers tulang ikan tuna mempengaruhi kualitas warna dari biskuit crackers itu sendiri.

Hasil penelitian kriteria aroma menunjukkan nilai $P = 0,115$ pemberian tulang ikan tuna pada biskuit crackers tulang ikan tuna tidak bermakna ($P > 0,05$) yaitu terhadap aroma, artinya pemberian tulang ikan tuna pada olahan biskuit crackers tulang ikan tuna tidak mempengaruhi kualitas aroma dari biskuit crackers itu sendiri.

Hasil penelitian kriteria tekstur menunjukkan nilai $P = 0,000$ pemberian tulang ikan tuna pada biskuit crackers tulang ikan tuna bermakna ($P < 0,05$) terhadap tekstur, artinya pemberian tulang ikan tuna pada olahan biskuit crackers tulang ikan tuna mempengaruhi kualitas tekstur dari biskuit itu sendiri.

Hasil penelitian kriteria rasa menunjukkan nilai $P = 0,000$ pemberian tepung tulang ikan tuna pada biskuit crackers tulang ikan tuna bermakna ($P < 0,05$) terhadap rasa, artinya pemberian tulang ikan tuna pada olahan biskuit crackers tulang ikan tuna mempengaruhi kualitas rasa dari biskuit itu sendiri.

Hasil penelitian uji statistik *over all* mutu hedonik menunjukkan nilai $P = 0,000$ pemberian tulang ikan tuna pada biskuit crackers tulang ikan tuna bermakna ($P < 0,05$)

artinya pemberian tulang ikan tuna pada biskuit crackers tulang ikan tuna berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas dari biskuit. Selanjutnya hasil penelitian pada uji hedonik nilai $P = 0,000$ menunjukkan pemberian tulang ikan tuna pada biskuit crackers berpengaruh nyata ($P < 0.05$) terhadap daya terima atau tingkat kesukaan panelis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian biskuit crackers tulang ikan tuna dalam 100 gram, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan :

1. Kadar abu biskuit crackers tulang ikan tuna paling tinggi terdapat pada perbandingan 0:1 dengan kandungan kadar abu sebanyak 43,24%.
2. Kadar karbohidrat biskuit crackers tulang ikan tuna paling tinggi terdapat pada perbandingan 1:0 dengan kandungan karbohidrat sebanyak 43,88 %.
3. Kadar protein biskuit crackers tulang ikan tuna paling tinggi terdapat pada perbandingan 1:3 dengan kandungan protein sebanyak 9,25 %.
4. Kadar lemak biskuit crackers tulang ikan tuna paling tinggi terdapat pada perbandingan 1:0 dengan kandungan lemak sebanyak 30,27 %.
5. Kadar kalsium biskuit crackers tulang ikan tuna paling tinggi terdapat pada perbandingan 0:1 dengan kandungan kalsium sebanyak 17,82%.
6. Kadar zat besi biskuit crackers tulang ikan tuna paling tinggi terdapat pada perbandingan 0:1 dengan kandungan zat besi sebanyak 1,717 ug/g.
7. Kadar vitamin A biskuit crackers tulang ikan tuna paling tinggi terdapat pada perbandingan 1:3 dengan kandungan vitamin A sebanyak 1,13 ug/g.
8. Uji hedonik dan uji mutu hedonik terhadap biskuit crackers tulang ikan tuna paling disukai dan mempunya kualitas baik adalah biskuit crackers dengan perbandingan 3:1. Uji *Friedman* untuk analisa organoleptik menunjukkan ada

pengaruh kualitas biskuit crackers dari aspek warna, tekstur, rasa, mutu overall dan tingkat kesukaan sedangkan dari aspek aroma tidak ada pengaruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai masa simpan biskuit crackers tulang ikan tuna.
2. Pemanfaatan tepung tulang ikan biskuit crackers dapat dipublikasikan pada produk perikanan lain misalnya kulit pangsit, kerupuk dan lain-lainnya.
3. Uji organoleptik sebaiknya dilakukan pada penelis sesuai dengan sasaran peneliti.
4. Bagi masyarakat dapat membuat biskuit crackers untuk menjadi makanan layak konsumsi sebagai makanan tambahan guna memenuhi kebutuhan zat gizi perharinya.
5. Peneliti untuk selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan formulasi yang berbeda selain yang telah diteliti.

Daftar Pustaka

- Adwiyah, Ayun Kumala, Dkk. 2014. Serburia Suplemen Tulang Ikan Bandeng Dengan Cangkang Kapsul Alginate Untuk Mencegah Osteoporosis. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Vol 4 No.1
- Agustina, Agnes T, dkk. 2015. Kajian Gelatin Kulit Ikan Tuna (Thunnus Albacore) Yang Diproses Menggunakan Asam Asetat. *Perikanan dan Ilmu Kelautan*, 1 (5): 1186-1189.
- Ahmad M. Arman. 2012. Identifikasi Ciri-Ciri Morfologi Pada Ikan Pelagis Besar Tuna Mendidihan (Thunnus Albacores), Ternate, 25 Maret.
- Ali, Muhammad. 1993. *Strategi penelitian pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Almatsier, Sunita. 2010. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama.
- Amiruddin, Musfiq. 2007. Pembuatan dan Analisis Karakteristik Geleting Dari Tulang Ikan Tuna (*thunnus albacores*). Bogor. Departemen Teknologi Industri Pertanian.
- Amriani, dkk. 2017. Analisis kandungan zat gizi biskuit ubi jalar ungu (*iphomea batatas L. poiret*) sebagai perbaikan gizi masyarakat
- Anita. 2010. Komposisi Tepung Terigu. Yogyakarta, 25 maret
- Apsari, Winanti. 2011. Analisis Permintaan Ekspor Ikan Tuna Segar Indonesia di Pasar Internasional. Skripsi. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institusi Pertanian.
- Arsenal, Arsal. 2014. Mengenal Tuna Mata Besar (Bigeye Thuna) (Thunnus Obesus), perikanan. <http://arsal-arsenal.blogspot.co.id/2014/08/mengenal-tuna-mata-besar-bigeye-thuna-thunnus-obesus.html> (Diakses 19 Februari 2018)
- Barasi, Mary E. At A Glance. 2009. *Ilmu Gizi*. Penerjemah: Hermin. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Beck, Marry E. *Ilmu Gizi dan Diet Hubungannya dengan Penyakit-penyakit untuk Perawat dan Dokter*. Yogyakarta:Penerbit ANDI Yogyakarta, 2011.
- Cerawala. 2012. Ikan Tuna Sirip Biru (Thunnus Thynnus). Edisi 412. <http://cakrawala42.blogspot.co.id/2012/11/ikan-tuna-sirip-biru-thunnus-thynnus.html> (Diakses 25 Maret 2017).

- Candra, Deni Fidia. 2015. Kandungan Gizi dan Manfaat. <http://kobb1lips233.blogspot.co.id/2015/08/kandungan-gizi-dan-manfaat.html> (Diakses 25 Maret 2017).
- Christina Litaay, Joko Santoso. 2013. Pengaruh Perbedaan Metode Perendaman dan Lama Perendaman Terhadap Karakteristik Fisiko-Kimia Tepung Ikan Cakalang (*Katsuwonus Pelamis*). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropi*. 5.
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: Toha Putra.
- Hafsiyah, Nurul Asyifa. 2017. Analisis Kandungan Gizi Tepung Tulang Ikan Tuna (*Thunnus sp*) Sebagai Perbaikan Gizi Masyarakat.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al Azhar Juzu 'I*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hardianah, dkk. 2014. *Gizi, Pemantapan Diet, dan Obesitas*. Yogyakarta: Nuha Madika.
- Febry, Ayu Bulan. 2013. *Ilmu Gizi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasrtasapoetra, dkk. 2008. *Ilmu Gizi (Korelasi Gizi, dan Produksi Kerja)*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Marta'ati, Marisa, dkk. 2015. Pengaruh Penambahan Tepung Tulang Ikan Tuna (*Thunnus sp*) dan Proposi Jenis Shortening Terhadap sifat Organoleptik Rich Biscuit. *Pendidikan Tata Boga*, 4 (1): 153-161.
- Maulida, Nurul. 2005. Pemanfaatan Tepung Tulang Ikan Mendidihan (*Thunnus Albacares*) Sebagai Suplemen Dalam Pembuatan Biskuit (Crackers). Skripsi. Bogor: Fakultas perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertama Bogor.
- Muji, Rahayu. 2013. Uji Organoleptik. <http://mujarahayu69.blogspot.co.id/2013/03/organolepti.html> (Diakses 25 Maret 2017).
- Rahmantya, dkk. 2015. Analisis data pokok kelautan dan perikanan. Pusat data, statistik dan informasi.
- Putranto, Hilman Fadhli, Dkk. 2015. Karakteristik Ikan Belida (*Chitata Sp*) Sebagai Sumber Kalsium Dengan Metodehidrolisis Protein. Samarinda. Vol 40 Nomor 1 11-20.

- Putra, M. Ryo Andika, dkk. 2015. Fortifikasi Tepung Tulang Ikan Gabus (*Channas Striata*) Pada Kerupuk Sebagai Sumber Kalsium. *Teknologi Hasil Perikanan*, 4 (2): 128-139.
- Putra, Yogi Hadi, dkk. 2012. Pengaruh Pencampuran Fillet dan Tulang Tuna (*Thunnus sp*) Terhadap Karakteristik Nugget Yang Dihasilkan. *Teknologi Pangan*, 1.
- Putra, Sitiatava Rizema. 2013. *Pengantar Ilmu Gizi dan Diet*. D-Medika. Jogjakarta.
- Ridhatukfahmi, Dkk. 2014 Pemanfaatan Limbah Sidat (*Anguilla Sp.*) Sebagai Sumber Omega-3 Dan Mineral. Bogor.
- Risnoyatiningsih, Sri. "Hidrolisis Pati Ubi Jalar Kuning Menjadi Glukosa secara Enzimatis". *Jurnal*. 5 (2). Surabaya, 2011.
- Rochima, Emma, Dkk. 2015. Karakterisasi Kimiawi Dan Organoleptik Pempek Dengan Penambahan Tepung Tulang Ikan Mas Asal Waduk Cirata. *Jatinangor*. Vol VI No. 1.
- Romlah, Nurlaeli. 2012. Pengendalian Mutu Cake Mocaf (Modifiet Cassava Flour) Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas Balacie*). Skripsi. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sari, Fitri Kumala, Dkk. 2013. Pengaruh Penambahan Tulang Ikan Lele (*Clarias Sp*) Dan Kacang Tunggak (*Rigna Ungulculata*) Terhadap Kandungan Kalsium Dan Protein Pada Susu Jagung Manis (*Zea Maya Saccharata*). *Ilmu Dan Teknologi Pangan*. Surakarta. Vol 2 No 1.
- Sediaoetama, Achmad Djaeni. 2010. *Ilmu Gizi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Misbah*. Jakarta 15 (1)
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Sutrisno, Koswara. 2009.
- SNI (Standar Nasional Indonesia). *Mutu dan cara Uji Biskuit*. Badan Standarisasi Nasional SNI 01-2973-1992.
- SNI (Standar Nasional Indonesia). *Uji Bahan Makanan dan Minuman*. Badan Standarisasi Nasional SNI 01-2891-2011.

- Suarsana, dkk. 2011. Tepung Tempe Kaya Isoflavon Meningkatkan Kadar Kalsium, Posfor Dan Etrogen Plasma Tikus Betina Normal. *Jurnal Weteriner* 12 (3): 229-234.
- Syahrudin, Akmal Novrian. 2014. "Identifikasi Zat Gizi Dan Kualitas Tepung Kulit Pisang Raja (*Musa Sapientum*) Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari Dan Oven". *Skripsi*.Jurusan Gizi Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- Syarfaini. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*. Jalan Sultan Alauddin no. 63 makassar. Alauddin University Press
- Syarfaini. 2014. *Status Gizi Masyarakat*. Jalan Sultan Alauddin no. 63 makassar. Alauddin University Press.
- Talib, Ahmad. 2015. *Makron Kenari Sebagai Alternatif Sumber Kalsium dan Fosfor Cegah Osteoporosis*. Malang. Universitas Brawijaya Prees (UB press).
- Tejasari. 2005. *Nilai Pangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- The Lottery, 2006. *Makanan Fungsional*. Yogyakarta: Konisius
- Wardani, dkk. 2012. Fortifikasi Tepung Tulang Tuna Sebagai Sumber Kalsium Terhadap Tingkat Kesukaan Donat. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 3 (4): 41-50).
- Wasil, Muhammad. 2016. Uji Hedonik Dan Mutu Hedonik. Jampi: Teknologi Pertanian.
- Wikipedia, 2016. *Wikipedia The Free Encyclopedia*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Albakora> (22 Desember)
- Zuhrina. Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Pisang Raja (*Musa Paradisiaca*) Terhadap Daya Terima Kue Donat. *Skripsi*.Medan: Universitas Sumatra Utara, 2011.
- Zobra, Paura Rangga, dkk. 2010. Pengaruh Tepung Tulang Ikan Tuna Madidihang (*Thunnus Albacares*) Terhadap Kadar Kalsium Dan Fosfor Dalam Darah Tikus Putih (*Rattus Norvegicus*) Model Ovariektomi. Briwijaya, Universitas Briwiya.

L

A

M

P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN I

RESEP FORMULASI *BISKUIT CRACKERS* TULANG IKAN TUNA

Bahan	Kontrol 100% : 0	BTI 0% : 100%	BTI 50% : 50%	BTI 25% : 75%	BTI 75% : 25%
Tepung terigu (g)	100	0	50	75	25
Tepung Tulang Ikan Tuna (g)	0	100	50	25	75
Margarine (g)	30	30	30	30	30
Gula halus (g)	3	3	3	3	3
Garam (g)	0,3	0,3	0,3	0,3	03
Daun seledri (g)	2	2	2	2	2

LAMPIRAN 2

SCORE SHEET MUTU HEDONIK BISKUIT CRACKERS

Nama : _____

Jenis Kelamin : L / P


Tanggal Pengujian : _____

Deskripsi Produk :

Dihadapan Anda disajikan beberapa produk biskuit crackers dengan tambahan tulang ikan tuna (*Thunnus Sp.*). Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap warna, aroma, tekstur dan rasa dari produk tersebut berdasarkan skala berikut:

Uji Mutu Hedonik		Formula				
		F0	F1	F2	F3	F4
Warna						
1	Sangat gelap					
2	Gelap					
3	Agak gelap					
4	Biasa/netral					
5	Agak terang					
6	Terang					
7	Sangat terang					
Aroma						
1	Sangat tidak harum					
2	Tidak harum					
3	Agak tidak harum					
4	Biasa					
5	Agak harum					
6	Harum					
7	Sangat harum					
Tekstur						
1	Sangat tidak keras					
2	Tidak keras					
3	Agak tidak keras					
4	Biasa					
5	Agak keras					
6	keras					
7	Sangat keras					
Rasa						
1	Sangat tidak enak					
2	Tidak enak					

3	Agak tidak enak					
4	Biasa					
5	Agak enak					
6	Enak					
7	Sangat enak					
<i>Over All</i>						
1	Sangat tidak baik					
2	Tidak baik					
3	Agak tidak baik					
4	Biasa					
5	Agak baik					
6	Baik					
7	Sangat baik					



LAMPIRAN 3

SCORE SHEET BISKUIT CRACKERS

Nama : _____

Jenis Kelamin : L / P

Tanggal Pengujian : _____

Deskripsi Produk :

Dihadapan Anda disajikan beberapa produk biskuit crackers dengan tambahan tulang ikan tuna (*Thunnus Sp*). Anda diminta untuk memberikan penilaian (√) berdasarkan formula dan kesukaan dari produk tersebut berdasarkan skala berikut:

Uji Hedonik	Formula				
	F0	F1	F2	F3	F4
1	Sangat sangat tidak suka sekali				
2	Sangat sangat tidak suka				
3	Sangat tidak suka				
4	Tidak suka				
5	Agak tidak suka				
6	Biasa				
7	Agak suka				
8	Suka				
9	Sangat suka				
10	Sangat sangat suka				
11	Sangat sangat suka sekali				

LAMPIRAN 4 MASTER TABEL MUTU HEDONIK

a. Warna

b. Aroma

No	Sampel				
	F0	F1	F2	F3	F4
1	3	4	4	3	3
2	5	3	6	2	7
3	6	3	2	5	4
4	2	5	6	3	4
5	3	5	5	3	5
6	5	4	4	3	3
7	4	5	5	3	3
8	5	4	3	2	6
9	4	5	4	4	4
10	6	5	3	3	2
11	3	4	1	2	5
12	5	5	4	3	3
13	6	5	4	3	2
14	4	4	3	4	2
15	6	3	5	5	4
16	5	5	4	4	4
17	3	2	4	4	4
18	5	2	5	3	6
19	5	5	4	3	3
20	3	3	3	2	2
21	4	3	5	3	4
22	3	3	4	5	5
23	4	2	3	5	3
24	6	6	6	5	5
25	5	3	4	4	3
26	3	4	3	3	3
27	3	4	4	4	4
28	1	4	5	3	2
29	4	3	4	3	2
30	2	6	5	2	2
31	3	4	4	3	3
32	5	3	3	4	2
33	5	6	3	2	1
34	6	3	5	5	4
35	6	3	4	5	3
36	7	2	3	2	1
Jumlah	155	140	144	122	123
Rata-rata	4.31	3.89	4	3.39	3.42

No	Sampel				
	F0	F1	F2	F3	F4
1	6	3	3	3	3
2	5	6	4	5	4
3	6	2	3	4	5
4	5	6	4	5	6
5	5	6	6	6	4
6	4	5	6	3	4
7	3	4	5	6	6
8	5	5	2	2	5
9	5	3	4	4	5
10	6	5	3	4	3
11	5	2	3	6	4
12	6	6	6	6	5
13	6	2	4	4	5
14	4	7	6	5	5
15	4	5	6	5	6
16	5	3	3	3	3
17	4	5	5	4	6
18	6	7	5	4	5
19	2	3	4	5	6
20	5	5	5	4	4
21	6	6	5	3	6
22	6	6	4	3	3
23	5	2	3	5	5
24	6	4	5	5	5
25	4	1	3	4	2
26	4	6	4	4	6
27	5	5	4	5	5
28	5	3	5	4	7
29	4	1	4	3	4
30	4	6	5	2	4
31	5	6	5	6	5
32	6	3	4	5	2
33	6	6	3	4	5
34	7	4	3	2	5
35	4	5	5	6	7
36	5	6	4	3	6
Jumlah	179	160	153	152	171
Rata-rata	4.97	4.44	4.25	4.22	4.75

c. Tekstur

No	Sampel				
	F0	F1	F2	F3	F4
1	6	3	3	5	1
2	5	2	4	6	6
3	5	4	4	4	4
4	5	4	5	5	5
5	6	4	5	7	7
6	6	5	4	4	4
7	5	3	4	5	5
8	6	4	4	4	6
9	6	2	4	5	5
10	6	1	5	5	5
11	7	2	4	4	4
12	6	6	5	5	5
13	5	3	4	5	5
14	7	6	6	6	5
15	7	4	4	4	4
16	6	5	4	4	4
17	4	3	5	5	4
18	4	2	6	6	5
19	2	3	4	6	7
20	5	4	4	4	4
21	5	2	6	6	3
22	7	1	2	7	7
23	4	2	5	4	5
24	6	3	2	3	4
25	4	5	4	1	4
26	7	4	4	4	4
27	7	3	5	4	4
28	6	3	5	4	5
29	7	4	6	4	7
30	4	6	5	5	5
31	4	4	4	4	4
32	5	4	5	6	4
33	6	3	4	4	4
34	6	5	5	4	4
35	7	4	4	4	4
36	5	4	4	4	4
Jumlah	199	127	158	167	167
Rata-rata	5.53	3.53	4.39	4.64	4.64

d. Rasa

No	Sampel				
	F0	F1	F2	F3	F4
1	6	3	3	4	4
2	6	2	5	7	5
3	6	5	4	4	3
4	4	5	6	7	1
5	4	2	4	5	6
6	6	4	4	5	5
7	4	4	4	4	4
8	6	2	3	5	2
9	4	3	4	5	4
10	6	4	4	6	5
11	5	4	6	4	4
12	5	3	6	6	4
13	5	1	4	4	3
14	4	1	4	4	4
15	5	5	4	4	4
16	5	4	3	4	4
17	6	2	4	5	6
18	5	1	3	4	4
19	4	4	6	5	3
20	5	2	1	3	4
21	4	4	3	4	3
22	4	1	6	5	3
23	4	2	3	5	2
24	6	3	4	4	5
25	5	2	3	4	5
26	4	5	6	4	5
27	5	2	2	4	5
28	7	2	3	6	5
29	4	1	2	3	4
30	6	2	3	2	5
31	4	3	3	5	5
32	5	2	4	6	5
33	6	2	3	5	4
34	6	6	6	3	6
35	4	4	3	2	5
36	4	5	4	3	5
Jumlah	179	107	140	160	151
Rata-rata	4.97	2.97	3.89	4.44	4.19

e. Over All

No	Sampel				
	F0	F1	F2	F3	F4
1	6	3	3	4	5
2	3	4	6	7	6
3	7	6	5	4	5
4	4	7	5	6	6
5	4	3	4	5	5
6	6	5	4	5	5
7	4	4	4	4	4
8	6	1	4	4	2
9	5	3	4	5	4
10	7	4	4	6	5
11	5	2	4	3	6
12	5	4	6	3	4
13	3	1	4	5	4
14	7	5	6	6	6
15	4	4	5	5	5
16	5	3	3	4	4
17	7	2	4	5	4
18	6	3	2	4	5
19	4	4	6	5	3
20	7	2	3	3	4
21	5	3	4	4	3
22	4	2	6	5	5
23	4	2	3	5	2
24	6	6	6	6	6
25	4	2	3	3	5
26	1	6	4	5	4
27	5	2	2	4	5
28	7	3	4	5	6
29	4	2	3	3	4
30	4	2	3	2	5
31	4	3	3	4	4
32	6	2	4	5	4
33	6	2	4	3	5
34	7	5	4	2	5
35	4	4	4	2	5
36	4	4	4	6	6
Jumlah	180	120	147	157	166
Rata-rata	5	3.33	4.08	4.36	4.61

MASTER TABEL UJI HEDONIK

No	Sampel				
	F0	F1	F2	F3	F4
1	8	4	4	5	5
2	7	4	8	9	8
3	9	8	7	6	6
4	7	9	9	8	8
5	6	1	6	7	7
6	9	6	7	5	5
7	6	6	7	5	7
8	6	5	5	8	4
9	6	4	6	6	6
10	9	6	7	8	7
11	8	6	6	5	9
12	8	6	8	7	4
13	5	3	7	7	6
14	8	5	6	6	6
15	6	7	5	6	6
16	8	5	5	6	7
17	9	1	8	7	7
18	7	4	6	5	6
19	7	8	10	9	5
20	7	3	3	4	5
21	7	6	5	6	5
22	6	2	8	7	7
23	8	5	1	4	1
24	9	6	6	6	6
25	6	3	4	6	7
26	3	9	5	7	6
27	7	3	6	6	7
28	4	5	5	9	8
29	7	1	6	3	6
30	8	4	5	4	7
31	6	5	6	6	7
32	8	4	5	7	6
33	8	2	7	6	7
34	8	7	6	4	7
35	6	6	5	5	7
36	6	7	5	7	8
Jumlah	253	176	214	222	226
Rata-rata	7.03	4.89	5.94	6.17	6.28

LAMPIRAN 5

HASIL PENGOLAHAN DATA SPSS

1. Uji Hedonik

Ranks		Test Statistics ^a	
	Mean Rank		
UJI HEDONIK F0	3.79	N	36
UJI HEDONIK F1	2.17	Chi-Square	22.349
UJI HEDONIK F2	2.82	df	4
UJI HEDONIK F3	2.99	Asymp. Sig.	.000
UJI HEDONIK F4	3.24		

a. Friedman Test

2. Uji Mutu Hedonik

a. Warna

Ranks		Test Statistics ^a	
	Mean Rank		
WARNA F0	3.53	N	36
WARNA F1	3.21	Chi-Square	17.263
WARNA F2	3.35	df	4
WARNA F3	2.53	Asymp. Sig.	.002
WARNA F4	2.39		

a. Friedman Test

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

b. Aroma

Ranks	
	Mean Rank
AROMA F0	3.42
AROMA F1	3.04
AROMA F2	2.68
AROMA F3	2.65
AROMA F4	3.21

Test Statistics ^a	
N	36
Chi-Square	7.429
df	4
Asymp. Sig.	.115

a. Friedman Test

c. Tekstur

Ranks	
	Mean Rank
TESKTUR F0	4.07
TESKTUR F1	2.08
TESKTUR F2	2.82
TEKSTUR F3	3.03
TEKSTUR F4	3.00

Test Statistics ^a	
N	36
Chi-Square	37.551
df	4
Asymp. Sig.	.000

a. Friedman Test

d. Rasa

Ranks	
	Mean Rank
RASA F0	3.97
RASA F1	1.94
RASA F2	2.65
RASA F3	3.33
RASA F4	3.10

Test Statistics ^a	
N	36
Chi-Square	37.981
df	4
Asymp. Sig.	.000

a. Friedman Test

e. Over All

Ranks	
	Mean Rank
OVER ALL F0	3.81
OVER ALL F1	1.89
OVER ALL F2	2.69
OVER ALL F3	3.19
OVER ALL F4	3.42

Test Statistics ^a	
N	36
Chi-Square	36.417
df	4
Asymp. Sig.	.000

a. Friedman Test

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

LAMPIRAN 6

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor Sertifikat : 2.7154/LU-BBIHP/II/2018
Certificate Number
Nomor Analisis : P. 8714
Analysis Number
Nama Contoh : Biskuit Tulang Ikan Tuna
Sample(s) Name
Tanggal Penerbitan : 6 Februari 2018
Date of Issue

Parameter Parameter(s)	Satuan Unit(s)	Hasil Result	Metode Uji/Teknik Analytical Method
Kadar Air	%	Simplo : 7,83 Duplo : 7,85 Tripla : 7,87	SNI 01-2891-1992 Butir 5.1
Kadar Abu	%	Simplo : 16,71 Duplo : 16,68 Tripla : 16,79	SNI 01-2891-1992 Butir 6.1
Kadar Protein	%	Simplo : 8,46 Duplo : 8,60 Tripla : 8,56	SNI 01-2891-1992 Butir 7.1
Kadar Lemak	%	Simplo : 27,06 Duplo : 27,07 Tripla : 27,10	SNI 01-2891-1992 Butir 8.1
Karbohidrat	%	Simplo : 28,35 Duplo : 28,38 Tripla : 28,34	SNI 01-2891-1992 Butir 9



Penanggung Jawab Mutu,
[Signature]
IDAWATI

HASIL UJI

TEST RESULT

Nomor Sertifikat : 2.7154/LU-BBIHP/I/2018

Certificate Number

Nomor Analisis : P. 6715

Analysis Number

Nama Contoh : Biskuit Tulang Ikan Tuna

Sample(s) Name

Tanggal Penerbitan : 6 Februari 2018

Date of Issue

Paramoter <i>Parameter(s)</i>	Satuan <i>Units</i>	Hasil <i>Result</i>	Metode Uji/Teknik <i>Analytical Method</i>
Kadar Air	%	Simplo: 2,91 Duplo: 2,90 Tripla: 2,90	SNI 01-2891-1992 Butir 5.1
Kadar Abu	%	Simplo: 43,24 Duplo: 43,20 Tripla: 43,30	SNI 01-2891-1992 Butir 6.1
Kadar Protein	%	Simplo: 4,06 Duplo: 4,00 Tripla: 4,08	SNI 01-2891-1992 Butir 7.1
Kadar Lemak	%	Simplo: 27,28 Duplo: 27,24 Tripla: 27,25	SNI 01-2891-1992 Butir 8.1
Karbohidrat	%	Simplo: 13,72 Duplo: 13,71 Tripla: 13,71	SNI 01-2891-1992 Butir 9



HASIL UJI

TEST RESULT

Nomor Sertifikat : 2.7154/LU-BBIHP/1/2018

Certificate Number

Nomor Analisis : P. 6716

Analysis Number

Nama Contoh : Biskuit Tulang Ikan Tuna

Sample(s) Name

Tanggal Penerbitan : 6 Februari 2018

Date of Issue

Parameter <i>Parameter(s)</i>	Satuan <i>Unit(s)</i>	Hasil <i>Result</i>	Metode Uji/Teknik <i>Analytical Method</i>
Kadar Air	%	Simplo: 4,27 Duplo: 4,33 Tripla: 4,32	SNI 01-2691-1992 Butir 6.1
Kadar Abu	%	Simplo: 1,12 Duplo: 1,14 Tripla: 1,10	SNI 01-2691-1992 Butir 6.1
Kadar Protein	%	Simplo: 8,56 Duplo: 8,39 Tripla: 8,75	SNI 01-2691-1992 Butir 7.1
Kadar Lemak	%	Simplo: 30,27 Duplo: 30,30 Tripla: 30,25	SNI 01-2691-1992 Butir 8.1
Karbohidrat	%	Simplo: 43,86 Duplo: 43,91 Tripla: 43,87	SNI 01-2691-1992 Butir 9

UNIVERSITAS ALAUDDIN
MAKASSAR

Manajer Mutu,
[Signature]
DRIWATI

HASIL UJI
TEST RESULT

Nomor Sertifikat : 2.7154/LU-BBIHP/II/2018

Certificate Number

Nomor Analisis : P. 6717

Analysis Number

Nama Contoh : Biskuit Tulang Ikan Tuna

Sample(s) Name

Tanggal Penerbitan : 6 Februari 2018

Date of Issue

Parameter <i>Parameter(s)</i>	Satuan <i>Unit(s)</i>	Hasil <i>Result</i>	Metode Uji/Teknik <i>Analytical Method</i>
Kadar Air	%	Simplo: 8,13 Duplo: 8,04 Tripla: 8,04	SNI 01-2891-1992 Butir 5.1
Kadar Abu	%	Simplo: 6,84 Duplo: 6,74 Tripla: 6,82	SNI 01-2891-1992 Butir 6.1
Kadar Protein	%	Simplo: 9,22 Duplo: 9,23 Tripla: 9,30	SNI 01-2891-1992 Butir 7.1
Kadar Lemak	%	Simplo: 18,06 Duplo: 18,04 Tripla: 18,10	SNI 01-2891-1992 Butir 8.1
Karbohidrat	%	Simplo: 39,84 Duplo: 39,86 Tripla: 39,85	SNI 01-2891-1992 Butir 9

Manajer Teknis 1,
SARKIVAH



HASIL UJI

TEST RESULT

Nomor Sertifikat : 2.7154/LU-BBIHP/I/2018

Certificate Number

Nomor Analisis : P. 6718

Analysis Number

Nama Contoh : Biskuit Tulang Ikan Tuna

Sample(s) Name

Tanggal Penerbitan : 6 Februari 2018

Date of Issue

Parameter <i>Parameter(s)</i>	Satuan <i>Units</i>	Hasil <i>Result</i>	Metode Uji/Teknik <i>Analytical Method</i>
Kadar Air	%	Simplo: 2,30 Duplo: 2,21 Tripla: 2,28	SNI 01-2891-1992 Butir 5.1
Kadar Abu	%	Simplo: 42,60 Duplo: 42,64 Tripla: 42,79	SNI 01-2891-1992 Butir 6.1
Kadar Protein	%	Simplo: 4,32 Duplo: 4,43 Tripla: 4,48	SNI 01-2891-1992 Butir 7.1
Kadar Lemak	%	Simplo: 21,87 Duplo: 21,90 Tripla: 21,86	SNI 01-2891-1992 Butir 8.1
Karbohidrat	%	Simplo: 14,04 Duplo: 14,06 Tripla: 14,05	SNI 01-2891-1992 Butir 9

UNIVERSITAS NEGERI

ALAU DIN
MAKASSAR



Uji Parameter Teknis 1,

M. SARKIYAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA
LABORATORIUM RISET

Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/01/152
Lamp : 1
Hal : Laporan Hasil Analisa

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si, M.Si
Waktu analisa : Jum'at / 12 Januari 2018
Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Nyala
Judul Penelitian : Analisis Kandungan Zat Gizi Biskuit Tulang Ikan Tuna (*Thunnus sp*) Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat.

A. Data Deret Standar logam Ca

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	-0.0015
Standard 1	10	0.0019
Standard 2	20	0.0044
Standard 3	30	0.0077
Standard 4	40	0.0111
Standard 5	50	0.0152

B. Data Absorbansi Sampel logam Ca

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
BTT 1:0 1	0.0006	BTI 0:1 3	0.0246	BTI 1:1 2	0.0085
BTT 1:0 2	0.0006	BTI 1:3 1	0.0010	BTI 1:1 3	0.0092
BTT 1:0 3	0.0005	BTI 1:3 2	0.0017	BTI 3:1 1	0.0243
BTI 0:1 1	0.0244	BTI 1:3 3	0.0022	BTI 3:1 2	0.0249
BTI 0:1 2	0.0240	BTI 1:1 1	0.0089	BTI 3:1 3	0.0259

Faktor Pengenceran = 100

Semata-Gowa, 22 Januari 2018

Diperiksa Oleh
Kepala Laboratorium Kimia

Dra. Sri Chadiyah, M.Si
NIP : 19680216 199903 2 001

Disusun Oleh
Laboran

Awaluddin Iwan Perdana, S.Si, M.Si
NIP : 19800526 201101 1 004

Nomor : Lab Riset/LA/01/153
Lamp :-
Hal : *Laporan Hasil Analisa*

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si.,M.Si
Waktu analisa : Jum'at / 12 Januari 2018
Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Nyala
Judul Penelitian : Analisis Kandungan Zat Gizi Biskuit Tulang Ikan Tuna (*Thunnus sp*) Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat.

A. Data Deret Standar logam Fe

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	-0.0001
Standard 1	1	0.0569
Standard 2	2	0.0951
Standard 3	3	0.1476
Standard 4	4	0.1877
Standard 5	5	0.2231

B. Data Absorbansi Sampel logam Fe

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
BTT 1:0 1	0.0608	BTI 0:1 3	0.0812	BTI 1:1 2	0.0754
BTT 1:0 2	0.0584	BTI 1:3 1	0.0684	BTI 1:13	0.0714
BTT 1:0 3	0.0595	BTI 1:3 2	0.0606	BTI 3:1 1	0.0736
BTI 0:1 1	0.0828	BTI 1:3 3	0.0624	BTI 3:1 2	0.0625
BTI 0:1 2	0.0866	BTI 1:1 1	0.0741	BTI 3:1 3	0.0608

Samata-Gowa, 22 Januari 2018

Diperiksa Oleh

Kepala Laboratorium Kimia



[Signature]
Dra. St. Chadijah, M.Si

NIP : 19680216 199903 2 001

Disusun Oleh

Laboran

[Signature]

Awaluddin Iwan Perdana, S.Si.,M.Si

NIP : 19800526 201101 1 004



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Tamalene Makassar 90245



LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Nama : KARLINDA
NM : 70200113084
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Sampel : Biskuit Tulang Ikan Tuna (*Thunnus sp*)
Tanggal Penelitian : -
Judul Penelitian : Analisis Kandungan Zat Gizi Biskuit Tulang Ikan Tuna (*Thunnus sp*) Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat.

HASIL PEMERIKSAAN

NO. LAB	KODE SAMPEL	SATUAN	HASIL PEMERIKSAAN		
			Percobaan 1	Percobaan 2	Percobaan 3
17122530	BTT 1 : 0 ¹	ug/g	0.73		
17122531	BTT 1 : 0 ²	ug/g		0.85	
17122532	BTT 1 : 0 ³	ug/g			0.79
17122533	BTI 0 : 0 ¹	ug/g	1.11		
17122534	BTI 0 : 0 ²	ug/g		0.57	
17122535	BTI 0 : 0 ³	ug/g			0.64
17122536	BTI 1 : 1 ¹	ug/g	0.75		
17122537	BTI 1 : 1 ²	ug/g		1.02	
17122538	BTI 1 : 1 ³	ug/g			0.79
17122539	BTI 3 : 1 ¹	ug/g	0.92		
17122540	BTI 3 : 1 ²	ug/g		0.85	
17122541	BTI 3 : 1 ³	ug/g			1.03
17122542	BTI 1 : 3 ¹	ug/g	0.92		
17122543	BTI 1 : 3 ²	ug/g		1.15	
17122544	BTI 1 : 3 ³	ug/g			1.32

Makassar, 23 Februari 2018

Manajer Teknik,

Dr. ASWAN USMAN, M.Kes

NIP. 1971040420021210001



DOKUMENTASI

1. Pembuatan Tepung Tulang Ikan Tuna



Proses Pemotongan Tulang Ikan Tuna



Proses Pemasakan, Pembersihan, Presto Dan Perebusan Kembali Tulang Ikan Tuna



Penirisan, Ekstraksi Basa NaOH 1,5 N dan Penirisan Tulang Ikan Tuna



Proses Pembuatan Larutan NaOH 1,5 N



Proses Penimbangan Tulang, Pemasakan, dan Penimbangan Lemon



Perendaman Perasan Lemon



Pencampuran Parutan Kulit Lemon, Autoklaving, dan Pengovenan



Penghalusan Tulang Ikan Tuna dengan Blender dan Proses Penepungan dengan Ayakan 100 Mesh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2. Proses Pembuatan Biskuit Crackers



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



3. Uji Laboratorium

a. Uji Kadar abu






b. Uji Karbohidrat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





c. Uji Protein



UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
M A K A S S A R

d. Uji Lemak



e. Uji Kalsium dan Fe



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

f. Uji Vitamin A





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KASSAR

g. Uji Organoleptik



ALAUDDIN
M A K A R



RIWAYAT HIDUP



Karlinda, dilahirkan di Bilonga Kecamatan Bontonompo pada tanggal 29 Agustus 1994. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Alimuddin dan Sukma. Penulis mengawali pendidikan di SD Inpres Bilonga pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Bontonompo dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun tersebut pula penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bontonompo. Pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat dengan peminatan gizi hingga sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R