



BUKU DARAS
UIN ALAUDDIN
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Nur Hidayah, S.Kep.NS., MARS
Misbahuddin, S.Ag., M.Ag.



keperawatan anak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR 2011

BAB I

KONSEP KEPERAWATAN ANAK

SATUAN BAHASAN 1 :

FILOSOFI KEPERAWATAN ANAK, KEPERAWATAN ANAK DALAM KONTEKS KELUARGA, PRINSIP PERAWATAN ANAK, FUNGSI PERAWATAN ANAK, PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP KESEHATAN ANAK.

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah ini membahas mengenai filosofi keperawatan anak, keperawatan anak dalam konteks keluarga, prinsip perawatan anak, fungsi perawatan anak, dan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan anak.

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai filosofi keperawatan anak, keperawatan anak dalam konteks keluarga, prinsip perawatan anak, fungsi perawatan anak, dan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan anak. Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Fahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan filosofi keperawatan anak
2. Mahasiswa dapat menjelaskan keperawatan anak dalam konteks keluarga
3. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip perawatan anak
4. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi perawatan anak
5. Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan anak
6. Mahasiswa dapat membuat uraian sendiri tentang filosofi keperawatan anak
7. Mahasiswa dapat membuat uraian sendiri tentang keperawatan anak dalam konteks keluarga
8. Mahasiswa dapat membuat uraian sendiri tentang prinsip perawatan anak
9. Mahasiswa dapat membuat uraian sendiri tentang fungsi perawatan anak
10. Mahasiswa dapat membuat uraian sendiri tentang pengaruh lingkungan terhadap kesehatan anak.
11. Mahasiswa memahami manfaat pengetahuan tentang filosofi keperawatan anak
12. Mahasiswa memahami manfaat pengetahuan tentang keperawatan anak dalam konteks keluarga
13. Mahasiswa memahami manfaat pengetahuan tentang prinsip perawatan anak
14. Mahasiswa memahami manfaat pengetahuan tentang fungsi perawatan anak
15. Mahasiswa memahami manfaat pengetahuan tentang pengaruh lingkungan terhadap kesehatan anak.

FILOSOFI KEPERAWATAN ANAK, KEPERAWATAN ANAK DALAM KONTEKS KELUARGA, PRINSIP PERAWATAN ANAK, FUNGSI PERAWATAN ANAK, PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP KESEHATAN ANAK.

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lima hal ini dalam kaidah ushuliyah biasa dikenal dengan *mabadiul khamsah*, atau dalam bahasa Indonesia disebut "lima prinsip dasar". Juga biasa disebut dengan *maqashid asy-syar'iah*, atau dalam bahasa Indonesia disebut tujuan hukum Islam/syariat.

Setidaknya tiga dari yang disebut di atas berkaitan dengan disiplin ilmu keperawatan dan kesehatan. Tidak heran jika ditemukan bahwa Islam sangat kaya dengan tuntunan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.

1. Wahyu pertama yang diturunkan adalah Surah *Al-'alaq*.
2. Wahyu berikutnya adalah Surah *Al-Muddatstsir* yang di dalamnya diungkap tentang kebersihan.
3. Ada dua istilah dalam literatur keagamaan yang digunakan untuk menunjuk tentang pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam, yaitu sehat dan afiat.

Pakar bahasa Al-Qur'an dapat memahami dari ungkapan "sehat wal afiat", bahwa kata sehat berbeda dengan kata afiat, karena wa yang berarti "dan" adalah kata penghubung yang sekaligus menunjukkan adanya perbedaan antara yang disebut pertama(sehat) dan yang disebut kedua (afiat) Atas dasar itu dipahami adanya perbedaan makna di antara keduanya.

Dalam literatur keagamaan, bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, ditemukan sekian banyak doa yang mengandung permohonan afiat di samping permohonan memperoleh sehat.

Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda:

Artinya:

Mintalah ampunan dan keselamatan kepada Allah, sebab tidaklah seseorang diberi sesuatu setelah keyakinan, yang lebih dari keselamatan (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Salah satu doa yang biasa dibaca oleh beliau adalah

Artinya:

Ya Allah aku memohon kepada-Mu penjagaan dari yang terlarang dan keselamatan dalam urusan dunia dan agamaku, keluarga dan hartaku. (HR. Al-Bazzar dari Ibnu Abbas).

Dalam literatur fikih Islam, hampir dapat dipastikan bahwa semua kitab-kitab referensi fikih pasti membahas masalah kesehatan dan kebersihan. Baik yang berkaitan dengan kebersihan fisik maupun mental. Bahkan setiap kitab fikih, hampir dapat dipastikan selalu mengawali

pembahasan bab pertamanya dengan menguraikan thaharah (bersuci), dan berkaitan dengannya.


Islam memiliki falsafah yang sangat jelas tentang kesehatan dan keperawatan, bahkan Islam menganjurkan hal tersebut. Dalam Islam, fungsi manusia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

Pertama sebagai khalifah, khalifah artinya, wakil, penganti atau duta. Jika manusia disebut di dalam Al-Qur'an sebagai "khalifah" maka maksudnya manusia menduduki jabatan wakil yang artinya manusia diberi wewenang dan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan atau kekhalfahannya di muka bumi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang memberi kuasa, yakni Allah. Karenanya manusia, memiliki status pemimpin, pemelihara, pengatur untuk diri dan sesama makhluk lain yang di dalamnya tercermin fungsi manusia dan kemanusiaan (humanistik), termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan atau keperawatan anak.

Kedua, manusia sebagai hamba Allah/abdi; yang berkewajiban hanya menyembah kepada Allah semata. Hal ini menunjukkan bahwa segala perbuatan, tingkah laku atau segala gerak-gerik tubuh dan pikiran hanyalah ditujukan kepada Allah semata. Maka diyakini bahwa melaksanakan profesi keperawatan secara benar adalah bagian pengabdian kepada Allah selaku hamba Allah SWT.

Manusia sebagai perawat adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan sempurna (terdiri dari jasad, ruh dan nafs) dan memiliki iman, ilmu, dan mempunyai kewajiban untuk mengamalkan bagi kemaslahatan umat.

Manusia sebagai klien yang menjadi fokus pelayanan keperawatan pada dasarnya adalah makhluk yang berpotensi secara aktif menjadikan dirinya, menjadi manusia yang sempurna, sebagaimana firman Allah;



Artinya: (siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[621] Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah.

A. Filosofi Keperawatan Anak

Filosofi keperawatan anak merupakan keyakinan atau pandangan yang dimiliki perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada anak yang berfokus pada keluarga (family centered care), pencegahan terhadap trauma (atraumatic care), dan manajemen kasus.

B. Keperawatan Anak Dalam Konteks Keluarga

Pengertian Anak Sebagai Manusia Seutuhnya.

1. Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan mulai dari bayi hingga remaja.
2. Anak merupakan anggota unit keluarga dalam suatu kultur dan masyarakat.
3. Anak meliputi dalam proses perkembangan 0 - 18 tahun:
 - Ciri fisik /kognitif
 - Konsep diri
 - Pola koping
 - Perilaku sosial
4. Diyakini bahwa anak bukan miniatur orang dewasa, harta dan kekayaan orang tua yang nilainya dihitung secara ekonomi tetapi anak adalah makhluk yang unik dan utuh, biopsiko-sosio kultural spiritual.
5. Anak merupakan masa depan bangsa dan negara(dunia) yang berhak atas pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan spesifiknya pada tiap tahap usia.

C. Prinsip Perawatan Anak

1. Keperawatan kesehatan anak meliputi hubungan antara perawat dengan anak dan perawat dengan keluarga.
2. Perawat tidak semata-mata merawat anak selama sakit, tetapi bertanggung jawab secara keseluruhan yang memungkinkan memenuhi kebutuhan anak dan keluarga.
3. Lingkungan di sekitar anak memegang peranan penting bahwa merawat perlu memahami bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungannya.
4. Perawat dipandang sebagai orang yang dapat bekerja secara efektif dengan bayi dan anak serta dapat menciptakan suatu kondisi bagi anak lain agar berfungsi lebih efektif dalam merawat anaknya.
5. Berfikir kritis
6. Menggunakan data ilmu
7. Untuk memilih intervensi yang serasi perawat mengikutsertakan anak dan keluarga.
8. Perawat harus mempunyai keterampilan profesional untuk dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas.

D. Fungsi Perawatan Anak

1. Family Advocacy(Pembelaan)
 - a. Bersama keluarga perawat mengidentifikasi kebutuhan anak,tujuan dan merencanakan intervensi keperawatan yang cocok untuk memenuhi kebutuhan anak dan menyelesaikan

- masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.
- b. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarga mengetahui semua pelayanan kesehatan tersedia, menjelaskan prosedur dan pengobatan, mengikutsertakan dalam perawatan anak dan menganjurkan perubahan atau mensupport praktek pelayanan kesehatan
 - c. Perawat menggunakan pengetahuannya untuk membantu anak mencapai keadaan fisik dan emosional yang optimal
 - d. Perawat dapat terlibat dalam pendidikan, perubahan politik/legislatif, rehabilitasi, screening dan administrasi
2. Prevention/fasilitator
 - a. Perawat yang terlibat dalam perawatan oleh karena harus dapat menjalankan praktek dalam berbagai dimensi pencegahan.
 - b. Merencanakan perawatan dalam berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan (nutrisi, imunisasi, keamanan, perawatan gigi, sosialisasi, dan disiplin sekolah)
 - c. Pendekatan yang paling baik adalah pendidikan dan anticipatory guidance.
 - d. Membimbing orang tua untuk mencegah kemungkinan adanya masalah.
 3. Health Teaching.
 - a. Tidak dapat dipisahkan dengan family advocacy dan prevention dan dapat dilakukan di tiap tatanan pelayanan kesehatan
 - b. Menyarankan orang tua untuk memberikan kesempatan pada anak untuk merawat dirinya sendiri dan meningkatkan rasa harga diri dan kerja sama anak.
 - c. Perawat sebagai Role model bagi orang tua dan anak bagaimana merawat anak dan pengaruh kebiasaan hidup sehari-hari terhadap kesehatan anak.
 4. Support / Counseling
 - a. Support dapat dengan cara bermacam-macam, misalnya dengan mendengarkan, sentuhan, kehadiran fisik, dan hal ini dapat menolong anak untuk mengadakan non verbal.
 - b. Konseling bertukar pendapat untuk mengatasi masalah yang menjadi landasan konseling.
 5. Therapeutik Role
 - a. Bertugas untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak, termasuk makan, minum, mandi, BAB/BAK, berpakaian, dan keamanan sosialisasi.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pengobatan yang telah dirumuskan dokter dan terhadap tindakannya atau keputusannya.
 - c. Aspek yang penting adalah pengkajian terus menerus dan mengevaluasi status fisik.
 - d. Pengawasan terhadap kebutuhan klien dan perkembangan secara individu yang dapat mempengaruhi proses penyakit.

6. Koordinasi / Kolaborasi
 - a. Perawat sebagai anggota tim kesehatan bekerja sama dan mengkoordinasi pelayanan keperawatan dengan kegiatan yang dilakukan tenaga kesehatan lainnya.
 - b. Pendekatan inter disiplin memungkinkan Asuhan Holistik dengan saling melengkapi
 - c. Perawat bekerjasama dengan anak dan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan
 - d. Perawat mempunyai posisi penting untuk mengikutsertakan klien secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengkomunikasikan pendapatnya ke tim kesehatan lainnya.
7. Health Care Planning
 - a. Perawat tidak hanya berfokus pada keluarga inti saja, tetapi juga berperan dalam masyarakat yang lebih luas.
 - b. Harus tahu kebutuhan masyarakat secara aktif terlibat dalam memelihara kesejahteraan
 - c. Perawat meningkatkan kualitas pelayanan dan menjalankan asuhan sesuai dengan kode etik dan standar praktek


E. Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan Anak


Unsur Lingkungan dibagi dalam dua bagian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan Internal meliputi; genetika, struktur fungsi tubuh, psikologis, dan internal spiritual. Lingkungan eksternal, yaitu lingkungan disekitar manusia baik fisik, biologis, sosial, kultural dan spiritual.

Lingkungan internal maupun eksternal akan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia termasuk persepsinya terhadap sehat dan sakit. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hubungan yang dinamis dengan lingkungannya serta tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tersebut.

1. Genetika

Adapun yang dimaksud dengan genetika adalah lingkungan dalam diri manusia yang mempengaruhi unsur-unsur sifat dan struktur fungsi tubuh. Untuk menjaga keutuhan dan kesempurnaan struktur fungsi tubuh. Islam mengajarkan bahwa memelihara lingkungan internal genetika itu harus diawali sejak proses reproduksi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4] : 19





Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

[278] Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

[279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

Rasulullah SAW bersabda: *pilihlah tempat persemaian benihmu dari mereka yang baik karena pada keturunan itu akan mengendap sifat orangtuanya.* (HR. Ibnu Majah)

2. Struktur dan fungsi Tubuh

Struktur dan fungsi tubuh manusia merupakan lingkungan berada dalam diri manusia, di dalamnya berisi tulang-belulang, daging, dan darah. Itu semua harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun [23]: 12-16.




12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik.
15. Kemudian, sesudah itu, Sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.
16. Kemudian, Sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.

melaksanakan profesi keperawatan. Untuk menciptakan lingkungan internal spiritual maka seorang perawat memiliki karakter:

a. Senantiasa menjaga kesucian hatinya

Allah berfirman:



9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,

10. dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

b. Jujur

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan (taat) dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang membiasakan dirinya berkata benar hingga tercatat di sisi Allah siddiq. Dan dusta membawa kepada keburukan sedangkan keburukan membawa ke neraka. Dan seseorang suka berdusta hingga tercatat di sisi Allah pendusta (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


c. Tawadu


Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang bersikap tawadu' karena Allah, niscaya Allah mengangkat dan saling. (HR. Abu Na'im).

Adapun yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri manusia yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan profesi keperawatan, di dalamnya terdiri dari unsur biologis, fisik, sosial dan spiritual.

Lingkungan sosial adalah lingkungan eksternal yang memungkinkan terjadinya interaksi sesama manusia sehingga terbentuk tatanan masyarakat yang dinamis. Dengan adanya interaksi tersebut maka akan terjadi penularan penyakit antarasesama, terbentuknya pola hidup akibat perilaku yang saling mempengaruhi dan timbulnya nilai-nilai tentang kesehatan yang dianut oleh masyarakat.

Lingkungan sosial sangat mempengaruhi karakter ataupun perilaku hidup sehat untuk itu perlu diciptakan hubungan antarmanusia yang sehat dan saling nasehat-menasehati dalam kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4]: 1





Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

1. Disiplin

- a. Mengajar untuk mengikuti ajaran dari seseorang pemimpin, mendidik anak berbuat seoptimal mungkin sesuai potensi yang dimiliki.
- b. Tujuannya adalah :
 - 1) Jangka Pendek : Membuat anak terlatih dan terkontrol melalui ajaran yang pantas dan tidak pantas.
 - 2) Jangka Panjang : Untuk perkembangan pengendalian diri sendiri dan pengarahan diri sendiri. (Self Control dan self direction).
- c. Penyebab Indisiplin pada Anak Adalah :
 - 1) Orang tua selalu merasa bersalah
 - 2) Orang tua selalu ragu-ragu
 - 3) Orang tua yang memberi hukuman dan hukuman itu ditarik kembali.
- d. Upaya Mendisiplinkan Anak :
 - 1) Tegak dan tetap ramah
 - 2) Membiarkan masuk kedalam air dan bermain-main disana, menjerit dan berteriak waktu sedang aktif, lantai yang kotor kala anak sedang bermain.
 - 3) Beri kesempatan pada anak bahwa rasa marah itu normal
 - 4) Jangan selalu mengatakan ” Apakah kamu ingin! ”
 - 5) Jangan terlalu banyak memberi alasan (Usia 1- 3 tahun)

- 6) Perlukah menghukum anak
- 7) Hukuman bukan satu-satunya cara untuk menegakkan disiplin.
- 8) Sumber utama menegakkan disiplin untuk lingkungan keluarga rukun.
- 9) Tiga kawasan disiplin :
 - a) Daerah Hijau : Mencakup tingkah laku yang diperbolehkan atau diinginkan
 - b) Daerah Kuning: Tingkah laku tidak ideal tapi alasan tertentu kita tolerir
 - c) Daerah Merah : Tingkah laku yang tidak diijinkan.

2. Keamanan

Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam dunia yang kompleks, anak mengalami bermacam-macam ancaman terhadap rasa aman.

Faktor yang membentuk perasaan yang tidak aman :

- a. Rasa Iri pada saudara kandung
- b. Pindah tempat tinggal
- c. Penyangkalan pada diri sendiri atau pada anggota keluarga yang lain
- d. Perceraian orang tua
- e. Pada bayi terganggu ancaman fisik seperti lapar, dingin dan tidak nyaman.
- f. Pada anak kecil terjadi gangguan psikologis seperti marah dan sedih.
- g. Penolakan oleh orang yang dianggap penting.
- h. Tindakan Asosial

3. Cinta dan Kasih sayang

Cinta dan kasih sayang merupakan salah satu kebutuhan psikis yang harus terpenuhi dalam rangka anak tumbuh dan berkembang secara normal.

Tujuan Cinta dan kasih sayang adalah mendapatkan anak yang sehat baik fisik maupun mental dan membina ikatan emosional antara orang tua dan anak.

Sentuhan fisik pada anak sejak kecil (bayi) meliputi : Tingkahlaku, pelukan, belaian, ciuman. Dan di alam modern yang serba sibuk untuk hal tersebut tidak ada waktu. Lingkupan rasa cinta dan kasih sayang:

- a. Anak dapat diterima sebagaimana adanya
- b. Kebutuhan cinta kasih sayang sama besarnya dengan kebutuhan fisik akan makanan
- c. Harus dipenuhi sejak kecil sehingga anak dapat memberi cinta dan kasih sayang terhadap sesamanya
- d. Cinta dan kasih sayang ibarat fundamen pendidikan secara keseluruhan
- e. Cara ungkapan cinta harus terbuka
- f. Cara lain memperlihatkan contoh yang baik di orang tua

- g. Hubungan cinta kasih antara ibu dan anak
- h. Arti sentuhan fisik bagi anak.
- i. Komunikasi orang tua dan anak

4. Pengaruh Lingkungan Terhadap Kesehatan Anak

Anak adalah sosok individu yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari biopsiko sosial kultural adalah bagian dari keluarga dan masyarakat serta merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa.

Proses Tumbuh Kembang anak merupakan hasil interaksi antara :

- a. Nature (biologis serta bawaan anak)
- b. Nurture (Lingkungan)

Oleh karena itu anak memerlukan perlakuan yang sesuai dengan tahapannya dari orang tua/lingkungannya, sehingga setiap tahapan perkembangan pada anak itu terselesaikan dengan baik. Kebutuhan fisik, sosial dan emosional dari anak perlu disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Serta mempertimbangkan latar belakang budaya dan keluarga. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan anak, yakni :

- a. Faktor dari anak itu sendiri
- b. Faktor lingkungan yang berperan

5. Pola Asuh

Pola Asuh adalah cara orang tua mendidik dan membesarkan anak dalam keluarga baik itu orang tua sendiri atau orang yang mengasuh anak. Mendidik anak di jaman yang serba kompleks ini, memang gampang-gampang susah.

Ditangani dengan tangan besi, bisa-bisa ngambek. Jika serba boleh, anak jadi manja dan semau gue sehingga diperlukan pola asuh yang tepat. Faktor yang mempengaruhi Pola Asuh:

- a. Faktor Budaya
- b. Faktor Agama
- c. Faktor Kebiasaan dan kepercayaan
- d. Faktor Kepribadian Orang Tua
- e. Faktor pola Asuh

Pada umumnya bila orang tua sewaktu kecil dididik secara keras dan berdisiplin maka ia pun akan mendidik anaknya dengan cara yang demikian pula. Ada juga orang tua yang mendidik anaknya dengan cara yang sama sekali berbeda dengan pola didikan yang diperolehnya semasa kecil. Orang Tua seperti ini biasanya banyak mengalami kekecewaan dan trauma psikis akibat didikan yang terlalu keras. Terdapat Tiga Tipologi Pola Asuh Baku yaitu :

- a. Pola Asuh Otoriter
 - 1) Pola Asuh Yang dicirikan dengan kendali terhadap anak mutlak di tangan orang Tua.
 - 2) Komunikasi satu arah dari orang Tua ke anak.
 - 3) Orang Tua sangat menanamkan disiplin dan menuntut prestasi tinggi pada anaknya.

- 4) Orang Tua tidak memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pendapat.
- b. Pola Asuh Otoritatif (Demokratis)
- 1) Pola asuh yang bercirikan dengan komunikasi timbal balik
 - 2) Orang tua berupaya memberdayakan anak maka kontrol secara berangsur-angsur berpindah ketangan anak.
 - 3) Menuntut prestasi tinggi tapi dibarengi sikap demokratis dan kasih sayang yang tinggi.
 - 4) Pola Asuh model ini kuat dalam kontrol dan pengawasan,tetapi tetap memberi tempat bagi pendapat anak.
- c. Pola Asuh Permisif
- 1) Pola Asuh yang memberikan kebebasan mutlak dan kendali ada ditangan anak.
 - 2) Komunikasi bersifat dua arah,namun dialog yang ada tidak bersifat memberdayakan.
 - 3) Orang tua bersikap demokratis dan penuh kasih sayang,tapi disisi lain kendali orang tua dan tuntutan berprestasi terhadap anak rendah.
 - 4) Anak dibiarkan berbuat sesukanya tanpa beban kewajiban atau target apapun.

Meskipun pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang ideal diterapkan dalam keluarga,namun hal ini masih sulit menerapkannya secara komprehensif pada bayi atau batitah yang belum dapat diajak berdialog. Tetapi segera setelah anak bisa berbicara,sekitar usia 5 tahun keatas,maka perbedaan penerapan pola asuh diantara 3 tipologi betul-betul dapat dilakukan. Komponen yang harus diperhatikan dalam menerapkan pola Asuh:

- a. Kontrol atau kendali
- b. Motivasi.

Jika orang tua otoriter,selalu tidak akan ada komunikasi dan sebaliknya jika demokratis maka akan ada banyak dialog. Jika permisif,meskipun jumlah komunikasi jauh lebih banyak daripada otoriter,tapi sifatnya tidak memberdayakan.

Pola Asuh bukanlah satu-satunya unsur penting dalam membesarkan anak.tetapi pola asuh merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. Pola Asuh sangat jarang diterapkan secara ekstrem (selalu ada kombinasi dan variasi),sehingga masih bisa ditanggulangi jika ada kekeliruan dalam penerapannya. Pola Asuh Yang dikatakan terbaik bagi anak adalah yang diberikan :

- a. Dalam Satu rumah
- b. Dengan Satu orang yang berperan sebagai Ibu
- c. Dalam suatu keluarga utuh yang terdiri dari ayah dan ibu
- d. Ada kesinambungan pendidikan anak,dalam suasana yang damai dilandasi kasih sayang dan penerimaan.

Yang penting dalam penerapan pola Asuh adalah suasana damai dan kasih sayang dalam keluarga,hal ini bisa nyata dalam didikan anak dikeluarga besar,dimana anak dapat tumbuh dengan kepribadian yang baik. Untuk bisa menerapkan pola asuh,Idealnya orang tua memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Pola Asuh membutuhkan penalaran tertentu,tidak bisa asal larang.

6. Toilet training

Perkembangan otonomi terikat dengan kematangan dari banyak keterampilan fisik dan sosial. Untuk toilet training lebih mengutamakan peran serta orang tua dalam membantu anak untuk meningkatkan kemampuan dan percaya diri dalam mengatasi masalah eliminasi. Kebutuhan toilet training juga disesuaikan dengan proses tumbuh kembang anak.

Bayi baru lahir,buang air dengan kerja diluar kemauan. Anak seusia ini belum dapat mengontrol spingternya,sehingga kita harus menyadari bahwa ini adalah fisiologi. Tiap Ibu dengan sendirinya mengharapkan akan datang waktunya bila anknya sudah dapat BAB/BAK tanpa ditolong lagi. Pendidikan tentang cara buang air adalah suatu hal yang tidak perlu diberikan secepatnya.

Jadi bayi harus dibersihkan,dikeringkan dan diganti popoknya setelah setiap berkemih dan defekasi sambil mensosialisasikan anak terhadap lingkungannya dan memberikan pengertian perintah sederhana tanpa memberikan komentar yang negatif

Anak seusia toddler dan anak pra sekolah dapat mengontrol spinternya,tapi tidak menuntut kemungkinan bahwa anak ini kadang masih ngompol,apalagi pada saat terdesak. Jadi kita melatihnya mempergunakan pispot,sehingga melalui pantatnya merasakan lingkaran pot dan dia bisa BAB/BAK. Anak harus diperlihatkan bagaimana mengelap diri mereka setelah menggunakan toilet,bagaimana mencuci tangan dan mengeringkan tangan mereka. Yang perlu diperhatikan yaitu sikap optimis dan sikap mendorong dari kedua orang tua.

Berbeda dengan anak usia sekolah dan remaja Pada usia ini, Anak harus telah terlatih Buang Air,tetapi pengawasan dari orang yang lebih tua sebaiknya tetap diberikan. Hendaknya pendidikan dalam cara buang air mejadi sesuatu yang mengembirakan

7. Preventive terhadap injury dari neonatus sampai remaja

Kematian dan cacat akibat kecelakaan pada anak adalah karena kecelakaan kendaraan bermotor,tenggela,terbakar api, listrik,benda tajam, dan air panas.

Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan karena orang tua yang memulai untuk pencegahan kecelakaan tersebut.

Sebaiknya orang tua secara bertahap mengajarkan pada anak sedikit demi sedikit pengetahuan, keterampilan, peringatan serta pengertian umum dalam hal keamanan.

Dengan bertambahnya Usia anak, orang tua harus benar-benar dapat membimbing dan mengarahkan anak sehingga kecelakaan dapat dihindari sekecil mungkin, sehingga pendidikan yang diberikan sejak dini akan berpengaruh sampai anak menjadi remaja.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan I dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Buat rumusan tentang filosofi keperawatan anak !
2. Buat rumusan tentang keperawatan anak dalam konteks keluarga!
3. Buat uraian tentang prinsip perawatan anak !

Rangkuman

1. Filosofi keperawatan anak merupakan pandangan yang dimiliki perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada anak yang berfokus pada keluarga (family centered care), pencegahan terhadap trauma (atraumatic care), dan manajemen kasus.
2. Keperawatan anak dalam konteks keluarga memandang anak sebagai manusia seutuhnya.
3. Prinsip perawatan anak meliputi hubungan antara perawat dengan anak dan perawat dengan keluarga, perawat bertanggung jawab secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga, serta memiliki keterampilan secara profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas.
4. Fungsi perawatan anak meliputi : family advocacy (pembelaan), prevention/fasilitator, health teaching, support/conseling, therapeutik role, koordinasi/kolaborasi, dan health care planing.
5. Lingkungan yang mempengaruhi kesehatan anak meliputi : disiplin, keamanan, cinta dan kasih sayang, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan anak, pola asuh, toilet training, dan preventive terhadap injury dari neonatus sampai remaja.

Tes Formatif

1. Bagaimanakah filosofi keperawatan anak ?
2. Jelaskan pengertian anak sebagai manusia seutuhnya?
3. Jelaskan fungsi perawatan anak sebagai health care planning !

Kunci Jawaban Tes Formatif

1. Filosofi keperawatan anak merupakan keyakinan atau pandangan yang dimiliki perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada anak yang berfokus pada keluarga (family centered care), pencegahan terhadap trauma (atraumatic care), dan manajemen kasus.
2. Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan mulai dari bayi hingga remaja, Anak

merupakan anggota unit keluarga dalam suatu kultur dan masyarakat.

3. Fungsi perawatan anak sebagai health care planning :
 - a. Perawat tidak hanya berfokus pada keluarga inti saja, tetapi juga berperan dalam masyarakat yang lebih luas.
 - b. Harus tahu kebutuhan masyarakat secara aktif terlibat dalam memelihara kesejahteraan
 - c. Perawat meningkatkan kualitas pelayanan dan menjalankan asuhan sesuai dengan kode etik dan standar praktek

BAB II KOMUNIKASI PADA ANAK

SATUAN BAHASAN 2 :

PENGERTIAN KOMUNIKASI, PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI , KOMUNIKASI PADA ANAK SESUAI TUMBUH KEMBANG , TEKNIK BERKOMUNIKASI PADA ANAK, PENDEKATAN UMUM PADA ANAK SEBELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN, PENGARUH SOSIOKULTURAL PADA ANAK.

a. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian komunikasi, bagaimana prinsip-prinsip dalam berkomunikasi, komunikasi pada anak sesuai tumbuh kembangnya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada anak sebelum dilakukan pemeriksaan serta pengaruh sosiokultural pada anak.

Mengenai pengertian komunikasi, dikemukakan pengertian komunikasi menurut Depkes RI. Dalam membahas mengenai prinsip-prinsip komunikasi dikemukakan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang perawat dalam melakukan komunikasi dengan pasien maupun orang lain.

Dalam bahasan komunikasi pada anak, dikemukakan komunikasi-komunikasi yang dapat dilakukan seorang anak, sesuai tumbuh kembangnya, mulai dari masa bayi, usia 1-3 tahun, usia 4-5 tahun, usia kurang dari 5 tahun, sampai anak usia sekolah.

Mengenai teknik berkomunikasi akan dibahas mengenai teknik-teknik yang dilakukan ketika hendak berkomunikasi dengan anak-anak agar komunikasi yang dilakukan efektif. Selain hal itu dalam bab ini juga dibahas mengenai pendekatan yang dilakukan pada anak sebelum dilakukan pemeriksaan, serta pengaruh sosiokultural pada kesehatan anak.

b. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai pengertian komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi , komunikasi pada anak sesuai tumbuh kembang , teknik berkomunikasi pada anak, pendekatan umum pada anak sebelum dilakukan pemeriksaan, pengaruh sosiokultural pada anak, Kemudian buat intisari/ringkasan mengenai hal-hal yang penting dalam pembahasan tersebut. Selanjutnya fahami dengan baik intisari/ringkasan yang telah dibuat.

c. Tujuan Pembelajaran


1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip-prinsip komunikasi.
2. Mahasiswa dapat memahami komunikasi pada anak sesuai tumbuh kembangnya.
3. Mahasiswa dapat mengetahui teknik berkomunikasi dengan anak.

4. Mahasiswa dapat memahami pendekatan umum yang dilakukan pada anak sebelum dilakukan pemeriksaan.
5. Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh sosiokultural pada anak.

PENGERTIAN KOMUNIKASI, PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI , KOMUNIKASI PADA ANAK SESUAI TUMBUH KEMBANG , TEKNIK BERKOMUNIKASI PADA ANAK, PENDEKATAN UMUM PADA ANAK SEBELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN, PENGARUH SOSIOKULTURAL PADA ANAK.

Dalam Al-Qur'an kata komunikasi secara tekstual tidak dijumpai, tetapi ayat-ayat yang mengisyaratkan komunikasi, baik yang sifatnya pemberian informasi, percakapan berita dan lain-lain banyak dijumpai dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada empat kata kunci dalam Al-Qur'an yang bisa dianalisa berkenaan dengan komunikasi. Keempat kata tersebut adalah *al-Bayan, al-Taa'ruf, al-naba, dan al-Qaul*.

Kata *al-Bayan* dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 2 kali, dalam bentuk nakirah dan ma'rifah. Dalam bentuk nakirah Allah SWT, menyebutkan dalam Qs. Ali Imran [3]: 138.





Artinya:

(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Syaukani memberi penjelasan tentang arti al-bayan adalah kemampuan berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial selalu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian, dia memerlukan masyarakat sekitarnya berkomunikasi dan berinteraksi.

Kata *Ta'aruf* dalam Al-Qur'an terdapat dua bentuk dalam bentuk jamak taksir dan jamak muzakkar salim. Kata ta'ruf dalam bentuk jamak taksir terdapat dalam Qs Al-Hujurat[49]: 13.





Artinya:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam berkomunikasi, seorang komunikator dalam menyampaikan pesannya senantiasa memperhatikan tatakrama dan bahasa-bahasa yang menyejukkan hati audiencenya. Kata kata yang menyejukkan hati akan memberikan ketenangan dan kesejukan bagi para pendengarnya.

1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau ide diantara dua orang atau lebih menurut cara tertentu dengan harapan

timbul suatu pengertian bersama tentang arti, maksud dan kegunaan pesan sehingga menghasilkan respons yang diharapkan (Depkes RI, 1987).

Komunikasi adalah proses dimana informasi disampaikan kepada orang lain melalui simbol-simbol, tanda-tanda atau tingkah laku.

2. Prinsip-prinsip Komunikasi

Prinsip komunikasi terapeutik menurut Carl Rogers adalah

1. Perawat harus mengenal dirinya sendiri yang berarti menghayati, memahami dirinya sendiri serta menilai yang dianut.
2. Komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya dan saling menghargai.
3. Perawat harus memahami, menghayati nilai yang dianut oleh pasien.
4. Perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien baik fisik maupun mental.
5. Perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan agar pasien bebas dan berkembang tanpa rasa takut.
6. Perawat harus mampu menguasai perasaan sendiri secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan maupun frustrasi.
7. Mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya.
8. Memahami betul arti empati sebagai tindakan terapeutik.
9. Kejujuran dan komunikasi terbuka merupakan dasar dari hubungan terapeutik.
10. Mampu berperan sebagai role model agar dapat menunjukkan dan menyalahkan orang lain tentang kesehatan.
11. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, tindakan keperawatan yang dilakukan maupun terhadap pasien.

C. Komunikasi pada Anak Sesuai dengan Tumbuh Kembang

1. Masa Bayi

Pada masa bayi belum dapat menggunakan kata-kata lebih banyak komunikasi secara nonverbal. Mengungkapkan kebutuhan dengan tingkah laku dan bersuara yang dapat diinterpretasikan oleh orang di sekitarnya.

2. Anak Usia 1 – 3 Tahun.

Pada usia ini anak dapat berbicara namun belum jelas, sudah dapat menggunakan bahasa untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya sehingga dapat diinterpretasikan oleh orang disekitarnya, banyak menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal, mengatakan dan menerima kata “tidak” dan “ya”.

3. Anak Usia 4 – 5 Tahun.

Dapat berkomunikasi secara verbal, dapat mengembangkan ingatan, dapat pergi dan kembali dalam hal waktu dan tempat. Mulai belajar peran, selalau bersikap bersaing.

4. Anak Usia Kurang dari 5 Tahun.

- a. Sangat egosentris, hanya melihat sesuatu berpusat pada dirinya (komunikasi berpusat pada dirinya).
- b. Takut terhadap ketidaktahuan. Beritahu apa yang akan terjadi pada dirinya, bagaimana mereka harus merasakannya.
- c. Belum fasih berbicara.
- d. Pandangan mata sejajar, Jongkok, duduk di kursi kecil, berlutut.

5. Anak Usia Sekolah

- a. Anak Usia 5 – 8 Tahun
 1. Bila menemui masalah hanya percaya terhadap apa yang mereka lihat dan mereka ketahui tanpa memerlukan penjelasan secara mendalam. Anak tertarik pada aspek fungsional dari semua prosedur, obyek dan aktivitas. Mengapa, bagaimana, untuk apa prosedur tersebut dilakukan dan untuk apa (jelaskan).
 2. Sangat memperhatikan kebutuhan tubuhnya oleh karena itu mereka peka terhadap sesuatu yang mengancam atau menyakiti tubuhnya
- b. Anak Usia 8 – 12 Tahun
 1. Mempunyai pola pikir dan tingkah laku yang merupakan perhatian anak-anak menjadi dewasa.
 2. Bila stres, diskusi tentang masalahnya dengan teman sejawatnya, orang dewasa di luar keluarga, terbuka pada perawat.
 3. Menolak orang yang berusaha menjatuhkan harga dirinya.
 1. Beri Support penuh perhatian
 2. Jangan melakukan interupsi
 3. Ekspresi wajah tidak menunjukkan heran
 4. Hindari pertanyaan yang menimbulkan rasa malu.
 4. Waktu wawancara anak dan orang tua diikutsertakan, bila ada dilema, yaitu masalah anak-orang tua, maka perawat penting mengklarifikasi masalahnya.

D. Teknik Berkomunikasi dengan Anak

- a. Melalui orang ketiga, tidak langsung bertanya pada anak.
- b. Bercerita, bahasa mudah dimengerti, teknik menarik, perhatikan gambar.
- c. Biblioterapi ; buku/majalah : Membantu anak mengekspresikan perasaan dan melakukan aktivitas sesuai dengan cerita dalam buku.
- d. Menyebutkan keinginan : Dengan cara ini perawat dapat mengetahui apa yang menjadi keluhan anak.
- e. Rating Scale khususnya untuk usia sekolah, digunakan untuk mengkaji rasa sakit, sedih dan gembira.
6. Pro dan Kontra : Ajukan satu situasi, misalnya : Situasi rumah sakit lalu diminta untuk menulis lima hal yang baik dan lima hal yang buruk.

7. Menulis : Pada anak yang tidak dapat mengungkapkan perasaan secara verbal, anjurkan menulis dan diskusikan.
8. Menggambar ; sangat berarti untuk proyeksi kepribadian secara spontan.
- 9 Bermain
 - a. Sangat efektif
 - b. Dapat diketahui perkembangan : fisik / intelektual / sosial
 - c. Dapat menjalin hubungan interpersonal dengan teman dan petugas, misalnya :
 - 1) Bayi : Cilukba
 - 2) Toddler : Boneka tangan
 - 3) Anak lebih besar: (bermain ular tangga, main tamu tamu) : untuk menganjurkan anak mau makan dan minum.

E. Pendekatan Umum pada Anak Sebelum Dilakukan Pemeriksaan

- a. Bicara dengan orang tua sambil tidak memperdulikan anak, lambat laun terpusat atau sesuatu yang diinginkan, misalnya boneka / mainan.
- b. Buat penilaian yang cocok atau pujian tentang pakaian dan penampilan.
- c. Ceritakan sesuatu yang lucu atau permainan yang simpel.
- d. Gunakan mainan yang tidak menakutkan, misalnya boneka tangan untuk berbicara dengan perawat.
- e. Jika memungkinkan beri pilihan apakah anak lebih senang diperiksa di atas meja atau dipangkuan ibunya.
- f. Memulai pemeriksaan yang dapat dikerjakan sambil bermain yang terakhir baru dilakukan pemeriksaan yang menakutkan.

F. Pengaruh Sosiokultural terhadap Kesehatan Anak

Pengaruh sosiokultural terhadap kesehatan anak dapat ditinjau dari beberapa faktor, yaitu :

1. Agama

Ada suatu agama atau kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat yang memandang suatu penyakit sebagai suatu hukuman atau kutukan dari tuhan, sehingga penyakit dibiarkan saja tanpa dilakukan pengobatan dan perawatan.
2. Keyakinan dan praktek kesehatan

Keyakinan yang keliru terhadap suatu penyakit berakibat pada tingkah laku pencarian pelayanan kesehatan, contoh : keyakinan bahwa anak diare karena giginya akan tumbuh.
3. Bahasa dan Komunikasi

Cara seseorang dalam mengutarakan sakitnya dan apa yang diperlukan untuk mengatasi penyakitnya berbeda-beda dan sangat tergantung pada latar belakang kebudayaan. Contoh : bangsa Yahudi, Itali memberikan respon terhadap sakit dengan cara yang emosional dan berlebih-lebihan. Sedang orang Amerika dan Irlandia

tidak pernah mengeluh sakit. Kebudayaan Yahudi dan Italia membenarkan seseorang untuk menyatakan perasaan sakitnya secara bebas dengan kata-kata, suara, gerakan-gerakan sehingga mereka bebas untuk mengeluh terhadap penyakitnya dan mewujudkannya dengan cara menangis berteriak, dll. Sebaliknya orang Amerika selalu menutupi perasaan sakitnya, buat mereka berteriak/menangis tidak akan menolong si sakit.

4. Praktek Parenting

Perbedaan perlakuan antara anak yang diharapkan dengan anak yang tidak diharapkan, contoh: seorang ibu yang mengharapkan anak laki-laki akan memberikan perlakuan dengan lebih baik jika anaknya laki-laki.

Budaya yang memperlakukan anak perempuan lebih baik dari pada anak laki-laki.

Pengaruh anggota keluarga dalam membesarkan anak. Contoh : para nenek biasanya berpengaruh dalam membesarkan anak, memberikan petunjuk yang bertentangan dengan tenaga kesehatan, misalnya dalam pengobatan perawatan.

5. Diet

Budaya yang memberikan batasan atau larangan konsumsi makanan tertentu sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya suatu jenis nutrisi atau terbatasnya bahan nutrisi. Contoh : umumnya orang india tidak makan daging sapi karena menganggap sapi adalah nenek moyang mereka.

Pola pemberian makanan yang keliru dalam suatu masyarakat, contoh: pemberian bubur pada bayi pada usia sebelum 4 bulan.

6. Nilai Keluarga

Tanggung jawab membesarkan anak atau memberikan perawatan pada anak

Pendidikan kesehatan pada anak dalam keluarga

Kondisi financial keluarga. Keluarga yang mengalami stress ekonomi akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak baik nutrisi maupun kasih sayang karena waktu yang habis untuk kesibukan diluar.

L a t i h a n

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan II dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Buat rumusan tentang pengertian dan prinsip-prinsip komunikasi !
2. Buat uraian mengenai komunikasi pada tiap tahapan tumbuh kembang.
3. Buat uraian tentang teknik berkomunikasi dengan anak !
4. Buat rumusan tentang factor sosiokultural yang mempengaruhi kesehatan anak.

R a n g k u m a n

1. Komunikasi adalah proses dimana informasi disampaikan kepada orang lain melalui simbol-simbol, tanda-tanda atau tingkah laku.
2. Komunikasi pada anak harus disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang anak.
3. Teknik berkomunikasi pada anak yaitu melalui orang ketiga/orang lain, bercerita, biblioterapi, menulis, rating scale, pro kontra, serta bermain.

Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian komunikasi !
2. Jelaskan prinsip-prinsip komunikasi !
3. Jelaskan perbedaan komunikasi pada setiap tahapan tumbuh kembang anak !
4. Bagaimana teknik berkomunikasi dengan anak ?
5. Bagaimana pendekatan yang dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan pada anak ?
6. Sebutkan factor-faktor sosiokultural yang mempengaruhi kesehatan anak.

Kunci Jawaban

1. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau ide diantara dua orang atau lebih menurut cara tertentu dengan harapan timbul suatu pengertian bersama tentang arti, maksud dan kegunaan pesan sehingga menghasilkan respons yang diharapkan
2. Prinsip-prinsip komunikasi :
Prinsip komunikasi terapeutik menurut Carl Rogers adalah Perawat harus mengenal dirinya sendiri. Komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, salingpercaya dan saling menghargai. Perawat harus memahami nilai yang dianut pasien Perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien baik fisik maupun mental .Perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan agar pasien bebas dan berkembang tanpa rasa takut.. Perawat harus mampu menguasai perasaan sendiri secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan maupun frustrasi.
3. Perbedaan komunikasi pada tiap tahapan perkembangan
 - a. Masa bayi, lebih banyak komunikasi nonverbal
 - b. Anak Usia 1 – 3 Tahun,banyak menggunakan komunikasi verbal (namun belum jelas) dan nonverbal, mengatakan dan menerima kata “tidak dan “ya”.
 - c. Anak Usia 4 – 5 Tahun.
Dapat berkomunikasi secara verbal, dapat mengembangkan ingatan, dapat pergi dan kembali dalam hal waktu dan tempat.
 - d. Anak Usia Kurang dari 5 Tahun,sangat egosentris, takut

- terhadap ketidaktahuan, belum fasih berbicara.
- e. Anak Usia Sekolah
 Anak Usia 5 – 8 Tahun. Bila menemui masalah hanya percaya terhadap apa yang mereka lihat dan mereka ketahui tanpa memerlukan penjelasan secara mendalam. Sangat memperhatikan kebutuhan tubuhnya.
4. Teknik berkomunikasi dengan anak
 - a. Melalui orang ketiga, tidak langsung bertanya pada anak.
 - b. Bercerita, bahasa mudah dimengerti, teknik menarik, perlihatkan gambar.
 - c. Biblioterapi ; buku/majalah : Membantu anak mengekspresikan perasaan dan melakukan aktivitas sesuai dengan cerita dalam buku.
 - d. Menyebutkan keinginan : Dengan cara ini perawat dapat mengetahui apa yang menjadi keluhan anak.
 - e. Rating Scale khususnya untuk usia sekolah, digunakan untuk mengkaji rasa sakit, sedih dan gembira.
 - f. Pro dan Kontra : Ajukan satu situasi, misalnya : Situasi rumah sakit lalu diminta untuk menulis lima hal yang baik dan lima hal yang buruk.
 - g. Menulis : Pada anak yang tidak dapat mengungkapkan perasaan secara verbal, anjurkan menulis dan diskusikan.
 - h. Menggambar ; sangat berarti untuk proyeksi kepribadian secara spontan.
 - i. Bermain
 - a. Sangat efektif
 - b. Dapat diketahui perkembangan : fisik / intelektual / sosial
 - c. Dapat menjalin hubungan interpersonal dengan teman dan petugas, misalnya :
 - 1) Bayi : Cilukba
 - 2) Toddler : Boneka tangan
 - 3) Anak lebih besar: (bermain ular tangga, main tamu tamu) : untuk menganjurkan anak mau makan dan minum.
 5. Pendekatan yang dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan pada anak.
 - a. Bicara dengan orang tua sambil tidak memperdulikan anak, lambat laun terpusat atau sesuatu yang diinginkan, misalnya boneka / mainan.
 - b. Buat penilaian yang cocok atau pujian tentang pakaian dan penampilan.
 - c. Ceritakan sesuatu yang lucu atau permainan yang simpel.
 - d. Gunakan mainan yang tidak menakutkan, misalnya boneka tangan untuk berbicara dengan perawat.
 - e. Jika memungkinkan beri pilihan apakah anak lebih senang diperiksa di atas meja atau dipangkuan ibunya.

- f. Memulai pemeriksaan yang dapat dikerjakan sambil bermain yang terakhir baru dilakukan pemeriksaan yang menakutkan.
- 6. Faktor sosiokultural yang mempengaruhi kesehatan anak yaitu: Agama, bahasa dan komunikasi, praktek parenting, keyakinan dan praktek kesehatan, diet dan nilai keluarga .

BAB III

KONSEP TUMBUH KEMBANG ANAK

SATUAN BAHASAN 3:

TINJAUAN UMUM TUMBUH KEMBANG, TEORI PERKEMBANGAN, FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUH KEMBANG, KONSEP PSIKONEUROIMUNOLOGI, BERMAIN, CIRI-CIRI TUMBUH KEMBANG ANAK, PERKEMBANGAN ANAK BALITA.

A. Gambaran singkat mengenai materi kuliah

Materi kuliah ini membahas mengenai tinjauan umum tumbuh kembang, teori perkembangan, faktor faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, konsep psikoneuroimunologi, bermain, ciri-ciri tumbuh kembang anak, perkembangan anak balita.

Dalam pembahasan mengenai tinjauan umum tumbuh kembang dijelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan teori perkembangan antara lain Freud, Piaget, Erikson, dan Kohlberg.

B. Pedoman mempelajari materi

Baca dengan baik uraian mengenai tinjauan umum tumbuh kembang, teori perkembangan, faktor faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, konsep psikoneuroimunologi, bermain, ciri-ciri tumbuh kembang anak, perkembangan anak balita kemudian buatlah intisari/ringkasan dari tiap uraian diatas. Fahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.

C. Tujuan pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta perbedaannya.
2. Mahasiswa dapat membuat uraian sendiri mengenai pendapat tentang teori perkembangan.
3. Mahasiswa dapat membuat uraian sendiri mengenai factor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep psikoneuroimunologi
5. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep bermain pada anak.
6. Mahasiswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuh kembang anak
7. Mahasiswa dapat menjelaskan tahap perkembangan anak balita.
8. Mahasiswa memahami manfaat pengetahuan tentang konsep tumbuh kembang anak.

TINJAUAN UMUM TUMBUH KEMBANG, TEORI PERKEMBANGAN, FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUH KEMBANG, KONSEP PSIKONEUROIMUNOLOGI, BERMAIN, CIRI-CIRI TUMBUH KEMBANG ANAK, PERKEMBANGAN ANAK BALITA

Menurut Pandangan Islam

Sebagaimana pandangan para ahli yang membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan manusia tersebut pada tiga macam. Oleh Islam juga mengakui adanya ketiga macam periodisasi tersebut, mengingat bahwa setiap anak sejak ia dilahirkan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan menuju kesempurnaannya. Untuk itu penulis uraikan periodisasi tersebut sebagai berikut :

(1) Periodisasi berdasar pada segi biologis

Dalam menjelaskan masalah tersebut, penulis mengemukakan firman Allah SWT, dalam al-Quran surat al-Mukmin[23] ayat 67 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُرَابٍ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Dia-Lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes, air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya)

Ayat tersebut menunjukkan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia secara biologis yang berlangsung : (a) Masa dalam kandungan atau masa embrio, yaitu mulai saat terjadinya union antara sperma pria dan ovum perempuan, kemudian segumpal darah dan segumpal daging, (b) Masa kanak-kanak, yaitu sejak anak dilahirkan atau masa vital (bayi) sampai masa bermain, (c) Masa remaja, yaitu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, (d) Masa dewasa atau masa tua, yaitu

batas puncak pertumbuhan jasmani sehingga menurun pertumbuhan tersebut, dan (e) Masa meninggal dunia

Memperhatikan keterangan-keterangan tersebut, jelas bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak secara biologis berlangsung pada fase dalam kandungan ibu dan fase masa kanak-kanak.

(2) Periodisasi berdasar pada segi paedagogis.

Untuk menguraikan masalah tersebut, maka bertitik tolak dari keterangan nash sebagai berikut :

(a) Sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Samurah RA, yang berbunyi :

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Artinya : Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh dan digunting rambutnya dan diberi nama.

(b) Sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari ‘Umar bin Sya’ib, yang berbunyi :

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي سَبْعِ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : Perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan shalat ketika berumur tujuh tahun, dan pertegaslah mereka, jika umurnya telah sampai sepuluh tahun, dan berpisah tempat tidurlah.

(c) Firman Allah SWT, dalam al-Quran surat al-A’raf ayat 172, yang berbunyi :

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ؛ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا . .

Terjemahnya :

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu ?”. Mereka menjawab : Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi . . .

Keterangan-keterangan yang bersumber dari nash al-Quran dan hadits tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan secara paedagogis, yang dapat dibagi sebagai berikut :

Fase dalam kandungan ibu, sebagaimana tertuang dalam ayat 172 surat al-A'raf tersebut, dalam hal ini terjadi pertumbuhan naluri/indogen yang kelak akan dibawa ketika lahir menuju pertumbuhan seluruh perwatakannya dengan bantuan faktor lingkungan/eksogen sehingga sempurna.

Fase dalam umur 0 – 6 tahun, adalah masa pendidikan secara dressur terhadap hal-hal yang baik. Justeru itu, untuk menjaga kesucian jasmani dan rohani anak, maka ia diaqiqahkan, digunting rambutnya serta diberi nama, sebagaimana yang dimaksud oleh hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad tersebut.

Fase untuk menenangkan seksual anak, yaitu orangtua berpisah tempat tidur dengan anak, mengingat pada masa tersebut, anak mempunyai watak dan kecenderungan untuk meniru perbuatan orang lain, terutama perbuatan kedua orangtuanya. Fase tersebut berlangsung sejak berumur 11 tahun dan seterusnya.

(3) Periodisasi berdasar pada segi psikologis

Seorang Sarjana Islam : Ali Fikri, berpendapat bahwa perkembangan anak secara psikologis dibagi sebagai berikut :

Masa kanak-kanak, adalah sejak anak itu lahir sampai umur 7 tahun . . .

Masa berbicara, mulai umur 8 tahun sampai tahun ke 14. Masa ini disebut periode cita-cita.

Masa aqil baligh, dari umur 15 sampai umur 21 tahun . . .

Dengan keterangan-keterangan pada pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak sejak ia lahir telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan menuju kesempurnaannya, baik yang bersifat secara biologis, paedagogis, maupun psikologis, baik menurut pandangan para ahli maupun pandangan agama Islam.

2) Pertumbuhan dan perkembangan agama pada anak

Sebagaimana diketahui bahwa setiap manusia lahir dengan bakat relegiusitasnya yang merupakan faktor dasar, namun harus memperoleh bimbingan dan pimpinan dari luar diri anak atau dari

faktor ajar, sehingga ia mencapai tingkat kesempurnaan dan kecerdasan untuk memahami hal-hal yang gaib atau abstrak. Jadi sebaiknya pendidikan agama bagi anak-anak bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya, yaitu sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan ibu, sebagaimana yang diuraikan oleh Casimir, bahwa anak dalam kandungan ibunya dapat dididik beragama, dengan “memberi suasana keagamaan dalam bentuk membaca ayat-ayat suci al Quran (surat Yusuf, surat Yasin, dan lain-lain”, kemudian anak setelah lahir, ia diadzankan pada telinga kanan atau sisi kanannya dan diiqamahkan pada telinga kiri atau sisi kirinya, sebagaimana yang dianjurkan oleh hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya’la dari Hasan Bin Ali, yang berbunyi :

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى

Artinya : Barangsiapa lahir baginya seorang anak, maka hendaklah ia membacakan adzan pada telinga sebelah kanannya dan membacakan iqamah pada telinga sebelah kirinya.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa faktor ajar atau faktor eksogen memberi andil yang sangat utama dalam pembentukan faktor dasar/indogen. Justeru itu perkembangan agama pada anak sangat bergantung kepada penghayatan orangtua dan keluarga terhadap ajaran agama. Artinya, bahwa anak tidak mengalami perkembangan agama seperti yang dianjurkan oleh orangtuanya melainkan menurut orangtua atau keluarga itu sendiri berbuat/beramal atau mengamalkan ajaran agama, mengingat bahwa anak menerima pembinaan atau bimbingan dan pendidikan adalah secara percontohan dan pembiasaan, selain itu pemikiran anak hanya bersifat konkrit. Dalam menanamkan keyakinan kepada Allah SWT, maka anak sebaiknya diajak berdoa dengan sesuatu yang bersifat abstrak, seperti keselamatan, ketenteraman, kekuatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Sebaliknya jangan diajak memohon kepada Allah SWT, tentang hal-hal yang konkrit, sebab bila tidak terwujud, maka akan memberi kesempatan kepada anak untuk berfikir bahwa Tuhan tidak mampu memberi sesuatu yang dibutuhkan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan agama pada anak adalah dimulai

sejak lahir, hanya saja membutuhkan pimpinan dan bimbingan dari orangtua dan lingkungan sekitarnya.

Oleh orientalis barat berbeda pandangan dengan keterangan di atas, seperti Rumke, beranggapan bahwa kepercayaan anak terhadap Tuhan “baru tumbuh dengan leluasa setelah rasa ikatan anak bapak terlepas, dan rasa keagamaan baru timbul pada anak dalam masa pubertas”¹. Selanjutnya Alfert Binet, seorang psikolog berkebangsaan Perancis, mengatakan bahwa “. . . kemampuan untuk mengerti masalah-masalah yang abstrak, tidak sempurna perkembangannya sebelum mencapai usia 12 tahun . . .”

Keterangan di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari tingkat kecerdasan anak, maka belum dapat memahami hal-hal yang abstrak, namun berdasarkan potensi dasar atau naluri beragama yang dibawa sejak lahir yang didukung oleh bantuan faktor luar diri anak yaitu orangtua dan keluarga, maka setiap anak secara dini dapat menerima, memahami dan menghayati hal-hal yang abstrak.

A. Tinjauan Umum Tumbuh Kembang

Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pengertian perdefinisi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan (*Growth*)

Berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, poun, kilogram), ukuran panjang (centimeter, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan nitrogen tubuh).

2. Perkembangan (*Development*)

Adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Disini menyangkut adanya proses differensiasi dari sel sel tubuh, jaringan tubuh, organ organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.

B. Teori Perkembangan

Tahap tahap perkembangan berdasarkan psikoseksual teori (Freud) :

1. Fase oral
 - a. Fase 1 : bayi mendapat kepuasan melalui mulutnya

- b. Rasa lapar / tidak tenang / senang mendorong mengenal dunia luarnya melalui mukosa mulutnya dan permukaan tubuhnya
 - c. Menelan sesuatu akan memberi kepuasan dan memuntahkan sesuatu oleh karena ketegangan
 - d. Yaitu dikenal adalah ibunya oleh karena :
 - a) ibu sebagai sumber kenikmatan
 - b) ibu sebagai sumber erotik melalui oral secara pasif
2. Fase anal
- a. Sesuai perkembangan fisik otot (spinter) dan tuntutan lingkungan
 - b. Kesenangan dalam mengeluarkan feses dan urine secara aktif dengan melepaskan secara bebas.
 - c. Dipihak lain lingkungan menuntut defekasi dan miksi pada tempat tertentu untuk pemuasan :
 - a) sebagai perilaku sadis
 - b) perlakuan lingkungan secara sadis
3. Fase phalik
- a. Perolehan obyek kasih sayang (usia 3 – 7 Th) :
 - a) anak laki laki pada ibu
 - b) anak perempuan pada bapak
 - c) menyadari perbedaan phalik pada laki laki dan perempuan
 - b. Dihubungkan dengan :
 - a) laki laki pada ibu : audipus kompleks
 - b) perempuan pada bapak : elektra kompleks
4. Fase laten
- a. Pergolakan mereda
 - b. Fantasi banyak menguasai diri
 - c. Perkembangan sez berhenti hingga mencapai masa pubertas
5. Fase pubertas / tahap genital
- a. Masa remaja (11 th)
 - b. Masa antara kanak kanak dan dewasa
 - c. Alat kelamin mulai tumbuh dan berkembang dan dorongan seksual muncul lagi
 - d. Anak memulai dengan persiapan terahir untuk identitas / peranan sexual dewasa.
 Pada tahap ini kepuasan anak terhadap alat genital kembali bangkit dan mengarah pada perasaan cinta yang matang terhadap lawan jenis.

Tahap perkembangan kognitif (Piaget) :

1. Tahap sensori motor 0 – 2 tahun)
 Anal mempunyai kemampuan mengasimilasi dan mengakomodasi informasi dengan cara melihat, mendengar, menyentuh dan aktifitas motorik. Semua gerakan pada masa ini akan diarahkan ke mulut, gerakan fisik menunjukkan sifat egosentris dari pemikiran anak.
2. Tahap preoperasional (2 – 7 Tahun)

- Anak belum mampu mengoperasionalkan apa yang dipikirkan, perkembangan anak masih bersifat egosentris seperti memilih yang besar walaupun isi sedikit. Masa ini sifat pikiran bersifat transduktif menganggap semuanya sama seperti seorang pria di keluarga adalah ayah, maka semua pria adalah ayah. Apabila anak terbentur benda mati maka anak akan memukulnya.
3. Tahap kongkret (7 – 11 tahun)
Anak sudah memandang realistik dari dunianya dan mempunyai anggapan yang sama dengan orang lain, sifat egosentris sudah mulai hilang sebab anak sudah memiliki pengertian tentang keterbatasan diri sendiri, sifat pikiran sudah mempunyai dua pandangan (reversibilitas) cara memandang dari arah berlawanan (kebalikan). Pikiran realistik belum sampai membuat suatu konsep.
 4. Formal operasional (lebih dari 11 tahun)
Perkembangan anak pada masa ini sudah mencapai perkembangan pikiran dengan membentuk gambaran mental dan mempunyai penyelesaian aktivitas dalam pikiran, mampu menduga dan memperkirakan dengan pikiran yang abstrak.

Perkembangan Psikososial Anak (Erikson)

1. Tahap percaya dan tidak percaya, 0 – 1 tahun (bayi)
2. Tahap kemandirian, rasa malu dan ragu, 1-3 tahun (todler)
3. Tahap inisiatif, rasa bersalah, 2 – 4 tahun (prasekolah)
4. Tahap rajin dan rendah diri, 6 – 12 tahun (sekolah)
5. Tahap identitas dan kebingungan peran, (adolesence)
6. Tahap keintiman dan pemisahan
7. Tahap generasi dan penghentian
8. Tahap integritas dan keputusasaan

Perkembangan Psikomoral Anak (Kohlberg)

1. *Tahap orientasi hukum kepatuhan pada tingkat pra konvensional.*
Anak peka terhadap peraturan yang berlatar budaya, menghindari hukuman dan patuh pada hukum, bukan atas dasar norma pada peraturan moral yang mendasarinya.
2. *Tahap orientasi relatifitas dan instrumen pada tingkat pemikiran konvensional*
Segala tindakan yang dilakukan hanya untuk memuaskan individu akantetapi kadang kadang juga untuk orang lain, kesetiaan, penghargaan, kebijakan diambil untuk diperhitungkan.
3. *Tahap orientasi masuk kelompok (hubungan dengan orang lain)*
Bertingkh laku ang dapat menyenangkan dan diterima orang lain.
4. *Tahap orientasi hukum dan ketertiban pada tingkat pemikiran konvensional*
Membuat keputusan yang benar berarti mengerjakan tugas, berorientasi kepada otoritas yang sudah pasti dan usaha untuk memelihara ketertiban sosial.
5. *Tahap orientasi kontrak sosial tingkat pemikiran post kontroversial otonom/berprinsip*

Mementingkan kegunaannya, berprinsip tindakan yang benar adalah tindakan yang dimengerti dari segala hak individu yang umum dan disetujui oleh masyarakat.

6. *Tabap orientasi azas etika universal pada tingkat pemikiran post kontroversial otonom/ berprinsip.*

Keputusan yang diambil berdasarkan suasana hati, prinsip etika yang dipilih sendiri, berpedoman kepada peraturan yang umum di masyarakat.

Frankenburg dkk (1981) melalui **DDST** (Denver Developmental Screening Test) mengemukakan 4 parameter perkembangan yang dipakai dalam menilai perkembangan anak balita yaitu :

1. *Personal sosial* (kepribadian atau tingkah laku sosial).
Aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya.
2. *Fine motor adaptive* (gerakan motorik halus).
Aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan otot otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Misalnya kemampuan menggambar, memegang suatu benda.
3. *Language* (bahasa)
Kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah dan berbicara spontan.
4. *Gross motor* (perkembangan motorik kasar)
Aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ / individu. Walaupun demikian, kedua peristiwa itu terjadi secara sinkron pada setiap individu.

Untuk tercapainya tumbuh kembang yang optimal tergantung pada potensi biologisnya. Tingkat tercapainya potensi biologis seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor genetik, lingkungan bio-fisiko-psiko-sosial dan perilaku. Proses yang unik dan hasil akhir yang berbeda beda yang memberikan ciri tersendiri pada setiap anak.

Tujuan ilmu tumbuh kembang adalah mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan segala upaya untuk menjaga dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak baik fisik, mental dan sosial. Juga menegakkan diagnosis dini setiap kelainan tumbuh kembang dan kemungkinan penanganan yang efektif serta mencari penyebab dan mencegah keadaan tertentu.

C. Faktor faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang

1. Faktor genetik

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Melalui intruksi genetik yang terkandung di dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan pertumbuhan. Ditandai dengan intensitas dan

kecepatan pembelahan, derajat sensitifitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang. Termasuk faktor genetik antara lain berbagai faktor bawaan yang normal dan patologic, jenis kelamin, suku bangsa atau bangsa. Potensi genetik yang bermutu hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga diperoleh hasil akhir yang optimal. Gangguan pertumbuhan dinegara maju lebih sering diakibatkan oleh faktor genetik ini. Sedangkan dinegara yang sedang berkembang, gangguan pertumbuhan selain diakibatkan oleh faktor genetik, juga faktor lingkungan yang kurang memadai untuk tumbuh kembang anak yang optimal, bahkan kedua faktor ini dapat menyebabkan kematian anak-anak sebelum mencapai usia balita.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan bio-fisiko-psiko-sosial yang mempengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi sampai akhir hayatnya.

Faktor lingkungan ini secara garis besar dibagi menjadi :

a. Faktor prenatal.

Yaitu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin mulai dari konsepsi sampai lahir, antara lain adalah:

Gizi ibu pada waktu hamil.

Mekanis persalinan, Toxin / zat kimia, Endokrin, Radiasi, Infeksi, Stress, Imunitas, Anoksia Embrio.

b. Faktor postnatal

Yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah lahir, secara umum dapat digolongkan menjadi :

1) Faktor Biologis

Ras / suku bangsa, Jenis kelamin, Umur, Gizi, Perawatan kesehatan, Kepekaan terhadap penyakit, Penyakit kronis, Fungsi metabolisme, Hormon

2) Faktor Fisik

Cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, Sanitasi Keadaan rumah, Radiasi

3) Faktor Psikososial

Stimulasi, Motivasi belajar, Ganjaran atau hukuman yang wajar, Kelompok sebaya, Stress, Sekolah, Cinta dan kasih sayang, Kualitas interaksi anak orang tua

4) Faktor keluarga dan adat istiadat

Pekerjaan / ekonomi keluarga, Pendidikan ayah / ibu, Jumlah saudara, Jenis kelamin dalam keluarga, Stabilitas rumah tangga, Kepribadian ayah ibu, Norma dan tabu, Agama, Urbanisasi, Kehidupan politik

D. Konsep Psikoneuroimunologi

Konsep ini menjelaskan bagaimana kondisi psikologis mempengaruhi proses penyembuhan. Yaitu adanya poros hipotalamus, hipofisis dan adrenal, dijabarkan bahwa stress psikologis akan berpengaruh pada hipotalamus, kemudian hipotalamus akan mempengaruhi hipofisis, sehingga hipofisis akan mengekskresikan ACTH (adrenal cortikotropik hormon) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelenjar adrenal sebagai penghasil kortisol. Apabila stress yang dialami sangat tinggi maka adrenal akan memproduksi kortisol dalam jumlah banyak sehingga dapat menekan sistem imun (Clancy, 1998). Penekanan sistem imun inilah yang berakibat pada hambatan proses penyembuhan sehingga diperlukan waktu perawatan yang lebih lama dan bahkan akan mempercepat terjadinya komplikasi-komplikasi selama perawatan.

E. Bermain

Menurut Rosa M. Sacharin (1987), bermain didefinisikan sebagai aktifitas dimana individu dapat :

- a. Mempraktikan dan menyempurnakan ketrampilan yang melibatkan fungsi motorik, sensorik dan ketrampilan sosial.
- b. Memberikan ekspresi terhadap pemikiran, berguna dalam penyelesaian masalah dan sebagai cara untuk perkembangan mental.
- c. Menjadi kreatif, yaitu mampu menggunakan mentalnya untuk mengembangkan imajinasi serta ekspresi terhadap pemikiran kreatif.
- d. Bahasa Sempurna.
Anak mempelajari bahasa secara luas selama situasi bermain. Anak bermain dengan bahasa sebagai suatu ketrampilan dan sebagai sarana komunikasi.
- e. Terindoktrinasi ke dalam budaya dimana ia tinggal dan belajar untuk menerima nilai secara moral.
- f. Mempersiapkan diri untuk berperan dan berperilaku dewasa.
Dalam bermain anak memerankan peranan orang dewasa dan mulai membuat model dirinya sendiri atas dasar perilaku orang dewasa.
- g. Agar dapat beradaptasi secara lebih efektif terhadap stress karena penyakit dan hospitalisasi, karena anak mendapat ketenangan selama bermain.

Bermain memiliki fungsi penting dalam kehidupan anak. Yaitu untuk mendukung proses **tumbuh kembang**. Bermain di Rumah Sakit memiliki fungsi penting lain yaitu menghilangkan kecemasan, Rosa M. Sacharin (1996).

Menurut Aziz Alimul Hidayat (2005) bermain memiliki nilai terapeutik, bermain dapat menjadikan diri anak lebih senang dan nyaman sehingga stress dan ketegangan dapat dihindarkan.

Dengan bermain anak dapat mengkomunikasikan pengalamannya, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengkomunikasikan ketakutannya. Kemampuan seorang anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Rumah Sakit

tergantung dari kepribadian, pengalaman sebelumnya terhadap proses sakit / dirawat dan kecerdasannya. Tambahan faktor lain yaitu sangat dibutuhkan sistem dukungan (support system) yang tersedia seperti dukungan orang tua dan keluarga, teman sekamar dan peran perawat.

Lingkungan Rumah Sakit dapat membangkitkan ketakutan yang tidak dapat dihindarkan secara total tetapi sedapat mungkin harus dihindarkan. Kerja seorang perawat sering berhubungan dan menyebabkan nyeri yang merupakan faktor penyebab cemas. Dengan bermain situasi ini bisa dikomunikasikan. Tindakan keperawatan dilakukan sambil bermain dapat menurunkan tingkat kecemasan anak. Rumah Sakit Yang peduli anak akan menyediakan kesempatan untuk bermain.

F. Ciri-ciri tumbuh kembang anak

Tumbuh kembang anak yang sudah dimulai sejak konsepsi sampai dewasa itu mempunyai ciri ciri tersendiri yaitu :

1. Merupakan proses yang kontinyu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan.
2. Dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau perlambatan. Periode pertumbuhan cepat adalah masa janin, masa bayi 0 sampai 1 tahun, dan masa pubertas.
3. Pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi kecepatannya berbeda antara anak satu dengan lainnya.
4. Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi susunan saraf. Sebagai contoh tidak ada latihan yang dapat menyebabkan anak dapat berjalan sampai sistem syaraf siap untuk itu, tetapi tidak adanya kesempatan praktik akan menghambat kemampuan ini.
5. Aktifitas seluruh tubuh diganti respon indifidu yang khas. Sebagai contoh : bayi akan menggerakkan seluruh tubuhnya kalau melihat sesuatu yang menarik, tetapi pada anak yang lebih besar reaksinya hanya tertawa atau meraih benda tersebut.
6. Arah perkembangan anak adalah sefalokaudal. Langkah pertama sebelum berjalan adalah perkembangan menegakkan kepala.
7. Reflek primitif seperti refleks memegang dan berjalan akan menghilang sebelum gerakan volunter tercapai.

G. Perkembangan anak balita

Bagian Psikologi FKUI bersama Unit Kerja Pediatri Sosial Ikatan Dokter Anak Indonesia menyusun skema praktis Perkembangan Mental anak Balita yang disebut SKALA YAUMIL MIMI :

1. Dari lahir sampai 3 bulan :
 - a. Belajar mengangkat kepala
 - b. Belajar mengikuti objek dengan matanya
 - c. Melihat ke muka orang dengan tersenyum
 - d. Bereaksi terhadap suara atau bunyi
 - e. Mengenal ibunya dengan penglihatan, pendengaran dan kontak
 - f. Menahan barang yang dipegangnya
 - g. Mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh

2. Dari 3 sampai 6 bulan
 - a. Mengangkat kepala 90° dan mengangkat dada dengan bertopang tangan
 - b. Mulai belajar meraih benda benda yang ada dalam jangkauannya atau diluar jangkauannya
 - c. Menaruh benda benda di mulutnya
 - d. Berusaha memperluas lapangan pandangan
 - e. Tertawa dan mejerit karena gembira bila diajak bermain
 - f. Mulai berusaha mencari benda benda yang hilang
3. Dari 6 sampai 9 bulan
 - a. dapat duduk tanpa dibantu
 - b. dapat tengkurap dan berbalik sendiri
 - c. dapat merangkak meraih benda atau mendekati seseorang
 - d. memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain
 - e. memegang benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk
 - f. bergembira dengan melempar benda benda
 - g. mengeluarkan kata kata yang tanpa arti
 - h. mengenali muka anggota keluarga dan takut kepada orang asing
 - i. mulai berpartisipasi dalam permainan tepuk tangan dan sembunyi sembunyian
4. Dari 9 sampai 12 bulan
 - a. dapat berdiri sendiri tanpa dibantu
 - b. dapat berjalan dengan dituntun
 - c. menirukan suara
 - d. mengulang bunyi yang didengarnya
 - e. belajar menyatakan satu atau dua kata
 - f. mengerti perintah sederhana atau larangan
 - g. memperlihatkan minat yang besar dalam mengeksplorasi sekitarnya, ingin menyentuh apa saja dan memasukkan benda benda ke mulutnya
 - h. berpartisipasi dalam permainan
5. Dari 12 sampai 18 bulan
 - a. berjalan dan mengeksplorasi rumah dan sekeliling rumah
 - b. menyusun 2 atau 3 kotak
 - c. dapat mengatakan lima sampai sepuluh kata
 - d. memperlihatkan rasa cemburu dan rasa bersaing
6. Dari 18 sampai 24 bulan
 - a. naik turun tangga
 - b. menyusun 6 kotak
 - c. menunjuk mata dan hidungnya
 - d. menyusun dua kata
 - e. belajar makan sendiri
 - f. menggambar garis di kertas atau pasir
 - g. mulai belajar mengontrol BAK dan BAB
 - h. menaruh minat kepada apa yang dikerjaka orang orang yang lebih besar
 - i. memperlihatkan minat kepada anak lain dan bermain main dengan mereka.
7. Dari 2 sampai 3 tahun

- a. belajar melompat, memanjat, melompat dengan satu kaki
 - b. membuat jembatan dengan tiga kotak
 - c. mampu menyusun kalimat
 - d. mempergunakan kata kata saya, bertanya, mengerti kata kata yang ditujukan kepadanya
 - e. menggambar lingkaran
 - f. bermain bersama dengan anak lain dan menyadari adanya lingkungan lain diluar keluarganya
8. Dari 3 sampai 4 tahun
- a. berjalan jalan sender mengunjungi tetangga
 - b. berjalan pada jari kaki
 - c. belajar berpakaian dan membuka pakaian sender
 - d. menggambar garis silang
 - e. menggambar orang hanya kepala dan badan
 - f. mengenal dua atau tiga warna
 - g. bicara dengan baik
 - h. menyebut namanya, jenis kelamin dan umurnya
 - i. banyak bertanya
 - j. bertanya bagaimana anak dilahirkan
 - k. mengenal sisiatas, sisi bawah, depan dan belakang
 - l. mendengarkan cerita cerita
 - m. bermain dengan anak lain
 - n. menunjukkan rasa sayang kepada saudara saudaranya
 - o. dapat melaksanakan tugas tugas sederhana
9. Dari 4 sampai 5 tahun
- a. melompat dan menari
 - b. menggambar orang dari kepala, lengan, badan
 - c. menggambar segi empat dan segi tiga
 - d. pandai bicara
 - e. dapat menghitung jari jarinya
 - f. dapat menyebut hari hari dalam seminggu
 - g. mendengar dan mengulang hal hal penting dan cerita
 - h. minat pada kata baru dan artinya
 - i. memprotes bila dilarang apa yang diingini
 - j. mengenal empat warna
 - k. memperkirakan bentuk benda, membedakan besar dan kecil
 - l. menaruh minat kepada aktifitas orang dewasa.

LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan 3, dipersilahkan mengerjakan latihan berikut:

1. Buat rumusan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Buat rumusan tentang tahap-tahap perkembangan anak.
3. Buat uraian tentang konsep psikoneorimunologi pada anak.

RANGKUMAN

1. Pertumbuhan (*Growth*) berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, poun, kilogram), ukuran panjang (centimeter, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan nitrogen tubuh).
2. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Disini menyangkut adanya proses differensiasi dari sel sel tubuh, jaringan tubuh, organ organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.
3. Ada beberapa teori perkembangan yaitu : tahap perkembangan psikosexual teori (Freud), tahap perkembangan kogniti (Piaget), tahap perkembangan psikososial anak (erikson), tahap perkembangan psikomoral anak (Kohlberg).
4. Factor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu factor genetic dan factor lingkungan.
5. Bermain memiliki fungsi penting dalam kehidupan anak. Yaitu untuk mendukung proses tumbuh kembang. Bermain di Rumah Sakit memiliki fungsi penting lain yaitu menghilangkan kecemasan. Dengan bermain anak dapat mengkomunikasikan pengalamannya, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengkomunikasikan ketakutannya. Kemampuan seorang anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Rumah Sakit tergantung dari kepribadian, pengalaman sebelumnya terhadap proses sakit / dirawat dan kecerdasannya. Tambahan faktor lain yaitu sangat dibutuhkan sistem dukungan (support system) yang tersedia seperti dukungan orang tua dan keluarga, teman sekamar dan peran perawat.

TES FORMATIF

1. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan anak!
2. Sebutkan tahap perkembangan anak menurut teori Erikson!
3. Jelaskan pengertian bermain menurut Rosa M. Sacharin!
4. Sebutkan ciri-ciri tumbuh kembang anak!
5. Sebutkan perkembangan mental pada anak balita di usia 18 sampai 24 bulan!

KUNCI JAWABAN

1. Pertumbuhan (*Growth*) berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, poun, kilogram), ukuran panjang (centimeter, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan nitrogen tubuh).

Sedangkan Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Disini menyangkut adanya proses differensiasi dari sel sel tubuh, jaringan tubuh, organ organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.

2. Perkembangan Psikososial Anak (Erikson)
 - a. Tahap percaya dan tidak percaya, 0 – 1 tahun (bayi)
 - b. Tahap kemandirian, rasa malu dan ragu, 1-3 tahun (toddler)
 - c. Tahap inisiatif, rasa bersalah, 2 – 4 tahun (prasekolah)
 - d. Tahap rajin dan rendah diri, 6 – 12 tahun (sekolah)
 - e. Tahap identitas dan kebingungan peran, (adolesence)
 - f. Tahap keintiman dan pemisahan
 - g. Tahap generasi dan penghentian
 - h. Tahap integritas dan keputusasaan
3. Menurut Rosa M. Sacharin (1987), bermain didefinisikan sebagai aktifitas dimana individu dapat :
 - a. Mempraktikan dan menyempurnakan ketrampilan yang melibatkan fungsi motorik, sensorik dan ketrampilan sosial.
 - b. Memberikan ekspresi terhadap pemikiran, berguna dalam penyelesaian masalah dan sebagai cara untuk perkembangan mental.
 - c. Menjadi kreatif, yaitu mampu menggunakan mentalnya untuk mengembangkan imajinasi serta ekspresi terhadap pemikiran kreatif.
 - d. Bahasa Sempurna. Anak mempelajari bahasa secara luas selama situasi bermain. Anak bermain dengan bahasa sebagai suatu ketrampilan dan sebagai sarana komunikasi.
 - e. Terindoktrinasi ke dalam budaya dimana ia tinggal dan belajar untuk menerima nilai secara moral.
 - f. Mempersiapkan diri untuk berperan dan berperilaku dewasa. Dalam bermain anak memerankan peranan orang dewasa dan mulai membuat model dirinya sendiri atas dasar perilaku orang dewasa.
 - g. Agar dapat beradaptasi secara lebih efektif terhadap stress karena penyakit dan hospitalisasi, karena anak mendapat ketenangan selama bermain
4. Tumbuh kembang anak yang sudah dimulai sejak konsepsi sampai dewasa itu mempunyai ciri ciri tersendiri yaitu :
 - a. Merupakan proses yang kontinyu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan.
 - b. Dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau perlambatan. Periode pertumbuhan cepat adalah masa janin, masa bayi 0 sampai 1 tahun, dan masa pubertas.

- c. Pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi kecepatannya berbeda antara anak satu dengan lainnya.
 - d. Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi susunan saraf. Sebagai contoh tidak ada latihan yang dapat menyebabkan anak dapat berjalan sampai sistem syaraf siap untuk itu, tetapi tidak adanya kesempatan praktik akan menghambat kemampuan ini.
 - e. Aktifitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. Sebagai contoh : bayi akan menggerakkan seluruh tubuhnya kalau melihat sesuatu yang menarik, tetapi pada anak yang lebih besar reaksinya hanya tertawa atau meraih benda tersebut.
 - f. Arah perkembangan anak adalah sefalokaudal. Langkah pertama sebelum berjalan adalah perkembangan menegakkan kepala.
 - g. Reflek primitif seperti refleksi memegang dan berjalan akan menghilang sebelum gerakan volunter tercapai.
5. Perkembangan mental anak balita di usia 18 sampai 24 bulan, yaitu:
- a. naik turun tangga
 - b. menyusun 6 kotak
 - c. menunjuk mata dan hidungnya
 - d. menyusun dua kata
 - e. belajar makan sendiri
 - f. menggambar garis di kertas atau pasir
 - g. mulai belajar mengontrol BAK dan BAB
 - h. menaruh minat kepada apa yang dikerjakan orang-orang yang lebih besar
 - i. memperlihatkan minat kepada anak lain dan bermain-main dengan mereka

BAB IV KONSEP BERMAIN PADA ANAK

SATUAN BAHASAN 4 :

PENGERTIAN BERMAIN, FUNGSI BERMAIN, TUJUAN BERMAIN, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERMAIN, KLASIFIKASI BERMAIN, KARAKTERISITIK BERMAIN SESUAI TAHAP PERKEMBANGAN, BERMAIN DI RUMAH SAKIT.

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian bermain, fungsi bermain, tujuan bermain, faktor-faktor yang mempengaruhi bermain, klasifikasi bermain, karakteristik bermain sesuai tahap perkembangan, bermain di rumah sakit.

Mengenai pengertian bermain di kemukakan pendapat oleh Depdikbud tahun 1983.

Dalam bahasan mengenai fungsi bermain ada beberapa perkembangan yaitu sensori motorik, kognitif, social, terapi, dan sebagai alat komunikasi. Selain itu juga di uraikan beberapa tujuan bermain. Sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi bermain yaitu Tahap Perkembangan, Status kesehatan, Jenis Kelamin, Lingkungan dan Alat Permainan Yang cocok.

Dalam klasifikasi bermain dibedakan menurut isi dan menurut karakteristik sosial. Karakteristik bermain sesuai tahap perkembangan berdasarkan usia yaitu Bayi, 1 bulan, 2 – 3 bulan, 4 – 6 bulan, Toddler (2-3 tahun), Preschool (3 – 6 tahun), Usia (6 – 12 tahun), dan adolescence. Sedangkan bahasan bermain di rumah sakit di uraikan bagaimana keuntungan bermain di Rumah Sakit dan Prinsip Bermain di Rumah Sakit.

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai pengertian bermain, fungsi bermain, tujuan bermain, faktor-faktor yang mempengaruhi bermain, klasifikasi bermain, karakteristik bermain sesuai tahap perkembangan, bermain di rumah sakit. Kemudian buatlah intisari/ ringkasan tiap bahasan tersebut. Fahami dengan baik intisari/ ringkasan tersebut.


C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian bermain, fungsi bermain, tujuan bermain, faktor-faktor yang mempengaruhi bermain, klasifikasi bermain, karakteristik bermain sesuai tahap perkembangan, bermain di rumah sakit

2. Mahasiswa dapat membuat uraian sendiri mengenai bermain pada anak sesuai dengan tumbuh kembang anak.
3. Mahasiswa memahami manfaat pengetahuan tentang bermain.

PENGERTIAN BERMAIN, FUNGSI BERMAIN, TUJUAN BERMAIN, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERMAIN, KLASIFIKASI BERMAIN, KARAKTERISITIK BERMAIN SESUAI TAHAP PERKEMBANGAN, BERMAIN DI RUMAH SAKIT

Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam Qs. Al-Furqaan[25]: 74



Artinya:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Dalam konteks ini, Al-Ghazali yang kemudian dikuatkan prinsip-prinsipnya oleh Ibn Qayyim al-Jauzzyah menegaskan bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangatlah penting, oleh karena itu pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik, dengan pembiasaan dan contoh-contoh teladan, memberikan permainan yang wajar dan mendidik, jangan sampai memberikan permainan yang mematikan hati, merusak kecerdasan, menghindarkannya dari pergaulan yang buruk. Pengaruh yang positif diharapkan akan menjadi kerangka dasar bagi anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Membangun kerangka dasar pada anak usia dini dapat diibaratkan membangun sebuah bangunan bertingkat. Bangunan seperti itu tentu saja akan dimulai dengan membuat kerangka pondasi yang sangat kokoh yang mampu menopang bagian bangunan yang ada di atasnya. Demikian pula anak-anak yang memiliki pondasi yang kuat dan kokoh ketika usia dini maka akan menjadi dasar dan penopang bagi perkembangan

anak memasuki pendidikan selanjutnya, termasuk mempersiapkan hidupnya di tengah masyarakat. Menurut pandangan Syekh Mansur Ali Rajab dalam karyanya *Ta'ammulat fi falsafah al-Akhlaq* terdapat paling tidak lima aspek yang dapat diturunkan dari seseorang kepada anaknya, yaitu: 1). Jasmaniyah, seperti warna kulit, bentuk tubuh, sifat rambut dan sebagainya. 2). Intelektualnya, seperti, kecerdasan dan atau kebodohan. 3) tingkah laku, seperti tingkah laku terpuji, tercela, lemah lembut, keras kepala, taat, durhaka. 4) alamiyah, yaitu pewarisan internal yang dibawa sejak kelahiran tanpa pengaruh dari faktor eksternal. 5) sosiologis, yaitu pewarisan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ibn Qayyim Al-Jauzyyah dalam salah satu karyanya yang monumental tentang pendidikan anak '*Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*' menegaskan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, suci dan selamat dari penyimpangan dan menolak hal-hal buruk yang membahayakan dirinya. Namun lingkungan yang rusak dan pergaulan yang tidak baik akan menodai kefitrahan anak dan dapat mengakibatkan berbagai penyimpangan dan pada gilirannya akan menghambat perkembangan akal pikirannya. Sehingga tujuan akhir dari pendidikan anak prasekolah adalah memberikan landasan iman dan mental yang kokoh dan kuat pada anak, sehingga akan hidup bahagia bukan saja di saat ia dewasa dalam kehidupannya di dunia, tetapi juga bahagia di akherat, bahkan diharapkan dapat mengikut sertakan kebahagiaan itu untuk kedua orang tua, guru dan mereka yang mendidiknya. Sehingga pendidikan anak usia dini pada hakekatnya juga merupakan intervensi dini dengan memberikan rangsangan edukasi sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi tersembunyi (*hidden potency*) serta mengembangkan potensi tampak (*actual potency*) yang terdapat pada diri anak. Upaya mengenal dan memahami berbagai ragam potensi anak usia dini merupakan persyaratan mutlak untuk dapat memberikan rangsangan edukasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan potensi tertentu dalam diri anak. Upaya ini dapat dilalukan dengan memahami berbagai dimensi perkembangan anak seperti bahasa, intelektual, emosi, social, motorik konsep diri, minat dan bakat.

Tujuan lain dari pemberian program simulasi edukasi adalah melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak. Gangguan ini dapat muncul dari dua faktor, yakni faktor internal yang terdapat dalam diri anak dan faktor eksternal yang berwujud lingkungan di sekitar anak, baik yang berwujud lingkungan fisik seperti tempat tinggal, makanan dan alat-alat permainan ataupun lingkungan sosial seperti jumlah anak, peran ayah/ ibu, peran nenek/ kakek, peran pembantu, serta nilai dan norma sosial yang berlaku.

Ayat di atas yang menjadi doa sehari-hari setiap orang tua yang mendambakan hadirnya keturunan yang qurratu a'yun, hendaknya dijadikan acuan dalam pembinaan anak, sehingga tidak lengah sesaatpun dalam upaya melakukan pengawasan, pendidikan dan pembinaan anak-anak mereka. Itulah di antara ciri Ibadurrahman yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya yang memiliki kepedulian besar terhadap nasib anak-anak mereka di masa yang akan datang. Semoga akan senantiasa lahir dari rahim bangsa ini generasi yang qurratu a'yun, bukan hanya untuk kedua orang tuanya, tetapi juga masyarakatnya dan bangsanya.

Anak tidak memisahkan antara dan bekerja. Bagi anak bermain merupakan seluruh aktivitas anak termasuk bekerja, kesenangannya, dan merupakan metode bagaimana mereka mengenal dunia. Bermain tidak sekedar mengisi waktu, tetapi merupakan suatu kebutuhan seperti halnya makanan, perawatan, cinta kasih, danlain-lain. Anak memerlukan berbagai variasi mainan untuk kesehatan fisik, mental dan perkembangan emosinya. Melalui bermain anak tidak hanya menstimulasi anak tidak hanya menstimulasi perkembangan otot-ototnya, tetapi lebih dari itu. Anak tidak sekedar melompat, melempar atau berlari. Tetapi mereka bermain dengan menggunakan seluruh emosinya, perasaannya dan pikirannya. Kesenangan merupakan salah satu elemen pokok dalam bermain. Anak akan bermain selama aktivitas tersebut mengiburnya. Pada saat mereka bosan, mereka akan berhenti bermain.

Bermain bukan berarti membuang-buang waktu, juga bukan berarti membuat si anak menjadi sibuk sementara orang tuanya mengerjakan pekerjaannya sendiri. Tetapi anak akan menemukan kekuatan dan kelemahannya sendiri, minatnya, cara menyelesaikan tugas-tugas dalam

bermain, dan lain-lain. Bermain adalah unsure yang penting untuk perkembangan anak baik fisik, emosi, mental, intelektual, kreativitas dan social. Anak yang mendapat kesempatan cukup untuk bermain akan menjadi orang dewasa yang mudah berteman, kreatif dan cerdas, bila dibandingkan dengan mereka yang masa kecilnya kurang mendapat kesempatan bermain.

1. Pengertian Bermain

Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara suka rela untuk memperoleh kesenangan dan bermain merupakan cermin kemampuan fisik, intelektual, emosional dan social (Depdikbud, 1983). Oleh karena itu bermain merupakan media belajar bagi anak.

2. Fungsi Bermain

Fungsi bermain bagi anak :

1. Perkembangan Sensori Motorik : yaitu membantu perkembangan gerak dengan memainkan suatu obyek, misalnya : meraih pensil.
2. Perkembangan Kognitif : yaitu membantu mengenai benda disekitar misalnya : logo, balok (bongkar pasang mainan).
3. Perkembangan social : yaitu anak belajar berinteraksi dengan orang lain dan mempelajari peran dalam kelompok misalnya : dapat diperoleh dari orang tua, guru, orang lain disekitar bermain, maka anak akan bertingkah laku sesuai/diterima oleh teman, anak akan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan, jujur terhadap orang lain.
4. Terapi : bermain akan memeberi kesempatan pada anak untuk mengekspresikan perasaan yang tidak enak misalnya, marah, depresi, benci, takut.
5. Sebagai alat komunikasi : bermain merupakan komunikasi terutama pada anak yang belum menyatakan perasaan secara verbal, misalnya : melukis, menggambar, bermain peran.

3. Tujuan Bermain

Selain fungsi bermain bagi anak, bermain juga mempunyai tujuan antara lain:

1. Dapat melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan yang normal.
2. Dapat mengekspresikan keinginan, perasaan dan fantasi melalui permainan
3. Dapat mengembangkan kreativitas melalui pengalaman berain yang tepat.
4. Dapat beradaptasi lebih efektif terhadap stress karena sakit dan dirawat di rumah sakit dan mendapatkan kesenangan.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bermain

1. Tahap Perkembangan : setiap tahap perkembangan mempunyai potensi/keterbatasan.
2. Status kesehatan : anak yang sakit makan kemampuan kognitif atau psikomotornya terganggu.

3. Jenis Kelamin : sangat dipengaruhi oleh usia terutama permainan yang digunakan.
4. Lingkungan : lokasi, kultur, negara.
5. Alat Permainan Yang cocok : alat permainan yang sesuai tahap perkembangan maka anak akan menggunakan dan merasa senang.

5. Klasifikasi bermain

1. Menurut Isi :

- a. “Social Play” : belajar memberi respon, misalnya orang dewasa berbicara/memanjakan anak, maka anak akan merasa senang dengan respon mengeluarkan suara tersenyum.
- b. “Sense Of Pleasure Play” : dengan bermain akan memperoleh kesenangan dsri suatu objek disekelilingnya, misalnya : bermain pasir, air.
- c. “Skill Play” dengan bermain anak dapat memperoleh ketrampilan sehingga anak akan memperoleh berulang-ulang.
- d. “Dramatik Play atau Role Play” dengan bermain anak akan dapat melakukan peran, misalnya : sebagai perawat, dokter, guru, ibu, ayah dan anak akan membuat fantasi dari permainan tersebut.

2. Menurut Karakteristik Sosial :

- a. “*Solitary Play*” bermain sendiri walaupun ada orang lain didekatnya(1-3).
- b. “*Paralel Play*”, bermain sejenis , anak bermain dalam suatu kelompok, masing-masing mempunyai mainan yang sama, tetapi tidak ada interaksi diantara mereka : tidak tergantung (interaksi tetapi belum bersosialisasi) Todler, Preschool.
- c. “*Associative Play*” bermain dalam kelompok. Anak bermain dalam suatu aktivitas yang sama tetapi belum terorganisasi. Tidak ada pembagian tugas, mereka bermain sesuai keinginannya.
- d. “*Cooperative*” pelayanan bermain dalam kelompok. Permainan terorganisir, terencana, ada tujuan, ada aturan-aturan misalnya : main kartu, balap sepeda.
- e. “*Unlocker play*” (pengamat). Anak melihat anak bermain hal ini sudah merupakan bermain, menurunkan stress.

6. Karakteristik Bermain Sesuai Tahap Perkembangan

- a. Bayi
Tumbuh kembang saat bayi sangat pesat, maka berikan mainan yang berbeda. Yang menonjol pada waktu bayi yaitu affective play dan sense of pleasure play.
- b. 1 bulan
 1. visual : lihat dari jarak jauh, gantungkan benda yang terang/menyolok.
 2. Auditory : Bicara dengan bayi, menyanyi, musik, radio, detik jam.
 3. Tactile : dipeluk, digendong.
 4. Kinetik : diayun, kereta untuk jalan-jalan.

- c. 2 – 3 bulan
 1. Visual : beri objek warna terang, bawa bayi ke ruangan berbeda, letakan bayi agar dapat memandangi sekitar.
 2. Auditory : bicaralah dengan bayi, beri mainan yang berbunyi, ikut sertakan dalam pertemuan keluarga
 3. Tactile : membelai waktu memandikan, sisir rambut dengan lembut, gosok dengan lotion atau dengan bedak.
 4. Kinetik : jalan-jalan dengan kereta, gerakan berenang.
- d. 4 – 6 bulan
 1. visual : beri cermin, bawa nonton TV, beri mainan dengan warna terang.
 2. Auditory : ajak bicara, ulangi suara-suara yang dibuatnya, panggil namanya, remas kertas dekat telinganya, letakan mainan berbunyi dekat telinganya.
 3. Tactile : beri mainan berbagai tekstur lembut, kasar, bermain air, masukan ke dalam bak mandi.
 4. Kinetik : Bantu telungkup, sokong waktu duduk, tunjukkan bangunan-bangunan agak jauh, bermain bola, Beri mainan yang dapat ditarik/didorong
 5. Mainan yang dianjurkan pada bayi umur 6 –12 bulan
Blockles dengan warna terang dan menyolok, bola besar, mainan yang dapat didorong/ditarik, boneka berbunyi, balon.
- e. Toddler (2-3 tahun)
Mulai berjalan, memanjat, lari; dapat memainkan sepatu dengan tangannya; senang melempar, mendorong, mengambil sesuatu; perhatiannya sangat singkat; mulai mengerti memiliki “milikku”; toddler selalu bertengkar memperebutkan mainan.
- f. Preschool (3 – 6 tahun)
Anak sangat aktif dan imaginative, mulai terbentuk perkembangan moral, dapat melompat. Karakteristik bermain preschool adalah : peralatan rumah tangga, sepeda roda tiga, lilin, boneka, buku-buku dengan kata-kata simple, alat olah raga, kapal terbang, mobil truk.
- g. Usia (6 – 12 tahun)
 1. Bermain dengan kelompok, dapat belajar dengan aturan-aturan kelompok.
 2. Belajar mandiri, kooperative bersaing, menerima orang lain dan tingkah laku yang diterima.
 3. Bermain tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan fisik, intelektual, fantasi, tetapi anak mulai membentuk club serta persatuan dalam tim.
 4. Karakteristik “cooperative play”, mechanical serta Mother Roles : keduanya senang membaca.
 5. Mainan untuk usia sekolah : usia 6 – 8 tahun adalah kartu, boneka, alat-alat untuk melukis, alat-alat olah raga, buku-buku, sepeda; mainan usia 8 –12 tahun adalah : buku, mengumpulkan perangko, main kartu, olah raga : berenang, sepeda, sepatu roda, pingpong.
- h. Adolescence :
Anak lebih dekat dengan kelompok luar.

Permainan : sepak bola, badminton, buku, basket, mendengar musik. Dalam memilih permainan, orang tua harus dilibatkan sehingga anak merasa seperti dirumah sendiri dan dapat bermain dengan kelompok, anak mudah mengekspresikan perasaan, diskusi.

7. Bermain Di Rumah Sakit

- A. Keuntungan bermain di Rumah Sakit
 1. Meningkatkan hubungan perawat pasien di Rumah Sakit
 2. Dapat mengekspresikan perasaan tidak enak, misalnya : takut sendirian, rasa marah.
 3. Memulihkan rasa mandiri pada anak, dengan kegembiraan dalam bermain.
 4. Bermain terapeutik : dapat meningkatkan penguasaan pengalaman yang traumatic, misalnya : peran perawat, dokter.
 5. Membina tingkah laku positif di Rumah Sakit terhadap perawat. Di rumah Sakit selain mendapat pengalaman traumatic juga dapat bermain seperti anak lain.
 6. Alat berkomunikasi antara perawat – pasien yaitu cerita gambar.
- B. Prinsip Bermain di Rumah Sakit :
 1. Tidak banyak membutuhkan energi
 2. Permainan simple
 3. Kegiatan yang singkat waktunya
 4. Mempertimbangkan keamanan : perlukaan, infeksi silang.
 5. Kelompok umur yang sama.
 6. Melibatkan orang tua
 7. Permainan tidak bertentangan dengan pengobatan
 8. Semua alat bermain harus dicuci larutan desinfeksi.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan 4 dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Buat rumusan tentang pengertian bermain, fungsi bermain, serta tujuan bermain !
2. Buat uraian faktor-faktor yang mempengaruhi bermain dan klasifikasi bermain.
3. Buat uraian karakteristik bermain sesuai tahap perkembangan dan uraian bermain di rumah sakit.

Rangkuman

1. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara suka rela untuk memperoleh kesenangan.
2. Fungsi bermain pada anak dapat mengembangkan sensori motorik, kognitif, social, sebagai terapi dan sebagai alat komunikasi.
3. Karakteristik bermain anak harus sesuai tahap perkembangan anak

Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian bermain
2. Buat uraian tujuan dari bermain
3. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bermain

Kunci Jawaban Tes Formatif

1. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara suka rela untuk memperoleh kesenangan serta cermin kemampuan fisik, intelektual, emosional dan social seorang anak sehingga bermain merupakan media belajar bagi anak.
2. Adapun tujuan bermain adalah sebagai berikut :
 1. Dapat melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan yang normal.
 2. Dapat mengekspresikan keinginan, perasaan dan fantasi melalui permainan
 3. Dapat mengembangkan kreativitas melalui pengalaman bermain yang tepat.
 4. Dapat beradaptasi lebih efektif terhadap stress karena sakit dan dirawat di rumah sakit dan mendapatkan kesenangan.
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bermain yaitu :
 1. Tahap Perkembangan : setiap tahap perkembangan mempunyai potensi/keterbatasan.
 2. Status kesehatan : anak yang sakit makan kemampuan kognitif atau psikomotornya terganggu.
 3. Jenis Kelamin : sangat dipengaruhi oleh usia terutama permainan yang digunakan.
 4. Lingkungan : lokasi, kultur, negara.
 5. Alat Permainan Yang cocok : alat permainan yang sesuai tahap perkembangan maka anak akan menggunakan dan merasa senang

BAB V

PERSIAPAN ANAK UNTUK PROSEDUR DIAGNOSTIK

SATUAN BAHASAN 5 : PRINSIP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN ANAK DALAM PROSEDUR DIAGNOSTIK

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah ini membahas mengenai prinsip persiapan dan perencanaan anak dalam prosedur diagnostik

B. Pedoman Mempelajari Materi


Baca dengan baik uraian mengenai prinsip persiapan dan perencanaan anak dalam prosedur diagnostik. Kemudian buatlah intisari/ringkasan tiap poin pembahasan. Fahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang prinsip persiapan
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang perencanaan anak dalam prosedur diagnostik
3. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang prinsip persiapan
4. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang perencanaan anak dalam prosedur diagnostik
5. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang prinsip persiapan
6. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang perencanaan anak dalam prosedur diagnostik

PRINSIP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN ANAK DALAM PROSEDUR DIAGNOSTIK

Berdasarkan pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut kata Ath-Thifl yang berarti anak yang masih kecil sebelum usia baligh, maka terdapat empat ayat yang menyebut kata ini secara tekstual. Dua ayat berbicara tentang proses kejadian manusia yang berawal dari air mani, yaitu surah Al-Hajj: 5



Artinya:

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah.


dan surah Ghafir: 67. Sedangkan kedua ayat lainnya yang menyebut kata At-Thifl terdapat dalam surah An-Nur : 31 dan 59 yang menjelaskan tentang adab seorang anak di dalam rumah terhadap kedua orang tuanya.



Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki,

atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.



Artinya:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin[1049]. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Yang paling mendasar dalam pembahasan seputar anak tentu tentang kedudukan anak dalam perspektif Al-Qur'an agar dapat dijadikan acuan oleh orang tua dan para pendidik untuk menghantarkan mereka menuju kebaikan dan memelihara serta meningkatkan potensi mereka. Al-Qur'an menggariskan bahwa anak merupakan karunia sekaligus amanah Allah swt, sumber kebahagiaan keluarga dan penerus garis keturunan orang tuanya. Keberadaan anak dapat menjadi: 1) Penguat iman bagi orang tuanya [QS: 37: 102] seperti yang tergambar dalam kisah Ibrahim ketika merasa kesulitan melakukan titah Allah untuk menyembelih Ismail, justru Ismail membantu agar ayahnya mematuhi perintah Allah swt untuk menyembelihnya, 2) Anak bisa menjadi do'a untuk kedua orang tuanya. [QS: 17: 24], 3) Anak juga dapat menjadi penyejuk hati (Qurratu A'ayun), [QS: 26: 74], 4) menjadi pendorong untuk perbuatan yang baik [QS: 19: 44]. Akan tetapi, pada masa yang sama, anak juga dapat menjadi 5) fitnah, [QS: 8; 28] 6), bahkan anak dapat menjelma menjadi musuh bagi orang tuanya. [QS: 65: 14]

Maka dari itu, para ulama sepakat akan pentingnya masa kanak-kanak dalam periode kehidupan manusia. Beberapa tahun pertama pada masa kanak-kanak merupakan kesempatan yang paling tepat untuk membentuk kepribadian dan mengarahkan berbagai kecenderungan ke arah yang positif. Karena pada periode tersebut kepribadian anak mulai terbentuk dan kecenderungan-kecenderungannya semakin tampak. Menurut Syekh Fuhaim Musthafa dalam karyanya *Manhaj al-Thifl al-Muslim: Dalilul Mu'allimin wal Aba' Ilat-Tarbiyati Abna masa kanak-kanak* ini juga merupakan kesempatan yang sangat tepat untuk membentuk pengendalian agama, sehingga sang anak dapat mengetahui, mana yang diharamkan oleh agama dan mana yang diperbolehkan.

Dalam hal ini, keluarga merupakan tempat pertama dan alami untuk memelihara dan menjaga hak-hak anak. Anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang secara fisik, akal dan jiwanya, perlu mendapatkan bimbingan yang memadai. Di bawah bimbingan dan motifasi keluarga yang continue akan melahirkan anak-anak yang dikategorikan 'qurratu a'yun'.

Untuk mewujudkan semua itu, maka sejak awal Islam telah menyoroti berbagai hal di antaranya penegasan bahwa awal pendidikan seorang anak dimulai sejak sebelum kelahirannya, yaitu sejak kedua orang tuanya memilih pasangan hidupnya. Karena pada dasarnya anak akan tumbuh dan berkembang banyak tergantung dan terwarnai oleh karakter yang dimiliki dan ditularkan oleh kedua orang tuanya. Di antara tujuan disyariatkan pernikahan adalah terselamatkannya keturunan dan terciptanya sebuah keluarga yang hidup secara harmonis yang dapat menumbuhkan nilai-nilai luhur dan bermartabat.

Setiap anak yang akan dilakukan prosedur harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan pendekatan yang baik akan menolong anak dipersiapkan sehingga rasa sakit dan rasa tidak nyaman dapat dirasakan seminimal mungkin. Bagaimanapun seorang perawat harus mengetahui bahwa respon anak dipengaruhi oleh karakteristik perkembangan secara fisik,andaian, faktor lingkungan, pengalaman hospitalisasi, pengalaman prosedur yang telah dialami dan kesehatan seseorang serta pengertian tentang situasi lingkungan setiap anak dikaji tingkah laku secara umum dan kondisi anak berdasarkan respon anak terhadap sakitnya.

Prosedur diagnostik merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk membantu menegakan suatu diagnosis. Suatu persiapan, izinkan anak untuk bertanya sehingga tidak terjadi suatu kesalahpahaman.

Waktu untuk mempersiapkan anak adalah bervariasi sesuai dengan tingkat usia dan jenis prosedur yang akan dilakukan. Jika prosedur yang akan dilaksanakan kompleks, maka waktu yang dibutuhkan cukup lama terutama anak yang sudah cukup besar. Sebagai contoh menerangkan prosedur pengambilan darah yang dapat dilakukan sebelum prosedur dimulai.

Seorang perawat yang sehari-harinya melaksanakan hubungan dengan anak tidak akan mengalami kesulitan untuk melibatkan anak supaya bekerjasama. Tetapi jika perawat tersebut belum mengenal anak, maka hal yang paling baik adalah mengenalkan diri pada anak melalui orang yang sudah dipercaya oleh anak.

Selama pelaksanaan prosedur diagnostik anak memerlukan support yang paling baik bagi anak adalah orang tuanya sendiri. Karena secara alamiah peran orang tua adalah membuat anak merasa aman dan nyaman.

1. Prinsip Persiapan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan anak yang akan dilakukan prosedur diagnostik yaitu :

a. Persiapan mental

Prinsip persiapan anak yang akan dilakukan prosedur seperti pengobatan, pembedahan, terapi fisik adalah sama, yaitu :

- 1) Menentukan dengan detail bentuk prosedur yang akan dilakukan.
- 2) Komunikasi dengan anak dan orang tua untuk menentukan tingkat pengetahuan.
- 3) Rencanakan pengajaran yang disesuaikan dengan perkembangan dan pengetahuan anak.
- 4) Libatkan orang tua dalam pengajaran dan tujuan orang tua dapat bekerjasama dalam pelaksanaan prosedur, karena jika orang tua tidak berpartisipasi akan menyebabkan anak merasa cemas.

Sebelum melakukan prosedur perawat menerangkan apa yang akan dikerjakan dan apa yang diharapkan keterangan yang akan diberikan pada anak. Saat memberikan pengarahan orang tua juga harus hadir, waktu pengarahan direncanakan pada saat yang tepat hingga anak mampu memahaminya.

Penggunaan objek perlengkapan sangat penting untuk anak kecil yang belum mampu berpikir (belum mempunyai konsep, misalkan dengan mengalihkan anak untuk menyentuh alat-alat perawat seperti stetoskop).

Walaupun kata-kata yang tepat digunakan untuk menerangkan prosedur kan bervariasi untuk setiap golongan usia. Penting untuk pertimbangan situasi :

- 1) Gunakan alat Bantu yang konkrit/nyata, jangan abstrak untuk menerangkan prosedur misalnya dengan menggunakan gambar.

- 2) Beritahukan bagian tubuh mana yang akan dilakukan prosedur.
 - 3) Gunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh anak misalnya anestesi adalah tidur yang spesial.
 - 4) Izinkan anak untuk melakukan beberapa prosedur yang melibatkan dirinya misalnya tarik napas dalam.
 - 5) Terangkan pada anak jika karena sesuatu prosedur ada bagian tubuh yang berhubungan, misalnya setelah dilakukan tonsilektomi akan terjadi perubahan suara sementara tapi anak masih dapat berbicara.
 - 6) Berikanlah kepercayaan pada anak dengan cara menerangkan secara jujur jika suatu prosedur memberikan rasa tidak menyenangkan.
 - 7) Tekankan akhir dari prosedur dan hal-hal yang menyenangkan setelah pelaksanaan prosedur misalnya boleh pulang untuk bertemu dengan keluarga.
- b. Persiapan Anak Dilihat Dari Prosedur Perkembangan
- 1) Infant (0-1 Tahun)
 Pada masa ini karakteristik dari perkembangannya membutuhkan kasih sayang dari orang tua, maka untuk tindakan perawatan dalam hal melakukan prosedur kita harus melibatkan orang tua anak. Usahakan agar orang tua dapat mendampingi anak setelah dilakukan prosedur.
 Selain itu, pada masa infant mempunyai karakteristik cemas terhadap orang asing. Maka dalam melakukan prosedur harus selalu perlahan-lahan dan dengan cara halus. Karena pada masa ini merupakan fase sensoris kotor. Selain itu gunakan analgetik misalnya anestesi local, sedapatnya untuk mengurangi rasa sakit. Peluk dan pangkul anak setelah prosedur selesai dan dianjurkan orang tua untuk memberikan rasa aman pada anak, jagalah anak dari objek yang membuat rasa takut.
 - 2) Toddler (1-3 tahun)
 Pada usia ini anak lebih menunjukkan sikap egosentris sehingga perawat perlu menerangkan prosedur sehubungan dengan apa yang akan dialami, didengarnya, dirasakan dan dicium. Perawat dapat mengatakan pada anak bahwa anak boleh menangis/ekspresi verbal untuk menyatakan rasa tidak senangnya dan terangkan pada anak bahwa setiap prosedur juga harus memperhatikan tingkah laku negativisme yaitu dengan menjaga anak saat melaksanakan prosedur dengan teknik komunikasi, gunakan teknik pengalihan perhatian dan restrain adekuat. Dalam menggunakan komunikasi hendaknya perawat menggunakan bahasa yang singkat dan sederhana sesuai dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Berikan satu petunjuk untuk instruksi, misalnya tidur kemudian pegang tangan saya kemudian gunakan peralatan. Demonstrasi dengan menggunakan boneka yang disenangi anak dan anak akan berpikir bahwa bonekanya merasakan prosedur yang dilakukan, siapkan dan lengkapi alat sebelum melibatkan dalam prosedur waktu penjelasan prosedur 5-10 menit.

- 3) Pra sekolah (3 – 5 tahun)
 Pada usia ini anak lebih senang bermain, maka cara pendekatan seorang perawat untuk menerangkan suatu prosedur harus secara sederhana dengan menggunakan alat Bantu sebagai demonstrasi. Jelaskan prosedur pada anak sebelum dan setelah pelaksanaan untuk menghindari pengertian yang salah, karena pada masa ini kemampuan bahasa anak lebih baik, maka anjurkan pada anak untuk mengungkapkan perasaan lewat kata-kata. Pada masa toddler sakit dan hospitalisasi selain disamakan dengan hukuman, maka harus diterangkan kenapa semua prosedur harus dilaksanakan. Setelah itu mintalah anak untuk menjelaskan kembali kenapa suatu prosedur harus dikerjakan dan bereilah pujian untuk kerjasamanya. Waktu penjelasan prosedur \pm 10-15 menit.
- 4) Usia Sekolah (6-12 tahun)
 Pada usia lebih ditekankan pada keluarga bermain, tetapi sistem permainannya lebih terorganisir. Anak selalu ingin belajar dan ingin selalu belajar dan ingin selalu tahu sehingga dalam menerangkan prosedur, kita gunakan ilmu pengetahuan yang sesuai. Terangkan prosedur yang akan dilakukan dengan menggunakan anatomi dan gambar yang sederhana serta terangkan juga fungsi dan mekanismenya. Berikan kesempatan untuk bertanya sebelum dan sesudah melakukan prosedur, karena konsep mulai meningkat rencana pengajaran \pm 20 menit.
- 5) Usia Remaja
 Masa ini merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Biasanya tidak mau berhubungan atau menerima orang yang berusaha mau menjatuhkan harga dirinya. Waktu wawancara jaga kerahasiaan dan bila anak tersebut merasa stress diskusikan maslahnya dengan teman sebaya, orang diluar keluarga dan terbuka pada perawat. Cara berkomunikasi dengan anak remaja adalah berikan kesempatan terlebih dahulu pada orang tua. Perhatikan saat dia berbicara, jangan ditekan, hindari komentar/ekspresi menunjukkan tidak senang. Perawat harus mengantisipasi kemungkinan anak mempunyai ciri bahasa atau kultur sendiri yang memungkinkan berbeda dengan orang lain. Tumbuhkan sikap perawat pada anak bahwa perawat mau menjaga kerahasiaannya.

2. Perencanaan Anak Dalam Prosedur Diagnostik

a. Pengkajian dan perencanaan

Sebelum memulai suatu prosedur perawat harus menyiapkan anak tersebut dan mengkaji sejauh mana kerjasama dan hambatan yang dihadapinya. Sebelum prosedur dilakukan hendaknya perawat menjelaskan kepada anak dan orang tua \rightarrow Support orang tua. Hanya saja kehadiran orang tua dan anak itu sendiri. Di beberapa instansi anak-anak dan remaja dapat berpartisipasi dan diberi pilihan untuk melakukannya juga.

b. Diagnosa perawatan

Seorang perawat mengkaji anak secara khusus berawal dari prosedur yang spesifik dan membuat diagnosis yang sesuai. Sebagian besar anak mempunyai tingkat pengalaman yang berbeda-beda misalnya :

- 1) Cemas sehubungan dengan :
 - a) Adanya ancaman terhadap integritas tubuh akibat prosedur invasive.
 - b) Merasa kehilangan seseorang yang dianggap penting karena persiapan yang sementara.
 - c) Perubahan lingkungan yang asing.
 - d) Hospitalisasi.
 - e) Pembedahan dan akibatnya.
 - f) Kecemasan orang tua.
 - g) Kurangnya pengetahuan.
- 2) Koping individu yang tidak efektif sehubungan dengan :
 - a) Lingkungan yang asing.
 - b) Nyeri akibat prosedur.
 - c) Keterbatasan pengetahuan.
- 3) Ketidaknyamanan sehubungan dengan :
 - a) Akibat tindakan
 - b) Posisi yang tidak sesuai

c. Pelaksanaan Prosedur

Sebelum prosedur dimulai hendaknya perawat memberikan pengarahan juga harus mempersiapkan peralatan dan ruangan. Hal ini untuk mencegah penundaan yang tidak perlu dan tindakan yang berlebihan karena akan meningkatkan rasa cemas. Jika memungkinkan prosedur dilakukan di ruangan tindakan. Melibatkan anak dalam tindakan akan menolong supaya mereka mau bekerjasama. Izinkan mereka untuk memberikan pilihan jika situasinya memungkinkan bagaimanapun juga pilihan yang diberikan harus sesuai dengan jadwal tindakan yang bermanfaat bagi anak.

Bimbinglah anak agar percaya bahwa mengambil keputusan untuk menolak atau menunda pengobatan adalah dibenarkan jika hal ini tidak mengubah program pengobatan tidak kacau. Tempatkan anak dalam keadaan/situasi yang menarik perhatiannya terhadap prosedur yang berkurang.

Izinkanlah anak untuk mengekspresikan perasaan misalnya : marah, cemas, takut atau emosi karena suatu tingkah laku yang diperlihatkan anak merupakan koping. Ini adalah hal yang wajar, respon apapun yang diperlihatkan anak, perawat harus dapat menerimanya. Bimbinglah anak untuk melakukan teknik koping yang baik.

Cara untuk membantu koping anak adalah :

- 1) Berikan informasi melalui penjelasan secara verbal.
- 2) Perawatan terhadap stress.
- 3) Modeling.
- 4) Kehadiran orang tua.

- 5) Aktivitas gerak.
- 6) Bermain.
- 7) Relaksasi.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan 5 dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Buat rumusan tentang prinsip persiapan !
2. Buat rumusan tentang persiapan anak untuk prosedur diagnostik !

Rangkuman

1. 2 hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan anak yang akan dilakukan prosedur diagnostik yaitu persiapan mental dan persiapan anak dilihat dari prosedur perkembangan.
2. Perencanaan anak dalam prosedur diagnostik meliputi 3 hal yaitu pengkajian dan perencanaan, diagnosa keperawatan, dan pelaksanaan prosedur.

Tes Formatif

1. Sebutkan prinsip persiapan mental pada anak yang akan dilakukan prosedur diagnostik !
2. Sebutkan 3 contoh diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan pemberian prosedur diagnostic pada anak !
3. Bagaimana cara membantu koping anak ?

Kunci Jawaban Tes Formatif

1. Prinsip persiapan mental pada anak yang akan dilakukan prosedur diagnostik adalah :
 - a. Menentukan dengan detail bentuk prosedur yang akan dilakukan.
 - b. Komunikasi dengan anak dan orang tua untuk menentukan tingkat pengetahuan.
 - c. Rencanakan pengajaran yang disesuaikan dengan perkembangan dan pengetahuan anak.
 - d. Libatkan orang tua dalam pengajaran dan tujuan orang tua dapat bekerjasama dalam pelaksanaan prosedur, karena jika orang tua tidak berpartisipasi akan menyebabkan anak merasa cemas.
2. Contoh diagnose keperawatan :
 - a. Cemas berhubungan dengan adanya ancaman terhadap integritas tubuh akibat prosedur invasive
 - b. Cemas berhubungan dengan hospitalisasi
 - c. Koping individu tidak efektif berhubungan dengan nyeri akibat prosedur
3. Cara membantu koping anak :
 - a. Berikan informasi melalui penjelasan secara verbal.
 - b. Perawatan terhadap stress.
 - c. Modeling.
 - d. Kehadiran orang tua.

- e. Aktivitas gerak.
- f. Bermain.
- g. Relaksasi.

BAB VI
PROSES KEPERAWATAN
PADA BAYI BARU LAHIR NORMAL/ANAK

SATUAN BAHASAN 6 :

PENGERTIAN NEONATUS, PENANGANAN BAYI SEGERA SETELAH LAHIR, PENATALAKSANAAN BAYI BARU LAHIR, PERAWATAN BAYI BARU LAHIR, IDENTIFIKASI BAYI.

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah ini membahas tentang proses keperawatan pada bayi baru lahir normal/anak, terdiri dari pengertian neonatus, penanganan bayi segera setelah lahir, penatalaksanaan bayi baru lahir, perawatan bayi baru lahir, dan identifikasi bayi.

Pada materi mengenai penatalaksanaan bayi baru lahir dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi, yaitu dinilai dari perhitungan apgar skorenya. Pada bayi normal apgar skorenya yaitu 7-10.

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai pengertian neonates, penanganan bayi segera setelah lahir, penatalaksanaan dan perawatan bayi baru lahir, dan identifikasi bayi. Kemudian buatlah intisari/ringkasan dari pembahasan tersebut. Pahami dengan baik intisari/ringkasan.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian neonatus
2. Mahasiswa dapat memberikan uraian mengenai penanganan bayi segera setelah lahir.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan penatalaksanaan serta perawatan bayi baru lahir.
4. Mahasiswa dapat memberikan uraian sendiri mengenai identifikasi bayi.
5. Mahasiswa memahami manfaat pengetahuan tentang proses keperawatan pada bayi baru lahir normal.

PENGETERIAN NEONATUS, PENANGANAN BAYI SEGERA SETELAH LAHIR, PENATALAKSANAAN BAYI BARU LAHIR, PERAWATAN BAYI BARU LAHIR, IDENTIFIKASI BAYI.

Allah berfirman dalam Qs Al-Hajj []: 5

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

Artinya:

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Perawatan janin merupakan bagian perawatan maternal, karena janin melewati jalan lahir bagaimanapun bayi akan menjadi orang yang berdiri sendiri, membutuhkan perhatian dan supervisi individual.

Waktu kelahiran sempurna adalah segera ketika bayi terpisah dari ibunya, tali pusat dan placenta tidak berhubungan dengan bagian tubuh bayi sehingga posisinya tidak mempengaruhi waktu persalinan.

A. Pengertian

Neonatus atau Bayi Baru Lahir (BBL) adalah bayi baru lahir dari usia 0-28 hari, lahir biasanya dengan usia gestasi 38 minggu sampai 42 minggu.

Askep Neonatus atau BBL : asuhan yang diberikan pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran sebagian besar bayi yang baru lahir akan menunjukkan usaha spontan dengan sedikit bantuan aspek-aspek penting dari asuhan segera bayi yang baru lahir.

B. Penanganan Bayi Segera Setelah Lahir

1. Secara cepat menilai pernapasannya letakkan bayi dengan handuk di atas perut ibu.
2. Kain bersih dan kering atau kasa lap darah atau lendir dari wajah bayi untuk mencegah jalan udaranya terhalang. Periksa ulang pernapasan bayi.
3. Keringkan badan bayi dan cairan ketuban dengan handuk atau kain yang halus dan lembut . Bila bayi tersebut menangis atau bernapas biarkan bayi tersebut dengan ibunya.
4. Bila bayi tersebut tidak bernapas 30 detik segera lakukan bantuan resusitasi.
5. Menilai apgar 1 menit pertama untuk menentukan ada tidaknya asfiksia.
6. Pertolongan tali pusat klem dan potong tali pusat. Klemlah tali pusat dengan dua buah klem, pada titik kira-kira 2 dan 3 cm dari pangkal pusat bayi (tinggalkan kira-kira satu cm di antara klem-klem tersebut). Potonglah tali pusat di antara kedua klem sambil

- melindungi bayi dari gunting dengan tangan kiri anda. Pertahankan kebersihan pada saat memotong tali pusat. Ganti sarung tangan anda bila ternyata sudah kotor. Potonglah tali pusatnya dengan pisau atau gunting yang steril atau disinfeksi tingkat tinggi (DTT). Periksa tali pusat setiap 15 menit. Apabila masih terjadi perdarahan, lakukan pengikatan ulang yang lebih ketat.
7. Sambil menunggu penilaian apgar 5 menit berikut lakukan pemeriksaan ada tidaknya cacat bawaan atau trauma lahir.
 8. Bila nilai apgar 5 menit sama atau lebih besar bayi dapat direncanakan untuk rawat gabung.
 9. Bungkus bayi dengan kain termasuk kepalanya.

C. Penatalaksanaan Bayi Baru Lahir Pemeriksaan Fisik

Nilai Apgar :

Tanda	0	1	2
Apperance Warna Kulit	Biru, Pucat	Badan Merah , Ekst. Biru	Semua Merah
Pulse Denyut Jantung	Tidak ada	< 100	> 100
Grimace reflex	Tidak ada	Sedikit gerakan mimic	Menangis kuat
Activity tonus otot	Lemas	Ada refleksi Ekstremitas	Gerakan aktif
Respiration effort usaha napas	Tidak ada	Lambat/ tidak teratur	Baik/ menangis

Penilaiannya :

1. Asfiksia berat (nilai apgar 0 – 3)
Memerlukan resusitasi segera secara aktif, dan pemberian oksigen terkendali
2. Asfiksia ringan/sedang (nilai apgar 4 – 6).
Memerlukan resusitasi dan pemberian oksigen sampai bayi dapat bernafas normal kembali.
3. Bayi normal (nilai apgar 7 – 10).
 - a) Berat Lahir : 2.500 – 4.000 gram
 - b) Kepala : - ukuran lingkaran kepala 31 – 35 cm
- terdapat kaput suksedaneum
 - c) Mata : - tertutup rapat
- bila terbuka mungkin agak juling
 - d) Hidung : - batang hidung menonjol
 - e) Mulut : - refleks mengisap sudah baik
- memalingkan kepala jika pipi disentuh
 - f) Leher : - bayi tidak dapat mengangkat kepalanya
 - g) Dada : - dada bergerak simetris
- bentuk
- putting

- bunyi nafas
- bunyi jantung
- h) Perut : - ukuran lingkaran perut lebih besar sedikit dari lingkaran dada
- perut lembek dan bundar
- i) Pemeriksaan Refleksi :
 - 1) Refleksi morro : bila posisi bayi dirubah secara tiba-tiba atau mendengar suara yang keras, maka bayi akan menarik kedua tangan dan kedua kaki mendekati ke tubuhnya serta ibu jari dan telunjuk akan membentuk huruf C kemudian kembali lagi seperti semula. Refleksinya berkurang usia 4 bulan dan menghilang pada usia 6 bulan.
 - 2) Refleksi rooting dan sucking : bila pipi dan sudut mulut bayi disentuh dengan ujung jari atau putting susu, bayi akan menoleh kearah sentuhan, lalu membuka mulut dan mulai mengisap. Refleksi ini berkurang pada usia 6 bulan dan hilang pada usia 1 tahun.
 - 3) Swallowing : beri cairan atau basahi lidah maka bayi akan meneleng sambil menghisap. Refleksi ini selalu ada dan tidak hilang.
 - 4) Stepping : bila bayi diberdirikan dengan bantuan dan telapak kakinya didatarkan maka secara otomatis bayi akan melangkah. Refleksi ini hilang pada usia 1 sampai 2 bulan.
 - 5) Palmar Graps : diletakkan jari pada telapak tangan bayi, maka bayi akan menggenggam dengan kuat. Refleksi ini akan berkurang pada usia 4 bulan.
 - 6) Babinski : Refleksi babinski akan hilang pada usia 1 tahun.
- j) Alat Kelamin : - pada bayi laki teraba buah zakar
- testis berada dalam skrotum
- penis berlubang
- pada bayi perempuan hymen sering tertutup
- uretra berlubang
- labia minor dan labia mayor
- k) Dubur : dubur berlubang
- l) Anggota Gerak : - semua anggota gerak dapat bergerak bebas
- gerakan normal
- jumlah jari
- m) Kulit : - verniks
- warna
- pembengkakan atau bercak-bercak hitam
- tanda-tanda lahir
- n) Mekonium : keluar dalam 24 jam pertama. Hari I : bergumpal seperti lendir kental keabuan sepanjang 2-5 cm, frekuensi = 1-2 kali.

D. Perawatan Bayi Baru Lahir

1. Perawatan 1 jam Bayi Baru Lahir :

- a. Memantau tanda vital bayi baru lahir dengan jantung, frekuensi pernapasan, suhu tubuh.
- b. Melaksanakan rawat gabung
- c. Mempertahankan suhu tubuh optimal (36-37⁰ C)
- d. Memberikan kolostrum dan ASI :
 - 1) Menggunakan kedua payudara (kiri dan kanan) secara bergantian
 - 2) ASI diberikan menurut kebutuhan bayi (ondemand)
 - 3) Memerhatikan ibu tentang keadaan umum bagi bayi lahir : kesadaran bayi, warna kulit dan tinja.

Mekonium :

 - 1) Hari 1-3 : kental, hitam, melekar seperti : air frekuensi 4-5 kali.
 - 2) Hari 3-5 : agak encer (seperti ingus) dengan sedikit makanan yang tidak dicerna, warna hijau-sawo matang frekuensi 1-6 kali.
 - 3) Hari 4-5 : warna merah kuning seperti emas lemas seperti tepung (bila minum asi).

2. Perawatan setelah 24 jam

- a. Lakukan perawatan tali pusat :
 - 1) Pertahankan sisi tali pusat dalam keadaan terbuka gar terkena udara dan tutupi dengan kain bersih secara longgar;
 - 2) Lipatlah popok di bawah sisa tali pusat;
 - 3) Jika tali pusat terkena kotoran atau tinja, cuci dengan sabun dan air bersih, dan keringkan betu-betul.
- b. Dalam waktu 24 jam dan sebelum ibu dan bayi dipulangkan ke rumah, berikan imunisasi – BCG, polio oral, dan hepatitis B.
- c. Ajarkan tanda-tanda bahaya bayi pada orang tua dan beritahu orang tua agar merujuk bayi segera untuk perawatan lebih lanjut, jika ditemui tanda-tanda tersebut.
- d. Ajarkan pada orang tua cara merawat bayi mereka dan perawatan harian untuk bayi baru lahir :
- e. Beri ASI sesuai dengan kebutuhan setiap 2-3 jam (paling sedikit setiap 4 jam), mulai dari hari pertama.
- f. Pertahankan agar bayi selalu denga ibu.
- g. Jaga bayi dalam keadaan bersih, hangat dan kering, dengan mengganti popok dan selimut sesuai dengan keperluan. Pastikan bayi tidak terlalu panas dan terlalu dingin (dapat menyebabkan dehidrasi. Ingat bahwa kemampuan pengaturan suhu bayi masih dalam perkembangan). Apa saja yang dimasukkan ke dalam mulut bayi harus bersih.
- h. Jaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering.
- i. Peganglah, sayangi dan nikmati kehidupan bersama bayi.
- j. Awasi masalah dan kesulitan pada bayi dan minta bantuan jika perlu.
- k. Jaga keamanan bayi terhadap trauma dan penyakit / infeksi.
- l. Ukur suhu tubuh bayi jika tampak sakit atau menyusu kurang baik.
- m. Berikan vitamin K

Untuk mencegah terjadinya perdarahan karena defisiensi vitamin K pada bayi baru lahir, lakukan hal-hal berikut :

- 1) semua bayi baru lahir normal dan cukup bulan perlu diberi vitamin K peroral 1 mg/hari selama tiga hari,
- 2) bayi resiko tinggi diberi vitamin K parenteral dengan dosis 0,5 – 1 mg I.M.

E. Identifikasi Bayi

Alat pengenal untuk memudahkan identifikasi bayi perlu dipasang segera pascapersalinan. Alat pengenal yang efektif harus diberikan kepada setiap bayi baru lahir dan harus tetap di tempatnya sampai waktu bayi dipulangkan.

1. Alat yang digunakan, hendaknya kebal air, dengan tepi yang halus tidak mudah melukai, tidak mudah sobek, dan tidak mudah lepas.
2. Pada alat / gelang identifikasi harus tercantum :
 - a) nama (bayi, ibunya),
 - b) tanggal lahir,
 - c) nomor bayi,
 - d) jenis kelamin,
 - e) unit.
3. Di setiap tempat tidur harus diberi tanda dengan mencantumkan nama, tanggal lahir, nomor identifikasi.
4. Sidik telapak kaki bayi dan sidik jari ibu harus dicetak di catatan yang tidak mudah hilang. Ukurlah berat lahir, panjang bayi, lingkaran kepala, lingkaran perut dan catat dalam rekam medis.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan 6, dipersilahkan mengerjakan latihan berikut:

1. Buat rumusan tentang pengertian neonatus.
2. Buat uraian tentang penatalaksanaan bayi baru lahir.

Rangkuman

1. Neonatus atau Bayi Baru Lahir (BBL) adalah bayi baru lahir dari usia 0-28 hari, lahir biasanya dengan usia gestasi 38 minggu sampai 42 minggu.
2. Penatalaksanaan bayi baru lahir dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi, yaitu dinilai dari perhitungan apgar skorenya. Pada bayi normal apgar skorenya yaitu 7-10
3. Perawatan bayi baru lahir terbagi dua, yaitu: perawatan 1 jam bayi baru lahir dan perawatan bayi setelah 24 jam.
4. Alat pengenal untuk memudahkan identifikasi bayi perlu dipasang segera pascapersalinan, dan diberikan kepada setiap bayi baru lahir.

Tes Formatif

1. Jelaskan perbedaan neonatus dengan asuhan keperawatan neonatus!
2. Sebutkan langkah-langkah penanganan bayi segera setelah lahir!
3. Sebutkan perawatan apa saja yang diberikan pada bayi baru lahir setelah 1 jam!
4. Sebutkan alat pengenal yang efektif yang diberikan untuk memudahkan identifikasi bayi.

Kunci Jawaban

1. Neonatus atau Bayi Baru Lahir (BBL) adalah bayi baru lahir dari usia 0-28 hari, lahir biasanya dengan usia gestasi 38 minggu sampai 42 minggu. Sedangkan Askep Neonatus atau BBL adalah asuhan yang diberikan pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran sebagian besar bayi yang baru lahir akan menunjukkan usaha spontan dengan sedikit bantuan aspek-aspek penting dari asuhan segera bayi yang baru lahir.
2. Langkah-langkah penanganan bayi segera setelah lahir yaitu:
 - a. Secara cepat menilai pernapasannya letakkan bayi dengan handuk di atas perut ibu.
 - b. Kain bersih dan kering atau kasa lap darah atau lendir dari wajah bayi untuk mencegah jalan udaranya terhalang. Periksa ulang pernapasan bayi.
 - c. Keringkan badan bayi dan cairan ketuban dengan handuk atau kain yang halus dan lembut . Bila bayi tersebut menangis atau bernapas biarkan bayi tersebut dengan ibunya.
 - d. Bila bayi tersebut tidak benapas 30 detik segera lakukan bantuan resusitasi.
 - e. Menilai apgar 1 menit pertama untuk menentukan ada tidaknya asfiksia.
 - f. Pertolongan tali pusat klem dan potong tali pusat. Klemlah tali pusat dengan dua buah klem, pada titik kira-kira 2 dan 3 cm dari pangkal pusat bayi (tinggalkan kira-kira satu cm di antara klem-klem tersebut). Potonglah tali pusat di antara kedua klem sambil melindungi bayi dari gunting dengan tangan kiri anda. Pertahankan kebersihan pada saat memotong tali pusat. Ganti sarung tangan anda bila ternyata sudah kotor. Potonglah tali pusatnya dengan pisau atau gunting yang steril atau disinfeksi tingkat tinggi (DTT). Periksa tali pusat setiap 15 menit. Apabila masih terjadi perdarahan, lakukan pengikatan ulang yang lebih ketat.
 - g. Sambil menunggu penilaian apgar 5 menit berikut lakukan pemeriksaan ada tidaknya cacat bawaan atau trauma lahir.
 - h. Bila nilai apgar 5 menit sama atau lebih besar bayi dapat direncanakan untuk rawat gabung.
 - i. Bungkus bayi dengan kain termasuk kepalanya.
3. Perawatan 1 jam Bayi Baru Lahir :
 - a. Memantau tanda vital bayi baru lahir dengan jantung, frekuensi pernapasan, suhu tubuh.
 - b. Melaksanakan rawat gabung

- c. Mempertahankan suhu tubuh optimal (36-37⁰ C)
 - d. Memberikan kolostrum dan ASI :
 - 1) Menggunakan kedua payudara (kiri dan kanan) secara bergantian
 - 2) ASI diberikan menurut kebutuhan bayi (ondemand)
 - 3) Memeperhatikan ibu tentang keadaan umum bagi bayi lahir : kesadaran bayi, warna kulit dan tinja.
- Mekonium :
- 1) Hari 1-3 : kental, hitam, melekar seperti : air frekuensi 4-5 kali.
 - 2) Hari 3-5 : agak encer (seperti ingus) dengan sedikit makanan yang tidak dicerna, warna hijau-sawo matang frekuensi 1-6 kali.
 - 3) Hari 4-5 : warna merah kuning seperti emas lemas seperti tepung (bila minum asi).
4. Alat pengenal yang efektif yang diberikan untuk memudahkan identifikasi bayi yaitu:
- a. Alat yang digunakan, hendaknya kebal air, dengan tepi yang halus tidak mudah melukai, tidak mudah sobek, dan tidak mudah lepas.
 - b. Pada alat / gelang identifikasi harus tercantum :
 - 1) nama (bayi, ibunya),
 - 2) tanggal lahir,
 - 3) nomor bayi,
 - 4) jenis kelamin,
 - 5) unit.
 - c. Di setiap tempat tidur harus diberi tanda dengan mencantumkan nama, tanggal lahir, nomor identifikasi.
 - d. Sidik telapak kaki bayi dan sidik jari ibu harus dicetak di catatan yang tidak mudah hilang. Ukurlah berat lahir, panjang bayi, lingkaran kepala, lingkaran perut dan catat dalam rekam medis.

BAB VII
ASUHAN KEPERAWATAN
GANGGUAN SISTEM PERNAFASAN PADA ANAK

SATUAN BAHASAN 7:
ASUHAN KEPERAWATAN ASMA, BRONKOPNEUMONIA,
DAN IRDS.

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah pada BAB ini akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada gangguan sistem pernapasan yang meliputi asuhan keperawatan pada penyakit asma, bronkopneumonia, dan IRDS

Mengenai asuhan keperawatan pada pasien Asma, bronkopneumonia, dan IRDS akan dibahas mengenai konsep medis dari setiap penyakit di atas baik pengertian, etiologi, patofisiologi, pemeriksaan penunjang maupun penatalaksanaan/pengobatan pada setiap kasus, serta asuhan keperawatannya sendiri yang meliputi pengakajian, dignosa keperawatan ,perencanaan, dan intervensi keperawatan.

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai konsep medis dari setiap penyakit maupun asuhan keperawatannya. Kemudian buat intisari/ringkasan mengenai hal-hal yang penting dalam pembahasan tersebut. Selanjutnya fahami dengan baik intisari/ringkasan yang telah dibuat.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai konsep medis penyakit asma
2. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada pasien asma
3. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai konsep medis penyakit bronkopneumonia.
4. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada pada pasien dengan penyakit bronkopneumonia
5. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep medis IRDS
6. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada kasus IRDS.

ASUHAN KEPERAWATAN ASMA, BRONKOPNEUMONIA, DAN IRDS

ASMA

1. Pengertian

Asma adalah suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respon trachea dan bronchus terhadap berbagai rangsangan dengan manifestasi adanya penyempitan luas jalan napas dan derajatnya dapat berubah-ubah, baik secara spontan maupun sebagai hasil pengobatan. (*The American Thoracic Society*, 1962).

Asma bronchiale adalah obstruksi atau penyempitan sebagian dari bronchus yang bersifat reversible disertai dengan berkurangnya aliran udara dan wheezing. (J. Purnawan, 1997 ; 208).

Asma adalah keadaan klinik yang ditandai oleh masa penyempitan bronchus reversible, dipisahkan oleh masa dimana ventilasi mendekati keadaan normal. (Sylvia AP, 1992 ; hal. 147).

2. Etiologi

Dari kategori asma, maka penyebab dari penyakit asma dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Asma ekstrinsik atau alergik, disebabkan oleh alergen yang diketahui. Bentuk ini biasanya ada riwayat keluarga yang mempunyai penyakit atopik dengan demam jerami, eksema, dermatitis dan asma sendiri. Asma ini disebabkan oleh kepekaan individu terhadap alergen.
- b. Asma intrinsik atau idiopatik, sering tidak ditemukan faktor yang jelas. Faktor – faktor yang non spesifik diduga penyakit influenza, latihan fisik dan emosi.
- c. Asma campuran, yang mana terdiri dari komponen-komponen asma ekstrinsik dan intrinsik.

3. Patologi

Asma ialah penyakit paru dengan cirri khas yakni saluran napas sangat mudah bereaksi terhadap berbagai ransangan atau pencetus dengan manifestasi berupa serangan asma. Kelainan yang didapatkan adalah: Otot bronkus akan mengkerut (terjadi penyempitan), Selaput lendir bronkus uedema. Produksi lendir makin banyak, lengket dan kental, sehingga ketiga hal tersebut menyebabkan saluran lubang bronkus menjadi sempit dan anak akan batuk bahkan dapat sampai sesak napas. Serangan tersebut dapat hilang sendiri atau hilang dengan pertolongan obat.

Pada stadium permulaan serangan terlihat mukosa pucat, terdapat edema dan sekresi bertambah. Lumen bronkus menyempit akibat spasme. Terlihat kongesti pembuluh darah, infiltrasi sel eosinofil dalam secret didalam lumen saluran napas. Jika serangan sering terjadi dan lama atau menahun akan terlihat deskuamasi (mengelupas) epitel, penebalan membran hialin bosal, hyperplasia serat elastin, juga hyperplasia dan hipertrofi otot bronkus. Pada serangan yang berat atau pada asma yang menahun terdapat penyumbatan bronkus oleh mucus yang kental.

Pada asma yang timbul akibat reaksi imunologik, reaksi antigen – antibody menyebabkan lepasnya mediator kimia yang dapat menimbulkan kelainan patologi tadi. Mediator kimia tersebut adalah:

- a. Histamin
 - Kontraksi otot polos
 - Dilatasi pembuluh kapiler dan kontraksi pembuluh vena, sehingga terjadi edema
 - Bertambahnya sekresi kelenjar dimukosa bronchus, bronkholius, mukosaa, hidung dan mata
- b. Bradikinin
 - Kontraksi otot polos bronchus
 - Meningkatkan permeabilitas pembuluh darah
 - Vasodepressor (penurunan tekanan darah)
 - Bertambahnya sekresi kelenjar peluh dan ludah
- c. Prostaglandin
 - bronkokostriksi (terutama prostaglandin F)

4. Patofisiologi

Perubahan jaringan pada asma tanpa komplikasi terbatas pada bronchus dan terdiri dari spasme otot polos, oedema mukosa dan hipersekresi mukus.

Mobilisasi sekret pada lumen dihambat oleh penyempitan saluran udara dan mengelupasnya sel epitel bersilia, yang dalam keadaan normal membantu membersihkan mukus.

Salah satu sel yang memegang peranan penting pada patogenesis asma ialah sel mast. Sel mast dapat terangsang oleh berbagai pencetus misalnya alergen, infeksi, “exercise”, dan lain-lain. Sel ini akan mengalami degranulasi dan mengeluarkan bermacam-macam mediator misalnya histamin, bradikinin, enzim-enzim dan peroksidase. Selain mast, sel basofil dan beberapa sel lain dapat juga mengeluarkan mediator.

Bila alergen sebagai pencetus maka alergen yang masuk ke dalam tubuh merangsang sel plasma/sel pembentuk antibodi lainnya untuk menghasilkan antibodi reagenik (Ig E). selanjutnya Ig E akan beredar dan menempel pada reseptor yang sesuai pada dinding sel mast. Sel mast yang demikian disebut sel mast yang tersensitasi. Alergen tersebut akan menempel pada sel mast yang tersensitasi dan kemudian akan terjadi degradasi dinding dan degranulasi sel mast. Mediator dapat bereaksi langsung dengan reseptor di mukosa bronchus sehingga menurunkan siklik AMP (*Adenosin Mono Fosfat*) kemudian terjadi bronkokonstriksi. Mediator dapat juga menyebabkan bronkokonstriksi dengan mengiritasi reseptor iritant.

Permeabilitas epitel dapat juga meningkat karena infeksi, asap rokok dengan peningkatan aktivitas reseptor iritan. Mediator dapat pula meninggikan permeabilitas dinding kapiler sehingga Ig E dan leukosit masuk ke dalam jaringan ikat bronkus, terjadi reaksi type III pada leukosit (reaksi kompleks antigen – antibody) kemudian terjadi kerusakan leukosit, lisosom keluar, kerusakan jaringan setempat dan

pengeluaran prostaglandin serta mediator lainnya. Prostaglandin F₂ menurunkan siklik AMP dan terjadi bronkokonstriksi.

Ujung syaraf vagus merupakan reseptor batuk dan reseptor taktil (iritan) yang dapat terangsang oleh mediator, peradangan setempat dan pencetus bukan alergen lainnya sehingga terjadi refleksi parasimpatis, kemudian bronkokonstriksi.

5. Gambaran klinik

- a. Wheezing
- b. Dyspnea dengan lama ekspirasi, penggunaan otot-otot asesori pernapasan
- c. pernapasan cuping hidung
- d. batuk kering (tidak produktif) karena secret kental dan lumen jalan napas sempit
- e. diaphoresis
- f. sianosis
- g. nyeri abdomen karena terlibatnya otot abdomen dalam pernapasan
- h. kecemasan, labil dan penurunan tingkat kesadaran
- i. tidak toleran terhadap aktifitas : makan, bermain, berjalan, bahkan bicara

Gejala asma yang klasik terdiri atas batuk, sesak nafas dan mengi' (wheezing) dan pada sebagian penderita disertai rasa nyeri di dada. Pada waktu serangan penderita bernafas cepat dan dalam, gelisah, duduk dengan menyangga ke depan serta tampak otot-otot bantu pernafasan bekerja keras.

Gejala-gejala tersebut tidak selalu terdapat bersama-sama, sehingga kita mengetahui beberapa tingkatan penderita asma sebagai berikut :

- a. Tingkat Pertama, yaitu penderita asma yang secara klinis normal, tanpa kelainan pemeriksaan fisis maupun kelainan pemeriksaan fungsi parunya. Pada penderita ini timbul gejala asma bila ada faktor pencetus.
- b. Tingkat kedua, yaitu penderita asma tanpa keluhan dan tanpa kelainan pada pemeriksaan fisisnya, tetapi fungsi paru-parunya menunjukkan tanda-tanda obstruksi jalan nafas.
- c. Tingkat ketiga, adalah penderita asma tanpa keluhan tetapi pada pemeriksaan fisis maupun pemeriksaan fungsi paru menunjukkan tanda obstruksi jalan nafas. penderita ini sudah sembuh dari serangan asmanya, tetapi bila tidak meneruskan pengobatannya akan mudah mendapat serangan asma kembali.
- d. Tingkat keempat, adalah penderita yang mengeluh sesak nafas, batuk dan nafas berbunyi. Pada pemeriksaan fisis maupun pemeriksaan spirometri dan ditemukan tanda-tanda obstruksi jalan nafas. penderita tingkat ini terbagi atas beberapa tingkat atau derajat.

Pada serangan asma yang berat gejala-gejala yang timbul makin banyak antara lain:

- 1). Kontraksi otot-otot bantu pernafasan, terutama otot sternokleidomastoideus.
- 2). Cianosis

- 3). Silent chest
 - 4). Gangguan kesadaran
 - 5). Penderita tampak letih
 - 6). Hiperinflasi dada
 - 7). Takikardia
- e. Tingkat kelima, adalah status asmatikus yaitu suatu keadaan darurat medis berupa serangan asma akut yang berat bersifat refrakter sementara, terhadap pengobatan yang diberikan/lasim dipakai. Obstruksi jalan nafas harus diperhatikan dengan serius.

6. Stadium Asma

- a. Stadium I
Waktu terjadinya edema dinding bronkus, batuk proksimal, karena iritasi dan batuk kering. Sputum yang kental dan mengumpul merupakan benda asing yang merangsang batuk
- b. Stadium II
Sekresi bronkus bertambah banyak dan batuk dengan dahak yang jernih dan berbusa. Pada stadium ini anak akan mulai merasa sesak napas berusaha bernapas lebih dalam. Ekspirasi memanjang dan terdengar bunyi mengi. Tampak otot napas tambahan turut bekerja. Terdapat retraksi supra sternal, epigastrium dan mungkin juga sela iga. Anak lebih senang duduk dan membungkuk, tangan menekan pada tepi tempat tidur atau kursi. Anak tampak gelisah, pucat, sianosis sekitar mulut, toraks membungkuk ke depan dan lebih bulat serta bergerak lambat pada pernapasan. Pada anak yang lebih kecil, cenderung terjadi pernapasan abdominal, retraksi supra sternal dan interkostal.
- c. Stadium III
Obstruksi atau spasme bronkus lebih berat, aliran udara sangat sedikit sehingga suara napas hampir tidak terdengar. Stadium ini sangat berbahaya karena sering disangka ada perbaikan. Juga batuk seperti ditekan. Pernapasan dangkal, tidak teratur dan frekuensi napas yang mendadak meninggi.

7. Pemeriksaan Diagnosis

- a. Spirometri untuk menunjukkan adanya obstruksi jalan nafas reversibel.
Peningkatan FEV₁, atau FVC sebanyak > 20% menunjukkan diagnosis asma.
- b. Tes provokasi, untuk menunjukkan hiperaktivitas bronchus.
Penurunan FEV₁, sebesar 20% atau lebih setelah test provokasi menunjukkan hiperaktivitas bronchus.
- c. Pemeriksaan test kulit, untuk menunjukkan adanya antibodi Ig E yang spesifik dalam tubuh. Test ini hanya menyokong anamnesis, karena alergen yang menunjukkan test kulit positif (+) tidak selalu merupakan penyebab asma, sedangkan hasil negatif (-) tidak selalu berarti tidak ada faktor kerentanan kulit.
- d. Pemeriksaan kadar Ig E total dan Ig E spesifik untuk menyokong adanya penyakit atopi.

- e. Pemeriksaan radiologi (foto thoraks), dilakukan bila ada kecurigaan terhadap proses patologik di paru atau komplikasi asma.
- f. Analisis gas darah, dilakukan pada penderita asma berat. Pada keadaan tersebut dapat terjadi hipoksemia, hiperkapnia dan asidosis respiratorik.
- g. Pemeriksaan eosinofil dalam darah, dapat membantu membedakan asma dengan bronchitis kronik. Pada penderita asma jumlah eosinofil dalam darah biasanya meningkat.
- h. Pemeriksaan sputum, untuk melihat adanya eosinofil dan meselium *Aspergillus Fumigatus*.

8. Komplikasi

- a. Pneumotoraks
- b. Pneumodiastinum dan emfisema sub kutis
- c. Atelektasis
- d. Gagal nafas
- e. Bronchitis
- f. Fraktur iga

9. Penatalaksanaan

- Prinsip umum pengobatan asma bronchiale adalah :
- a. Menghilangkan obstruksi jalan nafas dengan segera.
 - b. Mengenal dan menghindari faktor-faktor yang dapat mencetuskan serangan asma.
 - c. Memberikan pendidikan kesehatan kepada penderita dan keluarganya mengenai penyakit asma baik mengenai cara pengobatan maupun perjalanan penyakitnya.

10. Prognosis

- a. Tergantung pada tipe awal, manifestasi alergik mungkin akan berkurang dengan bertambahnya usia.
- b. Pengobatan di antara waktu serangan sering mencegah serangan akut.
- c. Status asmatikus tetap merupakan sindrom yang mengancam jiwa penderita.

Asuhan Keperawatan

I. Pengkajian

1. Riwayat asthma atau alergi dan serangan asthma yang lalu, alergi dan masalah pernapasan
2. Kaji pengetahuan anak dan orang tua tentang penyakit dan pengobatan
3. Riwayat psikososial: factor pencetus, stress, latihan, kebiasaan dan rutinitas, perawatan sebelumnya
4. Pemeriksaan fisik
 - a. Pernapasan
 1. Napas pendek
 2. Wheezing
 3. Retraksi

4. Takipnea
5. Batuk kering
6. Ronkhi
- b. Kardiovaskuler
 - Takikardia
- c. Neurologis
 1. Kelelahan
 2. Ansietas
 3. Sulit tidur
- d. Muskuloskeletal
 - Intolerans aktifitas
- e. Integumen
 1. Sianosis
 2. pucat
- f. Psikososial
 - Tidak kooperatif selama perawatan
5. Kaji status hidrasi
 - a. Status membran mukosa
 - b. Turgor kulit dan Output urine

II. Diagnosa Keperawatan

1. Gangguan pertukaran gas, tidak efektif bersihan jalan napas b.d. bronkospasme dan edema mukosa
2. Kelelahan b.d. hipoksia dan peningkatan kerja pernapasan
3. Perubahan status nutrisi kurang dari kebutuhan b.d. distress GI
4. Resiko kekurangan volume cairan b.d. meningkatnya pernapasan dan menurunnya intake oral
5. Kecemasan b.d. hospitalisasi dan distress pernapasan
6. Perubahan proses keluarga b.d. kondisi kronik
7. Kurang pengetahuan b.d. proses penyakit dan pengobatan]

III. Perencanaan (*nursing care planning*)

- a. Bersihan jalan nafas tak efektif berhubungan dengan bronkospasme, peningkatan produksi sekret.

Tujuan : Bersihan jalan nafas efektif tanpa adanya sumbatan pada jalan nafas

Kriteria evaluasi, pasien akan :

- a. Mempertahankan jalan nafas paten dengan evaluasi bunyi nafas jelas/bersih.
- b. Menunjukkan perilaku untuk memperbaiki bersihan jalan nafas.

Intervensi :

- 1). Auskultasi bunyi nafas
- 2). Kaji/pantau frekuensi nafas
- 3). Catat adanya/derajat dispnea
- 4). Beri posisi yang nyaman
- 5). Pertahankan polusi lingkungan minimum
- 6). Dorong/bantu latihan nafas
- 7). Observasi karakteristik batuk

- 8). Pertahankan masukan cairan sesuai indikasi
 - 9). Berikan bronkodilator aerosol
 - 10). Beri oksigen dan kaji respon distress pernapasan
 - 11). Jangan pernah gunakan sedatif
- b. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan obstruksi jalan nafas, spasme bronchus.

Tujuan : Tidak terjadi kerusakan pertukaran gas.

Kriteria evaluasi, pasien akan :

- a. Menunjukkan perbaikan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat dan bebas gejala distress pernafasan.
- b. Berpartisipasi dalam program pengobatan dalam tingkat kemampuan/situasi.

Intervensi :

- 1.) Kaji frekuensi dan kedalaman pernafasan
 - 2.) Beri posisi yang nyaman
 - 3.) Kaji/awasi perubahan warna kulit dan membran mukosa
 - 4.) Dorong pengeluaran sputum
 - 5.) Auskultasi bunyi nafas
 - 6.) Palpasi fremitus
 - 7.) Awasi tingkat kesadaran/status mental
 - 8.) Awasi tanda-tanda vital
 - 9.) Berikan oksigen tambahan sesuai indikasi
- c. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan dispnea, kelemahan, produksi sputum, mual/muntah.

Tujuan : Terjadi pemenuhan nutrisi yang adekuat/sesuai kebutuhan tubuh.

Kriteria evaluasi, pasien akan :

- a. Menunjukkan peningkatan berat badan menuju tujuan yang tepat.
- b. Menunjukkan perilaku/perubahan pola hidup untuk meningkatkan atau mempertahankan berat badan yang tepat.

Intervensi :

- a. Kaji kebiasaan diet klien
- b. Auskultasi bunyi usus
- c. Berikan perawatan oral
- d. Beri porsi makan kecil tapi sering
- e. Timbang berat badan sesuai indikasi
- f. Kolaborasi dengan ahli gizi/pendukung tim untuk memberikan makanan yang mudah dicerna.
- g. Kaji pemeriksaan laboratorium.

Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan mengacu kepada tujuan yang diharapkan :

- a. Fungsi paru optimal
- b. Anak dapat melakukan aktifitas sehari-hari
- c. Ventilasi/oksigenasi adekuat untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri.
- d. Masukan nutrisi memenuhi kebutuhan kalori.

- e. Bebas infeksi/komplikasi
- f. Proses penyakit/prognosis dan program terapi dipahami.

BRONCHOPNEUMONIA

1. Pengertian

Bronchopneumonia adalah salah satu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pneumonia secara spesifik. Pneumonia adalah proses inflamatori parenkim yang umumnya disebabkan oleh agen infeksius. Jika satu bagian substansial dari satu atau lebih yang terkena, penyakit ini disebut sebagai pneumonia lobaris (Brunner dan Suddarth, 2001)

Bronchopneumonia adalah proses pneumonia yang dimulai di bronkus dan menyebar ke jaringan paru sekitarnya (Engram, Barbara, 1998)

Bronchopneumonia adalah pneumonia yang mempunyai pola penyebaran berbercak, teratur dalam satu atau lebih area terlokalisasi di dalam bronki dan meluas ke parenkim paru yang berdekatan disekitarnya. Bronchopneumonia lebih umum terjadi dibanding pneumonia lobaris (Brunner dan Suddarth 2001).

2. Etiologi/Penyebab

- a. Bakteri (Pneumokokkus, streptokokkus, basilgram (haemophilus influenza).
- b. Virus
- c. Aspirasi (makanan, benda asing, cairan amnion).
- d. Jamur.

3. Patofisiologi

Perubahan saluran nafas secara patofisiologi pada umumnya tidak dapat dibedakan antara beberapa bronchopneumonia. Pada semua kasus hampir disetai bronchitis dan interstitial.

Adanya microorganisme penyebab timbulnya proses peradangannya pada bronchiolus dan alveoli. Perubahan patofisiologi meliputi kerusakan epitel dan pembentukan mucus dan akhirnya terjadi penyumbatan pada bronchus serta dapat pula terjadi infiltrat limfositik pimbrochiolus dan infeksi sel blast baik di duktus alveoli maupun dinding alveolus.

Adapun efek dari bronchopneumonia dalam waktu yang panjang adalah bronchiectasis dan gangguan fungsi paru – paru.

4. Gambaran klinik

- a. Kesulitan dan sakit pada saat pernafasan, nyeri pleuritik, napas dangkal dan mendengkur, takipnea, bunyi nafas diatas area yang mengalami konsolidasi mengecil, kemudian menjadi hilang, krakels, ronki, egofoni, gerakan dada tidak simetris
- b. Menggigil dan demam $38,8^0$ sampai $41,1^0$ C; delirium, diaforesis, anoreksia, malaise, batuk kental, produktif, sputum

kuning kehijauan kemudian berubah menjadi kemerahan atau berkarat.

- c. Gelisah, sianosis, area sirkumoral, dasar kuku kebiruan, takipnea
- d. Masalah masalah psikososial ; disorientasi, ansietas, takut mati

5. Pemeriksaan diagnostik

- a. Pemeriksaan sinar x dada; bercak atau infiltrat difus, efusi pleural. Mengidentifikasi distribusi struktural (misalnya lobar, bronkial); dapat juga menyatakan abses luas/infiltrat, empiema (stapilococcus); infiltrat menyebar atau terlokalisasi (bakterial); atau penyebaran/perluasan infiltrat nodul (lebih sering virus). Pada pneumonia mikoplasma, sinar x dada mungkin bersih.
- b. Pemeriksaan sputum; kultur dan pewarnaan gram
- c. Hitung leukosit ; leukositosis biasanya ada, meskipun sel darah putih rendah terjadi pada infeksi virus, kondisi tekanan imun seperti AIDS, memungkinkan berkembangnya pneumonia bakterial.
- d. Kultur darah, sputum : dapat diambil dengan biopsi jarum, aspirasi transtrakeal, bronkoskopi fiberoftik, atau biopsi pembukaan paru untuk mengatasi organisme penyebab. Lebih dari 1 tipe organisme ada; bakteri yang umum meliputi diplococcus pneumoniae, stapilococcus aureus, A – Hemolitik streptococcus, Hemofilus influenza; CMV.
- e. Penelitian serologik; titer; aglutini dingin
- f. Gas darah arteri Pa O₂ < 80 mmHg ; tidak normal mungkin terjadi, tergantung pada luas paru yang terlibat dan penyakit paru yang ada.
- g. Aspirasi transtrakeal
- h. Bronkoskopi

6. Diagnosis

Diagnosis pneumonia ditegakkan dengan pengumpulan riwayat kesehatan (terutama infeksi saluran pernafasan yang baru saja dialami), pemeriksaan fisik, rontgen dada, kultur darah (invasi aliran darah, yang disebut bakteriemia, sering terjadi), dan pemeriksaan sputum.

7. Komplikasi

Komplikasi yang mungkin timbul pada pneumonia (Susan Martin Tucker, 1998) meliputi :

- a. Atelektasis
- b. Emfisema
- c. Perikarditis superinfeksi
- d. SDPD
- e. Abses paru
- f. Meningitis
- g. Emfisema
- h. Kerusakan fungsi hepar

- i. Edema fulmoner
- j. Gagal pernafasan

8. Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

Pengkajian pernafasan lebih jauh mengidentifikasi manifestasi klinis pneumonia; nyeri, takipnea; penggunaan otot – otot aksesori pernafasan untuk bernafas, nadi cepat, bounding atau bradikardia relatif; batuk; dan sputum purulen. Keparahan, letak, dan penyebab nyeri dada harus diidentifikasi juga hal apa yang dapat menghilangkannya. Segala perubahan dalam suhu dan nadi, jumlah, batuk, dan warna sekresi, frekuensi dan keparahan batuk, dan tingkat takipnea atau sesak nafas juga dipantau. Konsolidasi pada paru – paru dikaji dengan mengevaluasi bunyi nafas (pernafasan bronkial, ronki bronkovesikuler, atau krekles), fremitus, egofoni, pektoriloquy berbisik, dan hasil perkusi (pekok pada bagian dada yang sakit).

b. Diagnosa keperawatan yang paling sering ditemukan pada pneumonia meliputi :

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan inflamasi trakeobronkhial.
2. Kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolar.
3. Resiko tinggi terhadap penyebaran infeksi ketidakadekuatan pertahanan utama.

c. Perencanaan

Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan:

1. Inflamasi trakeobronkial, pembentukan edema, peningkatan produksi sputum.
2. Nyeri pleuritik.
3. Penurunan energi, kelemahan.

Ditandai dengan :

1. Perubahan frekuensi, kedalaman pernapasan.
2. Bunyi napas tak normal, penggunaan otot aksesoris.
3. Dispnea, sianosis.
4. Batuk, efektif atau tak efektif, dengan/tanpa produksi sputum.

Hasil yang diharapkan :

1. Mengidentifikasi/menunjukkan perilaku mencapai bersihan jalan nafas.
2. Menunjukkan jalan nafas paten dengan bunyi nafas bersih, tak ada dispnea, sianosis.

Tindakan/intervensi :

- 1.) Kaji frekuensi/kedalam pernapasan dan gerakan dada.
- 2.) Auskultasi daerah paru, catat area penurunan/tak ada aliran udara dan bunyi napas adventisius, misalnya krekels, mengi.
- 3.) Bantu pasien latihan napas sering. Tunjukkan/bantu pasien mempelajari melakukan batuk, misalnya, menekan dada dan batuk efektif sementara posisi duduk tinggi.

- 4.) Berikan cairan sedikitnya 2500 ml/hari (kecuali kontra indikasi). Tawarkan air hangat, daripada dingin.
- 5.) Bantu mengawasi efek pengobatan nebuliser dan fisioterapi lain, misalnya spirometer intensif, IPPB, tiupan botol, perkusi, drainase postural. Lakukan tindakan diantara waktu makan dan batasi cairan bila mungkin.
menurunkan muntah karena batuk, pengeluaran sputum.
- 6.) Berikan obat sesuai indikasi: mukolitik, ekspektoran, bronkodilator, analgesik.
- 7.) Berikan cairan tambahan, misalnya IV, oksigen humidifikasi, dan ruangan humidifikasi.
- 8.) Awasi seri sinar x dada, GDA, nadi oksimetri.

Gangguan Pertukaran gas, kerusakan berhubungan dengan:

1. Perubahan membran alveolar-kapiler (efek inflamasi).
2. Gangguan kapasitas pembawa oksigen darah (demam, perpindahan kurva oksihemoglobin).
3. Gangguan pengiriman oksigen (hipoventilasi).

Ditandai dengan:

1. Dispnea, sianosis.
2. Takikardia.
3. Gelisah/perubahan mental.
4. Hipoksia.

Hasil yang diharapkan:

1. Menunjukkan perbaikan ventilasi oksigenasi jaringan dengan GDA dalam rentang normal dan tak ada gejala distress pernafasan.
2. Berpartisipasi pada tingkatan untuk memaksimalkan oksigenasi.

Tindakan/intervensi:

- 1.) Kaji frekuensi, kedalaman, dan kemudahan bernafas.
- 2.) Observasi warna kulit, membran mukosa, dan kuku, catat adanya sianosis perifer (kuku) atau sianosis sentral (sirkumoral).
- 3.) Kaji status mental.
- 4.) Awasi frekuensi jantung/irama.
- 5.) Awasi suhu tubuh, sesuai indikasi. Bantu tindakan kenyamanan untuk menurunkan demam dan menggigil, misalnya selimut tambahan/ menghilangkannya, suhu ruangan nyaman, kompres hangat atau dingin.
- 6.) Pertahankan istirahat tidur. Dorong menggunakan tehnik relaksasi nafas dalam, dan batuk efektif.
- 7.) Tinggikan kepala dan dorong sering mengubah
- 8.) Kaji tingkat ansietas. Dorong menyatakan masalah/perasaan. Jawab pertanyaan dengan jujur. Kunjungi dengan sering, atur pertemuan/kunjungan oleh orang terdekat/pengunjung sesuai indikasi.
- 9.) Observasi penyimpangan kondisi, catat hipotensi, banyaknya jumlah sputum merah muda/berdarah, pucat,

sianosis, perubahan tingkat kesadaran, dispnea berat, gelisah.

- 10.) Siapkan untuk/pemindahan ke unit perawatan kritis bila diindikasikan.
- 11.) Berikan terapi oksigen dengan benar, misalnya dengan nasalprong, masker venturi.
- 12.) Awasi GDA, nadi oksimetri.

Infeksi, resiko tinggi terhadap (penyebaran) berhubungan dengan:

1. Ketidakadekuatan pertahanan utama (penurunan kerja silia, perlengkapan secret pernafasan).
2. Tidak adekuat pertahanan sekunder (adanya infeksi, penekanan imun) penyakit kronis, malnutrisi).

Ditandai dengan:

(Tidak dapat diterapkan: tanda-tanda dan gejala-gejala membuat diagnosa actual).

Hasil yang diharapkan.

1. Mencapai waktu perbaikan infeksi berulang tanpa komplikasi.
2. Mengidentifikasi intervensi untuk mencegah/menurunkan resiko infeksi.

Tindakan/intervensi

- 1.) Pantau tanda vital dengan ketat, khususnya selama awal terapi.
- 2.) Anjurkan pasien mempertahankan pengeluaran secret (misalnya meningkatkan pengeluaran daripada menelannya) dan melaporkan perubahan warna, jumlah, dan bau secret.
- 3.) Tunjukkan/dorong tehnik mencuci tangan yang baik.
- 4.) Ubah posisi dengan sering dan berikan pembuangan paru yang baik.
- 5.) Batasi pengunjung sesuai indikasi.
- 6.) Lakukan isolasi pencegahan sesuai individual.
- 7.) Dorong keseimbangan istirahat adekuat dengan aktifitas sedang. Tingkatkan masukan nutrisi adekuat.
- 8.) Awasi keefektifan terapi antimikrobial.
- 9.) Selidiki perubahan tiba-tiba penyimpangan kondisi, seperti peningkatan nyeri dada, bunyi jantung ekstra, gangguan sensori berulangnya demam, perubahan karakteristik sputum.
- 10.) Berikan antimikrobial sesuai indikasi dengan hasil kultur sputum/darah, misalnya, penicillin, eritromisin, tetrasiklin, amikain, sefalosporin; amantadin

ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN DENGAN IRDS

A Pengertian :

Adalah penyakit yang terjadi sebagai akibat tidak adanya, kurangnya atau berubahnya komponen surfaktan pulmoner. Surfaktan, adalah suatu kompleks lipoprotein yang berfungsi untuk mencegah kolapsnya alveoli

B Etiologi

Dihubungkan dengan usia kehamilan, BB bayi Lahir kurang dari 2500 gram. Sering kali pada Bayi dengan berat lahir kurang dari 1000 gram

C Patofisiologi

Sindrom gawat pernafasan atau penyakit membran hialin terjadi akibat tidak adanya/kurangnya, berubahnya komponen surfaktan, suatu kompleks lipoprotein → mengakibatkan kolaps alveoli dan mengakibatkan hipoksia → terjadi konstruksi vaskuler dan penurunan perfusi pulmoner → Gagal nafas progresif.

D. Manifestasi Klinik

1. Takipnea (lebih dari 60 x per menit)
2. Retraksi interkostal dan sterna
3. Dengkur ekspiratori
4. Pernapasan cuping hidung
5. Sianosis sejalan dengan peningkatan hipokseミア
6. daya komplain paru menurun
7. Hipotensi sistemik (pucat perifer, edema, pengisian kapiler tertunda lebih dari 3-4 detik)
8. Penurunan keluaran urine
9. Penurunan suara nafas, Ronchi +
10. Tachicardi pada saat terjadi asidosis dan
11. Hipokseミア

D. Komplikasi

1. Ketidak seimbangan asam basa
2. Pneumothoraks, hipotensi, Asidosis
3. Pneumodiastinum, PDA, BPD.
4. Perdarahan pulmoner
5. Displasia bronkopulmoner
6. Apnea
7. Hipotensi sistemik
8. Anemia
9. Infeksi
10. Perubahan perkembangan bayi

E. Diagnostik test:

1. Kajian foto toraks
2. Analisa Gas Darah
3. Imaturs lecithin-sphingomiolin
4. Darah lengkap
5. Elektrolit : Kalium,calsium,Natrium dan lain-lain.

F. Tindakan medis :

1. Pemberian O₂
2. Pertahankan kestabilan suhu
3. Berikan asupan cairan
4. Pemberian obat
5. Intubasi bila perlu

G. ASUHAN KEPERAWATAN

Pengkajian :

1. Kaji status respiratori
2. Kaji status kardiovaskuler
3. Kaji oksigenasi anak
4. Kaji status hidrasi anak
5. Kaji status nutrisi anak
6. Kaji tingkat pertumbuhan anak
7. Kaji tingkat interaksi bayi-keluarga
8. Kaji koping keluarga

Diagnosa Keperawatan/Intervensi

1. Gangguan Pertukaran gas b/d imatur paru atau kurangnya cairan surfaktan
2. Bersihan jalan nafas tidak efektif
3. Pola nafas tidak efektif
4. Perubahan nutrisi: kurang dari kebutuhan tubuh
5. Hipotermia
6. Perubahan perfusi jaringan
7. Perubahan pertumbuhan dan perkembangan
8. Perubahan pengasuhan
9. Kelebihan volume cairan
10. Resiko tionggi penatalaksanaan program terapeutik tidak efektif

Intervensi Keperawatan

1. Pertahankan stabilitas jantung paru
2. Pantau kedalaman, kesimetrisan, dan irama pernapasan
3. Pantau kecepatan, kualitas dan murmur bunyi jantung
4. Kaji responsivitas terhadap intervensi medis, ventilasi mekanik, pemberian aerosol dan terapi pengganti surfaktan
5. Panatau gas darah arteri
6. Pantau PaO₂
7. Pantau tekanan darah dan fluktuasinya
8. Berikan obat yang diperlukan

9. Optimalkan Oksigenisasi
 - a. Pantau korelasi antara posisi dan hasil pemantauan transkutan
 - b. Atur pelaksanaan perawatan dan prosedur rutin
 - c. Pertahankan posisi dan kepatenan nasal prolons
 - d. Lakukan pengisapan sesuai keperluan
 - e. Berikan sedatif dan analgesik seperlunya
 - f. Pertahankan stabilitas suhu
10. Pertahankan cairan, nutrisi, dan asupan kalori yang seimbang
 - a. Pertahankan akses IV yang diperlukan
 - b. Beri makan melalui rute yang paling sesuai dengan status medis
11. Tingkatkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal
 - a. Pertahankan lingkungan yang terapeutik
 - b. Identifikasi isyarat stress dan interaksi individu
 - c. Sesuaikan intervensi dengan tingkat toleransi individu
 - d. Ajarkan orangtua isyarat-isyarat bayi dan menganjurkan orang tua untuk memegang dan menatalaksanakan perawatan rutin bagi bayi.
 - e. Ikut sertakan anggota keluarga dalam perawatan bayi.

Evaluasi

1. Bayi memiliki fungsi paru yang optimal dengan pertukaran gas dan oksigenisasi yang cukup untuk perfusi jaringan dan pertumbuhan
2. Bayi memenuhi parameter pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan umurnya
3. Orang tua mampu merawat bayinya.

L a t i h a n

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan 7 dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Buat rumusan tentang pengertian asma, bronkopneumonia, dan IRDS !
2. Buat uraian mengenai konsep terjadinya asma, bronkopneumonia, dan IRDS!
3. Buat rumusan tentang perbedaan penanganan/penatalaksanaan pada pasien asma, bronkopneumonia, dan IRDS !
4. Buatlah satu contoh asuhan keperawatan gangguan system pernapasan.

R a n g k u m a n

1. Asma adalah suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respon trachea dan bronchus terhadap berbagai rangsangan dengan manifestasi adanya penyempitan luas jalan napas dan derajatnya dapat berubah-ubah, baik secara spontan maupun sebagai hasil pengobatan.
2. Asma dapat disebabkan karena factor ekstrinsik, intrinsic, maupun campuran. Faktor-faktor ini akan mnstimulus pengeluaran histamine, bradikinin, maupun prostaglandin. Dengan manifestasi klinis wheezing, dispneu, pernapasan cuping hidung, dan sianosis.

3. Prinsip umum penanganan asma yaitu mengenali pencetusnya, menghindari pencetus tersebut dan memberikan pendidikan kesehatan.
4. Bronchopneumonia adalah salah satu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pneumonia secara spesifik. Penyebabnya adalah bakteri, virus, aspirasi dan jamur. Dengan manifestasi klinis kesulitan saat bernapas, gangguan psikologis, demam dan gelisah.
5. Adalah penyakit yang terjadi sebagai akibat tidak adanya, kurangnya atau berubahnya komponen surfaktan pulmoner, dengan manifestasi klinis dispneu, retraksi intercosta, tachikardia, penurunan keluaran urin.
6. Asuhan keperawatan gangguan system pernapasan meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, dan evaluasi.

Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian asma dan IRDS !
2. Apa yang menyebabkan bronkopneumonia dan IRDS ?
3. Jelaskan pengaruh mediator-mediator kimia yang mempengaruhi kejadian asma !
4. Sebutkan diagnose keperawatan yang sering muncul pada kasus bronkopneumonia.
5. Hal-hal apa saja yang harus dikaji pada pasien IRDS ?
6. Jelaskan satu perencanaan keperawatan dari diagnose keperawatan yang sering muncul pada kasus asma.

Kunci Jawaban

1. *Asma* adalah suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respon trachea dan bronchus terhadap berbagai rangsangan dengan manifestasi adanya penyempitan luas jalan napas dan derajatnya dapat berubah-ubah, baik secara spontan maupun sebagai hasil pengobatan.
IRDS Adalah penyakit yang terjadi sebagai akibat tidak adanya, kurangnya atau berubahnya komponen surfaktan pulmoner. Surfaktan, adalah suatu kompleks lipoprotein yang berfungsi untuk mencegah kolapsnya alveoli.
2. *Bronkopneumonia* disebabkan
 - a. Bakteri (Pneumokokkus, streptokokkus, basilgram – (haemophilus influenza).
 - b. Virus
 - c. Aspirasi (makanan, benda asing, cairan amnion).
 - d. Jamur.

IRDS dihubungkan dengan usia kehamilan, BB bayi Lahir kurang dari 2500 gram. Sering kali pada Bayi dengan berat lahir kurang dari 1000 gram
3. Pengaruh mediator kimia pada kasus asma yaitu :
 - a. Histamin
 - Kontraksi otot polos
 - Dilatasi pembuluh kapiler dan kontraksi pembuluh vena, sehingga terjadi edema

- Bertambahnya sekresi kelenjar mukosa bronchus, bronchioles, mukosa, hidung dan mata
- b. Bradikinin
 - Kontraksi otot polos bronchus
 - Meningkatkan permeabilitas pembuluh darah
 - Vasodepressor (penurunan tekanan darah)
 - Bertambahnya sekresi kelenjar peluh dan ludah
- c. Prostaglandin
 - bronkokonstriksi (terutama prostaglandin F)
- 4. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada bronkopneumonia :
 - a. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan inflamasi trakeobronkial.
 - b. Kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolar.
 - c. Resiko tinggi terhadap penyebaran infeksi ketidakadekuatan pertahanan utama.
- 5. Hal-hal yang perlu dikaji pada kasus IRDS yaitu :
 - a. Kaji status respiratori
 - b. Kaji status kardiovaskuler
 - c. Kaji oksigenasi anak
 - d. Kaji status hidrasi anak
 - e. Kaji status nutrisi anak
 - f. Kaji tingkat pertumbuhan anak
 - g. Kaji tingkat interaksi bayi-keluarga
 - h. Kaji coping keluarga
- 6. Satu contoh perencanaan dari diagnosa keperawatan Bersihan jalan nafas tak efektif berhubungan dengan bronkospasme, peningkatan produksi sekret.

Tujuan : Bersihan jalan nafas efektif tanpa adanya sumbatan pada jalan nafas

Kriteria evaluasi, pasien akan :

 - a. Mempertahankan jalan nafas paten dengan evaluasi bunyi nafas jelas/bersih.
 - b. Menunjukkan perilaku untuk memperbaiki bersihan jalan nafas

Intervensi :

 - a. Auskultasi bunyi nafas
 - b. Kaji/pantau frekuensi nafas
 - c. Catat adanya/derajat dispnea
 - d. Beri posisi yang nyaman
 - e. Pertahankan polusi lingkungan minimum
 - f. Dorong/bantu latihan nafas
 - g. Observasi karakteristik batuk
 - h. Pertahankan masukan cairan sesuai indikasi
 - i. Berikan bronkodilator aerosol
 - j. Beri oksigen dan kaji respon distress pernapasan
 - k. Jangan pernah gunakan sedatif

BAB VIII

ASUHAN KEPERAWATAN PADA BAYI DENGAN RISIKO

SATUAN BAHASAN VIII

ASKEP BAYI DENGAN BBLR, HIPERBILIRUBIN DAN TETANUS NEONATORUM

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah pada BAB ini akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada bayi dengan risiko yang meliputi asuhan keperawatan pada BBLR,hiperbilirubin, dan askep bayi dengan tetanus neonatorum.

Mengenai asuhan keperawatan pada bayi dengan BBLR,hiperbilirubin, dan tetanus neonatorum, akan dibahas mengenai konsep medis dari setiap kasus di atas baik pengertian, etiologi, patofisiologi, pemeriksaan penunjang maupun penatalaksanaan/pengobatannya, serta asuhan keperawatannya sendiri yang meliputi pengakajian, diagnosa keperawatan ,perencanaan, dan intervensi keperawatan.

D. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai konsep medis dari setiap kasus maupun asuhan keperawatannya. Kemudian buat intisari/ringkasan mengenai hal-hal yang penting dalam pembahasan tersebut. Selanjutnya fahami dengan baik intisari/ringkasan yang telah dibuat.

E. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai konsep medis pada bayi dengan BBLR
2. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada kasus bayi dengan BBLR.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai konsep medis bayi dengan tetanus neonatorum.
4. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada kasus bayi dengan tetanus neonatorum
5. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep medis tetanus neonatorum
6. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada bayi dengan tetanus neonatorum.

ASKEP BAYI DENGAN BBLR, HIPERBILIRUBIN DAN TETANUS NEONATORUM

1. Askep BBLR

A. Pengertian.

Sejak tahun 1961 WHO telah mengganti istilah *premature baby* dengan *low birth weight baby* (bayi berat lahir rendah = BBLR). Hal ini dilakukan karena tidak semua bayi dengan berat kurang dari 2500 gr pada waktu lahir bayi prematur.

Keadaan ini dapat disebabkan oleh :

1. Masa kehamilan kurang dari 37 minggu dengan berat yang sesuai (masa kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir yang teratur).
2. Bayi *small for gestational age* (SGA) : bayi beratnya kurang dari berat semestinya menurut masa kehamilannya (kecil untuk masa kehamilan = KMK).
3. Bayi cukup bulan : bayi beratnya kurang dari berat semestinya menurut masa kehamilan

Untuk menentukan apakah bayi baru lahir itu prematur (sesuai masa kehamilan = SMK), matur normal, KMK atau besar untuk masa kehamilan (BMK) dapat dipakai *tabel growth charts of weight against gestation*. Pada tabel ini berat bayi matur normal dan bayi prematur (SMK) terletak diantara 10 th percentile dan 90 th percentile. Pada bayi KMK beratnya dibawah 10 th percentile. Bila berat bayi di atas 90 th percentile ia disebut *heavy for dates* atau BMK. Bayi posmatur bila kelahirannya terjadi pada masa kehamilan lebih dari 42 minggu.

B. Etiologi

Faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya persalinan pre term (prematurn) atau berat badan lahir rendah adalah :

1. Faktor ibu.
 - a. Gizi saat hamil kurang
 - b. Umur kurang dari 20 tahun atau diatas 35 tahun.
 - c. Jarak hamil dan bersalin terlalu dekat.
 - d. Penyakit menahun ibu : hipertensi, jantung, gangguan pembuluh darah (perokok).
 - e. Faktor pekerja yang terlalu berat.
2. Faktor kehamilan.
 - a. Hamil dengan hidramnion.
 - b. Hamil ganda.
 - c. Perdarahan ante partum.
 - d. Komplikasi hamil : pre- eklampsia/eklampsia, ketuban pecah dini.
3. Faktor janin .
 - a. Cacat bawaan .
 - b. Infeksi dalam rahim.

4. Faktor yang masih belum diketahui.

C.Diagnosis dan gejala klinik.

1. Sebelum bayi lahir
 - a. Pada anamnesa sering dijumpai adanya riwayat abortus, partus prematurus dan lahir mati.
 - b. Pembesaran uterus tidak sesuai tuanya kehamilan.
 - c. Pergerakan janin yang pertama (Queckening) terjadi lebih lambat, gerakan janin lebih lambat walaupun kehamilannya sudah agak lanjut.
 - d. Pertambahan berat badan ibu lambat dan tidak sesuai menurut seharusnya .
 - e. Sering dijumpai kehamilan dengan oligohidramnion atau bisa pula dengan hidramnion, hiperemesis gravidarum dan pada hamil lanjut dengan toksemia gravidarum atau perdarahan ante partum.
4. Setelah bayi lahir
 - a. Bayi dengan retardasi pertumbuhan intra uterin
 - b. Secara klasik tampak seperti bayi yang kelaparan. Tanda-tanda bayi ini adalah tengkorak kepala keras, gerakan bayi terbatas, verniks kaseosa sedikit atau tidak ada, kulit tipis, kering berlipat-lipat, mudah diangkat. Abdomen cekung atau rata jaringan lemak bawah kulit sedikit, tali pusat tipis, lembek dan berwarna kehijauan
 - c. Bayi prematur yang lahir sebelum kelahiran 37 minggu .
 - d. Verniks kaseosa ada, jaringan lemak bawah kulit sedikit, tulang tengkorak lunak mudah bergerak, muka seperti boneka (Doll – Like) abdomen buncit, tali pusat tebal dan segar menangis lemah, tonus otot hipotoni, dan kulit tipis, merah dan transparant.
 - e. Bayi Small For Date sama dengan bayi retardasi pertumbuhan intra uterin.
 - f. Bayi prematur kurang sempurna pertumbuhan alat-alat dalam tubuhnya karena itu gangguan pernafasan, infeksi, trauma kelahiran, hipotermi dan sebagainya. Pada bayi kecil untuk masa kehamilan (Small For Date) alat-alat dalam tubuh berkembang dibandingkan dengan bayi prematur berat badan sama, karena itu akan lebih muda hidup di luar rahim, namun tetap lebih peka terhadap infeksi dan hipotermi dibandingkan bayi matur dengan berat badan Normal.

Gambaran BBLR.

Gambaran bayi berat badan lahir tergantung dari umur kehamilan sehingga dapat dikatakan bahwa makin kecil bayi atau makin muda kehamilan makin nyata.

Sebagai gambaran umum dapat dikemukakan bahwa bayi berat badan lahir rendah mempunyai karakteristik :

1. Berat kurang dari 2500 gr.
2. Panjang kurang dari 45 cm.
3. Lingkaran dada kurang dari 30 cm.
4. Lingkaran kepala kurang dari 33 cm.
5. Umur kehamilan kurang dari 37 minggu.
6. Kepala relatif lebih besar.
7. Kulit : tipis transparan, rambut lanugo banyak, lemak kulit kurang.
8. Otot hipotonik – lemah .
9. Pernapasan tak teratur dapat terjadi apnea (gagal napas).
10. Ekstremitas : paha abduksi, sendi lutut/kaki fleksi lurus.
11. Kepala tidak mampu tegak.
12. Pernapasan sekitar 45 sampai 50 kali permenit.
13. Frekwensi nadi 100 sampai 140 kali permenit.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam BBLR adalah :

1. Suhu tubuh

- Pusat mengatur napas badan masih belum sempurna .
- Luas badan bayi relatif besar sehingga penguapannya bertambah .
- Otot bayi masih lemah.
- Lemak kulit dan lemak coklat kurang, sehingga cepat kehilangan panas badan.
- Kemampuan metabolisme panas masih rendah , sehingga bayi dengan berat badan lahir rendah erlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak kehilangan panas badan dan dapat dipertahankan sekitar

2. Pernapasan

- Fungsi pengatur pernapasan belum sempurna
- Surfaktan paru – paru masih kurang, sehingga perkembangannya tidak sempurna
- Otot pernapasan dan tulang iga lemah
- Dapat disertai penyakit : penyakit hialin membran, mudah infeksi paru – paru dan gagal pernapasan

3. Alat pencernaan makanan

- Belum berfungsi sempurna sehingga penyerapan makanan dengan banyak lemah/ kurang baik
- Aktivitas otot pencernaan makanan masih belum sempurna, sehingga pengosongan lambung berkurang
- Mudah terjadi regurgitasi isi lambung dan dapat menimbulkan aspirasi pneumonia.

4. Hepar yang belum matang (immatur)

Mudah menimbulkan gangguan pemecahan billirubin, sehingga mudah terjadi hiperbillirubinemia (kuning) sampai kern ikterus.

5. Ginjal masih belum matang.

Kemampuan mengatur pembuangan sisa metabolisme dan air masih belum sempurna sehingga mudah terjadi oedema.

6. Perdarahan dalam otak.

- a. Pembuluh darah bayi BBLR masih rapuh, dan mudah pecah.
- b. Sering mengalami gangguan pernapasan, sehingga memudahkan terjadinya perdarahan dalam otak.
- c. Perdarahan dalam otak memperburuk keadaan dan menyebabkan kematian bayi.
- d. Pemberian O₂ belum mampu diatur sehingga mempermudah terjadi perdarahan dan nekrosis.

E. Pencegahan

Persalinan preterm dapat dicegah dengan upaya :

1. Melakukan pengawasan hamil dengan dan teratur.
2. Melakukan konsultasi terhadap penyakit yang dapat menyebabkan kehamilan dan persalinan.
3. Memberikan nasehat tentang : gizi saat kehamilan : meningkatkan pengertian KB interval; memperhatikan tentang berbagai kelainan yang timbul dan segera melakukan konsultasi ; menganjurkan untuk pemeriksaan tambahan sehingga secara dini penyakit ibu dapat diketahui dan di awasi/diobati
4. Meningkatkan keadaan sosial – ekonomi keluarga dan kesehatan lingkungan .

F. Perawatan BBLR

Dengan memperhatikan gambaran klinik diatas dan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada bayi BBLR, maka perawatan dan pengawasan bayi BBLR ditujukan pada pengaturan panas badan , pemberian makanan bayi, dan menghindari infeksi.

Pengaturan suhu tubuh bayi BBLR

Bayi BBLR mudah dan cepat sekali menderita *Hypotermia* bila berada di lingkungan yang dingin. Kehilangan panas disebabkan oleh permukaan tubuh bayi yang relatif lebih luas bila dibandingkan dengan berat badan, kurangnya jaringan lemak dibawah kulit dan kekurangan lemak coklat (*brown fat*). Untuk mencegah hipotermi, perlu diusahakan lingkungan yang cukup hangat untuk bayi dan dalam keadaan istirahat konsumsi oksigen paling sedikit, sehingga suhu tubuh bayi tetap normal. Bila bayi dirawat dalam inkubator, maka suhunya untuk bayi dengan berat badan kurang dari 2000 gr adalah 35 °C dan untuk bayi dengan BB 2000 gr sampai 2500 gr 34 °C , agar ia dapat mempertahankan suhu tubuh sekitar 37 °C .Kelembaban inkubator berkisar antara 50-60 persen . Kelembaban yang lebih tinggi di perlukan pada bayi dengan sindroma gangguan pernapasan. Suhu inkubator dapat di turunkan 1 °C per minggu untuk bayi dengan berat badan 2000 gr dan secara berangsur angsur ia dapat diletakkan di dalam tempat tidur bayi dengan suhu lingkungan 27 °C-29 °C. Bila inkubator tidak ada, pemanasan dapat dilakukan dengan membungkus bayi dan meletakkan botol-botol hangat di sekitarnya atau dengan memasang lampu petromaks di dekat tempat tidur bayi atau dengan menggu nakan metode kangguru. Cara lain untuk mempertahankan suhu tubuh bayi sekiter 36 °C-37 °C adalah dengan memakai alat *perspexheat shield* yang

diselimuti pada bayi di dalam inkubator. Alat ini berguna untuk mengurangi kehilangan panas karena radiasi. Akhir-akhir ini telah mulai digunakan inkubator yang dilengkapi dengan alat temperatur sensor (*thermistor probe*). Alat ini ditempelkan di kulit bayi. Suhu inkubator di kontrol oleh alat *servomechanism*. Dengan cara ini suhu kulit bayi dapat dipertahankan pada derajat yang telah ditetapkan sebelumnya. Alat ini sangat bermanfaat untuk bayi dengan berat lahir yang sangat rendah.

Bayi dalam inkubator hanya dipakaikan popok. Hal ini penting untuk memudahkan pengawasan mengenai keadaan umum, perubahan tingkah laku, warna kulit, pernapasan, kejang dan sebagainya sehingga penyakit yang diderita dapat dikenal sedini mungkin dan tindakan serta pengobatan dapat dilaksanakan secepat – cepatnya.

Pencegahan infeksi.

Infeksi adalah masuknya bibit penyakit atau kuman kedalam tubuh, khususnya mikroba. Bayi BBLR sangat mudah mendapat infeksi. Infeksi terutama disebabkan oleh infeksi nosokomial. Kerentanan terhadap infeksi disebabkan oleh kadar *immunoglobulin serum* pada bayi BBLR masih rendah, aktifitas bakterisidal neutrofil, efek sitotoksik limfosit juga masih rendah dan fungsi imun belum berpengalaman.

Infeksi lokal bayi cepat menjalar menjadi infeksi umum. Tetapi diagnosis dini dapat ditegakkan jika cukup waspada terhadap perubahan (kelainan) tingkah laku bayi sering merupakan tanda infeksi umum. Perubahan tersebut antara lain : malas menetek, gelisah, letargi, suhu tubuh meningkat, frekwensi pernafasan meningkat, muntah, diare, berat badan mendadak turun.

Fungsi perawatan disini adalah memberi perlindungan terhadap bayi BBLR dari infeksi. Oleh karena itu, bayi BBLR tidak boleh kontak dengan penderita infeksi dalam bentuk apapun. Digunakan masker dan abjun khusus dalam penanganan bayi, perawatan luka tali pusat, perawatan mata, hidung, kulit, tindakan aseptik dan antiseptik alat – alat yang digunakan, isolasi pasien, jumlah pasien dibatasi, rasio perawat pasien yang idea, mengatur kunjungan, menghindari perawatan yang terlalu lama, mencegah timbulnya asfiksia dan pemberian antibiotik yang tepat.

Pengaturan intake

Pengaturan intake adalah menentukan pilihan susu, cara pemberian dan jadwal pemberian yang sesuai dengan kebutuhan bayi BBLR.

ASI (Air Susu Ibu) merupakan pilihan pertama jika bayi mampu mengisap. ASI juga dapat dikeluarkan dan diberikan pada bayi jika bayi tidak cukup mengisap. Jika ASI tidak ada atau tidak mencukupi kususny pada bayi BBLR dapat digunakan susu formula yang komposisinya mirip ASI atau susu formula khusus bayi BBLR.

Cara pemberian makanan bayi BBLR harus diikuti tindakan pencegahan khusus untuk mencegah terjadinya regurgitasi dan masuknya udara dalam usus. Pada bayi dalam inkubator dengan kontak yang minimal, tempat tidur atau kasur inkubator harus diangkat dan

bayi dibalik pada sisi kanannya. Sedangkan pada bayi lebih besar dapat diberi makan dalam posisi dipangku. Pada bayi BBLR yang lebih kecil, kurang giat mengisap dan sianosis ketika minum melalui botol atau menetek pada ibunya, makanan diberikan melalui NGT.

Jadwal pemberian makanan disesuaikan dengan kebutuhan dan berat badan bayi BBLR. Pemberian makanan interval tiap jam dilakukan pada bayi dengan Berat Badan lebih rendah.

Pernapasan

Jalan napas merupakan jalan udara melalui hidung, pharing, trachea, bronchiolus, bronchiolus respiratorius, dan duktus alveolaris ke alveoli. Terhambatnya jalan nafas akan menimbulkan asfiksia, hipoksia dan akhirnya kematian. Selain itu bayi BBLR tidak dapat beradaptasi dengan asfiksia yang terjadi selama proses kelahiran sehingga dapat lahir dengan asfiksia perinatal. Bayi BBLR juga berisiko mengalami serangan apneu dan defisiensi surfaktan, sehingga tidak dapat memperoleh oksigen yang cukup yang sebelumnya di peroleh dari plasenta. Dalam kondisi seperti ini diperlukan pembersihan jalan nafas segera setelah lahir (aspirasi lendir), dibaringkan pada posisi miring, merangsang pernapasan dengan menepuk atau menjentik tumit. Bila tindakan ini gagal, dilakukan ventilasi, intubasi endotrakheal, pijatan jantung dan pemberian natrium bikarbonat dan pemberian oksigen dan selama pemberian intake dicegah terjadinya aspirasi. Dengan tindakan ini dapat mencegah sekaligus mengatasi asfiksia sehingga memperkecil kematian bayi BBLR.

G. Prognosis bayi berat badan lahir rendah

Kematian perinatal pada bayi berat lahir rendah 8 kali lebih besar dari bayi normal pada umur kehamilan yang sama.

Prognosis akan lebih buruk lagi bila berat badan makin rendah.

Angka kematian yang tinggi terutama disebabkan oleh seringnya dijumpai kelainan komplikasi neonatal seperti asfiksia, aspirasi pneumonia, perdarahan intrakranial dan hipoglikemia. Bila bayi ini selamat kadang-kadang dijumpai kerusakan pada saraf dan akan terjadi gangguan bicara, IQ yang rendah, dan gangguan lainnya.

H. Asuhan keperawatan

Pengkajian.

1. Biodata
2. Riwayat kelahiran lalu
3. Status gravid ibu
4. Riwayat persalinan
5. Keadaan bayi saat lahir
6. Apgar skor
7. Pemeriksaan fisik yaitu :
 - a. Aktifitas istirahat

Status sadar, bayi tampak semi koma saat tidur dalam, meringis atau tersenyum, adalah bukti tidur dengan gerakan mata cepat (REM), tidur sehari rata-rata 20 jam.

- b. Sirkulasi
Rata-rata nadi apikal 120-160 dpm, dapat berfluktuasi 70-100 dpm (tidur) sampai 180 dpm (menangis), nadi perifer mungkin lemah, nadi brachialis dan radialis lebih muda dipalpasi daripada nadi femoralis, mur-mur jantung
- c. Eliminasi
Abdomen lunak tanpa distensi, bising usus aktif, urine tidak berwarna atau kuning pucat, dengan 6-10 popok basah / 24 jam.
- d. Makanan / Cairan
Berat badan rerata 2500 - 4000 gram, kurang dari 2500 gram menunjukkan KMK (prematurnya, sindrom rubella, gameli) lebih dari 4000 gram menunjukkan BMK (diabetes maternal atau dapat dihubungkan dengan herediter), pada mulut : saliva banyak.
- e. Neurosensori
Lingkar kepala 32-37 cm, fontanel anterior dan posterior lunak dan datar, caput suksadaneum mungkin ada selama 3-4 hari, mata dan kelopak mata mungkin edema, strabismus dan fenomena mata boneka mungkin ada, lipatan epicantus, adanya refleks (moro, plantar, palmar, babinski) tidak adanya kegugupan, letargi hipotonia, parese.
- f. Pernafasan
Takipnea sementara dapat terlihat, khususnya setelah kelahiran sesaria dan presentase bokong, pola pernafasan diafragmatik dan abdominal dengan gerakan sinkron dari dada dan abdomen, pernafasan dangkal dan cuping hidung, retraksi dinding dada, dan ronchi pada inspirasi atau ekspirasi dapat menandakan aspirasi.
- g. Keamanan
Karena kulit kemerahan atau kebiruan, cepal hematoma tampak sehari setelah kelahiran, peningkatan ukuran pada usia 2-3 hari kemudian direabsorpsi perlahan lebih dari 1-6 bulan, pergerakan ekstremitas dan tonus otot baik.
- h. Seksualitas
Genitalia wanita : labia vagina agak kemerahan atau edema, tanda vagina/hymen dapat terlihat
Genitalia pria : testis turun, scrotum tertutup dengan rugae, fimosis juga biasa terjadi.
- i. Pemeriksaan diagnostik
Leucosit : 18.000/mm³
Hemoglobin : 15-20 gram/dl
Hematokrit : 43%-61%
Bilirubin total : 6 mg/dl pada hari pertama kehidupan, 8 mg/dl 1-2 hari dan 12mg/dl pada 3-5 hari
Dektroksit : tetes glukosa pertama selama 4-6 jam pertama kelahiran rata-rata 40-50 mg/dl, meningkat 60-70 mg/dl pada hari ke-3

Diagnosa keperawatan yang lazim muncul

1. Risiko gangguan nutrisi
2. Risiko Inefektif Thermoregulator (hipotermi)
3. Risiko infeksi
4. Kelebihan volume cairan
5. Risiko asfiksia
6. Risiko aspirasi
7. Gangguan perfusi jaringan
8. Pola napas tak efektif
9. Kecemasan orang tua
10. PK : Peningkatan bilirubin

Rencana keperawatan.

DX I Resiko gangguan nutrisi :

Tujuan : Mencerna masukan nutrisi adekuat untuk penambahan berat badan.

Kriteria hasil :

- a. Berat badan meningkat 750 – 1000 gr / bulan
- b. Berat badan naik 30 gr / hari

Intervensi	Rasional
1. Kaji pola minum bayi dan kebutuhan-kebutuhan nutrisi - Kaji volume, durasi dan upaya selama pemberian minum, kaji respon bayi. - Kaji masukan kalori / nutrisi yang lalu, kenaikan / penurunan BB selalu dicatat	1. Untuk menentukan berapa kebutuhan nutrisi bayi perhari atau kebutuhan minum (cc/ KgBb) sehingga dapat diberikan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya dengan tidak terlepas dari intervensi yang lain yang dapat meningkatkan kenaikan berat badan bayi.
2. Ajarkan pada orang tua tentang tehnik –tehnik pemberian Asi/ Pasi yang efektif	2. Setelah pulang nanti orang tua tidak kaku dan sudah terbiasa memberikan Asi / Pasi pada bayi, dan mengerti kapan bayi sudah mulai haus : misal pada saat menangis.
3. Berikan Intervensi spesifik untuk meningkatkan pemberian makanan peroral yang efektif : a. Pemberian dengan sendok secara	3. Pemberian minum/ makan lewat sendok agar anak tidak bigung dengan puting susu ibu, dan pemberian secara bertahap mengurangi risiko aspirasi. Asi yang

<p>bertahap</p> <p>b. Kontroll stimulasi setiap pemberian makanan</p> <p>c. Anjurkan pada ibu untuk sering –sering meneteki anaknya</p> <p>4. Tingkatkan tidur dan kurangi pemakaian energi yang berlebih</p> <p>5. Berikan pemberian makan / nutrisi dengan proses adaptasi secara bergantian ASI- PASI (sesuai keb. Perhari X BB : Pemberian susuai umur masa kehamilan.</p> <p>6. Timbang BB bayi sebelum dan sesudah makan</p> <p>7. Bersihkan mulut bayi setelah pemberian nutrisi</p>	<p>kandungannya lebih baik dari makan pengganti Asi.</p> <p>4. Tidur yang banyak akan membuat energi yang masuk dirubah menjadi lemak sehingga dapat dipakai sebagai cadangan makanan.</p> <p>5. Mengadaptasikan bayi dengan putting susu supaya tidak bigung, dan melatih reflek mengisap yang baik. Mengetahui kenaikan BB bayi dan keefektifan pemberian nutrisi baik asi maupun Pasi dan mengetahui Jumlah pemasukan.</p> <p>6. Untuk mengetahui seberapa banyak asupan nutrisi yang masuk</p> <p>7. Mencegah terjadinya infeksi dan perkembangan biakan kuman akibat susu basi.</p>
--	--

DX II Risiko Inefektif Thermoregulator (hipotermi) :

Tujuan : Mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal
 Kriteria :

1. Bebas dari tanda – tanda stres dingin atau hipotermia
2. Suhu tubuh : 36,5 – 37,5°C

Intervensi	Rasional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Minitor tanda – tanda vital bayi setiap 4 jam . 2. Minitor suhu bayi <ol style="list-style-type: none"> a. Jika suhu dibawah normal : <ol style="list-style-type: none"> 1. Selimuti dengan 2 selimut. 2. Pasang tutup kepala. b. Jika suhu di atas normal : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lepaskan selimut. 2. Lepaskan tutup kepala. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui fungsi vital organ – organ tubuh terutama termostat regulator suhu tubuh. 2. Fluktuasi suhu tubuh pada bayi sering terjadi, dengan mengenali suhu tubuh (panas atau dingin) maka akan dapat dihindari terjadinya komplikasi hypothermia atau

<p>3. Keringkan setiap bagian untuk mengurangi evaporasi Kurangi dan hindarkan sumber – sumber kehilangan panas pada bayi seperti</p> <p>a. Evaporasi. Saat mandi, sipakan lingkungan yang hangat.</p> <p>b. Konveksi Hindari aliran udara (pendingin udara, jendela, kipas angin) yang langsung mengenai bayi.</p> <p>c. Konduksi Hangatkan seluruh barang – barang dan bahan – bahan untuk perawatan (baju, sprei, dll). Kurangi benda – benda diruangan yang menyerap panas (logam).</p> <p>d. Radiasi Pertahan suhu ruangan.</p> <p>4. Pertahankan suhu incubator.</p>	<p>hyperthermia</p> <p>3. Kehilangan panas pada bayi terjadi sangat cepat, peningkatan suhu 1^o C suhu tubuh akan kehilangan 12 cc / jam. Dengan intervensi tersebut maka dapat direncanakan dengan baik hala – hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi sumber – sumber kehilangan panas pada bayi.</p> <p>4. Inkubator dapat dimanajemenkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bayi.</p>
--	---

DX III Risiko infeksi

Tujuan : Bebas dari tanda – tanda infeksi

Kriteria :

Menunjukkan pemulihan tepat waktu pada puntung tali pusat dan sisi sirkumsisi bebas dari drainase atu eritema

Intervensi	Rasional
<p>1. Kaji factor – factor yang dapat membawa infeksi, seperti :</p> <p>2. a. Tindakan non steril. b. Pengunjung yang banyak c. Lingkungan kotor</p>	<p>1. Untuk menentukan intervensi yang akan diberikan pada bayi.</p> <p>2. Mencegah masuknya organisme – organisme penyebab infeksi (cros infeksi).</p>

<p>dll.</p> <p>d. Posisi saat memberi minum</p> <p>3. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi dan melakukan tindakan.</p> <p>4. Pertahankan tindakan tehnik antiseptik dalam setiap tindakan (seperti : sterilisasi alat dan desinfeksi).</p> <p>5. Pisah bayi – bayi yang mengalami penyakit infeksi.</p> <p>6. Rawat bekas tali pusat dengan menggunakan bethadine dan dibungkus dengan kasa steril.</p> <p>7. Lindungi bayi yang mengalami defisit imun dari infeksi :</p> <p>a. Instruksikan pengunjung untuk cuci tangan sebelum mendekati bayi.</p> <p>b. Batasi pengunjung bila memungkinkan.</p> <p>c. Batasi alat – alat infasif (IV, NGT, specimen Lab dll) untuk yang benar – benar perlu saja.</p> <p>8. Kurangi kerentanan individu terhadap infeksi seperti : pertahankan masukan nutrisi ASI dan PASI</p>	<p>3. Meminimalkan dan membunuh bakteri, jamur dan untuk mencegah infeksi akibat kontaminasi nasokomial.</p> <p>4. Mengurangi risiko penularan penyakit pada bayi lain.</p> <p>5. Mencegah masuknya kuman dan berkembangnya bakteri oleh karena media yang lembab.</p> <p>6. Mengurangi kontak dengan agen penyebab infeksi dan sumber infeksi.</p> <p>7. Nutrisi yang baik, daya tahan tubuh meningkat dan infeksi tidak terjadi.</p>
--	--

DX IV Kelebihan volume cairan

Tujuan : Berkemih 2 – 6 kali dengan haluaran 15 – 60 ml / kg / hari dari hari ke 2 kehidupan

Kriteria :

- a. Tidak ada oedema
- b. Tanda vital dalm batas normal
- c. BB sesuai dengan perkembangan

Intervensi	Rasional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji intake dan output 2. Rencanakan penggantian cairan pada pasien 3. kaji kulit, wajah, area tergantung untuk oedema. Evaluasi derajat oedema. 4. Auskultasi paru dan bunyi jantung 5. Kaji tingkat kesadaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu untuk menentukan fungsi ginjal, kebutuhan penggantian cairan dan penurunan resiko kelebihan cairan 2. Membantu menghindari periode tanpa cairan 3. Edema terjadi terutama pada jaringan yang tergantung 4. Kelebihan cairan dapat menimbulkan edema paru dan GJK dibuktikan oleh terjadinya bunyi napas tambahan, bunyi jantung ekstra. 5. Dapat menunjukkan perpindahan cairan, akumulasi toksin, asidosis, ketidakseimbangan elektrolit, atau terjadinya hipoksia

DX V Risiko asfiksia / aspirasi.

Tujuan : Bebas dari cedera asfiksia / aspirasi

Kriteria : Melakukan adaptasi lingkungan atau kewaspadaan untuk mencegah cedera kecelakaan.

Intervensi	Rasional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji faktor – faktor lingkungan yang membuat bayi beresiko asfiksiasi 2. Diskusikan bahaya berkenaan dengan aspirasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktepatan penyimpanan dan penggunaan kantong plastik, pengikat selimut atau matras kedor, kemungkinan untuk tenggelam, dan gelang – gelang disekitar dot / pengalas dada (khususnya bila alat ini digunakan pada waktu tidur sejenak atau malam hari) membuat bayi beresiko asfiksia 2. Bahaya aspirasi pada bulan pertama paling sering

serta penggunaan dan penyimpanan bedak bayi yang tepat	karena wadah bedak bayi yang karena bentuknya dianggap seperti botol, sehingga membuat risiko inhalasi, aspirasi, dan kemungkinan asfiksia fatal.
3. Berikan bimbingan antisipasi perlunya menepuk bayi supaya sendawa sebelum menempatkan ditempat tidur, posisi yang tepat.	3. Regurgitasi berkenaan dengan peristaltik balik dan spinter kardia rileks atau imatur meningkatkan risiko aspirasi.

DX VII Gangguan perfusi jaringan

Tujuan : Mempertahankan kadar PO₂ dan PCO₂ dalam batas normal

Kriteria :

- a. Membran mukosa merah muda
- b. Prekwensi jantung normal.

Intervensi	Rasional
1. Tinjau ulang informasi yang berhubungan dengan kondisi bayi, seperti lama persalinan, tipe kelahiran apgar skor, kebutuhan tindakan, resusitatif saat kelahiran, dan obat – obatan ibu yang digunakan selama kehamilan atau kelahiran.	1. Persalinan yang lama meningkatkan resiko hipoksia, dan depresi pernapasan dapat terjadi setelah pemberian atau penggunaan obat oleh ibu.
2. Perhatikan usia gestasi, BB, dan jenis kelamin.	2. Neonatus lahir sebelum minggu ke 30 atau BB kurang dari 1500 gr beresiko tinggi terhadap terjadinya RDS.
3. Kaji status pernapasan, perhatikan tanda – tanda distress pernapasan (mis : Tachipnea, pernapasan cuping hidung, retraksi, ronkhi, atau krekels	3. Takhipnea menandakan distress pernapasan khususnya pernapasan lebih besar dari 60 kali / menit setelah 5 jam pertama kehidupan.
4. gunakan pemantauan oksigen transkutan atau oksimeter nadi. Catat kadar setiap jam ubah sisi alat setiap 3 – 4 jam.	4. Memberikan pemantauan non inpasif konstan terhadap kadar oksigen. (catatan : insufisiensi pulmonal biasanya memburuk selama 24 – 48 njam pertama, kemudian

5. Hisap hidung dan orofaring dengan hati-hati sesuai kebutuhan. Batasi waktu obstruksi jalan napas dengan kateter 5 – 10 detik. Observasi pemantau oksigen transkutan atau oksimeter nadi sebelum selama pengisapan.	5. Mungkin perlu untuk mempertahankan kepatenan jalan napas, khususnya pada bayi yang menerima ventilasi terkontrol. Bayi biasanya tidak mengembangkan refleks terkoordinasi, untuk mengisap, menelan dan bernapas sampai gestasi minggu ke 32 sampai ke 34.
6. Observasi terhadap tanda dan lokasi sianosis	6. Sianosis adalah tanda lanjut dari PAO ₂ rendah dan tidak tampak sampai ada sedikit lebih dari 3 g /dl
7. Pantau pemeriksaan lab dengan tepat : grafik seri GDA	7. Hipoksemia, hiperkapnia, dan asidosis menurunkan produksi surfaktan.
8. Berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan.	8. Perbaiki kadar oksigen dan karbon dioksida dapat meningkatkan fungsi pernapasan

DX VIII Pola napas tidak efektif

Tujuan : Mempertahankan pola pernapasan periodik (periode apneik berakhir 5 – 10 detik diikuti dengan periodik pendek ventilasi cepat).

Kriteria :

- Membran mukosa merah muda
- Prekardi jantung normal.

Intervensi	Rasional
1. Kaji frekwensi pernapasan dan pola pernapasan, perhatikan adanya apnea dan perubahan frekwensi jantung tonus otot dan warna kulit berkenaan dengan prosedur atau perawatan. Lakukan pemantauan jantung dan pernapasan yang kontinyu	1. Membantu dalam membedakan periode perputaran pernapasan normal dari serangan apneik sejati, yang terutama sering terjadi sebelum gestasi minggu ke 30
2. Isap jalan napas sesuai kebutuhan	2. Menghilangkan mukus yang menyumbat jalan napas
3. Tinjau ulang riwayat ibu terhadap obat – obatan	3. Magnesium sulfat dan narkotik menekan pusat

yang dapat memperberat depresi pernapasan pada bayi	pernapasan dan aktivitas SSP
4. Posisikan bayi pada abdomen atau posisi terlentang dengan gulungan popok dibawah bahu untuk menghasilkan sedikit hiperekstensi	4. Posisi ini dapat memudahkan pernapasan dan menurunkan episode apneik khususnya pada adanya hipoksia, asidosis metabolik atau hiperkapnia.
5. Berikan rangsang taktil yang segera (mis : gosokkan punggung bayi) bila terjadi Apnea. Perhatikan adanya sianosis, bradikardia atau hipotonia.	5. Merangsang SSP untuk meningkatkan gerakan tubuh dan kembalinya pernapasan spontan.
6. Tempatkan bayi pada matras yang bergelombang	6. Gerakan memberikan rangsangan, yang dapat menurunkan kejadian apneik.
7. Pantau pemeriksaan laboratorium (GDA, glukosa serum, elektrolit, kultur, dan kadar obat)sesuai indikasi	7. Hipoksia, asidosis metabolik, hiperkapnia, hipoglikemia, hipokalsemia, dan sepsis dapat meperberat serangan apneik.
8. Beri oksigen sesuai indikasi.	8. Perbaiki kadar oksigen dan karbon dioksida dapat meningkatkan fungsi pernapasan

DX IX Kecemasan orang tua

Tujuan : Kecemasan berkurang / teratasi

Kriteria :

- Ibu mengerti tentang kondisi bayinya
- Ibu mengetahui cara perawatan bayi dalam incubator.
- Ekspresi tampak tidak cemas

Intervensi	Rasional
1. Kaji tingkat kecemasan orang tua	1. Menentukan sejauh mana tingkatan dari pada klien, apakah sudah memasuki tahap yang lebih tinggi atau tidak

<p>2. Jelaskan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi bayinya sekarang - Perawatan bayi di incubator <p>3. Beri support mental dari petugas</p> <p>4. Beritahu hasil pemeriksaan yang didapatkan.</p>	<p>2. Meningkatkan kepercayaan ibu akan kondisi bayinya</p> <p>3. Meningkatkan harga diri klien sehingga tidak mudah putus asa</p> <p>4. Meyakinkan klien tentang kondisi – kondisi yang bermasalah dalam kesehatan</p>
---	---

DX X PK : Peningkatan bilirubin

Tujuan : Bilirubin dalam batas normal

Kriteria :

Tanda kremer tidak ada

Intervensi	Rasional
<p>1. Kaji tingkatan dari pada ikterus Total billirubin Normal darah perifer : 0-1 hari 6 mg/dl, 1-2 hari : 8 mg/dl, 3-5 hari : 12 mg/dl patologis bila :Terjadi peningkatan 5-7 mg atau lebih pada 24 jam pertama dilahirkan. Konsentrasi billirubin bayi aterm 10 mg % dan , 12,5 % pada premature</p> <p>2. Pertahankan Asupan nutrisi / Asi atau Pasi yang adekuat</p> <p>3. Lakukan prosedur fototerapi sesuai instruksi dokter dalam 24 jam meliputi ; Telentang + luminal Istirahat /minum Miring kiri Istirahat/ minum Miring kanan Istirahat minum Telentang Istirahat /minum</p>	<p>1. Mengetahui tingkatan ikterus pada kremer I – V, dan mengetahui patologis dari munculnya tanda billirubin.</p> <p>2. Agar billirubin mudah larut dalam plasma dan mudah diekstrak ke seluruh empedu</p> <p>3. Fototerapi menyebabkan terjadinya isomerisasi billirubin sehingga billirubin mudah dihantarkan ke empedu dan dikeluarkan dalam saluran pencernaan</p>

Miring kiri + Luminal Istirahat minum Tengkurap Istirahat minum Miring kanan Istirahat minum Terlentang Istirahat/ minum	
---	--

2. Askep Hiperbiliubinemia

a. Definisi :

Hiperbilirubinemia adalah berlebihnya akumulasi bilirubin dalam darah (level normal 5 mg/dl pada bayi normal) yang mengakibatkan jaundice, warna kuning yang terlihat jelas pada kulit, mukosa, sklera dan urine.

b. Etiologi:

Hiperbilirubinemia dapat disebabkan oleh bermacam-macam keadaan. Penyebab yang tersering ditemukan disini adalah hemolisis yang timbul akibat inkompatibilitas golongan darah ABO atau defisiensi enzim G6PD. Hemolisis ini dapat pula timbul karena adanya perdarahan tertutup (sefal hematoma, perdarahan subaponeorotik) atau inkompatibilitas golongan darah Rh. Infeksi juga memegang peranan penting dalam terjadinya hiperbilirubinemia : keadaan ini terutama terjadi pada penderita sepsis dan gastroenteritis. Beberapa faktor lain yang juga merupakan penyebab hiperbilirubinemia adalah hipoksia/anoksia, dehidrasi dan acidosis, hipoglikemia dan polisitemia.

c. Patofisiologi

Peningkatan kadar bilirubin tubuh dapat terjadi pada beberapa keadaan. Kejadian yang sering ditemukan adalah apabila terdapat penambahan beban bilirubin pada sel hepar yang terlalu berlebihan. Hal ini dapat ditemukan bila terdapat peningkatan penghancuran eritrosit, polisitemia, memendeknya umur eritrosit janin/bayi, meningkatnya bilirubin dari sumber lain, atau terdapatnya peningkatan sirkulasi enterohepatik.

Gangguan ambilan bilirubin plasma juga dapat menimbulkan peningkatan kadar bilirubin tubuh. Hal dapat terjadi apabila kadar protein-Y berkurang atau pada keadaan protein-Y dan protein-Z terikat oleh anion lain, misalnya pada bayi dengan acidosis atau dengan hipoksia/anoksia. Keadaan lain yang memperlihatkan peningkatan kadar bilirubin adalah apabila ditemukan gangguan konjugasi hepar (defisiensi enzim glukoronil transferase) atau bayi yang menderita gangguan ekskresi, misalnya penderita hepatitis neonatal atau sumbatan saluran empedu intra/ekstra hepatic.

Pada derajat tertentu, bilirubin ini akan bersifat toksik dan merusak jaringan tubuh. Toksisitas ini terutama ditemukan pada

bilirubin indirek yang bersifat sukar larut dalam air tapi mudah larut dalam lemak. Sifat ini memungkinkan terjadinya efek patologik pada sel otak apabila bilirubin tadi dapat menembus sawar darah otak. Kelainan yang terjadi pada otak ini disebut kern ikterus atau ensefalopati biliaris. Pada umumnya dianggap bahwa kelainan pada susunan saraf pusat tersebut mungkin akan timbul apabila kadar bilirubin indirek lebih dari 20 mg/dl. Mudah tidaknya bilirubin melalui sawar darah otak ternyata tidak hanya tergantung dari tingginya kadar bilirubin tetapi tergantung pula pada keadaan neonatus sendiri. Bilirubin indirek akan mudah melalui sawar darah otak apabila pada bayi terdapat keadaan imaturitas, berat badan lahir rendah, hipoksia, hiperkarbia, hipoglikemia, dan kelainan susunan saraf pusat yang terjadi karena trauma atau infeksi.

Tabel.1 Perbandingan Tipe Unconjugatif Hyperbilirubinemia

	<i>Fisiologis jaundice</i>	<i>Jaundice yang berhubungan dengan Breast feeding</i>	<i>Jaundice Breast milk</i>	<i>Hemolitik disease</i>
<i>Penyebab</i>	Fungsi hepatic immatur ditambah peningkatan bilirubin dari hemolisis RBC	Intake susu yang jelek berhubungan dengan konsumsi kalori yang sedikit pada bayi sebelum susu ibu keluar	Faktor-faktor pada susu ibu yang berubah, bilirubin menjadi bentuk lemak yang mana direabsorbsi usus	Incompatibilitas antigen yang menyebabkan hemolisis sebagian dari RBC. Hati tidak mampu untuk mengkonjugasikan dan mengeksresikan kelebihan bilirubin dari hemolisis
<i>Onset</i>	Setelah 24 jam pertama (bayi prematur, bayi lahir lama)	2 - 3 hari	4 - 5 hari	Selama 24 jam pertama
<i>Puncak</i>	72 jam	2 - 3 hari	10 - 15 hari	Bervariasi
<i>Durasi</i>	Berkurang setelah 5-7 hari		Sampai seminggu	
<i>Terapi</i>	Fototerapi jika bilirubin meningkat dengan cepat	Berikan ASI sesering mungkin, berikan suplemen kalori, fototerapi untuk kadar bilirubin 18 - 20 mg/dl	Hentikan ASI selama 24 jam untuk mendeterminasi sebab, jika kadar bilirubin menurun pemberian ASI dapat diulangi. Dapat dilakukan fototerapi tanpa menghentikan pemberian ASI	Posnatal: fototerapi, bila perlu transfusi tukar Prenatal: Transfusi (fetus) Mencegah sensitisasi dari RH negatif ibu dengan RhoGAM

Pengkajian

1. Riwayat keluarga dan kehamilan:
 - a. Orang tua atau saudara dengan neonatal jaundice atau penyakit lever
 - b. Prenatal care
 - c. DM pada ibu
 - d. Infeksi seperti toxoplasmosis, spilis, hepatitis, rubela, sitomegalovirus dan herpes yang mana ditransmisikan secara silang keplasenta selama kehamilan
 - e. Penyalahgunaan obat pada orang tua
 - f. Ibu dengan Rh negatif sedangkan ayah dengan Rh positif
 - g. Riwayat transfusi Rh positif pada ibu Rh negatif
 - h. Riwayat abortus dengan bayi Rh positif
 - i. Obat-obatan selama kehamilan seperti sulfonamid, nitrofurantoin dan anti malaria
 - j. Induksi oksitosin pada saat persalinan
 - k. Penggunaan vakum ekstraksi
 - l. Penggunaan phenobarbital pada ibu 1-2 bulan sebelum persalinan
2. Status bayi saat kelahiran:
 - a. Prematuritas atau kecil masa kehamilan
 - b. APGAR score yang mengindikasikan asfiksia
 - c. Trauma dengan hematoma atau injuri
 - d. Sepsis neonatus, adanya cairan yang berbau tidak sedap
 - e. Hepatosplenomegali
3. Kardiovaskuler
Edema general atau penurunan volume darah, mengakibatkan gagal jantung pada hidro fetalis
4. Gastrointestinal
 - a. Oral feeding yang buruk
 - b. Kehilangan berat badan sampai 5 % selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori
 - c. Hepatosplenomegali
5. Integumen
 - a. Jaundice selama 24 jam pertama (tipe patologis), setelah 24 jam pertama (Fisiologik tipe) atau setelah 1 bulan dengan diberikan ASI
 - b. Kalor yang disebabkan oleh anemia yang terjadi karena hemolisis RBC
6. Neurologik
 - a. Hipotoni
 - b. Tremor, tidak adanya reflek moro dan reflek menghisap, reflek tendon yang minimal
 - c. Iritabilitas, fleksi siku, kelemahan otot, opistotonis
 - d. Kejang
7. Pulmonari
 - a. Apnu, sianosis, dyspnea setelah kejadian kern ikterus
 - b. Aspiksia, efusi pulmonal

8. Data Penunjang
 - a. Golongan darah dan faktor Rh pada ibu dan bayi untuk menentukan resiko incompatibilitas, Rh ayah juga diperiksa jika Rh ibu negatif (test dilakukan saat prenatal)
 - b. Amniosintesis dengan analisa cairan amnion, Coombs test dengan hasil negatif mengindikasikan peningkatan titer antibodi Anti D, bilirubin level pada cairan amnion meningkat sampai lebih dari 0,28 mg/dl sudah merupakan nilai abnormal (mengindikasikan kebutuhan transfusi pada janin).
 - c. Coombs test (direct) pada darah tali pusat setelah persalinan, positif bila antibodi terbentuk pada bayi.
 - d. Coombs test (indirect) pada darah tali pusat, positif bila antibodi terdapat pada darah ibu.
 - e. Serial level bilirubin total, lebih atau sama dengan 0,5 mg/jam samapi 20 mg/dl mengindikasikan resiko kernikterus dan kebutuhan transfusi tukar tergantung dari berat badan bayi dan umur kehamilan.
 - f. Direct bilirubin level, meningkat jika terjadi infeksi atau gangguan hemolisis Rh
 - g. Hitung retikulosit, meningkat pada hemolisis
 - h. Hb dan HCT
 - i. Total protein, menentukan penurunan binding site
 - j. Hitung leukosit, menurun sampai dibawah 5000/mm³, mengindikasikan terjadinya infeksi
 - k. Urinalsis, untuk mendeteksi glukosa dan aseton, PH dan urobilinogen, kreatinin level

Diagnosa Keperawatan

Dx. 1. Resiko tinggi injuri berhubungan dengan produk sisa sel darah merah yang berlebihan dan imaturitas hati

Tujuan 1: Pasien mendapatkan terapi untuk menyeimbangkan eksresi bilirubin

Tindakan:

1. Kaji adanya jaundice pada kulit, yang mana mengindikasikan peningkatan kadar bilirubin
2. Cek kadar bilirubin dengan bilirobinometer transkutan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan kadar bilirubin
3. Catat waktu terjadinya jaundice untuk membedakan fisiologik jaundice (terjadi setelah 24 jam) dengan patologik jaundice (terjadi sebelum 24 jam)
4. Kaji status bayi khususnya faktor yang dapat meningkatkan resiko kerusakan otak akibat hiperbilirubinemia (seperti hipoksia, hipotermia, hipoglikemia dan metabolik asidosis)
5. Memulai feeding lebih cepat untuk mengeksresikan bilirubin pada feces

Hasil yang diharapkan:

1. Bayi baru lahir memulai feeding segera setelah lahir
2. Bayi baru lahir mendapatkan paparan dari sumber cahaya

Tujuan 2: tidak terjadi komplikasi dari fototerapi

Tindakan:

1. Tutupi mata bayi baru lahir untuk menghindari iritasi kornea
2. Tempatkan bayi secara telanjang dibawah cahaya untuk memaksimalkan paparan cahaya pada kulit
3. Ubah posisi secara teratur untuk meningkatkan paparan pada permukaan tubuh
4. Monitor suhu tubuh untuk mendeteksi hipotermia atau hipertermia
5. Pada peningkatan BAB, bersihkan daerah perianal untuk menghindari iritasi
6. Hindarkan penggunaan minyak pada kulit untuk mencegah rasa pedih dan terbakar
7. Berikan intake fluid secara adekuat untuk menghindari rehidrasi

Hasil yang diharapkan : tidak terjadi iritasi mata, dehidrasi, instabilitas suhu dan kerusakan kulit

Tujuan 3: Tidak adanya komplikasi dari transfusi tukar (jika terapi ini diberikan)

Tindakan:

1. Jangan berikan asupan oral sebelum prosedur (2-4 jam) untuk mencegah aspirasi
2. Cek donor darah dan tipe Rh untuk mencegah reaksi transfusi
3. Bantu dokter selama prosedur untuk mencegah infeksi
4. Catat secara akurat jumlah darah yang masuk dan keluar untuk mempertahankan volume darah
5. Pertahankan suhu tubuh yang optimal selama prosedur untuk mencegah hipotermia dan stress karena dingin atau hipotermia
6. Observasi tanda perubahan reaksi transfusi (Tacykardia, bradikardia, distress nafas, perubahan tekanan darah secara dramatis, ketidakstabilan temperatur, dan rash)
7. Siapkan alat resusitasi untuk mengatasi keadaan emergensi
8. Cek umbilikal site terhadap terjadinya perdarahan atau infeksi
9. Monitor vital sign selama dan setelah transfusi untuk mendeteksi komplikasi seperti disritmia jantung.

Hasil yang diharapkan :

1. Bayi menunjukkan tidak adanya tanda-tanda reaksi transfusi
2. Vital sign berada pada batas normal
3. Tidak terjadi infeksi atau perdarahan pada daerah terpasangnya infus

Dx.2. Perubahan proses keluarga berhubungan dengan bayi dengan potensial respon fisiologis yang merugikan

Tujuan 1: Keluarga dapat memberikan suport emosional

Tindakan:

1. Hentikan fototerapi selama kunjungan keluarga, lepaskan tutup mata bayi untuk membantu interaksi keluarga
2. Jelaskan proses fisiologis jaundice untuk mencegah kekhawatiran keluarga dan potensial over proteksi pada bayi

3. Yakinkan keluarga bahwa kulit akan kembali normal
4. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya untuk memperpendek periode jaundice
5. Jelaskan kegunaan ASI untuk mengatasi jaundice dan penyakit lainnya

Hasil yang diharapkan :

Keluarga menunjukkan pengertian terhadap terapi dan prognosa

Tujuan 2: Keluarga dapat melaksanakan fototerapi di rumah

Tindakan:

1. Kaji pengertian keluarga terhadap jaundice dan terapi yang diberikan
2. Instruksikan keluarga untuk:
 - a. Melindungi mata
 - b. Merubah posisi
 - c. Memberikan asupan cairan yang adekuat
 - d. Menghindari penggunaan minyak pada kulit
 - e. Mengukur suhu aksila
 - f. Mengobservasi bayi: warna, bentuk makanan, jumlah makanan
 - g. Mengobservasi bayi terhadap tanda letargi, perubahan pola tidur, perubahan pola eliminasi
3. Menjelaskan perlunya test bilirubin bila diperlukan

Hasil yang diharapkan:

Keluarga dapat menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan fototerapi di rumah (khususnya metode dan rasional)

3. **Askep Tetanus neonatorum**

Pengertian

Neonatus adalah organisme pada periode adaptasi kehidupan intra uterus ke kehidupan intra uterin hingga berusia kurang dari 1 bulan. (Asri Rosad, 1987)

Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus yang disebabkan oleh clostridium tetani yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) yang menyerang sistem saraf pusat. (Abdul Bari Saifuddin, 2000)

Etiologi

Penyebab penyakit ini adalah clostridium tetani. Kuman ini bersifat anaerobik dan mengeluarkan eksotoksin yang neurotropik.

Epidemiologi

Clostridium tetani berbentuk batang langsing, tidak berkapsul, gram positif. Dapat bergerak dan membentuk sporaspora, terminal yang menyerupai tongkat penabuh genderang (drum stick). Spora spora tersebut kebal terhadap berbagai bahan dan keadaan yang merugikan termasuk perebusan, tetapi dapat dihancurkan jika dipanaskan dengan otoklaf. Kuman ini dapat hidup bertahun-tahun di dalam tanah, asalkan

tidak terpapar sinar matahari, selain dapat ditemukan pula dalam debu, tanah, air laut, air tawar dan traktus digestivus manusia serta hewan.

Patologi

Kelainan patologik biasanya terdapat pada otak pada sumsum tulang belakang, dan terutama pada nukleus motorik. Kematian disebabkan oleh asfiksia akibat spasmus laring pada kejang yang lama. Selain itu kematian dapat disebabkan oleh pengaruh langsung pada pusat pernafasan dan peredaran darah. Sebab kematian yang lain ialah pneumonia aspirasi dan sepsis. Kedua sebab yang terakhir ini mungkin sekali merupakan sebab utama kematian tetanus neonatorum di Indonesia.

Gambaran Klinik

Masa inkubasi biasanya 3 – 10 hari. Gejala permulaan adalah bayi mendadak tidak mau atau tidak bisa menetek karena mulut tertutup (trismus), mulut mencucu seperti ikan, dapat terjadi spasmus otot yang luas dan kejang yang umum. Leher menjadi kaku dan kepala mendongak ke atas (opistotonus). Dinding abdomen kaku, mengeras dan kalau terdapat kejang otot pernafasan, dapat terjadi sianosis. Suhu dapat meningkat sampai 39^o C. Naiknya suhu ini mempunyai prognosis yang tidak baik.

Diagnosis

Diagnosis tetanus neonatorum tidak susah. Trismus, kejang umum, dan mengkakunya otot-otot merupakan gejala utama tetanus neonatorum. Kejang dan mengkakunya otot-otot dapat pula ditemukan misalnya pada kernicterus, hipokalsemia, meningitis, trauma lahir, dan lain-lain. Gejala trismus biasanya hanya terdapat pada tetanus.

Pencegahan

- A. Melalui pertolongan persalinan tiga bersih, yaitu bersih tangan, bersih alas, dan bersih alat.
 1. Bersih tangan
Sebelum menolong persalinan, tangan penolong disikat dan dicuci dengan sabun sampai bersih. Kotoran di bawah kuku dibersihkan dengan sabun. Cuci tangan dilakukan selama 15 – 30 “ . Mencuci tangan secara benar dan menggunakan sarung tangan pelindung merupakan kunci untuk menjaga lingkungan bebas dari infeksi.
 2. Bersih alas
Tempat atau alas yang dipakai untuk persalinan harus bersih, karena clostridium tetani bisa menular dari saluran genital ibu pada waktu kelahiran.
 3. Bersih alat
Pemotongan tali pusat harus menggunakan alat yang steril. Metode sterilisasi ada 2, yang pertama dengan pemanasan kering : 170^o C selama 60 ‘ dan yang kedua menggunakan

otoklaf : 106 kPa, 121^o C selama 30 ' jika dibungkus, dan 20 ' jika alat tidak dibungkus.

B. Perawatan tali pusat yang baik

Untuk perawatan tali pusat baik sebelum maupun setelah lepas, cara yang murah dan baik yaitu menggunakan alkohol 70 % dan kasa steril. Kasa steril yang telah dibasahi dengan alkohol dibungkuskan pada tali pusat terutama pada pangkalnya. Kasa dibasahi lagi dengan alkohol jika sudah kering. Jika tali pusat telah lepas, kompres alkohol ditruskan lagi sampai luka bekas tali pusat kering betul (selama 3 – 5 hari). Jangan membubuhkan bubuk dermatol atau bedak kepada bekas tali pusat karena akan terjadi infeksi.

C. Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada ibu hamil

Kekebalan terhadap tetanus hanya dapat diperoleh melalui imunisasi TT. Ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT dalam tubuhnya akan membentuk antibodi tetanus. Seperti difteri, antibodi tetanus termasuk dalam golongan Ig G yang mudah melewati sawar plasenta, masuk dan menyebar melalui aliran darah janin ke seluruh tubuh janin, yang akan mencegah terjadinya tetanus neonatorum.

Imunisasi TT pada ibu hamil diberikan 2 kali (2 dosis). Jarak pemberian TT pertama dan kedua, serta jarak antara TT kedua dengan saat kelahiran, sangat menentukan kadar antibodi tetanus dalam darah bayi. Semakin lama interval antara pemberian TT pertama dan kedua serta antara TT kedua dengan kelahiran bayi maka kadar antibodi tetanus dalam darah bayi akan semakin tinggi, karena interval yang panjang akan mempertinggi respon imunologik dan diperoleh cukup waktu untuk menyeberangkan antibodi tetanus dalam jumlah yang cukup dari tubuh ibu hamil ke tubuh bayinya.

TT adalah antigen yang sangat aman dan juga aman untuk ibu hamil tidak ada bahaya bagi janin apabila ibu hamil mendapatkan imunisasi TT . Pada ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT tidak didapatkan perbedaan resiko cacat bawaan ataupun abortus dengan mereka yang tidak mendapatkan imunisasi .

Penatalaksanaan

a. Medik

1. Mengatasi kejang

Kejang dapat diatasi dengan mengurangi rangsangan atau pemberian obat anti kejang. Obat yang dapat dipakai adalah kombinasi fenobarbital dan largaktil. Fenobarbital dapat diberikan mula-mula 30 – 60 mg parenteral kemudian dilanjutkan per os dengan dosis maksimum 10 mg per hari. Largaktil dapat diberikan bersama luminal, mula-mula 7,5 mg parenteral, kemudian diteruskan dengan dosis 6 x 2,5 mg setiap hari. Kombinasi yang lain adalah luminal dan diazepam dengan dosis 0,5 mg/kg BB. Obat anti kejang yang lain adalah kloralhidrat yang diberikan lewat rektum.

2. Pemberian antitoksin
Untuk mengikat toksin yang masih bebas dapat diberi A.T.S (antitetanus serum) dengan dosis 10.000 satuan setiap hari selama 2 hari .
 3. Pemberian antibiotika
Untuk mengatasi infeksi dapat digunakan penisilin 200.000 satuan setiap hari dan diteruskan sampai 3 hari panas turun.
 4. Tali pusat dibersihkan atau di kompres dengan alkohol 70 % atau betadin 10 %.
 5. Memperhatikan jalan nafas, diuresis, dan tanda vital. Lendir sering dihisap.
- b. Keperawatan
- Masalah yang perlu diperhatikan adalah bahaya terjadi gangguan pernafasan, kebutuhan nutrisi/cairan dan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai penyakit.
1. Bahaya terjadinya gangguan pernafasan
Gangguan pernafasan yang sering timbul adalah apnea, yang disebabkan adanya tenospasmin yang menyerang otot-otot pernafasan sehingga otot tersebut tidak berfungsi. Adanya spasme pada otot faring menyebabkan terkumpulnya liur di dalam rongga mulut sehingga memudahkan terjadinya pneumonia aspirasi. Adanya lendir di tenggorokan juga menghalangi kelancaran lalu lintas udara (pernafasan). Pasien tetanus neonatorum setiap kejang selalu disertai sianosis terus-menerus. Tindakan yang perlu dilakukan :
 - a. Baringkan bayi dalam sikap kepala ekstensi dengan memberikan ganjal di bawah bahunya.
 - b. Berikan O₂ secara rumat karena bayi selalu sianosis (1 – 2 L/menit jika sedang terjadi kejang, karena sianosis bertambah berat O₂ berikan lebih tinggi dapat sampai 4 L/menit, jika kejang telah berhenti turunkan lagi).
 - c. Pada saat kejang, pasangkan sudut lidah untuk mencegah lidah jatuh ke belakang dan memudahkan penghisapan lendirnya.
 - d. Sering hisap lendir, yakni pada saat kejang, jika akan melakukan nafas buatan pada saat apnea dan sewaktu-waktu terlihat pada mulut bayi.
 - e. Observasi tanda vital setiap ½ jam .
 - f. Usahakan agar tempat tidur bayi dalam keadaan hangat.
 - g. Jika bayi menderita apnea :
 - 1) Hisap lendirnya sampai bersih
 - 2) O₂ diberikan lebih besar (dapat sampai 4 L/ menit)
 - 3) Letakkan bayi di atas tempat tidurnya/telapak tangan kiri penolong, tekan-tekan bagian iktus jantung di tengah-tengah tulang dada dengan dua jari tangan kanan dengan frekuensi 50 – 6 x/menit.
 - 4) Bila belum berhasil cabutlah sudut lidahnya, lakukan pernafasan dengan menutup mulut dan hidung

bergantian secara ritmik dengan kecepatan 50 – 60 x/menit, bila perlu diselingi tiupan.

2. Kebutuhan nutrisi/cairan
Akibat bayi tidak dapat menetek dan keadaan payah, untuk memenuhi kebutuhan makananya perlu diberikan infus dengan cairan glukosa 10 %. Tetapi karena juga sering sianosis maka cairan ditambahkan bikarbonas natrikus 1,5 % dengan perbandingan 4 : 1. Bila keadaan membaik, kejang sudah berkurang pemberian makanan dapat diberikan melalui sonde dan selanjutnya sejalan dengan perbaikan bayi dapat diubah memakai dot secara bertahap.
3. Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai penyakit
Kedua orang tua pasien yang bayinya menderita tetanus perlu diberi penjelasan bahwa bayinya menderita sakit berat, maka memerlukan tindakan dan pengobatan khusus, keberhasilan pengobatan ini tergantung dari daya tahan tubuh si bayi dan ada tidaknya obat yang diperlukan hal ini mengingat untuk tetanus neonatorum memerlukan alat/otot yang biasanya di RS tidak selalu tersedia dan harganya cukup mahal (misalnya mikrodruip). Selain itu yang perlu dijelaskan ialah jika ibu kelak hamil lagi agar meminta suntikan pencegahan tetanus di puskesmas, atau bidan, dan minta pertolongan persalinan pada dokter, bidan atau dukun terlatih yang telah ikut penataran Depkes. Kemudian perlu diberitahukan pula cara perawatan tali pusat yang baik.

L a t i h a n

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan 8 dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Buat rumusan tentang pengertian BBLR, hiperbilirubin, dan tetanus neonatorum !
2. Buat uraian mengenai konsep terjadinya BBLR, hiperbilirubin, dan tetanus neonatorum!
3. Buat rumusan tentang perbedaan penanganan/penatalaksanaan pada bayi dengan BBLR, hiperbilirubin dan tetanus neonatorum !
4. Buatlah satu contoh asuhan keperawatan dengan risiko.

R a n g k u m a n

1. Bayi Berat Lahir Rendah merupakan suatu kondisi seorang bayi lahir dengan berat badan < 2500 gr, yang disebabkan oleh factor Ibu, kehamilan, janin maupun factor lain yang belum diketahui.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada BBLR adalah suhu, pernapasan, alat pencernaan makanan, hepar yang belum matang (immature), Ginjal immature dan peredaran darah otak.
3. Perawatn BBLR yaitu pengaturan suhu, pencegahan infeksi, pemantauan intake dan pernapasan

4. Hiperbilirubinemia adalah berlebihnya akumulasi bilirubin dalam darah (level normal 5 mg/dl pada bayi normal) yang mengakibatkan jaundice, warna kuning yang terlihat jelas pada kulit, mukosa, sklera dan urine.
5. Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus yang disebabkan oleh clostridium tetani yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) yang menyerang sistem saraf pusat, yang disebabkan oleh *Clostridium Tetani*
6. Asuhan keperawatan dengan risiko meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, dan evaluasi.

Tes Formatif

1. Apakah yang dimaksud BBLR dan tetanus neonatorum ?
2. Bagaimana pengaturan suhu pada BBLR
3. Sebutkan diagnose keperawatan yang sering muncul pada kasus hiperbilirubin
4. Jelaskan satu diagnose keperawatan pada BBLR beserta perencanaan keperawatan yang dilakukan untuk masalah tersebut.
5. Hal apa yang perlu dikaji pada system gastrointestinal kasus hiperbilirubin ?

Kunci Jawaban

1. Bayi Berat Lahir Rendah merupakan suatu kondisi seorang bayi lahir dengan berat badan < 2500 gr, yang disebabkan oleh factor Ibu, kehamilan, janin maupun factor lain yang belum diketahui.
Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus yang disebabkan oleh clostridium tetani yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) yang menyerang sistem saraf pusat, yang disebabkan oleh *Clostridium Tetani*
2. Pengaturan suhu pada BBLR adalah Untukm mencegah hipotermi, perlu diusahakan lingkungan yang cukup hangat untuk bayi dan dalam keadaan istirahat konsumsi oksigen paling sedikit, sehingga suhu tubuh bayi tetap normal. Bila bayi dirawat dalam inkubator, maka suhunya untuk bayi dengan berat badan kurang dari 2000 gr adalah 35 °C dan untuk bayi dengan BB 2000 gr sampai 2500 gr 34 °C , agar ia dapat mempertahankan suhu tubuh sekitar 37 °C .Kelembaban inkubator berkisar antara 50-60 persen
3. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada aksus hiperbilirubin adalah
 - a. Risiko tinggi injuri berhubungan dengan produk sisa sel darah merah yang berlebihan dan imaturitas hati
 - b. Perubahan proses keluarga berhubungan dengan bayi dengan potensial respon fisiologis yang merugikan
4. DX I **Risiko gangguan nutrisi :**
Tujuan : Mencerna masukan nutrisi adekuat untuk penambahan berat badan.

Kriteria hasil :

- a. Berat badan meningkat 750 – 1000 gr / bulan
- b. Berat badan naik 30 gr / hari

Intervensi	Rasional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji pola minum bayi dan kebutuhan-kebutuhan nutrisi <ul style="list-style-type: none"> - Kaji volume, durasi dan upaya selama pemberian minum, kaji respon bayi. - Kaji masukan kalori / nutrisi yang lalu, kenaikan / penurunan BB selalu dicatat 	<p>Untuk menentukan berapa kebutuhan nutrisi bayi perhari atau kebutuhan minum (cc/ KgBb) sehingga dapat diberikan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya dengan tidak terlepas dari intervensi yang lain yang dapat meningkatkan kenaikan berat badan bayi.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Ajarkan pada orang tua tentang tehnik –tehnik pemberian Asi/ Pasi yang efektif 	<p>Setelah pulang nanti orang tua tidak kaku dan sudah terbiasa memberikan Asi / Pasi pada bayi, dan mengerti kapan bayi sudah mulai haus : misal pada saat menangis.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 3. Berikan Intervensi spesifik untuk meningkatkan pemberian makanan peroral yang efektif : <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian dengan sendok secara bertahap - Kontroll stimulasi setiap pemberian makanan - Anjurkan pada ibu untuk sering –sering menetekinya 	<p>Pemberian minum/ makan lewat sendok agar anak tidak bigung dengan putting susu ibu, dan pemberian secara bertahap mengurangi risiko aspirasi. Asi yang kandungannya lebih baik dari makan pengganti Asi.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 4. Tingkatkan tidur dan kurangi pemakaian energi yang berlebih 	<p>Tidur yang banyak akan membuat energi yang masuk dirubah menjadi lemak sehingga dapat dipakai sebagai cadangan makanan.</p>

5. Hal yang perlu dikaji pada pada system gastrointestinal hiperbilirubin adalah
 - a. Oral feeding yang buruk
 - b. Kehilangan berat badan sampai 5 % selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori
 - c. Hepatosplenomegali

BAB IX
ASUHAN KEPERAWATAN
GANGGUAN SISTEM HEMATOLOGI
PADA ANAK

SATUAN BAHASAN 9

ASKEP BAYI DENGAN ANEMIA, LEUKIMIA, THALASEMIA, DAN DBD

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah pada BAB ini akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada bayi dengan gangguan sistem hematologi pada anak, yang meliputi asuhan keperawatan pada kasus anemia, leukimia, thalasemia, dan DBD.

Mengenai asuhan keperawatan pada bayi dengan anemia, leukimia, thalasemia, dan DBD., akan dibahas mengenai konsep medis dari setiap kasus di atas baik pengertian, etiologi, patofisiologi, pemeriksaan penunjang maupun penatalaksanaan/pengobatannya, serta asuhan keperawatannya sendiri yang meliputi pengakajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, dan intervensi keperawatan.

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai konsep medis dari setiap kasus maupun asuhan keperawatannya. Kemudian buat intisari/ringkasan mengenai hal-hal yang penting dalam pembahasan tersebut. Selanjutnya fahami dengan baik intisari/ringkasan yang telah dibuat.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai konsep medis pada bayi dengan anemia
2. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada kasus bayi dengan anemia
3. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai konsep medis bayi dengan leukimia
4. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada kasus bayi dengan leukimia
5. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep medis thalasemia
6. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada bayi dengan thalasemia.
7. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep medis DBD
8. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada bayi dengan DBD.

ASKEP BAYI DENGAN ANEMIA, LEUKIMIA, THALASEMIA, DAN DBD

A. Anemia

Anemia merupakan istilah umum untuk menguraikan penyakit yang berkaitan dengan suatu penurunan kadar hemoglobin kadar sirkulasi. Anemia dapat timbul sebagai akibat kehilangan darah, kerusakan eritrosit yang berlebihan, kekurangan zat besi yang disebutkan sebagai beberapa sebab utama saja

1. Anemia aplastik

a. Definisi :

Anemia aplastik dapat didefinisikan sebagai suatu kegagalan anatomi dan fisiologi dari sumsum tulang yang mengarah pada suatu penurunan nyata atau tidak adanya unsur pembentuk darah dalam sumsum tulang.

b. Etiologi :

a. Faktor Kongenital

Sindrom fankoni yang biasanya disertai kelainan bawaan lain seperti microsephali, strabismus, anomali jari, kelainan ginjal dan sebagainya

b. Faktor didapat

- a) Bahan kimia : Benzena, insektisida, senyawa As, Au, Pb
- b) Obat : Cloramfenikol, Mesantoin (anti konvulsan), piribenzamin (anti histamin), santonin/kalomel, obat sitostatika (mileran, metrotrexate, TEM, Vincristine, rubidomycine, dsb)
- c) Radiasi : Sinar rontgen, radio aktif.
- d) Faktor individu : Alergi terhadap obat, bahan kimia dll
- e) Infeksi : Tuberculosis milier, hepatitis dab
- f) Lain – lain : Keganasan, penyakit ginjal, gangguan endokrin.
- g) Idiopatik : Merupakan penyebab yang paling sering.

c. Patofisiologi :

Anemia aplastik adalah gangguan akibat kegagalan sumsum tulang yang menyebabkan penipisan semua unsur sumsum. Produksi sel-sel darah menurun atau terhenti. Timbul pansitopenia dan hiposelularitas sumsum. Manifestasi gejala tergantung beratnya trombositopenia (gejala pendarahan), neutropenia (infeksi bakteri, demam) dan anemia (pucat, lelah, gagal jantung kongestif, tachi kardia). Prognosisnya gawat. 50 % pasien meninggal dalam 6 bulan setelah diagnosis. Prognosis pasien dengan lebih dari 70 % sel-sel nonhematopoetik adalah buruk.

Insidens :

1. Anemia aplastik dapat timbul pada senbarang usia

2. 50 % kasus bersifat idiopatik
3. Angka hidup jangka panjang dengan pencangkokan sumsum tulang dari donor kompatibel secara histologik mencapai 70 – 90 % pada anak – anak
4. Angka kejadian anemia aplastik yang didapat adalah 1 dalam 1 juta, perbandingan penderita laki – laki perempuan adalah 1 : 1, dan dapat terjadi pada sembarang usia
5. Pada 75 % anak dengan anemia Fanconi, diagnosis ditegakkan antara umur 3 dan 14 tahun : rasio laki – laki – perempuan dari anemia Fanconi adalah 1,3 : 1

Manifestasi klinis :

1. Petekia, echimosis, epistaksis (muncul lebih dulu)
2. Ulserasi oral, infeksi bakteri, demam (muncul kemudian)
3. Anemia, pucat, lelah, takhycardia (tanda lanjut)
4. Bercak Café-au-lait, hiperpigmentasi mirip – melanin, tanpa ibu jari (anemia Fanconi)

Komplikasi :

1. Sepsis
2. Sensitisasi terhadap antigen donor yang bereaksi silang menyebabkan pendarahan yang tidak terkendali.
3. Cangkokan vs penyakit hospes (timbul setelah pencangkokan sumsum tulang)
4. Kegagalan cangkok sumsum (terjadi setelah transplantasi sumsum tulang)
5. Leukemia miogen akut-berhubungan dengan anemia fanconi

Uji laboratorium dan diagnostik :

1. Hitung darah lengkap disertai diferensial – anemia makrositik, penurunan granulosit, monosit dan limfosit
2. Jumlah trombosit – menurun
3. Jumlah retikulosit – menurun
4. Aspirasi & biopsi sumsum tulang – hiposelular
5. Elektroforesis hemoglobin – kadar hemoglobin janin meningkat
6. Titer antigen sel darah merah – naik
7. Uji gula air – positif
8. Uji Ham – positif
9. Kadar folat dan B12 serum – normal atau meningkat
10. Uji kerusakan kromosom – positif untuk anemia Fanconi

Penatalaksanaan Medis :

Pilihan utama pengobatan anemia aplastik adalah transplantasi sumsum tulang dengan donor saudara kandung, yang antigen limfosit manusianya (HLA) sesuai. Imunoterapi dengan globulin anti timosit (ATG) atau globulin anti limfosit (ALG) adalah terapi primer bagi anak yang bukan calon untuk transplantasi sumsum tulang. Terapi penunjang mencakup pemakaian antibiotik dan pemberian produk darah. Antibiotika dipakai untuk mengatasi demam dan neutropenia, antibiotika

profilaktif tidak diindikasikan untuk anak yang asimtomatik. Produk darah yang dapat diberikan adalah sbb :

1. Trombosit – untuk mempertahankan jumlah trombosit diatas 20.000/mm³. Pakai feresis trombosit donor tunggal untuk menurunkan jumlah antigen limfosit manusia yang terpajan pada anak itu.
2. Packed red blood cells – untuk mempertahankan kadar hemoglobin diatas g/dl (anemia kronik sering ditoleransi dengan baik) untuk terapi jangka panjang pakai deferoxamin sebagai agens pengikat ion logam untuk mencegah komplikasi kelebihan besi
3. Granulosit – ditransfusi ke pasien yang menderita sepsis gram negatif

Pengkajian Keperawatan :

1. Mengkaji tempat-tempat perdarahan dan gejala perdarahan
2. Mengkaji tingkat aktivitas
3. Mengkaji tingkat perkembangan

Diagnosa Keperawatan :

1. Risiko tinggi cedera
2. Risiko tinggi infeksi
3. Intoleransi aktivitas
4. Kelelahan
5. Perubahan pertumbuhan dan perkembangan

Intervensi Keperawatan :

1. Identifikasi dan laporkan tanda dan gejala perdarahan
 - a) Tanda-tanda vital (denyut apex meningkat, nadi lemah dan cepat, TD menurun)
 - b) Tempat perdarahan
 - c) Warna kulit (pucat) dan tanda-tanda diaforesis
 - d) Kelemahan
 - e) Penurunan tingkat kesadaran
 - f) Penurunan jumlah trombosit
2. Lindungi dari trauma
 - a) Jangan beri aspirin atau obat-obat NSAID
 - b) Hindari suntikan IM dan suppositoria
 - c) Beri obat kontrasepsi untuk mengurangi menstruasi berlebihan
 - d) Usahakan higiene mulut yang baik dengan sikat gigi lunak
3. Lindungi dari Infeksi
 - a) Hindari kontak dengan sumber infeksi potensial
 - b) Usahakan isolasi ketat (rujuk kebijakan dan prosedur RS)
4. Beri produk darah dan pantau respon anak terhadap infus (setelah transplantasi sumsum tulang untuk menghindari sensitisasi terhadap antigen transplantasi donor)
 - a) Observasi adanya efek samping atau respons yang merugikan
 - b) Observasi tanda-tanda kelebihan cairan

- c) Pantau tanda-tanda vital sebelum pemasangan infus, pantau selama 15 menit selama jam pertama dan kemudian setiap jam setiap infus terpasang
5. Berikan periode istirahat yang lebih sering. Berikan asuhan keperawatan untuk meningkatkan toleransi aktivitas dan mencegah kelelahan
6. Pantau respons terapeutik dan respon yang merugikan terhadap pengobatan, pantau kerja dan efek samping obat
7. Siapkan anak dan keluarga untuk transplantasi sumsum tulang
8. pantau tanda-tanda komplikasi trasplantasi sumsum tulang
9. Berikan aktivitas pengalih dan rekreasi sesuai usia
10. Berikan penjelasan sesuai usia sebelum pelaksanaan prosedur

Hasil yang diharapkan :

1. Anak berangsur-angsur mengalami peningkatan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan akhirnya trombosit
2. Infeksi yang terjadi pada anak semakin sedikit
3. Episode perdarahan pada anak minimal
4. Anak dan keluarga memahami perlunya perawatan di rumah dan perawatan tindak lanjut.

2. Anemia Defisiensi Zat Besi

Definisi :

Merupakan anemia yang paling umum, zat besi merupakan unsur yang diperlukan dalam pembentukan hemoglobin, karena itu defisiensi zat besi akan mempengaruhi jumlah hemoglobin yang dapat diperoleh.

Etiologi :

Menurut patogenesisnya anemia defisiensi besi dibagi menjadi :

1. Masukan kurang : MEP, defisiensi diet relatif yang disertai pertumbuhan yang cepat
2. Absorpsi kurang : MEP, diare kronik, sindrom malabsorpsi lainnya
3. Sintesis kurang : tranferin kurang (hipotransferinemia kongenital)
4. Kebutuhan yang bertambah : infeksi, pertumbuhan yang cepat
5. Pengeluaran yang bertambah karena anchylostomiasis, amubiasis yang menahun, polip, hemolisis intravaskular kronis yang menyebabkan hemosiderinemia.

Patofisiologi :

Anemia defisiensi zat besi paling sering terjadi karena pengenalan makanan padat yang terlalu dini (sebelum usia 4-6 bulan) dihentikannya susu formula bayi yang mengandung zat besi atau ASI sebelum usia 1 tahun, dan minum susu sapi berlebihan tanpa tambahan makanan padat kaya besi. Bayi yang tidak cukup bulan, bayi dengan perdarahan perinatal yang berlebihan, atau bayi dari ibu yang kurang gizi dan kurang zat besi, juga tidak memiliki cadangan zat besi yang adekuat. Bayi ini berisiko lebih tinggi

mengalami anemia defisiensi zat besi sebelum berusia 6 bulan. Anemia defisiensi zat besi dapat juga terjadi karena kehilangan darah yang kronik. Pada bayi, hal ini terjadi karena perdarahan usus kronik yang disebabkan oleh protein dalam susu sapi yang tidak tahan panas. Pada anak sembarang umur kehilangan darah sebanyak 1 – 7 ml dari saluran cerna setiap hari dapat menyebabkan anemia defisiensi zat besi. Pada remaja putri, anemia defisiensi zat besi juga dapat terjadi karena menstruasi yang berlebihan.

Insidens :

1. 3% - 24% bayi berusia 6 - 24 bulan menderita anemia defisiensi zat besi
2. 29% - 68% bayi berusia 6 – 24 bulan mengalami defisiensi zat besi
3. Insidensi defisiensi zat besi dan anemia defisiensi zat besi pada remaja putri adalah 11% - 17%
4. Puncak insidens anemia defisiensi zat besi adalah antara 12 – 18 bulan

Manifestasi Klinik :

1. Konjunctiva pucat (hemoglobin 6 – 10 g/dl)
2. Telapak tangan pucat (Hb dibawah 8 g/dl)
3. Iritabilitas dan anorexia (Hb 5 g/dl atau lebih rendah)
4. Takikardi, murmur sistolik
5. Pika
6. Lethargi, kebutuhan tidur meningkat
7. Kehilangan minat terhadap mainan atau aktivitas bermain

Komplikasi :

1. Perkembangan otak buruk
2. daya konsentrasi menurun
3. Hasil uji perkembangan menurun
4. Kemampuan mengolah informasi yang didengar menurun

Uji laboratorium dan Diagnostik :

1. Kadar porfirin eritrosit bebas – meningkat
2. Konsentrasi besi serum – menurun
3. Saturasi transferin – menurun
4. Konsentrasi feritin serum – menurun
5. Hemoglobin – menurun
6. Rasio hemoglobin – porfirin eritrosit – lebih dari 2,8 µg/g adalah diagnostik untuk defisiensi besi.
7. Mean Corpuscle Volume (MCV) dan Mean Corpuscle Hemoglobin Concentration (MCHC) – menurun, menyebabkan anemia hipokrom mikrositik atau sel-sel darah merah yang kecil-kecil dan pucat
8. Selama pengobatan, jumlah retikulosit – meningkat dalam 3 –5 hari sesudah dimulainya terapi besi mengindikasikan respon terapeutik yang positif
9. Dengan pengobatan, hemoglobin – kembali normal dalam 4 – 8 minggu mengindikasikan tambahan besi dan nutrisi yang adekuat

Penatalaksanaan Medis :

Usaha pencegahan ditujukan pada pengobatan dan intervensi. Pencegahan tersebut mencakup menganjurkan ibu untuk memberikan ASI, makan makanan kaya zat besi dan, minum vitamin prenatal yang mengandung besi. Terapi untuk mengatasi anemia zat besi terdiri dari program pengobatan berikut : Zat besi diberikan per oral (PO) dalam dosis 2 – 3 mg per kg unsur besi. Semua bentuk zat besi sama efektifnya (ferosulfat, ferofumarat, ferosuksinat, feroglukonat). Vitamin C harus diberikan bersama zat besi (vitamin C meningkatkan absorpsi besi). Zat besi paling baik diserap bila diminum 1 jam sebelum makan. Terapi besi hendaknya diberikan sekurang-kurangnya selama 6 minggu setelah anemia dikoreksi untuk mengisi kembali cadangan besi. Zat besi yang disuntikkan jarang dipakai kecuali terdapat penyakit malabsorpsi usus halus.

Pengkajian Keperawatan :

1. Kaji reaksi anak terhadap terapi besi
2. Kaji tingkat aktivitas anak
3. Kaji tingkat perkembangan anak

Diagnosa Keperawatan :

1. Intoleransi aktivitas
2. Perubahan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh
3. Keletihan
4. Risiko tinggi perubahan pertumbuhan dan perkembangan

Intervensi Keperawatan :

1. Pantau efek terapeutik dan efek yang tidak diinginkan terhadap terapi zat besi pada anak
 - a. Efek samping dari terapi oral (perubahan warna gigi) jarang terjadi
 - b. Ajarkan tentang cara-cara mencegah perubahan warna gigi
 - a) minum preparat besi dengan air, sebaiknya dengan jus jeruk
 - b) berkumur setelah minum obat
 - c. Anjurkan untuk meningkatkan makanan berserat dan air untuk mengurangi konstipasi dari zat besi
 - d. Untuk mengatasi konstipasi berat akibat zat besi, cobalah untuk menurunkan dosis zat besi, tetapi memperpanjang lama pengobatan.
2. Ajarkan pada orangtua tentang asupan nutrisi yang adekuat
 - a. Kurangi asupan susu pada anak
 - b. Tingkatkan asupan daging dan pengganti protein yang sesuai
 - c. Tambahkan padi-padian utuh dan sayur-sayuran hijau dalam diet
3. Dapatkan informasi tentang riwayat diet dan perilaku makan
 - a. Kaji faktor-faktor yang menyebabkan defisiensi besi nutrisi psikososial, perilaku, dan nutrisi

- b. Buat rencana bersama orangtua tentang pendekatan-pendekatan kebiasaan makan yang dapat diterima
 - c. Rujuk ke ahli gizi untuk evaluasi dan terapi intensif
4. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya, karena zat besi dari ASI mudah untuk diserap

Hasil yang diharapkan :

1. Warna kulit anak membaik
2. Pola tumbuh anak membaik
3. Tingkat aktivitas anak sesuai dengan usianya
4. Orangtua menunjukkan pemahamannya terhadap aturan pengobatan di rumah (pemberian obat, makanan kaya zat besi yang sesuai)

3. Anemia Sel Sabit

Definisi :

Anemia sel sabit adalah anemia dimana kondisi eritrosit mengandung bentuk hemoglobin yang abnormal (HbS) dengan rantai beta yang abnormal. Sebagai akibatnya mereka mengambil bentuk aneh (bersabit) jika tekanan oksigen menurun..

Etiologi :

Kelainan bawaan (kongenital) atau merupakan faktor yang didapat (acquired).

Patofisiologi :

Defek dasar pada penyakit ini adalah adalah gen autosom yang mutan yang mempengaruhi penggantian valin dengan asam glutamat pada rantai hemoglobin. Sel darah merah pada anemia ini berbentuk sabit dan memiliki kemampuan yang kurang dalam hal membawa oksigen. Sel ini juga memiliki angka destruksi yang lebih besar dari sel darah normal. Jangka hidupnya menurun hingga 16 sampai 20 hari. Sel sabit sangat kaku, karena hemoglobinnnya berbentuk gel, dehidrasi seluler, dan membrannya yang tidak fleksibel. Sel-sel ini menyebabkan terperangkap dalam sirkulasi dan membentuk lingkaran setan infark dan sickling yang progresif. Terdapat 3 jenis krisis : (1) oklusi pembuluh darah (sangat nyeri); (2) sekuestrasi limpa; dan (3) aplastik. Krisis sel sabit menurun frekuensinya sejalan dengan bertambahnya usia. Mortalitas pada tahun-tahun pertama umumnya disebabkan oleh infeksi dan krisis sekuestrasi.

Insidens :

1. Insidens penyakit sel sabit pada individu kulit hitam diperkirakan 1 dari 400
2. Sifat sel sabit terdapat pada satu dari setiap 10 orang Amerika berkulit hitam
3. 25% kematian terjadi sebelum berusia 5 tahun
4. Dengan pengobatan baru, 85% orang dengan gangguan ini dapat hidup sampai usia 20 tahun; 60%, diatas 50 tahun.`

Manifestasi Klinis :

1. Krisis oklusi pembuluh darah (krisis nyeri), terjadi akibat iskemia pada jaringan distal dari oklusi

- a. Iritabilitas
 - b. Muntah
 - c. Demam
 - d. Anorexia
 - e. Nyeri sendi
 - f. Daktilitis (sindrom kaki dan tangan) – rentang gerak berkurang dan ekstremitas meradang
 - g. Ulkus kaki
 - h. Stroke
 - i. Perdarahan okuler
 - j. Retinopati proliferatif
 - k. Sindrom dada akut
2. Krisis sekuestrasi (umumnya terlihat pada anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun), akibat seringnya terjadi infark dari sel-sel sabit (diikuti atrofi limpa)
 - a. Pembesaran limpa yang cepat dan masif (splenomegali)
 - b. Penurunan kadar hemoglobin yang cepat
 - c. Pembesaran hati
 - d. Kolaps sirkulasi dan syok
 - e. Takikardia, dispnea, pucat dan kelemahan (umum)
 3. Krisis aplastik, terjadi akibat destruksi yang cepat terhadap sel darah merah, terutama selama infeksi saat mekanisme kompensasinya mengalami depresi
 - a. Kelemahan
 - b. Membran mukosa pucat
 - c. Ikterus pada sklera
 - d. Anorexia
 - e. Kerentanan terhadap infeksi meningkat
 - f. Takikardia
 - g. Jumlah retikulosit menurun

Komplikasi :

1. Kurang tidur
2. Pubertas tertunda
3. Fertilitas terganggu
4. Priapismus
5. Batu empedu
6. Ulkus tungkai
7. Penyakit jantung, hati dan ginjal menahun
8. Osteomielitis
9. Depresi, isolasi, dan rendah diri
10. Enuresis
11. Risiko tinggi ketergantungan obat
12. Hubungan anak – orangtua tegang
13. Stroke

Uji Laboratorium dan Diagnostik :

1. Elektroforesis hemoglobin, sebaiknya dilakukan pada saat lahir terhadap semua bayi sebagai bagian dari skrining bayi baru lahir. Uji ini dapat menghitung persentase hemoglobin S yang ada

2. Darah atau sel fetus – uji ini memungkinkan penetapan diagnosis prenatal antara kehamilan minggu ke 9 dan 11

Penatalaksanaan Medis :

Meskipun sampai saat ini belum ditemukan obat untuk anemia sel sabit, tetapi penatalaksanaan medis yang dilakukan dapat mengurangi terjadinya krisis. Pemberian penicillin profilaktik untuk mencegah septikemia hendaknya dilakukan pada periode baru lahir. Imunisasi tambahan yang diperlukan adalah (1) vaksin pneumokokus saat berusia 2 tahun, dengan booster saat anak berusia 4 sampai 5 tahun dan (2) vaksin influenza

Program hipertransfusi bagia anak dengan riwayat stroke, penyakit paru progresif dan mungkin juga krisis vasooklusif berat (kontroversial), adalah pengobatan yang kini diberikan. Kelebihan besi menyebabkan besi tersebut mengendap pada organ-organ dengan komlikasi sebagai berikut : kardiomiopati, sirosis, diabetes tergantung insulin, hipotiroidisme, hipoparatiroidisme, pertumbuhan yang tertunda, dan perkembangan seks yang juga tertunda. Deferoksamin (Desferal) yang diberikan melalui subkutan atau transfusi, mengkelasi besi sehingga dapat dikeluarkan bersama urin atau empedu untuk membantu mengurangi komplikasi tersebut.

Analgesik dipakai untuk mengendalikan nyeri selama masa krisis. Antibiotik dapat dipakai, karena infeksi dapat memicu terjadinya krisis.

Pengkajian Keperawatan :

1. Kaji sistem kardiovaskulernya (nadi, thorax, tampilan umum, kulit dan edema)
2. Kaji sistem respirasinya (bernapas, hasil auskultasi thorax, bentuk dan lingkardada, tampilan umum)
3. Kaji tingkat nyeri anak

Diagnosa Keperawatan :

1. Perubahan perfusi jaringan : ginjal, serebrum, dan perifer
2. Nyeri
3. Risiko tinggi keletihan
4. Risiko tinggi infeksi
5. Risiko tinggi kelebihan volume cairan
6. Risiko tinggi cedera
7. Perubahan pertumbuhan dan perkembangan
8. Risiko tinggi koping keluarga tidak efektif : menurun
9. Risiko tinggi koping individu tidak efektif : menurun
10. Risiko tinggi penatalaksanaan program terapeutik tidak efektif

Intervensi Keperawatan :

1. Cegah atau minimalkan efek dari krisis sel sabit :
 - a. Sadari bahwa pengkajian dan penanganan dini adalah kunci pencegahan dan intervensi episode krisis

- b. Hindari dingin dan vasokonstriksi selama episode nyeri, dingin dapat meningkatkan sickling
 - c. Berikan dan tingkatkan hidrasi (satu setengah sampai 2 kali didrasi rumatan)
 - (1) pertahankan dengan ketat asupan dan keluaran
 - (2) kaji adanya tanda-tanda dehidrasi
 - d. tingkatkan oksigenasi jaringan : pantau adanya tanda-tanda hipoksia – sianosis; hiperventilasi; peningkatan denyut apeks; frekuensi napas dan tekanan darah; dan konfusi mental
2. Berikan periode istirahat yang sering untuk mengurangi pemakaian oksigen
 3. Pantau penggunaan alat oksigen
 4. Berikan dan pantau penggunaan produk darah dan terapi kelasi; kaji tanda-tanda reaksi transfusi demam, gelisah, disritmia jantung, menggigil, mual dan muntah, nyeri dada, urin merah atau hitam, sakit kepala, nyeri pinggang, dan tanda-tanda syok atau gagal ginjal
 5. Pantau adanya tanda-tanda kelebihan cairan sirkulasi (overload)-dispnea, naiknya frekuensi pernapasan, sianosis, nyeri dada, dan batuk kering
 6. Hilangkan atau minimalkan nyeri :

Panas lembab untuk 24 jam pertama

 - a. Whirpool atau walking tank, terutama jika terjadi pembengkakan
 - b. Latihan terapeutik
 - c. Pemberian anlgesik sesuai instruksi, berdasarkan pengkajian nyeri
 - d. Penggunaan metoda nonfarmakologik seperti imajinasi terbimbing
 7. Cegah infeksi
 - a. Kaji adanya tanda-tanda infeksi – demam, malaise atau iritabilitas, serta jaringan lunak dan limfonodus yang meradang dan bengkak
 - b. Sadari bahwa anak terutama rentan terhadap sepsis pneumokokus dan pneumonia (anak kurang dari 3 sampai 4 tahun) dan osteomielitis salmonela
 8. Pantau adanya tanda-tanda komplikasi :
 - a. Kolaps vaskuler dan syok
 - b. Splenomegali
 - c. Infark tulang dan persendian
 - d. Ulkus tungkai
 - e. Stroke
 - f. Kebutaan
 - g. Nyeri dada atau dispnea
 - h. Pertumbuhan dan perkembangan yang tertunda
 9. Beri penjelasan pada anak sesuai usia tentang perawatan di rumah sakit dan prosedur/tindakan

10. Beri dukungan emosional pada anak dan keluarga :
 - a. Dorong agar anak melakukan aktivitas normal
 - b. Dorong anak agar bekerjasama dengan anak-anak dan keluarga lain yang juga menderita anemia sel sabit
11. Anjurkan orang tua untuk melakukan skrining anggota keluarganya
 - a. Skrining bayi baru lahir untuk hemoglobinopati
 - (1) identifikasi saat lahir memungkinkan profilaksis dini terhadap infeksi
 - (2) pemakaian penisilin profilaktik dianjurkan untuk dimulai pada periode bayi baru lahir (berusia 4 bulan)
 - b. Skrining saudara kandung terhadap penyakit dan pembawa sifat sel sabit

Hasil Yang Diharapkan :

1. Anak dan keluarga memahami pentingnya pemeriksaan tindak lanjut dan kapan harus meminta bantuan medis
2. Krisis oklusi pembuluh, sekuestrasi dan aplastik yang dialami anak minimal
3. Keluarga mencari konseling genetik bagi anak lainnya

Intervensi :

1. Kaji adanya tanda-tanda leukopenia : demam, infeksi
2. Kaji adanya tanda-tanda trombositopenia : petechiae, purpura perdarahan membran mukosa; kaji adanya tanda-tanda invasi ekstra medula : limfadenopati, hepatomegali, splenomegali
3. Kaji adanya pembesaran testis, hematuria, hipertensi, gagal ginjal, inflamasi disekitar rectal dan nyeri.

Diagnosa Keperawatan :

1. Risiko infeksi berhubungan dengan menurunnya sistem pertahanan tubuh
2. Risiko injury; perdarahan berhubungan dengan perubahan faktor pembekuan
3. Risiko kurangnya volume cairan berhubungan dengan mual dan muntah
4. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan cancer cahexia
5. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan pemberian pemberian kemoterapi, radioterapi
6. Nyeri berhubungan dengan dilakukannya pemeriksaan diagnostik, efek fisiologis neoplasma
7. Perubahan proses keluarga berhubungan dengan memiliki anak dengan kondisi yang mengancam kehidupan
8. Berduka berhubungan dengan kehilangan aktual/potensial

Intervensi Keperawatan :

1. Mencegah risiko infeksi
 - a. Tempatkan anak dalam ruangan khusus untuk meminimalkan terpaparnya anak dari sumber infeksi

- b. Anjurkan pengunjung atau staf melakukan tehnik mencuci tangan yang baik
 - c. Gunakan tehnik aseptik untuk seluruh prosedur invasif
 - d. Monitor tanda-tanda vital anak
 - e. Evaluasi keadaan anak terhadap tempat-tempat munculnya infeksi seperti tempat penusukan jarum, ulserasi mukosa, masalah gigi
 - f. Hindari penggunaan temperatur rectal, supositoria atau enema
 - g. Berikan waktu yang sesuai antara aktivitas dan istirahat
 - h. Berikan diet nutrisi secara lengkap
 - i. Berikan vaksinasi dari virus yang tidak diaktifkan (misalnya varicella, polio salk, influenza)
 - j. Monitor penurunan jumlah leukosit yang menunjukkan anak memiliki risiko yang besar untuk terkena infeksi
 - k. Kolaborasi untuk pemberian antibiotik
2. Mencegah risiko injury; perdarahan
 - a. Evaluasi kulit dan membran mukosa setiap hari
 - b. Laporkan setiap tanda-tanda terjadi perdarahan (tekanan darah menurun, denyut nadi cepat, pucat diaforesis, meningkatnya kecemasan)
 - c. Periksa setiap urin atau tinja terhadap adanya tanda-tanda perdarahan
 - d. Gunakan jarum yang kecil pada saat melakukan injeksi
 - e. Gunakan sikat gigi yang lembut atau lunak dan oral hygiene
 - f. Hindari untuk pemberian aspirin
 - g. Lakukan pemeriksaan darah secara teratur
 - h. Kaji adanya tanda-tanda terlibatnya sistem saraf pusat (sakit kepala, penglihatan kabur)
 3. Mencegah risiko kurangnya volume cairan
 - a. Berikan antiemetik awal sebelum dilakukan kemoterapi
 - b. Berikan antiemetik seara beraturan pada waktu program kemoterapi
 - c. Kaji respon anak terhadap antiemetik
 - d. Hindari memberikan makanan yang memiliki aroma yang merangsang mual atau muntah
 - e. Anjurkan makan dengan porsi kecil tapi sering
 - f. Kolaborasi untuk pemberian cairan infus untuk mempertahankan hidrasi
 4. Memberikan nutrisi yang adekuat
 - a. Berikan dorongan pada orang tua untuk tetap rileks pada saat anak makan
 - b. Ijinkan anak untuk memakan makanan yang dapat ditoleransi anak, rencanakan untuk memperbaiki kualitas gizi padasaat selera makan anaka meningkat
 - c. Berikan makanan yang disertai dengan suplemen nutrisi untuk meningkatkan kualitas intake nutrisi

- d. Ijinkan anak untuk terlibat dalam persiapan dan pemilihan makanan
- 5. Mencegah kerusakan integritas kulit
 - a. Kaji secara dini tanda-tanda kerusakan integritas kulit
 - b. Berikan perawatan kulit khususnya daerah perianal dan mulut
 - c. Ganti posisi dengan sering
 - d. Anjurkan intake dengan kalori dan protein yang adekuat
- 6. Mencegah atau mengurangi nyeri
 - a. Kaji tingkat nyeri dengan skala nyeri
 - b. Kaji adanya kebutuhan klien untuk mengurangi rasa nyeri
 - c. Evaluasi efektivitas terapi pengurangan rasa nyeri dengan melihat derajat kesadaran dan sedasi
 - d. Berikan tehnik mengurangi rasa nyeri nonfarmakologi
 - e. Berikan pengobatan anti nyeri secara teratur untuk mencegah timbulnya nyeri berulang
- 7. Meningkatkan peran keluarga :
 - a. Jelaskan alasan dilakukannya setiap tindakan
 - b. Hindari untuk menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada
 - c. Jelaskan orang tua tentang proses penyakit
 - d. Jelaskan seluruh tindakan yang dapat dilakukan oleh anak
 - e. Jadwalkan waktu bagi keluarga dan anak bersama-sama tanpa diganggu oleh staf RS
 - f. Dorong keluarga untuk mengekspresikan perasaannya sebelum anak didiagnosis menderita keganasan dan prognosis anak buruk
 - g. Diskusikan dengan keluarga bagaimana mereka akan mengatakan kepada anak tentang pengobatan anak dan kemungkinan terapi tambahan
- 8. Antisipasi berduka
 - a. Kaji tahapan berduka pada anak/keluarga
 - b. Berikan dukungan pada respon adaptif yang diberikan klien, ubah respon maladaptif
 - c. Luangkan waktu bersama anak untuk memberikan dukungan pada anak agar mengekspresikan perasaannya atau ketakutannya
 - d. Fasilitasi anak untuk mengekspresikan perasaannya melalui bermain.

Hasil yang diharapkan :

- 1. Anak mencapai remisi
- 2. Anak bebas dari komplikasi penyakit
- 3. Anak dan keluarga mempelajari tentang coping yang efektif untuk menghadapi hidup dan penatalaksanaan penyakit tersebut

2. **Thalasemia**

a. Definisi :

Thalasemia adalah suatu gangguan darah yang diturunkan ditandai oleh defisiensi produksi rantai globin pada hemoglobin terutama rantai beta, kendatipun dapat mempengaruhi juga rantai alfa. Kondisi ini dapat homozigot (talasemia rantai alfa) yang ketal in utero, menyebabkan hidrops fetalis, atau heterozigot (talasemia rantai beta) yang secara relatif merupakan kondisi jinak.

b. Etiologi : Faktor genetik

c. Patofisiologi :

- 1) Normal Hb adalah terdiri dari Hb-A dengan 2 polipeptida rantai alfa dan 2 rantai beta
- 2) Pada beta thalasemia yaitu tidak adanya atau kurangnya rantai beta dalam molekul hemoglobin yang mana ada gangguan kemampuan eritrosit membawa oksigen
- 3) Ada suatu kompensator yang meningkat dalam rantai alpa, tetapi rantai beta memproduksi secara terus menerus sehingga menghasilkan hemoglobin defective. Ketidakseimbangan polipeptida ini memudahkan ketidakstabilan dan desintegrasi. Hal ini menyebabkan sel darah merah menjadi hemolisis dan menimbulkan anemia dan atau hemosiderosis
- 4) Kelebihan pada rantai alpa ditemukan pada thalasemia beta dan kelebihan rantai beta dan gamma ditemukan pada thalasemia alpa. Kelebihan rantai polipeptida ini mengalami presipitasi dalam sel eritrosit. Globin intra-eritrositik yang mengalami presipitasi, yang terjadi sebagai rantai polipeptida alpa dan beta, atau terdiri dari hemoglobin tak stabil – badan Heinz, merusak sampul eritrosit dan menyebabkan hemolisis
- 5) Reduksi dalam hemoglobin menstimulasi bone marrow memproduksi RBC yang lebih. Dalam stimulasi yang konstan pada bone marrow, produksi RBC diluar menjadi eritropoetik yang aktif. Kompensator produksi RBC secara terus menerus pada suatu dasar kronik, dan dengan cepatnya destruksi RBC, menimbulkan tidak adekuatnya sirkulasi hemoglobin. Kelebihan produksi dan destruksi RBC menyebabkan bone marrow menjadi tipis dan mudah pecah atau rapuh.

d. Manifestasi Klinis :

- 1) Letargi
- 2) Pucat
- 3) Kelemahan
- 4) Anorexia
- 5) Sesak napas

- 6) Tebalnya tulang kranial
 - 7) Pembesaran limpa
 - 8) Menipisnya tulang kartilago
 - 9) Dysritmia
- e. Komplikasi :
- 1) Fraktur patologi
 - 2) Hepatosplenomegali
 - 3) Gangguan tumbuh kembang
 - 4) Disfungsi organ
- f. Uji Laboratorium dan Diagnostik :
- 1) Studi hematologi : terdapat perubahan-perubahan pada sel darah merah yaitu mikrositosis, hipokromia, anisositosis, poikilositosis, sel target eritrosit yang imatur, penurunan hemoglobin dalam hematokrit
 - 2) Elektroforesis hemoglobin : peningkatan hemoglobin F dan A2
- g. Penatalaksanaan Medis :
- 1) Pemberian transfusi hingga Hb mencapai 10 g/dl. Komplikasi dan pemberian transfusi darah yang berlebihan akan menyebabkan terjadi penumpukan zat besi yang disebut hemosiderosis. Hemosiderosis dapat dicegah dengan pemberian deferoxamine (Desferal)
 - 2) Splenectomy : dilakukan untuk mengurangi penekanan pada abdomen dan meningkatkan rentang hidup sel darah merah yang berasal dari suplemen (transfusi)
- h. Pengkajian Keperawatan :
- 1) Pengkajian Fisik :
 - a) Riwayat keperawatan
 - b) Kaji adanya tanda-tanda anemia (pucat, lemah, sesak, napas cepat, hipoxia kronik, nyeri tulang dan dada, menurunnya aktivitas, anorexia), epistaksis berulang
 - 2) Pengkajian Psikososial
 - a) Anak : usia, tugas perkembangan psikososial (Erikson), kemampuan beradaptasi dengan penyakit, mekanisme koping yang digunakan)
 - b) Keluarga : respon emosional keluarga, koping yang digunakan keluarga, penyesuaian keluarga terhadap stress
- i. Diagnosa Keperawatan :
- 1) Perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan berkurangnya komponen seluler yang penting untuk menghantarkan oksigen/zat nutrisi ke sel
 - 2) Intoleransi aktivitas berhubungan dengan tidak seimbangnya kebutuhan pemakaian dan suplai oksigen
 - 3) Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kurangnya selera makan
 - 4) Tidak efektif koping keluarga berhubungan dengan dampak penyakit anak terhadap fungsi keluarga

j. Intervensi :

- 1) Perfusi jaringan adekuat
 - a) Memonitor tanda-tanda vital, pengisian kapiler, warna kulit, membran mukosa
 - b) Meninggikan posisi kepala di tempat tidur
 - c) Memeriksa dan mendokumentasikan adanya rasa nyeri
 - d) Observasi adanya keterlambatan respon verbal, kebingungan atau gelisah
 - e) Mengobservasi dan mendokumentasikan adanya rasa dingin
 - f) Mempertahankan suhu lingkungan agar tetap hangat sesuai kebutuhan tubuh
 - g) Memberikan oksigen sesuai kebutuhan
- 2) Mendukung anak tetap toleran terhadap aktivitas
 - a) Menilai kemampuan anak dalam melakukan aktivitas sesuai dengan kondisi fisik dan tugas perkembangan anak
 - b) Memonitor tanda-tanda vital selama dan setelah melakukan aktivitas, dan mencatat adanya respon fisiologis terhadap aktivitas (peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah atau nafas cepat)
 - c) Memberikan informasi kepada pasien atau keluarga untuk berhenti melakukan aktivitas jika terjadi gejala-gejala peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, napas cepat, pusing atau kelelahan
 - d) Berikan dukungan kepada anak untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai kemampuan anak
 - e) Mengajarkan kepada orang tua teknik memberikan reinforcement terhadap partisipasi anak di rumah
 - f) Membuat jadwal aktivitas bersama anak dan keluarga dengan melibatkan tim kesehatan lain
 - g) Menjelaskan dan memberikan rekomendasi kepada sekolah tentang kemampuan anak dalam melakukan aktivitas, memonitor kemampuan melakukan aktivitas secara berkala dan menjelaskan kepada orang tua dan sekolah
- 3) Memenuhi kebutuhan nutrisi yang adekuat
 - a) Mengijinkan anak untuk memakan makanan yang dapat ditoleransi anak, rencanakan untuk memperbaiki kualitas gizi pada saat selera makan anak meningkat
 - b) Berikan makanan yang disertai suplemen nutrisi untuk meningkatkan kualitas intake nutrisi
 - c) Mengijinkan anak untuk terlibat dalam persiapan dan pemilihan makanan
 - d) Mengevaluasi berat badan anak setiap hari

- 4) Keluarga akan mengatasi dan dapat mengendalikan stress yang terjadi pada keluarga
 - a) Memberikan dukungan pada keluarga dan menjelaskan kondisi anak sesuai realita yang ada
 - b) Membantu orang tua untuk mengembangkan strategi untuk melakukan penyesuaian terhadap krisis akibat penyakit yang diderita anak
 - c) Memberikan dukungan kepada keluarga untuk mengembangkan harapan realistis terhadap anak
 - d) Menganalisa sistem yang mendukung dan penggunaan sumber-sumber di masyarakat (pengobatan, keuangan, sosial) untuk membantu proses penyesuaian keluarga terhadap penyakit anak

Hasil yang diharapkan :

- 1) Anak menunjukkan tanda-tanda perfusi jaringan yang adekuat
- 2) Anak akan toleran terhadap aktivitas
- 3) Anak akan menunjukkan tanda-tanda terpenuhinya kebutuhan nutrisi
- 4) Keluarga dapat mengatasi dan mengendalikan stress

3. Demam Berdarah Dengue (DHF)

a. Definisi :

Demam berdarah Dengue adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue (arbovirus) yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk aedes aegypti.

b. Etiologi :

Virus dengue sejenis arbovirus

c. Patofisiologi :

- 1) Virus dengue akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan kemudian akan bereaksi dengan antibodi dan terbentuklah kompleks virus – antibodi, dalam sirkulasi akan mengaktivasi sistem komplemen. Akibat aktivasi C3 dan C5 akan dilepas C3a dan C5a, 2 peptida yang berdaya untuk melepaskan histamin dan merupakan mediator kuat sebagai faktor meningginya permeabilitas dinding pembuluh darah dan menghilangkan plasma melalui endotel dinding itu
- 2) Terjadinya trombotopenia, menurunnya fungsi trombosit dan menurunnya faktor koagulasi (protrombin, faktor V, VII, IX, X dan fibrinogen) merupakan faktor penyebab terjadinya perdarahan hebat, terutama perdarahan saluran gastrointestinal pada DHF
- 3) Yang menentukan beratnya penyakit adalah meningginya permeabilitas dinding pembuluh darah, menurunnya volume plasma, terjadinya hipotensi, trombotopenia dan diatesis hemoragik. Renjatan terjadi secara akut
- 4) Nilai hematokrit meningkat bersamaan dengan hilangnya plasma melalui endotel pembuluh darah. Dan dengan

hilangnya plasma klien mengalami hipovolemik. Apabila tidak diatasi bisa terjadi anorexia jaringan, asidosis metabolik dan kematian

- d. Klasifikasi DBD :
 - 1) Derajat I : demam disertai gejala klinis lain atau perdarahan spontan, uji tourniket positif, trombositopenia dan hemokonsentrasi
 - 2) Derajat II : derajat I disertai perdarahan spontan di kulit dan atau perdarahan lain
 - 3) Derajat III : kegagalan sirkulasi, nadi cepat dan lemah, hipotensi, kulit dingin, lembab, gelisah
 - 4) Derajat IV : renjatan berat, denyut nadi dan tekanan darah tidak dapat diukur
- e. Manifestasi Klinis :
 - 1) Demam tinggi selama 5 – 7 hari
 - 2) Perdarahan terutama perdarahan bawah kulit; petechie, echimosis, hematoma
 - 3) Epistaksis, hematemesis, melena, hematuri
 - 4) Mual, muntah, tidak ada nafsu makan, diare, konstipasi
 - 5) Nyeri otot, tulang sendi, abdomen dan ulu hati
 - 6) Sakit kepala
 - 7) Pembengkakan sekitar mata
 - 8) Pembesaran hati, limpa dan kelenjar getah bening
 - 9) Tanda-tanda renjatan (cyanosis, kulit lembab dan dingin, tekanan darah menurun, gelisah, capillary refill lebih dari 2 detik, nadi cepat dan lemah)
- f. Uji Laboratorium dan Diagnostik :
 - 1) Darah lengkap : hemokonsentrasi (hematokrit meningkat 20% atau lebih), trombositopenia ($100.000/\text{mm}^3$ atau kurang)
 - 2) Serologi : uji HI (hemaagglutination inhibition test)
 - 3) Rontgen thorax : efusi pleura
- g. Penatalaksanaan Medis :
 - 1) Minum banyak 1,5 – 2 liter/24 jam dengan air the, gula, atau susu
 - 2) Antipiretik jika terdapat demam
 - 3) Antikonvulsan jika terdapat kejang
 - 4) Pemberian cairan melalui infus, dilakukan jika pasien mengalami kesulitan minum dan nilai hematokrit cenderung meningkat
- h. Pengkajian Keperawatan :
 - 1) Kaji riwayat keperawatan
 - 2) Kaji adanya peningkatan suhu tubuh, tanda-tanda perdarahan, mual, muntah, tidak nafsu makan, nyeri ulu hati, nyeri otot dan sendi, tanda-tanda renjatan (denyut nadi cepat dan lemah, hipotensi, kulit dingin dan lembab terutama pada ekstremitas, sianosis, gelisah, penurunan kesadaran)

- i. Diagnosa Keperawatan :
1. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler, perdarahan, muntah, dan demam
 2. Perubahan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan perdarahan
 3. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah, tidak ada nafsu makan
 4. Perubahan proses keluarga berhubungan dengan kondisi anak
 5. Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus

Intervensi Keperawatan :

1. Mencegah terjadinya kekurangan volume cairan :
 - a. Mengobservasi tanda-tanda vital paling sedikit setiap 4 jam
 - b. Monitor tanda-tanda meningkatnya kekurangan cairan : turgor tidak elastis, ubun-ubun cekung, produksi urin menurun
 - c. Mengobservasi dan mencatat intake dan output
 - d. Memberikan hidrasi yang adekuat sesuai dengan kebutuhan tubuh
 - e. Memonitor nilai laboratorium : elektrolit darah, BJ urin, serum albumin
 - f. Memberikan hidrasi yang adekuat sesuai dengan kebutuhan tubuh
 - g. Mempertahankan intake dan output yang adekuat
 - h. Memonitor dan mencatat berat badan
 - i. Memonitor pemberian cairan melalui intravena setiap jam
 - j. Mengurangi kehilangan cairan yang tidak terlihat (IWL)
2. Perfusi jaringan adekuat
 - a. Mengkaji dan mencatat tanda-tanda vital (kualitas dan frekuensi denyut nadi, tekanan darah, capillary refill)
 - b. Mengkaji dan mencatat sirkulasi pada ekstremitas (suhu, kelembaban, dan warna)
 - c. Menilai kemungkinan terjadinya kematian jaringan pada ekstremitas seperti dingin, nyeri, pembengkakan kaki
3. Kebutuhan nutrisi adekuat
 - a. Ijinkan anak untuk memakan makanan yang dapat ditoleransi anak, rencanakan untuk memperbaiki kualitas gizi pada saat selera makan anak meningkat
 - b. Berikan makanan yang disertai suplemen nutrisi untuk meningkatkan kualitas intake nutrisi
 - c. Mengajukan kepada orang tua untuk memberikan makanan dengan tehnik porsi kecil tetapi sering
 - d. Menimbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama, dan skala yang sama
 - e. Mempertahankan kebersihan mulut pasien
 - f. Menjelaskan pentingnya intake nutrisi yang adekuat untuk penyembuhan penyakit

4. Mensupport coping keluarga adaptif
 - a. Mengkaji perasaan dan persepsi orang tua atau anggota keluarga terhadap situasi yang penuh stress
 - b. Ijinkan orang tua dan keluarga untuk memberikan respon secara panjang lebar dan identifikasi faktor yang paling mencemaskan keluarga
 - c. Identifikasi coping yang biasa digunakan dan seberapa besar keberhasilannya dalam mengatasi keadaan
 - d. Tanyakan kepada keluarga apa yang dapat dilakukan untuk membuat anak/keluarga menjadi lebih baik, dan jika memungkinkan memberikan apa yang diminta oleh keluarga
 - e. Memenuhi kebutuhan dasar anak; jika anak sangat tergantung dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ijinkan hal ini terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian secara bertahap meningkatkan kemandirian anak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
5. Mempertahankan suhu tubuh normal
 - a. Ukur tanda-tanda vital : suhu
 - b. Ajarkan keluarga dalam pengukuran suhu
 - c. Lakukan tepid sponge (seka) dengan air biasa
 - d. Tingkatkan intake cairan
 - e. Berikan terapi untuk menurunkan suhu

Hasil yang diharapkan :

1. Anak dapat menunjukkan tanda terpenuhinya kebutuhan cairan
2. Anak dapat menunjukkan tanda perfusi jaringan perifer yang adekuat
3. Anak menunjukkan kebutuhan nutrisi yang adekuat
4. Keluarga menunjukkan coping yang adaptif
5. Anak menunjukkan tanda-tanda vital dalam batas normal

L a t i h a n

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan 9 dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Buat rumusan tentang pengertian Anemia, leukemia, thalasemia, dan DBD !
2. Buat uraian mengenai konsep terjadinya Anemia, leukemia, thalasemia, dan DBD!
3. Buat rumusan tentang perbedaan penanganan/penatalaksanaan anemia, leukemia, thalasemia dan DBD pada anak !
4. Buatlah satu contoh asuhan keperawatan dengan gangguan system hematologi.

R a n g k u m a n

1. Anemia merupakan istilah umum untuk menguraikan penyakit yang berkaitan dengan suatu penurunan kadar hemoglobin kadar sirkulasi. Anemia dapat timbul sebagai akibat kehilangan

- darah, kerusakan eritrosit yang berlebihan, kekurangan zat besi yang disebutkan sebagai beberapa sebab utama saja.
2. Anemia dapat digolongkan menjadi anemia aplastik, anemia defisiensi zat besi, anemia sel sabit,
 3. Leukimia adalah proliferasi sel darah putih yang masih immatur dalam jaringan pembentuk darah
 4. Thalasemia adalah suatu gangguan darah yang diturunkan ditandai oleh defisiensi produksi rantai globin pada hemoglobin terutama rantai beta, kenderitanya dapat mempengaruhi juga rantai alfa.
 5. Demam berdarah Dengue adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue (arbovirus) yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk aedes aegypti.

Tes Formatif

1. Jelaskan perbedaan anemia dan thalasemia !
2. Bagaimana pengkajian pada kasus leukimia ?
3. Sebutkan diagnosa keperawatan yang sering muncul pada kasus DBD.
4. Jelaskan penanganan pada kasus DBD !
5. Jelaskan satu perencanaan keperawatan dari sebuah diagnose keperawatan yang sering muncul pada kasus thalasemia.
6. Jelaskan pemeriksaan penunjang pada kasus leukimia!

Kunci jawaban

1. Perbedaan anemia dan thalasemia adalah, anemia dapat disebabkan karena perdarahan, kekurangan zat besi, maupun kelainan pada eritrosit, yang mengakibatkan gangguan pada pengangkutan Oksigen, sedangkan thalasemia disebabkan karena kelainan pada haemoglobin yang secara normal memiliki 2 rantai Alfa dan rantai Beta, namun pada thalasemia terjadi abnormalitas sehingga mengganggu fungsi dari haemoglobin dalam mengangkut oksigen.
2. Pengkajian pada kasus leukimia
 - a. Riwayat penyakit
 - b. Kaji adanya tanda-tanda anemia : pucat, kelemahan, sesak, napas cepat
 - c. Kaji adanya tanda-tanda leukopenia : demam, infeksi
 - d. Kaji adanya tanda-tanda trombositopenia : petechiae, purpura perdarahan membran mukosa; kaji adanya tanda-tanda invasi ekstra medula : limfadenopati, hepatomegali, splenomegali
 - e. Kaji adanya pembesaran testis, hematuria, hipertensi, gagal ginjal, inflamasi disekitar rectal dan nyeri.
3. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada kasus DBD adalah

- a. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler, perdarahan, muntah, dan demam
 - b. Perubahan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan perdarahan
 - c. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah, tidak ada nafsu makan
 - d. Perubahan proses keluarga berhubungan dengan kondisi anak
 - e. Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi virus
4. Penangan pada kasus DBD adalah
- a. Minum banyak 1,5 – 2 liter/24 jam dengan air the, gula, atau susu
 - b. Antipiretik jika terdapat demam
 - c. Antikonvulsan jika terdapat kejang
 - d. Pemberian cairan melalui infus, dilakukan jika pasien mengalami kesulitan minum dan nilai hematokrit cenderung meningkat
 - e. Memenuhi kebutuhan nutrisi yang adekuat
 - a. Mengijinkan anak untuk memakan makanan yang dapat ditoleransi anak, rencanakan untuk memperbaiki kualitas gizi pada saat selera makan anak meningkat
 - b. Berikan makanan yang disertai suplemen nutrisi untuk meningkatkan kualitas intake nutrisi
 - c. Mengijinkan anak untuk terlibat dalam persiapan dan pemilihan makanan
 - d. Mengevaluasi berat badan anak setiap hari
5. Pemeriksaan darah tepi : terdapat lekosit imatur
- a) Aspirasi sumsum tulang (BMP) : hiperseluler terutama banyak terdapat sel muda
 - b) Biopsi sumsum tulang
 - c) Lumbal punksi untuk mengetahui apakah sistem saraf pusat terinfiltrasi

BAB X
ASUHAN KEPERAWATAN
GANGGUAN SISTEM PERKEMIHAN PADA ANAK

SATUAN BAHASAN 10 :

ASUHAN KEPERAWATAN SINDROM NEFROTIK, ASUHAN KEPERAWATAN GAGAL GINJAL AKUT DAN KRONIS.

a. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan gangguan system perkemihan pada anak yang terdiri dari asuhan keperawatan sindrom nefrotik, asuhan keperawatan gagal ginjal akut dan kronis.

Pada materi ini akan dibahas dari defenisi, patofisiologi, manifestasi klinis, penatalaksanaan, dan asuhan keperawatannya, dari masing-masing penyakit yang muncul pada anak.

b. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai asuhan keperawatan gangguan system perkemihan pada anak yang terdiri dari asuhan keperawatan sindrom nefrotik, asuhan keperawatan gagal ginjal akut dan kronis. Kemudian buatlah intisari/ringkasan dari pembahasan tersebut. Pahami dengan baik intisari/ringkasan.

c. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menyebutkan penyakit yang lazim muncul pada anak dengan gangguan system perkemihan.
2. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada beberapa penyakit kulit yang lazim ditemukan pada anak.
3. Mahasiswa memahami manfaat pengetahuan tentang asuhan keperawatan gangguan system perkemihan.

ASUHAN KEPERAWATAN SINDROM NEFROTIK, ASUHAN KEPERAWATAN GAGAL GINJAL AKUT DAN KRONIS.

A. Asuhan Keperawatan Sindrom nefrotik

1. Defenisi

Sindroma nefrotik ialah penyakit dengan gejala edema , proteinuria , hipoalbuminemia dan hiperkholesterolemia. Terbanyak terdapat antara 3-4 tahun dengan perbandingan pria ; wanita =2:1.

Tanda-tanda tersebut dijumpai disetiap kondisi yang sangat merusak membran kapiler glomerulus dan menyebabkan peningkatan permeabilitas glomerulus.

2. Patofisiologi

Manifestasi primer sindrom nefrotik adalah hilangnya plasma protein, terutama albumin, kedalam urine. Meskipun hati mampu meningkatkan produksi albumin, namun organ ini tidak mampu untuk terus mempertahankannya jika albumin terus menerus hilang melalui ginjal. Akhirnya terjadi hipoalbuminemia. Menurunnya tekanan onkotik menyebabkan edema generalisata akibat cairan yang berpindah dari system vaskuler kedalam ruang cairan ekstraseluler. Penurunan sirkulasi darah mengaktifkan system rennin – Angiotensin, menyebabkan retensi natrium dan edema lebih lanjut. Hilangnya protein dalam serum menstimulasi sintesis lipoprotein dihati dan peningkatan konsentrasi lemak dalam darah (hiperlipidemia)

Sindrom nefrotik dapat terjadi disetiap penyakit renal intrinsic atau sistemik yang mempengaruhi glomerulus. Meskipun secara umum penyakit ini dianggap menyerang anak-anak, namun sindrom nefrotik juga terjadi pada orang dewasa termasuk lansia. Penyebab mencakup glomerulonefritis kronik, diabetes mellitus disertai glomerulosklerosis intrakapiler, amilodosis ginjal, penyakit lupus eritematosus sistemik dan trombosis vena renal.

3. Manifestasi Klinik

Manifestasi sindrom nefrotik adalah edema. Edema biasanya lunak dan cekung bila ditekan (pitting), dan umumnya ditemukan disekitar mata (periorbital), pada area ekstremitas (sacrum, tumit dan tangan), dan pada abdomen (acites). Gejala lain seperti malaise, sakit kepala, iritabilitas dan keletihan umumnya terjadi.

4. Pembagian Sindrom Nefrotik (Etiologi)

Sebab yang pasti belum diketahui. Akhir-akhir ini dianggap sebagai suatu “auto immune disease”, jadi merupakan suatu reaksi antigen – antibody.

Umumnya orang membagi etiologinya dalam:

a. Sindroma Nefrotik Bawaan .

Resistem terhadap semua pengobatan .

Gejala; Edema pada masa neonatus. Pengangkokan ginjal dalam masa neonatus telah dicoba tapi tidak berhasil .

b. Sindroma Nefrotik Sekunder

Yang disebabkan oleh:

- 1) Malaria kuartana atau parasit lain

- 2) Penyakit kolagen seperti ; disseminated lupus erythematosus; anaphylactoid purpura.
 - 3) Glomerulonefritis akut atau glomerulonefritis kronik dan trombosis vena renalis.
 - 4) Bahan kimia : Trimetadion, paradion, penisilamin, garam emas, senagatan lebah, poison oak, air raksa.
 - 5) Amiloidosis, sick sell disease, hiperprolonemia.
- c. Syndrome Nefrotik Idiopatik
 Gambaran klinik : Edema merupakan klinik yang menonjol, kadang-kadang 40% dari berat badan. Pada keadaan anasarka terdapat asites, hidrotoraks, edema scrotum. Penderita sangat rentang terhadap infeksi sekunder. Selama beberapa minggu terdapat haem aturia, asotemia dan hipertensi ringan.

5. Evaluasi Diagnostik

Urinalisis menunjukkan haematuria mikroskopik, sedimen urine, dan abnormalitas lain. Jarum biopsi ginjal mungkin dilakukan untuk pemeriksaan histology terhadap jaringan renal untuk memperkuat diagnosis.

Terdapat proteinuri terutama albumin (85 – 95%) sebanyak 10 – 15 gr/hari. Ini dapat ditemukan dengan pemeriksaan Essbach. Selama edema banyak, diuresis berkurang, berat jenis urine meninggi. Sedimen dapat normal atau berupa toraks hialin, dan granula lipoid, terdapat pula sel darah putih. Dalam urine ditemukan double refractile bodies. Pada fase nonnefritis tes fungsi ginjal seperti : glomerular filtration rate, renal plasma flow tetap normal atau meninggi . Sedangkan maksimal konsentrating ability dan acidification kencing normal . Kemudian timbul perubahan pada fungsi ginjal pada fase nefrotik akibat perubahan yang progresif pada glomerulus.

Kimia darah menunjukkan hipoalbuminemia, kadar globulin normal atau meninggi sehingga terdapat rasio Albumin-globulin yang terbalik, hiperkolesterolemia, fibrinogen meninggi. Sedangkan kadar ureum normal. Anak dapat menderita defisiensi Fe karena banyak transferin ke luar melalui urine. Laju endap darah tinggi, kadar kalsium darah sering rendah dalam keadaan lanjut kadang-kadang glukosuria tanpa hiperglikemia.

6. Penatalaksanaan

- a. Istirahat sampai tinggal edema sedikit.
- b. Makanan yang mengandung protein sebanyak 3-4 mg/kgBB/hari : minimum bila edema masih berat. Bila edema berkurang diberi garam sedikit.
- c. Mencegah infeksi. Diperiksa apakah anak tidak menderita TBC.
- d. Diuretika.
- e. Inter national Cooperatife study of Kidney disease in Children mengajukan:
 - 1) Selama 28 hari prednison per os sebanyak 2 mg/kgBB/sehari dengan maksimum sehari 80 mg.

- 2) Kemudian prednison per os selama 28 hari sebanyak 1,5 mg/kgBB / hari setiap 3hari dalam 1minggggu dengan dosis maksimum sehari: 60mg. Bila terdapat respons selama (b) maka dilanjutkan dengan 4 minggu secara intermiten.
 - 3) Pengobatan prednison dihentikan. Bila terjadi relaps maka seperti pada terapi permulaan diberi setiap hari prednison sampai urine bebas protein. Kemudian seperti terapi permulaan selama 5 minggu tetapi secara interminten.
- f. Antibiotika hanya diberikan jika ada infeksi.
- g. Lain-lain : Fungsi acites, Fungsi hidrotoraks dilakukan bila ada indikasi vital. Bila ada dekompensasi jantung diberikan digitalisasi.

1. Pengkajian

- a. Sistem Genitourinaria
 - 1) Proteinuria
 - 2) Hematuria
 - 3) Albuminuria
 - 4) Oliguria
 - 5) Anuria
- b. Sistem Integumen
 - 1) Oedema
 - 2) Kulit kering
 - 3) Pucat
- c. Sistem Sirkulasi
 - 1) Hipertensi
 - 2) Anemia
- d. Sistem Gastrointestinal
 - 1) Mual
 - 2) Muntah
 - 3) Anoreksia
- e. Sistem Musculoskeletal
 - 1) Lethargi
 - 2) Malaise dan Intoleran aktifitas

2. Rencana Asuhan Keperawatan

Diagnosa Keperawatan 1.

Kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan haluaran urin, dan perubahan osmolar karena kehilangan protein.

Tujuan: Mempertahankan berat tubuh ideal tanpa kelebihan cairan dengan kriteria :

- a. Oedema berkurang/hilang, haluaran urine dalam batas normal (1–2 ml/KgBB/jam)
- b. Tekanan darah dalam batas normal.
- c. Tidak ada peningkatan berat badan/perubahan berat badan yang lambat, menunjukkan tanda-tanda vital normal.

Intervensi:

- a. Kaji ulang status cairan dan pertahankan status cairan dalam batas normal dengan :
 - 1) Timbang berat badan harian

- 2) Hitung balance cairan
 - 3) Amati turgor kulit dan adanya edema
 - 4) observasi tekanan darah, denyut dan irama nadi minimal per 4 jam.
- b. Identifikasi sumber potensial cairan
 - 1) Medikasi dan cairan yang digunakan untuk pengobatan.
 - 2) Makanan
 - c. Kolaborasi dengan tim gizi dalam pemberian makanan dengan diet rendah garam/pantang garam.
 - d. Bantu klien dalam menghadapi ketidaknyamanan akibat pembatasan makanan.
 - e. Tingkatkan dan dorong hygiene oral dengan sering dengan menyikat gigi terutama sebelum makan.

Diagnosa Keperawatan 2.

Perubahan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia dan pembatasan diet.

Tujuan:

- a. Intake pemasukan nutrisi adekuat sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan dengan kriteria 90 % nutrisi dapat terpenuhi.
- b. Berat badan sesuai.
- c. Menunjukkan tidak adanya penambahan atau penurunan berat badan yang cepat.
- d. Menunjukkan turgor kulit yang normal tanpa edema dan kadar albumin plasma normal.

Intervensi:

- a. Observasi status nutrisi berupa :
 - 1) Pengukuran antropometrik
 - 2) Pantau nilai lab. (kreatinin, protein)
- b. Kaji ulang pola diet nutrisi klien dengan memantau :
 - 1) Riwayat diet.
 - 2) Makanan kesukaan.
- c. Kaji faktor yang berperan dalam mengubah masukan nutrisi :
 - 1) Anoreksia, mual dan muntah.
 - 2) Diet yang tidak menyenangkan bagi klien.
 - 3) Kurang memahami pembatasan diet.
 - 4) Stomatitis.
- d. Menyediakan makanan kesukaan klien dalam batas-batas diet.
- e. Anjurkan camilan tinggi kalori, rendah natrium diantara waktu makan seperti biskuit tawar (gabin)
- f. Jelaskan rasional pembatasan diet dan hubungan dengan penyakit yang diderita klien.
- g. Ciptakan lingkungan yang menyenangkan selama waktu makan
- h. Kaji ulang bukti adanya masukan protein yang tidak adequate :
 - 1) Pembentukan edema ditempat lain setiap hari
 - 2) Penyembuhan yang lambat
 - 3) Penurunan kadar albumin serum.

Diagnosa Keperawatan 3 :

Intoleran aktivitas berhubungan dengan kelelahan/kelemahan, anemia dan retensi produk sampah.

Tujuan: Berpartisipasi terhadap aktifitas yang dapat ditoleransi dengan kriteria :

- a. Melaporkan peningkatan rasa sejahtera.
- b. Melakukan aktifitas dan istirahat secara bergantian.
- c. Berpartisipasi dalam aktifitas perawatan mandiri yang dipilih.
- d. Kadar Hb kembali normal.

Intervensi:

- a. Observasi faktor yang menyebabkan/menimbulkan kelelahan berupa ;
 - 1) Anemia.
 - 2) Retensi produk sampah (ureum dan kreatinin).
- b. Tingkatkan kemandirian dalam aktivitas perawatan diri yang dapat ditoleransi. Bantu jika kelelahan terjadi.
- c. Anjurkan aktivitas alternatif sambil istirahat misalnya dengan membaca buku atau bermain.

Diagnosa Keperawatan 4 :

Kecemasan klien dan orang tua berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang kondisi dan penanganannya

Tujuan: Kecemasan orang tua berkurang/hilang dengan kriteria orang tua dapat relaksasi dan tenang, partisipasi dalam aktivitas, tenang dan berpartisipasi dalam perawatan dan pengobatan

Intervensi :

- a. Kaji pemahaman tentang penyakit yang diderita anaknya, konsekuensi dan penanganannya.
- b. Jelaskan fungsi renal dan konsekuensi penyakit sesuai tingkat pemahaman dan kesiapan klien dan keluarga untuk belajar.
- c. Bantu klien dan keluarga untuk mengidentifikasi cara-cara untuk memahami berbagai perubahan akibat penyakit dan penanganan yang mempengaruhi hidupnya.

B. Asuhan Keperawatan Gagal ginjal akut dan kronis

1. Gagal Ginjal Akut

a. Defenisi

Gagal ginjal akut ialah suatu keadaan klinik dimana jumlah urin mendadak berkurang di bawah 300 ml/m² dalam sehari disertai gangguan fungsi ginjal lainnya. Seiring dipergunakan istilah lain untuk keadaan tersebut seperti nefrosis toksik akut, nekrosis tubular akut, nefrosis nefron rendah dan lain sebagainya.

b. Penyebab

1. Faktor Prerenal

Semua faktor yang menyebabkan peredaran darah ke ginjal berkurang dengan terdapatnya hiovolemia, misalnya :

- a) Perdarahan karena trauma operasi

- b) Dehidrasi atau berkurangnya volume cairan ekstraseluler (dehidrasi pada diare).
- c) Berkumpulnya cairan intersititial di suatu daerah luka (kombustio), pasca bedah yang cairannya berkumpul di daerah operasi, peritonitis dan proses eksudatif lain yang menyebabkan hipovolemia).

Bila faktor prarental dapat diatasi, faal ginjal akan menjadi normal kembali, tetapi jika hipovolemia berlangsung lama, maka akan terjadi kerusakan pada parenkim ginjal.

2. Faktor Renal

Faktor ini merupakan sebab gagal ginjal akut terbanyak. Terjadi kerusakan di glomerulus berlangsung cepat dan mendadak, atau dapat berlangsung perlahan-lahan dan akhirnya mencapai stadium uremis, kelainan di ginjal ini dapat merupakan kelanjutan dari hipoperfusi prerenal dan iskemia kemudian menyebabkan nekrosis jaringan ginjal.

Berbagai penyebab kelainan ini ialah

- a) Koagulasi intravaskuler seperti pada sindrom hemolitik uremik, renjatan sepsis dan renjatan hemoragik, heparin digunakan untuk mengurangi trombosis dan meluasnya kelainan ginjal.
- b) Glomerulopati (akut) seperti glomerulonefritis akut ascastreptococ, lupusnefritism rapidly progressive glomerulobefritis, penolakan akut atau krisis donor ginjal.
- c) Penyakit neoplastik akut seperti leukemia, limfoma, dan tumor lain yang langsung menginfiltrasi ginjal dan menimbulkan kerusakan, kerusakan ini dapat disebabkan oleh jiperuresemia atau xantinuria.
- d) Nekrosis ginjal akut misalnya nekrosis tubulus akit akibat renjatan dan iskemia lama, nefrotoksin (kloroform, sublimat, insektisida organik, kloraskalilus dan lain-lain)
- e) Pielonefritis akut (jarang menyebabkan gagal ginjal akut) tetapi umumnya pielonefritis kronik berpulang baik sebagai penyakit primer maupun sebagai komplikasi kelainan structural menyebabkan kehilangan faal ginjal secara progresif.
- f) Glomereonefritis kronik dengan kehilangan fungsi progresif,

3. Faktor pascarenal

Semua faktor yang menyebabkan obstruksi pada saluran kemih seperti kelainan bawaan, tumor, nefrolitiasis, keracunan jengkol, dan sebagainya harus bersifat bilateral.

c. Pengkajian

- 1. Sistem Genitourinaria
 - a) Oliguria
 - b) Anuria
- 2. Sistem Persarafan
 - a) Pusing

- b) Apati sampai somnolent
- c) Kejang
- 3. Sistem Integumen
 - a) Dehidrasi
 - b) Kulit kering
- 4. Sistem Sirkulasi
 - a) Hipertensi
 - b) Hipervolemia
 - c) Anemia

d. Rencana Asuhan Keperawatan

Diagnosa Keperawatan 1:

Kelebihan volume cairan berhubungan dengan gagal atau penurunan mekanisme regulasi ginjal

Hasil yang diharapkan: Anak tidak menunjukkan bukti atau komplikasi akumulasi cairan dan produk sisa antara periode dialysis.

Intervensi Keperawatan/Rasional

1. Bantu dalam dialysis untuk mempertahankan fungsi ekskretori.
2. Pantau kemajuan untuk mengkaji keadekuatan terapi dan mendeteksi kemungkinan komplikasi.

Diagnosis Keperawatan 2:

Risiko tinggi cedera berhubungan dengan akumulasi elektrolit dan produk sisa

Hasil Yang diharapkan: Anak tidak menunjukkan akumulasi produk sisa.

Intervensi Keperawatan/Rasional

1. Bantu dengan analisis untuk mempertahankan fungsi ekskresi.
2. Berikan katexalate sesuai ketentuan untuk menurunkan kadar kalium serum.
3. Berikan diet rendah protein, kalium, dan natrium, bila diresepkan untuk menurunkan kebutuhan ekskresi pada ginjal
4. Observasi adanya bukti-bukti produk sisa yang terakumulasi (hiperkalemia, hipernatremia, uremia) untuk menjamin pengobatan yang segera.

Diagnosa Keperawatan 3:

Potensial infeksi berhubungan dengan penurunan pertahanan tubuh, kelebihan beban cairan.

Hasil yang diharapkan: Anak dan keluarga menerapkan praktik kesehatan, anak tidak menunjukkan bukti-bukti infeksi.

Intervensi Keperawatan/Rasional

1. Lindungi anak dari kontak dengan individu yang terinfeksi untuk meminimalkan pemajanan pada organisasi infeksi.
2. Tempatkan dalam ruangan dengan anak tidak terinfeksi
3. Batasi kontak dengan individu yang mengalami infeksi, termasuk keluarga, anak lain, teman, dan anggota staf.

4. Ajari pengunjung, tentang perilaku pencegahan yang tepat (mis, mencuci tangan)
5. Observasi aseptis medis
6. Lakukan teknik mencuci tangan yang baik
7. Jaga agar anak tetap hangat dan kering karena kerentanan terhadap infeksi pernapasan atas.

2. Gagal Ginjal Kronik

a. Defenisi

Gagal ginjal kronik (GGK) merupakan suatu penyakit ginjal tahap akhir yang terjadi bila ginjal yang sakit tidak mampu mempertahankan komposisi kimiawi cairan tubuh dalam batas normal.

b. Pengkajian awal

1. Lakukan pengkajian fisik rutin dengan memperhatikan pengukuran parameter pertumbuhan.
2. Dapatkan riwayat kesehatan, khususnya mengenai disfungsi ginjal, perilaku makan, frekuensi infeksi, tingkat energi.
3. Observasi adanya bukti-bukti manifestasi GGK

c. Tanda dan Gejala

1. Kehilangan energi normal
2. Peningkatan kelelahan saat aktivitas
3. Pucat
4. Peningkatan tekanan darah.
5. Retardasi pertumbuhan
6. Penurunan berat badan

d. Pengkajian

1. Sistem Genitourinaria
 - a) Oliguria
 - b) Anuria
2. Sistem Persarafan
 - a) Pusing
 - b) Apati sampai somnolent
 - c) Kejang
3. Sistem Integumen
 - a) Dehidrasi
 - b) Kulit kering
4. Sistem Sirkulasi
 - a) Hipertensi
 - b) Hipervolemia
 - c) Anemia

e. Rencana Asuhan Keperawatan

Diagnosis Keperawatan 1:

Risiko Tinggi cedera berhubungan dengan akumulasi elektrolit dan produk sisa.

Hasil yang diharapkan: Anak tidak menunjukkan bukti akumulasi produk sisa.

Intervensi Keperawatan/Rasional

1. Bantu dengan analisis untuk mempertahankan fungsi ekskresi.
2. Berikan katexalate sesuai ketentuan untuk menurunkan kadar kalium serum.
3. Berikan diet rendah protein, kalium, dan natrium, bila diresepkan untuk menurunkan kebutuhan ekskresi pada ginjal
4. Observasi adanya bukti-bukti produk sisa yang terakumulasi hiperkalemia, hipernatremia, uremia untuk menjamin pengobatan yang segera.

Diagnosa keperawatan 2:

Kelebihan Volume cairan berhubungan dengan gagalnya mekanisme regulasi ginjal.

Hasil yang diharapkan: Anak tidak menunjukkan bukti atau komplikasi akumulasi cairan dan produk sisa antara periode dianalisis.

Intervensi Keperawatan/Rasional

1. Bantu dalam dialysis untuk mempertahankan fungsi ekskretori.
2. Pantau kemajuan untuk mengkaji keadekuatan terapi dan mendeteksi kemungkinan komplikasi.

Diagnosa Keperawatan 3:

Perubahan nutrisi berhubungan dengan pembatasan diet.

Hasil yang diharapkan: Pasien mengkonsumsi diet yang tepat.

Intervensi Keperawatan/Rasional

1. Berikan instruksi diet untuk makanan yang menurunkan kebutuhan ekskretorius pada ginjal dan berikan kalori yang cukup serta protein untuk pertumbuhan.
2. Batasi protein, fosfor, garam dan kalium sesuai ketentuan.
3. Dorong masukan karbohidrat, memberikan kalori untuk pertumbuhan, dan makanan tinggi kalsium untuk mencegah demineralisasi tulang.
4. Anjurkan makanan yang kaya asa,, dosfat dan beri karena anemia dalam komplikasi dari GGK.
5. Atur pertemuan ahli diet ginjal dengan keluarga untuk membahas makanan yang diizinkan dan membentuk dalam perencanaan diet sehingga keluarga memahami kebutuhan diet anak.
6. Bantu pasien hemodialisis dalam mengisi permintaan menu makanan (untuk dimakan pada saat dialysis).

Diagnosa Keperawatan 4:

Gangguan citra tubuh berhubungan dengan penyakit kronis, kerusakan pertumbuhan dan persepsi tentang menjadi berbeda.

Hasil Yang diharapkan: Anak menunjukkan pemahaman tentang GGK dan mematuhi terapi. Anak menunjukkan tanda-tanda harga diri positif.

Intervensi Keperawatan/Rasional

1. Berikan pendidikan tentang GGK, termasuk penatalaksanaan, pengobatan dan hasil jangka panjang.
2. Dorong kemandirian anak dalam perawatan dan penatalaksanaan GGK karena kemandirian membantu anak mengembangkan harga positif.
3. Izinkan anak untuk berpartisipasi dalam prosedur dialysis.
4. Izinkan anak untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan bila tepat.
5. Tingkatkan harga diri pada anak GGK
6. Atur kelompok pendukung pasien atau berikan konseling sesuai kebutuhan.
7. Berikan penguatan positif selama prosedur dianalisis dan kunjungan tindak lanjut.

Diagnosa Keperawatan 5:

Perubahan Proses keluarga berhubungan dengan akan yang menderita penyakit kronis.

Hasil yang diharapkan: Anak dan keluarga menunjukkan kemampuan untuk melakukan koping terhadap stress penyakit (uraikan).

Intervensi Keperawatan/Rasional

1. Bantu orangtua dalam perencanaan diet dan dukung upaya mereka untuk menyesuaikan diet untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga.
2. Berikan bimbinganantisipasi yang berhubungan dengan kemungkinan dan kejadian yang diperkirakan, seperti gejala, diet, dan efek obat-obatan.
3. Bantu orangtua dalam pembuatan keputusan mengenai analisis dan transplantasi karena akan ada alternatif lain bila perawatan paliatif tidak lagi efektif.
4. Siapkan anak dan keluarga untuk hemodialisis di rumah atau dialysis peritonel kontinu di rumah.
5. Pertahankan kontak periodic dengan keluarga untuk dukungan terus-menerus.
6. Rujuk keluarga pada lembaga khusus dan kelompok pendukung untuk dukungan jangka panjang

LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan X, dipersilahkan mengerjakan latihan berikut:

1. Buat uraian tentang asuhan keperawatan sindrom nefrotik
2. Buat uraian tentang asuhan keperawatan gagal ginjal akut
3. Buat uraian tentang asuhan keperawatan gagal ginjal kronik.

RANGKUMAN

1. Penyakit yang biasa muncul pada system perkemihan pada anak yaitu sindrom nefrotik, gagal ginjal akut, dan gagal ginjal kronik.
2. Sindrom nefrotik adalah penyakit dengan gejala edema, proteinuria, hipalbuminemia dan hiperkholesterolemia.
3. Syndrome nefrotik terdiri atas tiga, yaitu: sindrom nefrotik bawaan, sindrom nefrotik sekunder, dan sindrom nefrotik idiopatik.
4. Gagal ginjal akut adalah suatu keadaan klinik dimana jumlah urin mendadak berkurang dibawah 300 ml/m² dalam sehari disertai gangguan fungsi ginjal lainnya.
5. Gagal ginjal kronik adalah suatu penyakit ginjal tahap akhir yang terjadi bila ginjal yang sakit tidak mampu mempertahankan komposisi kimiawi cairan tubuh dalam batas normal.

TES FORMATIF

1. Sebutkan manifestasi klinik yang muncul pada sindrom nefrotik!
2. Sebutkan penatalaksanaan yang dilakukan pada sindrom nefrotik.
3. Jelaskan penyebab terjadinya gagal ginjal akut!
4. Sebutkan diagnose keperawatan utama dari gagal ginjal akut serta intervensi yang dapat dilakukan!
5. Sebutkan tanda dan gejala yang dirasakan pada gagal ginjal kronik!
6. Sebutkan diagnose keperawatan yang dapat muncul pada gagal ginjal kronik!

KUNCI JAWABAN

1. Manifestasi klinik sindrom nefrotik adalah edema. Edema biasanya lunak dan cekung bila ditekan (piting), dan umumnya ditemukan disekitar mata (periorbital), pada area ekstremitas (sacrum, tumit dan tangan), dan pada abdomen (acites). Gejala lain seperti malaise, sakit kepala, iritabilitas dan keletihan umumnya terjadi.
2. Adapun penatalaksanaan pada sindrom nefrotik yaitu:
 - a. Istirahat sampai tinggal edema sedikit.
 - b. Makanan yang mengandung protein sebanyak 3-4 mg/kgBB/hari :minimum bila edema masih berat. Bila edema berkurang diberi garam sedikit.
 - c. Mencegah infeksi. Diperiksa apakah anak tidak menderita TBC.
 - d. Diuretika.
 - e. Inter national Cooperatife study of Kidney disease in Children mengajukan:
 - 1) Selama 28 hari prednison per os sebanyak 2 kg/kgBB/sehari dengan maksimun sehari 80 mg.

- 2) Kemudian prednison per os selama 28 hari sebanyak 1,5 mg/kgBB / hari setiap 3hari dalam 1minggu dengan dosis maksimum sehari : 60mg . Bila terdapat respons selama (b) maka dilanjutkan dengan 4 minggu secara intermiten.
- 3) Pengobatan prednison dihentikan. Bila terjadi relaps maka seperti pada terapi permulaan diberi setiap hari prednison sampai urine bebas protein. Kemudian seperti terapi permulaan selama 5 minggu tetapi secara intermiten.
- f. Antibiotika hanya diberikan jika ada infeksi.
- g. Lain-lain : Fungsi acites, Fungsi hidrotoraks dilakukan bila ada indikasi vital. Bila ada dekompensasi jantung diberikan digitalisasi.
3. Penyebab gagal ginjal akut yaitu:
 - a. Faktor Prerenal: semua faktor yang menyebabkan peredaran darah ke ginjal berkurang dengan terdapatnya hipovolemia.
 - b. Faktor Renal: merupakan sebab gagal ginjal akut terbanyak. Terjadi kerusakan di glomerulus berlangsung cepat dan mendadak, atau dapat berlangsung perlahan-lahan dan akhirnya mencapai stadium uremis, kelainan di ginjal ini dapat merupakan kelanjutan dari hipoperfusi prerenal dan iskemia kemudian menyebabkan nekrosis jaringan ginjal.
 - c. Faktor Pascarenal: semua faktor yang menyebabkan obstruksi pada saluran kemih seperti kelainan bawaan, tumor, nefrolitiasis, keracunan jengkol, dan sebagainya harus bersifat bilateral.
4. Diagnose keperawatan utama pada gagal ginjal akut yaitu: Kelebihan volume cairan berhubungan dengan gagal atau penurunan mekanisme regulasi ginjal.
Adapun intervensinya yaitu:
 - a. Bantu dalam dialysis untuk mempertahankan fungsi ekskretori.
 - b. Pantau kemajuan untuk mengkaji keadekuatan terapi dan mendeteksi kemungkinan komplikasi.
5. Tanda dan gejala dari gagal ginjal kronik yaitu:
 - a. Kehilangan energi normal
 - b. Peningkatan kelelahan saat aktivitas
 - c. Pucat
 - d. Peningkatan tekanan darah.
 - e. Retardasi pertumbuhan
 - f. Penurunan berat badan
6. Diagnosa keperawatan yang muncul pada gagal ginjal kronik yaitu:
 - a. Resiko tinggi cedera berhubungan dengan akumulasi elektrolit dan produk sisa.
 - b. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan gagalnya mekanisme regulasi ginjal.
 - c. Perubahan nutrisi berhubungan dengan pembatasan diet.
 - d. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan penyakit kronis, kerusakan pertumbuhan dan persepsi tentang menjadi berbeda.
 - e. Perubahan proses keluarga berhubungan dengan akan yang menderita penyakit kronis.

BAB XI

ASUHAN KEPERAWATAN GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN

SATUAN BAHASAN 11:

PENGERTIAN DIARE, ETIOLOGI, PATOFISIOLOGI, KLASIFIKASI, MANIFESTASI, KOMPLIKASI, PENATALAKSANAAN, DAN ASUHAN KEPERAWATAN DIARE.

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah ini membahas mengenai pengertian diare, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi, komplikasi, penatalaksanaan, dan asuhan keperawatan diare.

Mengenai klasifikasi diare dikemukakan pendapat Ashwill dan Droske.

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai pengertian diare, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi, komplikasi, penatalaksanaan, dan asuhan keperawatan diare. Kemudian buatlah intisari/ ringkasan tiap poin pembahasan. Fahami dengan baik intisari/ ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian diare
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang etiologi diare
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang patofisiologi diare
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang klasifikasi diare
5. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang manifestasi diare
6. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang komplikasi diare
7. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang penatalaksanaan diare
8. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang asuhan keperawatan diare
9. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang pengertian diare
10. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang etiologi diare
11. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang patofisiologi diare
12. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang klasifikasi diare
13. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang manifestasi diare
14. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang komplikasi diare
15. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang penatalaksanaan diare
16. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang asuhan keperawatan diare
17. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang pengertian diare
18. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang etiologi diare
19. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang patofisiologi diare
20. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang klasifikasi diare

21. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang manifestasi diare
22. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang komplikasi diare
23. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang penatalaksanaan diare
24. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang asuhan keperawatan diare

PENGETERIAN DIARE, ETIOLOGI, PATOFISIOLOGI, KLASIFIKASI, MANIFESTASI, KOMPLIKASI, PENATALAKSANAAN, DAN ASUHAN KEPERAWATAN DIARE

A. Pengertian

Diare adalah keadaan kekerapan dan keenceran buang air besar dimana frekuensinya lebih dari tiga kali per hari dan banyaknya lebih dari 200 – 250 gram.

B. Etiologi

1. Faktor Infeksi

- a. Infeksi enteral yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare pada anak.
- b. Infeksi bakteri : *Vibrio comma*, *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Compiobacter*, *Yersenia* dan *Acromonas*.
- c. Infeksi virus : Entero virus (*Virus echo*, *Coxsackie* dan *Poliomyelitis*), *Adeno virus*, *Rota virus* dan *Astrovirus*.
- d. Infeksi parasit : Cacing, protozoa dan jamur.
- e. Infeksi parental, yaitu infeksi dibagian tubuh lain diluar alatpencernaan, seperti *Otitis Media Akut*, *Tonsilopharingitis* dan sebagainya. Keadaan ini terutama pada bayi dan anak dibawah 2 tahun.

2. Bukan faktor infeksi

- a. Alergi makanan : susu dan protein.
- b. Gangguan metabolik atau malabsorpsi.
- c. Iritasi langsung pada saluran pencernaan oleh makanan.
- d. Obat-obatan seperti antibiotik.
- e. Penyakit usus seperti *Colitis ulserative*, *crohn disease* dan *enterocolitis*.
- f. Faktor psikologis : rasa takut dan cemas.
- g. Obstruksi usus.

C. Patofisiologi

1. Gangguan osmotik

Makanan atau zat yang tidak dapat diserap menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit kedalam rongga usus, hal ini menyebabkan isi rongga usus berlebihan sehingga merangsang usus mengeluarkannya (diare).

2. Gangguan sekresi

Toxin pada dinding usus meningkatkan sekresi air dan elektrolit kedalam usus, peningkatan isi rongga usus merangsang usus untuk mengeluarkannya.

3. Gangguan motilitas usus

Hyperperistaltik menyebabkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan. Atau *peristaltik* yang menurun menyebabkan bakteri tumbuh berlebihan menyebabkan peradangan pada rongga usus sehingga

sekresi air dan elektrolit meningkat hal ini menyebabkan absorpsi rongga usus menurun sehingga terjadilah diare.

D. Klasifikasi diare

Tahapan dehidrasi menurut **Ashwill dan Droske (1977)** :

1. *Dehidrasi ringan* : dimana berat badan menurun 3 – 5 % dengan volume cairan yang hilang kurang dari 50 ml/kgBB.
2. *Dehidrasi sedang* : dimana berat badan menurun 6 – 9 % dengan volume cairan yang hilang kurang dari 50 – 90 ml/kgBB.
3. *Dehidrasi berat* : dimana berat badan menurun lebih dari 10 % dengan volume cairan yang hilang sama dengan atau lebih dari 100 ml/kgBB.

Derajat dehidrasi menurut WHO :

YANG DINILAI	SKOR		
	1	2	3
Keadaan Umum	Baik	Lesu/haus	Gelisah, Lemas, Ngantuk, Syok
Mata	Biasa	Cekung	Sangat cekung
Mulut	Biasa	Kering	Sangat Kering
Pernafasan	< 30x	30 – 40 x	> 40x
Turgor	Baik	Kurang	Jelek
Nadi	< 120x	120 – 140x	> 140 x

Keterangan :

Skor : 6 : Tanpa dehidrasi, 7 – 12 : Dehidrasi ringan – sedang, dan
 ≥ 13 : Dehidrasi berat

E. Manifestasi Klinik

Gejal klinik yang timbul tergantung dari intensitas dan tipe diare, namun secara umum tanda dan gejala yang sering terjadi adalah :

- a. Sering buang air besar lebih dari 3 kali dan dengan jumlah 200 – 250 gr.
- b. Anorexia.
- c. Vomiting.
- d. Feces encer dan terjadi perubahan warna dalam beberapa hari.
- e. Terjadi perubahan tingkah laku seperti rewel, iritabel, lemah, pucat, konvulsi, dan merasa nyeri pada saat buang air besar.
- f. Respirasi cepat dan dalam.

- g. Kehilangan cairan/dehidrasi dimana jumlah urine menurun, turgor kulit jelek, kulit kering, terdapat fontanel dan mata yang cekung serta terjadi penurunan tekanan darah.

F. Komplikasi

Komplikasi yang sering terjadi pada anak yang menderita diare adalah :

1. Dehidrasi
2. Hipokalemi.
3. Hipokalsemi
4. Cardiac disrythmias
5. Hiponatremi.
6. Syok hipovolemik
7. Asidosis.

G. Penatalaksanaan

Dasar-dasar penatalaksanaan diare pada anak adalah : **(5 D)**

1. Dehidrasi.
2. Diagnosis.
3. Diet.
4. Defisiensi disakarida
5. Drugs

Pada dehidrasi ringan diberikan :

1. Oralit + cairan
2. ASI/susu yang sesuai
3. Antibiotika (hanya kalau perlu saja)

Pada dehidrasi sedang, penderita tidak perlu dirawat dan diberikan :

1. Seperti pengobatan dehidrasi ringan
2. Bila tidak minum ASI :
 - a. Kurang dari 1 tahun LLM dengan takaran 1/3, 2/3 penuh ditambah oralit.
 - b. Untuk umur 1 tahun lebih , BB 7 kg lebih : teh, biskuit, bubur dan seterusnya selain oralit. Formula susu dihentikan dan baru dimulai lagi secara realimentasi setelah makan nasi.

Pada dehidrasi berat, penderita harus dirawat di RS. Pengobatan diare lebih mengutamakan pemberian cairan, kalori dan elektrolit yang bisa berupa larutan oralit (garam diare) guna mencegah terjadinya dehidrasi berat, sedangkan antibiotika atau obat lain hanya diberikan bila ada indikasi yang jelas. Spasmolitik dan obstipansia pada diare tidak diberikan karena tidak bermanfaat bahkan dapat memperberat penyakit.

Penanganan IVFD :

1. \leq 2 tahun : ASERING system 24 jam
 - 4 Jam I : 5 tts / Kg bb / mnt
 - 20 Jam II : 3 tts / Kg bb / mnt

2. > 2 tahun : RL system 8 jam
 1 jam I : 10 tts / Kg bb / mnt
 7 jam II : 3 tts / Kg bb / mnt

H. Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

Dasar data pengkajian klien :

a. Aktivitas/Istirahat

Gejala : Kelemahan, kelelahan, malaise, cepat lelah. Insomnia, tidak tidur semalaman karena diare. Merasa gelisah dan ansietas. Pembatasan aktivitas/kerja s/d efek proses penyakit.

b. Sirkulasi

Tanda : Takhikardi (respon terhadap demam, dehidrasi, proses inflamasi dan nyeri). Kemerahan, area ekimosis (kekurangan vitamin K). Hipotensi termasuk postural. Kulit/membran mukosa : turgor buruk, kering, lidah pecah-pecah (dehidrasi/malnutrisi).

c. Integritas Ego

Gejala : Ansietas, ketakutan, emosi kesal, mis. Perasaan tidak berdaya/tidak ada harapan. Faktor stress akut/kronis mis. Hubungan dengan keluarga/pekerjaan, pengobatan yang mahal. Faktor budaya – peningkatan prevalensi.

Tanda : Menolak, perhatian menyempit, depresi.

d. Eliminasi

Gejala : Tekstur feses bervariasi dari bentuk lunak sampai bau atau berair. Episode diare berdarah tidak dapat diperkirakan, hilang timbul, sering tidak dapat dikontrol, perasaan dorongan/kram (tenesmus). Defekasi berdarah/pus/mukosa dengan atau tanpa keluar feces. Perdarahan rektal.

Tanda : Menurunnya bising usus, tidak ada peristaltik atau adanya peristaltik yang dapat dilihat. Haemoroid, oliguria.

e. Makanan/Cairan

Gejala : Anoreksia, mual/muntah. Penurunan BB. Tidak toleran terhadap diet/sensitive mis. Buah segar/sayur, produk susu, makanan berlemak.

Tanda : Penurunan lemak subkutan/massa otot. Kelemahan, tonus otot dan turgor kulit buruk. Membran mukosa pucat, luka, inflamasi rongga mulut.

f. Higiene

Tanda : Ketidakmampuan mempertahankan perawatan diri. Stomatitis menunjukkan kekurangan vitamin. Bau badan.

g. Nyeri/Kenyamanan

Gejala :Nyeri/nyeri tekan pada kuadran kanan bawah (mungkin hilang dengan defakasi). Titik nyeri berpindah, nyeri tekan, nyeri mata, foofobia.
Tanda :Nyeri tekan abdomen/distensi.

h. K e a m a n a n

Gejala : Anemia hemolitik, vaskulitis, arthritis, peningkatan suhu (eksaserbasi akut), penglihatan kabur. Alergi terhadap makanan/produk susu.
Tanda :Lesi kulit mungkin ada, ankilosa spondilitis, uveitis, konjungtivitis/iritis.

i. Interaksi Sosial

Gejala :Masalah hubungan/peran s/d kondisi, ketidakmampuan aktif dalam sosial.

j. Penyuluhan Pembelajaran

Gejala :Riwayat keluarga berpenyakit Diare.

2. Diagnosa Keperawatan, Tujuan, Rasionalisasi Yang Lazim Terjadi

a. *Diare b/d inflamasi, iritasi dan malabsorpsi usus, adanya toksin dan penyempitan segmental usus ditandai dengan :*

- 1) Peningkatan bunyi usus/peristaltik.
- 2) Defakasi sering dan berair (fase akut)
- 3) Perubahan warna feses.
- 4) Nyeri abdomen tiba-tiba, kram.

Tujuan :

- 1) Keluarga akan melaporkan penurunan frekuensi defakasi, konsistensi kembali normal.
- 2) Keluarga akan mampu mengidentifikasi/menghindari faktor pemberat.

Intervensi :

- 1) Observasi dan catat ferkuensi defakasi, karekeristik, jumlah dan faktor pencetus.
R/ : Membantu membedakan penyakit individu dan mengkaji beratnya episode.
- 2) Tingkatkan tirah baring, berikan alat-alat disamping tempat tidur.
R/ : Istirahat menurunkan motalitas usus juga menurunkan laju metabolisme bila infeksi atau perdarahan sebagai komplikasi. Defakasi tiba-tiba dapat terjadi tanpa tanda dan dapat tidak terkontrol, peningkatan resiko inkontinensia/jatuh bila alat-alat tidak dalam jangkauan tangan.
- 3) Buang feses dengan cepat dan berikan pengharum ruangan.
R/ : Menurunkan bau tak sedap untuk menghindari rasa malu klien.
- 4) Identifikasi makanan/cairan yang mencetuskan diare.

- R/ : Menghindari iritan dan meningkatkan istirahat usus.
- 5) Observasi demam, takhikardi, lethargi, leukositosis/leukopeni, penurunan protein serum, ansietas dan kelesuan.
R/ :Tanda toksik megakolon atau perforasi dan peritonitis akan terjadi/ telah terjadi memerlukan intervensi medik segera.
- 6) Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian :
- Antikolinergik.
R/ : Menurunkan motilitas/peristaltik GI dan menurunkan sekresi digestif untuk menghilangkan kram dan diare.
 - Steroid
R/ : Diberikan untuk menurunkan proses inflamasi.
 - Antasida
R/ : Menurunkan iritasi gaster, mencegah inflamasi dan menurunkan resiko infeksi pada kolitis.
 - Antibiotik
R/ : Mengobati infeksi supuratif lokal.
- 7) Bantu/siapkan intervensi bedah.
R/ : Mungkin perlu bila perforasi atau obstruksi usus terjadi atau penyakit tidak berespon terhadap pengobatan medik.
- b. *Resiko kurang volume cairan b/d Kehilangan banyak melalui rute normal (diare berat, muntah), status hipermetabolik dan pemasukan terbatas.*
Tujuan :
Klien akan menampakkan volume cairan adekuat/mempertahankan cairan adekuat dibuktikan oleh membran mukosa lembab, turgor kulit baik dan pengisian kapiler baik, TTV stabil, keseimbangan masukan dan haluaran dengan urine normal dalam konsentrasi/jumlah.
Intervensi :
- Awasi masukan dan haluaran urine, karakter dan jumlah feces, perkiraan IWL dan hitung SWL.
R/ : Memberikan informasi tentang keseimbangan cairan, fungsi ginjal dan kontrol penyakit usus juga merupakan pedoman untuk penggantian cairan.
 - Observasi TTV.
R/ : Hipotensi (termasuk postural), takikardi, demam dapat menunjukkan respon terhadap dan/atau efek kehilangan cairan.
 - Observasi adanya kulit kering berlebihan dan membran mukosa, penurunan turgor kulit, prngisisan kapiler lambat.

- R/ : Menunjukkan kehilangan cairan berlebihan/dehidrasi.
- 4) Ukur BB tiap hari.
R/ : Indikator cairan dan status nutrisi.
 - 5) Pertahankan pembatasan peroral, tirah baring dan hindari kerja.
R/ : Kolon diistirahatkan untuk penyembuhan dan untuk menurunkan kehilangan cairan usus.
 - 6) Catat kelemahan otot umum dan disritmia jantung
R/ : Kehilangan cairan berlebihan dapat menyebabkan ketidak seimbangan elektrolit. Gangguan minor pada kadar serum dapat mengakibatkan adanya dan/atau gejala ancaman hidup.
 - 7) Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian :
 - a) Cairan parenteral, transfusi darah sesuai indikasi.
R/ : Mempertahankan istirahat usus akan memerlukan penggantian cairan untuk memperbaiki kehilangan/anemia.
 - b) Anti diare.
R/ : Menurunkan kehilangan cairan dari usus.
 - c) Antiemetik
R/ : Digunakan untuk mengontrol mual/muntah pada eksaserbasi akut.
 - d) Antipiretik
R/ : Mengontrol demam. Menurunkan IWL.
 - e) Elektrolit tambahan
R/ : Mengganti kehilangan cairan melalui oral dan diare.
- c. *Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b/d gangguan absorpsi nutrien, status hipermetabolik, secara medik masukan dibatasi ditandai dengan :*
- 1) Penurunan BB, penurunan lemak subkutan/massa otot, tonus otot buruk.
 - 2) Bunyi usus hiperaktif.
 - 3) Konjungtiva dan membran mukosa pucat.
 - 4) Menolak untuk makan.
- Tujuan :
- Klien akan menunjukkan/menampakkan BB stabil atau peningkatan BB sesuai sasaran dan tidak ada tanda-tanda malnutrisi.
- Intervensi :
- 1) Timbang BB setiap hari atau sesuai indikasi.
R/ : Memberikan informasi tentang kebutuhan diet/keefektifan terapi.
 - 2) Dorong tirah baring dan/atau pembatasan aktifitas selama fase sakit akut.
R/ : Menurunkan kebutuhan metabolik untuk mencegah penurunan kalori dan simpanan energi.

- 3) Anjurkan istirahat sebelum makan.
R/ : Menenangkan peristaltik dan meningkatkan energi untuk makan.
 - 4) Berikan kebersihan mulut terutama sebelum makan.
R/ : Mulut yang bersih dapat meningkatkan rasa makanan.
 - 5) Ciptakan lingkungan yang nyaman.
R/ : Lingkungan yang nyaman menurunkan stress dan lebih kondusif untuk makan.
 - 6) Batasi makanan yang dapat menyebabkan kram abdomen, flatul.
R/ : Mencegah serangan akut/eksaserbasi gejala.
 - 7) Dorong klien untuk menyatakan perasaan masalah mulai makanan/diet.
R/ : Keragu-raguan untuk makan mungkin diakibatkan oleh takut makan akan menyebabkan eksaserbasi gejala.
 - 8) Kolaborasi dengan tim gizi/ahli diet sesuai indikasi, mis : cairan jernih berubah menjadi makanan yang dihancurkan, rendah sisa, protein tinggi, tinggi kalori dan rendah serat.
R/ : Memungkinkan saluran usus untuk mematkan kembali proses pencernaan. Protein perlu untuk penyembuhan integritas jaringan. Rendah serat menurunkan respon peristaltik terhadap makanan.
 - 9) Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian :
 - a) Preparat Besi.
R/ : Mencegah/mengobati anemi.
 - b) Vitamin B₁₂
R/ : Penggantian mengatasi depresi sumsum tulang karena proses inflamasi lama, Meningkatkan produksi SDM/memperbaiki anemia.
 - c) Asam folat.
R/ : Kehilangan folat umum terjadi akibat penurunan masukan/absopsi.
 - d) Nutrisi parenteral total, terapi IV sesuai indikasi.
R/ : Program ini mengistirahatkan GI sementara memberikan nutrisi penting.
- d. *Nyeri b/d Hiperperistaltik, diare lama, iritasi kulit/jaringan, ekskoriiasi fisura perirektal ditandai dengan :*
- 1) Laporan nyeri abdomen kolik/kram/nyeri menyebar.
 - 2) Perilaku distraksi, gelisah.
 - 3) Ekspresi wajah meringis
 - 4) Perhatian pada diri sendiri.
- Tujuan :
- 1) Klien akan melaporkan nyeri hialng/terkontrol.
 - 2) Klien akan menampakkan perilaku rileks dan mampu tidur/istirahat dengan tepat.

Intervensi :

- 1) Dorong klien/keluarga untuk melaporkan nyeri yang dialami oleh klien.
R/ : Mencoba untuk mentoleransi nyeri daripada meminta analgesik.
 - 2) Observasi laporan kram abdomen atau nyeri, catat lokasi, lamanya, intensitas (skala 0 – 10), selidiki dan laporkan perubahan karakteristik nyeri.
R/ : Nyeri sebelum defakasi sering terjadi dengan tiba-tiba dimana dapat berat dan terus menerus. Perubahan pada karakteristik nyeri dapat menunjukkan penyebaran penyakit/terjadinya komplikasi.
 - 3) Amati adanya petunjuk nonverbal , selidiki perbedaan petunjuk verbal dan nonverbal.
R/ : Bahasa tubuh/petunjuk nonverbal dapat secara psikologis dan fisiologis dapat digunakan pada hubungan petunjuk verbal untuk untuk mengidentifikasi luas/beratnya masalah.
 - 4) Kaji ulang faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya/menghilangnya nyeri.
R/ : Dapat menunjukkan dengan tepat pencetus atau faktor pemberat atau mengidentifikasi terjadinya komplikasi.
 - 5) Berikan tindakan nyaman seperti pijatan punggung, ubah posisi dan aktifitas senggang.
R/ : Meningkatkan relaksasi, memfokuskan kembali perhatian dan meningkatkan kemampuan coping.
 - 6) Observasi/catat adanya distensi abdomen dan TTV.
R/ : Dapat menunjukkan terjadinya obstruksi usus karena inflamasi, edema dan jaringan parut.
 - 7) Kolaborasi dengan tim gizi/ahli diet dalam melakukan modifikasi diet dengan memberikan cairan dan meningkatkan makanan padat sesuai toleransi.
R/ : Istirahat usus penuh dapat menurunkan nyeri/kram.
 - 8) Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian :
 - a) Analgesik
R/ : Nyeri bervariasi dari ringan sampai berat dan perlu penanganan untuk memudahkan istirahat secara adekuat dan prose penyembuhan.
 - b) Antikolinergik
R/ : Menghilangkan spasme saluran GI dan berlanjutnya nyeri kolik.
 - c) Anodin supp.
R/ : Merilekskan otot rectal dan menurunkan nyeri spasme.
- e. *Kecemasan orang tua berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang kondisi dan penanganan ditandai dengan :*
- 1) Eksaserbasi penyakit tahap akut.
 - 2) Peningkatan ketegangan, distress, ketakutan.

- 3) Menunjukkan masalah tentang perubahan hidup.
- 4) Perhatian pada diri sendiri.

Tujuan :

- 1) Orang tua akan menampakkan perilaku rileks dan melaporkan penurunan kecemasan sampai tingkat mudah ditangani.
- 2) Orang tua akan menyatakan kesadaran perasaan kecemasan dan cara sehat menerimanya.

Intervensi :

- 1) Amati petunjuk perilaku mis : gelisah, peka rangsang, menolak, kurang kontak mata, perilaku menarik perhatian.
R/ : Indikator derajat kecemasan/stress. Hal ini dapat terjadi akibat gejala fisik kondisi juga reaksi lain.
- 2) Dorong orang tua untuk mengeksplorasi perasaan dan berikan umpan balik.
R/ : Membuat hubungan terapeutik. Membantu klien/orang terdekat dalam mengidentifikasi masalah yang menyebabkan stress. Klien dengan diare berat/konstipasi dapat ragu-ragu untuk meminta bantuan karena takut terhadap staf.
- 3) Berikan informasi nyata/akurat tentang apa yang dilakukan mis : tirah baring, pembatasan masukan peroral dan posedur.
R/ : Keterlibatan klien dalam perencanaan perawatan memberikan rasa kontrol dan membantu menurunkan kecemasan.
- 4) Berikan lingkungan tenang dan istitahat.
R/ : Memindahkan klien dari stress luar meningkatkan relaksasi dan membantu menurunkan kecemasan.
- 5) Dorong orang tua untuk menyatakan perhatian, perilaku perhatian.
R/ : Tindakan dukungan dapat membantu klien merasa stress berkurang, memungkinkan energi dapat ditujukan pada penyembuhan/perbaikan.
- 6) Bantu orang tua untuk mengidentifikasi/memerlukan perilaku koping yang digunakan pada masa lalu.
R/ : Perilaku yang berhasil dapat dikuatkan pada penerimaan masalah/stress saat ini, meningkatkan rasa kontrol diri klien.
- 7) Bantu orang tua belajar mekanisme koping baru mis : teknik mengatasi stress, keterampilan organisasi.
R/ : Belajar cara baru untuk mengatasi masalah dapat membantu dalam menurunkan stress dan kecemasan, meningkatkan kontrol penyakit.

f. Kurang pengetahuan orang tua (kebutuhan belajar) tentang kondisi, prognosis kebutuhan pengobatan b/d kesalahan interpretasi informasi, kurang mengingat dan tidak mengenal sumber informasi ditandai dengan :

- 1) Pertanyaan, meminta informasi, pernyataan salah konsep.
- 2) Tidak akurat mengikuti instruksi.
- 3) Terjadi komplikasi/eksaserbasi yang dapat dicegah.

Tujuan :

- 1) Orang tua akan menyatakan pemahaman tentang proses penyakit dan pengobatan.
- 2) Orang tua akan dapat mengidentifikasi situasi stress dan tindakan khusus untuk menerimanya.
- 3) Orang tua akan berpartisipasi dalam program pengobatan.
- 4) Orang tua akan melakukan perubahan pola hidup tertentu.

Intervensi :

- 1) Kaji persepsi orang tua tentang proses penyakit yang diderita anaknya.
R/ : Membuat pengetahuan dasar dan memberikan kesadaran kebutuhan belajar individu.
- 2) Jelaskan tentang proses penyakit, penyebab/efek hubungan faktor yang menimbulkan gejala dan mengidentifikasi cara menurunkan faktor penyebab.
Dorong orang tua untuk mengajukan pertanyaan.
R/ : Pengetahuan dasar yang akurat memberikan orang tua kesempatan untuk membuat keputusan informasi/pilihan tentang masa depan dan kontrol penyakit kronis. Meskipun kebanyakan klien tahu tentang proses penyakitnya sendiri, mereka dapat mengalami informasi yang tertinggal atau salah konsep.
- 3) Jelaskan tentang obat yang diberikan, tujuan, frekuensi, dosis dan kemungkinan efek samping.
R/ : Meningkatkan pemahaman dan dapat meningkatkan kerjasama dalam program.
- 4) Tekankan pentingnya perawatan kulit mis : teknik cuci tangan dengan baik dan perawatan perineal yang baik.
R/ : Menurunkan penyebaran bakteri dan risiko iritasi kulit/kerusakan, infeksi.

3. Implementasi (Pelaksanaan dari Intervensi)

4. E v a l u a s i

Asuhan keperawatan pada klien dengan masalah utama diare dikatakan berhasil/efektif jika :

- a. Klien mampu menampakkan hilangnya diare melalui fungsi usus optimal/stabil.
- b. Komplikasi minimal/dapat dicegah.
- c. Stres mental/emosi keluarga (orang tua) minimal/dapat dicegah dengan menerima kondisi dengan positif.
- d. Orang tua mampu mengetahui/memahami/menyebutkan informasi tentang proses penyakit, kebutuhan pengobatan dan aspek jangka panjang/potensial komplikasi berulangnya penyakit.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan 11 dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Buat rumusan tentang pengertian diare !
2. Buat uraian tentang patofisiologi diare !
3. Buat uraian tentang manifestasi diare !

Rangkuman

1. Diare adalah keadaan kekerapan dan keenceran buang air besar dimana frekuensinya lebih dari tiga kali per hari dan banyaknya lebih dari 200 – 250 gram.
2. Etiologi diare terdiri dari dua faktor yaitu faktor infeksi dan bukan faktor infeksi
3. Proses terjadinya diare karena tiga hal yaitu gangguan osmotik, gangguan sekresi, dan gangguan motilitas usus.
4. Klasifikasi diare terdiri atas 3 golongan yaitu dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat.
5. Manifestasi klinik diare berupa BAB lebih dari tiga kali sehari dengan jumlah 200-250 gr, anoreksia, vomiting, feces encer, terjadi perubahan warna feces, perubahan tingkah laku (rewel, gelisah), respirasi cepat dan dalam, dehidrasi/kehilangan cairan.
6. Komplikasi diare berupa dehidrasi, hipokalemi, hipokalsemi, cardiac dysrhythmias, hiponatremi, syok hipovolemik, dan asidosis.
7. Dasar penatalaksanaan diare pada anak yaitu : dehidrasi., diagnosis, diet, defisiensi disakarida, dan drugs.
8. Diagnosa yang dapat muncul dari diare yaitu :
 - a. Diare berhubungan dengan inflamasi, iritasi usus, dan malabsorpsi usus
 - b. Resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan banyak cairan melalui rute normal (diare berat, muntah)
 - c. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan gangguan absorpsi nutrient, status hipermetabolik
 - d. Nyeri berhubungan dengan dengan hiperpristaltik usus, iritasi jaringan
 - e. Ansietas orang tua berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang kondisi dan penanganan.

- f. Kurang pengetahuan orang tua (kebutuhan belajar) tentang kondisi, prognosis kebutuhan pengobatan b/d kesalahan interpretasi informasi, kurang mengingat dan tidak mengenal sumber informasi.

Tes Formatif

1. Jelaskan pengertian diare !
2. Sebutkan etiologi dari diare !
3. Apakah komplikasi dari diare ?
4. Bagaimana penatalaksanaan dasar diare pada anak ?

Kunci Jawaban Tes Formatif

1. Diare adalah keadaan kekerapan dan keenceran buang air besar dimana frekuensinya lebih dari tiga kali per hari dan banyaknya lebih dari 200 – 250 gram.
2. Etiologi diare adalah :
 - a. Faktor Infeksi
 - 1) Infeksi enteral yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare pada anak.
 - 2) Infeksi bakteri : *Vibrio comma*, *Escherchia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Compilobacter*, *Yersenia* dan *Acromonas*.
 - 3) Infeksi virus : *Entero virus* (*Virus echo*, *Coxsackie* dan *Poliomyelitis*), *Adeno virus*, *Rota virus* dan *Astrovirus*.
 - 4) Infeksi parasit : *Cacing*, protozoa dan jamur.
 - 5) Infeksi parental, yaitu infeksi dibagian tubuh lain diluar alatpencernaan, seperti *Otitis Media Akut*, *Tonsilopharingitis* dan sebagainya. Keadaan ini terutama pada bayi dan anak dibawah 2 tahun.
 - b. Bukan faktor infeksi
 - 1) Alergi makanan : susu dan protein.
 - 2) Gangguan metabolik atau malabsorpsi.
 - 3) Iritasi langsung pada saluran pencernaan oleh makanan.
 - 4) Obat-obatan seperti antibiotik.
 - 5) Penyakit usus seperti *Colitis ulserative*, *crohn disease* dan *enterocolitis*.
 - 6) Faktor psikologis : rasa takut dan cemas.
 - 7) Obstruksi usus.
3. Komplikasi diare berupa dehidrasi, hipokalemi, hipokalsemi, *cardiac dysrhythmias*, *hiponatremi*, syok hipovolemik, dan asidosis.
4. Dasar penatalaksanaan diare pada anak yaitu : dehidrasi., diagnosis, diet, defisiensi disakarida, dan drugs.

BAB XII

ASUHAN KEPERAWATAN

GANGGUAN SISTEM PERSARAFAN

SATUAN BAHASAN 12

HIDROSEFALUS, SPINA BIFIDA, CEREBRAL PALSY, DAN ENCEPHALITIS.

A. Gambaran singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah ini membahas mengenai Hidrosefalus, Spina Bifida, Cerebral Palsy, dan Encephalitis.

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai Hidrosefalus, Spina Bifida, Cerebral Palsy, dan Encephalitis. Kemudian buatlah intisari/ringkasan tentang tiap penyakit yang dibahas tersebut. Fahami dengan baik intisari/ringkasan tersebut.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hidrosefalus
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Spina Bifida
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Cerebral Palsy
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Encephalitis
5. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang Hidrosefalus
6. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang Spina Bifida
7. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang Cerebral Palsy
8. Mahasiswa dapat membuat uraian tentang Encephalitis
9. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang Hidrosefalus
10. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang Spina Bifida
11. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang Cerebral Palsy
12. Mahasiswa dapat memahami manfaat pengetahuan tentang Encephalitis

HIDROSEFALUS, SPINA BIFIDA, CEREBRAL PALSY, DAN ENCEPHALITIS.

A. Hidrosefalus

Hidrosefalus ialah keadaan patologi otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan serebrospinalis (CSS) dengan atau pernah dengan tekanan intracranial yang meninggi sehingga terdapat pelebaran ruangan tempat mengalir CSS. Harus dibedakan dengan pengumpulan cairan lokal tanpa tekanan intrakranial yang meninggi seperti pada kista porensfali atau pelebaran ruangan CSS akibat tertimbunnya CSS yang menempati ruangan, sesudah terjadinya atrofi otak.

Ruangan CSS mulai terbentuk pada minggu kelima masa embrio, terdiri dari sistem ventrikel, sisterna magna pada dasar otak dan ruang subaraknoid yang meliputi seluruh susunan saraf. CSS yang dibentuk dalam sistem ventrikel oleh pleksus koroidalis kembali ke dalam peredaran darah melalui kapiler dalam piamater dan akronoid yang meliputi seluruh susunan saraf pusat (SSP). Hubungan antara sistem ventrikel dan ruang subaraknoid adalah melalui foramen Magendie di median dan foramen Luschka di sebelah lateral ventrikel IV.

Aliran CSS yang normal ialah dari ventrikel lateralis melalui foramen Monroi ke ventrikel III, dari tempat ini melalui saluran yang sempit akuaduktus Sylvii ke ventrikel IV dan melalui foramen Luschka dan Magendie ke dalam ruang subaraknoid melalui sisterna magna. Penutupan sisterna basalis menyebabkan gangguan kecepatan resorpsi CSS oleh sistem kapiler.

Hidrosefalus memberikan gejala bila disertai tekanan CSS yang meninggi. Terdapat 2 macam, yaitu :

1. Hidrosefalus obstruktif, tekanan CSS yang tinggi disebabkan obstruksi pada salah satu tempat antara pembentukan CSS oleh pleksus koroidalis dan keluarnya dari ventrikel IV melalui foramen Luschka dan Magendie.
2. Komunikans, yaitu bila tekanan CSS yang meninggi tanpa penyumbatan sistem ventrikel. Pembagian lain adalah :
 - a. Bawaan (congenital)
 - b. Didapat

Hidrosefalus terjadi bila terdapat penyumbatan aliran CSS pada salah satu tempat antara tempat pembentukan CSS dalam sistem ventrikel dan tempat absorpsi dalam ruangan subaraknoid. Akibat penyumbatan terjadi dilatasi ruangan CSS di atasnya. Tempat yang sering tersumbat dan terdapat dalam klinik ialah foramen Monroi, foramen Luschka dan Magendie, sisterna magna dan sisterna basalis. Teoritis pembentukan CSS yang terlalu banyak dengan kecepatan absorpsi yang normal akan menyebabkan terjadinya hidrosefalus, namun dalam klinik sangat jarang terjadi, misalnya terlihat pelebaran ventrikel tanpa penyumbatan pada adenomata pleksus koroidalis. Berkurangnya absorpsi CSS pernah dilaporkan dalam kepustakaan pada obstruksi kronis aliran vena otak pada trombosis sinus

longitudinalis. Contoh lain ialah terjadinya Hidrosefalus setelah operasi koreksi daripada spina bifida dengan meningokel akibat berkurangnya permukaan untuk absorpsi. Penyebab penyumbatan untuk aliran CSS yang sering terdapat pada bayi dan anak ialah :

1. Kelainan bawaan (congenital)
2. Infeksi
3. Neoplasma
4. Perdarahan

Daftar masalah keperawatan Hidrosefalus :

1. Resiko terhadap infeksi b/d desinena hematogen dari pathogen stasis cairan tubuh, penekanan respon inflamasi
Kriteria hasil : Mencapai penyembuhan tepat waktu tanpa adanya penyebaran infeksi
Tindakan :
 - a. Berikan tindakan isolasi sebagai tindakan pencegahan
 - b. Pertahankan tehnik aseptik dan cuci tangan yang baik kepada pasien, pengunjung maupun staf
 - c. Pantau suhu secara teratur
 - d. Teliti adanya keluhan nyeri dada, berkembangnya nadi yang tidak teratur
 - e. Ubah posisi secara teratur dan anjurkan nafas dalam
 - f. Catat karakteristik urine seperti warna, kejernihan dan bau.
 - g. Identifikasi kontak yang beresiko
 - h. Berikan terapi antibiotika sesuai kolaborasi
2. Resiko tinggi terhadap perubahan perfusi jaringan b/d edema serebral, hipovolemia, masalah pertukaran pada tingkat seluler
Kriteria hasil :
 - a. Mempertahankan tingkat kesadaran
 - b. Mendemonstrasikan tanda vital stabil
 - c. Melaporkan tak adanya / menurunkan berat sakit kepala
 - d. Mendemonstrasikan tak adanya perbaikan kognitif dan tanda TIK meningkat

Tindakan :

 - a. Pertahankan tirah baring dengan kepala mendatar dan pantau tanda vital
 - b. Pantau status neurologist
 - c. Kaji adanya regiditasi nukal, gemetar, dan kegelisahan yang meningkat
 - d. Pantau tanda vital
 - e. Pantau pola dan irama nafas
 - f. Pantau intake dan output
 - g. Bantu pasien berkemih atau batuk, muntah dan mengejan.

- h. Berikan tindakan yang memberikan rasa nyaman
 - i. Berikan waktu istirahat antara aktifitas perawatan dan batasi lamanya tindakan
 - j. Anjurkan keluarga bicara dengan pasien bila perlu
 - k. Tinggikan kepala pasien 15 – 45 derajat sesuai toleransi
 - l. Berikan cairan IV dengan alat control bila diperlukan
 - m. Pantau gas darah arteri
 - n. Gunakan selimut hipothermi
 - o. Berikan obat steroid sesuai indikasi.
3. Resiko tinggi terhadap trauma b/d iritasi korteks (kejang umum), keterlibatan area local, kelemahan umum, ataksia, vertigo
- Kriteria hasil :
- a. Tidak adanya tanda dan gejala menjadi actual
 - b. Tidak mengalami kejang atau cedera lain.
- Tindakan :
- a. Pantau adanya kejang/kedutan tangan
 - b. Berikan keamanan pasien dengan memberikan pengamanan (penghalang tempat tidur)
 - c. Pertahankan tirah baring selama fase akut.
 - d. Berikan obat fenitoin, diazepam, luminal (sesuai indikasi)
4. Nyeri akut b/d agen pencedera biologis adanya proses infeksi, toksin dalam sirkulasi
- Kriteria hasil :
- a. Melaporkan nyeri hilang/terkontrol
 - b. Menunjukkan postur rileks dan mampu tidur/istirahat dengan tepat
- Tindakan :
- a. Berikan lingkungan yang tenang ruangan agak gelap.
 - b. Tingkatkan tirah baring, Bantulah perawatan dir.
 - c. Letakan kantung es pada kepala, pakaian dingin.
 - d. Dukung untuk menemukan posisi yang nyaman
 - e. Berikan rentang latihan aktif/pasif secara tepat dan massage otot
 - f. Gunakan pelembab yang agak hangat
 - g. Berikan analgetik (bila perlu)
5. Kerusakan mobilitas fisik b/d kerusakan neuromuskuler, penurunan kekuatan/kelemahan.
- Kriteria hasil :
- a. Mencapai kembali/mempertahankan posisi fungsional optimal yang ditunjukkan oleh tidak adanya kontraktur
 - b. Mempertahankan/meningkatkan kekuatan dan fungsi umum
 - c. Mempertahankan integritas kulit, fungsi kandung kemih dan usus
- Tindakan :

- a. Periksa kembali kekuatan otot
 - b. Kaji derajat imobilisasi
 - c. Letakan pasien dalam posisi yang dapat menghindari kerusakan karena tekanan
 - d. Pertahankan kesejajaran posisi tubuh (bokong, kaki dan tangan)
 - e. Bantu dalam melakukan latihan.
 - f. Bantu pasien dalam program latihan (penggunaan alat)
 - g. Berikan perawatan kulit dengan cermat, massage dengan pelembab dang anti linen dan pakaian.
 - h. Periksa daerah adanya nyeri tekan berikan matras udara/air, terapi kinetic sesuai kebutuhan
6. Perubahan persepsi sensori b/d penurunan persepsi sensori transmisi atau integrasi
- Kriteria hasil :
- a. Meningkatkan tingkat kesadaran
 - b. Mengakui perubahan dalam kemampuan dan adanya keterlibatan residu
 - c. Mendemonstrasikan perubahan prilaku
- Tindakan :
- a. Pantau secara teratur perubahan orientasi, kemampuan bicara dan alam perasaan
 - b. Kaji kesadaran sensorik seperti respon panas dingin benda runcing atau tumpul.
 - c. Observasi respon prilaku
 - d. Catat adanya perubahan yang spesifik dalam kemampuan
 - e. Hilangkan suara bising dan bicara dengan suara lembut
 - f. Berikan stimulasi yang bermanfaat : verbal (bicara) penciuman, taktil
 - g. Berikan lingkungan yang nyaman
 - h. Buat jadwal istirahat yang adekuat
 - i. Berikan kesempatan mengungkapkan perasaannya
 - j. Berikan keamanan kepada pasien
 - k. Rujuk pada ahli fisioterapi (okupasi, wicara, kognitif)
7. Ketakutan/ansietas b/d krisis situasi, ancaman kematian/perubahan status kesehatan, pemisahan dari sistim pendukung .
- Kriteria hasil :
- a. Mengakui dan mendiskusikan rasa takut
 - b. Mengungkapkan keakuratan pengetahuan tentang situasi
 - c. Tampak rileks dan melaporkan ansietas berkurang sampai pada tingkat yang dapat diatasi.
- Tindakan :
- a. Kaji tingkat mental dan tingkat ansietas
 - b. Berikan informasi berhubungan dengan penyakit dan gejala (bila memungkinkan).

- c. Jawab setiap pertanyaan dengan penuh perhatian
 - d. Jelaskan tentang prosedur tindakan dan perawatan
 - e. Libatkan pasien/keluarga dalam perawatan pasien
 - f. Berikan dukungan terhadap perencanaan gaya hidup yang nyata setelah sakit
 - g. Berikan petunjuk mengenai sumber penyokong (keluarga, konselor dsb)
 - h. Lindungi privasi pasien bila terjadi kejang
 - i. Berikan pada pasien dan keluarga jika tidak terjadi kerusakan otak.
8. Kurang pengetahuan (kebutuhan belajar) mengenai penyebab infeksi dan pengobatan b/d kurang pemajanan, kesalahan interpretasi informasi, kurang mengingat, keterbatasan kognitif

Kriteria hasil :

- a. Mengungkapkan pemahanan tentang kondisi/proses penyakit dan pengobatan
- b. Dengan melakukan prosedur yang perlu dan menjelaskan alasan tindakan

Tindakan :

- a. Berikan informasi yang singkat sederhana dan jelas
- b. Diskusikan mengenai proses penyembuhan
- c. Berikan mengenai kebutuhan diet tinggi protein atau karbohidrat
- d. Instruksikan pada pasien terus menerus latihan rentang gerak secara bertahap
- e. Diskusikan tentang pentingnya istirahat yang adekuat
- f. Tingkatkan perkembangan dari system latihan yang dimodifikasi
- g. Kaji ulang pengobatan yang diberikan dan tekankan untuk mengkonsultasikan kesehatannya.
- h. Diskusikan pencegahan proses penyakit
- i. Berikan penjelasan ulang mengenai timbulnya tanda atau gejala yang membutuhkan penanganan medis dengan segera
- j. Tekankan pentingnya evaluasi ulang dan terapi rawat jalan secara rutin
- k. Identifikasi sumber penyokong yang ada.

B. Spina Bifida

Spina bifida merupakan abnormaly dalam pembentukan tulang belakang, yakni suatu defek dalam penutupan saluran tulang belakang. Hal ini biasanya terjadi pada minggu IV masa embrio. Gangguan penutupan ini biasanya terdapat posterior mengenai prosesus spinosus dan lamina; sangat jarang defek terjadi dibagian anterior. Terdapat terbanyak pada vertebra lumbalis atau lumbosakralis.

Pembagian :

1. Spina bifida okulta
Defek terdapat pada arkus vertebra herniasi jaringan.
2. Meningocele spinalis
Defek pada duramater dan arkus spinalis. Herniasi kantung berisi leptomenigen dan cairan, tanpa jaringan saraf.
3. Meningomyelomeningocele
Kantung herniasi terdiri dari leptomenigen, cairan, jaringan saraf berupa serabut spinalis atau sebagian medula spinalis.
4. Myelomeningocele
Kantung terdiri dari leptomenigen, cairan serebrospinalis, serabut saraf, sebagian jaringan saraf yang membentuk kista berisi cairan yang berhubungan dengan kanalis sentralis.
5. Spina bifida occulta
Tulang belakang terbuka seluruhnya.

C. Cerebral Palsy

1. Definisi

Cerebral Palsy ialah keadaan kerusakan jaringan otak yang kekal dan tidak progresif. Terjadi pada waktu masih muda (sejak dilahirkan) dan merintangi perkembangan otak normal dengan gambaran klinis dapat berubah selama hidup dan menunjukkan kelainan dalam sikap dan pergerakan, disertai kelainan neurologist berupa kelumpuhan spastis, gangguan ganglia basal dan serebelum dan kelainan mental.

2. Etiologi

Penyebabnya dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pranatal, perinatal dan pascanatal.

- a. Pranatal

Infeksi terjadi dalam masa kandungan, menyebabkan kelainan pada janin, misalnya oleh lues, toksoplasmosis, rubella, dan penyakit inklusi sitomegalik. Kelainan yang menyolok biasanya gangguan pergerakan dan retardasi mental. Anoksia dalam kandungan terkena radiasi sinar X dan keracunan kehamilan dapat menimbulkan cerebral palsy.

- b. Perinatal

- 1) Anoksia/hipoksia

Penyebab yang terbanyak ditemukan dalam masa perinatal ialah "brainjury". Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya anoksia. Hal ini terdapat pada keadaan presentasi bayi abnormal, disproporsi sefalopelvik, partus lama, plasenta previa, infeksi plasenta, partus menggunakan bantuan instrumen tertentu dan lahir dengan seksio caesaria.

- 2) Perdarahan otak

Perdarahan dan anoksia dapat terjadi bersama-sama, sehingga sukar membedakannya, misalnya perdarahan yang mengelilingi batang otak, mengganggu pusat pernafasan dan peredaran darah sehingga terjadi

anoksia. Perdarahan dapat terjadi di ruang subaraknoid akan menyebabkan penyumbatan CSS sehingga mengakibatkan hidrosefalus. Perdarahan di ruang subdural dapat menekan korteks serebri sehingga timbul kelumpuhan spastis.

3) Prematuritas

Bayi kurang bulan mempunyai kemungkinan menderita perdarahan otak lebih banyak dibandingkan bayi cukup bulan, karena pembuluh darah, enzim, faktor pembekuan darah dan lain-lain masih belum sempurna.

4) Ikterus

Ikterus pada masa neonatus dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang kekal akibat masuknya bilirubin ke ganglia basal, misalnya pada kelainan inkompatibilitas golongan darah.

5) Meningitis purulenta

Meningitis purulenta pada masa bayi bila terlambat atau tidak tepat pengobatannya akan mengakibatkan gejala sisa berupa “cerebral palsy”

c. Pascanatal

Setiap kerusakan pada jaringan otak yang mengganggu perkembangan dapat menyebabkan “cerebral palsy”. Misalnya pada trauma kapitis, meningitis, ensefalitis dan luka parut pada otak pasca operasi.

Daftar masalah keperawatan Cerebral Palsy :

1. Resiko tinggi terhadap perubahan perfusi jaringan b/d edema serebral, hipovolemia, masalah pertukaran pada tingkat seluler

Kriteria hasil :

- a. Mempertahankan tingkat kesadaran
- b. Mendemonstrasikan tanda vital stabil
- c. Melaporkan tak adanya / menurunkan berat sakit kepala
- d. Mendemonstrasikan tak adanya perbaikan kognitif dan tanda TIK meningkat

Tindakan :

- a. Pertahankan tirah baring dengan kepala mendatar dan pantau tanda vital
- b. Pantau status neurologist
- c. Kaji adanya regiditasi nukal, gemetar, dan kegelisahan yang meningkat
- d. Pantau tanda vital
- e. Pantau pola dan irama nafas
- f. Pantau intake dan output
- g. Bantu pasien berkemih atau batuk, muntah dan mengejan.
- h. Berikan tindakan yang memberikan rasa nyaman

- i. Berikan waktu istirahat antara aktifitas perawatan dan batasi lamanya tindakan
 - j. Anjurkan keluarga bicara dengan pasien bila perlu
 - k. Tinggikan kepala pasien 15 – 45 derajat sesuai toleransi
 - l. Berikan cairan IV dengan alat control bila diperlukan
 - m. Pantau gas darah arteri
 - n. Gunakan selimut hipothermi
 - o. Berikan obat steroid sesuai indikasi.
2. Resiko tinggi terhadap trauma b/d iritasi korteks (kejang umum), keterlibatan area local, kelemahan umum, ataksia, vertigo
- Kriteria hasil :
- a. Tidak adanya tanda dan gejala menjadi actual
 - b. Tidak mengalami kejang atau cedera lain
- Tindakan :
- a. Pantau adanya kejang/kedutan tangan
 - b. Berikan keamanan pasien dengan memberikan pengaman (penghalang tempat tidur)
 - c. Pertahankan tirah baring selama fase akut.
 - d. Berikan obat fenitoin, diazepam, luminal (sesuai indikasi)
3. Nyeri akut b/d agen pencedera biologis adanya proses infeksi, toksin dalam sirkulasi
- Kriteria hasil :
- a. Melaporkan nyeri hilang/terkontrol
 - b. Menunjukkan postur rileks dan mampu tidur/istirahat dengan tepat
- Tindakan :
- a. Berikan lingkungan yang tenang ruangan agak gelap.
 - b. Tingkatkan tirah baring, Bantulah perawatan dir.
 - c. Letakan kantung es pada kepala, pakaian dingin.
 - d. Dukung untuk menemukan posisi yang nyaman
 - e. Berikan rentang latihan aktif/pasif secara tepat dan massage otot
 - f. Gunakan pelembab yang agak hangat
 - g. Berikan analgetik (bila perlu)
4. Kerusakan mobilitas fisik b/d kerusakan neuromuskuler, penurunan kekuatan/kelemahan.
- Kriteria hasil :
- a. Mencapai kembali/mempertahankan posisi fungsional optimal yang ditunjukkan oleh tidak adanya kontraktur
 - b. Mempertahankan/meningkatkan kekuatan dan fungsi umum
 - c. Mempertahankan integritas kulit, fungsi kandung kemih dan usus
- Tindakan :
- a. Periksa kembali kekuatan otot


- b. Kaji derajat imobilisasi
 - c. Letakan pasien dalam posisi yang dapat menghindari kerusakan karena tekanan
 - d. Pertahankan kesejajaran posisi tubuh (bokong, kaki dan tangan)
 - e. Bantu dalam melakukan latihan.
 - f. Bantu pasien dalam program latihan (penggunaan alat)
 - g. Berikan perawatan kulit dengan cermat, massage dengan pelembab dan anti linen dan pakaian.
 - h. Periksa daerah adanya nyeri tekan berikan matras udara/air, terapi kinetik sesuai kebutuhan
5. Perubahan persepsi sensori b/d penurunan persepsi sensori transmisi atau integrasi
- Kriteria hasil :
- a. Meningkatkan tingkat kesadaran
 - b. Mengakui perubahan dalam kemampuan dan adanya keterlibatan residu
 - c. Mendemonstrasikan perubahan perilaku

D. Encephalitis

1. Defenisi
Encephalitis adalah infeksi jaringan otak oleh berbagai jenis mikroorganisme.
2. Etiologi
Berbagai Mikroorganisme dapat menimbulkan encephalitis misalnya : Bakteri, jamur, spirochaeta, dan virus. Penyebab tersering dan terpenting adalah virus.
3. Gejala Klinis
Meskipun penyebabnya berbeda tetapi gejala encephalitis umumnya sama dan khas, sehingga dapat digunakan sebagai kriteria diagnosis umumnya gejala yang didapat adalah :
 - a. Suhu yang mendadak naik / hiperpireksia
 - b. Kesadaran menurun dengan cepat
 - c. Nyeri kapala dan muntah
 - d. Kejang general / local
 - e. Parese dan paralise
 - f. Afasia
 - g. LCS dalam batasa normal biasanya hanya didapatkan kenaikan jumlah sel protein dan glukosa
 - h. EEG aktifitas listrik menurun sesuai tingkat penurunan kesadaran

Diagnosa encephalitis didasarkan pada gejala klinis yang nampak, sedangkan diagnose etiologi dapat ditegakkan melalui pemeriksaan kultur darah, LCS, jaringan otak, faeces dan urin.
4. Pengobatan
Pengobatan pasien encephalitis terdiri dari :
 - a. Anti konvulsi : diazepam, luminal
 - b. Antipiretik

- c. IVFD
- d. Menurunkan oedema otak dengan pemberian larutan hipertonis seperti dextrose 10 %, 20%, 40%, atau pemberian manitol 20% dikombinasi dengan pemberian steroid.



Daftar masalah keperawatan encephalitis :

1. Resiko terhadap infeksi b/d desimenata hematogen dari pathogen stasis cairan tubuh, penekana respon inflamasi
Kriteria hasil : Mencapai penyembuhan tepat waktu tanpa adanya penyebaran infeksi
Tindakan :
 - c. Berikan tindakan isolasi sebagai tindakan pencegahan.
 - d. Pertahankan tehnik aseptik dan cuci tangan yang baik kepada pasien, pengunjung maupun staf.
 - e. Pantau suhu secara teratur.
 - f. Teliti adanya keluhan nyeri dada, berkembangnya nadi yang tidak teratur
 - g. Ubah posisi secara teratur dan anjurkan nafas dalam.
 - h. Catat karakteristik urine seperti warna, kejernihan dan bau.
 - i. Identifikasi kontak yang beresiko.
 - j. Berikan terapi antibiotika sesuai kolaborasi

2. Resiko tinggi terhadap perubahan perfusi jaringan b/d edema serebral, hipovolemia, masalah pertukaran pada tingkat seluler
Kriteria hasil :
 - a. Mempertahankan tingkat kesadaran.
 - b. Mendemonstrasikan tanda vital stabil
 - c. Melaporkan tak adanya / menurunkan berat sakit kepala
 - d. Mendemonstrasikan tak adanya perbaikan kognitif dan tanda TIK meningkatTindakan :
 - a. Pertahankan tirah baring dengan kepala mendatar dan pantau tanda vital
 - b. Pantau status neurologist
 - c. Kaji adanya regiditasi nukal, gemetar, dan kegelisahan yang meningkat
 - d. Pantau tanda vital
 - e. Pantau pola dan irama nafas
 - f. Pantau intake dan output
 - g. Bantu pasien berkemih atau batuk, muntah dan mengejan.
 - h. Berikan tindakan yang memberikan rasa nyaman
 - i. Berikan waktu istirahat antara aktifitas perawatan dan batasi lamanya tindakan
 - j. Anjurkan keluarga bicara dengan pasien bila perlu
 - k. Tinggikan kepala pasien 15 – 45 derajat sesuai toleransi
 - l. Berikan cairan IV dengan alat control bila diperlukan
 - m. Pantau gas darah arteri
 - n. Gunakan selimut hipothermi
 - o. Berikan obat steroid sesuai indikasi.

3. Resiko tinggi terhadap trauma b/d iritasi korteks (kejang umum), keterlibatan area local, kelemahan umum, ataksia, vertigo
Kriteria hasil :
 - a. Tidak adanya tanda dan gejala menjadi actual

b. Tidak mengalami kejang atau cedara lain.

Tindakan :

- a. Pantau adanya kejang/kedutan tangan
- b. Berikan keamanan pasien dengan memberikan pengamananan (penghalang tempat tidur)
- c. Pertahankan tirah baring selama fase akut.
- d. Berikan obat fenitoin, diazepam, luminal (sesuai indikasi)

4. Nyeri akut b/d agen pencedera biologis adanya proses infeksi, toksin dalam sirkulasi

Kriteria hasil :

- a. Melaporkan nyeri hilang/terkontrol
- b. Menunjukkan postur rileks dan mampu tidur/istirahat dengan tepat

Tindakan :

- a. Berikan lingkungan yang tenang ruangan agak gelap.
- b. Tingkatkan tirah baring, Bantulah perawatan dir.
- c. Letakan kantung es pada kepala, pakaian dingin.
- d. Dukung untuk menemukan posisi yang nyaman
- e. Berikan rentang latihan aktif/pasif secara tepat dan massage otot
- f. Gunakan pelembab yang agak hangat
- g. Berikan analgetik (bila perlu)

5. Kerusakan mobilitas fisik b/d kerusakan neuromuskuler, penurunan kekuatan/kelemahan.

Kriteria hasil :

- a. Mencapai kembali/mempertahankan posisi fungsional optimal yang ditunjukkan oleh tidak adanya kontraktur
- b. Mempertahankan/meningkatkan kekuatan dan fungsi umum
- c. Mempertahankan integritas kulit, fungsi kandung kemih dan usus

Tindakan :

- a. Periksa kembali kekuatan otot
- b. Kaji derajat imobilisasi
- c. Letakan pasien dalam posisi yang dapat menghindari kerusakan karena tekanan
- d. Pertahankan kesejajaran posisi tubuh (bokong, kaki dan tangan)
- e. Bantu dalam melakukan latihan.
- f. Bantu pasien dalam program latihan (penggunaan alat)
- g. Berikan perawatan kulit dengan cermat, massage dengan pelembab dang anti linen dan pakaian.
- h. Periksa daerah adanya nyeri tekan berikan matras udara/air, terapi kinetic sesuai kebutuhan

6. Perubahan persepsi sensori b/d penurunan persepsi sensori transmisi atau integrasi

Kriteria hasil :

- a. Meningkatkan tingkat kesadaran

- b. Mengakui perubahan dalam kemampuan dan adanya keterlibatan residu
- c. Mendemonstrasikan perubahan perilaku

Tindakan :

- a. Pantau secara teratur perubahan orientasi, kemampuan bicara dan alam perasaan
- b. Kaji kesadaran sensorik seperti respon panas dingin benda runcing atau tumpul.
- c. Observasi respon perilaku
- d. Catat adanya perubahan yang spesifik dalam kemampuan
- e. Hilangkan suara bising dan bicara dengan suara lembut
- f. Berikan stimulasi yang bermanfaat : verbal (bicara) penciuman, taktil
- g. Berikan lingkungan yang nyaman
- h. Buat jadwal istirahat yang adekuat
- i. Berikan kesempatan mengungkapkan perasaannya
- j. Berikan keamanan kepada pasien
- k. Rujuk pada ahli fisioterapi (okupasi, wicara, kognitif)

7. Ketakutan/ansietas b/d krisis situasi, ancaman kematian/perubahan status kesehatan, pemisahan dari sistem pendukung .

Kriteria hasil :

- a. Mengakui dan mendiskusikan rasa takut
- b. Mengungkapkan keakuratan pengetahuan tentang situasi
- c. Tampak rileks dan melaporkan ansietas berkurang sampai pada tingkat yang dapat diatasi

Tindakan :

- a. Kaji tingkat mental dan tingkat ansietas
- b. Berikan informasi berhubungan dengan penyakit dan gejala (bila memungkinkan).
- c. Jawab setiap pertanyaan dengan penuh perhatian
- d. Jelaskan tentang prosedur tindakan dan perawatan
- e. Libatkan pasien/keluarga dalam perawatan pasien
- f. Berikan dukungan terhadap perencanaan gaya hidup yang nyata setelah sakit
- g. Berikan petunjuk mengenai sumber penyokong (keluarga, konselor dsb)
- h. Lindungi privasi pasien bila terjadi kejang
- i. Berikan pada pasien dan keluarga jika tidak terjadi kerusakan otak.

8. Kurang pengetahuan (kebutuhan belajar) mengenai penyebab infeksi dan pengobatan b/d kurang pemajanan, kesalahan interpretasi informasi, kurang mengingat, keterbatasan kognitif

Kriteria hasil :

- a. Mengungkapkan pemahaman tentang kondisi/proses penyakit dan pengobatan
- b. Dengan melakukan prosedur yang perlu dan menjelaskan alasan tindakan

Tindakan :

- a. Berikan informasi yang singkat sederhana dan jelas
- b. Diskusikan mengenai proses penyembuhan
- c. Berikan mengenai kebutuhan diet tinggi protein atau karbohidrat
- d. Instruksikan pada pasien terus menerus latihan rentang gerak secara bertahap
- e. Diskusikan tentang pentingnya istirahat yang adekuat
- f. Tingkatkan perkembangan dari system latihan yang dimodifikasi
- g. Kaji ulang pengobatan yang diberikan dan tekankan untuk mengkonsultasikan kesehatannya.
- h. Diskusikan pencegahan proses penyakit
- i. Berikan penjelasan ulang mengenai timbulnya tanda atau gejala yang membutuhkan penanganan medis dengan segera
- j. Tekankan pentingnya evaluasi ulang dan terapi rawat jalan secara rutin
- k. Identifikasi sumber penyokong yang ada.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan 12 dipersilahkan mengerjakan latihan berikut :

1. Buat rumusan tentang pengertian Hidrosefalus !
2. Buat rumusan tentang pengertian Cerebral Palsy !
3. Buat uraian tentang Encephalitis !

Rangkuman

1. Hidrosefalus adalah ialah keadaan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan serebrospinalis (CSS) dengan atau pernah dengan tekanan intracranial yang meninggi sehingga terdapat pelebaran ruangan tempat mengalirkan CSS.
2. Penyebab penyumbatan untuk aliran CSS yang sering terdapat pada bayi dan anak ialah :
 - a. Kelainan bawaan (congenital)
 - b. Infeksi
 - c. Neoplasma
 - d. Perdarahan
3. Spina bifida merupakan abnormaly dalam pembentukan tulang belakang, yakni suatu defek dalam penutupan saluran tulang belakang.
4. Klasifikasi Spina Bifida yaitu spina bifida okulta, meningokel spinalis, meningomielokel, mielomeningosistokel, dan rakiskisis spinal lengkap.
5. Cerebral palsy adalah keadaan kerusakan jaringan otak yang kekal dan tidak progresif.
6. Etiologi Cerbral Palsy dibagi menjadi tiga bagian yaitu prenatal, perinatal, dan pascanatal.
7. Encephalitis adalah infeksi jaringan otak oleh berbagai jenis mikroorganisme

- Etiologi Encephalitis berupa Bakteri, jamur, spirochaeta, dan virus. Penyebab tersering dan terpenting adalah virus.
8. Manifestasi klinis Encephalitis adalah : Suhu yang mendadak naik / hiperpireksia, Kesadaran menurun dengan cepat, Nyeri kepala dan muntah, Kejang general / local, Parese dan paralise, Afasia, LCS dalam batasa normal biasanya hanya didapatkan kenaikan jumlah sel protein dan glukosa, dan EEG aktifitas listrik menurun sesuai tingkat penurunan kesadaran.
 9. Pengobatan Pengobatan pasien encephalitis terdiri dari :
 - a. Anti konvulsi : diazepam, luminal
 - b. Antipiretik
 - c. IVFD
 - d. Menurunkan oedema otak dengan pemberian larutan hipertonis seperti dextrose 10 %, 20%, 40%, atau pemberian manitol 20% dikombinasi dengan pemberian steroid.
 10. Beberapa diagnosa yang dapat muncul dari gangguan system saraf pada anak, misalnya :
 - a. Resiko tinggi terhadap perubahan perfusi jaringan b/d edema serebral, hipovolemia, masalah pertukaran pada tingkat seluler.
 - b. Nyeri akut b/d agen pencedera biologis, adanya proses infeksi, toksin dalam sirkulasi.
 - c. Kerusakan mobilitas fisik b/d kerusakan neuromuskuler, penurunan kekuatan/kelemahan
 - d. Perubahan persepsi sensori b/d penurunan persepsi sensori transmisi/ integrasi.

Tes Formatif

1. Apakah yang dimaksud dengan hidrosefalus ?
2. Sebutkan etiologi pranatal pada cerebral palsy !
3. Bagaimana manifestasi klinis dari encephalitis ?
4. Sebutkan 2 diagnosa keperawatan yang dapat muncul dari encephalitis !

Kunci Jawaban Tes Formatif

1. Hidrosefalus adalah ialah keadaan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan serebrospinalis (CSS) dengan atau pernah dengan tekanan intracranial yang meninggi sehingga terdapat pelebaran ruangan tempat mengalir CSS.
2. Etiologi pranatal pada cerebral palsy : Infeksi terjadi dalam masa kandungan, menyebabkan kelainan pada janin, misalnya oleh lues, toksoplasmosis, rubella, dan penyakit inklusi sitomegalik. Kelainan yang menyolok biasanya gangguan pergerakan dan retardasi mental. Anoksia dalam kandungan terkena radiasi sinar X dan keracunan kehamilan dapat menimbulkan cerebral palsy.
3. Manifestasi klinis Encephalitis adalah : Suhu yang mendadak naik / hiperpireksia, Kesadaran menurun dengan cepat, Nyeri kepala

dan muntah, Kejang general / local, Parese dan paralise, Afasia, LCS dalam batasa normal biasanya hanya didapatkan kenaikan jumlah sel protein dan glukosa, dan EEG aktifitas listrik menurun sesuai tingkat penurunan kesadaran.

4. Diagnosa keperawatan yang dapat muncul dari encephalitis adalah :
 - a. Nyeri akut b/d agen pencedera biologis, adanya proses infeksi, toksin dalam sirkulasi.
 - b. Kerusakan mobilitas fisik b/d kerusakan neuromuskuler, penurunan kekuatan/kelemahan.

BAB XIII

ASUHAN KEPERAWATAN GANGGUAN SISTEM INTEGUMEN

SATUAN BAHASAN 13 :

KONSEP MEDIS, DIAGNOSA KEPERAWATAN YANG LAZIM DITEMUKAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN KULIT, INTERVENSI KEPERAWATAN YANG LAZIM DILAKUKAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN KULIT, ASUHAN KEPERAWATAN PADA BEBERAPA PENYAKIT KULIT YANG LAZIM DITEMUKAN PADA ANAK.

A. Gambaran Singkat Mengenai Materi Kuliah

Materi kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan gangguan system integument yang terdiri dari konsep medis, diagnosa keperawatan yang lazim ditemukan pada anak dengan gangguan kulit, intervensi keperawatan yang lazim dilakukan pada anak dengan gangguan kulit, dan asuhan keperawatan pada beberapa penyakit kulit yang lazim ditemukan pada anak.

Pada materi mengenai konsep medis akan dibahas mengenai struktur anatomi dari kulit itu sendiri. Sedangkan pada materi mengenai asuhan keperawatan pada beberapa penyakit kulit yang lazim ditemukan pada anak akan dibahas Diaper Rash (Ruam, popok, dermatitis popok iritan primer), Impetigo, Dermatitis Atopik, dan Scabies.

B. Pedoman Mempelajari Materi

Baca dengan baik uraian mengenai asuhan keperawatan gangguan system integument yang terdiri dari konsep medis, diagnosa keperawatan yang lazim ditemukan pada anak dengan gangguan kulit, intervensi keperawatan yang lazim dilakukan pada anak dengan gangguan kulit, dan asuhan keperawatan pada beberapa penyakit kulit yang lazim ditemukan pada anak. Kemudian buatlah intisari/ ringkasan dari pembahasan tersebut. Pahami dengan baik intisari/ ringkasan.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai struktur anatomi dari system integument.
2. Mahasiswa dapat menyebutkan diagnose keperawatan yang lazim ditemukan pada anak.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan intervensi keperawatan yang lazim dilakukan pada anak.
4. Mahasiswa dapat membuat asuhan keperawatan pada beberapa penyakit kulit yang lazim ditemukan pada anak.
5. Mahasiswa memahami manfaat pengetahuan tentang asuhan keperawatan gangguan system integument.

KONSEP MEDIS, DIAGNOSA KEPERAWATAN YANG LAZIM DITEMUKAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN KULIT, INTERVENSI KEPERAWATAN YANG LAZIM DILAKUKAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN KULIT, ASUHAN KEPERAWATAN PADA BEBERAPA PENYAKIT KULIT YANG LAZIM DITEMUKAN PADA ANAK.

A. Konsep Medis

Kulit dan appendicesnya merupakan struktur yang kompleks yang membentuk jaringan tubuh yang kuat dan keras. Fungsinya dapat dipengaruhi oleh kerusakan terhadap struktur demikian juga karena penyakit. Karena terdapat banyak penyakit yang mempengaruhi kulit, maka makalah ini dibatasi hanya yang paling sering ditemukan.

1. Tinjauan Struktur Anatomi

Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis atau lapisan luar dan dermis atau kulit sebenarnya, terdapat juga appendices pada kulit yang termasuk rambut dan kuku.

a. Epidermis

Epidermis terdiri dari sel epitel yang mengalami keratinisasi yang mengandung bahan lemak yang menjadikan kulit kedap air. Sel superficial dari stratum ini secara konstan dilepaskan dan diganti. Sel lain mengandung cairan berminyak. Lapisan ketiga terdiri dari sel-sel yang mengandung granula yang mampu merefraksi cahaya dan membantu memberikan warna putih pada kulit. Lapisan keempat mengandung sel yang memproduksi melamin, yaitu suatu bahan yang berfungsi sebagai protektif terhadap efek sinar ultraviolet. Epidermis tidak mengandung pembuluh darah, tetapi limfe bersirkulasi dalam ruang interseluler.

b. Dermis

Lapisan ini terdiri dari jaringan fibrosa yang lebih padat pada bagian superficial dibandingkan dengan bagian dalamnya. Dapat diidentifikasi dua lapisan; yaitu yang pertama mengandung akhiran saraf sensorik, pembuluh darah dan limfatika; yang kedua mengandung serat kolagen, serat elastic, glandula sebacea dan glandula sudorifera, folikel rambut dan muskulus arrektor pilli

c. Hipodermis

Lapisan ini terdiri dari jaringan fibrosa yang lebih apdat pada bagian superficial dibandingkan dengan bagian dalamnya. Dapat diidentifikasi dua lapisan: yaitu yang pertama mengandung akhiran saraf sensorik, pembuluh darah dan limfatika; yang kedua mengandung serat kolagen, serat elastic, glandula sebacea dan glandula sudorifera, folikel rambut dan muskulus arrektor pilli.

d. Hipodermis

Lapisan ini merupakan zona transisisonal diantara kulit dan jaringan adipose dibawahnya, mengandung sel lemak demikian juga jaringan ikat putih dan kuning, kumparan dari sejumlah glandula sebacea dan radiks dari sejumlah rambut. Pemberian zat makanan dermis atau korium terganggu pada vena dan limfatika, Baik saraf bermielin maupun tidak bermielin ditemukan pada kulit yang berisi organ akhir dan banyak serat saraf. Organ ini memberikan respon sensasi terhadap panas, dingin, nyeri, getar dan rasa ringan.

e. Kelenjar Keringat

Kelenjar keringat terdiri dari glomerulus atau bagian sekresi dan duktus. Secara relative terdapat satu darah yang kaya dan mensekresi keringat yang agak keruh, hampir tidak berbau, hampir mengandung 99 persen air dan sejumlah kecil klorida, urea, ammoniak, asam urat dan kreatinin. Berbagai tipe kelenjar keringat ditemukan pada area seperti genitalia, anus, aksila dan putting susu dan masing-masing juga mempunyai bau yang khas.

f. Appendises.

Appendises termasuk rambut dan kuku. Rambut berasal dari epitel dan terbentuk dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang timbul dalam struktur yang kompleks, yaitu folikel yang terletak dalam lapisan dermis yang lebih dalam. Pada saat rambut melintasi lapisan permukaan dari dermis maka rambut dilapisi oleh sebum yang merupakan. Fungsinya sebagai pelumas kulit dan menjaga kulit tetap lentur, bertindak sebagai penolak air dan melindungi kulit dari udara yang kering.

Kuku terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang bersatu dengan kuat. Pada bagian proksimal kuku terbentuk dalam matriks kulit. Dasar kuku dari sel prickle yang agak mengalami modifikasi pada mana kuku melekat dengan kulit.

2. Fungsi Kulit

- a. Bertindak sebagai barier terhadap infeksi asal berada dalam keadaan utuh, tetapi dapat juga dirusak oleh mikroorganism dengan aksi dari asam lemak rantai panjang yang ditemukan dalam kulit.
- b. Ketahanan jaringan yang kuat melindungi jaringan dibawahnya .
- c. Kulit bertindak sebagai suatu insulator (hypodermis) dan membantu mengatur suhu tubuh.
- d. Karena mengandung akhiran saraf sensorik, sensasi dari kulit memainkan peranan penting dalam mempertahankan kesehatan.
- e. Sampai tingkat tertentu, kulit bertindak sebagai organ ekskresi untuk mengeluarkan produk sampah tubuh. Karenanya memainkan peranan penting dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit.

- f. Dalam kondisi yang sesuai, kulit mengatur vitamin D, yang terbentuk dengan aksi fotokimia dan sinar ultraviolet pada sterol yang diduga dieksresikan dalam sebulan.
- 3. Terminologi pada Kondisi Dermatologis**
Banyak bentuk berbeda dari lesi diuraikan dalam status dermaotologis yang menentukan penyakit spesifik. Hal ini dapat dibagi dalam bentuk yang tidak merusak kulit (lesi primer) dan yang merusak kulit (lesi sekunder).

a. Lesi Primer

- 1) Makula
Perubahan dalam warna kulit, bervariasi dalam ukuran dan bentuk, dan tampak sebagai pewarnaan pada kulit. Makula dibentuk dari :
 - a) Deposit pigmen dalam kulit misalnya frekles
 - b) Keluarnya darah ke dalam kulit misalnya petekie
 - c) Dilatasi permanen dari pembuluh perifer misalnya nevi
 - d) Dilatasi sementara dari pembuluh darah perifer misalnya eritema
- 2) Papula
Terdapat elevasi yang dapat diraba dari kulit yang bervariasi diameternya dari sekitar 1 sampai 5 mm. Permukaan dapat tajam, bulat atau datar.
Terletak superficial dan dibentuk dari proliferasi sel atau eksudasi cairan ke dalam kulit.
- 3) Nodul
Serupa dengan papula tetapi terletak lebih dalam. Bervariasi dalam ukuran dan biasanya lebih besar dari papula.
- 4) Vesikel
Merupakan lepuh kecil yang dibentuk dengan akumulasi cairan dalam epidermis, biasanya terisi dengan cairan serosa dan ditemukan pada anak-anak yang menderita eksema.
- 5) Bula atau pustula
Bula merupakan vesikel besar yang mengandung serum, pus atau darah ditemukan biasanya pada pemfigus neonatorum.
- 6) Gelegata
Merupakan elevasi sementara kulit yang disebabkan oleh dermis dan dilatasi kapiler sekitarnya. Biasanya berkaitan dengan respon alergi terhadap bahan asing.

b. Lesi sekunder

- 1) Skuama
Adalah lapisan tanduk dari epidermis mati yang menumpuk pada kulit yang dapat berkembang sebagai akibat perubahan inflamasi, ditemukan pada psoriasis.
- 2) Krusta
Terbentuk dari serum, darah atau nanah yang mengering pada kulit masing-masing dikenal dari warna: merah

kehitaman (krusta darah), kuning kehijauan (krusta nanah) dan berwarna madu (krusta serum).

- 3) Fisura
Merupakan retakan kecil yang meluas melalui epidermis dan memaparkan dermis. Dapat terjadi pada kulit kering pada inflamasi kronik.
- 4) Ulkus
Merupakan lesi yang terbentuk oleh kerusakan local dari seluruh epidermis dan sebagian atau seluruh korium dibawahnya.

4. Prinsip Umum Dalam Terapi Penyakit kulit

Tujuan terapi adalah melestarikan atau memelihara keadaan fisiologis dari kulit. Terapi local sering dipilih karena medikasi dapat diberikan dalam konsentrasi yang optimal pada tempat yang tepat diperlukan.

Air memainkan peranan penting dan ditemukan banyak pada larutan dan lotion. Jika kulit mengalami hidrasi maka akan menjadi lembut dan licin dan untuk tetap dalam keadaan ini, kelembaban lingkungan harus adekuat (sekitar 60 %). Jika menurun maka stratum korneum menciut dan pecah, barrier epidermis hilang dan mikroorganisme dan iritan akan masuk, menimbulkan respon inflamasi. Dapat terjadi overhidrasi jika jumlah air yang diabsorbsi meningkat dan sambungan lipid yang ketat antara sel stratum korneum secara berangsur-angsur diganti dengan air. Hal ini dapat terjadi pada daerah popok, ketiak dan daerah lainnya.

Dasar preparat topical :

- a. Cairan
 - 1) Sebagai kompres basah juga dapat menghilangkan rasa gatal
 - 2) Dengan bedak, jika digunakan sebagai pasta pengering
 - 3) Dengan minyak, jika digunakan sebagai vanishing, karena penitrasinya cepat dan memungkinkan penguapan
 - 4) Kelebihan pelumas dan emulsifikasi. Air dalam minyak berfungsi sebagai krim emolien yang menembus lebih lambat sehingga dapat menahan kelembaban pada kulit.
- b. Minyak sebagai zalf : hal ini menahan bahan pada kulit untuk waktu yang lama dan mencegah penguapan air.
- c. Bedak, berfungsi meningkatkan penguapan.

5. Pengkajian dan manifestasi kulit yang lain

Pengkajian keperawatan dengan memperhatikan manifestasi kulit antara lain :

- a. Eritema : area kemerahan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah darah yang teroksidasi pada vaskularisasi dermal.
- b. Ekimosis : kemerahan yang terlokalisasi atau perubahan warna keunguan disebabkan oleh ekstrevasasi darah kedalam jaringan kulit dan subcutan.
- c. Ptekie : bercak kecil dan berbatas tajam dalam lapisan epidermis superficial

- d. Gambaran pola penyebaran lesi (misalnya permukaan ekstensor, lipatan-lipatan, area terpajan, seluruh tubuh, area popok)
- e. Gambaran konfigurasi dan pengaturan lesi (misalnya terpisah-pisah, berkelompok atau menyatu, melingkar/bercincin, konfluen, linier, menyebar)
- f. Gambaran adanya karakteristik berhubungan dengan : suhu, kelembaban, tekstur, elastisitas dan kekerasan kulit secara umum atau pada area lesi.
- g. Observasi adanya bukti-bukti manifestasi subjektif yang berkaitan dengan lesi misalnya : pruritus, nyeri atau nyeri tekan, rasa terbakar, tertusuk, tersengat, menjalar, anestesia, hyperestesia, hipestesia atau hipotesia, konstan atau intermiten, diperbesar oleh aktivitas atau situasi khusus.
- h. Observasi adanya bukti-bukti faktor pemberat misalnya : benda asing seperti serat kayu, serangga, kutu busuk sebelumnya.
- i. Dapatkan riwayat kesehatan untuk reaksi kulit sebelumnya misalnya adanya alergi dan penyakit yang berhubungan dengan manifestasi kulit.
- j. Dikaji faktor pencetus seperti pemajanan terhadap penyakit infeksi kontak dengan zat kimia, tumbuhan, binatang, serangga, sinar matahari, alergi pakaian atau mainan misalnya dari wol, logam, zat topical misalnya sabun, make up, lotion, garam mandi, suhu panas atau dingin yang berlebihan.
- k. Dapatkan riwayat nutrisi terutama makanan yang dikenal sebagai allergenic.
- l. Bantu dengan prosedur diagnostic misalnya tes kulit, pemeriksaan mikroskopik terhadap kerokan, biopsy, kultur, sito diagnostik, pengujian bercak, tes darah.

B. Diagnosa Keperawatan Yang Lazim Ditemukan Pada Anak Dengan Gangguan Kulit

1. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan agens lingkungan : faktor somatic; deficit imunologis.
2. Resiko tinggi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan trauma mekanik; sekresi tubuh; peningkatan kerentanan terhadap infeksi.
3. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan adanya organisme infeksiif
4. Resiko tinggi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan faktor allergic
5. Nyeri berhubungan dengan lesi kulit; pruritus
6. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan persepsi penampilan
7. Perubahan proses keluarga berhubungan dengan mempunyai anak dengan kondisi kulit yang parah (misalnya ; eksema, psoriasis, itiosis)
8. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan penjamu dan agens infeksi.
9. Resiko tinggi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan penggarukan pruritus.

C. Intervensi Keperawatan Yang Lazim Dilakukan Pada Anak Dengan Gangguan Kulit.

1. Pengendalian infeksi yang tepat
2. Mempertahankan hidrasi kulit
3. Lakukan tindakan nonfarmakologis untuk penanganan nyeri dan pruritus.
4. Mempertahankan status nutrisi
5. Dorong dan fasilitasi aktifitas bermain sesuai dengan kondisi kulit dan usia perkembangan anak.
6. Meningkatkan kebersihan personal dan lingkungan rumah
7. Melatih keluarga melaksanakan program terapeutik.

D. Asuhan Keperawatan pada beberapa Penyakit kulit yang lazim ditemukan pada Anak.

1. Diaper Rash (Ruam, popok, dermatitis popok iritan primer : DPIP)

1.1 Konsep dasar

a) Definisi

Dermatitis popok iritan primer (DPIP) merupakan istilah yang lebih tepat digunakan dimana erupsi yang terjadi akibat kontak iritan dengan hahan excreta. DPIP merupakan gangguan kulit yang paling sering didaerah popk dan diperkirakan 50% dari bayi mengalaminya. Diaper rash merupakan akibat akhir karena kontak terus menerus dengan larutan alkali kluat.

Banyak faktor yang menimbulkan atau memperhebat keadaan ini, misalnya kebersihan kulit yang tidak terjaga akibat jarang ganti popok setelah bayi kencing, keadaan lingkungan yang panas dan lembab atau akibat mencret, reaksi kontak terhadap karet, plastyik atau detergen.


b) Etiologi

- 1) Kontak dengan ammonia yang berasal dari pemecahan urea urine oleh bakteri usus.
- 2) Sering diare yang mengiritasi kulit : organisme pada kulit yang memecahkan urea ammonia sehingga meningkatkan basa.
- 3) Sabun pada popok yang tidak tercuci dengan baik merupakan sumber.

c) Pathofisiologi

Timbul pada bayi baru lahir 1-3 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 7-12 bulan (Dali Amiruddin, 2003, hal 357). Terjadi iritasi primer pada kulit yang terkena dan muncul sebagai erythema. Erupsi terdapat pada daerah kontak yang menonjol seperti pantat, alat kelamin, perut bawah dan paha atas. Dalam bentuk yang lebih parah akan terdapat papula erythemathosa, vesicular dan uselarasi.

Patogenesis PDIP dapat dilihat pada bagan dibawah:



d. Gambaran Klinis

Gambaran Klinis biasanya disebabkan oleh kontak langsung kulit dengan urine dan feses. Eritem yang konfluen nampak pada permukaan konveks yang bersentuhan langsung popok seperti: bokong, genital. Abdomen bagian bawah dan paha bagian atas.

Pada kasus ringan biasanya hanya tampak yang jika dibiarkan akan mengelupas dan udem, mungkin disertai vesikel dan bula, bila terjadi erosi akan menunjukkan gejala klinis yang eksematous dan piodermik. Pada meatus glans penis laki-laki tampak ulkus yang tertutup membrane mirip dengan membrane difteri. Pelepasan popok sering menimbulkan bau amoniak.

Pada kasus berat yang menyerupai eczema herpetikum, umumnya timbul akibat kontak kronis dengan urine atau feses. Lesi berupa erosi, nodul ataupun ulserasi. Lesi erosi dengan tepi meninggi memberikan gambaran seperti punched out, keadaan ini biasanya sulit diatasi bila penyebab yang mendasarinya tidak teratasi.

e. Diagnosa Banding

- 1) Dermatitis seboroik
- 2) Psoriasiform napkin dermatitis
- 3) Dermatitis atopi

- 4) Intertrigo
- 5) Neonatal Kandidiasis
- 6) Sifilis Kongenital
- 7) Defisiensi Zink
- 8) Granuloma gluteal infantum

f. Penalaksanaan terafuetik

Keberhasilan pengobatan DPIP tergantung pada pengetahuan akan faktor penyebab. Pemberian preperat topical tanpa memperhatikan frekuensi penggantian popok sering mengakibatkan kegagalan terapi.

1) Penggunaan popok

Tujuan utama penatalaksanaan DPIP adalah mengurangi kelembaban karena itu yang terpenting adalah hgiene yang baik menjaga daerah popok agar tetap bersih dan kering.

2) Terafi Spesifik

DPIP sedang dan berat tidak akan mengalami perbaikan bila hanya menggunakan krim pelindung. Pada keadaan tersebut dianjurkan menggunakan kortikosteroid topical potensi rendah dank rim pelindung. Krim hidrokortison 1% 2 x sehari selama 3-5 hari. Bila dicurigai terjadi superinfeksi dengan kandida dapat digunakan clotrimazole 1% atau mikonazole 2%. Hidrokorstison dan anti jamur dioleskan bersamaan 2 kali sehari pada saat mengganti popok kemudian dioleskan barrier ointment diatasnya.

1.2 Proses keperawatan

a. Pengkajian

Pada pengkajian fisik didapatkan data-data sebagai berikut:

1) Subjektif:

- a) Keluarga mengatakan popok jarang diganti
- b) Riwayat gesekan kulit dengan popok atau kontak lama dengan urine dan atau tinja
- c) Pakaian yang dicuci kurang bersih.

2) Objektif:

- a) Bayi rewel gelisah karena gatal
- b) Eritema dan skuama pada kulit yang terkena, seringkali lesi populovesikel, bula, fisura dan erosi
- c) Personal hygiene yang kurang terpelihara
- d) Jarang terlihat pada daerah lipatan paha dan alat kelamin.

Selain hal diatas perlu dikaji juga tentang cara pemeliharaan kulit dan pakaian bayi terutama popok atau celana.

Data penunjang: pemeriksaan isi putsula untuk mendeteksi adanya jamur (infeksi kandida)

b. Diagnosa Keperawatan:

- 1) Nyeri berhubungan dengan lesi kulit

- 2) Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan papula eritematosa
- 3) Kurangnya pengetahuan orang tua tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya informasi.

c. Intervensi Keperawatan

- 1) Daerah yang terkena ruam popok, tidak boleh ditutup harus dibiarkan terbuka dan tetap kering
- 2) Bersihkan kulit bayi dengan menggunakan kapas halus yang mengandung sedikit minyak
- 3) Segera bersihkan bila anak selesai BAB, BAK
- 4) Atur posisi yang nyaman agar tidak terjadi penekanan pada daerah lesi
- 5) Anjurkan ibu tetap memberikan ASI
- 6) Ajarkan teknik pemeliharaan kebersihan pakaian dan alat-alat lainnya misalnya celana yang terkena direndam dalam larutan acidum boricum, lalu dibilas dan dikeringkan (larutan acidum boricum menetralkan ammonia sehingga suasana menjadi asam)
- 7) Anjurkan ibu memperhatikan kebersihan tubuh bayi secara keseluruhan, sering mengganti popok dan pencucian organ kelamin dengan seksama menggunakan air hangat dan sabun lunak.
- 8) Popok sekali pakai mengandung bahan-bahan superabsorben yang dapat menolong untuk memberikan lingkungan yang relative kering.
- 9) Pemberian bahan pelindung topical lunak (petrolatum atau pasta seng oksida) setelah dimandikan dapat mencegah ruam popok
- 10) Hidrokortison topical 0,5-1% setiap mengganti popok dalam jangka waktu terbatas dapat dianjurkan.

2. Impetigo

Impetigo merupakan infeksi stafilokokus, mulai sebagai lepuh kecil yang mengering dengan cepat untuk membentuk suatu skab dengan sebaran tepi yang merata basah. Pada neonatus ditemukan sebagai pemfigus neonatorum yang nyata bulosa.

Prinsip terapi dan manajemen perawatan:

- a. Neonatus harus diisolasi
- b. Obat-obatan. Antibiotik diberikan peroral dan dapat diberikan secara local
- c. Penatalaksanaan lesi. Scab dan crusta harus diangkat karena dibawahnya terjadi penyembuhan. Satu-satunya pengecualian jika impetigo tumpang tindih dengan keadaan lagi, seperti scabies. Scab dapat diangkat dengan menggunakan tampalan saku setiap 15 menit selama satu jam. Tampalan dibuat dengan menambahkan air mendidih secara lambat pada 30gr tepung maizena, diaduk merata sampai timbul gel secara menyeluruh. Bahan ini dibiarkan mendingin dan kemudian disebar pada

pita dan ditutupi dengan lapisan kasa. Tampalan dikenakan pada area yang terkena dan dibalut pada posisinya.

- d. Perawatan rutin
- e. Dukungan bagi orang tua, hal ini bertujuan untuk membantu orang tua mengerti penyebab dan memberikan bimbingan mengenai pencegahan dan perawatan dirumah.

3. Dermatitis Atopik (eczema)

a. Konsep Medis

a) Definisi

Ekzema atau inflamasi eczema kulit mengacu pada kategori deskriptif dari penyakit dermatologi dan bukan pada penyebab khusus. Ekzema merupakan istilah yang menguraikan setiap dermatitis inflamatoar yang khas dengan adanya eritema, papula, vesikula, cairan, krusta dan skuama pada berbagai fase sesolusi. Keadaan ini melibatkan epidermis dan lapisan vascular kulit.

Inflamasi disebabkan oleh beberapa iritan dalam tubuh yang menimbulkan erupsi. Ini berasal dari kapiler. Kasus ringan hanya terdapat eritema dan skuama tetapi seringkali terdapat vesikula dan keadaan basah (weeping wells).

Dermatitis atopik (DA) adalah sejenis ekzema pruritik yang biasanya terjadi pada masa bayi dan berhubungan dengan alergi dengan kecendrungan herediter.

b) Mekanisme terjadinya reaksi alergi

Diduga terdapat beberapa mekanisme yang berperan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pembebasan histamine, suatu bahan yang kuat untuk menimbulkan reaksi yang kuat pada otot polos, dilatasi kapiler dan penurunan tekanan darah.
- 2) Pembebasan bahan lain, misalnya asetilkolin.
- 3) Reaksi antara allergen dan suatu antibody

c) Gambaran Klinik

Lesi kulit pada awalnya tampak pada pipi, dahi dan kulit kepala, tetapi juga ditemukan pada permukaan fleksor dari lengan dan tungkai. Pada alhirnya mereka menyebar pada seluruh permukaan kulit. Hal ini sangat gatal dan sebaian besar perubahan kulit timbul akibat menggaruk, menggosok dan ekskoriiasi.

d. Penatalaksanaan Terapi

- 1) Diberikan antihistamin untuk mengurangi rasa gatal
- 2) Pemberian krim hidrokortison atau kortikosteroid local sangat efektif. Jika bayi sakit berat, maka anak dapat dibalut dengan pembalut katun yang dibasahi dalam krim. Verban dapat ditingkatkan sampai selama seminggu. Anak-anak yang lebih tua dapat mencapai keadaan ringan dengan

menggunakan krim kortikosteroid pada lesi, tetapi obat ini dapat diabsorpsi.

- 3) Dapat diberikan antibiotik untuk mengobati setiap infeksi yang rekuren.

a. Konsep Asuhan Keperawatan

a. Pengkajian

- 1) Dapatkan riwayat keluarga tentang bukti-bukti lesi kulit dan alergi
- 2) Dapatkan kesehatan, terutama berhubungan dengan serangan sebelumnya, faktor lingkungan atau diet yang berhubungan dengan eksaserbasi saat ini dan sebelumnya.
- 3) Pengkajian fisik dilakukan dengan penekanan khusus pada karakteristik dan distribusi manifestasi kulit.
- 4) Observasi adanya manifestasi eksema :

Distribusi lesi :

- 1) Bentuk infantile-umum, terutama pipi, kulit kepala dan permukaan ekstensor dan ekstermitas.
- 2) Bentuk masa kanak-kanak area fleksural (fosa antekubital dan fosa popliteal, leher) pergelangan tangan, pergelangan kaki dan kaki.
- 3) Bentuk praremaja dan remaja-wajah, bagian leher, tangan, kaki, wajah. Fosa antekubital dan popliteal (sampai luas yang lebih sedikit).

Tampilan Lesi :

- 1) Bentuk infantile: eritema, vesikel, papula, menangis, merembes, krusta, mengelupas, seringkali simetris.
- 2) Bentuk lesi dimasa kanak-kanak : simetris, kelompok eritema kecil atau papula berwarna merah seperti daging atau bercak yang mengelupas yang minimal. Kering dan mungkin hiperpigmentasi. Lisensifikasi (penebalan kulit dengan penekanan –penekanan lipatan). Keratosis pilaris (hyperkeratosis folikular) merupakan hal yang umum terjadi.
- 3) Bentuk remaja/dewasa : sama dengan manifestasi masa kanak-kanak. Lesi kering dan tebal (plak mengalami lisensifikasi) merupakan hal umum terjadi papula berkumpul.

Manifestasi lain :

- 1) Gatal terus menerus
- 2) Kulit yang tidak sakit kering dan kasar
- 3) Dapat menunjukkan satu atau lebih hal-hal berikut :
 - a) Limfadenopati, terutama pada area yang sakit
 - b) Peningkatan lipatan palmar
 - c) Lipatan atopik (garis atau lekukan tambahan pada kelopak mata bawah)
 - d) Cenderung mengalami tangan dingin
 - e) Pitiriasis alba (area hipopigmentasi kecil dan terbatas tidak tegas)

- f) Wajah pucat (khususnya sekitar hidung, mulut dan telinga)
- g) Perubahan warna kebiruan dibawah mata (bengkak allergic)
- h) Peningkatan kerentanan terhadap infeksi kutan tak umum (terutama virus)
- 4) Observasi tipe, distribusi dan bukti infeksi sekunder dari lesi
- 5) Lakukan atau Bantu dengan prosedur diagnostic tes kulit, diet eliminasi.

2. Diagnosa Keperawatan Dan Intervensi

Diagnosa Keperawatan 1 : Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan eksema.

Tujuan perawatan : Mempertahankan hidrasi kulit.

Intervensi	Rasional
Jaga agar kuku, jari tangan dan kaki tetap pendek dan bersih, jika memungkinkan pakaian sarung tangan katun lembut atau stocking	Minimalkan trauma dan infeksi sekunder
Hindari penggunaan pakaian dan bahan-bahan yang dapat memstimulasi gatal misalnya : bahan nilon, wol, boneka berbulu, gunakan pakaian dari katun	Pakaian dari bahan-bahan nilon dan wol dapat meningkatkan keringat yang dapat meningkatkan rasa gatal
Hindari ruangan dari panas dan lembab	Keringat akan memperberat rasa gatal
Dorong untuk tidur dan istirahat adequate	Kelebihan dan peka rangsangan lebih cenderung untuk menggaruk
Berikan mandi koloit (misalnya tepung pati dalam air hangat)	Mengurangi rasa gatal yang berat khususnya menjelang tidur
Lakukan program terapeutik yang ditetapkan (metode kering: jangan sering memandikan, bersihkan kulit dengan agens non lipit, hidropilik; dan mandi basah; mandikan dengan sering, penggunaan lubrikans, gunakan hanya sabun sangat ringan	Mempertahankan hidrasi kulit: metode basah untuk menjaga kelembaban tetap ada dalam kulit
Berikan anti histamine oral, sedative ringan, bila diresepkan	Mencegah pengeluaran histamine, sedative ringan memungkinkan anak dapat istirahat yang cukup

Diagnosa Keperawatan 2 : Perubahan proses keluarga berhubungan dengan ketidak nyamanan anak dan lamanya terapi

Tujuan perawatan : Keluarga klien dapat memberikan perawatan lanjutan di rumah

Intervensi	Rasional
Dorong aktifitas bermain yang sesuai dengan kondisi kulit dan usia perkembangan anak	Menfasilitasi perkembangan normal
Berikan bermain kinestetik, mainan yang bergerak dan besar	Memerlukan keterampilan motorik halus bila tangan ditutupi
Demonstrasikan prosedur yang tepat untuk pengenceran sabun dan penggunaan balutan basah	Meningkatkan kemampuan keluarga dalam program perawatan lanjutan di rumah
Anjurkan pemasangan balutan pada saat yang tenang ketika anak telah beristirahat dengan baik dan telah menerima obat-obatan untuk rasa gatal	Meningkatkan kerjasama anak selama penatalaksanaan tindakan dilakukan
Berikan penjelasan alasan diet hipoalergenik atau pembuangan inhalan	Meningkatkan kepatuhan program terapi
Kaji lingkungan rumah sebelum memberikan cara-cara menghilangkan inhalan	Kemampuan keluarga dalam pencegahan inhalan dicapai bila ada kepastian cara-cara penatalaksanaan yang benar

4. Scabies

1. Konsep Dasar

a) Defenisi

Scabies adalah penyakit menular akibat infestasi tungau *sarcoptes scabiei* varian hominis dan produknya pada tubuh (M.Dali Amiruddin,2003).

Pada populasi yang besar dan padat, insiden scabies tinggi karena kemungkinan kontak person besar. Penyakit ini juga sering disebut : the itch, gudik, budukan, gatal agogo.

b) Masa Inkubasi

Masa inkubasi bervariasi ada yang beberapa minggu bahkan berbulan-bulan tanpa menunjukkan gejala, terutama scabies pada orang bersih. Mellanby menunjukkan sensitisasi dimulai 2-4 minggu setelah penyakit dimulai selama waktu tersebut tungau betina berada diatas kulit atau sedang menggali terowongan tanpa menimbulkan gejala seperti gatal. Gatal muncul setelah penderita tersentisasi oleh ekskreta kutu yang merupakan gejala subjektif yang menonjol dan sangat mengganggu.

c) **Gambaran Klinis**

Dikenal 4 (empat) tanda terutama (Cardinal Sign) pada infeksi yaitu :

- 1) Pruritus nocturna : gatal yang hebat pada malam hari, hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas tungau akibat suhu yang lebih lembab dan panas.
- 2) Sekelompok orang : penyakit ini menyerang manusia secara kelompok, misalnya dalam sebuah keluarga biasanya seluruh anggota keluarga terkena.
- 3) Adanya terowongan (kunikulus/kanalikuli) : kelangsungan hidup sarcoptes scabie sangat tergantung kepada kemampuannya meletakkan telur, larva dan limfa didalam stratum korneum. Terowongan ini biasanya berbentuk baris lurus atau berkelok, rata-rata panjangnya 1 cm, berwarna putih keabu-abuan, pada ujung terowongan ditemukan papul atau vesikel bila ada infeksi sekunder ruam kulitnya menjadi polimorfi (pustule, ekskoriasis dan lain-lain).
- 4) Menemukan sarcoptes Scabei : apabila kita dapat menemukan kunikulus/terowongan yang masih utuh kemungkinan besar kita dapat menemukan tungau dewasa, larva, limfa maupun skibala dan ini merupakan hal yang palinh diagnostic.
Scabies pada bayi dan anak : lesi scabies pada anak dapat mengenai seluruh tubuh, termasuk seluruh kepala, leher, telapak tangan, telapak kaki dan sering terjadi infeksi sekunder berupa impetigo, eksima sehingga terowongan jarang ditemukan. Pada bayi, lesi terdapat diwajah.

d) **Diagnosis**

Diagnosis ditegakkan bila ditemukan tungau pada lesi. Beberapa cara untuk menemukan tungau dan produknya yaitu:

- 1) Kerokan kulit
Papul atau kanalikuli yang utuh ditetesi dengan minyak mineral dan larutan KOH 10%, lalu lakukan kerokan dengan menggunakan scalpel steril. Bahan pemeriksaan diletakkan diatas objek gelas dan ditutup dengan kaca lalu diperiksa dibawah mikroskop.
- 2) Mengambil tungau dengan jarum
Carilah terowongan, kemudian gunakan jarum suntik yang runcing ditusukkan kedalam terowongan yang utuh dengan menggerakkan jarum secara tangensial keujung lainnya, kemudian mengeluarkannya, akan dapat terlihat tungau berada pada ujung jarum berupa parasit yang sangat kecil dan transparan.
- 3) Tes tinta pada terowongan (Burrow ink test)
Papula scabies dilapisi dengan tinta cina, dibiarkan selama 20 – 30 menit kemudian dihapus dengan alcohol, tes

- dinyatakan positif bila terbentuk gambaran kanalikuli yang khas berupa garis menyerupai huruf S.
- 4) Membuat biopsi irisan (epidermal shave biopsy)
Lesi jepitan dengan ibu jari dan telunjuk kemudian dibuat irisan tipis sangat superficial dengan pisau, kemudian diletakkan dibawah objek gelas, ditetesi dengan minyak mineral dan diperiksa dibawah mikroskop.
 - 5) Uji tetrasiklin
Pada lesi diolesi salep tetrasiklin, apabila tetrasiklin sudah masuk kedalam kanalikuli kemudian dibersihkan dan dengan menggunakan sinar ultraviolet dari lampu wood, tetrasiklin tersebut akan memberikan fluoresensi kuning keemasan pada kanalikuli.

e. **Penatalaksanaan terapi dan manajemen perawatan**

- 1) Penatalaksanaan umum
Pemeliharaan kebersihan badan, pakaian, sprei dan handuk yang digunakan harus dicuci secara teratur bila perlu direndam dengan air panas.
- 2) Penatalaksanaan khusus
Pemberian obat-obatan harus didasarkan atas efikasi dan potensi toksisitas dan cara penggunaan obat yang tepat.

Terapi local :

- 1) Diberikan mandi hangat dan kulit digosok dengan flannel kasar
- 2) Setelah kulit dikeringkan, dioleskan emulsi benzyl benzoate dengan tangan pada semua bagian kulit, dari leher sampai jari-jari. Ruangan harus hangat dan emulsi dibiarkan kering sebelum anak diberikan pakaian.
- 3) Anak tidak dimandikan selama 48 jam, jika tangan dicuci maka emulsi ini diberikan kembali.
- 4) Kemungkinan diberikan terapi kedua.
Seluruh keluarga harus diobati dan ini biasanya dilakukan dengan rawat jalan.

Terdapat beberapa obat khusus scabies yaitu :

- 1) Sulfur : dalam bentuk paraffin lunak, padat dan berwarna dengan konsentrasi 10 %. Digunakan setiap malam hari selama 3 malam, lalu dicuci bersih setelah 24 jam dan bisa diulangi setelah 1 minggu kemudian.
- 2) Benzil benzoate : Bahan sintesa dari balsem perlu dalam bentuk emulsi atau losion 12-14 % namun biasanya 25 %, digunakan pada kulit selama 24 jam, diberikan setiap 2-3 hari berturut-turut atau dengan interval 1 minggu.
- 3) Gamma benzene heksaklorida : tersedia dalam bentuk Krim lotion, gel, tidak berbau dan tidak berwarna, bersifat scabisid atau mematikan kutu. Cara pemakaian dengan mengoleskan keseluruhan tubuh dari leher kebawah selama 12/24 jam dalam bentuk krim 1 % atau lotion.

- 4) Permethin
- 5) Crotamiton Krim
- 6) Ivermectin

2. Asuhan Keperawatan

a) Pengkajian

- 1) Lakukan pemeriksaan fisik khususnya pengkajian sistem integument, pemeriksaan karakteristik dan distribusi manifestasi kulit.
- 2) Pengkajian keluhan khususnya adanya pruritusnocturna observasi adanya terowongan/kunikulus.
- 3) Dapatkan riwayat kesehatan anggota keluarga lain kemungkinan penyebaran penyakit.
- 4) Kaji personal hygiene, kebersihan lingkungan rumah dan status nutrisi.

b) Diagnosa keperawatan dan intervensi

Diagnosa keperawatan 1 : nyeri berhubungan dengan lesi kulit

Tujuan : Klien mengalami ketidaknyamanan minimal

Intervensi	Rasional
Jaga agar kulit tetap bersih, ganti pakaian tidur dan linen setiap hari	Mencegah ekskoriasi dan infeksi kulit
Lakukan strategi nonfarmakologis untuk membantu anak mengatasi nyeri	Teknik-teknik seperti relaksasi, pernafasan berirama dan distraksi dapat membuat nyeri, dapat lebih ditoleransi
Gunakan strategi yang dikenal anak atau gambarkan beberapa strategi dan biarkan anak memilih salah satunya	Memudahkan pembelajaran anak dan penggunaan strategi yang tepat.
Libatkan orang tua dalam pemilihan strategi	Orang tua penting dilibatkan karena mengetahui lebih dekat dengan anak
Bantu atau minta orang tua membantu anak dengan menggunakan strategi selama nyeri actual	Pelatihan diperlukan untuk membantu anak berfokus pada tindakan yang diperlukan.
Berikan analgesic dan anti pruritus sesuai kebutuhan dan ketentuan	Impuls analgesia dapat memblok rasa nyeri sebelum sampai ke otak, meningkatkan nilai ambang nyeri dari reseptor nyeri pada kulit.

Diagnosa Keperawatan 2 : Resiko penularan penyakit berhubungan dengan penjamu dan agen infeksi.
 Tujuan : Klien tidak dapat menyebarkan penyakit.

Intervensi	Rasional
Lakukan pengendalian infeksi yang tepat, lakukan isolasi	Pengendalian infeksi yang ketat akan mengurangi resiko penularan penyakit
Pertahankan hygiene personal dan lingkungan	Menurunkan pemajanan pada organisme hidup
Ajarkan anak yang sakit metode protektif pengendalian infeksi	Melatih anak melakukan tindakan pencegahan penyebaran infeksi
Ajarkan pada keluarga pengendalian penyebaran infeksi dan kepatuhan mengikuti program terapi	Penyebaran infeksi akan lebih efektif bila keluarga memahami cara penularan dan program pengobatan yang tuntas.
Berikan obat anti biotik bila diresepkan	Mengatasi dan mencegah infeksi
Dukung pertahanan tubuh alamiah melalui nutrisi yang baik	Status nutrisi yang aedkuat meningkatkan pertahanan tubuh terhadap agen infeksi.

Diagnosa Keperawatan 3 : Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan penggarukkan pruritus.
 Tujuan : Klien dapat mempertahankan integritas kulit.

Intervensi	Rasional
Jaga agar kuku tetap pendek dan bersih	Meminimalkan trauma dan infeksi sekunder
Pakaikan sarung tangan atau restrein siku	Mencegah trauma dan penggarukkan
Berikan pakaian yang tipis, longgar dan tidak mengiritasi	Panas yang berlebihan menyebabkan stimulus rasa gatal
Tutup area dengan pakaian selapis	Mencegah penggarukkan langsung pada kulit
Berikan lotion yang melembutkan sedikit saja pada area terbuka	Area lesi terbuka absorpsi obat meningkat, lotion dan krim khusus menurunkan pruritus
Ajarkan keluarga penatalaksanaan tindakan terapeutik	Meningkatkan kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan yang tepat
Berikan antipruritus bila diresepkan	Meminimalkan stimulus gatal.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi pada Satuan Bahasan XIII, dipersilahkan mengerjakan latihan berikut:

1. Buat uraian tentang struktur anatomi dari sistem integumen.
2. Buat uraian mengenai lesi primer dan lesi sekunder.
3. Buat uraian tentang patogenesis dari Dermatitis Popok Iritan Primer.

Rangkuman

1. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis atau lapisan luar dan dermis atau kulit sebenarnya, terdapat juga apendises pada kulit yang termasuk rambut dan kuku.
2. Penyakit kulit yang lazim ditemukan pada anak yaitu Diaper Rash (Ruam, popok, dermatitis popok iritan primer), Impetigo, Dermatitis Atopik, dan Scabies.
3. Diagnose keperawatan yang lazim muncul pada anak dengan gangguan kulit yaitu: kerusakan integritas kulit, resiko tinggi kerusakan integritas kulit, resiko tinggi infeksi, nyeri, gangguan citra tubuh, perubahan proses keluarga.
4. Tujuan terapi pada penyakit kulit adalah melestarikan atau memelihara keadaan fisiologis dari kulit. Terapi local sering dipilih karena medikasi dapat diberikan dalam konsentrasi yang optimal pada tempat yang tepat diperlukan.

Tes Formatif

1. Sebutkan fungsi dari kulit!
2. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) pengkajian keperawatan dengan memperhatikan manifestasi kulit yang biasa muncul pada anak
3. Jelaskan pengertian beberapa penyakit kulit yang lazim ditemukan pada anak.
4. Sebutkan diagnose yang muncul dari penyakit kulit tersebut.
5. Sebutkan intervensi keperawatan yang lazim dilakukan pada anak dengan gangguan kulit!

Kunci Jawaban

1. Adapun fungsi kulit yaitu :
 - a. Bertindak sebagai barier terhadap infeksi asal berada dalam keadaan utuh, tetapi dapat juga dirusak oleh mikroorganisme dengan aksi dari asam lemak rantai panjang yang ditemukan dalam kulit.
 - b. Ketahanan jaringan yang kuat melindungi jaringan dibawahnya .
 - c. Kulit bertindak sebagai suatu insulator (hypodermis) dan membantu mengatur suhu tubuh.
 - d. Karena mengandung akhiran saraf sensorik, sensasi dari kulit memainkan peranan penting dalam mempertahankan kesehatan.
 - e. Sampai tingkat tertentu, kulit bertindak sebagai organ ekskresi untuk mengeluarkan produk sampah tubuh. Karenanya

- memainkan peranan penting dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit.
- f. Dalam kondisi yang sesuai, kulit mengatur vitamin D, yang terbentuk dengan aksi fotokimia dan sinar ultraviolet pada sterol yang diduga dieksresikan dalam sebulan.
2. Pengkajian keperawatan dengan memperhatikan manifestasi kulit antara lain:
 - a. Eritema : area kemerahan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah darah yang teroksidasi pada vaskularisasi dermal.
 - b. Ekimosis : kemerahan yang terlokalisasi atau perubahan warna keunguan disebabkan oleh ekstrevasi darah kedalam jaringan kulit dan subcutan.
 - c. Ptekie : bercak kecil dan berbatas tajam dalam lapisan epidermis superficial
 - d. Gambaran pola penyebaran lesi (misalnya permukaan ekstensor, lipatan-lipatan, area terpajan, seluruh tubuh, area popok)
 - e. Gambaran konfigurasi dan pengaturan lesi (misalnya terpisah-pisah, berkelompok atau menyatu, melingkar/bercincin, konfluen, linier, menyebar).
 3. Beberapa penyakit kulit yang lazim ditemukan pada anak yaitu:
 - a. Dermatitis popok iritan primer, adalah gangguan kulit yang terjadi akibat kontak iritan dengan bahan excreta.
 - b. Impetigo, adalah infeksi stafilokokus mulai sebagai lepuh kecil yang mengering dengan cepat untuk membentuk suatu skab dengan sebaran tepi yang merata basah.
 - c. Dermatitis atopik, adalah sejenis eksema pruritik yang biasanya terjadi pada masa bayi dan berhubungan dengan alergi dengan kecenderungan herediter.
 - d. Scabies, adalah penyakit menular infestasi tungau *sarcoptes scabiei* varian hominis dan produknya pada tubuh.
 4. Diagnose yang dapat muncul dari penyakit diatas yaitu:
 - a. Dermatitis popok iritan primer:
 - 1) Nyeri yang berhubungan dengan lesi kulit
 - 2) Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan papula eritematosa
 - 3) Kurangnya pengetahuan orangtua tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya informasi.
 - b. Dermatitis Atopik:
 - 1) Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan eksema.
 - 2) Perubahan proses keluarga berhubungan dengan ketidaknyamanan pada anak dan lamanya terapi.
 - c. Scabies:
 - 1) Nyeri berhubungan dengan lesi kulit
 - 2) Resiko penularan penyakit berhubungan dengan pejamu dan agen infeksi.
 - 3) Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan penggarukan pruritis.
 5. Adapun intervensi keperawatan yang lazim dilakukan pada anak dengan gangguan kulit yaitu:

- a. Pengendalian infeksi yang tepat
- b. Mempertahankan hidrasi kulit
- c. Lakukan tindakan nonfarmakologis untuk penanganan nyeri dan pruritus.
- d. Mempertahankan status nutrisi
- e. Dorong dan fasilitasi aktifitas bermain sesuai dengan kondisi kulit dan usia perkembangan anak.
- f. Meningkatkan kebersihan personal dan lingkungan rumah
- g. Melatih keluarga melaksanakan program terapeutik.

DAFTAR PUSTAKA ANAK

- Bobak Irene M dan Jensen Margaret D, Perawatan Maternitas dan Ginekologi II. Yayasan Ikatan Alumni Pendidikan Keperawatan Pajajaran : Bandung 2000.
- Carpenito Lynda J, Buku Saku Keperawatan Edisi 6. Penerbit buku kedokteran, EGC : Jakarta 1997
- Carpenito Lynda J, Rencana Asuhan dan Dokumentasi Keperawatan Edis 2. Penerbit buku kedokteran, EGC : Jakarta
- Doengoes Marilyn E. dan Moorhouse Mary Frances. Rencana Perawatan Maternal / Bayi. Penerbit buku kedokteran, EGC : Jakarta 2001
- Manuaba Ida Bagus Gde DSOG. Dr. Prof. Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana. Penerbit buku kedokteran, EDC : Jakarta 1998
- Mochtar Rustam MPH. Dr. Prof. Sinopsis Obstetri Jilid 1 Edisi 2. Penerbit buku kedokteran, EGC. Jakarta 1998
- Wiknjosastro Hanifa, DSOG dr.Prof. Ilmu Kebidanan. Yayasan Bina Pustaka sarwono Prawirohardjo : Jakarta 1999.
- Betz L. Cecily. **Buku Saku Keperawatan Pediatri**. Edisi 3. Penerbit Buku Kedokteran, EGC. Jakarta. 2002
- Dina Dr,dr,. **Penatalaksanaan Penyakit Alergi**. Airlangga University Press. Surabaya. 1993
- Speer Kathleen Morgan.**Pediatric Care Planning Ashwill**, third edition. Pediatric Nurse Practitioner Childrens Medical Center of Dallas. Springhouse Corporation. Springhouse Pennsylvania. 1999
- Ngastiyah. **Perawatan anak Sakit**. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 1997
- Corwin, J. Elizabeth. **Buku Saku Patofisiologi**. Penerbit Buku Kedokteran. EGC. Jakarta. 2000
- Suriadi, SKp., Rita, SKp. **Asuhan Keperawatan pada Anak**. Edisi 1. CV Sagung Seto. Jakarta, 2001
- Markum, A.H., **Buku Ajar Ilmu Kesehatan Anak**, Jilid I, Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991
- Melson, Kathryn A & Marie S. Jaffe, **Maternal Infant Health Care Planning**, Second Edition, Springhouse Corporation, Springhouse Pennsylvania, 1994

Wong, Donna L., Wong & Whaley's Clinical Manual of Pediatric Nursing, Fourth Edition, Mosby-Year Book Inc., St. Louis Missouri, 1990

Doenges, Marilyn E., Maternal/Newborn Care Plans : Guidelines for Client Care, F.A. Davis Company, Philadelphia, 1988

Soetjiningsih, Tumbuh Kembang Anak, Bagian Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Udayaha Bali, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995 Jakarta.

Buku Saku Keperawatan Pediatrik, Ceccly L.Betz, Linda A. Sowden.