

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI ANAK BALITA
DI WILAYAH PESISIR PANTAI DESA TOSEWO KECAMATAN
TAKKALALLA KABUPATEN WAJO
TAHUN 2013**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

SULFIAH

NIM :70200109082

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan atau plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2013

Penyusun,

SULFIAH

70200109082



KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berhasilnya penyusunan skripsi ini dengan judul *“Faktor yang berhubungan dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013”*. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **H.Ahmad** dan Ibunda **Hj.Asnidar** serta Suamiku **Ambo Asse, A.Md, ANT** atas kasih sayang yang tak terhingga, dukungan tak kenal lelah dan senantiasa memberikan doa restu serta bantuan moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di bangku kuliah, serta Adikku **Awal Pradinata** dan **Ariel Achmad** yang selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Semoga persembahan penyelesaian tugas akhir ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu pembimbing, ibu **Hj. Syarfaini, SKM., M.Kes.** Selaku

pembimbing I dan bapak **Muhammad Rusmin SKM., MARS.** selaku pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan kepada penulis mulai dari awal hingga selesainya penulisan ini. Demikian pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr.dr.H. Rasjidin Abdullah, MPH.,MH.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Andi Susilawaty,S.Si.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak dr. Kidri Alwi, M.Kes selaku penguji I dan Bapak Dr. Hasaruddin, M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
5. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendorong dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para ibu-ibu yang telah bersedia anak balitanya dijadikan sampel dalam penelitian ini.
7. Sahabat-sahabatku Namirah Wahid, Nining Ariestianita, Dini Anggriani, dan Dewi Utari Ramadany, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, pikiran, dan semangat.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Jurusan Kesehatan Masyarakat dan jurusan gizi “09” yang selalu memberikan pendapat dan saran.

9. Rekan PBL Parangloe (Mira, Nining, Cici, Vira, , Mila, Linda, Indri, diana, aswat, Sulham, Alul), rekan Magang di Dinkes (Echy, Dilla, Nunu, Dini), rekan KKN posko I Samata (Salma, Aya, Helni, Tiar, Yudi, Ipul, kak Ros, kak Diah, Joe, Ikbal) yang sampai sekarang masih memberikan dukungan dan bantuan.

10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Atas segala bantuan tersebut penulis menghaturkan doa kepada Allah SWT semoga diberikan balasan yang setimpal. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu segala kritik dan saran tetap penulis nantikan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya. Semoga karya ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Gizi dan Kesehatan. Aamiin.



Makassar, Juli 2013

Penyusun

ABSTRAK

NAMA PENYUSUN : Sulfiah
NIM : 70200109082
JUDUL SKRIPSI : **Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Anak Balita Di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013.**
PEMBIMBING : **Hj. Syarfaini, SKM., M.Kes**
Muhammad Rusmin, SKM., MARS

Status gizi adalah keadaan kesehatan akibat interaksi antara makanan, tubuh manusia dan lingkungan hidup manusia. Status gizi dipengaruhi oleh banyak factor yaitu factor langsung yakni makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak dan factor tidak langsung yakni ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Dari kedua factor status gizi tersebut, saling berhubungan satu sama lain. Sehingga dalam penelitian ini, dikaji tentang adakah hubungan antara pendapatan keluarga, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan gizi ibu, tingkat asupan energy, tingkat asupan protein dan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pendapatan keluarga, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan gizi ibu, tingkat asupan energy, tingkat asupan protein dan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan rancangan Cross Sectional Study. Sampel yang diambil sejumlah 40 anak balita dengan menggunakan total sampling. Instrument penelitian yang digunakan berupa kuisioner, formulir recall 24 jam, seca, dan microtoice. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Data sekunder diperoleh dari buku profil Desa Tosewo tahun 2013 dan Puskesmas Parigi kecamatan takkalalla Kabupaten Wajo. Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah dengan menggunakan statistic uji chi-square.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa factor yang tidak berhubungan dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo antara lain : pendapatan keluarga, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan gizi ibu, penyakit infeksi, masing-masing berdasarkan BB/U, TB/U, BB/TB, dan tingkat asupan energy, serta tingkat asupan protein berdasarkan BB/U dan TB/U. Sedangkan factor yang berhubungan dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo antara lain : tingkat asupan energy, dan tingkat asupan protein berdasarkan BB/TB .

Saran yang dapat penulis ajukan terkait penelitian ini adalah Perlunya pemantauan status gizi pada anak balita secara berkala sehingga keadaan status gizi anak balita dapat diketahui dan segera dilakukan penanggulangan apabila terjadi masalah gizi, serta perlunya penyuluhan tentang masalah gizi agar masyarakat utamanya para ibu lebih memahami dengan baik dan Hendaknya para ibu lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya sehingga para anak balita dapat terhindar dari masalah-masalah gizi yang tidak diharapkan.


Daftar Pustaka : **28 (1986-2013)**

Kata Kunci : **Status Gizi, Anak balita**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Status Gizi	7
B. Tinjauan Umum tentang Anak Balita	19
C. Tinjauan Umum tentang Penyakit Infeksi	23
D. Tinjauan Umum tentang Asupan makanan	26
E. Tinjauan Umum tentang Tingkat Pengetahuan ibu	35
F. Tinjauan Umum tentang Wilayah Pesisir	39
G. Tinjauan Umum tentang Tingkat pendidikan	40
H. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Keluarga	41
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	43
B. Landasan Teori	44
C. Model Hubungan Antar Variabel	45
D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	46

E. Hipotesis	49
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel	50
D. Metode Pengumpulan Data	51
E. Pengolahan dan Penyajian Data	52
BAB V HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan	84
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	103



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Arah kebijaksanaan pembangunan bidang kesehatan adalah untuk mempertinggi derajat kesehatan, termasuk di dalamnya keadaan gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan pada umumnya (Suharjo, 2003).

Ditinjau dari sudut masalah kesehatan dan gizi, maka anak balita termasuk dalam golongan masyarakat kelompok rentan gizi, yaitu kelompok masyarakat yang paling mudah menderita kelainan gizi. Secara umum terdapat 4 masalah gizi pada balita di Indonesia yaitu Kekurangan Energi Protein (KEP), Kurang Vit A (KVA), Kurang yodium (Gondok Endemik), dan kurang zat besi (Anemia Gizi Besi). Akibat dari kurang gizi ini kerentanan terhadap penyakit-penyakit infeksi dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian balita (Universitas Pembangunan Nasional veteran, 2003).

Menurut Data World Health Organization (WHO) tahun 2002 menyebutkan, penyebab kematian balita urutan pertama disebabkan gizi buruk dengan angka 54%. WHO (1999) mengelompokan wilayah berdasarkan

prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok yaitu rendah (dibawah 10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29%) dan sangat tinggi (30%). Dengan menggunakan pengelompokan prevalensi gizi kurang berdasarkan WHO, Indonesia tahun 2004 tergolong negara dengan status kekurangan gizi yang tinggi karena 5.119.935 (atau 28,47%) dari 17.983.244 balita di Indonesia termasuk kelompok gizi kurang dan gizi buruk.

Secara nasional prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia masih tinggi. Salah satu konsekuensi dari gizi kurang adalah gangguan pertumbuhan (Sri Mulyati 2007 dalam Sunardi 2008). Data tahun 2007 memperlihatkan 4 juta balita Indonesia kekurangan gizi, 700 ribu diantaranya mengalami gizi buruk. Sementara yang mendapat program makanan tambahan hanya 39 ribu anak.

Masalah gizi di Indonesia pada saat ini menghadapi masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Masalah gizi kurang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan (sanitasi), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan dan adanya daerah miskin gizi (yodium). Sebaliknya masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan serta kurangnya ketrampilan di bidang memasak, konsumsi anak, keragaman bahan dan keragaman jenis makanan yang mempengaruhi kejiwaan misalnya kebosanan balita terhadap makanan yang diberikan oleh ibu.

Gizi kurang dan gizi buruk berdampak serius terhadap kualitas generasi mendatang. Anak yang menderita gizi kurang akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental.

Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dikenal luas sebagai lumbung pangan nasional ternyata memiliki angka kejadian gizi kurang yang tinggi. Survei Konsumsi Gizi menunjukkan bahwa sejak tahun 1995 sampai tahun 1998 terjadi peningkatan persentase keluarga di Sulsel yang mengalami defisit konsumsi energi dari 39% menjadi 57% .

Sedangkan, Secara umum prevalensi gizi buruk di Sulawesi Selatan menurut hasil Riskesdas adalah 5,1% dan gizi kurang 12,5% dari 23 kab./kota terdapat delapan kab./kota yang diatas angka provinsi dan Sulawesi Selatan sudah mencapai target pencapaian program perbaikan gizi pada RPJM 2015 sebesar 20% (Dinkes, 2012).

Ada berbagai kabupaten yang terdapat di Sulawesi Selatan yang tidak menutup kemungkinan mengalami kasus gizi kurang bahkan kasus gizi buruk pada balita yang ada di daerah tersebut, Salah satunya kabupaten Wajo. Data persentase anak balita Bawah Garis Merah (BGM) terakhir menunjukkan pada tahun 2007 meningkat dengan tajam hingga 851 kasus BGM atau 1.66% dari 51.236 balita yang menyebar di hampir seluruh Kabupaten Wajo. Salah satu kecamatan yang memiliki kasus kelainan gizi yaitu Kecamatan Takkalalla tepatnya di desa Tosewo. Data tahun 2012 bahwa prevalensi kasus gizi kurang (BGM) yaitu sebanyak 27,5 % sedangkan prevalensi gizi lebih sebanyak 20,4 % dari 1.171 balita.

Desa Tosewo merupakan desa yang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Takkalalla yang wilayahnya berupa wilayah pesisir pantai yang kaya akan sumberdaya alam baik laut maupun daratan, misalnya sumberdaya perikanan. Sehingga sebagian besar masyarakat hidup dan bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani kebun.

Status gizi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi secara kompleks, ditingkat rumah tangga status gizi dipengaruhi oleh kemampuan ibu rumah tangga menyediakan pangan yang cukup baik kuantitas maupun kualitasnya. Asupan gizi ibu dan anak dipengaruhi tingkat pendidikan perilaku serta keadaan kesehatan anggota rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut terlihat erat hubungan antara ketahanan pangan status gizi dan kesehatan masyarakat.

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi dan kesehatan, khususnya ibu merupakan salah satu penyebab terjadinya kekurangan gizi pada balita. Pengetahuan minimal yang harus diketahui seorang ibu adalah tentang kebutuhan gizi, cara pemberian makan, jadwal pemberian makan pada anak balita, sehingga akan menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi perlu dibina perilaku yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu gizi. Kurang gizi pada anak balita dapat juga disebabkan perilaku ibu dalam pemilihan bahan makanan yang tidak benar. Pemilihan bahan makanan,

tersedianya jumlah makanan yang cukup dan keanekaragaman makanan ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu tentang makanan dan gizinya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti Faktor yang berhubungan dengan status gizi pada anak balita di wilayah pesisir pantai Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah Faktor yang berhubungan dengan status gizi pada anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo 2013”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Faktor yang berhubungan dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo 2013.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan asupan makanan dalam hal ini asupan energy dan protein dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo 2013.
- b. Mengetahui hubungan pengetahuan ibu dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo 2013.

- c. Mengetahui hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo 2013.
- d. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo 2013.
- e. Mengetahui hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo 2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan menambah khasanah kepustakaan terutama yang terkait dengan status gizi anak balita.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan masukan bagi masyarakat dalam menindaklanjuti masalah yang ada pada status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai.

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak yang terkait dalam rangka bersama-sama mewujudkan derajat kesehatan khususnya anak balita.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS GIZI

1. Definisi Status Gizi

Menurut Soekirman (2000) status gizi adalah keadaan kesehatan akibat interaksi antara makanan, tubuh manusia dan lingkungan hidup manusia. Selanjutnya, Suhardjo (2003) menyatakan bahwa status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari pemakaian, penyerapan dan penggunaan makanan.

Sedangkan menurut Supriasa, IDN. Bakri, B. & Fajar, I. (2002), status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari status tubuh yang berhubungan dengan gizi dalam bentuk variable tertentu. Jadi intinya terdapat suatu variable yang diukur (misalnya berat badan dan tinggi badan) yang dapat digolongkan ke dalam kategori gizi tertentu (misalnya ; baik, kurang, dan buruk).

Pertumbuhan seorang anak bukan hanya sekedar gambaran perubahan ukuran tubuh, tetapi lebih dari itu memberikan gambaran tentang keseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi (status gizi). Oleh karena itu pertumbuhan merupakan indikator yang baik dari perkembangan status gizi anak (Depkes RI, 2000).

Status gizi menjadi indikator ketiga dalam menentukan derajat kesehatan anak. Status gizi yang baik dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencapai kematangan yang optimal. Gizi yang baik juga dapat memperbaiki ketahanan tubuh sehingga diharapkan tubuh akan bebas dari segala penyakit. Status gizi ini dapat membantu untuk mendeteksi lebih dini risiko terjadinya masalah kesehatan. Pemantauan status gizi dapat digunakan sebagai bentuk antisipasi dalam merencanakan perbaikan status kesehatan anak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi

Faktor yang menyebabkan kurang gizi telah diperkenalkan UNICEF dan telah digunakan secara internasional, yang meliputi beberapa tahapan penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita, baik penyebab langsung, tidak langsung, akar masalah dan pokok masalah. Berdasarkan Soekirman dalam materi Aksi Pangan dan Gizi nasional (Depkes RI, 2000), penyebab kurang gizi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyebab langsung yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan makanan yang kurang tetapi juga karena penyakit. Anak yang mendapat makanan yang baik tetapi karena sering sakit diare atau demam dapat menderita kurang gizi. Demikian pada anak yang makannya tidak cukup baik maka daya tahan tubuh akan melemah dan mudah terserang penyakit.

Kenyataannya baik makanan maupun penyakit secara bersama-sama merupakan penyebab kurang gizi.

- b. Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Ketahanan pangan adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga dalam jumlah yang cukup dan baik mutunya. Pola pengasuhan adalah kemampuan keluarga untuk menyediakan waktunya, perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial. Pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan adalah tersedianya air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh seluruh keluarga. Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan keluarga. Makin tinggi pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan terdapat kemungkinan makin baik tingkat ketahanan pangan keluarga, makin baik pola pengasuhan anak dan keluarga makin banyak memanfaatkan pelayanan yang ada. Ketahanan pangan keluarga juga terkait dengan ketersediaan pangan, harga pangan, dan daya beli keluarga, serta pengetahuan tentang gizi dan kesehatan.

3. Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi adalah interpretasi dari data yang didapatkan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi populasi atau

individu yang berisiko atau dengan status gizi buruk (Hartriyanti dan Triyanti, 2007).

Menurut Supriasa, et al (2002), penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

a. Penilaian secara langsung.

Penilaian status gizi secara langsung dibagi menjadi empat penilaian yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Adapun penilaian dari masing-masing adalah sebagai berikut (Supriasa, et al, 2002):

1) Antropometri

Secara umum bermakna ukuran tubuh manusia. Antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Parameter yang diukur antara lain BB, TB, LLA, Lingkar kepala, Lingkar dada, Lemak subkutan. Indeks antropometri bisa merupakan rasio dari satu pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang dihubungkan dengan umur (Hartriyanti, Yayuk dan Triyanti, 2007).

2) Klinis

Metode ini, didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal tersebut dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

3) Biokimia

Adalah suatu pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: urine, tinja, darah, beberapa jaringan tubuh lain seperti hati dan otot.

4) Biofisik

Penentuan gizi secara biofisik adalah suatu metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi, khususnya jaringan, dan melihat perubahan struktur jaringan.

b. Penilaian secara tidak langsung

Penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi menjadi 3 yaitu: survey konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi (Supariasa, et all 2002).

Adapun uraian dari ketiga hal tersebut adalah:

1) Survey konsumsi makanan

Adalah suatu metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi.

2) Statistik vital

Adalah dengan cara menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

3) Faktor ekologi

Berdasarkan ungkapan dari Bengoa dikatakan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-lain.

4. Jenis dan Parameter Status Gizi

Dalam menentukan status gizi harus ada ukuran baku (*reference*). Baku antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah baku *World Health Organization – National Centre for Health Statistics* (WHO-NCHS) sesuai rekomendasi pakar gizi dalam pertemuannya di Bogor tahun 2000. Selain itu juga dapat digunakan baku rujukan yang dibuat oleh Departemen Kesehatan RI. Departemen Kesehatan RI membuat baku rujukan penilaian status gizi anak balita yang terpisah antara anak laki-laki dan perempuan. Kriteria jenis kelamin inilah yang membedakan baku WHO-NCHS dengan baku Harvard. Baku rujukan penilaian status gizi menurut Depkes RI terlampir dalam lampiran.

Parameter antropometri untuk penilaian status gizi berdasarkan parameter :

a. Umur.

Umur sangat memegang peranan dalam penentuan status gizi, kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Hasil penimbangan berat badan maupun tinggi badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Kesalahan

yang sering muncul adalah adanya kecenderungan untuk memilih angka yang mudah seperti 1 tahun; 1,5 tahun; 2 tahun. Oleh sebab itu penentuan umur anak perlu dihitung dengan cermat. Ketentuannya adalah 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari. Jadi perhitungan umur adalah dalam bulan penuh, artinya sisa umur dalam hari tidak diperhitungkan (Depkes, 2004).

b. Berat Badan

Berat badan merupakan salah satu ukuran yang memberikan gambaran massa jaringan, termasuk cairan tubuh. Berat badan merupakan pengukuran yang terpenting pada bayi baru lahir. Dan hal ini digunakan untuk menentukan apakah bayi termasuk normal atau tidak (Supriasa, et al, 2001).

Berat badan merupakan hasil peningkatan / penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh antara tulang, otot, lemak, cairan tubuh. Parameter ini yang paling baik untuk melihat perubahan yang terjadi dalam waktu singkat karena konsumsi makanan dan kondisi kesehatan (Soetjiningsih 1998).

Penentuan berat badan dilakukan dengan cara menimbang. Alat yang digunakan sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Mudah digunakan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain, (2) Mudah diperoleh dan relatif murah harganya, (3) Ketelitian penimbangan maksimum 0,1 kg, (4) Skalanya mudah dibaca, (5) Aman untuk menimbang balita. Sedangkan jenis timbangan sebaiknya yang memenuhi persyaratan tersebut, timbangan yang dianjurkan untuk anak balita adalah *dacin* dengan kapasitas minimum 20 kg dan maksimum 25 kg. jenis timbangan lain yang dapat digunakan adalah

detecto, sedangkan timbangan injak (*bath room scale*) akurasinya kurang karena menggunakan per, sehingga hasilnya dapat berubah-ubah.

Berat badan ini dinyatakan dalam bentuk indeks BB/U (Berat Badan menurut Umur) atau melakukan penilaian dengan melihat perubahan berat badan pada saat pengukuran dilakukan, yang dalam penggunaannya memberikan gambaran keadaan kini. Berat badan paling banyak digunakan karena hanya memerlukan satu pengukuran, hanya saja tergantung pada ketetapan umur, tetapi kurang dapat menggambarkan kecenderungan perubahan situasi gizi dari waktu ke waktu (Djumadias Abunain, 1990) dalam Atmarita, Soendoro, T. Jahari, AB. Trihono dan Tilden, R. (2009).

Pengukuran berat badan digunakan untuk menilai hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh, misalnya tulang, otot, lemak, organ tubuh, dan cairan tubuh sehingga dapat diketahui status keadaan gizi atau tumbuh kembang anak. Selain menilai berdasarkan status gizi dan tumbuh kembang anak, berat badan juga dapat digunakan sebagai dasar perhitungan dosis dan makanan yang diperlukan dalam tindakan pengobatan.

c. Tinggi Badan

Tinggi badan merupakan ukuran antropometrik kedua yang cukup penting. Keistemewaannya bahwa ukuran tinggi badan akan meningkat terus pada waktu pertumbuhan sampai mencapai tinggi yang optimal. Di samping itu tinggi badan dapat dihitung dengan dibandingkan berat badan dan dapat mengesampingkan umur.

Tinggi badan memberikan gambaran fungsi pertumbuhan yang dilihat dari keadaan kurus kering dan kecil pendek. Tinggi badan sangat baik untuk melihat keadaan gizi masa lalu terutama yang berkaitan dengan keadaan berat badan lahir rendah dan kurang gizi pada masa balita. Tinggi badan dinyatakan dalam bentuk Indeks TB/U (tinggi badan menurut umur), atau juga indeks BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan) jarang dilakukan karena perubahan tinggi badan yang lambat dan biasanya hanya dilakukan setahun sekali. Keadaan indeks ini pada umumnya memberikan gambaran keadaan lingkungan yang tidak baik, kemiskinan dan akibat tidak sehat yang menahun (Depkes RI, 2004). Pengukuran tinggi badan untuk anak yang sudah bisa berdiri dilakukan dengan alat pengukur tinggi mikrotoa (*microtoise*) yang memiliki ketelitian 0,1 cm. sedangkan pada anak yang belum bisa berdiri digunakan alat pengukur panjang badan dengan posisi anak berbaring di tempat datar. Pengukuran tinggi badan maupun panjang badan dapat dilakukan dengan menggunakan pita ukur.

Cara mengukur panjang badan usia 0-24 bulan yaitu:

- (1). alat pengukur diletakkan di atas meja atau tempat yang datar
- (2). bayi ditidurkan lurus di dalam alat pengukur
- (3). bagian bawah alat pengukur sebelah kaki digeser sehingga tepat menyinggung telapak kaki bayi dan skala pada sisi alat ukur dapat dibaca.

Penilaian Status Gizi berdasarkan indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standart Baku Antropometri WHO-NCHS :

1) Indikator BB/U

Indikator BB/U dapat normal, lebih rendah, atau lebih tinggi setelah dibandingkan dengan standar WHO. Status gizi tergolong baik jika BB/U normal, BB/U rendah dapat diartikan status gizi tersebut tergolong gizi kurang atau buruk. Sedangkan BB/U tinggi digolongkan sebagai status gizi lebih. Baik status gizi kurang maupun lebih, kedua-duanya memiliki resiko yang tidak baik bagi kesehatan. Status gizi kurang yang diukur dengan indikator BB/U dalam ilmu gizi digolongkan ke dalam kelompok “berat badan rendah” (BBR) atau *underweight*. Menurut tingkat keparahannya, BBR dikelompokkan ke dalam kategori BBR tingkat ringan (*mild*), sedang (*moderate*), dan berat (*severe*). BBR tingkat berat atau sangat berat (berat badan sangat rendah = BBSR) sering disebut sebagai status gizi buruk. Gizi buruk pada anak-anak di masyarakat dikenal dengan marasmus dan kwashiorkor (Soekirman, 2000).

2) Indikator TB/U

Indikator TB/U dapat dinyatakan normal, kurang, dan tinggi menurut standar WHO. Menurut WHO, bagi anak yang memiliki TB kurang maka dikategorikan sebagai *stunted* (pendek tidak sesuai dengan umur). Tingkat keparahannya dapat digolongkan ringan, sedang, dan berat atau buruk. Hasil pengukuran TB/U menggambarkan status gizi masa lalu. Seorang anak yang

tergolong *stunted* kemungkinan keadaan gizi masa lalu kurang atau tidak baik (Soekirman, 2000).

Berbeda dengan BBR yang diukur dengan BB/U yang mungkin dapat diperbaiki dalam waktu pendek, baik pada anak ataupun pada dewasa. *Stunted* pada orang dewasa tidak lagi dapat dipulihkan. Kemungkinan untuk memulihkan pada anak balita dengan cara menormalkan pertumbuhan linier (pertumbuhan berat badan mengikuti pertumbuhan tinggi badan dengan percepatan tertentu) dan mengejar pertumbuhan potensial (pertumbuhan tinggi badan menurut keturunan genetik dalam lingkungan yang ideal) masih dapat dilakukan. Sedangkan pada anak usia sekolah sampai remaja kemungkinan menormalkan pertumbuhan linier masih ada, tetapi kemungkinannya kecil untuk dapat *catch-up growth* (Soekirman 2000).

Dalam keadaan normal tinggi badan tumbuh bersamaan dengan bertambahnya umur. Pertambahan tinggi atau panjang badan relatif kurang sensitif terhadap kurang gizi dalam waktu yang singkat. Pengaruh kurang gizi terhadap pertumbuhan tinggi badan baru dapat dilihat dalam waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu indikator TB/U menggambarkan status gizi masa lampau (Soekirman 2000).

3) Indikator BB/TB

Pengukuran antropometri yang terbaik adalah menggunakan indikator BB/TB. Ukuran ini menggambarkan status gizi saat ini dengan lebih sensitif dan spesifik, Seseorang dengan BB/TB kurang dikategorikan sebagai “kurus” atau

“wasted”. Berat badan berhubungan linier dengan tinggi badan. Dalam kondisi normal perkembangan berat badan akan mengikuti pertambahan tinggi badan pada percepatan tertentu. Dengan demikian berat badan yang normal akan proposional dengan tinggi badan. Indikator BB/TB ini diperkenalkan pertama kali oleh Jelliffe pada tahun 1966 dan merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini, terutama jika data umur yang akurat sulit untuk diperoleh. Oleh sebab itu, indikator BB/TB merupakan indikator yang independen terhadap umur (Soekirman, 2000).

Tabel 1. Penilaian Status Gizi Anak berdasarkan indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standart Baku Antropometri WHO-NCHS

No	Indeks	Batas Pengelompokan	Status Giz
1	BB/U	$< -3 \text{ SD}$ $-3 \text{ s/d } < -2 \text{ SD}$ $-2 \text{ s/d } +2 \text{ SD}$ $> +2 \text{ SD}$	Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih
2	TB/U	$< -3 \text{ SD}$ $-3 \text{ s/d } < -2 \text{ SD}$ $-2 \text{ s/d } +2 \text{ SD}$ $> +2 \text{ SD}$	Sangat Pendek Pendek Normal Tinggi

3	BB/TB	< -3 SD	Sangat Kurus
		-3 s/d < -2 SD	Kurus
		-2 s/d +2 SD	Normal
		> +2 SD	Gemuk

Sumber : KEPMENKES RI, (2010).

B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK BALITA

1. Pengertian Anak Balita

Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak di bawah lima tahun (Muaris.H, 2006). Sedangkan menurut Soetjiningsih (1995) Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan.

Masa 24-59 bulan adalah masa peralihan dimana anak balita belajar dan diberi makanan biasa seperti layaknya orang dewasa (pada kelompok ini juga rentan terhadap kekurangan gizi).

Menurut Sutomo. B. dan Anggraeni. DY, (2010), Balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3-5 tahun). Saat usia batita, anak masih tergantung penuh kepada orang tua untuk melakukan kegiatan penting, seperti mandi, buang air dan makan. Perkembangan berbicara dan berjalan sudah bertambah baik. Namun kemampuan lain masih terbatas.

Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia. Perkembangan dan pertumbuhan di masa itu menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya. Masa tumbuh kembang di usia ini merupakan masa yang berlangsung cepat dan tidak akan pernah terulang.

Menurut Soetjiningsih (1995) tahapan-tahapan perkembangan adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahun kedua secara perlahan-lahan anak mulai bisa mengenal lingkungan secara luas maupun kalimat dan menyusun kalimat bersama anak yang lain. Menurut (depkes, 1993) anak pada usia ini sudah bias diajarkan gerakan-gerakan motorik ringan seperti : berjalan mundur, menangkap bola, juga sudah bisa diberi stimulasi (perkembangan membuat garis lurus dan bulatan mengikuti perintah yang sederhana).
- b. Pada tahun ketiga anak mulai berjalan – jalan sendiri, belajar berpakaian, mengenal 2 atau 3 warna menyebut nama dan bicara dengan baik.
- c. Pada tahun keempat anak sudah mampu melompat dan menari, pandai bicara, dapat menghitung jari-jarinya, dapat menyebut nama-nama dalam minggu, mendengar dan mengulangi hal-hal yang penting.

2. Karakteristik Balita

Menurut karakteristik, balita terbagi dalam dua kategori yaitu anak usia 1 – 3 tahun (batita) dan anak usia prasekolah (Uripi, 2004). Anak usia 1-3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan dari apa

yang disediakan ibunya. Laju pertumbuhan masa batita lebih besar dari masa usia pra-sekolah sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Namun perut yang masih lebih kecil menyebabkan jumlah makanan yang mampu diterimanya dalam sekali makan lebih kecil dari anak yang usianya lebih besar. Oleh karena itu, pola makan yang diberikan adalah porsi kecil dengan frekuensi sering.

Pada usia pra-sekolah anak menjadi konsumen aktif. Mereka sudah dapat memilih makanan yang disukainya. Pada usia ini anak mulai bergaul dengan lingkungannya atau bersekolah playgroup sehingga anak mengalami beberapa perubahan dalam perilaku. Pada masa ini anak akan mencapai fase gemar memprotes sehingga mereka akan mengatakan “tidak” terhadap setiap ajakan. Pada masa ini berat badan anak cenderung mengalami penurunan, akibat dari aktivitas yang mulai banyak dan pemilihan maupun penolakan terhadap makanan. Diperkirakan pula bahwa anak perempuan relative lebih banyak mengalami gangguan status gizi bila dibandingkan dengan anak laki-laki (BPS, 1999).

3. Karakteristik makanan pada anak balita

Anak –anak membutuhkan energy dan nutrisi yang tinggi. Namun dimasa pra sekolah usia 24-59 bulan nafsu makannya tidak menentu dan sangat pemilih saat makan. Namun tak usah cemas pastikan saja disetiap makanan si kecil terdapat kandungan nutrisi yang diperlukan (suharjo, 2003) :

a. Karbohidrat

Setidaknya satu jenis karbohidrat seperti nasi, roti, pasta, mie, kentang, disajikan dalam satu masakan .

b. Buah dan sayuran

Makan buah dan sayur dalam sehari sebaiknya 5 porsi, atau seukuran 5 genggam sayuran. Buah dapat dijadikan topping pudding untuk makanan selingan. Jika anak tidak menyukai sayuran, cobalah sembunyikan sayuran didalam makanan kesukaan anak seperti bubur dan lain-lain.

c. Susu dan olahannya

Susu dan olahannya merupakan makanan sumber kalsium. Anak diharuskan minum susu sekitar 500 ml setiap hari. Susu dapat digunakan sebagai campuran sereal, pudding, keju, dan lain-lain.

d. Daging dan ikan

Daging dan ikan harus dimakan sekali atau dimakan dua kali dalam seminggu. Dapat juga diselingi dengan daging sapi atau daging ayam. Ahli gizi menyarankan setidaknya 2 porsi ikan perminggu. Jangan berikan porsi makan ikan lebih yang mengandung lemak seperti ikan hiu dan ikan marlin karena mengandung merkuri tinggi yang dapat mempengaruhi sistem saraf.

4. Gizi kurang pada anak balita

Anak balita sehat atau kurang gizi secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umurnya dengan rujukan

standar yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik, kalau diatas standar anak tersebut mengalami gizi lebih, jika sedikit dibawah standar maka disebut gizi kurang dan apabila jauh dibawah standar maka dikatakan gizi buruk. Anak kurang gizi pada tingkat ringan dan atau sedang tidak diikuti gejala sakit. Dia seperti anak-anak lain masih bermain dan sebagainya, tetapi bila diamati dengan seksama badannya mulai kurus. Gizi kurang dan gizi buruk dipengaruhi tiga hal yaitu anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang, anak tidak mendapat asuhan gizi yang baik, dan anak mungkin menderita penyakit infeksi.

C. TINJAUAN TENTANG PENYAKIT INFEKSI

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit seperti bakteri, virus, jamur, cacing dan sebagainya.

St. Rahma (2010) dalam Hasriani (2004) mengemukakan bahwa penyakit infeksi mempunyai efek terhadap status gizi untuk semua umur, tetapi lebih nyata pada kelompok anak. Kebutuhan energy pada saat infeksi biasa mencapai dua kali kebutuhan normal karena meningkatnya metabolisme dalam tubuh.

Penyakit infeksi dapat bertindak sebagai pemula terjadinya kurang gizi sebagai akibat menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit.

Masa bayi dan balita sangat rentan terhadap penyakit. Jaringan tubuh pada bayi dan balita belum sempurna dalam upaya membentuk pertahanan tubuh seperti halnya orang dewasa. Umumnya penyakit yang menyerang anak bersifat akut artinya penyakit menyerang secara mendadak dan gejala timbul dengan cepat.

Infeksi bisa berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara yaitu mempengaruhi nafsu makan sehingga kebutuhan zat gizinya tidak terpenuhi. Secara umum defisiensi zat gizi sering merupakan awal dari gangguan defisiensi system kekebalan.

Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal balik dan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi dan keadaan gizi yang kurang dapat mempermudah seseorang terkena penyakit infeksi. (Supariasa, 2002).

Berikut penyakit infeksi yang sering dialami oleh balita :

1. Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA)

Infeksi saluran pernapasan meliputi penyakit saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah dari seluruh kematian balita.

Dalam program P2 ISPA dikenal 3 klasifikasi ISPA yaitu :

- a. ISPA berat, ditandai sesak nafas yaitu adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam pada waktu inspirasi (secara klinis ISPA berat = pneumonia berat).
- b. ISPA sedang, bila frekuensi nafas menjadi cepat, yaitu :

- 1) Umur 2 bulan sampai 1 tahun = 50 kali/menit atau lebih
 - 2) Umur 1 sampai 4 tahun = 40 kali/menit atau lebih
- c. ISPA ringan, ditandai dengan batuk atau pilek yang disertai demam, tetapi nafas cepat dan tanpa tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam.

2. Diare

Secara umum diare didefinisikan sebagai berak encer atau cair, 3x atau lebih dalam 24 jam dan didalam tinja disertai dengan atau tanpa lender atau darah.

Diare merupakan gejala penyakit yang penting dan dapat disebabkan oleh banyak factor seperti salah makan . kejadian diare biasanya berhubungan dengan musim , misalnya pada musim buah-buahan sering bersamaan banyaknya lalat. Gejala penyakit ini dapat berbahaya dan menyebabkan kematian pada anak-anak kecil terutama bila pada penderita gizi kurang.

Diare dapat menyebabkan anak tidak mempunyai nafsu makan sehingga kekurangan jumlah makanan dan minuman yang masuk ketubuhnya, yang dapat berakibat kurang gizi. Serangan diare berulang atau diare akut yang berat pada anak berakibat kurang gizi dan mengarah ke KEP dan merupakan resiko kematian (ST. Rahmah, 2010)

D. TINJAUAN TENTANG ASUPAN MAKANAN

Asupan makanan adalah semua jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam sehari. Pratiwi dalam gizi masyarakat 2007 (Gizi dan kesehatan masyarakat, 2007)

Umumnya asupan makanan dipelajari untuk dihubungkan dengan keadaan gizi masyarakat suatu wilayah atau individu. Informasi ini dapat digunakan untuk perencanaan pendidikan gizi khususnya untuk menyusun menu atau intervensi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), mulai dari keadaan kesehatan dan gizi serta produktivitasnya. Mengetahui asupan makanan suatu kelompok masyarakat atau individu, merupakan salah satu cara untuk menduga keadaan gizi kelompok masyarakat atau individu bersangkutan.

Sedangkan kecukupan gizi yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari hampir semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mengukur jumlah asupan konsumsi makanan tingkat individu dapat menggunakan metode recall 24 jam , estimated food recall, food weighing, dietary history dan food frequency yang dapat dihitung konsumsi zat gizi dengan menggunakan DKBM, sehingga dapat diketahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tiap individu.

1. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran konsumsi pada individu yaitu :

a. Metode recall 24 jam

Metode recall 24 jam adalah metode untuk memperoleh data mengenai jumlah kalori (energi) pada konsumsi makanan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu.

b. Metode frekuensi makanan (food frequency)

Metode frekuensi makanan adalah metode untuk memperoleh data tentang frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan jadi selama periode tertentu seperti hari, minggu, bulan atau tahun tapi kita tidak menggunakan tahun karena membutuhkan waktu terlalu lama. Selain itu dengan metode frekuensi makanan dapat memperoleh gambaran pola konsumsi bahan makanan secara kualitatif, tetapi karena periode pengamatannya lebih lama dan dapat membedakan individu berdasarkan ranking tingkat konsumsi zat gizi, maka cara ini paling sering digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi.

c. Adapun pemilihan metode pengukuran konsumsi makanan yang digunakan yaitu:

Penelitian ini untuk mengetahui asupan makanan menggunakan metode pengukuran konsumsi makanan yaitu metode recall 24 jam. Prinsip dari metode recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah

makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Biasanya dimulai sejak individu bangun pagi kemarin sampai dia istirahat tidur malam harinya.

Adapun asupan makanan atau asupan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh yaitu :

1. Asupan Energi

Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan merupakan sumber energy untuk menunjang semua kegiatan atau aktivitas manusia. Energy dalam tubuh manusia dapat timbul dikarenakan adanya pembakaran karbohidrat, protein dan lemak (Suhardjo, 2003).

Dengan demikian agar manusia selalu tercukupi energinya diperlukan pemasukan zat-zat makanan yang cukup pula kedalam tubuhnya. Manusia yang kurang makanan akan lemah baik daya kegiatan, pekerjaan fisik atau daya pemikirannya karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya yang dapat menghasilkan energy (Suhardjo, 2003).

Seseorang tidak dapat menghasilkan energy yang melebihi dari apa yang diperoleh dari makanan kecuali jika meminjam atau menggunakan cadangan energy dalam tubuh, namun kebiasaan meminjam ini akan dapat mengakibatkan keadaan yang gawat yaitu kekurangan gizi khususnya energy (Suhardjo, 2003).

Dalam usaha menciptakan manusia-manusia sehat pertumbuhannya, penuh semangat dan penuh kegairahan dalam bekerja, serta tinggi daya cipta dan kreatifitasnya, maka sejak anak-anak harus dipersiapkan. Untuk itu

energy harus benar-benar diperhatikan, tetap selalu berada dalam serba kecukupan (G. Kartasapoetra dan Narsetyo,2001).

2. Asupan Protein

Dalam proses pencernaan, protein akan dipecah menjadi satuan-satuan dasar kimia, kemudian diserap dan dibawa oleh aliran darah keseluruh tubuh, dimana sel-sel jaringan mempunyai kemampuan untuk mengambil asam amino yang diperlukan untuk kebutuhan membangun dan memelihara kesehatan jaringan.

Protein terbentuk dari unsur-unsur organik yang hampir sama dengan karbohidrat dan lemak yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen akan tetapi ditambah dengan unsur lain yaitu nitrogen.

Dalam Alquran juga membagi protein menjadi :

a. Protein nabati atau nabatum (tumbuh-tumbuhan)

Sebagaimana tercantum dalam Alquran surah Abasa (80) ayat 24-31 :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلَبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهِمَ وَأَبًّا ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit), Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma, Kebun-kebun (yang) lebat, Dan buah-buahan serta rumput-rumputan”(Q.S. ‘Abasa/80: 24-31)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt telah menganugrahi atau telah memberikan kepada hambaNya atau kepada manusia sumber protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati sebagaimana dalam terjemah ayat diatas yaitu Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan kurma, Kebun-kebun (yang) lebat,dan buah-buahan serta rumput-rumputan.

b. Protein hewani atau hayawanun (binatang)

- 1) *Hayawanun bahri* yang berasal dari laut yang hidup di air asin ataupun air tawar. Adapun yang dihalalkan Allah swt, ditegaskan dalam Alquran surah An-Nahl (16) ayat 14 :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَآكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

“ Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”(Q.S. An-Nahl/16: 14).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt mengkaruniakan lautan agar manusia memanfaatkan lautan tersebut dengan sebaik-baiknya, baik dalam hal memperoleh makanan yakni sumber protein hewani yang berasal dari laut (ikan), maupun sumber-sumber keuntungan lainnya.

Selain dari ayat tersebut, hadist yang menjelaskan tentang halalnya sumber protein yang berasal dari laut yaitu:

Rasulullah saw bersabda :

اللَّهُ عَنْهُمَا :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَيْتَاتَانِ الْمَيْتَاتَانِ

(أَخْرَجَهُ مَاجَه وَفِيهِ)


Artinya :

Dari Ibnu Umar–radiyallahu ‘anhuma- dia berkata, Rasulullah – shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Adapun dua darah yaitu ati dan limpa” Dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan di dalamnya terdapat kedhoifan.

Maksud dari hadist tersebut yakni darah yang mengalir, diambil dari kebolehan dua darah yang disebutkan di dalam hadits tersebut. Haramnya bangkai, yaitu hewan yang mati begitu saja atau disembelih tidak dengan cara yang sesuai dengan syari’at. Ati dan limpa itu halal dan suci, Bangkai belalang dan ikan juga halal dan suci. Makna bangkai belalang adalah belalang yang mati bukan akibat ulah manusia, melainkan mati begitu saja dengan sebab-sebab kematian seperti kedinginan, hanyut, atau yang lainnya. Adapun yang mati dengan sebab racun maka bangkai tersebut diharamkan karena di dalamnya terkandung racun yang mematikan yang diharamkan. Demikian juga bangkai ikan adalah ikan yang mati bukan akibat perbuatan manusia, melainkan yang mati begitu saja, baik dengan sebab hanyut oleh

ombak atau keringnya air sungai, atau karena suatu musibah yang bukan akibat ulah manusia. Maksudnya adalah bahwa jika ditemukan telah menjadi bangkai dengan cara apa saja, maka ia halal dan suci. Adapun yang mati dengan sebab oleh sesuatu yang disebut dengan pencemaran air laut dengan bahan beracun atau hal-hal yang mematikan, maka ini diharamkan, bukan karena substansi bangkai ikannya akan tetapi karena racun dari zat-zat yang berbahaya atau yang mematikan tersebut.

- 2) *Hayawanun barri* yaitu hewan yang berasal dari darat. Adapun yang diharamkan Allah swt, ditegaskan dalam Alquran surah Al-An'am (6) ayat 142 :



وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَاقْرَاشٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“ Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”(Q.S. Al-An'am/6: 142).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa selain hewan ternak digunakan sebagai alat bantu untuk manusia dalam hal mengangkut sesuatu, hewan ternak juga digunakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan

makanannya. Hewan ternak inilah yang merupakan sumber hewani yang berasal dari darat.

Protein mempunyai fungsi yang unik bagi tubuh yaitu :

1. Protein menyediakan bahan – bahan yang penting peranannya untuk pertumbuhan dan memelihara jaringan tubuh.

Protein sebagai zat pembangun, yaitu merupakan bahan pembangun jaringan baru. Dengan demikian protein amatlah penting bagi semua taraf kehidupan, mulai dari anak-anak, remaja yang sedang tumbuh, juga pada masa hamil dan menyusui pada wanita dewasa, orang yang sakit dan dalam taraf penyembuhan demikian juga orang dewasa dan lanjut usia. Berarti pembentukan jaringan baru selalu terjadi selama kita hidup.

2. Protein bekerja sebagai pengatur kelangsungan proses didalam tubuh.

Selain protein penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, protein juga turut memelihara serta mengatur proses-proses yang berlangsung dalam tubuh. Hormon yang mengatur proses pencernaan dalam tubuh adalah terdiri dari protein. Mineral dan vitamin yang bergabung dengan protein membentuk enzim yang berperan besar untuk kelangsungan proses pencernaan dalam tubuh. Demikian juga zat kekebalan tubuh mengandung protein,

3. Memberikan tenaga, jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak.

Karena komposisi protein mengandung unsur karbon maka protein dapat berfungsi bahan bakar sumber energi. Bila tubuh tidak menerima karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang cukup memenuhi kebutuhan tubuh, maka untuk menyediakan energi bagi kelangsungan aktivitas tubuh, protein akan dibakar sebagai sumber energi. Dalam keadaan ini, keperluan tubuh akan energi diutamakan sehingga sebagian protein tidak dapat dipergunakan untuk membentuk jaringan.

Berat badan sangat menentukan banyaknya protein yang diperlukan. Berat badan erat sekali hubungannya dengan jumlah jaringan yang aktif yang selalu memerlukan protein lebih banyak untuk pembentukan, pemeliharaan dan pengaturan dibandingkan dengan jaringan yang tidak aktif. Oleh karena itu orang yang beratnya lebih tinggi memerlukan protein yang lebih banyak dari pada orang yang lebih ringan.

Umur merupakan factor yang sangat menentukan banyaknya kebutuhan protein terutama pada golongan muda yang masih dalam pertumbuhan. Kebutuhan energy dan protein pada bayi dan balita relatif besar dibandingkan orang dewasa sebab pada usia tersebut pertumbuhannya masih sangat pesat. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal kebutuhan energy dan protein. Kecukupan akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Namun untuk protein, angka kebutuhannya bergantung pada mutu protein. Semakin baik mutu protein, semakin rendah angka kebutuhan protein. Mutu protein bergantung

pada susunan asam amino yang membentuknya, terutama asam amino esensial

E. TINJAUAN TENTANG TINGKAT PENGETAHUAN IBU

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu :

1. Tahu (know)

Tahu diartikan mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

2. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar.

3. Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum – hukum ,rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis (Analysis)

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Soekidjo Notoatmodjo, 2005).

Dalam pengelolaan gizi diperlukan adanya pengetahuan, kurangnya daya beli merupakan suatu kendala, tetapi defisiensi gizi akan berkurang bila orang mengetahui bagaimana menggunakan daya beli yang ada. Menurut Achmad Djaeni Sediaoetam tingkat pengetahuan akan mempengaruhi seseorang dalam memilih makanan. Untuk masyarakat yang berpendidikan dan cukup pengetahuan tentang gizi, pertimbangan fisiologis lebih menonjol dibandingkan dengan kebutuhan kepuasan psikis. Tetapi umumnya akan terjadi kompromi antara keduanya, sehingga akan menyediakan makanan yang lezat dan bergizi seimbang (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2008).

Rendahnya pengetahuan ibu merupakan faktor penting karena mempengaruhi kemampuan ibu dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mendapatkan kecukupan bahan makanan. Pengetahuan tentang kandungan zat gizi dalam berbagai bahan makanan, kegunaan makanan bagi kesehatan keluarga dapat membantu ibu memilih bahan makanan yang berharga tidak begitu mahal akan tetapi nilai gizinya tinggi (Sjahmien Moehji, 2002).

Gizi kurang banyak menimpa anak balita sehingga golongan anak ini disebut golongan rawan. Masa peralihan antara saat disapih dan mengikuti ibu atau pengasuh anak mengikuti kebiasaan yang keliru. Penyuluhan gizi dan bukti-bukti perbaikan gizi pada anak memperbaiki sikap ibu yang kurang menguntungkan pertumbuhan anak (Sajogyo, 1994).

Pengetahuan gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor, disamping pendidikan yang pernah dijalani, faktor lingkungan sosial dan frekuensi kontak dengan media massa juga mempengaruhi pengetahuan gizi. Salah satu penyebab terjadinya gangguan gizi adalah kurangnya pengetahuan gizi atau kemampuan untuk menerapkan informasi tentang gizi dalam kehidupan sehari-hari (Suhardjo, 2003).

Tingkat pengetahuan gizi seseorang besar pengaruhnya bagi perubahan sikap dan perilaku di dalam pilihan bahan makanan, yang selanjutnya akan berpengaruh pula keadaan gizi individu yang bersangkutan. Keadaan gizi yang rendah disuatu daerah akan menentukan tingginya angka kurang gizi secara nasional.

Tingkat pengetahuan gizi ibu sebagai pengelola rumah tangga akan berpengaruh pada macam bahan makanan yang akan dikonsumsinya. Dalam kehidupan sehari-hari terlihat keluarga yang sungguhpun berpenghasilan cukup akan tetapi akan makana yang disajikan seadanya saja. Dengan demikian, berpenghasilan kurang akan tetapi juga pada keluarga yang berpenghasilan relatif baik (cukup). Keadaan ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan akan faedah makanan bagi kesehatan tubuh merupakan sebab buruknya mutu gizi makanan keluarga, khususnya makanan balita (Moehji, 2002).

Pengetahuan gizi yang baik akan menyebabkan seseorang mampu menyusun menu yang baik untuk dikonsumsi. Semakin banyak pengetahuan gizi seseorang, maka ia akan semakin memperhitungkan jenis dan jumlah makanan yang diperolehnya untuk dikonsumsi (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2008).

Semakin bertambah pengetahuan ibu maka seorang ibu akan semakin mengerti jenis dan jumlah makanan untuk dikonsumsi seluruh anggota keluarganya termasuk pada anak balitanya. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga, sehingga dapat mengurangi atau mencegah gangguan gizi pada keluarga (Suhardjo, 1986).

Kurangnya pengetahuan dan salah konsepsi tentang kebutuhan pangan dan nilai pangan adalah umum dijumpai seti negara di dunia. Kemiskinan dan kekurangan persediaan pangan yang bergizi merupakan

faktor penting dalam masalah kurang gizi, penyebab lain yang penting dari gangguan gizi adalah kurangnya pengetahuan tentang dan mengetahui kemampuan untuk menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Suhardjo, 2003).

F. TINJAUAN TENTANG WILAYAH PESISIR

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut ataupun biasa dikatakan dengan wilayah pantai. Pada umumnya keluarga yang bertempat tinggal di wilayah pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup didasar, kolam, maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut.

Masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang dalam mempertahankan hidupnya bergantung pada sumber yang ada didalam lautan, terutama laut yang berada disekitar lingkungan masyarakat dan dalam mengelola sumber daya alam masyarakat nelayan melakukannya dengan sederhana.

Berusaha sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang cepat mendatangkan hasil. Bagi nelayan, hari ini bekerja, hari ini pula dapat melihat hasilnya. Namun tidak semua nelayan mujur ada kalanya tidak mendapat hasil sama sekali. Oleh karena itu, dalam usah mencukupi rumah tangganya,

nelayan harus bekerja keras menangkap ikan untuk segera menjualnya pada juragan atau pembeli ikan keliling.

Penelitian achmadi, dkk (1990) menunjukkan bahwa keadaan gizi nelayan masih merupakan salah satu masalah yang penting dikawasan pantai (nikmah, 2004).

G. TINJAUAN TENTANG TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang pernah dialami oleh seseorang dan berijazah. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam kesehatan terutama dalam pola asuh anak dan alokasi sumber zat gizi. Rendahnya tingkat pendidikan ibu menyebabkan berbagai keterbatasan dalam menangani masalah gizi dan keluarga serta anak balitanya (St. Rahmah 2010, dalam Slope, 1989).

Dalam pencapaian tujuan pendidikan, dapat ditempuh melalui 3 jenis pendidikan yaitu :

1. Pendidikan informal

Jenis pendidikan ini meliputi keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai dan cara hidup pada umumnya, berlangsung sepanjang umur dan cara berlansungnya paling wajar. Berlangsung tidak terikat jam, hari, bulan dan tahun tetapi bias terjadi setiap saat pada insane yang berinteraksi secara sadar dan bermakna.

2. Pendidikan non formal

Tujuan dari pendidikan ini selalu berorientasikan langsung pada hal-hal yang penting bagi kehidupan, tergantung pada taraf hidup orang yang bersangkutan secara ekonomis. Pendidikan jenis ini perlu diorganisasikan, misalnya pretek kerja lapang atau magang.

3. Pendidikan formal

Ciri pendidikan formal adalah adanya jenjang kronologis yang ketat untuk tingkat-tingkat umur populasi sasaran dan menurut tingkat pengetahuan dan keterampilan.

Pendidikan ibu merupakan modal utama dalam menunjang ekonomi keluarga juga berperan dalam penyusunan makan keluarga, serta pengasuhan anak dan perawatan anak. Bagi keluarga dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima informasi kesehatan khususnya di bidang gizi, sehingga dapat menambah pengetahuannya dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

H. TINJAUAN TENTANG PENDAPATAN KELUARGA

Dalam kehidupan sehari-hari pendapatan erat kaitannya dengan gaji, upah, serta pendapatan lainnya yang diterima seseorang setelah orang itu melakukan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.

Tingkat pendapatan akan menentukan makanan apa yang akan dibeli oleh keluarga. Orang miskin biasanya akan membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk makanan. Rendahnya pendapatan merupakan rintangan

yang menyebabkan orang –orang tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang dibutuhkan. Adapula keluarga yang sebenarnya mempunyai penghasilan cukup namun sebagian anaknya berstatus kurang gizi (sajogyo, 1994).

Anak –anak yang tumbuh dalam suatu keluarga miskin paling rentan terhadap kurang gizi diantara seluruh anggota keluarga dan anak yang paling kecil biasanya paling terpengaruh oleh kekurangan pangan. Jumlah keluarga juga mempengaruhi keadaan gizi (Suhardjo, 2003).

Umumnya, jika pendapatan naik, jumlah dan jenis makanan cenderung ikut membaik juga. Tingkat penghasilan ikut menentukan jenis pangan apa yang akan dibeli dengan adanya tambahan uang. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula persentase dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk membeli buah, sayur-mayur dan berbagai jenis bahan pangan lainnya. Jadi penghasilan merupakan faktor penting bagi kuantitas dan kualitas.



BAB III KERANGKA KONSEP


A. Dasar pemikiran variabel yang diteliti

Status gizi adalah keadaan kesehatan akibat interaksi antara makanan, tubuh manusia dan lingkungan hidup manusia. Status gizi menjadi indikator ketiga dalam menentukan derajat kesehatan anak. Status gizi yang baik dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencapai kematangan yang optimal.

Anak Balita adalah anak yang berusia antara 12-59 bulan yang sedang menunjukkan pertumbuhan badan yang pesat sehingga memerlukan zat-zat gizi yang lebih tinggi setiap kilogram berat badan. Anak balita termasuk ke dalam kelompok usia yang berisiko tinggi terhadap penyakit. Penyakit infeksi merupakan penyakit yang dapat mempengaruhi status gizi anak balita. Terjadinya penyakit infeksi pada anak balita biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang diberikan kepada anak sehingga ketahanan tubuh menurun dan virulensi pathogen lebih kuat menyebabkan keseimbangan terganggu dan terjadilah infeksi. Ditingkat rumah tangga, status gizi juga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga menyediakan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup dalam hal ini ketersediaan pangan dan pendapatan keluarga dalam mencukupi kebutuhan gizi keluarganya. Dan yang paling penting tingkat pendidikan dan Tingkat pengetahuan ibu dalam merawat dan mengatur pola makan anaknya agar status gizinya baik sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan keluarga.


B. Landasan Teori

Bagan penyebab masalah gizi konsep UNICEF







Sumber : UNICEF (1998)

C. Model Hubungan Antara Variabel



Keterangan :

-  : Variabel Independen (variabel yang mempengaruhi)
-  : Variabel Dependen (variabel yang dipengaruhi)
-  : Variabel yang diteliti
-  : Variabel yang tidak diteliti

C. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif

1. Status Gizi

Defenisi Operasional

Status Gizi adalah suatu keadaan keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi yang dinilai berdasarkan ukuran antropometri yaitu rasio berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut umur (BB/TB) terhadap nilai Z skor.

Kriteria Objektif :

Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Normal : apabila -2 s/d $+2$ SD

Tidak normal : apabila < -3 s/d $> +2$ SD

Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

Normal : apabila -2 s/d $+2$ SD

Tidak normal : apabila < -3 s/d $> +2$ SD

Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Normal : apabila -2 s/d $+2$ SD

Tidak normal : apabila < -3 s/d $> +2$ SD

2. Asupan makanan

Defenisi operasional

Asupan makanan adalah jumlah asupan energi dan protein yang dikonsumsi oleh anak balita yang bersumber dari makanan, minuman, dan ASI (bagi yang menyusui) yang selama 24 jam kemarin. Asupan makanan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan metode recall 24 jam.

Kriteria objektif :

a) Asupan energy

Asupan energy adalah jumlah total energy yang bersumber dari makanan, minuman dan ASI yang dikonsumsi subjek.

Kriteria objektif :

Cukup : 80 – 100 % AKG

Kurang : < 80 % AKG

b) Asupan protein

Asupan protein adalah jumlah total protein dari makanan, minuman dan ASI yang dikonsumsi subjek.

Kriteria objektif :

Cukup : 80 – 100 % AKG

Kurang : < 80 % AKG

3. Tingkat Pengetahuan gizi

Defenisi Operasional

Tingkat pengetahuan gizi adalah kemampuan ibu/ yang mengasuh anak balita dalam hal ilmu pengetahuannya yang diperoleh dari jumlah jawaban yang benar dari semua pertanyaan yang ada yang diberi nilai dengan skor, kemudian hasilnya dinyatakan dalam persen.

Kriteria objektif:

Baik : dikatakan baik apabila jumlah jawaban 50%

Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban < 50%

4. Penyakit infeksi

Defenisi operasional

Penyakit infeksi adalah penyakit diare dan penyakit ISPA serta penyakit infeksi lain yang pernah atau masih menderita oleh anak sebulan terakhir berdasarkan pengakuan dari ibu.

Kriteria objektif :

Menderita : bila sampel menderita salah satu penyakit infeksi

Tidak menderita : bila sampel tidak menderita penyakit infeksi

5. Tingkat Pendidikan

Defenisi operasional

Tingkat Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh atau dialami oleh seorang ibu/yang mengasuh anak balita dan bejazah.

Kriteria objektif

Tinggi : jika telah menjalani pendidikan minimal lulus SMP dan SMA atau sederajat.

Rendah : jika telah menjalani pendidikan minimal lulus SD atau sederajat.

6. Pendapatan keluarga

Defenisi operasional

Pendapatan keluarga adalah segala bentuk penghasilan seluruh anggota keluarga dalam bentuk rupiah setiap bulannya.

Kriteria objektif

Cukup bila Rp. 1.400.000/ bulan

Kurang bila < Rp. 1.400.000/bulan (UMR Kab.Wajo)

D. Hipotesis

Ho : Tidak ada hubungan asupan makanan (energy dan protein) dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Ha : Ada hubungan asupan makanan (energy dan protein) dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Ho : Tidak ada hubungan pengetahuan dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Ha : Ada hubungan pengetahuan dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Ho : Tidak ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Ha : Ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Ho : Tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Ha : Ada hubungan tingkat pendidikan dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Ho : Tidak ada hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Ha : Ada hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan rancangan Cross Sectional Study.

B. Lokasi dan waktu pelaksanaan

- a. Lokasi penelitian adalah di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
- b. Waktu penelitian di mulai tanggal 24 - 3 Juni 2013

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua balita yang berada di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo. Adapun jumlah anak balita yang terdapat di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo yaitu sebanyak 78 anak. Sedangkan jumlah anak balita usia 12-59 bulan sebanyak 40 anak.

2. Sampel

a. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu anak balita yang berada di wilayah pesisir pantai desa Tosewo kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo usia 12-59 bulan. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan total sampling. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 anak balita.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu ibu atau yang mengasuh dari anak balita yang kami jadikan sampel.

Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Yang termasuk kriteria inklusi, yaitu :

1. Ibu anak Balita usia 12-59 bulan
2. Anak balita yang ada di wilayah pesisir Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.
3. Bersedia diteliti

Kriteria Eksklusi

Kriteria Eksklusi adalah karakteristik sampel yang layak untuk diteliti, tetapi karena sesuatu hal sehingga sampel tersebut tidak layak untuk diteliti.

1. Tidak bersedia diteliti

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

- a. Tingkat pendidikan, Pengetahuan, penyakit infeksi dan pendapatan keluarga : diperoleh data melalui wawancara berpedoman pada kuisioner.
- b. Asupan makanan : diperoleh dari recall 24 jam.

- c. Status gizi : Diperoleh data melalui pengukuran langsung dengan cara antropometri. Timbangan injak untuk mengukur berat badan, microtoice untuk mengukur tinggi badan.

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas gambaran umum desa tosewo kecamatan takkalalla kabupaten wajo yang diperoleh dari buku profil Desa tahun 2013, serta gambaran status kesehatan desa tosewo kecamatan takkalalla kabupaten wajo yang diperoleh dari Buku Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dan petugas puskesmas Parigi kecamatan takkalalla yang menaungi desa tosewo serta literatur-literatur yang ada atau pihak yang terkait untuk melengkapi hasil penelitian ini.

E. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Data yang telah terkumpul diteliti kelengkapannya, jika ada data yang kurang lengkap dapat segera dilengkapi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputerisasi dengan menggunakan program *SPSS for window*, dan program *Child Growth Standard WHO Antro 2005* dan *Nutrisurvey*. *SPSS* digunakan untuk mengolah data hasil kuisioner dan *Child Growth Standard WHO Antro 2005* digunakan untuk mengolah data hasil pengukuran antropometri sehingga dapat ketahui status gizi setiap anak, sedangkan *nutrisurvey* untuk recall 24 jam yakni asupan makanan anak balita. Data disajikan dalam bentuk tabel disertai penjelasan dalam bentuk narasi.

2. Analisis data

Analisis data yang dilakukan menggunakan uji statistic dengan bantuan komputerisasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi :

a. Analisi Univariat

Hasil penelitian akan disajikan dalam table distribusi frekuensi dan analisis persentase.

b. Analisis Bivariat

Analisi bivariat dilakukan untuk mengetahui kemaknaan hubungan, ada tidaknya factor yang berhubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara satu per satu. Uji statistic yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan keluarga, tingkat asupan makanan, penyakit infeksi, pendidikan ibu, pengetahuan ibu dengan status gizi anak balita adalah uji chi-square. Derajat kepercayaan yakni 95% (0,05).

Penilaian atau interpretasi :

- 1) H_a ditolak jika nilai $P < 0,05$ berarti ada hubungan yang bermakna
- 2) H_0 diterima jika nilai $P > 0,05$ berarti tidak ada hubungan yang bermakna

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa tosewo merupakan bagian wilayah di Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, dengan luas wilayah 10400 M² yang terdiri dari 2 dusun yaitu dusun Campi dan dusun Bocco-Bocco'e. Nama lain dari Desa Tosewo yakni Desa Botto. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Benteng

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Desa Leweng

Sebelah Barat : Desa Lamarua

Adapun jumlah penduduk didesa ini yaitu 2147 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 573 KK. Sarana pendidikan yang ada didesa ini yaitu 1 PAUD, 1 TK, 2 sekolah dasar (SD), 1 SLTP. Adapun posyandu dilaksanakan ditiap dusun yaitu di Dusun Campi dan Dusun Bocco-Bocco'e. Tenaga kesehatan di desa ini hanya ada 1 bidan tetap dan 1 bidan kontrak (bidan pembantu).

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo sejak tanggal 24-3 juni 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 40 anak balita.

Dalam penelitian ini cara pengambilan data primer diperoleh melalui pemeriksaan langsung berupa pengukuran berat badan serta tinggi badan, dan wawancara berdasarkan kuesioner dan formulir recall yang dilakukan dua kali.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh informasi secara umum tentang semua variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat distribusi frekuensi dalam bentuk tabel.

1) Deskripsi variabel responden dan sampel

a. Umur responden

Tabel 2.
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Umur Responden (Tahun)	n	%
22 – 27	14	35,0
28 – 33	17	42,5
34 – 39	9	22,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa responden yang berumur 22-27 tahun sebanyak 14 orang (35,0%), responden yang berumur 28-33 tahun sebanyak 17 orang (42,5%), dan responden yang berumur 34-39 tahun sebanyak 9 orang (22,5%). Jadi responden yang paling banyak berdasarkan kelompok umur yaitu pada kelompok umur 28-33 tahun sebanyak 17 orang (42,5%) dan responden yang paling sedikit yaitu pada kelompok umur 34-39 tahun yakni 9 orang (22,5%).

b. Jenis Kelamin Anak

Tabel 3.
Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin Anak
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Jenis Kelamin	n	%
Laki-laki	17	42,5
Perempuan	23	57,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa dari 40 sampel , terdapat 17 sampel (42,5%) yang berjenis kelamin laki-laki dan 23 sampel (57,5) yang berjenis kelamin perempuan.

c. Umur Anak

Tabel 4.
Distribusi Sampel Berdasarkan Umur Anak
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Umur (Bulan)	n	%
12	10	25,0
24	8	20,0
36	12	30,0
48	6	15,0
59	4	10,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa anak yang berumur 12 bulan sebanyak 10 anak (25,0%), anak yang berumur 24 bulan sebanyak 8 anak (20,0%), anak yang berumur 36 bulan sebanyak 12 anak (30,0%), anak yang berumur 48 bulan sebanyak 6 anak (15,0%) dan anak yang berumur 59 bulan sebanyak 4 anak (10,0%). Jadi jumlah anak yang paling banyak yaitu berumur 36 bulan sebanyak 12 anak (30,0%) dan jumlah anak yang paling sedikit yaitu berumur 59 bulan sebanyak 4 anak (10,0%).

d. Berat Badan Anak Balita

Tabel 5.
Distribusi Sampel Berdasarkan Berat Badan Anak Balita
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Berat Badan (Kg)	n	%
6,0 – 10,1	11	27,5
11,0 – 14,5	18	45,0
15,0-34,0	11	27,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5 diatas, diketahui bahwa anak dengan berat badan antara 6,0 – 10,1 kg sebanyak 11 anak (27,5%), berat badan antara 11,0-14,5 kg sebanyak 18 anak (45,0%) dan berat badan antara 15,0-34,0 kg sebanyak 11 anak (27,5%). Jadi berat badan anak yang paling banyak berada pada kelas interval 11,0-14,5 kg yaitu sebanyak 18 anak (45,0%).

e. **Tinggi Badan Anak Balita**

Tabel 6.
Distribusi Sampel Berdasarkan Tinggi Badan Anak Balita
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Tinggi Badan (Cm)	n	(%)
60-70	2	5,0
71-80	8	20,0
81-90	11	27,5
91-100	11	27,5
101-110	8	20,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 6 diatas, diketahui bahwa anak dengan tinggi badan antara 60-70 cm sebanyak 2 anak (5,0%), tinggi badan antara 71-80 cm sebanyak 8 anak (20,0%), tinggi badan antara 81-90 cm sebanyak 11 anak (27,5%), tinggi badan antara 91-100 cm sebanyak 11 anak (27,5%) dan tinggi badan antara 101-110 cm sebanyak 8 anak (20,0%). Jadi tinggi badan yang paling banyak berada pada kelas interval 81-90 cm dan 91-100 cm dengan jumlah anak yang sama yaitu 11 anak (27,5%) dan yang paling sedikit berada pada kelas interval 60-70 yaitu 2 anak (5,0%).

2) Deskripsi Variabel Yang diteliti

a. Pendapatan responden

Tabel 7.
Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Keluarga
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Pendapatan	n	%
Cukup	15	37,5
Kurang	25	62,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai pendapatan yang cukup sebanyak 15 orang (37,5%) dan responden yang mempunyai pendapatan yang kurang sebanyak 25 orang (62,5%).

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 8.
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Tingkat Pendidikan	n	%
Tinggi	9	22,5
Rendah	31	77,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 8 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi sebanyak 9 orang (22,5%) dan yang mempunyai tingkat pendidikan rendah sebanyak 31 orang (77,5%).

c. Tingkat pengetahuan ibu

Tabel 9.
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Ibu
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Tingkat Pengetahuan	n	%
Baik	4	10,0
Kurang	36	90,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 9 diatas, Dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 4 orang (10,0%) dan responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 36 orang (90,0%).

d. Tingkat Konsumsi Energi

Tabel 10.
Distribusi Sampel Berdasarkan Tingkat Asupan Energi
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Tingkat asupan energi	n	%
Cukup	21	52,5
Kurang	19	47,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 10 diatas, diketahui bahwa sampel yang asupan energinya cukup (80 - 100% AKG) sebanyak 21 anak (52,5 %), dan sampel yang asupan energinya kurang (< 80% AKG) sebanyak 19 anak (47,5 %).

e. Tingkat Konsumsi Protein

Tabel 11.
Distribusi Sampel Berdasarkan Tingkat Asupan Protein
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Tingkat asupan energy	n	%
Cukup	21	52,5
Kurang	19	47,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 11 diatas, diketahui bahwa sampel yang asupan proteinnya baik (80 - 100% AKG) sebanyak 21 anak (52,5 %) dan sampel yang asupan proteinnya kurang (< 80 % AKG) sebanyak 19 anak (47,5%).

f. Penyakit Infeksi

Tabel 12.
Distribusi Sampel Berdasarkan Penyakit Infeksi
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Penyakit Infeksi	n	%
Menderita	29	72,5
Tidak menderita	11	27,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 8 diatas, diketahui bahwa sampel yang menderita penyakit infeksi sebanyak 29 anak (72,5%), sedangkan sampel yang tidak menderita penyakit infeksi sebanyak 11 anak (27,5%).

Penyakit infeksi yang dimaksud yaitu infeksi saluran pencernaan dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Tabel 12.a
Distribusi Sampel Berdasarkan Penyakit Infeksi ISPA
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

ISPA	n	%
Ya	23	57,5
Tidak	17	42,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 8a diatas, diketahui bahwa dari 40 sampel terdapat 23 anak (57,5%) yang menderita ISPA sedangkan yang tidak menderita ISPA sebanyak 17 anak (42,5%).

Tabel 12.b
Distribusi Sampel Berdasarkan Penyakit Infeksi Diare
di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
Tahun 2013

Diare	n	%
Ya	7	17,5
Tidak	33	82,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 8a diatas, diketahui bahwa dari 40 sampel terdapat 7 anak (17,5%) yang menderita diare sedangkan yang tidak menderita diare sebanyak 33 anak (82,5%).

g. Status Gizi Anak Balita

1) Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Tabel 13.
Distribusi Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Indeks Antropometri BB/U di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Status Gizi BB/U	n	%
Gizi buruk	2	5,0
Gizi kurang	4	10,0
Gizi baik	32	80,0
Gizi lebih	2	5,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan Tabel 13 diatas menunjukkan bahwa dari 40 sampel, status gizi anak balita menurut BB/U dengan menggunakan indicator WHO-NCHS diperoleh anak balita yang berstatus gizi buruk sebanyak 2 anak (5,0%), yang berstatus gizi kurang sebanyak 4 anak (10,0%), yang berstatus gizi baik sebanyak 32 anak (80,0%), dan yang berstatus gizi lebih sebanyak 2 anak (5,0%).

2) **Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)**

Tabel 14.
Distribusi Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Indeks Antropometri TB/U di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Status Gizi TB/U	n	%
Sangat pendek	2	5,0
Pendek	10	25,0
Normal	26	65,0
Tinggi	2	5,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan Tabel 14 diatas menunjukkan bahwa dari 40 sampel, status gizi anak balita menurut TB/U dengan menggunakan indicator WHO-NCHS diperoleh anak balita berstatus sangat pendek sebanyak 2 anak (5,0%), yang berstatus pendek sebanyak 10 anak (25,0%), yang berstatus normal sebanyak 26 anak (65,0%), dan yang berstatus tinggi sebanyak 2 anak (5,0%).

3) **Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)**

Tabel 15.
Distribusi Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Indeks Antropometri BB/TB di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Status Gizi BB/TB	n	%
Sangat kurus	2	5,0
Kurus	3	7,5
Normal	34	85,0
Gemuk	1	2,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan Tabel 15 diatas menunjukkan bahwa dari 40 sampel, status gizi anak menurut BB/TB dengan menggunakan indicator WHO-NCHS diperoleh anak balita yang berstatus sangat kurus sebanyak 2 anak (5,0%), yang berstatus kurus sebanyak 3 anak (7,5%), yang berstatus normal sebanyak 34 anak (85,0%), dan yang berstatus tinggi sebanyak 1 anak (2,5%).

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Pendapatan Keluarga dengan Status Gizi Anak Balita

1) Pendapatan Keluarga dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Tabel 16.
Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Pendapatan keluarga	Status gizi BB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	13	86,7	2	13,3	15	100	0,686
Kurang	19	76,0	6	24,0	25	100	
Total	32	80,0	8	20,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 16 diatas menunjukkan bahwa dari 40 anak yang keluarganya memiliki pendapatan keluarga yang cukup terdapat 13 anak (86,7%) yang memiliki status gizi normal dan 2 anak (13,3%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan pada keluarga yang memiliki

pendapatan kurang terdapat 19 anak (76,0%) yang memiliki status gizi normal dan 8 anak (20,0%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,686$ karena nilai $p > 0,05$ ($0,686 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut umur.

2) Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

Tabel 17.
Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan TB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Pendapatan keluarga	Status gizi TB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	10	66,7	5	33,3	15	100	0,864
Kurang	16	64,0	9	36,0	25	100	
Total	26	65,0	14	35,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 17 diatas menunjukkan bahwa dari 40 anak yang keluarganya memiliki pendapatan keluarga yang cukup terdapat 10 anak (66,7%) yang memiliki status gizi normal dan 5 anak (33,3%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan pada keluarga yang memiliki pendapatan kurang terdapat 16 anak (64,0%) yang memiliki status gizi normal dan 9 anak (36,0%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,864$ karena nilai $p > 0,05$ ($0,864 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita berdasarkan tinggi badan menurut umur.

3) Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Tabel 18.
Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/TB Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Pendapatan keluarga	Status gizi BB/TB				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	13	86,7	2	13,3	15	100	1,000
Kurang	21	84,0	4	16,0	25	100	
Total	34	85,0	6	15,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 18 diatas menunjukkan bahwa dari 40 anak yang keluarganya memiliki pendapatan keluarga yang cukup terdapat 13 anak (86,7%) yang memiliki status gizi normal dan 2 anak (13,3%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan pada keluarga yang memiliki pendapatan kurang terdapat 21 anak (84,0%) yang memiliki status gizi normal dan 4 anak (16,0%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 1,000$ karena nilai $p > 0,05$ ($1,000 > 0,05$) maka

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut tinggi badan.

b. Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Status Gizi Anak Balita

1) Tingkat Pendidikan Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Tabel 19.
Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat Pendidikan	Status gizi BB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Tinggi	7	77,8	2	22,2	9	100	1,000
Rendah	25	80,6	6	19,4	31	100	
Total	32	80,0	8	20,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 19 diatas menunjukkan bahwa dari 40 anak balita yang memiliki ibu dengan tingkat pendidikan tinggi terdapat 7 anak (77,8%) yang memiliki status gizi normal dan 2 anak (22,2%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memilki ibu dengan tingkat pendidikan rendah terdapat 25 anak (80,6%) yang memiliki status gizi normal dan 6 anak (19,4%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 1,000$ karena nilai $p > 0,05$ ($1,000 > 0,05$)

maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut umur.

2) Tingkat Pendidikan Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

Tabel 20.
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan status gizi anak balita berdasarkan TB/U di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat Pendidikan	Status gizi TB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Tinggi	7	77,8	2	22,2	9	100	0,453
Rendah	19	61,3	12	38,7	31	100	
Total	26	65,0	14	35,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 20 diatas menunjukkan bahwa dari 40 anak balita, yang memiliki ibu dengan tingkat pendidikan tinggi terdapat 7 anak (77,8%) yang memiliki status gizi normal dan 2 anak (22,2%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memilki ibu dengan tingkat pendidikan rendah terdapat 19 anak (61,3%) yang memiliki status gizi normal dan 12 anak (38,7%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,483$ karena nilai $p > 0,05$ ($0,483 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan status gizi anak balita berdasarkan tinggi badan menurut umur.

3) **Tingkat Pendidikan Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)**

Tabel 21.
Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/TB Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat Pendidikan	Status gizi BB/TB				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Tinggi	6	66,7	3	33,3	9	100	0,115
Rendah	28	90,3	3	9,7	31	100	
Total	34	85,0	6	15,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 21 diatas menunjukkan bahwa dari 40 anak balita, yang memiliki ibu dengan tingkat pendidikan tinggi terdapat 6 anak (66,7%) yang memiliki status gizi normal dan 3 anak (33,3%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memiliki ibu dengan tingkat pendidikan rendah terdapat 28 anak (90,3%) yang memiliki status gizi normal dan 3 anak (9,7%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai p = 0,115 karena nilai p > 0,05 (0,115 > 0,05) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut tinggi badan.

c. Hubungan Tingkat Pengetahuan Gizi Dengan Status Gizi Anak Balita

1) Tingkat Pengetahuan Gizi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Tabel 22.
Hubungan Tingkat Pengetahuan Gizi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat pengetahuan	Status gizi BB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Baik	3	75,0	1	25,0	4	100	1,000
Kurang	29	80,6	7	19,4	36	100	
Total	32	80,0	8	20,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 22 diatas menunjukkan bahwa dari 40 anak balita, yang memiliki ibu dengan tingkat pengetahuan baik terdapat 3 anak (75,0%) yang memiliki status gizi normal dan 1 anak (225,0%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memilki ibu dengan tingkat pengetahuan kurang terdapat 29 anak (80,6%) yang memiliki status gizi normal dan 7 anak (19,4%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 1,000$ karena nilai $p > 0,05$ ($1,000 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pengetahuan dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut umur.

2) **Tingkat Pengetahuan Gizi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)**

Tabel 23.
Hubungan Tingkat Pengetahuan Gizi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan TB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat pengetahuan	Status gizi TB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Baik	3	75,0	1	25,0	4	100	1,000
Kurang	23	63,9	13	36,1	36	100	
Total	26	65,0	14	35,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 23 diatas menunjukkan bahwa dari 40 anak balita, yang memiliki ibu dengan tingkat pengetahuan baik terdapat 3 anak (75,0%) yang memiliki status gizi normal dan 1 anak (25,0%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memiliki ibu dengan tingkat pengetahuan kurang terdapat 23 anak (63,9%) yang memiliki status gizi normal dan 13 anak (36,1%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 1,000$ karena nilai $p > 0,05$ ($1,000 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pengetahuan dengan status gizi anak balita berdasarkan tinggi badan menurut umur.

3) **Tingkat Pengetahuan Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)**

Tabel 24.
Hubungan Tingkat Pengetahuan Gizi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/TB Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat pengetahuan	Status gizi BB/TB				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Baik	3	75,0	1	25,0	4	100	0,493
Kurang	31	86,1	5	13,9	36	100	
Total	34	85,0	6	15,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 24 diatas menunjukkan bahwa dari 40 anak balita, yang memiliki ibu dengan tingkat pengetahuan baik terdapat 3 anak (75,0%) yang memiliki status gizi normal dan 1 anak (25,0%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memiliki ibu dengan tingkat pengetahuan kurang terdapat 31 anak (86,1%) yang memiliki status gizi normal dan 5 anak (13,9%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,493$ karena nilai $p > 0,05$ ($0,493 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pengetahuan dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut tinggi badan.

d. Hubungan Tingkat Asupan Energi Dengan Status Gizi Anak Balita

1) Tingkat Asupan Energi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Tabel 25.
Hubungan Tingkat Asupan Energi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat asupan energi	Status gizi BB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	15	71,4	6	28,6	21	100	0,241
Kurang	17	89,5	2	10,5	19	100	
Total	32	80,0	8	26,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 25 diatas menunjukkan bahwa anak balita yang memiliki tingkat asupan energy yang cukup terdapat 15 anak (71,4%) yang memiliki status gizi normal dan 6 anak (28,6%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memilki tingkat asupan energy kurang terdapat 17 anak (89,5%) yang memiliki status gizi normal dan 2 anak (10,5%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,241$ karena nilai $p > 0,05$ ($0,241 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat asupan energi dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut umur.

2) **Tingkat Asupan Energi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)**

Tabel 26.
Hubungan Tingkat Asupan Energi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan TB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat asupan energi	Status gizi TB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	13	61,9	8	38,1	21	100	0,666
Kurang	13	68,4	6	31,6	19	100	
Total	26	65,0	14	35,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 26 diatas menunjukkan bahwa anak balita yang memiliki tingkat asupan energy yang cukup terdapat 13 anak (61,9%) yang memiliki status gizi normal dan 8 anak (38,1%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memilki tingkat asupan energy kurang terdapat 13 anak (68,4%) yang memiliki status gizi normal dan 6 anak (31,6%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,666$ karena nilai $p > 0,05$ ($0,666 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat asupan energi dengan status gizi anak balita berdasarkan tinggi badan menurut umur.

3) **Tingkat Asupan Energi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan(BB/TB)**

Tabel 27.
Hubungan Tingkat Asupan Energi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/TB Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat asupan energi	Status gizi BB/TB				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	15	71,4	6	28,6	21	100	0,02
Kurang	19	100	0	0	19	100	
Total	34	85,0	6	15,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 27 diatas menunjukkan bahwa anak balita yang memiliki tingkat asupan energy yang cukup terdapat 15 anak (71,4%) yang memiliki status gizi normal dan 6 anak (28,6%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memiliki tingkat asupan energy kurang terdapat 19 anak (100%) yang memiliki status gizi normal dan tidak ada anak yang berstatus gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,02$ karena nilai $p < 0,05$ ($0,02 < 0,05$) maka disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat asupan energi dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut tinggi badan.

e. Hubungan Tingkat Asupan Protein Dengan Status Gizi Anak Balita

1) Tingkat Asupan Protein Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Tabel 28.
Hubungan Tingkat Asupan Protein Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat asupan protein	Status gizi BB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	15	71,4	6	28,6	21	100	0,241
Kurang	17	89,5	2	10,5	19	100	
Total	32	80,0	8	26,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 28 diatas menunjukkan bahwa anak balita yang memiliki tingkat asupan protein yang cukup terdapat 15 anak (71,4%) yang memiliki status gizi normal dan 6 anak (28,6%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memiliki tingkat asupan protein kurang terdapat 17 anak (89,5%) yang memiliki status gizi normal dan 2 anak (10,5%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai p = 0,241 karena nilai p > 0,05 (0,241 > 0,05) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut umur.

2) **Tingkat Asupan Protein Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)**

Tabel 29.
Hubungan Tingkat Asupan Protein Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan TB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat asupan protein	Status gizi TB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	13	61,9	8	38,1	21	100	0,666
Kurang	13	68,4	6	31,6	19	100	
Total	26	65,0	14	35,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 29 diatas menunjukkan bahwa anak balita yang memiliki tingkat asupan protein yang cukup terdapat 13 anak (61,9%) yang memiliki status gizi normal dan 8 anak (38,1%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memiliki tingkat asupan protein kurang terdapat 13 anak (68,4%) yang memiliki status gizi normal dan 6 anak (31,6%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,666$ karena nilai $p > 0,05$ ($0,666 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita berdasarkan tinggi badan menurut umur.

3) **Tingkat Asupan Protein Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)**

Tabel 30.
Hubungan Tingkat Asupan Protein Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/TB Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Tingkat asupan protein	Status gizi BB/TB				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Cukup	15	71,4	6	28,6	21	100	0,02
Kurang	19	100	0	0	19	100	
Total	34	85,0	6	15,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 30 diatas menunjukkan bahwa anak balita yang memiliki tingkat asupan protein yang cukup terdapat 15 anak (71,4%) yang memiliki status gizi normal dan 6 anak (28,6%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang memiliki tingkat asupan protein kurang terdapat 19 anak (100%) yang memiliki status gizi normal .

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,02$ karena nilai $p < 0,05$ ($0,02 < 0,05$) maka disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut tinggi badan.

f. Hubungan Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Anak Balita

1) Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Tabel 31.
Hubungan Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Penyakit infeksi	Status gizi BB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Menderita	22	75,9	7	24,1	29	100	0,405
Tidak menderita	10	90,9	1	9,1	11	100	
Total	32	80,0	8	20,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 31 diatas menunjukkan bahwa anak balita yang menderita penyakit infeksi terdapat 22 anak (75,9%) yang memiliki status gizi normal dan 7 anak (24,1%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang tidak menderita penyakit infeksi terdapat 10 anak (90,9%) yang memiliki status gizi normal dan 1 anak (9,1%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,405$ karena nilai $p > 0,05$ ($0,405 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut umur.

2) Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

Tabel 32.
Hubungan Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan TB/U Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Penyakit infeksi	Status gizi TB/U				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Menderita	18	62,1	11	37,9	29	100	0,315
Tidak menderita	8	72,7	3	27,3	11	100	
Total	26	65,0	14	35,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 32 diatas menunjukkan bahwa anak balita yang menderita penyakit infeksi terdapat 18 anak (62,1%) yang memiliki status gizi normal dan 11 anak (37,9%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang tidak menderita penyakit infeksi terdapat 8 anak (72,7%) yang memiliki status gizi normal dan 3 anak (27,3%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 0,315$ karena nilai $p > 0,05$ ($0,315 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita berdasarkan tinggi badan menurut umur.

3) Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Tabel 33.
Hubungan Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Anak Balita Berdasarkan BB/TB Di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Penyakit infeksi	Status gizi BB/TB				Jumlah		P
	Normal		Tidak normal		n	%	
	n	%	n	%			
Menderita	24	82,8	5	17,2	29	100	1,000
Tidak menderita	10	90,9	1	9,1	11	100	
	34	85,0	6	15,0	40	100	

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 33 diatas menunjukkan bahwa anak balita yang menderita penyakit infeksi terdapat 24 anak (82,8%) yang memiliki status gizi normal dan 5 anak (17,2%) yang memiliki status gizi tidak normal. Sedangkan anak yang tidak menderita penyakit infeksi terdapat 10 anak (90,9%) yang memiliki status gizi normal dan 1 anak (9,1%) yang memiliki status gizi tidak normal.

Dari hasil uji statistic chi-square dengan tingkat kemaknaan = 0,05, diperoleh nilai $p = 1,000$ karena nilai $p > 0,05$ ($1,000 > 0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita berdasarkan berat badan menurut tinggi badan.

C. PEMBAHASAN

Menurut Soekirman (2000) status gizi adalah keadaan kesehatan akibat interaksi antara makanan, tubuh manusia dan lingkungan hidup manusia. Selain itu status gizi merupakan keadaan kesehatan individu-individu yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energy dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri (Suhardjo,2003).

Pertumbuhan seorang anak bukan hanya sekedar gambaran perubahan ukuran tubuh, tetapi lebih dari itu memberikan gambaran tentang keseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi (status gizi). Oleh karena itu pertumbuhan merupakan indikator yang baik dari perkembangan status gizi anak.

Jika keseimbangan akan kebutuhan terganggu, misalnya pengeluaran energy dan protein lebih banyak dibandingkan pemasukan maka akan terjadi kekurangan energy protein , dan jika berlangsung lama akan timbul masalah yang dikenal KEP berat atau gizi buruk (Depkes RI, 2000).

Status gizi dipengaruhi oleh asupan makanan dan penggunaan zat gizi di dalam tubuh. Bila tubuh memperoleh cukup zat gizi dan digunakan secara efisien maka akan tercapai status gizi optimal.

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا
الرَّحْمَنُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ

أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

{ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ }

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy telah mengabarkan kepada saya Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah subhanahu wata'ala QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: ('Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus")”.

Berdasarkan hadist tersebut, bahwa anak lahir dalam keadaan firah (berpotensi baik). Orang tua adalah pihak yang sejak awal paling dekat dan berpengaruh langsung pada anak. Jika orang tua tidak memberikan perawatan dan perhatian yang tepat sejak usia dini maka tumbuhlah jasmani dan rohani yang tidak sehat. Sebaliknya, jika orang tua memberikan perhatian yang baik maka jasmani dan rohaninya pun akan sehat.

Untuk itu, seorang ibu perlu memperhatikan anak-anaknya baik untuk perawatan maupun untuk kebutuhan tubuh akan zat-zat gizinya.

Selain factor asupan makanan, factor social ekonomi, pendidikan, pengetahuan, dan penyakit infeksi pun merupakan factor yang menentukan status gizi

anak balita. Berikut ini hasil pembahasan penelitian status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013.

1. Hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013.

Tingkat pendapatan akan menentukan makanan apa yang akan dibeli oleh keluarga. Orang miskin biasanya akan membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk makanan. Rendahnya pendapatan merupakan rintangan yang menyebabkan orang-orang tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang dibutuhkan. Adapula keluarga yang sebenarnya mempunyai penghasilan cukup namun sebagian anaknya berstatus kurang gizi (sajogyo, 1994).

Anak-anak yang tumbuh dalam suatu keluarga miskin paling rentan terhadap kurang gizi (suhardjo, 2003).

Uji chi-square yang dilakukan pada tingkat pendapatan keluarga terhadap status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 0,686$ (BB/U), nilai $p = 0,864$ (TB/U) dan $p = 1,000$ (BB/TB). Karena nilai $p > 0,05$ baik dilihat berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dan status gizi anak balita tidak berhubungan karena antara keluarga yang berpendapatan cukup dan kurang tidak membuktikan hubungan yang signifikan antara yang berstatus gizi

normal dan tidak normal. Anak yang memiliki keluarga yang berpendapatan cukup dan kurang sama-sama memiliki lebih banyak berstatus gizi yang normal di bandingkan yang tidak normal dengan demikian keluarga yang berpendapatan cukup dan kurang sama saja dan tidak berhubungan dengan status gizi anak balita pada penelitian ini. Walaupun keluarga berpendapatan kurang, akan tetapi juga memiliki anak balita dengan status gizi normal, hal ini disebabkan karena berdasarkan dilapangan sifat kekeluargaan masih sangat kental sehingga masyarakat masih saling membantu, selain itu rata-rata orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut tidak membeli ikan karena hasil tangkapan sendiri, sehingga asupan protein anak masih tetap terpenuhi, jadi walaupun keluarga yang tingkat pendapatannya kurang, masih tetap memiliki anak balita yang berstatus gizi normal.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sejalan dengan pendapat (Achmad Djaeni Sediaoetama , 2008) yang menyatakan bahwa antara penghasilan dan gizi, jelas ada hubungan yang menguntungkan. Pengaruh peningkatan penghasilan terhadap perbaikan kesehatan dan kondisi keluarga lain yang mengadakan interaksi dengan status gizi yang berlawanan hamper universal. Ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan perbaikan taraf ekonomi maka tingkat gizi pendukung akan meningkat. Namun ahli gizi dapat menerima dengan catatan, bila hanya factor ekonomi saja yang merupakan penentu status gizi, kenyataannya masalah gizi bersifat multikompleks karena tidak hanya factor ekonomi yang berperan tetapi banyak factor lain yang ikut menentukan.

2. Hubungan tingkat pendidikan dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam kesehatan terutama dalam pola asuh anak dan alokasi sumber zat gizi. Rendahnya tingkat pendidikan ibu menyebabkan berbagai keterbatasan dalam menangani masalah gizi dan keluarga serta anak balitanya (St. Rahmah 2010, dalam Slope).

Peranan orang tua, khususnya ibu dalam menyediakan dan menyajikan makanan yang bergizi bagi keluarga, khususnya anak menjadi sangat penting. Kualitas pelayanan ibu dalam keluarga ditentukan oleh penguasaan informasi dan factor ketersediaan waktu yang memadai. Kedua factor tersebut merupakan factor determinan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, interaksi social dan pekerjaan (soekirman, 2000).

Uji chi-square yang dilakukan pada tingkat pendidikan ibu terhadap status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 1,000$ (BB/U), nilai $p = 0,453$ (TB/U) dan nilai $p = 0,115$ (BB/TB). Karena nilai $p > 0,05$ berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pendidikan gizi ibu dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, karena antara ibu yang berpendidikan tinggi dan rendah tidak ada bedanya sebab ibu yang berpendidikan rendah juga mempunyai

lebih banyak anak yang berstatus gizi normal dibandingkan anak yang berstatus gizi tidak normal, begitupun juga yang berpendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena berdasarkan penelitian atau yang terjadi dilapangan, walaupun ibu berpendidikan rendah, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dan pengaruh dari media elektronik misalnya televisi, secara tidak langsung para ibu belajar dari media tersebut dan memperoleh informasi-informasi yang dapat berpengaruh terhadap keluarganya, misalnya makanan-makanan yang baik untuk anak-anak.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sejalan dengan pendapat (Suhardjo, 2003) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh. Dari kepentingan gizi keluarga, pendidikan diperlukan agar seseorang lebih tanggap terhadap adanya masalah gizi didalam keluarga dan bias mengambil tindakan secepatnya.

3. Hubungan tingkat pengetahuan gizi dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla.

Rendahnya pengetahuan ibu merupakan faktor penting karena mempengaruhi kemampuan ibu dalam mengelola sumber pangan yang ada untuk mendapatkan kecukupan bahan makanan. Pengetahuan tentang kandungan zat gizi dalam berbagai bahan makanan, kegunaan makanan bagi kesehatan keluarga dapat membantu ibu memilih bahan makanan yang berharga tidak begitu mahal akan tetapi nilai gizinya tinggi (Sjahmien Moehji, 2002).

Uji chi-square yang dilakukan pada tingkat pengetahuan gizi terhadap status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 1,000$ (BB/U), nilai $p = 1,000$ (TB/U), dan nilai $p = 0,493$ (BB/TB). Karena nilai $p > 0,05$ baik dilihat dari BB/U, TB/U dan BB/TB maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pengetahuan dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi anak balita Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, karena ibu yang memiliki tingkat pengetahuan kurang juga mempunyai anak yang berstatus gizi normal lebih banyak dibandingkan yang tidak normal, bahkan lebih banyak dibandingkan yang berpengetahuan baik. Hal ini disebabkan oleh para ibu memang kurang akan pengetahuan gizinya secara teori, akan tetapi para ibu memperoleh pengetahuan tentang makanan yang baik dari pengalaman atau dari luar, walaupun ia tidak mengetahui secara detail kandungan tiap makanan yang disediakan pada anak dan keluarganya. Selain itu, ketersediaan makanan juga mendukung, karena banyaknya ikan dan biasanya ikan tidak dibeli melainkan diberikan oleh orang-orang yang mempunyai tempat pemeliharaan ikan (empang) ataupun dari hasil sendiri.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sejalan dengan pendapat (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000) yang menyatakan bahwa pengetahuan gizi yang baik akan menyebabkan seseorang mampu menyusun menu yang baik untuk dikonsumsi.

Semakin banyak pengetahuan gizi seseorang maka ia akan semakin memperhitungkan jenis dan jumlah makanan yang diperolehnya untuk dikonsumsi.

4. Hubungan tingkat asupan energy dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan merupakan sumber energy untuk menunjang semua kegiatan atau aktivitas manusia. Energy dalam tubuh manusia dapat timbul dikarenakan adanya pembakaran karbohidrat, protein dan lemak (Suhardjo, 2003).

Dalam usaha menciptakan manusia-manusia sehat pertumbuhannya, penuh semangat dan penuh kegairahan dalam bekerja, serta tinggi daya cipta dan kreatifitasnya, maka sejak anak-anak harus dipersiapkan. Untuk itu energy harus benar-benar diperhatikan, tetap selalu berada dalam serba kecukupan (G. Kartasapoetra dan Narsetyo, 2001).

Untuk kebutuhan tubuh anak balita sumber energy dipergunakan dalam pembangunan jaringan tubuh. Banyak sedikitnya energy yang dibutuhkan seseorang tergantung dari umur, berat badan, jenis kegiatan, jenis kelamin dan kesehatan tubuh.

Uji chi-square yang dilakukan pada tingkat asupan energy dengan status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 0,241$ (BB/U), nilai $p = 0,666$ (TB/U) dan nilai $p = 0,02$ (BB/TB). Karena nilai $p > 0,05$ dilihat berdasarkan BB/U dan TB/U maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat asupan energi dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, sedangkan nilai $p <$

0,05 berdasarkan BB/TB, maka disimpulkan ada hubungan tingkat asupan energy dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak balita yang memiliki tingkat asupan energy yang cukup sebanyak 15 anak yang memiliki status gizi normal dan 6 anak yang memiliki status gizi tidak normal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa anak yang memiliki asupan energy cukup berpeluang besar untuk memiliki status gizi yang normal, sedangkan 5 anak yang memiliki status gizi tidak normal akan tetapi asupan energinya cukup, hal ini disebabkan oleh banyak factor, salah satunya adanya suatu penyakit yang diderita oleh anak sehingga menyebabkan status gizinya tidak normal serta adanya pengaruh sosial. Selain itu anak yang memiliki asupan energy kurang sebanyak 19 anak yang berstatus gizi normal dan tidak ada anak yang memiliki status gizi tidak normal. Berdasarkan hal tersebut, asupan energy yang kurang lebih banyak terjadi pada anak berstatus gizi normal, hal ini disebabkan oleh banyak factor, salah satunya dari orang tua atau keluarga, selain itu dari individu itu sendiri juga berpengaruh. Anak yang memiliki tingkat ketahanan tubuh yang baik yang disebabkan oleh asupan makanan sewaktu ia kecil juga berpengaruh sehingga status gizinya tidak mudah terganggu. Ibu juga harus pintar-pintar dalam menyediakan makanan terhadap anaknya harus memperhatikan tidak hanya dari segi rasa, akan tetapi dari zat gizi yang dikandung makanan tersebut sehingga dapat mencukupi asupan makanan yang dibutuhkan utamanya asupan energy.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat (G. Kartasapoetra dan Narsetyo, 2001) berpendapat bahwa dalam usaha menciptakan manusia-manusia yang sehat pertumbuhannya, penuh semangat serta tinggi daya cipta dan kreatifitasnya, maka sejak anak-anak harus dipersiapkan. Untuk itu energy harus benar-benar diperhatikan.

5. Hubungan tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Dalam proses pencernaan, protein akan dipecah menjadi satuan-satuan dasar kimia, kemudian diserap dan dibawa oleh aliran darah keseluruh tubuh, dimana sel-sel jaringan mempunyai kemampuan untuk mengambil asam amino yang diperlukan untuk kebutuhan membangun dan memelihara kesehatan jaringan.

Berdasarkan sumbernya, protein ada 2 yaitu protein hewani contohnya daging, telur ikan dan lain-lain, sedangkan protein nabati contohnya dari biji-bijian, kacang-kacangan dan lain-lain.

Protein sebagai zat pembangun, yaitu merupakan bahan pembangun jaringan baru. Dengan demikian protein amatlah penting bagi semua taraf kehidupan, mulai dari anak-anak, remaja yang sedang tumbuh, juga pada masa hamil dan menyusui pada wanita dewasa, orang yang sakit dan dalam taraf penyembuhan demikian juga orang dewasa dan lanjut usia.

Uji chi-square yang dilakukan pada tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 0,241$ (BB/U), nilai $p = 0,666$ (TB/U) dan nilai $p = 0,02$ (BB/TB). Karena nilai p

< 0,05 berdasarkan BB/TB, maka disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, sedangkan nilai $p > 0,05$ dilihat berdasarkan BB/U dan TB/U maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak balita yang memiliki asupan protein cukup sebanyak 15 anak yang berstatus gizi normal dan 6 anak yang berstatus gizi tidak normal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa anak yang memiliki asupan protein cukup juga memiliki status gizi yang normal, sedangkan 6 anak yang memiliki status gizi tidak normal akan tetapi asupan proteinnya cukup, hal ini disebabkan oleh banyak factor, salah satunya adanya suatu penyakit yang diderita oleh anak sehingga menyebabkan status gizinya tidak normal serta proses penyerapan protein terganggu serta pengaturan konsumsi yang tidak terkontrol. Selain itu anak yang memiliki asupan protein kurang sebanyak 19 anak yang berstatus gizi normal dan tidak ada anak yang memiliki status gizi tidak normal. Berdasarkan hal tersebut, asupan protein yang kurang lebih banyak terjadi pada anak berstatus gizi normal disebabkan juga oleh banyak factor, salah satunya dari orang tua atau keluarga. Anak balita yang bertempat tinggal didesa tersebut, memang lebih berpeluang besar untuk memiliki status gizi normal, karena pengaruh dari asupan makanan yang dikonsumsi tiap hari yang kaya akan protein hewani yakni ikan, sehingga walaupun asupan proteinnya kurang sewaktu melakukan recall, akan tetapi pengaruh dari daya tahan

tubuhnya, dan pengaruh makanannya yang dikonsumsi tiap hari. Sehingga seorang Ibu harus memperhatikan makanan anaknya, karena jangan sampai makanan yang dimakan kurang akan protein sehingga nantinya akan mempengaruhi status gizinya dari normal menjadi tidak normal.

Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (St. Rahma, 2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan tingkat konsumsi protein dengan status gizi anak 1-3 tahun di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Selain itu pendapat dari (Suhardjo, 2003) juga sejalan yang menyatakan bahwa status gizi atau tingkat konsumsi pangan merupakan bagian terpenting dari status kesehatan seseorang.

Hal ini juga membuktikan bahwa keluarga yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai akan mempengaruhi asupan protein seseorang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa keluarga yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai asupan proteinnya pasti tercukupi dengan baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga yang bertempat di wilayah pesisir pantai asupan proteinnya tidak tercukupi.

6. Hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di desa tosewo kecamatan takkalalla kabupaten wajo.

Penyakit infeksi dapat bertindak sebagai pemula terjadinya kurang gizi sebagai akibat menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit. Masa bayi dan balita sangat rentan terhadap penyakit. Jaringan tubuh pada bayi dan balita belum

sempurna dalam upaya membentuk pertahanan tubuh seperti halnya orang dewasa. Umumnya penyakit yang menyerang anak bersifat akut artinya penyakit menyerang secara mendadak dan gejala timbul dengan cepat.

Infeksi bisa berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara yaitu mempengaruhi nafsu makan sehingga kebutuhan zat gizinya tidak terpenuhi. Secara umum defisiensi zat gizi sering merupakan awal dari gangguan defisiensi system kekebalan.

Uji chi-square yang dilakukan pada penyakit infeksi dengan status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 0,405$ (BB/U), nilai $p = 0,315$ (TB/U) dan nilai $p = 1,000$ (BB/TB). Karena nilai $p > 0,05$ baik dilihat berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo karena tidak hanya yang berstatus gizi tidak normal yang menderita penyakit infeksi, tetapi yang berstatus gizi normal juga yang menderita penyakit infeksi, bahkan berdasarkan hasil penelitian, rata-rata anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo menderita penyakit infeksi, walaupun penyakit infeksi yang diderita tiap anak berbeda. Berdasarkan dilapangan, penyakit infeksi, banyak diderita oleh para anak balita baik yang berstatus gizi normal maupun yang tidak normal disebabkan oleh

pada saat itu merupakan peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan di daerah tersebut sehingga banyaknya anak balita yang terkena penyakit infeksi misalkan batuk, demam dan diare, karena pada saat itu anak balita sangat rentan terkena penyakit infeksi.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan pendapat (I Nyoman Supriasa, 2002) yang menyatakan bahwa Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal balik dan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi dan keadaan gizi yang kurang dapat mempermudah seseorang terkena penyakit infeksi.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/U, TB/U dan BB/TB di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013.
2. Tidak ada hubungan tingkat pendidikan berdasarkan indeks antropometri BB/U, TB/U dan BB/TB di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013.
3. Tidak ada hubungan tingkat pengetahuan gizi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/U, TB/U, dan BB/TB di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013.
4. Ada hubungan tingkat asupan energy dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/TB dan tidak ada hubungan tingkat asupan energi berdasarkan indeks antropometri BB/U dan TB/U di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013.
5. Ada hubungan tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/TB dan tidak ada hubungan tingkat asupan protein berdasarkan indeks antropometri BB/U dan TB/U di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013.

6. Tidak ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/U, TB/U dan BB/TB di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

B. Saran

1. Para ibu hendaknya lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya sehingga para anak balita dapat terhindar dari masalah-masalah gizi yang tidak diharapkan.
2. Para ibu perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi keluarganya setiap hari bukan hanya sekedar makan saja tapi juga harus lebih memperhatikan kandungan gizinya sehingga kebutuhan energy dan proteinnya dapat terpenuhi dan dapat memperbaiki status gizi anak mereka.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Formulir Recall 24 jam
3. Master Tabel Penelitian
4. Hasil Analisis data
5. Surat Izin Penelitian Dari Dekan FIK UIN
6. Surat Izin Penelitian Dari Balitbang
7. Surat izin penelitian dari Kantor Daerah Kota Sengkang Kabupaten Wajo
8. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Setempat
9. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Camat Setempat
10. Dokumentasi penelitian
11. Riwayat Hidup



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni,Reni. 2013. *Pengklasifikasian status gizi balita berdasarkan indeks antropometri (BB/U) menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation*. Fakultas ilmu komputer dan teknologi informasi universitas gunadarma : jurnal ilmiah tanggal akses 11-2-2013 : 11.31
- Atmarita, Soendoro, T. Jahari, BA. Trihono. & Tilden R. 2009. *Kejadian masalah balita pendek bersamaan dengan kegemukan merupakan ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak diindonesia*. Persagi : jurnal ilmiah persagi.org/index.php?hal=8&jmlp=13.
- BPS. *Indikator kesejahteraan rakyat 1998*. 1999. Jakarta : BPS.
- Depag R.I. 2010. *Alquran dan tafsirNya (edisi yang disempurnakan)*. Jakarta: Penerbit Lentera abadi.
- Departemen gizi dan kesehatan masyarakat fkm UI. 2007. *Gizi dan kesehatan masyarakat*. Jakarta : pt. Raja grafindo persada.
- Depkes RI. 2000. *Gizi dan kesehatan saluran pencernaan pada bayi dan anak*. Jakarta : Nestle Nutrilon. Depkes RI. *Pedoman gizi seimbang*. Jakarta : Dirjen kesmas. 2004.
- Dinas kesehatan kabupaten wajo. 2013. *Profil kesehatan tahun 2007 Kab.Wajo*. Wajo.
- Dinkes. 2012. *Status gizi balita di Sulawesi selatan*. Makassar: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
- G. Kartasapoetra. Narsetyo. 2001. *Ilmu gizi*. Jakarta: Rineka cipta.
- Hadist. 2010. *Air (Hadits 11) : Halalnya bangkai ikan dan belalang, serta ati dan limpa*. <http://mueslimah.blogspot.com/>, diakses tanggal 22 Mei 2013.
- Hartriyanti, y. & triyanti. 2007. *Penilaian status gizi*. In : syafiq, a.et. All, eds. *Gizi dan kesehatan masyarakat*. Jakarta : rajagrafindo persada.
- KEPMENKES RI. 2012. *Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta : Direktorat Bina Gizi
- Moehji , Sjahmien. 2002. *Ilmu gizi* .Cet I. Jakarta : Bharata.

- Muaris.H. 2006. *Sarapan sehat untuk anak balita*. Jakarta: pt. Gramedia pustaka utama
- Nikmah. 2004. *Hubungan pola makan dengan status gizi anak balita pada keluarga nelayan di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai*. Makassar: fkm uh.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2005. *Metodologi penelitian kesehatan*. cet. 3. Jakarta : PT.rineka cipta.
- Retnaningsih, Ekowati. 2012. *Studi kasus: model peningkatan ketahanan pangan keluarga untuk penunjang gizi kesehatan keluarga di kelurahan talang keramat kabupaten banyu asin*. *Jurnal pembangunan manusia*.
- Sajogyo,dkk. 1994. *Gizi yang merata*. Yogyakarta : UGM press.
- Sediaoetama, ahmad djaeni. 2008. *Ilmu gizi untuk mahasiswa dan profesi, jilid*. Jakarta: PT. dian rakyat.
- Soekirman. 2000. *Ilmu gizi dan aplikasinya untuk keluarga dan masyarakat*. Jakarta: direktorat jenderal pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional.
- Soetjningsih. 2000. *Tumbuh kembang anak* . Jakarta : Penerbit buku kedokteran. EGC.
- St. Rahma. 2010. *Factor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak usia 1-3 tahun di desa marayoka kecamatan bangkala kabupaten jeneponto tahun*.makassar : fik uin. Suhardjo dan clara m,kusharto. *Prinsip ilmu gizi*. Yogyakarta: kanisius ikapi. 1992.
- Suhardjo,dkk. 1986. *Pangan, gizi dan pertanian*. jakarta : UI press.
- Suhardjo. 2003. *Perencanaan pangan dan gizi*. Jakarta : bumi aksara.
- Sukmawati, sri dara ayu . *Hubungan status gizi, berat badan lahir (bbl), imunisasi dengan kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ispa) pada balita di wilayah kerja puskesmas tunikamaseang kabupaten maros..dosen jurusan gizi poltekes makassar*. Media gizi pangan, vol. X, edisi 2, juli – desember 2010: jurnal universitas sumatera utara diakses tanggal akses 11 Februari 2013 : 11.32
- Supariasa, IDN,dkk. 2002. *Penilaian status gizi*. Jakarta : EGC.

Universitas pembangunan nasional veteran. Jurnal skripsi. diakses tanggal 11
Februari 2013 : 11.31

Uripi ,Vera. 2004. *Menu sehat untuk balita*. Jakarta : Puspa suara.



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Penilaian Status Gizi Anak berdasarkan indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standar Baku Antropometri WHO-NCHS	18
Tabel 2.	Distribusi responden berdasarkan kelompok umur	55
Tabel 3.	Distribusi berdasarkan jenis kelamin anak	56
Tabel 4.	Distribusi berdasarkan umur anak.....	57
Tabel 5.	Distribusi berdasarkan berat badan anak.....	58
Tabel 6.	Distribusi berdasarkan tinggi badan anak.....	59
Tabel 7.	Distribusi berdasarkan pendapatan keluarga	60
Tabel 8.	Distribusi berdasarkan tingkat pendidikan	60
Tabel 9.	Distribusi berdasarkan tingkat pengetahuan	61
Tabel 10.	Distribusi berdasarkan tingkat asupan energi	61
Tabel 11.	Distribusi berdasarkan tingkat asupan protein	62
Tabel 12.	Distribusi berdasarkan penyakit infeksi	62
Tabel 13.	Distribusi status gizi berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U).....	64
Tabel 14.	Distribusi status gizi berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U)	64
Tabel 15.	Distribusi status gizi berdasarkan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)	65
Tabel 16.	Distribusi pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/U	66
Tabel 17.	Distribusi pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri TB/U	67

Tabel 18.	Distribusi pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/TB.....	68
Tabel 19.	Distribusi tingkat pendidikan dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/U	69
Tabel 20.	Distribusi tingkat pendidikan dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri TB/U	70
Tabel 21.	Distribusi tingkat pendidikan dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/TB.....	71
Tabel 22.	Distribusi tingkat pengetahuan gizi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/U	72
Tabel 23.	Distribusi tingkat pengetahuan gizi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri TB/U	73
Tabel 24.	Distribusi tingkat pengetahuan gizi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/TB	74
Tabel 25.	Distribusi tingkat asupan energi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/U	75
Tabel 26.	Distribusi tingkat asupan energi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri TB/U	76
Tabel 27.	Distribusi tingkat asupan energi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/TB	77
Tabel 28.	Distribusi tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/U	78
Tabel 29.	Distribusi tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri TB/U	79
Tabel 30.	Distribusi tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/TB.....	80
Tabel 31.	Distribusi penyakit infeksi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/U	81

Tabel 32. Distribusi penyakit infeksi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri TB/U82

Tabel 33. Distribusi penyakit infeksi dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks antropometri BB/TB83



Pendahuluan

Latar belakang

Secara nasional prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia masih tinggi. Salah satu konsekuensi dari gizi kurang adalah gangguan pertumbuhan (Sri Mulyati 2007 dalam Sunardi 2008). Data tahun 2007 memperlihatkan 4 juta balita Indonesia kekurangan gizi, 700 ribu diantaranya mengalami gizi buruk. Sementara yang mendapat program makanan tambahan hanya 39 ribu anak.

Masalah gizi di Indonesia pada saat ini menghadapi masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Masalah gizi kurang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan (sanitasi), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan dan adanya daerah miskin gizi (yodium). Sebaliknya masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan serta kurangnya ketrampilan di bidang memasak, konsumsi anak, keragaman bahan dan keragaman jenis makanan yang mempengaruhi kejiwaan misalnya kebosanan balita terhadap makanan yang diberikan oleh ibu.

Gizi kurang dan gizi buruk berdampak serius terhadap kualitas generasi mendatang. Anak yang menderita gizi kurang akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental.

Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dikenal luas sebagai lumbung pangan nasional ternyata memiliki angka kejadian gizi kurang yang tinggi. Survei Konsumsi Gizi menunjukkan bahwa sejak tahun 1995 sampai tahun 1998 terjadi peningkatan persentase keluarga di Sulsel yang mengalami defisit konsumsi energi dari 39% menjadi 57% .

Sedangkan, Secara umum prevalensi gizi buruk di Sulawesi Selatan menurut hasil Riskesdas adalah 5,1% dan gizi kurang 12,5% dari 23 kab./kota terdapat delapan kab./kota yang diatas angka provinsi dan Sulawesi Selatan sudah mencapai target pencapaian program perbaikan gizi pada RPJM 2015 sebesar 20% (Dinkes, 2012).

Ada berbagai kabupaten yang terdapat di Sulawesi Selatan yang tidak menutup kemungkinan mengalami kasus gizi kurang bahkan kasus gizi buruk pada balita yang ada di daerah tersebut, Salah satunya kabupaten Wajo. Data persentase anak balita Bawah Garis Merah (BGM) terakhir menunjukkan pada tahun 2007 meningkat dengan tajam hingga 851 kasus BGM atau 1.66% dari 51.236 balita yang menyebar di hampir seluruh Kabupaten Wajo. Salah satu kecamatan yang memiliki kasus kelainan gizi yaitu Kecamatan Takkalalla tepatnya di desa Tosewo. Data tahun 2012 bahwa prevalensi kasus gizi kurang (BGM) yaitu sebanyak 27,5 % sedangkan prevalensi gizi lebih sebanyak 20,4 % dari 1.171 balita.

Desa Tosewo merupakan desa yang merupakan salah satu desa yang berada diwilayah kecamatan Takkalalla yang wilayahnya berupa wilayah pesisir pantai yang kaya akan sumberdaya alam baik laut maupun daratan, misalnya sumberdaya perikanan. Sehingga sebagian besar masyarakat hidup dan bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani kebun.

Status gizi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi secara kompleks, ditingkat rumah tangga status gizi dipengaruhi oleh kemampuan ibu rumah tangga menyediakan pangan yang cukup baik kuantitas maupun kualitasnya. Asupan gizi ibu dan anak dipengaruhi tingkat pendidikan perilaku serta keadaan kesehatan

anggota rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut terlihat erat hubungan antara ketahanan pangan status gizi dan kesehatan masyarakat.

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi dan kesehatan, khususnya ibu merupakan salah satu penyebab terjadinya kekurangan gizi pada balita. Pengetahuan minimal yang harus diketahui seorang ibu adalah tentang kebutuhan gizi, cara pemberian makan, jadwal pemberian makan pada anak balita, sehingga akan menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi perlu dibina perilaku yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu gizi. Kurang gizi pada anak balita dapat juga disebabkan perilaku ibu dalam pemilihan bahan makanan yang tidak benar. Pemilihan bahan makanan, tersedianya jumlah makanan yang cukup dan keanekaragaman makanan ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu tentang makanan dan gizinya.

Metode

Desain dan lokasi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan rancangan Cross Sectional Study. Lokasi penelitian adalah di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Cara pemilihan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua balita yang berada di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo. Adapun jumlah anak balita yang terdapat di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo yaitu sebanyak 78 anak. Sedangkan jumlah anak balita usia 12-59 bulan sebanyak 40 anak.

Sampel dalam penelitian ini yaitu anak balita yang berada di wilayah pesisir pantai desa Tosewo kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo usia 12-59 bulan. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan total sampling. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 anak balita.

Responden dalam penelitian ini yaitu ibu atau yang mengasuh dari anak balita yang kami jadikan sampel.

Jenis dan cara pengumpulan data

Data primer dikumpulkan dari anak balita yang terpilih sebagai sampel meliputi Tingkat pendidikan, Pengetahuan, penyakit infeksi dan pendapatan keluarga : diperoleh data melalui wawancara berpedoman pada kuisioner, Asupan makanan : diperoleh dari recall 24 jam. Status gizi : Diperoleh data melalui pengukuran langsung dengan cara antropometri. Timbangan injak untuk mengukur berat badan, microtoice untuk mengukur tinggi badan.

Pengolahan dan analisis data

Data yang telah terkumpul diteliti kelengkapannya, jika ada data yang kurang lengkap dapat segera dilengkapi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputerisasi dengan menggunakan program *SPSS for window*, dan program *Child Growth Standard WHO Antro 2005 dan Nutrisurvey*. *SPSS* digunakan untuk mengolah data hasil kuisioner dan *Child Growth Standard WHO Antro 2005* digunakan untuk mengolah data hasil pengukuran antropometri sehingga dapat ketahui status gizi setiap anak,

sedangkan *nutr survey* untuk recall 24 jam yakni asupan makanan anak balita. Data disajikan dalam bentuk tabel disertai penjelasan dalam bentuk narasi.

Hasil dan pembahasan

Deskripsi variabel dan sampel

Responden yang berumur 22-27 tahun sebanyak 14 orang (35,0%), responden yang berumur 28-33 tahun sebanyak 17 orang (42,5%), dan responden yang berumur 34-39 tahun sebanyak 9 orang (22,5%). Jadi responden yang paling banyak berdasarkan kelompok umur yaitu pada kelompok umur 28-33 tahun sebanyak 17 orang (42,5%) dan responden yang paling sedikit yaitu pada kelompok umur 34-39 tahun yakni 9 orang (22,5%).

Anak yang berumur 12 bulan sebanyak 10 anak (25,0%), anak yang berumur 24 bulan sebanyak 8 anak (20,0%), anak yang berumur 36 bulan sebanyak 12 anak (30,0%), anak yang berumur 48 bulan sebanyak 6 anak (15,0%) dan anak yang berumur 59 bulan sebanyak 4 anak (10,0%). Jadi jumlah anak yang paling banyak yaitu berumur 36 bulan sebanyak 12 anak (30,0%) dan jumlah anak yang paling sedikit yaitu berumur 59 bulan sebanyak 4 anak (10,0%).

Anak dengan berat badan antara 6,0 – 10,1 kg sebanyak 11 anak (27,5%), berat badan antara 11,0-14,5 kg sebanyak 18 anak (45,0%) dan berat badan antara 15,0-34,0 kg sebanyak 11 anak (27,5%). Jadi berat badan anak yang paling banyak berada pada kelas interval 11,0-14,5 kg yaitu sebanyak 18 anak (45,0%).

Anak dengan tinggi badan antara 60-70 cm sebanyak 2 anak (5,0%), tinggi badan antara 71-80 cm sebanyak 8 anak (20,0%), tinggi badan antara 81-90 cm sebanyak 11 anak (27,5%), tinggi badan antara 91-100 cm sebanyak 11 anak (27,5%) dan tinggi badan antara 101-110 cm sebanyak 8 anak (20,0%). Jadi tinggi badan yang paling banyak berada pada kelas interval 81-90 cm dan 91-100 cm dengan jumlah anak yang sama yaitu 11 anak (27,5%) dan yang paling sedikit berada pada kelas interval 60-70 yaitu 2 anak (5,0%)

Deskripsi variabel yang diteliti

Responden yang mempunyai pendapatan yang cukup sebanyak 15 orang (37,5%) dan responden yang mempunyai pendapatan yang kurang sebanyak 25 orang (62,5%).

responden yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi sebanyak 9 orang (22,5%) dan yang mempunyai tingkat pendidikan rendah sebanyak 31 orang (77,5%).

responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 4 orang (10,0%) dan responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 36 orang (90,0%).

sampel yang asupan energinya cukup (80 - 100% AKG) sebanyak 21 anak (52,5 %), dan sampel yang asupan energinya kurang (< 80% AKG) sebanyak 19 anak (47,5 %).

sampel yang asupan proteinnya baik (80 - 100% AKG) sebanyak 21 anak (52,5 %) dan sampel yang asupan proteinnya kurang (< 80 % AKG) sebanyak 19 anak (47,5%).

sampel yang menderita penyakit infeksi sebanyak 29 anak (72,5%), sedangkan sampel yang tidak menderita penyakit infeksi sebanyak 11 anak (27,5%).

a. Status Gizi Anak Balita

1) Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

Tabel 13.

Distribusi Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Indeks Antropometri BB/U di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Status Gizi BB/U	n	%
------------------	---	---

Gizi buruk	2	5,0
Gizi kurang	4	10,0
Gizi baik	32	80,0
Gizi lebih	2	5,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan Tabel 13 diatas menunjukkan bahwa dari 40 sampel, status gizi anak balita menurut BB/U dengan menggunakan indicator WHO-NCHS diperoleh anak balita yang berstatus gizi buruk sebanyak 2 anak (5,0%), yang berstatus gizi kurang sebanyak 4 anak (10,0%), yang berstatus gizi baik sebanyak 32 anak (80,0%), dan yang berstatus gizi lebih sebanyak 2 anak (5,0%).



2) **Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)**

Tabel 14.

Distribusi Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Indeks Antropometri TB/U di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Status Gizi TB/U	n	%
Sangat pendek	2	5,0
Pendek	10	25,0
Normal	26	65,0
Tinggi	2	5,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan Tabel 14 diatas menunjukkan bahwa dari 40 sampel, status gizi anak balita menurut TB/U dengan menggunakan indicator WHO-NCHS diperoleh anak balita berstatus sangat pendek sebanyak 2 anak (5,0%), yang berstatus pendek sebanyak 10 anak (25,0%), yang berstatus normal sebanyak 26 anak (65,0%), dan yang berstatus tinggi sebanyak 2 anak (5,0%).

3) **Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB)**

Tabel 15.

Distribusi Status Gizi Anak Balita Berdasarkan Indeks Antropometri BB/TB di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013

Status Gizi BB/TB	n	%
Sangat kurus	2	5,0
Kurus	3	7,5
Normal	34	85,0
Gemuk	1	2,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan Tabel 15 diatas menunjukkan bahwa dari 40 sampel, status gizi anak menurut BB/TB dengan menggunakan indicator WHO-NCHS diperoleh anak balita yang berstatus sangat kurus sebanyak 2 anak (5,0%), yang berstatus kurus sebanyak 3 anak (7,5%), yang berstatus normal sebanyak 34 anak (85,0%), dan yang berstatus tinggi sebanyak 1 anak (2,5%).

Pembahasan

1. Hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Tahun 2013.

Tingkat pendapatan akan menentukan makanan apa yang akan dibeli oleh keluarga. Orang miskin biasanya akan membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk makanan.

Rendahnya pendapatan merupakan rintangan yang menyebabkan orang-orang tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang dibutuhkan. Adapula keluarga yang sebenarnya mempunyai penghasilan cukup namun sebagian anaknya berstatus kurang gizi (sajogyo, 1994).

Anak-anak yang tumbuh dalam suatu keluarga miskin paling rentan terhadap kurang gizi (suhardjo, 2003).

Uji chi-square yang dilakukan pada tingkat pendapatan keluarga terhadap status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 0,686$ (BB/U), nilai $p = 0,864$ (TB/U) dan $p = 1,000$ (BB/TB). Karena nilai $p > 0,05$ baik dilihat berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dan status gizi anak balita tidak berhubungan karena antara keluarga yang berpendapatan cukup dan kurang tidak membuktikan hubungan yang signifikan antara yang berstatus gizi normal dan tidak normal. Anak yang memiliki keluarga yang berpendapatan cukup dan kurang sama-sama memiliki lebih banyak berstatus gizi yang normal di bandingkan yang tidak normal dengan demikian keluarga yang berpendapatan cukup dan kurang sama saja dan tidak berhubungan dengan status gizi anak balita pada penelitian ini. Walaupun keluarga berpendapatan kurang, akan tetapi juga memiliki anak balita dengan status gizi normal, hal ini disebabkan karena berdasarkan dilapangan sifat kekeluargaan masih sangat kental sehingga masyarakat masih saling membantu, selain itu rata-rata orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut tidak membeli ikan karena hasil tangkapan sendiri, sehingga asupan protein anak masih tetap terpenuhi, jadi walaupun keluarga yang tingkat pendapatannya kurang, masih tetap memiliki anak balita yang berstatus gizi normal.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sejalan dengan pendapat (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2008) yang menyatakan bahwa antara penghasilan dan gizi, jelas ada hubungan yang menguntungkan. Pengaruh peningkatan penghasilan terhadap perbaikan kesehatan dan kondisi keluarga lain yang mengadakan interaksi dengan status gizi yang berlawanan hamper universal. Ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan perbaikan taraf ekonomi maka tingkat gizi pendukung akan meningkat. Namun ahli gizi dapat menerima dengan catatan, bila hanya factor ekonomi saja yang merupakan penentu status gizi, kenyataannya masalah gizi bersifat multikompleks karena tidak hanya factor ekonomi yang berperan tetapi banyak factor lain yang ikut menentukan.

2. Hubungan tingkat pendidikan dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam kesehatan terutama dalam pola asuh anak dan alokasi sumber zat gizi. Rendahnya tingkat pendidikan ibu menyebabkan berbagai keterbatasan dalam menangani masalah gizi dan keluarga serta anak balitanya (St. Rahmah 2010, dalam Slope).

Peranan orang tua, khususnya ibu dalam menyediakan dan menyajikan makanan yang bergizi bagi keluarga, khususnya anak menjadi sangat penting. Kualitas pelayanan ibu dalam keluarga ditentukan oleh penguasaan informasi dan factor ketersediaan waktu yang memadai. Kedua factor tersebut merupakan factor determinan yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, interaksi social dan pekerjaan (soekirman, 2000).

Uji chi-square yang dilakukan pada tingkat pendidikan ibu terhadap status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 1,000$ (BB/U),

nilai $p = 0,453$ (TB/U) dan nilai $p = 0,115$ (BB/TB). Karena nilai $p > 0,05$ berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pendidikan gizi ibu dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, karena antara ibu yang berpendidikan tinggi dan rendah tidak ada bedanya sebab ibu yang berpendidikan rendah juga mempunyai lebih banyak anak yang berstatus gizi normal dibandingkan anak yang berstatus gizi tidak normal, begitupun juga yang berpendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena berdasarkan penelitian atau yang terjadi dilapangan, walaupun ibu berpendidikan rendah, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dan pengaruh dari media elektronik misalnya televisi, secara tidak langsung para ibu belajar dari media tersebut dan memperoleh informasi-informasi yang dapat berpengaruh terhadap keluarganya, misalnya makanan-makanan yang baik untuk anak-anak.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sejalan dengan pendapat (Suhardjo, 2003) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh. Dari kepentingan gizi keluarga, pendidikan diperlukan agar seseorang lebih tanggap terhadap adanya masalah gizi didalam keluarga dan bias mengambil tindakan secepatnya.

3. Hubungan tingkat pengetahuan gizi dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla.

Rendahnya pengetahuan ibu merupakan faktor penting karena mempengaruhi kemampuan ibu dalam mengelola sumber pangan yang ada untuk mendapatkan kecukupan bahan makanan. Pengetahuan tentang kandungan zat gizi dalam berbagai bahan makanan, kegunaan makanan bagi kesehatan keluarga dapat membantu ibu memilih bahan makanan yang berharga tidak begitu mahal akan tetapi nilai gizinya tinggi (Sjahmien Moehji, 2002).

Uji chi-square yang dilakukan pada tingkat pengetahuan gizi terhadap status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 1,000$ (BB/U), nilai $p = 1,000$ (TB/U), dan nilai $p = 0,493$ (BB/TB). Karena nilai $p > 0,05$ baik dilihat dari BB/U, TB/U dan BB/TB maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pengetahuan dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi anak balita Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, karena ibu yang memiliki tingkat pengetahuan kurang juga mempunyai anak yang berstatus gizi normal lebih banyak dibandingkan yang tidak normal, bahkan lebih banyak dibandingkan yang berpengetahuan baik. Hal ini disebabkan oleh para ibu memang kurang akan pengetahuan gizinya secara teori, akan tetapi para ibu memperoleh pengetahuan tentang makanan yang baik dari pengalaman atau dari luar, walaupun ia tidak mengetahui secara detail kandungan tiap makanan yang disediakan pada anak dan keluarganya. Selain itu, ketersediaan makanan juga mendukung, karena banyaknya ikan dan biasanya ikan tidak dibeli melainkan diberikan oleh orang-orang yang mempunyai tempat pemeliharaan ikan (empang) ataupun dari hasil sendiri.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sejalan dengan pendapat (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2000) yang menyatakan bahwa pengetahuan gizi yang baik akan menyebabkan

seseorang mampu menyusun menu yang baik untuk dikonsumsi. Semakin banyak pengetahuan gizi seseorang maka ia akan semakin memperhitungkan jenis dan jumlah makanan yang diperolehnya untuk dikonsumsi.

4. Hubungan tingkat asupan energy dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan merupakan sumber energy untuk menunjang semua kegiatan atau aktivitas manusia. Energy dalam tubuh manusia dapat timbul dikarenakan adanya pembakaran karbohidrat, protein dan lemak (Suhardjo, 2003).

Dalam usaha menciptakan manusia-manusia sehat pertumbuhannya, penuh semangat dan penuh kegairahan dalam bekerja, serta tinggi daya cipta dan kreatifitasnya, maka sejak anak-anak harus dipersiapkan. Untuk itu energy harus benar-benar diperhatikan, tetap selalu berada dalam serba kecukupan (G. Kartasapoetra dan Narsetyo, 2001).

Untuk kebutuhan tubuh anak balita sumber energy dipergunakan dalam pembangunan jaringan tubuh. Banyak sedikitnya energy yang dibutuhkan seseorang tergantung dari umur, berat badan, jenis kegiatan, jenis kelamin dan kesehatan tubuh.

Uji chi-square yang dilakukan pada tingkat asupan energy dengan status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 0,241$ (BB/U), nilai $p = 0,666$ (TB/U) dan nilai $p = 0,02$ (BB/TB). Karena nilai $p > 0,05$ dilihat berdasarkan BB/U dan TB/U maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat asupan energi dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, sedangkan nilai $p < 0,05$ berdasarkan BB/TB, maka disimpulkan ada hubungan tingkat asupan energy dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak balita yang memiliki tingkat asupan energy yang cukup sebanyak 15 anak yang memiliki status gizi normal dan 6 anak yang memiliki status gizi tidak normal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa anak yang memiliki asupan energy cukup berpeluang besar untuk memiliki status gizi yang normal, sedangkan 5 anak yang memiliki status gizi tidak normal akan tetapi asupan energinya cukup, hal ini disebabkan oleh banyak factor, salah satunya adanya suatu penyakit yang diderita oleh anak sehingga menyebabkan status gizinya tidak normal serta adanya pengaruh sosial. Selain itu anak yang memiliki asupan energy kurang sebanyak 19 anak yang berstatus gizi normal dan tidak ada anak yang memiliki status gizi tidak normal. Berdasarkan hal tersebut, asupan energy yang kurang lebih banyak terjadi pada anak berstatus gizi normal, hal ini disebabkan oleh banyak factor, salah satunya dari orang tua atau keluarga, selain itu dari individu itu sendiri juga berpengaruh. Anak yang memiliki tingkat ketahanan tubuh yang baik yang disebabkan oleh asupan makanan sewaktu ia kecil juga berpengaruh sehingga status gizinya tidak mudah terganggu. Ibu juga harus pintar-pintar dalam menyediakan makanan terhadap anaknya harus memperhatikan tidak hanya dari segi rasa, akan tetapi dari zat gizi yang dikandung makanan tersebut sehingga dapat mencukupi asupan makanan yang dibutuhkan utamanya asupan energy.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat (G. Kartasapoetra dan Narsetyo, 2001) berpendapat bahwa dalam usaha menciptakan manusia-manusia yang sehat pertumbuhannya, penuh semangat serta tinggi daya cipta dan kreatifitasnya, maka sejak anak-anak harus dipersiapkan. Untuk itu energy harus benar-benar diperhatikan.

5. Hubungan tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita di Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Dalam proses pencernaan, protein akan dipecah menjadi satuan-satuan dasar kimia, kemudian diserap dan dibawa oleh aliran darah keseluruh tubuh, dimana sel-sel jaringan mempunyai kemampuan untuk mengambil asam amino yang diperlukan untuk kebutuhan membangun dan memelihara kesehatan jaringan.

Berdasarkan sumbernya, protein ada 2 yaitu protein hewani contohnya daging, telur ikan dan lain-lain, sedangkan protein nabati contohnya dari biji-bijian, kacang-kacangan dan lain-lain.

Protein sebagai zat pembangun, yaitu merupakan bahan pembangun jaringan baru. Dengan demikian protein amatlah penting bagi semua taraf kehidupan, mulai dari anak-anak, remaja yang sedang tumbuh, juga pada masa hamil dan menyusui pada wanita dewasa, orang yang sakit dan dalam taraf penyembuhan demikian juga orang dewasa dan lanjut usia.

Uji chi-square yang dilakukan pada tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 0,241$ (BB/U), nilai $p = 0,666$ (TB/U) dan nilai $p = 0,02$ (BB/TB). Karena nilai $p < 0,05$ berdasarkan BB/TB, maka disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, sedangkan nilai $p > 0,05$ dilihat berdasarkan BB/U dan TB/U maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tingkat asupan protein dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak balita yang memiliki asupan protein cukup sebanyak 15 anak yang berstatus gizi normal dan 6 anak yang berstatus gizi tidak normal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa anak yang memiliki asupan protein cukup juga memiliki status gizi yang normal, sedangkan 6 anak yang memiliki status gizi tidak normal akan tetapi asupan proteinnya cukup, hal ini disebabkan oleh banyak factor, salah satunya adanya suatu penyakit yang diderita oleh anak sehingga menyebabkan status gizinya tidak normal serta proses penyerapan protein terganggu serta pengaturan konsumsi yang tidak terkontrol. Selain itu anak yang memiliki asupan protein kurang sebanyak 19 anak yang berstatus gizi normal dan tidak ada anak yang memiliki status gizi tidak normal. Berdasarkan hal tersebut, asupan protein yang kurang lebih banyak terjadi pada anak berstatus gizi normal disebabkan juga oleh banyak factor, salah satunya dari orang tua atau keluarga. Anak balita yang bertempat tinggal didesa tersebut, memang lebih berpeluang besar untuk memiliki status gizi normal, karena pengaruh dari asupan makanan yang dikonsumsi tiap hari yang kaya akan protein hewani yakni ikan, sehingga walaupun asupan proteinnya kurang sewaktu melakukan recall, akan tetapi pengaruh dari daya tahan tubuhnya, dan pengaruh makanannya yang dikonsumsi tiap hari. Sehingga seorang Ibu harus memperhatikan makanan anaknya, karena jangan sampai makanan yang dimakan kurang akan protein sehingga nantinya akan mempengaruhi status gizinya dari normal menjadi tidak normal.

Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (St. Rahma, 2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan tingkat konsumsi protein dengan status gizi anak 1-3 tahun di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Selain itu pendapat dari (Suhardjo, 2003) juga sejalan yang menyatakan bahwa status gizi atau tingkat konsumsi pangan merupakan bagian terpenting dari status kesehatan seseorang.

Hal ini juga membuktikan bahwa keluarga yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai akan mempengaruhi asupan protein seseorang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa keluarga yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai asupan proteinnya pasti tercukupi dengan baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga yang bertempat di wilayah pesisir pantai asupan proteinnya tidak tercukupi.

6. Hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di desa tosewo kecamatan takkalalla kabupaten wajo.

Penyakit infeksi dapat bertindak sebagai pemula terjadinya kurang gizi sebagai akibat menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit. Masa bayi dan balita sangat rentan terhadap penyakit. Jaringan tubuh pada bayi dan balita belum sempurna dalam upaya membentuk pertahanan tubuh seperti halnya orang dewasa. Umumnya penyakit yang menyerang anak bersifat akut artinya penyakit menyerang secara mendadak dan gejala timbul dengan cepat.

Infeksi bisa berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara yaitu mempengaruhi nafsu makan sehingga kebutuhan zat gizinya tidak terpenuhi. Secara umum defisiensi zat gizi sering merupakan awal dari gangguan defisiensi system kekebalan.

Uji chi-square yang dilakukan pada penyakit infeksi dengan status gizi anak balita berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB diperoleh masing-masing nilai $p = 0,405$ (BB/U), nilai $p = 0,315$ (TB/U) dan nilai $p = 1,000$ (BB/TB). Karena nilai $p > 0,05$ baik dilihat berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo karena tidak hanya yang berstatus gizi tidak normal yang menderita penyakit infeksi, tetapi yang berstatus gizi normal juga yang menderita penyakit infeksi, bahkan berdasarkan hasil penelitian, rata-rata anak balita di Wilayah Pesisir Pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo menderita penyakit infeksi, walaupun penyakit infeksi yang diderita tiap anak berbeda. Berdasarkan dilapangan, penyakit infeksi, banyak diderita oleh para anak balita baik yang berstatus gizi normal maupun yang tidak normal disebabkan oleh pada saat itu merupakan peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan didaerah tersebut sehingga banyaknya anak balita yang terkena penyakit infeksi misalkan batuk, demam dan diare, karena pada saat itu anak balita sangat rentang terkena penyakit infeksi.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan pendapat (I Nyoman Supriasa, 2002) yang menyatakan bahwa Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal balik dan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi dan keadaan gizi yang kurang dapat mempermudah seseorang terkena penyakit infeksi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa factor yang tidak berhubungan dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo antara lain : pendapatan keluarga, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan gizi ibu, penyakit infeksi, masing-masing berdasarkan BB/U, TB/U, BB/TB, dan tingkat asupan energy, serta tingkat asupan protein berdasarkan BB/U dan TB/U. Sedangkan factor yang berhubungan dengan status gizi anak balita di wilayah pesisir pantai Desa Tosewo Kecamatan Takkalalla

Kabupaten Wajo antara lain : tingkat asupan energy, dan tingkat asupan protein berdasarkan BB/TB .

Saran

Para ibu hendaknya lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya sehingga para anak balita dapat terhindar dari masalah-masalah gizi yang tidak diharapkan.

Para ibu perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi keluarganya setiap hari bukan hanya sekedar makan saja tapi juga harus lebih memperhatikan kandungan gizinya sehingga kebutuhan energy dan proteinnya dapat terpenuhi dan dapat memperbaiki status gizi anak mereka.

Daftar pustaka

Anggraeni,Reni. 2013. *Pengklasifikasian status gizi balita berdasarkan indeks antropometri (BB/U) menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation*. Fakultas ilmu komputer dan teknologi informasi universitas gunadarma : jurnal ilmiah tanggal akses 11-2-2013 : 11.31

Atmarita, Soendoro, T. Jahari, BA. Trihono. & Tilden R. 2009. *Kejadian masalah balita pendek bersamaan dengan kegemukan merupakan ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak diindonesia*. Persagi : jurnal ilmiah persagi.org/index.php?hal=8&jmlp=13.

BPS. *Indikator kesejahteraan rakyat 1998*. 1999. Jakarta : BPS.

Depag R.I. 2010. *Alquran dan tafsirNya (edisi yang disempurnakan)*. Jakarta: Penerbit Lentera abadi.

Departemen gizi dan kesehatan masyarakat fkm UI. 2007. *Gizi dan kesehatan masyarakat*. Jakarta : pt. Raja grafindo persada.

Depkes RI. 2000. *Gizi dan kesehatan saluran pencernaan pada bayi dan anak*. Jakarta : Nestle Nutrilon. Depkes RI. *Pedoman gizi seimbang*. Jakarta : Dirjen kesmas. 2004.

Dinas kesehatan kabupaten wajo. 2013. *Profil kesehatan tahun 2007 Kab.Wajo*. Wajo.

Dinkes. 2012. Status gizi balita di Sulawesi selatan. Makassar: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

G. Kartasapoetra. Narsetyo. 2001. *Ilmu gizi*. Jakarta: Rineka cipta.

Hadist. 2010. Air (Hadits 11) : *Halalnya bangkai ikan dan belalang, serta ati dan limpa*. <http://mueslimah.blogspot.com/>, diakses tanggal 22 Mei 2013.

Hartriyanti, y. & triyanti. 2007. *Penilaian status gizi*. In : syafiq, a.et. All, eds. *Gizi dan kesehatan masyarakat*. Jakarta : rajagrafindo persada.

- KEPMENKES RI. 2012. *Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta : Direktorat Bina Gizi
- Moehji , Sjahmien. 2002. *Ilmu gizi* .Cet I. Jakarta : Bharata.
- Muaris.H. 2006. *Sarapan sehat untuk anak balita*. Jakarta: pt. Gramedia pustaka utama
- Nikmah. 2004. *Hubungan pola makan dengan status gizi anak balita pada keluarga nelayan di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai*. Makassar: fkm uh.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2005. *Metodologi penelitian kesehatan*.cet. 3. Jakarta : PT.rineka cipta.
- Retnaningsih, Ekowati. 2012.*Studi kasus: model peningkatan ketahanan pangan keluarga untuk penunjang gizi kesehatan keluarga di kelurahan talang keramat kabupaten banyu asin*. *Jurnal pembangunan manusia*.
- Sajogyo,dkk. 1994. *Gizi yang merata*.Yogyakarta : UGM press.
- Sediaoetama, ahmad djaeni. 2008. *Ilmu gizi untuk mahasiswa dan profesi, jilid*. Jakarta: PT. dian rakyat.
- Soekirman. 2000. *Ilmu gizi dan aplikasinya untuk keluarga dan masyarakat*. Jakarta: direktorat jenderal pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional.
- Soetjningsih. 2000.*Tumbuh kembang anak* . Jakarta : Penerbit buku kedokteran. EGC.
- St. Rahma. 2010. *Factor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak usia 1-3 tahun di desa marayoka kecamatan bangkala kabupaten jeneponto tahun*.makassar : fik uin.
- Suhardjo dan clara m,kusharto. *Prinsip ilmu gizi*. Yogyakarta: kanisius ikapi. 1992.
- Suhardjo,dkk. 1986.*Pangan,gizi dan pertanian*.jakarta : UI press.
- Suhardjo. 2003. *Perencanaan pangan dan gizi*. Jakarta : bumi aksara.
- Sukmawati, sri dara ayu . *Hubungan status gizi, berat badan lahir (bbl), imunisasi dengan kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ispa) pada balita di wilayah kerja puskesmas tunikamaseang kabupaten maros..dosen jurusan gizi poltekes makassar*. *Media gizi pangan*, vol. X, edisi 2, juli – desember 2010: jurnal universitas sumatera utara diakses tanggal akses 11 Februari 2013 : 11.32
- Supariasa, IDN,dkk. 2002. *Penilaian status gizi*. Jakarta : EGC.
- Universitas pembangunan nasional veteran. *Jurnal skripsi*. diakses tanggal 11 Februari 2013 : 11.31
- Uripi ,Vera. 2004. *Menu sehat untuk balita*. Jakarta : Puspa suara.

L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KUISIONER PENELITIAN
FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI ANAK BALITA
DI WILAYAH PESISIR DESA TOSEWO KECAMATAN TAKKALALLA
KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

Pelaksanaan Pengambilan data : Tgl BlnThn

A. IDENTITAS KELUARGA RESPONDEN

1. Identitas Kepala Keluarga

- a. Nomor responden :
- b. Umur :Tahun
- c. Alamat :
- d. Tingkat pendidikan ibu :
 - 1) Tidak sekolah
 - 2) SD
 - 3) SMP
 - 4) SMA
 - 5) Perguruan tinggi
 - 6) Lain-lain, sebutkan
- e. Pendapatan keluarga :
 - Suami : Rp.
 - Istri : Rp.
 - (pendapatan perbulan)

2. Identitas Anak

- a. Nama Anak :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Anak Ke :
- d. Anak diberi :
 - 1) ASI Eksklusif
 - 2) Susu formula
 - 3) Asi Eksklusif dan susu formula
 - 4) Lainnya, sebutkan.....

B. STATUS GIZI

- 1. Umur :Tahun
- 2. Berat badan Anak :Kg
- 3. Tinggi Badan :Cm

C. TINGKAT PENGETAHUAN GIZI IBU

1. Apa yang dimaksud gizi seimbang ?
 - a. Tidak tahu
 - b. Kurang tahu (Jika menjawab “Makanan bergizi”)
 - c. Tahu (Jika menjawab “Makanan yang dikonsumsi sesuai kebutuhan atau yang dibutuhkan oleh tubuh”)
2. Makanan apa saja yang mengandung zat tenaga (karbohidrat) ?
 - a. Tidak tahu
 - b. Kurang tahu (menjawab 1 item)
 - c. Tahu (menjawab lebih dari 1 item)
Item : nasi, jagung, kentang, sagu, ubi, roti.
3. Makanan apa saja yang mengandung zat pembangun (protein) ?
 - a. Tidak tahu
 - b. Kurang tahu (menjawab 1 item)
 - c. Tahu (menjawab lebih dari 1 item)
Item : telur, daging, ayam, ikan, tempe, tahu.
4. Zat – zat apa saja yang dapat menghasilkan energy ?
 - a. Tidak tahu
 - b. Kurang tahu (menjawab 1 item)
 - c. Tahu (menjawab lebih dari 1 item)
Item : karbohidrat, protein, lemak
5. Sampai umur berapa anak diberi asi eksklusif ?
 - a. Tidak tahu
 - b. 6 bulan
 - c. 2 tahun
6. Apa akibat anak jika diberi susu formula ?
 - a. Tidak tahu
 - b. Lebih aktif/fisik kuat
 - c. Anak cenderung memiliki BB lebih
7. Apa akibat pemberian makanan yang kurang pada balita ?
 - a. Tidak tahu
 - b. Kurang tahu (menjawab 1 item)
 - c. Tahu (menjawab lebih dari 1 item)
Item : anak kurus, kurang sehat, lemas, tidak aktif, tumbuh kembang terganggu
8. Apakah yang menyebabkan anak menderita gizi buruk ?
 - a. Tidak tahu
 - b. Kurang tahu (menjawab 1 item)

FORMULIR RECALL 24 JAM

NAMA RESPONDEN :

HARI/TANGGAL :

Waktu Makan	Jenis Makanan/Bahan Makanan	Cara Pengolahan	Jumlah (Ukuran)	
			URT	Gram
Pagi				
Makanan selingan				
Siang				
Makanan selingan				
Malam				
Makanan selingan				

MASTER TABEL

nama ibu	umur ibu	alamat	nama anak	jenis kelamin	umur anak	BB
T	35	tosewo	MH	laki-laki	4	15
L	35	tosewo	HS	perempuan	3	34
H	22	tosewo	RP	laki-laki	1	10,1
L	29	tosewo	SR	perempuan	1	9
S	28	tosewo	AL	perempuan	4	12
A	26	tosewo	AD	laki-laki	3	15
E	30	tosewo	T	perempuan	4	14
I	27	tosewo	FR	perempuan	1	8
L	28	tosewo	FK	perempuan	3	13
M	32	tosewo	FD	perempuan	3	14,5
S	35	tosewo	MR	perempuan	4	12
E	35	tosewo	MY	laki-laki	3	13
S	22	tosewo	KM	perempuan	5	16
F	29	tosewo	RK	laki-laki	3	16
T	27	tosewo	BA	laki-laki	4	18
A	27	tosewo	FH	laki-laki	1	9
H	25	tosewo	AS	perempuan	5	15
T	25	tosewo	ZPM	perempuan	1	11
S	37	tosewo	AR	laki-laki	2	11
L	34	tosewo	SL	perempuan	1	9
S	33	tosewo	MR	laki-laki	1	9
N	24	tosewo	IY	perempuan	5	14
R	24	tosewo	WT	perempuan	1	8
S	33	tosewo	FH	perempuan	1	6
M	27	tosewo	MA	laki-laki	3	11
P	39	tosewo	EV	perempuan	2	12
U	28	tosewo	MZ	laki-laki	1	10
B	29	tosewo	CT	perempuan	2	14
E	35	tosewo	SN	perempuan	3	13
C	35	tosewo	GW	perempuan	3	12
M	29	tosewo	RS	laki-laki	2	14
K	33	tosewo	IAM	perempuan	3	15
D	28	tosewo	SY	laki-laki	2	8
M	26	tosewo	AG	laki-laki	2	10
R	30	tosewo	SY	laki-laki	5	17
T	26	tosewo	HR	perempuan	2	11
N	27	tosewo	SD	laki-laki	4	15
S	29	tosewo	RS	perempuan	3	11
A	30	tosewo	MS	laki-laki	2	12
E	28	tosewo	MN	perempuan	3	12

TB	pendapatan	tk.pend.ibu	tk.peng.ibu	peny.infeksi	diare	ISPA	Energi
101	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang
105	cukup	tinggi	baik	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup
82	cukup	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup
77	cukup	rendah	kurang	menderita	YA	TIDAK	kurang
90	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
90	cukup	tinggi	baik	menderita	TIDAK	YA	kurang
103	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang
68	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
90	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang
98	cukup	tinggi	baik	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup
97	kurang	rendah	kurang	menderita	YA	TIDAK	kurang
91	kurang	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang
110	kurang	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup
96	kurang	rendah	kurang	menderita	YA	TIDAK	cukup
102	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang
79	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
105	kurang	tinggi	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang
80	kurang	tinggi	baik	menderita	TIDAK	YA	kurang
91	kurang	tinggi	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
75	cukup	tinggi	kurang	menderita	YA	TIDAK	kurang
70	cukup	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup
107	kurang	tinggi	kurang	menderita	YA	YA	cukup
72	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang
72	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
84	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang
87	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang
77	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
96	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
100	cukup	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang
94	kurang	rendah	kurang	menderita	YA	TIDAK	kurang
87	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang
100	kurang	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang
80	kurang	rendah	kurang	menderita	YA	TIDAK	cukup
87	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
104	cukup	tinggi	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
89	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
100	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup
88	kurang	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup
90	kurang	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang
92	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup

protein	SGBBU	SGTBU	SGBBTB	SGBBU1	SGTBU1	SGBBTB
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	tidak normal	normal	tidak normal	gizi lebih	normal	gemuk
cukup	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
kurang	normal	tidak normal	normal	gizi baik	tinggi	normal
cukup	tidak normal	tidak normal	normal	gizi lebih	tinggi	normal
kurang	normal	tidak normal	normal	gizi baik	pendek	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	normal	tidak normal	normal	gizi baik	pendek	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
kurang	tidak normal	normal	normal	gizi kurang	normal	normal
kurang	normal	tidak normal	normal	gizi baik	pendek	normal
cukup	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	tidak normal	tidak normal	normal	gizi kurang	sangat pendek	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	normal	normal	tidak normal	gizi baik	normal	kurus
kurang	normal	tidak normal	normal	gizi baik	pendek	normal
cukup	normal	tidak normal	normal	gizi baik	pendek	normal
cukup	tidak normal	normal	tidak normal	gizi kurang	normal	kurus
kurang	normal	tidak normal	normal	gizi baik	pendek	normal
cukup	tidak normal	normal	tidak normal	gizi buruk	normal	sangat kurus
kurang	tidak normal	tidak normal	normal	gizi kurang	sangat pendek	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	normal	tidak normal	normal	gizi baik	pendek	normal
cukup	normal	tidak normal	normal	gizi baik	pendek	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	tidak normal	tidak normal	tidak normal	gizi buruk	pendek	sangat kurus
cukup	normal	normal	tidak normal	gizi baik	normal	kurus
cukup	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	normal	tidak normal	normal	gizi baik	pendek	normal
kurang	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal
cukup	normal	normal	normal	gizi baik	normal	normal

TABEL FREKUENSI

UMUR RESPONDEN

umur ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22	2	5.0	5.0	5.0
	24	2	5.0	5.0	10.0
	25	2	5.0	5.0	15.0
	26	3	7.5	7.5	22.5
	27	5	12.5	12.5	35.0
	28	5	12.5	12.5	47.5
	29	5	12.5	12.5	60.0
	30	3	7.5	7.5	67.5
	32	1	2.5	2.5	70.0
	33	3	7.5	7.5	77.5
	34	1	2.5	2.5	80.0
	35	6	15.0	15.0	95.0
	37	1	2.5	2.5	97.5
	39	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

UMUR ANAK

umur anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	10	25.0	25.0	25.0
	24	8	20.0	20.0	45.0
	36	12	30.0	30.0	75.0
	48	6	15.0	15.0	90.0
	59	4	10.0	10.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

JENIS KELAMIN

Jenis kelamin anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	17	42.5	42.5	42.5
	perempuan	23	57.5	57.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

BERAT BADAN

berat badan anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6,0 - 10,1	11	27.5	27.5	27.5
	11,0 – 14,5	18	45.0	45.0	72.5
	15,0-34,0	11	27.5	27.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TINGGI BADAN

tinggi badan anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60-70	2	5.0	5.0	5.0
	71-80	8	20.0	20.0	25.0
	81-90	11	27.5	27.5	52.5
	91-100	11	27.5	27.5	80.0
	101-110	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

PENDAPATAN KELUARGA

pendapatan keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	15	37.5	37.5	37.5
	kurang	25	62.5	62.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

TINGKAT PENDIDIKAN IBU

tingkat pendidikan ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tinggi	9	22.5	22.5	22.5
rendah	31	77.5	77.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

TINGKAT PENGETAHUAN IBU

tingkat pengetahuan ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid baik	4	10.0	10.0	10.0
kurang	36	90.0	90.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

PENYAKIT INFEKSI

penyakit infeksi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid menderita	29	72.5	72.5	72.5
tidak menderita	11	27.5	27.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

DIARE

diare

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid YA	7	17.5	17.5	17.5
TIDAK	33	82.5	82.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

ISPA

ISPA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	YA	23	57.5	57.5	57.5
	TIDAK	17	42.5	42.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

ASUPAN ENERGI

asupan energi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	21	52.5	52.5	52.5
	kurang	19	47.5	47.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

ASUPAN PROTEIN

asupan protein

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	21	52.5	52.5	52.5
	kurang	19	47.5	47.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

STATUS GIZI MENURUT BB/U

Status Gizi BB/U

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid gizi buruk	2	5.0	5.0	5.0
gizi kurang	4	10.0	10.0	15.0
gizi baik	32	80.0	80.0	95.0
gizi lebih	2	5.0	5.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Status Gizi BB/U

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid normal	32	80.0	80.0	80.0
tidak normal	8	20.0	20.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

STATUS GIZI MENURUT TB/U

Status gizi TB/U

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat pendek	2	5.0	5.0	5.0
pendek	10	25.0	25.0	30.0
normal	26	65.0	65.0	95.0
tinggi	2	5.0	5.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Status gizi TB/U

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid normal	26	65.0	65.0	65.0
tidak normal	14	35.0	35.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	


STATUS GIZI MENURUT BB/TB

Status gizi BB/TB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat kurus	2	5.0	5.0	5.0
	kurus	3	7.5	7.5	12.5
	normal	34	85.0	85.0	97.5
	gemuk	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Status gizi BB/TB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	34	85.0	85.0	85.0
	tidak normal	6	15.0	15.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	



TABEL HUBUNGAN

PENDAPATAN KELUARGA*STATUS GIZI ANAK BALITA

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
pendapatan keluarga * Status Gizi BB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
pendapatan keluarga * Status gizi TB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
pendapatan keluarga * Status gizi BB/TB	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

pendapatan keluarga * Status Gizi BB/U

Crosstab

			Status Gizi BB/U		Total normal
			Normal	tidak normal	
pendapatan keluarga	cukup	Count	13	2	15
		Expected Count	12.0	3.0	15.0
		% within pendapatan keluarga	86.7%	13.3%	100.0%
	kurang	Count	19	6	25
		Expected Count	20.0	5.0	25.0
		% within pendapatan keluarga	76.0%	24.0%	100.0%
Total	Count	32	8	40	
	Expected Count	32.0	8.0	40.0	
	% within pendapatan keluarga	80.0%	20.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.667(b)	1	.414		
Continuity Correction(a)	.167	1	.683		
Likelihood Ratio	.698	1	.403		
Fisher's Exact Test				.686	.350
Linear-by-Linear Association	.650	1	.420		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.00.

pendapatan keluarga * Status gizi TB/U

Crosstab

			Status gizi TB/U		Total
			normal	tidak normal	normal
pendapatan keluarga	cukup	Count	10	5	15
		Expected Count	9.8	5.3	15.0
		% within pendapatan keluarga	66.7%	33.3%	100.0%
	kurang	Count	16	9	25
		Expected Count	16.3	8.8	25.0
		% within pendapatan keluarga	64.0%	36.0%	100.0%
Total		Count	26	14	40
		Expected Count	26.0	14.0	40.0
		% within pendapatan keluarga	65.0%	35.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.029(b)	1	.864		
Continuity Correction(a)	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.029	1	.864		
Fisher's Exact Test				1.000	.571
Linear-by-Linear Association	.029	1	.866		
N of Valid Cases	40				

- a Computed only for a 2x2 table
 b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.25.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.027	.864
	Cramer's V	.027	.864
N of Valid Cases		40	

- a Not assuming the null hypothesis.
 b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

pendapatan keluarga * Status gizi BB/TB

Crosstab

			Status gizi BB/TB		Total
			normal	tidak normal	normal
pendapatan keluarga	cukup	Count	13	2	15
		Expected Count	12.8	2.3	15.0
		% within pendapatan keluarga	86.7%	13.3%	100.0%
	kurang	Count	21	4	25
		Expected Count	21.3	3.8	25.0
		% within pendapatan keluarga	84.0%	16.0%	100.0%
Total		Count	34	6	40
		Expected Count	34.0	6.0	40.0
		% within pendapatan keluarga	85.0%	15.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.052(b)	1	.819		
Continuity Correction(a)	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.053	1	.818		
Fisher's Exact Test				1.000	.600
Linear-by-Linear Association	.051	1	.821		
N of Valid Cases	40				

- a Computed only for a 2x2 table
 b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.25.

TINGKAT PENDIDIKAN * STATUS GIZI ANAK BALITA

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
tingkat pendidikan ibu * Status Gizi BB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
tingkat pendidikan ibu * Status gizi TB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
tingkat pendidikan ibu * Status gizi BB/TB	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

tingkat pendidikan ibu * Status Gizi BB/U

Crosstab

			Status Gizi BB/U		Total
			normal	tidak normal	normal
tingkat pendidikan ibu	tinggi	Count	7	2	9
		Expected Count	7.2	1.8	9.0
		% within tingkat pendidikan ibu	77.8%	22.2%	100.0%
	rendah	Count	25	6	31
		Expected Count	24.8	6.2	31.0
		% within tingkat pendidikan ibu	80.6%	19.4%	100.0%
Total	Count	32	8	40	
	Expected Count	32.0	8.0	40.0	
	% within tingkat pendidikan ibu	80.0%	20.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.036(b)	1	.850		
Continuity Correction(a)	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.035	1	.851		
Fisher's Exact Test				1.000	.590
Linear-by-Linear Association	.035	1	.852		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.80.

tingkat pendidikan ibu * Status gizi TB/U

Crosstab

			Status gizi TB/U		Total
			normal	tidak normal	normal
tingkat pendidikan ibu	tinggi	Count	7	2	9
		Expected Count	5.9	3.2	9.0
		% within tingkat pendidikan ibu	77.8%	22.2%	100.0%
	rendah	Count	19	12	31
		Expected Count	20.2	10.9	31.0
		% within tingkat pendidikan ibu	61.3%	38.7%	100.0%
Total	Count	26	14	40	
	Expected Count	26.0	14.0	40.0	
	% within tingkat pendidikan ibu	65.0%	35.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.833(b)	1	.361		
Continuity Correction(a)	.266	1	.606		
Likelihood Ratio	.880	1	.348		
Fisher's Exact Test				.453	.310
Linear-by-Linear Association	.813	1	.367		
N of Valid Cases	40				

- a Computed only for a 2x2 table
 b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.15.

tingkat pendidikan ibu * Status gizi BB/TB

Crosstab

			Status gizi BB/TB		Total
			normal	tidak normal	normal
tingkat pendidikan ibu	tinggi	Count	6	3	9
		Expected Count	7.7	1.4	9.0
		% within tingkat pendidikan ibu	66.7%	33.3%	100.0%
	rendah	Count	28	3	31
		Expected Count	26.4	4.7	31.0
		% within tingkat pendidikan ibu	90.3%	9.7%	100.0%
Total	Count	34	6	40	
	Expected Count	34.0	6.0	40.0	
	% within tingkat pendidikan ibu	85.0%	15.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.061(b)	1	.080		
Continuity Correction(a)	1.487	1	.223		
Likelihood Ratio	2.647	1	.104		
Fisher's Exact Test				.115	.115
Linear-by-Linear Association	2.985	1	.084		
N of Valid Cases	40				

- a Computed only for a 2x2 table
 b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.35.

TINGKAT PENGETAHUAN GIZI *STATUS GIZI ANAK BALITA

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
tingkat pengetahuan ibu 1 * Status Gizi BB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
tingkat pengetahuan ibu 1 * Status gizi TB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
tingkat pengetahuan ibu 1 * Status gizi BB/TB	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

tingkat pengetahuan ibu * Status Gizi BB/U

Crosstab

			Status Gizi BB/U		Total
			normal	tidak normal	normal
tingkat pengetahuan ibu 1	baik	Count	3	1	4
		Expected Count	3.2	.8	4.0
		% within tingkat pengetahuan ibu 1	75.0%	25.0%	100.0%
	kurang	Count	29	7	36
		Expected Count	28.8	7.2	36.0
		% within tingkat pengetahuan ibu 1	80.6%	19.4%	100.0%
Total	Count	32	8	40	
	Expected Count	32.0	8.0	40.0	
	% within tingkat pengetahuan ibu 1	80.0%	20.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.069(b)	1	.792		
Continuity Correction(a)	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.066	1	.797		
Fisher's Exact Test				1.000	.607
Linear-by-Linear Association	.068	1	.795		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.

tingkat pengetahuan ibu * Status gizi TB/U

Crosstab

			Status gizi TB/U		Total
			normal	tidak normal	normal
tingkat pengetahuan ibu 1	baik	Count	3	1	4
		Expected Count	2.6	1.4	4.0
		% within tingkat pengetahuan ibu 1	75.0%	25.0%	100.0%
	kurang	Count	23	13	36
		Expected Count	23.4	12.6	36.0
		% within tingkat pengetahuan ibu 1	63.9%	36.1%	100.0%
Total		Count	26	14	40
		Expected Count	26.0	14.0	40.0
		% within tingkat pengetahuan ibu 1	65.0%	35.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.195(b)	1	.658		
Continuity Correction(a)	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.205	1	.651		
Fisher's Exact Test				1.000	.562
Linear-by-Linear Association	.190	1	.663		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.40.

tingkat pengetahuan ibu * Status gizi BB/TB

Crosstab

			Status gizi BB/TB		Total
			normal	tidak normal	normal
tingkat pengetahuan ibu 1	baik	Count	3	1	4
		Expected Count	3.4	.6	4.0
		% within tingkat pengetahuan ibu 1	75.0%	25.0%	100.0%
	kurang	Count	31	5	36
		Expected Count	30.6	5.4	36.0
		% within tingkat pengetahuan ibu 1	86.1%	13.9%	100.0%
Total	Count	34	6	40	
	Expected Count	34.0	6.0	40.0	
	% within tingkat pengetahuan ibu 1	85.0%	15.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.349(b)	1	.555		
Continuity Correction(a)	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.306	1	.580		
Fisher's Exact Test				.493	.493
Linear-by-Linear Association	.340	1	.560		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .60.



TINGKAT ASUPAN ENERGI*STATUS GIZI ANAK BALITA

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
asupan energi * Status Gizi BB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
asupan energi * Status gizi TB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
asupan energi * Status gizi BB/TB	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

asupan energi * Status Gizi BB/U

Crosstab

			Status Gizi BB/U		Total normal
			normal	tidak normal	
asupan energi	cukup	Count	15	6	21
		Expected Count	16.8	4.2	21.0
		% within asupan energi	71.4%	28.6%	100.0%
	kurang	Count	17	2	19
		Expected Count	15.2	3.8	19.0
		% within asupan energi	89.5%	10.5%	100.0%
Total		Count	32	8	40
		Expected Count	32.0	8.0	40.0
		% within asupan energi	80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.030(b)	1	.154		
Continuity Correction(a)	1.059	1	.303		
Likelihood Ratio	2.118	1	.146		
Fisher's Exact Test				.241	.152
Linear-by-Linear Association	1.979	1	.159		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.80.

asupan energi * Status gizi TB/U

Crosstab

			Status gizi TB/U		Total
			normal	tidak normal	normal
asupan energi	cukup	Count	13	8	21
		Expected Count	13.7	7.4	21.0
		% within asupan energi	61.9%	38.1%	100.0%
	kurang	Count	13	6	19
		Expected Count	12.4	6.7	19.0
		% within asupan energi	68.4%	31.6%	100.0%
Total	Count	26	14	40	
	Expected Count	26.0	14.0	40.0	
	% within asupan energi	65.0%	35.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.186(b)	1	.666		
Continuity Correction(a)	.010	1	.921		
Likelihood Ratio	.187	1	.666		
Fisher's Exact Test				.748	.461
Linear-by-Linear Association	.182	1	.670		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.65.

asupan energi * Status gizi BB/TB

Crosstab

			Status gizi BB/TB		Total
			normal	tidak normal	normal
asupan energi	cukup	Count	15	6	21
		Expected Count	17.9	3.2	21.0
		% within asupan energi	71.4%	28.6%	100.0%
	kurang	Count	19	0	19
		Expected Count	16.2	2.9	19.0
		% within asupan energi	100.0%	.0%	100.0%
Total	Count	34	6	40	
	Expected Count	34.0	6.0	40.0	
	% within asupan energi	85.0%	15.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.387(b)	1	.011		
Continuity Correction(a)	4.342	1	.037		
Likelihood Ratio	8.689	1	.003		
Fisher's Exact Test				.021	.014
Linear-by-Linear Association	6.227	1	.013		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.85.

TINGKAT ASUPAN PROTEIN*STATUS GIZI ANAK BALITA

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
asupan protein * Status Gizi BB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
asupan protein * Status gizi TB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
asupan protein * Status gizi BB/TB	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

asupan protein * Status Gizi BB/U

Crosstab

			Status Gizi BB/U		Total
			normal	tidak normal	normal
asupan protein	cukup	Count	15	6	21
		Expected Count	16.8	4.2	21.0
		% within asupan protein	71.4%	28.6%	100.0%
	kurang	Count	17	2	19
		Expected Count	15.2	3.8	19.0
		% within asupan protein	89.5%	10.5%	100.0%
Total		Count	32	8	40
		Expected Count	32.0	8.0	40.0
		% within asupan protein	80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.030(b)	1	.154		
Continuity Correction(a)	1.059	1	.303		
Likelihood Ratio	2.118	1	.146		
Fisher's Exact Test				.241	.152
Linear-by-Linear Association	1.979	1	.159		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.80.

asupan protein * Status gizi TB/U

Crosstab

			Status gizi TB/U		Total
			normal	tidak normal	normal
asupan protein	cukup	Count	13	8	21
		Expected Count	13.7	7.4	21.0
		% within asupan protein	61.9%	38.1%	100.0%
	kurang	Count	13	6	19
		Expected Count	12.4	6.7	19.0
		% within asupan protein	68.4%	31.6%	100.0%
Total	Count	26	14	40	
	Expected Count	26.0	14.0	40.0	
	% within asupan protein	65.0%	35.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.186(b)	1	.666		
Continuity Correction(a)	.010	1	.921		
Likelihood Ratio	.187	1	.666		
Fisher's Exact Test				.748	.461
Linear-by-Linear Association	.182	1	.670		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.65.

asupan protein * Status gizi BB/TB

Crosstab

			Status gizi BB/TB		Total normal
			normal	tidak normal	
asupan protein	cukup	Count	15	6	21
		Expected Count	17.9	3.2	21.0
		% within asupan protein	71.4%	28.6%	100.0%
	kurang	Count	19	0	19
		Expected Count	16.2	2.9	19.0
		% within asupan protein	100.0%	.0%	100.0%
Total	Count	34	6	40	
	Expected Count	34.0	6.0	40.0	
	% within asupan protein	85.0%	15.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.387(b)	1	.011		
Continuity Correction(a)	4.342	1	.037		
Likelihood Ratio	8.689	1	.003		
Fisher's Exact Test				.021	.014
Linear-by-Linear Association	6.227	1	.013		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.85.

PENYAKIT INFEKSI*STATUS GIZI ANAK BALITA

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
penyakit infeksi * Status Gizi BB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
penyakit infeksi * Status gizi TB/U	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
penyakit infeksi * Status gizi BB/TB	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%

penyakit infeksi * Status Gizi BB/U

Crosstab

			Status Gizi BB/U		Total
			normal	tidak normal	normal
penyakit infeksi	menderita	Count	22	7	29
		Expected Count	23.2	5.8	29.0
		% within penyakit infeksi	75.9%	24.1%	100.0%
	tidak menderita	Count	10	1	11
		Expected Count	8.8	2.2	11.0
		% within penyakit infeksi	90.9%	9.1%	100.0%
Total		Count	32	8	40
		Expected Count	32.0	8.0	40.0
		% within penyakit infeksi	80.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.129(b)	1	.288		
Continuity Correction(a)	.384	1	.535		
Likelihood Ratio	1.276	1	.259		
Fisher's Exact Test				.405	.279
Linear-by-Linear Association	1.100	1	.294		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.20.

penyakit infeksi * Status gizi TB/U

Crosstab

			Status gizi TB/U		Total
			normal	tidak normal	normal
penyakit infeksi	menderita	Count	18	11	29
		Expected Count	18.9	10.2	29.0
		% within penyakit infeksi	62.1%	37.9%	100.0%
	tidak menderita	Count	8	3	11
		Expected Count	7.2	3.9	11.0
		% within penyakit infeksi	72.7%	27.3%	100.0%
Total		Count	26	14	40
		Expected Count	26.0	14.0	40.0
		% within penyakit infeksi	65.0%	35.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.398(b)	1	.528		
Continuity Correction(a)	.068	1	.795		
Likelihood Ratio	.409	1	.523		
Fisher's Exact Test				.715	.404
Linear-by-Linear Association	.388	1	.533		
N of Valid Cases	40				

a Computed only for a 2x2 table

b 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.85.

penyakit infeksi * Status gizi BB/TB

Crosstab

			Status gizi BB/TB		Total
			normal	tidak normal	normal
penyakit infeksi	menderita	Count	24	5	29
		Expected Count	24.7	4.4	29.0
		% within penyakit infeksi	82.8%	17.2%	100.0%
	tidak menderita	Count	10	1	11
		Expected Count	9.4	1.7	11.0
		% within penyakit infeksi	90.9%	9.1%	100.0%
Total	Count	34	6	40	
	Expected Count	34.0	6.0	40.0	
	% within penyakit infeksi	85.0%	15.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.416(b)	1	.519		
Continuity Correction(a)	.022	1	.882		
Likelihood Ratio	.453	1	.501		
Fisher's Exact Test				1.000	.464
Linear-by-Linear Association	.405	1	.524		
N of Valid Cases	40				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.65.

**GAMBAR PROSES PENELITIAN STATUS GIZI ANAK BALITA DI WILAYAH PESISIR PANTAI DESA
TOSEWO KECAMATAN TAKKALALLA KABUPATEN WAJO TAHUN 2013**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP



SULFIAH, Lahir di Tosewo 2 Februari 1991. Anak pertama (1) dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda H.Ahmad dan Ibunda Hj.Asnidar. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pada tahun 1997 di SD Negeri 112 Botto Desa Tosewo Kec.Takkalalla Kab.Wajo. Setelah itu melanjutkan pendidikan di sekolah lanjut tingkat pertama SMP Negeri 1 Takkalalla dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas SMA Negeri 3 Sengkang dan keluar sebagai alumni 2009. Pada tahun yang sama penulis mendaftar SNMPTN dan diterima sebagai Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

MASTER TABEL

nama ibu	umur ibu	alamat	nama anak	jenis kelamin	umur anak	BB	TB	pendapatan	tk.pend.ibu	tk.peng.ibu	peny.infeksi	diare	ISPA	Energi	protein	SGBBU	SGTBU	SGBBTB
temma	35	tosewo	muh.hafiz	laki-laki	4	15	101	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang	kurang	normal	normal	normal
h.lina	35	tosewo	herlin sukri	perempuan	3	34	105	cukup	tinggi	baik	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang	cukup	tidak normal	normal	tidak normal
hastuti	22	tosewo	rama pratama	laki-laki	1	10,1	82	cukup	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup	cukup	normal	normal	normal
lina	29	tosewo	suci rahmadani	perempuan	1	9	77	cukup	rendah	kurang	menderita	YA	TIDAK	kurang	kurang	normal	tidak normal	normal
h.sumi	28	tosewo	aliya	perempuan	4	12	90	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	tidak normal	tidak normal	normal
anti	26	tosewo	alviandi	laki-laki	3	15	90	cukup	tinggi	baik	menderita	TIDAK	YA	kurang	kurang	normal	tidak normal	normal
emmy	30	tosewo	tina	perempuan	4	14	103	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang	kurang	normal	normal	normal
icha	27	tosewo	fiersha ramadani	perempuan	1	8	68	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	normal	tidak normal	normal
indah	28	tosewo	fika ramadani	perempuan	3	13	90	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang	kurang	normal	normal	normal
h.meri	32	tosewo	faradillah	perempuan	3	14,5	98	cukup	tinggi	baik	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup	cukup	normal	normal	normal
suri	35	tosewo	mira rahmadani	perempuan	4	12	97	kurang	rendah	kurang	menderita	YA	TIDAK	kurang	kurang	tidak normal	normal	normal
essang	35	tosewo	muh.yusuf	laki-laki	3	13	91	kurang	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang	kurang	normal	tidak normal	normal
salmiati	22	tosewo	kasmira	perempuan	5	16	110	kurang	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup	cukup	normal	normal	normal
fokky	29	tosewo	rafky	laki-laki	3	16	96	kurang	rendah	kurang	menderita	YA	TIDAK	cukup	cukup	normal	normal	normal
tenri	27	tosewo	baso azis	laki-laki	4	18	102	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang	kurang	normal	normal	normal
anti	27	tosewo	ferdi ahmad	laki-laki	1	9	79	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	tidak normal	tidak normal	normal
hase	25	tosewo	arlin safira	perempuan	5	15	105	kurang	tinggi	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang	kurang	normal	normal	normal
tekke	25	tosewo	zalwa putri maura	perempuan	1	11	80	kurang	tinggi	baik	menderita	TIDAK	YA	kurang	kurang	normal	normal	normal
suriani	37	tosewo	arjuanda rahmat	laki-laki	2	11	91	kurang	tinggi	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	normal	normal	tidak normal
h.lina	34	tosewo	salsabilla	perempuan	1	9	75	cukup	tinggi	kurang	menderita	YA	TIDAK	kurang	kurang	normal	tidak normal	normal
senna	33	tosewo	muh.reski	laki-laki	1	9	70	cukup	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup	cukup	normal	tidak normal	normal
nanna	24	tosewo	iin yulianti	perempuan	5	14	107	kurang	tinggi	kurang	menderita	YA	YA	cukup	cukup	tidak normal	normal	tidak normal
rahmah	24	tosewo	widyawati	perempuan	1	8	72	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang	kurang	normal	tidak normal	normal
senni	33	tosewo	fauziah	perempuan	1	6	72	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	tidak normal	normal	tidak normal
mukhlis	27	tosewo	muh.aidil	laki-laki	3	11	84	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang	kurang	tidak normal	tidak normal	normal
pawe	39	tosewo	ervianti	perempuan	2	12	87	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang	kurang	normal	normal	normal
untung	28	tosewo	muh.zakwan	laki-laki	1	10	77	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	normal	tidak normal	normal
burhan	29	tosewo	citra	perempuan	2	14	96	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	normal	tidak normal	normal
ellung	35	tosewo	siti nuraisyah	perempuan	3	13	100	cukup	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang	kurang	normal	normal	normal
cemba	35	tosewo	gustiwi	perempuan	3	12	94	kurang	rendah	kurang	menderita	YA	TIDAK	kurang	kurang	normal	normal	normal
mini	29	tosewo	reval saputra	laki-laki	2	14	87	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	kurang	kurang	normal	normal	normal
kase	33	tosewo	indiya ayu mentari	perempuan	3	15	100	kurang	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang	kurang	normal	normal	normal
darna	28	tosewo	syahril	laki-laki	2	8	80	kurang	rendah	kurang	menderita	YA	TIDAK	cukup	cukup	tidak normal	tidak normal	tidak normal
malang	26	tosewo	anugrah	laki-laki	2	10	87	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	normal	normal	tidak normal
rase	30	tosewo	syaddiq risqula	laki-laki	5	17	104	cukup	tinggi	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	normal	normal	normal
tika	26	tosewo	harsanti	perempuan	2	11	89	cukup	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	normal	normal	normal
niar	27	tosewo	supriadi	laki-laki	4	15	100	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	normal	normal	normal
salma	29	tosewo	riska	perempuan	3	11	88	kurang	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	cukup	cukup	normal	tidak normal	normal
h.ani	30	tosewo	muh.syahril	laki-laki	2	12	90	kurang	rendah	kurang	tidak menderita	TIDAK	TIDAK	kurang	kurang	normal	normal	normal
h.eda	28	tosewo	marwa nur madina	perempuan	3	12	92	kurang	rendah	kurang	menderita	TIDAK	YA	cukup	cukup	normal	normal	normal

