

**ISOLASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DARI FRAKSI N-HEKSAN  
KULIT BUAH PISANG RAJA (*Musa paradisiaca* var Raja)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**SEPTI NURYANA MUHSIN**

**NIM: 60500113007**

ALAUDDIN  
MAKASSAR

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septi Nuryana Muhsin  
NIM : 60500113007  
Tempat/Tgl.Lahir : Pemalang, 12 September 1994  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Judul : Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder dari Fraksi N-Heksan Kulit Buah Pisang Raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 30 Agustus 2018  
Penyusun



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SEPTI NURYANA MUHSIN  
NIM: 60500113007

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder dari Fraksi N-heksan Kulit Buah Pisang Raja (*Musa paradisiaca* var Raja)**”, yang disusun oleh **Septi Nuryana Muhsin, NIM: 60500113007**, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2018 bertepatan dengan 16 Zulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dan Ilmu kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata- Gowa, 28 Agustus 2018  
16 Zulhijjah 1439 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr.M. Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Sekretaris	: H. Asri Saleh S.T, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhsin Mahfudz, M. Th. I	(.....)
Pembimbing I	: Asriani Ilyas, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sappewali, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag  
NIP: 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder dari Fraksi n-Heksan Kulit Buah Pisang Raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja)**”. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada nabi besar Muhammas saw., sahabat, tabiut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah swt.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhsin Mustara dan Ibunda Dyah Maryati atas doanya yang tulus, kesabaran, nasehat-nasehatnya kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Rismawati Sikanna S.Si., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

5. Ibu Asriani Ilyas, S.Si., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Sappewali S.Pd., M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.
6. Ibu Aisyah S.Si., M.Si selaku penguji I dan bapak Dr. Muhsin Mahfudz, M. Th. I selaku Penguji Agama yang senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis.
7. Segenap Dosen Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
8. Para Laboran Jurusan Kimia, Kak Nuraini S.Si, Kak Awaluddin, S.Si, M.Si., Kak Ahmad Yani, S.Si, Kak Andi Nurahma, S.Si, Kak Fitri Azis, S.Si., S.Pd dan Kak Ismawanti, S.Si yang telah sabar dalam mendampingi penulis dalam melakukan penelitian.
9. Sahabatku Astrini Sakinah AR, S.Si dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Keluarga besar Kimia mulai angkatan 2010, 2011, 2012 juga junior angkatan 2014, 2015 dan 2016, terkhusus untuk angkatan ELEKTRON yang menemani penulis sejak memasuki jenjang perkuliahan di jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karenanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis dan bagi pembaca umumnya

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR. ....	iv
DAFTAR ISI. ....	vii
DAFTAR TABEL. ....	x
DAFTAR GAMBAR. ....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK. ....	xii
ABSTRACT. ....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang. ....	1
B. Rumusan Masalah. ....	5
C. Tujuan Penelitian. ....	5
D. Manfaat Penelitian. ....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Uraian Tanaman Pisang Raja ( <i>musa paradisiaca</i> Var. <i>Raja</i> ). ....	7
B. Potensi Pisang Sebagai Penurun Kadar Gula Darah. ....	9
C. Senyawa Metabolit Sekunder. ....	11
1. Fenolik. ....	13
2. Alkaloid. ....	19
3. Steroid. ....	19

4. Terpen. ....	21
D. Ekstraksi. ....	21
E. Kromatografi. ....	22
F. Spektroskopi Infrared (IR). ....	25
G. Diabetes Militus (DM). ....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penelitian. ....	30
B. Alat dan Bahan. ....	30
1. Alat. ....	30
2. Bahan. ....	30
C. Metode Penelitian. ....	31-33
1. Ekstraksi kulit buah pisang raja ( <i>Musa paradisiaca</i> var.Raja). ....	31
2. Fraksinasi. ....	31
3. Pemurnian. ....	31
4. Identifikasi. ....	32
5. Kharakterisasi dengan spektrofotometer IR. ....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian. ....	35-38
1. Ekstraksi. ....	35
2. Fraksinasi. ....	35
3. Pemurnian. ....	37
4. Identifikasi. ....	37
5. Karakterisasi dengan FTIR. ....	38
B. Pembahasan. ....	38-47

1. Ekstraksi. ....	38
2. Fraksinasi. ....	39
3. Pemurnian. ....	41
4. Identifikasi. ....	41
5. Karakterisasi dengan FTIR. ....	43
6. Efektivitas fraksi N-heksan kulit buah pisang raja ( <i>Musa paradisiaca</i> Var. Raja) terhadap penurunan kadar gula darah. ....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan. ....	48
B. Saran. ....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA. ....</b>	<b>48-52</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN. ....</b>	<b>54-69</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Frekuensi inframerah beberapa golongan senyawa. ....	26
2. Hasil fraksinasi kromatografi kolom cair vakum (KKCV). ....	34
3. Uji kualitatif senyawa metabolit sekunder kulit pisang raja. ....	36
4. Mengukur hasil spektrum FTIR isolat murni. ....	37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tanaman Pisang Raja ( <i>Musa paradisiaca</i> Var. <i>Raja</i> ). .....	7
2. Struktur Khalkon Dan Dihidrochalkon. ....	14
3. Struktur Auron.....	15
4. Struktur Flavan, Flavan-3-Ol Dan Flavan-3,4-Diol. ....	15
5. Struktur Flavanon. ....	16
6. Struktur Flavon. ....	17
7. Struktur Flavonol. ....	17
8. Struktur Antosianin. ....	18
9. Struktur Cholestane dan Kolesterol.....	20
10. Hasil KLT 13 Fraksi Gabungan. ....	35
11. Hasil KLT uji tiga sistem eluen. ....	36
12. Mekanisme Reaksi Uji Liebermann-Burchard. ....	43
13. Mengukur Hasil Spektrum FTIR Isolat Murni. ....	44
14. Mekanisme Radikal Bebas.....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Penelitian. ....	54
2. Skema prosedur kerja. ....	55-57
3. Dokumentasi penelitian. ....	58-61
4. Hasil penelitian. ....	62-69



## ABSTRAK

**Nama : Septi Nuryana Muhsin**

**Nim : 60500113007**

**Judul : Isolasi senyawa metabolit sekunder dari fraksi n-heksan kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja)**

---

Pisang raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja) merupakan jenis tanaman yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi bagian kulitnya menjadi limbah yang masih kurang pemanfaatannya. Limbah kulit pisang mengandung senyawa metabolit sekunder yang berpotensi dalam menurunkan kadar gula darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada kulit pisang raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstraksi menggunakan pelarut n-heksan, kromatografi, fraksinasi, uji kualitatif dengan menggunakan uji fitokimia serta karakterisasi dengan menggunakan spektrofotometer FTIR. Hasil uji fitokimia dari isolat dengan menggunakan pereaksi Liebermann-Burchad terjadi perubahan warna dari bening menjadi hijau yang menandakan positif steroid. Hasil tersebut didukung oleh hasil karakterisasi isolat menggunakan spektrofotometer FTIR yang menunjukkan adanya gugus O-H, C=C, C=O dan C-H

**Kata kunci** : Kulit Pisang Raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja), Steroid, Isolasi.



## ABSTRACT

**Name : Septi Nuryana Muhsin**

**Nim : 60500113007**

**Title : Isolation of metabolite compounds secondary to the fraction of n-heksan  
banana King (*Musa paradisiaca* Var. Raja)**

---

Banana King (*Musa paradisiaca* Var. Raja) is a type of plant that is widely utilized by the community but the skin becomes waste that is still less utilization. Banana skin waste contains secondary metabolites which have the potential to reduce blood sugar levels. This study aims to determine the type of secondary metabolite compounds found in banana peel (*Musa paradisiaca* Var. Raja). The method used in this research is extraction using n-hexane solvent, chromatography, fractionation, qualitative test using phytochemical test and characterization by using FTIR spectrophotometer. The results of phytochemical tests of isolates using Liebermann-Burchad reagents change color from clear to green indicating positive steroids. The results were supported by isolate characterization using FTIR spectrophotometer showing the presence of group O-H, C = C, C = O and C-H

**Keywords: *Banana King (Musa paradisiaca* Var. Raja), *Steroid and Isolation.***



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada garis katulistiwa. Letak Indonesia yang berada pada garis katulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim setiap tahunnya yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini memberikan keuntungan karena dengan curah hujan yang cukup tinggi mendukung tumbuhnya beranekaragam hayati di wilayahnya. Keanekaragaman hayati ini terlihat dari berbagai spesies tumbuhan yang dapat tumbuh dengan subur di wilayah Indonesia.

Beragamnya tumbuhan baik berupa buah-buahan, sayur-sayuran maupun tumbuhan lainnya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari maupun sebagai obat tradisional. Sebagaimana Al-Qur'an telah menjelaskan tentang pengobatan dalam Q.S. Asy-Syu'araa/ 26: 80.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِدْتُ

Terjemahnya:

“dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (Kementrian Agama RI, 2006: 520).

Ayat tersebut pada kata **وَإِذَا مَرَضْتُ** yang berarti “dan apabila aku sakit”, memiliki makna bahwa penyakit terjadi bukan karena Allah swt. melainkan karena ulah manusia sendiri yang tidak menjaga kesehatannya dan melanggar apa yang dilarangkan Allah swt. namun demikian, Allah swt. memberi kesembuhan bagi orang-orang yang terus berusaha dan berikhtiar. Seorang hamba harus terus berusaha

dan yang menentukan hasilnya adalah Allah swt. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang kita dianjurkan untuk melakukan pengobatan karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan (Shihab, 2002: 258-261)

Pengobatan dapat dilakukan baik dengan mengonsumsi obat sintetik yang diperoleh dengan resep dokter maupun obat-obatan tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu kelompok tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat tradisional adalah pisang. Selain dikonsumsi sebagai bahan makanan, pisang memiliki khasiat menyembuhkan penyakit seperti pendarahan rahim, amandel, cacar, diare, liver, menurunkan tekanan darah (Dalimarta dalam Maya, 2015: 1).

Pisang merupakan jenis tumbuhan yang dapat tumbuh sepanjang tahun sehingga produksinya melimpah, dimana berdasarkan data dari badan pusat statistik nasional tahun 2012 melaporkan produksi pisang di Indonesia yaitu 6,2 juta ton pertahun (Radiya, 2013: 2). Sebagaimana Al-Qur'an telah menjelaskan tentang tumbuhan pisang dalam Q.S Al-waqiah/ 56:29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ

ALAUDDIN

Terjemahnya:

“Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya)” (Kementrian Agama RI, 2006: 781).

Ayat diatas menjelaskan Allah swt. telah menciptakan pohon pisang dengan berbagai kebaikan. Allah menumbuhkan pisang dengan jumlah buah yang melimpah, dimana tumbuhan pisang setiap berbuah akan menghasilkan beberapa susun buah dengan ukuran yang berbeda tetapi memiliki rasa yang lebih manis daripada madu (Abdullah, 2010: 573-574). Pisang dalam ayat diatas merupakan pohon pisang yang

terdapat di surga. Seperti yang diyakini bahwa surga merupakan tempat yang penuh kenikmatan dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya selalu memiliki kebaikan dan manfaat yang besar untuk penghuninya. Pohon pisang merupakan salah satu diantara buah-buahan yang Allah swt. sebutkan di dalam Al-Qur'an, hal ini menunjukkan pohon pisang merupakan buah yang istimewa dan memiliki banyak kebaikan dan manfaat untuk tubuh. Allah swt. telah menciptakan tumbuhan pisang dengan berbagai kandungan senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan dan sebagai manusia kita diperintahkan untuk berfikir dan mengambil pelajaran dari setiap ciptaan Allah swt. Seperti teori yang dikemukakan oleh Nasr (2004) mengenai manusia pontifex merupakan manusia yang dapat memahami kebaikan dan kehidupan di surga serta mampu menerapkannya dalam kehidupan didunia dengan mempelajari ciptaan-ciptaan Allah swt.

Tumbuhan pisang selain memiliki buah dengan rasa yang manis juga memiliki banyak manfaat. Pisang banyak dimanfaatkan mulai dari bagian batangnya yang dijadikan kompos, daunnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membungkus olahan makanan dan lain-lain, bagian buahnya dikonsumsi sedangkan kulit buahnya di buang. Kulit buah pisang memiliki jumlah yang melimpah yaitu sekitar 1/3 dari buah pisang yang belum di kupas (Saputra, 2016: 10).

Salah satu jenis pisang dengan limbah kulit buah yang melimpah adalah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja). Kulit pisang raja memiliki kandungan senyawa metabolit primer yaitu karbohidrat 59%, protein 0,9% dan lemak 1,7% (Munawaroh, 2015: 1). Selain itu kulit pisang raja juga mengandung senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder berfungsi sebagai pertahanan diri tumbuhan dan setiap spesies memiliki karakteristik tersendiri dalam kandungan metabolit

sekundernya. Dengan demikian, setiap metabolit sekunder memiliki sifat bioaktif tertentu (Ilyas, 2013: 5).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) yang berjudul “uji efektivitas ekstrak kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) terhadap penurunan kadar gula darah mencit jantan (*Mus musculus*)” melaporkan bahwa ekstrak kulit buah pisang raja berdasarkan uji kualitatif menunjukkan ekstrak tersebut mengandung senyawa golongan flavonoid, alkaloid dan steroid. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pane (2013), melaporkan bahwa dalam kulit pisang raja terdapat senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid dan saponin, dan pada ekstrak metanol, fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat masing-masing menunjukkan aktivitas antioksidan.

Senyawa metabolit sekunder jenis flavonoid merupakan kelompok senyawa metabolit sekunder yang banyak di temukan pada tanaman. Flavonoid memiliki efektivitas antioksidan lebih kuat daripada vitamin C dan E (Nurheti dalam Syamsuddin, 2013: 36). Metabolit sekunder jenis alkaloid juga banyak di temukan pada tumbuhan dan berfungsi sebagai racun untuk melindungi diri dari serangga dan binatang (Mukhriani, 2014: 61). Sedangkan metabolit sekunder jenis steroid selain ditemukan pada hewan juga banyak ditemukan pada tumbuhan. Pada hewan dan manusia, steroid berperan penting bagi tubuh dalam menjaga keseimbangan garam, mengendalikan metabolisme tubuh dan meningkatkan fungsi organ seksual. Steroid juga berperan sebagai antioksidan dalam menangkal radikal bebas (Nasrudin, dkk., 2017: 333).

Radikal bebas atau reactive oxygen spesies (ROS) di dalam tubuh terbentuk karena elektron bebas yang keluar akibat bocornya rantai elektron berikatan dengan

oksigen (Ajie, 2015: 71). Radikal bebas ini akan merusak sel  $\beta$  pankreas sehingga tidak terbentuk insulin dan menyebabkan penggunaan glukosa ke jaringan terhambat sehingga kadar gula darah meningkat (Prabawa, 2015: 9). Antioksidan dapat memperbaiki kerusakan sel  $\beta$  tanpa mengubah poliferasi sel  $\beta$  pankreas dengan menyumbangkan atom hidrogennya untuk berikatan dengan radikal bebas dan menjadi senyawa yang lebih stabil sehingga dapat mengurangi resistensi insulin (Ajie, 2015: 71).

Penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah di dalam tubuh disebut sebagai penyakit diabetes mellitus (DM). Penyakit DM kadang terlambat diketahui oleh penderitanya, karena penyakit DM tidak menimbulkan gejala dan menyebabkan kerusakan vaskular sebelum penyakit tersebut terdeteksi (Putri, 2015: 235). Namun demikian, DM merupakan penyakit yang menjadi penyebab kematian nomor 4 di dunia (Akinchi dalam Anas, 2015: 29). Efek buruk radikal bebas dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan konsumsi makanan sehat menyebabkan angka penderita DM semakin meningkat setiap tahunnya (Poretsky dalam Anas, 2015: 28).

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dilakukan isolasi senyawa metabolit sekunder dari fraksi n-heksan kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) dan pengaruhnya terhadap penurunan kadar gula darah.

## **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jenis senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam fraksi aktif n-heksan kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja)?

2. Bagaimana pengaruh senyawa metabolit sekunder dari fraksi aktif n-heksan kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) dalam menurunkan kadar gula darah?

### **C. Tujuan**

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam fraksi aktif n-heksan kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja).
2. Mengetahui pengaruh senyawa metabolit sekunder dari fraksi aktif n-heksan kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) dalam menurunkan kadar gula darah.

### **D. Manfaat**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjadi bahan rujukan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) oleh penelitian selanjutnya.
2. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai manfaat kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) dalam menurunkan kadar gula darah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Uraian Pisang Raja (*Musa paradisiaca* var. *Raja*)**

Pisang merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia. Pisang banyak ditanam di pekarangan rumah dan dapat tumbuh di daerah sampai ketinggian 800 meter dari permukaan laut (Atun, 2007: 83). Pisang merupakan komoditas buah tropis yang cukup berpotensi di wilayah Sulawesi Selatan dan merupakan hasil tanaman pertanian dari kelompok hortikultura. Produksi rata-rata pisang adalah 63.166 ton pertahun (Andriani, 2012: 1).

Salah satu jenis pisang yang banyak tumbuh yaitu pisang raja (*Musa paradisiaca* var. *Raja*). Menurut ahli sejarah dan botani, secara umum pisang raja (*Musa paradisiaca* var. *Raja*) berasal dari kawasan Asia Tenggara dan pulau-pulau pasifik barat yang selanjutnya menyebar ke berbagai negara beriklim tropis dan sub tropis (Andriani, 2012: 4).



**Gambar 2.1.** Pisang raja (*Musa paradisiaca* var. *Raja*).

(Sumber: Nurfadila, 2016)

Menurut Tjiptrosoepomo dalam Andriani (2012: 4), klasifikasi tanaman pisang raja adalah sebagai berikut:

Kerajaan	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Monocotyledoneae
Ordo	: Zingiberales
Famili	: Musaceae
Genus	: <i>Musa</i> L.
Spesies	: <i>Musa paradisiaca</i> var. Raja

Pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) memiliki bentuk buah yang melengkung dengan bagian pangkal buah berbentuk bulat, daging buah berwarna kuning agak kemerahan, tidak memiliki biji, empulur buah bertekstur kasar tapi memiliki rasa yang manis (Andriani, 2012: 2).

Pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) memiliki kandungan mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, kalium dan besi. Pisang juga memiliki kandungan vitamin yang sangat tinggi terutama provitamin A seperti betakaroten, dan vitamin B seperti tiamin, ribloflavin, niasin dan vitamin B6/ piridoxin (Andriani, 2012: 3). Pisang juga mengandung berbagai senyawa lain seperti air, gula pereduksi, sukrosa, pati, protein kasar, pektin, lemak kasar dan abu (Saputra, 2016: 8).

Menurut Saputra (2016), jumlah kulit pisang adalah 1/3 dari buah pisang yang belum di kupas. Kulit buah pisang masak yang berwarna kuning memiliki kandungan flavonoid dan senyawa fenolik lainnya. Kulit pisang raja memiliki kandungan karbohidrat 59%, lemak 1,7%, protein 0,9% dan serat kasar sebanyak 31,7% (Munawaroh, 2015:1).

Kulit pisang bermanfaat dalam mengobati berbagai penyakit seperti diabetes mellitus dan berbagai penyakit lainnya (Utami, 2017). Kulit pisang juga diolah menjadi tepung yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bioplastik ramah lingkungan (Munawaroh, 2015). Selain itu, ekstrak kulit pisang dapat dijadikan sebagai bahan alami dalam pembuatan salep antiinflamasi (Nastiti, 2015).

### **B. Potensi pisang sebagai penurun kadar gula darah**

Pisang memiliki potensi yang besar sebagai penurun gula darah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017), yang melaporkan bahwa kulit pisang raja efektif dalam menurunkan kadar gula darah. Dimana ekstrak n-heksan kulit pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) memiliki efektivitas tinggi dibandingkan dengan ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol yaitu sekitar 18,8116%. Kulit pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid yang berfungsi sebagai antioksidan yang berperan dalam menurunkan kadar gula darah. Efektivitas flavonoid dan alkaloid sebagai antioksidan memperbaiki kerusakan pada sel  $\beta$  pankreas dan memperbaiki sekresi insulin sehingga dapat menurunkan kadar gula darah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pane (2013), juga melaporkan bahwa kulit pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) memiliki efektivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan kulit buah pisang ambon dan kulit buah pisang mas. Kulit buah pisang raja mengandung senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid dan saponin yang merupakan senyawa yang berperan sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan menghambat peroksida lipid. Ekstrak metanol kulit buah pisang raja memiliki efektivitas antioksidan yang dapat menghambat peroksida lipid. Fraksi n-heksan kulit buah pisang raja memiliki efek antioksidan yang tinggi dibandingkan dengan fraksi metanol kulit buah pisang

raja tetapi efektivitas antioksidan dalam menghambat peroksida lipid terbesar adalah pada fraksi etil asetat.

Beberapa jenis pisang lainnya juga telah dibuktikan efektivitasnya dalam menurunkan kadar gula darah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2017) yang melaporkan bahwa pisang kepok (*Musa paradisiaca* L) memiliki efek penurunan kadar gula darah. Ekstrak etil asetat kulit buah pisang kepok memiliki efektivitas penurunan kadar gula darah paling tinggi dibandingkan dengan ekstrak n-heksan dan ekstrak metanol kulit buah pisang kepok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2017) diketahui bahwa pada pisang kepok terdapat senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid, dimana telah diketahui bahwa senyawa golongan flavonoid berperan sebagai antioksidan dan terbukti berperan pula dalam menurunkan kadar gula darah.

Kulit pisang ambon dan kulit pisang goroho juga memiliki efektivitas dalam menurunkan kadar gula darah. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, dkk (2015) yang melaporkan efektivitas kulit pisang jenis pisang ambon dalam menurunkan kadar gula darah. Penelitian Indrawati, dkk (2015) melaporkan bahwa ekstrak dari kulit pisang ambon (*Musa paradisiaca* L) memiliki efektivitas terhadap penurunan kadar gula darah dibandingkan dengan metformin yang merupakan obat penurun kadar gula darah sintetik dan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin, dkk (2013) melaporkan bahwa kulit buah pisang goroho (*Musa acuminata* L.) berpotensi dalam menurunkan kadar gula darah, dimana pada pisang goroho terdapat senyawa metabolit sekunder jenis flavonoid yang berperan sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas sehingga dapat mengurangi stres oksidatif (mengurangi resistensi insulin dan mencegah timbulnya

penyakit krinis seperti diabetes). Ekstrak kulit pisang goroho memiliki efek penurunan kadar gula darah yang hampir sama dengan obat metformin yang dalam penelitian ini digunakan sebagai kontrol positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak dari kulit pisang memiliki efektivitas dalam penurunan kadar gula darah karena kandungan senyawa metabolit sekunder yang berperan sebagai antioksidan khususnya senyawa metabolit golongan flavonoid.

### **C. Senyawa metabolit sekunder**

Senyawa metabolit terdiri atas 2 yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Senyawa metabolit primer diproduksi tumbuhan pada masa pertumbuhan dan merupakan komponen utama yang terlibat langsung dalam proses pertumbuhan. Metabolit primer secara makro terdiri atas 4 golongan utama yaitu karbohidrat yang merupakan senyawa paling melimpah dan dibutuhkan oleh makhluk hidup dengan rumus molekul  $(CH_2O)_n$ . Karbohidrat berfungsi sebagai pembangun struktur seperti dinding sel maupun sebagai sumber energi. Selain karbohidrat, makromolekul yang lain adalah lipid, protein dan asam nukleat. Lipid merupakan golongan senyawa yang tidak larut dalam air dan berfungsi sebagai senyawa yang digunakan untuk menyimpan energi dan menyusun struktur sel seperti fosfolipid yang membentuk membran sel. Makromolekul protein berfungsi sebagai biokatalis berbagai reaksi metabolisme, pembangun struktur organisme, sebagai molekul pengangkut, sebagai pertahanan tubuh organisme dan molekul regulator dalam proses metabolisme. Sedangkan asam nukleat merupakan makromolekul yang berperan khusus dalam proses metabolisme. Asam nukleat terdiri atas 2 yaitu *deoxy ribose nucleic acid* (DNA) dan *ribose nucleic acid* (RNA) (Raharjo, 2013: 19-24).

Metabolit sekunder merupakan senyawa yang esensial untuk hidup dan tumbuh, disintesis setelah masa pertumbuhan dari satu atau lebih metabolit primer dengan berbagai jalur metabolisme dan bersifat spesifik pada suatu spesies. Metabolit primer dan metabolit sekunder memiliki keterkaitan, dimana metabolit sekunder dalam fungsinya memerlukan prekursor yang berasal dari metabolit primer seperti asetil-CoA yang berperan sebagai prekursor biosintesis metabolit sekunder golongan isoprenoid, terpenoid dan poliketida, eritrosa sebagai prekursor asam shikimat yang merupakan metabolit sentral dalam biosintesis senyawa aromatis seperti asam amino fenilalanin tirosin dan triptofan serta metabolit golongan fenilpropanoid dan flavonoid, sedangkan asam amino secara umum merupakan prekursor metabolit alkaloid (Raharjo, 2013: 42-45).

Metabolit sekunder memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai perlindungan terhadap serangan mikroba, dimana metabolit sekunder akan diinduksikan dan disintesis di sekitar sel yang terinfeksi mikroba. Metabolit sekunder juga menjadi perlindungan terhadap serangan atau gangguan herbivora, dimana metabolit sekunder berperan sebagai pestisida alami pada tumbuhan, sebagai perlindungan terhadap gangguan lingkungan, dimana metabolit sekunder akan melindungi dari UV yaitu dengan mensintesis antosianin dan osmoproteksi dengan mensintesis prolin, glisin dan betain. Metabolit sekunder juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain disekitarnya (fungsi kompetisi) dan menarik serangga pollinator dan hewan herbivora untuk membantu pembuahan dan penyebaran biji (Ilyas, 2013: 5).

Metabolit sekunder terdiri atas 4 kelompok besar yaitu kelompok terpenoid (senyawa yang bersifat volatil) contohnya karotenoid, kelompok steroid (lemak) contohnya kolestrol dan hormon adrenal, kelompok fenolat (sistem cincin aromatik yang memiliki gugus hidroksil fenolik) contohnya flavonoid, lignin, kumarin, tannin dan stilben, serta kelompok alkaloid (senyawa yang mengandung basa nitrogen) (Ilyas, 2013: 7).

### 1. Fenolik


Senyawa fenolik merupakan senyawa yang paling banyak ditemukan di hampir semua bagian tanaman seperti akar, batang, daun buah dan sebagainya. Senyawa fenolik merupakan kelompok senyawa bahan alam dengan cincin aromatik yang mengandung satu atau lebih substituen hidroksil. Cincin aromatik pada senyawa fenolik menunjukkan serapan yang kuat pada daerah serapan spectrum UV dan menunjukkan pergeseran batokromik jika ditambahkan dengan pereaksi geser seperti NaOH dan pereaksi geser lainnya (Ilyas, 2013: 63). Fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang dapat disintesis tumbuhan, sebagai respon terhadap berbagai kondisi seperti infeksi, radiasi UV, dan lain sebagainya. Pada tumbuhan, fenolik dapat bertindak sebagai *antifeedants*, *atraktan* untuk penyerbuk, *kontributor pigmentasi* tanaman, *antioksidan*, sebagai pelindung dari berbagai jenis parasit dan paparan suhu ekstrim (Arif dan Tukiran, 2015: 105).

Fenolik yang paling banyak di alam yaitu flavonoid. Flavonoid adalah metabolit sekunder yang memiliki struktur inti  $C_6-C_3-C_6$  yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan dengan 3 atom C, biasanya dengan ikatan atom O yang berupa ikatan heterosiklik (Hanani, 2015: 103). Metabolit sekunder yang seperti flavonoid yang memberikan kontribusi keindahan warna dan kesemarakkan pada bunga dan

buah-buahan di alam. Flavonoid memberikan warna kuning dan jingga, antosianin memberikan warna merah, biru atau ungu yaitu semua warna yang terdapat pada pelangi kecuali warna hijau. Secara biologis, flavonoid memainkan peranan penting dalam kaitan penyerbukan pada tanaman oleh serangga. Sejumlah flavonoid mempunyai rasa pahit hingga dapat bersifat menolak sejenis ulat tertentu (Sastrohamidjojo, 1996: 140).


Flavonoid pada tumbuhan biasanya terdapat dalam bentuk glikosida baik sebagai flavonoid O-glikosida atau flavonoid C-glikosida. Flavonoid O-glikosida merupakan flavonoid yang satu atau lebih gugus hidroksilnya dengan adanya asam. Akibat ikatan ini flavonoid menjadi kurang reaktif dan lebih mudah larut dalam pelarut polar (Hanani, 2015: 104).

Khalkon merupakan flavonoid minor yang jumlahnya terbatas di alam. Khalkon memiliki kerangka unik dan berbeda dengan senyawa flavonoid lainnya yaitu pada struktur karbon tiga (C3) berbentuk rantai terbuka yang menghubungkan cincin A dan cincin B pada cincin heterosiklik C untuk kerangka flavonoid utama. Khalkon merupakan senyawa yang penting karena merupakan prekursor pembentuk secara langsung dari semua jenis flavonoid lainnya (Ilyas, 2013: 76). Khalkon merupakan golongan flavonoid yang terdapat sebagai pigmen bunga kuning, kadang-kadang terdapat dalam jaringan lain dengan ciri khasnya jika ditambahkan ammonia akan menghasilkan warna merah (Harborne. 1987: 69).




**Gambar 2.1.** Struktur khalkon dan dihidrokalkon.  
(Sumber: Ilyas, 2013)

Auron merupakan golongan flavonoid yang memiliki pigmen bunga kuning, kadang-kadang terdapat dalam jaringan lain. Auron memiliki ciri khas yaitu jika ditambahkan ammonia akan menghasilkan warna merah (Harborne, 1987: 69). Auron pada pengujian dengan spektrofotometer Uv-Vis memiliki rentangan serapan spectrum pita I yaitu 380-430 dan pita II memiliki kekuatan spectrum yang lemah yaitu 230-270 (Aziz dan Ratna, 2013: 4).



**Gambar 2.1.** Struktur auron  
(Sumber: Ilyas, 2013)


Flavan merupakan senyawa flavonoid minor dan merupakan kerangka utama dan terdapat senyawa-senyawa flavan tersubstitusi dengan gugus hidroksil yaitu flavanol (Ilyas, 2013: 84-85). Flavanol merupakan golongan flavonoid yang tersebar dalam ko-pigmen dan warna dalam bunga sianik dan asianik, tersebar luas dalam daun. Memiliki ciri khas yakni setelah dihidrolisis muncul bercak kuning pada kromatogram forestal (Harborne, 1987: 69).



**Gambar 2.2.** Struktur flavan, flavan-3-ol dan flavan-3,4-diol.  
(Sumber: Ilyas, 2013)


Isoflavon merupakan salah satu jenis flavonoid yang banyak tersebar pada tanaman berwarna, sering kali dalam akar, atau pada tumbuhan yang satu suku, Leguminosae. Ciri khasnya yaitu dapat larut dalam air panas dan bergerak pada kertas dengan pengembang air namun tidak ada uji warna yang khas. Biflavonil merupakan jenis flavonoid yang tersebar pada tanaman berwarna namun hampir seluruhnya terbatas pada gimnospermae. Biflavonil memiliki ciri khas yaitu pada kromatogram BAA berupa bercak redup dengan Rf tinggi (Harborne, 1987: 69). Selain itu juga terdapat flavonoid jenis biflavonoid yang merupakan flavonoid dimer. Flavonoid yang biasa terlibat ialah flavanon dan flavon yang secara biosintesis mempunyai pola oksigenasi yang sederhana 5, 6, 7, 3', 4' dan terkadang berikatan karbon atau berikatan dengan eter (Geiger dan Quinn dalam Markham, 1988: 8).

Flavanon adalah jenis golongan flavonoid yang tersebar pada daun dan buah terutama pada buah jeruk memiliki ciri khusus yaitu menghasilkan warna merah kuat dengan penambahan Mg/HCl, kadang sangat pahit (Harborne, 1987: 69).




**Gambar 2.3.** struktur flavanon.  
(Sumber: Ilyas, 2013)

Flavon merupakan salah satu golongan flavonoid yang memiliki ciri khusus yakni setelah terhidrolisis akan menimbulkan bercak coklat redup pada kromatogram forestal (Harborne, 1987: 69). Flavon mudah diurai dengan alkali dan menghasilkan diasilmetan. Flavon stabil terhadap asam kuat dan umumnya mudah didealkilasi dengan penambahan asam HBr atau dengan  $AlCl_3$  dalam pelarut inert (Ilyas, 2013: 89). Glikoflavon merupakan jenis golongan flavonoid yang memiliki ciri khas yaitu mengandung gula yang berikatan melalui ikatan C-C, bergerak dengan pengembang air, tidak seperti flavon biasa (Harborne, 1987: 69).



**Gambar 2.4.** Struktur flavon.  
(Sumber: Ilyas, 2013)


Flavonoid jenis lainnya yaitu flavonol yang banyak tersebar pada ko-pigmen tanaman berwarna dalam bunga sianik dan asianik tersebar luar dalam daun. Ciri khasnya yaitu setelah dihidrolisis timbul bercak kuning murup pada kromatogram forestal bila disinari dengan sinar UV (Harborne. 1987: 69).



**Gambar 2.5.** Struktur flavonol.

(Sumber: Ilyas, 2013)

Proantosianidin banyak ditemukan pada tanaman berwarna dan daun tumbuhan kayu. Memiliki ciri-ciri khusus seperti menghasilkan antosianidin (warna dapat diekstraksi dengan amil alkohol) bila jaringan dipanaskan dalam HCL 2M setelah setengah jam (Harborne. 1987: 69). Sebagian besar antosianin alam adalah glikosida (posisi 3 atau 3,5-) dari bentuk antosianidin. Antosianin merupakan kelompok flavonoid utama pembentuk warna dasar sianik (pigmen) pink, merah, ungu maupun biru gelap (Ilyas, 2013: 92). Antosianin merupakan golongan flavonoid yang tersebar dalam pigmen bunga merah marak, merah senduduk dan biru juga dalam daun dan jaringan lain. Ciri khas dari flavonoid jenis antosianin yaitu larut dalam air (Harborne. 1987: 69).



**Gambar 2.6.** Struktur antosianin.

(Sumber: Ilyas, 2013)

Flavonoid merupakan senyawa polar dengan gugus hidroksil atau gula sehingga mudah larut dalam pelarut polar dan air (Ilyas, 2013: 74). Flavonoid khususnya dalam bentuk glikosida akan mengalami dekomposisi oleh enzim jika

dalam bentuk masih segar atau tidak kering. Beberapa flavonoid yang bersifat kurang polar (isoflavon, flavanon, flavonetermetilasi dan flavonol) dapat diekstraksi menggunakan pelarut dengan polaritas rendah, seperti kloroform dan eter.

Senyawa flavonoid memiliki sifat sebagai pereduksi yang baik, dapat menghambat banyak reaksi oksidasi, baik secara enzimatik maupun non enzimatik. Flavonoid bertindak sebagai penangkal yang baik terhadap radikal hidroksi dan superoksida sehingga dapat melindungi membran lipid dari reaksi-reaksi yang dapat berefek buruk dan menyebabkan kerusakan sel (Ilyas, 2013: 74). Flavonoid sebagai antioksidan alami bekerja menghambat dan memperlambat proses oksidasi yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas dengan melengkapi kekurangan satu elektron yang dimiliki radikal bebas yang dapat menimbulkan terjadinya stres oksidatif. Senyawa flavonoid menghambat terbentuknya metabolit reaktif yang dapat berikatan dengan makromolekul jaringan sehingga mencegah kerusakan jaringan, karena ketika flavonoid bereaksi dengan radikal bebas maka flavonoid akan mendonorkan proton dan menjadi senyawa radikal. Tetapi elektron tidak berpasangan yang dihasilkan akan di delokalisasi oleh resonansi sehingga membuat senyawa flavonoid radikal memiliki energi yang sangat rendah untuk menjadi radikal yang reaktif (Erni, dkk., 2014: 95).

## **2. Alkaloid**

Senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid banyak terdapat pada tanaman berbunga, *angiospermae*. Alkaloid juga ditemukan pada hewan, serangga, organisme laut, mikroorganisme dan tanaman rendah. Alkaloid adalah suatu kelompok senyawa yang banyak terdapat pada sebagian besar tanaman bunga. Kelompok tertentu alkaloid dihubungkan dengan famili atau genera tanaman tertentu. Kebanyakan famili

yang memiliki kandungan alkaloid adalah *Liliacea*, *Solanaceae* dan *Rubiaceae*. Selain itu terdapat famili yang tidak lazim mengandung alkaloid yaitu *Papaveraceae*. Kebanyakan dalam famili yang berasal dari satu genus mengandung alkaloid yang sama. Senyawa golongan alkaloid memiliki sifat basa, dimana sifat ini tergantung dari adanya pasangan elektron pada nitrogen. Jika gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron sebagai contoh gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen naik sehingga senyawa bersifat lebih basa (Sastrohamidjojo, 1996: 209)


### 3. Steroid

Senyawa metabolit golongan steroid adalah senyawa bahan alam yang terbentuk dari jalur biogenesis yang sama dengan terpenoid. Steroid merupakan terpenoid lipid dengan empat cincin kerangka dasar karbon yang menyatu. Steroid memiliki struktur senyawa yang beragam karena adanya gugus fungsi teroksidasi yang terikat pada cincin dan cincin karbonnya dapat teroksidasi (Nasruddin, dkk., 2017: 333).


Steroid membentuk kelompok senyawa yang terkait secara struktural pada turunannya memiliki fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan hidup organisme. Beberapa steroid yang umum dikenal diantaranya adalah steroid jenis sterol (misalnya: vitamin D, hormon seks, asam empedu, karsinogenik dan sapogenin tertentu). Senyawa-senyawa steroid terdistribusi secara luas baik pada bahan alam darat maupun bahan alam laut. Sterol terbentuk pada hewan dan tumbuhan yang mengandung minyak dan lemak rantai panjang. Steroid yang diperoleh dari sumber hewan diistilahkan sebagai *zoosterol* dan yang diperoleh dari bahan tumbuhan

diistilahkan sebagai *fitosterol*. Kelompok sterol ketiga yang diperoleh dari ragi dan jamur disebut sebagai *mycoesterol* (Ilyas, 2013: 43-50).

Sterol adalah triterpena yang kerangka dasarnya adalah cincin siklopentana perhidrofenantrena. Sterol umumnya terdapat dalam bentuk bebas dan sebagai glukosida sederhana. Salah satu jenis sterol adalah fukosterol yang merupakan sterid yang ditemukan pada tumbuhan. Selain itu juga terdapat sterol dalam bentuk lain seperti kolesterol (Harborne, 1987: 148).



**Gambar 2.7.** Struktur cholestane  
(Sumber: Tonius, 2016)



**Gambar 2.8.** Struktur kolesterol  
(Sumber: Lenni, 2006)

#### 4. Terpen

Senyawa metabolit lainnya yaitu golongan terpen, dimana terpen merupakan nama yang diberikan kepada senyawa yang mempunyai perumusan molekul  $C_{10}H_{16}$  yang secara etimologi berasal dari pohon terebinth, *Pistacia terebinthus*. Volatilitas terpen dapat dikenali dengan mudah dalam tanaman yang berbau harum, selain itu senyawa terpen dapat diisolasi dengan mudah dengan cara destilasi dari daun, batang dan bunga dari tanaman, dimana hasil dari destilasi dikenal sebagai minyak “*essential*” atau disebut juga minyak atsiri (Sastrohamidjojo, 1996: 78-79).

Kebanyakan senyawa terpenoid terdapat bebas dalam jaringan tanaman, tidak terikat dengan senyawa-senyawa lain, tetapi banyak diantara senyawanya yang terdapat sebagai glikosida, ester dari asam organik dan dalam beberapa hal terikat

dengan protein. Anggota yang rendah (senyawa  $C_{10}$  dan  $C_{15}$ ) sering dapat diperoleh dengan cara distilasi uap dengan tanaman yang segar atau kering sedangkan anggota yang lebih tinggi ( $C_{20}$  atau lebih) biasanya diisolasi dengan cara ekstraksi dengan pelarut kemudian dipisahkan dan dimurnikan dengan cara kristalisasi, destilasi dan kromatografi (Sastrohamidjojo, 1996: 78-79).

#### **D. Ekstraksi**

Ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa dari matriks atau simplisia dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Metode ekstraksi yang digunakan tergantung pada jenis, sifat fisik dan sifat kimia dari kandungan senyawa yang akan di ekstraksi. Proses ekstraksi menggunakan pelarut disesuaikan dengan polaritas dari senyawa yang akan di ambil. Simplisia yang akan di ambil dapat berupa simplisia segar ataupun simplisia yang telah dikeringkan (Hanani, 2015: 10).

Salah satu jenis ekstraksi yang banyak digunakan adalah maserasi. Maserasi merupakan jenis ekstraksi dingin atau tanpa melalui proses pemanasan. Maserasi merupakan metode pemisahan senyawa dari simplisia dengan cara merendam simplisia dalam pelarut pada suhu kamar sehingga dapat mengurangi kerusakan senyawa metabolit pada simplisia. Proses yang terjadi pada maserasi yaitu pelarut akan memecah dinding sel akibat perbedaan konsentrasi di dalam dan diluar sel sehingga senyawa yang terdapat di dalam sel akan berpindah keluar dari sel dan pelarut akan masuk ke dalam sel sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi di dalam dan di luar sel (Hanani, 2015: 10-11).

Maserat yang diperoleh dengan proses maserasi kemudian dipekatkan dengan menggunakan alat rotary evaporator yang akan memekatkan larutan dengan memisahkan ekstrak dari pelarut yang menggunakan pemanasan pada suhu kontan

berkisar antara 30°C sampai 40°C sehingga dapat diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental dapat membentuk kristal jika di diamkan. Kristal yang terbentuk dapat berupa kristal tunggal yang dapat di murnikan dengan proses rekristalisasi. Kristal dapat juga terdiri dari berbagai zat sehingga perlu dilarutkan kembali dan dipisahkan zat yang ingin di ambil dengan menggunakan kromatografi (Harborne, 1987: 6-7).

### **E. Kromatografi**

Kromatografi berasal dari kata latin *chroma* yang berarti warna dan *graphien* berarti menulis. Kromatografi pertama kali diperkenalkan oleh Michael Tswest (1903) seorang ahli botani dari Rusia yang berhasil memisahkan klorofil dan pigmen-pigmen warna lainnya dalam ekstrak tumbuhan dengan menggunakan serbuk kalsium karbonat yang di isikan ke dalam kolom kaca yang selanjutnya dialiri dengan pelarut petroleum eter (Alimin, 2007: 73). Beberapa jenis kromatografi yaitu kromatografi lapis tipis (KLT) dan kromatografi kolom.

Kromatografi lapis tipis dikembangkan oleh Izmailof dan Scahraibeer pada tahun 1938. Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan bentuk kromatografi lapis planar, selain kromatografi kertas dan elektroforesis. Kromatografi lapis tipis yang bertindak sebagai fase diam adalah lapisan seragam (*uniform*) pada permukaan bidang datar berupa kaca, pelat aluminium ataupun pelat plastik (Chadijah, 2014: 47). Lapisan tipis adsorben yang merupakan fase diam sebenarnya berupa alumina, silica gel, selulosa, dan dapat berupa material lainnya. Sedangkan fase geraknya adalah pelarut, dimana pelarut akan bergerak naik pada fase diam (Alimin, 2007: 73). Kromatografi lapis tipis mempunyai keuntungan yaitu membutuhkan waktu yang lebih cepat serta diperoleh pemisahan yang lebih baik. Kromatografi lapis tipis dapat

digunakan dalam memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik, seperti lipida-lipida dan hidrokarbon (Sastrohamidjojo, 2007: 27-28).

Kromatografi lapis tipis preparatif merupakan jenis kromatografi yang dilakukan dengan menggunakan lapisan tebal silika (sampai 1 mm) pada pelat sebagai pengganti lapisan silika yang tipis (0,1mm-0,25mm) pada plat KLT biasa (Harborne, 1987: 14). Kromatografi lapis tipis preparatif berfungsi memisahkan senyawa dari sampel dalam jumlah besar berdasarkan fraksinya (Fariddatusaadah, dkk., 2016: 144). Kromatografi lapis tipis preparatif bertujuan untuk mengisolasi senyawa metabolit sekunder satu persatu dengan cara bercak yang sesuai digunting atau dikerok dari setiap kromatogram, kemudian digabungkan dan dimaserasi dengan larutan yang cocok (aglikon dengan MeOH dan glikosida dengan MeOH-H<sub>2</sub>O, 1:1). Setelah dibiarkan beberapa jam, sambil kadang-kadang dikocok terus menerus, cairan dituang. Ekstraksi dilakukan secara berulang agar lebih efisien. Selanjutnya ekstrak digabung, disaring dan diuapkan sampai kering. Pemisahan lebih lanjut dapat dilakukan dengan Kromatografi lapis tipis menggunakan pengembang yang berbeda (Markham, 1988: 26). Kelebihan dari kromatografi lapis tipis preparatif yaitu dapat digunakan berulang-ulang dengan pengembang sama ataupun pengembang yang berbeda dengan cara mengeringkan pelat sebelum menggunakan pengembang yang berbeda (Harborne, 1897: 15).

Kromatografi kolom merupakan suatu metode pemisahan suatu senyawa menggunakan bantuan kolom dimana fase diam di dalam kolom dapat dipilih silika gel atau alumina. Kromatografi kolom ini memiliki fase diam berupa gel yang terbuat dari dekstran, suatu bahan yang berasal dari hasil ikatan silang molekul-molekul polisakarida. Bahan ini apabila dimasukkan dalam air akan menggelembung

dengan membentuk saringan berpori dengan ukuran pori-pori tertentu. Dimana pori-pori akan menjerat komponen atau molekul-molekul zat berdasarkan perbedaan ukurannya (Alimin, dkk., 2007: 77-78). Kolom yang diisi dengan fase diam dan sampel dimasukkan ke dalam kolom kemudian di aliri dengan pelarut yang sesuai. Pelarut yang mengalir kolom akan mengangkut senyawa-senyawa yang merupakan komponen-komponen dari sampel melalui pori-pori dari fase diam sehingga pemisahan dapat dilakukan. Komponen yang terbawa pelarut keluar dari kolom akan ditampung ke dalam botol-botol (Sastrohamidjojo, 2007: 2-3). Kekurangan metode ini adalah fase diamnya terbatas dan proses pemisahan kurang sempurna (Alimin, dkk., 2007: 77).

Kromatografi kolom flash merupakan kromatografi dengan tekanan rendah yaitu dibawah 20 psi. kromatografi ini memanfaatkan gaya gravitasi dalam proses pemisahan komponen senyawa dari sampel dengan kualitas pemisahan sedang. Kromatografi jenis ini kurang baik digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki banyak komponen tetapi baik digunakan untuk memisahkan komponen zat di dalam reaksi organik (Lestari, 2011: 10). Kromatografi cair vakum merupakan kromatografi kolom yang menggunakan kolom kromatografi dan dihubungkan dengan pompa vakum yang diisi dengan TLC (10-40  $\mu$ g) sehingga prosesnya lebih cepat (Atun, 2007: 57).

#### ***F. Spektroskopi infrared***

Spektrofotometer inframerah merupakan alat yang dapat digunakan dalam menentukan spektrum serapan suatu senyawa. Spektrofotometer menentukan kekuatan dan kedudukan relatif dari semua serapan dalam daerah inframerah dan melukiskannya pada kertas grafik yang telah dikalibrasi. Spektrum inframerah

menyatakan intensitas serapan lawan bilangan gelombang atau panjang gelombang (Sastrohamidjojo, 1992: 12).

Spektrofotometer inframerah memiliki komponen pokok yaitu sumber radiasi inframerah, monokromator dan detector. Sumber radiasi inframerah akan memancarkan sinar dan mengenai sampel yang akan dianalisis, dimana sumber radiasi inframerah yang digunakan adalah Nerts glower dang globar. Nerts glower merupakan tabung hampa dari Zirkonium dan Yttrium oksid yang dipanaskan dan mempunyai suhu  $750^{\circ}\text{C}$  -  $1200^{\circ}\text{C}$ , tetapi nerts glower memiliki waktu hidup yang pendek, sedangkan globar memiliki sifat yang mudah teroksidasi dan tidak dapat dioperasikan pada suhu yang lebih tinggi tanpa mengurangi waktu hidupnya. Monokromator terdiri dari prisma atau grating, dimana sinar yang didispersikan oleh prisma tergantung pada indeks biasnya yang berubah dengan perubahan frekuensi radiasi. Spektrofotometer inframerah memiliki tiga macam detector yaitu bolometer, termokopel dan sel pneumatic golay. Ketiga detektor bekerja berdasarkan pengaruh panas yang dihasilkan bila radiasi inframerah diserap dari berkas sinar yang mengenainya (Sastrohamidjojo, 1992: 138-139).

Spektrofotometer inframerah memiliki prinsip kerja yaitu sinar radiasi inframerah akan dipancarkan melewati sampel dan diteruskan ke monokromator yang selanjutnya di deteksi oleh detektor yang terhubung ke komputer. Komputer akan membaca dan menampilkan hasil analisis berupa spektrum yang dapat dibaca dengan analisis elusidasi struktur berupa struktur kimia dan bentuk ikatan molekul serta gugus fungsional pada sampel yang di uji (Sari, 2011: 17).

Spektrum inframerah suatu senyawa merupakan sidik jari molekul senyawa tersebut. Suatu senyawa memiliki ikatan dan frekuensi vibrasi yang berbeda sehingga

menimbulkan spektrum yang spesifik untuk tiap senyawa. Pengukuran spektrum inframerah dilakukan pada bentuk padat dalam campuran dengan kalium bromida atau bentuk cair dalam kloroform atau minyak nuyol. Manfaat spektrum inframerah yaitu banyak gugus fungsi yang memiliki frekuensi getaran pada bilangan gelombang khusus (Hanani, 2015: 27-28). Spektrum inframerah memiliki kegunaan yang sangat penting, dimana spektrum inframerah menunjukkan gugus fungsi dari suatu senyawa. Serapan setiap tipe ikatan (N-H, C-H, O-H, C-X, C=O, C-O, C-C, C=C, C=N dan sebagainya) hanya diperoleh pada bagian kecil tertentu dari daerah vibrasi inframerah (Sastrohamidjojo, 1992: 4).

Menurut Hanani (2014: 28), Frekuensi inframerah beberapa golongan senyawa dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2.2.** Frekuensi inframerah beberapa golongan senyawa

Golongan senyawa	Daerah frekuensi pita khas (cm <sup>-1</sup> )
Alkana	2940, 2850, 1450 dan 1375
Alkena	3050, 1850, 1650 dan 1410
Alkuna	2250-2100
Asetilen	3310, 2225, 2150, 1300
Amina	3500, 3400-3100, 1610
Aldehid dan Keton	2750, 2680, 1740-1700
Alkohol dan Fenol	3610, 3600-2400
Asam Karboksilat	3520, 3400-2500, 1760, 1710
Isosianat	2270

### **G. *Diabetes militus (DM)***

Diabetes mellitus berasal dari bahasa Yunani Diabainein yang berarti tembus atau pancuran air, dan Mellitus yang berarti rasa manis (Suryono dan Sevin, 2012: 20). Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kelainan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis sehingga mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Penyakit DM dapat terjadi karena faktor obesitas, genetik, pertambahan usia, kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak seimbang (Azrimaidaliza, 2011: 1-2).

Diabetes mellitus mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menangani glukosa (gula) sehingga dapat menyebabkan gangguan pada kerja organ lainnya. Kadar trigliserida yang tinggi sering ditemukan pada pasien yang menderita diabetes mellitus. Kadar gula darah yang terlalu tinggi akan beresiko menyebabkan terjadinya jantung koroner (Anies, 2015: 53-54).

Menurut Azrimaidaliza (2011), klasifikasi DM adalah sebagai berikut: Tipe 1, ditandai dengan kegagalan produksi insulin yang parsial atau total oleh sel-sel B pankreas. Tipe 2, ditandai dengan resistensi insulin ketika hormon insulin diproduksi dengan jumlah yang tidak memadai atau kurang sehingga menjadi tidak efektif. Tipe 3, terjadi defek genetik pada fungsi sel-B, defek genetik pada kerja insulin. Diabetes gestasional merupakan diabetes yang di derita oleh ibu hamil.

Penderita DM akan mengalami gejala seperti selalu buang air kecil, banyak minum, banyak makan tetapi mengalami penurunan berat badan (Putri dan Muhammad, 2013: 234). Penderita DM bisa disebabkan karena 2 faktor penyebab

yang mendasar yaitu karena adanya kelainan pada sel beta dan karena adanya kelainan pada jaringan perifer yang berlanjut pada disfungsi sel beta pankreas. Kelainan sel beta pankreas akan menyebabkan pankreas tidak dapat menghasilkan hormon insulin dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Sedangkan fungsi hormon insulin sangat diperlukan untuk mengangkut gula darah atau glukosa ke dalam sel-sel tubuh sehingga kekurangan hormon insulin akan menyebabkan kadar glukosa di dalam darah menjadi tinggi. Kelainan pada jaringan perifer akan menyebabkan disfungsi beta pankreas yang menyebabkan keterlambatan sekresi insulin yang tidak seimbang dengan banyaknya glukosa yang masuk ke dalam aliran darah sehingga jumlah insulin yang efektif belum mencukupi, jumlah reseptor insulin di jaringan perifer kurang, kualitas reseptor insulin tidak efektif sehingga akan menyebabkan kadar glukosa darah menjadi tinggi. Jumlah insulin yang menurun di dalam tubuh akan menyebabkan gula darah meningkat dan menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh (Suryono dan Sevin, 2012: 24).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Juni 2017- Februari 2018 bertempat di Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Analitik dan Laboratorium Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

#### B. Alat dan Bahan

##### 1. Alat

Alat yang digunakan adalah *FTIR Nicolet iS10*, *rotary evaporator*, kromatografi kolom vakum cair (KKCV), rangkaian alat destilasi, lampu UV 254-366 nm, neraca analitik, oven, blender, *hot plate*, pipet skala, *chamber*, gelas kimia, pipet tetes, botol vial, botol gelap, wadah fraksi, toples, porselin tetes, pipa kapiler, gunting, cutter, spatula, pinset dan mistar.

##### 2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah asam sulfat pekat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), aseton ( $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ ), aquades ( $\text{H}_2\text{O}$ ), besi (III) klorida ( $\text{FeCl}_3$ ) 5% dan 1%, etil asetat ( $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ ), kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja), klorofom ( $\text{CHCl}_3$ ), n-heksan ( $\text{C}_6\text{H}_{14}$ ), natrium hidroksida ( $\text{NaOH}$ ) 10%, metanol ( $\text{CH}_3\text{OH}$ ), pereaksi dragendoff, pereaksi lieberman-burchard, pereaksi mayer, pereaksi wagner, plat KLT, silika  $G_{60}$  (230-400 mesh) no. katalog 7330, 7733 dan vaselin.

### ***C. Metode Penelitian***

#### **1. Ekstraksi kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja)**

Kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) dibersihkan, di potong-potong dan dijemur pada suhu kamar hingga kering. Kulit buah kering diblender hingga membentuk serbuk. Serbuk kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) selanjutnya ditimbang sebanyak 500 gram dan dimaserasi selama 1x24 jam menggunakan pelarut n-Heksan ( $C_6H_{14}$ ), diulang sebanyak 3 kali. Maserat disaring dan diuapkan dengan menggunakan *rotary evaporator* hingga membentuk ekstrak kental.

#### **2. Fraksinasi**

Analisis menggunakan KLT dengan larutan pengembang (eluen) terhadap ekstrak kental n-heksan hingga diperoleh eluen yang sesuai. Kemudian ekstrak kental n-heksan difraksinasi dengan kromatografi kolom cair vakum (KKCV) menggunakan silika sebagai fase diamnya dan pengembang yang diperoleh dari hasil KLT yang kepolarannya terus ditingkatkan bertindak sebagai fase gerak. Hasil fraksinasi ditampung dalam beberapa wadah kemudian dianalisis menggunakan KLT. Fraksi-fraksi yang mempunyai nilai  $R_f$  yang sama digabung.

#### **3. Pemurnian**

Pemurnian dilakukan dengan cara kristalisasi dan rekristalisasi. Isolat murni ditandai dengan hasil KLT yang menunjukkan satu noda dengan pengujian tiga sistem eluen. Isolat murni yang diperoleh diidentifikasi dengan uji kualitatif dan dilanjutkan dengan karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR.

#### **4. Identifikasi**

##### **a. Uji kualitatif**

##### **1) Uji Flavonoid**

##### **a) Uji pereaksi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>**

Fraksi diencerkan terlebih dahulu dengan pelarutnya (n-heksan) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditambahkan pereaksi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat. Hasil positif menunjukkan perubahan warna kuning tua menjadi merah tua (Marlinda, 2012: 25).

##### **b) Uji pereaksi NaOH 10%**

Fraksi diencerkan terlebih dahulu dengan pelarutnya (n-heksan) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditambahkan pereaksi NaOH 10%. Hasil positif menunjukkan perubahan warna kuning tua menjadi kuning muda (Marlinda, 2012: 25).

##### **c) Uji pereaksi FeCl<sub>3</sub>**

Fraksi diencerkan terlebih dahulu dengan pelarutnya (n-heksan) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditambahkan pereaksi FeCl<sub>3</sub>. Hasil positif menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman, kompleks biru, kekuningan, hijau kekuningan atau kuning kehijauan (Marlinda, 2012: 25).

##### **2) Uji Alkaloid**

##### **a) Uji Pereaksi Meyer**

Fraksi diencerkan terlebih dahulu dengan pelarutnya (n-heksan) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditambahkan pereaksi Meyer. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih atau kuning (Marlinda, 2012: 25).

**b) Uji Perekasi Dragendorff**

Fraksi diencerkan terlebih dahulu dengan pelarutnya (n-heksan) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditambahkan pereaksi Dragendorff. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya larutan berwarna coklat (Marlinda, 2012: 25).

**c) Uji Perekasi Wagner**

Fraksi diencerkan terlebih dahulu dengan pelarutnya (n-heksan) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditambahkan pereaksi Wagner. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan jingga (Marlinda, 2012: 25).

**3) Uji Terpenoid dan Steroid**

Fraksi diencerkan terlebih dahulu dengan pelarutnya (n-heksan) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditambahkan pereaksi Lieberman-burchard. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya larutan berwarna merah-ungu (terpenoid) dan terbentuk warna biru atau hijau (steroid) (Marlinda, 2012: 25).

**4) Uji saponin**

Fraksi dimasukkan kedalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan aquades, kemudian dipanaskan. Selanjutnya dikocok kuat secara vertical selama 10 detik. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya busa yang stabil setinggi 1-10cm selama 10 menit (Yuliana, 2016: 41)

**b. Karakterisasi dengan Spektrofotometer IR**

Isolat murni diambil sebanyak 1 mg, kemudian dicampurkan KBr dengan cara digerus hingga homogen. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam alat

pembuat pellet pada tekanan 74 mmHg selama 5 menit hingga diperoleh pellet yang ketebalannya mencapai  $\pm 1$  mm. Pellet diletakkan pada wadah pellet dan diukur serapannya dengan alat inframerah (IR). IR berfungsi untuk mengetahui gugus-gugus fungsi dari suatu senyawa yang terkandung dalam kulit buah pisangraja (*Musa paradisiaca* var. Raja) (Yuliana, 2016: 41).



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil**

**1. Ekstraksi**

Kulit buah pisang raja ditimbang sebanyak 500 gram kemudian dimaserasi dengan menggunakan pelarut n-Heksan selama 3x24 jam. Ekstrak yang diperoleh berwarna kuning kecoklatan sebanyak 35,5125 gram.

**2. Fraksinasi**

Ekstrak n-Heksan kulit buah pisang raja di fraksinasi awal dengan kromatografi kolom cair vakum (KKCV) dengan menggunakan perbandingan pelarut yang ditingkatkan kepolarannya seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1:** Hasil fraksinasi kromatografi kolom cair vakum (KKCV)

No.	Eluen	Warna Fraksi
1	n-Heksan 100%	Larutan tidak berwarna
2	n-Heksan 100%	Larutan tidak berwarna
3	n-Heksan 100%	Larutan tidak berwarna
4	n-Heksan:etil asetat (9,8:0,2)	Larutan tidak berwarna
5	n-Heksan:etil asetat (9,8:0,2)	Larutan tidak berwarna
6	n-Heksan:etil asetat (9,8:0,2)	Larutan tidak berwarna
7	n-Heksan:etil asetat (9,5:0,5)	Larutan tidak berwarna
8	n-Heksan:etil asetat (9,5:0,5)	Larutan tidak berwarna
9	n-Heksan:etil asetat (9,5:0,5)	Larutan tidak berwarna
10	n-Heksan:etil asetat (9:1)	Larutan tidak berwarna

11	n-Heksan:etil asetat (9:1)	Larutan agak kekuningan
12	n-Heksan:etil asetat (9:1)	Larutan agak kekuningan
13	n-Heksan:etil asetat (8:2)	Larutan agak kekuningan
14	n-Heksan:etil asetat (7:3)	Larutan berwarna kekuningan
15	n-Heksan:etil asetat (6:4)	Larutan berwarna kekuningan
16	n-Heksan:etil asetat (5:5)	Larutan berwarna kekuningan
17	n-Heksan:etil asetat (4:6)	Larutan berwarna kuning
18	n-Heksan:etil asetat (3:7)	Larutan berwarna kuning
19	n-Heksan:etil asetat (2:8)	Larutan agak kuning dan keruh
20	n-Heksan:etil asetat (1:9)	Larutan keruh
21	Etil asetat 100%	Larutan keruh
22	Methanol 100%	Larutan agak coklat dan keruh

Fraksi yang diperoleh kemudian di KLT dengan menggunakan eluen n-Heksan:etil asetat (9:1) untuk mengetahui fraksi yang memiliki nilai Rf yang sama. Fraksi dengan nilai Rf yang sama selanjutnya di gabungkan. Fraksi gabungan yang diperoleh adalah sebanyak 13 fraksi yaitu fraksi A-M.


Fraksi B berdasarkan hasil KLT menunjukkan noda tunggal sehingga dilanjutkan ke tahap pemurnian.



**Gambar 4.1:** Hasil KLT 13 fraksi gabungan

### 3. Pemurnian

Fraksi B diuji kemurniannya dengan menggunakan KLT dengan tiga sistem eluen yaitu eluen etil asetat:klorofom (8:2), n-Heksan:klorofom (5:5) dan n-Heksan:etil asetat (9:1). Hasil dari KLT dengan tiga sistem eluen menunjukkan noda tunggal yang menandakan bahwa isolat yang diperoleh sudah murni.



**Gambar 4.2:** Hasil KLT uji sistem tiga eluen (a) eluen etil asetat:klorofom (8:2) dengan Rf 0,9 (b) eluen n-Heksan:klorofom (5:5) dengan Rf 0,9 (c) n-Heksan:etil asetat (9:1) dengan Rf

0,07

### 4. Identifikasi

Isolat murni selanjutnya diuji kualitatif. Hasil uji kualitatif menunjukkan isolat murni mengandung senyawa steroid seperti pada tabel di bawah ini:

**Table 4.2:** Uji kualitatif senyawa metabolit sekunder kulit pisang raja

Uji kualitatif		Ekstrak	Hasil
Golongan	Pereaksi		Isolat murni
Flavonoid	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> pekat	+	-
	NaOH 10%	-	-
	FeCl <sub>3</sub> 5%	+	-
Alkaloid	Mayer	+	-
	Dragendorff	+	-
	Wagner	+	-
Steroid	Liebermann-Burchard	+	+
Terpenoid	Liebermann-Burchard	-	-
Saponin	Aquades+ dipanaskan+ dikocok	-	-

## 5. Karakterisasi dengan Spektrofotometer FTIR

Isolat murni selanjutnya di karakterisasi dengan menggunakan spektrofotometer FTIR dan diperoleh nilai serapan gugus fungsi seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3:** Mengukur hasil spektrum FTIR isolat murni

Bilangan gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ )	Gugus fungsional
3448,77	Gugus hidroksil (OH)
2918,07 dan 2849,77	Ikatan C-H alifatik
1734,94	Gugus karbonil (C=O)
1643,47	Ikatan C=C

### B. Pembahasan

#### 1. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa dari matriks atau simplisia dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai (Hanani, 2015: 10-11). Kulit pisang raja dikeringkan pada suhu kamar untuk mengurangi kadar air di dalam kulit buah pisang raja. Pengeringan dilakukan pada suhu kamar agar kandungan senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam kulit buah pisang raja tidak mengalami kerusakan akibat terkena sinar matahari langsung. Kulit buah pisang raja dihaluskan dengan blender untuk menambah luas permukaan karena semakin besar luas permukaan akan mempermudah pelarut untuk mengikat senyawa yang terdapat di dalam kulit buah pisang raja, sehingga senyawa yang ditarik lebih maksimal.

Serbuk kulit buah pisang raja diekstraksi dengan metode maserasi karena memiliki keunggulan yaitu pengerjaannya mudah dan menghindari kerusakan komponen pada simplisia. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan cara merendam simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai pada suhu ruang sehingga tidak terjadi kerusakan senyawa metabolit yang terkandung pada simplisia.

Pada proses maserasi, adanya perbedaan konsentrasi di dalam dan diluar sel akan menyebabkan senyawa di dalam sel berdifusi melewati dinding sel dan larut dalam pelarut organik. Proses ini berlangsung sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi di dalam dan diluar sel. Kulit buah pisang raja di maserasi dengan menggunakan pelarut n-Heksan selama 3x24 jam untuk memaksimalkan zat yang diperoleh pada proses ekstraksi. Penggunaan pelarut n-Heksan dalam proses maserasi ini karena pelarut tersebut merupakan pelarut non polar yang dapat melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat non polar dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah (2017) menyatakan bahwa pelarut n-Heksan dapat menarik senyawa-senyawa yang berpotensi memiliki efektivitas dalam penurunan kadar gula darah.

Hasil dari proses maserasi disebut dengan maserat. Maserat yang diperoleh berwarna kecoklatan. Maserat di evaporasi untuk memisahkan pelarut dengan zat-zat yang sudah terikat dengan pelarut sehingga diperoleh ekstrak kental kulit buah pisang raja yang berwarna kuning kecoklatan sebanyak 35,5125 gram.

## **2. Fraksinasi**

Ekstrak kental n-Heksan kulit buah pisang raja di analisis dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) untuk mencari eluen yang sesuai. Pada kromatografi lapis tipis ini digunakan silica G<sub>60</sub> PF 254 sebagai fase diam. Berdasarkan hasil KLT diketahui eluen yang sesuai yaitu eluen n-Heksan:etil asetat (9,5:0,5) dengan nilai R<sub>f</sub> 0,29 yang menandakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam sampel terpisah dengan baik.

Ekstrak kental n-Heksan kulit buah pisang raja di fraksinasi awal dengan menggunakan kromatografi kolom cair vakum (KKCV) untuk memisahkan senyawa-senyawa yang terdapat di dalam ekstrak menjadi lebih sedikit dalam beberapa fraksi. Proses fraksinasi KKCV digunakan silica G<sub>60</sub> Merk no. katalog 7730 sebagai fase diam dan eluen sebagai fase geraknya. Silica G<sub>60</sub> Merk no. katalog 7730 dimasukkan sedikit demi sedikit kedalam kolom kromatografi (*shinter glass*) sambil ditekan-tekan sampai padat dan tidak terdapat rongga udara. Hal ini ditandai dengan tidak adanya gelembung udara ketika dialiri pelarut serta pelarut mengalir dengan lancar.

Ekstrak kental n-Heksan kulit buah pisang raja dilarutkan menggunakan pelarut aseton dan di impregnasi dengan silika G<sub>60</sub> Merk no. katalog 7733, kemudian dimasukkan kedalam kolom kromatografi dan ditutup dengan kertas saring. Impregnasi dilakukan agar ekstrak kental dapat tercampur sempurna sehingga senyawa dapat terpisah dengan baik, sedangkan kertas saring digunakan untuk menyaring kotoran yang mungkin terdapat pada eluen sehingga tidak tercampur dengan sampel.

Proses fraksinasi dilakukan dengan mengalirkan eluen yang ditingkatkan kepolarannya dari non polar sampai polar. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sampel.. Eluen yang digunakan pada proses fraksinasi yaitu n-Heksan 100% tiga kali, n-Heksan:etil asetat (9,2:0,8) tiga kali, n-Heksan:etil asetat (9,5:0,5) tiga kali, n-Heksan:etil asetat (9:1) tiga kali, n-Heksan:etil asetat (8:2) satu kali, n-Heksan:etil asetat (7:3) satu kali, n-Heksan:etil asetat (6:4) satu kali, n-Heksan:etil asetat (5:5) satu kali, n-Heksan:etil asetat (4:6) satu kali, n-Heksan:etil

asetat (3:7) satu kali, n-Heksan:etil asetat (2:8) satu kali, n-Heksan:etil asetat (1:9) satu kali, etil asetat 100% satu kali, metanol 100% satu kali.

Fraksinasi ekstrak kental n-Heksan kulit buah pisang raja diperoleh sebanyak 22 fraksi yang akan di analisis KLT untuk mengetahui fraksi yang mempunyai nilai  $R_f$  yang sama. Fraksi dengan nilai  $R_f$  dan bentuk noda yang sama berarti memiliki kemungkinan lebih besar senyawa yang sama sehingga dapat digabungkan. Fraksi gabungan yang diperoleh berjumlah 13 fraksi yaitu fraksi A (fraksi 1), B (fraksi 2), C (fraksi 3-5), D (fraksi 6-7), E (fraksi 8-9), F (fraksi 10), G (fraksi 11-13), H (fraksi 14), I (fraksi 15), J (fraksi 16), K (fraksi 17-18), L (fraksi 19) dan M (fraksi 20-22). Fraksi B berdasarkan hasil analisis KLT menunjukkan satu noda sehingga dilakukan uji kemurnian.

### **3. Pemurnian**

Pemurnian merupakan suatu tahapan untuk menghilangkan zat pengotor yang terdapat pada isolat. Kemurnian isolat dapat diketahui dengan pengujian KLT tiga sistem eluen. KLT tiga sistem eluen dilakukan dengan menggunakan perbandingan eluen etil asetat:klorofom (8:2) dengan nilai  $R_f$  0,9, n-Heksan:klorofom (5:5) dengan nilai  $R_f$  0,9 dan n-Heksan:etil asetat (9:1) dengan nilai  $R_f$  0,07. Hasil KLT tiga sistem eluen, ketiganya menunjukkan satu noda. Isolat murni ditandai dengan hasil KLT tiga sistem eluen yang menunjukkan satu noda (Ilyas, 2015: 121).

### **4. Identifikasi**

Identifikasi dilakukan dengan uji fitokimia untuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder pada sampel. Uji fitokimia ini dilakukan pada ekstrak dan isolat yang diperoleh. Berdasarkan hasil uji fitokimia diketahui ekstrak kulit buah pisang raja mengandung senyawa flavonoid, alkaloid dan steroid. Pengujian

flavonoid dengan menggunakan pereaksi  $H_2SO_4$  terjadi perubahan dari kekuningan menjadi warna merah bata, penambahan pereaksi NaOH 10% terjadi perubahan dari warna kekuningan menjadi bening, sedangkan dengan penambahan pereaksi  $FeCl_3$  terjadi perubahan dari warna kuning menjadi kuning pucat yang menandakan ekstrak positif mengandung senyawa flavonoid. Adanya flavonoid pada kulit pisang telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pane (2013) yang melaporkan bahwa berdasarkan uji fitokimia diketahui bahwa kulit pisang raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja) mengandung senyawa flavonoid dan juga saponin. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Syamsuddin, dkk (2013) juga melaporkan bahwa pada kulit pisang goroho (*Musa acuminata* L) mengandung senyawa flavonoid.

Pengujian alkaloid dilakukan dengan menambahkan pereaksi meyer menyebabkan terjadi perubahan larutan berwarna kekuningan menjadi terbentuk endapan putih, penambahan pereaksi dragendorff menghasilkan perubahan warna dari kekuningan menjadi berwarna coklat, sedangkan dengan penambahan pereaksi wagner menghasilkan perubahan dari warna kekuningan menjadi terbentuk endapan jingga yang menunjukkan ekstrak positif alkaloid. Adanya senyawa alkaloid sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2017) yang melaporkan bahwa pada kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca* Var. Kepok) berdasarkan uji fitokimia diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid dan flavonoid. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Maya, dkk., (2015) juga melaporkan bahwa kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca* Var. Kepok) berdasarkan hasil uji fitokimia positif mengandung senyawa alkaloid.

Pengujian dilakukan terhadap ekstrak dan isolat diketahui mengandung senyawa steroid. Hal ini ditandai dengan penambahan pereaksi Liebermann-burchad

pada ekstrak yang menunjukkan perubahan warna dari kekuningan menjadi hijau dan pada isolat terjadi perubahan warna dari bening menjadi berwarna kehijauan yang menunjukkan positif mengandung senyawa steroid (Tonius, 2016: 4).




**Gambar 4.3.** Mekanisme reaksi uji Liebermann-Burchard  
(Sumber: Setyowati, dkk., 2014: 276)

Gambar 4.3. merupakan mekanisme reaksi pada uji fitokimia dengan menggunakan pereaksi Liebermann-Burchard. Asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat pada pereaksi Liebermann-Burchard akan bereaksi dengan steroid membentuk warna biru atau hijau, dimana reaksi yang terjadi yaitu reaksi asetilasi gugus  $-\text{OH}$  sehingga terbentuk kompleks asetil steroid (Ilyas, dkk., 2015: 123). Hal ini terjadi karena pelepasan  $\text{H}_2\text{O}$  dan penggabungan karbokation yang ditandai dengan lepasnya gugus asetil akibat penambahan asam asetat anhidrida. Gugus asetil ini kemudian membentuk ikatan rangkap. Pelepasan gugus hidrogen menghasilkan resonansi yang akan menyebabkan ikatan rangkap berpindah. Senyawa karbokation menyebabkan reaksi adisi elektrofilik disertai pelepasan hidrogen. Gugus hidrogen yang lepas akan menyebabkan perpanjangan konjugasi yang menghasilkan terbentuknya warna hijau (Setyowati, dkk., 2014: 276).

## 5. Karakterisasi dengan spektrofotometer FTIR

Spektrofotometer FTIR merupakan alat yang digunakan untuk menentukan spektrum serapan suatu senyawa yang dikalibrasi dalam bentuk grafik dengan bilangan serapan panjang gelombang sehingga dapat menunjukkan gugus fungsi yang

terdapat dalam sampel. Hasil spektrofotometer FTIR isolat n-Heksana kulit buah pisang raja adalah sebagai berikut:




**Gambar 4.4:** Mengukur hasil spektrum FTIR isolat murni

Pada gambar 4.4 hasil FTIR isolat murni terlihat adanya serapan pada daerah 3448,77 cm<sup>-1</sup> dengan bentuk pita yang melebar menunjukkan adanya gugus OH pada isolat. Gugus OH memberikan satu puncak dengan puncak serapan yang melebar pada daerah serapan 3650-3200 cm<sup>-1</sup> (Sastrohamidjojo, 1992: 13). Selain itu terdapat pita tajam dengan intensitas kuat pada 1643,47 cm<sup>-1</sup> yang merupakan C=C alkena yang berada pada rentang daerah serapan 1680-1600 cm<sup>-1</sup> (Sastrohamidjojo, 1992: 15). Terdapat pita tajam dengan intensitas kuat pada daerah 1734,94 cm<sup>-1</sup> yang merupakan ikatan rangkap karbonil (C=O) yang memiliki rentang daerah serapan 1750-1705 cm<sup>-1</sup> (Mohring, dkk., 2010: 295). Serta terdapat gugus C-H dengan pita tajam dan intensitas kuat pada 2918,07 dan 2849,77. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan serapan yang khas untuk senyawa steroid. Steroid memiliki serapan gugus C=C, C=O dan O-H (Astuti, dkk., 2014: 11).

**6. Efektifitas fraksi n-Heksan kulit pisang raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja) terhadap penurunan kadar gula darah**

Radikal bebas merupakan atom atau gugus yang kekurangan satu elektron tidak berpasangan. Radikal bebas terbentuk karena oksigen yang berikatan dengan elektron bebas di dalam mitokondria akan menyebabkan peningkatan konsentrasi kalsium sitosol sehingga terjadi kerusakan pada sel  $\beta$  pankreas (Dwinani, 2014: 6). Rusaknya sel  $\beta$  pankreas menyebabkan tidak terbentuknya insulin sehingga penggunaan glukosa ke jaringan menjadi terhambat (Prabawa, 2015: 9). Steroid dapat berperan sebagai antioksidan dalam menangkal radikal bebas (Nasruddin, dkk., 2017: 333). Gugus OH pada senyawa steroid berperan sebagai antioksidan dalam menangkal radikal bebas (Yusni, 2017: 62). Reaksi penghambatan radikal bebas dengan senyawa antioksidan dapat dilihat dari persamaan berikut:



**Gambar 4.5** Mekanisme radikal bebas

Berdasarkan gambar 4.5. menunjukkan steroid sebagai antioksidan yang memiliki gugus OH akan menyumbangkan atom hidrogennya (H) untuk berikatan dengan radikal bebas ( $R^*$ ) sehingga terbentuk senyawa yang stabil (RH). Sedangkan steroid akan menjadi radikal antioksidan ( $A^*$ ) yang memiliki keadaan lebih stabil dari radikal semula ( $R^*$ ) (Yuswantina, 2009: 12).

Mekanisme lainnya yaitu antioksidan dapat menghambat absorpsi glukosa di usus dengan menghambat transportasi aktif GLUT di usus dan menjadi inhibitor enzim-enzim pencernaan di usus seperti enzim  $\alpha$ -glukosidase dan pankreatik  $\alpha$ -amylase sehingga glukosa tidak terbentuk. Selain itu antioksidan juga bekerja dengan menghambat proses glukogenesis di hati, meningkatkan pemakaian glukosa di otot dan sel lemak serta meningkatkan sekresi insulin ke darah. Antioksidan akan melindungi sel  $\beta$  pankreas dari glukotoksik, mengikat radikal bebas dan memperantarai aktivitas enzim antioksidan di pankreas (Prabawa, 2015: 5). Antioksidan dapat memperbaiki kerusakan sel  $\beta$  pankreas sehingga mengurangi resistensi insulin dan menyebabkan turunnya kadar gula darah (Ajie, 2015: 71). Antioksidan bekerja secara sinergis dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain dalam menyeimbangkan jumlah radikal bebas dan antioksidan didalam tubuh sehingga terjadi penurunan kadar gula darah (Yusni, 2017: 62).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) yang melaporkan bahwa pada ekstrak n-Heksan kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja) mengandung senyawa metabolit sekunder jenis steroid, flavonoid dan alkaloid yang ketiganya bersinergi dalam memberi efek penurunan kadar gula darah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sediarmo, dkk (2011) melaporkan bahwa pada tumbuhan ciplukan terkandung senyawa aplysterylacetate yang merupakan senyawa golongan steroid, dimana senyawa golongan steroid mempunyai kemampuan dalam menstimulasi terbentuknya insulin dari sel  $\beta$  pankreas sehingga dapat menurunkan kadar gula darah. Penelitian yang dilakukan oleh Prabawa (2015) melaporkan bahwa tanaman putri malu (*Mimosa pudica*) memiliki efek penurunan kadar gula darah, dimana zat aktif yang berperan dalam penurunan kadar gula darah

yaitu senyawa steroid, alkaloid, glukosida flavonoid dan senyawa fenolik. Widowati (2016) juga melaporkan bahwa ekstrak etanol biji klabet (*Trigonella foenum-graecum* L) memiliki efektifitas dalam menurunkan kadar gula darah karena adanya senyawa fenugrekin yang merupakan senyawa sapogenin steroid.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak n-heksan kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* var. Raja) adalah steroid.
2. Senyawa steroid pada fraksi N-heksan kulit buah pisang raja bersinergi dengan komponen senyawa lainnya memiliki aktivitas dalam menurunkan kadar gula darah.

#### **B. Saran**

Saran pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya peneliti berikutnya melakukan karakterisasi isolat murni n-Heksan kulit buah pisang raja dengan menggunakan spektrofotometer NMR.
2. Melakukan isolasi senyawa metabolit sekunder pada kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca* Var. Raja) dengan mengambil sampel pada setiap susunan buah dalam satu tandan pisang.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Ajie, Rizky bayu. "White Dragon Fruit (*Hylocereus Undatus*) Potential AS Diabetes Mellitus Treatment". *J Majority* 4. No.1. 2015.

Abdullah, Dr bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Lubabun Tafsir Min Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul ghoffar I. M dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Syafi'I, 2010.

Alimin, dkk. *Kimia Analitik*. Makassar: Alauddin Press, 2007.

Anas, Yance, dkk. "Aktivitas Antidiabetes Fraksi N-Heksan Ekstrak Etanol Daun LengLengan (*Leucas lavandulifolia* JE. Smith) pada Tikus DM Tipe-2 yang Mengalami Resistensi Insulin". *Ilmiah Farmasi* 3, No. 1. ISSN 2354-6565, 2015.

Andriani, Dwi. "Studi Pembuatan Bolu Kukus Tepung Pisang Raja (*Musa Paradisiaca* L.)", *Skripsi*. Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, 2012.

Anies, M, Kes., Pkk, Prof. Dr. dr. *Kolestrol dan Penyakit Jantung Koroner*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.

Arif, Rokhmad Samsul Dan Tukiran. "Identifikasi Senyawa Fenolik Hasil Isolasi Dari Fraksi Semi Polar Ekstrak Etil Asetat Kulit Batang Tumbuhan Nyiri Batu (*Xylocarpus Moluccensis*)". *UNESA Jurnal Of Chemistry* 4, No. 2, 2015.

Astuti, Maria Dewi, dkk. "Isolasi Steroid Dari Fraksi N-Heksan Batang Bajakah Tampala". *Prosiding Seminar Nasional Kimia*. ISBN: 978-602-0951-00-3 Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya. 2014.

Atun, Sri, dkk. "Identifikasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Kimia dari Ekstrak Metanol Kulit Buah Pisang (*Musa paradisiaca* Linn)". *Indo. J. Chem* 7, No. 1, 2007.

Aziz, Zuhelmi dan Ratna Djamil. "Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid dalam Fraksi n-Butanol dari Ekstrak Etanol Daun Biji (*Psidium Guajava*. L)". *Seminar Nasional LUSTRUM X*, 2013.

Azrimaidaliza."Asupan Zat Gizi dan Penyakit Diabetes Mellitus". *Kesehatan Masyarakat* 6, No.1, 2011.

Chadijah, Sitti. *Pemisahan Kimia*. Makassar: Alauddin Press, 2014.

- Dwinani, Sagita Nawa. "Kemampuan Ekstrak Etanol Bekatul Beras Ketan Hitam Dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah Pada Tikus Nefropati Diabetes". *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 2014.
- Erni, dkk. "Pengaruh Pemberian Minyak Mandar Yang Ditambahkan Bubuk Daun Sukun (*Atrocarpus Altilis*) Terhadap Kadar Kolesterol Mencit (*Mus Musculus*)" *Jurnal Bionature* 15, No. 2, 2014.
- Faridatussaadah, Siti Nur, dkk. "Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid dari Daun Mangkokan (*Poliscias sculletarium* (Burm.f.) Fosb)". *Prosiding Farmasi* 2 No.1, 2016. ISSN 2460-6472.
- Harborne, J.B. *Phytochemical Methods*. Terj. Dr. Kosasi Padmawinata dan Dr. Iwang Soediro, *Metode Fitokimia*. Bandung: ITB, 1987.
- Hanani MS, Endang. *Analisis Fitokimia*. Jakarta: EGC, 2015.
- Ilyas, Asriani. *Kimia Organik Bahan Alam*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Ilyas, asriani, dkk. "Senyawa Golongan Steroid Dari Ekstrak N-Heksan Kulit Batang Kayu Bitti (*Vitex Cofassus*) Dan Uji Aktivitas Terhadap Arthemia Salica Leach". *Chimica et natura acta* 3 No.3. 2015.
- Indrawati, Sri, dkk. "Efek Antidiabetes Ekstrak Air Kulit Buah Pisang Ambon (*Musa Paradisiaca L.*) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) Model Hiperglikemia". *Galenika Journal of Pharmacy* 2, No. 1. 2015. ISSN: 2442-8744.
- Jayanti, Nur. " Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiacal L.*) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pada Mencit (*Mus musculus*) dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder". *Skripsi*, Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Lenny, S.Si.,M.Si., Sovia. "Senyawa Terpenoid dan Steroida". *Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatra Utara Medan*, 2006.
- Lestari, Puji. "Isolasi dan Identifikasi Komponen Kimia Ekstrak Etanol Buah Merah (*Pandanus conodeus* Lam)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Markham,K.R. *Cara Mengidentifikasi Flavonoid*. Bandung: ITB, 1988.
- Marlinda, Mira."Analisis Senyawa Metabolit Sekunder dan Uji ToksisitasEkstrak Etanol Biji Buah Alpukat (*Persea americana* Mill.)" *MIPA unsrat online* h. 24-28, 2012.
- Maya, Stanly Wasty, dkk."Phytochemical Screening and Antipyretic Effect of Steam Juice From Kepok Banana (*Musa Paradisiaca L*) On White Male Rats Stain


- Wistar (*Rattus Nor Vegicus*) Induced With DTP-Hb". *Pharmakon Ilmiah Farmasi* 4, No.1, 2015. ISSN: 2302-2493.
- Munawaroh, Amin. "Pemanfaatan Tepung Kulit Pisang (*Musa Paradisiaca*) Dengan Variasi Penambahan Gliserol Sebagai Bahan Alternatif Pembuatan Bioplastik Ramah Lingkungan". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Mohring, Jerry R., dkk, *Techniques in Organic Chemistry*, Amerika: Williamson Microscale, 2010.
- Nasruddin, dkk. "Isolasi Senyawa Steroid Dari Kulit Akar Senggugu (*Clerodendrum Serratum* L. Moon)". *Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT* 6. No.3. 2017 ISSN: 2302-2493.
- Nastiti, Aisyah Sari, dkk., "Banking Banana Skin Nano Gel Aplikasi Salep Antiinflamasi Dari Ekstrak Kulit Pisang (*Musa paradisiaca*) Sebagai Alternatif Salep Berbahan Alami" *Universitas Brawijaya Malang*, 2015.
- Pane, Elfira Rosa. "Uji Aktivitas Senyawa Antioksidan Dari Ekstrak Metanol Kulit Pisang Raja (*Musa Paradisiaca* Sapientum)". *Valensi* 3, No.2, 2013. ISSN: 19788193
- Prabawa, Muhammad Dacil Kurniawan. "Uji Efek Penurun Glukosa Darah Ekstrak Etanol 70% Akar Dan Batang Putri Malu (*Mimosa Pudica*) Pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar Yang Diinduksi Aloksan". *Naskah Publikasi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 2015.
- Putri, Nurlaili Haida Kurnia Dan Muhammad Atoillah Isfandiari. "Hubungan Empat Pilar Pengendalian DM Tipe 2 Dengan Rerataan Kadar Gula Darah" *Jurnal Berkala Epidemiologi* 1, No.2, 2013.
- Radiya, Mezi. "Karakterisasi Morfologi Tanaman Pisang (*Musa Paradisiaca* L.) Di Kabupaten Agam" *Agroteknologi*, 2013.
- Raharjo, Tri Joko. *Kimia Hasil Alam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Saputra, Mochamad Karel. "Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Pisang Kepok (*Musa Paradisiaca* Linn.) Sebagai Stabilizer Terhadap Sifat Kimia Dan Organoleptik Es Krim" *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2016.
- Sari, Mayang. "Identifikasi Protein Menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR)". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011.
- Sastrohamidjojo, Dr. Hardjono. *Sintesis Bahan Alam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

- Sastrohamidjojo, Dr. Hardjono. *Dasar-Dasar Spektroskopi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Sastrohamidjojo, Dr. Hardjono. *Kromatografi*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Sastrohamidjojo, Dr. Hardjono. *Spektroskopi Inframerah*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992.
- Sediarso, dkk., "Efek Antidiabetes dan Identifikasi Senyawa Dominan Fraksi Klorofom Herba Ciplukan (*Physalis angulata L*)" *Majalah Ilmu Kefarmasian* 8 No 1, 2011.
- Setiyowati, Widiastuti Agustina Eko, dkk., "Skrining Fitokimia Dan Identifikasi Komponen Utama Ekstrak Metanol Kulit Durian (*Durio zibenthinus* Murr.) Varietas Petruk" *Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia VI*. 2014. ISBN: 979363174-0.
- Shihab, M, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* Volume 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suryono dan Sevin Yudha C. "Efektivitas Daun Sirih Merah Untuk Menurunkan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Mellitus". *AKP*, No.6, 2012.
- Syamsuddin, Sri Murti Sari, dkk. "Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Pisang Goroho (*Musa A Cuminata L.*) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Tikus Putih Jantan Galur Wistar Yang Diinduksi Sukrosa" *Pharmacon Ilmiah Farmasi* 2, No.1. 2013. ISSN: 2302-2493.
- Tonius, Joly, dkk. "Isolasi Dan Karakterisasi Senyawa Steroid Fraksi N-Heksan Daun Buas-Buas (*Premna serratifolia L*)" *JKK* 5 No.1. 2016. ISSN 2303-1077.
- Utami, Rezki Nurfadilla, "Uji Efektivitas Ekstrak Kulit Buah Pisang Raja (*Musa Paradisiaca* Var. Raja) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pada Mecit Jantan (*Mus Musculus*) dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder ". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Widowati, Lucie, dkk., "Pengaruh Ekstrak Etanol Biji Klebet (*Trigonella foenum-graecum L*) Terhadap Kadar Gula Darah Tikus NIDDM" *Bul penel Kesehatan* 32, 2006.
- Yuliana. "Isolasi Senyawa Bioaktif Antibakteri pada Ekstrak etanol Teripang Pasir (*Holothuria seabra*) di Kepulauan Selayar" *Skripsi*, Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Yusni, dkk. "Penurunan Kadar Gula Darah Akibat Pemberian Ekstrak Manggis (*Garcinia mangostana*) dan tomat (*Lycopersicum esculentum* Mill) pada Tikus Diabetes". *Global Medikal and Health Communication* 5 No. 1. 2017.

Yuswantina, Richa. “Uji Aktivitas Penangkap Radikal Dari Ekstrak Petroleum Eter, Etil Asetat dan Etanol Rhizoma Binahong (*anredera cordifolia* (Tenore) Steen) Dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrihidrazil)”. *Skripsi*. Fakultas Farmasi Universitas Surakarta, 2009.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


**Lampiran 1: Skema Penelitian**


## Lampiran 2: Skema Prosedur Kerja

### a. Ekstraksi



## b. fraksinasi awal





### Lampiran 3: Dokumentasi penelitian



#### a. Ekstraksi



Mengumpulkan kulit buah pisang raja (*Musa paradisiaca*)



Membersihkan sampel




Menimbang sampel sebanyak 500 gram



Mengeringkan dan menghaluskan sampel

**b. Maserasi**

Maserasi sampel dengan pelarut n-Heksan selama 24 jam (3x)



Disaring dengan menggunakan kain blacu



Ekstrak kental



Maserat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

**c. Fraksinasi awal**

Ekstrak kental



Silica untuk fase diam



Silica untuk impregnasi



Eluen



KKCV




Fraksi hasil KKC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ALAUDDIN  
ASSAR

#### d. Identifikasi



Isolat fraksi gabungan B


Uji tiga sistem eluen



Karakterisasi FTIR

#### Lampiran 4: Hasil Penelitian

##### a. hasil KLT ekstrak n-Heksan kulit buah pisang raja




KLT ekstrak n-Heksan kulit buah pisang raja dengan eluen n-Heksan:etil asetat (9,5:0,5): (a) penyinaran lampu UV 254-366 nm dan (b) penampakan noda setelah disemprot  $\text{H}_2\text{SO}_4$  10% dan di oven.

##### b. hasil KLT fraksi n-Heksan kulit buah pisang raja pada KKCV




(a)



(b)

c. Hasil KLT isolat kulit buah pisang raja pada uji tiga sistem eluen



(a)

(b)

(c)

**Gambar 4.2:** Hasil KLT uji sistem tiga eluen (a) eluen etil asetat:klorofom (8:2) dengan Rf 0,9 (b) eluen n-Heksan:klorofom (5:5) dengan Rf 0,9 (c) n-Heksan:etil asetat (9:1) dengan Rf 0,07


**d. Tabel hasil uji kualitatif ekstrak kental**

No.	Sampel	Pereaksi	Hasil	Keterangan
1.	Ekstrak kental	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Terbentuk warna merah bata	(+) flavonoid
		NaOH 10%	Larutan bening	
		FeCl <sub>3</sub> 5%	Terbentuk warna kuning	(+) alkaloid
		Mayer	Terbentuk endapan putih	
		Dragendorff	Terbentuk warna cokelat	
		Wagner	Terbentuk endapan jingga	(+) steroid
		Liebermann-Burchard	Terbentuk warna hijau	
Aquades + panaskan + dikocok	Tidak terbentuk busa	(-) saponin		
2.	Isolat murni	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Terbentuk larutan jingga	(+) flavonoid
		NaOH 10%	Larutan bening	
		FeCl <sub>3</sub> 5%	Terbentuk endapan kuning	(+) alkaloid
		Mayer	Larutan berwarna kehijauan	
		Dragendorff	Terbentuk warna merah muda dengan endapan kuning	
		Wagner	Terbentuk larutan keunguan dengan endapan jingga	(+) steroid
		Liebermann-Burchard	Terbentuk larutan berwarna kehijauan	
Aquades + panaskan + dikocok	Tidak terbentuk busa	(-) saponin		

e. Uji kualitatif ekstrak kental dan isolat murni

1. Ekstrak kental

a) Uji flavonoid



b) Uji alkaloid



c) Uji terpenoid dan steroid



2. Isolat murni


a) Uji flavonoid



b) Uji alkaloid




c) Uji terpenoid dan steroid



d) Uji saponin



f. Spektrum IR isolat murni



g. komposisi pereaksi uji kualitatif

1. Reagen dragendorff

Bahan:

Larutan I : 0,6 gram  $\text{Bi}(\text{NH}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  dalam 2 mL HCl pekat dan 10 mL  $\text{H}_2\text{O}$

Larutan II: 6 gram KI dalam 10 mL  $\text{H}_2\text{O}$ .

Cara pembuatan:

Larutan I dibuat dengan menimbang 0,6 gram  $\text{Bi}(\text{NH}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  yang dilarutkan ke dalam 2 mL HCl pekat dan 10 mL aquades ( $\text{H}_2\text{O}$ ) dan larutan II dibuat dengan menimbang 6 gram KI dilarutkan ke dalam 10 mL aquades. Kedua larutan tersebut dicampurkan dengan 7 mL HCl pekat dan 15 mL aquades. Reagen yang diperoleh berwarna jingga.

## 2. Reagen Meyer

Bahan:

Larutan I : 1,385 gram  $\text{HgCl}_2$  dalam 600 mL aquades

Larutan II: 5 gram KI dalam 10 mL aquades

Cara pembuatan:

Larutan I di buat dengan menimbang 1,385 gram  $\text{HgCl}_2$  kemudian dilarutkan dalam 600 mL aquades. Sedangkan larutan II dibuat dengan menimbang 5 gram KI kemudian dilarutkan dalam 10 mL aquades. Selanjutnya larutan I dituangkan kedalam larutan II kemudian diencerkan dalam 100 mL aquades. Reagen yang dipperoleh tidak berwarna.

## 3. Reagen Liebermann-Burchard

Bahan:

Asam sulfat pekat 5 mL, anhidra asetat 5 mL dan etanol absolute 50 mL.

Cara pembuatan:

Asam sulfat pekat 5 mL dan anhidra asetat 5 mL dicampurkan kedalam etanol absolute sebanyak 50 mL, kemudian didinginkan dalam lemari pendingin.

#### 4. Reagen Wagner

Bahan:

2,5 gram iodin dan 2 gram KI

Cara pembuatan:

10 mL aquades di pipet kemudian ditambahkan 2,5 gram iodin dan 2 gram kalium iodida lalu dilarutkan dan diencerkan dengan aquades menjadi 200 mL dalam labu takar. Reagen yang diperoleh berwarna cokelat.

#### h. Tabel hasil fraksinasi kromatografi kolom cair vakum (KKCV)

No.	Eluen	Warna Fraksi
1	n-Heksan 100%	Larutan tidak berwarna
2	n-Heksan 100%	Larutan tidak berwarna
3	n-Heksan 100%	Larutan tidak berwarna
4	n-Heksan:etil asetat (9,8:0,2)	Larutan tidak berwarna
5	n-Heksan:etil asetat (9,8:0,2)	Larutan tidak berwarna
6	n-Heksan:etil asetat (9,8:0,2)	Larutan tidak berwarna
7	n-Heksan:etil asetat (9,5:0,5)	Larutan tidak berwarna
8	n-Heksan:etil asetat (9,5:0,5)	Larutan tidak berwarna
9	n-Heksan:etil asetat (9,5:0,5)	Larutan tidak berwarna
10	n-Heksan:etil asetat (9:1)	Larutan tidak berwarna
11	n-Heksan:etil asetat (9:1)	Larutan agak kekuningan
12	n-Heksan:etil asetat (9:1)	Larutan agak kekuningan
13	n-Heksan:etil asetat (8:2)	Larutan agak kekuningan
14	n-Heksan:etil asetat (7:3)	Larutan berwarna kekuningan

15	n-Heksan:etil asetat (6:4)	Larutan berwarna kekuningan
16	n-Heksan:etil asetat (5:5)	Larutan berwarna kekuningan
17	n-Heksan:etil asetat (4:6)	Larutan berwarna kuning
18	n-Heksan:etil asetat (3:7)	Larutan berwarna kuning
19	n-Heksan:etil asetat (2:8)	Larutan agak kuning dan keruh
20	n-Heksan:etil asetat (1:9)	Larutan keruh
21	Etil asetat 100%	Larutan keruh
22	Methanol 100%	Larutan agak coklat dan keruh

---

## BIOGRAFI

Septi Nuryana Muhsin yang akrab dipanggil Septi, lahir pada 12 September 1994 merupakan buah cinta dari Ayah bernama Muhsin Mustara dan Ibu bernama Dyah Maryati. Penulis memulai jenjang pendidikan di SDN jati mulya II kosambi Tangerang pada tahun 2001 dan pindah ke SDN Minasaupa pada 2004. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Minasaupa pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan di MTsN Model Makassar. Setelah lulus di MTsN Model Makassar pada tahun 2010, penulis pindah ke Bulukumba dan melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Bulukumba. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikannya di SMAN 3 Bulukumba dan syukur Alhamdulillah berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi di PTN UIN Alauddin Makassar melalui jalur undangan. Penulis mengambil Jurusan Kimia Sains Fakultas Sains dan Teknologi. Penulis sangat bersyukur dapat menempuh pendidikan tinggi dan semoga ilmu yang penulis dapat selama belajar di UIN Alauddin Makassar dapat penulis manfaatkan dengan baik.

Aamiin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R