

**KEKONGRUENAN UNTUK HASIL BAGI FERMAT MODULO  $p^4$** **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar S.Mat  
Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**RIFA'ID**  
**NIM : 60600112077**

**JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2018

Penyusun,

**Rifa'id**

**NIM : 60600112077**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kekongruenan untuk Hasil Bagi Fermat Modulo  $p^4$ ”, yang disusun oleh Saudara **Rifa'id**, Nim: **60600112077** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal **10 Agustus 2018 M**, bertepatan dengan **28 Dzulkaidah 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 10 Agustus 2018 M  
28 Dzulkaidah 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Muh. Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Ridwan, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag  
Nip. 19691205 199303 1 001



## MOTTO

*“Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.”*

*(-Imam Syafi’i-)*

*“Akal adalah timbangan yang cermat dan hasilnya pasti dapat dipercaya.”*

*(-Ibnu Khaldun-)*

*“Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kau harus bersabar dengan apa yang kau benci.”*

*(-Imam Ghazali-)*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillaahirrohmaanirrohiim*

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang...


Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk,

Ayahanda, saya ucapkan terima kasih atas limpahan kasih sayang selama saya menjadi seorang anak.

Ibunda tercinta, saya ucapkan terima kasih atas limpahan doa dan dukungan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.

Keluarga besarku yang tercinta, adek-adekku yang sangat memberi aku dukungan dalam berakhirnya karya ini.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan ilmu, nikmat, limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat dan salam selalu tercurahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai suri taula dan hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Adapun judul dari skripsi ini adalah “*Kekongruenan Untuk Hasil Bagi Fermat Modulo  $p^4$* ”.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayah tercinta Bapak Arifin dan Ibunda tercinta Maemunah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, restu serta perhatian moral, materil maupun doa atas kesuksesan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

Rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pula kepada:

1. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar atas pemberian kesempatan pada penulis untuk melakukan studi skripsi ini,
2. Bapak Irwan, S.Si.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Matematika atas bimbingan, waktu dan ilmu yang diberikan dalam penyempurnaan skripsi ini,
3. Ibu Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd, selaku pembimbing pertama yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,
4. Bapak Muhammad Ridwan, S.Si., M.Si, selaku pembimbing kedua yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,
5. Bapak Muhammad Irwan, S.Si., M.Si. selaku penguji pertama yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,
6. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si, selaku penguji kedua yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini,

7. Bapak/Ibu Dosen di Jurusan Matematika yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan ilmu, arahan dan motivasi dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
8. Staf Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini telah membantu dalam pengurusan akademik dan persuratan dalam penulisan,
9. Kakak-kakak, adik-adik, serta keluarga yang selama ini memberikan semangat dan do'a, sehingga skripsi ini diselesaikan,
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 dengan nama "KU12VA" yang selalu memberikan semangat dan inspirasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi,
11. Kepada seluruh keluarga, sahabat dan pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa dan motivasinya.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Agustus 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SIMBOL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1-6</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Masalah.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7-42</b>
A. Bilangan Bulat.....	7
B. Bilangan Prima.....	9
C. Faktor Persekutuan Terbesar dan Kelipatan Persekutuan Terkecil.....	11
D. Keterbagian.....	14
E. Kekongruenan.....	17

F. Notasi Sigma.....	21
G. Permutasi dan Kombinasi.....	22
H. Induksi Matematika Kuat.....	24
I. Identitas Pascal.....	24
J. Teorema Fermat.....	29
K. Teorema Binomial.....	31
L. Bilangan Bernoulli.....	40
M. Bilangan Harmonik.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51-52</b>
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Sumber Penelitian.....	51
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
D. Prosedur Penelitian.....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53-73</b>
A. Hasil .....	53
B. Pembahasan .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR SIMBOL

$\equiv$	=Kekongruenan
$\forall$	=Untuk semua
$\in$	= Elemen atau anggota atau himpunan
$(a, b)$	= Faktor persekutuan $a$ dan $b$
$[a, b]$	=Kelipatan persekutuan $a$ dan $b$
$(a, b, c, \dots)$	= Faktor persekutuan bilangan prima relatif untuk $a, b, c, \dots$
$[x]$	= Fungsi <i>floor</i>
$\mathbb{Z}$	= Anggota himpunan bilangan bulat
$ x $	= Harga mutlak bilangan bulat $x$
$a b$	= Suatu bilangan bulat $a$ dengan $b$ faktor dari $a$
$\sum_{a=0}^n a$	= Penjumlahan (sigma) bilangan bulat $a$ , dari $a = 0$ sampai $n$
$n!$	= $n$ factorial
$p(n, r)$	= Permutasi objek yang diambil dari $n$ objek
$c(n, r)$	= Kombinasi objek yang diambil dari $n$ objek
$\binom{n}{r}$	= Kombinasi objek yang diambil dari $n$ objek

## ABSTRAK

**NAMA** : RIFA'ID  
**NIM** : 6060012077  
**JURUSAN** : MATEMATIKA  
**JUDUL SKRIPSI** : Kekongruenan Untuk Hasil Bagi Fermat Modulo  $p^4$

---

Dalam penulisan ini, yang mencangkup bilangan harmonik, bilangan Bernoulli, teorema binomial dan identitas pascal, bilangan prima dan teorema Fermat, mempunyai hubungan yang terkandung dalam satu judul yang penulis angkat yaitu “kekongruenan untuk hasil bagi Fermat modulo  $p^4$ ”. Hanya saja penulisan ini difokuskan pada modulo dengan sisa berupa negatif untuk  $p$  bilangan prima ganjil positif. Berdasarkan teorema binomial dan identitas pascal yang diketahui, maka persamaan ini yang pakai untuk hasilnya. Dari identitas persamaan ini, ruas kanan dihubungkan dengan bilangan harmonik dan bilangan Bernoulli, untuk bilangan bilangan harmonik yang dipakai adalah persamaan-persamaan kekongruennannya untuk modulo  $p, p^2, p^3$ , dan  $p^4$ , akan tetapi bilangan harmonik  $H_n$  dan  $H_{n,m}$  untuk  $n \geq 1, m \geq 1$  berbeda, begitu pula untuk bilangan Bernoulli  $B_n$ , yaitu persamaan-persamaan dalam bentuk kekongruenan yang dipakai. Dengan menyamakan persamaan-persamaan ini dan kemudian dihubungkan dengan teorema Binomial dan identitas pascal, maka hasil yang peroleh mengandung bilangan harmonik dan bilangan bernoulli untuk kekongruenan modulo  $p^4$  dengan sisa berupa negatif untuk  $p$  suatu bilangan prima ganjil positif.

*Kata Kunci : Identitas Pascal, Kekongruenan, Teorema Kecil Fermat, Bilangan Bernoulli, dan Bilangan Harmonik*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Sebelum mengenal perhitungan angka dan bilangan, cara menghitung beberapa kepemilikan pada saat itu menggunakan beberapa lambang (simbol) untuk membandingkan banyak sedikitnya suatu kepemilikan, dalam perhitungannya mula-mula menggunakan kerikil, kemudian simpul pada tali lalu menggunakan jari tangan atau ranting pohon. Semakin berkembang dan berjalannya waktu, semakin berkembang pula cara menghitungnya seperti sampai pada waktu sekarang, dan sampai sekarang ilmu tersebut disebut ilmu hitung (ilmu matematika).

Dimasa sekarang ilmu hitung atau biasa disebut matematika memiliki beberapa cabang ilmu,dalam artian saling berhubungan antara ilmu yang satu dengan yang lain, salah satunya seperti ilmu matematika dengan ilmu kimia. Ilmu matematika pula memiliki pokok bahasan yang banyak, salah satunya adalah pokok bahasan teori bilangan. Teori bilangan adalah merupakan salah satu cabang ilmu matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat.

Dalam teori bilangan, bilangan bulat sangat perlu dipelajari karena dengan bilangan bulat banyak mengenai tentang konsep bilangan seperti bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan cacah dan masih banyak lagi, terlebih lagi dalam penelitian ini difokuskan pada bilangan prima.

Kodefikasi-kodefikasi bilangan prima dalam Qur'an salah satunya mengenai bilangan prima yaitu tentang konsep kekongruenan (hasil bagi dan sisa suatu bilang bulat), dalam surat Al-Kahfi ayat 25 :

وَلْيَبُثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

*Terjemahnya:*

*“Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi) (QS. Al-Kahfi:18:25)”*.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir tentang surat ini bahwa ayat ini merupakan pemberitahuan Allah subhanahu wata'ala. kepada Rasul tentang lama masa tinggalnya para pemuda penghuni gua sejak mereka ditidurkan sampai dibangun kembali oleh Allah subhanahu wata'ala dan mempertemukan mereka dengan orang-orang yang hidup pada masa itu. Pada masa itu mereka tinggal selama tiga ratus tahun ditambah sembilan tahun menurut perhitungan bulan (tahun Syamsiah), dan tiga ratus tahun menurut perhitungan matahari (tahun Qomariyah).<sup>1</sup>

Bila dilihat dari lama waktu tinggalnya, 309 adalah bilangan bulat, bila dibagi dengan bilangan 3 diperoleh 103, yang merupakan bilangan prima, menurut konsep kekongruenan bilangan 103 bila dibagi dengan sembarang bilangan prima yang kurang dari 103 maka hasilnya tidak ada bilangan asli artinya akan ada tambahan suatu bilangan bulat sebagai contoh 103 dibagi dengan 3

---

<sup>1</sup> Bin Muhammad, Dr. Abdullah. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Cet. 1, Jilid 5: Bogor; Pustaka Imam asy-syafi'i; Rabi'ul Awwal 1424 H/Mei 2003), h. 250.

(boleh bilangan prima lainnya) kali 34 ditambah 1, ini menunjukkan dalam teorema sisa, atau secara matematikanya  $103 = (3 \times 34) + 1$ . Dilihat dari hasil bagi, bilangan 34 merupakan bilangan sujud, karena dalam sholat sehari semalam sebanyak 17 rakaat, setiap rakaat dilakukan dua kali sujud sehingga jumlahnya 34 kali sujud. Apabila  $103 = (5 \times 20) + 3$ , dilihat dari hasil bagi bilangan 20 menunjuk kepada orang, dalam Qur'an surat Al-Anfaal ayat 65 yang berbunyi : *“wahai nabi (Muhammad) kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang (yang sabar) di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti”*. Maksudnya adalah doronglah semangat mereka untuk mengerjakan hal tersebut, dan pada saat itu Rasulullah memotivasi mereka untuk berperang ketika mengatur barisan mereka dan menghadapi musuh.

Terlebih lagi jika dipandang Firman Allah, angka 309 dengan cara yang sama melalui konsep kekongruenan sama hasilnya yaitu mempunyai sisa, secara matematika  $309 = (7 \times 44) + 1$ . Dilihat dari hasil bagi, bilangan 44 merupakan jumlah dari kata dalam setiap ayat yang di ulang dalam surat Ar-Rahman sedangkan surat Ar-Rahman dengan total jumlah kata sebanyak 683, angka 683 merupakan bilangan prima ke 124 dan bilangan 124 merupakan hasil kali dari  $4 \times 31$ .

Dalam sebuah Hadits, Rasulullah salallaahu alaihi wasalam bersabda :

إِنَّ اللَّهَ وَتَرِيحَبَّالْوَتِر

*“Sesungguhnya Allah subhanahu wata’ala. itu witr dan Dia mencintai yang witr (ganjil),” (HR Bukhari dan Muslim).*

Allahsubhanahu wata’ala itu witr, yang artinya esa dan tidak ada sekutu yang serupa bagi-Nya. Sedangkan makna “Allahsubhanahu wata’ala mencintai witr adalah bahwa mengutamakan bilangan ganjil dalam beberapa amalan dan ketaatan.

Oleh karena itu, Allah subhanahu wata’ala.menjadikan sholat itu 5 waktu, bersuci 3 kali, thawaf 7 kali, sa’i 7 kali, melontar jumroh 7 kali, hari tasyriq ada 3 hari, beristinjak(cebok) 3 kali, kain kafan disyariatkan 3 lapis, zakat pertanian (nishobnya) 5 wasaq, zakat perak 5 uqiyah, demikian juga nishob zakat unta dan lainnya.

Dari keterangan di atas,witr yang dimaksud bukanlah berarti mencakup segala sesuatu secara umum, melainkan maksudnya adalah Allah subhanahu wata’ala. menghukumi beberapa hukum syari’at dan ciptaan-Nya berjumlah witr, seperti sholat disyariatkan witr, langit berjumlah witr, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu ummat Islam perlu mendalami makna ungkapan bilangan prima yang terdapat dalam Qur’an, karena Qur’an sudah ditetapkan Allahsubhanahu wata’ala, tidaklah heran jika mengkaji seluruhnya termasuk

---

<sup>2</sup>[Http://bimbies.wordpress.com/2014/10/07/mengapa-allah-swt-suka-dengan-hal-ganjil/amp/](http://bimbies.wordpress.com/2014/10/07/mengapa-allah-swt-suka-dengan-hal-ganjil/amp/)



bilangan-bilangan lainnya. Terlebih lagi bila dikaji dengan bilangan prima, konsep kekongruenan dengan sifat keterbagian, dan dalam penulisan ini kita hanya perlu mengetahui konsep bilangan prima secara lebih detail yaitu tentang hasil bagi dan sisa dengan menggunakan salah satu teorema yang dinamakan “teorema kecil *Fermat*”.

Dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti ini, maka terdoronglah peneliti untuk menyusun sebuah penelitian yang berjudul “kekongruenan untuk hasil bagi Fermat modulo  $p^4$ , sehingga mahasiswa matematika dapat dengan mudah mempelajari dan memahami tentang apa arti dari kekongruenan dalam teorema *Fermat* tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana cara menemukan kekongruenan yang terdapat dalam hasil bagi Fermat dengan modulo  $p^4$ ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu, untuk mengetahui cara menemukan kekongruenan dalam hasil bagi Fermat dengan modulo  $p^4$  dengan menghasilkan sisa berupa negatif.

### **D. Manfaat**

Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat mengetahui secara deskripsi kekongruenan dengan melibatkan teorema Fermat modulo  $p^4$ . Sedangkan jika

penelitian ini digunakan dikalangan mahasiswa dan umu lainnya sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi jika dilakukan penelitian kedepannya.

#### ***E. Batasan Masalah***

Untul mencari kekongrunan dalam penelitian ini hanya perhitungan manual atau tidak menggunakan program komputer, dan perhitungan ini tidak mencangkup modulo  $p^n$ ,  $n > 4$ , maka perhitungan untuk penelitian ini hanya sampai  $p^4$

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Bilangan bulat*

Himpunan bilangan bulat adalah gabungan dari himpunan bilangan cacah dan himpunan bilangan bulat negatif.

Definisi 1: (definisi ketunggalan suatu bilangan bilangan)

Jika  $n$  bilangan bulat, maka  $-n$  didefinisikan tunggal sehingga;

$$n + (-n) = (-n) + n = 0$$

Definisi 1 menyatakan bahwa secara umum,  $-n$  adalah satu-satunya bilangan, yang bila ditambah dengan  $n$  akan menghasilkan 0, dimana  $n$  adalah bilangan asli. Bilangan  $-n$  disebut “invers tambah (aditif) dari  $n$ ” atau “lawan dari  $n$ ”. Jika  $-n$  adalah invers tambah dari  $n$  maka  $n$  adalah invers tambah dari  $-n$ . Seandainya  $n = 0$  (nol) dan lawan dari 0 adalah  $-0$  dengan  $0 + (-0) = 0$ , tidak termasuk dalam definisi 1 karena 0 sendiri mempunyai sifat  $0 + 0 = 0$ .<sup>3</sup>

Definisi 2:(definisi bilangan bulat)

Misalkan  $\mathbb{Z}$  menyatakan anggota himpunan suatu bilangan bulat maka

$$\mathbb{Z} = \{y \mid -\infty < y < \infty, \}$$

---

<sup>3</sup>Muhammad Arif Tiro, dkk., *pengenalan teori bilangan* (Makassar: Andira Publisher, 2008), h. 112

Dengan operasi penjumlahan (+) dan perkalian ( $\times$ ), dan mempunyai sifat tertutup, asosiatif, komutatif, distributif, serta identitas penjumlahan dan identitas perkalian.

Ada beberapa Sifat-sifat bilangan bulat sebagai berikut :

1. Sifat tertutup
  - a. Sifat tertutup terhadap penjumlahan ada dengan tunggal, yakni untuk setiap  $a$  dan  $b$  di dalam  $\mathbb{Z}$  maka  $a + b$  juga di dalam  $\mathbb{Z}$ .
  - b. Sifat tertutup terhadap perkalian ada dengan tunggal, yakni untuk setiap  $a$  dan  $b$  di dalam  $\mathbb{Z}$  maka  $a \times b$  juga di dalam  $\mathbb{Z}$ .
2. Sifat komutatif
  - a. Sifat komutatif terhadap penjumlahan yaitu untuk setiap  $a$  dan  $b$  di dalam  $\mathbb{Z}$  berlaku  $a + b = b + a$
  - b. Sifat komutatif terhadap perkalian yaitu untuk setiap  $a$  dan  $b$  di dalam  $\mathbb{Z}$  berlaku  $a \times b = b \times a$
3. Sifat asosiatif
  - a. Sifat asosiatif terhadap penjumlahan yaitu untuk sembarang bilangan bulat  $a, b$  dan  $c$  di dalam  $\mathbb{Z}$  berlaku  $(a + b) + c = a + (b + c)$ ,
  - b. Sifat asosiatif terhadap perkalian yaitu untuk sembarang bilangan bulat  $a, b$  dan  $c$  di dalam  $\mathbb{Z}$  berlaku  $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ .
4. Sifat distributif
  - a. Sifat distributif kiri perkalian terhadap penjumlahan yaitu untuk sembarang bilangan bulat  $a, b$  dan  $c$  di dalam  $\mathbb{Z}$  berlaku  $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$ ,

- b. Sifat distributif kanan perkalian terhadap penjumlahan yaitu untuk sembarang bilangan bulat  $a, b$  dan  $c$  di dalam  $\mathbb{Z}$  berlaku
- $$(a + b) \times c = (a \times c) + (b \times c).$$
5. Unsur identitas penjumlahan yaitu untuk setiap bilangan bulat  $a$ , selalu berlaku  $a + 0 = 0 + a = a$ , sehingga  $0$  (nol) disebut unsur identitas penjumlahan.
6. Unsur identitas perkalian yaitu untuk setiap bilangan bulat  $a$ , ada dengan tunggal bilangan bulat  $1$  sehingga  $a \times 1 = 1 \times a = a$ , sehingga  $1$  disebut unsur identitas perkalian.
7. Sifat-sifat lainnya:
- Refleksi yaitu  $\forall a \in \mathbb{Z}$  berlaku  $a = a$ ;
  - Simetris yaitu jika  $a = b$  maka  $b = a$ ,  $\forall a \in \mathbb{Z}$ ;
  - Transitif yaitu jika  $a = b$  dan  $b = c$  maka  $a = c$ ,  $\forall a \in \mathbb{Z}$  maka  $b, c \in \mathbb{Z}$ ;
  - Substitusi yaitu jika jika  $a = b$  maka dapat disubstitusikan untuk  $a$  dalam suatu pernyataan tanpa merubah nilai dari pernyataan tersebut.

## **B. Bilangan prima**

Bilangan prima merupakan salah satu bagian dari teori bilangan yang telah menjadi objek penelitian selama berabad-abad. Salah satu hal yang membuatnya menarik adalah pola distribusinya seolah acak. Oleh sebab itu, bilangan prima banyak digunakan di bidang informatika, dalam proses *Enkripsi* yaitu proses dimana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang

hampir tidak dikenali, sebagai informasi awalnya hanya dengan menggunakan algoritma tertentu, yaitu pesan dengan tingkat keamanan yang relatif tinggi.

Bilangan prima memiliki kekhususan dan peran penting yang tidak dimiliki oleh bilangan lain. Selain itu, sebagai kontradiksi mengenai rumus dan banyaknya bilangan prima belum tentu dijelaskan secara tuntas. Karena itu, sejarah dan perkembangan bilangan prima semakin meluas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, bilangan prima sangat unik.

Definisi 3: (definisi bilangan prima)

Bilangan bulat  $p > 1$  disebut bilangan prima bilamana tidak ada pembagi  $d$  terhadap  $p$  yang memenuhi syarat  $1 < d < p$ . Dengan perkataan lain, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu, yang faktor pembaginya adalah satu dan bilangan itu sendiri. Sebuah bilangan bulat  $p > 1$  yang bukan bilangan prima disebut bilangan komposit (tersusun).<sup>4</sup>

Definisi 3 diatas, misalkan diberikan dua bilangan bulat yaitu  $d = 5$  dan  $p = 7$  maka 7 tidak bisa dibagi oleh 5 selain 1 dan bilangannya sendiri yaitu 7 dan 5 tidak ada pembaginya kecuali 1 dan 5 itu sendiri yang artinya 1 dapat membagi keduanya sedangkan keduanya tidak bisa membagi satu sama lain selain dirinya sendiri atau bisa tuliskan  $1 < 5 < 7$ .

Banyak matematikawan mencoba mencari rumus untuk menentukan bilangan prima, akan tetapi rumus yang mereka temukan tidak membuahkan hasil

---

<sup>4</sup>Muhammad Arif Tiro, dkk., *pengenalan teori bilangan* (Makassar: Andira Publisher, 2008), h. 221

yang puas. Rumus yang masih dipakai untuk menentukan bilangan prima tersebut sebagiannya adalah;

- a) Bilangan prima Sophie Germain, yaitu bilangan prima dengan rumus  $2p + 1$ , misalnya 23 adalah prima Sophie Germain karena  $(2 \times 23) + 1 = 47$  dan bilangan 47 juga merupakan bilangan prima. Sehingga bilangan ini diberi nama sesuai dengan nama matematikawan asal Prancis “Marie Sophie Germain”.
- b) Teorema Fermat yang menyatakan bahwa “jika  $p$  adalah bilangan prima, maka untuk semua bilangan bulat  $a$ ,  $a^p = a \pmod{p}$ ”. Ini berarti, jika diambil sembarang bilangan  $a$  kemudian di kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak  $p$  kali, dan dikurangi dengan  $a$ , hasilnya akan habis dibagi oleh  $p$ .<sup>5</sup>

### ***C. Faktor Persekutuan Terbesar dan Kelipatan Persekutuan Terkecil***

Definisi 4.a: (definisi Faktor Persekutuan)

Bila  $d|a$  dan  $d|b$  maka  $d$  disebut faktor persekutuan dari  $a$  dan  $b$ . Sebagai ilustrasi, 1 merupakan faktor persekutuan dari setiap pasangan bilangan bulat. Bila  $a$  dan  $b$  tidak keduanya 0 maka faktor persekutuannya tidak akan melebihi  $|a|$  dan juga  $|b|$ .

Definisi 4.b: (definisi Faktor Persekutuan Terbesar)

Bilangan paling besar diantara semua faktor persekutuan tersebut disebut faktor persekutuan terbesar (FPB) atau *great common divisor* (*gcd*). Dalam

---

<sup>5</sup>Muhammad Arif Tiro, dkk., *pengenalan teori bilangan* (Makassar: Andira Publisher, 2008), h.224-225.

hal ini  $d$  disebut faktor persekutuan terbesar dari  $a$  dan dari  $b$ , atau ditulis  $d = \gcd(a, b)$ , atau FPB( $a, b$ ) =  $d$ , tetapi biasa ditulis  $(a, b) = d$ .

Definisi 4.b di atas dengan  $(a, b) = d$  dapat dikarakterisasikan oleh;

1.  $d|a$  dan  $d|b$  (ini berarti  $d$  faktor persekutuan dari  $a$  dan dari  $b$ ).
2. Bila ada  $c$  dengan  $c|a$  dan  $c|b$  maka  $c \leq d$ , ini berarti  $d$  faktor persekutuan terbesar.

Definisi 5: (definisi bilangan prima relatif)

Untuk tiga bilangan bulat  $a, b$  dan  $c$  dikatakan saling prima relatif jika  $(a, b, c) = 1$

Akan tetapi, apabila  $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) = 1$  maka  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$  juga dikatakan saling prima relatif yaitu “saling prima dua-dua atau saling prima sepasang demi sepasang”, seperti  $(7, 8, 15) = 1$  merupakan saling prima dan saling prima dua-dua,  $(4, 6, 9, 10) = 1$  merupakan saling prima dan tidak saling prima dua-dua karna  $(4, 6) = 2$ ;  $(4, 10) = 2$ ;  $(6, 9) = 3$ ;  $(6, 10) = 2$  meski  $(4, 9) = (9, 10) = 1$

Untuk bilangan yang kecil, pekerjaan menentukan FPB tidaklah menjadi masalah. Tetapi untuk bilangan yang besar maka diperlukan metoda khusus dalam menentukan FPB. Sebagai ilustrasi ketika diminta menentukan FPB dari 1492 dan 1066 maka cara mendaftarkan semua faktor kedua bilangan ini kemudian mengambil yang terbesar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, maka metode untuk menentukan faktor tersebut disebut algoritma *Euclidean*.



Algoritma *Euclidean* adalah algoritma untuk mencari FPB dari dua buah bilangan bulat, *Euclid* adalah seorang matematikawan asal Yunani yang pertama kali menuliskan algoritma ini didalam bukunya yang terkenal yaitu *Element*.

Lemma 1: (Lemma *Euclid*)

Jika  $a|bc$  dan  $(a, b) = 1$  maka  $a|c$

Bukti :

Untuk  $(a, b) = 1$  berdasarkan definisi 3, terdapat bilangan bulat  $x, y$  dimana  $(a \times x) + (b \times y) = 1$ . Karena  $a|(b \times c)$ , terdapat suatu bilangan bulat  $s$  dimana  $a \times s = b \times c$ . selanjutnya  $c = c \times 1 = c \times a \times x + c \times b \times y = c \times a \times x + c \times s \times y$ , yang berarti  $a|c$ .<sup>6</sup>

Contoh 1:

Misalkan 81 dan 266, dengan  $266 = (81 \times 3) + 23$ . Perhatikanlah bahwa  $(81, 23) = 1$  maka menurut Lemma *Euclidean*  $(266, 81) = 1$ , hal ini menunjukkan bahwa  $(266, 81, 23) = 1$  merupakan saling prima relatif.

Definisi 6 : (definisi Kelipatan Persekutuan Terkecil)

Diberikan  $a, b \in \mathbb{Z}$  yang keduanya tidak nol, bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan dari  $a$  dan  $b$  dinamakan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari  $a$  dan  $b$ , dan dinotasikan dengan  $[a, b]$ , atau dapat kita catat bahwa jika  $a|c$  dan  $b|c$  maka  $[a, b]|c$ .

---

<sup>6</sup>Didit B. Nugroho, *Diktat kuliah MX 127 Teori Bilangan* (Salatiga: Prodi matematika FSM Universitas Kristen Satya Wacana, Desember 2008), hal.28.

#### D. Keterbagian

Definisi 7 : (definisi keterbagian)

Bila  $a$  dan  $b$  suatu bilangan bulat positif, dan  $a = q \times b$  untuk semua bilangan bulat  $q$  maka dapat dikatakan bahwa  $b$  dapat membagi habis  $a$ , atau  $b$  adalah faktor dari  $a$ , dan dapat ditulis  $a|b$ , jika  $a \nmid b$  maka  $b$  bukan faktor dari  $a$ .

Contoh 2:

Dengan mengambil nilai  $a = 20$ , Faktor-faktor dari 20 adalah, 1, 2, 4, 5 dan 20, dapat ditulis  $20|1, 20|2, 20|4, 20|5$ , dan  $20|20$ .

Teorema 1: (Teorema algoritma pembagian)

Untuk setiap pasangan bilangan bulat  $a$  dan  $p$  dimana  $p > 0$ , selalu terdapat secara tunggal pasangan bilangan bulat  $q$  dan  $r$  yang memenuhi:

$$a = (p \times q) + r \text{ dengan } 0 \leq r < p$$

Dalam persamaan ini  $q$  dinamakan hasil bagi (*quotient*) dan  $r$  dinamakan sisa atau residu (*remainder*)

Bukti:

Untuk diketahui bahwa  $[x]$  adalah fungsi *floor* yang menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan  $x$  dimana  $x$  adalah sembarang bilangan riil yang mempunyai sifat  $x - 1 < [x] \leq x$ .

Sekarang diambil  $p > 0$  dan misalkan diambil sembarang bilangan bulat  $a$  yang didefinisikan,

$$q = \left\lfloor \frac{a}{p} \right\rfloor$$

$$r = a - p \times q$$

Secara jelas pada  $a = p \times q + r$ , tetapi perlu membuktikan bahwa  $0 \leq r < p$ . Dan berdasarkan sifat fungsi *floor*,

$$\frac{a}{p} - 1 < \left\lfloor \frac{a}{p} \right\rfloor \leq \frac{a}{p}.$$

Dengan mengalikan semua suku dengan  $-p$ ;

$$p - a > -p \left\lfloor \frac{a}{p} \right\rfloor \geq -a$$

Sekarang tambahkan  $a$  kesemua ruas diperoleh;

$$p > a - pq \geq 0$$

Karena  $r = a - pq$  maka akan terbukti dengan hasil akhir

$$0 \leq r < p$$

Teorema 2:

Untuk setiap pasangan bilangan bulat  $a$  dan  $p$  dimana  $p < 0$ , selalu terdapat dengan tunggal pasangan bilangan bulat  $q$  dan  $r$  sehingga,

$$a = q \times (-p) + r \text{ dengan } 0 \leq r < -p$$

Bukti :

Berdasarkan teorema 1, karena  $q$  merupakan bilangan bulat, dengan mengambil  $q = -q$  maka,

$$\begin{aligned} a &= (p \times (-q)) + r \text{ dengan } 0 \leq r < p \\ &= (q \times (-p)) + r \text{ dengan } 0 \leq r < -p \end{aligned} \tag{2.1}$$

Akan tetapi pada teorema 1 untuk setiap pasangan bilangan bulat  $a$  dan  $p$  dimana  $p \neq 0$ , selalu terdapat dengan tunggal pasangan bilangan bulat  $q$  dan  $r$  sehingga

$$a = q \times p + r, 0 \leq r < |q| \quad (2.2)$$

Dengan membagi kedua ruas dengan  $q$  dimana  $q > 0$  diperoleh :

$$\frac{a}{q} = p + \frac{r}{q}, \text{ dengan } 0 \leq \frac{r}{q} < 1 \quad (2.3)$$

Persamaan (2.3) menandakan bahwa dengan  $p$  adalah hasil bagi dan  $\frac{r}{q}$  menyatakan sisa yang selalu berada pada batas  $0 \leq \frac{r}{q} < 1$ .<sup>7</sup>

Contoh 3:

Misalkan  $n$  bilangan kuadrat. Buktikan bahwa untuk  $n$  memberikan sisa 0 atau 1 jika dibagi 4.

Jawab :

Karena  $n$  bilangan kuadrat maka ia dapat ditulis  $n = a^2$  untuk suatu bilangan bulat  $a$ . Sekarang ambil  $b = 4$ . Berdasarkan teorema 1 terdapatlah  $q$  dan  $r$  sehingga

$$a = 4q + r$$

dimana dapat menghasilkan sisa  $r = 0$  atau  $r = 1$ . Dengan kedua ruas dikuadratkan didapat:

$$\begin{aligned} a^2 &= (4q + r)^2 \\ &= 16q^2 + 8qr + r^2 \end{aligned}$$

---

<sup>7</sup>Didit B. Nugroho, *Diktat kuliah MX 127 Teori Bilangan* (Salatiga: Prodi matematika FSM Universitas Kristen Satya Wacana, Desember 2008), hal.12-13

Diamati semua kemungkinan nilai  $r$ . Jika  $r = 0$  diperoleh  $n = 4(4q^2) + 0$ .  
 Jika  $r = 1$  diperoleh  $n = 4(4q^2 + 2q) + 1$ , untuk kedua kasus ini, memberikan sisa 0 atau 1. Ini terbukti bahwa untuk  $n$  suatu bilangan kuadrat yang memberikan sisa 0 atau 1 jika dibagi 4.

### **E. Kekongruenan**

Kekongruenan adalah sebuah kesamaan dalam rumus matematika yaitu ketika rumus itu ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kekongruenan dalam teori bilangan membahas mengenai sisa-sisa dari suatu bilangan bulat yang tidak habis di bagi oleh bilangan lain, kekongruenan disimbolkan dengan " $\equiv$ ",

Modulo adalah sebuah operasi bilangan yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Misalkan diberikan dua bilangan  $a$  dan  $b$ , untuk  $a, b \in \mathbb{Z}$ , ditulis  $a$  modulo  $b$  ( $a \bmod b$ ) adalah bilangan bulat dengan sisa pembagian  $a$  ketika dibagi oleh  $b$ . Misalnya,  $5 \bmod 7$  yaitu memiliki sisa 5 jika bilangan itu dibagi 7 dan bilangan yang dimaksud adalah 26, 33, 40, dan seterusnya,  $2 \bmod 9$  yaitu memiliki sisa 2 jika bilangan itu dibagi 9 dan bilangan yang dimaksud adalah 11, 20, 29, dan seterusnya. Penerapan operasi modulus dalam teori bilangan tergolong dalam aritmatika modulo.

Dalam teori kongruensi terdapat sifat-sifat dasar untuk kekongruensiannya sehingga dapat dinyatakan dalam definisi berikut:

Definisi 8: (definisi kekongruenan)

Misalkan  $p \in \mathbb{N}$  dan  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Dikatakan kongruen modulo  $p$ , yang dinotasikan dengan  $a \equiv b \pmod{p}$ , jika  $p$  membagi habis  $a - b$  atau  $p|(a - b)$ .

Contoh 4:

(i)  $24 \equiv 3 \pmod{7}$

Untuk 24 modulo 7 akan bersisa 3, karena berdasarkan definisi 8,7 dapat membagi habis  $(24 - 3)$  atau  $7|(24 - 3)$ .

(ii)  $50 \equiv 2 \pmod{3}$

Untuk 50 modulo 3 akan bersisa 2, karena berdasarkan definisi 8,3 dapat membagi habis  $(50 - 2)$  atau  $3|(50 - 2)$ .

(iii)  $2^5 \equiv -9 \pmod{41}$

Untuk  $2^5$  modulo 41 akan bersisa  $-9$ , karena berdasarkan definisi 8,41 dapat membagi habis  $(2^5 - (-9))$  atau  $41|(2^5 - (-9))$ .

Pada definisi 7, diambil  $p$  sebagai pembagi maka sebarang bilangan bulat  $a$  selalu terdapat hasil bagi dengan simbol  $q$  dan jika tak membagi habis, maka ada sisa dengan simbol  $r$  dan diperoleh kembali teorema 1, atau dapat ditulis

$$a \equiv r \pmod{p} \tag{2.4}$$

Karena ada  $p$  pilihan untuk  $r$  maka disimpulkan bahwa setiap bilangan bulat pasti kongruen modulo  $p$  dengan salah satu bilangan  $0, 1, 2, \dots, (p - 1)$ . Khususnya bila hanya  $a \equiv 0 \pmod{p}$ . Himpunan bilangan  $\{1, 2, 3, \dots, (p - 1)\}$  disebut residu taknegatif terkecil modulo  $p$ . Secara umum, barisan bilangan bulat  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_p$  dikatakan membangun himpunan lengkap residu modulo  $p$  jika setiap bilangan bulat kongruen dengan salah satu bilangan  $a_k$ . Dengan kata lain jika  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_p$  kongruen modulo  $p$  dengan  $0, 1, 2, \dots, (p - 1)$  dengan urutan yang tidak beraturan.

Teorema 3 : (teorema-teorema kekongruenan)

Misalkan  $p$  adalah bilangan bulat positif sembarang dan misalkan  $a, b, c$ , dan  $d$  adalah bilangan bulat;

1.  $a \equiv a \pmod{p}$
2. Jika  $a \equiv b \pmod{p}$  maka  $b \equiv a \pmod{p}$
3. Jika  $a \equiv b \pmod{p}$  dan  $b \equiv c \pmod{p}$  maka  $a \equiv c \pmod{p}$
4. Jika  $a \equiv b \pmod{p}$  dan  $c \equiv d \pmod{p}$  maka :
  - a.  $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{p}$
  - b.  $ac \equiv bd \pmod{p}$
  - c.  $a \pm c \equiv b \pm c \pmod{p}$
  - d.  $ac \equiv bc \pmod{p}$

Bukti :

1.  $a - a = 0.p$ ; maka disimpulkan  $a \equiv a \pmod{p}$
2. Diberikan  $a \equiv b \pmod{p}$  maka  $a - b = qp$ , jika  $q$  diganti menjadi  $(-q)$  maka  $b - a \equiv (-qp)$  dengan demikian  $b \equiv a \pmod{p}$
3. Diberikan  $a \equiv b \pmod{p}$  yaitu  $a - b = q_1p$  dan  $b \equiv c \pmod{p}$  yaitu  $b - c = q_2p$  diperoleh  $(a - b) + (b - c) = q_1p + q_2p, \rightarrow a - c = (q_1 + q_2)p$  dengan demikian  $a \equiv c \pmod{p}$ .
4. Karena diketahui  $a \equiv b \pmod{p}$  dan  $c \equiv d \pmod{p}$  maka:
  - a.  $a - b = q_1p$  dan  $c - d = q_2p$ , jika keduanya dijumlahkan atau dikurangkan kebawah kebawah maka :

$$\begin{array}{rcl}
 a - b & = & q_1p \\
 c - d & = & q_2p \quad \pm \\
 \hline
 (a - b) \pm (c - d) & = & q_1p \pm q_2p
 \end{array}$$

Dengan menggunakan sedikit operasi aljabar  $(a \pm c) - (b \pm d) = (q_1 \pm q_2)p$ , dengan demikian  $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{p}$ .

b.  $a = q_1p + b$  dan  $c = d + q_2p$ , keduanya dikalikan kebawah maka :

$$\begin{array}{rcl}
 a & = & q_1p + b \\
 c & = & q_2p + d \quad \times \\
 \hline
 axc & = & (q_1p + b)(q_2p + d)
 \end{array}$$

Dengan operasi aljabar pada ruas kanan,  $p(q_1q_2p + q_1b + q_2d) + bd$ , maka  $ac = p(q_1q_2p + q_1b + q_2d) + bd$  dengan demikian diperoleh  $ac \equiv bd \pmod{p}$

c.  $(a - b) = qp$ , pada ruas kiri dengan menambahkan  $c - c = 0$  atau  $-c + c = 0$  (menurut definisi 1),

$$\begin{aligned}
 (a \pm c \mp c - b) &= qp \\
 (a \pm c) - (b \pm c) &= qxp \\
 (a \pm c) &= qp + (b \pm c)
 \end{aligned}$$

Jadi,  $(a \pm c) \equiv (b \pm c) \pmod{p}$

d. Menurut sifat-sifat bilangan bulat, nomor 9 (unsur identitas perkalian) pada halaman 8,

$$\begin{array}{rcl}
 a & = & qp + b \\
 ac & = & cqp + bc \quad \text{kedua ruas dikalikan dengan } c
 \end{array}$$



$$ac \equiv bc \pmod{p}$$

### F. Notasi Sigma

Jumlahan dari beberapa barisan bilangan baik positif maupun negatif disebut deret, untuk penggunaan notasi sigma yang disimbolkan dengan " $\Sigma$ ", (baca: sigma). Untuk diketahui jika;

$$\sum_{i=0}^n i = 0 + 1 + 2 + 3 + \dots + n \quad (2.5)$$

Yang menyatakan jumlahan satu bilangan yang dimulai dari  $i = 0$  sampai  $i = n$ , dengan 0 menyatakan batas awal dan  $n$  menandakan batas terakhir dari penjumlahan bilangan itu. Jika jumlahan suatu bilangan dirumuskan dengan,

$$\sum_{i=1}^{m-2} (3m - x)^i$$

Maka mempunyai artinya jika  $m = 5$ , diperoleh

$$(15 - x)^1 + (15 - x)^2 + (15 - x)^3$$

Untuk jumlahan suatu bilangan, biasanya terlebih dahulu menuliskan jumlahan bilangannya sebelum notasi sigma ditulis, karena untuk menentukan bagaimana notasi sigma yang akan dibentuk nantinya. Berarti beberapa jumlahan suatu bilangan banyak modelnya,

1.  $5(1) + 10(2) + 15(3) + 20(4) + \dots + 5(n)(n) = \sum_{k=1}^n 5(k)(k)$
2.  $1 + 2p + 3p^2 + 4p^3 + 5p^4 + 6p^5 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p^{k-1}$
3.  $(x - 1) + (x - 2)^2 + (x - 3)^3 + \dots + (x - n)^n = \sum_{k=1}^n (x - k)^k$

Akan tetapi biasa juga dahulukan notasi sigma agar dapat ditentukan jumlahnya, seperti;

$$1. \sum_{k=0}^n k^2 - a = (0^2 - a) + (1^2 - a) + (2^2 - a) + \dots + (n^2 - a)$$

$$2. \sum_{k=1}^{n+3} n2^n = 1.2^1 + 2.2^2 + 3.2^3 + \dots + (n+3)2^{(n+3)}$$

### G. Permutasi dan Kombinasi

Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Misalkan jumlah objek adalah  $n$ , maka urutan pertama dipilih dari  $n$  objek, urutan kedua dipilih dari  $n - 1$  objek urutan ketiga dipilih dari  $n - 3$  objek, begitu seterusnya sampai urutan terakhir dipilih 1 objek yang tersisa, menurut kaidah permutasi dari  $n$  objek adalah;

$$n(n - 1)(n - 2)(n - 3) \dots (2)(1) = n! \quad (2.6)$$

Definisi 10 :(definisi permutasi) :

Permutasi  $r$  dari  $n$  objek adalah jumlah kemungkinan urutan  $r$  buah objek yang dipilih dari  $n$  buah objek, dengan  $r \leq n$ , yang dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama.

Jadi, jumlah susunan berbeda dari pemilihan  $r$  objek yang diambil dari  $n$  objek disebut permutasi- $r$ , dilambangkan dengan  $p(n, r)$ ;<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Rinaldi Munir. *Matematika Diskrit*, (Ed. Revisi keenam) Penerbit. Informatika Bandung september 2016h. 238-239

$$p(n, r) = n(n - 1)(n - 2)(n - 3) \dots (n - (r - 1)) \quad (2.7)$$

Atau bisa juga ditulis,

$$p(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!} \quad (2.8)$$

Sedangkan kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi, urutan kemunculan diabaikan.

Definisi 11 :(definisi kombinasi) :

Kombinasi  $r$  elemen dari  $n$  elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut  $r$  elemen yang diambil dari  $n$  buah elemen.<sup>9</sup>

Rumus  $\frac{n!}{r!(n-r)!}$  disebut rumus kombinasi  $-r$ , dan dilambangkan dengan  $C(n, r)$

atau  $\binom{n}{r}$ , jadi;

$$\begin{aligned} \binom{n}{r} &= \frac{n!}{r!(n-r)!} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)}{r(r-1)(r-2) \dots 3.2.1} \end{aligned} \quad (2.9)$$

## H. Induksi Matematika Kuat

Induksi matematika kuat yang berbunyi : *Misalkan  $p(n)$  adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan ingin membuktikan bahwa  $p(n)$  benar untuk semua bilangan bulat  $n \geq n_0$ . Untuk membuktikan ini, hanya perlu menunjukkan bahwa;*

---

<sup>9</sup>Rinaldi Munir. *Matematika Diskrit*, (Ed. Revisi keenam) Penerbit. Informatika Bandung september 2016h. 244-245

1.  $p(n_0)$  benar, dan
2. Jika  $p(n_0), p(n_0 + 1), p(n_0 + 2), \dots, p(n)$  benar, maka  $p(n + 1)$  juga benar untuk setiap bilangan bulat  $n \geq n_0$ , sehingga  $p(n)$  benar untuk semua bilangan bulat  $n \geq n_0$ .

Tercatat bahwa versi induksi yang lebih kuat mirip dengan induksi sederhana, kecuali pada langkah 2 diambil hipotesis induksi yang lebih kuat bahwa semua pernyataan  $p(1), p(2), p(3), \dots, p(n)$  adalah benar daripada hipotesis yang menyatakan bahwa  $p(n)$  benar. Prinsip induksi kuat memungkinkan mencapai kesimpulan yang sama meskipun memberlakukan andaian yang lebih banyak.<sup>10</sup>

### I. *Identitas Pascal*

Secara formal identitas pascal dapat dinyatakan dalam persamaan-persamaan :

$$1. \binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \quad (2.10.1)$$

$$2. \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (2.10.2)$$

$$3. \binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \binom{k+2}{k} + \binom{k+4}{k} \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1} \quad (2.10.3)$$

Bukti :

---

<sup>10</sup>Rinaldi Munir. *Matematika Diskrit*, (Ed. Revisi keenam) Informatika Bandung september 2016, h. 161

Dalam kasus pembuktian ini, dapat dibuktikan untuk ruas kanan akan sama dengan ruas kiri, sekarang untuk proses langkah ruas kanan,

$$1. \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

kalikan dengan  $\frac{(n+1)}{(n+1)}$  pada ruas kanan diperoleh,

$$\begin{aligned} \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{(n+1)}{(n+1)} \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!} + \frac{(n+1)}{(n+1)} \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{1}{(n+1)} \frac{(n+1)!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{1}{(n+1)} \frac{(n+1)!}{k!(n-k)!} \end{aligned}$$

Pada ruas kanan suku pertama, kalikan dengan  $\frac{k}{k}$  dan suku kedua, kalikan

dengan  $\frac{(n-k+1)}{(n-k+1)}$ , sehingga diperoleh,

$$\begin{aligned} \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{k}{(n+1)} \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!} + \frac{(n-k+1)}{(n+1)} \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!} \\ &= \frac{k}{n+1} \binom{n+1}{k} + \frac{n-k+1}{n+1} \binom{n+1}{k} \\ &= \frac{k+(n-k+1)}{n+1} \binom{n+1}{k} \\ &= \binom{n+1}{k} \end{aligned}$$

2. Sama dengan kasus pertama, pembuktian ini dapat dibuktikan untuk ruas kanan akan sama dengan ruas kiri, sekarang untuk proses langkah ruas kanan,

$$\begin{aligned} \binom{n}{n-k} &= \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \binom{n}{k} \end{aligned}$$

3. Untuk kasus kali ini, dapat dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika kuat,

Untuk  $p(1)$

$$\begin{aligned} \binom{k}{k} &= \binom{k+1}{k+1} \\ &= \frac{(k+1)!}{(k+1)! \{(k+1) - (k+1)\}!} \\ &= \frac{(k+1)k!}{(k+1)k!(k-k)!} \\ &= \binom{k}{k} \end{aligned}$$

Andaikan untuk benar untuk  $p(n)$

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \binom{k+2}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

Maka akan benar pula bahwa

Untuk  $p(n+1)$ ,

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \binom{k+2}{k} + \dots + \binom{n}{k} + \binom{n+1}{k} = \binom{(n+1)+1}{k+1}$$

juga benar untuk  $n \geq 1$ .

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \binom{k+2}{k} + \dots + \binom{n}{k} + \binom{n+1}{k} = \binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{k}$$

$$\binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{k} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!((n+1)-(k+1))!} + \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!}$$

Dengan mengalikan  $\frac{(n+2)}{(n+2)}$  pada ruas kanan diperoleh;

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{k} &= \frac{(n+2)}{(n+2)} \times \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} + \frac{(n+2)}{(n+2)} \times \frac{(n+1)!}{k!(n-(k-1))!} \\ &= \frac{(n+2)!}{(n+2)(k+1)!(n-k)!} + \\ &\quad \frac{(n+2)!}{(n+2)k!((n+2)-(k+1))!} \end{aligned}$$

Sekali lagi pada ruas kanan, untuk suku pertama dengan mengalikan

$\frac{(n-k+1)}{(n-k+1)}$  dan suku kedua dengan mengalikan  $\frac{(k+1)}{(k+1)}$  peroleh;

$$\binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{k} = \frac{(n-k+1)}{(n-k+1)} \times \frac{(n+2)!}{(n+2)(k+1)!(n-k)!}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{(k+1)}{(k+1)} \times \frac{(n+2)!}{(n+2)k!((n+2)-(k+1))!} \\
& = \frac{(n-k+1)}{(n+2)} \frac{(n+2)!}{(k+1)!(n-k+1)!} \\
& + \frac{(k+1)}{(n+2)} \frac{(n+2)!}{(k+1)!((n+2)-(k+1))!} \\
& = \frac{(n-k+1)}{(n+2)} \frac{(n+2)!}{(k+1)!((n+2)-(k+1))!} \\
& + \frac{(k+1)}{(n+2)} \frac{(n+2)!}{(k+1)!((n+2)-(k+1))!} \\
& = \frac{(n-k+1)}{(n+2)} \frac{(n+2)}{(k+1)} + \frac{(k+1)}{(n+2)} \frac{(n+2)}{(k+1)} \\
& = \left( \frac{(n-k+1)}{(n+2)} + \frac{(k+1)}{(n+2)} \right) \frac{(n+2)}{(k+1)} \\
& = \frac{n-k+1+k+1}{(n+2)} \frac{(n+2)}{(k+1)} \\
& = \frac{(n+2)}{(n+2)} \frac{(n+2)}{(k+1)} \\
& = \binom{(n+1)+1}{k+1}
\end{aligned}$$



## J. Teorema Fermat

Menguji keprimaan suatu bilangan bulat  $n$  dengan cara membaginya dengan sejumlah bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan  $\sqrt{n}$ , akan tetapi ini kurang efektif karena jika  $n$  besar nilainya, harus menentukan terlebih dahulu semua bilangan prima yang lebih kecil dari  $\sqrt{n}$ . Terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk menguji keprimaan suatu bilangan bulat  $n$  yang dikenal dengan Teorema Fermat (kadang-kadang dinamakan *Fermat's Little Theorem*).<sup>11</sup>

Teorema Fermat merupakan suatu teori yang sangat terkenal dalam teori bilangan, teorema ini dibuktikan oleh seorang matematikawan dari negara Prancis yang bernama *Piere de Fermat*. Dalam teorema Fermat ini terdapat dua teorema, yang pertama dinamakan teorema kecil Fermat dan yang kedua dinamakan teorema terakhir Fermat. Akan tetapi dalam penulisan ini hanya membahas mengenai teorema kecil Fermat.

Teorema 3: (Teorema Kecil Fermat)

Jika  $p$  suatu bilangan prima dan  $(a, p) = 1$  untuk suatu bilangan bulat  $a$  maka :

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (2.11)$$

---

<sup>11</sup>Muhammad Arif Tiro, dkk., *pengenalan teori bilangan* (Makassar: Andira Publisher, 2008), h.309-310.

Atau dengan kata lainnya “jika  $p$  adalah bilangan prima dan  $a$  adalah prima relatif dengan  $p$  maka  $a^{p-1} - 1$  dapat dibagi oleh  $p$ ”, karena ada suatu bilangan  $q$ , penulisan lain untuk teorema Fermat ini adalah

$$q_p(a) = \frac{a^{p-1} - 1}{p} \quad (2.12)$$

Bukti :

Ambil sembarang bilangan prima  $p$  dan bilangan bulat  $a$  sedemikian sehingga  $(a, p) = 1$ .

Jika dipilih  $a$  membentuk barisan  $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ , maka memiliki sisaan terkecil modulo  $p$  dan dari  $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$  adalah suatu permutasi dari  $1, 2, 3, \dots, (p-1)$  sehingga hasil kalinya akan kongruen dengan modulo  $p$  juga, yaitu;

$$\begin{aligned} a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \dots \cdot (p-1) &\equiv \{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1)\} \pmod{p} \\ a^{p-1} \{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1)\} &\equiv (p-1)! \pmod{p} \\ a^{p-1} (p-1)! &\equiv (p-1)! \pmod{p} \end{aligned} \quad (2.13)$$

Karena  $p$  dan  $p-1$  adalah saling prima maka dengan menghapus  $(p-1)!$  dalam persamaan (2.12) pada kedua ruas diperoleh kembali persamaan (2.12),<sup>12</sup> dan dengan mengalikan kedua ruas dengan  $a$  bisa juga ditulis  $a^p \equiv a \pmod{p}$ . Bukti lain yang dapat ditunjukkan adalah, karena

---

<sup>12</sup>Muhammad Arif Tiro, dkk., *pengenalan teori bilangan* (Makassar: Andira Publisher, 2008), h.311.

$a^p \equiv a \pmod{p}$  jika  $(a, p) = p$ , maka  $p|a$  sehingga  $a \equiv 0 \pmod{p}$  dan  $a^p \equiv 0 \pmod{p}$  pula. Jadi  $a^p \equiv a \pmod{p}$ .

### **K. Teorema Binomial**

Teorema Binomial adalah rumus penjabaran  $(x + y)^n$ , dengan  $n$  bilangan bulat tak negatif. Untuk  $n$  yang kecil, penjabaran  $(x + y)^n$ , dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi, dengan nilai  $n$  yang besar, seperti cara menghitung  $(x + y)^{20}$ ,  $(x + y)^{50}$ ,  $(x + y)^{100}$  dan sebagainya jelas akan menghabiskan waktu yang cukup jika harus dijabarkan satu demi satu atau suku demi suku seperti biasanya dilakukan pada  $n$  yang kecil. Dengan adanya teorema binomial inilah cara mudah dan cepat dapat dipakai untuk menjabarkan suatu bilangan dengan pangkat tertinggi.

Teorema 4 : (Teorema Binomial)

Misalkan  $x$  dan  $y$  adalah bilangan-bilangan riil dan  $n$  adalah bilangan bulat tak negatif, maka:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \quad (2.14)$$

Bukti :

Teorema Binomial akan dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika, bahwa teorema benar untuk  $n = 0$ , yaitu

$$(x + y)^0 = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{0} x^{0-k} y^k$$

Ruas kiri :  $(x + y)^0 = 1$ , berapapun untuk harga  $x$  dan  $y$ )

Ruas kanan :  $\binom{n}{0} x^0 y^0 = 1.1 = 1$

Terlihat bahwa;

$$(x + y)^0 = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{0} x^{0-k} y^k$$

Induksi : Misalkan teorema benar untuk  $n = k$ ,

$$(x + y)^k = \binom{k}{0} x^k + \binom{k}{1} x^{k-1} y + \binom{k}{2} x^{k-2} y^2 + \dots + \binom{k}{k-1} x y^{k-1} + \binom{k}{k} y^k$$

Akan dibuktikan bahwa teorema juga benar untuk  $n = k + 1$ , yaitu bahwa :

$$\begin{aligned} (x + y)^{k+1} &= (x + y)^k (x + y) \\ &= \binom{k+1}{0} x^{k+1} + \binom{k+1}{1} x^k y + \binom{k+1}{2} x^{k-1} y^2 + \dots + \\ &\quad \binom{k+1}{k} x y^k + \binom{k+1}{k+1} y^{k+1} \end{aligned}$$

Dengan menggunakan kebenaran hipotesis  $(x + y)^k$  maka diperoleh,

$$\begin{aligned} (x + y)^{k+1} &= \left( \binom{k}{0} x^k + \binom{k}{1} x^{k-1} y + \binom{k}{2} x^{k-2} y^2 + \dots + \binom{k}{k-1} x y^{k-1} \right. \\ &\quad \left. + \binom{k}{k} y^k \right) (x + y) \\ &= \left( \binom{k}{0} x^k + \binom{k}{1} x^{k-1} y + \dots + \binom{k}{k} y^k \right) x + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left( \binom{k}{0} x^k + \binom{k}{1} x^{k-1}y + \dots + \binom{k}{k} y^k \right) y \\
&= \left( \binom{k}{0} x^{k+1} + \binom{k}{1} x^k y + \dots + \binom{k}{k} x y^k \right) + \\
& \quad \left( \binom{k}{0} x^k y + \binom{k}{1} x^{k-1} y^2 + \dots + \binom{k}{k} y^{k+1} \right) \\
&= \binom{k}{0} x^{k+1} + \left( \binom{k}{1} + \binom{k}{0} \right) x^k y + \left( \binom{k}{2} + \binom{k}{1} \right) x^{k-1} y^2 + \dots + \\
& \quad \left( \binom{k}{k} + \binom{k}{k-1} \right) x y^k + \binom{k}{k} y^{k+1}
\end{aligned}$$

Menurut persamaan (2.10.1),  $\binom{k}{r} + \binom{k}{r-1} = \binom{k+1}{r}$ , sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
(x+y)^{k+1} &= \binom{k}{0} x^{k+1} + \binom{k+1}{1} x^k y + \binom{k+1}{2} x^{k-1} y^2 + \dots + \binom{k+1}{k} x y^k \\
& \quad + \binom{k}{k} y^{k+1} \\
&= \binom{k+1}{0} x^{k+1} + \binom{k+1}{1} x^k y + \binom{k+1}{2} x^{k-1} y^2 + \dots + \\
& \quad \binom{k+1}{k} x y^k + \binom{k+1}{k+1} y^{k+1}
\end{aligned}$$

Dengan  $\binom{k}{0} = \binom{k+1}{0} = \binom{k}{k} = \binom{k+1}{k+1} = 1$ ,

Karena terbukti bahwa teorema juga benar untuk  $n = k + 1$ , sehingga terbukti bahwa

$$(x + y)^n = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1}y + \binom{n}{2} x^{n-2}y^2 + \dots + \binom{n}{n-1} xy^{n-1} + \binom{n}{n} y^n$$

Benar untuk semua bilangan bulat positif  $n$ .<sup>13</sup>

berdasarkan teorema Binomial dan identitas Pascal, perhatikanlah identitas berikut ini;

$$\sum_{k=1}^n \frac{(1-x)^k}{k} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k} (x^k - 1) \quad (2.15)$$

Identitas persamaan (2.15) dapat dibuktikan dengan cara ruas kanan dengan uraian tertentu akan sama dengan ruas kiri dengan uraian tertentu, untuk ruas kanan,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k} (x^k - 1) &= \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k (x)^k}{k} - \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k} \\ &= \left( \binom{n}{1} \frac{(-x)^1}{1} + \binom{n}{2} \frac{x^2}{2} + \binom{n}{3} \frac{(-x)^3}{3} + \dots \right. \\ &\quad \left. + \binom{n}{n} \frac{(-x)^n}{n} \right) - \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k} \end{aligned} \quad (2.16)$$

Sekarang, untuk ruas kiri persamaan (2.15),

---

<sup>13</sup>Drs. Jong Jek Siang, M. Sc. *Matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer*, Penerbit Andi yogyakarta. 2002, hal. 167-170.

$$\sum_{k=1}^n \frac{(1-x)^k}{k} = \frac{(1-x)^1}{1} + \frac{(1-x)^2}{2} + \frac{(1-x)^3}{3} + \frac{(1-x)^4}{4} + \frac{(1-x)^5}{5} \\ + \dots + \frac{(1-x)^n}{n}$$

Sedangkan untuk  $\frac{(1-x)^1}{1}, \frac{(1-x)^2}{2}, \frac{(1-x)^3}{3}$ , dan seterusnya padaruasakanan,

berdasarkan teorema Binomial diperoleh,

$$\frac{(1-x)^1}{1} = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} \frac{(1)^{1-k}(-x)^k}{1} \\ = \binom{1}{0} (1)^{1-0}(-x)^0 + \binom{1}{1} (1)^{1-1}(-x)^1 \\ = 1 - x$$

$$\frac{(1-x)^2}{2} = \sum_{k=0}^2 \binom{2}{k} \frac{(1)^{2-k}(-x)^k}{2} \\ = \frac{\binom{2}{0} (1)^{2-0}(-x)^0}{2} + \frac{\binom{2}{1} (1)^{2-1}(-x)^1}{2} + \frac{\binom{2}{2} (1)^{2-2}(-x)^2}{2} \\ = \frac{1}{2} - x + \frac{x^2}{2}$$

$$\frac{(1-x)^3}{3} = \sum_{k=0}^3 \binom{3}{k} \frac{(1)^{3-k}(-x)^k}{3} \\ = \frac{\binom{3}{0} (1)^{3-0}(-x)^0}{3} + \frac{\binom{3}{1} (1)^{3-1}(-x)^1}{3} + \frac{\binom{3}{2} (1)^{3-2}(-x)^2}{3} \\ + \frac{\binom{3}{3} (1)^{3-3}(-x)^3}{3} \\ = \frac{1}{3} - x + x^2 - \frac{x^3}{3}$$

$$\begin{aligned}
\frac{(1-x)^4}{4} &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} \frac{(1)^{4-k}(-x)^k}{4} \\
&= \frac{\binom{4}{0}(1)^{4-0}(-x)^0}{4} + \frac{\binom{4}{1}(1)^{4-1}(-x)^1}{4} + \frac{\binom{4}{2}(1)^{4-2}(-x)^2}{4} \\
&\quad + \frac{\binom{4}{3}(1)^{4-3}(-x)^3}{4} + \frac{\binom{4}{4}(1)^{4-4}(-x)^4}{4} \\
&= \frac{1}{4} - x + \frac{3x^2}{2} - x^3 + \frac{x^4}{4} \\
\frac{(1-x)^5}{5} &= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} (1)^{5-k}(-x)^k \\
&= \frac{\binom{5}{0}(1)^{5-0}(-x)^0}{5} + \frac{\binom{5}{1}(1)^{5-1}(-x)^1}{5} + \frac{\binom{5}{2}(1)^{5-2}(-x)^2}{5} \\
&\quad + \frac{\binom{5}{3}(1)^{5-3}(-x)^3}{5} + \frac{\binom{5}{4}(1)^{5-4}(-x)^4}{5} + \frac{\binom{5}{5}(1)^{5-5}(-x)^5}{5} \\
&= \frac{1}{5} - x + 2x^2 - 2x^3 + x^4 - \frac{x^5}{5} \\
&\quad \vdots
\end{aligned}$$

$$\frac{(1-x)^n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(1)^{n-k}(-x)^k}{n} \tag{2.17}$$

Dengan menjumlahkan kebawah persamaan (2.17) pada ruas kanan untuk konstanta dalam variabel  $x$  diperoleh;

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$



Dengan menyamakan hasil ini pada persamaan (2.16) untuk konstanta dalam variabel  $x$  diperoleh,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = - \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k} \quad (2.18)$$

Persamaan (2.18) dapat dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika kuat dan bantuan aturan kombinasi pada persamaan (2.9),

Untuk  $p(1)$

$$\sum_{k=1}^1 \frac{1}{k} = - \sum_{k=1}^1 \binom{1}{k} \frac{(-1)^k}{k}$$

$$\frac{1}{1} = - \binom{1}{1} \frac{(-1)^1}{1}$$

$$1 = 1$$

Andaikan benar untuk  $p(n)$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = - \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k}$$

Maka akan benar pula untuk  $p(n + 1)$  dengan  $n \geq 1$ ;

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \frac{1}{n+1} = - \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} \frac{(-1)^k}{k}$$

Perhatikan uraiannya berikut;

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \frac{1}{n+1} = - \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k} + \frac{1}{n+1}$$

$$\begin{aligned}
&= -\left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k} - \frac{1}{n+1}\right) \\
&= -\left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k} + \frac{-1}{n+1}\right) \\
&= -\sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} \frac{(-1)^{k+1}}{k}
\end{aligned}$$

Jadi terbukti,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = -\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k}$$

Sekarang, dengan menjumlahkan kebawah pada persamaan (2.17) untuk koefisien pada variabel  $x$  diperoleh,

$$\begin{aligned}
&(-x) + (-x) + (-x) + (-x) + (-x) + \cdots + (-x) \\
&= -x - x - x - x - x - \cdots - x \\
&= -nx
\end{aligned}$$

Dengan menyamakan hasil ini pada persamaan (2.16) yang mengandung variabel  $x$ , diperoleh,

$$-nx = \binom{n}{1} \frac{(-x)^1}{1}$$

$$-nx = n(-x)$$

$$-nx = -nx$$

Sekarang, dengan menjumlahkan kebawah pada persamaan (2.17) untuk koefisien pada variabel  $x^2$  diperoleh,

$$\frac{x^2}{2} + x^2 + \frac{3x^2}{2} + 2x^2 + \cdots + \binom{n}{2} \frac{1}{n} x^2 = \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \cdots + \frac{n-1}{2}\right) x^2$$

Dengan menyamakan hasil ini pada persamaan (2.16) yang mengandung variabel  $x^2$ , diperoleh,

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \dots + \frac{n-1}{2}\right) x^2 &= \binom{n}{2} \frac{x^2}{2} \\ (1 + 2 + 3 + \dots + (n-1)) \frac{x^2}{2} &= \binom{n}{2} \frac{x^2}{2} \\ \left(\binom{1}{1} + \binom{2}{1} + \binom{3}{1} + \dots + \binom{n-1}{1}\right) \frac{x^2}{2} &= \binom{n}{2} \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan (2.10.3) dengan  $k = 1$  maka diperoleh;

$$\binom{n}{2} \frac{x^2}{2} = \binom{n}{2} \frac{x^2}{2}$$

Sekarang, dengan menjumlahkan kebawah pada persamaan (2.17) untuk koefisien pada variable  $x^3$  diperoleh

$$\begin{aligned} \left(-\frac{x^3}{3}\right) + (-x^3) + (-2x^3) + \dots + \binom{n}{3} \frac{1}{n} (-x^3) \\ = -\left(\left(\frac{1}{3} + \frac{3}{3} + \frac{6}{3} + \dots + \frac{(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2}\right) x^3\right) \end{aligned}$$

Dengan menyamakan hasil ini pada persamaan(2.16) yang mengandung variabel  $x^3$ , diperoleh,

$$\begin{aligned} -\left(\left(\frac{1}{3} + \frac{3}{3} + \frac{6}{3} + \dots + \frac{(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2}\right) x^3\right) &= \binom{n}{3} \frac{(-x)^3}{3} \\ -\left(1 + 3 + 6 + \dots + \frac{(n-1)(n-2)}{2}\right) \frac{x^3}{3} &= -\binom{n}{3} \frac{x^3}{3} \\ -\left(\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \dots + \binom{n-1}{2}\right) \frac{x^3}{3} &= -\binom{n}{3} \frac{x^3}{3} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan (2.10.3) dengan  $k = 2$  maka diperoleh,

$$-\binom{n}{3} \frac{x^3}{3} = -\binom{n}{3} \frac{x^3}{3}$$

Pada persamaan (2.17) jika diseteruskan dengan menjumlahkan kebawah sampai pada variabel  $x^n$ , diperoleh,

$$\binom{n}{n} \frac{(-x)^n}{n}$$

Dengan menyamakan hasil ini pada persamaan (2.16) yang mengandung variabel  $x^n$ , diperoleh,

$$\binom{n}{n} \frac{(-x)^n}{n} = \binom{n}{n} \frac{(-x)^n}{n}$$

Jadi terbukti bahwa,

$$\sum_{k=1}^n \frac{(1-x)^k}{k} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k} (x^k - 1)$$

## L. *Bilangan Bernoulli*

Dalam materi kekongruenan, bilangan bernoulli untuk suku banyak didefinisikan oleh sebuah persamaan berikut :

Definisi 12: (definisi bilangan Bernoulli)

Dengan  $B_n$  menyatakan bilangan bernoulli,  $B_n(x)$  menyatakan suku banyak bilangan bernoulli dan nilai  $B_{2n+1} = 0$  untuk  $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ , maka;<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>K. Ireland and M Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, GTM 84, Springer-Verlag, New York Heidelberg Berlin, 1982. P. 229

$$B_0 = 1, \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k = 0 \quad (n = 2, 3, 4, 5, \dots) \quad (2.19.1)$$

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k x^{n-k} = 0 \quad (n = 2, 3, 4, 5, \dots) \quad (2.19.2)$$

Untuk penjumlahan berikut,

$$\sum_{i=1}^{p-1} i = 1 + 2 + 3 + \dots + (p-1)$$

$$\sum_{i=1}^{p-1} i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (p-1)^2$$

$$\sum_{i=1}^{p-1} i^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + (p-1)^3$$

⋮

$$\sum_{i=1}^{p-1} i^k = 1^k + 2^k + 3^k + \dots + (p-1)^k$$

Menurut S. Kongsit dan P. K. Saikia (*shilong, Meghalaya, India*),<sup>15</sup> dengan kekongruenan bahwa untuk suatu  $p$  bilangan prima ganjil dan  $k$  suatu bilangan bulat positif dengan  $(p-1) \nmid k$ , maka berlaku.

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + (p-1)^k = \sum_{j=1}^{p-1} j^k \equiv pB_k \pmod{p^2} \quad (2.20)$$

Dan untuk beberapa bilangan prima  $p > 3$ , berlaku pula

---

<sup>15</sup>S. Khongsit and P.K Saikia, *A Congruence For The Fermat Quotient Modulo  $p^3$* . shilong, Meghalaya, India. Integer (2016). P. 2

$$\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{k^3} \equiv -2B_{p-3}(\text{mod } p) \quad (2.21.1)$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \equiv \frac{2}{3}pB_{p-3}(\text{mod } p^2) \quad (2.21.2)$$

$$\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{k^2} \equiv \frac{7}{3}pB_{p-3}(\text{mod } p^2) \quad (2.21.3)$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} \equiv -\frac{1}{3}p^2B_{p-3}(\text{mod } p^3) \quad (2.21.4)$$

Secara umum, menurut Z. H. Sun,<sup>16</sup> diberikan suatu bilangan prima  $p > 5$  maka,

$$\sum_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{x^k} \equiv \begin{cases} \frac{k(2^{k+1} - 1)}{2(k+1)} pB_{p-1-k}(\text{mod } p^2) & \text{jika } k \in \{2, 4, 6, \dots, p-5\} \\ -\frac{2^k - 2}{k} B_{p-k}(\text{mod } p) & \text{jika } k \in \{3, 5, \dots, p-4\} \end{cases} \quad (2.22)$$

## M. Bilangan Harmonik

### 1. Pengertian bilangan Harmonik

Bilangan Harmonik adalah bilangan yang didefinisikan untuk penjumlahan serangkain harmonik, dimana untuk  $n \geq 1, m \geq 1$  maka,

$$H_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$H_{n,m} = \frac{1}{1^m} + \frac{1}{2^m} + \frac{1}{3^m} + \frac{1}{4^m} + \dots + \frac{1}{n^m}$$

---

<sup>16</sup> Z. H. Sun, *Congruences Concerning Bernoulli Number and Bernoulli polynomials*, Discrete App. Math. 105 (2000), P. 210.

Definisi 13 : (Bilangan Harmonik)

Untuk penjumlahan serangkaian bilangan sesara harmonik, diberikan

$$n \geq 1, m \geq 1,$$

$$H_0 = 0, \quad H_{0,0} = 0, \quad H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}, \quad \text{dan} \quad H_{n,m} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^m}$$

Bilangan Harmonik memenuhi dengan dentitas seperti :

$$a. H_n = H_{n-1} + \frac{1}{n} \quad (2.23.1)$$

$$b. H_n = H_{n+1} - \frac{1}{n+1} \quad (2.23.2)$$

$$c. \sum_{k=1}^{n-1} H_k = nH_n - n \quad (2.23.3)$$

$$d. \sum_{k=n-1}^{n-1} \binom{k}{n-1} H_k = \binom{n-1}{n-1} H_{n-1} \quad (2.23.4)$$

Bukti :

a. Dari definisi 13,

$$\begin{aligned} H_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{n} \\ &= H_{n-1} + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

b. Dari definisi 13,

$$\begin{aligned}
 H_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \frac{1}{n+1} \\
 &= H_{n+1} + \frac{1}{n+1}
 \end{aligned}$$

c. dengan menggunakan induksi matematika kuat dan bantuan aturan kombinasi,

untuk  $p(1)$

$$H_1 = 2H_2 - 2$$

$$1 = \left(2 \binom{3}{2}\right) - 2$$

$$1 = 1$$

Andaikan benar  $p(n)$

$$\sum_{k=1}^{n-1} H_k = nH_n - n$$

Maka akan dibuktikan pula bahwa  $p(n+1)$

$$\sum_{k=1}^{(n+1)-1} H_k = (n+1)H_{(n+1)} - (n+1)$$

Juga benar untuk  $n > 1$

$$\sum_{k=1}^{(n+1)-1} H_k = \sum_{k=1}^n H_k$$



$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^{n-1} H_k + H_n \\
&= (nH_n - n) + H_n \\
&= n \left( H_{n+1} - \frac{1}{n+1} \right) - n + \left( H_{n+1} - \frac{1}{n+1} \right) \\
&= nH_{n+1} - \frac{n}{n+1} - n + H_{n+1} - \frac{1}{n+1} \\
&= nH_{n+1} + H_{n+1} - n - \left( \frac{n+1}{n+1} \right) \\
&= (n+1)H_{n+1} - n - 1
\end{aligned}$$

Jadi terbukti bahwa,  $\sum_{k=1}^{n-1} H_k = nH_n - n$

d. Dengan menggunakan induksi matematika kuat dan bantuan aturan kombinasi,

Untuk  $p(1)$

$$\sum_{k=1}^1 \binom{k}{1} H_k = \binom{1}{1} H_1$$

$$\binom{1}{1} H_1 = \binom{1}{1} H_1$$

Andaikan benar untuk  $p(n)$

$$\sum_{k=n-1}^{n-1} \binom{k}{n-1} H_k = \binom{n-1}{n-1} H_{n-1}$$

Maka untuk  $p(n + 1)$

$$\sum_{k=(n+1)-1}^{(n+1)-1} \binom{k}{(n+1)-1} H_k = \binom{(n+1)-1}{(n+1)-1} H_{(n+1)-1}$$

Juga benar untuk  $n > 1$ . Sekarang perhatikan uraian berikut,

$$\begin{aligned} \sum_{k=(n+1)-1}^{(n+1)-1} \binom{k}{(n+1)-1} H_k &= \sum_{k=n}^n \binom{k}{n} H_k \\ &= \binom{n}{n} H_n \\ &= \binom{(n+1)-1}{(n+1)-1} H_{(n+1)-1} \end{aligned}$$

Jadi terbukti,

$$\sum_{k=n-1}^{n-1} \binom{k}{n-1} H_k = \binom{n-1}{n-1} H_{n-1}$$

## 2. kekongruenan bilangan harmonik

Lemma 1: (lemma kekongruenan bilangan harmonik)

Diberikan  $p$  sebuah bilangan prima ganjil dan  $k \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$  dimana

$$\begin{aligned} \binom{p-1}{k} (-1)^k &\equiv \left( 1 - pH_k + \frac{p^2}{2} ((H_k)^2 - H_{k,2}) \right. \\ &\quad \left. - \frac{p^3}{6} ((H_k)^3 - 3(H_k)(H_{k,2}) + 2H_{k,3}) \right) \pmod{p^4} \\ &\equiv \left( 1 - pH_k + p^2 \frac{1}{2} ((H_k)^2 - H_{k,2}) \right) \pmod{p^3} \\ &\equiv (1 - pH_k) \pmod{p^2} \end{aligned} \tag{2.24}$$

Bukti : untuk nilai  $k = 0, 1, 2$  hasilnya mudah didapat, untuk  $k \geq 3$ ;

$$\begin{aligned}
\binom{p-1}{k} &= \frac{(p-1)(p-2)(p-3) \dots (p-k)((p-1)-k)!}{((p-1)-k)! k!} \\
&= \frac{(p-1)(p-2)(p-3) \dots (p-k)}{k!} \\
&= \frac{p^k}{k!} + \dots + \frac{p^4}{k!} \sum_{1 \leq i < j < l < m \leq k} \frac{(-1)(-2)(-3) \dots (-k)}{(-i)(-j)(-l)(-m)} \\
&\quad + \frac{p^3}{k!} \sum_{1 \leq i < j < l \leq k} \frac{(-1)(-2) \dots (-k)}{(-i)(-j)(-l)} + \frac{p^2}{k!} \sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{(-1)(-2) \dots (-k)}{(-i)(-j)} \\
&\quad + \frac{p}{k!} \sum_{i=1}^k \frac{(-1)(-2) \dots (-k)}{(-i)} + \frac{(-1)^k k!}{k!} \\
&\equiv (-1)^k \left( -p^3 \sum_{1 \leq i < j < l \leq k} \frac{1}{ijl} + p^2 \sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{1}{ij} - p \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} + 1 \right) \pmod{p^4} \\
&\equiv (-1)^k \left( p^2 \sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{1}{ij} - p \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} + 1 \right) \pmod{p^3} \\
&\equiv (-1)^k \left( -p \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} + 1 \right) \pmod{p^2}
\end{aligned}$$

Sedangkan untuk nilai,

$$\sum_{1 \leq i < j < l \leq k} \frac{1}{ijl} = \frac{1}{6} \left( \left( \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \right)^3 - 3 \left( \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \right) \left( \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} \right) + 2 \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^3} \right) \quad (2.25)$$

$$\sum_{1 \leq i < j \leq k} \frac{1}{ij} = \frac{1}{2} \left( \left( \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \right)^2 - \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} \right) \quad (2.26)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.25) dan (2.26) diperoleh,

$$\begin{aligned} \binom{p-1}{k} &\equiv (-1)^k \left( -p^3 \frac{1}{6} \left( \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \right)^3 - 3 \left( \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \right) \left( \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} \right) + 2 \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^3} \right) \\ &\quad + p^2 \frac{1}{2} \left( \left( \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \right)^2 - \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} \right) - p \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} + 1 \pmod{p^4} \\ &\equiv (-1)^k \left( p^2 \frac{1}{2} \left( \left( \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \right)^2 - \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} \right) - p \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} + 1 \right) \pmod{p^3} \\ &\equiv (-1)^k \left( -p \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} + 1 \right) \pmod{p^3} \end{aligned}$$

sedangkan menurut definisi 13,  $\sum_{i=1}^k \frac{1}{i} = H_k$  dan  $\sum_{i=1}^k \frac{1}{i^m} = H_{k,m}$ , menjadi,

$$\begin{aligned} \binom{p-1}{k} &\equiv (-1)^k \left( -\frac{p^3}{6} \{ (H_k)^3 - 3(H_k)(H_{k,2}) + 2H_{k,3} \} + p^2 \frac{1}{2} \{ (H_k)^2 - H_{k,2} \} \right. \\ &\quad \left. - pH_k + 1 \right) \pmod{p^4} \\ &\equiv (-1)^k \left( p^2 \frac{1}{2} \{ (H_k)^2 - H_{k,2} \} - pH_k + 1 \right) \pmod{p^3} \\ &\equiv (-1)^k (-pH_k + 1) \pmod{p^2}.^{17} \end{aligned}$$

Dengan mengalikan  $(-1)^k$  pada kedua ruas maka diperoleh;

$$\begin{aligned} (-1)^k \binom{p-1}{k} &\equiv (-1)^{2k} \left( -\frac{p^3}{6} \{ (H_k)^3 - 3(H_k)(H_{k,2}) + 2H_{k,3} \} \right. \\ &\quad \left. + p^2 \frac{1}{2} \{ (H_k)^2 - H_{k,2} \} - pH_k + 1 \right) \pmod{p^4} \end{aligned}$$

---

<sup>17</sup>Z. H. Sun, *Congruences Involving Bernoulli and Euler Number*, J. Number Theori 128 (2008), P. 285-286

$$\begin{aligned} &\equiv (-1)^k \left( p^2 \frac{1}{2} \{ (H_k)^2 - H_{k,2} \} - pH_k + 1 \right) \pmod{p^3} \\ &\equiv (-1)^k (-pH_k + 1) \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Jadi terbukti untuk persamaan (2.24).

Lemma 2: (lemma kekongruenan bilangan harmonik)

Untuk beberapa bilangan prima  $p > 3$ , maka

$$H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p^2} \quad (2.27)$$

Bukti:

Dari persamaan (2.24) (lemma 1) baris ketiga, dengan mengganti  $k = p - 1$ , maka diperoleh,

$$\begin{aligned} (-1)^{p-1} \binom{p-1}{p-1} &\equiv (1 - pH_{p-1}) \pmod{p^2} \\ 1 &\equiv (1 - pH_{p-1}) \pmod{p^2} \end{aligned}$$

Dan berdasarkan relasi kekongruenan dapat ditulis,

$$H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Secara umum untuk suatu bilangan prima  $p > 3$  dan  $k \in \{1, 2, 3, \dots,$

$p - 4\}$  maka diperoleh,

$$\sum_{x=1}^{p-1} \frac{1}{x^k} = H_{p-1,k} \equiv 0 \pmod{p}.^{18} \quad (2.28)$$

---

<sup>18</sup>G. H. Hardy, E.M. Wright, And Introduction to the theory of Numbers, 5th, Oxford Univ. Press, Oxford, 1981, p.104

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. *Jenis Penelitian***

Adapun jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian tersebut adalah berbentuk kajian pustaka (*library research*) yaitu kajian yang menggunakan beberapa referensi (buku atau jurnal). Penelitian ini disebut juga penelitian sains karena mengkaji berbagai buku atau jurnal yang ditulis oleh para pakar matematika.

#### **B. *Sumber Penelitian***

Untuk melancarkan penelitian ini, peneliti mengambil sumber dari beberapa buku atau beberapa jurnal yang berkaitan dengan judul tersebut.

#### **C. *Lokasi dan Waktu Penelitian***

Adapun lokasi yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu bertempat di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan, media internet juga dapat dijadikan bahan atau tempat diambilnya referensi (jurnal Internasional) tersebut. Sedangkan jangka waktu yang akan dilakukan untuk penelitian ini yaitu sampai berakhirnya semua penelitian.

#### **D. *Prosedur Penelitian***

Untuk mencapai tujuan penelitian pada pendahuluan, maka langkah-langkah yang di ambil adalah sebagai berikut:

1. Menemukan beberapa persamaan pada kombinatorik, dan bilangan harmonik.
2. Menemukan beberapa kekongruenan untuk modulo  $p, p^2, p^3$  dan  $p^4$ .
3. Membuktikan kekongruenan hubungan antara bilangan Bernoulli dan bilangan harmonik modul  $p^4$  untuk  $p$  suatu bilangan prima ganjil positif.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

Berdasarkan uraian dari prosedur penelitian, maka langkah awal yang dilakukan adalah;

1. Menentukan beberapa persamaan pada kombinatorik, dan bilangan harmonik.

Dari persamaan (2.9) untuk persamaan kombinasi,

$$\binom{p}{k} = \frac{p}{k} \binom{p-1}{k-1} \quad (4.1)$$

Diberikan  $p > k$  dengan  $p$  suatu bilangan prima ganjil, dan  $k$  suatu bilangan asli, maka diperoleh persamaan-persamaan harmonik,

$$a. H_{p-(k+1)} = H_{p-1} - \sum_{j=1}^k \frac{1}{p-j} \quad (4.2.1)$$

$$b. (H_{p-(k+1)})^2 = (H_{p-1})^2 - 2H_{p-1} \sum_{j=1}^k \frac{1}{p-j} + \left( \sum_{j=1}^k \frac{1}{p-j} \right)^2 \quad (4.2.2)$$

$$c. H_{p-(k+1),2} = H_{p-1,2} - \sum_{j=1}^k \frac{1}{(p-j)^2} \quad (4.2.3)$$

Persamaan (4.2.2) diperoleh dari persamaan (4.2.1) dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Untuk persamaan (4.2.3) diperoleh dari persamaan (4.2.1) untuk bilangan harmonik kuadrat berdasarkan definisi 13. Untuk persamaan-persamaan bilangan harmonik lainnya diperoleh,



$$\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_k}{k^2} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^3} \quad (4.3.1)$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_k^2}{k^2} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{2H_{k-1}}{k^3} + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^4} \quad (4.3.2)$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k,2}}{k^2} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^4} \quad (4.3.3)$$

$$\sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} \quad (4.3.4)$$

$$\sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} \quad (4.3.5)$$

$$\sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} \quad (4.3.6)$$

$$\sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} \quad (4.3.7)$$

$$\sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{(p-k)-1}}{(p-k)^3} \quad (4.3.8)$$

$$\sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{(p-k)-1}^2}{(p-k)^2} \quad (4.3.9)$$

$$\sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{(p-k)-1,2}}{(p-k)^2} \quad (4.3.10)$$

Untuk persamaan (4.3.1) sampai persamaan (4.3.10) pernyataan untuk nilai  $k$  ganjil adalah dimulai dari  $1, 3, 5, \dots, p - 1$ , sedangkan untuk  $k$  genap dimulai dari  $2, 4, 6, \dots, p - 1$ .

Persamaan (4.3.1) diperoleh dengan menjabarkan ruas kiri bilangan

harmoniknya,  $\frac{H_k}{k^2} = \frac{H_{k-1} + \frac{1}{k}}{k^2}$  dengan menguraikan secara aljabar dan kedua ruas

masing masing disigmakan untuk  $k$  ganjil positif. Persamaan (4.3.2) dengan

langkah yang sama pada persamaan (4.3.1) dengan mengkuadratkan bilangan

harmoniknya a dan untuk  $k$  bilangan bulat positif. Persamaan (4.3.3) diperoleh

dengan menjabarkan ruas kiri bilangan harmoniknya,  $\frac{H_{k,2}}{k^2} = \frac{H_{k-1,2} + \frac{1}{k^2}}{k^2}$  dengan

mrnguraikan secara aljabar dan masing-masing kedua ruas disigmakan untuk  $k$

bilangan bulat positif. Persamaan (4.3.4) dengan menguraikan ruas kanan suku

pertama untuk  $k$  bilangan bulat positif dan dengan menguraikan ruas kanan

suku kedua untuk  $k$  ganjil positif maka akan menghasilkan ruas kiri.

Persamaan (4.3.5) sama dengan persamaan (4.3.4) untuk penjabarannya, hanya

saja bilangan harmoniknya dipangkatkan dua. Persamaan (4.3.6) sama dengan

persamaan (4.3.4) untuk penjabarannya, hanya saja bilangan harmonik kuadrat.

Persamaan (4.3.7) sama dengan persamaan (4.3.4) untuk penjabarannya, akan

tetapi untuk penyebut  $k^3$ . Persamaan (4.3.8) diperoleh dari ruas kiri, bila

dijabarkan untuk  $k$  genap akan sama hasilnya dengan ruas kanan bila jabarkan

juga untuk  $k$  ganjil. Persamaan (4.3.9) diperoleh dari ruas kiri bila dijabarkan

untuk  $k$  genap akan sama hasilnya dengan ruas kanan bila jabarkan juga untuk

$k$  ganjil dan bilangan harmoniknya dipangkatkan dua. Persamaan (4.3.10) diperoleh dari ruas kiri bila dijabarkan untuk  $k$  genap akan sama hasilnya dengan ruas kanan bila jabarkan juga untuk  $k$  ganjil dan merupakan bilangan harmonic kuadrat.

2. Menemukan beberapa kekongruenan untuk modulo  $p, p^2, p^3$  dan  $p^4$ .

Dari identitas persamaan (2.15), dengan mengambil  $x = 0$  dan  $n = p$  maka diperoleh,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^p \frac{1}{k} &= \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} (-1)^k \left(-\frac{1}{k}\right) \\ \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{p} &= \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} (-1)^k \left(-\frac{1}{k}\right) + \binom{p}{p} (-1)^p \left(-\frac{1}{p}\right) \\ \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} &= - \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} \left(\frac{(-1)^k}{k}\right) + \left(\frac{-(-1)^p}{p}\right) - \frac{1}{p} \\ \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} &= - \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} \frac{(-1)^k}{k} - \left(\frac{(-1)^p + 1}{p}\right) \end{aligned} \quad (4.4)$$

Persamaan (4.4) baris kedua diuraikan secara bentuk sigma dari baris pertama, dengan masing-masing kedua ruas ditambahkan dengan  $\left(-\frac{1}{p}\right)$  dan diuraikan secara aljabar, diperoleh baris kedua. Untuk  $p$  prima ganjil positif, maka  $\left(\frac{(-1)^p + 1}{p}\right) = 0$ , jadi persamaan (4.4) dapat ditulis menjadi,

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} = - \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} \frac{(-1)^k}{k} \quad (4.5)$$

Dengan mensubtitusikan persamaan (4.1) ke persamaan (4.5) diperoleh,

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} = -p \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p-1}{k-1} \frac{(-1)^k}{k^2} \quad (4.6)$$

Dari lemma 1 (persamaan (2.24)) pada baris kedua, dengan mengganti  $k = k - 1$  diperoleh,

$$\binom{p-1}{k-1} (-1)^k \equiv - \left( 1 - pH_{k-1} + \frac{p^2}{2} ((H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}) \right) \pmod{p^3} \quad (4.7)$$

Dengan mensubtitusikan persamaan (4.7) ke persamaan (4.6) diperoleh,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} &\equiv p \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \left( 1 - pH_{k-1} + \frac{p^2}{2} ((H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}) \right) \pmod{p^3} \\ &\equiv p \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} - p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \left( \frac{1}{2} ((H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}) \right) \pmod{p^3} \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} = p^3 q + p \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} - p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \left( \frac{1}{2} ((H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}) \right)$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} = p^3 \left( q + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \left( \frac{1}{2} ((H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}) \right) \right) + p \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} - p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2}$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} \equiv \left( p \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} - p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} \right) \pmod{p^3} \quad (4.8)$$

Persamaan (4.8) baris kedua diperoleh dari baris pertama dengan perkalian kedalam secara aljabar. Untuk  $q$  suatu bilangan bulat, menurut relasi kekongruenan diperoleh baris ketiga, bila diuraikan secara aljabar, diperoleh baris keempat. Pada baris keempat,

$$q + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \left( \frac{1}{2} ((H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}) \right)$$

Merupakan hasil kali. Karena menurut kekongruenan, diperoleh baris kelima.

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.21.2) dan (2.21.4) ke persamaan (4.8) diperoleh,

$$-\frac{1}{3}p^2B_{p-3} \equiv \left( \frac{2}{3}p^2B_{p-3} - p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} \right) \pmod{p^3}$$

$$-\frac{1}{3}p^2B_{p-3} = p^3q + \frac{2}{3}p^2B_{p-3} - p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2}$$

$$p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} = p^3q + \frac{2}{3}p^2B_{p-3} + \frac{1}{3}p^2B_{p-3}$$

$$p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} = p^2(pq + B_{p-3})$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} = pq + B_{p-3}$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} \equiv B_{p-3} \pmod{p} \tag{4.9}$$

Persamaan (4.9) baris kedua diperoleh dari baris pertama menurut relasi kekongruenan dengan  $q$  suatu bilangan bulat. Baris kedua, kedua ruas sama-sama ditambahkan dengan,

$$p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + \frac{1}{3} p^2 B_{p-3}$$

Diperoleh baris ketiga. Dengan proses secara aljabar, diperoleh baris keempat dan kelima, serta menurut relasi kekongruenan, diperoleh baris keenam.

Dari lemma 1 (persamaan (2.24)) pada baris pertama untuk  $k = k - 1$  diperoleh,

$$\begin{aligned} \binom{p-1}{k-1} (-1)^k &\equiv - \left( 1 - pH_{k-1} + \frac{p^2}{2} (H_{k-1}^2 - H_{k-1,2}) \right. \\ &\quad \left. - \frac{p^3}{6} (H_{k-1}^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2} + 2H_{k-1,3}) \right) \pmod{p^4} \end{aligned} \quad (4.10)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (4.10) ke persamaan (4.6) diperoleh,

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} \equiv p \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \left( 1 - pH_{k-1} + \frac{p^2}{2} (H_{k-1}^2 - H_{k-1,2}) - \frac{p^3}{6} (H_{k-1}^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2} + 2H_{k-1,3}) \right) \pmod{p^4}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} &\equiv p \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} - p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(H_{k-1}^2 - H_{k-1,2})}{2k^2} \\ &\quad - p^4 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(H_{k-1}^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2} + 2H_{k-1,3})}{6k^2} \pmod{p^4} \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} = p^4 q + p \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} - p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(H_{k-1}^2 - H_{k-1,2})}{2k^2}$$

$$\begin{aligned}
& -p^4 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(H_{k-1}^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2} + 2H_{k-1,3})}{6k^2} \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} &= p^4 \left( q - p^4 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(H_{k-1}^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2} + 2H_{k-1,3})}{6k^2} \right) + p \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} \\
& -p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(H_{k-1}^2 - H_{k-1,2})}{2k^2} \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} &\equiv p \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k^2} - p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{2k^2} - p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{2k^2} \pmod{p^4} \quad (4.11)
\end{aligned}$$

Persamaan(4.11) baris kedua diperoleh dari baris pertama dengan uraian secara aljabar. Menurut relasi kekongruenan, untuk  $q$  suatu bilangan bulat, diperoleh baris ketiga. Baris keempat ruas kanan suku pertama,

$$q - p^4 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(H_{k-1}^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2} + 2H_{k-1,3})}{6k^2}$$

Merupakan hasil bagi, ini tidak diambil karena modulo  $p^4$ , menurut relasi kekongruan, diperoleh baris kelima.

Dengan mensubtitusikan persamaan (2.21.2), (2.21.4), dan (4.9) ke persamaan (4.11) diperoleh,

$$\begin{aligned}
-\frac{1}{3}p^2B_{p-3} &\equiv \frac{2}{3}p^2B_{p-3} - p^2B_{p-3} + p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{2k^2} - p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{2k^2} \pmod{p^4} \\
-\frac{1}{3}p^2B_{p-3} &\equiv -\frac{1}{3}p^2B_{p-3} + p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{2k^2} - p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{2k^2} \pmod{p^4}
\end{aligned}$$

$$p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{2k^2} \equiv p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{2k^2} \pmod{p^4}$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} \equiv \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} \pmod{p} \quad (4.12)$$

Persamaan (4.12) diperoleh dari baris pertama dengan dengan menjumlahkan ruas kanan suku pertama dan suku kedua, dengan maing masing kedua ruas ditambahkan

$$-\frac{1}{3}p^2 B_{p-3} + p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{2k^2}$$

Diperoleh baris ketiga. Sedangkan menurut relasi kekongruenan dan kedua ruas sama-sama dibagi  $p^3$  diperoleh baris keempat.

Dari persamaan (4.2.1) dan berdasarkan lemma 2 (persamaan (2.27)) dapat ditulis,

$$\begin{aligned} H_{p-(k+1)} &= H_{p-1} - \sum_{j=1}^k \frac{1}{p-j} \equiv \sum_{j=1}^k \frac{1}{j} \pmod{p} \\ &\equiv H_k \pmod{p} \end{aligned} \quad (4.13)$$

Dari persamaan (4.13), maka persamaan (4.3.8) dapat ditulis,

$$\sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{(p-k)-1}}{(p-k)^2} \equiv \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_k}{k^2} \pmod{p} \quad (4.14)$$



Untuk ruas paling kiriberdasarkan persamaan (4.3.4), dan ruas paling kanan berdasarkan persamaan (4.3.1), sehingga persamaan(4.14) dapat ditulis,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} &\equiv \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^3} \pmod{p} \\ \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} &\equiv 2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^3} \pmod{p} \end{aligned} \quad (4.15)$$

Persamaan (4.15) baris kedua, diperoleh dari kedua ruas masing-masing ditambahkan,

$$\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2}.$$

Persamaan(4.15) ruas kanan suku kedua,

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^3} &\equiv - \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{1}{k^3} \pmod{p} \\ &\equiv -\frac{1}{8} \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{k^3} \pmod{p} \end{aligned} \quad (4.16)$$

Persamaan (4.16) baris kedua diperoleh dari baris pertama dengan mengambil  $k$  suatu bilangan bulat agar menjadi sigma yang dimulai dari  $k = 1$ , Dengan mnsbutitusikan persamaan (2.21.1), ke persamaan (4.16) diperoleh,

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^3} &\equiv \left(-\frac{1}{8}\right) (-2) B_{p-3} \pmod{p} \\
\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^3} &\equiv \frac{1}{4} B_{p-3} \pmod{p}
\end{aligned} \tag{4.17}$$

Persamaan(4.17) baris kedua diperoleh dari baris pertama dengan sedikit proses aljabar.

Pada persamaan (4.15) untuk ruas kiri substitusikan persamaan (4.9), dan ruas kanan suku kedua substitusikan persamaan (4.17) maka diperoleh,

$$\begin{aligned}
B_{p-3} &\equiv 2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + \frac{1}{4} B_{p-3} \pmod{p} \\
B_{p-3} - \frac{1}{4} B_{p-3} &\equiv 2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} \pmod{p} \\
\frac{3}{8} B_{p-3} &\equiv \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} \pmod{p}
\end{aligned} \tag{4.18}$$

Persamaan(4.18) baris kedua diperoleh dari baris pertama dengan masing masing kedua ditambahkan  $-\frac{1}{4} B_{p-3}$ , kemudian dengan sedikit proses aljabar, diperoleh baris ketiga.

Berdasarkan teorema 3 nomor 2, persamaan (4.18) dapat ditulis,

$$\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} \equiv \frac{3}{8} B_{p-3} \pmod{p} \tag{4.19}$$

Dari persamaan (4.2.2) dan berdasarkan lemma 2 (persamaan (2.27)) maka diperoleh,

$$\begin{aligned} H_{(p-k)-1}^2 &\equiv \left( \sum_{j=1}^k \frac{1}{j} \right)^2 \pmod{p} \\ &\equiv H_k^2 \pmod{p} \end{aligned} \quad (4.20)$$

Berdasarkan persamaan (4.20), persamaan (4.3.9) dapat ditulis,

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} &= \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{p-(k+1)}^2}{(p-k)^2} \\ &\equiv \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_k^2}{k^2} \pmod{p} \end{aligned} \quad (4.21)$$

Persamaan (4.21) ruas kiri substitusikan persamaan (4.3.5), dan ruas kanan substitusikan persamaan (4.3.2) ( $k$  ganjil), maka dapat di tulis menjadi,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} &\equiv \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{2H_{k-1}}{k^3} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^4} \pmod{p} \\ \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} &\equiv 2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} + 2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^4} \pmod{p} \end{aligned} \quad (4.22)$$

Persamaan (4.22) baris kedua diperoleh dari baris pertama dengan masing-masing kedua ruas tambahkan,

$$\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2}$$

Untuk ruas kanan suku ketiga pada persamaan (4.22),

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^4} &\equiv - \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{1}{k^4} \pmod{p} \\
&\equiv -\frac{1}{16} \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{k^4} \pmod{p}
\end{aligned} \tag{4.23}$$

Persamaan (4.23) baris kedua diperoleh dari baris pertama dengan mengambil  $k$  suatu bilangan bulat agar menjadi sigma yang dimulai dari  $k = 1$ , Pada persamaan (2.22) untuk  $k$  yang genap dan pada persamaan tersebut, dengan  $x$  diganti dengan  $k$  maka diperoleh,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{k^4} &\equiv \frac{4(2^{4+1} - 1)}{2(4 + 1)} pB_{p-1-4} \pmod{p^2} \\
\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{k^4} &\equiv \frac{62}{5} pB_{p-5} \pmod{p^2} \\
\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{k^4} &= p^2q + \frac{62}{5} pB_{p-5} \\
\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \frac{1}{k^4} &\equiv 0 \pmod{p}
\end{aligned} \tag{4.24}$$

Persamaan (4.24) baris kedua diperoleh dari baris pertama dengan sedikit proses aljabar, baris ketiga diperoleh menurut relasi kekongruenan untuk suatu bilangan bulat  $q$ , baris keempat diperoleh karena sisa pembagian oleh  $p$  adalah nol,  $p^2q$  bisa dibagi oleh  $p$ . Dengan mensubstitusikan persamaan (4.24) ke persamaan (4.23) diperoleh,

$$\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^4} \equiv 0 \pmod{p} \quad (4.25)$$

Untuk ruas kanan suku kedua, persamaan (4.3.7) dapat diubah menjadi,

$$\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} \equiv - \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} \pmod{p} \quad (4.26)$$

Substitusikan persamaan (4.3.8), kepersamaan (4.26) diperoleh,

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} &\equiv - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{p-(k+1)}}{(p-k)^3} \pmod{p} \\ &\equiv - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_k}{k^3} \pmod{p} \\ &\equiv - \left( \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^4} \right) \pmod{p} \end{aligned} \quad (4.27)$$

Menurut relasi kekongruenan, persamaan (4.27) dapat ditulis,

$$2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} \equiv \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^4} \pmod{p} \quad (4.28)$$

Substitusikan persamaan (4.25) ke persamaan (4.28) diperoleh,

$$2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^3} \equiv 0 \pmod{p} \quad (4.29)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (4.25) dan (4.29) ke persamaan (4.22) diperoleh,

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} \equiv 2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} + 0 + 0 \pmod{p}$$

$$\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{k^2} \equiv \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{2k^2} \pmod{p} \quad (4.30)$$

Menurut relasi kekongruenan, persamaan(4.30) baris kedua diperoleh dari baris pertama.

Dari persamaan (4.2.3) dengan mensubstitusikan persamaan (2.28) ( $k = 2$ ) diperoleh,

$$H_{p-(k+1),2} = 0 - \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{(p-k)^2} \equiv H_{k,2} \pmod{p} \quad (4.31)$$

Menurut persamaan (4.31), persamaan (4.3.10) dapat ditulis menjadi,

$$\sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} \equiv \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k,2}}{k^2} \pmod{p} \quad (4.32)$$

Dari persamaan (4.32), ruas kiri substitusikan persamaan (4.3.6) dan ruas kanan substitusikan persamaan (4.3.3), maka dapat ditulis menjadi,

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} \equiv \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^4} \pmod{p}$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} \equiv 2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^4} \pmod{p} \quad (4.33)$$

Persamaan(4.33) baris kedua diperoleh dari baris pertama dengan masing-masing kedua ruas ditambahkan,

$$\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2}.$$

Persamaan (4.33) ruas kanan suku kedua, substitusikan persamaan (4.25) diperoleh,

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} \equiv 2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} + 0 \pmod{p}$$

Menurut teorema 3 nomor 3 maka diperoleh,

$$\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} \equiv \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{2k^2} \pmod{p} \quad (4.34)$$

3. Membuktikan kekongruenan hubungan antara bilangan Bernoulli dan bilangan harmonik modulo  $p^4$  untuk  $p$  suatu bilangan prima ganjil positif.

Menurut persamaan (2.15), dengan mengganti  $x = -1$  dan  $n = p$  diperoleh,

$$\sum_{k=1}^p \frac{2^k}{k} = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} (-1)^k \frac{(-1)^k - 1}{k}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} + \frac{2^p}{p} &= \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} (-1)^k \frac{(-1)^k - 1}{k} + \binom{p}{p} (-1)^p \frac{(-1)^p - 1}{p} \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} &= \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} (-1)^k \frac{(-1)^k - 1}{k} + \left( \frac{1 - (-1)^p}{p} \right) - \frac{2^p}{p} \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} &= \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} (-1)^k \frac{(-1)^k - 1}{k} + \left( \frac{1 - (-1)^p - 2^p}{p} \right) \tag{4.35}
\end{aligned}$$

Persamaan (4.35) baris kedua ruas kiri diperoleh dari baris pertama dengan menguraikan suku demi suku, begitu pula untuk ruas kanan, sedangkan baris ketiga diperoleh dengan masing-masing kedua ruas ditambahkan  $-\frac{2^p}{p}$ .

Ruas kanan suku kedua persamaan (4.35) Untuk  $p$  suatu bilangan prima ganjil positif  $(-1)^p = -1$ , dan ruas kanan suku kedua substitusikan persamaan (4.1) sehingga dapat ditulis menjadi,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} &= \sum_{k=1}^{p-1} p \binom{p-1}{k-1} (-1)^k \frac{(-1)^k - 1}{k^2} + \frac{2 - 2^p}{p} \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} &= \sum_{k=1}^{p-1} p \binom{p-1}{k-1} (-1)^k \frac{(-1)^k - 1}{k^2} + 2 \left( \frac{1 - 2^{p-1}}{p} \right) \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} - 2 \left( \frac{1 - 2^{p-1}}{p} \right) &= \sum_{k=1}^{p-1} p \binom{p-1}{k-1} (-1)^k \frac{(-1)^k - 1}{k^2} \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} + 2 \left( \frac{2^{p-1} - 1}{p} \right) &= \sum_{k=1}^{p-1} p \binom{p-1}{k-1} (-1)^k \frac{(-1)^k - 1}{k^2} \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} + 2 \left( \frac{2^{p-1} - 1}{p} \right) &= \sum_{k=1}^{p-1} p \binom{p-1}{k-1} (-1)^k \frac{(-1)^k - 1}{k^2} \tag{4.36}
\end{aligned}$$



Persamaan(4.36) dari baris pertama sampai baris terakhir diuraikan secara aljabar. Berdasarkan lemma 1 (persamaan (2.24)) baris pertama, dengan mengganti  $k = k - 1$  diperoleh

$$\begin{aligned}
\binom{p-1}{k-1} (-1)^{k-1} &\equiv 1 - pH_{k-1} + p^2 \left( \frac{(H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}}{2} \right) \\
&\quad - p^3 \frac{((H_{k-1})^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2})}{6} - p^3 \left( \frac{2H_{k-1,3}}{6} \right) \pmod{p^4} \\
- \binom{p-1}{k-1} (-1)^k &\equiv 1 - pH_{k-1} + p^2 \left( \frac{(H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}}{2} \right) \\
&\quad - p^3 \frac{((H_{k-1})^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2})}{6} \\
&\quad - p^3 \left( \frac{2H_{k-1,3}}{6} \right) \pmod{p^4} \tag{4.37}
\end{aligned}$$

Berdasarkan teorema Fermat pada persamaan (2.12),  $(q_p(a) = \frac{a^{p-1}}{p})$  dengan  $a = 2$ , dan mensubstitusikan persamaan (4.37) ke persamaan (4.36) serta untuk suatu bilangan asli positif  $k$  ganjil,  $(-1)^k = -1$  sehingga dapat ditulis menjadi,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} + 2q_p(2) &\equiv - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} p \left( 1 - pH_{k-1} + p^2 \left( \frac{(H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}}{2} \right) \right) + \\
&\quad \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} p \left( p^3 \frac{((H_{k-1})^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2})}{6} \right) \frac{(-1-1)}{k^2} \pmod{p^4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\equiv 2p \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^2} - 2p^2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + 2p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}}{2k^2} \\
&\quad - 2p^4 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{((H_{k-1})^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2})}{6k^2} \pmod{p^4} \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} + 2q_p(2) &= p^4 q + 2p \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^2} - 2p^2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + \\
&\quad 2p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}}{2k^2} - 2p^4 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{((H_{k-1})^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2})}{6k^2} \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} + 2q_p(2) &= p^4 \left( q - 2 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{((H_{k-1})^3 - 3H_{k-1}H_{k-1,2})}{6k^2} \right) + \\
&\quad 2p \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^2} - 2p^2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} + 2p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}}{2k^2} \\
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} + 2q_p(2) &\equiv 2p \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^2} - 2p^2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} \\
&\quad + p^3 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{(H_{k-1})^2 - H_{k-1,2}}{k^2} \pmod{p^4} \\
&\equiv 2p \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^2} - 2p^2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1}}{k^2} \\
&\quad + p^3 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{(H_{k-1})^2}{k^2} - p^3 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{k^2} \pmod{p^4} \quad (4.38)
\end{aligned}$$

Persamaan (4.38) baris kedua diperoleh dari baris pertama dengan sedikit proses aljabar, baris ketiga diperoleh berdasarkan relasi kekongruenan, baris keempat dengan menyamakan koefisien  $p^4$  sebagai hasil bagi, dan baris kelima menurut relasi kekongruenan, sedangkan baris keenam diperoleh dari baris kelima dengan menguraikan ruas kanan suku ketiga.

Pada persamaan (4.38) ruas kanan suku pertama,

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^2} &= \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{1}{(p-k)^2} \equiv \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{1}{k^2} \left(1 + \frac{2p}{k}\right) \pmod{p^2} \\
&\equiv \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{1}{k^2} + 2p \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{p-1} \frac{1}{k^3} \pmod{p^2} \\
&\equiv \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\frac{(p-1)}{2}} \frac{1}{k^2} + \frac{p}{4} \sum_{k=1}^{\frac{(p-1)}{2}} \frac{1}{k^3} \pmod{p^2} \tag{4.39}
\end{aligned}$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.21.1) dan (2.21.3) ke persamaan (4.39) diperoleh,

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{p-1} \frac{1}{k^2} &\equiv \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{3} p B_{p-3} + \frac{p}{4} \cdot (-2B_{p-3}) \pmod{p^2} \\
&\equiv \frac{7p}{12} B_{p-3} - \frac{2p}{4} \cdot B_{p-3} \pmod{p^2} \\
&\equiv \frac{1}{12} p B_{p-3} \pmod{p^2} \tag{4.40}
\end{aligned}$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (4.19), (4.30), (4.34) dan (4.40) ke persamaan (4.38) diperoleh,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{p-1} \frac{2^k}{k} + 2q_p(2) &\equiv 2p \left( \frac{1}{12} p B_{p-3} \right) - 2p^2 \frac{3}{8} B_{p-3} \\
&+ p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{2k^2} - p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{2k^2} \pmod{p^4} \\
&\equiv -\frac{7}{12} p^2 B_{p-3} + p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1}^2}{2k^2} \\
&- p^3 \sum_{k=1}^{p-1} \frac{H_{k-1,2}}{2k^2} \pmod{p^4} \tag{4.41}
\end{aligned}$$

### ***B. Pembahasan***

Untuk perlu diketahui, langkah demi langkah dalam perhitungannya yaitu menurut teorema Binomial dan identitas pascal yang terdapat pada persamaan (2.15) dan setelah itu dengan menghubungkan persamaan-persamaan pada bilangan Harmonik, dimana bilangan harmonik ini terdapat juga bilangan Bernoulli.

Dengan menggunakan identitas persamaan (2.15) dengan  $x = 1$  dan  $n = p$ , untuk suatu  $p$  bilangan prima ganjil terdapat teorema Fermat bila diuraikan secara aljabar. Jika disubstitusikan menurut lemma 1 (persamaan (2.24)) baris pertama dengan modulo  $p^4$ , hasil persamaan ini mengandung bilangan Harmonik dan bilangan Bernoulli untuk  $p$  suatu bilangan prima ganjil positif, maka hasil akhir kekongruenan dari sisa pembagiannya terdapat sisa berupa negatif.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### *A. Kesimpulan*

untuk menemukan cara kekongruenan hasil bagi Fermat, yaitu terlebih dahulu mencari persamaan pada kombinatorik, identitas pascal, persamaan-persamaan pada bilangan harmonik dan persamaan pada bilangan bernoulli. Sedangkan untuk mencari beberapa kekongruenan pada bilangan harmonik dan bilangan bernoulli untuk modulo  $p, p^2, p^2$ , dan  $p^4$ , yaitu dengan selalu melibatkan persamaan kekongruenan bilangan harmonik pada lemma 1 dan lemma 2. Dengan menghubungkan beberapa persamaan-persamaan ini, maka dengan menghubungkan beberapa identitas-identitas dan persamaan-persamaan ini diperoleh persamaan (4.41).

#### *B. Saran*

Dari hasil penelitian ini, uraiannya masih secara manual atau perhitungan biasa. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar mencoba menemukan modulo  $p^n$ , dimana  $n > 4$  dengan menggunakan program komputer.

## DAFTAR PUSTAKA

- ArifTiro, Muhammad.dkk.*pengenalan teori bilangan* (Makassar: Andira Publisher, 2008).
- Bin Muhammad, Dr. Abdullah. *Lubaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir* (Cet. 1, Jilid 8: Bogor; Pustaka Imam asy-syafi'i; Muharram 1426 H/Februari 2005).
- Bin Muhammad, Dr. Abdullah. *Lubaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir* (Cet. 1, Jilid 5: Bogor; Pustaka Imam asy-syafi'i; Rabi'ul Awwal 1424 H/Mei 2003).
- E.M. Wright, G. H. Hardy, *And Introduction to the theory of Numbers*, 5th, Oxford Univ. Press, Oxford, 1981, p.104
- Drs. Jong Jek Siang, M. Sc. *Matematika diskrit dan aplikasinya pada ilmu komputer*, Penerbit Andi yogyakarta. 2002.
- [Http://bimbies.wordpress.com/2014/10/07/mengapa-allah-subhanahu wata'ala-suka-dengan-hal-ganjil/amp/](http://bimbies.wordpress.com/2014/10/07/mengapa-allah-subhanahu-wata'ala-suka-dengan-hal-ganjil/amp/) (diakses pada tanggal 07 Oktober 2014).
- K. Ireland and M Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory, GTM 84, Springer-Verlag, New York Heidelberg Berlin*, 1982.
- Munir, Rinaldi. *Matematika Diskrit* (Edisi keenam), (Penerbit; Informatika Bandung, september 2016)
- Nugroho, Didit B. *Diktat kuliah MX 127 Teori Bilangan* (Salatiga: Prodi matematika FSM Universitas Kristen Satya Wacana, Desember 2008).
- S. Khongsit and P.K Saikia.*A Congruence For The Fermat Quotient Modulo  $p^3$* . shilong, Meghalaya, India.Integer (2016).
- Sun, Z. H.*Congruences Concering Bernoulli Number and Bernoulli polynomials*, Discrete App. Math. 105 (2000).
- Sun, Z. H.*Congruences Involving Bernoulli and Euler Number*, J. Number Theori 128 (2008).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Rifa'id, tempat kelahiran Soro, Kec. Lambu, Kab. Bima pada tanggal 12 Maret 1993. Sehari-harinya bisa dipanggil fa'id atau rifa'i, putra dari pasangan Bapak Arifin dan Ibu Maemunah yang merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Penulis menginjak dunia pendidikan saat berusia 7 tahun, yaitu pendidikan di SDN 02 Malaju pada tahun 2000-2006, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMPN 1 SAPE pada tahun 2006-2009, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 SAPE pada tahun 2009-2012. Pendidikan tertinggi saat itu dimulai ketika penulis lulus pada jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM) di jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar) pada tahun 2012, dengan program strata satu (S1) non kependidikan. Atas rahmat Allah subhanahu wata'ala, penulis berhasil menyelesaikan studi dengan judul skripsi "*kekongruenan untuk hasil bagi Fermat modulo  $p^4$* ".