

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR PADA BAYI  
NY 'A' DENGAN ASFIKZIA BERAT DI RSUD LABUANG BAJI  
MAKASSAR TANGGAL 15 JULI – 11 AGUSTUS  
TAHUN 2018**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar Ahli Madya  
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin  
Makassar**

**Oleh:**

**SURIATI  
NIM: 70400115076**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2018**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 21 Agustus 2018

Penyusun

**SURIATI**

NIM: 70400115076

## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH


Nama : Suriati  
Nim : 70400115076  
Judul : Manajmen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny 'A'  
dengan Asfiksia Berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tanggal 15  
Juli – 11 Agustus Tahun 2018

Samata-Gowa, 21 Agustus 2018

Pembimbing I

  
**Firdayanti, S.SiT, M.Keb**  
**NIP. 19751113200604 2 001**

Pembimbing II

  
**Dr. dr. Hj. Svatirah, Sp.A., M.Kes**  
**NIP. 19800701 200604 2 002**

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul, “Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir pada Bayi Ny ‘A’ dengan Asfiksia Berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tanggal 15 Juli – 11 Agustus Tahun 2018”. Yang disusun oleh SURIATI NIM : 70400115076, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 yang dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 21 Agustus 2018  
9 Dzulhijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb. (.....)

Pembimbing I : Firdayanti, S.SiT., M.Keb. (.....)

Pembimbing II : Dr. dr. Hj. Syatirah, Sp.A., M.Kes. (.....)

Penguji I : Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M.Keb. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Siti Aisyah Kara, PhD. (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP. 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segalah puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi semoga rahmat dan hidayah tercurahkan kepada kita semua sehingga segala aktivitas bernilai ibadah disisi Allah SWT. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir pada Bayi Ny ‘A’ dengan Asfiksia Berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tanggal 15 Juli – 11 Agustus Tahun 2018” dapat diwujudkan. Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa dan sistematika penulisan yang ada didalamnya.

Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak. Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun merupakan masukan dan penyempurnaan selanjutnya sangat dibutuhkan. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya yang telah mencurahkan kasih sayang serta do'a yang tiada henti-hentinya demi kebaikan dan keberhasilan di dunia dan akhirat.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi.
3. Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.sc. sebagai Dekan Fakultas kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Dekan I, pembantu Dekan II, dan pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. Dr. Hj. Siti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb. selaku ketua jurusan kebidanan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar dan sebagai Sekretaris dalam ujian Karya Tulis Ilmiah.
5. Ibu Firdayanti, S.SiT, M.Keb. selaku pembimbing I yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md. Keb.
6. Ibu dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH. selaku pembimbing II yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md. Keb.

7. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku pengganti pembimbing II yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md. Keb.
8. Ibu Anieq Mumhti'ah Alkautsar, S.ST, M.Keb sebagai penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah.
9. Prof. Dr. Hj. Siti Aisyah Kara, Ph.D sebagai penguji II yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan Karya Tulis Ilmiah.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Kepada Kepala Ruang Perinatologi dan para pegawai RSUD Labuang Baji Makassar yang telah banyak memberi bantuan selama penulis melakukan penelitian.
12. Kepada kakak ku Ahmad Ramli dan Irdyah Inayah yang selalu mendukung dan memotivasi hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
13. Kepada sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan motivasi dan bantuan serta selalu menemani dalam pembuatan tugas akhir hingga dapat menyelesaikannya.
14. Kepada Fatimah Hartinah sebagai senior yang selalu membimbing dan memberikan motivasi selama pembuatan tugas akhir hingga dapat menyelesaikannya.

15. Serta kepada teman-teman yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini senantiasa memberikan motivasi tersendiri bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan terlalu banyak orang yang mempunyai andil kepadapenulis selama menempuh pendidikan di Universitas sehingga tidak sempat dan tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang yang terbatas ini. Kepada mereka tanpa terkecuali, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya semoga menjadi ibadah dan amal jariyah, Amin.

Samata-Gowa, 21 Agustus 2018

Penulis

**SURIATI**

NIM: 70400115076

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penulis .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir .....	12
B. Tinjauan Umun Tentang Asfiksia.....	26
C. Tinjauan tentang Manajemenn Kebidanan .....	44
D. Tinjaun Islam tentang Bayi Baru Lahir .....	58

### BAB III STUDI KASUS

A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.....	61
B. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 15 Juli 2018 .....	77
C. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 16 Juli 2018 .....	83
D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 17 Juli 2018 .....	87
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 24 Juli 2018 .....	89
F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 11 Agustus 2018 .....	91

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar .....	95
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosis/Masalah Aktual .....	97
C. Langkah III : Identifikasi DiagnosisMasalah Potensial .....	99
D. Langkah IV : Tindakan <i>Emergency</i> dan Kolaborasi .....	100
E. Langkah V : Intervensi.....	101
F. Langkah VI : Implementasi.....	103
G. Langkah VII : Evaluasi .....	103

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	107

### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : APGAR Score.....	31
Tabel 3.1 : APGAR Score.....	64
Tabel 3.2 : Observasi tanda-tanda vital .....	75
Table 3.3 :Observasi tanda-tanda vital .....	82
Table 3.4 : Jadwal kunjungan .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Peredaran Darah .....	14
Gambar 2.2 : <i>Ballard Score</i> .....	23
Gambar 2.3 : Kurva Lubchenco .....	24
Gambar 2.4 : Diagram Alur resusitasi bayi baru lahir dengan asfiksia .....	34
Gambar 2.5 : Posisi Bayi.....	35
Gambar 2.6 : Isap Lendir .....	36
Gambar 2.7 : Penggunaan Sungkup .....	38
Gambar 2.8 : Kompresi Dada.....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi (Kepala balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran II : Surat Izin atau Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Labuang Baji Makassar.
- Lampiran III : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Labuang Baji Makassar.
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup.

## **ABSTRAK**

**JURUSAN KEBIDANAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2018**

**Suriati, 70400115076**

**Pembimbing I : Firdayanti**

**Pembimbing II : Syatirah**

**“Manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir pada bayi Ny ‘A’ dengan Asfiksia berat di RSUD Labuang Baji Makassar tanggal 15 Juli – 11 Agustus tahun 2018”**

---

---

Asfiksia bayi baru lahir adalah keadaan dimana bayi yang baru lahir tidak mampu bernapas secara spontan dan teratur yang ditandai dengan adanya hipoksemia, hiperkarbia dan asidosis, faktor-faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum adalah faktor ibu, faktor plasenta, faktor janin, dan faktor persalinan kemudian penanganan dengan melakukan resusitasi aktif dan segera untuk memulihkan fungsi pernapasan bayi baru lahir yang mengalami asfiksia.

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Bayi Baru Lahir pada bayi Ny ‘A’ dengan Asfiksia Berat di RSUD Labuang Baji Makassar pada tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah varney dan SOAP dengan asuhan dimulai dari bayi baru lahir.

Hasil dari studi kasus pada bayi Ny ‘A’ dengan asfiksia berat selama dalam penanganan yang telah dilakukan tidak ditemukan hambatan kemudian penatalaksanaan yang diberikan yaitu resusitasi segera sehingga keadaan bayi dapat membaik dengan adanya tanda keadaan umum baik, denyut jantung normal, pernapasan teratur, warna kulit tidak sianosis, menangis kuat dan gerakan aktif.

Kesimpulan dari kasus yaitu sesuai asuhan yang telah diberikan dengan kunjungan selama 3 hari dan kunjungan rumah sebanyak 2 kali didapatkan hasil yaitu Tanda-tanda vital dalam batas normal, gerakan aktif, refleks isap dan refleks moro sudah ada.

**Daftar pustaka : 29 (1991-2017)**

**Kata kunci : Bayi baru lahir, Asfiksia berat**

## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2018

Suriati, 70400115076

Supervisor I : Firdayanti

Supervisor II : Syatirah

---

**“The Newborn Obstetric Care Management on Mrs. A’s Baby with Severe Asphyxia at Labuang Baji Makassar Regional Public Hospital, on July 15 – August 11, 2018”**

Newborn asphyxia is a condition where a newborn baby is unable to breathe spontaneously and regularly which is characterized by hypoxemia, hypercarbia and acidosis; the risk factors for neonatal asphyxia are maternal, placental, fetal, and delivery factors then the treatment by conducting active and immediate resuscitation to restore the respiratory function of newborns having asphyxia.

This scientific paper is aimed at implementing the Newborn Care Management on Mrs. A’s Baby with Severe Asphyxia at Labuang Baji Makassar Regional Public Hospital in 2018 based on 7 steps of Varney and SOAP with care starting from the baby was born.

The results of the case study on Mrs. A’s baby with severe asphyxia during the treatment, it was not found any obstacles, then the management provided was immediate resuscitation so that the baby’s condition could improve with signs of good general condition, normal heart rate, regular breathing, skin color not cyanosis, strong crying, and active movement.

The conclusion of the case is that according to the care provided with a 3-day visit and a , the results are vital signs within normal limits, active movements, suction reflex, and existed moro reflex.

**Bibliography** : 29 (1991-2017)  
**Keywords** : Newborn, Severe Asphyxia



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Asfiksia neonatorum atau asfiksia bayi baru lahir adalah keadaan dimana bayi yang baru lahir tidak mampu bernapas secara spontan dan teratur, kondisi ini ditandai dengan adanya hipoksemia, hiperkarbia dan asidosis (Sembiring, 2017). Asfiksia ini dapat terjadi karena kurangnya kemampuan organ pernapasan bayi dalam menjalankan fungsi pengembangan paru-paru. Umumnya bayi yang mengalami asfiksia memiliki riwayat gawat janin sebelum lahir dan masalah ini erat hubungannya dengan adanya gangguan kesehatan ibu selama hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama atau sesudah persalinan (Indrayani dan Djami, 2013:344).

Asfiksia pada bayi baru lahir adalah suatu keadaan bayi baru lahir yang gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Asfiksia dapat mengakibatkan kematian dan diperkirakan satu juta anak yang bertahan setelah mengalami asfiksia saat lahir kini hidup dengan morbiditas jangka panjang seperti *cerebral palsy*, retardasi mental, dan gangguan belajar. Faktor-faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum adalah faktor ibu, faktor plasenta, faktor janin, dan faktor persalinan (Rahma dan Armah, 2014: Vol VII No.I).

Didapatkan informasi dari BP IDAI (2013), jumlah kematian bayi baru lahir di seluruh dunia diperkirakan sebanyak 130 juta bayi baru lahir setiap tahun

dan didapatkan sekitar 4 juta meninggal dunia pada 28 hari pertama kehidupannya. Kemudian terjadi tiga perempat kematian neonatus didapatkan dalam usia minggu pertama dan 25% meninggal pada usia 24 jam pertama. Angka kematian neonatus menyumbang 40% kematian balita di seluruh dunia. PBB ikut dalam mengurangi masalah tersebut dengan mencanangkan 4 *Millenium Development goals* untuk mengurangi angka kematian neonatus sebanyak 2/3 pada tahun 2015 dan menfokuskan pada negara yang angka kematian neonatus tertinggi. Dua per tiga kematian neonatus didapatkan dari 10 negara yang sebagian besar berada di Asia. Diketahui Pakistan menduduki peringkat ke 3 dengan perkiraan kejadian 28.000 per tahun kematian neonatus sehingga diperkirakan sebanyak 49 per 1000 kelahiran atau menyumbang 7% dari seluruh dunia kematian neonatus yang terdiri dari kasus infeksi (36%), persalinan prematur (28%) dan asfiksia (23%).

Pada tahun 2013 AKB di Indonesia mencapai 25 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, dan Singapura, angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan negara-negara tersebut dimana angka kematian anak di Malaysia 7 per 1.000 kelahiran hidup, Filipina 24 per 1.000 kelahiran hidup dan Singapura 2 per 1.000 kelahiran hidup (WHO, 2014). Berdasarkan Riskerdes 2015, pada kasus hiperbilirubin asfiksia termasuk dalam penyebabnya yaitu sebesar 51%.

Berdasarkan survei demograf dan SDKI 2012, kematian neonatus menyumbang 47% penyebab terbanyak adalah asfiksia bayi baru lahir, prematur,

bblr dan infeksi (Kemenkes Ri, 2014) kemudian WHO mengatakan penyebab langsung kematian neonatus adalah infeksi 32%, asfiksia 29 %, komplikasi prematur 24%, kelainan bawaan 10%, dll 5%. Upaya dalam menurunkan angka kematian bayi baru lahir yang diakibatkan asfiksia salah satunya dengan cara melakukan suatu pelatihan keterampilan resusitasi kepada para tenaga kesehatan agar lebih terampil dalam melakukan resusitasi dan menganjurkan kepada masyarakat ataupun ibu khususnya agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan keterampilan (Depkes RI, 2013).

Berdasarkan Profil Kesehatan Sulawesi selatan 2013, ditemukan 146.233 kelahiran bayi terdiri dari 145.306 bayi lahir hidup dan 927 bayi meninggal, sedangkan di kota Makassar sendiri 2223 secara keseluruhan terdapat 19.550 kelahiran bayi yang terdiri dari 19.496 lahir hidup dan 54 bayi meninggal (Kemenkes RI, 2013).

Kemudian ditemukan penyebab kematian di kota Pare-pare tahun (2014), disebabkan oleh asfiksia 31%, kematian bayi dengan asfiksia terjadi pada usia kurang lebih 48 jam setelah kelahiran, 46 % sampai tempat rujukan di puskesmas dan 54% terjadi setelah sampai di tempat rujukan dan hal ini dapat disebabkan karena program stabilisasi pada bayi asfiksia belum optimal.

Pada Profil Kesehatan Kota Makassar (2015), kematian bayi memberikan kontribusi sebanyak 59% dan masalah ini sangat penting dan menjadi perhatian sehingga pemerintah mengupayakan penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari). Informasi dari tahun ke tahun menunjukkan masalah ini mampu mengalami

fluktuasi, pada tahun 2015 sebesar 1,19 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun 2014 sebesar 0,98 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2013 sebesar 2,44 per 1.000 kelahiran hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan Armah (2013), tentang analisis faktor risiko kejadian pada bayi baru lahir di RS Syekh Yusuf Gowa dan RS Dr wahidin sudirohusodo Makassar menunjukkan dari 104 kasus asfiksia yang terjadi didapatkan antar faktor risiko berdasarkan umur ibu (20-35 tahun) sebanyak 65,39%, berdasarkan persalinan lama (>18 jam untuk multipara >24 jam untuk primipara) sebanyak 58,65%, berdasarkan jenis persalinan (persalinan dengan tindakan) sebanyak 56,73% dan berdasarkan usia kehamilan (<37 minggu dan >42 minggu) sebanyak 55,76% .

Berdasarkan data awal yang didapatkan di RSUD Labuang Baji didapatkan kasus asfiksia dengan kelahiran secara Normal pada tahun 2015 yaitu 1.279 kelahiran dengan 39 kasus asfiksia, tahun 2016 jumlah kelahiran 1.392 dengan 32 kasus asfiksia, dan tahun 2017 dengan jumlah kelahiran 1.359 dengan 40 kasus asfiksia. Sedangkan pada kelahiran secara *Sectio caesaria* pada tahun 2015 didapatkan 259 jumlah kelahiran dengan 32 kasus asfiksia, tahun 2016 didapatkan 116 kelahiran dengan 16 kasus asfiksia, sedangkan pada tahun 2017 didapatkan 149 kelahiran dengan 20 kasus asfiksia. Kemudian data kematian bayi yang disebabkan kasus asfiksia pada tahun 2017 sebanyak 19 kematian dari 60 kasus asfiksia.

Asfiksia pada bayi baru lahir merupakan masalah yang sangat penting karena dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir. Selain itu angka kejadian asfiksia juga masih tinggi dan masih menjadi wewenang bidan dalam memberikan manajemen asuhan kebidanan. Berdasarkan uraian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan studi kasus dengan judul manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir pada bayi Ny 'A' dengan Asfiksia berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2018.

### ***B. Ruang Lingkup Pembahasan***

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan dapat memperoleh informasi dan pelayanan nyata tentang proses asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia berat yang rawat di RSUD Labuang Baji.

### ***C. Tujuan Penulisan***

#### ***1. Tujuan umum***

Mampu melaksanakan manajemen asuhan kebidanan Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia Berat.

#### ***2. Tujuan khusus***

- a. Melakukan pengkajian untuk menegakkan diagnosis dan masalah aktual pada kasus bayi baru lahir pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat di RSUD Labuang baji Makassar Tahun 2018.

- b. Melakukan pengkajian untuk menegakkan diagnosis dan masalah potensial pada kasus bayi baru lahir pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2018.
- c. Melakukan tindakan segera pada kasus bayi baru lahir pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat di RSUD Labuang Baji Tahun 2018.
- d. Merencanakan tindakan dalam asuhan kebidanan pada kasus bayi baru lahir pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2018.
- e. Melakukan tindakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2018.
- f. Melakukan evaluasi hasil tindakan asuhan kebidanan pada kasus bayi baru lahir pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2018.
- g. Melakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada kasus bayi baru lahir pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2018.
- h. Melakukan penelusuran mendalam terhadap literatur untuk mencari dan mendiskusikan kesenjangan antara teori dan fakta kasus dilapangan pada kasus bayi baru lahir pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2018.
- i. Melakukan penerapan nilai-nilai ke-Islaman dalam manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat.

#### ***D. Manfaat penulisan***

##### **1. Manfaat bagi Rumah sakit**

Dapat menjadi sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pengelola program kesehatan di Rumah sakit dalam mencegah dan penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia berat.

##### **2. Manfaat pengembangan ilmu kebidanan**

- a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan acuan bagi penulis karya tulis ilmiah berikutnya.
- b. Pelaksanaan asuhan kebidanan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang bayi baru lahir dengan asfiksia berat.

##### **3. Manfaat bagi penulis**

Penulisan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang bayi baru lahir dengan asfiksia berat.

##### **4. Manfaat bagi institusi**

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia berat.

## 5. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca tentang bayi baru lahir dengan asfiksia berat.

### ***E. Metode penulisan***

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

#### 1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literature dan media internet yang berhubungan tentang bayi dengan asfiksia berat.

#### 2. Studi kasus

Studi kasus yaitu peneliti melakukan metode pendekatan pemecahan masalah dalam kebidanan antara lain pengkajian, merumuskan diagnosa/Masalah aktual dan potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan dan mengevaluasi asuhan kebidanan serta mendokumentasikan kasus bayi baru lahir dengan Asfiksia berat. Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan tehnik:

##### a. Anamnesa

Peneliti mengadakan tanya jawab dengan orang tua atau keluarga klien yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Peneliti akan bertanya tentang riwayat terkait pengalaman persalinan yang di alami atau pertanyaan lainnya yang relevan yang dapat memberikan informasi factor apa yang menyebabkan bayi baru lahir dengan asfiksia berat.

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis yaitu inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Pemeriksaan dignostik lainnya juga dilakukan dengan menggunakan format pengkajian. Pemeriksaan bayi baru lahir peneliti melihat dan mendeteksi masalah pada fisik klien yang menyebabkan bayi baru lahir dengan asfiksia berat.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian ini meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi, yang dialami serta pola interaksi bayi baru lahir dengan Asfiksia berat terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

d. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan bayi baru lahir dengan Asfiksia berat yang bersumber dari catatan, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya. Studi dokumentasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

e. Diskusi

Peneliti mengadakan tanya jawab dengan tenaga kesehatan yaitu bidan di RSUD Labuang Baji yang menangani langsung bayi baru lahir dengan Asfiksia berat serta berdiskusi dengan dosen pembimbing karya tulis ilmiah.

## ***F. Sistematika Penulisan***

Adapun sistematika penelitian yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari Bab I sampai Bab V yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulis, manfaat penulis dan metode penulisan serta sistematika penelitian bayi baru lahir dengan Asfiksia berat.


Bab II yaitu tinjauan pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teori yang meliputi tinjauan tentang bayi baru lahir, tinjauan tentang khusus tentang asfiksia, proses manajemen kebidanan dan SOAP terdiri dari proses manajemen kebidanan dan pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan serta tinjauan Islam terhadap bayi baru lahir dengan Asfiksia berat.

Bab III yaitu studi kasus, pada bab ini akan diuraikan tentang 7 langkah varney (2003) terhadap bayi baru lahir dengan asfiksia berat yang meliputi, langkah I (pengumpulan data dasar/pengkajian), langkah II (interpretasi data: identifikasi masalah atau diagnosa), langkah III mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV kebutuhan terhadap tindakan segera, langkah V rencana asuhan yang menyeluruh, langkah VI implementasi/pelaksanaan asuhan, langkah VII evaluasi hasil asuhan serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Bab IV pembahasan, pada bab ini membandingkan kesenjangan antara teori mengenai bayi baru lahir dengan Asfiksia berat dan asuhan kebidanan serta

praktek yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar dalam menangani kasus asfiksia berat.

Pada Bab V yaitu penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan pada bayi baru lahir dengan Asfiksia berat, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka.



## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Tinjauan umum tentang bayi baru lahir

##### 1. Pengertian bayi baru lahir

Beberapa ahli telah memberikan pendapat tentang pengertian bayi baru lahir. Diantaranya dari Marmi dan Rahardjo (2014:1) mengatakan bayi baru lahir adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran yang berusia 0-28 hari, kemudian menurut BP IDAI (2013) hampir sama yaitu bayi baru lahir atau neonatus adalah bayi yang baru saja dilahirkan ibu sampai umur 28 hari. Sedangkan bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari usia kehamilan 3 samapai 42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram samapi 4000 gram (Saleh, 2012:2).

Kemudian didapatkan ayat tentang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun dan kita di anjurkan untuk bersyukur kepada Allah SWT karena dialah pemberi segalanya dalam QS. An Nahl ayat: 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya :

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (kementrian Agama RI, 2010: 275)

## 2. Perubahan fisiologis pada BBL

Adapun beberapa perubahan yang terjadi pada bayi ketika sudah lahir di dunia menurut beberapa ahli yaitu:

### a. Sistem pernapasan


Struktur matang ranting paru-paru sudah bisa mengembangkan sistem alveoli. Selama dalam uterus janin mendapatkan oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta. Setelah bayi lahir, pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi. Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 menit pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya surfaktan yang dengan menarik napas dan mengeluarkan napas dengan merintih sehingga udara tertahan di dalam. Respirasi pada neonatus biasanya pernapasan diafragmatik dan abdomen, sedangkan frekuensi dan dalam tarikan belum teratur.

Apabila surfaktan berkurang, maka alveoli akan kolaps dan paru-paru kaku, sehingga terjadi atelektasis dalam keadaan anoksia neonatus masih dapat mempertahankan hidupnya karena adanya kelanjutan metabolisme anaerobik (Indrayani dan Djami, 2013).

b. Peredaran darah

Pada masa fetus daerah dari plasenta melalui vena umbilikal is sebagian ke hati, sebagian ke langsung ke serabi kiri jantung, kemudian ke bilik kiri jantung. Dari bilik kiri darah di pompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Dari bilik kanan darah di pompa sebagian ke paru dan sebagian melalui duktus arteriosus ke aorta.

Gambar 2.1. Peredaran darah



Sumber: Jinxue, 2017: vol.33 no 5

Setelah bayi lahir, paru akan berkembang mengakibatkan tekanan arteriol dalam paru menurun. Tekanan dalam jantung kanan turun, Sehingga tekanan jantung kiri lebih besar daripada tekanan jantung kanan yang mengakibatkan menutupnya foramen oval secara fungsional. Hal ini terjadi pada jam-jam pertama setelah kelahiran. Oleh karena tekanan dalam paru turun dan tekanan dalam aorta desenden naik dan karena rangsangan biokimia ( $paO_2$  yang naik), duktus arteriosus berobliterasi ini terjadi pada hari pertama.

Aliran darah sistolik pada hari pertama rendah, yaitu 1,96 liter/menit/m<sup>2</sup> dan bertambah pada hari kedua dan ketiga (3,54 liter/m<sup>2</sup>) karena penutupan duktus arteriosus. Tekanan darah pada waktu lahir di pengaruhi oleh jumlah darah yang melalui transfusi plasenta dan pada jam-jam pertama sedikit menurun, untuk kemudian naik lagi dan menjadi konstan kira-kita 85/40 mmHg (Armini, dkk. 2017:6-7).

c. Suhu Tubuh

Ada 4 mekanisme kemungkinan hilangnya panas tubuh dari bayi baru lahir ke lingkungannya.

1. Konduksi

Panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda sekitarnya yang kontak langsung dengan tubuh bayi (pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung).

Contoh: Menimbang bayi tanpa alas timbangan, tangan penolong yang dingin memegang bayi baru lahir, menggunakan stetoskop dingin untuk pemeriksaan BBL.

2. Konveksi

Panas hilang dari tubuh bayi ke udara sekitarnya yang sedang bergerak (jumlah panas yang hilang tergantung pada kecepatan dan suhu udara).

Contoh: membiarkan atau menempatkan BBL dekat jendela, membiarkan bayi baru lahir di ruangan yang terpasang kipas angin.

### 3. Radiasi

Panas dipancarkan dari BBL, keluar tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin (pemindahan panas antara 2 objek yang berbeda).

Contoh: bayi baru lahir dibiarkan dalam ruangan AC tanpa di berikan pemanas (radiant warmer), bayi baru lahir dibiarkan dalam keadaan telanjang, bayi baru lahir ditidurkan berdekatan dengan ruang yang dingin, misalnya dekat tembok.

### 4. Evaporasi

Panas hilang melalui proses penguapan tergantung kepada kecepatan dan kelembapan udara (perpindahan panas dengan cara mengubah cairan menjadi uap). Evaporasi dipengaruhi oleh: jumlah panas yang dipakai, tingkat kelembapan udara, aliran udara yang melewati.

Mencegah kehilangan panas: keringkan bayi secara saksama, selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat, tutup bagian kepala bayi, anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusukan bayinya, jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir, tempatkan bayi di lingkungan yang hangat.

Dalam proses adaptasi kehilangan panas, bayi mengalami: stres pada BBL menyebabkan hipotermi, BBL mudah kehilangan panas, bayi menggunakan timbunan lemak coklat untuk meningkatkan suhu

tubuhnya, lemak coklat terbatas, sehingga apabila habis akan menyebabkan adanya stress dingin (Armini, dkk. 2017: 7-9).

d. Metabolisme

Luas permukaan tubuh neonatus, relatif lebih luas dari tubuh orang dewasa sehingga metabolisme basal per kg BB akan lebih besar. Pada jam-jam pertama energi didapatkan dari pembakaran karbohidrat dan pada hari ke dua energi basal dari pembakaran lemak (Marmi dan rahardjo 2014:23-24).

e. Keseimbangan Air dan Fungsi Ginjal

Tubuh BBL mengandung relatif banyak air dan kadar natrium relatif lebih besar dari kalium karena ruangan ekstraseluler luas. Fungsi ginjal belum sempurna karena:

- 1) Jumlah nefron masih belum sebanyak orang dewasa.
- 2) Ketidakseimbangan luas permukaan glomerulus dan volume tubulus proksimal.
- 3) *Renal blood flow* relatif kurang bila dibandingkan dengan orang dewasa (Indrayani & Djami, 2013).

f. Imunoglobulin

Pada neonatus tidak terdapat sel plasma pada sum-sum tulang dan lamina propia ilium dan apendiks. Plasenta merupakan sawar, sehingga fetus bebas dari anti antigen dan stres imunologis.

Pada BBL hanya terdapat *gama globulin G*, sehingga imunologi dari ibu dapat melalui plasenta karena berat molekulnya kecil. Tetapi bila ada infeksi yang dapat melalui plasenta (Lues, toksoplasma, herpes simpleks, dll) reaksi imunologis dapat terjadi dengan pembentukan sel plasma dan antibody gama A, G dan M (Armini, dkk. 2017:10).

g. Traktus Digestivus

Traktus digestivus relatif lebih berat dan lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa. Pada neonatus traktus digestivus mengandung zat yang berwarna hitam kehijauan yang terdiri dari mukopolisakarida dan disebut mekonium. Pengeluaran mekonium biasanya dalam 10 jam pertama dan 4 hari biasanya tinja sudah berbentuk serta berwarna normal. Enzim dalam traktus digestivus biasanya sudah terdapat pada neonatus, kecuali amylase pankreas. Bayi sudah ada refleksi hisap dan menelan, sehingga pada saat bayi lahir sudah bisa minum ASI. Gumoh sering terjadi akibat dari hubungan esofagus bahwa dengan lambung belum sempurna, dan kapasitas dari lambung juga terbatas yaitu  $\pm 30$  cc (Indrayani dan Djami, 2013).

h. Hati

Segera setelah lahir, hati menunjukkan perubahan kimia dan morfologis, yaitu kenaikan kadar protein dan penurunan kadar lemak serta glikogen. Sel hemopoetik juga mulai berkurang, walaupun memakan waktu agak lama. Enzim hati belum aktif benar pada waktu bayi baru

lahir, daya detoksifikasi hati pada neonatus juga belum sempurna, contohnya pemberian obat kloramfenikol dengan dosis lebih dari 50 mg/kgBB/hari dapat menimbulkan *grey baby syndrome* (Marmi dan rahardjo, 2014: 22-23).

i. Keseimbangan Asam Basa

PH darah pada waktu lahir rendah karena glikolisis anaerobik. Dalam 24 jam neonatus telah mengompensasi asidosis ini (Indarayani & Djami, 2013).

3. Pemeriksaan fisik

a. Menilai keadaan umum

Langkah yang awal dilakukan untuk menilai saat bayi lahir untuk pemberian asuhan selanjutnya yaitu

- 1) Lahir cukup bulan ?
- 2) Cairan ketuban jernih?
- 3) Bernafas atau menangis?
- 4) Denyut jantung >100 kali/menit ?
- 5) Tonus otot baik? (Lissauer dan Fanaroff, 2013:54)

b. Tanda-tanda vital

Pemeriksaan tanda-tanda vital dilakkan untuk mengukur keadaan bayi saat setelah lahir.

- 1) Pemeriksaan suhu tubuh bayi dengan menghindari memandikan bayi hingga sedikitnya enam jam dan hanya setelah itu jika tidak terdapat

masalah medis dan jika suhunya 36,5 C kemudian bungkus bayi dengan kain yang kering dan hangat hingga kepala tertutup (Saifuddin, 2014).

2) Pernapasan adalah tanda vital pertama yang berhenti ketika bbl kekurangan oksigen (Dewi, 2014:18).

3) Pemeriksaan nadi

Pemeriksaan nadi harus dilakukan pada keempat ekstremitas dalam menilai biasanya terdapat kesalahan yang sering dilakukan adalah pemeriksaan hanya menghitung frekuensi nadi per menit. Padahal seharusnya penilaian nadi harus mencakup frekuensi atau laju nadi, irama, isi atau kualitas serta ekualitas nadi (Wahidiyat dan Sastroasmoro, 2014:27)

c. Telinga

Pemeriksa dalam hubungan letak dengan mata dan kepala

d. Mata

Melihat tanda-tanda infeksi seperti adanya pus

e. Hidung dan mulut

Melihat bentuk bibir dan langit-langit, periksa adanya sumbing dan refleks hisap dengan penilaian mengamati bayi pada saat menyusu

f. Leher

Melihat adanya pembengkakan dan gumpalan

g. Dada

Melihat bentuk, puting, bunyi napas dan bunyi jantung

h. Bahu, lengan, dan tangan

Melihat gerakan normal dan jumlah jari

i. Sistem syaraf

Adanya refleks moro, lakukan rangsangan dengan suara keras dengan tepukan tangan

j. Perut

Melihat bentuk, penonjolan atau lembek sekitar tali pusat pada saat menangis, perdarahan tali pusat?

k. Kelamin perempuan

Ditandai dengan vagina berlubang, uretra berlubang dan labia minora menutupi labia mayora.

l. Kelamin laki-laki

Dilihat dari testis berada dalam skrotum dan penis berlubang dan pada ujung letak lubang.

m. Tungkai dan kaki

Dilihat dari gerakan normal, tampak normal dan jumlah jari.

n. Punggung dan anus

Pemeriksaan ini dilakukan dengan melihat pembengkakan atau ada cekungan, ada anus dan lubang.

o. Kulit

Pemeriksaan dengan melihat Verniks (tidak perlu dibersihkan karena menjaga kehangatan tubuh bayi), warna, ada pembengkakan atau bercak-bercak hitam, dan tanda-tanda lahir (Saifuddin, 2014).

4. Ballard score

Sistem penilaian untuk menentukan usia gestasi bayi baru lahir melalui penilaian neuromuscular dan fisik. Penilaian neuromuskuler meliputi postur, jendela pergerakan tangan, gerakan lengan membalik, sudut popliteal, tanda selendang, lutut ke telinga sedangkan pemeriksaan fisik meliputi kulit, lanugo, permukaan plantar, payudara, mata/telinga dan genitalia perempuan/laki-laki (Ballard JL, dkk. 1991).

Kemudian hasil penilaian baik dari maturitas neuromuskuler maupun fisik akan disesuaikan dengan skor dan dijumlahkan hasilnya

Gambar 2. 2. *Ballard Score*

	- 1	0	1	2	3	4	5
<b>Postur</b>							
<b>Jendela pergelangan tangan</b>							
<b>Gerakan lengan membalik</b>							
<b>Sudut poplitea</b>							
<b>Tanda selendang</b>							
<b>Lutut ke telinga</b>							

	- 2	- 1	0	1	2	3	4	5
Kulit		Lengket, rapuh, transparan	Merah seperti getas, lembus pandang	Licin, merah muda, vena membayang	Pengelupasan &/atau ruam superfisial, beberapa vena	Pecah2, daerah pucat, jarang vena	Pekamen, pecah-pecah dalam, tidak terlihat vena	Seperti kulit pecah-pecah, berkeriput
Lanugo		Tidak ada	Jarang sekali	Banyak sekali	menipis	(+)daerah tanpa rambut	Sebagian besar tanpa rambut	
Garis telapak kaki	Tumit – Ibu jari kaki < 40 mm	Tumit – Ibu jari kaki 40 –50 mm	> 50 mm, tidak ada lipatan	Garis-garis merah lipis	Garis melintang hanya pd bag. anterior	Garis lipatan sampai 2/3 anterior	Garis lipatan pada seluruh telapak	
Payudara		Tidak dikenali	Susah dikenali	Areola datar (-) menonjol	Areola berlingk2, Penonjolan 1-2 mm	Areola terangkat, Penonjolan 3-4 mm	Areola penuh, Penonjolan 5- 10 mm	
Mata / telinga	Kelopak menyatu erat	Kelopak menyatu longgar	Kelopak terbuka, pinna datar, telap terlipat	Pinna sedikit bergelombang, neklot lambal	Pinna bergelombang baik, lembek tapi siap neklot	Keras & berbentuk segera neklot	Kartilago tebal, daun telinga kaku	
Genitalia pria		Skrotum datar & halus	Skrotum kosong, rugae samar	Testis di kanal bagian atas, rugae jarang	Testis menuju ke bawah, sedikit rugae	Testis sudah turun, rugae jelas	Testis tergalang, rugae dalam	
Genitalia wanita		Klitris menonjol, labia datar	Klitris menonjol, labia minora kecil	Klitris menonjol, minora membesar	Labia mayora & minora memojol	Labia mayora besar, labia minora kecil	Labia mayora menutupi klitoris & labia minora	


  

Skor	Minggu
-10	20
-5	22
0	24
5	26
10	28
15	30
20	32
25	34
30	36
35	38
40	40
45	42
50	44

Sumber : Ballard JL, dkk. 1991

Berdasarkan pertumbuhan intra uterin dilihat dari kurva lubchenco dan batalgin, penilaian Sesuai Masa kehamilan (SMK) yaitu bayi dengan lahir sesuai dengan berat lahir untuk masa gestasi dan pada IUGC terletak antara persentil ke 10 dan ke 90, Kecil Masa Kehamilan (KMK) yaitu bayi dengan lahir lebih kecil dari berat lahir untuk masa gestasi dan mengalami gangguan pertumbuhan intra uteri diliat dari IUGC dibawah persentil ke 10 kemudian Besar Masa Kehamilan (BMK) yaitu bayi dengan berat lahir lebih dari berat lahir untuk masa gestasinya dilihat dari IUGC > 9 (Singhal, Dkk, 2017).

Gambar 2.3. Kurva lubchenco



Sumber : Singhal, Dkk, 2017

#### 5. Ciri-ciri bayi baru lahir

Bayi baru lahir dapat dikatakan normal jika memiliki ciri-ciri tersendiri diantaranya yaitu, memiliki berat badan 2500-4000 gram, panjang badan 48-52 cm, lingkar dada 30-38 cm, lingkar kepala 33-35 cm, frekuensi jantung 120-160x/menit, pernapasan 40-60x/menit, kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan sub kutan cukup, rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah sempurna, kuku agak panjang dan lemas, genetalia jika perempuan labia mayora sudah menutupi labia minora sedangkan pada laki-laki testis sudah turun, skrotum sudah ada.

Kemudian refleks hisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik, refleks morro atau gerak memeluk bila dikagetkan sudah baik, refleks graps atau menggenggam sudah baik, refleks rooting mencari puting susu dengan rangsangan taktil pada pipi dan daerah mulut terbentuk dengan baik, eliminasi baik, meconium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan (Dwienda, dkk: 2014:5).

#### 6. Lingkup neonatus bermasalah

Pada bayi baru lahir sangat diharapkan dan diinginkan lahir dengan normal tanpa ada masalah apapun, namun kenyataannya berbagai masalah dapat terjadi pada bayi baru lahir diantaranya yaitu asfiksia (Tidak bernapas/sulit bernapas), hipotermia dan hipetermia, bayi berat lahir rendah (BBLR), dehidrasi, ikterus neonatorum, kejang, obstipasi, Infeksi, sindrom kematian bayi mendadak, diare (Dwienda, dkk: 2014:14-15).

#### 7. Fisiologis pernapasan bayi baru lahir

Oksigen sangat penting untuk kehidupan sebelum dan sesudah persalinan. Selama di dalam Rahim janin mendapatkan oksigen dan nutrisi dari ibu melalui mekanisme difusi melalui plasenta yang berasal dari ibu diberikan kepada janin. Sebelum lahir, alveoli paru bayi menguncup dan terisi oleh cairan. Paru janin tidak berfungsi sebagai sumber oksigen atau jalan untuk mengeluarkan  $\text{CO}^2$  (karbondioksida) sehingga paru tidak perlu diperfusi atau dialiri darah dalam jumlah besar.

Setelah lahir, bayi tidak berhubungan dengan plasenta lagi sehingga akan segera bergantung kepada paru sebagai sumber utama oksigen. oleh karena itu, maka beberapa saat sesudah lahir paru harus segera terisi oksigen dan pembuluh darah paru harus berelaksasi untuk memberikan perfusi pada alveoli dan menyerap oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh (Dwienda, dkk. 2014:15).

## ***B. Tinjauan umum tentang asfiksia***

### **1. Pengertian Asfiksia**

Didapatkan beberapa definisi tentang Asfiksia yang di jelaskan oleh para Ahli diantaranya yaitu dari Dwienda (2014:15), mengatakan bahwa asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi yang tidak dapat bernafas spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan  $O^2$  dan makin meningkatkan  $CO^2$  yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut. Sedangkan dari Sembiring (2017), mengatakan asfiksia neonatorum adalah kegagalan bernapas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir yang ditandai dengan keadaan  $PaO^2$  di dalam darah rendah (hipoksemia), hiperkarbia ( $Pa CO^2$  meningkat) dan asidosis.

### **2. Penyebab Asfiksia**

Penyebab asfiksia dapat berasal dari faktor ibu, janin dan plasenta. Adanya hipoksia dan iskemia jaringan menyebabkan perubahan fungsional dan biokimia pada janin. Faktor ini yang berperan pada kejadian asfiksia (Sembiring, 2017).

a. Faktor Keadaan Ibu

Faktor yang didapatkan dari keadaan ibu yaitu:

- 1) penyakit kronis (TBC, jantung, kekurangan gizi, ginjal)
- 2) penyakit selama kehamilan (Preeklampsia dan eklampsia)
- 3) penyakit genetik
- 4) persalinan patologis (presentasi bokong, letak lintang, partus lama atau partus macet, demam sebelum dan selama persalinan, vakum ekstraksi, forceps)
- 5) infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV)
- 6) kehamilan lebih bulan yaitu lebih 42 minggu kehamilan (Dewi, 2014:12-13).

b. Faktor Keadaan Tali Pusat

Faktor yang dapat menyebabkan penurunan sirkulasi uteroplasenter yang dapat mengakibatkan menurunnya pasokan oksigen ke bayi sehingga dapat menyebabkan asfiksia pada bayi baru lahir adalah Lilitan tali pusat, tali pusat pendek, simpul tali pusat dan prolapsus tali pusat (Indrayani & Djami, 2013:345).

c. Faktor plasenta

Adapun yang mengakibatkan asfiksia didapat dari faktor plasenta diantaranya:

- 1) Infark plasenta yaitu terjadinya pematangan plasenta, noduler dan keras sehingga tidak berfungsi dalam pertukaran nutrisi.

- 2) Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta yang letaknya normal pada korpus uteri sebelum janin lahir. biasanya terjadi pada trimester III, walaupun dapat pula terjadi pada setiap saat dalam kehamilan.
- 3) Plasenta previa yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. pada keadaan normal plasenta terletak di bagian atas uterus (Dewi, 2014:14-15).

d. Faktor dari bayi

Asfiksia dapat terjadi tanpa didahului dengan tanda dan gejala gawat janin. Namun bisa didapatkan dari faktor bayi premature (sebelum 37 minggu kehamilan), persalinan dengan tindakan (sungsang, bayi kembar, distosia bahu, ekstraksi vakum dan ekstraksi forsep), kelainan konginetal dan air ketuban bercampur meconium (Indrayani & Djami, 2013:345-346).

3. Patofisiologi Asfisika

Transisi dari kehidupan janin intrauterin ke kehidupan bayi ektrauterin menunjukkan perubahan alveoli paru janin dalam uterus berisi cairan paru sebelum lahir, seluruh oksigen yang digunakan janin berasal dari difusi darah ibu ke darah janin melewati membrane plasenta. Hanya sebagian kecil darah janin yang mengalir ke paru-paru janin (sekitar 4%) paru janin tidak berfungsi sebagai jalur transportasi oksigen ataupun untuk ekskresi

karbon dioksida aliran darah ke paru-paru belum mempunyai peran penting untuk oksigenasi maupun untuk keseimbangan asam basa pada janin.

Paru janin mengembang dalam uterus akan tetapi kantung-kantung udara yang akan menjadi alveoli berisi cairan, bukan udara. sebagian besar darah dari sisi kanan jantung tidak dapat memasuki paru karena resistensi pembuluh darah paru janin yang mengkerut masih tinggi, sehingga sebagian besar aliran darah ini mengambil jalur yang mempunyai resistensi yang lebih rendah yaitu melewati duktus arteriosus menuju aorta.

Pada saat lahir bayi mengambil napas pertama, udara memasuki alveoli paru dan cairan paru diabsorpsi oleh jaringan paru. Pada napas kedua dan berikutnya, udara yang masuk dalam alveoli bertambah banyak dan cairan paru diabsorpsi sehingga kemudian seluruh alveoli berisi udara yang mengandung oksigen. Aliran darah paru meningkat secara dramatis. hal ini disebabkan aliran ekspansi paru yang membutuhkan tekanan puncak inspirasi dan tekanan akhir ekspirasi yang lebih tinggi.

Ekspansi paru dan peningkatan tekanan oksigen alveoli, keduanya menyebabkan penurunan resistensi vaskuler paru dan peningkatan aliran darah dari arteri pulmonalis paru setelah lahir aliran intrakardial dan ekstrakardial mulai beralih arah, yang kemudian duktus arteriosus tidak berfungsi lagi. kegagalan penurunan resistansi vaskuler paru menyebabkan hipertensi pulmonal persisten. (PPH) pada BBL, sehingga duktus arteriosus botalli tetap berfungsi lagi (menuju aorta), aliran darah ke paru menjadi

inadekuat dan hipoksemia terulang kembali. ekspansi paru yang inadekuat menyebabkan gagal napas (Dewi, 2014:19-21).

#### 4. Gejala klinis

Didapatkan manifestasi klinis asfiksia yaitu bayi tidak bernapas atau megap-megap, denyut jantung kurang dari 100x/menit, tonus otot menurun, warna kulit kebiruan kulit sianosis, pucat, kejang dan penurunan kesadaran tidak ada respon terhadap refleks rangsangan (Nadyah, 2013:95).

#### 5. Diagnosa

##### a. Anamnesis

Ditanyakan riwayat penyakit ibu yang lalu dan sekarang, adanya tanda-tanda kehamilan resiko tinggi yang mengarah ke gawat janin, gangguan/kesulitan waktu lahir, lahir tidak bernapas/ menangis.

##### b. Pemeriksaan fisik

Melihat bayi cukup bulan atau tidak (berat badan, panjang badan, tanda-tanda bayi cukup bulan), bayi tidak bernapas atau napas megap-megap, retraksi dinding dada dan tonus otot menurun (Dewi, 2014:21).

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## c. Nilai Apgar

Tabel 2. 1. APGAR *score*

Tanda	0	1	2
<i>Appearance</i>	Seluruhnya biru	Kulit tubuh merah muda, ekstremitas biru	Seluruh tubuh merah muda
<i>Pulse</i>	Tidak ada	<100x/m	>100x/m
<i>Grimace</i>	Tidak ada respon	Meringis/ menangis	Meringis/bersin/ batuk
<i>Activity</i>	Lemah/tidak ada	Sedikit gerak	Bergerak aktif
<i>Respiration</i>	Tidak ada	Lemah atau tidak teratur	Menangis kuat, pernapasan baik dan teratur

Sumber: Nadyah, 2013: 96

Nilai 0-3 : Asfiksia berat

Nilai 4-6 : Asfiksia sedang

Nilai 7-10 : Normal

Asfiksia janin dalam rahim untuk menegakkan diagnosa gawat janin dapat ditetapkan dengan melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

a) Denyut jantung janin

denyut jantung janin normal antara 120-160x/menit. Terjadinya gawat janin menimbulkan perubahan denyut jantung janin.

b) Mekonium dalam air ketuban. Pengeluaran mekonium pada letak kepala menunjukkan gawat janin (Dwienda, 2014:16-17).

6. Klasifikasi klinis asfiksia


Sesuai data yang didapatkan terdapat 3 klasifikasi dari asfiksia yaitu asfiksia berat, sedang dan ringan dan ditandai dengan ciri-cirinya masing-masing diantaranya yaitu.

- a. Asfiksia berat ditandai dengan bayi yang memiliki ciri seperti berikut yaitu, nilai APGAR 0-3, frekuensi jantung kecil ( $<40x$ /menit), tidak ada usaha napas, tonus otot lemah, bahkan hampir tidak ada, Bayi tidak dapat memberikan reaksi jika diberikan rangsangan, bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna kelabu, terjadi kekurangan  $O^2$  yang berlanjut sebelum atau sesudah persalinan. Penatalaksanaan  $\rightarrow$  resusitasi aktif dan segera.
- b. Asfiksia sedang dikatakan jika memiliki ciri-ciri seperti berikut yaitu, nilai APGAR 4-6, frekuensi jantung menurun ( $60-80x$ /menit), usaha napas lambat, tonus otot biasanya dalam keadaan baik, bayi masih bisa bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan, bayi tampak sianosis, tidak terjadi kekurangan  $O^2$  yang bermakna selama proses persalinan. Penatalaksanaan  $\rightarrow$  resusitasi.
- c. Asfiksia ringan dikatakan jika memiliki ciri-ciri seperti berikut yaitu, nilai APGAR 7-10, Takipnea dengan napas  $>60x$ /menit, bayi tampak sianosis, adanya retraksi sela iga, Bayi merintih (grunting), adanya pernapasan cuping hidung, bayi kurang aktifitas, dari pemeriksaan auskultasi diperoleh wheezing positif. Pelaksanaan  $\rightarrow$  Resusitasi (Dwienda, 2014:17-18).


#### 7. Penatalaksanaan Asfiksia Bayi Baru Lahir

Resusitasi BBL bertujuan untuk memulihkan fungsi pernapasan bayi baru lahir yang mengalami asfiksia dan menyelamatkan hidupnya tanpa gejala sisa dikemudian hari. Kondisi ini merupakan dilema bagi penolong tunggal

persalinan karena disamping menangani ibu bersalin, ia juga harus menyelamatkan bayi yang mengalami asfiksia. Resusitasi BBL pada APN ini dibatasi pada langkah-langkah penilaian, langkah awal dan ventilasi untuk inisiasi pemulihan pernafasan.



Gambar 2. 4. Diagram alur resusitasi bayi baru lahir dengan asfiksia



Sumber: Kemenkes RI, 2010: 5

## 1. Langkah Awal

Langkah awal ini perlu dilakukan secara tepat (dalam waktu 30 detik). Secara umum, 6 langkah awal merangsang bayi baru lahir untuk bernapas spontan dan teratur.


### 1) Jaga bayi tetap hangat

Letakkan bayi di atas kain yang ada di atas perut ibu atau dekat perineum, selimuti bayi dengan kain tersebut, pindahkan bayi ke atas kain ke tempat resusitasi.

### 2) Atur posisi

Baringkan bayi terlentang dengan kepala di dekat penolong, ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi.

Gambar 2. 5. Posisi Bayi



Gambar 1. Mengatur posisi bayi  
Sumber: Beck et al, 2005

Sumber: Beck et al, 2005

### 3) Isap lendir

Gunakan alat penghisap lendir Delee atau bola karet

Gambar 2. 6. Isap lendir



Sumber: AHA-APP, 2000

- a. Pertama, isap lendir di dalam mulut kemudian baru hisap lendir di hidung.
- b. Hisap lendir sambil menarik keluar penghisap (bukan pada saat memasukkan).
- c. Bila menggunakan penghisap lendir Delee, jangan memasukkan ujung penghisap terlalu dalam (Lebih dari 5 cm ke dalam mulut atau lebih dari 3cm ke dalam hidung) karena dapat menyebabkan denyut jantung bayi melambat atau henti nafas bayi.

M A K A S S A R

4) Keringkan dan rangsang taktil

Keringkan bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya dengan sedikit takanan. Rangsangan ini dapat memulai pernafasan bayi atau bernapas lebih baik dan lakukan rangsangan taktil dengan beberapa cara di bawah ini:

- 1) Menepuk atau menyentil telapak kaki.
- 2) Menggosok punggung, perut, dada atau tungkai bayi dengan telapak tangan.

5) Reposisi

Atur kembali posisi kepala dan selimuti bayi.

- a. Ganti kain yang telah basah dengan kain bersih dan kering.
- b. Selimuti bayi dengan kain tersebut, jangan tutupi bagian muka dan dada agar pemantauan pernafasan bayi dapat diteruskan.
- c. Atur kembali posisi terbaik kepala bayi.

6) Penilaian apakah bayi menangis atau bernapas spontan dan teratur?

Lakukan penilaian apakah bayi bernapas normal, megap-megap atau tidak bernapas. Maka meletakkan bayi diatas dada itu dan selimuti keduanya untuk menjaga kehangatan tubuh bayi melalui persentuhan kulit ibu dan bayi selanjutnya anjurkan ibu untuk menyusukan bayi sambil membelainya.

Bila bayi tidak bernapas atau megap-megap, maka segera lakukan tindakan ventilasi (Indrayani & Djami, 2013:359-360).

## 2. Ventilasi

Ventilasi adalah bagian dari tindakan resusitasi untuk memasukan sejumlah udara ke dalam paru dengan tekanan positif yang memadai untuk membuka alveoli paru agar bayi bisa bernapas spontan dan teratur. Langkah-langkah ventilasi.

Gambar 2. 7. Penggunaan sungkup



Sumber: Kemenkes RI, 2010

- a. Pasang sungkup, perhatikan lekatan sungkup pasang dan pegang sungkup agar menutupi mulut dan hidung bayi.
- b. Ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air, amati gerakan dada bayi bila tidak mengembang periksa posisi kepala, pastikan posisinya sudah benar kemudian bila dada mengembang lakukan ke tahap selanjutnya.

c. Bila dada bayi mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm air dalam 30 detik dan pastikan udarah masuk (dada mengembang) dalam 30 detik tindakan.

d. Penilaian apakah bayi menangis atau bernapas spontan dan teratur.

Bila bayi sudah bernapas normal maka hentikan ventilasi secara bertahap, bila bayi tidak bernapas atau magap-magap lanjutkan VTP kemudian siapkan rujukan bila bayi belum bernapas spontan setelah 2 menit di ventilasi namun bila tidak dirujuk lakukan ventilasi samapai 20 menit (Indrayani & Djami, 2013:361-363).


### 3. Kompresi dada

Kompresi dada terdiri dari kompresi ritmik stertum yang menekan jantung terhadap tulang belakang, meningkatkan tekanan intratorakal dan mensirkulasikan darah ke organ-organ vital.

Kompresi dada harus selalu disertai dengan ventilasi menggunakan oksigen 100% untuk memastikan bahwa darah dalam sirkulasi teroksigenasi dengan baik. Langkah-langkah kompresi dada:

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Gambar 2. 8. Kompresi Dada



Sumber: Dallas,1991

- a. Kompresi dada dengan meletakkan kedua tangan di sekeliling dada neonatus dengan jari-jari tangan di bawah punggung untuk memberikan topangan dan kedua ibu jari berada pada sepertiga bawah sternum (tepat di atas prosesus xiphoideus) atau gunakan jari satu tangan untuk mengompresi dan letakkan tangan yang lain di bawah punggung untuk memberikan topangan.
- b. Kompresi sternum dengan kedalaman kurang lebih sepertiga diameter antero-posterior dada dan dengan tenaga yang cukup untuk menghasilkan denyut nadi yang dapat teraba. Jari-jari tangan harus tetap menempel pada dada antar waktu kompresi.
- c. Lakukan tiga kompresi diikuti oleh satu ventilasi dengan kecepatan gabungan kompresi dan ventilasi 120 kali setiap menit. Tindakan ini memberikan 90 kali kompresi dan 30 ventilasi setiap menitnya.

Berhenti selama  $\frac{1}{2}$  detik setelah setiap kompresi ketiga untuk melakukan ventilasi.

- d. Periksa frekuensi detak jantung setelah 30 detik. Bila detaknya 60x/menit atau lebih, hentikan kompresi tetap lanjut ventilasi sampai kecepatan detak jantung lebih dari 100x/menit dan muncul pernapasan normal (Lockhart, 2014:274-275).

Kemudian didapatkan salah satu dzikir yang dapat di bacakan sambil melakukan resusitasi kompresi dada sesuai tuntutan islam dalam QS. Ali imran:173

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya :

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung" (Kementrian Agama RI, 2010: 72).

#### 4. Asuhan Pascaresusitasi

Asuhan pascaresusitasi diberikan sesuai dengan keadaan bayi setelah menerima tindakan resusitasi. Asuhan pascaresusitasi di lakukan pada keadaan:

##### a. Resusitasi berhasil

Bayi menangis dan bernapas normal sesudah langkah awal atau sesudah ventilasi. Perlu pemantauan dan dukungan resusitasi.

Resusitasi dinyatakan berhasil apabila pernapasan bayi teratur, warna

kulitnya kembali normal yang kemudian diikuti dengan perbaikan tonus otot/ bergerak aktif. Lanjutkan dengan asuhan berikut.

a. Konseling

Jelaskan pada ibu dan keluarganya tentang hasil resusitasi yang telah dilakukan.

- a) Jawab setiap pertanyaan yang diajukan
- b) ajarkan ibu cara menilai pernapasan dan menjaga kehangatan tubuh bayi. Bila ditemukan kelainan segera hubungi penolong
- c) anjurkan ibu segera memberi ASI kepada bayi (Asuhan dengan metode kanguru)
- d) Jelaskan pada ibu dan keluarganya untuk mengenali tanda-tanda bahaya baru lahir dan bagaimana memperoleh pertolongan segera bila terlihat tanda-tanda tersebut pada bayi.

b. Lakukan asuhan bayi baru lahir normal, meliputi :

Anjurkan ibu menyusui sambil memperhatikan dan membelai bayinya, berikan vitamin K, antibiotic salep mata, imunisasi hepatitis B.

c. Lakukan pemantauan seksama terhadap bayi pascaresusitasi selama 2 jam pertama.

Memperhatikan tanda-tanda kesulitan bernapas pada bayi dengan Tarikan intercostals, napas megap-megap, frekuensi napas  $<30$  x/menit atau  $>60$ x/menit, bayi kebiruan atau pucat, bayi lemas.

Kemudian pantau jika bayi tampak pucat walaupun tampak bernapas normal.

b. Resusitasi tidak berhasil

Bayi perlu rujukan, yaitu sesudah ventilasi 2 menit belum bernapas atau bayi sudah bernapas tetapi masih megap-megap atau pada saat pemantauan kondisi bayi makin memburuk.

c. Resusitasi gagal

Resusitasi dinyatakan gagal apabila setelah 20 menit ventilasi, bayi gagal bernapas (Indrayani & Djami, 2013:366).

5. Asuhan tindak lanjutan pascaresusitasi

Sesudah resusitasi, bayi masih perlu asuhan lanjutan yang diberikan melalui kunjungan rumah. Tujuan asuhan lanjutan adalah untuk memantau kondisi kesehatan bayi setelah tindakan resusitasi.

Kunjungan rumah (kunjungan neonates 0-7 hari) dilakukan sehari setelah bayi lahir. Gunakan algoritma, Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) untuk melakukan penilaian, membuat klasifikasi, menentukan tindakan dan pengobatan serta tindakan dan pengobatan serta tindak lanjut.

- 1) Bila pada kunjungan rumah (hari-1) ternyata bayi termasuk dalam klasifikasi merah maka bayi harus segera dirujuk
- 2) Bila termasuk klasifikasi kuning, bayi harus dikunjungi kembali pada hari ke-2.

- 3) Bila termasuk klasifikasi hijau, anjurkan agar bayi mendapat perawatan bayi baru lahir di Rumah.

Untuk kunjungan rumah berikutnya (kunjungan neonates 8 sampai dengan 28 hari), gunakan juga algoritmaq MTBM. Bayi dikatakan aman, apabila ibu:

- 1) Tidak memiliki kekhawatiran mengenai perilaku bayinya
- 2) Memegang dan berbicara dengan bayinya dengan penuh kasih sayang.
- 3) Mengetahui tanda-tanda bahaya dan upaya apa yang harus dilakukan  
(Indrayani, 2013:367-368)

### ***C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia Berat***

#### **1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan**

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses manajemen ini terdiri dari 7 langkah berurutan dimana di setiap langkah disempurnakan secara periodik, proses ini dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi (Varney, 2001). Dengan adanya proses manajemen ini maka mudah kita dapatkan mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan suatu asuhan yang aman dan efektif.

2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan Asfiksia berat

Manajemen kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan yang dimana dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa di aplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bisa dipecah-pecah ke dalam tugas-tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi Asiksia berat.

Berikut langkah-langkah dalam proses penatalaksanaan menurut Varney (2003), Adapun tahapan manajemen asuhan kebidanan menurut langkah Varney adalah sebagai berikut:

a. Langkah I (Pengumpulan data dasar)

Pengumpulan data dasar yang lengkap untuk menilai yang menyangkut keadaan bayi yang meliputi riwayat kesehatan bayi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium serta laporan keterangan tambahan lain yang berhubungan dengan kondisi klien. Data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan orang tua atau keluarga klien dan bidan penolong persalinan.

Pada kasus bayi baru lahir kemungkinan anamnesa yang didapatkan atau data subjektif adalah bayi lahir normal di tolong oleh bidan, segera menangis, usia kehamilan 37 minggu- 42 minggu, bayi berjenis kelamin

perempuan atau laki-laki dengan berat badan 2500-4000 gram dan keadaan ibu dan bayi sehat.

Data objektif menurut Marmi dan Rahardjo (2014) yang didapatkan bayi baru lahir adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran yang berusia 0-28 hari, sedangkan menurut Dwienda, dkk (2014) bayi baru lahir normal adalah berat badan 2500-4000 gram, panjang badan 48-52 cm, lingkar dada 30-38 cm, lingkar kepala 33-35 cm, frekuensi jantung 120-160x/menit, pernapasan 40-60x/menit, kulit kemerah-merahan, rambut kepala biasanya telah sempurna, genetalia jika perempuan labia mayora sudah menutupi labia minora sedangkan pada laki-laki testis sudah turun, skrotum sudah ada, daerah mulut terbentuk dengan baik, eliminasi baik, mekonium berwarna hitam kecoklatan (Dwienda, dkk: 2014).

Kemudian pada kasus bayi baru lahir dengan asfiksia berat kemungkinan anamnesa yang didapatkan atau data subjektif yaitu riwayat penyakit selama hamil, persalinan patologis (presentasi bokong, letak lintang, partus lama atau macet dan vakum ekstaksi), kehamilan lewat bulan dan yang mungkin didapatkan dari bayi yaitu bayi prematur, kelainan konginetal dan air ketuban bercampur mekonium serta dari tali pusat yaitu solusio plasenta, lilitan tali pusat, tali pusat pendek, prolapsus tali pusat kemudian bayi lahir didapka tanda seperti bayi tidak bernapas segera setelah lahir, warna kulit kebiruan kulit sianosis, pucat, kejang dan tidak ada respon terhadap refleks rangsangan kemudian.

Data objektif yang didapatkan yaitu bayi tidak bernapas atau megap-megap, tidak ada denyut jantung, tidak ada respon terhadap rangsangan, tidak bergerak atau lemah. Kemudian pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan pH darah janin untuk mengetahui adanya asidosis menyebabkan turunnya pH sebagai tanda bahaya gawat janin (Wiknjosastro, 1999).

b. Langkah II (Merumuskan diagnosa aktual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan intervensi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Diagnosis adalah hasil analisa dan perumusan masalah yang diputuskan dalam menegakkan diagnosa bidan dengan menggunakan pengetahuan sebagai dasar atau arahan untuk mengambil tindakan.

Setelah melakukan pemeriksaan maka akan didapatkan kesimpulan bahwa masalah bayi baru lahir dengan asfiksia berat ditetapkan berdasarkan interpretasi data yang dikumpulkan saat melakukan pemeriksaan serta pengumpulan data subjektif dan data objektif.

Pada kasus bayi baru lahir dengan asfiksia berat kemungkinan anamnesa yang didapatkan atau data subjektif yaitu riwayat penyakit selama hamil, persalinan patologis (presentasi bokong, letak lintang, partus lama atau macet dan vakum ekstraksi), kehamilan lewat bulan dan yang mungkin didapatkan dari bayi yaitu bayi prematur, kelainan konginetal dan air ketuban bercampur mekonium serta dari tali pusat yaitu

solusio plasenta, plasenta kecil, plasenta rapuh, lilitan tali pusat, tali pusat pendek kemudian bayi lahir didapatkan tanda seperti bayi tidak bernafas segera setelah lahir dengan tidak benangis, warna kulit kebiruan kulit sianosis, pucat, kejang dan tidak ada respon terhadap refleksi rangsangan kemudian.

Data objektif yang didapatkan yaitu bayi tidak bernapas atau megap-megap, tidak ada denyut jantung, tidak ada respon terhadap rangsangan, tidak bergerak atau lemah. Kemudian pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan pH darah janin untuk mengetahui adanya asidosis menyebabkan turunnya pH sebagai tanda bahaya gawat janin (Wiknjosastro, 1999).

c. Langkah III (Merumuskan diagnosis/masalah potensial yang membutuhkan antisipasi masalah potensial)

Mengidentifikasi adanya diagnosis atau masalah potensial yang mungkin terjadi berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Masalah yang mungkin timbul dari bayi baru lahir dengan asfiksia berat adalah dapat mengalami gangguan pernapasan akan berisiko mengalami kejang, kerusakan otak, asidosis, hipoksemia (tubuh kekurangan oksigen), gangguan paru-paru dan lemah denyut jantung hingga pada tahap kematian bayi.

Kerusakan otak dapat mengakibatkan anak dapat mengalami kesulitan berbicara, bergerak, berjalan dan mendengar yang merupakan

ciri-ciri keterbelakangan mental yang disebabkan stroke janin akibat gangguan suplai darah ke otak janin yang berguna untuk perkembangan pertumbuhan dan kekurangan oksigen selama proses kelahiran.

Sianosis memicu pada kebiruan warna kulit, kuku dan membran mukosa akibat penurunan oksigen dalam darah, sedangkan hipoksia terjadi bila terdapat gangguan dalam sistem transportasi oksigen ke seluruh sel tubuh biasanya terjadi denyut jantung cepat, napas pendek dan cepat warna kulit berubah ke biruan atau kemerahan sesuai penyebab hipoksia dan kehilangan kesadaran.

- d. Langkah IV (Identifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera)

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter melakukan konsultasi atau penanganan segera bersama anggota tim kesehatan lain sesuai kondisi bayi.

Pada kasus bayi baru lahir dengan asfiksia berat diperlukan adanya tindakan segera dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, masalah pada bayi dengan asfiksia maka tindakan segera yang harus dilakukan yaitu resusitasi agar bayi dapat bernapas spontan kemudian dengan melakukan suction atau delee untuk membersihkan jalan napas dan pemberian  $O^2$  untuk membatuh pemberian oksigen serta kolaborasi dengan dokter dan persiapan rujukan.

e. Langkah V (Merencanakan asuhan secara menyeluruh)

Merencanakan asuhan menyeluruh yang rasional berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi segala hal yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah terkait, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi untuk klien tersebut. Rencana tindakan yang dapat dilakukan pada bayi dengan asfiksia adalah:

Nilai keadaan bayi, menjaga kehangatan bayi dengan mengeringkan tubuh bayi dan membungkus bayi dengan kain yang bersih dan kering kecuali muka dan dada, memposisikan bayi sedikit ekstensi dengan mengganjal bahu bayi dengan kain, membersihkan jalan nafas dengan alat penghisap lender menggunakan Delee, nilai kembali keadaan bayi, berikan rangsangan taktil dengan cara menggosok dan menepuk punggung dan kaki bayi, atur kembali posisi bayi, nilai keadaan bayi.

Jika bayi bernapas normal, warna kulit kemerahan, tonus otot baik atau pergerakan aktif maka dilakukan asuhan pasca resusitasi yaitu dengan pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermi, pemberian Vit K, pemberian salep mata/ tetes mata, pemeriksaan fisik. Kemudian jika bayi tidak bernapas/ bernapas megap-megap maka dilakukan ventilasi dengan memasang sungkup, perhatikan letak pasang sungkup menutupi dagu, hidung dan mulu, ventilasi 2 x dengan tekanan 30 cm air jika dada mengembang lakukan

ventilasi 20 x dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik, menilai keadaan bayi.

Jika bayi mulai bernapas normal maka hentikan ventilasi lalu lakukan asuhan pasca resusitasi, tetapi jika bayi masih blum bernapas atau bernapas megap-megap maka ulangi ventilasi sebanyak 20 x selama 30 detik, hentikan kemudian nilai kembali napas bayi tiap 30 detik, jika bayi tidak bernapas spontan sesudah 2 menit resusitasi maka siapkan rujukan, nilai denyut jantung. Tetapi ketika tidak dirujuk maka sesudah 10 menit bayi tidak bernapas spontan dan tidak terdengar denyut jantung maka pertimbangkan menghentikan resusitasi, koseling dan kemudian pencatata dokumentasi.

f. Langkah VI (Melaksanakan perencanaan)

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan Ini biasa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau hanya sebagian dan dilakukan oleh anggota tim kesehatan yang lain. Rencana yang dilakukan pada bayi baru lahir dengan kasus asfiksia berat yaitu dengan melakukan perencanaan asuhan yang telah direncanakan secara menyeluruh.

g. Langkah VII (Evaluasi)

Mengevaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan hingga terjadi perubahan dari bayi baru lahir dengan asfiksia berat, mengulangi kembali proses manajemen dengan benar terhadap setiap aspek asuhan

yang sudah dilaksanakan tetap belum efektif dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada bayi baru lahir.

Nilai pernapasan, jika napas spontan lakukan penilaian denyut jantung. Denyut jantung  $>100x$ /menit nilai warna kulit jika merah/ sinosis prefer lakukan observasi apabila biru berikan oksigen. Penilaian denyut jantung bila  $100x$  maka hentikan bantuan napas observasi napas tetapi jika tidak ada peningkatan maka lakukan PPV disertai kompresi jantung, jika denyut jantung  $80x$ /menit kompresi jantung berhenti lakukan PPV denyut jantung  $>100x$ /menit.

Jika tidak lakukan pemberian obat epine  $1:10.000$  dosis  $0,2-0,3$  mL/kg BB secara IV. Lakukan penilaian denyut jantung jika berhasil hentikan obat dan jika tidak berikan obat sesuai dosis dalam 3-5 menit kemudian lakukan penilaian denyut jantung jika tidak ada respon tanpa ada hipovolemi berikan bikarbonat dengan dosis  $2$  MEQ/ kg BB secara IV selama 2 menit.

Kemudian ketika bayi tampak membaik maka dilakukan asuhan perawatan bayi normal dengan menganjurkan ibu menyusui sambil memperhatikan dan membelai bayingnya serta pemberian vitamin K, antibiotik salep mata, imunisasi hepatitis B, lakukan pemantauan seksama terhadap bayi pascaresusitasi selama 2 jam pertama.

1) Perhatikantanda-tanda kesulitan bernapas pada bayi.

Tarikan intercostal, napas megap-megap, frekuensi napas <30 x/menit atau >60x/menit, bayi kebiruan atau pucat, bayi lemas.

2) Pantau juga bayi yang tampak pucat walaupun tampak bernapas normal yaitu dengan menjaga agar bayi tetap hangat dan kering.

3. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP)

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan. Metode ini diperkenalkan untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu:

a. *Subjektif (s)*

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia berat yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui anamnesa dengan kedua orang tua, keluarga pasien dan bidan penolong persalinan.

Pada kasus bayi baru lahir kemungkinan anamnesa yang didapatkan atau data subjektif adalah bayi lahir normal di tolong oleh bidan, segera menangis, usia kehamilan 37 minggu- 42 minggu, bayi berjenis kelamin perempuan atau laki-laki dengan berat badan 2500-4000 gram dan keadaan ibu dan bayi sehat.

Kemudian pada kasus bayi baru lahir dengan asfiksia berat kemungkinan anamnesa yang didapatkan atau data subjektif yaitu riwayat penyakit selama hamil, persalinan patologis (presentasi bokong, letak lintang, partus lama atau macet dan vakum ekstaksi), kehamilan lewat bulan dan yang mungkin didapatkan dari bayi yaitu bayi premature, kelainan konginetal dan air ketuban bercampur mekonium serta dari plasenta yaitu solusio plasenta, plasenta kecil, plasenta rapuh kemudian bayi lahir didapatkan tanda seperti bayi tidak bernapas segera setelah lahir dengan tidak menangis, warna kulit kebiruan kulit sianosis, pucat, kejang, dan tidak ada respon terhadap refleks rangsangan.

*b. Objective (o)*

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidana yang diperoleh melalui beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada orang tua atau keluarga, bidan penolong persalinan dan melihat kondisi bayi sesuai dengan tanda dan gejala bayi baru lahir dengan asfiksia berat dengan melakukan pemeriksaan fisik inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi serta pemeriksaan penunjang untuk melakukan diagnose aktual.

Data objektif yang didapatkan bayi baru lahir adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran yang berusia 0-28 hari Marmi dan Rahardjo (2014), memiliki berat badan 2500-4000 gram, panjang badan 48-52 cm, lingkar dada 30-38 cm, lingkar kepala 33-35 cm, frekuensi jantung 120-

160x/menit, pernafasan 40-60x/menit, kulit kemerah-merahan, rambut kepala biasanya telah sempurna, genetalia jika perempuan labia mayora sudah menutupi labia minora sedangkan pada laki-laki testis sudah turun, skrotum sudah ada, daerah mulut terbentuk dengan baik, eliminasi baik, mekonium berwarna hitam kecoklatan (Dwienda, dkk: 2014).

Data objektif yang mungkin didapatkan dari bayi baru lahir dengan asfiksia berat yaitu bayi tidak bernapas atau megap-megap, tidak ada denyut jantung, tidak ada respon terhadap rangsangan, tidak bergerak atau lemah. Kemudian pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan pH darah janin untuk mengetahui adanya asidosis menyebabkan turunnya pH sebagai tanda bahaya gawat janin (Wiknjastro, 1999).

c. *Assesment (a)*

Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia berat dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien, apakah bayi baru lahir masuk kategori asfiksia berat.

Pada kasus asfiksia menegaskan diagnosa bahwa benar pasien menderita asfiksia berat pada bayi baru lahir berdasarkan dari data subjektif dan objektif yang didapatkan kemudian setelah menegaskan diagnose asfiksia pada bayi baru lahir kita perlu mengantisipasi terjadinya gangguan pernafasan yang akan berisiko mengalami kejang, kerusakan

otak, asidosis, hipoksemia (tubuh kekurangan oksigen), gangguan paru-paru dan lemah denyut jantung hingga pada tahap kematian bayi.

d. *Planning (p)*

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia berat di mana planning ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien. SOAP ini dilakukan pada asuhan terhadap bayi baru lahir dengan asfiksia berat pada tahap berikutnya.

Adapun penatalaksanaan asfiksia berat yaitu mengatur posisi bayi karena itu adalah langkah utama untuk memperbaiki jalan napas bayi kemudian merangsang bayi dengan menepuk atau menyentil telapak kaki atau menggosok punggung, perut, dada atau tungkai bayi dengan telapak tangan kemudian keringkan bayi dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya.

Selanjutnya melakukan kunjungan ulang dan mengkaji keadaan umum bayi dan observasi TTV bayi untuk memastikan bayi sudah bernafas normal seperti bayi lainnya serta rawat gabung dengan ibu dan dapat ASI eksklusif.

Kemudian dilakukan kunjungan neonatus hari pertama hingga usia 28 hari dengan jadwal kunjungan, (KN I) dilaksanakan saat usia 6 jam –

48 jam, (KN II) dilaksanakan saat usia 3 hari – 7 hari, (KN III) dilaksanakan saat usia 8 hari 28 hari (Hidayat, 2016).

1) Kunjungan I (1 hari) : Mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi dan menggunakan sarung tangan, memotong tali pusat, menilai usaha napas, warna kulit dan frekuensi denyut jantung kemudian melakukan 6 langkah awal resusitasi dalam 30 detik, melanjutkan dengan resusitasi tekanan positif, pemberian O<sup>2</sup> secara nasal 1 liter/menit, kolaborasi dengan dokter dengan pemberian infus Dextrose 10% 8 tpm, perawatan tali pusat dengan melihat adanya tanda infeksi yaitu tali pusat merah, bengkak, ada pengeluaran nanah/darah, injeksi vit K 1 mg, pemberian salep mata, mengobservasi TTV tiap 15 menit tempatkan di atas infant warmer, status puasa, kemudian memperbaiki kondisi umum bayi mencegah bayi kehilangan panas, mengobservasi keadaan umum, tanda-tanda kesulitan bernapas, warna kulit dan refleks bayi secara ketat selama 2 jam pertama dan melakukan asuhan pascaresusitasi selama 24 jam pertama.

2) Kunjungan II (2 hari): Memberitahu keluarga hasil pemeriksaan, mengobservasi TTV dan pola napas, mempertahankan pemberian O<sup>2</sup> sesuai indikasi 0,5 liter/menit, menjaga kehangatan bayi dan infus tridex 8 tpm.

3) Kunjungan III (3 hari) : Memberitahu keluarga hasil pemeriksaan, mempertahankan kehangatan bayi, menjaga *personal hygiene*,

perawatan tali pusat dan mengobservasi ttv bayi dan persiapan pulang ke rumah.

- 4) Kunjungan IV (10 hari) : Memberitahu ibu dan keluarga kondisi dan perkembangan bayi saat ini, mengonservasi keadaan umum bayi, menjaga *personal hygiene*, menganjurkan ibu memberikan ASI secara *on demand* sesuai kebutuhan bayi.
- 5) Kunjungan V (18 hari) : Memberitahu ibu dan keluarga kondisi dan perkembangan bayi saat ini, mengobservasi keadaan umum bayi, tetap menjaga *personal hygiene* dan memberikan ASI pada bayi sesuai kebutuhan.
- 6) Kunjungan VI (28 hari) : Memberitahu ibu dan keluarga tentang kondisi serta perkembangan bayi, mengobservasi keadaan umum, tetap menjaga *personal hygiene* dan memberikan ASI secara *on demand*.

#### **D. Tinjauan Islam tentang bayi baru lahir**

Didapatkan ayat tentang proses penciptaan manusia dalam QS. Al- Mu'minun: 12-15

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾  
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

12). Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah 13). Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) 14). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik 15). Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati (Kementrian Agama RI, 2010: 342).

Dimana al-Quran mengungkapkan bahwa manusia pada awalnya berasal dari saripati yang berasal dari tanah sebagai substansi dasar kehidupan manusia, seperti protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah. Kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon (sperma), kemudian hasil dari pernikahan (hubungan seksual), maka terjadilah pembaruan antara sperma (lelaki) dan ovum (sel telur wanita) di dalam rahim. Kemudian menjadi membesar sedikit demi sedikit hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna. (Shihab, 2005: 165-167).

Kemudian hadist yang di dapatkan tentang bayi baru lahir yang di anjurkan untuk mengadzani karena menurutnya agar kalimat pertama yang berdentung dalam pendengaran seorang manusia adalah kalimat-kalimat tersebut

(adzan) yang merupakan kebesaran dan keagungan rabb, juga dua kalimat syahadat yang merupakan kalimat seseorang masuk islam seperti pada hadist:

رَوَى أَبُو رَافِعٍ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ

Artinya:

*Abu Rafi meriwayatkan : Aku melihat Rasulullah SAW mengadzani telinga Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. (HR. Abu Daud, At-Tirmizy dan Al-Hakim).*

Demikian hadist diatas menegaskan tentang kesunnahan mengadzani bayi baru lahir agar kalimat pertama yang di dengar oleh bayi adalah kalimat Allah, karena dimana syaitan senantiasa menunggu kelahiran bayi. Di sisi lain, mengadzani bayi berarti memperdengarkan kekuasaan Allah mencakup kebesaran dan keagungan rabb, juga agar seruan beribadah kepada Allah lebih dahulu diterima si bayi daripada seruan syaitan (untuk mengikuti langkah-langkahnya).

### **BAB III**

#### **STUDI KASUS**

#### **MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR PADA BAYI NY 'A' DENGAN ASFIKIA BERAT DI RSUD LABUANG BAJI**

**MAKASSAR TANGGAL 15 JULI 2018**

No. register : 360xxx  
Tanggal lahir : 15 Juli 2018, Pukul 00:30 WITA  
Tanggal pengkajian : 15 Juli 2018, Pukul 00:30 WITA  
Nama pengkaji : Suriati

#### **A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

##### **1. Identifikasi**

##### **a. Bayi**

Nama : Bayi Ny 'A'  
Umur : 0 hari  
Tanggal lahir : 15 juli 2018  
Jenis kelamin : Perempuan  
Anak ke : 2

##### **b. Orang tua**

Nama : Ny 'A' / Tn 'A'  
Umur : 35 thn / 36 thn  
Nikah : 1x / ± 8 thn  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SMU / SMU  
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta  
Alamat : Bajeng barat

## 2. Riwayat kesehatan

- a. Keluhan utama bayi lahir tidak bernapas spontan atau bernapas megap-megap
- b. Riwayat keluhan utama sejak lahir bayi tidak bernapas spontan, frekuensi jantung 40x/m, pergerakan lemah, warna kulit merah ekstremitas biru dan tidak ada reaksi saat diberi rangsangan.
- c. Bayi masuk ke ruang perinatologi 30 menit setelah lahir dengan diagnosis asfiksia berat, ditandai dengan tidak segera menangis setelah lahir
- d. Bayi belum bernapas teratur, gerakan lemah, badan merah dan ekstremitas biru
- e. Riwayat kehamilan/persalinan
  - 1) Ibu datang dengan rujukan preeklamsia dari RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar tanggal 14 juli 2018, pukul 22.00 wita
  - 2) Masuk melalui ruang bersalin untuk rencana *Sectio caesaria*.
  - 3) Masuk ruang operasi tanggal 14 juli 2018, pukul 23:30 wita
  - 4) Riwayat persalinan yang lalu

Anak	Tahun	BBL	Jk	Penolong	Tempat persalinan	Kondisi
1	2013	3000gr	L	Bidan	Pkm	Baik
2	2018	2800gr	P	Dokter	pattalasang RSUD Labuang Baji	Baik

5) Riwayat persalinan

- a) Ibu mengatakan bahwa ini adalah anak yang kedua dan tidak pernah keguguran
- b) HPHT : 12- 11- 2017
- c) HTP : 19- 8- 2018
- d) Masa gestasi : 39 Minggu 3 hari
- e) ANC sebanyak 4 kali
- f) Imunisasi TT sebanyak 1 kali tanggal 3 januari 2018
- g) Ibu memiliki riwayat hipertensi selama kehamilan

6) Riwayat persalinan sekarang

- a) Bayi lahir tanggal 15 juli 2018, jam 00.30 wita dengan *Seccio caesaria*.
- b) Bayi lahir tidak bernafas spontan, denyut jantung lemah tidak teratur dengan frekuensi 40 kali/menit, warna kulit badan dan ekstremitas biru

3. Riwayat psikologis, Sosial dan Ekonomi

- a. Ekspresi wajah ibu dan keluarga tampak cemas
- b. Hubungan ibu, suami dan keluarga baik
- c. Ibu menggunakan BPJS untuk membayar biaya perawatan

4. Data spiritual

- a. Keluarga berdoa kepada Allah SWT agar bayinya selamat
- b. Ibu dan keluarga rajin melaksanakan sholat 5 waktu

## 5. Pemeriksaan fisik

- a. Keadaan umum bayi buruk, bayi belum bernafas spontan, tonus otot lemah bahkan tidak ada
- b. Tanda-tanda vital
- 1) Frekuensi jantung : 40 kali/menit
  - 2) Pernapasan : belum bernafas spontan
  - 3) Suhu : 36,5°C
- c. APGAR Score dinilai segera setelah lahir pada pukul 00:30 wita sampai menit ke 5.

Table 3.1. APGAR Score

Tanda	0	1	2	1	5
<i>Appearance</i>	Pucat	Kulit tubuh merah muda, ekstremitas biru	Seluruh tubuh merah muda	1	1
<i>Pulse</i>	Tidak ada	<100x/m	>100x/m	1	1
<i>Grimace</i>	Tidak ada	Perubahan Mimic	Meringis/bersin	0	0
<i>Activity</i>	Tidak ada	Sedikit gerak	Bergerak aktif	0	1
<i>Respiration</i>	Tidak ada	Lemah/ tidak teratur	Menangis kuat	1	1
	Jumlah			3	4

Sumber : Data Primer

## d. Pemeriksaan fisik

## 1) Kepala

Rambut hitam, ubun-ubun belum tertutup, tidak ada benjolan

## 2) Mata

Simetris kiri dan kanan, kongjungtiva merah muda, sclera putih

## 3) Hidung

Simetris kiri dan kanan, gerakan cuping hidung tidak ada

## 4) Mulut dan bibir

Bibir tampak kering dan pucat, terdapat banyak lender, tidak ada kelainan bawaan dan pallatum, reflex isap tidak ada

## 5) Telinga

Simetris kiri kanan, tampak bersih, tidak ada secret

## 6) Leher

Tidak ada pembesaran atau benjolan

## 7) Dada dan perut

Simetris kiri dan kanan, gerakan dada tidak ada, keadaan tali pusat tampak basah, dan terjepit dengan penjepit tali pusat

## 8) Punggung dan Bokong

Tonjolan punggung tidak ada

## 9) Genetalia

Labia mayora menutupi labia minora

## 10) Anus

Tampak ada lubang anus

## 11) Ekstremitas

Simetris kiri dan kanan, jumlah jari-jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada pergerakan aktif, warna biru dan terabab dingin

## 12) Kulit

Verniks kurang, warna tubuh kebiruan dan tidak ada tanda lahir

**B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL**

**Diagnosa aktual** : BCB/ SMK bayi lahir dengan asfiksia berat

## 1. BCB

Data dasar

DS : a. Ibu mengatakan HPHT tanggal 12 november 2017

b. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 15 juli 2018

DO : a. HTP : 19-08-2018

b. BBL : 2800 gram

c. PBL : 47 cm

Analisis dan interpretasi data

Hasil pengkajian dari HPHT tanggal 12 november 2018 sampai bayi lahir tanggal 15 juli 2018 berarti usia kehamilan 39 minggu 3 hari dan sesuai dengan usia kehamilan normal yaitu 37-42 minggu, Sehingga bayi termasuk ke dalam kategori bayi cukup bulan (BCB).

## 2. SMK

Data dasar

DS : a. ibu mengatakan melahirkan tanggal 15 juli 2018

b. berat badan lahir 2800 gram

c. Usia kehamilan saat melahirkan 39 minggu 3 hari

DO : a. HTP : 19-08-2018

b.BBL : 2800 gram

c. PB nL : 47 cm

#### Analisis dan interpretasi data

Bayi Ny 'A' lahir pada usia kehamilan 39 minggu 3 hari dengan berat badan lahir 2800 gram. Sesuai dengan *Ballard score* yaitu disesuaikan dengan skor dan dijumlahkan nilai maturitas neuromuskuler dan fisik dilihat dari skor dan dijumlahkan hasilnya kemudian interpretasi hasil dilihat pada table skor

#### Penilaian meliputi:

##### a. Maturitas neuromuskuler:

- 1) Postur :4
- 2) Jendela pergerakan tangan :3
- 3) Gerakan lengan membalik: :3
- 4) Sudut popliteal: :3
- 5) Tanda seldang :3
- 6) Lutut ke telinga :3

##### b. Pemeriksaan fisik:

- 1) Kulit :4
- 2) Lanugo :3
- 3) Permukaan plantar :3

- 4) Payudara :4  
 5) Mata/telinga :3  
 6) Genitalia perempuan :4

Tota skor : Maturitas neuromuskuler + fisik

: 19 + 21

: 40

Usia maturitas :40 minggu

kemudian berdasarkan kurva pertumbuhan dan perkembangan janin intra uterin dari Battalgia dan Lubchenco, berat bayi Ny 'A' yang lahir dengan berat lahir persentil >10 sampai 90 disebut bayi sesuai masa kehamilan (SMK).

### 3. Asfiksia berat

Data dasar

DS: ibu mengatakan bayinya lahir tidak langsung menangis

- DO:
- bayi lahir tidak bernapas spontan
  - frekuensi jantung saat lahir 40 x/menit
  - tonus otot lemah bahkan tidak ada
  - bayi tidak bereaksi saat di beri rangsangan
  - warna kulit merah ekstremitas biru

Analisa dan interpretasi

Pada persalinan dengan ibu riwayat preeklamsia yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya asfiksia berat. Umumnya bayi yang mengalami asfiksia memiliki riwayat gawat janin sebelum lahir dan masalah ini erat hubungannya dengan adanya gangguan kesehatan ibu selama hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama atau sesudah persalinan (Indrayani dan Djami, 2013:344).

Pada Bayi dengan asfiksia ditandai dengan keadaan bayi baru lahir yang tidak dapat bernapas spontan atau bernapas megap-megap, tonus otot lemah, warna kulit biru yang ditandai adanya hipoksia dan sianosis dan didapatkan penilaian dalam APGAR Score 3/4.

### **C. LANGKAH III : ANTISIPASI DIAGNOSIS/MASALAH POTENSIAL**

**Diagnose potensial** : kematian bayi

- DO :
- a. bayi lahir tidak segera menangis
  - b. bayi belum bernapas spontan
  - c. tidak bereaksi saat diberi rangsangan

Analisa dan interpretasi data

Asfiksia pada bayi baru lahir adalah suatu ke

adaaan bayi baru lahir yang gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, adanya hipoksemia (kekurangan oksigen pada tubuh) dan gangguan pada metabolisme dalam tubuh sehingga dapat mengakibatkan kematian jika tidak tertangani dengan cepat dan tepat.

#### **D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA DAN KOLABORASI**

**Tanggal : 15 juli 2018, pukul 01:30 wita**

1. Bersihkan jalan napas dengan alat pengisap lender yang tersedia seperti deele.  
Rasional : untuk membersihkan jalan napas agar bayi dapat bernapas secara spontan tanpa masalah.
2. Memosisikan bayi dengan baik dengan posisi ekstensi atau dengan mengganjal bahu dengan kain.  
Rasional : untuk membuka jalan napas sehingga bayi dapat segera bernapas spontan
3. Keringkan tubuh bayi dengan kain yang kering dan hangat sambil melakukan rangsangan taktil.  
Rasional : rangsangan taktil dapat merangsang pernapasan dan meningkatkan aspirasi O<sub>2</sub>.
4. Jika bayi tidak bernapas/ bernafas megap-megap maka dilakukan ventilasi dengan menggunakan ambu bag, ventilasi sebanyak 20 x selama 30 detik sampai bayi dapat bernapas spontan dan frekuensi jantung >100x/menit.

Rasional : tindakan memasukkan udara kedalam paru dengan tekanan positif untuk membuka alveoli agar bisa bernafas secara spontan dan teratur.

5. Apakah bayi sudah bernapas spontan dan frekuensi jantung sudah normal tetapi bayi masih biru maka akan dilakukan pemberian oksigen 1 liter/menit menggunakan nasal kanula.

Rasional : oksigen untuk memperbaiki keadaan umum bayi dan mencegah asidosis yang berkelanjutan dan menghentikan jika warna kulit normal yaitu kemerah-merahan.

#### **E. LANGKAH V : INTERVENSI**

**Tanggal 15 juli 2018, pukul 01:30 wita**

**Diagnose aktual : BCB, SMK, bayi lahir dengan asfiksia berat**

**Tujuan :**

1. Kasus asfiksia mendapatkan penatalaksanaan segera
2. Ketika lahir bayi dapat beradaptasi dengan perubahan fisiologis di luar kandungan

**Kriteria :**

1. Keadaan umum bayi baik
2. Bayi bernafas spontan tanpa kesulitan dan menangis segera telah lahir
3. Gerakan aktif
4. Kulit tidak sianosis
5. Tanda- tanda vital normal

- a. Frekuensi jantung :120-160x/m
  - b. Pernafasan :40-60x/m
  - c. Suhu :36,5-37,5c
6. Tidak mengalami gangguan metabolisme (BAK dan BAB lancar)
  7. Refleks isap dan menelan baik

Intervertasi tanggal 15 juli 2018, pukul 01:30 wita

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi lalu gunakan sarung tangan saat memegang bayi.  
Rasional : untuk mencegah infeksi nosokomial.
2. Mecegah kehilangan panas termasuk menyiapkan tempat kering dan hangat dengan infra warmer.  
Rasional : perbedaan suhu intrauterine dan ekstrauterin saat bayi lahir harus disesuaikan sehingga memerlukan pengawasan agar tidak kehilangan panas.
3. Bungkus bayi dengan selimut bersih dan kering.  
Rasional : untuk memcegah kehilangan panas.
4. Meletakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian nilai usaha napas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit.  
Rasional : untuk mengetahui kondisi bayi dan menentukan tindakan yang diperlukan selanjutnya
5. Melakukan perawatan tali pusat.  
Rasional : menghindari adanya tanda-tanda infeksi pada bayi

6. Injeksi vitamin K (Neo-K phytonadion) 0,05 cc.

Rasional : mencegah terjadinya perdarahan

7. Memberikan salep mata.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi pada mata bayi baru lahir.

8. Malakukan pemeriksaan fisik.

Rasional : mendeteksi secara dini kelainan fisik pada bayi

9. Memberikan imunisasi Hepatitis B 0,5 mL intramuskuler pada paha kanan anterolateral, kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K.

Rasional : memberikan kekebalan tubuh pada bayi

10. Observasi TTV tiap 15 menit

Rasional : untuk mengetahui keadaan umum bayi sehingga dapat dilakukan tindakan jika tanda-tanda vital diluar normal

## **F. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI**

**Tanggal 15 juli 2018, pukul 01:30 wita**

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi dan menggunakan sarung tangan saat memegang bayi

Hasil : tangan bersih dan telah memakai sarung tangan

2. Menilai usaha napas, frekuensi jantung, dan warna kulit

Hasil : bayi belum bernapas spontan, frekuensi jantung 40x/m dan warna kulit biru.

3. Membungkus bayi dengan selimut bersih dan kering

Hasil : bayi diselimuti kain

4. Mengatur posisi bayi dengan benar (kepala sedikit ekstensi atau meletakkan handuk/kain dibawah bahu bayi).

Hasil: posisi bayi ekstensi

5. Membersihkan jalan nafas dari lender dengan menggunakan delee

Hasil : jalan nafas bersih

6. Mengeringkan bayi dan melakukan ransangan taktil

Hasil : terlaksana

7. Melakukan tindakan VTP (Ventilasi Tekanan Positif) sebanyak 20 x dalam 30 detik sampai bayi bernafas spontan dan teratur

Hasil : tindakan VTP terlaksana

8. Mengobservasi pemberian O<sub>2</sub> sebanyak 1 liter/menit menggunakan nasal kanula

Hasil : terlaksana

9. Memasang infus dextrose 10% sebanyak 8 tpm mikro di tangan kiri.

Hasil : infus terpasang

10. Melakukan perawatan tali pusat

Hasil : tali pusat basah dan terjepit

11. Menginjeksi vitamin K (*Neo-k phytonadione*) 0.05cc di pada kiri anterolateral secara IM (Aspirasi).

Hasil : terlaksana

12. Memberikan salep mata

Hasil : terlaksana

13. Menginjeksi Hb.0 secara IM dipada kanan anterolateral 1-2 jam setelah pemberian Vit K.

Hasil : Terlaksana

14. Mengobservasi TTV tiap 15 menit

Hasil :

Tabel 3.2. Observasi tanda-tanda vital

Jam	frekuensi jantung	Pernapasan	Suhu
01:00 wita	80x/menit	20x/menit	36,0°C
01:15 wita	88x/menit	28x/menit	36,5°C
01:30 wita	90x/menit	30x/menit	36,8°C
01:45 wita	100x/menit	38x/menit	36,8°C
02:00 wita	110x/menit	38x/menit	36,8°C
02:15 wita	110x/menit	44x/menit	36,8°C

Sumber: Data Primer 2018

15. Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada tali pusat yaitu tali pusat merah, bengkak, ada pengeluaran nanah/darah

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

## G. LANGKAH VII : EVALUASI

**Tanggal 15 Juli 2018, pukul 00:30 WITA**

Diagnosa : BCB, SMK, bayi lahir dengan asfiksia berat

Masalah potensial : kematian bayi.

1. Bayi belum beradaptasi dengan baik di luar kandungan seperti metabolisme belum lancar seperti BAK dan BAB
2. Asfiksia belum teratasi dengan yaitu dengan adanya:
  - a. Bayi masih bernapas megap-megap dengan frekuensi 28x/m

- b. Frekuensi jantung 40x/m
- c. Suhu 36,5c
- d. Bayi bergerak sedikit



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR**

**PADA BAYI NY 'A' DENGAN ASFIKZIA BERAT**

**DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**

**TANGGAL 15 JULI 2018**

No. register : 360xxx  
 Tanggal lahir : 15 Juli 2018, Pukul 00:30 WITA  
 Tanggal pengkajian : 15 Juli 2018, Pukul 00:30 WITA  
 Nama pengkaji : Suriati

**IDENTITAS**

a. Bayi

Nama : Bayi Ny 'A'  
 Umur : 0 hari  
 Tanggal lahir : 15 juli 2018  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Anak ke : 2

b. Orang tua

Nama : Ny 'A' / Tn 'A'  
 Umur : 32 thn / 34 thn  
 Nikah : 1x / ± 8 thn  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMU / SMU  
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta  
 Alamat : Bajeng barat

**DATA SUBJEKTIF**

1. Bayi lahir tidak menangis
2. Bayi lahir tanggal 15 juli 2018, pukul 00:30 wita
3. Ibu mengatakan bahwa ini anak kedua dan tidak pernah keguguran
4. Usia kehamilan saat melahirkan adalah 39 minggu 3 hari
5. ANC sebanyak 4 kali
6. Imunisasi TT 1 kali tanggal 03 januari 2018
7. Tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat saat hamil
8. Ibu riwayat hipertensi dalam kehamilan
9. Tidak memiliki riwayat penyakit keturunan

**DATA OBJEKTIF**

1. Keadaan umum bayi buruk, bayi tidak menangis setelah lahir
2. Berat badan lahir : 2800 gram
3. Panjang badan lahir : 47 cm
4. Tanda-tanda vital
  - a. Frekuensi jantung : 40x/ menit
  - b. Pernapasan : belum bernapas spontan
  - c. Suhu : 36,5°C

## 5. Pemeriksaan fisik

### a. Kepala

Rambut hitam, ubun-ubun belum tertutup, tidak ada benjolan

### b. Mata

Simetris kiri dan kanan, kongjungtiva merah muda, sclera putih dan tidak ada ikterus

### c. Hidung

Simetris kiri dan kanan, gerakan cuping hidung tidak ada

### d. Mulut dan bibir

Bibir tampak kering dan pucat, terdapat banyak lender, tidak ada kelainan bawaan dan pallatum, refleks isap tidak ada

### e. Telinga

Simetris kiri kanan, tampak bersih, tidak ada secret

### f. Leher

Tidak ada pembesaran atau benjolan

### g. Dada dan perut

Simetris kiri dan kanan, gerakan dada tidak ada, keadaan tali pusat tampak basah, dan terjepit dengan penjepit tali pusat

### h. Punggung dan Bokong

Tonjolan punggung tidak ada

### i. Genetalia

Labia mayora menutupi labia manora

## j. Anus

Tampak ada lubang anus

## k. Ekstremitas

Simestris kiri dan kanan, jumlah jari-jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada pergerakan aktif, warna biru dan terabab dingin

## l. Kulit

Verniks kurang, warna tubuh kebiruan dan tidak ada tanda lahir

**ASSESSMENT**

Bayi Ny 'A' BCB/SMK dengan asfiksia berat

**PLANNING**

**Tanggal 15 Juli 2018, pukul 01:30 WITA**

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi dan menggunakan sarung tangan saat memegang bayi

Hasil : tangan bersih dan telah memakai sarung tangan.

2. Menilai usaha napas, frekuensi jantung, dan warna kulit

Hasil : bayi belum bernapas spontan, frekuensi jantung 40x/m dan warna kulit biru.

3. Membungkus bayi dengan selimut bersih dan kering

Hasil : bayi diselimuti kain

4. Mengatur posisi bayi dengan benar (kepala sedikit ekstensi atau meletakkan handuk/kain dibawah bahu bayi).

Hasil: posisi bayi ekstensi

5. Membersihkan jalan napas dari lender dengan menggunakan delee  
Hasil : jalan napas bersih
6. Mengeringkan bayi dan melakukan ransangan taktil  
Hasil : terlaksan
7. Melakukan tindakan VTP (Ventilasi Tekanan Positif) sebanyak 20 x dalam 30 detik sampai bayi bernapas spontan dan teratur  
Hasil : tindakan VTP terlaksana
8. Mengobservasi pemberian O<sub>2</sub> sebanyak 1 liter/menit menggunakan nasal kanula  
Hasil : terlaksana
9. Memasang infus dextrose 10% sebanyak 8 tpm mikro ditangan kiri  
Hasil : infus terpasang
10. Melakukan perawatan tali pusat  
Hasil : tali pusat basah dan terjepit
11. Menginjeksi vitamin K (*Neo-k phytonadione*) 0.05cc  
Hasil : terlaksana
12. Memberikan salep mata  
Hasil : terlaksana
13. Mengobservasi TTV tiap 15 menit  
Hasil :

Tabel 3.3. Observasi tanda-tanda vital

Jam	frekuensi jantung	Pernapasan	Suhu
01:00 wita	80x/menit	20x/menit	36,0°C
01:15 wita	88x/menit	28x/menit	36,5°C
01:30 wita	90x/menit	30x/menit	36,8°C
01:45 wita	100x/menit	38x/menit	36,8°C
02:00 wita	110x/menit	38x/menit	36,8 °C
02:15 wita	110x/menit	44x/menit	36,8°C

Sumber: Data Primer

14. Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada tali pusat yaitu tali pusat merah, bengkak, ada pengeluaran nanah/darah

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR  
PADA BAYI NY 'A' DENGAN ASFIKSIA BERAT HARI KE II  
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR  
TANGGAL 16 JULI 2018**

**DATA SUBJEKTIF**

1. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 15 juli 2018, pukul 00:30 wita
2. Ibu mengatakan bayinya lahir tidak langsung menangis dan saat ini sudah bisa menangis
3. Ibu merasa sedikit legah dan bahagia dengan keadaan bayinya

**DATA OBJEKTIF**

1. Bayi sudah bisa menangis tapi belum kuat
2. Tonus otot mulai membaik
3. Reflex hisap dan moro sudah ada
4. Tali pusat masih tampak basah dan tidak ada tanda infeksi
5. Tanda-tanda vital
  - a. Frekuensi jantung : 112 x/menit
  - b. Pernapasan : 94x/m
  - c. Suhu : 36,6 °c
6. Terpasang infus dekstroza 10% dengan 8 tpm
7. Terpasang O2 1 liter/menit

**ASSESMENT**

Bayi Ny 'A' umur 2 hari BCB/SMK dengan asfiksia berat

## PLANNING

**Tanggal 16 juli 2018, pukul 08:00 wita**

1. Memberitahu keluarga kondisi bayi saat ini bahwa bayi sudah mulai membaik.

Hasil: ibu dan keluarga sudah mengetahui

2. Mengobservasi keadaan umum bayi

Hasil: a. keadaan umum bayi baik

b. tanda-tanda vital

a) frekuensi jantung : 112x/m

b) pernapasan : 94x/m

c) suhu : 36,6°C

3. Menjaga personal hygiene

Hasil : terlaksana

4. Memantau berat badan bayi setiap hari

Hasil : a. BBL : 2800 gram

b. BBS : 2700 gram

5. Memberikan ASI pada bayi sesuai kebutuhan, sesuai tuntunan dalam islam untuk pemberian ASI karena dilihat dari manfaatnya dan dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Kementrian Agama RI, 2010: 37).

Ayat yang memerintahkan dengan kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya, berarti dalam Al-quran sudah menjelaskan bahwa telah digariskan air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan adalah ASI tetap makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian tentu air susu ibu kandung lebih baik dari pada yang lain, dengan ibu kandung anak akan merasa lebih tenang sebab menurut penelitian

ilmuwan ketika bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam kandungan yang berbeda dengan orang lain (Shihab, 2002).

Hasil : bayi telah minum

6. Mengobservasi pemberian O<sub>2</sub> 1 liter/menit

Hasil : terlaksana



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR  
PADA BAYI 'A' DENGAN ASFIKSIA BERAT HARI KE III  
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR  
TANGGAL 17 JULI 2018**

**DATA SUBJEKTIF**

1. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 15 Juli 2018, pukul 00:30 WITA
2. Ibu mengatakan bayinya lahir tidak segera menangis dan saat ini sudah biasa menangis
3. Kondisi bayinya sekarang sudah sedikit lebih baik
4. Ibu bahagia bayinya dalam keadaan baik-baik saja

**DATA OBJEKTIF**

1. Bayi sudah bisa menangis
2. Tonus otot mulai membaik
3. Reflex hisap dan moro sudah ada
4. Tali pusat masih tampak basah dan tidak ada tanda infeksi
5. Tanda-tanda vital
  - a. Frekuensi jantung : 120x/menit
  - b. Pernapasan : 58x/menit
  - c. Suhu : 37°C

**ASSESMEN**

Bayi Ny 'A' umur 3 hari BCB/SMK dengan asfiksia berat

## PLANNING

**Tanggal 17 Juli 2018, pukul 08:00 WITA**

1. Memberitahu keluarga kondisi dan perkembangan bayinya

Hasil : ibu dan keluarga mengetahui

2. Mengobservasi keadaan umum bayi

Hasil : a. keadaan umum bayi baik

b. Tanda-tanda vital

a) Frekuensi jantung : 120x/ menit

b) Pernapasan : 58 x/menit

c) Suhu : 37°C

3. Melakukan perawatan tali pusat

Hasil : tali pusat masih tampak basah dan tidak ada tanda infeksi

4. Menjaga personal hygiene

Hasil : bayi bersih

5. Memantau berat badan bayi setiap hari

Hasil : a. BBL : 2800 gram

b. BBS : 2700 gram

6. Memberikan ASI pada bayi sesuai kebutuhan

Hasil : terlaksana

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN**  
**BAYI BARU LAHIR PADA BAYI NY 'A'**  
**TANGGAL 24 JULI 2018**

**DATA SUBJEKTIF**

1. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 15 juli 2018, pikul 00:30 wita
2. Ibu mengatakan bayinya lahir tidak menangis dan sekarang sudah bisa menangis
3. Bayinya sekarang dalam keadaan baik
4. Ibu merasa bahagia karena kondisi bayinya

**DATA OBJEKTIF**

1. Keadaan umum bayi sudah baik
2. Tonus otot sudah baik
3. Reflex hisap dan moro sudah ada
4. Tali pusat sudah puput
5. Tanda-tanda vital
  - a. Frekuensi jantung : 138x/menit
  - b. pernapasan :44x/menit
  - c. suhu :37°c

**ASSESMEN**

Bayi Ny 'A' umur 10 hari

## PLANNING

Tanggal 24 juli 2018, pukul 10:00 wita

1. Memberitahu ibu dan keluarga tentang kondisi dan perkembangan bayinya saat ini

Hasil : ibu dan keluarga mengerti

2. Mengobservasi keadaan umum bayi

Hasil : a. keadaan umum bayi baik

b. tanda-tanda vital

a) Frekuensi jantung : 138x/menit

b) Pernapasan : 44x/menit

c) Suhu : 37°c

3. Menjaga *personal hygiene*

Hasil : bayi bersih

4. Memantau berat badan bayi setiap hari

Hasil : a. BBL :2800 gram

b. BBS :3000 gram

5. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI secara *on demand* atau sesuai kebutuhan bayi

Hasil : ibu bersedia

6. Memberitahu ibu untuk menjaga bayinya dengan baik

Hasil : ibu mngerti dan akan menjaga baiknya

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN**  
**BAYI BARU LAHIR PADA BAYI NY 'A'**  
**TANGGAL 11 AGUSTUS 2018**

**DATA SUBJEKTIF**

1. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 15 juli 2018, pukul 00:30 wita
2. Ibu mengatakan bayinya tidak menangis setelah lahir dan sekarang sudah bisa menangis
3. Ibu bahagia dan bersyukur karena bayinya dalam keadaan baik
4. Sekarang bayinya sudah aktif seperti bayi lainnya
5. Bayinya sudah berumur 28 hari

**DATA OBJEKTIF**

1. Keadaan umum bayi baik
2. Tonus otot baik
3. Refleks hisap dan moro ada
4. Tali pusat sudah puput
5. Tanda-tanda vital:
  - a. Frekuensi jantung : 140x/menit
  - b. Pernapasan : 50x/menit
  - c. Suhu : 36,6°C

## ***ASSESMENT***

Bayi Ny 'A' umur 28 hari

## **PLANNING**

**Tanggal 11 agustus 2018, pukul 10:00 wita**

1. Memberitahu ibu dan keluarga tentang kondisi dan perkembangan bayinya

Hasil : ibu dan keluarga mengerti

2. Mengobservasi keadaan umum bayi

Hasil : a. keadaan umum bayi baik

b. tanda-tanda vital

- a) Frekuensi jantung :140x/menit
- b) Pernapasan :50x/menit
- c) Suhu :36,7°c

3. Menjaga *personal hygiene*

Hasil : bayi bersih

4. Memantau berat badan bayi setiap hari

Hasil : a. BBL : 2800 gram

b. BBS : 3500 gram

5. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya secara *on demand*

yaitu sesuai kebutuhan bayi


Hasil : ibu bersedia

6. Mengajukan ibu untuk menjaga bayinya dengan baik

Hasil : ibu mengerti dan akan menjaganya

7. Mengajukan ibu untuk membawa bayinya imunisasi di pusat pelayanan kesehatan pada usia 1 bulan tanggal 15 agustus 2018

Hasil : ibu bersedia membawa bayinya imunisasi



Tabel 3.4. Jadwal kunjungan

Jadwal kunjungan	Nutrisi	TTV	BB	Keadaan
15 juli 2018	ASI perah	HR: 40x/m P:-	2800 gram	Buruk
16 juli 2018	ASI perah	S:36,5°C HR: 112 x/m P: 94 x/m	2700 gram	Sedikit membaik
17 juli 2018	ASI perah	S: 36,6°C HR:120 x/m P:58 xm	2700 gram	Membaik
24 juli 2018	ASI	S: 37°C HR: 138 x/m P: 44 x/m	3000 gram	Baik
11 agustus 2018	ASI	S: 37°C HR: 140 x/m P: 50 x/m S: 36,6°C	3700 gram	Sangat baik

Sumber : Data Primer

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membandingkan tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus penanganan dalam asuhan kebidanan pada bayi Ny 'A' dengan *asfiksia* berat di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2018.

Dalam hal ini, penulis akan membahas berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan 7 langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, perumusan diagnosa atau masalah aktual, perumusan diagnose atau masalah potensial, melakukan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

#### **A. LANGKAH I : PENGUMPULAN DATA DASAR**

Tahap pengkajian diawali dengan pengumpulan data melalui anamnesis yang meliputi identitas bayi dan orang tua, data biologis atau fisiologis, riwayat kehamilan atau persalinan lalu dan sekarang, pemeriksaan fisik sesuai pengkajian yang tersedia. Data yang dikumpulkan adalah data yang tepat yaitu data yang relevan dengan situasi yang sedang ditinjau atau data yang memiliki hubungan dengan situasi yang ditinjau. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, pemeriksaan. Observasi adalah pengumpulan data melalui indra penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi

batuk, bunyi napas), penciuman (bau napas, bau luka) serta perabaan (suhu badan dan nadi).

Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, sumber yang dapat memberikan informasi yang akurat yang diperoleh secepat mungkin dan sekecil mungkin seperti keluarga, bidan, dokter, catatan dokter dan bidan, serta tenaga kesehatan lainnya tanpa ada hambatan. Karena baik dari keluarga maupun petugas kesehatan di lahan praktek bersedia untuk memberikan informasi atau data yang berhubungan dengan penyakit dan perawatan klien sehingga memudahkan untuk pengumpulan data.

Dalam tahap pengumpulan data dasar, penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, karena saat pengumpulan data pada bayi Ny 'A' orang tua maupun keluarga serta bidan dan dokter yang ada di ruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya untuk kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan benar tidaknya proses interpretasi data pada tahap selanjutnya.

Dari tinjauan teori asfiksia bayi baru lahir adalah keadaan dimana bayi yang baru lahir tidak mampu bernapas secara spontan dan teratur, kondisi ini ditandai dengan adanya hipoksemia, hiperkarbia dan asidosis (Sembiring, 2017). Salah satu penyebab asfiksia adalah faktor keadaan ibu yaitu ibu memiliki riwayat penyakit selama kehamilan seperti preeklamsia dan eklamsia.

Preeklamsia pada ibu hamil menimbulkan dampak yang bervariasi, misalnya menyebabkan hipoksia janin intrauteri. Pada hipertensi dalam kehamilan tekanan darah yang tinggi menyebabkan berkurangnya kiriman darah ke plasenta. Sudah pasti ini akan mengurangi suplai oksigen dan makanan bagi bayi, akibatnya perkembangan bayi menjadi lambat dan terjadi hipoksia intrauterine. Kemudian efek dari adanya hipoksia adalah asfiksia neonatorum dimana ketidakmampuan bayi setelah lahir untuk bernapas normal karena gangguan pertukaran dan transport oksigen dari ibu ke janin sehingga terdapat gangguan ketersediaan oksigen dan pengeluaran karbondioksida.

Tinjauan Pada bayi Ny 'A' didapatkan bayi lahir tidak segera menangis, frekuensi jantung 40x/menit, warna kulit merah ekstremitas biru, tonus otot lemah bahkan tidak ada, tidak ada reaksi saat diberi rangsangan, warna kulit badan dan ekstremitas biru.

Dari kasus Bayi Ny 'A' data yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan gejala yang terdapat dalam tinjauan pustaka sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan.

## **B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSIS/MASALAH AKTUAL**

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis yang spesifik. Kata masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosis, tetapi sesungguhnya

membutuhkan penanganan yang dituangkan kedalam rencana asuhan pada masalah yang terjadi sering diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan arahan dan disertai diagnosis. Diagnosa adalah hasil analisa dan perumusan masalah yang diputuskan dalam menegakkan diagnosa bidan dengan menggunakan pengetahuan sebagai dasar atau arahan untuk mengambil tindakan.

Dalam tinjauan teori mengatakan bahwa penentuan masa gestasi penting untuk menentuka apakah kehamilan cukup bulan atau lebih masa kehamilan karena erat dengan dengan tingkat morbiditas dan mortalitas janin. Secara ginekologi, kehamilan dikatakan matur/aterm bila mencapai 37-42 minggu dilihat dari hasil pengkajian tanggal HPHT, selanjutnya ketika lahir bayi dikatakan sesuai masa kehamilan (SMK) apabila antara berat badan lahir dengan usia kehamilan sesuai.

Berdasarkan hasil analisis data interpretasi data diperoleh dari data pertama, maka diagnosis atau masalah aktual pada bayi Ny 'A' adalah: BCB, SMK dengan bayi asfiksia berat.

1. Diagnose BCB mengacu pada konsep teori bahwa bayi cukup bulan adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37-42 minggu (259-293 hari), maka hal ini sesuai dengan data yang ada yaitu hasil bila dihitung dari HPHT : sampai bayi Ny 'A' dilahirkan yaitu tanggal

Pada bayi Ny 'A' didapatkan bayi dengan asfiksia berat akibat ibu riwayat preeklamsia dimana preeklamsia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya asfiksia karena penurunan aliran darah ke plasenta mengakibatkan gangguan

fungsi plasenta. Kondisi ini mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga suplai darah ke plasenta berkurang dan bisa terjadi hipoksia pada janin yang dapat berkelanjutan dan mengganggu pertukaran gas antara oksigen dan karbondioksida (Prawirohardjo, 2014)

Kasus pada bayi Ny 'A' tidak didapatkan kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus bayi Ny 'A' sesuai penilaian yang dilihat dari APGAR score 3/4 .

### **C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL**

Megidentifikasi adanya diagnosis atau masalah potensial yang mungkin terjadi berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Masalah yang mungkin timbul dari bayi baru lahir dengan *asfiksia berat* adalah dapat terjadi kematian pada bayi.

Asfiksia pada bayi baru lahir adalah suatu keadaan bayi baru lahir yang gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Asfiksia dapat mengakibatkan kematian dan diperkirakan satu juta anak yang bertahan setelah mengalami asfiksia saat lahir.

Pada Bayi Ny 'A' saat dilakukan pengkajian setelah lahir yang tidak mampu bernapas spontan yang dapat mengakibatkan kematian pada bayi baru lahir dimana *asfiksia* ini dapat terjadi karena kurangnya kemampuan organ pernafasan bayi dalam menjalankan fungsi pengembangan paru-paru. Umumnya bayi yang mengalami *asfiksia* memiliki riwayat gawat janin sebelum lahir dan masalah ini erat hubungannya dengan adanya gangguan kesehatan ibu selama

hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama atau sesudah persalinan (Indrayani dan Djami, 2013:344).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dengan tinjauan pada kasus.

#### **D. LANGKAH IV : MENGIDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI**

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter melakukan konsultasi atau penanganan segera bersama anggota tim kesehatan lain sesuai kondisi bayi.

Pada kasus bayi baru lahir dengan *asfiksia berat* diperlukan adanya tindakan segera dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, masalah pada bayi dengan asfiksia maka tindakan segera yang harus dilakukan yaitu resusitasi segera agar bayi dapat bernapas spontan kemudian dengan melakukan suction atau delee untuk membersihkan jalan napas dan pemberian O<sub>2</sub> untuk membantuh pemberian oksigen serta kolaborasi dengan dokter.

Berdasarkan kemungkinan adanya faktor-faktor ini, maka seharusnya melakukan persiapan yang maksimal terhadap kelahiran bayi yaitu tempat yang kondusif untuk melakukan resusitasi, peralatan dan obat-obatan yang selalu dalam kondisi siap pakai.

Pada Bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat maka tindakan yang dilakukan adalah dengan resusitasi aktif sesuai dengan penanganan pada tinjauan teori, maka tidak ditemukan kesenjangan antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus.

## **E. LANGKAH V : INTERVENSI**

Proses penyusunan asuhan suatu rencana tindakan harus berdasarkan identifikasi masalah saat sekarang serta antisipasi diagnosis dan masalah lain yang mungkin timbul namun lebih dahulu harus dirumuskan tujuan dan kriteria yang akan dicapai.

Perencanaan adalah proses penyusunan suatu rencana tindakan berdasarkan identifikasi masalah saat sekarang, serta identifikasi diagnosis dan masalah lain yang mungkin terjadi. Namun terlebih dahulu harus dirumuskan tinjauan yang akan dicapai serta kriteria keberhasilan.

Pada tahap perencanaan diagnosis kebidanan disusun menurut tingkat bertanya masalah dan kebutuhan pasien. Masalah asfiksia berat menjadi prioritas utama penulis sebagai masalah yang mengancam keselamatan bayi dan perlu tindakan segera sedangkan masalah potensial yang mungkin terjadi adalah kematian pada bayi.

Pada Bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat maka direncanakan asuhan sesuai dengan rencana asuhan kebidanan berdasarkan diagnosis/masalah aktual dan masalah potensial yaitu memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan agar ibu mengetahui kondisi bayinya dengan observasi tanda-tanda vital seperti pernapasan, denyut jantung, warna kulit dan suhu bayi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tindakan yang diberikan.

Menjaga kehangatan bayi dengan mengeringkan tubuh bayi dan membungkus bayi dengan kain yang bersih dan kering kemudian memposisikan

bayi sedikit ekstensi dengan mengganjal bahu bayi dengan kain dan membersihkan jalan nafas dengan alat penghisap lender menggunakan Delee. Nilai kembali keadaan bayi dan berikan rangsangan taktil dengan cara menggosok dan menepuk punggung dan kaki bayi, atur kembali posisi bayi dan nilai keadaan bayi yaitu usaha napas, prekuensi denyut jantung dan warna kulit.

Rangsangan taktil harus dilakukan secara lembut dan hati-hati yaitu dengan lembut menggosok punggung, tubuh, kaki atau tangan satu atau dua kali, kemudian dengan lembut tepuk atau sentil telapak kaki bayi tindakan ini dilakukan 30 sampai 60 detik dari sejak bayi lahir namun jika bayi masih mengalami kesulitan maka segera lakukan tindakan ventilasi aktif.

Ventilasi tekanan positif (VTP) adalah tindakan memasukkan sejumlah udara kedalam paru dengan tekanan positif, membuka alveoli untuk bernafas secara spontan dan teratur. Sebelumnya periksa dan pastikan alat resusitasi telah tersedia dan berfungsi baik, terlebih dahulu cuci tangan dan menggunakan sarung tangan sebelum memegang atau memeriksa bayi. Meletakkan sungkup dengan memasang dan perhatikan letak pasang sungkup menutupi dagu, hidung dan mulut.

Kemudian jika bayi tidak bernafas/ bernafas megap-megap maka dilakukan ventilasi 2 x dengan tekanan 30 cm air jika dada mengembang lakukan ventilasi 20 x dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik, menilai keadaan bayi. Jika bayi mulai bernafas normal maka hentikan ventilasi lalu lakukan asuhan pasca resusitasi dan observasi keadaan tiap 15 menit.

Dari data yang didapatkan maka tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus.

#### **F. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI ASUHAN KEBIDANAN**

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah lima yang dilaksanakan secara efisien dan aman. Walaupun bidan tidak melakukan tindakan sendiri namun tetap merupakan tanggung jawab atau memastikan langkah yang di rencanakan terlaksana. Dalam kolaborasi dengan dokter dan keterlibatan dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi bidan juga bertanggung jawab untuk terlaksananya asuhan yang menyeluruh.

Pada saat pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi Ny 'A' tindakan yang telah direncanakan seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik dan tidak menemukan hambatan karena seluruh tindakan dilakukan sudah tersusun sesuai kebutuhan klien. Meskipun tujuan yang diinginkan belum dapat tercapai semuanya, dimana masalah asfiksia berat belum teratasi ditandai bayi masih bernapas teratur dan menggunakan O<sub>2</sub>.

Pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia berat didapatkan asuhan sesuai dengan perencanaan sehingga tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus.

#### **G. LANGKAH VII : EVALUASI ASUHAN KEBIDANAN**

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atas keberhasilan dalam mengatasi

masalah yang dihadapi klien. Mengevaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan meliputi: pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar telah terpenuhi sesuai yang diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis dikatakan efektif jika terjadi perubahan.

Pada bayi Ny 'A' dengan asfiksia evaluasi yang berhasil dilakukan adalah keadaan umum bayi mulai membaik, kesadaran komposmentis, bayi sudah menangis, tanda-tanda vital dalam batas normal seperti suhu, pernapasan, tonus otot sudah membaik, reflex moro dan hisap sudah ada dan tidak ada tanda-tanda infeksi seperti pada tali pusat kemerahan, panas, bengkak, nyeri dan mengeluarkan pus atau nanah yang berbau busuk.

Demikian dapat dilihat bahwa proses manajemen kebidanan yang diterapkan pada bayi Ny 'A' dengan diagnosa BCB,SMK bayi dengan asfiksia berat sudah berhasil dengan keadaan bayi membaik.

## BAB V

### PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung dari tempat lahan praktek melalui studi kasus tentang asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat di RSUD Labuang Baji Makassar, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. KESIMPULAN

1. Telah dilakukannya pengkajian untuk menegakkan diagnosa dan masalah aktual pada kasus bayi baru lahir dengan *asfiksia berat* di RSUD Labuang baji dengan mengumpulkan data subjektif dan objektif pada bayi Ny 'A' dan didapatkan keadaan umum bayi buruk, bayi tidak bernafas atau megap-megap, tidak ada denyut jantung, tidak ada respon terhadap rangsangan dan tidak bergerak atau lemah.
2. Telah dilakukannya pengkajian untuk menegakkan diagnosa dan masalah potensial pada kasus bayi Ny 'A' dengan *asfiksia berat* di RSUD Labuang Baji yaitu dengan potensial terjadinya kematian pada bayi sehingga di perlukannya penanganan cepat dan tepat yaitu dengan kolaborasi dengan dokter untuk melakukan resusitasi.

3. Dilakukannya tindakan segera pada bayi Ny 'A' dengan *asfiksia berat* di RSUD Labuang Baji yaitu dengan berkolaborasi dengan dokter pada tindakan resusitasi.
4. Direncanakannya tindakan dalam asuhan kebidanan pada bayi Ny 'A' dengan *asfiksia berat* di RSUD Labuang Baji dengan melakukan penilaian keadaan bayi, menjaga kehangatan bayi diatas infant warmer, memposisikan bayi sedikit, membersihkan jalan nafas, berikan rangsangan taktil dengan cara menggosok dan menepuk punggung dan kaki bayi, nilai keadaan bayi kemudian Jika bayi tidak bernafas dilakukan ventilasi tekanan positif dan jika bayi tidak bernafas spontan sesudah 2 menit resusitasi, nilai denyut jantung. Sesudah 10 menit bayi tidak bernafas spontan dan tidak terdengar denyut jantung maka pertimbangkan menghentikan resusitasi, koseling dan kemudian pencatata dokumentasi.
5. Telah dilakukan semua tindakan asuhan kebidanan pada bayi Ny 'A' dengan *asfiksia berat* di RSUD Labuang Baji dengan melakukan seluruh tindakan yang telah direncanakan dengan baik dan tanpa hambatan.
6. Mengevaluasi hasil tindakan asuhan kebidanan pada bayi Ny 'A' dengan *asfiksia berat* di RSUD Labuang Baji yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil ditandai dengan keadaan umum bayi mulai membaik, bayi sudah menangis, bernafas teratur, dan ada reaksi bila diberi rangsangan.
7. Telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada bayi Ny 'A' dengan *Asfiksia Berat* di RSUD Labuang Baji

karena sangat diperlukan untuk salah satu bentuk laporan pertanggung jawaban bidan terhadap tindakan asuhan kebidanan yang diberikan dan dapat dijadikan bukti apabila terjadi gugatan dari klien dan keluarga.

8. Telah dilakukan penelusuran terhadap kesenjangan antara teori dan kenyataan pada kasus dilahan praktek dan tidak ada di temukan adanya kesenjangan.
9. Telah dilakukannya penerapan nilai-nilai ke-Islaman dalam manajemen asuhan kebidanan pada bayi Ny 'A' dengan *Asfiksia Berat* yaitu dengan menganjurkan ibu selalu berdo'a serta sabar untuk keselamatan bayinya serta selalu berdo'a ketika melakukan tindakan.

## **B. SARAN**

1. Bagi tenaga kesehatan
  - a. Keadaan bayi dengan asfiksia adalah hal buruk dan bahkan mengakibatkan kematian. Meskipun sebagai tenaga kesehatan kita dituntut untuk menyelamatkan bayi dengan melakukan tindakan asuhan secara professional dan menyerahkan hasilnya kepada maha pencipta Allah SWT.
  - b. Tenaga kesehatan khususnya bidan hendaknya senantiasa membina hubungan yang baik dengan klien dan keluarganya agar tercapai tujuan yang diinginkan
  - c. Tenaga kesehatan khususnya bidan sebaiknya harus selalu memperbaharui pengetahuan dan menerapkannya dalam asuhan terbaru untuk upaya penurunan AKI dan AKB.

2. Bagi institusi

- a. Membekali mahasiswa dengan terampilan yang cukup sebelum turun di lapangan khususnya dalam penanganan resusitasi yang merupakan bantuan dasar yang harus diketahui tenaga kesehatan.
- b. Menambah bahan bacaan di perpustakaan sebagai perkembangan pengetahuan yang terbaru dalam ilmu kebidanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga memperluas wawasan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar

3. Bagi RSUD Labuang Baji Makassar

- a. Sebagai pihak di rumah sakit selalu memeriksa kelengkapan dan kelayakan alat yang akan digunakan agar selalu dalam kondisi siap pakai.
- b. Mengsosialisasikan penerapan APN terbaru dalam pemberian pelayanan
- c. Adanya pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang penatalaksanaan resusitasi secara uptodate.

4. Bagi pemerintah

Sebagai penentu kebijakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat:

- a. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata agar dapat menjangkau seluruh masyarakat.
- b. Adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para tenaga kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Animah dan Wahyu. Jurnal obstretika scientia,2016, Hubungan Bayi Prematur dengan Kejadian Asfiksia Neonatus.(2016). *Jurnal obstretika scientia*. vol 4 No 2. Diakses 25 maret 2018.
- Armini, dkk. Asuhan Kebidanan neonatus, Bayi, balita & Anak Prasekolah.Yogyakarta, ANDI :2017. <https://books.google.co.id/book> diakses 31 maret 2018.
- Ballard JL, dkk. New Ballard Score, Expanded to include extremely premature infants. *Journal Pediatrics* 1991. 119:417-423. Diakses 15 agustus 2018.
- Balts. Doa untuk Bayi Baru Lahir, 2013: <https://konsultasisyariah.com/18705-doa-untuk-bayi-yang-baru-lahir.html> diakses 22 juli 2018.
- Dewi, Vivian. Resusitasi Neonatus. Jakarta: Salemba Medika. 2014.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar. Profil Kesehatan Kota Makassar 2015. <https://www.scribd.com> diakses 21 maret 2018.
- Dinas kesehatan propinsi Sulawesi Selatan. profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2016. <https://dinkes.sulselprov.go.id> diakses 21 maret 2018.
- Dinas kesehatan RI, profil Dinas Kesehatan Indonesian 2015. [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) diakses 20 maret 2018.
- Dwienda, dkk. Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi/Balita dan Anak Prasekolah Untuk Para Bidan. Yogyakarta: Deepublish: 2014.
- Faridi, Miftah. Indahnya Ibadah Muslim Kosmopolitan.Malaysia: PTS Islamika. 2014. <https://books.google.co.id/book> diakses tanggal 25 juli 2018.
- Harima M, dkk. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia.Analisis Pelaksanaan Program Stabilisasi Asfiksia oleh Bidan di Puskesmas Kota Pare-Pare. (2016). *JurnalManajemen Kesehatan Indonesia*, Vol 4 No 3. di akses tgl 4 Mei 2018
- Indrayani dan Djami. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta : TIM. 2013.
- Jinxue, dkk. Journal of intelligent & fuzzy System, Blood circulation disease treatment based on decentralized adaptive control (2017): Vol.33 No 5. Diakses tanggal 15 juli 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jl. Babakan Sari Bandung; Syaamil Quran. 2010.

- Kosim. Bayiku Hanya Bertahan 1 Minggu. Jakarta: BP IDAI. 2013.
- Lissauer dan Fanaroff. Selayang Neonatologi. Jakarta: PT Indeks. 2013.
- Lockhart. Asuhan Kebidanan Neonatus Normal & Patologis. Tangerang Selatan. Binarupa Aksara Publisher: 2014.
- Marmi dan Rahardjo. Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Matondang, Corry S, dkk. Diagnosis Fisis pada Anak. Jakarta: CV Sagung Seto. 2013.
- Morales, dkk. Pathophysiology of perinatal asphyxia: can we predict and improve individual outcomes?:2011, Mor Springer EPMA Journal, 2(2): 211–230
- Nadya. Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal. Alauddin University P. 2013.
- Nurhayati, dkk. Konsep Kebidanan. Jakarta: Salemba Medika. 2013.
- Prawirohardjo. Ilmu Kebidanan. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo: Jakarta. 2014.
- Rahma dan Armah. Analisis Faktor Resiko Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir di RSUD Syekh Yusuf Gowa dan RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2013 (2013) *Jurnal kesehatan* vol VII no 1, Diakses tgl 23 Maret 2018.
- Sembiring, Julina Br. Buku Ajaran Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah. Yogyakarta. Deepublish: 2017.
- Shihab, Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran. Jakarta: Lentera hati, 2002. Vol 10.
- Singhal, dkk. Accuracy of New Ballard Score in Small for Gestation Age Neunates. *Journal Of Tropical Pediatrics*: 2017, Vol 63 Diakses 15 agustus 2018.
- Sunarti, Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi ‘S’ dengan Asfiksia di RSUD Haji Makassar: Universitas islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Wahidiyat dan Sastroasmoro. Pemeriksaan Klinis pada Bayi dan Anak. Jakarta: CV Sagung Seto. 2014.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penulis

Nama : Suriati  
NIM : 70400115076  
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 03 juni 1997  
Suku : Makassar  
Asal daerah : Takalar  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Cakura, Desa Cakura Kec. Pol-Sel  
Kab. Takalar

### B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri No. 22 Cakura : 2003-2009  
SMP Negeri 5 Takalar : 2009-2012  
SMA Negeri 1 Takalar : 2012-2015  
UIN Alauddin Makassar : 2015-2018