

**AKTIVITAS ANTIOKSIDAN KONSORSIUM ISOLAT CENDAWAN
ENDOFIT ASAL KAYU SECANG (*Caesalpinia sappan* L.) dan
MAKROALGA *Eucheuma* sp.**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

RAHMAT YUSNI
NIM. 60300114134

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Yusni
NIM : 60300114134
Temat/ Tgl. Lahir : Rampoang/ 01 Agustus 1995
Jur/Prodi : Biologi/ S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : BTN Minasa Upa Block N16 no 14 Makassar
Judul : Aktivitas Antioksidan Konsorsium Isolat
Cendawan Endofit Asal Kayu Secang
(*Caesalpinia sappan*) dengan Makroalga
Eucheuma sp.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh batal demi hukum.

Makassar, 25 Juni 2018

Penyusun



Rahmat Yusni
60300114134

PEGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Aktivitas Antioksidan Konsorsium Isolat Cendawan Endofit Asal Kayu Secang (*Caesalpinia sappan*) dengan Makroalga *Eucheuma* sp.” yang disusun oleh **Rahmat Yusni**, NIM : 60300114134, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari, Senin 02 Juli 2018 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Makassar 25 Juni 2018


11 Syawal 1439 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hamzah Hasan, M.Hi.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hafsah, S.Si., M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin M. Ag.
NIP. 196912051993031001

PERSETUJUAN PEMBIBING

Pembimbing penulis skripsi saudara **Rahmat Yusni**, NIM : 60300114134, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul” **Aktivitas Antioksidan Konsorsium Isolat Cendawan Endofit Asal Kayu Secang (*Caesalpinia sappan*) dengan Makroalga *Eucheuma sp.*” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmu dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.**

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 25 Juni 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd.
NIP. 198109122009122

Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si.
NIP. 198607162015032006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya, Ilmu-Nya, Kesehatan-Nya, Waktu-Nya dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Aktivitas Antioksidan Konsorsium Isolat Cendawan Endofit Asal Kayu Secang (Ceasalpinia sappan) dan Makroalga Euchema sp.*” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selanjutnya penulis haturkan ucapan terima kasih, doa dan harapan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi, kerjasama maupun bimbingan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada :

1. Bapak, Mama, Kakak, adik dan keluargaku tercinta yang selalu mendidik dan memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati dan telah memberikan doa restunya dalam segala kegiatan dan selalu memberikan semangat baik materi dan moril kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah swt selalu menaungi mereka dan kemudian kelak dikumpulkan di Jannah-Nya.
2. Guru-guruku SDN 206 Rampoang, SMPN 12 Luwu Utara dan SMAN 4 Luwu Utara yang pernah penulis jadikan tempat menimba ilmu. Perantara

merekalah penulis dapat mengenal baca tulis dan memahami agama dengan benar semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau.

3. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sejarannya.
4. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sejarannya.
5. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi di Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
6. Hasyimuddin S.Si., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
7. Dr. Hafsan S.Si., M.Pd., sebagai pembibing I dan Eka Sukmawaty S.Si., M.Si., sebagai pembibing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan baik dari keilmuan maupun agama yang dengan tulus hati meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah swt. selalu menaungi mereka dan kemudian kelak dikumpulkan di Jannah-Nya.
8. Isna Rasdianah Aziz S.Si., M.Sc., dan Dr. Hamzah Hasan M.Hi., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat membangun untuk memulai penelitian dan penulisan skripsi.
9. Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si. selaku dosen Komprehensif Mikrobiologi dan St. Aisyah, S.Pd., M.Kes. selaku dosen Komprehensif ilmu biologi yang

sangat membantu penulis untuk mengingat kembali ilmu yang penulis dapatkan dan Dr. Dudung Abdulah selaku Dosen Komprehensif Agama yang sangat membantu penulis untuk mempelajari agama lebih banyak lagi.

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang penulis belum pernah dapatkan dimana pun, semoga Allah swt selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau.
11. Kepada para Laboran Jurusan Biologi Kakak Kurni, Kakak Nain, Kakak Sidar dan Ibu Faridah yang selalu mendampingi penulis dalam bekerja di labolatorium mauali dari penulis menjadi praktikan hingga penulis melakukan penelitian untuk penyelesaian tugas akhir, semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau.
12. Karyawan dan Staf dalam lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam urusan surat-menyerurat.
13. Kepala Perpustakaan Sehkh Yusuf UIN Alauddin Makassar dan sejarannya.
14. Terima kasih kepada Kakak Ati yang sangat membantu penulis dalam mengurus surat-menyerurat penelitian penulis, semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau dan melancarkan persalinan dan anaknya menjadi anak yang membanggakan orang tua dan berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
15. Terima kasih kepada Prof. (ris). Dr. Partomuan Simanjuntak M.Sc., Kepala Labolatorium Kimia Bahan Alam, dan Pak Eris Septiana S.Si., M.Si., selaku

pembimbing penulis pada saat PKL di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Cibinong.

16. Terima kasih kepada teman-teman di Laboratorium KBA : Kakak Arum, Kakak cunul, Kakak Diana, Ibu Lilik, Kakak Faisal, Kakak Dito, Kakak Ane, Kakak Tiwi dan lain-lain telah memberikan saran, ilmu dan semangat pada saat PKL sehingga ilmunya penulis gunakan dalam penelitaian penulisan skripsi, terkhusus Kakak Arum yang sangat membantu penulis.
17. Terima kasih kepada angkatan saya yang tercinta LACTEAL kalian adalah saudara-saudara saya semoga kita bisa wisuda bersama-sama.
18. Terima kasih kepada Alm. Ibu Dia selaku ibu kantin langganan penulis dan teman-teman semoga Allah swt. menerima amal ibadah beliau.
19. Terima kasih kepada teman-teman laboratorium Mikrobiologi yang selalu memberi semangat untuk tetap berjuang dan selalu sabar serta tidak cepat putus asa dalam penelitian.
20. Terima kasih kepada Tim telur Balado Mantap.
21. Terima kasih kepada Tim Cendawan Endofit Eka dan Sinwa.
22. Terima kasih kepada HMJ Biologi periode 2015-2016 dan 2016-2017 karena kepercayaan kepada penulis untuk membagi ilmu dan belajar.
23. Terima kasih kepada Kakak Pioner, Spora, Autotrof, 2008, Nocturnal, Osmosis, Sinapsis, Ranvier dan Brachialis. adik-adikku Impuls, Immunoglobulin dan 2017 semoga kalian cepat dapat nama angkatan juga.

Semoga Allah swt. memberikan balasan atas segala bantuannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena


itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin yaa rabbal alaminn

Makassar, 25 Juni-2018

Penulis

Rahmat Yusni.

Nim : 60300114134.




DAFTAR GAMBAR

2.1	Morfologi <i>Aspergillus</i> sp.....	14
2.2	Kurva Pertumbuhan Mikroba.....	19
2.3	Reaksi Kima DPPH menjadi DPPH Stabil.....	26
4.1	Kurva Pertumbuhan Konsorsium I.....	41
4.2	pH Masa Pertumbuhan Konsorsium I.....	42
4.3	Kurva Pertumbuhan Konsorsium II.....	43
4.4	pH Masa Pertumbuhan Konsorsium II.....	44
4.5	Kurva Pertumbuhan Konsorsium III.....	45
4.6	pH Masa Pertumbuhan Konsorsium III.....	46
4.7	Kurva Pertumbuhan Konsorsium IV.....	47
4.8	pH Masa Pertumbuhan Konsorsium IV.....	48
4.9	Diagram IC ₅₀ Konsorsium Isolat dan Vitamin C.....	58



DAFTAR TABEL

2.1	Tingkat Kekuatan Antioksidan dengan Metode DPPH.....	26
4.1	Uji Antagonis Isolat Cendawan Endofit.....	37
4.2	% Hambat Konsorsium Ekstrak Filtrat.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Alur Penelitian.....	69
Lampiran 2 Hasil Uji Antagonis Isolat Cendawan Endofit.....	71
Lampiran 3 Skema Kerja Peremajaan.....	76
Lampiran 4 Hasil Kurva Pertumbuhan.....	73
Lampiran 5 Skema Kerja Media Fermentasi.....	77
Lampiran 6 Skema Kerja Fermentasi	78
Lampiran 7 Skema Kerja Ekstraksi.....	79
Lampiran 8 Uji Aktivitas Antioksidan.....	80
Lampiran 9 Perhitungan Konsentrasi DPPH.....	82
Lampiran 10 Perhitungan Seri Konsentrasi Ekstrak.....	82
Lampiran 11 Perhitungan Seri Konsentrasi Vitamin C.....	83
Lampiran 12 Bobot Ekstrak Filtrat.....	84
Lampiran 13 Perubahan Warna Uji DPPH	84
Lampiran 14 Perhitungan Konsentrasi Ekstrak Filtrat.....	86
Lampiran 15 Perhitungan Presen Hambat.....	89



ABSTRAK

Nama : Rahmat Yusni
NIM : 60300114134
Judul Skripsi : “*Aktivitas Antioksidan Konsorsium Isolat Cendawan Endofit Asal Kayu Secang (Caesalpinia sappan) dan Makroalga Eucheuma sp.*”

Cendawan endofit merupakan mikroba yang hidup dalam jaringan tanaman yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan metabolik sekunder yang sama dengan tanaman inang tanpa merugikan tanaman inangnya. Cendawan endofit telah diketahui menjadi sumber baru senyawa bioaktif dengan keanekaragaman yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aktivitas antioksidan dari hasil konsorsium isolat cendawan endofit dan kemudian diuji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (*1,1-Difenil Pikrilhidrazil*) untuk menentukan persen hambat.

Semua ekstrak filtrat konsorsium isolat cendawan endofit memiliki aktivitas antioksidan yaitu konsorsium I ekstrak filtrat hari ke-12 dengan IC_{50} 69,938 ppm (kuat), ekstrak filtrat hari ke-14 dengan IC_{50} 62,531 ppm (kuat). Konsorsium II ekstrak filtrat hari ke-12 nilai IC_{50} 53,172 ppm (kuat) ekstrak filtrat hari ke-14 nilai IC_{50} 58,656 ppm dan konsorsium III ekstrak filtrat hari ke-14 nilai IC_{50} 50,318 ppm (kuat) ekstrak filtrat hari ke-16 nilai IC_{50} 50,318 ppm (kuat), konsorsium IV ekstrak filtrat hari ke-10 dengan nilai IC_{50} 36,011 ppm (sangat kuat) dan ekstrak filtrat hari ke-12 dengan IC_{50} 47,807 ppm (sangat kuat). Semua variasi konsorsium isolat cendawan endofit berpotensi dilakukan konsorsium dan berpotensi sebagai antioksidan untuk meredam radikal bebas.

Kata Kunci : Konsorsium, *Aspergillus* sp. *Crhysosporium*, *Tricoderma* sp. DPPH. Ekstrak Filtrat

ABSTRACT

Name : Rahmat Yusni
NIM : 60300114134
Thesis Title : "Antioxidant Activity Consortium Isolate Fungus Endofit Origin of Secang Wood (Caesalpinia sappan) and Makroalga Euchema sp."

Endophytic fungus are microbes living in plant tissues that have the ability to produce the same secondary metabolism with host plants without harming their host plants. The endophytic fungus has been known to be a new source of bioactive compounds with high diversity. This study aims to determine the antioxidant activity of the consortium of endophytic fungi isolates and then tested antioxidant activity by DPPH method (1,1-Diphenyl Pikrilhidrazil) to determine percent of inhibition.

All extracts of consortium filtrate isolates of endophytic fungus have antioxidant activity ie consortium I extract of filtrate on day 12 with IC50 69,938 ppm (strong), extent filtrate day 14 with IC50 62,531 ppm (strong). Extra consortium II Extract filtrate day 12 IC50 value 53,172 ppm (strong) extract of filtrate 14th day IC50 value 58,656 ppm and consortium III extract filtrate day 14 IC50 value 50,318 ppm (strong) extent filtrate day 16 value IC50 50,318 ppm (strong), consortium IV extract of 10th day filtrate with IC50 value of 36,011 ppm (very strong) and extract of day-12 filtrate with IC50 47,807 ppm (very strong). All consortium variations of endophytic fungus isolates are potentially undertaken by the consortium and potentially as antioxidants to reduce free radicals.

Keywords: Consortium, Aspergillus sp. Crhysosporium, Tricoderma sp. DPPH. Filtrate Extract

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAL.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II	
TINJAUAN TEORITIS.....	9
A. Islam dan Mikroba.....	9
B. Tinjauan Tentang Mikroba Endofit.....	12
C. Tinjauan Tentang <i>Aspergillus</i> sp.....	13
D. Tinjauan Tentang <i>Crhysosporium</i>	15
E. Tinjauan Tentang <i>Tricoderma</i> sp.....	16
F. Tinjauan Kurva Pertumbuhan.....	18
G. Tinjauan Tentang Fermentasi.....	19
H. Tinjauan Tentang Ekstraksi.....	21
I. Tinjauan Tentang Radikal Bebas.....	22
J. Tinjauan Tentang Antioksidan.....	23
K. Tinjauan Tentang Uji Aktivitas Antioksidan.....	25
L. Tinjauan Tentang Spektrofotometer.....	27
M. Kerangka Pikir.....	28
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Variabel Penelitian.....	29
D. Definisi Operasional Variabel.....	30

	E. Instrumen Penelitian.....	30
	F. Prosedur Kerja.....	31
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
	A. Uji Antagonis Isolat Cendawan Endofit.....	37
	B. Kurva Pertumbuhan Konsorsium Cendawan Endofit.....	40
	C. Fermentasi dan Ekstraksi Konsorsium Isolat Cendawan Endofit.....	50
	D. Uji Antioksidan Ekstrak Filtrat Konsorsium Isolat Cendawan Endofit.....	52
	E. Perhitungan Persen Hambat Aktivitas Antioksidan Konsorsium Isolat Cendawan Endofit.....	55
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	62
	KEPUSTAKAAN.....	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
	DAFTAR RIFAYAT HIDUP.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mukjizat ilmu di dalam *al-Qur'an*, akan menarik dan selalu baru sepanjang zaman karena setiap kaum akan samapai kepadanya *al-Qur'an* ini, mereka bisa melihat isi kandungan dengan mata kepala mereka dan mendapatkan di dalam *al-Qur'an* tanda-tanda dan bukti-bukti yang menguatkan bagi mereka bahwa *al-Qur'an* berasal langsung dari Allah swt. Seperti segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah swt. menciptakan segala sesuatu tanpa manfaat segalanya diciptakan dengan manfaatnya masing-masing. Akan tetapi manfaat diciptakannya sesuatu itu tidak diketahui oleh semua manusia sehingga harus di pelajari terlebih dahulu. Sebagai mana firman Allah swt. dalam QS. surah *al-Baqarah/ 02:29* Surah Madaniyyah yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Maha Mengetahui segala Sesuatu (Kementrian Agama RI, 2012).

Menurut *Tafsir Ibnu Katsir Jilid Satu* (1988) menafsirkan bahwa dalam memanfaatkan benda-benda di bumi ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua cara yaitu: memanfaatkan benda-benda itu dalam kehidupan jasad untuk

memberikan potensi pada tubuh dan dengan memikirkan dan memperhatikan benda-benda yang tidak dapat diraih oleh tangan secara langsung, untuk digunakan sebagai bukti tentang kekuasaan penciptanya dan dijadikan santapan rohani. Dengan ayat ini kita mengetahui bahwa pada dasarnya memanfaatkan segala benda di bumi ini dibolehkan. Tidak seorangpun mempunyai hak mengharuskan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah swt. kecuali dengan izin-Nya.

Al Imam Jalaluddin dalam *Tafsir Al-Qura'an Jalalain* (2010) menafsirkan bahwa Allah-lah yang telah menciptakan bumi beserta isinya dan Allah swt. menciptakan langit, agar orang-orang memperoleh manfaat dan mengambil perbandingan darinya. Hanyalah Allah swt. yang mampu menciptakan itu mulai dari pertama. Allah swt. lebih besar dan lebih hebat daripada kamu (manusia), karena Allah swt. mampu menghidupkan kamu (manusia) kembali.

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas didukung oleh dua tafsir, dapat disimpulkan bahwa Allah swt. menciptakan segala sesuatu mempunyai manfaat seperti Allah swt menciptakan cendawan endofit yang dapat dijadikan sebagai obat antioksidan untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh.

Gaya hidup yang kurang baik seperti mengkonsumsi makanan cepat saji, mengkonsumsi makanan yang tinggi kadar lemak, polusi udara, asap rokok dan paparan sinar ultraviolet serta padatnya aktivitas (Suhaj, 2006). Dapat menyebabkan meningkatnya resiko terkena penyakit, akibat aktivitas zat-zat beracun yang menumpuk dalam tubuh salah satunya adalah radikal bebas.

Radikal bebas adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih elektron bebas tidak berpasangan sehingga mengikat elektron lain disekitarnya menyebabkan elektron dari radikal bebas menjadi sangat reaktif. Hal ini dapat menjadikan sel-sel sehat dalam tubuh mengalami kerusakan akibat kereaktifan radikal bebas tersebut. Jika tidak ada pertahanan dari dalam tubuh secara optimal, maka sel-sel menjadi tidak sehat dan terbentuknya suatu penyakit (Hernani dan Mono, 2006 dalam Chusnul, 2017).

Dampak radikal bebas dapat menurunkan imunitas tubuh (Percario, 2012, dalam Septiana dkk, 2017). Menyebabkan penyakit degeneratif seperti hipertensi, kardiovaskuler, diabetes mellitus, kanker dan gejala penuaan. Radikal bebas dapat menimbulkan perubahan DNA antara lain hidroksilasi timin dan sitosin, permukaan inti purin dan pirimidin, serta putusya rantai fosfodiester DNA. Perubahan DNA menimbulkan mutasi yang dapat menyebabkan kanker. Radikal bebas dapat merusak protein karena dapat bereaksi dengan asam amino sehingga protein kehilangan fungsi biologisnya (Sies, 1993 dalam Erawaty, 2012).

Radikal bebas beresiko bagi kesehatan manusia. Radikal bebas akan menyebabkan timbulnya reaksi berantai yang dapat merusak makromolekul pembentuk sel, sehingga sel menjadi rusak, mati atau bermutasi (Sukiman, 2010). Radikal bebas berlangsung didalam tubuh melalui reaksi oksidasi. Pembentukan radikal bebas dalam proses biologis tubuh terjadi secara alami oleh karena itu tidak dapat dihindari (Lingga, 2012).

Proses reaksi berantai tersebut dapat dihambat oleh senyawa antioksidan yang bersifat menetralkan radikal bebas, senyawa antioksidan yang sumbernya

bisa di dapatkan melalui antioksidan sintetis (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia) dan antioksidan alami adalah antioksidan yang diperoleh secara alami yang sudah ada dalam bahan pangan, baik yang terbentuk selama dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan maupun yang diisolasi dari sumber alami.

Antioksidan adalah senyawa kimia yang memiliki elektron bebas dan dapat memberikan elektron (*electron donors*) kepada senyawa yang bersifat oksidasi (radikal bebas) sehingga aktivitas senyawa oksidasi tersebut bisa dihambat. Antioksidan dapat menetralkan radikal bebas (*free radical scavenger*), sehingga atom-atom molekul yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan dapat berpasangan dan menjadi stabil (Strobel, 2004 dalam Sukiman, 2010). Pada kadar atau jumlah tertentu antioksidan dapat menghambat atau memperkecil kerusakan akibat proses oksidasi sehingga kerusakan sel-sel dapat dicegah. Reaksi oksidasi dengan radikal bebas sering terjadi pada molekul protein, asam nukleat dan polisakarida (Sayuti dan Rina, 2015 dalam Chusnul, 2017). Penggunaan antioksidan sintetis untuk mencegah kerusakan akibat radikal bebas telah dilaporkan dapat menimbulkan efek samping yang toksik sehingga perlu dilakukan pencarian sumber antioksidan baru dari alam (Septiana, dkk 2017).

Sumber senyawa antioksidan bioaktif yang dewasa ini menjadi populer adalah yang berasal dari mikroba. Salah satu mikroba penghasil senyawa bioaktif adalah cendawan endofit yang merupakan cendawan yang tumbuh dan mengkolonisasi di jaringan tumbuhan (inang) terutama di bagian akar, batang dan daun. Cendawan endofit dapat menghasilkan senyawa-senyawa bioaktif dan

metabolit sekunder yang sama dengan inangnya. Hal ini diduga karena cendawan endofit mengalami koevolusi transfer genetik dari inangnya. Kemampuan mikroba endofit dalam menghasilkan senyawa bioaktif merupakan hal yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obat herbal. Hal ini karena mikroba endofit merupakan mikroorganisme yang mudah ditumbuhkan, memiliki siklus hidup yang pendek dan dapat menghasilkan jumlah senyawa bioaktif dalam jumlah besar dengan metode fermentasi.

Penelitian sebelumnya telah berhasil mengisolasi cendawan endofit sebagai sumber antioksidan alami yaitu cendawan endofit *Aspergillus* sp. asal makroalga *Eucheuma* sp. dengan IC_{50} 38,64 ppm dengan cendawan endofit *Crhysosporium* dengan daya hamabat lemah IC_{50} 219,25 ppm dan *Tricoderma* sp. dengan daya hambat sangat kuat dengan nilai IC_{50} 46,354 ppm asal kayu Secang (*Caesalpinia sappan*). Hal ini perlu dikembangkan lagi dengan cara konsorsium kultur isolat untuk melihat pengaruh aktivitas antioksidan cendawan endofit apabila di lakukan konsorsium oleh karena itu dilakukanlah penelitian dengan judul “**Aktivitas Antioksidan Konsorsium Isolat Cendawan Endofit Asal Kayu Secang (*Casalpinia sappan*) dan *Eucheuma* sp.**” Penelitian ini dilakukan untuk menentukan aktivitas antioksidan dari hasil konsorsium tiga isolat cendawan endofit dan kemudian diuji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (*1,1-Difenil Pikrilhidrazil*) untuk menentukan persen hambat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh aktivitas antioksidan hasil bioproduksi konsorsium isolat cendawan endofit asal kayu secang (*Caesalpinia sappan*) dan makroalga *Eucheuma* sp.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

1. Isolat cendawan endofit *Aspergillus* sp. asal makroalga *Eucheuma* sp. dan cendawan endofit *Crhysosporium* dan *Tricoderma* sp. asal tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan*) merupakan koleksi Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Tiga cendawan endofit tersebut dilakukan bioproduksi konsorsium dua dan tiga menghasilkan empat variasi yaitu : Konsorsium I *Aspergillus* sp. dengan *Crhysosporium* dan *Tricoderma* sp. Konsorsium II *Aspergillus* sp. dengan *Tricoderma* sp., Konsorsium III *Aspergillus* sp. dengan *Crhysosporium*, dan Konsorsium IV *Crhysosporium* dan *Tricoderma* sp.
3. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 02 Maret 2018 samapi 19 Mei 2018 di Laboratorium Mikrobiologi, di Laboratorium Ekologi Jurusan Biologi, di Labolatorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia dan Labolatorium Biofarmasi Jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, di bandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Arum Suci (2017) "*Identifikasi Senyawa Aktif Antioksidan Hail Bioproduksi Kombinasi Tiga Isolat Kapang Endofit dari Tanaman Kunyit (Curcuma loga L.,)*" Berdasarka hasil penelitian menunjukan bahwa filtrat hasil fermentasi kombinasi K.Cl.Sb.R11: K.Cl.Sb.B1; dan K.Cl.Cb.U1 memiliki aktivitas antioksidan tertinggi dengan nilai % hambat 69,610% pada konsentrasi 100 bpj dengan IC₅₀ sebesar 46,122 bpj.
2. Inna Shintia (2017) "*Uji Aktivitas Antioksidan Kapang Endofit Makroalga Eucheuma sp*". Hasil identifikasi menunjukkan bahwa isolat kapang endofit makroalga *Eucheuma sp*. Adalah *Aspergillus sp*. diperoleh IC₅₀ sebesar 38,64 ppm dan dikatakan kuat dalam meredam radikal bebas. Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai IC₅₀ berarti semakin tinggi aktivitas antioksidan.
3. Wulandari (2017) "*Uji aktivitas antioksidan kapang endofit asal tanaman kayu secang (Caesalpinia sappan. L)*" Hasil uji aktivitas antioksidan ditemukan kapang endofit *Trichoderma sp*. merupakan antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC₅₀ 46,354, *Curvularia sp*. dengan persen hambat IC₅₀ sebesar 91,926 antioksidan kuat, Sedangkan *chrysosporiu*, *Penicillium sp*. dan *Geottrichum candidum* merupakan antioksidan yang lemah dengan nilai IC₅₀ lebih dari 100-150.

4. Muharni, dkk (2014), “*Aktivitas Antioksidan Di-(2-Etilheksil) filtrat dari mikroba endofit Penicillium sp Curcuma zedoaria (Brg.) Roscoe*”, Hasil penelitian menunjukkan senyawa memberikan aktivitas antioksidan dengan IC_{50} 195,07 $\mu\text{g/mL}$ sedangkan standar Vitamin C memberikan nilai IC_{50} 6,06 $\mu\text{g/mL}$. Senyawa yang memiliki nilai $IC_{50} > 100 \mu\text{g/mL}$ di kategorikan tidak aktif. Berdasarkan data ini maka disimpulkan senyawa hasil isolasi di-(2-etilheksil) filtrat tidak bersifat aktif antioksidan.
5. Eris dkk (2017) “*Potensi Ekstrak Kapang Endofit Asal Rimpang Kunyit sebagai Antimalaria san Antioksidan*”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 18 isolat kapang endofit memiliki aktivitas antimalaria dan satu isolat tidak aktif serta seluruh isolat memiliki aktivitas antioksidan. Isolat Smi.Cl.6F merupakan isolat yang paling aktif pada uji aktivitas antimalaria dan antioksidan dengan nilai IC_{50} masing-masing uji sebesar 1,93 mg/mL dan 32,28 mg/L. Oleh karena itu isolat Smi.Cl.6F berpotensi digunakan sebagai obat antimalaria baru.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persen hambat aktivitas antioksidan hasil bioproduksi konsorsium isolat cendawan endofit asal kayu secang (*Ceasalpinia sappan*) dengan makroalga *Eucheuma* sp.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai informasi ilmu mengenai aktivitas antioksidan konsorsium tiga cendawan endofit dan sebagai bahan rujukan untuk dijadikan sediaan obat.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Islam dan Mikroba

1. Ayat Tentang Mikroba

Istilah *zarrah* sebagai wujud zat atau substansi materi yang paling kecil yang disebutkan dalam *al-Qur'an* merupakan petunjuk untuk mempelajari mikroorganisme dan materi mikrosom lainnya. Konsep sel sebagai materi fungsional terkecil ternyata dapat dipatahkan oleh adanya mikroorganisme. Mikroorganisme sebagai organisme sel tunggal merupakan bukti adanya materi fungsional di bawah sel. Itulah materi *zarrah*, *al-Qur'an* menunjuk pada konsep *zarrah* sebagai materi terkecil, dengan demikian masih ada substansi potensial dalam suatu zat yang lebih kecil dari sel.

Selain itu, adanya makhluk kecil seperti mikroba juga disebutkan dalam QS.

al-Baqarah/2 : 26 Surah Madaniyyah yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا
أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan

Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik (Kementrian Agama RI, 2012).

Bahwa kata (yang lebih rendah dari itu), menunjukkan bahwa Allah swt. kuasa untuk menciptakan apa saja, yaitu penciptaan apapun dengan obyek apa saja, baik yang besar maupun yang lebih kecil. Allah swt tidak pernah menganggap remeh sesuatu pun yang Dia ciptakan meskipun hal itu kecil. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dalam perumpamaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah swt. memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana Allah swt menciptakan mikroorganisme seperti kapang endofit meskipun memiliki ukuran yang sangat kecil tetapi keberadaannya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan (Tafsir Al'Quran Tematik 2009).

2. Ayat Tentang Penyakit

Dalam bahasa Arab kata sehat diungkapkan dengan kata *as-sihhah* atau yang seakar dengannya yaitu keadaan baik, bebas dari penyakit dan kekurangan serta dalam keadaan normal. Kata ini dan yang seakar dengannya tidak ditemukan dalam *al-Qur'an*. Kendati *al-Qur'an* bukanlah buku kesehatan, tetapi tidaklah sulit untuk menemukan petunjuk tentang kesehatan, sebab bagi seorang muslim *al-Qur'an* adalah tuntutan dan acuan dalam menjalankan kehidupan.

Seperti firman Allah swt dalam Q.S al-Isra/17: 82 Surah Makkiyyah yang berbunyi :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Terjemahnya :

Dan Kami turunkan dari *al-Quran* suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan *al-Quran* itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian (Kementrian Agama Ri, 2012).

Al-Qur'an sebagai sesuatu yang menjadi obat penawar (*syifa*) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kendati mayoritas ulama tafsir memahami kata *syifa* pada ayat di atas sebagai obat penawar dari segala bentuk penyakit hati seperti *syirik*, keraguan, *nifaq* dan lainnya. Tetapi sejumlah hadis Raul menjelaskan bahwa *Al-Qur'an* dapat menjadi bacaan menyembuhkan (*ruqyah*) bagi sejumlah penyakit fisik. Selain menyebut dirinya sebagai obat, *al-Quran* banyak memberikan tuntutan agar hidup sehat, baik fisik, mental, sosial dan spiritual. Tuntutan itu ada yang dalam bentuk pemeliharaan dan ada yang dalam bentuk pencegahan (Tafsir *Al'Quran* Tematik, 2009).

Nabi Muhammad saw, bersabda segala penyakit merupakan kuasa dari Allah swt. adalah Dzat yang maha adil dan bijaksana dalam segala hal, tidak terkecuali Dia menurunkan penyakit sekaligus menurunkan pula obatnya. Seperti dalam Hadis Riwayat Muslim :

لَكِنَّ دَاءَ دَوَاءٍ، فَإِذَا أَصَابَ الدُّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

Dari Jabir bin 'Abdullah radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "setiap penyakit pasti memiliki obat. Bela sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanah wa Ta'ala" (HR. Muslim).

Ibnu Qayyim Al Jauziyah (1994) menyatakan bahwa setiap penyakit pasti akan ada obatnya adalah bersifat umum, mencakup segala penyakit dan segala macam obat yang dapat menyembuhkan penderitaan, karena sesungguhnya Allah swt. telah menyiapkan segala macam obat penyakit baik penyakit ringan maupun penyakit berat, contohnya adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas.

Berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad saw. dalam hadis riwayat Muslim diatas, penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas seperti penyakit degeneratif karena radikal bebas dapat merubah susunan protein DNA pasti ada obatnya salah satu karunia yang diturunkan oleh Allah swt adalah cendawan endofit dan tugas kita sebagai peneliti muslim adalah mengembangkan ilmu pengetahuan agar penyakit yang diakibatkan radikal bebas dapat dicari solusinya.

B. Tinjauan Tentang Mikroba Endofit

Mikroba endofit adalah mikroba yang hidup di dalam jaringan tanaman pada periode tertentu dan dalam siklus hidupnya dapat membentuk koloni tanpa membahayakan tumbuhan inangnya (Hallmann, *et al.*, 1997 dalam Septiana dan Simanjuntak. 2016). Mikroba endofit memiliki kemampuan yang sama dengan inangnya dan mampu menghasilkan senyawa khusus, seperti metabolit sekunder,

untuk melindungi inangnya dari serangan hama dan penyakit (Taechowisan, *et al.*, 2005. dalam Septiana dan Simanjuntak. 2016). Salah satu mikroba endofit yang banyak dimanfaatkan ialah cendawan endofit. Beberapa manfaat cendawan endofit diantaranya sebagai antibiotik, antivirus, antikanker, antioksidan, antidiabetes, immunosupresif dan insektisida (Strobel,&Daisy, 2003, dalam Septiana dan Simanjuntak. 2016).

Mikroba endofit diisolasi dari jaringan tumbuhan dapat ditumbuhkan pada medium tumbuh artifisial. Di dalam medium tersebut mikroba endofit akan menghasilkan metabolit yang hampir sama dengan senyawa aktif yang berasal dari tumbuhan inangnya (Strobel *et al* 1998. Dalam Sukima, 2010).


Beberapa peneliti telah berhasil mengisolasi mikroba endofit dari tumbuhan inangnya, membiakkan mikroba endofit tersebut kedalam media sintetik dan menghasilkan metabolit sekunder yang sesuai dengan kandungan kimia di dalam tumbuhan inangnya tersebut. Strobel dan kawan-kawan yang berhasil mengisolasi mikroba kapang *Taxomyces andreana* dari tumbuhan *Taxus brevifolia*, kemudian membiakkan *in vitro* dan dapat memproduksi senyawa kimia diterpen taksol (Rajia, 2008). Simanjuntak, dkk. (2011) berhasil mengisolasi beberapa mikroba dari tumbuhan *Cinchona* sp. Skrining dan identifikasi hasil fermentasi dalam media sintetik menunjukkan bahwa mikroba endofit tersebut dapat menghasilkan senyawa alkaloid kuinina. Hasil ini menunjukkan bahwa peranan mikroba endofit untuk memproduksi senyawa metabolit sesuai dengan tumbuhan inangnya dapat

diandalkan untuk dilanjutkan dalam produksi skala industri (Edwar dan Simanjuntak, 2015).

C. Tinjauan Tentang Aspergillus sp.

Aspergillus sp. termasuk dalam mikroorganisme eukariotik. *Aspergillus sp.* memiliki ciri mikroskopis, konidiofor tegak, sederhana, ujung bulat, memancar dari ujung atau seluruh permukaan konidia bulat, sering berwarna warni, sebagai hifa bersepta dan bercabang, konidiofor muncul di *foot cell* (miselium yang bengkak dan berdinding tebal) membawa stigma dan akan tumbuh konidia yang membentuk rantai berwarna hijau, cokelat atau hitam (Srikandace, 2015).

Aspergillus sp. adalah kapang endofit yang hidup dalam jaringan tumbuhan, hewan, dan biota laut yang mampu menghasilkan bioaktif metabolit primer (karbohidrat, protein, dan lemak), dan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai bahan obat dan pangan. Metabolit primer kapang endofit yang dapat dijadikan sebagai bahan obat atau pangan ini adalah polisakarida, dinding sel *Aspergillus sp.* banyak mengandung polisakarida yang memberikan struktur pada sel (Gandjar, dkk 2006).



Spesies-spesies *Aspergillus* sp. dapat menghasilkan mikotoksin yang disebut alfatoksin. Dalam pembentukan mikotoksin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan (substrat, kelembaban, suhu, pH) dan lamanya kontak antara jamur dengan substrat. Mikotoksin diidentifikasi sebagai zat yang diproduksi oleh jamur dalam bahan makanan, dan bersifat tahan terdapat panas, sehingga dengan pengolahan, pemasaran tidak menjamin berkurangnya aktivitas toksin tersebut (Srikandi F., 1992, dalam Shintia, 2017).

Adapun klasifikasi *Aspergillus* sp. Adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Fungi
Filum	: Ascomycota
Classis	: Eurotiomycetes
Ordo	: Eurotiales
Familia	: Trichomaceae
Genus	: <i>Aspergillus</i>
Spesies	: <i>Aspergillus</i> sp. (Barnett dan Hunter, 1998).

D. Tinjauan Tentang Crhysosporium

Chrysosporium sp. adalah mikroorganisme bersel banyak atau multiseluler hidup secara aerobik, nonfotosintetik kemoheterotrof dan termasuk eukariotik. Mikroba ini menggunakan senyawa organik sebagai substrat dan bereproduksi secara aseksual dengan spora. Kebutuhan metabolisme mereka sama seperti bakteri, namun

membutuhkan lebih sedikit nitrogen serta dapat tumbuh dan berkembang biak pada pH rendah (Dini, 2010 dalam Latifa, 2017). Cendawan *chryso sporium* sp. sebagai inokulum fermentasi sudah banyak dilakukan karena pertumbuhannya relatif mudah dan cepat, dan kadar asam nukleatnya rendah, sehingga *chryso sporium* sp dikatakan cendawan endofit. (Scherllart, 1975 dalam Iriani, 2003 dalam Latifa, 2017).

Cendawan *chryso sporium* sp. memiliki ciri fisik yang berserabut seperti kapas dan berwarna putih serta memiliki spora dan talus bercabang yang disebut hifa. Kumpulan dari hifa disebut miselium (Fardiaz, 1989). Miselium *chryso sporium* sp. mempunyai tiga fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif, seksual dan aseksual. Fase vegetatif merupakan fase pertumbuhan dominan. Selama fase ini jamur paling banyak menghasilkan enzim ekstraselular. Tubuh buah jamur secara alami mulai terbentuk pada hari ke 18-20. Tubuh buah basah dan lembut, berwarna putih kekuningan (Siegel, 1987). Filamen dari *chryso sporium* sp. lebih sering digunakan untuk penerapan dalam bidang bioteknologi daripada tahap sporanya (Siegel, 987).

Adapun klasifikasi *Chryso sporium* sp. sebagai berikut:

Kingdom	: Fungi
Divisi	: Ascomycota
Classis	: Basidiomycetes
Ordo	: Aphylophorales
Familia	: Certiciaceae
Genus	: Chryso sporium
Spesies	: <i>Chryso sporium</i> sp. (Barnett dan Hanter, 1972).

E. Tinjauan Tentang Trichoderma sp.

Trichoderma sp. adalah salah satu cendawan tanah yang tersebar luas (kosmopolitan), yang hampir dapat ditemui di lahan-lahan pertanian dan perkebunan. *Trichoderma* bersifat saprofit pada tanah, kayu, dan beberapa jenis bersifat parasit pada jamur lain. *Trichoderma* sp. merupakan jenis yang paling banyak dijumpai diantara genusnya dan mempunyai kelimpahan yang tinggi pada tanah dan bahan yang mengalami dekomposisi. Pada spesies saprofit, cendawan tumbuh pada kisaran suhu optimal 22-30°C (Suharna dan Widyastutik, 1996).

Hampir seluruh jenis *Trichoderma* sp. dapat menghasilkan senyawa volatil yang dapat menghalangi pertumbuhan mikroorganisme lain. Selain itu, *Trichoderma* sp. juga menghasilkan antibiotik lain, seperti, asam *harzianik*, *alamethicin*, *tricholin*, *peptaibols*, *viridin*, *glicoviridin*, *glicosoprenin*, dan asam *heptelitic*. Mikoparasitisme merupakan kemampuan suatu jamur untuk menyerang langsung pada jamur lainnya (Suharna dan Widyastutik 1996).

Adapun Klasifikasi cendawan *Trichoderma* sp. adalah sebagai berikut :

Kingdom	: Fungi
Divisio	: Ascomycetes
Classis	: Deuteromycetes
Ordo	: Moniliales
Famila	: Moniliaceae
Genus	: <i>Trichoderma</i>
Species	: <i>Trichoderma</i> sp. (Barnett dan Hanter, 1972).

F. Tinjauan Kurva Pertumbuhan

Cendawan endofit adalah mikroba yang hidup di dalam jaringan tanaman pada periode tertentu dan mampu hidup dengan membentuk koloni dalam jaringan tanaman tanpa membahayakan inangnya (Radji, 2008).

Fase-fase pertumbuhan cendawan terdiri dari empat fase (Kumala, 2014), yaitu:

a. Fase Adaptasi (Lag)

Fase adaptasi atau yang disebut dengan fase lag berlangsung setelah dilakukan inokulasi pada medium nutrisi, merupakan fase penyesuaian dari mikroorganisme terhadap lingkungan baru baik pH maupun nutrisi yang terkandung dalam media fermentasi.

b. Fase Eksponensial (Log)


Fase log disebut juga fase pertumbuhan eksponensial atau pertumbuhan cepat, merupakan fase ketika mikroba aktif membelah pada kecepatan maksimum, dan mikroba sudah memanfaatkan nutrisi yang terkandung dalam media dengan ditandainya pertumbuhan mikroba.

c. Fase Stasioner

Pada fase stasioner, terjadi keseimbangan antara jumlah sel membelah dengan jumlah sel yang mati. Penyebab berhentinya pertumbuhan eksponensial adalah kekurangan nutrisi, akumulasi produk sisa, dan perubahan pH yang bersifat toksik bagi sel.

d. Fase Kematian

Jumlah sel yang mati meningkat. Faktor penyebabnya adalah ketidaktersediaan nutrisi dan akumulasi produk buangan toksik sehingga menyebabkan matinya sel mikroba.



Gambar, 2.2 Gambar 7. Kurva pertumbuhan mikroba endofit (Radji, 2005).

G. Tinjauan Tentang Fermentasi

Fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bahan yang berkualitas rendah serta berfungsi sebagai pengawet bahan dan merupakan suatu cara untuk menghilangkan zat antinutrisi atau racun yang terkandung dalam bahan makanan.

Fermentasi secara umum dibagi menjadi dua yaitu fermentasi media cair *liquid state fermentation* (LSF), dan fermentasi media padat *solid state fermentation* (SSF), fermentasi media cair diartikan sebagai fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel (Satiawihajar, 1992) atau substrat

baik sumber karbon maupun mineral terlarut atau tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair (Putri, 2016).

Jenis fermentasi media cair yang dilakukan adalah fermentasi yang diagitasi dimana substrat larut dalam air jenis fermentasi ini dikerjakan dalam suatu labu atau gelas yang cocok atau yang lebih modern dengan menggunakan fermentor dimana substratnya larut sempurna dalam air. Pengambilan substrat oleh mikroba melalui fase larut dalam air. Pada kultur labu yang dikocok, agitasi yang dilakukan dengan bantuan alat pengocok (*shaker*). Pada fermentor agitasi dikerjakan dengan pengaduk yang dijalankan oleh motor dan dapat dibantu oleh aerasi (gelembung udara) (Wijaya, 2014).

Hasil yang diperoleh pada fermentasi sebagai akibat metabolisme mikroba-mikroba pada suatu bahan pangan dalam keadaan anaerob. Mikroba yang melakukan fermentasi membutuhkan energi yang umumnya diperoleh dari glukosa. Mikroba dapat mengubah glukosa menjadi air, CO₂ dan energi (ATP) dalam keadaan aerob. Beberapa mikroba hanya dapat melangsungkan metabolisme dalam keadaan anaerob dan hasilnya adalah substrat yang setengah terurai. Hasil penguraian adalah air, CO₂, energi dan sejumlah asam organik lainnya, seperti asam laktat, asam asetat, etanol serta bahan-bahan organik yang mudah menguap (Rahman, 1990 dalam Shintia, 2017).

Media fermentasi yang digunakan adalah *Potato Dextrose Broth* (PDB), umumnya digunakan untuk menumbuhkan kapang (*molds*) dan khmir (*yeast*) *Potato Dextrose Broth* (PDB) memiliki formula yang sama dengan PDA, tetapi agarnya

dihilangkan. Harapan penggunaan *Potato Dextrose Broth* (PDB) pada lingkungan dan temperatur yang ditentukan dapat tumbuh selama 2-20 hari (LIPI, 2017).

H. Tinjauan Tentang Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi standar baku yang telah ditetapkan (Suroya, 2016).

Ekstraksi merupakan isolasi senyawa yang terdapat dalam larutan atau padatan dengan menggunakan pelarut yang cocok. Prinsip ekstraksi adalah melarutkan komponen senyawa yang berada dalam campuran secara selektif dengan pelarut yang sesuai. Hasil dari proses ekstraksi disebut ekstrak. Ekstraksi dapat dilakukan dengan pelarut organik terhadap bahan segar atau bahan yang telah dikeringkan. Berdasarkan energi yang digunakan, ekstraksi dibedakan menjadi dua cara, yaitu cara dingin dan cara panas. Hal yang harus diperhatikan pada proses ekstraksi adalah kestabilan dari senyawa yang diisolasi. Agar senyawa tersebut tidak rusak, sedangkan senyawa yang tahan panas dapat diekstraksi dengan cara panas (Dinas Kesehatan Republik Indonesia, 2000).

Masrasi (ekstraksi padat cair) menurut Depkes 2000 masrasi adalah proses penyaringan sampel bahan alam dengan suatu pelarut yang sesuai dengan cara

direndam pada suatu wadah atau bejana dan dilakukan pada suhu kamar dengan sesekali pengadukan, prinsip metode masrasi yaitu pencapaian konsentrasi pada kesetimbangan. Cara ini cukup sederhana hanya saja membutuhkan jumlah pelarut yang banyak (Dinas Kesehatan Republik Indonesia, 2000).

Partisi (ekstraksi cair cair) ekstraksi cair-cair merupakan suatu metode pemisahan senyawa berdasarkan partisi dengan menggunakan tingkat kepolaran pelarut mulai dari pelarut non polar, semi polar dan pelarut polar. Berdasarkan hukum partisi menurut *Nerst*, suatu sistem pemisahan mencapai kesetimbangan maka nisbah (ratio) konsentrasi (aktivitas) setiap komponen (larutan) di dalam kedua fase menjadi tetap dan dapat dinyatakan sebagai tetapan kesetimbangan (koefisien distribusi/partisi). Jika diinginkan pemisahan yang cukup memadai proses tersebut harus dilakukan beberapa kali. Setelah penyaringan pertama setiap fase dapat keseimbangan lebih lanjut dengan pelarut segar. Dengan pengulangan yang sistematis dari berbagai fraksi antara, pemisahan yang memuaskan dapat dicapai (Dinas Kesehatan Republik Indonesia, 2000).

I. Tinjauan Tentang Radikal Bebas

Dalam kadar normal, radikal bebas bekerja melindungi jaringan tubuh yang sehat dari kerusakan. Sebaliknya, jika berlebihan, maka akan menjadi molekul pemangsa yang bergerak liar menyerang bagian tubuh yang sehat menjadi rusak, serta membinasakan jaringan yang telah rusak tersebut hingga mendorong berlangsungnya kematian sel secara biologis. Pengaruh radikal bebas terhadap tubuh

sulit terdeteksi namun secara perlahan, tetapi menimbulkan dampak yang luas terhadap kesehatan. Inilah awal mula terjadinya penyakit menyerang tubuh (Syahir, 2017).

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan sehingga memiliki sifat tidak stabil, paramagnetik dan sangat reaktif. Sifat radikal bebas mirip dengan suatu oksidan yang mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron. Radikal bebas dapat menimbulkan perubahan DNA antara lain hidrosilasi timin dan sitosin, permukaan inti purin dan pirimidin, serta putusya rantai fosfodiester DNA. Perubahan DNA menimbulkan mutasi yang dapat menyebabkan kanker. Radikal bebas dapat merusak protein karena dapat bereaksi dengan asam amino sehingga protein kehilangan fungsi biologisnya (Sies, 1993; Erawaty, 2012 dalam Edwar dkk, 2015).

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di orbit luarnya. Radikal bebas dapat timbul dari proses metabolisme dalam tubuh dan dapat juga berasal dari lingkungan, seperti pencemaran udara, bahan kimia dari makanan dan air, alkohol, rokok, radiasi UV dan sebagainya (Wibowo, 2015).

J. Tinjauan Tentang Antioksidan

Antioksidan merupakan zat yang dapat melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas. Antioksidan adalah senyawa yang bekerja dengan cara memberikan satu atau lebih atom hidrogen atau elektron kepada senyawa lain yang bersifat

oksidan untuk menghambat aktivitas oksidasinya sehingga senyawa radikal bebas dapat lebih stabil (Sashikumar, dkk., 2009). Antioksidan merupakan zat yang dapat menetralkan radikal bebas (*free radical scavenger*), sehingga atom-atom molekul yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan dapat berpasangan dan menjadi stabil (Strobel, 2004 dalam Sukiman, 2010). Antioksidan ini berfungsi untuk mencegah kerusakan oksidasi pada kulit sehingga penuaan dini dapat teratasi (Praksah., 2001).

Senyawa antioksidan dapat menetralkan radikal bebas yang ditemukan didalam tubuh, senyawa yang ditemukan seperti enzim SOD (*Superoksida Dismutase*), *Gluthatione*, dan *Katalase*. Sumber lain antioksidan juga dapat diperoleh dari asupan makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E, dan betakarotin serta senyawa fenolik. Bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan alami, seperti rempah-rempah, coklat, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran seperti buah tomat, papaya, jeruk dan sebagainya (Prakash, 2001).

Menurut sumbernya, antioksidan terbagi menjadi dua, yaitu antioksidan alami dan sintetik. Contoh antioksidan sintetik adalah *Butil Hidroksi Toluena* (BHT) dan *Butil Hidroksi Anisol* (BHA). Namun, penggunaan antioksidan sintetik dikhawatirkan dapat bersifat karsinogenik dan toksik dalam dosis yang tinggi (Fosoyiro., dkk 2006 dalam Praditasari., 2016). Hal ini yang membuat antioksidan alami mulai dikembangkan. Penentuan senyawa dalam ekstrak tanaman yang dapat digunakan sebagai antioksidan dilakukan dengan uji aktivitas antioksidan (Praditasari., 2016).

Penggunaan antioksidan sintetis untuk mencegah kerusakan akibat radikal bebas telah dilaporkan dapat menimbulkan efek samping yang toksik sehingga perlu dilakukan pencarian sumber antioksidan baru dari alam, salah satu bahan alam yang banyak dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan tinggi ialah senyawa golongan polifenolik yang dapat ditemukan sebagai senyawa metabolit sekunder dari cendawan endofit (Septiana, dkk. 2017).


K. Tinjauan Tentang Uji Aktivitas Antioksidan

Radikal DPPH adalah suatu senyawa organik yang mengandung nitrogen tidak stabil dengan perubahan tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer dan digunakan konsentrasi bervariasi menyebabkan penurunan intensitas warna akibat berkurangnya ikatan rangkap terkonjugasi pada DPPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya penangkapan satu elektron oleh zat antioksidan, menyebabkan tidak adanya kesempatan elektron tersebut untuk beresonansi (Sayuti & Rina, 2015).

Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode peredaman radikal bebas dengan reagen 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) karena cepat, sederhana dan mudah digunakan (Tiwari, dkk., 2006 dalam) dengan modifikasi pada panjang gelombang 517 nm hanya untuk isolat yang memiliki aktivitas antioksidan yang terlihat pada spektroskopotometer, DPPH memberikan penyerapan kuat di 517 nm karena ganjilnya elektron. Sebagai elektron yang tidak berpasangan radikal ini dipasangkan dengan adanya penangkapan radikal bebas, ketika penyerapan berkurang dan larutan DPPH diturunkan maka warna berubah dari ungu tua ke

kuning muda dan yang dihasilkan sehubungan dengan jumlah elektron yang ditangkap (Blois, 1958 dalam Srujana, 2017 dalam Shintia, 2017).

Metode peredaman radikal bebas DPPH didasarkan pada reduksi dari larutan metanol radikal bebas DPPH yang berwarna oleh penghambatan radikal bebas. Ketika larutan DPPH yang berwarna ungu berikatan dengan pemberi elektron maka DPPH akan tereduksi menjadi DPPH-H (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazin*), menyebabkan warna ungu berubah menjadi warna kuning yang berasal dari gugus pikril (Prayoga, 2013). Reaksi reduksi DPPH tersebut dapat dilihat pada reaksi berikut:



Gambar 2.3 Reaksi kimia DPPH Radikal dengan Antioksidan menjadi DPPH stabil (Hindawi.com., 2017).

Menurut Blois (1958), tingkat aktivitas antioksidan senyawa uji menggunakan DPPH dapat digolongkan menurut IC_{50} . Semakin kecil nilai IC_{50} semakin tinggi aktivitas antioksidan yang terlihat dalam Tabel 2.1

Intensitas	Nilai IC_{50}
Sangat Kuat	< 50 ppm
Kuat	50-100 ppm
Sedang	101-150 ppm
Lemah	> 150 ppm

Tabel 2.1 Tingkat kekuatan antioksidan dengan metode DPPH.

L. Tinjauan Tentang Spektrofotometer

Spektrofotometri merupakan metode analisis secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada absorpsi radiasi elektromagnetik. Absorpsi radiasi oleh suatu sampel diukur pada berbagai panjang gelombang dan dialirkan oleh suatu perekam untuk menghasilkan spektrum tertentu yang khas untuk komponen yang berbeda (Khopkar, 2003).


Spektrofotometri UV-Vis adalah suatu metode yang digunakan untuk menetapkan serapan pada pengukuran di daerah ultraviolet dan cahaya monokromatik. Absorpsi sinar tampak (VIS) atau Ultraviolet (UV) oleh suatu molekul dapat menyebabkan terjadinya eksitasi molekul tersebut dari tingkat energi dasar (*ground state*) ke tingkat eksitasi (*excited state*). Absorpsi sinar UV dan VIS oleh suatu molekul, umumnya menghasilkan eksitasi ikatan elektron (*bonding*), sehingga panjang gelombang absorban maksimum dapat dikorelasikan dengan absorban UV dan VIS (penting penggunaannya) untuk penentuan kuantitatif senyawa-senyawa yang mengandung gugus penyerap (Bintang., 2010).

Panjang gelombang pada daerah ultraviolet (200-400 nm) atau daerah sinar tampak (400-800 nm). Biasanya cahaya terlihat merupakan campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang gelombang (λ), dari 400-800 nm (Tahir, 2008).

Kegunaan utama Spektrometri UV tampak adalah untuk identifikasi jumlah ikatan rangkap atau konjugasi aromatik. Misalnya untuk membedakan diena

terkonjugasi dan tidak, diena konjugasi dan triena terkonjugasi dan sebagainya.
(Panji, 2012).

M. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental yaitu untuk mendapatkan hasil persen hambatan antioksidan konsorsium tiga kultur isolat cendawan endofit.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu bertempat di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Laboratorium Ekologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Laboratorium Biofarmasi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 02-Maret-2018 sampai 19-Mei- 2018.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat yaitu konsorsium tiga isolat cendawan endofit dan variabel bebas yaitu persen hambat antioksidan konsorsium tiga isolat cendawan endofit.

D. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Uji antioksidan adalah konsorsium kultur isolat cendawan endofit yang telah dilakukan sebelumnya dan didapatkan cendawan endofit *Aspergillus* sp. asal makroalga *Eucheuma* sp. dengan *Crhysosporium* dan *Tricoderma* sp. asal kayu secang (*Caesalpinia sappan*). Dengan metode peredaman radikal bebas DPPH (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazil*).
2. Cendawan endofit adalah mikroba endofit yang hidup dalam jaringan tanaman yang berhasil diisolasi dari penelitian sebelumnya.
3. Konsorsium cendawan endofit adalah penggabungan isolat cendawan endofit pada media fermentasi.

E. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain oven, autoklaf, lemari es, sendok, botol pengenceran, cawan petri, inkubator, labu erlenmeyer, gelas piala, laminar air flow, erkas, gelas ukur, pipet tetes, jarum ose, bunsen, korek api, mikropipet tip, vortex mixer, buscner rotary, vacuum evaporator dan spektrofotometer UV-vis.

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah sampel cendawan endofit yaitu cendawan endofit *Aspergillus* sp. asal makroalga *Eucheuma* dengan cendawan endofit

Crhysosporium dan *Tricoderma* sp. asal tanaman kayu secang (*Caesalpinia sappan*). Koleksi Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Makassar.

Medium yang digunakan yaitu medium *Potato Dextrose Agar* (PDA), medium *Potato Dextrose Broth* (PDB), *Cloramfenikol*, aquades, alkohol 96%, dan pengujian antioksidan menggunakan etil asetat, metanol p.a, Vitamin C sebagai kontrol dan *Diphenyl-2-picrylhydrazyl* (DPPH) sebagai blangko.

F. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Preparasi media

a. Media Regenerasi *Potato Dextrose Agar Cloramfenikol* (PDA)

Meremajakan kultur murni isolat cendawan endofit pada media *Potato Dextrose Agar Cloramfenikol* (PDA) dan menambahkan *kloramfenikol* sebagai antibakteri untuk meminimalisir kontaminasi bakteri patogen, dengan komposisi untuk media *Potato Dextrose Agar* (4 g *potato starch*, 20 g *dextrose* dan 15 g agar) PDA merupakan media umum yang digunakan untuk mengembangbiakkan dan menumbuhkan cendawan dan khamir. Komposisi *Potato Dextrose Agar* ini terdiri dari bubuk kentang, *dextrose* dan juga agar. Bubuk kentang dan juga *dextrose* merupakan sumber makanan untuk cendawan dan khamir. Langkah kerja pembuatan media yaitu menimbang PDA sebanyak 39,0 gram dan *kloramfenikol* 250 gram dengan neraca analitik dalam gelas erlem kemudian menambahkan 1000 ml aquades.

Selanjutnya, *distirrer* menggunakan *hot plate magnetic stirrer* sampai semua bahan larut, selanjutnya disterilkan dengan autoklaf manual pada suhu 121°C selama 15 menit pada tekanan 2 atm.

Sebanyak $\pm 15\text{ mL}$ dituang ke dalam cawan petri secara aseptis dan didiamkan selama 24 jam untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi media, selanjutnya stok isolat cendawan endofit diinokulasi ke dalam media PDA pada cawan petri dengan ose yang steril dengan membentuk zona persegi ditabung stok dengan mengangkat sedikit agar yang ada dalam tabung stok dilakukan karena jenis cendawan endofit tidak berhifa. Lama tumbuhnya peremajaan isolat cendawan endofit 7-14 hari dengan ditandai munculnya hifa.

b. Media Fermentasi *Potato Dextrose Broth Cloramfenikol* (PDB)

Kentang merupakan sumber makanan untuk cendawan sehingga kentang dipilih menjadi media alternatif apabila media instan tidak ada. Langkah kerja pembuatan media yaitu menimbang media Kentang sebanyak 200 gram memasukkan ke dalam erlenmeyer dengan aquades 1000 mL, lalu memanaskan dan dibiarkan mendidih sehingga kentang menjadi lunak. Diamkan sampai dingin saring dan masukan ke dalam erlenmeyer, kemudian menimbang *Dextrose* 20 gram dan *cloramfenikol* 250 ml gram masukan ke dalam erlenmeyer tunggu hingga larut. Selanjutnya media disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Setelah itu sampel dimasukkan ke dalam media PDB (LIPI, 2016).

2. Pembuatan Kurva Pertumbuhan Konsersium Cendawan Endofit

Kurva pertumbuhan dibuat berdasarkan hasil biomassa kering hasil fermentasi. Cara kerja pembuatan kurva pertumbuhan yaitu pertama menggunting kertas saring dengan bentuk lingkaran dan menimbanginya dengan neraca analitik, selanjutnya kertas saring yang telah ditimbang digunakan untuk memisahkan biomassa dan filtrat. Biomassa yang diperoleh di oven selama 24 jam dan ditimbang ulang setelah kertas saring bersuhu ruang. Hasil timbangan awal kertas saring tanpa biomassa dikurang dengan timbangan kertas dengan biomassa yang sudah di oven merupakan bobot biomassa yang dimasukkan kedalam kurva pertumbuhan. Hal tersebut dilakukan dari hari ke-2 sampai dengan hari ke-20. Untuk menentukan fase-fase yang terjadi selama fermentasi kapang.

3. Fermentasi Konsorsium Isolat Cendawan Endofit Menggunakan Metode Dinamis

Kupas kentang dan potong mejadi dadu lalu cuci. Menimbang potongan kentang sebanyak 200 gram masukan kedalam erlenmeyer lalu didihkan dengan aquades 1000 mL, diamkan sampai dingin dan saring lalu masukan kedalam erlenmeyer, kemudian tambahkan dextrosa sebanyak 20 gram, tambakan *Cloramfenikol* 250 gram tunggu hingga larut. Selanjutnya media mengsterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit.

Mengambil isolat cendawan endofit yang tumbuh dicawan petri masing-masing dengan sedotan *bubbel* steril sebanyak 1 potongan hifa dan

memfermentasikan dalam 100 mL media cair PDB yang sebelumnya telah disterilkan dalam autoklaf 121⁰C selama 15 menit, pada Erlenmeyer 250 mL, sebanyak 10 buah erlenmeyer kemudian menginkubasi pada *rotary shaker* dengan kecepatan 120 rpm pada suhu ruang (25⁰C) selama 20 hari, setiap 2 hari 1 buah erlenmeyer mengambil dan memisahkan antara filtrat dan biomassa dengan cara menyaring.

4. Ekstraksi Hasil Fermentasi Konsorsium Isolat Cendawan Endofit

Labu erlenmeyer 250 mL yang mengandung 100 mL hasil fermentasi masing-masing disaring, kemudian diperoleh filtrat dan biomassa. Filtrat diekstraksi sebanyak tiga kali ulangan (ulangan pertama di rendam selama 24 jam untuk ulangan dua dan ketiga di rendam selama 2 jam) dengan 50 mL etil asetat menggunakan corong pisah, lalu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara fase etil asetat dan air. Ekstrak etil asetat dikumpulkan, lalu dipekatkan dengan *rotary vacuum evaporator*.

5. Uji Aktivitas Antioksidan Konsorsium Isolat Cendawan Endofit Dengan Metode DPPH

Penentuan persen hambat ditentukan dengan metode peredaman radikal bebas menggunakan DPPH dengan modifikasi metode Yan and Chen, 1995.

a). Pembuatan larutan DPPH 0,4 mM

DPPH berfungsi sebagai larutan uji yang bersifat radikal bebas adapu langka kerja pembuatannya yaitu menimbang DPPH sebanyak 7,9 mg DPPH (BM = 394,32)

dan melarutkan dalam 50 mL metanol proanalisis, homogenkan, kemudian tempatkan dalam botol berwarna gelap.

b). Pembuatan larutan blanko

Larutan blanko adalah larutan yang digunakan sebagai larutan untuk mengukur panjang serapan untuk pengukuran panjang gelombang serapan pada spektrofotometer. Langkah kerja pembuatan memasukkan sejumlah 0,6 mL DPPH 0,4 mM kedalam tabung reaksi skala, lalu ditambahkan metanol proanalisis hingga tanda batas (3 mL) kemudian homogenkan.

c). Pembuatan larutan uji

larutan uji adalah larutan ekstrak filtrat yang digunakan sebagai larutan uji coba. Langkah kerja menimbang 2,5 mg ekstrak dari bagian filtrat menggunakan timbangan analitik, kemudian melarutkan dengan metanol sampai 5 mL (500 bpj). Larutan ini merupakan larutan induk. Kemudian pipet 30 μ L, 60 μ L, 150 μ L, 300 μ L dan 600 μ L larutan induk tersebut kedalam tabung reaksi yang telah ditera 3 mL untuk mendapatkan konsentrasi sampel 5 bpj, 10 bpj, 25 bpj, 50 bpj dan 100 bpj. Pembuatan larutan uji dilakukan sebanyak dua kali (duplo).

d). Pembuatan larutan kontrol positif

Sejumlah 2,5 mg Vitamin C ditimbang, lalu dilarutkan dengan metanol sampai 5 mL (500 bpj). Larutan ini merupakan larutan induk. Kemudian dipipet 18 μ L, 36 μ L, 54 μ L, 72 μ L dan 90 μ L larutan induk tersebut kedalam tabung reaksi yang telah ditera 3 mL untuk mendapatkan konsentrasi sampel 3 bpj, 6 bpj, 9 bpj, 12

bpj dan 15 bpj. Pembuatan larutan kontrol positif dilakukan sebanyak dua kali (duplo).

e). Uji aktivitas antioksidan

Larutan uji dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi gelap lalu ditambahkan DPPH 0.4 mM sebanyak 600 dan ditera dengan metanol proanalisis sampai 3 mL kemudian di homogenkan menggunakan *vortex*. Larutan uji dan larutan blanko diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37, kemudian absorbansi ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm dan dihitung persen hambat.

f). Analisis data uji aktivitas antioksidan

Analisis uji aktivitas antioksidan dengan cara serapan blanko dan larutan uji yang telah diukur pada Spektrofotometer UV-Vis dicatat kemudian dicari persen hambatan aktivitas radikal bebas dengan cara memasukkan hasil serapan masing-masing sampel pada rumus sebagai berikut :

$$\text{Hambatan radikal bebas} = \frac{\text{serapan balangko} - \text{serapan sampel}}{\text{serapan balangko}} \times 100\%.$$

Setelah itu, tentukan nilai IC50 dari ekstrak filtrat dengan mencari persamaan garis linier: $Y = ax + b$.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Antagonis Isolat Cendawan Endofit

Isolat cendawan endofit dari batang kayu Secang (*Caesalpinia sappan* L.) yaitu *Trichoderma* sp. dan *Chrysosporium* sp. dengan makroalga *Euclima* sp. yaitu *Aspergillus* sp. diremajakan dalam media *Potato Dextrose Agar Cloramfenikol* (PDA), untuk memperoleh cendawan yang sehat, aktif dan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, murni dan mampu bereproduksi metabolik sekunder sesuai dengan yang diharapkan. Setelah diinkubasi selama tujuh hari pada suhu 30⁰C, karakteris morfologi dari isolat cendawan endofit *Trichoderma* sp., *Chrysosporium* sp. dan *Aspergillus* sp. Hasil yang di peroleh sama dengan karakteristik yang ada di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya dilakukan uji antagonis untuk melihat kemampuan cendawan endofit untuk hidup bersama pada media PDA, hasil uji antagonis isolat cendawan endofit disajikan pada Lampran dua.

Tab 4.1 Uji Antagonis Konsorsium Isolat Cendawan Endofit

No	Konsorsium	Nama Isolat Cendawan Endofit	Keterangan Interaksi Antagonis
1	Konsorsium I	<i>Trichoderma</i> sp., <i>Chrysosporium</i> sp., <i>Aspergillus</i> sp.	Ya
2	Konsorsium II	<i>Trichoderma</i> dan sp., <i>Aspergillus</i> sp.	Ya

3	Konsorsium III	<i>Chrysosporium</i> sp., dan <i>Aspergillus</i> sp.	Ya
4	Konsorsium IV	<i>Trichoderma</i> sp., dan <i>Chrysosporium</i> sp.	Tidak

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil uji antagonis konsorsium isolat cendawan endofit *Trichoderma* sp., *Chrysosporium* sp. dan *Aspergillus* sp. dari empat konsorsium yang dilakukan yang tidak antagonis adalah konsorsium IV yaitu isolat cendawan endofit *Trichoderma* sp. dengan *Chrysosporium* sp. karena adanya kesamaan waktu pertumbuhan isolat cendawan endofit yaitu 7-14 hari, dan yang antagonis adalah konsorsium yang memiliki isolat *Aspergillus* sp. yaitu konsorsium I, konsorsium II, konsorsium III. Hal ini menunjukkan bahwa cendawan endofit *Aspergillus* sp., bersifat dominasi.

Pernyataan bahwa isolat cendawan endofit *Aspergillus* sp., bersifat dominan karena waktu pertumbuhan *Aspergillus* sp. sangat cepat yaitu dua hingga empat hari berdasarkan pada peremajaan isolat tunggal pada media PDA. Sedangkan isolat cendawan endofit *Trichoderma* sp. dan *Chrysosporium* sp. membutuhkan waktu tumbuh 7-14 hari pertumbuhan di media PDA. Pernyataan tersebut didukung oleh Nuramalia (2016), menyatakan bahwa proses pertumbuhan jenis *Aspergillus* sp. berkisar antara dua hingga tiga hari, rata-rata pertumbuhan berhasil satu warna dan dapat diidentifikasi. Sedangkan *Trichoderma* sp. dan *Chrysosporium* sp. proses pertumbuhan sangat lambat berkisar antara 5-7 hari bahkan waktu untuk tumbuh lebih lama lagi dan terkadang mengalami gagal tumbuh dan tidak dapat

diidentifikasi. Berdasarkan Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa cendawan yang bersifat antagonis disebabkan oleh waktu pertumbuhan cendawan endofit.

Al-Qur'an diturunkan langsung dari sisi Allah swt. yang semakin menambah dan memperdalam keimanan, Dzat Yang Maha Tahu, Maha Bijaksan, lagi Maha mengetahui. *Al-Qur'an* ini adalah perkataan atau ucapan Allah swt. sedangkan makhluk adalah ciptaan-Nya. Salah satu makhluk ciptaan Allah swt. adalah cendawan endofit, keberadaan cendawan endofit dijelaskan Allah swt. dalam QS Ar-Rum/ 30; 19 surah Makkiyah yang berbunyi :

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kuburan) (Kementrian Agama RI, 2012).

Tafsir *Al-Maraghi* juz 21 (1989) menafsirkan bahwa Allah swt. menciptakan segala sesuatu dari hal-hal yang berbeda mengisyaratkan bahwa proses kehidupan dan kematian itu berjalan secara terus menerus, tidak berhenti di bumi dan di langit. Dia mengeluarkan manusia dari asal nutfah dan unggas dari asal telur. Sebagaimana Dia mampu pula untuk menciptakan sebaliknya, maka untuk itu Dia mengeluarkan nutfah dari manusia dan telur dari unggas. Bukan saja terlihat pada antara manusia melainkan tumbuh-tumbuhan. Hal ini terkandung bukti yang menunjukkan akan kesempurnaan dan kekuasaan-Nya dan keindahan ciptaan-Nya. Proses kehidupan dan kematian akan terus berjalan terus menerus, tidak berhenti di

bumi dan di langit, bukan proses kehidupan dan kematian bukan saja terlihat pada tumbuh-tumbuhan melainkan antara sesama manusia Allah swt. memperingatkan kelak kita akan dibangkitkan setelah kematian.

QS Ar-Ruum/30:19 memperingatkan kita tentang kehidupan dan kematian, hal ini sama dengan cendawan endofit yang diambil dari batang kayu secang (*Caesalpinia Sappan L.*), dan makroalga *Euchema sp.* dari bagian tanaman yang di potong sehingga mati, memanfaatkan cendawan endofit yang terkandung di dalam batang kayu secang (*Caesalpinia Sappan L.*), dan makroalga *Euchema sp.* dapat mengurangi penggunaan bahan dalam jumlah besar dan dapat mempertahankan bahan baku agar tetap terjaga kelestariannya karena hanya mengambil sebagian kecil dari bagian tanaman.

B. Kurva Pertumbuhan Konsorsium Cendawan Endofit


Kurva pertumbuhan konsorsium isolat cendawan endofit dibuat untuk melihat laju pertumbuhan konsorsium cendawan endofit dan menentukan fase-fase pertumbuhan cendawan endofit dan mencari fase stasioner konsorsium cendawan endofit untuk melihat persen hambat tertinggi antioksidan.

Pengukuran bobot biomassa konsorsium isolat cendawan endofit dilakukan setiap dua kali sehari selama 20 hari. Miselium cendawan endofit di fermentasi pada media PDB kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring dan dikeringkan dengan oven selama 24 jam pada suhu 60°C. Bobot kering biomassa cendawan endofit ditentukan dengan menghitung selisih kertas saring kosong dengan kertas

saring yang berisikan biomassa kering kemudian dibuat kurva pertumbuhan dengan pengambilan sampel hasil fermentasi. Tabel data pengukuran kurva pertumbuhan konsorsium isolat cendawan endofit disajikan pada lampiran tiga. Ganjar (2006), menyatakan bahwa pertumbuhan cendawan endofit dapat dilihat dari bobot biomassa cendawan endofit yang dihasilkan, hal tersebut terjadi akibat proses metabolisme cendawan endofit.

a. Konsorsium I (*Trichoderma* sp., *Chrysosporium* sp., *Aspergillus* sp.)

Kurva pertumbuhan isolat cendawan endofit menunjukkan waktu inkubasi dan jenis isolat cendawan yang di konsorsium serta pH media fermentasi mempunyai hubungan dengan fase pertumbuhan cendawan endofit. Berdasarkan gambar 4.1 kurva pertumbuhan konsorsium I isolat cendawan endofit.




Gambar 4.1 Kurva Pertumbuhan Isolat Cendawan endofit Konsorsium I.

Konsorsium I pada hari ke dua dan empat berada pada fase *lag* yaitu fase adaptasi atau peyesuaian cendawan endofit dengan media pertumbuhan baik nutrisi

dan pH media, Pada hari ke enam dan delapan konsorsium I cendawan endofit berada ada fase *eksponensial* dimana cendawan endofit mengalami fase pertumbuhan maksimal.

Pada hari ke sepuluh isolat cendawan endofit konsorsium I mengalami penurunan yang sangat besar dari 0,7147 gram menjadi 0,1059 gram hal tersebut di akibatkan karena adanya senyawa metabolik sekunder yang di hasilakan oleh isolat cendawan endofit yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan cendawan endofit yang lain. Pernyataan tersebut di dukung oleh Bustanussalam (2015) dalam Arum (2017) menyatakan bahwa bioproduksi kapang endofit tersebut ketika dikombinasikan, cenderung menurun. Penurunan ini disebabkan karena interaksi kapang endofit yang tidak maksimal dalam memproduksi metabolit sekunder.

pH masa pertumbuhan konsorsium I isolat cendawan endofit dapat di lihat pada gambar 4.2 dibawah ini




4.2 : pH masa Pertumbuhan Isoalt Cendawan Endofit Konsorsium I.

Pade fase *lag* hingga Fase *eksponensial* konsorsium I media pertumbuhan yaitu pH enam dan belum mengalami perubahan pH dari pH media awal yaitu enam.

Pada hari ke sepuluh pH media fermentasi yaitu empat. Dan pada fase stasioner pH media berada pada lima. Pada fase kematian isolat cendawan endofit konsorsium I pH media fermentasi yaitu enam.

b. Konsorsium II (*Trichoderma* sp. dengan *Aspergillus* sp.)

Kurva pertumbuhan konsorsium isolat cendawan endofit sangat dipengaruhi oleh waktu fermentasi, jenis isolat dan pH media fermentasi. Seperti kurva pertumbuhan konsorsium II isolat cendawan endofit. Berdasarkan gambar 4.2 Kurva Pertumbuhan Isolat Cendawan endotit Konsorsium II.




Gambar 4.3 Kurva Pertumbuhan Isolat Cendawan endotit Konsorsium II.

Pada hari ke dua dan empat konsorsium II berada pada fase *lag* yaitu fase penyesuaian atau adaptasi isolat cendawan endofit dengan media fermentasi baik nutrisi dan pH media fermentasi, Pada hari ke enam dan sepuluh isoalat cendawan endofit konsorsium II berada pada fase *eksponasial* yaitu dimana isolat cendawan endofit mengalami pertumbuhan maksimal karena isolat cendawan endofit sudah

mengalami adaptasi media fermentasi. Pada hari ke 12 dan 14 isolat cendawan endofit berada pada fase *stasioner* yaitu fase di mana cendawan endofit mengalami pertumbuhan yang seimbang, pada hari ke 16 – 20 isolat cendawan endofit berada pada fase kematian dimana bobot biomassa mengalami penurunan yang diakibatkan kurangnya nutrisi pada media fermentasi.

pH masa pertumbuhan konsorsium II isolat cendawan endofit dapat dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini.




Gambar 4.4 pH masa Pertumbuhan Isoalt Cendawan Endofit Konsorsium II.

Pada fase *lag* konsorsium II tumbuh pada pH media enam dari pH awal inokulasi yaitu lima media fermentasi mengalami perubahan. pH pada fase *eksponensial* yaitu lima dari pH awal inokulasi enam media fermentasi mengalami perubahan. pH pada fase *stasioner* yaitu empat. Pada fase kematian pH media enam.

c. Konsorsium III *Chrysosporium* sp. dengan *Aspergillus* sp.


Kurva pertumbuhan konsorsium isolat cendawan endofit sangat dipengaruhi oleh waktu fermentasi, jenis isolat dan pH media fermentasi. Seperti kurva pertumbuhan konsorsium III isolat cendawan endofit.



Gambar 4.5 Kurva Pertumbuhan Isolat Cendawan endofit Konsorsium III.

Pada hari ke dua dan empat isolat cendawan endofit konsorsium III berada pada fase *lag* yaitu fase adaptasi dimana isolat cendawan endofit konsorsium III menyesuaikan nutrisi dan pH pertumbuhan pada media fermentasi, Pada hari ke enam dan 12 berada pada fase *eksponensial* atau pertumbuhan maksimal, dimana isoalat cendawan endofit sudah memanfaatkan nutrisi media fermentasi, pada hari ke 14 dan 16 isolat cendawan endofit konsorsium III berada pada fase stasioner atau fase pertumbuhan seimbang dan pada hari ke 18 sampai 20 berada pada fase kematian dimana media fermentasi kekurangan nutrisi untuk di manfaatkan.

pH masa pertumbuhan konsorsium III isolat cendawan endofit dapat di lihat pada gambar 4.6 dibawah ini.




Gambar 4.4 pH masa Pertumbuhan Isoalt Cendawan Endofit Konsorsium III.

Pada fase *lag* pH media fermentasi yaitu enam dari pH dan pH inokulasi enam media fermentasi belum mengalami penurunan pH media. Pada fase *eksponensial* pH pada fase eksponensial yaitu empat dan mengalami penurunan. Fase stasioner pH media fermentasi empat dan fase kematian pH pada media fermentasi lima.

d. Konsorsium IV *Chrysosporium* sp. dengan *Trichoderma* sp.


Kurva pertumbuhan konsorsium isolat cendawan endofit sangat dipengaruhi oleh waktu fermentasi, jenis isolat dan pH media fermentasi. Seperti kurva pertumbuhan konsorsium IV isolat cendawan endofit.



Gambar 4.7 Kurva dan pH pada Masa Pertumbuhan Isolat Cendawan endotit Konsorsium IV.

Pada hari ke dua dan empat isolat cendawan endofit konsorsium IV berada pada fase *lag* yaitu fase adaptasi di mana isolat cendawan endofit konsorsium IV menyesuaikan nutrisi dan pH pertumbuhan pada media fermentasi, pada hari ke enam dan delapan berada pada fase *log* atau pertumbuhan maksimal, di mana isoalat cendawan endofit sudah memanfaatkan nutrisi media fermentasi, pada hari ke 10 dan 12 isolat cendawan endofit konsorsium IV berada pada fase stasoner atau fase pertumbuhan seimbang. Pada hari ke 16 sampai 20 berada pada fase kematian di mana media fermentasi kekurangan nutrisi untuk dimanfaatkan.

pH masa pertumbuhan konsorsium IV isolat cendawan endofit dapat di lihat pada gambar 4.8 dibawah ini.



Gambar 4.8 Kurva dan pH pada Masa Pertumbuhan Isolat Cendawan endotit Konsorsium IV.

Pada fase *lag* pH media fermentasi yaitu lima dari pH hari inokulasi enam media fermentasi mengalami penurunan pH media. pH pada fase eksponensial yaitu empat mengalami penurunan. Pada fase stasioner pH pada media fermentasi tiga. pH pada fase kematian enam.

Tujuan kurva pertumbuhan adalah untuk melihat fase stasioner isolat cendawan endofit, karena pada penelitian ini fase stasioner akan dijadikan sampel uji antioksidan. Berdasarkan hasil kurva pertumbuhan isolat konsorsium cendawan endofit pada penelitian ini fase stasioner terjadi pada hari 10-16. Fase stasioner akan dilanjutkan ketahapan berikutnya yaitu tahapan ekstraksi hal ini dikarenakan fase stasioner menghasilkan metabolik sekunder yang maksimal karena jumlah sel cendawan endofit yang mati dan hidup seimbang. Pernyataan di atas didukung oleh Elita (2013) yang menyatakan bahwa mikroorganisme pada fase stasioner atau fase pertumbuhan seimbang. Metabolik sekunder disintesis pada akhir siklus pertumbuhan

sel yaitu fase stasioner yaitu pada fase stasioner jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati.

Sintesis metabolik sekunder dimulai pada saat beberapa zat gizi di dalam media pertumbuhan cendawan endofit telah habis. Keterbatasan zat gizi tersebut menyebabkan terakumulasinya inducer enzim metabolik sekunder dan terlepasnya gen-gen untuk sintesis metabolik sekunder. Pernyataan Elita (2013) didukung pula oleh Pratiwi (2015) menjelaskan juga tentang metabolik sekunder biasanya di produksi pada akhir fase stasioner. Pada fase ini cendawan endofit lebih tahan terhadap kondisi ekstrim. Sintesis metabolik sekunder dimulai pada saat mulai habisnya beberapa komponen utama nutren pada media pertumbuhan. Keterbatasan sumber utama sintesis tersebut antara lain gula sebagai karbon dan protein sebagai sumber asam amino dan nitrogen. Hal ini dapat menyebabkan terjadi pelepasan zat-zat hasil proses katabolisme yang merupakan metabolik sekunder.

Menurut Srikandace (2017) Pada fase stasioner diduga sel-sel cendawan endofit lebih tahan terhadap keadaan ekstrim seperti suhu baik dingin maupun panas, radiasi bahan kimia dan metabolik sekunder yang dihasilkan cendawan itu sendiri. Keterbatasan sumber utama sintesis tersebut antara lain gula sebagai sumber karbon dan protein sebagai sumber asam amino atau nitrogen. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pelepasan zat-zat hasil proses katabolisme yang merupakan metabolik sekunder.

C. Fermentasi dan Ekstraksi Konsorsium Isolat Cendawan Endofit

Fermentasi dalam media PDB sebanyak 100 mL selama 20 hari. Fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi goyang dengan kecepatan 120 rpm. Fermentasi goyang dipengaruhi oleh aerasi dan agitasi. Fermentasi memerlukan aerasi untuk menyuplai kebutuhan oksigen endawan endofit dan agitasi untuk mengangkat suplai oksigen dalam media karena oksigen memiliki kelarutan yang rendah (Kumala, 2005).

Pada waktu fermentasi warna media PDB sebelum disterilisasi yaitu kuning keruh dan setelah disterilisasi berubah warna menjadi kuning bening, setelah dilakukan inokulasi cendawan endofit pada media fermentasi dan dilakukan inkubasi perubahan warna terjadi pada konsorsium I menjadi putih keruh, dan konsorsium II menjadi kuning pekat, konsorsium III menjadi putih keruh dan konsorsium IV hitam kecoklatan.

Perubahan warna yang terjadi karena adanya aktivitas isolat cendawan endofit dalam mensintesis nutrisi yang terdapat pada media PDB selama proses fermentasi. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Jauhari (2010) perubahan warna substrat di karenakan adanya aktivitas cendawan endofit atau terjadinya metabolisme saat memanfaatkan nutrisi yang terdapat pada media PDB, yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada substrat atau media fermentasi yang awalnya bening dan menjadi keruh. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa cendawan endofit mengalami pertumbuhan dan menghasilkan metabolik sekunder dalam media fermentasi PDB.

Setelah proses fermentasi selesai dilakukan penyaringan dengan menggunakan corong Buchner, diekstraksi dengan etil asetat dan dipekatkan dengan vakum rotavapor, selanjutnya ekstrak filtrat uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dengan melihat penghambatan radikal bebas.

Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode ekstraksi cair-cair (partisi). Menurut Khopkar (2008), metode ekstraksi cair-cair merupakan metode ekstraksi yang didasarkan pada sifat kelarutan komponen target dan distribusinya dalam dua pelarut yang tidak saling tercampur, di mana sebagai komponen target larutan pada fase pertama atau filtrat dan fase ke dua sebagai larutan atau pelarut seperti etil asetat (semipolar). Kesimpulannya pelarut polar akan menarik senyawa bersifat polar, pelarut semipolar akan menarik senyawa semipolar dan pelarut non polar akan menarik senyawa non polar sehingga memudahkan dalam pengambilan senyawa target.

Sifat pelarut yang digunakan dalam ekstraksi yaitu dapat melarutkan semua zat dengan cepat dan sempurna, mempunyai titik didih yang cukup rendah agar pelarut mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi, pelarut tidak boleh larut dalam air dan pelarut harus bersifat *inert* (tidak ikut bereaksi atau tidak berpengaruh) (Guenther, 1987).

Pelarut yang digunakan yaitu etil asetat dan metanol p.a. Etil asetat merupakan pelarut organik yang baik digunakan untuk melarutkan senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan (Arora, 2009) sedangkan metanol p.a.

merupakan pelarut yang efektif mengestraw senyawa-senyawa polar seperti flavonoid, fenolik, dan saponin.

Pada penelitian ini ekstrak filtrat diuji aktivitas antioksidanya sedangkan biomassa cendawan endofit tidak uji. Hal tersebut berdasarkan Bustanussalam (2015) berdasarkan persen hambatan ekstrak biomassa dan filtrat cendawan endofit, ekstrak filtrat memiliki persen hambat yang tinggi di bandingkan dengan nilai persen hambat ekstrak biomassa, hal tersebut disebabkan karena ekstrak filtrat terdapat lebih banyak metabolik sekunder yang bertindak sebagai pelindung cendawan endofit dari tanaman inangnya sedangkan ekstrak biomassa lebih banyak mengandung asam lemak yang dapat menurunkan aktivitas antioksidan. Bobot ekstrak filtrat semua konsorsium disajikan di lampiran 12.

D. Uji Antioksidasi Ekstrak Filtrat Konsorsium Isolat Cendawan Endofit

Uji aktivitas antioksidan dalam penelitian ini menggunakan metode DPPH (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazil*) telah digunakan secara luas untuk menguji kemampuan senyawa yang berperan sebagai pendonor elektron atau hidrogen. Metode DPPH juga merupakan metode pengujian antioksidan yang paling sederhana, cepat dan mudah untuk skrining aktivitas penangkal radikal bebas berbagai senyawa. Selain itu metode DPPH dipilih karena praktis dan akurat (Prakash, 2001).

Uji aktivitas antioksidan metabolik sekunder konsorsium isolat cendawan endofit dan Vitamin C sebagai perbandingan diawali dengan penentuan panjang gelombang (λ) maksimum. Panjang gelombang maksimum adalah panjang

gelombang di mana DPPH menunjukkan serapan maksimum (absorbansi paling besar). Berdasarkan hasil pengujian dengan spektrofotometer UV-Vis dengan (λ) maksimal 517 nm. Panjang gelombang 517 nm kemudian digunakan untuk setiap pengukuran aktivitas antioksidan dalam penelitian ini.

Uji aktivitas antioksidan menggunakan inkubasi dengan suhu 37⁰C selama 30 menit. Menurut Lailiyah (2014) sampel yang diinkubasi akan lebih stabil dan memiliki penurunan absorbansi yang lebih signifikan dibandingkan dengan sampel yang tidak diinkubasi. Pada suhu 37⁰C diduga sampel antioksidan bereaksi dengan baik dengan DPPH. Karena suhu yang telah terkondisikan dapat mempercepat terjadinya reaksi antioksidan antara sampel dengan DPPH. Yuswantia (2011) menyatakan bahwa inkubasi selama waktu yang didapat menunjukkan bahwa sampel yang mengandung antioksidan telah dalam meredam radikal bebas DPPH, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai absorbansi yang stabil.

Hasil uji senyawa antioksidan dari konsorsium I cendawan endofit pada hari ke-12 semua konsentrasi mengalami perubahan warna yaitu ungu pudar. Pada kontrol positif atau Vitamin C semua mengalami perubahan warna dari ungu menjadi kuning bening. Perubahan warna tersebut disajikan pada lampiran 13.

Perbedaan perubahan warna yang terjadi pada setiap konsorsium dapat disebabkan karena kemampuan yang dimiliki sampel dalam menghambat radikal bebas. Vitamin C atau asam askorbat merupakan antioksidan sintetis sehingga dalam konsentrasi kecil sekali pun mampu untuk mengikat radikal bebas.

Menurut Husna (2009) bahwa berubahnya warna ungu menjadi kuning seiring dengan terjadinya penurunan absorbansi molar dalam molekul DPPH karena elektron yang tadinya tidak berpasangan dengan terjadinya pemberian atom hidrogen dari antioksidan membentuk DPPH-H tereduksi (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazin*). Perubahan warna radikal bebas DPPH yang berwarna ungu menjadi kuning menunjukkan terjadinya reaksi peredaman radikal bebas. Molyneux (2004) suatu senyawa dikatakan memiliki senyawa antioksidan apabila mampu mendonorkan atom hidrogennya ditandai dengan perubahan warna ungu menjadi kuning pucat.

Allah swt. menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan seperti penyakit pasti Allah swt. juga menurunkan obatnya. Karena sesungguhnya Allah swt. telah menyiapkan obat untuk segala macam penyakit, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءٌ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمُهُ مِنْ عِلْمِهِ وَجِهَةٌ مِنْ جِهَاتِهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya : “Sesungguhnya Allah swt tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang mengetahuinya” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadis ini dalam Zawa'id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas Zadul Ma'ad, 4/12-13) (Farooqi, 2005).

Hadis di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya segala macam penyakit yang diturunkan oleh Allah swt. tentu ada obatnya. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa obat itu diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya, oleh karena itu kita dituntut mengembangkan ilmu pengetahuan dalam menemukan setiap obat yang

sudah diturunkan oleh Allah swt. untuk segala macam penyakit. Jika kita tidak mengembangkan ilmu pengetahuan, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa Allah swt. sudah menyediakan berbagai macam obat khususnya yang dapat kita peroleh dari dalam jaringan tanaman sebagai obat alami untuk beberapa penyakit. Dalam penelitian ini tumbuhan yang digunakan adalah kayu secang (*Caesalpinia sappann* L.) dan makroalga *Eucheuma* sp.

E. Perhitungan Persen Hambat Aktivitas Antioksidan Konsorsium Isolat Cendawan Endofit

Wijaya (2012) kemampuan suatu senyawa atau ekstrak untuk menghambat reaksi oksidan (aktivitas antioksidan) dapat dinyatakan dengan persen hambat atau peredaman radikal bebas.

Spesifikasi suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan menurut Blois (1958), berdasarkan nilai IC_{50}

Intensitas	Nilai IC_{50}
Sangat Kuat	< 50 ppm
Kuat	50-100 ppm
Sedang	101-150 ppm
Lemah	> 150 ppm

Semakin rendah nilai IC_{50} maka senyawa tersebut mempunyai keefektifan sebagai penangkap radikal bebas yang lebih baik dan semakin tinggi nilai IC_{50} suatu senyawa maka kurang efektif dalam menangkap radikal bebas (Cholisho. 2008).

Adapun perhitungan persen hambat aktivitas antioksidan dapat dilihat pada lampiran 15 dari semua konsorsium dan kontrol positif setiap konsentrasi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 : % Hambat Konsorsium Ekstrak Filtrat

Larutan	Konsentrasi (ppm)	% hambat	R ²	IC ₅₀ (µg/mL)	Keterangan
Konsorsium I Hari Ke-12	5	3,205	0,9733	69,938	Kuat
	10	10,448			
	25	18,589			
	50	46,346			
	100	71,153			
Konsorsium I Hari Ke-14	5	1,538	0,9805	62,531	Kuat
	10	12,884			
	25	22,307			
	50	45,769			
	100	75,448			
Konsorsium II Hari Ke-12	5	5,320	0,9439	52,924	Kuat
	10	18,269			
	25	38,846			
	50	50,897			
	100	81,410			
Konsorsium II Hari Ke-12	5	4,679	0,9161	53,172	Kuat
	10	17,307			
	25	38,846			
	50	55,705			
	100	78,33			
Konsorsium III Hari Ke-14	5	8,141	0,9154	58,656	Kuat
	10	16,858			
	25	40,256			
	50	37,051			
	100	78,465			
Konsorsium III Hari Ke-16	5	10,064	0,969	50,318	Kuat
	10	14,487			
	25	39,358			
	50	49,743			
	100	87,564			
Konsorsium IV Hari Ke-10	5	26,410	0,9884	36,011	Sangat Kuat
	10	34,385			
	25	46,538			


	50	59,102			
	100	89,935			
Konsorsium IV Hari Ke-12	5	15	0,9623	47,807	Sangat Kuat
	10	24,294			
	25	39,102			
	50	57,5			
	100	81,358			
Vitamin C	3	35,320	0,6663	2,061	Sangat Kuat
	6	83,333			
	9	96,282			
	12	97,051			
	15	97,308			

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ekstrak mempunyai hubungan berbanding lurus yaitu semakin tinggi konsentrasi ekstrak semakin tinggi pula aktifitas antioksidannya dan pada konsentrasi tertentu akan menjadi konstan hal tersebut dapat dilihat dari persen hambat.

Kemampuan antioksidan melemah pada konsentrasi tinggi dikarenakan menurut Husnah (2009) bahwa hubungan berbanding lurus antara kosentrasi ekstrak terhadap aktivitas antioksidan, besar konsentrasi ekstrak yang ditambahkan dapat mempengaruhi laju oksidasi pada konsentrasi tertentu menjadi cenderung konstan dan menurun. Pengaruh jumlah konsentrasi pada laju oksidasi tergantung pada struktur antioksidan, kondisi dan sampel uji. Sehingga antioksidan dapat bertindak sebagai prooksidan atau faktor-faktor yang mempegaruhi reaksi oksidasi pada konsentrasi tertinggi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan konsentrasi tertinggi 100 ppm dan Vitamin C 15 ppm, hal tersebut berdasarkan pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil persen hambat aktifitas antioksidan yang didapatkan selanjutnya dianalisis dengan persamaan regresi non-linear untuk mengukur ada tidaknya hubungan antara variabel, hubungan tersebut ditunjukkan dengan nilai R^2 (*Koefisien determinasi*) yang menunjukkan kontribusi variabel X (konsentrasi ekstrak) terhadap Y (persen hambat), artinya variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar R^2 misalnya nilai R^2 ekstrak metabolit sekunder konsorsium IV hari ke 12 yaitu 0,9884, maka konsentrasi ekstrak mempengaruhi persen aktivitas antioksidan sebesar 0,9884 %.

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai *inhibitor concentration* (IC_{50}), masing-masing konsorsium mempunyai nilai yang berbeda. *inhibitor concentration* (IC_{50}), merupakan konsentrasi suatu senyawa antioksidan yang dapat menyebabkan 50% DPPH kehilangan karakter radikal bebasnya atau konsentrasi suatu senyawa antioksidan yang memberikan persen hambat 50 %. Senyawa yang memiliki daya aktivitas antioksidan yang tinggi, memiliki IC_{50} yang rendah. Seperti pada diagram berikut :



Gambar 4.9 Diagram IC_{50} Konsorsium Isolat dan Vitamin C.

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa konsorsium I pada ekstrak isolat hari ke-12 sebesar 69,938 ppm masuk dalam kategori antioksidan kuat dan pada ekstrak isolat hari ke-14 sebesar 62,531 ppm masuk dalam kategori kuat. Konsorsium II pada ekstrak isolat hari ke-12 sebesar 52,924 ppm masuk dalam kategori kuat dan pada ekstrak isolat hari ke-14 sebesar 53,172 ppm masuk dalam kategori kuat. Konsorsium III pada ekstrak isolat hari ke-14 sebesar 58,656 ppm masuk dalam kategori kuat dan pada ekstrak hari ke-16 sebesar 50,318 ppm masuk dalam kategori kuat. Konsorsium IV pada ekstrak isolat hari ke-10 sebesar 36,011 ppm masuk dalam kategori sangat kuat dan pada ekstrak isolat hari ke-12 sebesar 47,807 ppm masuk dalam kategori sangat kuat.

Pada penelitian ini Vitamin C digunakan sebagai kontrol positif dengan daya hambat yang sangat kuat, yaitu 2,016 ppm. Hal ini menunjukkan bahawa sampel ekstrak metabolit sekunder semua konsorsium memiliki efektivitas yang rendah bilah dibandingkan dengan vitamin C. Hal tersebut dijelaskan oleh Sandhiutami (2012) bahwa semakin kecil nilai IC_{50} suatu senyawa uji maka senyawa tersebut semakin efektif dalam menagkal radikal bebas.

Meskipun demikian hasil konsorsium isolat cendawan endofit dapat digunakan sebagai pengganti antioksidan sintetik seperti BHA dan BHT dikarenakan antioksidan sintetik ini terbukti bersifat karsinogenik. Menurut Purwati (2009) antioksidan sintetik seperti *Butyl Hidroksi Anisol* (BHA) dan *Butyl Hidroksi Toluen* (BHT) saat ini penggunaannya mulai di batasi. Hasil penelitian Ford *et al* (1980)

dalam indartia (2002) menunjukkan bahwa BHA dan BHT ternyata dapat meracuni binatang uji coba dan bersifat karsinogenik, sehingga membahayakan kesehatan.

Penelitian sebelumnya yaitu fermentasi tunggal yang menggunakan cendawan endofit *Aspergillus* sp. asal makroalga *Euchema* sp sebagai sumber antioksidan alami memiliki nilai IC_{50} 38,64 ppm, sedangkan cendawan endofit *Crhysosporium* dengan daya hamabat lemah dengan nilai IC_{50} 219,25 ppm dan *Tricoderma* sp. dengan daya hambat sangat kuat dengan nilai IC_{50} 46,354 ppm.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, konsorsium IV isolat cendawan endofit memiliki aktifitas antioksidan yang sangat kuat yaitu hari ke-10 nilai IC_{50} sebesar 36,011 ppm dan hari ke-12 nilai IC_{50} sebesar 47,807 ppm bila dibandingkan dengan hasil uji isolat tunggal yaitu *Crhysosporium* IC_{50} 219,25 ppm dan *Tricoderma* sp. nilai IC_{50} 46,354 ppm. Namun beberapa hasil konsorsium cenderung menurun, hal ini diduga karena perbedaan sumber isolat tanaman inangnya dan kemampuan cendawan endofit yang berbeda dalam memproduksi senyawa metabolit sekunder. Menurut Pratiwi (2008) spesies mikroorganisme tertentu mungkin mampu memproduksi beberapa macam metabolit sekunder, sedangkan spesies lain hanya mampu memproduksi satu atau dua macam metabolit sekunder saja. Sedangkan menurut (Bustanusssalam *et al* 2015) penurunan ini disebabkan karena interaksi cendawan endofit yang tidak maksimal dalam memproduksi metabolit sekunder yang berperan sebagai antioksidan.

Berdasarkan hasil uji aktivitas antioksidan yang dihasilkan dari metabolit sekunder semua konsorsium isolat cendawan endofit dapat digunakan sebagai salah

satu terobosan pemanfaatan cendawan endofit dalam bidang mikrobiologi kesehatan khususnya sebagai sediaan obat pengganti obat sintetik untuk penyakit radikal bebas. Penelitian ini merupakan upaya kecil kami, karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah swt.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah konsorsium I pada ekstrak filtrat hari ke-12 sebesar nilai IC_{50} 69,938 ppm masuk dalam kategori antioksidan kuat dan pada ekstrak filtrat hari ke-14 sebesar nilai IC_{50} 62,531 ppm masuk dalam kategori kuat. Konsorsium II pada ekstrak filtrat hari ke-12 sebesar nilai IC_{50} 52,924 ppm masuk dalam kategori kuat dan pada ekstrak filtrat hari ke-14 sebesar nilai IC_{50} 53,172 ppm masuk dalam kategori kuat. Konsorsium III pada ekstrak filtrat hari ke-14 sebesar nilai IC_{50} 58,656 ppm masuk dalam kategori kuat dan pada ekstrak filtrat hari ke-16 sebesar nilai IC_{50} 50,318 ppm masuk dalam kategori kuat. Konsorsium IV pada ekstrak filtrat hari ke-10 sebesar nilai IC_{50} 36,011 ppm masuk dalam kategori sangat kuat dan pada ekstrak filtrat hari ke-12 sebesar nilai IC_{50} 47,807 ppm masuk dalam kategori sangat kuat.

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Untuk laju kecepatan pertumbuhan cendawan perlu dilakukan pengukuran diameter cendawan perhari agar data yang di peroleh lebih akurat.
2. Perlu dilakukan identifikasi senyawa apa saja yang terkandung dalam ekstrak filtrat.

KEPUSTAKAAN

- Asy-Syuyuthi Al Imam Jalaluddin Muhammad dan Al Jalaluddin Asy-Syuyuthi. Tafsir Jalalain. Surabaya: Pustaka Elba, 2010.
- Aron, Daljit S. Assay of Antioksidant Potential Of Two Aspergillus Isolates. By Different Methodes Under Various Physio-Chemical Conditions: *Brazilian Jurnal Of Microbiology*, 2009.
- Barnett HL. dan Hunter BB. *Illustrated Genera of Imperfect Fungi*. Minneapolis: Burgess Publ.Co, 1998.
- Benson, H.J. *Microbiological application: Laboratory manual in general microbiology*. New York: The McGraw-Hills Company, Inc. 2001.
- Bustanussalam., F. Eris. Septiana., Rachman., Y. Hapsari., P. Simanjuntak. *Potensi Ekstrak Kapang Endofit Asal Rimpang Kunyit sebagai Antimalaria san Antioksidan*. Bogor: Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, 2017.
- Budiana, N.S. *Buah Ajaib Tumpas Penyakit*. Jakarta: Penyebar Swadaya, 2013.
- Bintang, M. *Teknik Penelitian Biokimia*. Jakarta : Erlangga, 2010.
- Cholisho, Z. *Aktivitas Penangkap Radikal Bebas Ekstrak Etanol 70 % Biji Jengkol (Archidendron jiringa)*. *Pharmacon J.*, 2008
- Chusnul, S. *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah Okra Merah (Abelmoschus esculentus (L.) Moench. Dengan Metode Penghambatan Radikal Bebas (DPPH) dan Identifikasi Golongan Senyawa Kimia*. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan, 2017.
- Departemen, Agama RI. *Kesehatan dalam Prespektif al-Quran*. Jakarta: Lajanha Mushaf al-Qur'an, 2009.
- Dompeipen.J. Edward dan Simanutuntak Partomuan., *Aktivitas Antidiabetes dan Antioksidan Kapang Endofit dari Tanaman Mahoni (Swietenia macrophylla King)*. Bogor: Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. 2015.
- Dini, *Isolsi Fungi Endofit Penghasil Senyawaa Antioksidan Dari Tanaman Kleinhovvia hospital Linn* , Makassar: Universitas Hasanuddin, 2010.

- Elita, . Saryono, S dan Christine J. Penentuan Waktu Optimum Produksi Antioksidan dan Uji Fitokimia Ekstrak Kasar Jamur Endofit dari Umbi Tanaman Dahlia (*Dahlia virabilis*). *Jurnal Indo Che Acta*, 203.
- Eris. Septiana dan P. Simanjuntak. *Aktivitas Penghambatan Bakteri Pembentuk Histamin dan Antioksidan Kapang Endofit Kunyit Sebagai Pengawet Alami*. Bogor: Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, 2016.
- Fardiaz, S. *Fisiologi Fermentasi*. Bogor: Lembaga sumber daya informasi. IPB. 1988.
- Farooqi. *Terapi Herbal Cara Islam*. Jakarta: Mizan Publik. 2005.
- Gandjar, I., W. Sjamsuridzal, dan A. Oetari. *Mikologi dasar dan terapan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Harmastini, S. *Endofit *Taxus sumatrana* (Miquel) de Laubenfels dan Potensinya dalam Meproduksi Senyawa Antioksidan Sebagai Sumber Antioksidan*. Bogor: Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, 2010.
- Hernani dan Mono, R. *Tanman Berkasiat Antioksidan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.
- Hallmann, J., Quadt-Hallmann, A., Mahaffee, W.F., & Kloepper, J.W., Bacterial endophytes in agricultural crops. *Canadia Journal of Microbiology*, 43, 895-914. 1997.
- Husnah, M. *Golongan Senyawa Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kasar Buah Penino (*Solanum muricatum* Aiton) Berdasaekan Variasi Pelarut*. Malang; UIN Malang, 2009. Skripsi.
- Ibnu Katsier. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1, dan Jilid 4* (Penerjemah : H. Salim Bahreisy dan H. Said Bakhreisy). Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1988.
- I. Shintia. *Uji Ktivitas Antioksidan Kapang Endofit Makroalga *Euchema* sp.* Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Indriati A. Analisis Aktivitas Antioksidan Pada Buah Jambu Mete. Biosains. <http://digilib.brawijaya.ac.id>. 2002 (Diakses tanggal 18 Mei 2018).
- Jauhari, Lendra Tantowi. *Seleksi dan Identifikasi Kapang Endofit Penghasil Antimikroba Penghambat Pertumbuhan Mikroba Patogen*. Jakarta:

Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011, Skripsi.

Khopakar, S.M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: UI Press, 2008.

Kumala, Shirly., *Mikroba Endofit, Pemanfaatan Mikroba Endofit dalam Bidang Farmasi*. Jakarta Barat: PT ISFI Penerbitan. 2014.

Kementria Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2012.

Lailiyah, Ahwanul. Kapasitas Antioksidan Daun dan Kandungan Total Senyawa Fenolik Ekstrak Kasar Alga Coklat *Sargassum cristaefolium* dari Pantai Sumenep Madura. *Jurnal Alchemy*, 2014.

Lingga, L. *The Healing Power of Antioxidant : Mengenal lebih Jauh Sumber Antioksidan Unggulan*. Jakarta: Gramedia, 2012.

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Uji Aktivitas Antioksidan Kapang Endofit Bo.Ci.Cl.A3 asal Tanaman Kunyit (*Curcuma longa* Linn) dengan Variasi Nitrogen pada Media Fermentasi. Bogor: LIPI, 2016.

Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maraghi Juz 21* (penerjemah: Bahrum Abu Bakar, Lc., Hery Noer Aly dan K. Anshori Umar Sitanggal). Semarang: Toha Putra Semarang, 1989.

Molyneux, P. The Use Of The Stable Free Radical Diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) for Estimating Antioksidan Activity. *Journal of Science and Technology*, 2004.

Pertiwi, Mentari FD dan Wahono Hadi Susanto. Pengaruh proporsi (Buah: Sukrosa) dan Lama Osmosis Terhadap Kualitas Sri Buah Stroberi (*Fragaria Vasca* L). *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 2014.


Putri, S. Z. A. *Uji Aktivitas Antioksidan dan Identifikasi Senyawa Kimia Hasil Bioproduksi Isolat Kapang Endofit K.Cl.Sb.A.12 dari Akar Tanaman Kunyit (Curcuma Longa L.) Asal Sukabumi Bogor* : Universitas Pakuan. 2016. Skripsi.

Prayoga G., *Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH dan Identifikasi Golongan Senyawa Kimia dari Ekstrak Teraktif Daun Sambang Darah (Excoecaria cochinchinensis Lour)*. Depok : Universitas Indonesia. 2013.

- Prakash, A. *Antioxidant Activity*. Medallion Laboratories: Analithycal Progres, Vol 19 No : 2. 1 –4. 2001.
- Panji, Tri. *Teknik Spektroskopi untuk Elusidasi Struktur Molekul*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Radji, M. *Peranan Bioteknologi dan Mikroba Endofit dalam Pengembangan Obat Herbal*. Jakarta: Ilmu Kefarmasian. 2005.
- Radji, M., *Peranan Bioteknologi dan Mikroba Endofit dalam Pengembangan Obat Herbal*. Jakarta: Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi. Vol. II. Departemen Farmasi, FMIPA-UI, Kampus UI Depok. 113 – 126. Departemen Farmasi, FMIPA-UI, Kampus UI 16424 Majalah Ilmu Kefarmasian, No.3, 113 – 126 . 2008.
- Rahman A. *Teknologi Fermentasi*. Bogor: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPB. 1990.
- Sayuti, K. Dan Rina, Y. *Antioksidan Alam dan Sintetik*. Padang: Andalas Univerisyas Press, 2015.
- Srikandace, Yoice, Yatri Hapsari dan Partomuan Simanjuntak. Seleksi Mikroba Endofit *Curcuma zedoaria* dalam Memproduksi Senyawa Kimia Antimikroba. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 2007
- Stobel, G.A., B. Daisy., U Castillo., J. Harper. *Natural product from endophytic Microoganisms*. Jurnal Natural Product, 2004.
- Suhaj, M., Spice antioxidants isolation and their antiradical activity: a review. *Journal of Food Composition and Analysis*. 2006.
- Strobel, G., & Daisy, B., Bioprospecting for microbial endophytes and their natural products. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 67, 491-502. 2003 .
- Strobel G, and D Long. Endophytic microbes embody pharmaceutical potential. *Asni News* 63(5), 263. 1998.
- Srikandi F. *Mikrobiologi Pangan* 1. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992.
- Siegel, M. R., G. C. M. Latech, and M. C. Johnson. *Fungal Endophytes of Grasses*. *Ann. Rev. Phytopathology*. 25: 293-315. 1987.

- Suroya, L. F., *Aktivitas Antioksidan Tiga Kombinasi Ko-kultur Kapang Endofit dari Kunyit (Curcuma longa L.) dengan Metode DPPH Secara Kualitatif*. Bogor: IPB. 2016.
- Srikandace, Yoice. *Potensi Polisakarida Kapang Endofit Aspergillus sp. dari terumbu karang Seroja kol sebagai Sumber Antioksidan*. Bandung: SNIPS, 2015.
- Suharna dan Widyastutik. *Sifat Antagonistik Trichoderma sp. Terhadap Geotrichum candidum*. *Journal Mikrobiologi Tropika*. 1996.
- Taechowisan, T., Lu, C., Shen, Y., & Lumyong, S., 4-Arylcoumarins from endophytic *Streptomyces aureofaciens* CMUAc130 and their antifungal activity. *Annals of Microbiology*, 55, 63-66. 2005.
- Tahir, I., *Arti Penting kalibrasi Pada Proses Pengukuran Analitik: Aplikasi Pada Penggunaan PH Meter dan Spektrofotometer UV Vis*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2008.
- Veronica, V., Hasiani., Ahmad, I., Rijai, L. *Isolasi Jamur Endofit dan Produksi Metabolit Sekunder Antioksidan dari Daun Pacar (Lawsonia inermis L.)*. Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, Samarinda, 2015.
- Widyastuti., Kusuma, AK., Nurlaili., Sukmawat, F. *Aktivitas Antioksidan dan Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Stoberi (Fragaria x ananassa A.N. Duchesne)*. Sumatra Barat: Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukittinggi, 2016.
- Wasitatmadja, L.W. *Penunutan Ilmu Kosmetik dan Medik*. Jakarta: UI-Pres, 1997.
- Wijaya, J. *Potensi Ekstrak Metanol Daun Kapuk (Harmsiponax aculeatus) sebagai Obat Antimalaria*, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura, 2012.
- Wijaya, Eddy., *Isolasi dan Identifikasi Senyawa yang Aktif sebagai Antioksidan Hasil Bioproduksi Kapang Endofit Isolat CL.SMI.RF11 dari Rimpang Kunyit (Curcuma longa L.)*. Jakarta: Universitas Pancasila. 2014.
- Wibowo, Alvinia Evania., *Karakteristik Senyawa Kimia sebagai Antioksidan Hasil Bioproduksi Isolat K.Cl.Sb.A11 dari Akar Kunyit dalam Media PSB dengan Penambahan Yeast Extract*. Jakarta: Universitas Pancasila 2015.


Yusmawatina. The Experiment Antioxidan Activity of Aleuriten moluccana (L)
Willd Leaves Extract by DPPH Method. Pp 06, 2011.





LAMPIRAN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1 Alur Peneliti

Di ekstrak dengan
etil asetat




Ekstrak
Di uji aktivitas antioksidanya dengan regen DPPH



Lampiran 2 Hasil Uji Antagonis Isolat Cendawan Endofit

uji Antagonis isolat Cendawan Endofit *Trichoderma* sp., *Chrysosporium* sp.,
Aspergillus sp.

Konosorsium	Ulangan		Keterangan
<i>Trichoderma</i> sp., <i>Chrysosporium</i> sp., <i>Aspergillus</i> sp.			Antagonis
	<i>a</i>	<i>b</i>	

Gambar Karakteristik Isolat cendawan endofit *Trichoderma* sp., *Chrysosporium* sp., *Aspergillus* sp. (a) ulangan I, (b) ulangan II (Dok, Pribadi. 2018).

uji Antagonis isolat Cendawan Endofit *Trichoderma* sp., dan *Aspergillus* sp.,

Konosorsium	Ulangan		Keterangan
<i>Chrysosporium</i> sp., <i>Aspergillus</i> sp.			Antagonis
	<i>a</i>	<i>b</i>	

Uji Antagonis Isolat cendawan endofit *Trichoderma* sp., *Aspergillus* sp., (a) ulangan I, (b) ulangan II (Dok, Pribadi. 2018).

uji Antagonis isolat Cendawan Endofit *Trichoderma* sp., *Aspergillus* sp.

Konosorsium	Ulangan		Keterangan
<i>Trichoderma</i> sp., <i>Aspergillus</i> sp.			Antagonis

Uji Antagonis Isolat cendawan endofit *Chrysosporium* sp. dan *Aspergillus* sp., (a) ulangan I, (b) ulangan II (Dok, Pribadi. 2018).

uji Antagonis isolat Cendawan Endofit *Trichoderma* sp., *Chrysosporium* sp.

Konosorsium	Ulangan		Keterangan
<i>Trichoderma</i> sp., <i>Chrysosporium</i> sp.,			Tidak Antagonis

Gambar IV.1. Uji Antagonis Isolat cendawan endofit *Chrysosporium* sp. dan *Trichoderma* sp., (a) ulangan I, (b) ulangan II (Dok, Pribadi. 2018).

- **Keterangan**

- Kode isolat 3 (*Chrysosporium* sp)
- Kode isolat 4 (*Trichoderma* sp)
- Kode AS (*Aspergillus* sp)
- Uji Antagonis dilakukan dua kali (Diplo)

Lampiran 3 Hasil Kurva Pertumbuhan Konsorsium Isolat Cendawan Endofit

a. Konsorsium I *Trichoderma* sp., *Chrysosporium* sp., *Aspergillus* sp.

Hari/ Tanggal	Bobot Kertas Saring	Bobot Kertas Saring – Kertas Saring	Hasil
Kamis 19-April 2018 (H.2)	0,2539 gram	0,5805 gram	0,3266 gram
Sabtu 21-April 2018 (H.4)	0,2725 gram	0,5110 gram	0,3285 gram
Senin 23 April 2018 (H.6)	0,2621 gram	0,6080 gram	0,3459 gram
Rabu 25 April 2018 (H.8)	0,2766 gram	0,9913 gram	0,7147 gram
Jumad 27 April 2018 (H.10)	0,2602 gram	0,3661 gram	0,1059 gram
Minggu 29 April 2018 (H.12)	0,2739 gram	0,5337 gram	0,2598 gram
Selasa 01 Mei 2018 (H.14)	0,26120 gram	0,5545 gram	0,2930 gram
Kamis 03 Mei 2018 (H.16)	0,2670 gram	0,6666 gram	0,39960 gram
Sabtu 05 April 2018 (H.18)	0,2704 gram	0,4926 gram	0,2225 gram
Senin 07 Mei 2018 (H.20)	0,2869 gram	0,3206 gram	0,0337 gram

b. Konsorsium II Cendawan Endofit *Trichoderma* sp., *Aspergillus* sp.

Hari/ Tanggal	Bobot Kertas Saring	Bobot Kertas Saring – Kertas Saring	Hasil
Kamis 19-April 2018 (H.2)	0,2614 gram	0,5432 gram	0,2818 gram
Sabtu 21-April 2018 (H.4)	0,2584 gram	0,6385 gram	0,3801 gram
Senin 23 April 2018 (H.6)	0,2721 gram	0,7002 gram	0,4281 gram
Rabu 25 April 2018 (H.8)	0,2717 gram	0,7128 gram	0,4411 gram

Jumad 27 April 2018 (H.10)	0,2619 gram	0,7397 gram	0,4778 gram
Minggu 29 April 2018 (H.12)	0,2712 gram	0,6943 gram	0,4231 gram
Selasa 01 Mei 2018 (H.14)	0,2592 gram	0,6772 gram	0,4180 gram
Kamis 03 Mei 2018 (H.16)	0,2757 gram	0,6611 gram	0,3854 gram
Sabtu 05 April 2018 (H.18)	0,2589 gram	0,6251 gram	0,3662 gram
Senin 07 Mei 2018 (H.20)	0,2712 gram	0,6281 gram	0,3569 gram

c. Konsorsium III Isolat Cendawan Endofit *Asparagillus* sp., *Chrysosporium* sp.,

Hari/ Tanggal	Bobot Kertas Saring	Bobot Kertas Saring – Kertas Saring	Hasil
Kamis 19-April 2018 (H.2)	0,2567 gram	0,5859 gram	0,3292 gram
Sabtu 21-April 2018 (H.4)	0,2574 gram	0,6528 gram	0,3954 gram
Senin 23 April 2018 (H.6)	0,2621 gram	0,6886 gram	0,4265 gram
Rabu 25 April 2018 (H.8)	0,2627 gram	0,7873 gram	0,5246 gram
Jumad 27 April 2018 (H.10)	0,2659 gram	0,8411 gram	0,5752 gram
Minggu 29 April 2018 (H.12)	0,2590 gram	0,9753 gram	0,7163 gram
Selasa 01 Mei 2018 (H.14)	0,2590 gram	0,8692 gram	0,6102 gram
Kamis 03 Mei 2018 (H.16)	0,2520 gram	0,8724 gram	0,6204 gram
Sabtu 05 April 2018 (H.18)	0,2555 gram	0,6013 gram	0,3458 gram
Senin 07 Mei 2018 (H.20)	0,2593 gram	0,5652 gram	0,3059 gram

- d. Konsorsium IV Isolat Cendawan Endofit *Trichoderma* sp., *Chrysosporium* sp.,

Hari/ Tanggal	Bobot Kertas Saring	Bobot Kertas Saring – Kertas Saring	Hasil
Kamis 19-April 2018 (H.2)	0,2571 gram	0,6577 gram	0,4006 gram
Sabtu 21-April 2018 (H.4)	0,2675 gram	0,7603 gram	0,4151 gram
Senin 23 April 2018 (H.6)	0,2539 gram	0,7467 gram	0,4928 gram
Rabu 25 April 2018 (H.8)	0,2622 gram	0,8153 gram	0,5531 gram
Jumad 27 April 2018 (H.10)	0,2660 gram	0,8727 gram	0,6067 gram
Minggu 29 April 2018 (H.12)	0,2775 gram	0,8959 gram	0,6184 gram
Selasa 01 Mei 2018 (H.14)	0,2667 gram	0,6261 gram	0,3594 gram
Kamis 03 Mei 2018 (H.16)	0,2688 gram	0,5872 gram	0,3184 gram
Sabtu 05 April 2018 (H.18)	0,2923 gram	0,6012 gram	0,3089 gram
Senin 07 Mei 2018 (H.20)	0,2701 gram	0,5460 gram	0,2759 gram

Keterangan

- Tanggal inokulasi isolat cendawan endofit Selasa- 17/ April/2018.


Rumus

Bobot Biomassa


= Bobot Kertas saring – Bobot kertas saring

+ biomassa kering = hasil.


Lampiran 4 : Skema Kerja Peremajaan Konsorsium Isolat Cendawan Endofit




**Lampiran 5 : Skema Kerja Pembuatan Media Fermentasi Konsorsium Isolat
Cendawan Endofit**




Lampiran 6 : Skema Kerja Fermentasi Konsorsium Isolat Cendawan Endofit



Lampiran 7 : Sekema Kerja Ekstraksi Konsorsium Isolat Cendawan Endofit.

Lampiran 8 : Lampiran Kerja Uji Aktivitas Antioksidan Isolat Cendawan

Endofit Ekstra Filtrat



Nilai % Hambat



Persamaan regresi $Y = bx + a$



Nilai IC_{50}

Lampiran 9 : Perhitungan Konsentrasi DPPH

$$M = \frac{\text{bobot DPPH (g)}}{Mr.DPPH} \times \frac{1000}{V} = \frac{0,0079}{V394,32} \times \frac{1000}{50} = 0,0004M = 0,4 Mm$$

Lampiran 10 Perhitungan Seri Konsetrasi Ekstrak

- a. Konsentasi larutan induk

$$\text{Konsentrasi} = 2,5 \text{ mg} \times \frac{1000}{5 \text{ mL}} = 500 \text{ ppm}$$

- b. Konsetrasi 5 ppm

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu\text{L} \times 5 \text{ ppm}}{500 \text{ ppm}} = 30 \mu\text{L}$$

- c. Konsentasi 10 ppm

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu\text{L} \times 10 \text{ ppm}}{500 \text{ ppm}} = 60 \mu\text{L}$$

- d. Konsentasi 25 ppm

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu\text{L} \times 25 \text{ ppm}}{500 \text{ ppm}} = 150 \mu\text{L}$$

- e. Konsetrasi 50 ppm

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu\text{L} \times 50 \text{ ppm}}{500 \text{ ppm}} = 300 \mu\text{L}$$

- f. Konsetrasi 100 ppm

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu\text{L} \times 100 \text{ ppm}}{500 \text{ ppm}} = 600 \mu\text{L}$$

Lampiran 11 : Perhitungan Seri Konsentrasi Vitamin C

- a. Konsentrasi Larutan induk (500 ppm)

$$\text{Konsentrasi} = 2,5 \text{ mg} \frac{1000}{5 \text{ mL}} = 500 \text{ ppm}$$

- b. Konsentrasi 3 ppm

$$V_1 = \frac{V_2 [n]_1}{[n]_2} = \frac{3000 \mu\text{L} \times 3 \text{ ppm}}{500 \text{ ppm}} = 18 \mu\text{L}$$

- c. Konsentrasi 6 ppm

$$V_1 = \frac{V_2 [n]_1}{[n]_2} = \frac{3000 \mu\text{L} \times 6 \text{ ppm}}{500 \text{ ppm}} = 36 \mu\text{L}$$

- d. Konsentrasi 9 ppm

$$V_1 = \frac{V_2 [n]_1}{[n]_2} = \frac{3000 \mu\text{L} \times 9 \text{ ppm}}{500 \text{ ppm}} = 54 \mu\text{L}$$

- e. Konsentrasi 12 ppm

$$V_1 = \frac{V_2 [n]_1}{[n]_2} = \frac{3000 \mu\text{L} \times 12 \text{ ppm}}{500 \text{ ppm}} = 72 \mu\text{L}$$

- f. Konsentrasi 15 ppm

$$V_1 = \frac{V_2 [n]_1}{[n]_2} = \frac{3000 \mu\text{L} \times 15 \text{ ppm}}{500 \text{ ppm}} = 90 \mu\text{L}$$

Lampiran 12 : Bobot Ekstrak Filtrat Konsorsium Isolat Cendawan Endofit

Konsorsium	Bobot Botol Fial	Bobot Botol Fial + Ekstrak Filtrat	Bobot Ekstrak Filtart
Konsorsium I Hari Ke-12	13,5885 gram	13,6413 gram	0,0528 gram
Konsorsium I Hari Ke-14	10,4384 gram	10,4946 gram	0,0562 gram
Konsorsium II Hari Ke-12	11,5145 gram	11,7259 gram	0,2114 gram
Konsorsium II Hari Ke-14	11,5145 gram	11,6151 gram	0,1006 gram
Konsorsium III Hari Ke 14	9,8767 gram	9,9232 gram	0,0465 gram
Konsorsium III Hari Ke-16	21,0405 gram	21,0850 gram	0,0445 gram
Konsorsium IV Hari Ke-10	11,6447 gram	11,6818 gram	0,0371 gram
Konsorsium IV Hari Ke-12	10,0340 gram	10,1107 gram	0,0767 gram

Lampiran 13 Perubahan Warna Uji DPPH Konsorsium Isolat Cendawan Endofit

Konsorsium	M A K A Konsentrasi					DPPH
	5 ppm	10 ppm	25 ppm	50 ppm	100 ppm	
KI Hari ke-12	++	++	++	++	++	+
KI Hari ke-14	++	++	++	++	++	
KII Hari ke-12	++	++	++	+++	+++	
KII Hari ke-14	++	++	++	+++	+++	

KIII Hari ke-14	++	++	++	+++	+++	
KIII Hari ke-16	++	++	++	++	+++	
KIV Hari ke-10	++	+++	+++	+++	+++	
KIV Hari ke-12	++	++	++	+++	+++	
Vitamin C						
	3 ppm	6 ppm	9 ppm	12 ppm	15 ppm	
KONSENTRASI	++	+++	+++	+++	+++	

Keterangan :

- **K = Konsorsium**
- **Blanko (DPPH)**
- **+ = ungu**
- **++ = ungu pudar**
- **+++ = kuning bening**

Lampiran 14 : Perhitungan Konsentrasi Ekstak Filtrak Konsorsium Isolat

Cendawan Endofit

No	Konsorsium	Bobot ekstrak (mg)	Konsorsium dalam 2 mL pelarut (ppm)	Volume ekstrak (μL) dalam 100 ppm
1	Konsorsium I Hari Ke-12	52,8	26400	11,5
2	Konsorsium I Hari Ke-14	56,2	41300	7,1
3	Konsorsium II Hari Ke-12	211,4	105700	2,8
4	Konsorsium II Hari Ke-14	100,6	50300	5,9
5	Konsorsium III Hari Ke 14	46,5	23250	12,9
6	Konsorsium III Hari Ke-16	44,5	22250	13,4
7	Konsorsium IV Hari Ke-10	37,1	18550	16,1
8	Konsorsium IV Hari Ke-12	76,7	38350	7,8

- Perhitungan Konsentrasi ekstrak filtat dalam 2 mL metanol p.a

$$\text{Konsentrasi (ppm)} = \text{Bobot ekstrak (mg)} \frac{1000}{V \text{ (mL)}} = \text{pmm}$$

Konsorsium I Hari Ke-12

$$\text{Konsentrasi} = 52,8 \text{ mg} \frac{1000}{2 \text{ mL}} = 26400 \text{ pmm}$$

Konsorsium I Hari Ke-14

$$\text{Konsentrasi} = 56,2 \text{ mg} \frac{1000}{2 \text{ mL}} = 41300 \text{ pmm}$$

Konsorsium II Hari Ke-12

$$Konsentrasi = 211,4 \text{ mg} \frac{1000}{2 \text{ mL}} = 105700 \text{ ppm}$$

Konsorsium II Hari Ke 14

$$Konsentrasi = 100,6 \text{ mg} \frac{1000}{2 \text{ mL}} = 50300 \text{ ppm}$$

Konsorsium III Hari Ke-14

$$Konsentrasi = 46,5 \text{ mg} \frac{1000}{2 \text{ mL}} = 23250 \text{ ppm}$$

Konsorsium III Hari Ke-16

$$Konsentrasi = 44,5 \text{ mg} \frac{1000}{2 \text{ mL}} = 22250 \text{ ppm}$$

Konsorsium IV Hari Ke-10

$$Konsentrasi = 37,1 \text{ mg} \frac{1000}{2 \text{ mL}} = 18550 \text{ ppm}$$

Konsorsium IV Hari Ke-12

$$Konsentrasi = 76,7 \text{ mg} \frac{1000}{2 \text{ mL}} = 38350 \text{ ppm}$$

- Perhitungan volume ekstrak filfat 100 ppm dalam 3 mL metanol p.a

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \mu L$$

Konsorsium I Hari Ke-12

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu L \times 100 \text{ ppm}}{26400 \text{ ppm}} = 11,5 \mu L$$

Konsorsium I Hari Ke-14

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu L \times 100 ppm}{41300 ppm} = 7,2\mu L$$

Konsorsium II Hari Ke-12

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu L \times 100 ppm}{105700 ppm} = 2,8\mu L$$

Konsorsium II Hari Ke-14

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu L \times 100 ppm}{50300 ppm} = 5,9\mu L$$

Konsorsium III Hari Ke-14

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu L \times 100 ppm}{23250 ppm} = 12,9\mu L$$

Konsorsium III Hari Ke 16

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu L \times 100 ppm}{22250 ppm} = 13,4\mu L$$

Konsorsium IV Hari Ke-10

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu L \times 100 ppm}{18550 ppm} = 16,1\mu L$$

Konsorsium IV Hari Ke-12

$$V1 = \frac{V2 [n]1}{[n]2} = \frac{3000 \mu L \times 100 ppm}{38350 ppm} = 7,8\mu L$$

Lampiran 15 : Perhitungan % hambat ekstrak filtrat konsorsium Isolat

Cendawan Endofit

A. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Filtrat Konsorsium I Hari Ke- 12 Isolat

Cendawan Endofit

Blanko : Abs I = 0,780: Abs II = 0,780 ; Rata-rata = 0,780

	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-Rata Absorbansi	% hambat	IC50 (ppm)
		Abs I	Abs II			
Larutan Uji						
1	5	0,765	0,745	0,755	3,205	65,938
2	10	0,721	0,685	0,6985	10,448	
3	25	0,650	0,620	0,635	18,589	
4	50	0,512	0,325	0,4185	46,346	
5	100	0,215	0,235	0,225	71,153	
Vitamin C						
1	3	0,489	0,520	0,5045	35,320	2,061
2	6	0,095	0,165	0,130	83,333	
3	9	0,028	0,030	0,029	96,282	
4	12	0,025	0,021	0,023	97,051	
5	15	0,020	0,022	0,021	97,308	

- **Perhitungan % hambat Larutan Uji**

$$\% \text{ hambat} = \frac{\text{Abs. Blanko} - \text{Abs. Ekstrak}}{\text{Abs. Blanko}} \times 100 \%$$

1. Konsentrasi 5 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,755}{0,780} \times 100\% = 3,205\%$$

2. Konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,6985}{0,780} \times 100\% = 10,448 \%$$

3. Konsentrasi 25 ppm


$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,635}{0,780} \times 100\% = 18,589\%$$

4. Konsentrasi 50 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,4185}{0,780} \times 100\% = 46,346 \%$$

5. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,225}{0,780} \times 100\% = 71,153 \%$$



Perhitungan IC_{50} Konsorsium I hari Ke-12

Persamaan regresi linear : $Y = 0,7177x + 2,676$

$$IC\ 50 = \frac{50 - \text{intersept}}{\text{slope}} = \frac{50 - 2,676}{0,7177} = 65,938\%$$

- **Perhitungan % hambat Larutan Kontrol positif**

$$\% \text{ hambat} = \frac{\text{Abs. Blanko} - \text{Abs. Vitamin C}}{\text{Abs. Blanko}} \times 100\%$$

1. Konsentrasi 3 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,5045}{0,780} \times 100\% = 35,320\%$$

2. Konsentrasi 6 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,130}{0,780} \times 100\% = 83,333\%$$

3. Konsentrasi 9 ppm


$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,029}{0,780} \times 100\% = 96,282\%$$

4. Konsentrasi 12 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,023}{0,780} \times 100\% = 97,051\%$$

5. Konsentrasi 15 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,021}{0,780} \times 100\% = 97,308\%$$



Perhitungan IC_{50} Kontrol Positif

Persamaan regresi linear : $Y = 4,59846x + 40.522$

$$IC_{50} = \frac{50 - \text{intersept}}{\text{slope}} = \frac{50 - 40.522}{4,59846} = 2,061\%$$

B. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Filtrat Konsorsium I Hari Ke- 14 Isolat

Cendawan Endofit

Blanko : Abs I = 0,780; Abs II = 0,780 ; Rata-rata = 0,780

No	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-Rata Absorbansi	% hambat	IC50 (ppm)
		Abs I	Abs II			
Larutan Uji						
1	5	0,754	0,782	0,768	1,538	62,531
2	10	0,701	0,658	0,6795	12,884	
3	25	0,611	0,601	0,606	22,307	
4	50	0,525	0,321	0,423	45,769	

5	100	0,214	0,169	0,1915	75,448	
Vitamin C						
1	3	0,489	0,520	0,5045	35,320	2,061
2	6	0,095	0,165	0,130	83,333	
3	9	0,028	0,030	0,029	96,282	
4	12	0,025	0,021	0,023	97,051	
5	15	0,020	0,022	0,021	97,308	

- **Perhitungan % hambat Larutan Uji**

$$\% \text{ hambat} = \frac{\text{Abs. Blanko} - \text{Abs. Ekstrak}}{\text{Abs. Blanko}} \times 100 \%$$

1. Konsentrasi 5 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,768}{0,780} \times 100\% = 1,538\%$$

2. Konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,6795}{0,780} \times 100\% = 12,884\%$$

3. Konsentrasi 25 ppm


$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,606}{0,780} \times 100\% = 22,307\%$$

4. Konsentrasi 50 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,423}{0,780} \times 100\% = 45,769 \%$$

5. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,1915}{0,780} \times 100\% = 75,448 \%$$



Perhitungan IC_{50} Konsorsium I hari ke-14

Persamaan regresi linear : $Y = 0,7505x + 3,0703$

$$IC_{50} = \frac{50 - \text{intersept}}{\text{slope}} = \frac{50 - 3,0703}{0,7505} = 62,531\%$$

C. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Filtrat Konsorsium II Hari Ke- 12 Isolat Cendawan Endofit

Blanko : Abs I = 0,780: Abs II = 0,780 ; Rata-rata = 0,780

No	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-Rata Absorbansi	% hambat	IC50 (ppm)
		Abs I	Abs II			
Larutan Uji						
1	5	0,735	0,742	0,7385	5,320	

2	10	0,623	0,652	0,6375	18,269	52,924
3	25	0,516	0,438	0,477	38,846	
4	50	0,345	0,421	0,383	50,897	
5	100	0,165	0,125	0,145	81,410	
Vitamin C						
1	3	0,489	0,520	0,5045	35,320	2,061
2	6	0,095	0,165	0,130	83,333	
3	9	0,028	0,030	0,029	96,282	
4	12	0,025	0,021	0,023	97,051	
5	15	0,020	0,022	0,021	97,308	

- **Perhitungan % hambat Larutan Uji**

$$\% \text{ hambat} = \frac{\text{Abs. Blanko} - \text{Abs. Ekstrak}}{\text{Abs. Blanko}} \times 100 \%$$

1. Konsentrasi 5 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,7385}{0,780} \times 100\% = 5,320 \%$$

2. Konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,6375}{0,780} \times 100\% = 18,269 \%$$

3. Konsentrasi 25 ppm


$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,477}{0,780} \times 100\% = 38,846\%$$

4. Konsentrasi 50 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,383}{0,780} \times 100\% = 50,897 \%$$

5. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,145}{0,780} \times 100\% = 81,410 \%$$



Perhitungan IC_{50} Konsorsium II hari ke-12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ALAUDDIN
 PERSAMAAN REGRESI LINEAR : $Y = 0,7406x + 10,804$

$$IC_{50} = \frac{50 - \text{intersept}}{\text{slope}} = \frac{50 - 10,804}{0,7406} = 52,924\%$$

D. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Filtrat Konsorsium II Hari Ke- 14 Isolat

Cendawan Endofit

Blanko : Abs 1 = 0,780 Abs II = 0,780 ; Rata-rata = 0,780

No	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-Rata	% hambat	IC50 (ppm)
		Abs I	Abs II	Absorbansi		
Larutan Uji						
1	5	0,745	0,742	0,7435	4,679	53,172
2	10	0,657	0,635	0,645	17,307	
3	25	0,516	0,483	0,477	38,846	
4	50	0,395	0,296	0,3455	55,705	
5	100	0,157	0,181	0,169	78,33	
Vitamin C						
1	3	0,489	0,520	0,5045	35,320	2,061
2	6	0,095	0,165	0,130	83,333	
3	9	0,028	0,030	0,029	96,282	
4	12	0,025	0,021	0,023	97,051	
5	15	0,020	0,022	0,021	97,308	

- **Perhitungan % hambat Larutan Uji**

$$\% \text{ hambat} = \frac{\text{Abs. Blanko} - \text{Abs. Ekstrak}}{\text{Abs. Blanko}} \times 100 \%$$

1. Konsentrasi 5 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,7435}{0,780} \times 100\% = 4,679 \%$$

2. Konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,645}{0,780} \times 100\% = 17,307 \%$$

3. Konsentrasi 25 ppm


$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,477}{0,780} \times 100\% = 38,846\%$$

4. Konsentrasi 50 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,3455}{0,780} \times 100\% = 55,705 \%$$

5. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,169}{0,780} \times 100\% = 78,333 \%$$



Perhitungan IC_{50} Konsorsium II hari ke-14

Persamaan regresi linear : $Y = 0,7266x + 11.365$

$$IC\ 50 = \frac{50 - \text{intersept}}{\text{slope}} = \frac{50 - 11,365}{0,7266} = 53,172\%$$

E. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Filtrat Konsorsium III Hari Ke- 14 Isolat

Cendawan Endofit

Blanko : Abs I = 0,780: Abs II = 0,780 ; Rata-rata = 0,780

No	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-Rata	% hambat	IC50 (ppm)
		Abs I	Abs II	Absorbansi		
Larutan Uji						
1	5	0,701	0,732	0,7165	8,141	58,636
2	10	0,652	0,645	0,6485	16,858	
3	25	0,521	0,411	0,466	40,256	
4	50	0,561	0,621	0,491	37,051	
5	100	0,211	0,125	0,168	78,465	
Vitamin C						
1	3	0,489	0,520	0,5045	35,320	2,016
2	6	0,095	0,165	0,130	83,333	
3	9	0,028	0,030	0,029	96,282	
4	12	0,025	0,021	0,023	97,051	
5	15	0,020	0,022	0,021	97,308	

- **Perhitungan % hambat Larutan Uji**

$$\% \text{ hambat} = \frac{\text{Abs. Blanko} - \text{Abs. Ekstrak}}{\text{Abs. Blanko}} \times 100 \%$$

1. Konsentrasi 5 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,7165}{0,780} \times 100\% = 8,141 \%$$

2. Konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,6485}{0,780} \times 100\% = 16,858 \%$$

3. Konsentrasi 25 ppm


$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,466}{0,780} \times 100\% = 40,256 \%$$

4. Konsentrasi 50 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,491}{0,780} \times 100\% = 37,051 \%$$

5. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,168}{0,780} \times 100\% = 78,465 \%$$



Perhitungan IC_{50} Konsorsium III hari ke-14

Persamaan regresi linear : $Y = 0,6709x + 10,661$

$$IC\ 50 = \frac{50 - \text{intersept}}{\text{slope}} = \frac{50 - 10,661}{0,6709} = 53,172\%$$

F. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Filtrat Konsorsium III Hari Ke- 16 Isolat

Cendawan Endofit

Blanko : Abs I = 0,780; Abs II = 0,780 ; Rata-rata = 0,780

No	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-Rata Absorbansi	% hambat	IC50 (ppm)
		Abs I	Abs II			
Larutan Uji						
1	5	0,711	0,692	0,7015	10,064	50,318
2	10	0,745	0,589	0,667	14,487	
3	25	0,625	0,321	0,473	39,358	
4	50	0,663	0,121	0,392	49,743	
5	100	0,132	0,062	0,097	87,564	
Vitamin C						
1	3	0,489	0,520	0,5045	35,320	2,061
2	6	0,095	0,165	0,130	83,333	
3	9	0,028	0,030	0,029	96,282	
4	12	0,025	0,021	0,023	97,051	
5	15	0,020	0,022	0,021	97,308	

- **Perhitungan % hambat Larutan Uji**

$$\% \text{ hambat} = \frac{\text{Abs. Blanko} - \text{Abs. Ekstrak}}{\text{Abs. Blanko}} \times 100 \%$$

1. Konsentrasi 5 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,7015}{0,780} \times 100\% = 10,064\%$$

2. Konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,667}{0,780} \times 100\% = 14,487 \%$$

3. Konsentrasi 25 ppm


$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,473}{0,780} \times 100\% = 39,358 \%$$

4. Konsentrasi 50 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,392}{0,780} \times 100\% = 49,743 \%$$

5. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,097}{0,780} \times 100\% = 87,564 \%$$



Perhitungan IC_{50} Konsorsium III hari ke-16

Persamaan regresi linear : $Y = 0,7921x + 10,143$

$$IC\ 50 = \frac{50 - \text{intersept}}{\text{slope}} = \frac{50 - 10,143}{0,7921} = 50,318\%$$

G. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Filtrat Konsorsium IV Hari Ke- 10 Isolat

Cendawan Endofit

Blanko : Abs I = 0,780; Abs II = 0,780 ; Rata-rata = 0,780

No	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-Rata Absorbansi	% hambat	IC50 (ppm)
		Abs I	Abs II			
Larutan Uji						
1	5	0,625	0,523	0,574	26,410	36,011
2	10	0,523	0,501	0,512	34,385	
3	25	0,423	0,411	0,417	46,538	
4	50	0,312	0,326	0,319	59,102	
5	100	0,129	0,028	0,0785	89,935	
Vitamin C						
1	3	0,489	0,520	0,5045	35,320	2,061
2	6	0,095	0,165	0,130	83,333	
3	9	0,028	0,030	0,029	96,282	
4	12	0,025	0,021	0,023	97,051	
5	15	0,020	0,022	0,021	97,308	

- **Perhitungan % hambat Larutan Uji**

$$\% \text{ hambat} = \frac{\text{Abs. Blanko} - \text{Abs. Ekstrak}}{\text{Abs. Blanko}} \times 100 \%$$

1. Konsentrasi 5 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,574}{0,780} \times 100\% = 26,410 \%$$

2. Konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,512}{0,780} \times 100\% = 34,358 \%$$

3. Konsentrasi 25 ppm


$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,417}{0,780} \times 100\% = 46,538 \%$$

4. Konsentrasi 50 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,319}{0,780} \times 100\% = 59,102 \%$$

5. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,0785}{0,780} \times 100\% = 89,935 \%$$



Perhitungan IC_{50} Konsorsium IV hari ke-10

Persamaan regresi linear : $Y = 0,6379x + 27,028$

$$IC_{50} = \frac{50 - \text{intersept}}{\text{slope}} = \frac{50 - 27,028}{0,6379} = 36,011\%$$

H. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Filtrat Hasil Konsorsium IV Hari Ke- 12

Isolat Cendawan Endofit

Blanko : Abs I = 0,780: Abs II = 0,780 ; Rata-rata = 0,780

No	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi		Rata-Rata Absorbansi	% hambat	IC50 (ppm)
		Abs I	Abs II			
Larutan Uji						
1	5	0,701	0,625	0,663	15	47,802
2	10	0,728	0,453	0,5905	24,294	
3	25	0,625	0,325	0,475	39,102	
4	50	0,251	0,412	0,3315	57,5	
5	100	0,129	0,099	0,144	81,538	
Vitamin C						
1	3	0,288	0,288	0,288	30,424	2,061
2	6	0,025	0,098	0,0615	85,144	
3	9	0,040	0,140	0,09	78,260	
4	12	0,026	0,012	0,019	95,410	
5	15	0,021	0,001	0,011	97,342	

- **Perhitungan % hambat Larutan Uji**

$$\% \text{ hambat} = \frac{\text{Abs. Blanko} - \text{Abs. Ekstrak}}{\text{Abs. Blanko}} \times 100 \%$$

1. Konsentrasi 5 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,663}{0,780} \times 100\% = 15 \%$$

2. Konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,5905}{0,780} \times 100\% = 24,294 \%$$

3. Konsentrasi 25 ppm


$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,475}{0,780} \times 100\% = 39,102 \%$$

4. Konsentrasi 50 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,3315}{0,780} \times 100\% = 57,5\%$$

5. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ hambat} = \frac{0,780 - 0,114}{0,780} \times 100\% = 81,358 \%$$



Perhitungan IC_{50} Konsorsium IV hari ke-12

Persamaan regresi linear : $Y = 0,6736x + 17,89$

$$IC_{50} = \frac{50 - \text{intersept}}{\text{slope}} = \frac{50 - 17,89}{0,6736} = 47,802\%$$

