

**PENGARUH VARIASI KONSENTRASI EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH
PISANG KEPOK (*Musa paradisiaca*) DALAM BENTUK SEDIAAN GEL
MENGUNAKAN BASIS HPMC TERHADAP PENYEMBUHAN
LUKA SAYAT PADA KELINCI (*Oryctolagus cuniculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HASNIAR
NIM: 70100114025

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hasniar
Nim : 70100114025
Tempat/Tgl Lahir : Soppeng, 1 Januari 1996
Jur/ Prodi Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/ Program : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Abdul Kadir Dg. Suro No 171 Samata-Gowa
Judul : Pengaruh Variasi Konsentrasi Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*) dalam Bentuk Sediaan Gel Menggunakan Basis HPMC Terhadap Penyembuhan Luka Sayat pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 15 Agustus 2018

Penyusun,

Hasniar
NIM. 70100114025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Variasi Konsentrasi Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*) dalam Bentuk Sediaan Gel Menggunakan Basis HPMC Terhadap Penyembuhan Luka Sayat pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)” yang disusun oleh Hasniar, Nim: 70100114025, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahnkan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 15 Oktober 2018** yang bertepatan dengan **3 Dzulhijjah 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 15 Oktober 2018 M
3 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekertaris	: Haeria, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt	(.....)
Penguji I	: Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Penguji II	: Dr. Rosmini, S.Ag., M.Th.I	(.....)



Dr.dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19850203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah nikmat kesehatan, kekuatan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Rasa syukur yang tak terhingga kepadaNya atas segala hidayah dan karunia yang penulis dapatkan. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau dan sahabat beliau.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ‘sarjana farmasi’ di bidang farmasi. Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan ke depannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Penulis sadari, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Banyak terima kasih penulis haturkan kepada pihak yang telah membantu selama penulis menjalani pendidikan kuliah hingga selesainya Terima kasih yang setulusnya kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda H.Sarifuddin Dupe dan Ibunda tercinta Hj.Yulianti atas segala doa, kesabaran, dorongannya yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Kepada adik-adikku Irna Sari dan Yulian Ferdi, terima kasih untuk semangat, dukungan dan senyuman terindah kalian.

Terima kasih pula kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan (bidang akademik), Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan (bidang administrasi dan keuangan), dan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Haeria, S.Si., M.Si., selaku Ketua Program Studi Farmasi UIN Alauddin Makassar.
5. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., selaku sekretaris jurusan Farmasi
6. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt., Pembimbing I penelitian. bagi penulis telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
7. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt., selaku pembimbing II penelitian bagi penulis yang sangat banyak memberi saran dan arahan selama penelitian.
8. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt, selaku penguji Kompetensi.
9. Dr. Rosmini, S.Ag., M.Th.I, selaku pembimbing dan penguji agama dalam penyusunan skripsi penelitian bagi penulis.
10. Seluruh dosen, staf, laboran, civitas dan keluarga besar Farmasi terkhusus teman seperjuangan angkatan 2014 GALENICA atas sokongan dan informasi yang diberikan kepada penulis saat melaksanakan penelitian.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini mendapat ridha dari Allah swt. dan memberi manfaat bagi masyarakat dan penikmat ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis sendiri. Aamiin ya Rabbal Aalamin.

Samata-Gowa, 15 Agustus 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Hasniar
NIM.70100114025

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kulit	10
1. Fungsi Kulit	10
2. Anatomi Fisiologi Kulit	11
B. Luka	14
1. Definisi Kulit	14
2. Jenis-jenis Luka	15
3. Fase Penyembuhan Luka	18
C. Pisang.....	22
D. Ekstraksi.....	24
1. Pengertian Ekstraksi.....	24

2. Jenis-jenis Metode Ekstraksi.....	25
E. Hewan Uji	26
1. Klasifikasi Hewan Coba	27
2. Morfologi Hewan Coba (Kelinci).....	27
F. Sediaan Gel	29
1. Definisi Gel.....	29
2. Basis Gel	30
G. Komposisi Sediaan Gel.....	32
1. HPMC	32
2. Propilen Glikol.....	33
3. Metil Paraben	34
4. Aquadest	35
H. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
1. Lokasi Penelitian.....	41
2. Waktu Penelitian.....	41
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Sampel.....	41
E. Instrumen Penelitian	42
1. Alat.....	42
2. Bahan	42
F. Prosedur Kerja	42
1. Penyiapan Sampel.....	42
2. Metode Ekstraksi	43
3. Uji Identifikasi Senyawa Golongan	43
4. Pembuatan Sediaan Gel	45
5. Uji Perlakuan	45
6. Uji Stabilitas Sediaan Gel	46

7. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	66
RIWAYAT HIDUP	88



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Formulasi Gel	45
2. Rendamen Ekstrak yang diperoleh dari maserasi	48
3. Hasil Pengamatan Identifikasi Golongan Senyawa	48
4. Efek Penyembuhan Luka Sayat	49
5. Hasil Pengamatan Organoleptik Gel Ekstrak Etanol Kulit Pisang Kepok ..50	
6. Hasil Pengukuran pH Gel Ekstrak Etanol Kulit Pisang Kepok	50
7. Hasil Pengukuran Viskositas Gel Ekstrak Etanol Kulit Pisang Kepok	50
8. Hasil Pengukuran Daya Sebar Gel Ekstrak Etanol Kulit Pisang Kepok	50
9. Hasil Pengamatan Homogenitas Gel Ekstrak Etanol Kulit Pisang Kepok ..51	
10. Perubahan Panjang Luka Sayat pada Kelinci	72
11. Persentase Penyembuhan Luka Sayat Kelinci	73
12. Hubungan antara Formula dan Kecepatan Penutupan Luka	74
13. Analisis Ragam dengan Nila F Tabel	76
14. BNT (Beda Nyata Terkecil) Persentase Penyembuhan Luka	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pisang Kepok (<i>Musa paradisiaca</i>).....	22
2. Proses Ekstraksi Sampel	81
3. Uji Identifikasi Golongan Senyawa.....	82
4. Sediaan Gel Kulit Pisang Kepok dan Basis Gel	83
5. Uji Perlakuan	84
6. Pengamatan Homogenitas.....	85
7. Pengukuran Daya Sebar.....	86
8. Pengukuran pH	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Penyiapan Sampel Kulit Pisang Kepok	66
2. Ekstraksi Kulit Pisang Kepok	67
3. Uji Identifikasi Golongan	68
4. Pembuatan Sediaan Gel	69
5. Uji Perlakuan	70
6. Uji Stabilitas Fisik Sediaan	71
7. Perubahan Panjang Luka	72
8. Persentase Perubahan Panjang Luka Sayat	73
9. Perhitungan RAL, Hubungan antara Formula dan Kecepatan Penutupan Luka	74
10. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel	76
11. RAL antara Perlakuan dan Hari Penyembuhan	78
12. Perhitungan Persentase Rendamen Ekstrak	79
13. Perhitungan Pembuatan Gel	79
14. Gambar Penelitian	81

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dalam bentuk sediaan gel menggunakan basis HPMC terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dalam bentuk sediaan gel pada penyembuhan luka sayat kelinci.

Kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) diekstraksi lalu didapatkan ekstrak kulit buah pisang kepok kemudian diformulasi menjadi gel dengan menggunakan basis HPMC dengan varian konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 10%, 20%, dan 30%. Disamping itu juga digunakan basis gel sebagai kontrol negatif dan Bioplacenton® sebagai kontrol positif. Efek penyembuhan luka sayat menggunakan hewan uji kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) yang disayat menggunakan pisau bedah dengan melukai sepanjang 3 cm dan kedalaman 2 mm menembus lapisan kulit dermis.

Hasil analisis statistik dengan menggunakan metode Anova secara Rancangan Acak Lengkap menunjukkan bahwa sediaan gel kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dapat menurunkan dan menyembuhkan luka sayat pada kelinci dengan konsentrasi 30% yang menunjukkan efek penyembuhan luka sayat yang paling efektif.

Kata kunci : Luka sayat, Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*), Gel, Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

ABSTRACT

Research formulation and effectiveness test of gel dosage from ethanol extract from kepok banana peel (*Musa paradisiaca*) on healing wounds in rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) has been carried out. This study aims determine the effectiveness of kepok banana peel (*Musa paradisiaca*) in the gel dosage form on healing wounds of rabbits.

The kepok banana peel (*Musa paradisiaca*) was extracted and extracted banana fruit extract was then formulated into gel by using HPMC base with variant of extract concentration which was 10%, 20%, and 30%. It is also used as a negative control is base gel and Bioplacenton® as a positive control. The effect of healing the wound using a rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) test animal slashed using a scalpel with a 3 cm long wound and a depth of 2 mm through the dermis layer of skin.

Results of statistical analysis using the Anova method in Completely Randomized design showed that the kepok banana peel gel (*Musa paradisiaca*) may decrease and cuts heal in rabbit with a concentration of 30% which show the effective healing wound.

Keywords : Healing wound, Banana Peel (*Musa paradisiaca*), Gel, Rabbit (*Oryctolagus cuniculus*).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar. Luas kulit orang dewasa adalah 1,5 m² dengan berat kira-kira 15% berat badan. Kulit memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia. Salah satu fungsi utama dari kulit adalah proteksi terhadap gangguan yang berasal dari luar tubuh baik gangguan fisis ataupun mekanik (Wasitaatmadja, 2007). Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau rusaknya kesatuan/komponen jaringan dimana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Ketika luka timbul, beberapa efek akan muncul diantaranya hilangnya keseluruhan atau sebagian fungsi organ, respon stres simpatis, perdarahan dan pembekuan darah, kontaminasi bakteri dan kematian sel (Kaplan, 1992). Luka yang terjadi dapat berupa kerusakan pada epidermis saja, mengenai epidermis dan sebagian dermis bahkan menembus kulit melampaui dermis hingga mencapai jaringan subkutan, otot, bahkan tulang tergantung faktor penyebab terjadinya luka. (Judd, 2007).

Terdapat berbagai jenis luka tergantung dari penyebabnya, ada luka terbuka dan ada luka tertutup. Salah satu contoh dari luka terbuka yakni luka sayat. Luka sayat adalah luka yang terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam, misalnya terjadi akibat pembedahan. Luka sayat ditandai dengan ciri bagian luka terbuka, nyeri, panjang luka lebih besar daripada dalamnya luka (Berman, 2009).

Dalam penanganan luka tanaman tradisional memiliki daya tarik abadi dibandingkan dengan obat-obatan modern karena tanaman obat tradisional memiliki

sifat yang alamiah sehingga dianggap oleh masyarakat lebih aman dan baik. Obat tradisional mudah didapat karena tanpa resep dokter masyarakat dapat memilikinya. Selain itu, harganya relatif lebih murah dan memiliki efek samping yang minimal (Juckett, 2004). Keuntungan tanaman obat lainnya adalah tanaman obat dapat ditemukan secara luas (Agarwal, 2008). Beberapa tanaman obat yang dijadikan bahan untuk mempercepat proses penyembuhan luka, antara lain adalah pisang (*Musa paradisiaca* L), lidah buaya (*Aloe vera*), kunyit (*Curcuma longa* Linn.), dan pegagan (*Centella asiatica*).

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang potensi tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Demikian pula dengan tumbuh-tumbuhan ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara' Ayat 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (QS Asy-Syu'ara'/26: 7) (Kemenag RI Al-Quran dan Terjemahnya, 2009: 367).

Dalam kitab Tafsir al-Mishbah, dijelaskan bahwa ayat ini membuktikan melalui uraiannya keniscayaan ke-Esaan Allah SWT, karena aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaannya konsisten (Shihab, 2009: 189-190).

Dengan ayat Al-Quran di atas, kita sebagai makhluk hidup diperintahkan untuk melihat yang ada disekeliling kita terkait dengan begitu banyaknya ciptaan Allah yang terhampar dimuka bumi. Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk dan dibekali dengan akal agar kita bisa mempergunakan akal kita

untuk berpikir. Sebagai manusia yang memiliki akal dan menjadi seorang penuntut ilmu, maka hendaknya kita melakukan pengkajian ilmu seperti melakukan suatu penelitian terhadap macam-macam tumbuhan untuk mengetahui manfaat dan potensi dari suatu tumbuhan atau tanaman, salah satunya adalah pisang. Pisang adalah tanaman buah berupa herba yang berasal dari kawasan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Warintek, 2011). Di Indonesia, terdapat lebih dari 230 jenis pisang, tetapi yang umum dijual di pasaran dan umum dikonsumsi adalah pisang ambon lumut, pisang ambon kuning, pisang barangan, pisang raja, pisang kepok, pisang tanduk, dan pisang mas (Made Astawan, 2009).

Pemanfaatan buah pisang menyisakan kulit pisang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu produk olahan dari pisang adalah kripik pisang dan pisang goreng dan dengan produk samping dari olahan pisang tersebut adalah kulit pisang yang dibuang begitu saja. Kulit pisang tersebut ternyata memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah dapat digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Kulit buah pisang masak yang berwarna kuning kaya akan senyawa flavonoid, maupun senyawa fenolik yang lainnya, disamping banyak mengandung karbohidrat, mineral seperti kalium dan natrium, serta selulosa. Kulit pisang juga mengandung tanin, steroid dan saponin (Akpuaka, 2011).

Pada umumnya sediaan obat luka tersedia dalam bentuk cair atau setengah padat. Bentuk sediaan setengah padat seperti salep, krim dan gel. Gel menjadi pilihan untuk penyembuhan yang lebih baik karena memungkinkan waktu kontak obat yang lebih panjang dan melindungi luka dari kontaminasi luar. Sediaan obat luka dalam bentuk gel memberi kenyamanan pasien, karena kandungan airnya yang tinggi dapat

meredam inflamasi dan rasa panas. Dari sifat formulasi, sediaan gel lebih stabil, homogenitas tinggi dan viskositas yang mudah diatur. Untuk mendapatkan sediaan gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) yang baik dan efektif, perlu ditentukan konsentrasi ekstrak dalam gel yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian yang bertujuan mendapatkan pengobatan luka luar dalam bentuk sediaan gel yang memiliki efek samping kecil serta dapat meningkatkan nilai ekonomi kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*).



B. Rumusan Masalah

1. Apakah sediaan gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dapat memberi efek terhadap penyembuhan luka sayat terhadap kelinci?
2. Berapakah konsentrasi optimum sediaan gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) yang efektif menyembuhkan luka sayat pada kelinci?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sediaan gel ekstrak etanol kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) untuk membantu penyembuhan luka sayat terhadap kelinci?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sediaan gel ekstrak kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dapat memberi efek terhadap penyembuhan luka sayat terhadap kelinci?
2. Untuk mengetahui berapakah konsentrasi optimum sediaan gel ekstrak kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*) yang efektif menyembuhkan luka sayat pada kelinci?
3. Untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sediaan gel ekstrak etanol kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) untuk membantu penyembuhan luka sayat terhadap kelinci?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan menambah khasana ilmu pengetahuan tentang efektivitas sediaan gel dari ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) sebagai obat penyembuh luka sayat yang nantinya akan memeberikan manfaat terhadap pembuatan obat baru.

2. Secara metodologi

Secara metodologi penelitian ini menggunakan gel ekstrak kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*) sebagai obat penyembuh luka sayat dan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya untuk uji aktivitas lainnya.

3. Secara aplikatif

Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam usaha dalam mendapatkan sumber obat baru yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai wujud pemanfaatan sumber daya alam.

E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Defenisi Operasional

- a. Gel adalah suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan saling diresapi cairan.
- b. Ekstrak adalah hasil ekstraksi dengan menggunakan pelarut metanol pada kulit pisang kepok.
- c. Kulit pisang kepok adalah tumbuhan famili Musaceae dengan spesies *Musa paradisiaca* yang berfungsi sebagai penyembuh luka alami

- d. Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau rusaknya kesatuan/komponen jaringan dimana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang
- e. Luka sayat adalah luka yang terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam, misalnya terjadi akibat pembedahan

2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi formulasi sediaan gel ekstrak etanol kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) kemudian dilakukan uji efektivitas penyembuhan luka terhadap hewan uji kelinci yang sebelumnya telah dilukai/diberi luka sayatan.

F. Kajian Pustaka

1. Supriadi, J. *Pengaruh Ekstrak Etanol Kulit Pisang Ambon (Musa Paradisiaca, L. Forma Sapientum, L.) dalam Mempercepat Durasi Penyembuhan Luka Insisi pada Mencit Swiss Webster Betina*. Universitas Kristen Maranatha. Bandung: 2012. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penelitian ini bersifat eksperimental sungguhan, dengan menggunakan 25 ekor mencit Swiss Webster betina yang dibagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing perlakuan diberi EEKPA 5%, EEKPA 10%, EEKPA 20%, *Carboxymethyl Cellulose* (CMC) 1%, dan kloramfenikol selama 7 hari. Sedangkan pada penelitian saya, sampel yang digunakan adalah pisang dengan spesies yang berbeda yakni Pisang Kepok dan hewan yang digunakan sebagai hewan coba adalah kelinci. Pengujian efektivitas dari ekstrak kulit pisang kepok diformulasikan

dalam bentuk sediaan gel dengan varian konsentrasi yang digunakan adalah 10%, 20% dan 30%

2. Saraswati, f. *Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Etanol 96% Limbah Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca) terhadap bakteri Penyebab Jerawat (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, dan Propioni bacterium acne)*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2015. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*) yang diekstraksi dengan etanol 96% sebagai agen antibakteri, khususnya terhadap bakteri penyebab jerawat (*Staphylococcus epidermidis* ATCC 12228, *Staphylococcus aureus* ATCC 25923, dan *Propioni bacterium acne* ATCC 11827. Dari hasil penelitian diketahui kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*) yang diekstraksi dengan etanol 96% memiliki aktivitas antibakteri yang tinggi terjadi pada konsentrasi 100.000 ppm dengan zona hambat *Propionibacterium acne*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* sebesar 12,8 mm, 12,4 mm, dan 10,2 mm. Dari penelitian ini, yang diketahui kulit pisang kepok memiliki aktivitas antibakteri yang tinggi maka peneliti berinisiatif melakukan pengujian lain untuk mengetahui efektivitas kulit pisang kepok dalam proses penyembuhan luka dengan menggunakan metode ekstraksi dan pelarut yang sama untuk menarik senyawa metabolit sekunder yang berperan sebagai antibakteri yang juga dapat membantu proses penyembuhan luka.

3. Tiara M, dkk. *Formulasi Gel Ekstrak Daun Sasaladahan (Peperomia pellucida, L) dan Uji Efektivitasnya Terhadap Luka Bakar pada Kelinci (Oryctolagus cuniculus)*. FMIPA UNSRAT Manado. 2013. Dalam penelitiannya menggunakan ekstrak daun sasaladahan yang diformulasikan dalam bentuk sediaan gel dengan menggunakan 5 ekor kelinci sebagai hewan uji pada untuk melihat efektivitasnya terhadap penyembuhan luka bakar. Pada penelitian saya menggunakan metode yang sama dimana ekstrak diformulasikan kedalam bentuk sediaan gel dan menggunakan 5 ekor kelinci sebagai hewan uji yang kemudian diamati efektivitasnya pada penyembuhan luka. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan adalah sampel yang berbeda dan luka yang saya amati adalah luka sayat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kulit

Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar (Trenggono, 2007).

1. Fungsi Kulit

Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari mikroba. Selain itu, kulit merupakan suatu kelenjar holokrin yang besar (Trenggono, 2007). Secara umum fungsi kulit adalah:

a. Fungsi proteksi

Menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, misalnya zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan, gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur.

b. Fungsi absorpsi

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut lemak.

c. Fungsi ekskresi

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan ammonia.

d. Fungsi persepsi

Kulit mengandung ujung-ujung syaraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin oleh badan Krause. Rabaan diperankan oleh taktil meissner. Terhadap tekanan diperankan oleh badanvates paccini.

e. Fungsi pengaturan suhu tubuh

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit.

f. Fungsi pembentukan pigmen

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak dilapisan basal dan sel ini berasal dari rigi syaraf.

2. Anatomi Fisiologi Kulit

Luas kulit pada manusia kira-kira \pm 2 meter persegi, dengan berat 10 kg jika dengan lemaknya atau 4 kg jika tanpa lemak. Kulit terbagi atas tiga lapisan utama, yaitu:

- a. Epidermis (kulit ari), sebagai lapisan yang paling luar.
- b. Dermis (korium, kutis, kulit jangat)
- c. Di bawah dermis terdapat subkutis atau jaringan lemak bawah kulit.

Para ahli histologi membagi epidermis dari bagian terluar hingga ke dalam menjadi 5 lapisan, yakni :

- a. Lapisan tanduk (stratum korneum), sebagai lapisan paling atas
- b. Lapisan jernih (stratum lucidum), disebut juga “lapisan barrier”
- c. Lapisan berbutir-butir (stratum granulosum)
- d. Lapisan Malphigi (stratum spinosum) yang selnya seperti berduri
- e. Lapisan basal (stratum germinativum) yang hanya tersusun oleh satu lapisansel-sel basal (Trenggono, 2007)

- a. Epidermis

Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 milimeter, misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki, dan lapisan yang tertipis berukuran 0,1 milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis ini disebut keratinosit. Lapisan epidermis ini terdiri atas stratum korneum, stratum lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis. Lapisan tanduk (stratum korneum) terdiri atas beberapa sel yang pipih, mati, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini sebagian besar terdiri atas keratin, jenis protein yang tidak larut dalam air, dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Hal ini berkaitan dengan fungsi kulit untuk memproteksi tubuh dari pengaruh luar. Secara alami, sel-sel yang sudah mati di permukaan kulit akan melepaskan diri untuk berregenerasi. Permukaan stratum korneum dilapisi oleh suatu lapisan pelindung lembap tipis yang bersifat asam, disebut mantel asam kulit.

Stratum lucidum (lapisan jernih) terletak tepat di bawah stratum korneum, merupakan lapisan yang tipis, jernih, mengandung eleiden, sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki.

Stratum granulosum (lapisan berbutir-butir) tersusun oleh sel keratinosit yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, berinti mengkerut. Stoughton menemukan bahwa di dalam butir keratohyalin itu terdapat bahan logam, khususnya tembaga yang menjadi katalisator proses pertandukan kulit.

Stratum spinosum (lapisan malphigi) memiliki sel yang berbentuk kubus dan seperti berduri. Intinya besar dan oval. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Cairan limfa masih ditemukan mengitari sel-sel dalam lapisan malphigi ini.

Stratum germinativum (lapisan basal) adalah lapisan terbawah epidermis. Di dalam stratum germinativum juga terdapat di sel-sel melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinisasi dan fungsi yang hanya membentuk pigmen melanin dan memberikannya kepada sel-sel keratinosit melalui dendrit-dendritnya (Trenggono, 2007).

b. Dermis

Dermis membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit. Lapisan ini tersusun dari dua lapisan yaitu papilaris dan retikularis.

Lapisan papilaris dermis berada langsung dibawah epidermis dan tersusun terutama dari sel-sel fibroblast yang dapat menghasilkan salah satu bentuk kolagen, yaitu suatu komponen dari jaringan ikat.

Lapisan retikularis terletak dibawah lapisan papilaris dan juga memproduksi kolagen serta berkas-berkas serabut elastik. Dermis juga tersusun dari pembuluh darah serta limfe, serabut saraf, kelenjar keringat serta sebacea, dan akar rambut. Dermis sering disebut sebagai kulit “sejati” (Smeltzer, 2002)

c. Subkutis

Lapisan ini merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan lainnya oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan ini berfungsi sebagai cadangan makan.

Lapisan lemak ini disebut penikulus adiposus yang tebalnya tidak sama pada tiap-tiap tempat dan juga pembagian antara laki-laki dan perempuan tidak sama (berlainan). Guna penikulus adiposus adalah sebagai shock beaker atau pegas bila tekanan trauma mekanis yang menimpa pada kulit, isolator panas atau untuk mempertahankan suhu, penimbunan kalori, dan tambahan untuk kecantikan tubuh.

Di bawah subkutis terdapat selaput otot kemudian baru terdapat otot (Rahman, 2010).

B. Luka

1. Definisi Luka

Luka dapat didefinisikan sebagai cacat atau cedera jaringan hidup yang disebabkan oleh gangguan fisik atau termal yang timbul baik patologis dan psikologis, lesi trauma, bahan kimia, fisik, atau termal di alam, adalah yang paling umum (Boateng SJ, 2007).

Luka tubuh digolongkan menjadi luka disengaja (*intentional*) atau luka tidak disengaja (*unintentional*). Trauma disengaja terjadi selama terapi. Contohnya saat pembedahan, pungsi vena, atau luka bakar radiasi. Luka tidak disengaja adalah luka kecelakaan misalnya mengalami fraktur lengan dalam kecelakaan mobil (Audrey, 2009).

Luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit. Luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain. Ketika luka timbul, beberapa efek akan muncul (Lean, 2011):

- a. Hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ
- b. Respon stres simpatis
- c. Perdarahan dan pembekuan darah
- d. Kontaminasi bakteri
- e. Kematian sel

2. Jenis - Jenis Luka

Luka sering digambarkan berdasarkan bagaimana cara mendapatkan luka itu dan menunjukkan derajat luka

- a. Berdasarkan tingkat kontaminasi
 - 1) Clean Wounds (Luka bersih), yaitu luka bedah tidak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan (inflamasi) dan infeksi pada sistem pernafasan, pencernaan, genital dan urinari tidak terjadi. Luka bersih biasanya menghasilkan luka yang tertutup, jika diperlukan dimasukkan drainase tertutup. Kemungkinan terjadinya infeksi luka sekitar 1% - 5%.

- 2) Clean-contaminated Wounds (Luka bersih terkontaminasi), merupakan luka pembedahan dimana saluran respirasi, pencernaan, genital atau perkemihan dalam kondisi terkontrol, kontaminasi tidak selalu terjadi, kemungkinan timbulnya infeksi luka adalah 3% - 11%.
 - 3) Contaminated Wounds (Luka terkontaminasi), termasuk luka terbuka, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna, pada kategori ini juga termasuk insisi akut inflamasi nonpurulen. Kemungkinan infeksi luka 10% - 17%.
 - 4) Dirty or Infected Wounds (Luka kotor atau infeksi), yaitu terdapatnya mikroorganisme pada luka (Kozier, 2009).
- b. Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka:
- 1) Stadium I : Luka Superfisial (Non-Blanching Eritema): yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit.
 - 2) Stadium II : Luka "Partial Thickness" : yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal.
 - 3) Stadium III : Luka "Full Thickness" : yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fascia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya.

4) Stadium IV : Luka “Full Thickness” yang telah mencapai lapisan otot, tendon dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas (Asriani, 2012).

c. Berdasarkan waktu penyembuhan luka:

- 1) Luka akut yaitu luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati.
- 2) Luka kronis yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan, dapat karena faktor eksogen dan endogen (Perdanakusuma, 2007).

d. Berdasarkan terjadinya luka:

- 1) Luka insisi (Incised wounds), terjadi karena teriris oleh instrument yang tajam. Misal yang terjadi akibat pembedahan. Luka bersih (aseptik) biasanya tertutup oleh sutura seterah seluruh pembuluh darah yang luka diikat (ligasi)
- 2) Luka memar (Contusion Wound), terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak.
- 3) Luka lecet (Abraded Wound), terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tidak tajam.
- 4) Luka tusuk (Punctured Wound), terjadi akibat adanya benda, seperti peluru atau pisau yang masuk kedalam kulit dengan diameter yang kecil.
- 5) Luka gores (Lacerated Wound), terjadi akibat benda yang tajam seperti oleh kaca atau oleh kawat

- 6) Luka tembus (Penetrating Wound), yaitu luka yang menembus organ tubuh biasanya pada bagian awal luka masuk diameternya kecil tetapi pada bagian ujung biasanya lukanya akan melebar.

3. Fase Penyembuhan Luka

Penyembuhan luka yang normal merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis, tetapi mempunyai suatu pola yang dapat diprediksi. Proses penyembuhan luka adalah proses patofisiologis yang rumit. Meskipun luka mukosa menunjukkan penyembuhan dipercepat dibandingkan dengan luka kulit (Chen L, 2010).

Penyembuhan luka terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap peradangan akut, proliferasi sel, dan pematangan. Pada tahap proliferasi, aktivitas proliferasi sel fibroblas di lesi memiliki peran sentral untuk memulai proses penyembuhan luka (Song HS, 2008). Meningkatnya jumlah fibroblas di dermal menunjukkan kemampuan penyembuhan. Proses penyembuhan luka dapat terhambat oleh adanya stres oksigen reaktif (ROS) yang dihasilkan oleh mikroba atau neutrofil di daerah luka, melalui mekanisme yang menyebabkan kerusakan DNA. Fakta ini memperkuat pendapat bahwa keberadaan antioksidan lokal di daerah luka menjadi faktor penting yang turut mendorong percepatan proses penyembuhan (Bastone EB, 2000).

Pada Penyembuhan luka dapat dibagi menjadi 3 fase, fase-fase ini akan terjadi saling tumpang tindih (*overlapping*), dan berlangsung sejak terjadi luka sampai tercapainya resolusi luka. Semua luka harus melewati proses selular dan biokimia yang berkelanjutan ini, agar tercapai pengembalian integritas jaringan sempurna (Cohen, 1999).

Tahapan penyembuhan luka yaitu :

a. Fase Inflamasi

Fase inflamasi dimulai dengan migrasi leukosit didalam luka. Leukosit polimorfonuklear akan mendominasi luka dalam 24 jam pertama, diikuti makrofag dalam jumlah yang lebih banyak, dan kemudian limfosit. Sel-sel radang ini, mengatur perbaikan matriks jaringan ikat dengan melepaskan berbagai macam sitokin, yang sebelumnya dikenal sebagai faktor pertumbuhan. Respon vaskular dan selular terjadi ketika jaringan terpotong atau mengalami cedera. Vasokonstriksi pembuluh terjadi dan bekuan fibriplatelet terbentuk dalam upaya mengontrol pendarahan. Reaksi ini berlangsung 5 menit sampai 10 menit dan diikuti oleh vasodilatasi venula. Mikrosirkulasi kehilangan kemampuan vasokonstriksinya karena norepinefrin dirusak oleh enzim intraselular. Juga histamin dilepaskan sehingga meningkatkan permeabilitas kapiler.

Ketika mikrosirkulasi mengalami kerusakan, elemen darah seperti antibodi, plasma protein, elektrolit, komplemen, dan air menembus spasiu vascular selama 2 sampai 3 hari, menyebabkan edema, teraba hangat, kemerahan, dan nyeri. Netrofil adalah leukosit pertama yang bergerak kedalam jaringan yang rusak. Monosit yang berubah menjadi makrofag, memindahkan debris dan memindahkannya dari area tersebut. Antigen-antibodi juga timbul, sel-sel basal pada pinggir luka mengalami mitosis, dan menghasilkan sel-sel anak yang bermigrasi.

Dengan aktivitas ini, enzim proteolitik disekresikan dan menghancurkan bagian dasar bekuan darah. Celah antara kedua sisi luka secara progresif terisi dan sisinya pada akhirnya bertemu dalam 24 sampai 28 jam. Pada saat ini, migrasi sel

ditingkatkan oleh aktivitas sumsum tulang hiperplastik. Fase inflamasi ini disebut juga fase lambat, karena reaksi pembentukan kolagen masih sedikit dan luka hanya dipertautkan oleh fibrin yang amat lemah (Smeltzer, 2002).

b. Fase Proliferasi

Fase proliferasi yang ditandai oleh sintesis kolagen. Sintesis kolagen dimulai dalam 24 jam setelah cedera, namun tidak akan mencapai puncak hingga 5 hari kemudian. Setelah 7 hari, sintesis kolagen akan berkurang secara perlahan-lahan. (Schwartz, 2000).

Fibroblast memperbanyak diri dan membentuk jaringan-jaringan yang bermigrasi. Sel-sel epitel membentuk kuncup pada pinggiran luka, kuncup ini berkembang menjadi kapiler, yang merupakan sumber nutrisi bagi jaringan granulasi yang baru. Kolagen merupakan komponen utama dari jaringan ikat yang digantikan. Fibroblast melakukan sintesis kolagen dan mukopolisakarida. Dalam periode 2 sampai 4 minggu, rantai asam amino membentuk serat-serat dengan panjang dan diameter yang meningkat. Serat-serat ini menjadi kumpulan bundle dengan pila yang tersusun baik. Sintesis kolagen menyebabkan kapiler menurunkan jumlahnya. Setelah itu, sintesis kolagen menurun dalam upaya untuk menyeimbangkan jumlah kolagen yang rusak. Sintesis dan lisis seperti ini mengakibatkan peningkatan kekuatan (Smeltzer, 2002).

c. Fase Maturasi

Fase maturasi atau remodeling luka mengacu pada keseimbangan antara sintesis kolagen dan degradasi kolagen. Pada saat serabut-serabut baru dibentuk

dengan kepadatan pengerutan yang makin bertambah. Proses ini akan meningkatkan kekuatan potensial dari jaringan parut.

Setelah epitelisasi selesai, jaringan yang baru mengalami proses maturasi bila mengalami remodelling untuk meningkatkan regangan jaringan parut. Pada kulit putih, jaringan parut pada awalnya tampak merah dan menonjol, dan sejalan dengan waktu berubah menjadi lebih pucat, halus dan rata. Jaringan parut pada kulit gelap akan tampak lebih terang dibandingkan dengan kulit putih. Jaringan ikat yang matur tidak mengandung kelenjar keringat atau kelenjar lemak maupun rambut. Fase ini dapat berlangsung sampai 2 tahun.

Sekitar 3 minggu setelah cedera, fibroblast mulai meninggalkan luka. Jaringan parut tampak besar, sampai fibril kolagen menyusun kedalam posisi yang lebih padat. Hal ini sejalan dengan dehidrasi, mengurangi jaringan parut tetapi meningkatkan kekuatannya. Maturasi jaringan seperti ini terus berlanjut dan mencapai kekuatan maksimum dalam 10 -12 minggu, tetapi tidak pernah mencapai kekuatan asalnya dari jaringan sebelum luka (Smeltzer, 2002).

C. Pisang

Kedudukan tanaman pisang dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan adalah sebagai berikut (Tjitrosoepomo, 2013):



Gambar.1. *Musa paradisiaca*

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae

Famili : Musaceae

Genus : Musa

Spesies : *Musa paradisiaca*

Karakteristik morfologi pisang Kepok adalah sebagai berikut: tinggi pohon 3 m dengan lingkaran batang 40-50 cm berwarna hijau dengan sedikit atau tanpa coklat kehitaman. Panjang daun 180 cm, lebar 50-60 cm berlapis lilin pada permukaan sebelah bawah. Tandan buah mencapai panjang 30-60 cm, merunduk, tidak berbulu

halus. Jantung berbentuk bulat telur, agak melebar, kelopak luar berwarna ungu dan sebelah dalam berwarna merah. Sisir buah berjumlah 5-9 sisir dan tiap sisir berjumlah 10-14 buah berpenampang segi tiga atau segi empat atau bulat. Daging buah putih kekuning-kuningan, puting keungu-unguan, rasa kurang lunak dengan tekstur yang agak berkapur (kecuali pisang Siem). Termasuk dalam kelompok pisang kepok adalah pisang Kepok Kuning, Gajih Putih, Gajih Kuning, Saba, Siem, Cangklong dan pisang Kates (Rukmana, 1999).

Pisang kepok merupakan salah satu buah pisang yang enak dimakan setelah setelah diolah terlebih dahulu. Pisang kepok memiliki buah yang sedikit pipih dan kulit yang tebal, jika sudah matang warna kulit buahnya akan menjadi kuning. Pisang kepok memiliki rasa yang lebih enak, sehingga lebih disukai masyarakat (Prabawati dkk, 2008).

Pisang kepok banyak dikonsumsi dalam bentuk olahan. Pisang kepok di Filipina lebih dikenal dengan nama pisang saba, sedangkan di Malaysia dikenal dengan nama pisang nipah. Bentuk pisang kepok agak pipih sehingga pisang ini sering disebut pisang gepeng. Berat pisang pertandan bisa mencapai 14 – 22 kg dengan jumlah sisir 10 – 16 sisir, setiap sisir 12 – 20 buah. Apabila sudah matang warna kulitnya kuning menyeluruh (Satuhu, 1992).

Kulit pisang hanya sebagian kecil saja yang dimanfaatkan sebagai makanan ternak tanpa harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan kulit pisang menjadi obat adalah salah satu upaya menanggulangi kulit pisang, sehingga mempunyai manfaat. Umumnya, bagian yang sering dimanfaatkan masyarakat adalah bagian buahnya, sedangkan bagian kulit jarang atau bahkan tidak pernah dimanfaatkan. Padahal, pada

bagian kulit pisang inilah terdapat senyawa-senyawa yang mempunyai khasiat. Oleh sebab itu kandungan yang terdapat pada kulit pisang diduga dapat bermanfaat sebagai obat.

Kandungan yang terdapat pada kulit pisang kepok yaitu zat seperti protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, sukrosa, besi, vitamin A, B1, B6, C dan zat metabolit sekunder lainnya (Oktora, 2006). Berdasarkan kandungan yang dimiliki terdapat kandungan mampu menghambat bakteri. Salah satu senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri yaitu senyawa flavonoid dan tanin (Atun, 2007).

Kulit pisang mengandung flavonoid, tanin, steroid dan saponin (Akpuaka, 2011). Flavonoid dipercaya sebagai salah satu komponen penting dalam proses penyembuhan luka, Kelebihan jumlah fibroblas dapat menyebabkan hambatan dalam proses penyembuhan luka. Flavonoid menghibisi pertumbuhan fibroblas sehingga memberikan keuntungan perawatan luka (Khan, 2012). Senyawa flavonoid telah berhasil diidentifikasi didalam ekstrak kulit buah pisang kepok yang memiliki aktivitas antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Tanin memiliki kemampuan sebagai antimikroba serta dapat meningkatkan epitelisasi. Proses penyembuhan luka oleh tanin juga berkaitan dengan proses terbentuknya kolagen sehingga mempercepat penyembuhan luka (Atun, 2007).

D. Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan senyawa yang terdapat dalam sampel dengan campurannya menggunakan pelarut yang sesuai hingga terjadi keseimbangan konsentrasi senyawa dan pelarut dalam sel tanaman. Ekstraksi

dilakukan untuk mengisolasi senyawa bioaktif dari tanaman baik yang telah diketahui keberadaannya maupun yang belum diketahui dan juga digunakan untuk mengidentifikasi jenis metabolit sekunder dari suatu organisme (Mukhriani, 2014).

Ekstraksi merupakan metode pemisahan yang melibatkan perpindahan suatu zat dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Pada metode ekstraksi pelarut organik yang umum dipilih adalah pelarut dengan titik didih yang jauh lebih rendah dari titik didih senyawa yang akan diekstraksi, biasanya pelarut yang dipilih adalah pelarut yang memiliki harga yang murah dan mengandung senyawa yang tidak beracun (Firdaus, 2011).

2. Jenis-Jenis Metode Ekstraksi

Metode yang dapat digunakan dalam ekstraksi sampel yaitu:

a. Maserasi

Maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana. Ekstraksi dengan metode ini biasanya dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam pelarut. Pelarut akan menembus dinding sel dan akan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam sel dengan di luar sel, maka larutan yang terpekat akan didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel.

b. Refluks

Refluks adalah ekstraksi yang dilakukan dengan penggunaan temperatur tertentu, biasanya disesuaikan dengan titik didih pelarut yang digunakan. Ekstraksi ini dilakukan dengan volume pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya

pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga proses ekstraksi sempurna.

c. Perkolasi

Perkolasi adalah metode ekstraksi yang dilakukan dengan mengalirkan pelarut melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi yaitu kecuali dinyatakan lain, perkolasi dilakukan sebagai berikut: 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok dibasahi dengan 2,5 bagian sampai 5 bagian pelarut, lalu dimasukkan kedalam bejana tertutup sekurang-kurangnya selama 3 jam. Massa dipindahkan sedikit demi sedikit kedalam perklorator sambil tiap kali ditekan hati-hati, dituangi dengan pelarut secukupnya sambil cairan mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat pelarut. Selanjutnya perklorator ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah itu kran perklorator dibiarkan menetes dengan kecepatan 1 ml permenit (lambat).

d. Soxhletasi

Soxhletasi merupakan metode ekstraksi yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

E. Hewan uji

Hewan yang dipakai untuk pengujian adalah hewan sehat, karena hanya dari hewan yang sehat diharapkan produksi yang optimal dan layak digunakan dalam pengujian. Hewan paling sering dipakai adalah mencit, tikus, dan kelinci dengan mempertimbangkan faktor ukuran, kemudahan perawatan, harga, dan hasil yang cukup konsisten dan relevan (Sulastri, 2009).

Kelinci pada umumnya tidak berbahaya bila didekati dan dipegang lembut, sehingga banyak dipakai sebagai salah satu hewan pengujian.

1. Klasifikasi Hewan coba

Klasifikasi kelinci menurut Rudy Hustamin (2006) adalah

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Subfilum : Vertebrata
Kelas : Mammalia
Ordo : Logomorpha
Famili : Leporidae
Genus : *Oryctolagus*
Species : *Oryctolagus cuniculus*

2. Morfologi Hewan Coba (Kelinci)

Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) termasuk kedalam kelas mammalia yang mempunyai berat tubuh 1,35-7 kg dengan panjang 40-70 cm. Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) merupakan kelompok hewan yang paling sempurna baik morfologi ataupun anatominya karena ia mempunyai susunan organ yang kompleks dan susunan metabolisme didalam tubuhnya yang juga kompleks. Hewan ini banyak ditemukan dimana-dimana (Booolotion, 1979).

Tubuh kelinci berbulu halus dan daerah kulit yang tidak berbulu ada pada daerah ujung hidung dan sebagian kecil dari scrotum pada kelinci jantan dan bagian inguinal pada kedua jenis kelamin, baik jantan dan betina. Dari atas, kepala tampak besar dan daun telinga terlihat banyak vaskularisasinya. Bibir atas tampak terbelah,

sedangkan bibir bawah tidak terlihat terbelah dengan bagian anterior lateralnya berbentuk commissures, secara relatif mulut hanya terbuka sedikit. Sensor bulu (kumis) sangat menyolok atau sensitive. Nares external berbentuk ovoid dan bertemu dengan bagian bibir atas yang terbelah. Mata terletak lebih ke sisi lateral dibanding dengan kebanyakan mammalia (Kozma C, 1974).

Kelompok hewan ini mempunyai kelenjar mammae (kelenjar susu) dan pada umumnya kulit tubuh ditumbuhi oleh rambut. Hampir seluruh dunia dihuni oleh anggota kelas ini, mulai dari daerah kutub sampai kuator, bahkan di gurun pasir maupun di laut (Kastawi, 1992).

Dalam perkembangannya, kelinci merupakan makanan utama bagi hewan pemangsa, sehingga secara fisiologis mempunyai kemampuan untuk meloloskan diri dari pemangsa dan juga punya kemampuan menghasilkan banyak anak.

Kemampuan pernafasan kelinci cukup sulit untuk diukur, karena banyak variasi aktifitas yang mempengaruhi daya kerja paru-paru. Tetapi pengukuran kapasitas menangkap residu (*functional residual capacity*) dan volume kembangempisnya paru-paru dapat diukur secara tepat, masing-masing 11,3 mL dan 15,8 mL. Kecepatan pernafasan kelinci bervariasi antara 32-60 hembusan / menit. Kelinci dengan berat 2-4 kg mempunyai pernafasan sebesar 39 hembusan / menit.

Panjang saluran pencernaan kelinci yang meliputi usus kecil, cecum dan usus besar masing-masing sepanjang 3, 56 m; 0,61 m dan 1,61 m. Temperatur anus yang normal pada kelinci antara $38,6^{\circ} \sim 40,1^{\circ}\text{C}$ dengan rata-rata sebesar $39,5^{\circ}\text{C}$ (Sumadi, 2000).

Pertimbangan dalam memilih hewan uji dapat ditentukan berdasarkan avaiabilitas, harga, dan kemudahan perawatan. Namun, seiring perkembangan penelitian, upaya ini ditinjau pula dari tipe metabolisme, farmakokinetik, dan perbandingan catatan atau sejarah avaiabilitas (Sulastri, 2009).

F. Sediaan Gel

1. Definisi Gel

Gel adalah suatu sediaan semipadat yang jernih dan tembus cahaya yang mengandung zat-zat aktif dalam keadaan terlarut (Lachman, 2008). Bahan pembentuk gel, biasanya sebuah polimer dengan konsentrasi beberapa persen, memberikan konsistensi semisolid pada formulasi baik fisik ataupun *cross linking* (taut silang) kimia (Anwar, 2012).

Sifat dan karakteristik gel antara lain zat pembentuk gel yang ideal untuk sediaan farmasi dan kosmetik ialah inert, aman dan tidak bereaksi dengan komponen lain. Pemilihan bahan pembentuk gel harus dapat memberikan bentuk padatan yang baik selama penyimpanan tapi dapat rusak segera ketika sediaan diberikan kekuatan atau daya yang disebabkan oleh pengocokan dalam botol, pemerasan tube, atau selama penggunaan topikal. Karakteristik gel harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan sediaan yang diharapkan. Penggunaan bahan pembentuk gel yang konsentrasinya sangat tinggi atau BM besar dapat menghasilkan gel yang sulit untuk dikeluarkan atau digunakan. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Contoh polimer seperti MC, HPMC dapat terlarut hanya pada air yang dingin yang akan

membentuk larutan yang kental dan pada peningkatan suhu larutan tersebut akan membentuk gel (Lachman, 2008).

Idealnya pemilihan *gelling agent* dalam sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain. Penambahan *gelling agent* dalam formula perlu dipertimbangkan yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube selama pemakaian topikal. Beberapa gel terutama polisakarida alami peka terhadap derajat mikrobial. Penambahan bahan pengawat perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel dalam kaitannya dengan mikrobial (Lachman, 2008).

2. Basis Gel

Berdasarkan komposisinya, basis gel dapat dibedakan menjadi basis gel hidrofobik dan gel hidrofilik (Ansel, 2008).

a. Basis Gel Hidrofobik

Basis hidrofobik terdiri dari partikel-partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, bilamana ada hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus. Basis gel hidrofobik antara lain petrolatum, mineral oil/gel polietilen, plastibase, aluminium stearat, carbowax (Ansel, 2008).

b. Basis Gel Hidrofilik

Basis gel hidrofilik umumnya adalah molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Pada umumnya karena daya tarik menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik

dari bahan hidrofobik, sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar (Ansel, 2008). Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pembengkak, air, penahan lembab dan bahan pengawet (Voight, 1995).

Penahan lembab yang ditambahkan, yang juga berfungsi sebagai pembuat lunak harus memenuhi berbagai hal. Pertama, harus mampu meningkatkan kelembutan dan daya sebar sediaan, kedua melindungi dari kemungkinan menjadi kering. Sebagai penahan lembab dapat digunakan gliserol, sorbitol, etilenglikol dan propilenglikol dalam konsentrasi 10-20% (Voight, 1995).

Disebabkan oleh tingginya kandungan air, sediaan ini dapat mengalami kontaminasi mikrobial, yang secara efektif dapat dihindari dengan penambahan bahan pengawet. Untuk upaya stabilisasi dari segi mikrobial disamping penggunaan bahan-bahan pengawet seperti dalam balsam, khususnya untuk basis ini sangat cocok pemakaian metil dan propilparaben yang umumnya disatukan dalam bentuk larutan pengawet. Upaya lain yang diperlukan adalah perlindungan terhadap penguapan, untuk menghindari mengeringnya. Oleh karena itu untuk menyimpannya lebih baik menggunakan tube. Pengisian ke dalam botol, meskipun telah tertutup baik tetap tidak menjamin perlindungan yang memuaskan (Voight, 1995).

Keuntungan gel hidrofilik antara lain: daya sebar pada kulit baik, efek dingin yang ditimbulkan akibat lambatnya penguapan air pada kulit, tidak menghambat fungsi fisiologi kulit khususnya respirasi oleh karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci dengan air dan

memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan pelepasan obatnya baik (Ansel, 2008).

Polimer-polimer yang biasa digunakan untuk membuat gel-gel farmasetik meliputi gom alam tragakan, pektin, agar, asam alginat, serta bahan-bahan sintesis dan semi sintesis seperti metilselulosa, hidroksimetilselulosa, karboksimetilselulosa, dan karbopol yang merupakan polimer vinil sintesis dengan gugus karboksil yang terionisasi. Gel dibuat dengan proses peleburan, atau diperlukan suatu prosedur khusus berkenaan dengan sifat mengembang dari gel (Lachman, 2008).

G. Komposisi Sediaan

Formulasi sediaan gel terdiri dari bahan-bahan obat, pelarut, pengawet antimikroba (*preservative*), dan penstabil (Allen, 2013).

1. HPMC

Pemilihan *gelling agent* akan mempengaruhi sifat fisika gel serta hasil akhir sediaan. *Gelling agent* yang umumnya dipakai yaitu hidroksi propil metil selulosa (HPMC) dan karbomer. HPMC inert terhadap banyak zat, cocok dengan komponen kemasan serta mudah didapatkan. HPMC stabil pada pH 3 hingga 11, gel yang dihasilkan jernih, bersifat netral, serta viskositasnya yang stabil meski disimpan pada jangka waktu yang lama. HPMC juga tidak mengiritasi kulit dan tidak dimetabolisme oleh tubuh. Tidak larut dalam air panas namun mengembang menjadi gel. HPMC membentuk gel dengan mengabsorpsi pelarut dan menahan cairan tersebut dengan membentuk massa cair yang kompak. Meningkatnya jumlah HPMC yang digunakan maka akan semakin banyak cairan yang tertahan dan diikat oleh HPMC, berarti

viskositas meningkat. Dalam pembuatannya, HPMC dikembangkan di dalam air yang telah dipanaskan sehingga terbentuk gel yang diinginkan (Dewi dan Nyi, 2016).

HPMC (*hypromellose*) memiliki pemerian tidak berbau dan berasa, putih atau krem-putih berserat atau butiran bubuk. Larut dalam air dingin, membentuk kental koloid. Kelarutan praktis tidak larut dalam air panas, kloroform, etanol (95%), dan Eter, tapi larut dalam campuran etanol dan diklorometana, campuran metanol dan diklorometana, dan campuran air dan alkohol. HPMC banyak digunakan sebagai eksipien dalam sediaan farmasi seperti oral, optalmik, nasal, dan dalam formulasi topikal. Tidak bersifat toksik dan tidak mengiritasi meskipun digunakan secara oral (Rowe, 2009).

HPMC secara luas digunakan dalam industri farmasetika. HPMC diketahui memiliki stabilitas yang baik bahkan setelah paparan panas dan kondisi lembab tidak ada perubahan yang signifikan diamati dalam kehomogenitasan, pH, kejernihan, tekstur profil analisis dan reologi sifat gel HPMC (Dhawan, 2009).

2. Propilen glikol

Humektan digunakan untuk mengurangi kehilangan air pada sediaan semisolid. Pemilihan humektan tidak didasarkan hanya pada pengaruhnya terhadap disposisi air tetapi juga memberikan efek terhadap viskositas dan konsistensi dari produk akhir. Penahan lembab yang ditambahkan, yang juga berfungsi sebagai pembuat lunak harus memenuhi berbagai hal. Pertama, harus mampu meningkatkan kelembutan dan daya sebar sediaan, kedua melindungi dari kemungkinan menjadi kering. Sebagai penahan lembab dapat digunakan salah satunya adalah propilen glikol dalam konsentrasi 10-20% (Voight, 1995).

Propilen glikol mempengaruhi kemampuan pelepasan obat. Pada gel dengan HPMC sebagai *gelling agent*, penambah propilen glikol 5% meningkatkan kemampuan pelepasan obat. Penambahan propilen glikol bisa digunakan guna meningkatkan pelepasan obat (Dewi, 2016).

Propilen glikol digunakan sebagai humektan dalam sediaan topikal dengan konsentrasi $\approx 15\%$, memiliki pemerian jernih, tidak berwarna, cairan kental, cairan hampir tidak berbau, rasa agak manis dan higroskopik. Dapat bercampur dengan air, dengan etanol (95%)*p* dan dengan kloroform *p*, larut dalam 6 bagian eter, tidak dapat bercampur dengan eter minyak tanah *p* dan dengan minyak lemak. Propilen glikol tidak kompatibel dengan reagen pengoksidasi seperti potassium permanganat. Secara umum dianggap tidak toksik. Dalam sediaan topikal, propilen glikol memiliki tingkat iritasi yang lebih kecil dibandingkan gliserin (Rowe, 2009).

Propilen glikol merupakan salah satu pelembab (humektan) yang digunakan untuk mencegah kekeringan preparat pada sediaan karena kemampuannya menahan lembab (Ansel, 2008). Dalam beberapa penelitian digunakan propilen glikol dengan konsentrasi 15 %.

3. Metil paraben

Seperti yang telah diketahui bahwa gel memiliki kandungan air yang banyak. Sehingga dibutuhkan penambahan pengawet untuk mencegah terjadinya kontaminasi pembusukan bakterial. Pengawet yang paling tepat adalah penggunaan metil paraben 0,075% dan propil paraben 0,025% (Voigt, 1995).

Metil paraben memiliki fungsi sebagai bahan pengawet antimikroba (*preservative*), kebanyakan pengawet lebih bersifat bakteristatik daripada

bakteriosida tergantung pH dan pKa dari pengawet perlu menjadi prioritas utama (Anwar, 2012).

Metil paraben digunakan sebagai pengawet antimikroba (*preservative*) pada sediaan kosmetik, makanan, dan sediaan farmasetika. Biasa digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan paraben lainnya. Konsentrasi metil paraben sebagai pengawet pada sediaan topikal 0,02% - 0,3%. Metil paraben memiliki pemerian hablur kecil tidak berwarna, atau serbuk hablur putih, tidak berbau, khas, lemah, mempunyai sedikit rasa terbakar dan sangat sukar larut dalam air. Metil paraben dalam bentuk larutan berair stabil pada pH 3-6 (kurang dari 10% dekomposisi) hingga sekitar 4 tahun pada suhu kamar, sementara larutan berair pada pH 8 atau di atasnya akan cepat mengalami hidrolisis. Metil paraben tidak kompatibel dengan bentonit, magnesium trisilikat, tragakan, talk, garam alginat, minyak esensial, sorbitol, dan atropin telah dilaporkan. Metil paraben juga bereaksi dengan berbagai gula dan yang terkait dengan gula alkohol (Rowe, 2009).

4. Aquades

Gel adalah suatu sediaan dengan basis yang larut dalam air. Gel juga dapat dibentuk dengan selulosa air murni (Lachman, 2008). Telah lama diketahui bahwa air meningkatkan penyampaian zat aktif dari sediaan topikal dan transdermal. Kulit manusia mengandung senyawa higroskopik seperti asam amino, derivat asam amino, dan garam yang dapat menyerap air dalam stratum korneum (Anwar, 2012).

H. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan

Pemanfaatan tumbuh-tumbuhan demi kemaslahatan bersama adalah suatu bentuk aktualisasi pemberdayaan potensi alam sebagai suatu bentuk tanda-tanda kebesaran penciptaan Allah SWT dengan segala keaneka-ragamannya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang dianugerahi kesempurnaan akal untuk berpikir, hendaklah direnungkan pemaknaan ini lebih mendalam, bahwasanya tiada ciptaan yang diciptakan secara sia-sia, apa saja bentuknya itu selalu ada hikmah dan manfaat darinya.

Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, yang senantiasa tumbuh di permukaan bumi hanya untuk kelangsungan hidup bagi khalifah dimuka bumi, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al An'am ayat 99;

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

"Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman" (Q.S Al-An'am/6: 99) (Kemenag RI Al Quran dan Terjemahnya, 2009: 140).

Dalam kitab tafsir al-Mishbah dijeaskan bahwa Dialah yang menurunkan air hujan dari awan untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari bermacam tumbuhan dan berbagai biji-bijian. Kehijauan ialah kesuburan “Yang Kami keluarkan daripadanya biji-bijian yang bersusun”. Banyaklah pohon yang menghijau itu memberikan buah bersusun, seumpama buah pisang, atau jagung atau lainnya yang menghijau lantaran suburnya. Kemudian diperingatkan juga, mengenai kebun-kebun. “Dan kebun-kebun dari anggur, zaitun, dan delima yang bersamaan dan tidak bersamaan”. Baik anggur, zaitun ataupun delima ada yang memiliki kesamaan bentuk tetapi berlainan rasa. Seperti halnya pula pisang, meskipun batang dan daun pisang serupa, tetapi terdapat pula berbagai jenis pisang. “Pandanglah olehmu akan buah-buahannya apabila dia berbuah dan kemudian masak”. Cobalah perhatikan betapa menakjubkannya apalagi jika diperhatikan setelah masak. Niscaya akan timbul Iman dalam hati, bahwa manusia hidup di dalam dunia ini, yang berkembang berasal dari satu jiwa, adalah mendaot jaminan hidup yang sempurna dari Allah. Dan tidak ada selain Allah yang membuatnya seperti itu. “Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang beriman” (Shihab, 2009).

Pada akhir ayat ini disebutkan “ pandanglah olehmu akan buah-buahannya apabila dia berbuah dan masaknyanya”. Cobalah perhatikan apabila datang segala musim segala buah-buahan itu berbuah sungguh-sungguh semuanya itu mengheran dan menakjubkan, apatah lagi bila diperhatikan setelah dia masa. Niscaya akan timbullah Iman dalam hati, bahwa manusia hidup di dalam dunia ini, yang berkembang berasal dari satu jiwa adalah mendapat jaminan hidup yang sempurna dari Allah. Dan tidak

ada selain Allah yang membuatnya jadi begitu.“ Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang beriman” (Hamka, 2015: 2212).

Sebagai mana firman Allah SWT juga dijelaskan mengenai berbagai macam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam QS Ta-Ha ayat 53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
أَرْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ٥٣

Terjemahan:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Q.S TaHa/20: 53) (Kemenag RI Al Quran dan Terjemahnya. 2009: 315).

Wahai Fir'aun, Allah adalah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, juga bagi seluruh manusia, dan menjadikan jalanjalan yang rata dan lebar di atasnya bagimu agar kamu mudah bepergian, dan Dia pula yang menurunkan air hujan dari langit untuk menyuburkan tanah di sekitarmu.” Allah beralih menggunakan kalimat langsung dari-Nya, “Kemudian, Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan air hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan dengan beragam bentuk, rasa, dan kegunaan. Kami telah menganugerahkan kepadamu berjenis-jenis tetumbuhan, maka makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal (Kemenag RI, 2009).

Ayat ini merupakan kelengkapan dari perkataan Musa dalam menggambarkan sifat Tuhannya saat Fir'aun menanyakan kepadanya tentang Tuhannya. Musa berkata: Yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian

memberinya petunjuk. (Thaahaa:50) Kemudian Musa mendapat pertanyaan dari Fir'aun. Maka Musa menjawabnya lagi: Yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Menurut qiraat sebagian ulama, disebutkan mahdan (bukan mihadan) yang artinya tempat menetap bagi kalian, kalian dapat berdiri, tidur, dan bepergian di permukaannya. dan Yang telah menjadikan bagi kalian di bumi itu jalan-jalan. Yakni Dia telah menjadikan bagi kalian jalan-jalan agar kalian dapat berjalan di segala penjurunya. Sama halnya dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya: dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. (Al Anbiyaa:31) Firman Allah subhanahu wa ta'ala: ...dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Yaitu berbagai macam tetumbuhan berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, ada yang rasanya masam, ada yang manis, dan ada yang pahit, serta berbagai jenis lainnya dari hasil tanam-tanaman dan buah-buahan (Hamka, 2015: 5080).

Dialah Tuhan yang menganugerahkan nikmat kehidupan dan pemeliharaan kepada hamba-hamba-Nya. Dengan kekuasaan-Nya, Dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu, membuka jalan-jalan untuk kamu lalui dan menurunkan hujan di atas bumi sehingga terciptalah sungai-sungai. Dengan air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda warna, rasa dan manfaatnya. Ada yang berwarna putih dan hitam, ada pula yang rasanya manis dan pahit (Shihab, 2009).

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit ada obatnya, dan bila telah ditemukan dengan tepat obat suatu penyakit, niscaya akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla.” (HR. Muslim) (Muslim.or.id).

Dari ayat dan hadist di atas telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dimuka bumi ini dengan tidak sia-sia. Semuanya memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing. Allah swt telah memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Seperti halnya tanaman pisang kepok yang menjadi tokoh utama dalam penelitian ini. Dalam surah Al-An'am ayat 99 di atas, Allah swt telah memerintahkan kita untuk memperhatikan segala sesuatu yang ada di bumi termasuk di dalamnya yaitu fase yang terjadi pada tumbuhan hingga tumbuhan tersebut menghasilkan buah, dan kita diperintahkan pula untuk memperhatikan buah tersebut hingga mencapai fase kematangan yang dimana semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah swt. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa kulit pisang kepok yang sudah matang mengandung komponen senyawa yang berperan sebagai penyembuh luka sayat pada hewan uji dan memiliki efektivitas yang lebih bagus pada konsentrasi gel 30% dibandingkan dengan sediaan gel yang beredar dipasaran (Bioplacenton®). Inilah salah satu bukti kebesaran Allah swt dan kebenaran perkataan Allah swt yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tidak ada keraguan bagiNya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (bagi orang-orang yang beriman).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu eksperimental laboratorium

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, Laboratorium Farmasetika dan Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Mei - Juli 2018

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimental berupa pengumpulan data berdasarkan hasil dari eksperimental yang dilakukan.

D. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) matang yang diambil dari Kelurahan Tetti Kenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

E. Instrumen Penelitian

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat cukur, anak timbangan (*new prontial*®), *climatic chamber* (*Climatic*®), desikator, gelas kimia (*pyrex*®), gelas ukur (*pyrex*®), *hot plat*, lemari pengering, objek glass (*Slides*®), pH meter (ATC), pipet tetes, pisau bedah, pot, *rotary evaporator* (*Heidolph*®), silet, tabung reaksi (*pyrex*®), timbangan analitik (*Pesica*®), timbangan kasar, *viscometer Brookfield* (*DV-E Viscometer*®).

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan adalah ekstrak kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dan untuk bahan-bahan lain yang digunakan adalah aquadest, asam klorida (HCl) 2 N, asam sulfat pekat (H₂SO₄), besi (III) klorida (FeCl₃), Bioplacenton® gel, etanol 96%, hansaplast, HPMC, kasa, kelinci, lidokain, metil paraben, pereaksi dragendorff, propilen glikol, mayer, wagner, serbuk magnesium, tissue.

F. Prosedur Kerja

1. Penyiapan sampel (Sonja, 2017)

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kulit pisang kepok. Tahap-tahap pembuatan simplisia dari kulit buah pisang kepok yaitu dilakukan sortasi basah, lalu dicuci dengan air mengalir kemudian dirajang untuk mendapatkan ukuran yang kecil dan tipis menggunakan pisau selanjutnya dilakukan pengeringan dengan menggunakan lemari pengering kemudian dilakukan sortasi kering. Setelah itu sampel tanaman tersebut dibuat serbuk (simplisia).

2. Metode Ekstraksi (Sonja, 2017)

Serbuk kering kulit pisang kepok ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian dimaserasi dengan etanol 96% sebanyak 2 liter selama 3 x 24 jam dan sesekali diaduk. Filtrat yang diperoleh disaring kemudian dipekatkan menggunakan alat *rotary evaporator* untuk mendapatkan ekstrak kental. Ekstrak kental dibebaskan dengan cara ekstrak ditambahkan dengan air suling sebanyak 5 tetes kemudian dipanaskan di atas penangas sampai menguap (Rinaldi, 2013).

3. Uji Identifikasi Golongan (Marlinda, 2012)

a. Analisis Alkaloid

1) Uji pereksi mayer

Disiapkan ekstrak kulit pisang kepok yang dilarutkan dalam pelarutnya dan diambil beberapa tetes kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi. Pada sampel tersebut ditambahkan pereaksi mayer. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan putih atau kuning.

2) Uji pereaksi wagner

Disiapkan ekstrak kulit pisang kepok yang dilarutkan dalam pelarutnya dan diambil beberapa tetes kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi. Pada sampel tersebut ditambahkan pereaksi wagner. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat.

3) Uji pereaksi dragendorff

Disiapkan ekstrak kulit pisang kepok yang dilarutkan dalam pelarutnya dan diambil beberapa tetes kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi. Pada sampel

tersebut ditambahkan pereaksi dragendorff. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan jingga atau cokelat.

b. Analisis Tanin

Disiapkan ekstrak kulit pisang kepok 1 mL. Ditambahkan beberapa tetes larutan besi (III) Klorida 1%. Perubahan yang terjadi diamati, terbentuknya warna biru tua atau hitam kehijauan menunjukkan adanya senyawa tanin.

c. Analisis Flavonoid

Ekstrak kulit pisang kepok dimasukkan kedalam tabung reaksi. Ditambahkan pada sampel berupa serbuk Magnesium 2 N sebanyak 2 mg dan diberikan 3 tetes HCl pekat. Sampel dikocok dan diamati perubahan yang terjadi, terbentuknya warna merah, jingga atau kuning pada larutan menunjukkan adanya flavonoid.

d. Analisis Saponin

Disiapkan ekstrak kulit pisang kepok dimasukkan kedalam tabung reaksi. Air panas ditambahkan pada sampel. Perubahan yang terjadi terhadap terbentuknya busa diamati, reaksi positif jika busa stabil selama 30 menit dan tidak hilang pada penambahan 1 tetes HCl 2 N.

4. Pembuatan Sediaan Gel

Tabel 1. Formulasi Gel

Tiap 25 g mengandung:

No	Nama Bahan	Formula (%)			
		I	II	III	Kontrol -
1	Ekstrak Kulit Pisang Kepok	10	20	30	-
2	HPMC	2	2	2	2
3	Metil paraben	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Propilen glikol	15	15	15	15
5	Air suling (ad)	100	100	100	100

Pembuatan sediaan gel dengan cara setelah bahan ditimbang sesuai dengan takaran formula kemudian HPMC dikembangkan dengan air panas suhu 90°C lalu diaduk, dilarutkan metil paraben dengan air panas dan ditambahkan ke dalam HPMC. Dimasukkan ekstrak dicampur dengan propilen glikol sampai tercampur rata lalu dimasukkan kedalam HPMC sambil diaduk dengan menggunakan lumpang dan alu sampai terbentuk gel.

5. Uji Perlakuan

Mula-mula disediakan kelinci sehat yang telah diadaptasi selama 1 minggu, kemudian bulu pada kelinci dicukur dengan ukuran secukupnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 ekor kelinci dengan melukai pada bagian punggung kelinci menggunakan pisau bedah, panjang luka 3-cm dengan kedalaman sampai area dermis (sekitar 2 mm dari permukaan kulit). Masing-masing luka diberikan sediaan gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, kontrol positif (Bioplacenton®), dan kontrol negatif

(kontrol basis). Selama uji, hewan uji diberikan makanan yang sama untuk menghindari variabilitas internal dari masing-masing hewan uji. Pengamatan dilakukan hingga lukanya tertutup sempurna.

6. Uji Stabilitas Sediaan Gel

Pengujian stabilitas fisik sediaan gel dilakukan dengan metode *cycling test* yakni menyimpan sediaan pada periode waktu (24 jam persiklus) tertentu dengan perbedaan suhu yang ekstrim (5°C dan 35°C). Pengujian dilakukan sebelum dan setelah penyimpanan 6 siklus. Sediaan diuji terhadap terjadinya perubahan organoleptis, pH, viskositas homogenitas dan daya sebar.

a. Uji organoleptik (Maulina, 2015)

Pengamatan organoleptik dilakukan dengan mengamati perubahan bentuk, warna dan bau dari sediaan gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*).

b. Uji pH (Tranggono, 2007)

Pengukuran pH sediaan gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Alat pH meter terlebih dahulu dikalibrasi menggunakan larutan dapar netral (pH 7,0) lalu dikeringkan dengan kertas tisu. Pengukuran dilakukan dengan cara mencelupkan pH meter kedalam sediaan gel yang akan diuji, sampai alat akan menunjukkan angka yang konstan. Angka yang ditunjukkan pH meter merupakan nilai pH sediaan.

c. Uji Viskositas (Voight, 1995)

Uji viskositas gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dilakukan dengan menggunakan *viscometer Brookfield* pada kecepatan 50 rpm dan

menggunakan spindle nomor 05. Hal ini dilakukan dengan cara mencelupkan spindle ke dalam sediaan gel kemudian dilihat viskositasnya.

d. Uji Homogenitas (Maulina, 2015)

Uji homogenitas dilakukan dengan cara sediaan gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dioleskan tipis-tipis pada sekeping kaca. Kemudian ditutup dengan keping kaca lainnya, lalu diamati homogenitasnya. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar.

e. Uji Daya Sebar (Garg, 2002)

Uji daya sebar gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dilakukan dengan cara meletakkan gel sebanyak 1 g di atas plastik beralas kertas grafik, plastik lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter sebar gel diukur. Setelah itu ditambahkan 125 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit lalu diukur diameter yang konstan. Daya sebar 5 - 7 cm menunjukkan konsistensi semisolid.

7. Analisis Data (Sastrosupadi, 2000)

Setelah didapatkan hasil, maka dilakukan analisis data menggunakan analisis ANOVA Rancangan Acak Lengkap (RAL). RAL merupakan rancangan percobaan dimana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan. Dimana satuan percobaan yang digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Kulit Buah Pisang Kepok

Hasil ekstraksi kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) sebanyak 500 gram dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Rendamen Ekstrak yang diperoleh dari maserasi

Sampel	Berat Sampel	Berat Ekstrak	% Rendamen
Kulit Buah Pisang Kepok Matang (<i>Musa paradisiaca</i>)	500 gram	52,24 gram	10,44%

2. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa

Hasil identifikasi golongan senyawa dilakukan beberapa uji meliputi uji alkaloid, tanin, flavonoid, dan saponin. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil pengamatan identifikasi golongan senyawa

Metabolit sekunder	Hasil Pengamatan	Keterangan
Alkaloid	Terdapat endapan putih	+
1. Mayer	Terdapat endapan merah jingga	+
2. Dragendoff		
3. Wagner		
Flavonoid	Terdapat perubahan warna merah/jingga	+
Tanin	Terbentuk warna hitam kehijauan	+
Saponin	Terbentuk busa stabil	+

3. Hasil Uji Efektivitas Sediaan Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*) Pada Kelinci

Efek penyembuhan luka sayat gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) pada punggung kelinci dengan beberapa konsentrasi, dimana pengamatan dimulai saat disayat hingga luka tertutup 100% disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Efek penyembuhan luka sayat

Formula	Hari Ke-n luka tertutup 100%			Jumlah (Hari)	Rata-rata (Hari)
	Replikasi				
	1	2	3		
Gel 10%	16	16	16	48	16
Gel 20%	14	13	13	40	13,33
Gel 30%	12	12	11	35	11,66
Bioplacenton	13	12	13	38	12,66
Basis Gel	21	20	21	62	20,66
Jumlah	76	75	74	223	14,86

4. Hasil Uji Stabilitas Fisik Sediaan Gel

Uji stabilitas fisik sediaan gel terdiri dari pengamatan organoleptik yang meliputi warna, bau, dan bentuk, pemeriksaan pH, pemeriksaan homogenitas, pengujian daya sebar, serta penentuan viskositas. Dilakukan pada tiga formula dengan basis yang sama HPMC dan konsentrasi ekstrak yang berbeda. Formula F1 menggunakan konsentrasi ekstrak 10%, Formula F2 menggunakan ekstrak 20%,

Formula F3 menggunakan ekstrak 30%. Hasil dari uji stabilitas fisik sediaan gel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Pengamatan Organoleptik Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*)

Sediaan	Organoleptik					
	Bentuk		Warna		Bau	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
F1 10%	Semi padat	Semi padat	Coklat	Coklat	Khas ekstrak	Khas ekstrak
F2 20%	Semi padat	Semi padat	Coklat	Coklat	Khas ekstrak	Khas ekstrak
F3 30%	Semi padat	Semi padat	Coklat	Coklat	Khas ekstrak	Khas ekstrak

Tabel 6. Hasil Pengukuran pH Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*)

Sediaan	pH	
	Sebelum	Sesudah
F1 10%	5,2	4,4
F2 20%	5,3	4,4
F3 30%	5,3	4,4

Tabel 7. Hasil Pengukuran Viskositas Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*)

Sediaan	Viskositas (cP)	
	Sebelum	Sesudah
F1 10%	4032	3713
F2 20%	4230	4093
F3 30%	4307	4082

Tabel 8. Hasil Pengukuran Daya Sebar Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*)

Sediaan	Daya sebar (cm)	
	Sebelum	Sesudah
F1 10%	4,8	4,8

F2 20%	4,7	4,76
F3 30%	4,46	4,5

Tabel 9. Hasil Pengamatan Homogenitas Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*)

Sediaan	Homogenitas	
	Sebelum	Sesudah
F1 10%	≠Partikel padat	≠Partikel padat
F2 20%	≠Partikel padat	≠Partikel padat
F3 30%	≠Partikel padat	≠Partikel padat

B. Pembahasan

Kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) yang diekstraksi menggunakan penyari etanol 96%. Etanol 96%, digunakan sebab mudah menarik senyawa seperti saponin, flavanoid, dan tanin yang terdapat dalam kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) yang berefek dalam penyembuhan luka. Selain itu ekstrak polar etanol 96% mudah dibuat gel karena sifat kepolaran yang mudah bersatu dengan basis. Penelitian uji efek ekstrak etanol kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) ini diujikan pada kulit kelinci. Kelinci memiliki luas permukaan punggung yang lebih luas dibandingkan dengan hewan uji lainnya, maka efektif dapat digunakan untuk menguji aktivitas penyembuhan luka.

Proses ekstraksi yang digunakan adalah maserasi, dimana hasil maserasi yang didapatkan kemudian dipisahkan menggunakan alat *rotary evaporator* dan dibebaskan dengan cara penambahan aquadest sebanyak 5 tetes pada ekstrak kemudian diuapkan diatas penangas hingga menguap (Rinaldy, 2013). Hasil maserasi

500 gram simplisia kulit buah pisang kepok, diperoleh rendamen ekstrak etanol kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) sebanyak 52,24 gram.

Pada penelitian ini dilakukan uji identifikasi senyawa golongan untuk melihat adanya kandungan senyawa metabolit sekunder yang berperan dalam proses penyembuhan luka. Dari hasil pengamatan uji identifikasi senyawa golongan diketahui bahwa ekstrak etanol kulit buah pisang kepok terbukti mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan saponin. Pada uji flavonoid ditandai dengan perubahan warna menjadi merah jingga yang menunjukkan hasil positif adanya kandungan flavonoid. Pada uji tanin juga menunjukkan hasil yang sama, dimana ekstrak kulit buah pisang kepok menunjukkan adanya kandungan tanin dengan hasil positif terbentuknya warna hijau kehitaman. Begitupun dengan uji saponin ditandai dengan adanya busa yang stabil dalam 30 menit yang membuktikan ekstrak etanol kulit buah pisang kepok mengandung senyawa saponin.

Kandungan flavonoid merupakan antioksidan kuat yang dapat mengurangi lipid peroksidasi, meningkatkan kecepatan epitelisasi dan bersifat antimikroba. Penurunan lipid peroksidasi oleh flavonoid akan meningkatkan viabilitas serabut kolagen (Thakur, 2014). Tanin bersifat antimikroba dan meningkatkan epitelisasi sedangkan saponin meningkatkan kemampuan reseptor TGF- β fibroblas berkaitan dengan faktor pertumbuhan yang diperlukan oleh fibroblas dalam mensintesis kolagen (Rupina, 2016). Adanya kandungan flavonoid, tanin, dan saponin yang terkandung pada ekstrak kulit buah pisang kepok tersebut diketahui dapat mempercepat proses penyembuhan luka.

Pengujian efek penyembuhan luka sayat kulit buah pisang kepok yang diujikan pada kelinci diformulasikan dalam bentuk sediaan gel karena bentuk sediaan ini lebih mudah digunakan, daya sebar yang cepat pada kulit. Selain itu kandungan air yang tinggi pada sediaan gel dapat berperan sebagai penyejuk yang dapat meredakan panas pada kulit. Sehingga dapat mempercepat berakhirnya fase inflamasi dan meningkatkan efek penyembuhan luka. Pemilihan HPMC sebagai basis atau *gelling agent* karena HPMC tergolong basis hidrofilik yang mempunyai daya sebar yang baik pada kulit, efek dingin yang ditimbulkan dapat mencegah pelepasan air pada kulit. Selain itu, HPMC tidak mempengaruhi fungsi fisiologis kulit karena tidak menutupi pori-pori kulit, mudah dicuci dan memungkinkan pemakaian pada bagian yang berambut serta pelepasan obatnya baik (Voight, 1995).

Namun tingginya kadar air dalam sediaan gel membuat sediaan gel sangat rentan terkontaminasi oleh bakteri. Untuk itu dibutuhkan juga antibakteri atau pengawet dalam sediaan gel. Pengawet yang digunakan dalam sediaan gel ini adalah metil paraben. Metil paraben adalah pengawet yang efektif dapat menghilangkan kontaminasi mikroba yang disebabkan oleh tingginya kandungan air pada gel.

Selain pengawet dan basis, digunakan bahan tambahan lain dalam gel ini yaitu humektan. Humektan yang digunakan dalam gel ini adalah propilen glikol, yang berfungsi untuk mempertahankan kelembaban dan mengurangi kehilangan air pada sediaan semisolid seperti gel.

Pada penelitian ini digunakan basis gel HPMC tanpa ekstrak kulit buah pisang kepok sebagai kontrol negatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang memberikan efek penyembuhan luka adalah ekstrak kulit buah pisang kepok tersebut.

Sebagai kontrol positif digunakan Bioplacenton® agar dapat diketahui kesetaraan efektivitas gel dalam menentukan konsentrasi optimum ekstrak. Bioplacenton® mengandung *placenta extract* dan *neomycin sulfate*. Kombinasi ini merupakan bagian dari perawatan luka yang sangat efektif. *Placenta extract* sebagai "biogenic stimulator" memegang peranan penting dalam mempercepat regenerasi sel dan penyembuhan luka. Sedangkan *neomycin sulfate* bekerja sebagai antibiotik yang mampu membunuh beragam jenis kuman dengan daya kerja yang tidak terganggu oleh nanah.

Pengujian efek penyembuhan luka sayat gel kulit buah pisang kepok ini diujikan pada punggung kelinci yang diberikan luka sayatan dengan panjang luka 3 cm dan kedalaman luka menembus lapisan kulit dermis sekitar 2 mm dari permukaan kulit (Artay, 2006). Pengamatan penelitian dilakukan dengan mengukur perubahan panjang luka pada kelinci. Interval waktu pengukuran setiap 1 x 24 jam dan dilanjutkan dengan mengoleskan gel pada luka. Pengamatan dilakukan hingga luka tertutup sempurna.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, diketahui ketiga gel ini memberikan efek penutupan luka yang berbeda-beda. Efek penyembuhan luka sayat untuk gel konsentrasi 10% penutupan luka 100% dari ketiga replikasi berturut-turut terjadi pada hari ke-16. Untuk konsentrasi 20% penutupan luka 100% yaitu replikasi pertama terjadi pada hari ke-14, replikasi kedua dan ketiga terjadi pada hari ke-13 dan untuk gel dengan konsentrasi 30% ini ditandai terjadinya penyembuhan (penutupan luka) 100% untuk replikasi pertama dan kedua berturut-turut terjadi pada hari ke-12, dan replikasi ketiga terjadi pada hari ke-11. Kontrol positif Bioplacenton®, replikasi

pertama terjadi pada hari ke-13, replikasi kedua pada hari ke-12, dan replikasi ketiga pada hari ke-13 dan untuk kontrol negatif memiliki efek penyembuhan luka untuk replikasi pertama terjadi pada hari ke-21, replikasi kedua pada hari ke-20, dan replikasi ketiga pada hari ke-21.

Dari hasil perhitungan rata-rata hari efek penyembuhan luka gel ekstrak kulit buah pisang kepok yaitu pada gel I dengan konsentrasi 10% memiliki efek penyembuhan luka 16 hari, untuk gel ke II dengan konsentrasi 20% memiliki efek penyembuhan luka 13,33 hari, untuk gel ke III dengan konsentrasi 30% memiliki efek penyembuhan luka 11,67 hari, untuk kontrol positif (Bioplacenton®) memiliki efek penyembuhan luka 12,66 hari dan untuk kontrol negatif memiliki efek penyembuhan luka 20,67 hari.

Hasil analisis statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL) uji efek gel yang mengandung konsentrasi ekstrak etanol kulit buah pisang kepok berbeda antara gel 10%, 20%, 30%, kontrol negatif dan Bioplacenton® menunjukkan perbedaan waktu penyembuhan luka. Hal ini terlihat dari hasil analisis hubungan antara formula dan kecepatan penutupan luka dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 5%, dan 1%.

Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) penyembuhan luka menunjukkan bahwa sediaan gel Bioplacenton® (kontrol positif) berbeda nyata (signifikan) dengan gel 30% dan gel konsentrasi 20% dan sangat berbeda nyata (sangat signifikan) dengan gel 10% dan kontrol negatif. Sedangkan basis gel tanpa ekstrak (kontrol negatif) menunjukkan perbedaan sangat nyata (sangat signifikan) dengan gel 10%, 20%, dan 30%.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa gel ekstrak etanol kulit buah pisang kepok berefek dalam penyembuhan luka sayat pada kelinci dan konsentrasi ekstrak yang optimum diberikan oleh sediaan gel ekstrak etanol kulit buah pisang kepok 30%.

Setelah diketahui efektivitas dari sediaan gel ekstrak etanol kulit buah pisang kepok, kemudian dilakukan uji stabilitas pada sediaan gel untuk mengetahui stabilitas fisik seperti organoleptik, homogenitas, daya sebar, pH dan viskositas. Uji stabilitas dilakukan dengan pengamatan sebelum dan setelah penyimpanan dengan metode *cycling test* selama 6 siklus.

Pengamatan organoleptis pada semua sediaan gel menunjukkan pengamatan sebelum dan sesudah penyimpanan tidak memiliki perubahan yang berarti. Yaitu terlihat pada warna sediaan gel yang berwarna coklat dan bau khas ekstrak serta kenampakan yang jernih dan transparan, ini menunjukkan bahwa pengamatan dalam parameter ini sediaan dikatakan stabil baik sebelum maupun setelah penyimpanan, atau komponen dalam sediaan selama penyimpanan tidak mengalami reaksi antara bahan yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi tanda-tanda reaksi dari perubahan warna, kenampakan dan bau.

Pengamatan homogenitas pada semua sediaan dianggap stabil dalam parameter homogenitas, baik sebelum maupun setelah penyimpanan. Ini didasari dari hasil yang didapatkan bahwa tidak adanya partikel padat yang terdapat dalam gel, serta tidak adanya pembentuk gel yang masih menggumpal atau tidak merata dalam sediaan.

Hasil pengamatan pH sediaan gel I (ekstrak 10%) mengalami penurunan dari pH 5,2 menjadi 4,4. Begitupun dengan gel II (ekstrak 20%) mengalami penurunan dari pH 5,3 menjadi 4,4 sama halnya dengan gel III (ekstrak 30%) juga mengalami penurunan dari pH 5,3 menjadi 4,4 setelah penyimpanan dipercepat. pH ketiga sediaan gel setelah penyimpanan tidak memenuhi kategori pH sediaan gel yang baik. Dimana pH sediaan gel yang baik adalah sesuai dengan pH kulit. Kulit memiliki mantel asam yang merupakan perlindungan pertama pada kulit. Mantel asam ini memiliki pH berkisar 4,5- 6,5. Jika semakin alkalis atau semakin asam suatu bahan yang akan mengenai kulit, maka semakin sulit untuk menetralsirnya dan kulit akan semakin lelah karenanya. Kulit akan dapat menjadi pecah-pecah, kering, sensitif dan mudah infeksi. Perubahan pH dapat disebabkan karena kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu dan kelembaban udara. Pada ketiga formula ini mengalami perubahan pH setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Artinya bahwa gel dengan basis HPMC 2% pH nya tidak stabil dalam penyimpanan dan tidak memiliki pH sesuai dengan pH fisiologis kulit yaitu 4,5-6,5.

Uji daya sebar sediaan dilakukan untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan gel untuk menyebar pada kulit atau untuk mengetahui kemampuan menyebar sediaan gel saat dioleskan pada kulit. Daya sebar sediaan semi padat yang baik untuk penggunaan topikal berkisar pada diameter 5-7 cm. Hasil pada pengujian daya sebar didapatkan adanya penurunan daya sebar pada setiap formula. Pada gel I (ekstrak 10%) menunjukkan daya sebar yang stabil pada 4,8 cm sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Pada gel II (ekstrak 20%) kenaikan dari 4,7 cm menjadi 4,76 cm. Sedangkan pada Pada gel III (ekstrak 30%) kenaikan dari 4,46 cm menjadi

4,5 cm. Perolehan daya sebar pada sediaan gel ini tidak memenuhi kategori daya sebar yang baik.

Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, dimana nilai viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi nilai viskositas maka makin besar daya tahan untuk mengalir. Pengukuran viskositas gel menggunakan *Viscometer Brookfield*. Hasil pengukuran viskositas sediaan gel ekstrak etanol kulit buah pisang kepok sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat, menunjukkan adanya perubahan. Viskositas sediaan gel pada gel I (ekstrak 10%) mengalami penurunan dari 4032 cP menjadi 3713 cP. Untuk gel II (ekstrak 20%) mengalami penurunan dari 4230 cP menjadi 4093 cP setelah penyimpanan. Sama halnya dengan gel III (ekstrak 30%) juga mengalami penurunan dari 4307 cP menjadi 4082 cP setelah penyimpanan. Viskositas sediaan gel menurun setelah proses *cycling test*. *Cycling test* siklus terakhir disimpan pada suhu tinggi. Suhu tinggi akan memperbesar jarak antar partikel sehingga gaya antar partikel akan berkurang. Jarak yang semakin besar menyebabkan viskositas semakin menurun (Anggraeni, 2012).

Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas didapatkan sediaan gel dengan ekstrak etanol kulit buah pisang kepok dengan konsentrasi 10%, 20% dan 30% efektif dalam membantu proses penyembuhan luka sayat pada kelinci dan konsentrasi yang paling optimum adalah sediaan gel ekstrak etanol kulit pisang kepok 30%. Untuk uji stabilitas fisik sediaan gel untuk ketiga formula didapatkan hasil pada pengamatan organoleptik, homogenitas dan viskositas yang memenuhi karakteristik dari sediaan

gel sedangkan pada pengukuran pH dan daya sebar tidak memenuhi kategori pH dan daya sebar yang baik.

Sesuai dengan firman Allah dalam QS Asy-Syuara ayat 7 yang artinya “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”. Umat manusia sebagai khalifah di muka bumi, diperintahkan oleh Allah swt untuk memperhatikan bumi dalam hal ini melakukan suatu pengkajian ilmu atau penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang baik. Salah satunya adalah penelitian terhadap pisang kepok (kulit pisang) dan didapatkan hasil bahwa kulit pisang kepok ini memiliki manfaat sebagai penyembuh luka. Dapat dilihat juga dalam penggalan terjemahan dari QS Al’An-am ayat 99 “perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” Seperti halnya dalam penelitian ini, digunakan pisang kepok yang sudah matang dan terbukti memiliki efek yang baik dalam penyembuhan luka. Inilah salah satu bukti kebesaran serta kebenaran perkataan Allah swt yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan dibuktikan dengan kajian ilmiah. Tidak ada keraguan bagiNya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (bagi orang-orang yang beriman).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dapat memberikan efek penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).
2. Konsentrasi optimum gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) yang dapat menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) adalah konsentrasi 30%.
3. Lama waktu yang dibutuhkan oleh sediaan gel ekstrak kulit buah pisang kepok (*Musa paradisiaca*) untuk menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) yakni pada konsentrasi gel 10% untuk ketiga replikasi kelinci berturut-turut terjadi penyembuhan luka 100% pada hari ke-16, untuk gel 20% terjadi penyembuhan luka 100% pada kelinci yaitu replikasi pertama pada hari ke-14, replikasi kedua dan ketiga pada hari ke-13 sedangkan pada gel 30% terjadi penyembuhan luka 100% yaitu replikasi pertama dan kedua pada hari ke-12, dan replikasi ketiga pada hari ke-11.

B. Saran

1. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan optimasi sediaan gel ekstrak kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*).
2. Disarankan untuk melakukan pengujian lanjutan pada gel ekstrak kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*) dengan jenis luka yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Anggraeni Y, dkk. *Karakteristik Sediaan dan Pelepasan Natrium Diklofenak dalam Sistem Niosom dengan Basis Gel Carbomer 940*. Pharmasciential Vol 1 (1). 2012).

Artay Y, Korhan A. *Histology and Morphometry of White New Zealand Rabbit Skin*. Indian veterinary journal. 2006.

Agarwal P. K., Singh, A., Gaurav, K., Goel, S., Khanna, H. D., Goel R. K. *Evaluation of Wound Healing Activity of Extracts of Plantain Banana (Musa sapientum var. Paradisiaca) in rats*. Indian: J Exp Biol. 2008.

Akpuaka, M.U. and Ezem, S. N. *Preliminary Phytochemical Screening of Some Nigerian Dermatological Plants*, Journal of Basic Physical Research. 2011.

Allen, V. L., *Remington The Science and Practice of Pharmacy*. Edisi ke- 22. Pharmaceutical Press London Philadelphia. 2013

Ansel. C. Howard. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta: UI Press. 2008.

Anwar, Enfionara. *Eksipien dalam Sediaan Farmasi Karakteristik dan Aplikasi*. Jakarta: PT.Dian Rakyat. 2012.

Ariani A, Nurjannah. *Daya Hambat Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Kepok Mentah (Musa paradisiaca) terhadap Pertumbuhan Escherichia coli Secara In Vitro*. Akademi Farmasi ISFI. Banjarmasin: 2017.

Atun, Sri, dkk. *Identifikasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Kimia dari Ekstrak Metanol Kulit Buah Pisang (Musa paradisiaca L)*. Departement Of Chemistry Education, Faulti Of Mathematics and Natural Sciences Yogyakarta. 2007.

Astawan, Made. *Sehat dengan Hidangan Kacang dan Biji-Bijian*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2009.

Bastone, E.B. Freer. TJ. McNamara. JR. *Epidemiology of dental trauma: A Review of the Literature*. Aust Dent J; 45(1): 2–5. 2000.

Berman, Audrey. *Buku Ajar Praktik Keperawatan* . Klinis Kozier & ERB. 2009.

Boateng, S.J. Matthews KH. Steven HNE. Eccieston GM. *Wound healing dressing and drug delivey system: A Review*. J Pharmaceu Sci; 97: 2892–923. 2007.

- Booolotion, Richard A. *Zoology an Introduction to the Study Of Animals*. London: Macmillan Publishing. 1979.
- Chen, L. Arbieva ZH. Guo S. Marucha PT, Mustoe TA, DiPietro LA. *Potisional differences in the wound transcriptome of skin and oral mucosa*. BMC genomic. 11: 471. 2010.
- Cohen, I.K, Diegelmann RF, Yager DR, Wornum IL, Graham M, Crossland MC. *Wound care and wound healing*: Schwartz SI, Spencer S, Fischer D, Galloway DF, of surgery. Edisi ke-7. New York: McGraw-Hill. 1999.
- Dewi, Christine Citra., dan Nyi Mekar Saptarini. *Review Artikel: Hidroksi Propil Metil Selulosa Dan Karbomer Serta Sifat Fisikokimianya Sebagai Gelling Agent*. Bandung: Universitas Padjadjaran. 2016.
- Dhawan, S., Medhi, B., & Chopra, S. *Formulation and Evaluation of Diltiazem Hydrochloride Gels for the Treatment of Anal Fissures*. Scientia Pharmaceutica. 2009.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. *Sediaan Galenik*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1986.
- Firdaus. *Teknik dalam Laboratorium Organik*. Laporan Penulisan Buku Ajar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, 2011.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan*. Yogyakarta: UGM. 2013.
- Hustamin, Rudy. *Panduan Memelihara Kelinci Hias*. Jakarta: Agro Media Pustaka. 2006.
- Jucket, G. Herbal Medicine. In: Craig C.R., Stitzel R.E. editors. *Modern Pharmacology With Clinical Applications*. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2004.
- Judd, H. *Wound Care Made Incredibly Easy*. 1st Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2007
- Kaplan, N.E and Hentz, V.R. *Emergency Management of Skin and Soft Tissue Wounds An Illustrated Guide*. Little Brown, Boston: USA. 1992
- Kastawi, dkk. *Vertebrata*. Malang: IKIP. 1992.
- Khan, Z.Z. *Recurent Epidural Abcess Caused by Propionibacterium acnes*. Khansas Journal of Medicine. 2012.

- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2012.
- Kozier & Erb, et al. *Buku Ajar Praktik Keperawatan Klinis edisi 5*. Jakarta: EGC. 2009.
- Kozma, C. Macklin. *Anatomy, Physiology, and Biochemistri of the rabbit*. The Biology. 1974.
- Kusumawardhani Aliefia, dkk. *Pengaruh Sediaan Salep Ekstrak Daun Sirih (Piper betle Linn.) terhadap Jumlah Fibroblas Luka Bakar Derajat IIA pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) Galur Wistar*. Malang: FKUB. 2015.
- Lachman, Leon., Liberman HA & Kaning JL. *Teori dan Praktek Farmasi Industri Edisi Ke-2*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2007.
- Lean, Widuasuryano. *Luka dan Perawatannya*. RSUD Ngudi Waluya Wlingi: Blitar. 2011.
- Marlinda, Mira. *Analisis Senyawa Metabolit Sekunder dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Biji Buah Alpukat (Perseaamericana Mill)*. Jurnal MIPA Unsrat online. 2012.
- Maulina, Lena. *Formulasi Gel Ekstrak Etanol Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana) dengan Variasi Gelling Agent Sebagai Sediaan Luka Bakar*. Yogyakarta: FF Univ Ahmad Dahlan. 2015.
- Mukhriani. *Analisis Farmakognosis*. Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairial-Naisaburi, al-Musnad al-Sahih alMukhtasar Bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulillah saw, Juz. IV (Bairut; Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th), h. 1729.
- Oktora, L., Kumala, R, Pengajar S., Studi, P., & Universitas, F. *Pemanfaatan Obat Tradisional dan Keamanannya*. 2006.
- Perdanakusuma, David S. *Plastic Surgery Departement*. Surabaya-Indonesia. Airlangga University School Of Medicine-Dr. Soetomo General Hospital. 2007.
- Prabawati, S., Suryanti dan Setyabudi, D. A. *Teknologi Pasca Panen dan Teknik Pengolahan Buah Pisang*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2008.

- Rinaldy, Akhmad. *Uji Efek Antiaskariosis Ekstrak Etanol Biji Pepaya (Carica papaya L) Terhadap Cacing Gelang secara In-Vitro (Skripsi)*. FIK UINAM. 2013.
- Rowe, Raymon C., et. al. *Handbook Of Pharmaceutical Excipients Sixth Edition*. Chicago: RPS Publishing. 2009.
- Rukmana, R. *Usaha Tani Pisang*. Yogyakarta: Kanisius. 1999.
- Rupina, Wenny, dkk. *Efek Salep Ekstrak Etanol 70% Daun Karamunting terhadap Re-epitelisasi Luka Insisi Kulit Tikus Wistar*. FK Tanjungpura. 2016.
- Saraswati, f. *Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Etanol 96% Limbah Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca) terhadap bakteri Penyebab Jerawat (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, dan Propioni bacterium acne)*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2015.
- Sastrosupadi, A. *Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian*. Malang: Kanisius. 2000.
- Satuhu, Supriyadi. *Berkebun Pisang*. Jakarta: Penebar Swadaya. 1992.
- Schwartz, seymor I shires. Spencer. *Intisari prinsip-prinsip ilmu bedah edisi 6*. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC. 2000.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009.
- Smeltzer, S. Bare BG. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth edisi 8 volume I*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. 2002.
- Song, H.S. Park TW. Sohn UD. dkk. *The effect of caffeic acid on wound healing in skin-incised mice*. Koeran J Physiol Pharmacol. 12: 343. 2008.
- Sonja, V. T. *Uji Fitokimia Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca L) Bahan Alam Sebagai Pestisida Nabati Berpotensi Menekan Serangan Serangga Hama Tanaman Umur Pendek*. Samarinda: FKIP Universitas Mulawarman. 2017.
- Sulastri, F. *Uji Toksisitas Akut yang Diukur dengan Penentuan LD50 Ekstrak Daun Pegagan Terhadap Mencit BALB/C*. Semarang. 2009
- Sumadi, Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

Supriadi, J. *Pengaruh Ekstrak Etanol Kulit Pisang Ambon (Musa Paradisaca, L. Forma Sapientum, L.) dalam Mempercepat Durasi Penyembuhan Luka Insisi pada Mencit Swiss Webster Betina*. Universitas Kristen Maranatha. Bandung: 2012.

Wasitaatmadja, Syarif. *Anatomi Kulit*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 2007.

Thakur R, Jain N, Pathak R, Sandhu SS. *Practices in Wound Healing Studies of Plants. Evid Based Complement Alternat Med*. 2011 may 26.


Tiara M, dkk. *Formulasi Gel Ekstrak Daun Sasaladahan (Paperomia pelucida (L.) H.B.K) dan Uji Efektivitasnya Terhadap Luka Bakar pada Kelinci (Oryctolagus cuniculus)*. Manado: FMIPA Unsrat. 2013.

Trenggono, Retno Iswari. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Voight, Rudolf. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995.

Warintek. *Pisang*. Bandung: Riset Pertanian. 2011.


Lampiran 1. Penyiapan Sampel Kulit Pisang Kepok




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN


MAKASSAR


Lampiran 2. Ekstraksi Kulit Pisang Kepok


Lampiran 3. Uji Identifikasi Golongan



Lampiran 4. Pembuatan Sediaan Gel



Lampiran 5. Uji Perlakuan

Lampiran 6. Uji Stabilitas Fisik

Lampiran 7. Perubahan Panjang Luka

Tabel 10. Perubahan panjang luka sayat pada kelinci (cm)

Hari ke	Gel 10%			Gel 20%			Gel 30%			Bioplacenton®			Basis Gel		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
0	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1	3,00	2,90	2,90	2,90	2,80	2,80	2,80	2,70	2,70	2,70	2,60	2,50	3,00	3,00	3,00
2	2,70	2,60	2,60	2,70	2,50	2,60	2,60	2,50	2,30	2,50	2,50	2,40	3,00	3,00	2,90
3	2,60	2,50	2,40	2,40	2,30	2,40	2,30	2,20	2,00	2,20	2,30	2,20	2,80	2,80	2,70
4	2,40	2,40	2,30	2,20	2,10	2,20	2,00	2,00	1,80	2,10	2,20	2,00	2,70	2,70	2,60
5	2,10	2,20	2,10	2,00	2,00	1,90	1,70	1,80	1,50	2,00	2,00	1,80	2,50	2,50	2,50
6	1,90	2,00	2,00	1,80	1,80	1,70	1,50	1,50	1,30	1,90	1,80	1,70	2,40	2,30	2,40
7	1,70	1,80	1,70	1,50	1,60	1,50	1,20	1,30	0,90	1,70	1,60	1,40	2,20	2,20	2,30
8	1,60	1,50	1,60	1,30	1,40	1,20	0,90	1,00	0,70	1,50	1,30	1,20	2,10	1,90	2,10
9	1,30	1,50	1,40	1,10	1,20	0,90	0,60	0,70	0,50	1,20	1,00	1,10	1,80	1,70	1,90
10	1,00	1,20	1,10	0,80	0,90	0,60	0,30	0,40	0,30	0,90	0,70	0,80	1,50	1,50	1,60
11	0,70	0,80	0,80	0,60	0,60	0,40	0,10	0,20	0	0,60	0,30	0,60	1,30	1,40	1,40
12	0,60	0,70	0,60	0,40	0,30	0,20	0	0		0,30	0	0,40	1,20	1,20	1,30
13	0,50	0,50	0,50	0,10	0	0				0		0	0,90	1,00	1,10
14	0,30	0,40	0,30	0									0,70	0,80	0,90
15	0,10	0,20	0,10										0,60	0,60	0,70
16	0	0	0										0,50	0,50	0,60
17													0,40	0,30	0,50
18													0,40	0,20	0,40
19													0,30	0,10	0,30
20													0,10	0	0,20
21													0		0

Keterangan:

 Luka tertutup 100%, luka sembuh

Lampiran 8. Persentase Perubahan Panjang Luka Sayat

Tabel 11. Persentase penyembuhan luka sayat kelinci

Hari ke	Gel 10%			Gel 20%			Gel 30%			Bioplacenton®			Basis Gel		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	3,33	3,33	3,33	6,67	6,67	6,67	10,00	10,00	10,00	13,33	23,33	0	0	0
2	10,00	13,33	13,33	10,00	16,67	13,33	13,33	16,67	23,33	16,67	16,67	20,00	0	0	3,33
3	13,33	16,67	20,00	20,00	23,33	20,00	23,33	26,67	33,33	26,67	23,33	26,67	6,67	6,67	10,00
4	26,67	26,67	23,33	33,33	30,00	26,67	33,33	43,33	40,00	30,00	33,33	43,33	10,00	10,00	13,33
5	30,00	33,33	30,00	33,33	33,33	36,67	43,33	50,00	50,00	33,33	33,33	40,00	16,67	16,67	16,67
6	36,67	43,33	43,33	40,00	40,00	43,33	50,00	50,00	56,67	36,67	40,00	43,33	26,67	23,33	20,00
7	43,33	40,00	43,33	50,00	46,67	50,00	60,00	56,67	70,00	43,33	46,67	53,33	33,33	33,33	23,33
8	46,67	50,00	46,67	56,67	53,33	60,00	70,00	66,67	76,67	50,00	56,67	60,00	30,00	36,67	30,00
9	56,67	50,00	53,33	63,33	60,00	70,00	80,00	76,67	83,33	60,00	66,67	63,33	40,00	43,33	36,67
10	66,67	60,00	63,33	73,33	70,00	80,00	90,00	86,67	90,00	70,00	76,67	73,33	50,00	50,00	46,67
11	76,67	73,33	73,33	80,00	80,00	86,67	96,67	93,33	100	80,00	90,00	80,00	56,67	53,33	53,33
12	80,00	76,67	80,00	86,67	90,00	93,33	100	100		90,00	100	86,67	60,00	60,00	56,67
13	83,33	83,33	83,33	96,67	100	100				100		100	70,00	66,67	63,33
14	90,00	86,67	90,00	100									76,67	73,33	70,00
15	96,67	93,33	96,67										80,00	80,00	76,67
16	100	100	100										83,33	83,33	80,00
17													86,67	90,00	83,33
18													86,67	93,33	86,67
19													90,00	96,67	90,00
20													96,67	100	93,33
21													100		100

Keterangan:

Luka tertutup 100%, luka sembuh

Lampiran 9. Perhitungan RAL, Hubungan antara formula dan kecepatan penutupan luka

Tabel 12. Hubungan antara formula dan kecepatan penutupan luka

Formula	Hari Ke-n luka tertutup 100%			Jumlah (Hari)	Rata-rata (Hari)
	Replikasi				
	1	2	3		
Gel 10%	16	16	16	48	16,00
Gel 20%	14	13	13	40	13,33
Gel 30%	12	12	11	35	11,66
Bioplacenton	13	12	13	38	12,66
Basis Gel	21	20	21	62	20,66
Jumlah	76	75	74	223	14,86

Perhitungan Anova

Faktor Koreksi : $\frac{(\sum Y)^2}{k \times t}$

$$: \frac{(223)^2}{5 \times 3}$$

$$: \mathbf{3315,26}$$

JK Total : $((16)^2 + (16)^2 + (16)^2 + (14)^2 + (13)^2 + (13)^2 + (12)^2 + (12)^2 + (11)^2 + (13)^2 + (12)^2 + (13)^2 + (21)^2 + (20)^2 + (21)^2) - FK$

$$: 3475 - 3315,26$$

$$: \mathbf{159,74}$$

JK Perlakuan : $\frac{(48)^2 + (40)^2 + (35)^2 + (38)^2 + (62)^2}{3} - FK$

$$: 3472,33 - 3315,26$$

$$: \mathbf{157,07}$$

JK Galat : JK Total – JK Perlakuan

: 159,74 – 157,07

: **2,67**

DB Total : (k x t) – 1

: (5 x 3) – 1

: **14**

DB Perlakuan : k – 1

: 5 – 1

: **4**

DB Galat : DB Total – DB Perlakuan

: 14 – 4

: **10**

KT Perlakuan : $\frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$

: $\frac{157,07}{4}$

: **39,26**

KT Galat : $\frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$

: $\frac{2,67}{10}$

: **0,26**

$$F_{\text{hitung}} \text{ Perlakuan} : \frac{KT \text{ Perlakuan}}{KT \text{ Galat}}$$

$$: \frac{39,27}{0,26}$$

$$: 151,03$$

Lampiran 10. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel

Tabel 13. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel

Sumber Keragaman (SK)	Jumlah Kuadrat (JK)	Derajat Bebas (DB)	Kuadrat Tengah (KT)	F-Hitung	F-Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	157,07	4	39,27	151,05	2,13	3,74
Galat	2,67	10	0,26			
Total	159,74	14	39,54			

Kesimpulan

$F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$: perlakuan dan hari berbeda sangat signifikan

$F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$: berbeda nyata (5%), sangat nyata (1%)

Koefisien Keseragaman : $\frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100\%$

$$: \frac{\sqrt{0,26}}{14,86} \times 100\%$$

$$: 3,36$$

Perhitungan Nilai BNT 0,05

$$\begin{aligned} \text{BNT} &= t_{\alpha} ; \text{dbG} \frac{\sqrt{2KTG}}{r} \\ &= t(0,05) ; \frac{\sqrt{2 \times 0,26}}{3} \\ &= 1,81 \frac{\sqrt{0,52}}{3} \\ &= \mathbf{0,76} \end{aligned}$$

Perhitungan Nilai BNT 0,01

$$\begin{aligned} \text{BNT} &= t_{\alpha} ; \text{dbG} \frac{\sqrt{2KTG}}{r} \\ &= t(0,01) ; \frac{\sqrt{2 \times 0,26}}{3} \\ &= 2,76 \frac{\sqrt{0,52}}{3} \\ &= \mathbf{0,17} \end{aligned}$$

Lampiran 11. RAL (Rancangan Acak Lengkap), antara perlakuan dan hari penyembuhan

Tabel 14. BNT (Beda Nyata Terkecil) persentase penyembuhan luka

Perlakuan		I	II	III	IV	V
	Rata-rata	11,66	12,66	13,33	16,00	20,66
Gel 30% (I)	11,66	0				
Bioplacenton® (II)	12,66	1,00*	0			
Gel 20% (III)	13,33	1,67*	0,67*	0		
Gel 10% (IV)	16,00	4,34**	3,34**	2,67**	0	
Basis Gel (V)	20,66	9,00**	8,00**	7,33**	4,66**	0
		BNT 0,05 = 0,76		BNT 0,01 = 0,17		

Keterangan

* = Signifikan (Berbeda nyata)

** = Sangat Signifikan (Sangat berbeda nyata)

(n) = Non Signifikan

Lampiran 12. Perhitungan Persentase Rendamen Ekstrak

$$\begin{aligned} \text{Persen Rendamen} &= \frac{\text{Bobot ekstrak}}{\text{Bobot simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{52,24 \text{ g}}{500 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 10,44 \% \end{aligned}$$

Lampiran 13. Perhitungan Pembuatan Gel

1) Formula Gel 10%

$$\begin{aligned} \text{Ekstrak kulit pisang kepok} &: \frac{10}{100} \times 25 \text{ g} = 2,50 \text{ g} \\ \text{Hidroksiropil Metilsellulosa} &: \frac{2}{100} \times 25 \text{ g} = 0,50 \text{ g} \\ \text{Metil Paraben} &: \frac{0,1}{100} \times 25 \text{ g} = 0,02 \text{ g} \\ \text{Propilenglikol} &: \frac{15}{100} \times 25 \text{ g} = 3,75 \text{ g} \\ \text{Aquadest} &: \text{ad } 25 \text{ g} \end{aligned}$$

2) Formula Gel 20%

$$\begin{aligned} \text{Ekstrak kulit pisang kepok} &: \frac{20}{100} \times 25 \text{ g} = 5 \text{ g} \\ \text{Hidroksiropil Metilsellulosa} &: \frac{2}{100} \times 25 \text{ g} = 0,50 \text{ g} \\ \text{Metil Paraben} &: \frac{0,1}{100} \times 25 \text{ g} = 0,02 \text{ g} \\ \text{Propilenglikol} &: \frac{15}{100} \times 25 \text{ g} = 3,75 \text{ g} \\ \text{Aquadest} &: \text{ad } 25 \text{ g} \end{aligned}$$

3) Formula Gel 30%

Ekstrak kulit pisang kepok : $\frac{30}{100} \times 25 \text{ g} = 7,50 \text{ g}$

Hidroksiropil Metilsellulosa : $\frac{2}{100} \times 25 \text{ g} = 0,50 \text{ g}$

Metil Paraben : $\frac{0,1}{100} \times 25 \text{ g} = 0,02 \text{ g}$

Propilenglikol : $\frac{15}{100} \times 25 \text{ g} = 3,75 \text{ g}$

Aquadest : ad 25 g



Lampiran 14. Gambar Penelitian

Gambar 3. Ekstraksi



(a)



(b)



(c)



(d)

Keterangan:


(a) Pisang Kepok (*Musa paradisiaca*)

(b) Pengeringan

(c) Penguapan pelarut dengan *rotary evaporator*

(d) Ekstrak kental kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca*)

Gambar 4. Identifikasi Senyawa Golongan



(a)

(b)


(c)

Keterangan:

(a) Uji alkaloid pereaksi Mayer

(b) Uji alkaloid pereaksi Dragendoff

(c) Uji alkaloid pereaksi Wagner



(d)

(e)

(f)


Keterangan:

(d) Uji Flavonoid

(e) Uji Tanin

(f) Uji Saponin

Gambar 5. Sediaan Gel




Keterangan:

- (a) Gel Estrak Kulit Buah Pisang Kepok 10%
- (b) Gel Estrak Kulit Buah Pisang Kepok 20%
- (c) Gel Estrak Kulit Buah Pisang Kepok 30%
- (d) Basis Gel

Gambar 6. Uji Perlakuan



(a)



(b)



(c)




(d)

Keterangan:


- (a) Proses penyayatan
- (b) Pengukuran panjang luka
- (c) Proses pembentukan keropeng
- (d) Luka sayat sembuh 100%

Gambar 7. Pengamatan Homogenitas Gel



- Keterangan:
- (a) Sebelum penyimpanan dipercepat
 - (b) Setelah penyimpanan dipercepat

Gambar 8. Pengukuran Daya Sebar Gel



Keterangan:

(a) Sebelum penyimpanan dipercepat

(b) Setelah penyimpanan dipercepat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Gambar 9. Pengukuran pH Gel



(a)



(b)

Keterangan:

(a) Sebelum penyimpanan dipercepat

(b) Setelah penyimpanan dipercepat

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Hasniar sering disapa Nhyar atau Nibel. Lahir di Soppeng, 1 Januari 1996. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan H.Sarifuddin Dupe dan Hj.Yulianti.

Memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Pertiwi IV kemudian melanjutkan ke SDN Inti 135 Salebbo Mario, yang kemudian dilanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMPN 1 Marioriwawo. Setelah itu dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN 5 Soppeng. Setelah lulus SMA kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi tepatnya di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014 “Galenica” melalui jalur SPAN PTAIN.

Selama kuliah Hasniar aktif mengikuti organisasi di tingkat fakultas FKIK yaitu HMJ Farmasi periode 2014-2015 dan 2015-2016 dengan Senat Mahasiswa FKIK periode 2016-2017.