

**UJI SENYAWA ANTIOKSIDAN DARI FRAKSI ETIL ASETAT DAUN
BOTTO-BOTTO (*Chromolaena odorata* (L.) DENGAN METODE DPPH (2,2-
difenil-1-pikrilhidrazil)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURAFIFAH HAMID

NIM: 70100114044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurafifah Hamid
NIM : 70100114044
Tempat/TanggalLahir : Sinjai, 04 April 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Bikeru, Sinjai Selatan
Judul : Uji Senyawa Antioksidan dari Fraksi Etil Asetat Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* (L.) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2018
Penulis,

Nurafifah Hamid
NIM. 70100114044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Senyawa Antioksidan Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)” yang disusun oleh Nurafifah Hamid, NIM : 70100114044, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 M, yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 20 Agustus 2018 M
8 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: A. Armisman Edy Paturusi, S.Farm. M.Si. Apt	(.....)
Penguji I	: M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Mukhtar Latfi, M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 419550263 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah swt. atas segala nikmat kesehatan, kekuatan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Rasa syukur yang tiada terhingga kepadaNya atas segala hidayah dan karunia yang penulis dapatkan.

Salam dan shalawat senantiasa penulis kirimkan kepada junjungan utusan Allah, nabi besar Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat yang telah memberi kontribusi besar dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Semoga kita dapat menapak tilas langkah beliau.

Skripsi ini berjudul “ Uji Senyawa Antioksidan dari Fraksi Etil Asetat Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* (L.) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)”. Ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih penulis haturkan kepada kedua orang tercinta Ayahanda Abd. Hamid dan Ibunda Syamsiah Salama,serta keluarga besar Salama yang tak henti-hentinya memberi do'a dan

motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk materi, nasehat dan motivasi, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Kalian adalah orang-orang di balik kesuksesan penulis menyelesaikan pendidikan di jenjang (S1). Kepada semua keluarga besar Galenica, teman-teman penulis yaitu Team Botto-botto dan Kayu Jawa (Nunu,Izzya,Eci dan Imran) dan Team SKG yang selalu memberi semangat dan dorongan sehingga penulis dapat dengan gigih menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih pula kepada Bapak/ Ibu :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., Wakil Dekan I (bidang akademik), Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., Wakil Dekan II (bidang keuangan), Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., Wakil Dekan III (bidang kemahasiswaan) FKIK UIN Alauddin Makassar.
4. Haeria, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar.
5. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar.
6. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing I bagi penulis yang senantiasa dengan sabar memberi arahan dan bimbingannya kepada penulis.

7. Andi Armisman Edy Paturusi, S. Farm., M.Si., Apt. selaku pembimbing II penelitian bagi penulis yang sangat banyak memberi saran dan arahan selama penelitian.
8. M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi dalam penyusunan skripsi penelitian bagi penulis.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku penguji agama dalam penyusunan skripsi penelitian bagi penulis.
10. Dosen dan seluruh staf jurusan Farmasi beserta laboran atas bantuan dan kerjasamanya yang diberikan kepada penulis saat melaksanakan penelitian.
11. Keluarga besar Mahasiswa Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, rekan-rekan angkatan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 atas segala bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
12. Sahabat-sahabat SMP saya yang awet sampai kuliah Riskatul Muqarramah, Sukarni dan Sry Wahyuni dan alumni yang lain yang selama ini menemani dan menghibur saya.
13. Sahabat SMA saya, Hilyatul Jannah yang setia mendengar cerita-cerita saya
14. Kepada Nur Rahmah, Dana Febriani Amna, Siti Qurataayun, Sri Rahayu, Asmirah Resky Nur Octaviani, Rahmaniah Ediman, Lilis Kurnianti, Resky Nugraha, Serina Saud, serta teman-teman yang lain yang telah membantu dan menemani saya selama ini.
15. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pada penulis selama ini.

Akhirnya, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu di bidang Farmasi pada umumnya dan semoga Allah swt. selalu melimpahkan rahmat dan hidayah didalamnya. *Aamiin ya Rabbal Aalamin..*

Samata-Gowa,

Penulis,

Nurafifah Hamid
NIM. 70100114044



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	4
C. <i>Kajian Pustaka</i>	6
D. <i>Tujuan dan Manfaat Penelitian</i>	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	10
A. <i>Uraian Tanaman</i>	10
B. <i>Antioksidan</i>	12
C. <i>Uraian Metode Ekstraksi</i>	14
D. <i>Metode Pengujian Antioksidan dengan DPPH</i>	17
E. <i>Tinjauan Islam</i>	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. <i>Jenis Penelitian</i>	24
B. <i>Waktu dan Tempat Penelitian</i>	24
C. <i>Pendekatan Penelitian</i>	24
D. <i>Alat dan Bahan</i>	24
E. <i>Prosedur Kerja</i>	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
A. <i>Hasil Penelitian</i>	28
B. <i>Pembahasan</i>	33

BAB V PENUTUP.....	40
A. <i>Kesimpulan</i>	40
B. <i>Saran</i>	40
KEPUSTAKAAN.....	41
LAMPIRAN.....	43
<i>Lampiran 1. Alur Penelitian</i>	423
<i>Lampiran 2. Alur Fraksinasi</i>	44
<i>Lampiran 3. Perhitungan Pengenceran DPPH</i>	445
<i>Lampiran 4 . Gambar Penelitian</i>	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (<i>Chromolaena odorata</i>).....	28
Tabel 2. Hasil Gabungan Fraksi Ekstrak Daun Botto-botto (<i>Chromolaena odorata</i>).....	28
Tabel 3 Hasil Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (<i>Chromolaena odorata</i>).....	29
Tabel 4 Hasil Gabungan Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (<i>Chromolaena odorata</i>).....	29
Tabel 5 Hasil Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (<i>Chromolaena odorata</i>).....	30
Tabel 6 Hasil Gabungan Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (<i>Chromolaena odorata</i>).....	30
Tabel 7 Hasil Pengujian DPPH.....	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tanaman Botto-botto	9
Gambar 2 Hasil Ekstraksi Daun Botto-botto	44
Gambar 3 Partisi dengan Sentrifuge	44
Gambar 4 Proses Fraksinasi.....	45
Gambar 5 Hasil Fraksinasi.....	45
Gambar 6. Kromatografi Lapis Tipis pada Sinar Tampak.....	46
Gambar 7 Kromatografi Lapis Tipis pada Sinar UV 254 nm	46
Gambar 8. Kromatografi Lapis Tipis pada Sinar UV 366 nm.....	47
Gambar 9. Kromatografi Lapis Tipis setelah Disemprot H ₂ SO ₄	47
Gambar 10. Kromatografi Lapis Tipis pada Sinar Tampak.....	48
Gambar 11 Kromatografi Lapis Tipis pada Sinar UV 254 nm	48
Gambar 12. Kromatografi Lapis Tipis pada Sinar UV 366 nm	49
Gambar 13. Kromatografi Lapis Tipis setelah Disemprot H ₂ SO ₄	49
Gambar 14. Kromatografi Lapis Tipis setelah Disemprot H ₂ SO ₄	50
Gambar 15. Kromatografi Lapis Tipis setelah disemprot H ₂ SO	50
Gambar 16. Kromatografi Lapis Tipis pada Sinar Tampak.....	51
Gambar 17. Kromatografi Lapis Tipis pada Sinar UV 254 nm.....	51
Gambar 18. Kromatografi Lapis Tipis pada Sinar UV 366 nm.....	52
Gambar 19. Kromatografi Lapis Tipis setelah Disemprot H ₂ SO ₄	52
Gambar 20. Kromatografi Lapis Tipis setelah disemprot DPPH.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian.....	41
Lampiran 2. Alur Fraksinasi	42
Lampiran 3. Perhitungan.....	43
Lampiran 4. Gambar Penelitian	44



ABSTRAK

Nama Penulis : Nurafifah Hamid
NIM : 70100114044
Judul Skripsi : Uji Senyawa Antioksidan dari Fraksi Etil Asetat Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) dengan Metode DPPH (2,2-difenyl-1-pikrilhidrazil)

Telah dilakukan penelitian tentang Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi Etil Asetat Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) dengan Metode DPPH (2,2-difenyl-1-pikrilhidrazil). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter antioksidan dengan mengamati peredaman warna DPPH (2,2-difenyl-1-pikrilhidrazil) pada lempeng Kromatografi Lapis Tipis yang telah dielusi sampel fraksi Etil Asetat Daun Botto-botto. Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) diekstraksi dengan metanol kemudian difraksinasi dengan metode Kromatografi Cair Vakum sebanyak 3 kali. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya peredaman warna dari warna ungu menjadi warna kuning. Dari fraksi etil asetat diperoleh hasil penelitian F2, F3, F6, F7, F8, F9, F12, F13, F14, F15, F16 dan F17 memiliki aktivitas antioksidan. Dari identifikasi golongan senyawa dengan pereaksi semprot H₂SO₄ 10%, Dragendorf, AlCl₃, FeCl₃, dan Liebermann-Bouchard menunjukkan bahwa ekstrak Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) mengandung senyawa organik, alkaloid, flavonoid, fenolik, terpenoid atau triterpenoid.

Kata kunci : *Chromolaena odorata*, Antioksidan, Kromatografi Lapis Tipis Metode DPPH (2,2-difenyl-1-pikrilhidrazil)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Author : Nurafifah Hamid

Student Reg. Number : 70100114044

Title : Antioxidant Compound Test of Botto-botto Ethyl Acetate Fraction (*Chromolaena odorata*) by DPPH (2,2-difenyl-1-pikrilhidrazil) Method

Research has been conducted on the Antioxidant Activity Test of Botto-botto Ethyl Acetate Fraction (*Chromolaena odorata*) with DPPH (2,2-difenyl-1-pikrilhidrazil) Method. This study aims to determine antioxidant parameters by observing DPPH (2,2-difenyl-1-pikrilhidrazil) color damping on Thin Layer Chromatography plates that have been eluted by samples of Bottled-Botto Ethyl Acetate Leaf fraction. Botto-botto leaves (*Chromolaena odorata*) were extracted with methanol then fractionated by Vacuum Liquid Chromatography method 3 times. Positive results are indicated by the color reduction from purple to yellow. From ethyl acetate fraction obtained by research F2, F3, F6, F7, F8, F9, F12, F13, F14, F15, F16 and F17 have antioxidant activity. From the identification of compound classes with spray reagent H₂SO₄ 10%, Dragendorf, AlCl₃, FeCl₃, and Liebermann-Bouchard showed that Botto-botto Leaf extract (*Chromolaena odorata*) contains organic compounds, alkaloids, flavonoids, phenolics, terpenoids or triterpenoids.

Keywords: *Chromolaena odorata*, Antioxidants, Thin Layer Chromatography Method, DPPH (2,2-difenyl-1-pikrilhidrazil)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan siap saji saat ini yang banyak dikonsumsi masyarakat dapat mengandung xenobiotik seperti bahan pengawet, zat pewarna, penyedap rasa, serta zat kimia lain yang apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat sangat berbahaya. Xenobiotik tersebut dapat menjadi radikal bebas di dalam tubuh manusia. Radikal bebas ini dapat merusak sistem imunitas tubuh serta dapat memicu berbagai penyakit degenerative muncul seperti penyakit kanker dan stroke. Oleh karena itu, dibutuhkan antioksidan untuk mengatasi efek negatif dari radikal bebas tersebut (Ni et al., 2014)

Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul yang reaktif, memiliki elektron tidak berpasangan dan menginduksi radikal bebas. *Reactive Oxygen Species* (ROS) diyakini secara luas diyakini terlibat sebagai penyebab berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung koroner, penyakit alzheimer, gangguan neurodegeneratif, aterosklerosis, katarak dan termasuk peradangan yang ditunjukkan dengan tanda-tanda stress oksidatif. Senyawa ROS diantaranya adalah radikal anion superoksida, oksigen singlet, hidrogen peroksida dan radikal hidroksil yang sangat reaktif. Senyawa ROS diantaranya adalah radikal anion superoksida, oksigen singlet, hidrogen peroksida dan radikal hidroksil yang sangat reaktif (Nugraha, Firmansyah, & Jumaryatno, 2017).

Di Indonesia bahan-bahan alami seperti tanaman banyak digunakan sebagai pengawet. Banyak penelitian yang dilakukan tentang pengawet menggunakan bahan

alam seperti belimbing wuluh, jahe, kayu manis, daun nimba, dan sebagainya. *Chromolaena odorata* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan kirinyuh, termasuk tanaman gulma yang terdapat dalam pertanian dan lingkungan. Pada umumnya tumbuhan *Chromolaena odorata* memiliki kandungan senyawa seskuiterpen lakton dan diterpen lakton, disamping metabolit lain seperti flavonoid, terpenoid dan sterol (Her, Parnanto, Setyowati, & Utami, 2013).

Menurut Owolabi et al (2010) beberapa senyawa kimia dari minyak *Chromolaena odorata* dilaporkan dapat memiliki sifat antibakteri - pinene, dan germacrene D dalam *Chromolaena odorata* bersifat antibakteri terhadap *Bacillus cereus* dan *Aspergillus niger*. Senyawa golongan terpenoid yang terdapat pada *Chromolaena odorata* dapat berfungsi sebagai antioksidan. Sedangkan menurut penelitian Tran et al (2011) ekstrak daun *Chromolaena odorata* memiliki kandungan flavonoid, fenolik, alkaloid, terpenoid, dan minyak esensial. Dengan adanya informasi tentang kandungan senyawa dari Botto-botto (*Chromolaena odorata*) maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai potensi *Chromolaena odorata* sebagai bahan pengawet alami dan aktivitas anti oksidannya untuk pengobatan (Her et al., 2013).

Adanya flavonoid, terpenoid, alkaloid dan senyawa lainnya memungkinkan adanya efek antioksidan, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai identifikasi senyawa antioksidan hasil fraksi etil asetat daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) dengan metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil).

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nahl/16 :10-11

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu(10). Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan(11)” (Kementrian Agama RI,2013:268).

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pangan bagi kebutuhan manusia dan hewan. Ayat ini juga mengingatkan manusia agar selalu mensyukuri nikmat Allah swt. dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa Dia yang maha kuasa yang telah menurunkan dari arah langit air hujan sehingga tumbuhlah berbagai tanaman untuk dimanfaatkan. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) yang berkhasiat sebagai antioksidan. Antioksidan tersebut dapat berfungsi untuk menangkal radikal bebas yang dapat merusak tubuh manusia sehingga Daun Botto-botto (*Chromoalaena odorata*) dapat dimanfaatkan untuk pengobatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

B. Rumusan Masalah

Apakah fraksi etil asetat daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) memiliki aktivitas antioksidan?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Tumbuhan Botto-botto (*Chromolaena odorata* (L.) merupakan tumbuhan liar yang banyak tumbuh di Sulawesi khususnya di Kabupaten Gowa. Daun Botto-botto banyak dimanfaatkan sebagai obat saat terjadi luka dan pembekuan darah saat terjadi bisul atau borok.
- b. Ekstraksi adalah kegiatan penarikan zat dengan menggunakan pelarut metanol.
- c. Partisi ekstrak adalah proses pemisahan untuk memperoleh komponen zat terlarut dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut yang sesuai.
- d. Partisi cair padat merupakan pemisahan satu komponen dari padatan dengan melarutkannya dalam pelarut, tetapi komponen lainnya tidak dapat dilarutkan dalam pelarut tersebut.
- e. Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur.
- f. Etil Asetat
Etil asetat merupakan senyawa organik dengan rumus $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OC}(\text{O})\text{CH}_3$ yang digunakan untuk partisi sampel daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*).

g. Antioksidan

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat laju oksidasi molekul lain atau menetralkan radikal bebas.

h. Radikal Bebas

Radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, yang sangat reaktif terhadap sel-sel tubuh.

i. Identifikasi Senyawa Antioksidan dengan Metode DPPH

Identifikasi senyawa antioksidan dengan metode DPPH didefinisikan sebagai pengidentifikasian senyawa antioksidan pada setiap fraksi dengan melihat hasil positif berupa perubahan warna dari ungu DPPH menjadi kuning tanpa mengidentifikasi golongan senyawanya.

j. Fraksi Tingkat 1

Fraksi tingkat 1 merupakan hasil fraksi yang dilakukan pertama kalinya dengan metode Kromatografi Cair Vakum yang terdiri dari 3 fraksi berdasarkan persamaan noda pada Kromatografi Lapis Tipis, yaitu fraksi F1, F2 dan F3.

k. Fraksi Tingkat 2

Fraksi tingkat 2 didefinisikan sebagai hasil Kromatografi Cair Vakum dari fraksi F2 yang kemudian difraksi kembali dan menghasilkan 6 fraksi berdasarkan persamaan noda pada Kromatografi Lapis Tipis yaitu fraksi F4, F5, F6, F7, F8, dan F9.

l. Fraksi Tingkat 3

Fraksi tingkat 3 didefinisikan sebagai hasil Kromatografi Cair Vakum dari fraksi F9 yang kemudian difraksi kembali dan menghasilkan 9 fraksi

berdasarkan persamaan noda pada Kromatografi Lapis Tipis yaitu fraksi F10,F11,F12,F13,F14,F15,F16,17 dan F18.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji bagaimana fraksi etil asetat daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* (L.) memiliki aktivitas antioksidan.

D. Kajian Pustaka

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Parnanto dkk (2013), dengan judul “Kapasitas Antioksidan dan Kemampuan Antimikrobia pada Daun Kirinyuh (*Chromolaena odorata*) Selama Penyimpanan Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*) pada Suhu Dingin” dimana sampel yang diuji kapasitas antioksidannya berupa ekstrak kental (pasta) dari *Chromolaena odorata*. Dari hasil pengujian diketahui kapasitas antioksidan ekstrak daun *Chromolaena odorata* adalah 49,037 %. Hasil analisis kapasitas antioksidan ikan tongkol menunjukkan, kapasitas antioksidan tertinggi sebesar 27,11 % pada sampel *Chromolaena odorata* 0,75 % dan terendah sebesar 10,09 % pada sampel kontrol dihari ke-0. Sedangkan kapasitas antioksidan yang tertinggi dan terendah setelah penyimpanan selama 5 hari pada suhu rendah (0°C) sebesar 11,64 % pada sampel *Chromolaena odorata* 0,75 % dan 0,73 % pada sampel kontrol. Semakin tinggi konsentrasi *Chromolaena odorata* maka semakin tinggi pula kapasitas antioksidan ikan tongkol karena ekstrak *Chromolaena odorata* mempunyai kapasitas antioksidan. Dari hasil pengujian diketahui kapasitas antioksidan ekstrak daun *Chromolaena odorata* adalah 49,037 %.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kavitha Vijayaraghavan (2013) dengan judul “Studies On Phytochemical Screening And Antioxidant Activity Of *Chromolaena Odorata* And *Annona squamos*” dimana Ekstrak daun dan biji *Chromolaena odorata* diekstraksi dengan metanol dan kemudian dibuat suspensi DPPH dengan ekstrak. Suspensi diinkubasi selama 30 menit dalam kondisi gelap. Selanjutnya, setiap interval 5 menit penyerapan larutan diukur menggunakan pemindaian spektrum sinar ganda UV untuk mengukur aktivitas antioksidannya. Analisis pada ekstrak menunjukkan kemampuan ekstrak dari *Chromolaena odorata* menunjukkan adanya antioksidan dengan berbagai kandungan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, saponin, kuinon dan lain-lain.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syukrianto pada tahun 2017 dengan judul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Laruna (*Chromolaena odorata.l.*) dengan metode DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazin*) dijelaskan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada ekstrak etil asetat daun laruna dengan nilai IC50 sebesar 106,83 ppm, sedangkan aktivitas antioksidan terendah terdapat pada ekstrak n-Heksan dengan nilai IC50 sebesar 355,60 ppm. Ekstrak metanol, etil asetat dan n-Heksan daun laruna positif mengandung senyawa tanin, asam fenolik dan flavonoid. Hal ini dibuktikan melalui uji pendahuluan berupa uji skrining fitokimia dengan menggunakan pereaksi yang spesifik untuk uji kandungan senyawa tanin, asam fenolik dan flavonoid.

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rini Pramesti dengan judul “Aktivitas Antioksidan Ekstrak Rumput Laut *Caulerpa serrulata* Dengan Metode DPPH (*1,1-difenil 2 pikrilhidrazil*)” yang diekstraksi secara maserasi dengan metanol yang kemudian diuji Peredaman Radikal Bebas Untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak *C. serrulata* secara kualitatif. Uji ini menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan cara menotolkan ekstrak pada plat KLT kemudian dielusi dengan kloroform. Plat KLT dikeringkan dan disemprot dengan larutan 0,004% *1,1-difenil-2-pikrilhidrazil* (DPPH) dalam metanol. Setelah 30 menit plat KLT diamati, uji positif sebagai antioksidan apabila terjadi perubahan warna pada plat KLT dari warna ungu berubah putih kekuningan dengan latar ungu disekitar spot. Hasil uji aktivitas antioksidan dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi semakin tinggi pula tingkat inhibisi.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari fraksi etil asetat daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*).

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah kepada masyarakat tentang khasiat dari daun botto-botto (*Chromolaena odorata*) sebagai antiradikal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan ilmu pengetahuan masyarakat tentang khasiat dari botto-botto (*Chromolaena odorata*), serta dapat dimanfaatkan sebagai tanaman potensi daerah.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi

Regnum : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Asterales

Famili : Asteraceae

Genus : *Chromolaena*

Spesies : *Chromolaena odorata* (L.)

(Tjitrosoepomo, 2010),.



(Gambar 1. Tanaman Botto-botto (*Chromolaena odorata*))

2. Nama Daerah

Chromolaena odorata (L.) dikenal di Indonesia dan negara lain dengan nama yang berbeda. Di Makassar khususnya, spesies ini dikenal dengan beberapa nama, seperti Botto'-Botto', Laruna, dan Gondrong-Gondrong. Beberapa daerah lain misalnya, memiliki nama tersendiri, Kopasanda di Maros, Ki Rinyuh di Sunda, Tekelan di Jawa, *Siam Weed* atau *Jack in the Bush* di Inggris. (Prawiradiputra, 2006).

Letak cabang biasanya berhadap-hadapan (oposit) dan jumlahnya sangat banyak. Percabangannya yang rapat menyebabkan berkurangnya cahaya matahari ke bagian bawah, sehingga menghambat pertumbuhan spesies lain, termasuk rumput yang tumbuh di bawahnya. Dengan demikian gulma ini dapat tumbuh sangat cepat dan mampu mendominasi area dengan cepat pula. Kemampuannya mendominasi area dengan cepat ini juga disebabkan oleh produksi bijinya yang sangat banyak (Akbar,2017).

Tumbuhan ini sangat cepat tumbuh dan berkembang biak. Karena cepat perkembangbiakan dan pertumbuhannya, gulma ini cepat membentuk komunitas sehingga dapat menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain. Botto-Botto dapat tumbuh pada ketinggian 1000–2800 m dpl, tetapi di Indonesia banyak ditemukan di dataran rendah (0–500 m dpl) seperti di kebun karet dan kelapa serta di padang penggembalaan. (Prawiradiputra, 2006).

3. Kandungan Kimia

Tumbuhan ini banyak mengandung tannin, polifenol, kuinon, flavonoid, steroid, triterpenoid, dan monoterpen (Sudarmo, 2014). *Chromolaena odorata* diketahui mengandung senyawa fitokimia antara lain: quinon, steroid, terpenoid, glikosida jantung, saponin, alkaloid, tannin, flavonoid, flavonon, flavon, flavonoid glukosid, pirolizidin alkaloid, dan essential oil (Julian, 2015).

4. Kegunaan

Secara tradisional, tumbuhan gulma siam atau botto-botto terutama bagian daun banyak dimanfaatkan dalam pengobatan. Khasiat dari daun gulma siam adalah

untuk menangani gigitan lintah, luka jaringan lunak, luka bakar, dan infeksi kulit. Secara tradisional daun gulma siam digunakan sebagai obat dalam penyembuhan luka, obat kumur untuk pengobatan sakit pada tenggorokan, obat batuk, obat malaria, antimikroba, sakit kepala, antidiare, astringen, antispasmodik, antihipertensi, antiinflamasi dan diuretik (Vital dan Rivera, 2009). Daun gulma siam juga telah diaplikasikan pada manusia untuk membantu pembekuan darah akibat luka bisul atau borok (Hadiroseyani, dkk., 2005).

B. Antioksidan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berubahnya pola hidup masyarakat berdampak pada munculnya berbagai penyakit degeneratif. (Fitrah, Winarno, & Simanjuntak, 2017).

Beberapa penyakit kronis seperti kanker, jantung, artritis, diabetes, liver, inflamasi dan penyakit degeneratif lain saat ini sudah sangat lazim dijumpai di masyarakat. Ada berbagai macam teori yang mencoba menjelaskan penyebab penyakit degeneratif, salah satunya ialah teori radikal bebas. Berdasarkan teori ini, penyebab dari penyakit degeneratif ialah adanya proses oksidasi radikal bebas dalam mekanisme biokimia yang terjadi dalam tubuh manusia (Kazia, Lisi, Runtuwene, & Wewengkang, 2017).

Proses oksidasi radikal bebas dapat dihambat dengan senyawa yang tergolong antioksidan. Antioksidan bekerja dengan mendonorkan elektronnya kepada molekul

radikal bebas, sehingga dapat menstabilkan radikal bebas dan menghentikan reaksi berantai (Kazia et al., 2017).

Produksi radikal bebas dalam tubuh sebenarnya telah diimbangi dengan adanya reaksi enzimatik yang merupakan sistem pertahanan terhadap radikal bebas. Namun peningkatan produksi radikal bebas akibat faktor – faktor dari luar seperti stres, radiasi, dan zat pencemar mengakibatkan sistem pertahanan tersebut tidak memadai lagi sehingga untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dibutuhkan tambahan antioksidan dari luar (Kazia et al., 2017).

Radikal bebas pada dasarnya adalah molekul yang pada orbital terluarnya terdapat elektron yang tidak berpasangan sehingga menjadikannya sangat reaktif. Radikal ini apabila masuk ke dalam tubuh cenderung mengadakan reaksi berantai yang dapat memicu kerusakan-kerusakan yang berlanjut dan terus-menerus. Radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh pada dasarnya dapat diatasi oleh antioksidan endogen yang terdapat di dalam tubuh. Akan tetapi, radikal bebas juga dapat mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor stress, radiasi, asap rokok dan polusi lingkungan sehingga sistem pertahanan tubuh yang ada tidak memadai, sehingga tubuh memerlukan tambahan antioksidan dari luar yang dapat melindungi dari serangan radikal bebas (Sains & Teknologi, 2017).

Antioksidan dari luar dapat diperoleh dalam bentuk sintetis dan alami. Namun saat ini, antioksidan sintetis mulai dibatasi penggunaannya akibat adanya kekhawatiran terhadap efek samping yang mungkin dapat terjadi, sehingga

menjadikan antioksidan alami sebagai pilihan utama dalam menangkal radikal bebas (Kazia et al., 2017).

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menyumbangkan atau mendonorkan atom hidrogen atau proton kepada senyawa radikal bebas sehingga senyawa radikal tersebut menjadi lebih stabil. Dilihat dari sumber dimana antioksidan tersebut dapat diperoleh, antioksidan terbagi menjadi dua yakni antioksidan alami dan antioksidan buatan. Antioksidan alami dapat berasal dari buah-buahan dan tanaman, sedangkan antioksidan buatan dapat disintesis dari suatu reaksi. Penggunaan antioksidan buatan dalam jangka waktu yang panjang dan jumlah yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan hati. Oleh sebab itu, dewasa ini manusia cenderung memilih antioksidan dari alam seperti dari buah-buahan dan tanaman yang banyak terdapat di alam khususnya di Indonesia sendiri (Sains & Teknologi, 2017).

C. Uraian Metode Ekstraksi

1. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan (Mukhriani, 2014).

2. Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirak, dan lain-lain (Dirjen POM, 1986).

Maserasi dapat diklasifikasikan berdasarkan (Dirjen POM, 1986)

- a. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu antara 40-50°C. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan.
- b. Maserasi dengan mesin pengadukan adalah maserasi yang dilakukan dengan menggunakan mesin pengadukan yang berputar terus-menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam.
- c. Remaserasi adalah penyarian dimana cairan penyari dibagi menjadi 2. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah diantarkan dan diproses, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua.
- d. Maserasi melingkar adalah penyarian yang digunakan dengan cairan penyarian yang selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya.
- e. Maserasi melingkar bertingkat adalah metode penyarian yang menggunakan peralatan yang hampir sama dengan maserasi melingkar, tetapi dengan jumlah bejana penambang yang disesuaikan dengan keperluan (lebih banyak).

3. Partisi

a. Partisi Cair-cair

Partisi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut didalam 2 macam zat pelarut yang tidak saling bercampur atau dengan kata lain perbandingan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organik dan pelarut air. Ekstraksi cair-cair biasa juga disebut sebagai metode corong pisah. Jika suatu cairan ditambahkan ke dalam ekstrak yang telah dilarutkan dalam cairan lain yang tidak dapat bercampur dengan yang pertama, akan terbentuk dua lapisan. Satu komponen dari campuran akan memiliki kelarutan dalam kedua lapisan tersebut (biasanya disebut fase) dan setelah beberapa waktu dicapai kesetimbangan konsentrasi dalam kedua lapisan. Waktu yang diperlukan untuk tercapainya kesetimbangan biasanya dipersingkat oleh pencampuran keduanya dalam corong pisah (Dirjen POM, 1986)

Ekstraksi cair-cair dilakukan dengan cara pemisahan komponen kimia diantara 2 fase pelarut yang tidak saling bercampur. Dimana sebagian komponen larut pada fase pertama, dan sebagian larut pada fase kedua. Lalu kedua fase yang mengandung zat terdispersi dikocok, dan didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan terbentuk dua lapisan. Yakni fase cair dan komponen kimia yang terpisah. (Sudjadi, 1988).

b. Partisi Cair-padat

Jika suatu cairan ditambahkan ke dalam ekstrak yang telah dilarutkan dalam cairan lain yang tidak bercampur dengan yang utama akan terbentuk 2 lapisan. Satu komponen dari campuran akan memiliki kelarutan dalam kedua lapisan tersebut

(biasanya disebut fase) dan setelah beberapa waktu mencapai kesetimbangan konsentrasi dalam kedua lapisan. Kelarutan senyawa tidak bermuatan dalam satu fase pada suhu tertentu tergantung pada kemiripan kepolarannya dengan fase cair, menggunakan prinsip "like dissolve like". (Lubis, A. H., 1994).

4. Fraksinasi

Ektrak awal adalah campuran dari begitu banyak campuran senyawa yang sulit dipisahkan melalui pemisahan tunggal untuk melakukan isolasi tunggal. Sehingga ekstrak awal perlu dipisahkan menjadi fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. Fraksinasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya kromatografi kolom, kromatografi cair vakum dan lain-lain (Mukhriani,2014).

D. Metode Pengujian Antioksidan dengan DPPH

Ada berbagai macam metode yang sering digunakan dalam penentuan aktivitas antioksidan dan antiradikal. Salah satu yang sering digunakan adalah metode penangkapan radikal dengan menggunakan suatu radikal buatan stabil DPPH (*2,2-difenyl-2-pikrylhydrazil*) merupakan metode yang hasilnya dapat dipercaya sehingga sering digunakan dalam jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan skrining aktivitas antioksidan. Interaksi antioksidan dengan DPPH, baik secara transfer elektron atau hidrogen pada DPPH, akan menetralkan karakter radikal bebas dari DPPH. DPPH digunakan karena DPPH ini stabil pada suhu ruang. DPPH ini akan menerima elektron atau radikal hidrogen dan akan membentuk molekul diamagnetik yang stabil. (Bintang.2010).

E. Tinjauan Islam

Dalam Al-Qur'an terdapat begitu banyak ayat-ayat yang mengajak kita mentadabburi alam semesta, terutama tumbuh-tumbuhan. Salah satunya, Allah *subhaanahu wata'aala* berfirman dalam QS al-An'am/6:99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُمْتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Kementerian Agama RI,2013:140)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bukti-bukti kebesaran Allah *subhaanahu wata'aala*, antara lain menegaskan bahwa *Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit*. Yakni dengan kepastian dalam keadaan diberkati sebagai rezeki buat hamba-hamba Allah, untuk menyuburkan, dan sebagai pertolongan buat semua makhluk dan rahmat dari Allah buat mereka semua. *Lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau*. Artinya,

tanaman dan pepohonan yang hijau; sesudah itu Kami ciptakan padanya biji-bijian dan buah-buahan. *Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak.* Yakni sebagian darinya bertumpang tindih dengan sebagian yang lain seperti pada bulir-bulirnya dan lain sebagainya. *Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai.* Maksudnya, dekat untuk dipetik dan mudah memetikinya. Perihalnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Ali ibnu Abu Talhah Al-Walibi, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna firman-Nya: *tangkai-tangkai yang menjulai.* Yakni tangkai yang menjulai ke bawah bagi pohon kurma yang pendek, sehingga mayangnya yang dipenuhi dengan tangkai buah berada dekat tanah dan mudah dipetik. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Kemudian di akhir ayat disebutkan bahwa *Sesungguhnya pada yang demikian itu, hai manusia, ada tanda-tanda (kekuasaan Allah).* Yakni tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Pencipta semuanya itu, kebijaksanaan, dan rahmat-Nya. (Katsir.2004:305).

Berdasarkan tafsiran ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai manusia penting bagi kita untuk memperhatikan alam yang ada di sekitar kita, terutama tumbuh-tumbuhan. Karena melalui tumbuh-tumbuhan tersebut, kita dapat lebih memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan dengan berbagai manfaat bagi manusia. Salah satu manfaat yang sangat dirasakan oleh manusia adalah dengan adanya zat hijau pada daun yang berfungsi sebagai zat yang dapat menghasilkan makanan dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain. Tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut cukup

menjadi bukti kebesaran Allah *subhaanahu wata'aala* bagi orang-orang yang beriman. Tentu, tidak semua manfaat dari berbagai jenis tumbuhan di muka bumi ini diketahui, maka dari itu kita memiliki tugas untuk menggali dan meneliti manfaat dari berbagai tumbuhan yang Allah ciptakan terutama dalam hal pengobatan manusia agar kita lebih bersyukur, yakin akan kekuasaan Allah sehingga keyakinan tersebut dapat mempetebal keimanan kita kepada Allah *subhaanahu wata'aala*.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (QS.Asy-Syu'ara: 7)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna ayat tersebut menjelaskan ke-Maha Perkasaan Allah, Maha Agung serta Maha Kuasa yang telah menciptakan bumi dan menumbuhkan di dalamnya tumbuh-tumbuhan yang baik berupa tanaman-tanaman, buah-buahan dan hewan (Katsir.2004:141).

Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah telah menciptakan bumi dan isinya berupa tanaman-tanaman, buah-buahan dan hewan yang baik sehingga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan, salah satunya dalam bidang pengobatan. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seperti halnya Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) yang dapat memberikan efek pengobatan.

Dalam hadits-hadist Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga banyak menjelaskan tentang pengobatan, salah satunya dalam sabda beliau yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari no.5246 :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata ; telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia turunkan pula obat untuk penyakit tersebut." (HR. Bukhari No.5246).

Salah satu nikmat dari Allah ketika Allah Subhaanahu wata'aala, memberikan obat dari penyakit apa saja yang diderita oleh seorang hamba. Disebutkan pula pada riwayat yang lain, dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمَهُ مَنْ عِلْمَهُ وَجَهْلَهُ مَنْ جَهْلَهُ

Artinya :

"Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadits ini dalam Zawa'id-nya).

Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, namun kadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga orang yang belum bisa menemukannya. Oleh karenanya dibutuhkan ilmu pengetahuan dalam bidang obat-obatan untuk menemukan obat-obat tersebut seperti tanaman Botto-botto (*Chromolaena odorata*)

yang berpotensi untuk dijadikan obat karena tanaman ini memiliki manfaat bagi manusia salah satunya sebagai antioksidan.

Dalam Al-Qur'an surah al-Mujaadalah : 11, Allah *subhaanahu wata'aala* berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas merupakan tuntunan akhlak yang menyangkut perbuatan dalam majlis untuk menjalin harmonisasi dalam satu majlis. Allah berfirman: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu” oleh siapa pun: Berlapang-lapanglah yaitu berupayalah dengan sungguh-sungguh walau dengan memaksakan diri untuk memberi tempat orang lain dalam majlis-majlis yakni satu tempat, baik tempat duduk maupun bukan tempat duduk, apabila diminta kepada kamu agar melakukan itu maka lapangkanlah tempat untuk orang lain itu dengan suka rela. Jika kamu melakukan hal tersebut, niscaya Allah akan melapangkan segala sesuatu buat kamu dalam hidup ini. Dan apabila dikatakan:”Berdirilah kamu ketempat yang lain,

atau untuk diduduk tempatmu buat orang yang lebih wajar, atau bangkitlah melakukan sesuatu seperti untuk shalat dan berjihad, maka berdiri dan bangkitlah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu wahai yang memperkenankan tuntunan ini dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemudian di dunia dan di akhirat dan Allah terhadap apa-apa yang kamu kerjakan sekarang dan masa akan datang Maha Mengetahui (Shihab,2002: 77).

Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah *subhaanahu wata'aala* mewajibkan hamba-hambanya untuk menuntut ilmu yang disetarakan dengan ibadah. Allah *subhaanahu wata'aala* kemudian berjanji untuk meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka dengan ilmu tersebut, dapat diketahui tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu juga, dapat dilakukan pengujian-pengujian untuk mendapatkan kandungan senyawa pada tanaman tertentu yang kemudian dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya serta tepat penggunaan dan dosisnya. Maka dari itu dilakukan penelitian mengenai Uji Senyawa Antioksidan Fraksi Etil Asetat Daun Botto-botto (*Chromolena odorata*) agar dapat diperoleh senyawa-senyawa yang berkhasiat antioksidan yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai obat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *eksperimental laboratory* secara kualitatif.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal April 2018 – Juli 2018.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biofarmasi, Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *True Experimental* dengan desain penelitian *Control Group Post Test Only*.

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Peralatan yang digunakan yaitu batang pengaduk, *chamber*, eksikator, erlenmeyer (pyrex®), gelas kimia (pyrex®), gelas ukur (pyrex®), lampu UV 254 dan 366, oven, pipet mikro (Bio-Rad), penyemprot, pipet tetes, rotary evaporator (heildoph®), sendok besi, sentripuge, seperangkat alat kromatografi cair vakum, timbangan (Deltarange®), tabung reaksi (pyrex®), tabung sentripuge, timbangan analitik (kern®), toples, vial, vortex (Heidolph®).

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah aquadest, daun botto-botto (*Chromolaena odorata*), etil asetat, lempeng KLT, metanol, n-heksan, pereaksi (AlCl_3 , DPPH, FeCl_3 , H_2SO_4 , *Liebermann-Buchard*, *dragendroff*), dan silika GF 254.

E. Prosedur Kerja

1. Penyiapan Sampel

Sampel penelitian diambil di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebanyak 10 kg basah. Sampel ini kemudian dibersihkan dari kotoran dan dicuci menggunakan air mengalir. Sampel kemudian dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung. Setelah mengering, sampel kemudian diserbukkan.

2. Ekstraksi Sampel secara Maserasi

Sampel daun botto-botto (*Chromolaena odorata*) yang telah diserbukkan dimasukkan ke dalam wadah untuk proses maserasi, dibasahi dengan pelarut metanol hingga semua simplisia terbasahi, diaduk kemudian ditambahkan kembali metanol hingga simplisia terendam. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring. Dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Ekstrak metanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya sampai diperoleh ekstrak metanol kental.

3. Metode Partisi

Ekstrak metanol daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) dipartisi dengan metode partisi cair padat menggunakan pelarut n-heksan, dan kemudian ekstrak yang tidak larut n-heksan dipisahkan dari ekstrak yang larut n-heksan dan dipartisi kembali menggunakan pelarut etil asetat. Ekstrak yang larut etil asetat kemudian disentrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 15 menit dan kemudian diuapkan. Partisi dilakukan hingga diperoleh larutan jernih.

4. Metode Fraksinasi (Kromatografi Cair Vakum)

Fraksinasi dilakukan dengan metode Kromatografi Cair Vakum (KCV), hasil partisi larut etil asetat daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) ditimbang sebanyak 15 gram, kemudian dibuat bubuk ekstrak dan silika gel dengan menambahkan sedikit demi sedikit silika gel ke dalam sampel hingga terbentuk bubuk ekstrak dan silika gel yang homogen. Dimasukkan sisa silika gel GF 254 ke dalam senterglass dan kemudian dimampatkan, kemudian ditambahkan bubuk ekstrak ke dalam senterglass dan kembali dimampatkan, kemudian ditutup dengan kertas watmandi bagian atasnya. Cairan pengelusi adalah eluen pertama yang akan digunakan, ditambahkan melalui dinding kolom dijalankan sehingga eluen turun dan mengelusi komponen kimia. Kemudian dielusi kembali menggunakan berbagai perbandingan eluen dari eluen dengan kepolaran rendah hingga eluen dengan kepolaran yang tinggi. Fraksi-fraksi yang diperoleh diuapkan, kemudian diamati profil KLT-nya. Kemudian

dilanjutkan dengan fraksinasi tingkat kedua dengan berat sampel sebanyak 4,3 gram dan fraksinasi tingkat ketiga dengan berat sampel sebanyak 2 gram.

5. Uji DPPH

a. Pembuatan Larutan Pereaksi DPPH (*2,2 difenil -1- pikrilhidrazil*)

Ditimbang seksama DPPH 10 mg, kemudian dilarutkan dengan metanol p.a sebanyak 63 ml sehingga diperoleh konsentrasi 0,4 mM dan disimpan pada wadah gelap di dalam lemari es..

b. Penyemprotan DPPH pada Lempeng KLT

Ditotol setiap fraksi daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) pada lempeng KLT kemudian dielusi dengan perbandingan eluen yang sesuai. Kemudian disemprot DPPH dan diamati perubahan warna yang terjadi, jika terjadi perubahan dari warna ungu menjadi warna kuning pada bercak hasil KLT maka senyawa tersebut memiliki aktivitas penangkap radikal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstrak

Dari 10 kg sampel daun botto-botto basah menjadi 5 kg sampel daun botto-botto kering yang di maserasi dengan pelarut metanol sebanyak 17,5 L, diperoleh ekstrak kental sebanyak 275,4 g.

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{274,42 \text{ gram}}{5000 \text{ gram}} \times 100\% = 5,49\%$$

2. Partisi

Setelah diperoleh ekstrak metanol dari daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*), kemudian di partisi dengan metode partisi cair padat menggunakan pelarut etil asetat sebanyak 1.100 ml. Maka diperoleh hasil partisi etil asetat sebanyak 38 gram.

3. Fraksinasi

a. Fraksinasi Tingkat 1

Setelah diperoleh hasil partisi etil asetat daun Botto-botto (*Chromolaena odorat*), selanjutnya difraksinasi dengan Kromatografi Cair Vakum atau KCV sebanyak 15 gram, kemudian diperoleh 21 fraksi dengan perbandingan eluen n-heksan : etil asetat dengan 7 perbandingan dan eluen metanol : etil asetat dengan 5 perbandingan. Kemudian digabung menjadi 3 fraksi berdasarkan kesamaan penampakan noda pada kromatografi lapis tipis setelah diamati pada lampu UV 254 nm dan 36 nm.

Tabel 1. Hasil Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*)

No.	Eluen	Perbandingan Eluen	Volume (ml)	Keterangan
1.	Heksan : Etil asetat	7 : 3	100	A
2.	Heksan : Etil asetat	6 : 4	600	B1-B6
3.	Heksan : Etil asetat	5 : 5	200	C1 – C2
4.	Heksan : Etil asetat	4 : 6	200	D1 – D2
5.	Heksan : Etil asetat	3 : 7	200	E1 – E2
6.	Heksan : Etil asetat	2 : 8	200	F1 – F2
7.	Heksan : Etil asetat	1 : 9	100	G
8.	Heksan : Etil asetat	0 : 10	100	H
9.	Metanol : Etil asetat	3 : 7	100	I
10.	Metanol : Etil asetat	5 : 5	100	J
11.	Metanol : Etil asetat	7 : 3	100	K
12.	Metanol : Etil asetat	10 : 1	100	L

Tabel 2. Hasil Gabungan Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*)

No.	Fraksi Gabungan	Keterangan
1.	Fraksi F1	A-B3
2.	Fraksi F2	B4-F1
3.	Fraksi F3	F2-L

b. Fraksi Tingkat 2

Fraksi F2 kemudian difraksinasi kembali dengan Kromatografi Cair Vakum sebanyak 4,3 gram dengan eluen n-heksan : etil asetat dengan 8 perbandingan eluen dengan volume 850 ml dan diperoleh hasil fraksi sebanyak 17 fraksi kemudian digabung menjadi 6 fraksi.

Tabel 3. Hasil Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*)

No.	Eluen	Perbandingan Eluen	Volume (ml)	Keterangan
1.	Heksan : Etil asetat	10 : 1	50	A
2.	Heksan : Etil asetat	9 : 1	150	B1-B3
3.	Heksan : Etil asetat	8 : 2	150	C1 – C3
4.	Heksan : Etil asetat	7 : 3	250	D1 – D5
5.	Heksan : Etil asetat	6 : 4	50	E
6.	Heksan : Etil asetat	5 : 5	50	F
7.	Heksan : Etil asetat	4 : 6	100	G1-G2
8.	Heksan : Etil asetat	0 : 10	50	H

Tabel 4. Hasil Gabungan Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*)

No.	Fraksi Gabungan	Fraksi
1.	Fraksi F4	B2-C1
2.	Fraksi F5	C2-C3
3.	Fraksi F6	D1-D2
4.	Fraksi F7	D3
5.	Fraksi F8	D4-E
6.	Fraksi F9	F1-H

c. Fraksi Tingkat 3

Kemudian fraksi F9 kembali dikromatografi cair vakum sebanyak 2 gram dengan eluen heksan : etil asetat dengan 12 perbandingan dengan volume eluen 660 ml dan diperoleh 33 fraksi kemudian digabung menjadi 9 fraksi.

Tabel 5. Hasil Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*)

No.	Eluen	Perbandingan eluen	Volume (ml)	Keterangan
1.	Heksan : Etil asetat	9 : 1	40	A1-A2
2.	Heksan : Etil asetat	8,5 : 1,5	60 ml	B1-B3
3.	Heksan : Etil asetat	8 : 2	60	C1 – C3
4.	Heksan : Etil asetat	7,5 : 2,5	60	D1 – D3
5.	Heksan : Etil asetat	7 : 3	60	E1-E3
6.	Heksan : Etil asetat	6,5 : 3,5	60	F1-F3
7.	Heksan : Etil asetat	5,5 : 4,5	20	G
8.	Heksan : Etil asetat	6 : 4	180	H1-H9
9.	Heksan : Etil asetat	5 : 5	20	I
10.	Heksan : Etil asetat	4 : 6	20	J
11.	Heksan : Etil asetat	3 : 7	60	K
12.	Heksan : Etil asetat	2 : 8	20	L

Tabel 6. Hasil Gabungan Fraksinasi Ekstrak Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*)

No.	Fraksi Gabungan	Fraksi
1.	Fraksi F10	(C1-D3)
2.	Fraksi F11	(E2-E3)
3.	Fraksi F12	E1 dan F1)
4.	Fraksi F13	F2-F3
5.	Fraksi F14	G)
6.	Fraksi F15	H1-H3)
7.	Fraksi F16	(H4-H9)
8.	Fraksi F17	(I-K1)
9.	Fraksi F18	(K2-L)

4. Uji DPPH

Hasil fraksinasi yang telah digabung kemudian ditotol pada lempeng Kromatografi Lapis Tipis kemudian dielusi dengan eluen yang sesuai dan disemprot dengan pereaksi DPPH untuk menguji aktivitas antioksidan.

Tabel 7. Hasil Pengujian DPPH

No.	Fraksi	Keterangan
1.	F1	-
2.	F2	+
3.	F3	+
4.	F4	-
5.	F5	-
6.	F6	-
7.	F7	+
8.	F8	+
9.	F9	+
10.	F10	-
11.	F11	-
12.	F12	+
13.	F13	+
14.	F14	+
15.	F15	+
16.	F16	+
17.	F17	+
18.	F18	-

Keterangan :

- + : Memiliki aktivitas antioksidan
- : Tidak memiliki aktivitas antioksidan

B. Pembahasan

Radikal bebas pada dasarnya adalah molekul yang pada orbital terluarnya terdapat elektron yang tidak berpasangan sehingga menjadikannya sangat reaktif. Radikal ini apabila masuk kedalam tubuh cenderung mengadakan reaksi berantai yang dapat memicu kerusakan-kerusakan yang berlanjut dan terus-menerus. Radikal bebas yang masuk kedalam tubuh pada dasarnya dapat diatasi oleh antioksidan endogen yang terdapat didalam tubuh. Akan tetapi, radikal bebas juga dapat mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor stress, radiasi, asap rokok dan polusi lingkungan sehingga sistem pertahanan tubuh yang ada tidak memadai, sehingga tubuh memerlukan tambahan antioksidan dari luar yang dapat melindungi dari serangan radikal bebas. Kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas (kerusakan oksidatif) yang terjadi di dalam tubuh manusia pada dasarnya dapat diatasi dengan adanya antioksidan endogen yang terdapat didalam tubuh diantaranya enzim katalase, glutathion peroksidase, superoksida dismutase dan glutathion s-transferase. Akan tetapi, apabila jumlah radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh mengalami peningkatan, maka tentunya diperlukan tambahan antioksidan yang berasal dari luar tubuh (Sains & Teknologi, 2017).

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menyumbangkan atau mendonorkan atom hidrogen atau proton kepada senyawa radikal bebas sehingga

senyawa radikal tersebut menjadi lebih stabil. Dilihat dari sumber dimana antioksidan tersebut dapat diperoleh, antioksidan terbagi menjadi dua yakni antioksidan alami dan antioksidan buatan. Antioksidan alami dapat berasal dari buah-buahan dan tanaman, sedangkan antioksidan buatan dapat disintesis dari suatu reaksi. Penggunaan antioksidan buatan dalam jangka waktu yang panjang dan jumlah yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan hati. Oleh sebab itu, dewasa ini manusia cenderung memilih antioksidan dari alam seperti dari buah-buahan dan tanaman yang banyak terdapat di alam khususnya di Indonesia sendiri (Sains & Teknologi, 2017).

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Owolabi (2010), daun *Chromolaena odorata* mengandung terpenoid dan mempunyai aktivitas antioksidan. Alkaloid, tanin, steroid, terpenoid, dan flavonoid merupakan kandungan yang terdapat dalam *Chromolaena odorata* yang telah dilaporkan oleh Akinmoladun, et al (2007) mempunyai aktivitas antioksidan dan antibakteri. Menurut Owolabi et al (2010) beberapa senyawa kimia dari minyak *Chromolaena odorata* dilaporkan dapat memiliki sifat antibakteri dan antioksidan. Sedangkan senyawa yang berperan sebagai antioksidan adalah senyawa golongan fenolik yaitu pr - coumaric, ferulic dan vanilic acids. Senyawa - -pinene, dan germacrene D dalam *Chromolaena odorata* bersifat antibakteri terhadap *Bacillus cereus* dan *Aspergillus niger*. Senyawa golongan terpenoid yang terdapat pada *Chromolaena odorata* dapat berfungsi sebagai antioksidan. Sedangkan menurut penelitian Tran et al (2011) ekstrak daun

Chromolaena odorata memiliki kandungan flavonoid, phenolik, alkaloid, terpenoid, dan minyak esensial (Her et al., 2013).

Tanaman botto-botto telah banyak digunakan sebagai tanaman obat yang telah terbukti memiliki aktivitas penyembuhan luka, antibakteri, antimalaria, antiinflamasi, antioksidan, analgesik dan antiimunopresif, sitotoksik, antifungi, efektif untuk kanker payudara. Kandungan kimia dari tanaman ini ialah flavonoid (yaitu, rhamnetin, tamarixetin, ombuin, kaempferid, isosakuranetin, odoratin, rhamnositrin, laciniatin, acacetin, luteolin), fenolik (seperti p-cumaric, ferulic, asam vanilic), alkaloid, dan kaya akan esensial oil seperti α -pinene, β -pinene, germacrene D, β -copaen-4-alpha-ol, β -caryophyllene, geigerene, pregeijerene, cadinene, camphor, limonene. (Akbar.2017).

Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa dengan pelarut tertentu. Penggunaan pelarut metanol pada proses ekstraksi untuk menarik senyawa-senyawa yang ada pada daun botto-botto. Pelarut metanol ini bersifat semipolar yang dapat melarutkan senyawa kimia yang memiliki kepolaran tinggi maupun kepolaran rendah dalam simplisia, sulit ditumbuhi jamur dan bakteri, mudah diuapkan serta relatif lebih murah. Hasil ekstraksi sampel daun botto-botto diperoleh sebanyak 275,4 g dari 5 kg simplisia.

Partisi merupakan tahap awal pemurnian ekstrak. Partisi menggunakan dua pelarut yang tak bercampur yang ditambahkan ke dalam ekstrak. Partisi menggunakan dua pelarut tak bercampur yang kepolarannya meningkat. Partisi biasanya melalui dua tahap yaitu n-heksan untuk menghasilkan senyawa non polar di

lapisan organik, air/diklorometan atau air/etil asetat untuk membuat fraksi agak polar di lapisan organik. Partisi dapat memberikan pemisahan yang sangat baik terutama untuk senyawa-senyawa yang memiliki kelarutan yang sangat berbeda (Heinrich, 2005). Hasil partisi larut etil asetat yang diperoleh dari ekstrak metanol daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) yaitu sebanyak 38 gram.

Fraksinasi adalah proses pemisahan komponen-komponen dalam ekstrak menjadi fraksi-fraksi. Proses fraksinasi dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu kromatografi lapis tipis (KLT), kromatografi kolom, kromatografi cair vakum, HPLC dan GC. Jumlah komponen suatu senyawa yang sudah difraksinasi dapat diketahui menggunakan metode kromatografi lapis tipis (KLT). Proses metode ini menggunakan plat KLT yang sudah siap untuk digunakan. Terjadinya pemisahan komponen-komponen pada KLT dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengetahui jumlah komponen senyawa yang terdapat pada bahan alam yang akan diisolasi. Selain itu, nilai R_f juga dapat dijadikan sebagai panduan untuk memisahkan komponen kimia. Hasil analisis KLT inilah yang diterapkan pada proses fraksinasi dengan menggunakan kromatografi cair vakum.

Pada prinsipnya, fraksinasi merupakan proses penarikan senyawa pada partisi larut etil asetat dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pada umumnya, pelarut yang sering dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa yang non-polar digunakan n-heksan, untuk senyawa semi polar digunakan etil asetat dan untuk senyawa polar digunakan metanol (Mutiasari, IR, 2012).

Ada berbagai macam metode yang sering digunakan dalam penentuan aktivitas antioksidan maupun antiradikal. Metode yang hasilnya dapat dipercaya sehingga sering digunakan dalam penelitian-penelitian yang berkaitan dengan skrining aktivitas antioksidan yaitu metode penangkapan radikal dengan menggunakan suatu radikal buatan stabil DPPH (*2,2-difenyl-2-pikrylhydrazil hidrat*) (Sains & Teknologi, 2017).

DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu ruang sehingga sering digunakan. DPPH kemudian menerima elektron atau radikal hidrogen dan membentuk molekul diamagnetik yang stabil. Karakter radikal bebas dari DPPH akan dinetralkan melalui transfer elektron atau hidrogen pada DPPH karena adanya interaksi antioksidan dengan DPPH. (Sains & Teknologi, 2017).

Kelebihan dari metode DPPH yaitu metode tersebut sangat sederhana, mudah digunakan, cepat dan peka serta hanya memerlukan sedikit sampel. Mekanisme kerja pada metode DPPH yaitu senyawa antioksidan akan bereaksi dengan radikal bebas DPPH melalui mekanisme donasi atom hidrogen sehingga menyebabkan terjadinya peluruhan warna DPPH dari warna ungu menjadi warna kuning (Wijaya, Paendong, & Abidjulu, 2014).

Identifikasi senyawa antioksidan dengan metode DPPH dilakukan dengan penyemprotan DPPH terhadap lempeng KLT yang telah dielusi menggunakan fraksi etil asetat sehingga didapatkan hasil positif dengan penampakan perubahan warna dari warna ungu menjadi warna kuning pada beberapa fraksi, yaitu fraksi F2,F3, F7,F8, F9,F12, F13, F14, F15,F16,dan F17. Sedangkan untuk fraksi F1, F4,F5,F6,F10,F11,

dan F18 tidak mengalami peredaman warna ungu menjadi kuning yang dapat mengindikasikan adanya aktivitas antioksidan.

Perubahan warna pada plat KLT diduga karena senyawa antioksidan yang terkandung dalam sampel mampu meredam radikal bebas DPPH. Senyawa DPPH adalah radikal bebas yang stabil berwarna ungu dan ketika bereaksi dengan antioksidan akan berwarna kuning (Pramesti, 2013).

Antioksidan digunakan untuk menghambat autooksidasi. Fenol-fenol, senyawa dengan gugus OH yang terikat pada karbon cincin aromatic, merupakan antioksidan yang efektif, produk radikal bebas senyawa-senyawa ini terstabilkan secara resonansi dan karena itu tidak reaktif dibandingkan dengan kebanyakan radikal bebas lain. Vitamin E dan flavonoid adalah suatu antioksidan alamiah yang dijumpai dalam minyak-minyak nabati (Burhan.2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa fraksi F2, F3, F7, F8, F9, F12, F13, F14, F15, F16 dan F17 mengandung senyawa antioksidan yang ditandai dengan terjadinya peredaman warna dari warna ungu menjadi warna kuning pada lempeng kromatografi lapis tipis. Sedangkan untuk fraksi yang lain, tidak mengalami perubahan warna sehingga dapat dikatakan tidak mengandung senyawa antioksidan.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan pengujian aktivitas antioksidan terhadap fraksi daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) dengan menggunakan metode lain sehingga dapat dibandingkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode DPPH dan perlu dilakukan pemurnian lebih lanjut ketahap isolasi senyawa aktif untuk mengetahui kandungan senyawa yang paling efektif sebagai antioksidan.




KEPUSTAKAAN


- Akbar, Rahmah. (2017). *Skrining Partisi dan Fraksi-fraksi Larut Etil Asetat dari Ekstrak Metanol Daun Botto-botto (Chromolaena odorata l.) sebagai Inhibitor Pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis secara In Vitro Skripsi*. Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Chakraborty Anup Kumar, Rambhade Sujit and Patil Umesh k Chromolaena odorata (L.) : *An Overview [Journal] // Journal of Pharmacy Research*. - India : Department of Pharmaceutical chemistry, 2011. - 3 : Vol. 4. - pp. 573-576.
- Fitrah, M., Winarno, H., & Simanjuntak, P. (2017). *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Kimia Zat Anti Kanker dari Daun Kopasanda (Chromolaena odorata (L.)) (Isolation and Identification of Chemical Compounds as Anticancer from Leaves of Kopasanda (Chromolaena odorata (L.)))*, 15(1), 77–81.
- Her, N., Parnanto, R., Setyowati, R., & Utami, R. (2013). Nur Her Riyadi Parnanto 1), Rini Setyowati 1), Rohula Utami 1), VI(1).
- Julian Rodriguez Activity-Guided Separation of Chromolaena odorata Leaf Extract Reveals Fractions With Rice Disease-Reducing Properties [Journal] // *Eur J Plant Pathol*. - Denmark : [s.n.], May 2015 Kazia, A., Lisi, F., Runtuwene, M. R. J., & Wewengkang, D. S. *Uji Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan dari Ekstrak Metanol Bunga soyogik (Saurauia bracteosa de .)*, 6(1). 2017.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013.
- Mutiasari, IR Identifikasi *Golongan Senyawa Kimia Fraksi Aktif [Journal] // Jurnal Fitokimia*. - 2012.
- Nugraha, A. T., Firmansyah, M. S., & Jumaryatno, P. (2017). *Jurnal Ilmiah Farmasi Vol. 13 No. 1 Tahun 2017 Profil Senyawa Dan Aktifitas Antioksidan Daun Yakon* (, 13(1), 14–18. 2017
- Ni, et al. *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Binahong (Anredera ordifolia tenore) steenis) dengan 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) Menggunakan Spektrofotometer UV-VIS*. 2014.
- Nurafianty. *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Antibakteri Ekstrak N-Heksan Daun Jati (Tectona grandis L.F)*. Makassar. 2010
- Prawiradiputra Bambang R. *Ki Rinyuh (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Robinson): Gulma Padang Rumput Yang Merugikan [Journal]*. - Bogor : Balai Penelitian Ternak, 2006.

- Phan Than T., et al *Extracts from Leaves of Chromolaena odorata A. Potential Agent for wound Healing* [Journal]. - New York : Herbal Traditional Medicine: Marcel Dekker, 2004.
- Pramesti, R. (2013). *Aktivitas Antioksidan Ekstrak Rumput Laut Caulerpa serrulata Dengan Metode DPPH (1, 1 difenil 2 pikrilhidrazil), 2(April).*
- Shihab M. Quraish Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an [Book]. - Jakarta : Lentera Hati, 2009. - Vol. Volume 3.
- Suksamrarn apichart et al.. *Antimycobacterial activity and cytotoxicity of flavonoids from the flowers of Chromolaena odorata* [Journal] // Article of Pharmacial Research. - India : Archives Of Pharmacal Research, 2004. - 5 : Vol. 27.
- Sukrianto, *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Laruna (Chromolaena Odorata l.) dengan Metode DPPH (1,1-diphenyl-2- picrylhidrazin).* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.2017.
- Tjitrosoepomo. *Gembong Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)* [Journal]. - [s.l.] : Gajah Mada University, 2010. - p. Yogyakarta.
- Vaisakh,M.N, Pandey,Anima. *The Invasive Weed With Healing Properties: A Review On Chromolaena odorata.* [Journal]. - India : Department of Pharmaceutical Sciences, Birla Institute of Technology., 2012.
- Vijayaraghavan, et al. *Efficacy of Chromolaena odorata Leaf Extracts for the Healing of Rat Excision Wounds.*2017
- Wijaya, D. P., Paendong, J. E., & Abidjulu, J. *Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan dari Daun Nasi (Phrynium capitatum) dengan Metode DPPH,* 3(1), 11–15. 2014.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian

Lampiran 2. Alur Fraksinasi



Lampiran 3. Perhitungan Pengenceran DPPH

$$\begin{aligned}
 0,4 \text{ mM} &= \frac{4 \times 10^{-4} \text{ mol}}{L} \\
 &= \frac{4 \times 10^{-7} \text{ mol}}{\text{ml}} \\
 4 \times 10^{-7} \text{ mol} &= \frac{g}{BM} \\
 4 \times 10^{-7} \text{ mol} &= \frac{g}{394,32 \frac{g}{BM}} \\
 \text{Massa} &= 4 \times 10^{-7} \text{ mol} (394,32 \frac{g}{\text{mol}} \\
 \text{Massa/ ml} &= 0,0001577 \text{ g} \\
 10 \text{ mg/ ml} &= 0,0001577 \text{ g} \\
 \text{ml} &= \frac{0,01 \text{ g}}{0,0001577 \text{ g}} \\
 \text{ml} &= 63 \text{ ml}
 \end{aligned}$$

DPPH diambil sebanyak 10 mg dan dilarutkan ke dalam 63 ml metanol p.a.

Lampiran 4 . Gambar Penelitian



Gambar 2. Hasil ekstraksi daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*)



Gambar 3. Partisi Ekstrak daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*) menggunakan alat Sentrifuge

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar 4. Proses Fraksinasi dengan metode Kromatografi Cair Vakum




Gambar 5. Fraksi Etil Asetat Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata*)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R




Gambar 6. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-1 pada sinar tampak



Gambar 7. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-1 pada sinar UV
254 nm




Gambar 8. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-1 pada sinar UV




Gambar 9. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-1 setelah disemprot pereaksi H_2SO_4 setelah dipanaskan



Gambar 10. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-2 pada sinar tampak




Gambar 11. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-2 pada sinar UV 254 nm



Gambar 12. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-2 pada sinar UV

366 nm




Gambar 13. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-2 setelah disemprot pereaksi H_2SO_4 dan setelah dipanaskan




Gambar 14. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-2 setelah disemprot H_2SO_4 dan setelah dipanaskan




Gambar 15. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-2 setelah disemprot H_2SO_4 dan setelah dipanaskan



Gambar 16. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-3 pada sinar tampak



Gambar 17. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-3 pada sinar UV 254 nm




Gambar 18. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-3 pada sinar UV

366 nm



Gambar 19. Kromotografi Lapis Tipis untuk hasil fraksi tingkat ke-3 setelah disemprot H_2SO_4 dan setelah dipanaskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 20. Hasil penyemprotan DPPH

RIWAYAT HIDUP



Nurafifah Hamid yang sering disapa Afifah Lahir di Sinjai, 04 April 1996 dari pasangan suami istri Abdul Hamid dan Syamsiah Salama. Afifah merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Penulis memulai pendidikannya pada SDN 109 Cappagalung, kemudian lanjut ke SMPN 1 Sinjai Selatan, pada Tahun 2011, penulis melanjutkan sekolahnya di SMAN 1 Sinjai Selatan. Dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikannya di Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.

