

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY “H”
DENGAN PERSALINAN PRETERM GESTASI 34-36 MINGGU
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 03 JULI 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Oleh:

ANNA SAPITRI

NIM. 70400115006

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anna Sapitri
Nim : 70400115006
Tempat/Tgl. Lahir : Jenepono,17 Agustus 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada NY “H”
Dengan Persalinan Preterm Gestasi 34-36 Minggu Di
RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Tanggal 03 Juni 2018.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 06 Agustus 2018

24 Dzul-Qa’idah 1439 H

Penyusun

ANNA SAPITRI

Nim.70400115006

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : ANNA SAPITRI
NIM : 70400115006
Judul : "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "H" dengan
Persalinan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018"

Karya Tulis Ilmiah ini telah di periksa dan di setujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar hasil Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing I



Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.St., M.Keb

Pembimbing II



dr. Rini Fitriani, M.Kes
NIP.1980008 200801 2 001

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “H” dengan Persalinan Preterm Gestasi 34-36 minggu di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 03 Juli 2018”**. Yang disusun oleh ANNA SAPITRI NIM : 70400115006, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 06 Agustus 2018** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 06 Agustus 2018
24 Dzul-Qa’idah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT.,M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Anieq Mumthi’ah Alkautsar, S.SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Nadyah, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Sohra, M.Ag	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat , hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan akan kebenaran kepada seluruh umat manusia di muka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny “H” dengan Persalinan Preterm Gestasi 34-36 Minggu di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 03 Juni 2018”**. Karya Tulis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu masukan, kritikan, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Cinta dan penghormatan kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, ayahanda Kamaluddin dan Ibunda Rabania, dua orang yang menjadi sosok panutan sebelumku tersentuh dengan dunia luar, mereka adalah orang pertama yang

memberikanku kasih sayang, cinta, perhatian, doa dan bimbingan yang begitu besar, serta dasar hidup yang senantiasa ditanamkan sejak kecil. Kedua adikku tersayang Wawan Saputra dan Ardiansyah Saputra serta keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dari awal sampai sekarang yang membuatku semakin berjuang untuk mencapai gelar ini.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. beserta seluruh staf administrasi.
3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., S.KM., M.Keb selaku ketua prodi Kebidanan dan sekaligus sebagai penasihat akademik yang telah memberikan banyak bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Amd.Keb.
4. Ibunda Anieq Mumthiah Alkautsar, S.ST., M.Keb sebagai pembimbing I, yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dan telah ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Ibunda dr. Rini Fitriani, M.Kes sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dan telah ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibunda dr. Nadyah, M.Kes selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibunda Dr. Hj. Zohra, M.Ag selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
9. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sarana sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Selatan yang telah memberikan rekomendasi penelitian kepada peneliti.
11. Bapak Bupati kabupaten Gowa yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
12. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa yang telah memberikan izin kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

13. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2015 serta kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu semoga semua perjuangan kita sebagai amal baik di sisi-Nya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata, 06 Agustus 2018

24 Dzul-Qa'idah 1439 H

Penulis

ANNA SAPITRI
NIM : 70400115006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum tentang Persalinan	13
1. Pengertian Persalinan	13
2. Tujuan Asuhan Persalinan	14
3. Tanda-tanda persalinan.....	15
4. Tahap-tahap dalam proses Persalinan.....	17
5. Faktor yang mempengaruhi Persalinan.....	19
6. Mekanisme Persalinan.....	23
B. Tinjauan Khusus tentang Persalinan Preterm	25
1. Pengertian Persalinan Preterm	25
2. Klasifikasi Persalinan Preterm.....	26
3. Etiologi dan Faktor Predisposisi Persalinan Preterm.....	27
4. Tanda dan Gejala Persalinan Preterm.....	29
5. Diagnosis Persalinan Preterm.....	30
6. Komplikasi Persalinan Preterm	31
7. Dampak Persalinan Preterm.....	33
8. Penanganan Persalinan Preterm.....	37
C. Tinjauan Khusus tentang Bayi Baru Lahir Preterm	39
1. Pengertian Bayi Baru Lahir Preterm	39
2. Ciri-ciri Bayi Preterm	40
3. Masalah-masalah pada Bayi Baru Lahir Preterm.....	41
4. Sebab-sebab Kematian Bayi Preterm	43
5. Penanganan Bayi Baru Lahir Preterm	43

6. Perawatan Neonatal Esensial Setelah Lahir	44
D. Tinjauan Islam tentang Persalinan	46
E. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Persalinan Preter	52
1. Pengertian Managemen Kebidanan	52
2. Langkah-langkah dalam Managemen Kebidanan	53
BAB III STUDI KASUS	
A. Kala I	67
B. Kala II	89
C. Kala III	103
D. Kala IV	108
E. Pendokumentasian dalam bentuk SOAP	117
F. Kunjungan Nifas dan Bayi	137
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Kala I	187
B. Kala II	201
C. Kala III	208
D. Kala IV	212
E. Kunjungan Nifas dan Bayi	216
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	230

B. Saran	231
DAFTAR PUSTAKA	233



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemantauan his, DJJ, nadi, tekanan darah dan suhu	88
Tabel 1.2 Penilaian <i>APGAR score</i>	102
Tabel 1.3 Pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih ibu	114
Tabel 1.4 Pemantauan tinggi fundus uteri dan perdarahan	114
Tabel 1.5 Pemantauan tekanan darah, nadi dan suhu	115



ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR KARYA TULIS ILMIAH,
AGUSTUS 2018**

ANNA SAPITRI, 70400115006

Pembimbing I : Anieq Mumthiah Alkautsar, S.SiT., M.Keb

Pembimbing II : dr. Rini Fitriani, M.Kes

“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “H” dengan Persalinan Preterm Gestasi 34-36 Minggu di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018”

Persalinan preterm adalah kontraksi uterus secara teratur yang menyebabkan penipisan atau dilatasi serviks sebelum usia kehamilan 37 minggu dengan ciri diantaranya berat badan lahir kurang dari 2500 gram. Pada umumnya persalinan memiliki resiko bagi ibu maupun janin. Pada persalinan preterm resiko yang dapat terjadi pada ibu adalah jika persalinan preterm disertai dengan ketuban pecah dini maka akan berpotensi terjadinya infeksi, sedangkan resiko terhadap bayi seperti asfiksia, hipotermi, dan berat badan lahir rendah.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “H” Gestasi 34-36 minggu dengan Persalinan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP. Hasil yang didapatkan pada manajemen asuhan kebidanan intranatal pada Ny “H” gestasi 34-36 minggu dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018. Penatalaksanaan kasus persalinan preterm yang dilakukan dengan penatalaksanaan kala I sampai IV, bayi lahir normal dengan kondisi baik, keadaan umum ibu baik, serta tidak terjadi komplikasi pada masa persalinan maupun pasca persalinan.

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemantauan dan analisa data Ny “H” dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 proses persalinan kala I sampai IV berlangsung normal, tanpa komplikasi, bayi lahir spontan, segera menangis dengan jenis kelamin laki-laki, plasenta lahir kesan lengkap dan telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “H” dengan hasil tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan kasus.

Kata Kunci : Persalinan Preterm, 7 langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2018

ANNA SAPITRI, 70400115006

Supervisor I : Anieq Mumthiah Alkautsar, S.SiT., M.Keb

Supervisor II : dr. Rini Fitriani, M.Kes

“The Intranatal Midwifery Care Management on Mrs. “H” with Preterm Labor of 34-36 Weeks Gestation at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018”

Preterm labor is a regular uterine contraction that causes the cervix thinning or dilation before 37 weeks' gestation with features including a less than 2500 grams birth weight. In general, labor has risks for both mother and fetus. In preterm labor the risk that may happen to the mother is when the preterm labor accompanied by the premature rupture of membranes so it will have the potential for infection, while the risks to infants are asphyxia, hypothermia and low birth weight.

The study is a case study research using the Intranatal Midwifery Care Management approach on Mrs. "H" with 34-36 weeks gestation of the Preterm Labor at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 based on the 7 steps of Varney and SOAP. The results obtained are the management of a preterm labor case carried out with the management of I to IV stages, the baby is normally born with good condition, a good condition of mother, and no complications during the labor or postpartum.

The conclusion of the case is that 7 steps of Varney and SOAP applied for the midwifery problem solving process have been carried out in the form of monitoring and data analysis of Mrs. "H" with preterm labor at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 during the first to fourth stages of labor, without complications, the baby spontaneously born, immediately crying with male gender, complete placenta born, and documentation of all findings and actions carried out on Mrs. "H" with the results of no gap between the theory and the case.

Keywords : Preterm Labor, 7 steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan dapat didefinisikan secara medis sebagai kontraksi uterus yang teratur dan semakin kuat, menciptakan penipisan dan dilatasi serviks disepanjang waktu, yang menimbulkan dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui jalan lahir melawan resistansi jaringan lunak, otot, dan struktur tulang panggul (Betsy, dkk, 2014:2). Persalinan dan kelahiran adalah kejadian fisiologis yang normal. Kelahiran seorang bayi bagi ibu dan keluarga merupakan hal yang dinantikan selama 9 bulan lamanya. Saat persalinan dimulai, peran seorang ibu adalah melahirkan bayinya sedangkan peran petugas kesehatan dalam hal ini adalah memantau persalinan untuk mendeteksi dini adanya komplikasi serta keluarga dalam hal ini sangat berperan penting dalam membantu memberi dukungan pada ibu saat bersalin (Eka Puspita, 2014:2).

Persalinan preterm adalah partus dari hasil konsepsi yang dapat hidup tetapi belum aterm (cukup bulan). Berat janin antara 1000-2500 gram atau tua kehamilan antara 28 sampai 36 minggu (Ina Kuswanti, 2014 : 2). Sedangkan menurut Saifuddin (2009), persalinan prematur merupakan persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu yaitu antara 28-37 minggu atau dengan berat janin kurang dari 2500 gram. Masalah utama dalam persalinan

preterm adalah perawatan bayinya. Semakin muda usia kehamilannya, maka semakin besar morbiditas dan mortalitasnya (Ningrum, dkk, 2017:151).

Kejadian partus prematur yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu meningkatkan angka kematian bayi. Sampai saat ini mortalitas dan morbiditas bayi prematur masih sangat tinggi. Persalinan prematur yang terjadi akan melahirkan bayi yang mempunyai ketidakmatangan sistem organ tubuh seperti paru-paru, jantung, ginjal, hati, dan sistem pencernaan. Hal ini berakibat buruk bagi kelangsungan hidup bayi (Wijayanti, 2014:3).

Permasalahan yang terjadi pada persalinan preterm bukan saja pada kematian perinatal, melainkan bayi prematur ini sering pula disertai dengan kelainan, baik kelainan jangka pendek maupun jangka panjang. Kelainan jangka pendek yang sering terjadi adalah *Respiratory Distress Syndrome* (RDS), perdarahan intra/periventrikular, *Necrotizing Enterocolitis* (NEC), displasi bronko-pulmonalar, dan paten duktus arteriosus. Adapun kelainan jangka panjang sering berupa kelainan neurologik seperti serebral palsy, retinopati, retardasi mental, juga dapat disfungsi neurobehavioral. Beberapa faktor mempunyai andil dalam terjadinya persalinan preterm seperti faktor pada ibu, faktor janin, dan plasenta, ataupun faktor lain seperti sosial ekonomi (Prawirohardjo, 2014 : 667-668).

Persalinan preterm umumnya berkaitan dengan berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah dapat disebabkan oleh kelahiran preterm dan pertumbuhan janin yang terhambat. Persalinan preterm merupakan hal yang

berbahaya Karena potensial meningkatkan kematian perinatal sebesar 65-75%. Penyebab persalinan preterm bukan tunggal tetapi multi kompleks. Faktor yang diduga sebagai penyebab persalinan preterm seperti solusio plasenta, kehamilan ganda, kelainan uterus, polihidramnion, kelainan kongenital janin, ketuban pecah dini, termasuk infeksi. Faktor lain yang juga sering mempengaruhi terjadinya persalinan preterm adalah anemia, pola hidup tidak sehat, usia, penyakit yang menyertai kehamilan, ekonomi, paritas dan jarak kehamilan (Ningrum, dkk, 2017 : 151).

Angka kejadian prematur dan angka kematian bayi prematur di Indonesia masih tergolong tinggi. Indonesia masuk tergolong peringkat 10 besar dari 184 negara dengan angka kejadian prematur yang tinggi, yaitu 15,5 kelahiran prematur per 100 kelahiran hidup. Dilihat dari jumlah bayi yang lahir prematur, Indonesia merupakan negara kelima dengan jumlah bayi prematur terbanyak di dunia yaitu sebesar 675.700 bayi (WHO, 2014). Dilihat dari jumlah kematiannya, Indonesia berada pada peringkat 7 dari 10 negara dengan jumlah kematian bayi prematur yang tinggi, yaitu sebesar 25.800 kematian (UCFS, 2014). Di negara barat sampai 80% dari kematian neonatus akibat persalinan preterm. Di beberapa negara maju angka kematian neonatal pada persalinan preterm menurun, yang umumnya disebabkan oleh meningkatnya peranan *neonatal intensive care* dan akses yang lebih baik dari pelayanan ini (Winkjosastro, 2014 : 668).

Angka kematian bayi (AKB) di Indonesia masih cukup tinggi. Tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDG's) 2000-2015 dan sekarang dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) 2015-2030 berkomitmen untuk menurunkan AKB. SDG's mempunyai 17 tujuan dan 169 target, tujuan pertama, kedua dan ketiga berhubungan dengan kesehatan. Sedangkan tujuan yang berhubungan dengan penurunan AKB adalah tujuan yang ketiga yaitu dengan target penurunan AKB 12 per 1000 kelahiran hidup (Rutgers WPF Indonesia, 2015 : 11-13).

Menurut laporan *World Health organization* (WHO) AKB di dunia masih tinggi, dan Indonesia berada di posisi teratas dari negara *Association South East Asian Nation* (ASEAN) yaitu Singapura 3 per 1000 kelahiran hidup, Malaysia 5,5 per 1000 kelahiran hidup, Thailand 17 per 1000 kelahiran hidup, Vietnam 18 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB di Indonesia masih tinggi yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup, jika dibandingkan dengan target dari SDG's tahun 2015-2030 yaitu 12 per 1000 kelahiran hidup (WHO, 2015).

Dalam profil Kesehatan Indonesia tahun 2014, AKB di Indonesia sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2010 yaitu AKB sebanyak 34 per 1000 kelahiran hidup, tetapi angka tersebut jauh dari target SDG's yaitu AKB pada tahun 2015 sebanyak 23 per 1000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2015 : 26-27).

Jumlah ibu bersalin pada tahun 2013 sebanyak 128.516 dengan persalinan preterm sebanyak 789 kasus, pada tahun 2014 ibu bersalin sebanyak 129.813 dengan persalinan preterm sebanyak 797 kasus, pada tahun 2015 ibu bersalin sebanyak 132.657 dengan persalinan preterm sebanyak 802 kasus, pada tahun 2016 ibu bersalin sebanyak 139.717 dengan persalinan preterm sebanyak 819, pada tahun 2017 ibu bersalin sebanyak 149.562 dengan persalinan preterm sebanyak 892 kasus. (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, pada tahun 2013 ibu bersalin sebanyak 12.218 dengan persalinan preterm sebanyak 58 kasus, pada tahun 2014 ibu bersalin sebanyak 12.307 dengan persalinan preterm sebanyak 61 kasus, pada tahun 2015 ibu bersalin sebanyak 12.653 dengan persalinan preterm sebanyak 65 kasus, pada tahun 2016 ibu bersalin sebanyak 12.668 dengan persalinan preterm sebanyak 68 kasus, pada tahun 2017 ibu bersalin sebanyak 12.657 dengan persalinan preterm sebanyak 75 kasus.

Data yang diperoleh dari *medical record* RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tahun 2015 ibu bersalin sebanyak 1.804 dengan jumlah persalinan preterm sebanyak 65 kasus, pada tahun 2016 ibu bersalin sebanyak 1.578 dengan persalinan preterm sebanyak 90 kasus, sedangkan pada tahun 2017 ibu bersalin sebanyak 1.934 dengan jumlah persalinan preterm yang mengalami penurunan yaitu 87 kasus. Selain itu, angka kejadian persalinan preterm di

RSUD Syekh Yusuf Gowa merupakan peringkat ketujuh dari kasus patologi yang ada di kamar bersalin. Urutan peringkat tersebut yaitu: perdarahan, abortus, preeklamsi, serotinus, ketuban pecah dini, plasenta previa, persalinan preterm, dan molahidatidosa (*Medical Record RSUD Syekh Yusuf Gowa*).

Meskipun kasus persalinan preterm mengalami penurunan, namun persalinan preterm masih kategori ketujuh dalam kasus patologi yang ada di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Selain itu, 87 kasus persalinan preterm bukan jumlah yang sedikit dan persalinan preterm dianggap tetap perlu mendapat perhatian khusus karena apabila tidak tertangani dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang sangat besar baik terhadap ibu maupun pada janin.

Pendekatan obstetrik yang baik terhadap persalinan preterm akan memberikan harapan terhadap ketahanan hidup dan kualitas hidup bayi preterm (Prawirohardjo, 2014 : 668). Pelayanan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan yang harus diikuti oleh ibu hamil dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dan bertujuan untuk menjaga ibu hamil agar dapat melalui masa kehamilan, persalinan dan nifas dengan baik dan selamat, serta menghasilkan bayi yang sehat.

Oleh karena itu, diharapkan pengetahuan tentang kondisi-kondisi yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kehamilan yang dapat dipahami oleh masyarakat, terutama ibu hamil, dengan demikian diharapkan menjadi

pegangan dalam usaha pencegahan atau preventif dalam rangka menurunkan angka persalinan preterm, sehingga komplikasi yang tidak diinginkan pada ibu dan janin dapat dihindari. Hal ini dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kesehatan, khususnya maternal dan perinatal, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan tinjauan kasus untuk membahas persalinan preterm dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “ X“ dengan Persalinan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018”.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah ini adalah manajemen asuhan kebidanan dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan manajemen asuhan kebidanan dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018 dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi atau wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukannya pengumpulan data pada ibu bersalin dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018.

- b. Dirumuskannya interpretasi data pada ibu bersalin dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018.
- c. Diidentifikasinya diagnosis potensial pada ibu bersalin dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018.
- d. Diidentifikasinya diagnosis potensial pada ibu pada ibu bersalin dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018.
- e. Disusun rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018.
- f. Dilaksanakannya asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan pada ibu bersalin dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018.
- g. Dievaluasinya asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu bersalin dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018.
- h. Dilakukannya pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada kasus persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2018.
- i. Diintegrasikannya nilai-nilai keislaman kepada pasien dengan kasus persalinan preterm.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir di jenjang pendidikan Program Diploma tiga Kebidanan UIN Alauddin Makassar.

2. Manfaat Instansi

Memberikan informasi dan masukan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang manajemen asuhan kebidanan dengan persalinan preterm.

4. Manfaat bagi Institusi

Sebagai bahan ilmiah atau bahan bacaan untuk penulisan berikutnya.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Studi Pustaka

Penulis mempelajari buku-buku literatur dan mengambil data-data dari internet, antara lain: membaca buku dari berbagai sumber yang berkaitan dengan persalinan preterm, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah Varney yaitu: identifikasi dan analisa data dasar, identifikasi diagnosis atau masalah aktual, antisipasi diagnosa atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, dan evaluasi hasil kebidanan yang diberikan.

Untuk memperoleh data dalam pengkajian, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa atau wawancara

Penulis melakukan Tanya jawab dengan klien, dan suami maupun keluarganya, bidan, serta dokter yang berada di kamar bersalin yang dapat membantu dan memberikan keterangan atau info yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan kebidanan.

b. Observasi

Penulis memperoleh data dengan mengobservasi secara langsung.

c. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, dan perkusi.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.

- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau raba. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus, serta untuk mengetahui tekanan darah, sedangkan lenek digunakan untuk mendengar denyut jantung janin (DJJ).

3. Studi Dokumentasi

Membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium, dan atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya.

4. Diskusi

Penulis melakukan Tanya jawab dengan klien, keluarga klien, dan dosen pembimbing, baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk melancarkan penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan untuk penulisan proposal ini terdiri dari BAB I sampai BAB II, yaitu BAB I terdiri dari pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan metode penulisan. BAB II yaitu tinjauan pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teori yang meliputi tentang tinjauan umum tentang persalinan, tinjauan khusus

tentang persalinan preterm, dan tinjauan umum tentang bayi baru lahir preterm, tinjauan Islam tentang persalinan, dan proses manajemen asuhan kebidanan. BAB III yaitu studi kasus, pada bab ini akan diuraikan kasus yang telah dikaji dengan menggunakan 7 langkah Varney dan pendokumentasian SOAP, BAB IV yaitu pembahasan tentang kesesuaian antara tinjauan teori dengan studi kasus. BAB V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang persalinan

1. Pengertian persalinan

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Proses ini dimulai dengan adanya kontraksi persalinan sejati, yang ditandai dengan perubahan serviks secara progresif dan diakhiri dengan kelahiran plasenta (Eka Puspita dan Kurnia, 2014 : 2).

Persalinan merupakan kontraksi uterus yang teratur dan semakin kuat, menciptakan penipisan dan dilatasi serviks disepanjang waktu, yang menimbulkan dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui jalan lahir melawan resistansi jaringan lunak, otot, dan struktur tulang panggul (Betsy, dkk, 2014 : 2).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa persalinan merupakan proses pengeluaran konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar, yang ditandai dengan adanya kontraksi uterus yang menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap.

2. Tujuan asuhan persalinan

Tujuan asuhan persalinan adalah memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi (Endang, 2014 : 20).

Tujuan lain dari asuhan persalinan adalah:

- a. Meningkatkan sikap positif terhadap keramahan dan keamanan dalam memberikan pelayanan persalinan normal dan penanganan awal penyulit beserta rujukannya.
- b. Memberikan pengetahuan dan keterampilan pelayanan persalinan normal dan penanganan awal penyulit beserta rujukan yang berkualitas dan sesuai dengan prosedur standar.
- c. Mengidentifikasi praktik-praktik terbaik bagi penatalaksanaan persalinan dan kelahiran:
 - 1) Penolong yang terampil
 - 2) Kesiapan menghadapi persalinan, kelahiran, dan kemungkinan komplikasinya
 - 3) Patograf
 - 4) Episotomi terbatas hanya atas indikasi
 - 5) Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang merugikan dengan maksud menghilangkan tindakan tersebut. (Eka Puspita dan Kurnia Dwi, 2014 : 18).

3. Tanda-tanda persalinan

Menurut Manuaba dalam buku ilmu kebidanan dan penyakit kandungan telah disebutkan bahwa tanda-tanda persalinan dibagi menjadi dua fase, yaitu tanda bahwa persalinan sudah dekat dan tanda timbulnya persalinan (inpartu).

a. Tanda-tanda bahwa persalinan sudah dekat (Eka puspita, 2014 : 10-11)

1) Tanda Lightening

Menjelang minggu ke 36 kehamilan, tanda pada primigravida adalah terjadinya penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul yang disebabkan kontraksi *Braxton Hicks*, ketegangan dinding perut, ketegangan ligamentum rotundum, dan gaya berat janin dimana kepala ke arah bawah. Masuknya bayi ke pintu atas panggul membuat ibu merasakan ringan dibagian atas perut, rasa sesaknya berkurang, bagian bawah perut ibu terasa penuh, dan mengganjal, serta sering buang air kecil (follaksuria). Gambaran Lightening antara ketiga P yaitu *power*, *passage*, dan *passanger*. Sedangkan pada multipara gambarannya tidak begitu jelas, karena kepala janin baru masuk pintu atas panggul menjelang persalinan.

2) Terjadinya his permulaan

Dengan semakin tuanya umur kehamilan, pengeluaran estrogen dan progesteron semakin berkurang, sehingga oksitosin dapat menimbulkan kontraksi yang lebih sering, yang dikenal sebagai his

palsu, dengan sifat seperti rasa nyeri ringan dibagian bawah, datangnya tidak teratur, tidak ada perubahan pada serviks atau pembawa tanda, durasinya pendek, tidak bertambah bila beraktivitas.

b. Tanda-tanda timbulnya persalinan (inpartu)

1) Terjadinya his persalinan

His adalah kontraksi rahim yang dapat diraba menimbulkan rasa nyeri diperut serta dapat menimbulkan pembukaan serviks kontraksi rahim yang dimulai pada 2 *face maker* yang letaknya didekat *cornu uteri*. His yang menimbulkan pembukaan serviks dengan kecepatan tertentu disebut his efektif. His persalinan memiliki sifat sebagai berikut:

- a) Pinggang terasa sakit dan mulai menjalar ke depan.
- b) Teratur dengan interval yang makin pendek dan kekuatannya makin besar.
- c) Mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks.
- d) Penambahan aktivitas (seperti berjalan) maka his tersebut semakin meningkat.

2) Keluarnya lendir bercampur darah (*show*)

Lendir ini berasal dari pembukaan kanalis servikalis. Sedangkan pengeluaran darahnya disebabkan oleh robeknya pembuluh darah waktu serviks membuka.

3) Terkadang disertai ketuban pecah

Sebagian ibu hamil mengeluarkan air ketuban akibat pecahnya selaput ketuban menjelang persalinan. Jika ketuban sudah pecah, maka ditargetkan persalinan dapat berlangsung dalam 24 jam. Namun, apabila persalinan tidak tercapai, maka persalinan harus diakhiri dengan tindakan tertentu, misalnya *ekstraksi vacum* atau *sectio caesaria*.

4) Dilatasi dan *effacement*

Dilatasi adalah terbukanya kanalis servikalis secara berangsur-angsur akibat pengaruh his. *Effacement* adalah pendataran atau pemendekan kanalis servikalis yang semula panjang 1-2 cm menjadi hilang sama sekali, sehingga tinggal hanya ostium yang tipis seperti kertas (Elisabeth Siwi, 2014 : 15-20).

4. Tahapan-tahapan dalam proses persalinan

a. Persalinan kala I

Kala I adalah suatu kala dimulainya proses persalinan yang ditandai dengan adanya kontraksi yang teratur, adekuat dan menyebabkan perubahan pada serviks hingga mencapai pembukaan lengkap. Kala I terbagi menjadi 2 fase yaitu fase laten yang dimulai dari awal kontraksi hingga pembukaan mendekati 4 cm, kontraksi mulai teratur tetapi lamanya masih diantara 20-30 detik, tidak terlalu mules. Sedangkan fase aktif ditandai dengan kontraksi diatas 3 kali dalam 10

menit, lama kontraksi 40 detik atau lebih dan mules, pembukaan dari 4 cm sampai lengkap.

b. Persalinan kala II

Kala II dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai lahirnya bayi. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi.

c. Persalinan kala III

Batasan kala III yaitu setelah lahirnya bayi dan berlangsungnya proses pengeluaran plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir uterus teraba keras dengan fundus uteri agak diatas pusat. Biasanya plasenta lepas dalam 6 menit sampai 15 menit setelah bayi lahir dan kelaur spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri.

d. Persalinan kala IV

Kala IV dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama post partum. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kontraksi uterus sampai uterus kembali dalam bentuk normal. Hal ini dapat dilakukan dengan rangsangan taktil (masase) untuk merangsang uterus berkontraksi baik dan kuat. Perlu juga dipastikan bahwa plasenta lahir lengkap dan tidak ada yang tersisa sedikitpun dalam uterus serta benarbenar dijamin tidak terjadi perdarahan berlanjut (Fitria Melina, 2014 : 5-8).

5. Faktor yang mempengaruhi persalinan

a. *Power* (kekuatan/tenaga)

1) His

His adalah kontraksi otot-otot rahim pada persalinan. Sifat his yang baik dan sempurna meliputi:

- a) Kontraksi simultan simetris di seluruh uterus.
- b) Kekuatan terbesar (dominasi) di daerah fundus.
- c) Terdapat periode relaksasi diantara dua periode kontraksi.
- d) Terdapat retraksi otot-otot korpus uteri.
- e) Pada setiap his menyebabkan terjadinya perubahan pada serviks, yaitu menipis dan membuka.

Menurut sifatnya his persalinan dapat dibagi dalam:

- a) His pendahuluan merupakan his tidak kuat dan tidak teratur namun menyebabkan keluarnya *bloody show*.
- b) His pembukaan yaitu his yang menimbulkan pembukaan serviks, semakin kuat, teratur, dan sakit.
- c) His pengeluaran yaitu his yang mendorong anak keluar. His pengeluaran biasanya disertai dengan keinginan mengejan.
- d) His pelepasan uri yaitu kontraksi sedang untuk melepaskan dan melahirkan plasenta.
- e) His pengiring yaitu his yang kontraksinya lemah, masih sedikit nyeri dan terjadi pengecilan rahim dalam beberapa jam atau hari.

Pada his yang perlu diawasi adalah:

- a) Frekuensi yaitu waktu antara awal kontraksi dengan awal kontraksi berikutnya. Frekuensi mula-mula masih jarang dan tidak teratur, kemudian menjadi lebih sering, menjelang akhir persalinan kala I, kontraksi menjadi lebih sering yakni setiap dua sampai tiga menit.
 - b) Durasi yaitu lamanya tiap his berlangsung misalnya selama 40 detik.
 - c) Interval (kekuatan kontraksi) awal mula persalinan intensitasnya ringan, menjelang akhir kala I intensitasnya cukup kuat dan menjadi lebih kuat (Ina kuswanti, 2014 : 11-13).
- 2) Tenaga mendedan
- a) Setelah pembukaan lengkap dan ketuban pecah, tenaga yang mendorong anak keluar selain his adalah tenaga mengejan, dan disebabkan oleh otot-otot diafragma dan abdomen ibu berkontraksi dan mendorong keluar isi jalan lahir.
 - b) Tenaga ini serupa dengan tenaga pada saat buang air besar, tapi jauh lebih kuat.
 - c) Tekanan ini menekan uterus pada semua sisi dan menambah kekuatan untuk mendorong keluar.
 - d) Tenaga mendedan ini hanya dapat berhasil pada saat pembukaan sudah lengkap disertai his yang efektif atau adekuat.

e) Apabila dalam persalinan wanita melakukan usaha mendedan terlalu dini, dilatasi serviks akan terhambat. Mendedan akan melelahkan ibu dan menimbulkan trauma pada serviks (Eka Puspita sari dan Kurnia Dwi, 2014 : 38).

b. *Passage* (jalan lahir)

Passage atau faktor jalan lahir terdiri atas bagian keras tulang-tulang panggul yaitu rangka panggul dan lunak yaitu otot-otot, jaringan-jaringan, dan ligamen-ligamen (Ina Kuswanti, 2014 : 14).

c. *Passenger*

Janin dapat mempengaruhi jalannya kelahiran karena ukuran dan presentasinya.

Postur janin dalam rahim

1) Sikap

Menunjukkan hubungan bagian-bagian janin dengan sumbu janin, biasanya terhadap tulang punggungnya. Janin umumnya dalam sikap fleksi dimana kepala, tulang punggung dan kaki dalam keadaan fleksi serta lengan bersilang di dada.

2) Letak

Letak janin adalah bagaimana sumbu janin berada pada sumbu ibu.

3) Presentasi

Presentasi digunakan untuk menentukan bagian janin yang ada dibagian bawah rahim yang dijumpai pada palpasi atau pemeriksaan dalam. Misanya presentasi kepala, bokong, dan bahu.

4) Posisi

Posisi merupakan indikator untuk menentukan arah bagian terbawah janin apakah sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang kepala, ubun-ubun kecil kiri depan atau kanan belakang.

Letak janin dalam rahim

- a) Letak membujur (*Longitudinal*) seperti letak kepala dan letak sungsang.
- b) Letak lintang (*Transverse Lie*)
- c) Letak miring (*Oblique Lie*)

Posisi dan variasi

- a) Letak belakang kepala
- b) Presentasi dahi
- c) Presentasi muka
- d) Presentasi bokong
- e) Letak lintang (Eniyati, 2014 : 26-29).

d. Psikologis

Psikologis persalinan merupakan hubungan saling memengaruhi yang rumit antara dorongan psikologis dan fisiologis

dalam diri wanita. Salah satu kondisi psikologis yang dapat mengambat persalinan adalah rasa cemas (Kurnia, 2014: 67).

Faktor psikologi meliputi:

- 1) Persiapan fisik untuk melahirkan
- 2) Pengalaman persalinan
- 3) Dukungan orang terdekat
- 4) Integritas emosional (Eniyati, 2014 : 29)

e. Penolong

Peran penolong adalah memantau dengan seksama dan memberikan dukungan serta kenyamanan pada ibu baik dari segi emosi atau perasaan maupun fisik. Dalam hal ini penolong persalinan harus membantu pasien, memperjelas, serta mengurangi beban perasaan dan pikiran selama proses persalinan, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk pasien dan membantu mempengaruhi pasien, lingkungan fisik, dan diri sendiri dari rasa emosi, lelah, serta tetap melakukan perlindungan diri dari adanya kemungkinan bahaya infeksi selama proses persalinan (Eka Puspita dan Kurnia Dwi, 2014 : 73).

6. Mekanisme persalinan

Mekanisme persalinan normal adalah gerakan janin menyesuaikan ukuran dirinya dengan ukuran panggul ibu saat kepala melawati panggul yang meliputi gerakan:

a. *Engagement*

Peristiwa ketika diameter biparietal melewati pintu atas panggul dengan sutura sagitalis melintang/oblig di dalam jalan lahir dan sedikit fleksi . penurunan dimulai sebelum inpartu. Penurunan kepala terjadi bersamaan dengan mekanisme lainnya. Kekuatan yang mendukung antara lain tekanan cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong janin, dan kontaksi otot abdomen.

b. Fleksi

Pada permulaan persalinan kepala janin biasanya berada dalam sikap fleksi. Dengan adanya his dan tahan dari dasar panggul yang makin besar, maka kepala janin makin turun dan semakin fleksi sehingga dagu janin menekan pada dada dan belakang kepala (oksiput) menjadi bagian bawah. Keadaan ini dinamakan fleksi maksimal. Dengan fleksi maksimal kepala janin dapat menyesuaikan diri dengan ukuran panggul ibu.

c. Rotasi dalam atau putaran paksi dalam

Makin turunnya kepala janin dalam jalan lahir, kepala janin akan berputar sedemikian rupa sehingga diameter terpanjang rongga panggul atau diameter antero posretior kepala janin akan bersesuaian dengan diameter terkecil antero postero pintu bawah panggul. Hal ini karena kepala janin bergerak spiral sewaktu turun dalam jalan lahir. Bahu tidak berputar bersama-sama dengan kepala akan membentuk sudut 45

derajat. Keadaan demikian disebut putaran paksi dalam dan ubun-ubun kecil berada dibawah simpisis.

d. Ekstensi

Setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai didasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir dari pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas.

e. Rotasi luar/putaran paksi luar

Setelah ekstensi kemudian diikuti dengan putaran paksi luar yang pada hakikatnya kepala janin menyesuaikan kembali dengan sumbu panjang bahu, sehingga sumbu panjang bahu dengan sumbu kepala janin berada pada satu garis lurus.

f. Ekspulsi

Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simpisis dan menjadi sumbu putar untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu belakang menyusul dan selanjutnya seluruh tubuh bayi lahir searah dengan paksi jalan lahir (Ai Yeyeh, dkk, 2014 : 8-10).

B. Tinjauan khusus tentang persalinan preterm

1. Pengertian persalinan preterm

- a. Menurut WHO 2012 persalinan preterm merupakan persalinan yang terjadi antara usia kehamilan 28 minggu sampai kurang dari 37 minggu

yang dihitung dari hari pertama haid terakhir (Noviana dewi, dkk, 2016 : 21)

- b. Persalinan preterm adalah kejadian kontraksi uterus secara teratur yang menyebabkan penipisan atau dilatasi serviks sebelum kehamilan berusia lengkap 37 minggu (Janet Medforth, dkk, 2014 : 327).

2. Klasifikasi persalinan preterm

- a. Menurut kejadiannya, persalinan preterm digolongkan menjadi:

1) Spontan

Sekitar 50 % penyebab persalinan preterm tidak diketahui, oleh karena itu, digolongkan pada kelompok persalinan preterm spontan. Termasuk dalam golongan ini antara lain persalinan preterm kehamilan kembar, polohidramnion, atau persalinan preterm yang didasari oleh faktor psikososial dan gaya hidup.

2) Elektif

Hal-hal yang dapat menyebabkan persalinan preterm elektif adalah:

- a) Keadaan ibu yang dapat menyebabkan persalinan preterm elektif yaitu preeklampsia berat dan eklamsi, perdarahan antepartum (plasenta previa dan solusio plasenta), penyakit jantung, paru dan ginjal yang berat
- b) Keadaan janin yang dapat menyebabkan persalinan preterm seperti gawat janin (hipoksia atau gangguan jantung janin), infeksi

intrauterine, pertumbuhan janin terhambat (Prawirohardjo, 2014 : 670).

b. Menurut usia kehamilannya, terdapat 3 subkategori kelahiran preterm berdasarkan kategori World Health Organization (WHO, 2012), yaitu:

- 1) *Extremely preterm* (<28 minggu).
- 2) *Very preterm* (28 minggu hingga <32 minggu).
- 3) *Moderate to late preterm* (32 minggu hingga <37 minggu).

c. Berdasarkan berat badan lahir dibagi dalam 3 kelompok yaitu:

- 1) Berat badan lahir rendah : 1.500-2.500 gram
- 2) Berat badan lahir sangat rendah: 1.000-1.500 gram
- 3) Berat badan lahir ektrim rendah: <1.000 gram (Prawirohardjo, 2014 : 668).

3. Etiologi dan faktor predisposisi persalinan preterm

a. Etiologi

- 1) Janin dan plasenta
 - a) Perdarahan trimester awal.
 - b) Perdarahan antepartum (plasenta previa, solusio plasenta, vasa previa).
 - c) Ketuban pecah dini (KPD).
 - d) Pertumbuhan janin terhambat.
 - e) Cacat bawaan janin.
 - f) Kehamilan ganda atau gemeli.

g) Polihidramnion.

2) Ibu

a) Penyakit berat pada ibu.

b) Diabetes mellitus.

c) Preeklampsia.

d) Infeksi saluran kemih, genital dan intrauterine.

e) Penyakit infeksi dengan demam.

f) Stres psikologik.

g) Kelainan bentuk uterus atau serviks.

h) Riwayat persalinan preterm/abortus berulang.

i) Inkompetensi serviks (panjang serviks kurang dari 1 cm).

j) Pemakaian obat narkotik.

k) Trauma.

l) Perokok berat.

m) Kelainan imunologi (Prawirohardjo, 2014 : 669-670).

b. Faktor predisposisi

1) Preeklampsia, eklampsia.

2) Hemoragi antepartum, solusio plasenta, plasenta previa.

3) Retardasi pertumbuhan intrauterine.

4) Penyakit atau infeksi pada wanita ayau janin.

5) *preterm, prelabour rupture of the membranes (PPROM)*.

6) Kematian janin intrauteri.

- 7) Kehamilan ganda.
- 8) Polihidramnion.
- 9) Abnormalitas kongenital.
- 10) Persaliana prematur sebelumnya.
- 11) Inkomepensi serviks (Janet Medforth, dkk, 2014 : 327-328).

4. Tanda dan gejala persalinan preterm

a. Kontraksi uterus

Kontraksi uterus yang sering, terjadi setiap 10 menit atau kurang (lebih dari lima kali dalam satu jam), dapat mengindikasikan persalinan preterm. Kontraksi uterus yang tidak teratur disebut kontraksi *Braxton Hicks*, biasanya terjadi saat kehamilan mengalami kemajuan. Namun kontraksi yang sering atau teratur tidak boleh diabaikan. Kontraksi persalinan preterm sering sekali tidak terasa nyeri dan dapat digambarkan sebagai pengencangan uterus atau sebagai pergerakan bayi yang tidak beraturan.

b. Kram seperti saat haid

Kram pada bagian bawah abdomen atau paha atas ini dapat terjadi secara konstan atau intermiten.

c. Nyeri tumpul pada punggung bagian bawah

Nyeri punggung pada saat kehamilan bukanlah sesuatu yang tidak umum, tetapi nyeri punggung bagian bawah yang tidak mereda dengan istirahat atau perubahan posisi harus diperiksa. Nyeri terasa

menggerogoti atau berdenyut di bawah garis pinggang, yang dapat terjadi intermiten atau konstan, dan dapat menyebar ke bagian depan abdomen.

d. Tekanan panggul

Banyak ibu menggambarkan tekanan ini sebagai rasa berat pada abdomen bagian bawah, panggul, punggung, atau paha yang terasa seakan-akan bayi mendorong turun. Kondisi ini seringkali merupakan tekanan panggul yang ritmis dan tidak mereda dengan istirahat.

e. Kram abdomen

Kram usus disertai atau tanpa diare, terkadang digambarkan sebagai nyeri gas dapat berhubungan dengan persalinan prematur.

f. Peningkatan atau perubahan rabas vagina

Rabas berwarna putih susu merupakan hal yang normal saat kehamilan. Akan tetapi, peningkatan atau perubahan rabas yang tiba-tiba, baik berupa mukus, berair, atau disertai bercak darah, dapat berhubungan dengan persalinan prematur (Betsy, dkk, 2014 : 292).

5. Diagnosis persalinan preterm

Sering terjadi kesulitan dalam menentukan diagnosis ancaman persalinan preterm. Tidak jarang kontraksi yang timbul pada kehamilan benar-benar merupakan ancaman proses persalinan. Beberapa kriteria dapat dipakai sebagai diagnosis ancaman persalinan preterm, yaitu:

- a. Kontraksi yang berulang sedikitnya setiap 7-8 menit sekali, atau 2-3 kali dalam waktu 10 menit.
- b. Adanya nyeri pada punggung bawah.
- c. Perdarahan bercak.
- d. Perasaan menekan daerah serviks.
- e. Pemeriksaan serviks menunjukkan telah terjadi pembukaan sedikitnya 2 cm, dan penipisan 50-80 %.
- f. Presentasi janin rendah, sampai mencapai spina isiadika.
- g. Selaput ketuban pecah dapat merupakan tanda awal terjadinya persalinan preterm.
- h. Terjadi pada usia kehamilan 22-37 minggu (Prawirohardjo, 2014 : 671).

6. Komplikasi persalinan preterm

- a. Terhadap ibu yaitu : Distress maternal

Distress maternal harus dicegah karena memburuknya kondisi wanita akan mempengaruhi keadaan ibu dan janin yang belum lahir. Memperhatikan asuhan nutrisi pada ibu sejak awal persalinan dan segera mencari bantuan dokter jika persalinan tidak mengalami kemajuan.

- b. Terhadap bayi

- 1) Mudah terkena infeksi

Bayi prematuritas mudah sekali mengalami infeksi karena daya tahan tubuh masih lemah, kemampuan leukosit masih kurang dan

pembentukan antibody belum sempurna. oleh karena itu tindakan preventif sudah dilakukan sejak antenatal sehingga tidak terjadi persalinan dengan prematuritas.

2) Asfiksia

Asfiksia neonatorum adalah kegagalan napas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia dan asidosis. Asfiksia neonatorum dapat terjadi selama kehamilan, pada proses persalinan dan melahirkan atau periode setelah lahir (Anik dan Eka, 2013 : 296-298).

Klasifikasi asfiksia serta tanda dan gejalanya:

a) Asfiksia berat (Nilai APGAR 0-3)

- (1) Frekuensi jantung kecil, yaitu <40 kali per menit.
- (2) Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada.
- (3) Tidak ada usaha napas.
- (4) Bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna kelabu.
- (5) Bayi tidak dapat memberikan reaksi jika diberikan rangsangan.
- (6) Terjadi kekurangan oksigen yang berlanjut sebelum atau sesudah persalinan.

b) Asfiksia sedang (nilai APGAR 4-6)

- (1) Frekuensi jantung menurun menjadi 60-80 kali per menit.

- (2) Tonus otot biasanya dalam keadaan baik.
 - (3) Usaha napas lambat.
 - (4) Bayi tampak sianosis.
 - (5) Bayi masih bisa bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan.
 - (6) Tidak terjadi kekurangan oksigen yang bermakna selama proses persalinan.
- c) Asfiksia ringan (nilai APGAR 7-10)
- (1) Takipnea dengan napas lebih dari 60 kali per menit.
 - (2) Adanya retraksi sela iga.
 - (3) Bayi tampak sianosis.
 - (4) Bayi merintih.
 - (5) Adanya pernapasan cuping hidung.
 - (6) Bayi kurang aktivitas.
 - (7) Dari pemeriksaan auskultasi diperoleh hasil *ronchi*, *rales*, dan *wheezing* positif (Vivian, 2014 : 102).

7. Dampak persalinan preterm

a. Infeksi intrapartum

Infeksi dapat mengancam ibu dan janinnya pada proses persalinan, terutama bila disertai pecahnya ketuban. Persalinan preterm identik dengan pecahnya ketuban. Pada saat ketuban pecah sebelum waktunya resiko terjadinya infeksi sangat besar. Bakteri didalam cairan

amnion, menginvasi desidua serta pembuluh korion sehingga terjadi bakterimia dan sepsis pada ibu dan janin.

b. Hipotermia

Hipotermia merupakan keadaan dimana seorang individu mengalami atau beresiko mengalami penurunan suhu tubuh terus-menerus di bawah $35,5^{\circ}\text{C}$ per rectal karena peningkatan kerentanan terhadap faktor-faktor eksternal. Suhu normal bayi berkisar antara $36,5^{\circ}\text{C}$ - $37,5^{\circ}\text{C}$. Adapun gejala awal hipotermi apabila suhu $<36^{\circ}\text{C}$ atau kedua kaki dan tangan terasa dingin disebut hipotermia sedang. Disebut hipotermia berat apabila pernapasan lambat tidak teratur dan mungkin timbul hipoglikemi dan asidosis metabolik. Pada stadium lanjut hipotermia yaitu muka, ujung kaki dan tangan berwarna merah terang, bagian tubuh lainnya pucat, kulit mengeras, merah dan timbul edema terutama pada punggung, kaki, dan tangan.

c. Ikterus

Ikterus neonatorum merupakan warna kuning pada kulit dan bagian putih dari mata (sklera) pada beberapa hari setelah lahir yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin. Gejala ini terjadi antara 25%-50% pada seluruh bayi cukup bulan dan lebih tinggi lagi pada bayi prematur. Semua bayi prematur menjadi ikterus karena sistem enzim hatinya belum sempurna untuk membuang bilirubin dari aliran darah.

Ikterus dapat diperberat oleh polistemia, memar hemoliasis dan infeksi karena hiperbilirubinemia dapat menyebabkan kernikterus dan bilirubin diperiksa bila ikterus muncul dini atau cepat bertambah coklat (Ronald, 2011 : 47).

d. Pernapasan

Bayi prematur mungkin menderita membranialin. Pada penyakit ini tanda-tanda gawat pernapasan selalu ada dalam 4 jam, bayi harus dirawat terlentang atau tengkurap dalam inkubator, dada abdomen harus di paparkan untuk mengobservasi usaha pernapasan.

e. Berat badan lahir rendah (BBLR)

Bayi yang dilahirkan dengan belum cukup umur ciri-ciri yang dapat dilihat adalah bayi tersebut memiliki berat badan rendah yaitu kurang dari 2.500 gram. BBLR dibedakan menjadi:

- 1) Bayi berat lahir rendah, berat lahir 1500-2500 gram.
- 2) Bayi berat lahir sangat rendah, berat lahir kurang dari 1500 gram.
- 3) Bayi berat lahir ekstrim rendah, berat lahir kurang dari 1000 gram.

Adapun penanganan bayi berat lahir rendah adalah sebagai berikut:

1) Pengaturan suhu badan BBLR

BBLR dengan cepat akan kehilangan panas badan dan menjadi hipotermi karena pusat pengaturan panas belum berfungsi dengan baik, metabolisme rendah dan permukaan badan relatif luas oleh

karena itu bayi dengan BBLR harus dirawat dalam inkubator sehingga panas badannya dapat dipertahankan.

Apabila tidak ada inkubator bayi dapat dibungkus dengan kain dan di sampingnya di taruh botol berisi air panas sehingga suhu badannya dapat dipertahankan.

2) Pengawasan nutrisi

Alat pencernaan bayi belum sempurna, refleks masih lemah sehingga pemberian minum sebaiknya sedikit demi sedikit dengan frekuensi yang lebih sering sehingga pertumbuhan dapat meningkat. ASI merupakan makanan yang paling utama, sehingga ASI lah yang paling terlebih dahulu diberikan, bila faktor menghisapnya kurang maka ASI dapat diperas dan diberikan dengan sendok perlahan-lahan atau dengan memasang sonde. Permulaan cairan yang diberikan 50-60 cc / kg BB / hari terus dinaikkan sampai mencapai sekitar 200 cc/kg BB/hari.

3) Menghindari infeksi

Bayi dengan BBLR sangat rentan terhadap infeksi, karena daya tahan tubuh masih lemah, kemampuan leukosit masih kurang dan pembentukan antibodi belum sempurna. Oleh sebab itu, perhatikan prinsip-prinsip pencegahan infeksi termasuk cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

4) Penimbangan ketat

Bayi dengan BBLR harus dipantau dengan ketat perkembangan berat badannya karena perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi/nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh bayi (Anik dan Eka, 2013 : 319-320).

8. Penanganan persalinan preterm

Dalam persalinan preterm, terdapat beberapa hal yang membuat penanganan dari persalinan ini berbeda dengan persalinan normal. Manajemen persalinan preterm meliputi tirah baring, pemberian tokolitik, pemberian steroid, pemberian antibiotik, dan perencanaan persalinan.

a. Tirah baring

Tirah baring bertujuan agar ibu dapat beristirahat dengan tenang, walaupun secara statistik tidak terbukti mengurangi angka kejadian persalinan preterm.

b. Pemberian tokolitik

Tokolitik berfungsi untuk menghambat persalinan. Tokolitik yang digunakan adalah nifedipin, indomethacin, magnesium sulfat, atosiban, dan progesteron.

c. Pemberian steroid

Pemberian steroid bertujuan untuk pematangan paru janin. Pemberiannya dianjurkan pada minggu ke 24 sampai 34, namun dipertimbangkan sampai 36 minggu. Steroid yang digunakan adalah

betametason yang diberikan secara IM dengan dosis 12 mg dan diulangi 24 jam kemudian. Efek optimalnya dicapai dalam 1-7 hari pemberian. Apabila tidak terdapat betametason dapat diberikan deksametason dengan dosis 2x5 mg IM perhari selama 2 hari (Prawirohardjo, 2014 : 674).

d. Pemberian antibiotik

Apabila terjadi infeksi maka dianjurkan untuk memberikan antibiotik. Antibiotik tidak dianjurkan dalam persalinan yang tidak mengalami infeksi (Schhleubner, 2013). Pada ibu yang terdeteksi vaginosis bacterial, dapat diberikan klindamisin 2x300 mg selama 7 hari atau metrodinazol 2x500 mg selama 7 hari akan bermanfaat bila diberikan pada usia kehamilan kurang dari 32 minggu (Prawirohardjo, 2014 : 674).

e. Perencanaan persalinan

Untuk umur kehamilan <32 minggu sebaiknya ibu dirujuk ke tempat yang mempunyai fasilitas *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU). Kelahiran <24 minggu dilahirkan pervaginam. Kehamilan 24-37 minggu diperlakukan sesuai dengan resiko obstetrik lainnya dan disamakan dengan aturan persalinan preterm. Tidak dianjurkan dilakukan forceps atau episiotomi elektif (Prawirohardjo, 2014 : 675).

f. Kelahiran

- 1) Kelahiran harus dilaksanakan secara hati-hati dan perlahan-lahan untuk menghindari kompresi dan dekompresi kepala secara cepat.
- 2) Oksigen diberikan lewat masker kepada ibu selama kelahiran.
- 3) Ketuban tidak boleh dipecahkan secara artificial. Kantong ketuban berguna sebagai bantal bagi tengkorak prematur yang lunak dengan sutura-suturanya yang masih terpisah lebar.
- 4) Episiotomi mengurangi tekanan pada cranium bayi.
- 5) Forceps rendah dapat membantu dilatasi bagian lunak jalan lahir dan mengarahkan kepala bayi lewat perineum.
- 6) Ekstraksi bokong tidak boleh dilakukan. Bahaya tambahan pada kelahiran prematur adalah bahwa bokong tidak dapat menghasilkan pelebaran jalan lahir yang cukup untuk menyediakan ruang bagi kepala bayi yang relatif besar.
- 7) Kelahiran presipitatus dan yang tidak ditolong berbahaya bagi bayi-bayi prematur.
- 8) Seorang ahli neonatus harus hadir pada saat kelahiran (Harry Oxorn & William, 2010 : 588).

C. Tinjauan umum tentang bayi baru lahir

1. Pengertian bayi baru lahir preterm

- a. Bayi preterm adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu atau kurang (WHO).

- b. Bayi preterm adalah bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan dengan berat lahir kurang dari 2500 gram. Sebagian besar organ vitanya belum berfungsi dengan baik, karena kelahirannya yang masih dini, maka dari itu perlu perawatan khusus untuknya (Maryuni, 2013 : 24).

2. Ciri-ciri bayi preterm

- a. Berat badan kurang dari 2.500 gram, panjang badan kurang dari 45 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm, lingkar dada kurang dari 30 cm.
- b. Gerakan kurang aktif otot masih hipotonis.
- c. Umur kehamilan kurang dari 37 minggu.
- d. Kepala lebih besar dari badan, rambut tipis dan halus.
- e. Tulang-tulang tengkorak lunak, fontanella besar dan sutura besar.
- f. Telinga sedikit tulang rawannya dan berbentuk sederhana.
- g. Jaringan payudara tidak ada dan puting susu kecil.
- h. Pernapasan belum teratur dan sering mengalami serangan apnu.
- i. Kulit tipis dan transparan, lanugo (bulu halus) banyak terutama pada dahi dan pelipis dahi dan lengan.
- j. Lemak subkutan kurang.
- k. Genetalia belum sempurna, pada wanita labia minora belum tertutup oleh labia mayora.
- l. Reflex menghisap dan menelan serta reflex batuk masih lemah (Anik dan Eka, 2013 : 33).

3. Masalah-masalah pada bayi baru lahir preterm

a. Termoregulator

- 1) Masih prematur, sehingga fungsinya masih belum optimal sebagai pengatur kehilangan panas badan.
- 2) Sedikitnya timbungan lemak di bawah kulit dan luas permukaan badan relatif besar sehingga bayi premature mudah kehilangan panas dalam waktu singkat.

b. Masalah paru

- 1) Pusat pengaturan paru di medulla oblongata masih belum sepenuhnya dapat mengatur pernapasan.
- 2) Tumbuh kembang paru masih belum matur sehingga sulit berkembang dengan baik.
- 3) Otot pernapasan masih lemah, sehingga tangis bayi prematur terdengar lemah dan merintih.

c. Gastrointestinal

- 1) Belum sempurna sehingga tidak mampu menyerap makanan ASI yang sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Pengosongan lambung terlambat sehingga menimbulkan desistensi lambung dan usus.

d. Hati

- 1) Belum matur sehingga kurang dapat berfungsi untuk mendukung metabolisme.

- 2) Cadangan glikogen rendah.
- 3) Metabolisme bilirubin rendah menimbulkan hiperbilirubinemia yang selanjutnya akan menyebabkan ikterus sampai terjadi tibunan bilirubin dalam otak.
- 4) Tidak mampu mengolah vitamin K dan faktor pembekuan darah.

e. Ginjal

- 1) Masih prematur sehingga tidak sanggup untuk mengatur air dan elektrolit.
- 2) Pengaturan protein darah masih kurang sehingga mungkin dapat terjadi hipoproteinemia.

f. Tendensi

- 1) Pembuluh darah masih rapuh, sehingga permeabilitasnya tinggi, yang memudahkan terjadinya ekstravasasi cairan dan mudah terjadi edema.
- 2) Gangguan keseimbangan faktor pembekuan darah sehingga terjadi perdarahan.
- 3) Dalam keadaan gawat, misalnya terjadi trauma persalinan yang dapat menimbulkan syok sehingga terjadi perubahan hemodinamik sirkulasi dengan mengutamakan sirkulasi organ vital jantung dan susunan saraf pusat.

- 4) Gangguan sirkulasi darah akan mengubah distribusi oksigen, ke jaringan, vasokonstriksi nekrosis, ekstrasvasasi cairan dan menambah gangguan fungsi alat vital (Anik dan Eka, 2013 : 167-169).

4. Sebab-sebab kematian bayi prematur

- a. Prematuritas alat vital.
- b. Gangguan tubuh kembang paru-paru sehingga tidak mampu beradaptasi dengan dunia di luar kandungan.
- c. Perdarahan intrakranial.
- d. Kemungkinan infeksi karena daya tahan tubuh yang rendah.
- e. Gangguan adaptasi dengan nutrisi yang diberikan.
- f. Kegagalan dalam memberikan pertolongan adekuat di rumah sakit tersier (Anik dan Eka, 2013 : 317).

5. Penanganan bayi baru lahir preterm

- a. Untuk perawatan bayi preterm baru lahir perlu diperhatikan keadaan umum, biometri, kemampuan bernapas, kelainan fisik, dan kemampuan minum.
- b. Keadaan kritis bayi prematur yang harus dihindari adalah kedinginan, pernapasan yang tidak adekuat, atau trauma. Suasana hangat diperlukan untuk mencegah hipotermia pada neonatus.
- c. Bayi sebaiknya dirawat cara kanguru untuk menghindari hipotermia
- d. Perencanaan pengobatan dan asupan cairan.

- e. ASI diberikan lebih sering, tetapi bila tidak mungkin, diberikan sonde atau dipasang infus. Semua bayi baru lahir harus mendapat nutrisi sesuai dengan kemampuan dan kondisi bayi.
- f. Sebaiknya persalinan bayi terlalu muda atau terlalu kecil berlangsung pada fasilitas yang memadai, seperti pelayanan perinatal dengan personil dan fasilitas yang adekuat termasuk perawatan perinatal intensif (Prawirohardjo, 2014 : 676).

6. Perawatan neonatal esensial setelah lahir

- a. Menjaga bayi tetap hangat setelah bayidilahirkan dan berhasil melalui adaptasi dari intra ke ekstra uterin, bayi harus dijaga tetaphangat. Beberapa hal yang harus diperhatikan untukmenjaga bayi tetap hangat adalah:
 - 1) Jelaskan kepada ibu bahwa menjaga bayi tetap hangat adalah sangat penting untuk menjaga bayi tetap sehat
 - 2) Bayi memakai pakaian lembut , hangat, kering dan bersih, bila perlubayi memakai tutupkepala, sarung tangan dan kaos kaki
 - 3) Yakinkan bayi menggunakan baju dan diselimuti
 - 4) Bayi harus dirawat gabung dengan ibunya sehingga ibu mudah menjangkau bayinya
 - 5) Apabila bayi harus dipisah dengan ibunya, yakinkan bayi menggunakan pakaian yang hangat dan diselimuti

- 6) Raba telapak kaki bayi, bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit, atau ditambah selimut dan lakukan penilaian ulang
- 7) Jaga ruangan tetap hangat (Wibowo Tanjung, dkk, 2010 :23-26).

b. Pemeriksaan bayi setelah lahir

Pada prinsipnya waktu yang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan setelah bayi lahir adalah:

1) Sebelum bayi dipulangkan

Pengertian bayi dipulangkan dibagi menjadi yaitu apabila bayi lahir di rumah tempat ibu bersalin. Petugas meninggalkan rumah tempat bersalin minimal 2 jam setelah lahir dan apabila bayi lahir di fasilitas kesehatan, bayi dipulangkan minimal 24 jam setelah lahir.

2) Pada saat kunjungan ulang

Pengertian kunjungan ulang juga terbagi menjadi 2 pengertian, yaitu apabila bayi dibawa oleh keluarga ke fasilitas kesehatan karena suatu masalah dan sesuai jadwal kunjungan neonatus (Wibowo Tanjung, 2010 : 33-34).

c. Kunjungan rumah

Dalam setiap kunjungan rumah petugas harus mampu:

- 1) Menanyakan kepada ibu masalah yang dihadapi oleh bayinya
- 2) Apabila menemukan bayi sakit, harus mampu mengklasifikasikan penyakit bayi untuk kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri, diare, ikterus, kemungkinan berat badan rendah

- 3) Menangani masalah pemberian ASI
- 4) Menentukan status iimunisasi
- 5) Menentukan masalah atau keluhan lain
- 6) Menentukan tindakan tindakan dan memberikan pengobatan bila diperlukan
- 7) Bila perlu, merujuk bayi muda dan memberikan tindakan pra rujukan
- 8) Melakukan konseling bagi ibu
- 9) Memberikan pelayanan tindak lanjut (Buku Saku Pelkes Neonatal Esensial, 2010 : 23-25).

D. Tinjauan Islam tentang persalinan

Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur semua aspek kehidupan. Hamil merupakan suatu masa yang dimulai dari bertemunya sel sperma dan ovum yang dipertemukan dalam sebuah tempat yang diciptakan oleh Allah SWT dengan begitu kokoh (rahim). Maha besar Allah yang telah mencviptakanj manusia dengan sangat sempurna. kehamilan adalah salah satu hal yang dirahasiakan oleh Allah SWT, jika Allah berkehendak maka terjadilah.

Hal ini dapat dilihat dalam kisah nabi Isa a.s, ibu Nabi Isa a.s Maryam mengandung Nabi Isa a.s dalam keadaan ia tidak mempunyai seorang suami dan ia bukan pula seorang pezina. Kebesaran Allah SWT juga dapat dilihat dalam kisah nabi Zakariah a.s beliau tidak kunjung mempunyai keturunan

setelah 100 tahun usia pernikannya dengan istri dan istrinya pun adalah seseorang yang mandul. Dengan kebesaran Allah SWT, beliau akhirnya mendapat keturunan . dalam kisah tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kehamilan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya selain Allah SWT.

Proses penciptaan manusia telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. As-Sajdah (32) : 7-9.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٨)
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٩)

Terjemahnya :

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunan yang dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. (Kemenag RI, 2014 : 415)

Kata *sawwahu* atau menyempurnakannya mengisyaratkan proses lanjut dari kejadian manusia setelah terbentuk organ-organnya. Ini serupa dengan kata *taqwin*. Disebut 3 proses bentuk penciptaan. Dia yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu lalu menjadikan kamu seimbang. Tahap pertama pengisyratan pembentukan organ-organ tubuh secara umum, tahap kedua adalah tahap penghalusan dan penyempurnaan organ-organ itu. Dan tahap ketiga adalah tahapan peniupan ruh Ilahi, yang

menjadikan manusia memiliki potensi untuk tampil seimbang. (M. Quraish Shihab, 2002 : 213-214).

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT, telah menciptakan semua ciptaan-Nya dalam keadaan baik, yakni diciptakan-Nya secara sempurna agar masing-masing dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Manusia pun demikian diberi tugas dan pada saat yang sama manusia diuji dan untuk ujian itu diberi potensi sehingga pada akhirnya manusia berpotensi untuk menjadi baik dan buruk. Manusia yang utuh adalah manusia yang yang berhasil lulus dalam ujian (M. Quraish Shihab, 2002 : 366-367).

Mengenai proses persalinan digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. Maryam 19 : 23.

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مَتَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا

Terjemahannya :

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata “Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan (Kemenag RI, 2014 : 306).

Kata al-makhadh berasal dari kata al-makhdh yaitu gerakan yang sangat keras. Desakan janin untuk keluar melalui rahim mengakibatkan pergerakan anak dalam perut, dan mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit. Dari sini kata tersebut dipahami dalam arti sakit yang mendahului kelahiran anak.

Kata *jidz'I an-nakhlah* adalah batang pohon kurma. *Al-Biq'a'I* memahami keberadaan pohon kurma di tempat dan waktu itu sebagai suatu keajaiban. Ini karena ulama tersebut menduga bahwa kelahiran nabi Isa as terjadi di musim dingin, sedangkan kurma hanya berbuah di musim panas, dan sangat sulit bertahan di musim dingin. Selanjutnya ulama tersebut menulis bahwa barangkali beliau sengaja diarahkan ke pohon kurma karena banyak keserasian antara pohon kurma dan proses kelahiran itu. Pohon kurma tidak dapat berbuah kecuali setelah melalui proses perkawinan, sedang disini buahnya berjatuh tanpa perkawinan dan hanya dengan gerakan yang dilakukan oleh Maryam, persis sama dengan apa yang dialami oleh kelahiran anak Maryam yang tanpa perkawinan itu (M. Quraish Shihab, 2002 : 168-169).

Engagement adalah peristiwa ketika diameter biparietal melewati pintu atas panggul dengan sutura sagitalis melintang atau obliq di dalam jalan lahir dan sedikit fleksi. Penurunan kepala bersamaan dengan mekanisme lainnya. Kekuatan yang mendukung antara lain, tekanan cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong janin dan kontraksi abdomen (Kuswanti, dkk, 2014 : 13).

Berdasarkan uraian di atas tentang persalinan dalam pandangan Islam dan teori kesehatan dapat disimpulkan bahwa, ayat ini memberikan gambaran maha besar Allah SWT yang memberikan rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh setiap perempuan yang akan melahirkan untuk membantu

lahirnya bayi. Rasa sakit tersebut dalam ilmu kesehatan disebut his dalam persalinan. His dalam persalinan terjadi karena adanya kontraksi uterus yang adekuat sehingga menimbulkan rasa sakit yang hebat pada ibu yang menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin ke bawah dan membantu lahirnya bayi. His yang disertai pengeluaran lendir dan darah adalah salah satu tanda dimulainya persalinan. Jadi ayat tersebut memiliki keterikatan dengan pengetahuan khususnya dalam kesehatan yang dipelajari saat ini yaitu setiap ibu hamil pasti akan mengalami rasa sakit yang hebat saat menjelang persalinan dan hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT jauh sebelum ilmu pengetahuan tentang persalinan ditemukan.

Dalam kondisi inilah peran bidan dibutuhkan dalam membantu selama proses persalinan sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT, dalam QS. Al-ma'idah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
 نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) al-hadya dal al-qala'id dan jangan mengganggu para pengunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhan mereka. Apabila kamu telah bertahallul, maka berburuhlah.

Dan janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjid al-Haram, mendorong kamu berbuat aniaya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Kemenag RI, 2014:).

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan tolong-menolong dalam hal kebaikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan juga tolong menolonglah dalam hal ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksa-Nya (M. Quraish Shihab, 2002 : 13).

Kesimpulan dari ketiga ayat diatas adalah bahwa Allah SWT, telah menciptakan semua ciptaan-Nya dalam keadaan baik, seorang ibu yang mengandung anaknya selama kurang lebih 9 bulan akan merasakan sakit saat melahirkan. Pada saat melahirkan seorang ibu akan merasakan sakit yang luar biasa yaitu nyeri perut tembus belakang yang akan bertambah sakit saat adanya tanda-tanda persalinan sampai lahirnya bayi. Dalam hal ini, bidan sangat berperan penting untuk memberikan asuhan pada ibu seperti pada saat masa kehamilan menjelaskan pada ibu bahwa pada saat menjelang persalinan akan mengalami rasa sakit perut tembus belakang yang dirasakan oleh semua ibu yang akan melahirkan dan menjelaskan rasa sakit tersebut akan

membantu cepatnya bayi lahir. Bukan hanya itu, bidan juga berperan dalam mendeteksi dini apakah ada kelainan atau tidak dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, bidan harus memberikan asuhan yang komprehensif sesuai dengan kompetensi bidan.

E. Manajemen asuhan kebidanan dengan persalinan preterm

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

- a. Menurut Varney manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode mengorganisasikan pikiran dan tindakan yang melibatkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien.
- b. Menurut IBI (50 tahun IBI) manajemen kebidanan adalah pengkajian yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- c. Menurut Depkes RI manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilaksanakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat.
- d. Manajemen kebidanan merupakan metode atau bentuk pendekatan yang digunakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan sehingga langkah-langkah kebidanan merupakan alur pikir bidan dalam

pemecahan masalah atau pengambilan keputusan klinis. Asuhan kebidanan yang diberikan harus dicatat secara benar, sederhana, jelas dan logis sehingga perlu metode pendokumentasian. Metode pendokumentasian yang digunakan adalah SOAP yaitu Subjektif, Objektif, Assesment, dan Planning (Handayani, 2012: 58)

2. Langkah-langkah Dalam Manajemen Kebidanan

a. Langkah I : pengumpulan dan analisa data dasar

Melakukan pengumpulan informasi yang berkaitan secara akurat dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data tersebut dapat dilakukan dengan cara anamnesis yang meliputi biodata yang bertujuan memperjelas identitas pasien, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan sekarang dan riwayat psikososial untuk mendapatkan informasi tentang keluhan-keluhan yang biasa dialami oleh ibu dan kekhawatiran khusus yang muncul akibat adanya perubahan fisiologis maupun psikologis, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan khusus yang meliputi pemeriksaan inspeksi untuk mengamati penampilan ibu, emosi serta sikap. Palpasi yaitu pemeriksaan dengan meraba. Auskultasi bertujuan untuk mengetahui keadaan janin dalam kandungan. Perkusi yaitu pemeriksaan dengan cara mengetuk (patella) dengan tujuan mengetahui refleks patella positif atau negatif. Pada kasus persalinan preterm didapat data subjektif kehamilan ibu <37 minggu. Usia kehamilan juga

dapat ditentukan berdasarkan hari pertama haid terakhir, pergerakan janin pertama kali, dan tinggi fundus uteri pada pemeriksaan fisik. Selain itu, pemeriksaan fisik dapat berupa penentuan tafsiran berat janin.

Pemeriksaan ultrasonografi merupakan suatu metode diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempelajari morfologi dan fungsi suatu organ berdasarkan gambaran eko dari gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ. Pada bayi baru lahir preterm didapatkan ciri-ciri seperti: berat badan <2500 gram, panjang badan <46 cm, lingkar dada <30 cm, lingkar kepala <33 cm, terdapat banyak lanugo, refleks lemah, pada bayi laki-laki scrotum belum turun, pada bayi perempuan labia mayora belum menutupi labia minora, tangis lemah, tonus otot lemah, kulit lebih tipis.

b. Langkah II : merumuskan diagnosa/masalah aktual

Pada langkah ini dilaksanakan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa spesifik. Langkah awal dari perumusan masalah adalah/diagnosa kebidanan adalah pengolahan/analisis data yaitu menggabungkan dan menghubungkan data satu dengan data lainnya sehingga tergambar fakta.

Diagnosa persalinan preterm dapat ditegakkan berdasarkan usia kehamilan. Usia kehamilan dapat diketahui berdasarkan hari pertama haid terakhir, pergerakan janin pertama kali, dan tinggi fundus uteri. Kepastian usia persalinan preterm serta taksiran berat janin, juga dapat dipastikan dengan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Berdasarkan usia gestasi dan berat badan lahir kemungkinan yang dapat terjadi pada bayi menurut grafik *Lubchenco* yaitu: kecil untuk masa kehamilan (KMK), sesuai untuk masa kehamilan (SMK) dan besar untuk masa kehamilan (BMK).

c. Langkah III : mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial.

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilaksanakan pencegahan, sambil mengamati klien. Bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila masalah atau diagnosa potensial ini benar-benar terjadi.

Pada persalinan preterm masalah-masalah yang mungkin terjadi pada ibu yaitu infeksi intrapartum. Masalah ini dapat terjadi pada keadaan ketuban pecah dini. Masalah lain yang mungkin terjadi yaitu perdarahan postpartum, yang disebabkan dari berbagai hal salah satunya, setelah bayi dan plasenta lahir terjadi perdarahan yang masih aktif.

Masalah-masalah yang mungkin terjadi pada bayi lahir prematur yaitu : gawat janin berpotensi terjadi pada persalinan preterm, hal ini dapat disebabkan karena stress pada ibu yang berpengaruh terhadap janin dan mengakibatkan DJJ diluar batas normal. Asfiksia rentan terjadi pada bayi preterm. Salah satu penyebabnya yaitu apabila ibu mengalami hipoksia selama proses persalinan dan juga mengikat organ-organ pada bayi preterm belum sepenuhnya matang. Terutama paru-patu yang belum bisa berfungsi dengan baik.

Bayi baru lahir preterm belum dapat menstabilkan suhu tubuhnya dengan sendirinya seperti bayi lahir normal lainnya. Sehingga rentan terjadi hipotermi. Berat badan lahir rendah adalah salah satu hal yang sangat berpotensi terjadi pada bayi baru lahir preterm mengikat bahwa usia gestasi yang belum aterm, dan bayi yang seharusnya masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam rahim, karena beberapa faktor sudah harus terlahir dan hidup di luar rahim.

d. Langkah IV : melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi

Proses manajemen kebidanan dilakukan secara terus-menerus yang dapat menghasilkan data baru, dimana harus segera dinilai. Data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan yang memerlukan tindakan segera, beberapa data yang memerlukan indikasi adanya situasi yang membutuhkan tindakan segera sambil menunggu intervensi dari dokter. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan

asuhan pada pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan.

Dalam persalinan preterm diperlukan kolaborasi dengan dokter kandungan untukantisipasi terjadinya komplikasi terhadap ibu yaitu dengan pemberian antibiotik untuk pencegahan terjadinya infeksi intrapartum, pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru dan penanganan perdarahan postpartum berupa pemasangan infus dan transfusi darah, serta pemberian obat oksitosik. Selain kolaborasi dengan dokter kandungan dalam persalinan preterm juga perlu kolaborasi dengan dokter anak. Untuk memberikan pertolongan pertama pada bayi baru lahir preterm. Penyediaan oksigen, suction, infant warmer dan persiapan inkubator serta obat-obat.

e. Langkah V : merencanakan asuhan yang komprehensif

Pada langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Suatu rencana asuhan harus sama-sama disetujui oleh bidan maupun pasien agar efektif, karena pada akhirnya pasien yang akan menentukan apakah tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu pada langkah ini diperlukan diskusi antara tenaga kesehatan dengan pasien mengenai semua rencana tindakan termasuk penegasan dan persetujuan.

Merencanakan pemantauan DJJ, nadi dan his tiap 30 menit, memastikan DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit), nadi (60-

100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat, merencanakan pemberian kortikosteroid yang bertujuan untuk pematangan paru janin. Dalam hal ini steroid yang diberikan yaitu dexametason dan betametason, merencanakan asuhan persalinan sesuai dengan APN dan dilaksanakan secara berhati-hati karena kondisi bayi yang sepenuhnya prematur, serta merencanakan pertolongan pertama terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi pada bayi baru lahir preterm. Penyediaan *suction*, Oksigen, infant warmer dan incubator, merencanakan kunjungan rumah untuk memantau keadaan ibu dan bayi meliputi kunjungan I sampai kunjungan IV.

f. Langkah VI : melaksanakan perencanaan

Pada langkah enam ini rencana asuhan secara menyeluruh yang terurai dilangkah dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilaksanakan oleh bidan dan sebagian oleh pasien, atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, bidan tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut.

Memantau DJJ, nadi dan his tiap 30 menit. Memastikan DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit), nadi (60-100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat, memberikan kortikosteroid yang bertujuan untuk pematangan paru janin. Dalam hal ini steroid yang diberikan yaitu dexametason dan betametason, melakukan asuhan persalinan sesuai dengan APN dan dilaksanakan secara berhati-hati karena kondisi bayi yang sepenuhnya prematur serta melakukan penanganan bayi baru lahir yaitu bebaskan jalan napas, mengeringkan bayi, mencegah hipotermi, mencegah infeksi dan melakukan pertolongan pertama terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi pada bayi baru lahir preterm seperti penyediaan *suction*, Oksigen, *infant warmer* dan inkubator, melakukan kunjungan rumah untuk memantau keadaan serta perkembangan ibu dan bayi sampai 28 hari..

g. Langkah VII : evaluasi

Pada langkah ini dilaksanakan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar sudah terpenuhi sesuai kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dikatakan efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut sudah efektif sedang sebagian belum efektif.

Manajemen kebidanan ini merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan berikutnya. Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan persalinan, pada ibu kemungkinan terjadi perdarahan postpartum.

Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan, pada bayi kemungkinan terjadi asfiksia, hipotermi, kejang, dan bayi berat lahir rendah. Dan memiliki ciri-ciri seperti berat badan <2.500 gram, panjang badan <46 cm, lingkar dada <30 cm, lingkar kepala <33 cm, terdapat banyak lanugo, refleks lemah, pada bayi laki-laki skrotum belum turun, pada bayi perempuan labia mayora belum menutupi labia minora, tangis lemah, dan tonus otot lemah, kulit lebih tipis (Frisca Tresnawati, 2013 : 170-180). Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan dengan kunjungan rumah, pada bayi kemungkinan berat badan sudah mengalami peningkatan, kemampuan menyusui sudah baik serta kondisi dan keadaan umum bayi dalam batas normal.

Pendokumentasian manajemen kebidanan

Dokumentasi kebidanan adalah suatu sistem pencatatan atau pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan reproduksi dan semua kegiatan yang dilakukan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Dokumentasi SOAP merupakan urutan

langkah yang dapat membantu kita mengukur pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh.

SOAP (subjektif, objektif, *assessment*, *planning*).

1. Subjektif

- a. Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis.
- b. Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien (ekspresi mengenai kekhawatiran dan keluhannya).

2. Objektif

- a. Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien.
- b. Hasil pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lainnya.
- c. Informasi dari keluarga atau orang lain.

3. *Assessment*

- a. Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) data subjektif dan objektif.
- b. Diagnosi atau masalah.
- c. Diagnosis atau masalah potensial.
- d. Antisipasi diagnosis/masalah potensial/tindakan segera.

4. *Planning*

Pendokumentasian tindakan implementasi dan evaluasi, meliputi: asuhan mandiri, kolaborasi, tes diagnostik atau

laboratorium, konseling dan tindakan lanjut atau follow up (Frisca Tresnawati, 2013 : 181-186).

Rencana asuhan ibu masa nifas dan bayi

a. Asuhan ibu selama masa nifas

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, berlangsung kira-kira 6 minggu.

- 1) Anjurkan ibu untuk kontrol/kunjungan masa nifas setidaknya 4 kali yaitu 6-8 jam setelah persalinan (sebelum pulang), 6 hari setelah persalinan, 2 minggu setelah persalinan, 6 minggu setelah persalinan.
- 2) Periksa tekanan darah, perdarahan pervaginam, kondisi perineum, tanda infeksi, kontraksi uterus, tinggi fundus, dan temperatur secara rutin.
- 3) Nilai fungsi berkemih, fungsi cerna, penyembuhan luka, sakit kepala, rasa lelah, dan nyeri punggung.
- 4) Tanyakan pada ibu mengenai suasana emosinya, bagaimana dukungan yang didapatkannya dari keluarga, pasangan, dan masyarakat mengenai perawatan bayinya.
- 5) Tatalaksana atau rujuk ibu bila ditemukan masalah.
- 6) Minta ibu segera menghubungi fasilitas kesehatan bila ibu menemukan salah satu tanda berikut:

- (a) perdarahan pervaginam
- (b) sekret vagina
- (c) demam
- (d) nyeri perut berat
- (e) kelelahan atau sesak
- (f) bengkak di tangan, wajah, tungkai
- (g) sakit kepala atau pandangan kabur
- (h) nyeri payudara, bengkak, luka atau perdarahan puting.

7) Berikan informasi tentang perlunya melakukan hal-hal seperti menjaga kebersihan diri, istirahat, melakukan mobilisasi, pemenuhan kebutuhan nutrisi yang baik, menyusui dan merawat payudara, senggama, kontrasepsi dan keluarga berencana.

b. Asuhan bayi selama masa nifas

Asuhan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan

- 1) Pastikan bayi tetap hangat dan jangan mandikan bayi hingga 24 jam setelah persalinan. Jaga kontak kulit antara ibu dan bayi serta tutupi kepala bayi dengan topi.
- 2) Tanyakan kepada ibu dan ataukeluarga tentang masalah kesehatan pada ibu:
 - (a) Keluhan tentang bayinya

(b) Penyakit ibu yang mungkin berdampak pada bayi (TBC, demam saat persalinan, KPD >18 jam, hepatitis B atau C, syphilis, HIV/AIDS, penggunaan obat).

(c) Cara, waktu, tempat bersalin dan tindakan yang diberikan pada bayi jika ada.

(d) Warna air ketuban

(e) Riwayat bayi buang air kecil dan besar

(f) Frekuensi bayi menyusun dan kemampuan menghisap

3) Lakukan pemeriksaan fisik

4) Catat seluruh hasil pemeriksaan. Bila terdapat kelainan, lakukan rujukan sesuai pedoman

5) Berikan ibu nasihat merawat tali pusat bayi dengan benar

6) Jika tetes mata antibiotic profilaksis beum diberikan , berikan sebelum 12 jam setelah persalinan.

7) Perawatan khusus bayi berat lahir rendah (BBLR) atau bayi dengan kondisi rentan lainnya:

(a) Identitas BBLR dengan benar

(b) Nilai adanya tanda bahayadan rujuksegera bilaperlu

(c) Berikan dukungan lebih dalam pemberian ASI

(d) Berikan perhatian lebih dalam menjaga kehangatan bayi, misanya dengan kontak kulit ibu dan bayi atau perawatan metode kanguru

Kunjungan ulang

Terdapat minimal tiga kali kunjungan ulang bayi baru lahir yaitu pada usia 6-48 jam (kunjungan neonatal 1), pada usia 3-7 hari (kunjungan neonatal 2), pada usia 8-28 hari (kunjungan neonatal

1) Lakukan pemeriksaan fisik, timbang berat, periksa suhu, dan kebiasaan makan bayi

2) Periksa tanda-tanda bahaya

(a) Tanda mau minum atau menuntahkan semua

(b) Kejang

(c) Bergerak jika hanya dirangsang

(d) Napas cepat (≥ 60 kali/menit)

(e) Napas lambat (<30 kali/menit)

(f) Tarikan dinding dada kedalam yang sangat kuat

(g) Merintih

(h) Teraba demam (suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$)

(i) Teraba dingin (suhu $<36^{\circ}\text{C}$)

(j) Pusar kemerahan meluas ke dinding perut

(k) Diare

(l) Tampak kuning pada telapak tangan dan kaki

(m) Perdarahan

- 3) Periksa tanda-tanda infeksi kulit superfisial, seperti nanah keluar dari umbilicus kemerahan di sekitar umbilicus, pembengkakan, kemerahan, dan pengerasan kulit
- 4) Bila terdapat tanda bahaya atau infeksi, segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan
- 5) Pastikan ibu memberikan ASI eksklusif
- 6) Tingkatkan kebersihan dan rawat kulit, mata, serta tali pusat dengan baik
- 7) Menjekaskan pada ibu tentang jadwal imunisasi selanjutnya
- 8) Jelaskan pada ibu dan keluarga untuk waspada tentang tanda bahaya pada bayinya (Moeni Endy M, dkk, 2013 : 50-56).

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY “H”
DENGAN PERSALINAN PRETERM GESTASI 34-36MINGGU
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2018

No. register : xxxxxx
Tgl masuk : 03 Juli 2018, pukul : 04.15 WITA.
Tgl pengkajian : 03 Juli 2018, pukul : 04.15 WITA.
Tgl partus : 03 Juli 2018, pukul : 10.30 WITA.
Pengkaji : Anna Safitri

KALA I

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

1. Nama : Ny. “H” / Tn. “A”
2. Umur : 26 tahun / 24 tahun
3. Nikah/lamanya : 1x / ± 1 tahun
4. Suku : Makassar / Makassar
5. Agama : Islam / Islam
6. Pendidikan : SMA / SMA
7. Pekerjaan : IRT / Petani
8. Alamat : Palompong

B. Data Biologis atau Fisiologis

1. Keluhan utama : sakit perut tembus belakang sejak tanggal 02 Juli 2018, pukul 18.00 WITA, disertai pengeluaran lendir,darah sejak tanggal 03 Juli 2018, pukul 02.00 WITA dan pelepasan air di rumah sejak pukul 03.00 WITA.
2. Riwayat Keluhan Utama
 - a. Sifat nyeri hilang timbul
 - b. Lokasi nyeri dari perut tembus belakang
 - c. Cara mengatasi nyeri dengan mengelus-elus perut dan punggung

C. Riwayat Kesehatan yang lalu

1. Tidak ada riwayat alergi makanan dan obat-obatan
2. Tidak ada riwayat operasi
3. Tidak ada riwayat penyakit hipertensi, asma, diabetes mellitus, jantung dan penyakit lainnya

D. Riwayat Kesehatan Keluarga

1. Tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit menular ataupun penyakit menurun
2. Tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit asma, hipertensi, jantung dan diabetes mellitus

E. Riwayat Reproduksi

1. Riwayat menstruasi
Menarche : 14 tahun

Siklus : 28-30 hari

Durasi : 5-7 hari

Dismenorea : tidak ada

2. Riwayat Kehamilan Sekarang

a. G1P0A0

b. Hari pertama haid terakhir (HPHT) : 06 November 2017

c. Hari taksiran persalinan (HTP) : 13 Agustus 2017

d. Antenatal care (ANC) : 8 kali di puskesmas Pabbentengan

e. Imunisasi tetanus toxoid (TT)

TT I tanggal 17 Januari 2018 di Puskesmas Pabbentengan

TT II tanggal 14 Februari 2018 di Puskesmas Pabbentengan

3. Riwayat ginekologi

Tidak pernah mengalami kelainan

4. Riwayat KB

Tidak pernah menjadi akseptor KB dalam bentuk apapun

F. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1. Pola nutrisi

Kebiasaan ibu makan 3 kali dalam sehari dengan porsi sedang, ibu mengatakan nafsu makan berkurang selama kehamilan. Minum 6-7 gelas sehari. Selama inpartu ibu makan 1kali dan minum sesuai kebutuhan.

2. Pola eliminasi

Kebiasaan BAB 1 kali sehari, BAK 3-4 kali sehari. Selama inpartu belum pernah BAB dan lebih sering BAK.

3. Pola istirahat

Kebiasaan ibu tidur siang 1-2 jam sehari dan tidur pada malam hari 6-8 jam. Selama inpartu ibu tidak pernah tidur.

G. Pemeriksaan fisik

1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran komposmentis
- c. Tinggi badan : 150 cm
- d. Berat badan
 - Sebelum hamil : 50 kg
 - Sekarang : 56 kg
- e. LILA : 26 cm
- f. Tanda-tanda Vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 80 x/i

Suhu : 36,6 °C

Pernapasan : 22 x/i

g. Pemeriksaan fisik terfokus

1) Mata

Inspeksi : simetris, sklera putih, conjungtiva merah muda

2) Leher

Inspeksi : tidak ada pembengkakan pada leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis

3) Payudara

Inspeksi : simetris, tampak hyperpigmentasi pada areola pada areola mammae

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ada colostrum saat dipencet.

4) Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra.

Palpasi : Leopold I : TFU 27 cm, 3 jrapst, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

LP : 85 cm

TFU : 27 cm

TBJ : TFU x LP

: 27 x 85

: 2295 gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas dan kuat pada

kuadran kiri bawah perut ibu dengan

frekuensi 140 x/menit teratur.

His 2 kali dalam 10 menit, durasi 20-25 detik

5) Genetalia

Inspeksi : tidak ada oedema, tidak varices,
tampak pengeluaran lendir dan darah.

Palpasi : VT tanggal 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : tebal

Pembukaan : 2 cm

Ketuban : jernih

Presentase : uuk kiri lintang

Penurunan : Hodge I

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah, air
ketuban.

6) Ekstremitas

Inspeksi : simetris

Palpasi : tidak ada oedema dan tidak varices

H. Riwayat sosial ekonomi

1. Ibu mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangganya
2. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga
3. Suami dan keluarga senang dengan kehamilannya

I. Data psikologi

1. Ibu, suami dan keluarga sangat merasa senang atas kehamilan ibu
2. Selama pemeriksaan kehamilan, ibu selalu ditemani oleh suami dan keluarga

J. Data Spritual

Ibu dan keluarga senantiasa melaksanakan sholat dan berdoa serta berdzikir semoga persalinannya berjalan dengan lancar sehingga ibu dan bayinya sehat dan selamat.

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : G1P0A0, gestasi 34 minggu 1 hari, situs memanjang, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala 1 fase laten.

Masalah : kecemasan

1. G1P0A0

DS :

- a. Ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
- b. Ibu merasakan pergerakan janinnya sejak usia kehamilan \pm 4 bulan tepatnya bulan Maret 2018 dan sampai sekarang

DO :

- a. Tonus otot tampak kencang, tampak line nigra
- b. Palpasi abdomen
 - Leopold I : TFU 27 cm, 3 jrapst, bokong
 - Leopold II : PUKI
 - Leopold III : kepala
 - Leopold IV : BDP, 4/5
- c. Auskultasi : DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/ menit teratur.

Analisa dan intrepretasi data

- a. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama, pada pemeriksaan abdomen tampak adanya linea nigra yang menandakan ibu primigravida (Prawirohardjo, 2014).
- b. Tonus otot tegang tampak striae livide yaitu jaringan perut terbentuk kaena pecahnya pembuluh darah perifer akibat peregangan abdomen selama kehamilan (Prawirohardjo, 2010)
- c. Berdasarkan pemeriksaan abdomen dengan cara palapasi ditemukan adanya bagian-bagian janin dan DJJ, hal ini menandakan ibu sedang hamil (Prawirohardjo, 2010).

2. Gestasi minggu 34 minggu 1 hari

DS :

- a. Ibu mengatakan haid terakhir tanggal 06 November 2017
- b. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 8 bulan.
- c. Ibu mengatakan pergerakan janinnya dominan terasa pada sebelah kanan perut ibu sejak usia kehamilan \pm 4 bulan tepatnya bulan Maret 2018.

DO :

- a. HTP tanggal 13 Agustus 2018
- b. Leopold I : tinggi fundus uteri 3 jrapst, 27 cm teraba bokong.
- c. Tanggal pengkajian 03 Juli 2018

Analisa dan interpretasi data

- a. Dari HPHT tanggal 06 November 2017 sampai pengkajian 03 Juli 2018 maka umur kehamilan ibu 34 minggu 1 hari (Manuaba, 2008).
- b. Menurut rumus Mc.Donald : ukuran TFU (cm) \times $\frac{2}{7}$ = $27 \times \frac{2}{7}$ = 8 bulan (kehamilan dalam bulan)
- c. Dari hasil pemeriksaan leopold I, didapatkan bahwa TFU 3 jrapst, 27 cm sesuai dengan usia gestasi 34 minggu 1 hari (Prawirohardjo, 2010).

3. Situs memanjang

DS : Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat terutama di sebelah kanan perut ibu

DO : Palpasi : Leopold I : TFU 27 cm, 3 jrapst, bokong

Leopold II : PUKI
 Leopold III : kepala
 Leopold IV : BDP, 4/5

Auskultasi : DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit teratur.

Analisa dan interpretasi data

Jika ukuran janin adalah ukuran bokong/kepala dan sesuai sumbu panjang ibu maka janin dalam keadaan letak memanjang (Anik dan Eka, 2013 : 40).

4. Intrauterine

DS :

- a. Ibu mengatakan janinnya bergerak kuat
- b. Ibu mengatakan tidak pernah mengalami nyer perut hebat selama hamil

DO : Ibu tidak merasa nyeri saat di palpasi

Pada palpasi didapatkan :

Leopold I : TFU 27 cm, 3 jrapst, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

Analisa dan interpretasi data :

Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, janin dapat teraba saat palpasi serta tidak ada nyeri perut yang hebat dan tidak ada nyeri tekan, menandakan kehamilan ibu intrauterin (Prawirohardjo, 2010).

5. Tunggal

DS : ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat terutama di sebelah kanan perut ibu

DO : Palpasi : Leopold I : TFU 27 cm, 3 jrapst, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

Analisa dan interpretasi data :

Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, teraba satu bokong, satu punggung satu kepala dan terdengar satu jantung janin pada satu titik serta pergerakan janin pada salah satu sisi perut ibu menandakan janin tunggal (Prawirohardjo, 2014).

6. Hidup

DS : ibu mengatakan janinnya kuat bergerak di bagian kanan perut ibu

DO : DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit dan teratur.

Analisa dan interpretasi data :

Salah satu tanda pasti janin hidup adalah dengan adanya pergerakan janin dan terdengarnya DJJ (Prawirohardjo, 2014 : 218).

7. Keadaan ibu dan janin baik

DS : ibu merasakan pergerakan janinnya sejak usia 5 bulan dan sampai sekarang
ibu mengatakan janinnya bergerak kuat

DO :

- a. keadaan umum ibu baik
- b. kesadaran komposmentis
- c. pemeriksaan TTV

TD : 110/80 mmH

(normalnya sistolik 90-140 mmHg, diastolik 60-90 mmHg)

N : 80 x/I

(normalnya 60-80 x/menit)

S : 36,6 ° C

(normalnya 36,5° C sampai 37,5° C).

P : 22 x/i

(normalnya 16-24 x/menit)

- d. DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140 x/menit teratur.

Analisa dan interpretasi data

1. DJJ dalam batas normal, pergerakan janin yang dirasakan ibu serta pertumbuhan dan perkembangan perut ibu yang sesuai dengan umur kehamilan menandakan janin dalam keadaan baik (Eka Puspita, 2014).

2. Pada pemeriksaan dalam, molase ditemukan tidak ada, hal ini menandakan bahwa tulang-tulang kepalajanan terpisah sehingga dapat menyesuaikan diri dengan bagian keras panggul ibu (Prawirohardjo, 2011).

8. Inpartu kala 1 fase laten

DS : ibu mengatakan sakit perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir, darah dan air ketuban.

DO :

- a. kontraksi uterus baik, his 2x dalam 10 menit durasi 20-25 detik
- b. VT tanggal 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA.

Vulva dan vagina	: normal
Portio	: tebal
Pembukaan	: 2 cm
Ketuban	: jernih
Presentase	: uuk kiri lintang
Penurunan	: Hodge I
Molase	: tidak ada
Penumbungan	: tidak ada
Kesan panggul	: normal
Pelepasan	: lendir, darah, air ketuban

Analisa dan interpretasi data

- a. Lendir yang bercampur darah berasal dari servikalis karena serviks mulai membuka dan mendatar (Anik dan Eka, 2013)
- b. Ibu dikatakan inpartu bila adanya rasa sakit karena his yang datang, keluaranya lendir bercampur darah, kadang-kadang ketuabn pecah dengan dengan sendirinya, serta dalam pemeriksaan dalam serviks mendatar dan pembukaan telah ada (Prawirohardjo, 2014).
- c. Dikatakan fase laten jika dalam pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 1-3 cm (Eka Puspita, 2014).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

1. Antisiapsi terjadinya gawat janin

DS : ibu mengatakan pergerakan janinnya dirasakan ± 12 kali/hari dan sampai sekarang

DO : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 140 x/menit dan teratur

Analisa dan interpretasi data

Gawat janin terjadi jika janin tidak mendapatkan O_2 yang cukup sehingga terjadi hipoksia, tanda gawat janin adalah DJJ bervariasi dan akan kembali normal dalam beberapa waktu, jika DJJ tidak kembali normal setelah kontraksi ini merupakan tanda gawat janin (Prawirohardjo, 2010).

2. Partus lama

DS: ibu mengatakan sakit semakin kuat dan sering serta ada dorongan untuk meneran

DO : kontraksi uterus adekuat, his 5 kali dalam 10 menit durasi 40-45 detik

Pada pemeriksaan abdomen, Leopold IV : BDP, 0/5 didapatkan bagian terendah janin adalah kepala serta kesan panggul normal saat dilakukan pemeriksaan dalam.

Analisa dan interpretasi data

Partus lama didefinisikan sebagai persalinan abnormal, yang disebabkan karena kelainan his yang berarti his yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya sehingga persalinan mengalami hambatan atau kemacetan, kelainan janin meliputi kelainan letak yang menyebabkan persalinan mengalami gangguan, dan kelainan jalan lahir adalah kelainan dalam ukuran atau bentuk jalan lahir bisa menghalangi kemajuan persalinan atau mengalami kemacetan (Prawirohardjo, 2014).

3. Infeksi maternal

DS : Ibu dapat beradaptasi dengan nyeri dengan mengelus-elus perut dan pinggangnya

DO : Keadaan umum ibu baik ditandai dengan pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Analisa dan interpretasi data

Peningkatan resiko infeksi maternal adalah pemeriksaan dalam berkali-kali yang memicu masuknya kuman dari luar. Jika ketuban sudah pecah maka batasi pemeriksaan dalam (Prawirohardjo, 2014).

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Tidak ada data yang menunjang

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala I

Diagnosa potensial : Potensial terjadinya infeksi maternal

Tujuan : Kala I berlangsung normal

Kriteria :

1. Kontraksi uterus adekuat
2. His 5 kali dalam 10 menit durasi 40-45 detik
3. Fase aktif tidak lebih dari 12 jam
4. Ibu dapat beradaptasi dengan nyeri
5. Tidak ada tanda-tanda infeksi
6. Kondisi ibu dalam keadaan baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal

TD : 110/80 mmHg

N : 80 x/i

S : 36,6 °C

P : 22 x/i

7. DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140 x/i dan teratur yang normalnya antara 120-160 x/i.

Rencana tindakan

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
Rasional: agar ibudan keluarga merasa tenang
2. Mengosongkan kandung kemih ibu
Rasional: agar penurunan kepala bayi cepat
3. Menjelaskan penyebab nyeri
Rasional : agar ibu dapat mengetahui dan mengerti apa penyebab nyeri dan dapat beradaptasi dengan nyeri yang dirasakan
4. Menganjurkan ibu untuk menarik napas ketika terjadi kontraksi dan anjurkankeluarga untuk memberi ibu makan dan minum di sela-sela kontraksi
Rasional: untuk mengatasi nyeri yang dirasakan dan dengan pemberian hidrasi oral kepada ibu akan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga tidak terjadi dehidrasi dan kelelahan serta pemakaian cadangan kalori yang berlebihan
5. Menganjurkan kepada ibu berbaring miring ke kiri
Rasional : miring kiri dapat mencegah tertekannya vena cava inferior yang dapat mengakibatkan aliran arah terhambat sehingga berbaring ke kiri aliran darah terhambat sehingga berbaring ke kiri aliran darah dan oksigen ke janin lancar

6. Mengajarkan ibu cara mengedan yang benar

Rasional: untuk membantu proses persalinan

7. Menanyakan pada ibu siapa yang akan mendampingi saat persalinan dan menjelaskan pentingnya pendampingan saat persalinan

Rasional: mendukung selama persalinan dan mengambil keputusan

8. Memberikan dukungan psikologis dan emosional pada ibu dan keluarga

Rasional: agar semangat dan siap fisik serta mental dalam menghadapi persalinan.

9. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa sholat dan berdoa serta berdzikir agar persalinan ibu dilancarkan.

Rasional: agar tetap tenang dalam menghadapi persalinan

10. Melakukan pemasangan infus RL 28 tetes/menit.

Rasional : sebagai media untuk pemberian obat melalui intravena

11. Memberikan injeksi cefotaxime 1 gr IV/12 jam sesuai instruksi dokter

Rasional : injeksi ini diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi pada ketuban pecah dini

12. Memberikan kortikosteroid (dexamethasone) untuk pematangan paru janin 1 amp/6 jam/IM sesuai instruksi dokter

Rasional : kortikosteroid digunakan untuk mematangkan paru janin

13. Memantau DJJ, nadi dan his tiap 30 menit, tekanan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Rasional : untuk memantau keadaan ibu dan janin serta kemajuan persalinan.

14. Bersihkan vulva dengan kapas savlon sebelum melakukan pemeriksaan dalam untuk mencegah terjadinya infeksi

Rasional : untuk mencegah masuknya kuman ke jalan lahir yang dapat menyebabkan infeksi

15. Menganjurkan ibu mengganti sarungnya yang kotor

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi

16. Memantau kemajuan persalinan dengan partograf

Rasional : pemantauan dengan partograf merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan membantumenilai kemajuan persalinan dan pembukaan, keadaan ibu dan janin serta memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rencanaasuhan selanjutnya.

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan yaitu pembukaan sudah 2 cm, ketuban sudah pecah,keadaan ibu da janin baik.
2. Mengosongkan kandung kemih ibu
Hasil: ± 150 cc
3. Menjelaskan penyebab nyeri yang dirasakan ibu karena adanya dorongan kepala janin dari atas ke bawah (tertekannya ujung-ujung saraf saat uterus berkontraksi)
4. Menganjurkan kepada ibu untuk menarik napas ketika terjadi kontraksi yaitu tariknapas dalam-dalam lalu hembuskan lewat mulut seperti orang yang

sedang meniup-niup dan istirahat apabila tidak ada his, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum di sela-sela kontraksi.

5. Menganjurkan ibu untuk miring kiri dan tidak boleh berjalankarena ketuban sudah pecah
6. Mengajarkan kepada ibu cara mengedan yang benar yaitu tarik napas dalam-dalam lalu berkuat seperti orang yang sedang BAB, mata melihat perut ibu dan jangan mengeluarkan suara, keluarga membantu mengangkat badan ibu apabila pembukaan sudah lengkap
7. Menanyakan kepada ibu siapa yang akan mendampingi pada saat persalinan apaka suami atau keluarga lainnya dan menjelaskan pentingnya pendampingan saat persalinan.
8. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu dan keluarga agar tetap siap fisik dan mental selama persalinan.
9. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk senatiasa sholat dan berdoa serta berdzikir agar persalinan ibu dilancarkan
10. Melakukan pemasangan infus RL 28 tetes/menit
11. Memberikan injeksi cefotaxime 1 gr IV/12 jam sesuai dengan instruksi dokter
12. Memberikan kortikosteroid (dexamethasone) untuk pematangan paru janin 1 amp/6 jam/IM sesuai intruksi dokter
13. Memantau DJJ, nadi dan his tiap 30 menit, tekanan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Tabel 1.1. Pemantauan his, DJJ, nadi, tekanan darah, dan suhu

Waktu	His	DJJ	Nadi	Tekanan darah	Suhu
04.45 WITA	2X10' (20''-25'')	144 x/i	80 x/i		
05.15 WITA	2X10' (20''-25'')	140 x/i	84 x/i		
05.45 WITA	2X10' (20''-25'')	140 x/i	82 x/i		
06.15 WITA	2X10' (20''-25'')	140 x/i	84 x/i		
06.45 WITA	3X10' (30''-35'')	142 x/i	82 x/i		
07.15 WITA	3X10' (30''-35'')	148 x/i	80 x/i		
07.45 WITA	3X10' (30''-35'')	140 x/i	84 x/i		
08.15 WITA	4X10' (40''-45'')	138 x/i	82 x/i	110/70 mmHg	36,5°C

Sumber: Data Primer

14. Melakukan VT II tanggal 03 Juli 2018, pukul 08.15 WITA.

Vulva dan vagina : normal

Portio : tipis

Pembukaan : 7 cm

Ketuban : jernih

Presentase : uuk kiri depan

Penurunan : Hodge III

Molase : tidak ada

Penumbung : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

15. Mengosongkan kandung kemih pukul 08.45 WITA

Hasil: \pm 100 cc

16. Melanjutkan pemantauan DJJ, nadi dan his tiap 30 menit, tekanan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Tabel 1.1. Pemantauan his, DJJ, nadi, tekanan darah, dan suhu

Waktu	His	DJJ	Nadi	Tekanan darah	Suhu
08.45 WITA	4X10'(45''-50'')	144 x/i	84 x/i		
09.15 WITA	4X10'(45''-50'')	140 x/i	80 x/i		
09.45 WITA	4X10'(45''-50'')	146 x/i	84 x/i		
10.15 WITA	5X10'(45''-50'')	138 x/i	82 x/i		

Sumber: Data Primer

17. VT III tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.15 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10

Ketuban : kering

Presentase : uuk depan

Penurunan : Hodge IV

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah

18. Memantau kemajuan persalinan dengan partograf

Hasil : pemantauan dengan partograf merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan membantumenilai kemajuan persalinan dan pembukaan, keadaan ibu dan janin serta memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rencanaasuhan selanjutnya.

LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA

1. Kala 1 berlangsung normal ditandai dengan his adekuat 5x dalam 10 menit durasi 45-50 detik dengan ibu beradaptasi dengan nyerinya
2. Tidak terjadi infeksi ditandai dengan tidak ada tanda-tanda infeksi
3. Keadaan ibu dan janin baik, ditandai dengan denyut jantung janin terdengar jelas dengan frekuensi 140 x /menit
4. Ibu dan keluarga senantiasa berdoa dan berdzikir agar persalinan ibu dilancarkan
5. Ibu mengatakan ada tekanan pada anus dan ingin BAB
6. Ibu mengatakan ada dorongan untuk meneran
7. Ibu mengatakan sakitnya bertambah dan tembus kebelakang
8. Tampak perineum menonjol, vulva dan anus membuka

9. Tampak ibu ingin meneran.

KALA II

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS :

1. Ibu mengatakan sakitnya semakin kuat dan sering
2. Ibu mengatakan ada dorongan yang kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan ada tekanan pada anus dan rasa ingin meneran

DO :

1. His 5x dalam 10 menit durasi 45-50 detik
2. Perineum menonjol
3. Vulva dan anus membuka
4. DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit teratur.
5. VT tanggal 03 Juli 2018, PUKUL 10.15 WITA.

Vulva dan vagina : normal

Portio : melelap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : kering

Presentase : uuk depan

Penurunan : Hodge IV

Molase : tidak ada
Penumbungan : tidak ada
Kesan panggul : normal
Pelepasan : lendir dan darah

LANGKAH II : MENETAPKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala II

DS :

1. Ibu mengatakan sakitnya semakin kuat dan sering
2. Ibu mengatakan ada dorongan yang kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan ada tekanan pada anus dan rasa ingin BAB

DO :

1. His 5x dalam 10 menit durasi 45-50 detik
2. Perineum menonjol
3. Vulva dan anus membuka
4. DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140x/menit teratur
5. VT tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.15 WITA.

Vulva dan vagina : normal

Portio : melelap

Pembukaan	: 10
Ketuban	: kering
Presentase	: uuk depan
Penurunan	: Hodge IV
Molase	: tidak ada
Penumbungan	: tidak ada
Kesan panggul	: normal
Pelepasan	: lendir dan darah

Analisa dan interpretasi data :

- a. Serviks uteri berdilatasi sehingga membentuk suatu saluran yang akan dilewati bayi sampai mencapai dasar panggul (dilatasi sempurna). Hal ini mengakibatkan tekanan hebat pada otot dasar panggul dan bagian terendah janin menekan fleksus syaraf yang mengakibatkan rasa nyeri yang bertambah (Manuaba, 2008).
- b. Dengan adanya his yang adekuat mengakibatkan segmen atas rahim (SAR) berkontraksi mendorong janin turun ke segmen bawah rahim (SBR), segmen bawah tertarik ke atas menjadi dilatasi relaksasi sehingga membuat suatu saluran jalan lahir (Prawirohardjo, 2014: 292).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

1. Asfiksia neonatorum

DS : Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan

DO : HPHT tanggal 06 November 2017

HTP tanggal 13 Agustus 2018

Analisa dan interpretasi data :

Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi tidak bisa bernapas spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan O_2 dan semakin meningkatnya CO_2 yang menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan lanjut (Anik dan Eka, 2013 : 298).

2. Hipotermi

DS : ibu mengatakan umur kehamilannya \pm 8 bulan

DO : suhu bayi baru lahir

Analisa dan interpretasi data :

Berat badan dibawah 2500 gram lebih mudah kehilangan panas melalui evaporasi, konduksi, konveksi dan radiasi karena bayi baru lahir tidak dapat mengatur temperatur tubuhnya secara memadai dan dapat dengan cepat kedinginan. Jika kehilangan panas tidak segera diatasi maka dapat terjadi hipotermi (Ronald, 2011 : 47).

3. Berat badan lahir rendah

DS : ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 8 bulan

DO : berat badan lahir bayi

Analisa dan interpretasi data:

Bayi yang dilahirkan yang belum cukup umur diantaranya memiliki ciri-ciri seperti berat badan lahir rendah yaitu dibawah 2500 gram (Anik dan Eka, 2013 : 319).

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Tidak ada indikasi untuk dilakukannya tindakan segera/ emergency

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala II

Diagnosa potensial : Potensial terjadi hipotermi

Potesial terjadi asfiksia neonatorum

Potensial terjadi BBLR

Tujuan : Kala II berlangsung normal

Kriteria : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Kala II berlangsung tidak lebih dari 1-2 jam
2. Bayi lahir dalam waktu 15 menit, napas spontan dan segera menangis, warna kulit kemerah-merahan dan bergerak aktif
3. Keadaan umum ibu baik
4. Pemeriksaan TTV

TD : 110/70 mmHg

N : 84 x/i

S : 36,5 °C

P : 20 x/i

5. Jumlah darah tidak lebih dari 500 cc

Intervensi tanggal 03 Juli 2018

1. Melihat adanya tanda dan gejala kala II
(dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka).
Rasional : untuk mengetahui apakah sudah memimpin persalinan
2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan
Rasional : agar tidak kewalahan saat pembukaan lengkap
3. Memakai celemek
Rasional : untuk mencegah infeksi silang dan tidak kewalahan saat pembukaan lengkap
4. Memastikan tangan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang
5. Memakai handsoon
Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang
6. Menghisap oksitosin 1 ampul 10 IU dengan satu tangan

Rasional : menyiapkan alat dalam keadaan siap pakai

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas savlon

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

8. Melakukan pemeriksaan dalam

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

9. Mencelupkan handscoon secara terbalik ke dalam larutan clorin 0,5 %

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

10. Mendengarkan DJJ jika tidak berkontraksi

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin

11. Memberitahu kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik

Rasional : agar ibu tidak khawatir dengan keadaan janinnya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan.

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu yang baik untuk meneran serta menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa berdoa dan bedzikir agar persalinan ibu dilancarkan.

Rasional : dapat membantu proses persalinan

13. Melakukan pimpinan meneran jika ada kontraksi

Rasional : memperlancar berlangsungnya proses persalinan

14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman

Rasional : dapat membantu proses persalinan

15. Memasang handuk bersih di atas perut ibu jika terlihat kepala janin membuka vulva 5-6 cm
Rasional : untuk mengeringkan tubuh janin
16. Meletakkan underpad di bawah bokong ibu
Rasional : sebagai alat pengalas ibu
17. Membuka bak partus
Rasional : menyiapkan alat dalam keadaan siap pakai
18. Memakai handscoon steril pada kedua tangan
Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang
19. Memimpin persalinan dengan melindungi perineum dan tahan puncak kepala
Rasional : dengan menyokong perineum dapat mengurangi dan mencegah rupture perineum
20. Memeriksa adanya lilitan tali pusat
Rasional : lilitan tali pusat dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin
21. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar
Rasional : menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putaran paksi dalam
22. Meletakkan tangan secara biparietal dengan hati-hati, gerakan tangan ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior dan gerakkan tangan ke atas untuk melahirkan bahu posterior
Rasional : membantu pengeluaran bahu agar tidak terjadi robekan perineum
23. Melahirkan kepala, leher dan bahu dengan sanggah susur

Rasional : mengendalikan pengeluaran bayi

24. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk diantara kedua kaki.

Rasional : dengan sanggah susur dapat mencegah ruptur perineum dan trauma pada bayi

25. Meletakkan bayi di atas perut ibu lalu lakukan penilaian sepias dan melakukan penilaian *APGAR score* di menit 1 dan menit ke 5

Rasional : untuk menilai bayi segera setelah lahir

26. Mengeringkan seluruh badan bayi dengan kain bersih dan kering

Rasional : untuk mencegah bayi hipotermi

27. Memeriksa fundus uteri

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal

28. Meminta izin pada ibu untuk disuntik oksitosin

Rasional : untuk memberitahu ibu tindakan yang akan dilakukan

29. Menyuntikkan oksitosin 10 IU di 1/3 lateral paha ibu secara IM

Rasional : untuk membantu kontraksi uterus

30. Menjepit tali pusat

Rasional : untuk menentukan batas tali pusat yang akan dipotong

31. Memotong tali pusat

Rasional : memotong tali pusat akan memutuskan hubungan bayi dan ibu dan membantu proses pernapasan dan sistem sirkulasi dan agar darah dari tali pusat tidak mengalir.

32. Meletakkan bayi di atas perut ibu untuk IMD dan kontak skin to skin dengan ibunya selama 1 jam.

Rasional: untuk menjalin hubungan kasih antara ibu dan bayi

33. Beri topipada bayi dan selimuti dengan kain bersih dan kering.

Rasional: untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tidak hipotermi

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.15 WITA

1. Melihat adanya tanda dan gejala kala II

Hasil : adanya dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka.

2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan

3. Memakai celemek

4. Memastikan tangan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

5. Memakai handscoon

6. Menghisap oksitosin 1 ampul 10 IU dengan satu tangan

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas savlon

8. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.15 WITA

Hasil :

Vulva dan vagina : normal

Portio	: melesap
Pembukaan	: 10 cm
Ketuban	: kering
Presentase	: uuk depan
Penurunan	: Hodge IV
Molase	: tidak ada
Penumbungan	: tidak ada
Kesan panggul	: normal
Pelepasan	: lendir dan darah

9. Mencecupkan handscoon secara terbalik ke dalam larutan clorin 0,5 %
10. Mendengarkan DJJ jika tidak berkontraksi
11. Memberitahu kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu yang baik untuk meneran serta menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa berdoa dan bedzikir agar persalinan ibu dilancarkan
13. Melakukan pimpinan meneran jika ada kontraksi
14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman
15. Memasang handuk bersih di atas perut ibu jika terlihat kepala janin membuka vulva 5-6 cm
16. Meletakkan underpad di bawah bokong ibu

17. Membuka bak partus
18. Memakai handscoon steril pada kedua tangan
19. Memimpin persalinan dengan melindungi perineum dan tahan puncak kepala
20. Memeriksa adanya lilitan tali pusat
21. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar
22. Meletakkan tangan secara biparietal dengan hati-hati, gerakan tangan ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior dan gerakkan tangan ke atas untuk melahirkan bahu posterior
23. Melahirkan kepala, leher dan bahu dengan sanggah susur
24. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk diantara kedua kaki.

Hasil : bayi lahir spontan tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA. JK : laki-laki, BBL : 2400 gram, PBL : 45 cm, pemeriksaan *apgar score* yang dilakukan oleh bidan Masna dan Anna Safitri yaitu 8/10.

25. Meletakkan bayi di atas perut ibu lalu lakukan penilaian sepiantas dan melakukan penilaian *APGAR score* di menit 1 dan menit ke 5

Hasil : a. Badan bayi kemerahan dan bergerak aktif

b. Bayi menangis kuat dan bernapas tanpa kesulitan

Penilaian *APGAR score* yang dilakukan oleh bidan Masna dan Anna Safitri

Tabel 1.2. Penilaian APGAR score

Yang dinilai	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 5
<i>Apperence</i> (warna kulit)	Bayi biru, pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
<i>Pulse</i> (denyut jantung)	Tidak ada	<100 x/i	>100 x/i	2	2
<i>Grimace</i> (refleks)	Tidak ada	Merintih	Batuk bersin	2	2
<i>Activity</i> (tonus otot)	Tidak ada	Fleksi pada ekstremitas	Bergerak aktif	1	2
<i>Respiratory</i> (pernapasan)	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Menangis kuat	2	2

Jumlah APGAR score : 8/10

Sumber: Data Primer

26. Mengeringkan seluruh badan bayi dengan kain bersih dan kering
27. Meletakkan bayi di atas perut ibu untuk IMD
28. Memeriksa fundus uteri
29. Meminta izin pada ibu untuk disuntik oksitosin 10 IU
30. Menyuntikkan oksitosin 10 IU di 1/3 lateral paha ibu secara IM
31. Menjepit tali pusat
32. Memotong tali pusat
33. Beri topi pada bayi dan selimuti dengan kain hangat

LANGKAH VII : EVALUASI

Diagnosa : Perlangsungan kala II

Tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA

1. Kala II berlangsung tidak lebih dari \pm 15 menit
2. Bayi lahir dalam waktu 15 menit, napas spontan dan segera menangis, badan bayi kemerah-merahan dan bergerak aktif
3. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
4. TFU setinggi pusat
5. Ibu mengatakan nyeri perut
6. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya
7. Ibu dan keluarga senantiasa berdoa dan berdzikir agar persalinanibu dilancarkan
8. Perdarahan \pm 200 cc
9. Plasenta belum terlepas

KALA III**LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

DS :

1. Ibu mengatakan nyeri perut
2. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya

3. Ibu senantiasa berdoa dan berdzikir agar persalinannya lancar

DO :

1. Bayi lahir spontan pada tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA
2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. TFU teraba stinggipusat
4. Perdarahan \pm 200 cc
5. Nampak semburan darah tiba-tiba
6. Tampak tali pusat di depan vulva
7. Plasenta belum terlepas

LANGKAH II : MENETAPKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Perlangungan kala III

DS : ibu mengatakan nyeri perut

DO :

1. Bayi lahir spontan pada tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30WITA, JK: laki-laki, BBL : 2400gram, PBL : 45 cm, A/S : 8/10
2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. TFU setinggi pusat
4. Perdarahan \pm 350 cc
5. Tampak tali pusat di depan vulva

Analisa dan interpretasi data

1. Dalam waktu 5-10 menit seluruh plasenta terlepas, terdorong kedalam vagina dan akan lahir spontan (Mochtar, 2013).
2. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda uterus menjadi bundar, uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim, tali pusat bertambah panjang dan terjadi perdarahan/adanya semburan darah tiba-tiba (Eka dan Kurnia, 2013 : 90-91).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Tidak ada indikasi untuk ditegakkannya diagnosa/masalah potensial

LANGKAH IV: TINDAKANSEGERA/EMERGENCY

Tidak ada indikasi untuk dilakukannya tindakan segera/emergency

LANGKAH V: INTERVENSI

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala III

Diagnosa potensial : -

Tujuan : kala III berlangsung normal

Kriteria : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Perdarahan tidak lebih dari 500 cc
2. Lamanya kala III 30 menit
3. Plasenta dan selaputnya lahir lengkap

Intervensi

Tanggal 03 Juli 2018

34. Memindahkan klem tali pusat hingga 5-6 cm dari depan vulva, jika tali pusat bertambah panjang
35. Rasional: proses peregang tali pusat terkendali
36. Meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.
Rasional : proses peregang tali pusat terkendali
37. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial
Rasional : untuk memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya
38. Meregangkan tali pusat ke arah atas dan ke bawah
Rasional : memudahkan plasenta keluar sesuai kurva jalan lahir hingga tampak di vulva
39. Menjemput plasenta dengan kedua tangan jika plasenta sudah tampak di depan vulva
Rasional : agar plasenta dan selaputnya lahir lengkap
40. Melahirkan plasenta dengan memutar searah jarum jam
Rasional : agar plasenta dan selaputnya lahir lengkap
41. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap

Rasional : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban akan menyebabkan perdarahan

42. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Rasional : untuk mencegah terjadinya perdarahan aktif

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

34. Memindahkan klem tali pusat hingga 5-6 cm dari depan vulva, jika tali pusat bertambah panjang

35. Meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.

36. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial

37. Meregangkan tali pusat ke arah atas dan ke bawah

38. Menjemput plasenta dengan kedua tangan jika plasenta sudah tampak di depan vulva

39. Melahirkan plasenta dengan memutar searah jarum jam

Hasil : plasenta lahir pukul 10.40 WITA

40. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, jika lengkap masukkan pada tempatnya

Hasil : plasenta, selaput ketuban dan kotiledon lahir lengkap

41. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Hasil : tidak terdapat robekan jalan lahir dengan perdarahan aktif

LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 03 Juli 2018

1. Kala III berlangsung normal (± 10 menit)
2. Plasenta dan selaputnya lahir lengkap
3. TFU setinggi pusat
4. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
5. Perdarahan ± 350 cc
6. Ibu mengatakan lelah setelah proses persalinan
7. Ibu senantiasa berdoa dan berdzikir agar ibu dan bayi dalam keadaan normal
8. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 110/70 mmHg
 - b. N : 80 x/i
 - c. S : 36,5 °C
 - d. P : 20 x/i

KALA IV

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO :

1. Kala III berlangsung ± 10 menit
2. Plasenta lahir lengkap jam 10.40 WITA

3. TFU setinggi pusat
4. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. Perdarahan \pm 350 cc
6. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 110/70 mmHg
 - b. N : 80 x/i
 - c. S : 36,5 $^{\circ}$ C
 - d. P : 20 x/i

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala IV

DS : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO :

1. Kala III berlangsung \pm 10 menit
2. Plasenta lahir lengkap pukul 10.40 WITA
3. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 110/70 mmHg
 - b. N : 80 x/i
 - c. S : 36,5 $^{\circ}$ C
 - d. P : 20 x/i

Analisa dan interpretasi data :

1. Setelah plasenta dan selaput ketuban lahir menandakan bahwa telah masuk kala IV (Eka Puspita, 2014).
2. Perdarahan yang terjadi saat kontraksi uterus baik, biasanya karena adanya robekan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan inspeksi pada vulva, vagina dan serviks dengan ciri warna darah yang merah segar (Prawirohardjo, 2010).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya perdarahan postpartum

Analisa dan interpretasi data

1. Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah lebih dari 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000cc setelah persalinan abdominal (Prawirohardjo,2014).
2. Diagnosis perdarahan postpartum dapat ditegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak, bergumpal dan pada palpasi fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih (Prawirohardjo, 2014).

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Tidak ada indikasi untuk dilakukan tindakan segera

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa : Perlangsungan kala IV

Masalah aktual : Kelelahan

Tujuan : Kala IV berlangsung normal

Kriteria :

1. Tidak terjadi perdarahan
2. TFU 1 jrbpst
3. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
4. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 110/80mmHg
 - b. N : 82 x/i
 - c. S : 36,5 °C
 - d. P : 20 x/i
5. Pernapasan dan suhu bayi dalam batas normal
 - a. S : 36,5 °C
 - b. P : 48 x/i

Intervensi tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.40 WITA

42. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan robekan jalan lahir

Rasional : untuk yang berkontraksi yang baik menandakan kala III berlangsung normal dan untuk mencegah perdarahan aktif.

43. Mebiarkan bayi tetap melakukan IMD

44. Setelah 1 jam IMD lakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM
Rasional : untuk mengetahui apakah bayi lahir normal atau tidak
45. Memberikan imunisasi hepatitis B di 1/3 lateral paha kanan bayi secara IM 1 jam setelah pemberian vitamin K
Rasional : memberikan hepatitis
46. Lakukan pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pertama kemudian setiap 30 menit pada satu jam kedua
Rasional : kontraksi uterus yang baik menandakan kala IV berlangsung normal
47. Melakukan pemantauan tinggi fundus uteri dan jumlah perdarahan setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua
Rasional: untuk mengetahui proses involusi uteri dan mengantisipasi jumlah perdarahan
48. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi
Rasional : agar ibu dan keluarga mengetahui bagaimana kontraksi uterus yang baik dan dapat melakukannya sendiri
49. Melakukan pemantauan tekanan darah dan nadi setiap 15 menit pada 1jam pertamadan tiap 30 menit pada 1 jam kedua, serta suhu 1 kali tiap jam
Rasional : untuk mengetahui keadaan umum ibu
50. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bayi dalam keadaan baik

Rasional : untuk mengetahui keadaan umum bayi

51. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit

Rasional : untuk mencegah infeksi silang

52. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang telah disediakan

Rasional : untuk mencegah infeksi silang

53. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir dan air ketuban dengan air DTT kemudian bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering

Rasional : untuk memberikan rasa nyaman pada ibu dan mencegah infeksi silang

54. Memastikan ibu merasa nyaman serta memberitahu keluarga untuk memberikan makan dan minum kepada ibu

Rasional : makan dan minum akan mengembalikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinan sehingga ibu tidak merasa kelelahan

55. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan clorin 0,5 %

Rasional : untuk mencegah infeksi silang

56. Mencelupkan handscoon dengan larutan clorin 0,5 % secara terbalik

Rasional : untuk mencegah infeksi silang

57. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan

Rasional : agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri

58. Melengkapi partograf

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 03 Juli 2018

42. Memeriksa kembali kontraksi uterus dan robekan jalan lahir
43. Membiarkan bayi tetap melakukan IMD dan kontak skin to skin selama 1 jam
44. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM
45. Memberikan imunisasi hepatitis B di 1/3 lateral paha kanan bayi secara IM 1 jam setelah pemberian vitamin K
46. Lakukan pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua

Hasil:

Tabel 1.3. Pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih

Waktu	Kontraksi uterus	Kandung kemih
10.55 WITA	Baik	Kosong
11.10 WITA	Baik	Kosong
11.25 WITA	Baik	Kosong
11.40 WITA	Baik	Kosong
12.10 WITA	Baik	Kosong
12.40 WITA	Baik	Kosong

Sumber: Data Primer

47. Melakukan pemantauan tinggi fundusuteri dan jumlah perdarahan setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua

Hasil:

Tabel 1.4. Pemantauan tinggi fundus uteri dan perdarahan

Waktu	Tinggi fundus uteri	Perdarahan
10.55 WITA	Setinggi pusat	± 60 cc
11.10 WITA	Setinggi pusat	± 60 cc
11.25 WITA	Setinggi pusat	± 50 cc
11.40 WITA	Setinggi pusat	± 50 cc
12.10 WITA	1 jari bawah pusat	± 40cc
12.40 WITA	1 jari bawah pusat	± 30 cc

Sumber: Data Primer

48. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi

Hasil : agar ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

49. Melakukan pemantauan tekanan darah dan nadi setiap 15 menit pada 1 jam pertamadan tiap 30 menit pada 1 jam kedua, serta suhu 1 kali tiap jam

Hasil:

Tabel 1.5. Pemantauan tekanan darah, nadi, dan suhu

Waktu	Tekanan darah	Nadi	Suhu
10.55 WITA	110/70 mmHg	80 x/i	36,5 ⁰ C
11.10 WITA	120/70 mmHg	84 x/i	
11.25 WITA	110/80 mmHg	80 x/i	
11.40 WITA	120/80 mmHg	80 x/i	
12.10 WITA	120/70 mmhg	84 x/i	
12.40 WITA	120/70 mmHg	80 x/i	36,5 ⁰ C

Sumber: Data Primer

50. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bayi bernapas dengan baik

Hasil : HR : 140 x/i P : 46 x/i S : 36,5⁰ C

51. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit

52. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang telah disediakan

53. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir, air ketuban dengan air DTT dan memakaikan pakaian bersih dan kering

54. Memastikan ibu merasa nyaman serta memberitahu keluarga untuk memberikan makan dan minum kepada ibu

55. Mendekontaminasi tempat persalinan dengan larutan clorin 0,5 %

56. Membersihkan handscoon dengan larutan clorin 0,5 % secara terbalik

57. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir lalu keringkan

58. Melengkapi partograf

LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 03 Juli 2018, pukul 12.40 WITA

1. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
2. TFU 1 jrbpst
3. Jumlah perdarahan \pm 290 cc
4. Pemeriksaan TTV
 - TD : 110/70 mmHg
 - N : 82 x/i
 - S : 36,5 ⁰C
 - P : 20 x/i
5. Ibu sudah merasa nyaman dan tetap berdoa serta berdzikir agar ibu dan bayi dalam keadaan normal
6. Kesadaran komposmentis

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA
NY "H" DENGAN PERSALINAN PRETERM GESTASI 34-36 MINGGU
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2018**

No. register : xxxxxx

Tgl masuk : 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA

Tgl pengkajian : 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA

Tgl partus : 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA

Pengkaji : Anna Safitri

KALA I

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny "H" / Tn "A"

Umur : 26 tahun / 24 tahun

Nikah/lamanya : 1x / ± 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Petani

Alamat : Palompong

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan nyeri perut tembus belakang sejak tanggal 02 Juli 2018, pukul 18.00 WITA.
2. Ibu mengatakan pengeluaran lendir,darah sejak tanggal 03 Juli 2018, pukul 02.00 WITA.
3. Ibu mengatakan pengeluaran air di rumah sejak jam 02.30 WITA
4. Ibu mengatakan sifat nyeri hilang timbul
5. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama
6. Ibu mengatakan haid terakhirnya tanggal 06 November 2017.

7. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 8 bulan
8. Ibu mengatakan pergerakan janinnya dominan terasa pada sebelah kanan perut ibu dan dirasakan sejak usia kehamilan \pm 4 bulan tepatnya bulan Maret 2018 sampai sekarang.
9. Ibu melakukan kunjungan anc sebanyak 8 kali di puskesmas Pabbentengan
10. Ibu mengatakan sudah mendapatkan suntikan TT di puskesmas Pabbentengan sebanyak 2 kali yaitu TT1 tanggal 17 Januari 2018, TT2 tanggal 14 Februari 2018
11. Ibu belum pernah menjadi akseptor KB dalam bentuk apapun
12. Ibu tidak pernah menderita penyakit asma, DM, hipertensi, jantung, dan penyakit lainnya.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HTP : 13 Agustus 2018
4. Gestasi : 34 minggu 1 hari
5. Pemeriksaan Antropometri
 - a. BB : sebelum hamil : 50 kg
Sekarang : 56 kg
 - b. TB : 150 cm
 - c. LILA : 26 cm

6. Pemeriksaan TTV

- a. TD : 110/80 mmHg
- b. N : 82 x/i
- c. S : 36,6 °C
- d. P : 22 x/i

7. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Mata

Inspeksi : simetris, sklera putih, conjungtiva merah muda

b. Leher

Inspeksi : tidak ada pembengkakan pada leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar kelenjar tiroid dan limfe,
tidak ada pembesaran vena jugularis

c. Payudara

Inspeksi : simetris, tampak hyperpigmentasi pada areola pada areola
mammae

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ada colostrum saat
dipencet.

d. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra.

Palpasi : Leopold I : TFU 27cm, 3 jrapst, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

LP : 85 cm

TFU : 27 cm

TBJ : TFU x LP

27 x 85

2295 gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah
perut ibu dengan frekuensi 140 x/menit teratur

His 2 kali dalam 10 menit, durasi 20-25 detik

e. Genetalia

Inspeksi : tidak ada oedema, tidak varices, tampak pengeluaran lendir,
darah dan air ketuban

Palpasi : VT tanggal 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : tebal

Pembukaan : 2 cm

Ketuban : jernih

Presentase : uuk kiri lintang

Penurunan : Hodge I

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

f. Ekstremitas

Inspeksi : simetris

Palpasi : tidak ada oedema dan tidak varices

ASSESSMENT (A)

G1P0A0, gestasi 34 minggu 1 hari, situs memanjang, intrauterine, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala 1 fase laten, dengan persalinan preterm disertai ketuban pecah dini.

PLANNING (P)

1. Menjelaskan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan yaitu pembukaan sudah 2 cm, ketuban sudah pecah, keadaan ibu dan janin baik.
2. Mengosongkan kandung kemih ibu
3. Menganjurkan kepada ibu untuk menarik napas ketika terjadi kontraksi yaitu tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan lewat mulut seperti orang yang sedang meniup-niup dan istirahat apabila tidak ada his, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum di sela-sela kontraksi.
4. Menganjurkan ibu untuk miring kiri dan tidak boleh berjalan karena ketuban sudah pecah
5. Mengajarkan kepada ibu cara mengedan yang benar yaitu tarik napas dalam-dalam lalu berkuat seperti orang yang sedang BAB, mata melihat perut ibu

dan jangan mengeluarkan suara, keluarga membantu mengangkat badan ibu apabila pembukaan sudah lengkap

6. Menanyakan kepada ibu siapa yang akan mendampingi pada saat persalinan apakah suami atau keluarga lainnya dan menjelaskan pentingnya pendampingan saat persalinan.
7. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu dan keluarga agar tetap siap fisik dan mental selama persalinan.
8. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa berdoa dan bedzikir agar persalinan ibu dilancarkan
9. Melakukan pemasangan infus RL 28 tetes/menit
10. Memberikan injeksi cefotaxime 1 gr IV/12 jam sesuai dengan instruksi dokter
11. Memberikan kortikosteroid (dexamethasone) untuk pematangan paru janin 1 amp/6 jam/IM sesuai instruksi dokter
12. Memantau DJJ, nadi dan his tiap 30 menit, tekanan darah, suhu setiap 4 jam dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Tabel 1.1. Pemantauan his, DJJ, nadi, tekanan darah, dan suhu

Waktu	His	DJJ	Nadi	Tekanan darah	Suhu
04.45 WITA	2X10' (20''-25'')	144 x/i	80 x/i		
05.15 WITA	2X10' (20''-25'')	140 x/i	84 x/i		
05.45 WITA	2X10' (20''-25'')	140 x/i	82 x/i		
06.15 WITA	2X10' (20''-25'')	140 x/i	84 x/i		
06.45 WITA	3X10' (30''-35'')	142 x/i	82 x/i		
07.15 WITA	3X10' (30''-35'')	148 x/i	80 x/i		
07.45 WITA	3X10' (30''-35'')	140 x/i	84 x/i		
08.15 WITA	4X10' (40''-45'')	138 x/i	82 x/i	110/70 mmHg	36,8 ⁰ C

Sumber: Data Primer

13. Melakukan VT II tanggal 03 Juli 2018, pukul 08.15 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : tipis

Pembukaan : 7 cm

Ketuban : jernih

Presentase : uuk kiri depan

Penurunan : Hodge III

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

14. Memantau DJJ, nadi dan his tiap 30 menit, tekanan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Tabel 1.1. Pemantauan his, DJJ, nadi, tekanan darah, dan suhu

Waktu	His	DJJ	Nadi	Tekanan darah	suhu
08.45 WITA	4X10'(45''-50'')	144 x/i	84 x/i		
09.15 WITA	4X10'(45''-50'')	140 x/i	80 x/i		
09.45 WITA	4X10'(45''-50'')	146 x/i	84 x/i		
10.15 WITA	5X10'(45''-50'')	138 x/i	82 x/i		

Sumber: Data Primer

15. VT III tanggal 03 Juli, pukul 10.15 WITA

Vulva dan vagina : normal
 Portio : melelap
 Pembukaan : 10 cm
 Ketuban : kering
 Presentase : uuk depan
 Penurunan : Hodge IV
 Molase : tidak ada
 Penumbungan : tidak ada
 Kesan panggul : normal
 Pelepasan : lendir dan darah

16. Memantau kemajuan persalinan dengan partograf

KALA II**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan sakitnya semakin kuat dan sering
2. Ibu mengatakan ada dorongan yang kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan ada tekanan pada anus dan rasa ingin meneran

DATA OBJEKTIF (O)

1. Perineum menonjol
2. Vulva dan anus membuka
3. VT tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.15 WITA

Vulva dan vagina	: normal
Portio	: melelap
Pembukaan	: 10 cm
Ketuban	: kering
Presentase	: uuk depan
Penurunan	: Hodge IV
Molase	: tidak ada
Penumbungan	: tidak ada
Kesan panggul	: normal
Pelepasan	: lendir dan darah

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : Perlangsunan kala II

Masalah potensial : Potensial terjadi asfiksia neonatorum

Pontensial terjadinya hipotermi

Potensial terjadinya BBLR

PLANNING (P)

1. Melihat adanya tanda dan gejala kala II

(dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka).

2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan

- a. Partus set

Klem kocher

½ kocher

Gunting tali pusat

Gunting episitomi

Penjepit tali pusat

Kateter

Kasa

Handscoon

b. Hecting set

Naadle voerder

Pinset anatomi

Jarum

Cutgat

Gunting benang

Kasa

c. air DTT

d. kapas DTT

e. larutan clorin

f. tempat sampah

g. tensimeter

h. stetoskop

i. deele

j. dopler

k. underpad

l. obat

cairan infus

oksitosin

lidocain

salep mata

vit.k

HbO

3. Memakai celemek
4. Memastikan tangan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
5. Memakai handsoon
6. Menghisap oksitosin 1 ampul 10 IU dengan satu tangan
7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas savlon
8. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.15 WITA

Vulva dan vagina : normal
 Portio : melesap
 Pembukaan : 10 cm
 Ketuban : jernih
 Presentase : uuk depan
 Penurunan : Hodge IV
 Molase : tidak ada
 Penumbungan : tidak ada
 Kesan panggul : normal
 Pelepasan : lendir dan darah

9. Mencelupkan handscoon secara terbalik ke dalam larutan clorin 0,5 %
10. Mendengarkan DJJ jika tidak berkontraksi

11. Memberitahu kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu yang baik untuk meneran serta menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa berdoa dan berdzikir agar persalinannya dilancarkan
13. Melakukan pimpinan meneran jika ada kontraksi
14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman
15. Memasang handuk bersih di atas perut ibu jika terlihat kepala janin membuka vulva 5-6 cm
16. Meletakkan underpad di bawah bokong ibu
17. Membuka bak partus
18. Memakai handscoon steril pada kedua tangan
19. Memimpin persalinan dengan melindungi perineum dan tahan puncak kepala
20. Memeriksa adanya lilitan tali pusat
21. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar
22. Meletakkan tangan secara biparietal dengan hati-hati, gerakan tangan ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior dan gerakkan tangan ke atas untuk melahirkan bahu posterior
23. Melahirkan kepala, leher dan bahu dengan sanggah susur
24. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk diantara kedua kaki.

Hasil : bayi lahir spontan tanggal 03 Juli 2018, pukul : 10.30 WITA, BB : 2400 gram, PB : 45 cm.

25. Meletakkan bayi di atas perut ibu lalu lakukan penilaian sepiantas dan menilai *apgar score* pada menit pertamadan menit kelima

Hasil: a. Bayi menangis kuat, dan bernapas tanpa kesulitan
b. Badan bayi kemerah-merahan dan bergerak aktif

Penilaian *apgar score* yang dilakukan oleh bidan Masna dan Anna Safitri

Tabel 1.2. Penilaian *apgar score*

Yang dinilai	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 5
<i>Appereance</i> (warna kulit)	Bayi biru, pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
<i>Pulse</i> (denyut jantung)	Tidak ada	<100 x/i	>100 x/i	2	2
<i>Grimace</i> (refleks)	Tidak ada	Merintih	Batuk bersin	2	2
<i>Activity</i> (tonus otot)	Tidak ada	Fleksi pada ekstremitas	Bergerak aktif	1	2
<i>Respiratory</i> (pernapasan)	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Menangis kuat	2	2

Jumlah *APGAR score* : 8/10

Sumber: Data Primer

26. Mengeringkan seluruh badan bayi dengan kain bersih dan kering
27. Memeriksa fundus uteri untuk memastikan kehamilan tunggal
28. Meminta izin pada ibu untuk disuntik oksitosin 10 IU
29. Menyuntikkan oksitosin 10 IU di 1/3 lateral paha ibu secara IM
30. Menjepit tali pusat dengan umbilica cord 3 cm dari umbilicus bayi,urut kearah ibu lalu jepit klemkedua 2 cm dari penjepit tali pusat
31. Satu tangan memegang tali pusat bayi dan melindungi perut bayi sementara tangan yang satu memotong tali pusat secara perlahan
32. Meletakkan bayi di atas perut untuk IMD dan kontak skin to skin dengan ibunya selama 1 jam
33. Beri topi pada bayi dan selimuti kain hangat

KALA III

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan nyeri perut
2. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya
3. Ibu senantiasa berdoa dan berdzikir agar keadaannya dan bayi tetap sehat

DATA OBJEKTIF (O)

1. Bayi lahir spontan pada tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA
2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. TFU teraba setinggi pusat
4. Perdarahan \pm 200 cc

5. Plasenta belum terlepas
6. Tampak tali pusat di depan vulva

ASSESSMENT (A)

Perlangsungan kala III

PLANNING (P)

34. Memindahkan klem tali pusat hingga 5-6 cm dari depan vulva
35. Meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.
36. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial
37. Meregangkan tali pusat ke arah atas dan ke bawah
38. Menjemput plasenta dengan kedua tangan jika plasenta sudah tampak di depan vulva
39. Melahirkan plasenta dengan memutar searah jarum jam
Hasil: plasenta lahir jam 10.40 WITA
40. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap
41. Memeriksa adanya robekan jalan lahir
Hasil: tidak terdapat rupture

KALA IV**DATA SUBJEKTIF (S)**

Ibu mengatakan lelah setelah melahirkan

DATA OBJEKTIF (O)

1. Kala III berlangsung \pm 10 menit
2. Plasenta lahir lengkap pukul 10.40 WITA
3. TFU setinggi pusat
4. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. Perdarahan \pm 150 cc
6. Pemeriksaan TTV

TD : 110/70 mmHg

N : 80 x/i

S : 36,5 °C

P : 20 x/i

ASSESSMENT (A)

Perlangsungan kala IV

PLANNING (P)

42. Memeriksa kontraksi uterus dan robekan jalan lahir
43. Membiarkan bayi tetap melakukan IMD selama 1 jam
44. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM

Hasil: BB : 2400 gram

PB : 45 cm

LK : 31 cm

LD : 30 cm

LP : 30 cm

Vit K telah diberikan di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM

45. Memberikan imunisasi hepatitis B di 1/3 lateral paha kanan bayi secara IM 1 jam setelah pemberian vitamin K
46. Melakukan pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pada 1 jam pertama, dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua.

Tabel 1.3. Pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih

Waktu	Kontraksi uterus	Kandung kemih
10.55 WITA	Baik	Kosong
11.10 WITA	Baik	Kosong
11.25 WITA	Baik	Kosong
11.40 WITA	Baik	Kosong
12.10 WITA	Baik	Kosong
12.40 WITA	Baik	Kosong

Sumber: Data Primer

47. Melakukan pemantauan tinggi fundus uteri dan perdarahan setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua

Tabel 1.4. Pemantauan tinggi fundus uteri dan perdarahan

Waktu	Tinggi fundus uteri	Perdarahan
10.55 WITA	Setinggi pusat	± 60 cc
11.10 WITA	Setinggi pusat	± 60 cc
11.25 WITA	Setinggi pusat	± 50 cc
11.40 WITA	Setinggi pusat	± 50 cc
12.10 WITA	1 jrbpst	± 40 cc
12.40 WITA	1 jrbpst	± 30 cc

Sumber: Data Primer

48. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase dan menilai kontraksi
49. Melakukan pemantauan tekanan darah dan nadi setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua, serta memantau suhu 1 kali pada jam pertama dan 1 kali pada jam kedua

Tabel 1.5. Pemantauan tekanan darah, nadi dan suhu

Waktu	Tekanan darah	Nadi	Suhu
10.55 WITA	110/70 mmHg	80 x/i	36,5 °C
11.10 WITA	120/70 mmHg	84 x/i	
11.25 WITA	110/80 mmhg	80 x/i	
11.40 WITA	120/80 mmhg	80 x/i	
12.10 WITA	120/70 mmHg	84 x/i	
12.40 WITA	120/70 mmHg	80 x/i	36,5 °C

Sumber: Data Primer

50. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi

Hasil : bayi bernapas baik yaitu 50 x/menit dan suhu 36,5 °C

51. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit

52. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi

53. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir dan air ketuabn dengan air DTT

54. Memastikan ibu merasa nyaman serta memberitahu keluarga untuk memberikan makan dan minum kepada ibu

55. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan clorin 0,5 %

56. Membersihkan handscoon dengan larutan clorin 0,5 % secara terbalik

57. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir

58. Melengkapi partograf

KUNJUNGAN NIFAS DAN BAYI

KUNJUNGAN NIFAS I

Tempat : Ruangan Nifas

Tanggal : 03 Juli 2018

Jam : 13.00 WITA

IDENTITAS ITRI/SUAMI

1. Nama : Ny. "H" / Tn. "A"
2. Umur : 26 tahun / 24 tahun
3. Nikah/lamanya : 1x / ± 1 tahun
4. Suku : Makassar / Makassar
5. Agama : Islam / Islam
6. Pendidikan : SMA / SMA
7. Pekerjaan : IRT / Petani
8. Alamat : Palompong

DATA SUBJEKTIF (S)

4. Ibu mengeluh nyeri pada abdomen sejak 2 jam yang lalu
5. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, tanggal 03 Juli 2018, jam 10.30 WITA dengan jenis kelamin laki-laki.
6. Hari pertama haid terakhir tanggal 06 November 2017
7. Ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya
8. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan
9. Ibu belum BAB dan sudah BAK

10. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, asma, diabetes mellitus, jantung, dan penyakit lainnya.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 110/70 mmHg
 - b. N : 84 x/i
 - c. S : 36,8⁰ C
 - d. P : 20 x/i
4. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah : tidak pucat, tidak ada cloasma, tidak oedema, tidak nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, sklera tampak putih, konjungtiva merah muda
 - c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid, dan limfe
 - d. Payudara : simetris, puting susu menonjol, hyperpegmentasi areola mammae, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ada pengeluaran ASI saat dipencet

- e. Abdomen : tidak ada bekas luka operasi, TFU 1 jrbpst, kontraksi uterus bai, teraba keras dan bundar, kandung kemih ibu kosong
- f. Genetalia : tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran darah \pm 70 cc, tampak pengeluaran lochea rubra, ibu masih memakai popok, tidak ada oedema, tidak ada varices, tidak terdapat tanda-tanda infeksi
- g. Ekstremitas atas : terpasang infus RL 24 tetes/menit di lengan sebelah kiri ibu
- h. Ekstremitas bawah : simetris, tidak ada oedema, tidak ada varices, tidak nyeri tekan

ASSESSMENT (A)

Ny "A" PIA0 postpartum hari pertama dengan nyeri pada abdomen

PLANNING (P)

Tanggal 03 Juli 2018, pukul 13,00 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri pada abdomen, yaitu pada saat hamil rahim akan membesar sesuai ukuran janin yang dikandung, saat bayi lahir maka perlahan-lahan rahim akan menyusut dan mengecil sebesar buah pir kecil. Proses kembalinya ke bentuk semula dari rahim ini, maka disertai rasa seperti kram pada perut yang disebut dengan kontraksi uterus yang segera mengecil dan pembuluh darah yang terbuka saat lepasnya plasenta dapat

segera menutup kembali sehingga tidak terjadi perdarahan yang banyak. Nyeri seperti ini makin terasa saat menyusui, ibu tak perlu cemas karena dengan adanya rangsangan hisapan bayi maka keluar hormon oksitosin yang membantu kontraksi rahim tersebut, gunakanurita yang nyaman, lakukan relaksasi napas bila nyeri atau kram muncul.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan bidan dan bersedia melakukannya.

2. Menganjurkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus yaitu dengan meletakkan satu tangan di atas perut ibu, lalutekan dan putar secara terus-menerus searah jarum jam sampai perut ibu terba keras dan bundar.

Hasil :Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia melakukannya.

3. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi dini agar memperlancar pengeluaran lochea, mengurangi infeksi, mempercepat involusi uteri, memperlancar fungsi alat perkemihan serta meningkatkan kelancaran peredaran darah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

4. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin karena berat badan lahir bayi ibu dibawah 2500 gram, maka bayi perlu asupan nutrisi yang optimal karena ASI kaya akan manfaat dan menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya 1-3 jam, minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Memberikan penjelasan mengenai manfaat ASI yaitu:
 - a. ASI kaya akan zat penting yang dibutuhkan oleh bayi seperti DHA, AA, omega 6, laktosa, taurin, protein, laktobasillus, vitamin A, colostrum, lemak, dan zat besi.
 - b. ASI meberikan kekebalan yang optimal untuk sistem imun tubuh bayi
 - c. ASI sebagai sarana mendekatkan ibu dan bayinya
 - d. ASI tidak basi dan selalu segar serta lebih higienis

Hasil : ibu mengerti

6. Memberikan konseling pendidikan kesehatan tentang :
 - a. Nutrisi

Gizi yang dibutuhkan ibu yaitu makanan sehat dan seimbang yang mengandung lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, kalsium, seperti nasi, ikan, daging, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, tempe, tahu, kacang-kacangan dan banyak mengonsumsi air putih untuk memperbanya produksi ASI.
 - b. Personal *hygiene*

Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri seperti mandi dan gosok gigi minimal 2 kali sehari, mengganti celana dalam atau pembalut tiap kali dirasa lembab dan basah.
 - c. Istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup seperti tidur siang minimal 2 jam, tidur malam minimal 6 jam

d. Perawatan tali pusat

Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga tali pusat agar tetap bersih dan kering. Dibersihkan dengan kasa steril, yang dibasahi alcohol atau arimatang dimulai dari pangkal sampaiujung, talipusatdibiarkan tetap terbuka dan kering dengan sendirinya tanpa diberi diberi salep atau betadin

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menganjurkan dan mengajarka ibu untuk tetap mempertahankan suhu tubuh bayi agar tidak mudah kehilangan panas seperti membedong bayi dan dipakaikan pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Menjelaskan kepada ibu tentang alat kontrasepsi yaitu :

a. Kondom yaitu selubung tipis dari karet atau lateks yang berguna sebagai sarung penis yaang sedang ereksi selama berhubungan seksual dan menghalangi sperma masuk ke vagina yang membantu mencegahkehamilan. Kekurangannya dapat bocor yang dapat

menyebabkan fungsi tidak efektif.

b. Implant yaitu alat kontrasepsi berbentukbatang kecil (40 mm) yang dipasang dilengan bagian atas yangberfungsi untuk mencegah kehamilan dan aman bagi ibu menyusui. Kekurangannya yaitu menstruasi tidak teratur, tidak dapat digunakan bagi yang enderita penyakit diabetes

mellitus, penyakit liver, dan osteoporosis, dan dapat memicu iritasi dan rasa tidak nyaman di area yang dipasang implan.

- c. IUD/AKDR yaitu alat kontrasepsi yang ditempatkan dalam rahim untuk menunda kehamilan dan jarak persalinan yang menjamin perlindungan jangka panjang serta aman bagi ibu menyusui. Peningkatan menstruasi, bercak berselang, kemungkinan mengalami sakit punggung.
- d. Suntik KB merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan menyuntikkan hormon progestin setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Kekurangannya pada penggunaan jangka panjang dapat menurunkan kepadatan tulang.
- e. Pil KB yaitu pil yang dikonsumsi rutin setiap hari. Kekurangannya yaitu dapat menyebabkan bercak diantara menstruasi, mual, muntah, sakit kepala, dan tidak cocok bagi wanita yang sering lupa.

9. Meanjurkan ibu dan keluarga untuk senantiasa melaksanakan shalat lima waktu

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

10. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan selain ASI dan menjelaskan bahwa Allah Swt telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah :233

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

KUNJUNGAN NIFAS II**Tempat : Ruangan nifas****Tanggal: 04 Juli 2018****Jam : 08.30 WITA****DATA SUBJEKTIF (S)**

1. ibu mengatakan melahirkan 1 hari yang lalu tanggal 03 juli 2018 jam 10.30 WITA.
2. Ibu belum BAB dan sudah BAK
3. Ibu mengatakan perut masih mule-mules
4. Ibu mengatakan ASI sudah lancar

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 120/70 mmHg
 - b. N : 80 x/menit
 - c. S : 36,8 °C
 - d. P : 20x/menit
4. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah : tidak pucat, tidak ada kloasma, tidak oedema, tidak nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, sclera putih, conjungtiva merah muda

- c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelejar tiroid dan limfe
- d. Payudara : simetris, terdapat hyperpigmentasi pada areola mammae, puring susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ASI sudah keluar
- e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU 1 jrbpst, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
- f. Genetalia : tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea rubra, masih memakai pembalut, perdarahan ± 70 cc dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi.

ASSESSMENT (A)

P1A0 postpartum hari kedua

PLANNING (P)

Tanggal 04 Juli 2018, jam 08.30 WITA.

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja
 Hasil : ibu mengerti
2. Memberitahu ibu penyebab keluhan yang dirasakan ibu adalah hal yang fisiologis pada ibu masa nifas. Rasa mulas diakibatkan dari kontraksi uterus untuk mencegah perdarahan selain itu selama masa nifas juga akan terjadi peningkatan suhu tubuh, sedikit pusing dan lemas yang diakibatkan karena

kelelahan. Luka jahitan pada luka perineum akan sembuh dengan sendirinya selama 6-7 hari jika tidak ada tanda-tanda infeksi.

Hasil: ibu mengerti penyebab nyeri yang dirasakan

3. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus yaitu dengan meletakkan satu tangan di atas perut ibu, lalu tekan dan putar secara terus-menerus searah jarum jam sampai perut ibu terasa keras dan bundar.

Hasil :Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia melakukannya.

4. Mengajarkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu minimal 8 jam/hari dan menyarankan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti nasi, sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, telur, tempe, tahu, daging, ikan laut.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Mengajarkan ibu banyak minum 8 gelas/hari untuk membantu memperbanyak produksi ASI dan istirahat yang cukup untuk menambah energi ibu selama menyusui.

Hasil : ibu sudah mengerti

6. Memberikan ibu KIE tentang ASI eksklusif yaitu
 - a. Memberikan ASI saja selama 6 bulan tanpa makanan tambahan.
 - b. Sumber kekebalan bagi bayi untuk mencegah bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh bayi
 - c. Untuk mencegah alergi pada bayi

Hasil : ibu sudah mengerti

7. Mengajarkan ibu untuk melakukan perawatan payudara yaitu:

- a. Sebelum melakukan perawatan payudara dibersihkan terlebih dahulu
- b. Gunakan baby oil atau minyak kelapa pada kapas, kemudian puting dibersihkan.
- c. Tempelkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara ibu.
- d. Pengurutan dimulai kearah atas, ke samping, lalu kearah bawah.
- e. Dalam pengurutan posisi tangan kiri kearah sisi kiri, telapak tangan kearah sisi kanan, pengurutan diteruskan kearah bawah, kesamping selanjutnya melintang, lalu telapak tangan mengurut ke depan kemudian kedua tangan dilepaskan dari payudara. Ulangi gerakan 20-30 kali.
- f. Setelah itu bersihkan payudara terutama bekas minyak
- g. Anjurkan ibu untuk menggunakan bra yang dapat menyanggah payudara.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Memberitahu ibu tanda-tanda bahaya pada masa nifas
 - a. Perdarahan postpartum
 - b. Lochea berbau busuk
 - c. Sub-involusi uterus
 - d. Nyeri pada perut dan panggul
 - e. Pusing dan lemas yang berlebihan
 - f. Demam
 - g. Penyulit dalam menyusui
 - h. Infeksi pada luka perineum

Hasil : ibu sudah mengerti

9. Mengajarkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

10. Mengajarkan ibu senam nifas yaitu siap tubuh terlentang, kedua kaki lurus kedepan, angkat kedua tangan lurus ke atas samapi kedua telapak tangan bertemu, turunkan perlahan sampai kedua tangan terbuka lebar hingga sejajar dengan bahu, lakukan gerakan dengan mantap sehingga terasa otot sekitar tangan dan bahu terasa kencang.

Hasil : ibu mengerti.

11. Meanjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan shalat lima waktu

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

12. Mengajarkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan selain ASI dan menjelaskan bahwa Allah Swt telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah :233

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

KUNJUNGAN NIFAS KE III**Tempat : Rumah Ny “H”****Tanggal : 08 Juli 2018****Jam : 10.00 WITA****DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan melahirkan 6 hari yang lalu tanggal 03 juli 2018 jam 10.30 WITA
2. Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari
3. ASI sudah lancar.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 110/80 mmHg
 - b. N : 80 x/menit
 - c. S : 36,6 °C
 - d. P : 20x/menit
4. Pemeriksaan Fisik terfokus
 - a. Wajah : tidak pucat, tidak oedema, tidak nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, sclera putih, conjungtiva merah muda
 - c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid dan limfe

- d. Payudara : simetris, terdapat hyperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ASI lancar
- e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU pertengahan symphysis dan pusat, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik.
- f. Genitalia : tidak terdapat jahitan pada perineum , tampak pengeluaran lochea sanguinolenta, masih memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi

ASSESSMENT (A)

P1A0 6 hari postpartum

PLANNING (P)

Tanggal 08 Juli 2018, jam 10.00 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja
 Hasil : ibu mengerti
2. Memberikan konseling kepada ibu tentang perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari, yakni :
 - a. Biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka dan tetap dijaga kebersihannya.
 - b. Jangan membirakan bayi bersentuhan dengan benda dingin, dan tetap menjaga lingkungan sekitar bayi tetap hangat
 - c. Mengganti popok bayi tiap kali basah (setelah BAB/BAK)

Hasil : ibu sudah mengerti

3. Mengajarkan ibu cara perawatan metode kanguru
 - a. Letakkan bayi dengan posisi tegak diantara payudara ibu, kontak kulit dada ke dada
 - b. Kepala bayi menghadap ke samping dengan posisi sedikit menengadah supaya jalan napas terbuka dan kontak mata dengan ibu
 - c. Panggul bayi seperti posisikatak
 - d. Ikat dengan kain dibawah telinga bayi, ikatan yangkencang dibagian punggung sedangkan bagian perut dilonggarkan supaya bayi dapat bernapas dengan baik
 - e. Sebaiknya perawat metodekanguru dilakukan kurang dari 60 menit
 - f. Anjurkan ibu untuk melakukan metode ini sampai berat badan bayi mencapai usia 2500 gram atau usia bayimencapai 40 minggu.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk minum setiap kali menyusui dan tetap meminum tablet zat besi untuk menambahkan zat gizi setidaknya 40 hari pasca postpartum.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

KUNJUNGAN NIFAS KE IV**Tempat : Rumah Ny “H”****Tanggal: 16 Juli 2018****Jam : 10.00 WITA****DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan melahirkan 2 minggu yang lalu tanggal 03 juli 2018 jam 10..30 WITA.
2. Ibu mengatan BAB 1 kali sehari dan BAK 5-6 kali sehari.
3. Ibu mengatakan tidak ada nyeri perut dan sekarang darah nifas ibu berwarna kuning keputihan.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 120/70 mmHg
 - b. N : 80 x/menit
 - c. S : 36,58 °C
 - d. P : 20 x/menit
4. Pemeriksaan fisik terfokus
 - a. Wajah : tidak pucat, tidakoedema, tidak nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, sclera putih, conjungtiva merah muda

- c. Payudara : simetris, terdapat hyperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ada pengeluaran ASI
- d. Abdomen : tidak ada luka bekas, TFU pertengahan symphysis dan pusat, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik.
- e. Genetalia : tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea serosa, tidak oedema, tidak ada varices
- f. Ekstremitas : simetris, tidak oedema, tidak ada varices, tidak nyeri tekan

ASSESSMENT (A)

P1A0 postpartum hari ke 14

PLANNING (P)

Tanggal 16 Juli 2018, jam 10.00 WITA.

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja

Hasil : ibu mengerti

2. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI sesering mungkin kepada bayinya

Hasil : ibu sudah mengerti

3. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi untuk pemulihan rahim dan menjaga kualitas produksi ASI

Hasil : ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Memberikan konseling tentang :

1. *Personal hygiene*

2. Perawatan payudara

3. Posisi dan teknik menyusui bayi yang benar

4. Posisi menyendawakan bayi setelah menyusui

Hasil : ibu sudah mengerti

6. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan shalat lima waktu

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan selain ASI dan menjelaskan bahwa Allah Swt telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah :233

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

KUNJUNGAN NIFAS KE V**Tempat : Rumah Ny “H”****Tanggal : 22 Juli 2018****Jam : 10.00 WITA****DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan melahirkan 3 minggu yang lalu tanggal 03 juli 2018 jam 10..30 WITA.
2. Ibu mengatan BAB 1 kali sehari dan BAK 5-6 kali sehari.
3. Ibu mengatakan tidak ada nyeri perut dan sekarang darah nifas ibu berwarna kuning keputihan.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV

TD : 110/80 mmHg

N : 80 x/menit

S : 36,8 °C

P : 20x/menit

4. Pemeriksaan Fisik terfokus

- a. Wajah : tidak pucat, tidak oedema, tidak nyeri tekan

- b. Mata : simetris, sclera putih, conjungtiva merah muda

- c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid dan limfe
- d. Payudara : simetris, terdapat hyperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ASI lancar
- e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU tidak teraba, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik.
- f. Genetalia : tidak terdapat jahitan pada perineum , tampak pengeluaran lochea alba, masih memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi
- g. Ekstremitas : simetris, tidak oedema, tidak ada varices, tidak nyeri tekan

ASSESSMENT (A)

P1A0, Postpartum hari ke 21

PLANNING (P)

Tanggal 22 Juli 2018, jam 10.00 WITA

1. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu baik-baik saja
Hasil : ibu dan keluarga mengerti
2. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya yaitu tiap 1-3 jam dan tidak memberikan makanan tambahan selain ASI
Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri, istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan metode kanguru

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menjelaskan kembali pada ibu untuk tetap membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap normal

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan shalat lima waktu

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan selain ASI dan menjelaskan bahwa Allah Swt telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah :233

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

KUNJUNGAN NIFAS KE VI**Tempat : Rumah Ny “H”****Tanggal : 28 Juli 2018****Jam : 09.00 WITA****DATA SUBJEKTIF (S)**

4. Ibu mengatakan melahirkan 4 minggu yang lalu tanggal 03 juli 2018 jam 10..30 WITA,
5. Ibu mengatan BAB 1 kali sehari dan BAK 5-6 kali sehari.
6. Ibu mengatakan tidak ada nyeri perut dan sekarang darah nifas ibu berwarna kuning keputihan.

DATA OBJEKTIF (O)

5. Keadaan umum ibu baik
6. Kesadaran komposmentis
7. Pemeriksaan TTV
 - a. TD : 110/80 mmHg
 - b. N : 80 x/menit
 - c. S : 36,8 °C
 - d. P : 20x/menit
8. Pemeriksaan Fisik terfokus
 - a. Wajah : tidak pucat, tidak oedema, tidak nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, sclera putih, conjungtiva merah muda

- c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid dan limfe
- d. Payudara : simetris, terdapat hyperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ASI lancar
- e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU tidak teraba, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik.
- f. Genetalia : tidak terdapat jahitan pada perineum , tampak pengeluaran lochea alba, masih memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi
- g. Ekstremitas : simetris, tidak oedema, tidak ada varices, tidak nyeri tekan

ASSESSMENT (A)

P1A0, Postpartum hari ke 28

PLANNING (P)

Tanggal 22 Juli 2018, jam 10.00 WITA

1. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu baik-baik saja
Hasil : ibu dan keluarga mengerti
2. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya yaitu tiap 1-3 jam dan tidak memberikan makanan tambahan selain ASI
Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya
3. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri, istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan metode kanguru

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menjelaskan kembali pada ibu untuk tetap membedong bayi agar suhu tubuh

bayi tetap normal

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Meanjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan shalat

lima waktu

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6

bulan tanpa makanan tambahan selain ASI dan menjelaskan bahwa Allah Swt

telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun

sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah :233

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

KUNJUNGAN BAYI KE 1**Tempat : Kamar bersalin****Tanggal: 03 Juli 2018****Jam : 10.30 WITA****IDENTITAS BAYI**

Nama : Bayi Ny "H"

TTL : RSUD Syekh Yusuf Gowa, 03 Juli 2018, jam 10.30 WITA

Anak ke : Pertama

Jenis kelamin : Laki-laki

IDENTITAS ORANG TUA

Nama : Ny. "H" / Tn. "A"

Umur : 26 tahun / 24 tahun

Nikah/lamanya : 1x / ± 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Petani

Alamat : Palompong

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, 03 Juli 2018, jam 10.30 WITA.
2. Hari pertama haid terakhir tanggal 06 November 2017

3. Ini merupakan anak pertama dan tidak pernah keguguran
4. Ibu dan keluarga senang atas kelahiran bayinya
5. Bayi belum BAB dan BAK
6. Usia kehamilan ibu saat melahirkan \pm 8 bulan
7. Ibu telah memberikan ASI kepada bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Usia kehamilan ibu saat melahirkan 34 minggu 1 hari
4. Hari tafsiran persalinan 13 Agustus 2018
5. Penilaian sepiantas segera setelah bayi lahir yaitubayi dalam keadaan segera menangis, bernapas tanpa kesulitan, badan bayi kemerahan, dan bergerak aktif
6. Penilaian *apgar score* yang dilakukan oleh bidan Masna dan Anna Safitri

Tabel 1.2. Penilaian APGAR score

Yang dinilai	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 5
<i>Appereance</i> (warna kulit)	Bayi biru, pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
<i>Pulse</i> (denyut jantung)	Tidak ada	<100 x/i	>100 x/i	2	2
<i>Grimace</i> (refleks)	Tidak ada	Merintih	Batuk bersin	2	2
<i>Activity</i> (tonus otot)	Tidak ada	Fleksi pada ekstremitas	Bergerak aktif	1	2
<i>Respiratory</i> (pernapasan)	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Menangis kuat	2	2

Nilai APGARscore : 8/10

Sumber: Data Primer

7. Pemeriksaan antropometri

- a. BB : 2400 gram
- b. PB : 45 cm
- c. LK : 31 cm
- d. LD : 30 cm
- e. LP : 30 cm
- f. LILA : 7 cm

8. Pemeriksaan tanda-tanda vital

- a. HR : 140 x/i
- b. P : 46 x/i
- c. S : 36,5⁰C

9. Pemeriksaan fisik

- a. Kulit : warna tubuh kemerahan, dan tidak icterus
- b. Kepala : distribusi rambut dipuncak kepala, tidak ada massa
- c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis tengah wajah dan simetris
- d. Mata : simetris, sklera tidak ikterik, konjungtiva merah muda, pupil bereaksi bila ada cahaya, refleks mengedip ada
- e. Telinga : posisi telinga berada garis lurus dengan mata, kulit tidak kendur, pembentukan tulang rawan yaitu pinna terbentuk dengan baik dan kokoh
- f. Hidung : posisi digaris tengah, nares utuh dan bilateral

- g. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah dan uvula digaris tengah, refleksmenghisap serta refleks rooting ada
- h. Leher : simetris, tiroid digaris tengah, nodus limfe dan massa tidak ada
- i. Dada : gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 46 x/i (normalnya 40-60 x/i),serta napas jernih, sama kedua sisi, frekuensi jantung 140 x/i, tidak ada peningkatan timpani pada lapang paru
- j. Payudara : jarak antar puting sejajar
- k. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat masih basah yang dijepit umbilical cord, abdomen lunak, tidak ada massa, bising usus ada
- l. Genetalia : penis lurus, meatus urinarius ditengah di ujung glans testis, dan skrotum penuh
- m. Anus : tampak lubang anus
- n. Ekstremitas : jari tangan dan jari kaki lengkap
11. Pemeriksaan usia gestasi dengan skala ballard yang dilakukan oleh bidan Masna
- a. Maturitas fisik
- | | |
|--------------------|-----|
| Kulit | : 3 |
| Lanugo | : 2 |
| Garis telapak kaki | : 2 |

Payudara : 2
 Mata/telinga : 2
 Genetali pria : 3

b. Maturitas neuromuscular

Postur : 2
 Jendela pergelangan tangan: 2
 Gerakan tangan membalik : 2
 Sudut popliteal : 2
 Tumit ke telinga : 2
 Total skor : maturitas fisik + neuromuscular
 : 15 + 10
 : 25
 Usia maturitas : 34 minggu

12. Pemeriksaan refleks

- a. Refleks morro (-) : tidak ada respon saat dikejutkan
- b. Refleks rooting (+) : ada respon mencari puting
- c. Refleks sucking (+) : ada respon ingin menghisap
- d. Refleks grafs (+) : ada respon ingin menggenggam
- e. Refleks plantar (-) : tidak ada respon ketika bagian bawah disentuh
- f. Refleks babynsky (-) : tidak ada respon ketika disentuh dan tidak menarik ke dalam.

13. Eliminasi

a. BAB : (-)

b. BAK : (-)

ASSESSMENT (A)

Bayi Ny “H” dengan BKB, KMK, SPT, BBLR, segera menangis, dengan antisipasi terjadinya asfiksia neonatorum dan hipotermi

PLANNING (P)

Tanggal 03 Juli 2018

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa berat badan lahir bayi ibu rendah yaitu 2400 gram sedangkan normalnya antara 2500 sampai 4000 gram, namun keadaan bayi baik-baik saja

Hasil: ibu mengerti

2. Mengeringkan badan bayi dan mengganti dengan dengan kain yang bersih dan kering

Hasil: tindakan telah dilakukan

3. Menilai pernapasan bayi apakah bayi bernapas dengan baik atau mengalami asfiksia

Hasil: bayi bernapas dengan baik yaitu 46 x/i

4. Memakaikan bayi pakaian bersih dan kering lalu membedong bayi agar terhindar dari hipotermi

Hasil: bayi telah dibedong

5. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6 bulan yaitu tidak memberikan makanan tambahan selain ASI minimal 6 bulan

Hasil: ibu mengerti serta bersedia melakukannya

6. Menjelaskan kepada ibu manfaat ASI yaitu:
 - a. ASI kaya akan zat penting yang dibutuhkan bayi seperti DHA, AA, omega 6, laktosa, protein, laktobasillus, vitamin A, kolostrum dan lemak yang semuanya dalam takaran dan komposisi yang pas untuk bayi
 - b. ASI memberikan kekebalan yang optimal pada bayi
 - c. ASI tidak basi dan selalu higienis serta lebih segar
 - d. Sebagai sarana mendekatkan ibu dan bayinya

Hasil: ibu mengerti

7. Mengajarkan ibu teknik perawatan tali pusat
 - a. Bersihkan dengan kasa steril yang telah dibasahi alcohol/air matang dimulai dari pangkal tali pusat sampai ujung, setelah itu biarkan kering dengan sendirinya
 - b. Tali pusat harus tetap dalam keadaan terbuka
 - c. Tali pusat tidak boleh diberi salep ataupun betadin
 - d. Usahakan popok ataupun celana bayi tidak mengenai tali pusat agar terhindar dari iritasi

Hasil :ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Menjelaskan pada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya bayi baru lahir yaitu:
 - a. Pernapasan sulit

- b. Suhu tubuh bayi $<36,5^{\circ}\text{C}/>37,5^{\circ}\text{C}$
- c. Bayi biru, pucat dan memar
- d. Rewel dan muntah
- e. Tali pusat merah, bengkak, serta keluar cairan berbau busuk dan bernanah
- f. Tidak BAB selama 3 hari dan tinja merah
- g. Tidak BAK dalam 24 jam
- h. Kejang dan menggigil

Anjurkan ibu untuk segera datang ke pelayanan kesehatan jika mengalami salah satu dari tanda bahaya tersebut

Hasil: ibu mengerti dan keluarga mengerti serta bersedia datang segera ke pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami salah satu dari tanda bahaya tersebut

9. Menganjurkan ibu untuk selalu membedong bayinya, agar suhu tubuh bayi tetap hangat karena bayi baru lahir sangat mudah kehilangan panas, jadi harus senantiasa dipakaikan baju, celana, kaos tangan dan kaki, dan dibedong.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Meminta izin kepada ibu untuk diberi bayinya salep mata dan vitamin K di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM (90°)

Hasil: ibu memberi izin, bayi telah diberi salep mata dan vitamin K

11. Setelah 1 jam pemberian vitamin K beritahu ibu bahwa bayinya akan di imunisasi hepatitis B di 1/3 laterah paha kanan bayi secara IM (90°)

Hasil: ibu bersedia dan bayinya telah mendapat imunisasi hepatitis B

KUNJUNGAN BAYI KE II

Tempat : Rumah Ny “H”

Tanggal : 08 Juli 2018

Jam : 10.30 WITA

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, 03 Juli 2018, jam 10.30 WITA
2. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan
3. ASI sudah lancar dan ibu rutin menyusui bayinya
4. Bayi BAB 2-3 kali sehari, BAK 5-6 kali sehari
5. Ibu selalu membedong bayinya
6. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
7. Ibu dan keluarga merasa sangat senang atas kelahiran bayinya
8. Bayi disusui tiap 1 sampai 3 jam

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Kesadaran composmentis
3. Bayi berumur 6 hari
4. Pemeriksaan TTV
 - a. HR : 132 x/i
 - b. P : 40 x/i
 - c. S : 36,6 °C

5. Pengukuran antropometri

a. BB : BBL : 2400 gram

BBS : 2420 gram

b. PB : PBL : 45 cm

PBS : 45cm

c. LILA : 7 cm

6. Pemeriksaan fisik

a. Kulit : warna tubuh kemerahan, dan tidak icterus

b. Kepala : distribusi rambut dipuncak kepala, tidak ada massa

c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis tengah wajah dan simetris

d. Mata : simetris, sklera tidak ikterik, konjungtiva merah muda, pupil bereaksi bila ada cahaya, refleks mengedip ada

e. Telinga : simetris, tidak ada serumen

f. Hidung : posisi digaris tengah, nares utuh dan bilateral

g. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah dan uvula digaris tengah, refleks menghisap serta refleks rooting ada

h. Leher : simetris, tiroid digaris tengah, nodus limfe dan massa tidak ada

- i. Dada : gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 46 x/i (normalnya 40-60 x/i),serta napas jernih, sama kedua sisi, frekuensi jantung 140 x/i, tidak ada peningkatan timpani pada lapang paru
 - j. Payudara : jarak antar puting sejajar
 - k. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat tampak kering yang dijepit umbilical cord, abdomen lunak, tidak ada massa, bising usus ada
 - l. Genetalia : penis lurus, meatus urinarius ditengah di ujung glans testis, dan skrotum penuh
 - m. Anus : tampak lubang anus
 - n. Ekstremitas : jari tangan dan jari kaki lengkap
7. Pemeriksaan refleks
- a. Refleks morro (+) : ada respon saat dikejutkan
 - b. Refleks rooting (+) : ada respon mencari puting
 - c. Refleks sucking (+) : ada respon ingin menghisap
 - d. Refleks grafs (+) : ada respon ingin menggenggam
 - e. Refleks plantar (+) : ada respon ketika bagian bawah disentuh
 - f. Refleks babynsky (+) : ada respon ketika disentuh menarik ke dalam.

ASSESMENT (A)

Bayi Ny "H" umur 6 hari

PLANNING (P)

Tanggal 03 Juli 2018

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa berat badan bayi mengalami peningkatan yaitu 2420 gram dan keadaan bayi baik-baik saja

Hasil: ibu mengerti

2. Mengajarkan ibu untuk tetap senantiasa membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi sehari-hari seperti:

- a. Jangan membiarkan bayi bersentuhan dengan benda dingin dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar bayi agar tetap hangat
- b. Mengganti popok bayi tiap kali basah atau pada saat BAB dan BAK
- c. Mengganti pakaian bayi tiap kali basah dan lembab
- d. Segera menghangatkan bayi dan mengeringkan badan bayi setelah dimandikan

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Mengajarkan ibu cara perawatan metode kanguru yaitu:
 - a. Anjurkan ibu untuk mencuci tangan sebelum melakukan perawatan
 - b. Anjurkan ibu untuk membersihkan daerah dada dan abdomen dengan kain waslap

- c. Anjurkan ibu untuk memakaikan bayiya kaos kaki dan topi pada saat perawatan metode kanguru
- d. Letakkan bayi dengan posisi tegak diantara kedua payudara ibu, kontak kulit dada ke dada
- e. Kepala bayi menghadap ke samping dengan posisi sedikit menengadahkan supaya jalan napas terbuka dan ada kontak mata dengan ibu
- f. Panggul bayi dalam posisi seperti katak
- g. Ikat dengan kain kanguru, ikatan yang kencang dibagian punggung sedangkan bagian perut dilonggarkan supaya bayi dapat bernapas dengan baik
- h. Perawatan kanguru dapat dilakukan oleh suami
- i. Perawatan kanguru dapat dilakukan setiap hari sekitar 1-2 jam
- j. Anjurkan ibu untuk melakukannya rutin sampai berat badan bayi mencapai minimal 2500 gram

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesering mungkin agar ASI lancar dan mempercepat kenaikan berat badan bayi

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

KUNJUNGAN BAYI KE III**Tempat : Rumah Ny “H”****Tanggal : 16 Juli 2018****Jam : 10.00 WITA****DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, 03 Juli 2018, jam 10.30 WITA
2. ASI lancar
3. Bayi BAB 2-3 kali sehari, dan BAK 5-6 kali sehari
4. Ibu selalu membedong bayinya
5. Ibu setiap hari melakukan perawatan metode kanguru selama 1 sampai 3 jam perhari
6. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
7. Bayi disusui tiap 1-3 jam

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Kesadaran composmentis
3. Bayi berumur 14 hari
4. Pemeriksaan TTV
 - a. HR : 132 x/i
 - b. P : 40 x/i
 - c. S : 36,6 °C

5. Pengukuran antropometri

- a. BB : BBL : 2400 gram
 BBS : 2445 gram
- b. PB : PBL : 45 cm
 PBS : 46cm
- c. LILA : lahir : 7 cm
 Sekarang : 8 cm

6. Pemeriksaan fisik

- a. Kulit : warna tubuh kemerahan, dan tidak icterus
- b. Kepala : distribusi rambut dipuncak kepala, tidak ada massa
- c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis tengah wajah dan simetris
- d. Mata : simetris, sklera tidak ikterik, konjungtiva merah muda, pupil bereaksi bila ada cahaya, refleks mengedip ada
- e. Telinga : simetris, tidak ada serumen
- f. Hidung : posisi digaris tengah, nares utuh dan bilateral
- g. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah dan uvula digaris tengah, refleksmenghisap serta refleks rooting ada
- h. Leher : simetris, tiroid digaris tengah, nodus limfe dan massa tidak ada

- i. Dada : simetris, frekuensi napas 42 x/i (normalnya 40-60 x/i),serta napas jernih, sama kedua sisi, frekuensi jantung 132 x/i
- j. Payudara : jarak antar puting sejajar
- k. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat sudah puput, abdomen lunak, tidak ada massa
- l. Genetalia : penis lurus, meatus urinarius ditengah di ujung glans testis, dan skrotum penuh
- m. Anus : tampak lubang anus
- n. Ekstremitas : jari tangan dan jari kaki lengkap

ASSESMENT (A)

Bayi Ny "H" umur 14 hari

PLANNING (P)

Tanggal 16 Juli 2018

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa berat badan bayi mengalami peningkatan yaitu 2420 gram dan keadaan bayi baik-baik saja
Hasil: ibu mengerti
2. Menganjurkan ibu untuk tetap senantiasa membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat
Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya
3. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesring mungkin untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi

Hasil: ibu mengerti dan bersedia

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan metode kanguru

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menjelaskan kembali kepada ibu mengenai pentingnya menjaga kebersihan baik ibu maupun bayinya dan tetap melakukan perawatan bayi sehari-hari

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara agar ASI lancar

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya.



KUNJUNGAN BAYI KE IV

Tempat : Rumah Ny “H”

Tanggal : 22 Juli 2018

Jam : 09.30 WITA

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Bayi ibu sudah berumur 21 hari
2. ASI lancar
3. Bayi BAB 2-3 kali sehari dan sudah BAK 5-6 kali sehari
4. Ibu selalu membedong bayinya
5. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
6. Ibu tiap hari melakukan perawatan metode kanguru
7. Bayi disusui tiap 1 sampai 3 jam

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Kesadaran composmentis
3. Bayi berumur 21 hari
4. Pemeriksaan TTV
 - d. HR : 132 x/i
 - e. P : 40 x/i
 - f. S : 36,6 °C

5. Pengukuran antropometri

- d. BB : BBL : 2400 gram
 BBS : 2475 gram
- e. PB : PBL : 45 cm
 PBS : 46 cm
- f. LILA : lahir : 7 cm
 Sekarang : 8 cm

6. Pemeriksaan fisik

- a. Kulit : warna tubuh kemerahan, dan tidak icterus
- b. Kepala : distribusi rambut dipuncak kepala, tidak ada massa
- c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis tengah wajah dan simetris
- d. Mata : simetris, sklera tidak ikterik, konjungtiva merah muda, pupil bereaksi bila ada cahaya, refleks mengedip ada
- e. Telinga : simetris, tidak ada serumen
- f. Hidung : posisi digaris tengah, nares utuh dan bilateral
- g. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah dan uvula digaris tengah, refleks menghisap serta refleks rooting ada
- h. Leher : simetris, tiroid digaris tengah, nodus limfe dan massa tidak ada

- i. Dada : simetris, frekuensi napas 40 x/i (normalnya 40-60 x/i),serta napas jernih, sama kedua sisi, frekuensi jantung 130 x/i
- j. Payudara : jarak antar puting sejajar
- k. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat sudah puput, abdomen lunak, tidak ada massa
- l. Genetalia : penis lurus, meatus urinarius ditengah di ujung glans testis, dan skrotum penuh
- m. Anus : tampak lubang anus
- n. Ekstremitas : jari tangan dan jari kaki lengkap

ASSESMENT (A)

Bayi Ny "H" umur 21 hari

PLANNING (P)

Tanggal 22 Juli 2018

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa berat badan bayi mengalami peningkatan yaitu 2475 gram dan keadaan bayi baik-baik saja
Hasil: ibu mengerti
2. Menganjurkan ibu untuk tetap senantiasa membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat
Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya
3. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesring mungkin untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi

Hasil: ibu mengerti dan bersedia

4. Mengajarkan ibu untuk tetap melakukan perawatan metode kanguru

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menjelaskan kembali kepada ibu mengenai pentingnya menjaga kebersihan baik ibu maupun bayinya dan tetap melakukan perawatan bayi sehari-hari

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Mengajarkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara agar ASI lancar

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya.



KUNJUNGAN BAYI KE V

Tempat : Rumah Ny “H”

Tanggal : 28 Juli 2018

Jam : 09.30 WITA

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Bayi ibu sudah berumur 28 hari
2. ASI lancar
3. Bayi BAB 2-3 kali sehari dan sudah BAK 5-6 kali sehari
4. Ibu selalu membedong bayinya
5. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
6. Ibu tiap hari melakukan perawatan metode kanguru
7. Bayi disusui tiap 1 sampai 3 jam

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Kesadaran composmentis
3. Bayi berumur 21 hari
4. Pemeriksaan TTV
 - g. HR : 132 x/i
 - h. P : 40 x/i
 - i. S : 36,6 °C

5. Pengukuran antropometri

- a. BB : BBL : 2400 gram
 : BBS : 2475 gram
- b. PB : PBL : 45 cm
 : PBS : 46 cm
- c. LILA : lahir : 7 cm
 : Sekarang : 8 cm

6. Pemeriksaan fisik

- a. Kulit : warna tubuh kemerahan, dan tidak icterus
- b. Kepala : distribusi rambut dipuncak kepala, tidak ada massa
- c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis tengah wajah dan simetris
- d. Mata : simetris, sklera tidak ikterik, konjungtiva merah muda, pupil bereaksi bila ada cahaya, refleks mencedip ada
- e. Telinga : simetris, tidak ada serumen
- f. Hidung : posisi digaris tengah, nares utuh dan bilateral
- g. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah dan uvula digaris tengah, refleksmenghisap serta refleks rooting ada

- h. Leher : simetris, tiroid digaris tengah, nodus limfe dan massa tidak ada
- i. Dada : simetris, frekuensi napas 40 x/i (normalnya 40-60 x/i),serta napas jernih, sama kedua sisi, frekuensi jantung 132 x/i
- j. Payudara : jarak antar puting sejajar
- k. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat sudah puput, abdomen lunak, tidak ada massa
- l. Genetalia : penis lurus, meatus urinarius ditengah di ujung glans testis, dan skrotum penuh
- m. Anus : tampak lubang anus
- n. Ekstremitas : jari tangan dan jari kaki lengkap

ASSESMENT (A)

Bayi Ny "H" umur 28 hari

PLANNING (P)

Tanggal 28 Juli 2018

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa berat badan bayi mengalami peningkatan yaitu 2500 gram dan keadaan bayi baik-baik saja

Hasil: ibu mengerti

2. Menganjurkan ibu untuk tetap senantiasa membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesring mungkin untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi

Hasil: ibu mengertidan bersedia

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatanmetode kanguru

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menjelaskan kembali kepada ibu mengenai pentingnya menjaga kebersihan baik ibu maupun bayinya dan tetap melakukan perawatan bayi sehar-hari

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara agar ASI lancar

Hasil: ibu mengerti da bersedia melakukannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang ketidaksesuaian antara teori terhadap tinjauan kasus yang terjadi pada Ny “H” dengan kasus persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018. Pembahasan akan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan menurut 7 langkah Varney meliputi pengkajian sampai evaluasi. Pembahasan dilakukan untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah dan kesimpulan dari tinjauan teori dengan kasus sehingga dapat digunakan sebagai tindak lanjut dalam penerapan asuhan kebidanan yang efektif dan efisien khususnya pada pasien ibu bersalin dengan persalinan preterm.

A. KALA I

1. Langkah I pengumpulan dan analisa data dasar

Teori mengatakan bahwa langkah 1 dilakukan dengan cara pengumpulan data dasar untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap untuk membuat kesimpulan tentang apakah kehamilan normal atau tidak. Rencana yang rasional untuk memantau persalinan dapat ditegakkan berdasarkan keadaan ibu. Jika tidak ditemukan kelainan ibu maka harus diyakini bahwa kehamilan ibu adalah masuk dalam kategori hamil normal.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan bahwa ibu masuk tanggal 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA dengan keluhan sakit perut tembus belakang sejak tanggal 02 Juli 2018, pukul 18.00 WITA

sifat nyeri hilang timbul, disertai pengeluaran darah dan lendir tanggal 03 Juli 2018, pukul 02.00 WITA, dan pelepasan air jam 03.00 WITA. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya, hari pertama haid terakhir tanggal 06 November 2017, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang 8 bulan, pergerakan janin pertama kali dirasakan sejak usia kehamilan \pm 4 bulan tepatnya bulan Maret 2018 sampai sekarang dan dominan terasa pada sebelah kanan perut ibu. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 8 kali di puskesmas Pabbentengan dan sudah mendapat suntik imunisasi TT sebanyak 2 kali di puskesmas Pabbentengan, ibu belum pernah menjadi akseptor KB dalam bentuk apapun, ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, asma, diabetes mellitus, jantung, dan penyakit serius lainnya.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa tanda-tanda persalinan yaitu adanya kontraksi uterus (his) yang menimbulkan rasa sakit diperut tembus belakang. Diagnosa dapat ditegakkan adanya tanda-tanda persalinan jika timbulnya kontraksi uterus disertai dengan pengeluaran lendir bercampur darah. Lendir ini berasal dari kanalis servikalis karena serviks mulai membuka dan mendatar, sedangkan pengeluaran darahnya disebabkan oleh robeknya pembuluh darah saat serviks membuka. Terkadang ibu hamil mengeluarkan air ketuban akibat pecahnya selaput ketuban menjelang persalinan. Jika ketuban sudah pecah,

maka ditargetkan persalinan dapat berlangsung dalam 24 jam (Elisabeth Siwi, 2014 : 15-20).

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold I TFU 3 jrapst 27 cm teraba bokong, Leopold II teraba puki, Leopold III didapatkan kepala, Leopold IV didapatkan bergeak dalam panggul (BDP) 4/5. Keadaan janin baik yang ditandai dengan terdengarnya DJJ dalam batas normal yaitu 140 x/i, lingkaran perut 85 cm, tafsiran berat janin 2295 gram, his 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 20-25 detik. Adapun hasil pemeriksaan dalam yang didapatkan pada tanggal 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA yaitu vulva dan vagina tidak ada kelainan, portio tebal, pembukaan 2 cm, ketuban pecah jernih, presentase uuk kiri lintang, penurunan Hodge I, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir, darah, dan air ketuban. Selanjutnya dilakukan observasi his, denyut jantung janin, nadi setiap 30 menit, tekanan darah dan suhu serta observasi kemajuan persalinan tiap 4 jam pada kala I.

Hasil pemeriksaan usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus Neagle, mulai dari HPHT sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 34 minggu 1 hari. Pada pemeriksaan abdomen, tampak adanya linea nigra yang menandakan ibu primigravida, terdapatnya DJJ dan

terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda pasti kehamilan (Prawirohardjo, 2014).

Tinggi fundus uteri merupakan pemeriksaan TFU yang dapat mendukung diagnosis persalinan preterm. Jika pembesaran uterus lebih kecil dari dugaan usia kehamilan normal, maka kemungkinan terjadi usia kehamilan lebih muda dari taksiran. Pada kasus Ny "H" didapatkan TFU 3 jrapst 27 cm.

Taksiran berat janin merupakan pemeriksaan untuk menentukan berat janin dengan cara lingkaran perut dikalikan dengan tinggi fundus uteri. Pada persalinan preterm berat janin antara 1000-2500 gram (Prawirohardjo, 2014 : 668). Pada kasus Ny "H" taksiran berat janin yang didapatkan 2295 gram.

Pada kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Pada saat palpasi teraba satu kepala satu punggung, satu bokong, terdengar satu jantung janin pada satu titik serta pergerakan janin pada salah satu sisi perut ibu. Dirasakan pergerakan janin kuat ± 10 kali dalam sehari dan pada saat auskultasi didengarnya denyut jantung janin merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin dalam keadaan baik ditandai dengan DJJ terdengar jelas dan teratur dengan frekuensinya antara 120-160 x/menit serta dapat dilihat dari pembesaran perut ibu menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014).

Pemeriksaan ultrasonografi merupakan suatu metode diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempelajari morfologi

dan fungsi suatu organ berdasarkan gambaran eko dari gelombang gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ. Penentuan usia kehamilan dilakukan berdasarkan tabel data atau nomogram yang menggambarkan hubungan antara ukuran biometri janin dan usia kehamilan pada kehamilan normal., pemeriksaan USG juga sangat penting bagi ibu dengan persalinan preterm apalagi yang disertai dengan ketuban pecah dini. Pecahnya selaput ketuban yang menjadi tanda awal terjadinya persalinan preterm serta pada pemeriksaan fisik menunjukkan telah terjadi pembukaan >2 cm serta penipisan 50-80% (Prawirohardjo, 2014). Pada kasus Ny”H” tidak dilakukan pemeriksaan USG karena keadaan yang tidak memungkinkan.

Persalinan kala I yang ditandai dengan adanya his atau kontraksi seperti sakit perut tembus belakang, his yang semakin kuat dan sering, mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks. Selain his, persalinan juga ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dari kanalis servikalis. Persalinan juga terjadi dapat disebabkan oleh pengeluaran cairan ketuban, meliputi adanya *bloody show*, peningkatan rasa sakit, perubahan bentuk serviks, pendataran serviks, pembukaan serviks (dilatasi), pengeluaran cairan yang banyak atau selaput ketuban yang pecah dengan sendirinya (Eka Puspita, 2014).

Pemeriksaan USG ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis khususnya pada kasus persalinan preterm dan ketuban pecah dini. Tindakan

yang dilakukan yaitu memantau kemajuan persalinan dengan mengobservasi his dan pembukaan serviks. Memberitahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan menjelaskan penyebab nyeri yang dirasakan ibu, mendampingi ibu selama proses persalinan, menganjurkan ibu untuk miring kiri atau kanan sebagai tehnik relaksasi atau dengan menarik napas lewat hidung dan menghembuskan lewat mulut, menganjurkan keluarga untuk memberi minum, support dan motivasi kepada ibu ketika tidak ada kontraksi, mengobservasi his, melakukan pemeriksaan dalam.

Selain itu pemberian memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dan keluarga agar tetap senantiasa berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT. agar diberikan kesabaran dan ketabahan hati serta kemudahan dalam proses persalinan, mengajarkan ibu untuk meneran ketika ada his, mneyiapkan peralatan persalinan.

2. Langkah II merumuskan diagnosa/ masalah aktual

Berdasarkan data subjektif dan data objektif pada kasus Ny “H” didapatkan diagnosis inpartu kala I fase laten dengan persalinan preterm. Sesuai teori fase laten dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap yaitu pembukaan 1-3 cm.

Persalinan preterm adalah persalinan yang beresiko karena usia kehamilan yang belum cukup yang dapat menyebabkan resiko terhadap bayinya karena maturitas organ bayi belum sempurna. Adapun

masalah- masalah yang dapat terjadi pada bayi preterm antara lain termoregulator, masalah paru, gastrointestinal, hati, ginjal (Anik dan Eka, 2013 :167-169).

Berdasarkan teori bahwa persalinan normal adalah persalinan yang terjadi antara umur 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat janin 2500sampai 4000 gram (Marmi, 2011: 5). Pada kasus Ny “H” usia kehamilannya 34 minggu 1 hari.

Masalah yang bisa muncul serta menjadi ancaman terjadinya persalinan preterm seperti pecahnya selaput ketuban, presentase janin rendah, adanya nyeri punggung bawah, perdarahan bercak, perasaan menekan daerah *serviks* serta terjadinya kontraksi yang berulang (2-3 kali dalam 10 menit). Demikian pada hasil pengamatan didapatkan keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Begitu juga pada saat pemeriksaan dalam, didapatkan cairan dan selaput ketuban sudah tidak ada lagi serta terjadi tanda-tanda infeksi (Eliza, dkk, 2017).

Diagnosis persalinan preterm dapat ditegakkan dengan pengukuran tinggi fundus uteri, normalnya pada persalinan aterm yaitu usia kehamilan 37-40 minggu tinggi fundus uteri 2 jari dibawah prosessus xypodeus, jika pembesaran uterus tidak sesuai dengan usia kehamilan maka kemungkinan usia kehamilan lebih muda. Pada kasus Ny “H” didapatkan tinggi fundus uteri 3 jrapst, hal ini menunjukkan usia kehamilan belum aterm jika dilihat berdasarkan pengukuran tinggi fundus uteri.

Meskipun usia kehamilan ibu belum aterm, peran bidan yaitu memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dan keluarga untuk tetap berdo'a dan berdzikir kepada Allah SWT. agar tetap merasa tenang dan siap dalam menghadapi persalinan. Bukan hanya ibu dan keluarga, dalam hal ini bidan juga senantiasa berdo'a sebelum melakukan tindakan agar asuhan yang diberikannya sesuai sehingga ibu dan keluarga merasa tenang.

3. Langkah III mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial

Teori mengatakan masalah potensial yang dapat terjadi pada persalinan preterm yaitu gawat janin, infeksi maternal, dan partus lama. Antisipasi apabila memungkinkan dilakukan pencegahan. Dalam mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul pada kala I. Masalah potensial yang bisa terjadi pada persalinan preterm yakni dikarenakan diabetes melitus, preeklampsia dan eklampsia, infeksi saluran kemih, polihidramnion, riwayat persalinan preterm sebelumnya, inkompetensi serviks, pemakaian obat-obatan, perokok berat, kelainan kongenital, hemoragi antepartum, solusio plasenta dan plasenta previa serta adanya ketuban pecah dini (Janet Medforth, 2014).

Berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapatkan pada kasus Ny "H" komplikasi yang terjadi adalah ketuban pecah dini. Terjadinya ketuban pecah dini menimbulkan komplikasi infeksi pada maternal dan

neonatal (infeksi intrapartum), persalinan prematur terjadi karena adanya kontraksi serta aktivitas prostaglandin meningkat sehingga terjadi kolagenase jaringan yang akhirnya ketuban tipis dan mudah pecah spontan, partus lama karena his berkurang dan ketuban sudah pecah mengakibatkan penurunan janin terhambat, infeksi pada masa nifas serta meningkatkan seksio caesarea.

Adanya infeksi jalan lahir karena jalan lahir terbuka, maka dapat terjadi infeksi pada ibu apabila terlalu sering dilakukan pemeriksaan dalam. Bukan hanya pada ibunya, akibat persalinan preterm bisa berpengaruh pada janinnya yaitu gawat janin. Gawat janin ditandai dengan DJJ dalam proses persalinan bervariasi dan tidak kembali normal dalam beberapa waktu setelah kontraksi. Terjadinya persalinan preterm karena disebabkan oleh beberapa akibat komplikasi tersebut (Budi rahayu, 2017). Pada kasus Ny "H" tidak ada data yang menunjukkan bahwa terjadi gawat janin karena DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 140 x/menit dan teratur setelah kontraksi.

Setelah menjelaskan pada ibu dan keluarga bahwa masalah-masalah yang dapat terjadi akibat dari persalinan preterm, maka bidan berperan untuk tetap memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dan keluarga agar tetap berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT. agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi dan memberikan pemahaman bahwa Allah tidak memberikan cobaan diluar batas kemampuan manusia. Oleh karena itu, ibu pasti bisa dan mampu melewati persalinannya dengan lancar

4. Langkah IV melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi

Pada langkah ini dilakukan jika ditemukan adanya diagnosa potensial atau masalah *emergency* sehingga membutuhkan tindakan segera atau tindakan kolaborasi. Berdasarkan penerapan dalam asuhan kebidanan pada Ny “H” tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera atau kolaborasi. Menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa berdoa dan berdzikir agar persalinannya dilancarkan.

5. Langkah V merencanakan asuhan yang komprehensif

Pada langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh dimana asuhan ini ditentukan oleh langkah sebelumnya. Jika terdapat diagnosa potensial maka dilakukan rencana asuhan sesuai dengan diagnosa. Berdasarkan teori pengelolaan selama persalinan preterm yaitu pemantauan terhadap keadaan ibu dan kesejahteraan janin, pemantauan kontraksi, pemberian antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi, pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru janin, istirahat dengan posisi miring kiri agar peredaran darah ke uterus tetap lancar, pemberian cairan dan memperhatikan kebutuhan energy (Prawirohardjo, 2014 : 674-675).

Pada kasus Ny “H” rencana asuhan yang diterapkan antara lain pemberian antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi, pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru janin, pemantauan denyut jantung

janin, his, nadi setiap 30 menit, tekanan darah, suhu, dan kemajuan persalinan tiap 4 jam atau tiap 2 jam jika ada indikasi.

Dalam penanganan persalinan preterm yang perlu diperhatikan adalah keadaan ibu yang meliputi nadi setiap 30 menit, tekanan darah dan suhu tiap 4 jam, pemantauan keadaan janin yang meliputi denyut jantung janin dan kontraksi uterus tiap 30 menit. Pemberian antibiotik diperlukan karena ketuban sudah pecah oleh karena itu diperlukan untuk mencegah terjadinya infeksi. Pemberian kortikosteroid diberikan untuk pematangan paru janin. Ibu disarankan untuk miring kiri agar peredaran darah lancar ke uterus dan ibu juga sudah tidak bisa berjalan karena ketuban yang sudah pecah. Selain itu juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi pada ibu. Selain itu memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dan keluarga sangat penting agar tetap tenang dalam menghadapi persalinannya yaitu dengan memperbanyak berdoa, berdzikir, istighfar, membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

Pemberian antibiotik pada persalinan preterm karena ketuban ibu sudah pecah ini diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi. Pemberian kortikosteroid yang bertujuan untuk pematangan paru janin. Pemberiannya dianjurkan pada kehamilan 24-34 minggu (Prawirohardjo, 2014 : 674).

Pemberian kortikosteroid pada persalinan preterm sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pemberian kortikosteroid bertujuan untuk pematangan paru pada janin yang dapat mengurangi angka

kesakitan dan kematian pada bayi baru lahir preterm (Yuniar, dkk, 2015 :25).

6. Langkah VI melaksanakan perencanaan

Rencana tindakan dibuat berdasarkan intervensi yang dibuat sebelumnya. Rencana tindakan yang dibuat sesuai dengan teori yaitu pemberian antibiotik, pemberian kortikosteroid, memantau his, DJJ, dan nadi setiap 30 menit, tekanan darah dan nadi setiap 4 jam, dan pemantauan kemajuan persalinan setiap 4 jam atau tiap 2 jam jika ada indikasi.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "H" didapatkan telah diberikan antibiotik, kortikosteroid, pemantauan DJJ, nadi, his setiap 30 menit, dimulai dari pukul 04.15 WITA, dilakukan pemeriksaan dalam pertama pada pukul 04.15 WITA didapatkan keadaan vulva dan vagina tidak ada kelainan, portio tebal, pembukaan 2 cm, ketuban pecah jernih, presentase uuk kiri lintang, penurunan hodge 1, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir, darah, dan air ketuban, dilanjutkan pemantauan his, DJJ, nadi setiap 30 menit dan tekanan darah dan suhu tiap 4 jam pada pukul 04.15 WITA sampai pukul 08.15 WITA.

Melakukan pemeriksaan dalam kedua pada pukul 08.15 WITA, didapatkan vulva dan vagina normal, portio tipis, pembukaan 7 cm, ketuban jernih, presentase uuk kiri depan, penurunan hodge III, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir, darah dan

air ketuban. Pemantauan his, DJJ, nadi setiap 30 menit dilanjutkan pada pukul 08.30 WITA sampai pukul 10.15 WITA. Kembali dilakukan pemeriksaan dalam pada pukul 10.15 WITA didapatkan vulva dan vagina normal, portio melesap, pembukaan 10 cm, ketuban kering, presentase uuk depan, penurunan hodge IV, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendi dan darah. Pada pukul 10.15 WITA pembukaan sudah lengkap dan ibu sudah siap untuk dipimpin meneran.

Pada kasus Ny “H” pemantauan dilakukan sesuai dengan teori yaitu pemantauan his, DJJ, dan nadi setiap 30 menit, tekanan darah dan suhu tiap 4 jam, dan pemantauan kemajuan persalinan tiap 4 jam atau 2 jam jika ada indikasi. Selain itu, ibu dan keluarga telah diberikan dukungan spiritual yaitu dengan memperbanyak berdo'a, berdzikir, istighfar, membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sangat penting agar tetap tenang dalam menghadapi persalinannya.

7. Langkah VII evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan data inpartu kala I fase aktif dengan pembukaan lengkap pada pukul 10.15 WITA, ibu merasa ada dorongan untuk meneran, ibu merasa ingin BAB, tampak tekanan pada anus, vulva membuka, DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/i,

his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik, dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Hasil evaluasi didapatkan bahwa pembukaan sudah lengkap pada pukul 10.15 WITA, perlangsungan kala I berlangsung normal tidak mengalami gangguan atau penyulit. Selain itu, ibu dan keluarga telah memperbanyak berdoa, berdzikir, istighfar, membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan merasa tenang dalam menghadapi persalinannya.

8. Pendokumentasian SOAP

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "H" didapatkan data subjektif bahwa ibu masuk tanggal 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA dengan keluhan sakit perut tembus belakang sejak tanggal 02 Juli 2018, pukul 18.00 WITA sifat nyeri hilang timbul, disertai pengeluaran darah dan lendir tanggal 03 Juli 2018, pukul 02.00 WITA, dan pelepasan air jam 03.00 WITA. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya, hari pertamahaid terakhir tanggal 06 November 2017, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang 8 bulan, pergerakan janin pertama kali dirasakan sejak usia kehamilan \pm 4 bulan tepatnya bulan Maret 2018 sampai sekarang dan dominan terasa pada sebelah kanan perut ibu. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 8 kali di puskesmas Pabbentengan dan sudah mendapat suntik imunisasi TT sebanyak 2 kali, ibu belum pernah menjadi akseptor KB dalam bentuk

apapun, ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, asma, diabetes mellitus, jantung, dan penyakit serius lainnya.

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold I TFU 3 jrapst 27 cm terba bokong, Leopold II terba puki, Leopold III didapatkan kepala, Leopold IV didapatkan bergeak dalam panggul (BDP) 4/5. Keadaan janin baik yang ditandai dengan terdengarnya DJJ dalam batas normal yaitu 140 x/i, lingkaran perut 85 cm, tafsiran berat janin 2295 gram, his 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 20-25 detik. Adapun hasil pemeriksaan dalam yang didapatkan pada tanggal 03 Juli 2018, pukul 04.15 WITA yaitu vulva dan vagina tidak ada kelainan, portio tebal, pembukaan 2 cm, ketuban pecah jernih, presentase uuk kiri lintang, penurunan Hodge I, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir, darah, dan air ketuban.

Assessment yaitu hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "H" ditegakkan diagnosa G1P0A0, gestasi 34 minggu 1 hari, situs memanjang, intauterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase laten, persalinan preterm dengan ketuban pecah dini.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan pendokumentasian untuk semua rencana tindakan, implementasi dan

evaluasi perencanaan berdasarkan *assessment* yang didapatkan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” telah dilakukan intervensi dan implementasi sesuai dengan teori dan hasil evaluasi inpartu kala I fase aktif dengan pembukaan 10 cm pada pukul 10.15 WITA, ibu mempunyai dorongan untuk meneran, terasa ingin BAB, dengan his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik, DJJ dalam batas normal, serta tanda-tanda vital dalam batas normal, serta telah diberikan dukungan spiritual pada ibu dan keluarga seperti memperbanyak istighfar, berdoa, berdzikir dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran agar tetap tenang dalam menghadapi persalinannya.

B. KALA II

1. Langkah I pengumpulan dan analisa data dasar

Pengkajian adalah mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap dari sumber yang berkaitan dengan keadaan pasien dan untuk mendapatkan informasi tersebut diperlukan anamnesis. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan data subjektif ibu merasakan adanya dorongan yang kuat untuk meneran dan ibu merasa ingin BAB. Sedangkan data objektif didapatkan perineum menonjol dan vulva, vagina dan anus membuka. DJJ tedengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/i, his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik, dilakukan pemeriksaan dalam pada pukul 10.15 WITA didapatkan vulva dan vagina normal, portio

melesap, pembukaan 10 cm, ketuban kering, presentase uuk depan, penurunan hodge IV, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir dan darah. Meskipun sakit perut tembus belakang ibu bertambah sakit tetap tetap berdoa, berdzikir dan istighfar agar persalinannya dilancarkan.

Teori mengatakan bahwa tanda dan gejala kala II yaitu ibu merasakan adanya dorongan untuk meneran, ibu merasakan adanya tekanan pada anus dan vagina, perineum menonjol, vulva dan anus membuka (Fitria Melina, 2014 : 7). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang telah dilakukan.

2. Langkah II merumuskan diagnosa atau masalah aktual

Pada langkah ini menginterpretasikan data dari hasil pengkajian yang sudah ada yang akhirnya ditegakkan dalam diagnosa dalam lingkup praktek kebidanan. Teori mengatakan bahwa tanda dan gejala kala II yaitu ibu merasakan adanya dorongan untuk meneran, ibu merasakan adanya tekanan pada anus dan vagina, perineum menonjol, vulva dan anus membuka (Fitria Melina, 2014 : 7).

Pada kasus Ny “H” didapatkan tanda dan gejala kala II yaitu ibu merasakan adanya dorongan yang kuat untuk meneran dan ibu ingin merasa BAB. Sedangkan data objektif didapatkan perineum menonjol dan vulva, vagina dan anus membuka. DJJ tedengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/i, his 5 kali

dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik, dilakukan pemeriksaan dalam pada pukul 10.15 WITA didapatkan vulva dan vagina normal, portio melesap, pembukaan 10 cm, ketuban kering, presentase uuk depan, penurunan hodge IV, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir dan darah. Meskipun sakit perut tembus belakang ibu bertambah sakit tetap berdoa, tenang, berdzikir dan istighfar agar persalinannya dilancarkan.

Diagnosis kala II dapat ditegakkan atas dasar hasil pemeriksaan dalam yang menunjukkan pembukaan serviks telah lengkap dan terlihat bagian kepala bayi pada vulva dengan diameter 5-6 cm.

3. Langkah III mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial

Pada penjelasan teori yang telah dijelaskan bahwa masalah potensial yang dapat terjadi pada persalihan preterm adalah pada bayinya yaitu asfiksia yang merupakan keadaan bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Hipotermia yaitu suhu tubuh bayi $<36,5^{\circ}\text{C}$ serta kaki dan tangan teraba dingin. Bayi berat badan lahir rendah yaitu berat badan bayi baru lahir yang kurang dari 2500 gram (Anik dan Eka, 2013 : 319-320).

Asfiksia adalah suatu keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, sehingga bayi tidak dapat memasukkan oksigen dan tidak dapat mengeluarkan zat asam arang dari tubuhnya (Vivian, 2010 : 102). Pada kasus Ny "H"

didapatkan bayi segera menangis dan bernapas tanpa kesulitan dengan *apgar score* 8/10, suhu 36,5 °C, berat badan lahir 2400 gram.

Hipotermi adalah keadaan dimana bayi mengalami penurunan suhu tubuh secara terus-menerus dibawah 35,5°C dengan gejala kedua kaki dan tangan teraba dingin, pernapasan lambat tidak teratur, bagian tubuh lainnya pucat, kulit mengeras, merah dan timbul oedema terutama pada punggung, kaki dan tangan (Ronald, 2011 : 47). Pada kasus bayi Ny “H” tidak mengalami hipotermi karena suhu tubuh bayi dalam batas normal yaitu 35,5°C.

Berat badan lahir rendah adalah bayi yang dilahirkan belum cukup umur dengan ciri-ciri yang dapat dilihat yaitu bayi tersebut memiliki berat badan rendah kurang dari 2500 gram (Anik dan Eka, 2013 :319). Pada kasus bayi Ny “H” berat badan lahir rendah yaitu 2400 gram, ini menandakan bahwa bayi Ny “H” lahir dengan BBLR.

Setelah menjelaskan pada ibu dan keluarga tentang masalah-masalah yang dapat terjadi akibat dari persalinan preterm, maka bidan memberikan dukungan spiritual pada ibu dan keluarga agar tetap bedoa, berdzikir, tenang, dan istighfar agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT.

4. Langkah IV melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi

Pada langkah ini dilakukan tindakan segera atau kolaborasi. Tindakan ini diambil berdasarkan indikasi yang ditemukan pada langkah

sebelumnya. Pada kasus Ny “H” tidak dilakukan kolaborasi dengan dokter anak karena pada saat bayi lahir bayi segera menangis dan bernapas tanpa kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa bayi tidak mengalami asfiksia.

Berdasarkan teori intervensi yang telah dilakukan pada persalinan preterm pada kala II yaitu, melihat tanda dan gejala kala II, siapkan alat pertolongan persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, menganjurkan ibu untuk tetap berdoa, berzikir, istighfar dan tetap tenang agar persalinannya dilancarkan, letakkan handuk bersih diatas perut ibu dan dibawah ibu, lakukan pimpinan meneranjika kepala telah membuka vulva 5-6 cm, periksa lilitan tali pusat, tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan, kemudian lanjut untuk melahirkan bahu depan dan belakang, setelah bahu bayi lahir lakukan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir jepit dan potong tali pusat, lakukan penilaian sepintas dan nilai *apgar score* serta *ballard score* bayi, letakkan bayi diatas perut ibu untuk inisiasi menyusui dini (IMD).

Pada kasus Ny “H” intervensi sesuai dengan teori karena bayi dalam keadaan segera menangis dan bernapas tanpa kesulitan, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

5. Langkah V merencanakan asuhan yang komprehensif

Berdasarkan teori intervensi yang telah dilakukan terhadap persalinan preterm pada kala II yaitu, melihat tanda dan gejalakala II, siapkan alat persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, ibu telah diberikan dukungan spiritual agar tetap tenang, berdoa, berdzikir, istighfar agar persalinannya dilancarkan, letakkan handuk bersih diatas perut ibu dan underpad dibawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah terlihat membuka vulva 5-10 cm, periksa lilitan tali pusat, tunggu kepala sampai melakukan putaran paksi luar secara spontan, kemudian lanjut melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah bahu lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir lakukan penilaian sepiantas dan penilaian *APGAR score* di menit pertama dan menit kelima, letakkan bayi diatas perut ibu untuk IMD. Pada kasus Ny “H” intervensi sesuai dengan teori yang ada, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

6. Langkah VI melaksanakan perencanaan

Implementasi yang dilakukan pada kasus Ny “H” sesuai dengan intervensi, berdasarkan data yang didapatkan pada kasus tersebut bahwa pembukaan lengkap pada pukul 10.15 WITA, portio melesap, ketuban kering, presentase ubun-ubun kecil kiri depan, penurunan hodge IV, milase tidak ada, penumbungan tidak ada, pelepasan darah dan lendir.

Alat dan bahan telah dipersiapkan dan telah dilakukan pimpinan meneran pada pukul 10.15 WITA, ibu senantiasa berdoa, istighfar, berdzikir, dan tenang selama pimpinan meneran dilakukan, bayi lahir tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA, bayi lahir segera menangis, bernapas tanpa kesulitan, badan bayi kemerahan dan bergerak aktif. Bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan lahir 2400 gram, panjang badan lahir 45 cm, nilai *ballard score* 25 dengan maturitas kehamilan 34 minggu.

7. Langkah VII evaluasi

Kala II berlangsung normal pada kasus Ny “H” dengan bayi lahir spontan pada tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA bayi lahir segera menangis, bernapas tanpa kesulitan, bada bayi kemerahan, dan bergerak aktif, berat badan lahir bayi 2400 gram, panjang badan lahir 45 cm berjenis kelamin laki-laki, dan tinggi fundus uteri setinggi pusat. Selama pimpinan meneran dilakukan ibu tetap tenang, berdoa, berdzikir dan istighfar agar persalinannya dilancarkan.

8. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan bahwa ada dorongan yang kuat untuk meneran, perasaan ingin BAB, sakit perut tembus belakaang bertambah kuat, dan adanya rangsangan emosional.

Data objektif yang meliputi data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan lainnya. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan denyut jantung janinterdengar jelas dankuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/i, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik, tampak perineum menonjol, vulva, vagina dan anus membuka, pada pemeriksaan dalam pada pukul 10.15 WITA didapatkan pembukaan lengkap, portio melelap, ketuban kering, presentase uuk depan, penurunan hodge IV, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, pelepasan darah dan lendir.

Assessment adalah hasil anamnesis data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi masalah/diagnosa, antisipasi masalah potensial dan perlunya tindakan segera. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “H” didapatkan *assessment* perlangsungan kala II, diagnosa potensial yang ditegaskan yaitu antisipasi terjadinya asfiksia, hipotermi dan berat bada lahir rendah.

Planning adalah tindakan asuhan atau implementasi dan evaluasi dari tindakan yang diberikan berdasarkan *assessment* yang ditegaskan. Berdasarkan penerapan kasus Ny “H” tindakan asuhan yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada dan mendapatkan hasil evaluasi kala II berlangsung dengan normal yaitu selama pimpinan meneran dilakukan ibu tetap tenang, berdoa, berdzikir dan istighfar agar persalinannya

dilancarkan. Bayi lahir spontan pada tanggal 03 juli 2018, pukul 10.30 WITA segera menangis, bernapas tanpa kesulitan, badan bayi kemerahan, bergerak aktif, berat badan lahir 2400 gram, panjang badan lahir 45 cm, berjenis kelamin laki-laki, tinggi fundus uteri setinggi pusat.

C. KALA III

1. Langkah I pengumpulan dan analisa data dasar

Berdasarkan teori yang telah didapatkan bahwa pada kala III persalinan, otot uterus (miometrium) berkontraksi mengikuti berkurangnya ukuran rongga uterus secara tiba-tiba setelah lahirnya bayi. Penyusutan rongga uterus atau berkurangnya ukuran tempat implantasi plasenta. Tanda-tanda terlepasnya plasenta mencakup perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, tali pusat memanjang, dan adanya semburan darah tiba-tiba. Pada kala III, otot uterus berkontraksi mengikuti penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta.

Karena tempat perlekatan semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka plasenta akan terlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina. Setelah janin lahir, uterus mengadakan kontraksi yang mengakibatkan penciutan permukaan kavum uteri, tempat implantasi plasenta. Akibatnya, plasenta akan lepas dari tempat implantasinya (Eka dan Kurnia, 2013 : 90-91).

Pada kasus Ny “H” didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri pada perut bagian bawah, ibu tetap senantiasa berdo'a, berdzikir, istighfar agar persalinannya dilancarkan, dari data objektif didapatkan tampak adanya semburan darah tiba-tiba, tali pusat semakin panjang, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat. Bidan telah memberikan dukungan spiritual pada ibu agar berdo'a dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT agar persalinannya dilancarkan.

2. Langkah II merumuskan diagnosa atau masalah aktual

Berdasarkan teori yang dijelaskan mengenai persalinan kala III dimulai segera setelah lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit dan kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar. Penerapan asuhan kebidanan pada kasus Ny “H” berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapatkan, maka dapat ditegakkan diagnosa yaitu perlangsungan kala III. Berdasarkan asuhan yang telah diberikan tentang dukungan spiritual maka ibu dalam keadaan tenang karena senantiasa berdo'a dan istigfar serta yakin bahwa Allah SWT akan memperlancar persalinannya.

3. Langkah III mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada kasus Ny “H” maka tidak ada indikasi atau masalah potensial yang dapat ditegakkan. Dilihat dari teori yang dijelaskan maka kala III menunjukkan dalam keadaan normal

yaitu proses pengeluaran plasenta tidak lebih dari 30 menit dan tidak ada penyulit.

4. Langkah IV melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada kasus Ny “H” maka tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera ataupun kolaborasi. Dilihat dari penjelasan teori bahwa proses pengeluaran plasenta berlangsung normal dan tidak ada penyulit. Berdasarkan asuhan yang telah diberikan tentang dukungan spiritual maka ibu dalam keadaan tenang karena senantiasa berdoa dan istigfar serta yakin bahwa Allah SWT akan memperlancar persalinannya.

5. Langkah V merencanakan asuhan yang komprehensif

Berdasarkan diagnosis pada kasus Ny “H” maka tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah dilakukan intervensi yang sesuai yaitu melakukan pemberian oksitosin, masase uterus, dan peregangan tali pusat terkendali. Pemberian oksitosin diberikan dalam 1 menit setelah bayi lahir. Namun harus dipastikan dengan memeriksa tinggi fundus uteri untuk memastikan bahwa kehamilan tunggal. Pemberian oksitosin yaitu di sepertiga lateral paha ibu secara IM yang bertujuan untuk membantu agar kontraksi uterus baik, untuk membantu lahirnya plasenta dan mengurangi kehilangan darah karena memperbaiki kontraksi uterus. Berdasarkan asuhan yang telah diberikan tentang dukungan spiritual

maka ibu dalam keadaan tenang karena senantiasa berdoa dan istigfar serta yakin bahwa Allah SWT akan memperlancar persalinannya.

6. Langkah VI melaksanakan perencanaan

Berdasarkan kasus Ny "H" telah dilakukan implementasi berdasarkan teori yaitu dengan melakukan pemberian oksitosin secara IM di sepertiga lateral paha ibu, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali sambil melakukan dorsocranial, setelah plasentalahir dilakukan masase uterus. Pelepasan dan pengeluaran plasenta berlangsung normal dan tidak ada penyulit yaitu berlangsung selama 10 menit lahir lengkap dengan kotiledon yaitu pukul 10.40 WITA, dengan perdarahan kurang lebih 200 cc. Berdasarkan asuhan yang telah diberikan tentang dukungan spiritual maka ibu dalam keadaan tenang karena senantiasa berdoa dan istigfar serta yakin bahwa Allah SWT akan memperlancar persalinannya.

7. Langkah VII evaluasi

Sebagaimana implementasi yang telah dilakukan pada Ny "H" didapatkan hasil pemeriksaan ibu dalam keadaan normal yang ditandai dengan kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, perdarahan kurang lebih 150 cc berarti dalam batas normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kala III berlangsung normal, serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

8. Pendokumentasian SOAP

Data subjektif yang meliputi pendokumentasian dengan pengumpulan data pasien dan informasi-informasi yang didapatkan dari hasil anamnesis, pada kasus Ny “H” didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri pada perut bagian bawah.

Data objektif yaitu data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Pada kasus Ny “H” didapatkan tanda-tanda pelepasan plasenta dengan adanya semburan darah tiba-tiba, tali pusat bertambah panjang, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.

Assessment yaitu hasil analisis dari data subjektif dan data objektif dalam suatu identifikasi masalah/diagnosa, antisipasi terjadinya masalah potensial, dan perlunya tindakan segera. Pada kasus Ny “H” ditegakkan diagnosa perlangsungan kala III.

Planning yaitu hasil dari tindakan asuhan yang diberikan dan evaluasi dari hasil yang telah dilakukan. Pada kasus Ny “H” telah dilakukan tindakan asuhan sesuai dengan teori yang ada, dan hasil evaluasi didapatkan plasenta lahir lengkap pukul 10.40 WITA, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tanda-tanda vital dalam batas normal, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan perdarahan kurang dari 150 cc.

D. KALA IV

1. Langkah I pengumpulan dan analisa data dasar

Pada kasus Ny “H” didapatkan data subjektif ibu telah lelah setelah persalinan, ibu senantiasa berdoa setelah bayinya lahir agar keadaannya dan bayi baik-baik dan data objektif plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, TFU setinggi pusat, tanda-tanda vital dalam batas normal. Berdasarkan teori yang dijelaskan pada kala IV hal-hal yang harus diperhatikan adalah kontraksi uterus baik, pemeriksaan serviks, vagina dan perineum yang berguna untuk mengetahui apakah ada robekan jalan lahir atau tidak, perlu juga diperhatikan adalah bahwa plasenta lahir lengkap dan tidak ada yang tersisa sedikitpun dalam uterus serta benar-benar dijamin tidak terjadi perdarahan berlanjut (Fitria Melia, 2014 : 8).

2. Langkah II merumuskan diagnosa atau masalah aktual

Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan pada kasus Ny “H” makadiagnosis yang dapat ditegakkan adalah perlangungan kala IV, hal ini sesuai dengan teori bahwa plasenta lahir lengkap pukul 10.40 WITA dan tanda-tanda vital dalam batas normal.

3. Langkah III mengidentifikasi masalah atau diagnose potensial

Pada kasus Ny “H” masalah potensial yang dapat terjadi adalah perdarahan postpartum. Berdasarkan teori pada kala IV disebut dengan kala pengawasan selama 2 jam postpartum, karena kala ini rentan terjadi

perdarahan postpartum, perdarahan biasanya terjadi karena lemahnya kontraksi uterus yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan setelah bayi dan plasenta lahir, selain itu penyebab lain adalah jika ada robekan di jalan lahir, dan tidak normalnya proses pembekuan darah bisa menjadi pemicu perdarahan postpartum. Setelah bidan menjelaskan masalah yang dapat terjadi pada kala pengawasan yaitu perdarahan maka diberikan asuhan pada ibu agar tetap tenang dan berdoa, berdzikir pada Allah SWT. agar persalinannya dilancarkan dan ibu serta bayi dalam keadaan normal.

4. Langkah IV melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi

Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau tindakan kolaborasi, hal ini sesuai dengan teori berdasarkan data yang didapatkan bahwa kala IV berlangsung normal yaitu kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

5. Langkah V merencanakan asuhan yang komprehensif

Pada kasus Ny "H" intervensi yang dilakukan pada kala ini yaitu memantau tanda-tanda vital ibu, pemantauan kontraksi uterus, pemantauan perdarahan, tinggi fundus uteri, dan kandung kemih ibu. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua. Selain itu, dilakukan pemantauan suhu 1 kali tiap jam. Setelah pemantauan kala IV selesai, ibu dipindahkan ke ruangan nifas. Teori

menjelaskan bahwa sebagian besar kematian ibu pada periode pasca persalinan terjadi pada 6 jam pertama setelah persalinan, kematian ibu disebabkan oleh infeksi, dan perdarahan. Oleh karena itu, pemantauan selama 2 jam postpartum sangat penting dilakukan serta dukungan spiritual sangat penting diberikan pada ibu seperti berdoa, berdzikir, dan tetap tenang. Jika ibu stress maka akan memperburuk keadaan ibu dan kontraksi uterus tidak baik jika mengalami stres.

6. Langkah VI melaksanakan perencanaan

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah implementasi sesuai dengan teori. Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny “H” implementasi yang dilakukan yaitu memantau tanda-tanda vital ibu setiap 15 menit pada jam pertama yaitu pukul 10.55 WITA sampai 11.40 WITA dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kandung kemih ibu kosong, serta perdarahan kurang 30-40 cc, selanjutnya melakukan pemantauan setiap 30 menit pada jam kedua yaitu pukul 12.10 WITA sampai 12.40 WITA didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, kandung kemih ibu kosong, TFU 1 jari bawah pusat, serta perdarahan 10-20 cc. memberikan dukungan spiritual pada ibu seperti sholat, berdoa, berdzikir agar tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT baik dirinya maupun bayinya, keadaan bayi baik dengan pernapasan serta suhu dalam batas normal, selanjutnya mendokumentasikan hasil

pemantauan kedalam partograf. Setelah itu ibu dipindahkan keruangan nifas.

7. Langkah VII evaluasi

Pada kasus Ny”H” didapatkan kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih ibu kosong, jumlah perdarahan kurang lebih 290 cc, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemantauan kala IV berlangsung normal dan tidak ada penyulit serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek. Sementara itu, selama kala IV berlangsung, ibu senantiasa tenang, berdoa, berdzikir agar persalinannya berlangsung normal.

8. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yaitu data yang diperoleh dari pasien dengan cara pengumpulan data dari pasien melalui anamnesis. Berdasarkan kasus Ny “H” didapatkan bahwa ibu merasa kelelahan setelah persalinan, ibu senantiasa berdoa dan berdzikir agar persalinannya dilancarkan.

Data objektif merupakan hasil dari pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjanglainnya yang dilakukan yang didapatkan oleh petugas kesehatan, didapatkan data kala IV berlangsung normal kurang lebih 10menit, plasenta lahir lengkap dan selaput utuh, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat

dengan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, ibu tampak tenang dan bahagia.

Assessment adalah hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosis/masalah yang terjadi,antisipasi diagnosis/masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Berdasarkan kasus Ny “H” maka *assessment* yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV.

Planning yang meliputi tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assessment* yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan implementasi yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi yaitu ibu dalam keadaan baik, yang ditandai dengan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

E. Kunjungan Nifas dan Bayi

1. Kunjungan Nifas

a) Kunjungan Nifas I tanggal 03 Juli 2018, pukul 13.00 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan bahwa ibu mengeluh nyeri pada abdomen sejak 2 jam yang lalu , ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA dengan jenis kelamin laki-laki, ibu pertama kali

menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan, ibu belum BAB dan sudah BAK.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU 1 jrbst, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea rubra ± 70 cc, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan terpasang infus RL 24 tetes/menit di lengan sebelah kiri ibu.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "H" didapatkan assessment Ny "H" PIAO postpartum haripertama dengan nyeri abdomen.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assesement* yang didapatkan. Pada kasus Ny "H" telah dilakukan intervensi dan evaluasi seperti telah dijelaskan kepada ibu penyebab nyeri, telah diajarkan cara masase uterus, telah melakukan mobilisasi dini, telah dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif, telah diberikan konseling pendidikan kesehatan, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat

b) Kunjungan nifas II tanggal 04 Juli 2018, pukul 08.30 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan bahwa ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA, ibu sudah BAB dan sudah BAK, ASI sudah lancar.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU 1 jrbst, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea rubra \pm 70 cc, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan assessment Ny “H” PIAO postpartum hari ke 6.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assesement* yang didapatkan. Pada kasus Ny “H” telah diajarkan cara masase uterus, telah melakukan mobilisasi dini, telah dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif, telah diberikan konseling pendidikan kesehatan, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat

c) Kunjungan nifas III tanggal 08 Juli 2018, pukul 10.00 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan bahwa ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA, ibu BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari, ASI sudah lancar.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU pertengahan simfisis, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran sanguilenta, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan *assessment* Ny “H” PIAO postpartum hari ke 6.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assesement* yang didapatkan. Pada kasus Ny “H” telah diajarkan cara perawatan tali pusat, telah diajarkan cara perawatan metode kanguru, telah dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif dan sesering mungkin, telah diberikan konseling pendidikan

kesehatan, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat.

d) Kunjungan nifas IV tanggal 16 Juli 2018, pukul 10.00 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan bahwa ibu melahirkan 2 minggu yang lalu di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA, ibu BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari, ASI sudah lancar, tidak ada nyeri pert dan sekarang darah nifas ibu berwarna kuning keputihan.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU pertengahan simfisis dan pusat, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran serosa, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan assessment Ny “H” PIAO postpartum hari ke 14.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assesement* yang didapatkan. Pada kasus Ny “H” telah

diajarkan cara perawatan tali pusat, telah diajarkan cara perawatan metode kanguru, telah dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif dan sesering mungkin, telah diberikan konseling pendidikan kesehatan, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat.

e) Kunjungan nifas V tanggal 22 Juli 2018, pukul 10.00 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "H" didapatkan bahwa ibu melahirkan 2 minggu yang lalu di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA, ibu BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari, ASI sudah lancar, tidak ada nyeri pert dan sekarang darah nifas ibu berwarna kuning keputihan.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU tidak terabot, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran serosa, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "H" didapatkan *assessment* Ny "H" PIAO postpartum hari ke 21.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assesement* yang didapatkan. Pada kasus Ny “H”, telah diajarkan cara perawatan metode kanguru, telah dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif dan sesering mungkin, telah diberikan konseling pendidikan kesehatan, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat.

f) Kunjungan nifas VI tanggal 28 Juli 2018, pukul 10.00 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan bahwa ibu melahirkan 2 minggu yang lalu di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA, ibu BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari, ASI sudah lancar, tidak ada nyeri pert dan sekarang darah nifas ibu berwarna kuning keputihan.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU tidak terabot, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran alba, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan *assessment* Ny “H” PIAO postpartum hari ke 28.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assesement* yang didapatkan. Pada kasus Ny “H”, telah diajarkan cara perawatan metode kanguru, telah dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif dan sesering mungkin, telah diberikan konseling pendidikan kesehatan, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat.

2. Kunjungan bayi

a) Kunjungan bayi I tanggal 03 Juli 2018, pukul 10.30 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, HPHT tanggal 06 November 2017, ini merupakan anak pertama, ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan, bayi belum BAB dan BAK.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum bayi baik, kesadaran composmentis, usia kehamilan saat dilahirkan 34 minggu 1 hari, penilaian sepintas setelah bayi lahir yaitu bayi dalam

keadaan segera menangis, bernapas tanpa kesulitan, badan bayi kemerahan dan bergerak aktif, *apgar score* 8/10, pengukuran antropometri BB 2400 gram, PB 45 cm, LK 31 cm, LD 30 cm, LP30 cm, LILA 7 cm, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal, pemeriksaan usia gestasi dengan skala ballard usia maturitas didapatkan 34 minggu, pemeriksaan refleks didapatkan *morro* negatif, *rooting* positif, *sucking* positif, *grafs* positif, *plantar* negatif, *babynsky* negatif.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan *assessment* Bayi Ny “H” dengan BKB, KMK, SPT, BBLR, segera menangis, dengan antisipasi terjadinya asfiksianeonatorum dan hipotermi.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assesement* yang didapatkan. Pada kasus bayi Ny “H” telah dilakukan intervensi dan evaluasi seperti telah dijelaskan kepada ibu hasio pemeriksaan, badan bayi telah dikeringkan, telah memantau pernapasan bayi didapatkan bayi bernapas dengan baik, telah dipakaikan pakaian bersih dan kering dan bayi telah dibedong, telah dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif, telah dijelaskantanda bahaya bayi baru lahirtelah diberikan konseling

pendidikan kesehatan, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat, telah diberi salep mata, vitamin K dan imunisasi hepatitis B.

b) Kunjungan bayi II tanggal 08 Juli 2018, pukul 10.30 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, ibu menyusui bayinya tiap 1-3 jam ,ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan, bayi sudah BAB dan BAK, bayi ibu tidak rewel

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum bayi baik, kesadaran composmentis, bayi berumur 6 hari, TTV dalam batas normal, pengukuran antropometri BBS 2420 gram, PB 45 cm, LILA 7 cm, pemeriksaan fisik dalam batas normal, pemeriksaan refleks didapatkan *morro* positif, *rooting* positif, *sucking* positif, *grafs* positif, *plantar* positif, *babynsky* negatif.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan *assessment* Bayi Ny “H” umur 6 hari.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan

berdasarkan *assesement* yang didapatkan. Pada kasus bayi Ny “H” telah dilakukan intervensi dan evaluasi seperti telah dijelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan, telah diberikan konseling tentang perawatan bayi sehari-hari dan ibu telah mengerti dan telah merawat bayinya sesuai yang dijelaskan bidan, telah mengajarkan ibu perawatan metode kanguru, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat, ibu telah menyusui bayinya secara eksklusif.

c) Kunjungan bayi III tanggal 16 Juli 2018, pukul 10.00 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, ibu menyusui bayinya tiap 1-3 jam ,ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan, bayi sudah BAB dan BAK, bayi ibu tidak rewel, ibu melakukan perawatan metode kanguru setiap hari dibantu oleh suami dankeluarga lainnya.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum bayi baik, kesadaran composmentis, bayi berumur 14 hari, TTV dalam batas normal, pengukuran antropometri BBS 2445 gram, PBS 46 cm, LILA 8 cm, pemeriksaan fisik dalam batas normal,

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan *assessment* Bayi Ny “H” umur 14 hari.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assessment* yang didapatkan. Pada kasus bayi Ny “H” telah dilakukan intervensi dan evaluasi seperti telah dijelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan, telah diberikan konseling tentang perawatan bayi sehari-hari dan ibu telah mengerti dan telah merawat bayinya sesuai yang dijelaskan bidan, ibu telah melakukan perawatan metode kanguru, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat, ibu telah menyusui bayinya secara eksklusif.

d) Kunjungan bayi IV tanggal 22 Juli 2018, pukul 09.30 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, ibu menyusui bayinya tiap 1-3 jam, ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan, bayi sudah BAB dan BAK, bayi ibu tidak rewel, ibu melakukan perawatan metode kanguru setiap hari dibantu oleh suami dan keluarga lainnya.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum bayi baik, kesadaran composmentis, bayi berumur 21 hari, TTV dalam batas normal, pengukuran antropometri BBS 2475 gram, PBS 46 cm, LILA 8 cm, pemeriksaan fisik dalam batas normal,

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan *assessment* Bayi Ny “H” umur 21 hari.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assesment* yang didapatkan. Pada kasus bayi Ny “H” telah dilakukan intervensi dan evaluasi seperti telah dijelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan, telah diberikan konseling tentang perawatan bayi sehari-hari dan ibu telah mengerti dan telah merawat bayinya sesuai yang dijelaskan bidan, ibu telah melakukan perawatan metode kanguru, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat, ibu telah menyusui bayinya secara eksklusif.

e) Kunjungan bayi V tanggal 28 Juli 2018, pukul 10.00 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 03 Juli 2018, ibu menyusui bayinya tiap 1-3 jam , ibu pertama kali menyusui bayinya

saat IMD yang dibantu oleh bidan, bayi sudah BAB dan BAK, bayi ibu tidak rewel, ibu melakukan perawatan metode kanguru setiap hari dibantu oleh suami dan keluarga lainnya.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum bayi baik, kesadaran composmentis, bayi berumur 21 hari, TTV dalam batas normal, pengukuran antropometri BBS 2500 gram, PBS 47 cm, LILA 8 cm, pemeriksaan fisik dalam batas normal,

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” didapatkan *assessment* Bayi Ny “H” umur 28 hari.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan *assessment* yang didapatkan. Pada kasus bayi Ny “H” telah dilakukan intervensi dan evaluasi seperti telah dijelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan, telah diberikan konseling tentang perawatan bayi sehari-hari dan ibu telah mengerti dan telah merawat bayinya sesuai yang dijelaskan bidan, ibu telah melakukan perawatan metode kanguru, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat, ibu telah menyusui bayinya secara eksklusif

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan studi kasus manajemen asuhan kebidanan intranatal pada Ny “H” dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny “H” dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018. Pada kasus Ny”H” didapatkan data dasar dengan usia kehamilan 34-36 minggu dan adanya pengeluaran darah,lendir dan air ketuban.
2. Telah dilaksanakan perumusan untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosa atau masalah aktual pada Ny “H” dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018.
3. Telah dilakukan perumusan untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosa atau masalah potensial pada Ny”H” dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018.
4. Telah dilakukan identifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi pada Ny “H” dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018.
5. Telah dilakukan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “H” dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018.

6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “H” dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 dengan hasil semua tindakan dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya hambatan.
7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny “H” dengan persalinan preterm di RSUD syekh Yusuf Gowa tahun 2018 dengan hasil tidak ada kesenjangan antara studi kasus dan tinjauan pustaka.
8. Telah dilakukan pendokumentasian semua hasil asuhan kebidanan pada Ny “H” dengan persalinan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 dalam bentuk SOAP.
9. Telah diintegrasikannya nilai-nilai keislaman kepada Ny “H” dengan persalinan preterm.

B. SARAN

Berdasarkan dampak yang dapat ditimbulkan dari persalinan preterm maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi penulis

Lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terutama dalam memberikan asuhan kebidanan intranatal dengan persalinan preterm.

2. Bagi profesi

Mengharapkan agar dapat lebih meningkatkan pelayanan baik dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat maupun dalam memberikan asuhan kebidanan secara menyeluruh khususnya bagi ibu dengan persalinan preterm, sehingga dapat mengurangi resiko serta komplikasi yang dapat terjadi.

3. Bagi institusi

a. Pendidikan

Diharapkan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan baik secara teori maupun praktik, agar mahasiswa lebih menguasai penanganan dan pertolongan persalinan patologi khususnya persalinan preterm.

b. Rumah sakit

Diharapkan meningkatkan mampu meningkatkan mutu pelayanan baik dari segi penyediaan sarana dan prasarana maupun sistem pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan meminimalisir terjadinya keterlambatan pelayanan dan penanganan kasus patologi, yang dapat menyebabkan resiko terjadinya komplikasi dan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2014
- Dutton, Lauren A. *Rujukan Cepat kebidanan*. Jakarta : EGC, 2012.
- Eliza, dkk. Determinan Persalinan Prematur di RSUD Dr. Abdul Moeloek. *Jurnal Kesehatan*, Volume VIII, Nomor 2, Agustus 2017. Diakses pada tanggal 18 Maret 2018.
- Ermalena, *Indikator Kesehatan SDGs di Indonesia*. Balai Kartini, 2017. Diakses pada tanggal 02 April 2018.
- Eniyati & Melisa Putri. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Handayani. *Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2012.
- Hapsari, Ririn. *Agenda 2030 2015*. Jakarta : Rutgers WPF Indonesia, 2015. Diakses pada tanggal 02 April 2018.
- Janet, Medforth, dkk. *Kebidanan Oxford*. Jakarta: EGC, 2014
- Kennedy, Betsy B dkk. *Manajemen Intrapartum*. Jakarta : EGC, 2014.
- Kuswanti, Ina & Fitria. *ASKEB II Persalinan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Marmi. *Intranatal Care Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Maryuni, Anik & Eka Puspita. *Asuhan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal*. Jakarta : Trans Info Media, 2013.
- Moegni Endy M, dkk. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2013.
- Nanny Vivian. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Salemba Medika :2014.
- Ningrum Widyah, dkk. *Hubungan Umur, Paritas dan Kejadian Anemia dengan Kejadian Persalinan Prematur di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2016*. *Dinamika Kesehatan*, Vol. 8 No. 1, Juli 2017. Diakses tanggal 17 Maret 2018.
- Oxorn, Harry dan William R. For. *Ilmu Kebidanan Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.

- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.
- Profil Kesehatan Kabupaten Gowa. Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2017.
- Profil Kesehatan Sulawesi Selatan. Makassar: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017.
- Puspita, Eka & Kurnia Dwi. *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jakarta : Trans Info Media, 2014.
- Rengganis Noviana, dkk. *Rasio Prevalensi Anemia Ibu Bersalin Terhadap Kejadian Persalinan Preterm di RSUD Wonosari Tahun 2016*. Jurnal Teknologi Kesehatan, Volume 13, Nomor 2, September 2017. Diakses tanggal 17 Maret 2018.
- Ronald. *Pedoman Perawatan Balita*. Bandung : CV Nuansa Aulia, 2011.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah volume 8*. Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah volume 11*. Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Siwi Walyani, dkk. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Trans Info Media, 2013.
- Tresnawati, Frisca. *Asuhan kebidanan*. Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2013.
- UCSF. *Preterm Birth is Now Leading Cause of Death in Young Children Globally 2014*. University of California, San Fransisco. Diakses pada tanggal 17 Maret 2018.
- Wibowo Tunjung, dkk. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial*. Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2010. Diakses tanggal 21 Mei 2018.
- World Health Organization (WHO). *World Health Statistics*. 2015. Diakses tanggal 26/03/2018.
- Yeyeh Ai, dkk. *Asuhan Kebidanan II*. Jakarta : Trans Info Media, 2014.






DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata – Gowa Telp. 824835 Fax. 424836


PARTOGRAF

No. Register : 5071067 Nama Ibu : Ny "H" Umur : 26 tahun G I P 0 A 0
No. Puskesmas : Tanggal : 03 Juli 2018 Jam : 04-15 WITA Alamat : Palompong
Ketuban pecah : Sejak jam 03:00 WITA mules sejak jam 10:00 WITA



Oksidasi UJI tetes/menit

Obat dan Cairan IV : Insus RL 20 TPM + injeksi cefotaxime 1 gr / 12 jam / IV De xmetaspor 1 amp / 6 jam / IM



Suhu C : 38

Urin : Protein : Aseton : Volume : +100 cc

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal : 03 Juli 2018
2. Nama bidan :
3. Tempat Persalinan :
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindes Rumah Sakit
 Klinik Swasta Lainnya
4. Alamat tempat persalinan : Dr. Wahidin Sudirokusodo
5. Casakan : rujuk, kala : I/II/III/IV
6. Alasan merujuk :
7. Tempat rujukan :
8. Pendamping pada saat merujuk :
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : Ya Tidak
10. Masalah lain, sebutkan :
11. Penatalaksanaan masalah tsb :
12. Hasilnya :

KALA II

13. Episiotomi :
 Ya, Indikasi
 Tidak
14. Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
15. Gawat Janin :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 Tidak
16. Distosia bahu :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 Tidak
17. Masalah lain, sebutkan :
18. Penatalaksanaan masalah tersebut :
19. Hasilnya :

KALA III

20. Lama kala III : 10 menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U/m ?
 Ya, waktu : 1 menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 Ya, alasan
23. Pepegangan tali pusat terkendak ?
 Ya
 Tidak, alasan

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Ghb	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	10-15 WIB	110/70 mmHg	80 x/1	36,5°C	STP	Baik	Kosong	± 40 ml
	11-10 WIB	120/70 mmHg	84 x/1		STP	Baik	Kosong	± 60 ml
	11-25 WIB	110/80 mmHg	80 x/1		STP	Baik	Kosong	± 50 ml
	11-40 WIB	120/80 mmHg	80 x/1		STP	Baik	Kosong	± 50 ml
2	12-10 WIB	120/70 mmHg	84 x/1	36,5°C	1 distst	Baik	Kosong	± 40 ml
	13-40 WIB	120/70 mmHg	80 x/1		1 distst	Baik	Kosong	± 30 ml

- Masalah kala IV : Tidak ada
- Penatalaksanaan masalah tersebut :
- Hasilnya :

24. Masege fundus uteri ?
 Ya
 Tidak, alasan
25. Plasenta lahir lengkap (intact) Ya Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya Tidak
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
27. Laserasi :
 Ya, dimana
28. Jika laserasi perineum, derajat : 1/2/3/4
 Tindakan :
 Perjahitan, dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan
29. Atoni uteri :
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
 Tidak
30. Jumlah perdarahan : ± 350 ml
31. Masalah lain, sebutkan :
32. Penatalaksanaan masalah tersebut :
33. Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badan : 2.400 gram
35. Panjang : 45 cm
36. Jenis kelamin : P / L
37. Penilaian bayi baru lahir : Baik / ada penyulit
38. Bayi lahir :
 Normal, tindakan :
 mengeringkan
 menghangatkan
 rangsang taktil
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspiksia ringan/pucat/biru/lemas, tindakan :
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 rangsang taktil menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan
39. Pemberian ASI :
 Ya, waktu : jam setelah bayi lahir
 Tidak, alasan
40. Masalah lain, sebutkan :
- Hasilnya :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : J. Sultan Alauddin No. 63 Tolo, J0411384924 Fax, J04111804923 Samata-Gowa
 Kampus II : Jl. HR. Yasin Lingsar No. 36 Tello, J04113841879 Fax, J041118271630 Samata-Gowa

Nomor : B-616 /FKK/PP.00.9/ 04 /2018

Gowa, 4 April 2018

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Kepada Yth,
Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa

di
 Tempat

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Anna Safitri
 NIM : 70400115006
 Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny¹ Dengan Persalinan Preterm,
 Tempat Penelitian : RSUD Syekh Yusuf Gowa

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan Data Awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam
 An. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
 Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan:
 - Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8228/S.01/PTSP/2018
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1957/FKIK/PP.99.9/0/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa / peneliti dibawah ini

Nama : ANNA SAFITRI
 Nomor Pokok : 70400115006
 Program Studi : Kebidanan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Sungguminasa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY - " DENGAN PERSALINAN PRETERN DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2018 "

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. 22 Juni s/d 22 Juli 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demiikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 22 Juni 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A.M. YAMIN SE. MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Terselenggara oleh
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
 2. Peneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47 Telp./Fas. 0411-866545
E-mail : dinkes_gowass@yahoo.co.id
SUNGGUMINASA GOWA - 92111

SURAT KETERANGAN

Nomor : 440.1/119^B/DK-GWV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masniati, S.ST
Nip : 19770405 200502 2 001
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. 1 / II.d
Jabatan : Staf Sie. Kesehatan Keluarga dan Gizi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anna Safitri
Tempat/Tgl.Lahir : Jenepono, 17 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Samata

Telah melaksanakan Pengambilan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis yang berjudul : **"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY"** **"DENGAN PERSALINAN PRETERM DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA"**, yang berlangsung dari tanggal 07 s/d 14 Mei 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 14 Mei 2018

an. Kepala Dinas kesehatan Kab. Gowa
Staf Sie. Kesehatan Keluarga dan Gizi



Masniati, S.ST
Nip. 19770405 200502 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
 JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN STUDY KASUS

Nomor : 113/Diklat.RSUD-SY/VII /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Anna Safitri
 N i m : 70400115006
 Institusi : Akbid UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Study Kasus di Ruang Kamar Bersalin(INC) dan IGD Maternal RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny " H "* Dengan *Persalinan Preterm Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018* pada Tanggal 22 Juni 2018 s/d 20 Juli 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 20 Juli 2018

An. Ketua Diklat
 Koordinator bagian Penelitian


Dra. Hl. Raniyah Rauf, Bsc. MMRS
 Nip. 19630710 198703 2 019

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : ANNA SAPITRI
 Nim : 70400115006
 T.T.L : Jeneponto, 17 Agustus 1997
 Suku : Makassar
 Agama : Islam
 Alamat : Lambuepo, Kel. Pantai Bahari, Kec.
 Bangkala, Kab. Jeneponto

Nama Orang Tua

a. Ayah : Kamaluddin
 b. Ibu` : Rabania

B. Riwayat Pendidikan

SD Inpres Benteng I :2003-2009
 SMP Negeri 1 Bangkala :2009-2012
 SMA Negeri 2 Jeneponto :2012-2015
 UIN Alauddin Makassar :2015-2018