

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI
PADA NY “N” DENGAN PERSALINAN POSTTERM
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
17 JULI TAHUN 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

**Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli
Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu
Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

OLEH:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
70400115031
MAKASSAR**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA RISKA
Nim : 70400115031
Tempat/tanggal lahir : Maros, 16 Januari 1996
Jurusan/Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN. Paccinongang Harapan PA 10/21
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal patologi
pada Ny. “N” dengan Persalinan Postterm di RSUD.
Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 17 Juli
Tahun 2018.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau sepenuhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Gowa, 2 Agustus 2018

Penyusun

EKA RISKA
Nim: 70400115031

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Eka Riska
Nim : 70400115031
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Pada Ny^{"N"}
Dengan Persalinan Postterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa
Tanggal 17 Juli Tahun 2018

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar hasil Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing I



Anisa Mumthiah Al Kautsar. SsiT.,M.Keb

Pembimbing II



dr. Andi Sitti Rahmali M.kes

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "N" Dengan Persalinan Postterm di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 17 Juli 2018", yang disusun oleh Eka Riska NIM: 70400115031 Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari senin 09 Agustus 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 09 Agustus 2018 M
27 Dzulqaidah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyu Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Sitti Safiha S.SiT., S.K.M., M.Keb.	(.....)
Pembimbing I	: Anieq Mumtiah Alkautsar, S.SiT., M.Keb.	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes.	(.....)
Penguji I	: dr. Darmawansyih, M.Kes.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, M.Thi	(.....)

Dekan
/ Dr. dr. H. Andi Armyu Nurdin, M.Sc.
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat berniat ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menggelarkan permadani keislaman bagi umat manusia di muka bumi terutama bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi pada Ny “N” dengan Persalinan Postterm di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2018”**. Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Kasih sayang dan penghormatan yang tak terkira kepada kedua orang tua saya ibunda Johari dan ayahanda Nurdin yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, bimbingan dan pelajaran hidup yang begitu besar untuk saya. Dan juga kepada saudara-saudara saya terutama kakak saya Erniyanti, Ernawati, Erwin ermawan dan adik saya Evi trianna yang telah memberikan dukungan moril dan material selama masa studi.

Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pabbari, M.Si
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc beserta seluruh staf administrasi
3. Ibu Dr. H. Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M. Keb selaku ketua Prodi Kebidanan yang telah meluangkan waktu demi membimbing saya selama menjalani studi di prodi kebidanan Uin Alauddin Makassar.
4. Ibu Anieq Mumthiah Al-kautzar S.ST, M.keb selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu demi membantu, membimbing, serta memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
5. Ibu dr. Andi Siti Rahma, M. Kes selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu demi membantu, membimbing, serta memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
6. Ibu dr. Darmawansyih, M.Kes selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
7. Bapak Prof. Dr. H. Kasjim Salenda M,Thi selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini

8. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah meberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi
 9. Direktur dan petugas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
 10. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya angkatan 2015 serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik di sisi Allah swt.
- Akhir kata penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata-Gowa, 2 Agustus 2018

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

EKA RISKA
Nim : 70400115031

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	..ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penulisan.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Pustaka.....	10
1. Pengertian Persalinan.....	10
2. Jenis-Jenis Persalinan.....	11
3. Sebab-Sebab Persalinan.....	12
4. Tahapan Dalam Persalinan.....	13
5. Mekanisme Persalinan.....	15
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan.....	16

B. Tinjauan Umum Persalinan Dengan Persalinan Postterm.....	18
1. Pengertian Persalinan Postterm.....	18
2. Etiologi Persalinan Postterm.....	18
3. Patofisiologi Persalinan Postterm.....	20
4. Diagnosis Persalinan Postterm.....	20
5. Komplikasi Persalinan Postterm.....	21
6. Penanganan Persalinan Postterm.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Bayi Dengan Persalinan Postterm.....	25
1. Pengertian Bayi Baru Lahir Dengan Persalinan Postterm... ..	25
2. Ciri-Ciri Bayi Baru Lahir Dengan Dengan Persalinan Postterm.	25
3. Komplikasi Bayi Baru Lahir Dengan Persalinan Postterm.....	25
4. Penanganan Bayi Baru Lahir Dengan Persalinan Postterm.....	28
5. Penanganan Bayi Baru Lahir Asfiksia Dengan Resusitasi.....	29
D. Tinjauan Islam Tentang Manajemen Asuhan Persalinan.....	31
E. Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Persalinan Postterm.....	35
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan.....	35
2. Langkah-Langkah Dalam Manajemen Kebidanan.....	36
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan.....	43
BAB III STUDI KASUS.....	45
ASKEB INC	
A. Kala I.....	45
B. Kala II.....	63
C. Kala III.....	77

D. Kala IV.....	81
SOAP INC	
A. Kala I.....	89
B. Kala II.....	97
C. Kala III.....	105
D. Kala IV.....	107
SOAP PNC.....	111
SOAP BAYI.....	118
BAB IV PEMBAHASAN.....	123
A. Kala I.....	123
B. Kala II.....	133
C. Kala III.....	140
D. Kala IV.....	144
BAB V PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	




 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penilaian Bishop Score.....	23
Tabel 1.2 : Observasi TTV	87
Tabel 1.3 :Observasi TTV.....	109
Table 1.4: Penilaian Apgar Score	119



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Partograf
Lampiran IV	: Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Balitbanda Sulawesi Selatan)
Lampiran V	: Surat Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
Lampiran VI	: Surat Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Bupati Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur Rsud Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
Lampiran VII	: Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari RSUD Syekh Yusuf
Lampiran VII	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2018

Nama : EKA RISKHA

Nim : 70400115031

Pembimbing 1 : Anieq mumthiah alkautsar

Pembimbing II: Andi sitti rahma

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Pada Ny. "N"
dengan Persalinan Postterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa

Persalinan postterm adalah persalinan yang usia kehamilannya lebih dari 42 minggu atau 294 hari. Diagnosa usia kehamilan lebih dari 42 minggu didapatkan dari perhitungan seperti rumus *neagle* atau dengan tinggi fundus uteri, resiko bagi ibu dengan persalinan postterm dapat berupa partus lama, *inersia uteri* dan perdarahan pasca salin serta meningkatnya tindakan obstetrik.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi pada Ny. "N" dengan Persalinan Postterm di RSUD. Syekh Yusuf tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP. Yaitu langkah I pengkajian data dasar, langkah II diagnosa masalah aktual, langkah III diagnosa masalah potensial, langkah IV tindakan segera/kolaborasi, langkah V menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, langkah VI implementasi, langkah VII evaluasi .

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny "N" dengan persalinan postterm, ditemukan hambatan yakni pada bayi dengan asfiksia sedang dan telah dilakukan penanganan sesuai kasus.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada Ny. "N" dengan persalinan postterm di RSUD. Syekh Yusuf Gowa 2018 dan telah dilakukan pengkajian pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny. "N" dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan teori dan kasus.

Kata kunci: Persalinan Postterm, 7 langkah varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2018

Name : EKA RISKHA
Student Reg. No. : 70400115031
Supervisor I : Anieq Mumthiah Alkautzar
Supervisor II : Andi Sitti Rahmah
Title : The Intranatal Patology Obstetric Care Management
on Mrs. "N" with Post-term Delivery at RSUD Syekh Yusuf Gowa

The post-term delivery is a delivery with more than 42 weeks or 294 days gestational age. The diagnosis of more than 42 weeks' gestation is obtained from calculations using the *neagle* formula or with the uterine fundus height, the risk for mothers with post-term delivery can be prolonged labor, uterine inertia and post-partum bleeding and the increase of obstetric actions.

The study is aimed at implementing the Intranatal Pathology Obstetric Care Management on Mrs. "N" with Post-term Delivery at RSUD Syekh Yusuf in 2018, based on the 7 steps of Varney and SOAP. The first until eighth steps respectively are assessing the basic data, diagnosing the actual problems, diagnosing the potential problems, acting immediately/collaboratively, compiling a comprehensive care plan, implementation, and evaluation.

The results of the case study performed on Mrs. "N" with post-term delivery are found obstacles such as at the infants with moderate asphyxia and have been treated in accordance with the case.

The conclusion of the case study is that 7 steps of Varney and SOAP applied for the midwifery problem solving process have been carried out in the study and analysed the data on Mrs. "N" with post-term delivery at RSUD Syekh Yusuf Gowa in 2018, as well as the review of all findings and actions carried out on Mrs. "N" with the results of no gap between the theory and the case.

Keywords : Post-term Delivery, 7 Steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Persalinan postterm adalah persalinan yang usia kehamilannya lebih dari 42 minggu atau 294 hari. Diagnosa usia kehamilan lebih dari 42 minggu didapatkan dari perhitungan seperti rumus *neagle* atau dengan tinggi fundus uteri (Norma, Dwi, 2013: 202)

Persalinan postterm mempunyai hubungan erat dengan mortalitas dan morbiditas perinatal. Persalinan postterm berpengaruh pada janin, dalam kenyataannya persalinan postterm mempunyai pengaruh terhadap perkembangan janin sampai pada kematian janin akibat kekurangan zat makanan dan oksigen. Persalinan postterm mempunyai hubungan erat dengan mortalitas dan morbiditas perinatal. Sementara itu, resiko bagi ibu dengan persalinan postterm dapat berupa partus lama, *inersia uteri* dan perdarahan pasca salin serta meningkatnya tindakan obstetrik (Fadlun, Feryanto, 2013: 19).

Angka kejadian kehamilan postterm sebanyak 10% dari seluruh jumlah kelahiran pertahun. Data statistik menunjukkan, angka kematian janin dalam kehamilan postterm lebih tinggi dibandingkan dalam kehamilan cukup bulan. Angka kematian kehamilan lewat waktu mencapai 5-7%. Variasi insiden postterm berkisar antara 3,5-14% (SDKI, 2012).

Permasalahan pada persalinan postterm pada ibu yakni meningkatkan morbilitas dan mortalitas yang diakibatkan dari makrosomia janin dan tulang tengkorak menjadi lebih keras sehingga menyebabkan terjadinya distosia persalinan, *incordinate uterine action*, partus lama, meningkatkan tindakan obstetrik, dan perdarahan postpartum (Fadlun, Feryanto, 2013: 19).

Berdasarkan data yang diperoleh, di Sulawesi Selatan, jumlah kematian ibu yang dilaporkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota mengalami peningkatan dan penurunan yakni pada tahun 2012 jumlah kematian ibu sebanyak 160 atau 110,26 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 115 atau 78,38 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 138 orang atau 93,20 per 100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan SulSel, 2014:19-27).

Menurut Ratnawati dan Yusnawati dalam penelitiannya, kehamilan postterm mempunyai resiko lebih tinggi dari kehamilan aterm, terutama terhadap kematian perinatal (ante partum, intrapartum, dan postpartum) berkaitan dengan aspirasi meconium dan asfiksia, kematian janin akibat persalinan postterm terjadi pada 30% sebelum persalinan, 55% dalam persalinan, dan 15% pascanatal.

Permasalahan pada janin dalam persalinan postterm adalah plasenta tidak sanggup memberikan nutrisi dan pertukaran oksigen sehingga janin mempunyai resiko asfiksia sampai kematian dalam rahim, seperti pada data WHO pada tahun 2014, Angka Kematian Neonatus (AKN) di dunia adalah 26 per 1000 kelahiran hidup, dimana kelahiran dengan asfiksia menempati urutan kelima, yaitu sebanyak 9% sebagai penyebab kematian anak tertinggi di dunia setelah penyakit lain (WHO, 2014).

Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil penelitian Laeli, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa resiko kejadian asfiksia dari ibu yang mengalami kehamilan postterm sebanyak 61,7% dibandingkan ibu yang mengalami kehamilan aterm.

Angka Kematian Bayi (AKB) sendiri menurut Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015 yaitu 22 per 100.000 kelahiran hidup, selain angka kematian bayi, berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015, angka kematian ibu di Indonesia yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup yang mengalami penurunan dari tahun 2012 yakni sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 sebanyak 868 bayi atau 5,90 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.056 bayi atau 7,23 per 100.000 kelahiran hidup. (Profil Kesehatan Sulsel, 2014:19-27).

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, AKI dan AKB mengalami penurunan, yaitu AKI pada tahun 2012 sebanyak 12 orang atau 106,53 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2013 menurun menjadi 10 orang atau 80 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 sebanyak 3 orang atau 24 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2012 sebanyak 57 bayi atau 4,5 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2013 menjadi menurun menjadi 17 bayi atau 1 per 1000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 sebanyak 10 bayi atau 1 per 1000 kelahiran hidup (Dinkes Kabupaten Gowa, 2014: 25-29).

Berdasarkan data Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa, pada tahun 2015, angka kejadian postterm sebanyak 74 dari 1804 persalinan, tahun 2016 meningkat sebanyak 98 dari 1578 persalinan dan pada tahun 2017 sebanyak 20 dari 1180 persalinan.

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS), dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%, program ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian

ibu dan neonatal yang besar, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi tersebut disebabkan 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan menurunkan AKI dan AKB di enam provinsi tersebut, diharapkan akan dapat menurunkan AKI dan AKB di Indonesia secara signifikan (Depkes, 2016:104).

Program Emas berupaya menurunkan AKI dan AKB dengan cara yaitu: pertama, meningkatkan kualitas pelayanan *emergency obstetric* dan bayi baru lahir minimal di 150 Rumah Sakit PONEK dan 300 Puskesmas/Balkemas PONED, dan yang kedua yaitu memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antara puskesmas dan Rumah Sakit.

Berdasarkan Kemenkes 900 tahun 2002 tentang registrasi dan praktik bidan dan memperhatikan draf ke VI kompetensi inti bidan yang disusun oleh *International Confederation Of Midwife (ICM)* Februari 1999, kompetensi bidan yang mencakup dan berhubungan dengan judul diatas dalam pemberian asuhan yakni:

1. Bidan memiliki persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etik yang membentuk dasar asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya.
2. Bidan memberikan asuhan bermutu tinggi serta tanggap terhadap budaya setempat selama persalinan, memimpin persalinan yang bersih, aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan BBL.
3. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi komprehensif kepada BBL, sampai dengan 1 bulan. Adapun peran bidan dalam

menangani masalah asfiksia pada bayi baru lahir tercantum dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) pada standard 24 yakni penanganan asfiksia neonatorum yang dilakukan oleh bidan yaitu mengenali dengan tepat dengan asfiksia, serta melakukan tindakan yang sesuai, secara tepat, melakukan resusitasi dsb.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil kasus asuhan kebidanan intranatal pada ibu dengan persalina postterm, dengan mengkaji dan memaparkannya melalui karya tulis ilmiah guna mencari solusi dan memberikan asuhan yang sesuai.

B. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan studi ini menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan intranatal pada kasus persalinan postterm.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dilakukan asuhan kebidanan pada kasus persalinan postterm dengan menerapkan manajemen asuhan kebidanan secara nyata sesuai dengan standar dan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukan pengumpulan data dan analisis data dasar pada kasus persalinan postterm.
- b. Dilaksanakan pengidentifikasian diagnosa/ masalah aktual pada kasus persalinan postterm.
- c. Dilaksanakan pengidentifikasian diagnose/masalah potensial pada kasus persalinan postterm.

- d. Dilaksanakan perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada kasus persalinan postterm.
- e. Dilaksanakan rencana tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan kasus persalinan postterm.
- f. Dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada kasus persalinan postterm.
- g. Dilakukan evaluasi tindakan asuhan kebidanan pada kasus persalinan postterm.
- h. Didokumentasikan semua temuan dan tindakan dalam asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan pada kasus persalinan postterm.
- i. Didiskusikannya kesenjangan teori dengan dengan kasus yang didapatkan di lahan.
- j. Diintegrasikannya nilai-nilai keislaman kepada pasien dengan persalinan postterm.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai persalinan postterm yang dapat dijadikan bahan pembelajaran dari teori dan pengalaman yang diterapkan.

2. Manfaat Instansi

Sebagai sumber informasi serta meningkatkan pengetahuan kepada instansi terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

3. Manfaat Bagi Institusi

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber pengetahuan untuk penulis berikutnya dan juga sebagai sumber bagi rekan-rekan mahasiswa Kebidanan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam pencapaian asuhan kebidanan persalinan dengan postterm.

4. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan ujian akhir di jenjang Pendidikan Program Diploma III Kebidanan.

E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah:

1. Studi Pustaka

Penulis membaca dan mempelajari buku-buku serta literature dan media internet yang berhubungan dengan intranatal care khususnya kasus persalinan postterm.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan metode pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengumpulan dan analisa data, perumusan diagnosa masalah aktual dan potensial, perencanaan tindakan, evaluasi dan pendokumentasian untuk memperoleh data dalam pengkajian, penulis menggunakan teknik:

a) Anamnesa

Penulis melakukan Tanya jawab dengan klien, keluarga, bidan, dan dokter yang berada dikamar bersalin yang berhubungan dengan kasus yang dihadapi pasien.

b) Observasi

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung.

c) Pemeriksaan fisik

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan sistematis agar didapatkan data yang akurat.

3. Studi Dokumentasi

Penulis memperoleh informasi berdasarkan catatan medis pasien, baik dari bidan, dokter, maupun data penunjang lainnya.

4. Diskusi

Penulisan melakukan diskusi dengan tenaga kesehatan, pembimbing dan institusi demi kelancaran penulisan karya tulis ilmiah ini.

F. *Sistematika Penulisan*

Sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu: Pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Pada bab II terdiri dari tinjauan teori, akan menguraikan tinjauan umum tentang asuhan kebidanan dan persalinan, tinjauan khusus tentang persalinan postterm, tinjauan umum persalinan postterm menurut islam, proses manajemen dan asuhan kebidanana, serta pendokumentasian asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP.

Pada bab III yaitu pada kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa, atau masalah aktual, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, tindakan segera atau kolaborasi, rencana tindakan atau intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf dalam memberikan asuhan kebidanan intranatal dengan persalinan postterm.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Dan selanjutnya, datar pustaka bagian ini memuat datar literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Persalinan Normal

1. Pengertian persalinan

Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan yang cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentase belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam, produk konsepsi dikeluarkan sebagai akibat kontraksi teratur, progresif, sering dan kuat yang nampaknya tidak saling berhubungan, bekerja dalam keharmonisan untuk melahirkan bayi (Walyani, Purwoastuti, 2015: 5).

Menurut JNPK-KR DepKes RI, Persalinaan adalah proses dimana bayi, placenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dimulai dari inpartu sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis).

World Health Organisation (WHO) mendefinisikan Persalinan normal seperti spontan pada saat bersalin, beresiko rendah pada awal persalinan dan apa yang tersisa sehingga seluruh persalinan selesai. Bayi lahir spontan di posisi titik antara 37 dan 42 minggu sehingga selesai proses kehamilan dan setelah kelahiran, dan bayi berada dalam kondisi baik (Damayanti, Ika, dkk, 2014:2).

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus dari dalam vagina ke dunia luar (Prawirahardjo). Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, janin turun kedalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan ketuban terdorong keluar melalui jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses

pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42) minggu, lahir spontan dengan presentase belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin.

2. Jenis-jenis persalinan

Dua jenis persalinan berdasarkan bentuk persalinan dan menurut usia kehamilan:

- a. Berdasarkan bentuk persalinan
 - 1) Persalinan spontan adalah proses persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri.
 - 2) Persalinan buatan adalah proses persalinan dengan bantuan tenaga luar.
 - 3) Persalinan Anjuran adalah persalinan yang bila kekuatan yang diperlukan untuk bersalin ditimbulkan dari luar dengan jalannya rangsangan (Sari, Rimandini, 2014: 3-4).

- b. Jenis persalinan menurut usia kehamilan

- 1) Abortus

Pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berat badan janin kurang dari 500gram.

- 2) Partus *immature*

Pengeluaran buah kehamilan antara usia kehamilan 20 minggu sampai 28 minggu atau berat janin antara 500 gram dan kurang dari 1000 gram.

- 3) Partus *premature*

Pengeluaran buah kehamilan antara usia kehamilan 28 minggu dan <37 minggu atau berat badan lahir antara 1000 gram dan kurang dari 2500 gram.

4) Partus matur atau partus aterm

Pengeluaran buah kehamilan antara usia kehamilan 37-42 minggu atau berat badan lahir >2500 gram.

5) Partus post term atau post matur

Pengeluaran buah kehamilan lebih dari 42 minggu (Sari, Rimandini, 2014: 5 6).

3. Sebab- Sebab Terjadinya Persalinan

a. Teori Penurunan Hormon

Satu sampai dua terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron. Penurunan progesteron mempengaruhi relaksasi otot-otot Rahim, Sedangkan penurunan estrogen mempengaruhi kerentanan otot-otot Rahim. Pada saat kehamilan terjadi keseimbangan antara kedua hormon tersebut dan pada akhir kehamilan terjadi penurunan hormon.

b. Teori Distensi Rahim

Rahim yang membesar dan meregang akan menyebabkan iskemik otot rahim sehingga timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya.

c. Teori Iritasi Mekanik

Di belakang servik terdapat ganglion servikalis, ketika ganglion tersebut mengalami penekanan pada kepala janin dan mengakibatkan kontraksi pada Rahim.

d. Teori Plasenta Menjadi Tua

Akibat tuanya placenta mengakibatkan turunnya kadar progesteron yang mengakibatkan ketegangan pada pembuluh darah dan menyebabkan kontraksi pada Rahim.

e. Teori Prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua menjadi sebab permulaan persalinan karena menyebabkan kontraksi pada myometrium pada setiap umur kehamilan.

f. Teori oxytosin

Pada akhir kehamilan kadar oxytosin bertambah, oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot Rahim(kuswanti dan melina, 2014:3-4).

4. Tahapan dalam Persalinan Normal

a. Kala I (Kala Pembukaan)

Waktu untuk pembukaan serviks sampai menjadi pembukaan lengkap 10 cm. Inpartu ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah (*bloody show*) karena serviks mulai membuka (*dilatasi*) dan mendatar (*effacement*).

Kala I dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Fase laten: pembukaan serviks yang berlangsung lambat sampai pembukaan 3 cm lamanya 7-8 jam.
 - 2) Fase aktif: berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 subfase.
 - a) Periode akselerasi: berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm.
 - b) Periode dilatasi maksimal (*steady*): selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.
 - c) Periode deselerasi: berlangsung lambat, dalam waktu 2 jam pembukaan menjadi 10 cm (lengkap)
- b. Kala II (Kala Pengeluaran Janin)

Kala pengeluaran janin, sewaktu uterus dengan kekuatan his ditambah kekuatan mengedan mendorong janin keluar hingga lahir. Pada kala pengeluaran janin, his terkoordinasi, kuat, cepat, dan lebih lama. Kepala janin telah turun dan masuk ke rongga panggul sehingga terjadilah tekanan pada

otot-otot dasar panggul yang melalui lengkung refleks menimbulkan rasa mengedan, karena tekanan pada rektum, ibu merasa mau buang air besar, dengan tanda anus terbuka.

c. Kala III

Waktu untuk pelepasan dan pengeluaran uri. Setelah bayi lahir, kontraksi rahim beristirahat sebentar. Uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat, dan berisi placenta yang menjadi dua kali lebih tebal dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, timbul his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit seluruh placenta terlepas, terdorong kedalam vagina dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas simfisis atau fundus uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran placenta disertai dengan pengeluaran darah kira-kira 100-500 cc.

d. Kala IV

Mulai dari lahirnya uri, dan berakhir 2 jam setelah itu. Kala ini adalah kala pengawasan dan pada kali ini paling sering terjadi perdarahan postpartum. Masalah atau komplikasi yang paling sering terjadi paling banyak disebabkan oleh atonia uteri, lacerasi jalan lahir dan sisa placenta. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.

- 1) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan.
- 2) Setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan.
- 3) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan asuhan yang sesuai untuk penatalaksanaan atonia uteri (Indrayani, 2013: 49-53)

5. Mekanisme Persalinan Normal

Mekanisme persalinan merupakan gerakan janin yang mengakomodasi diri terhadap panggul ibu yang mengandalkan posisi, bentuk panggul, serta presentase jalan lahir.

a. *Engagement*

Terjadi ketika diameter terbesar dari presentasei bagian janin(biasanya kepala) telah memasuki PAP, pada primipara terjadi pada bulan terakhir tetapi pada multipara biasanya terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala melintasi PAP dapat terjadi dalam 2 keadaan yaitu sinklitismus (apabila arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang PAP), sedangkan asinklitismus (apabila arah sumbu kepala janin miring dengan bidang PAP).

Majunya kepala pada prim igravida terjadi setelah kepala masuk dalam rongga panggul, sebaliknya pada multipara masuknya kepala kedalam rongga panggul terjadi bersamaan dengan gerakan lain seperti flexi, putaran paksi dalam dan ekstensi.

b. Fleksi

Dengan majunya kepala, biasanya fleksi bertambah hingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Fleksi disebabkan karena janin didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari pinggir pintu atas panggul sehingga menyebabkan fleksi. Begitu penurunan menemukan tahanan dari pinggir PAP, maka akan terjadi fleksi sehingga Ubun-Ubun Kecil (UUK) lebih rendah dari Ubun-Ubun Besar (UUB).

c. *Internal Rotation* (Putaran Paksi Dalam)

Putaran paksi dalam adalah gerakan pemutaran kepala secara perlahan menggerakkan oksiput dari posisi asalnya ke anterior menuju shimpisis pubis.

Putaran paksi dalam terjadi setelah kepala sampai di hodge III atau setelah kepala sampai didasar panggul.

d. *Extension* (ekstensi)

Setelah putaran paksi dalam selesai dan kepala telah sampai didasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala.

e. *External Rotation* (Putaran paksi luar)

Setelah kepala lahir, maka kepala bayi memutar kembali kearah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam.

f. *Expulsion* (Ekspklusi)

Gerakan kelahiran bahu setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai *hypomochlion* untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian setelah kedua bahu lahir disusul lahirlah *trochanter* depan dan belakang sampai lahir janin seutuhnya depan, bahu belakang dan badan seluruhnya (Kuswanti, 2014).

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persalinan

Ada beberapa factor yang mempengaruhi persalinan :

a. Tenaga yang mendorong janin (*power*) terdiri dari:

Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu. (Indrayani, 2013: 62). His adalah kekuatan pada ibu yang menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin kebawah. Pada persentase kepala, bila his sudah cukup kuat, kepala akan turun dan dan mulai masuk kedalam rongga panggul (Prawirohardjo, 2014: 311). Sedangkan tenaga meneran adalah power yang mendorong janin keluar, uterus berkontraksi karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna dengan sifat-sifat: kontrak si simetris,

fundus dominan, relaksasi, involunter (terjadi diuar kehendak), intermitten (terjadi secara berkala), terasa sakit, terkordinasi, kadang dapat dipengaruhi dari luar secara fisik, kimia dan psikis.

b. Jalan lahir (*passage way*)

Merupakan jalan lahir dalam persalinan keadaan segmen atas dan segmen bawah rahim pada persalinan. Segmen atas memegang peran yang aktif karena kontraksi dan dindingnya bertambah tebal dengan majunya persalinan. Sebaliknya segmen bawah rahim memegang peran dan makin tipis dengan majunya persalinan karena peregangan. Jalan lahir terdiri dari pelvis dan jaringan lunak serviks, dasar panggul, vagina dan introitus (bagian luar/lubang vagina). (Indrayani, 2013: 62).

c. Janin (*passenger*)

Janin atau passenger bergerak sepanjang jalan lahir akibat interaksi beberapa faktor, diantaranya ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin karena plasenta dan air ketuban yang harus melewati jalan lahir, maka dianggap sebagai bagian dari passenger yang menyertai janin, namun placenta dan air ketuban jarang menghambat persalinan pada kehamilan normal (Indrayani, 2013: 84-86).

d. Psikologi

Ketakutan dan kecemasan sering menjadi penyebab lamanya persalinan, his menjadi kurang baik, pembukaan menjadi kurang lancar, perasaan takut dan cemas merupakan faktor utama penyebab rasa sakit dalam persalinan dan berpengaruh terhadap kontraksi rahim dan dilatasi serviks sehingga persalinan menjadi lama (Indrayani, 2013: 91).

e. Posisi (*position*)

Posisi ibu mempengaruhi jalannya persalinan, mengubah posisi mampu membuat rasa letih hilang dan melancarkan sirkulasi darah (Indrayani,2013:91)

B. Tinjauan Umum Persalinan Dengan Persalinan Postterm

1. Pengertian Persalinan Postterm

Persalinan postterm adalah persalinan yang usia kehamilannya lebih dari 42 minggu atau 294 hari. Diagnosa usia kehamilan lebih dari 42 minggu didapatkan dari perhitungan seperti rumus *neagle* atau dengan tinggi fundus uteri serial. (Norma, Dwi, 2013: 202)

Persalinan postterm menunjukkan kehamilan berlangsung sampai 42 minggu (294 hari) atau lebih, dihitung dari hari pertama haid terakhir menurut rumus *neagle* dengan siklus haid rata-rata 28 hari (Prawirohardjo, 2014: 686).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persalinan post term adalah persalinan yang usia kehamilannya berlangsung 42 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir.

2. Etiologi Persalinan Postterm

Menurut Sarwono Prawirohardjo dalam bukunya (Ilmu kebidanan, 2014: 686-693) faktor penyebab kehamilan postterm yaitu :

a. Pengaruh *progesterone*

Penurunan *hormon progesterone* dalam kehamilan merupakan kejadian perubahan endokrin yang penting dalam memacu proses biomolekuler pada persalinan dan meningkatkan sensitivitas uterus terhadap oksitosin, sehingga terjadinya kehamilan dan persalinan postterm adalah karena masih berlangsungnya pengaruh *progesteron*.

b. Teori oksitosin

Pemakaian oksitosin untuk induksi persalinan pada kehamilan lewat bulan memberi kesan atau dipercaya bahwa oksitosin secara fisiologis memegang peranan penting dalam menimbulkan persalinan dan pelepasan oksitosin dari *neurohipofisis*. Wanita hamil yang kurang pelepasan oksitosin dari *neurohipofisis* pada kelainan lanjut diduga sebagai salah satu factor penyebab kehamilan lewat bulan.

c. Teori kortisol/ *Adrenocorticotropic Hormone* (ACTH) janin

Dalam teori ini diajukan bahwa sebagai “pemberi tanda” untuk dimulainya persalinan adalah janin. Hal ini terjadi akibat peningkatan tiba-tiba kortisol plasma janin. Kortisol janin akan mempengaruhi plasenta sehingga produksi *progesterone* berkurang dan memperbesar sekresi estrogen, berpengaruh terhadap meningkatnya produksi prostaglandin. Pada janin yang mengalami cacat bawaan seperti ansefalus, hypoplasia adrenal janin, dan tidak adanya kelenjar hipofisis pada janin akan menyebabkan kortisol janin tidak diproduksi dengan baik sehingga kehamilan dapat berlangsung lewat.

d. Syaraf uterus

Tekanan pada ganglion servikalis dari *pleksus frankenhauser* akan membangkitkan kontraksi uterus. Pada keadaan dimana tidak ada tekanan pada pleksus ini, seperti pada kelainan letak, tali pusat pendek dan bagian bawah masih tinggi, semua hal tersebut sebagai penyebab terjadinya kehamilan lewat bulan.

e. *Herediter*

Beberapa penelitian menyatakan bahwa seorang ibu yang mengalami kehamilan lewat bulan, mempunyai kecenderungan untuk melahirkan lewat

bulan pada keturunan selanjutnya, karena postterm sering dijumpai pada keluarga tertentu (Prawirohardjo, 2014: 686-694).

3. Patofisiologi Persalinan Postterm

Fungsi placenta mencapai puncak pada kehamilan 38 minggu dan mulai menurun setelah 42 minggu, akibat dari proses penuaan plasenta, maka pemasokan makanan dan oksigen akan menurun disamping spasme arteri spiralis, Janin akan mengalami pertumbuhan terhambat dan penurunan berat dalam hal ini dapat disebut dismatur, jumlah air ketuban yang berkurang mengakibatkan perubahan abnormal jantung janin (Prawirohardjo, 2015: 318).

4. Diagnosis Persalinan Postterm

Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendukung diagnosis persalinan premature adalah:

- a. Pemeriksaan umur kehamilan dihitung menggunakan rumus *neegle* berdasarkan anamnesis hari pertama haid terakhir.
- b. Pemeriksaan berat badan ibu dan lingkar perut, ditandai dengan berat badan ibu turun, pembesaran perut mengecil karena air ketuban berkurang.
- c. Pemeriksaan tinggi fundus uteri.
- d. Pemeriksaan USG yaitu dengan pemeriksaan diameter biparietal kepala janin dapat diukur dengan teliti tanpa ada bahaya.
- e. Pemeriksaan *sitology* cairan amnion yaitu *amniostropi* dan pemeriksaan PH (dibawah 7,20) dianggap sebagai gawat janin (Norma, Dwi, 2013:203)

5. Komplikasi Persalinan Postterm

a. Untuk Ibu

- 1) Rasa takut dan cemas akibat terlambat lahir.
- 2) Morbilitas dan mortalitas ibu dapat meningkat sebagai akibat dari makrosomia janin dan tulang tengkorak menjadi lebih keras sehingga menyebabkan terjadinya distosia persalinan, *incoordinate uterine action*, partus lama, meningkatkan tindakan obstetrik, dan perdarahan postpartum (Fadlun, feryanto, 2013:91).

b. Untuk janin

- 1) Keluarnya mekonium yang dapat menyebabkan aspirasi mekonium.
- 2) Oligohidramnion dapat menyebabkan kompresi tali pusat, gawat janin sampai bayi meninggal.
- 3) Gawat janin atau kematian perinatal menunjukkan angka meningkat setelah usia kehamilan 42 minggu atau lebih, Sebagian besar terjadi intrapartum. Keadaan tersebut disebabkan karena hal-hal seperti makrosomia yang dapat menyebabkan terjadinya distosia pada persalinan, *Insufisiensi* placenta dapat berakibat pertumbuhan janin terlambat dan asfiksia, cacat bawaan terutama akibat *hypoplasia adrenal* dan ansefalus.
- 4) Sindrom prematuritas dapat dikenali pada neonatus melalui beberapa gangguan pertumbuhan, dehidrasi, kulit kering, keriput seperti kertas(hilangnya lemak subkutan), kuku tangan dan kaki panjang, tulang tengkorak lebih keras, hilangnya *vernix caseosa* dan lanugo, rambut kepala lebih banyak dan tebal, maserasi kulit terutama daerah lipatan paha dan genital luar, warna cokelat atau kekuningan pada kulit dan tali pusat (Fadlun, Feryanto, 2013: 89).

6. Penanganan Persalinan Postterm

- a. Menentukan apakah kehamilan telah berlangsung lewat bulan (postterm) atau bukan, jika ditemukan lewat bulan maka yang penting dilakukan adalah monitoring janin sebaik-baiknya dengan cara pemantauan Djj, nadi, his tiap 30 menit, dan memastikan semuanya dalam batas normal.
- b. Mengidentifikasi kondisi janin dan keadaan yang membahayakan janin dengan cara pemeriksaan kardiografi seperti *nonstress test* (NST) dan *contraction stress test* untuk mengetahui kesejahteraan janin sebagai reaksi terhadap gerakan janin atau kontraksi uterus dan pemeriksaan USG untuk menentukan besar janin, denyut jantung janin, gangguan pertumbuhan janin, keadaan dan derajat kematangan plasenta, jumlah (indeks cairan amnion dan kualitas air ketuban) (Fadlun, Feryanto, 2013: 90-92).
- c. Apabila tidak ada tanda-tanda *insuffisiensi* plasenta persalinan spontan dapat ditunggu dengan pengawasan ketat.
- d. Melakukan pemeriksaan serviks dengan skor bishop. *Bishop score* adalah suatu cara untuk menilai kematangan serviks dan responnya terhadap suatu induksi persalinan, jika serviks *bishop score* rendah, artinya serviks belum matang dan memberikan angka kegagalan yang lebih tinggi dibanding serviks yang matang.

Tabel 1.1 penilaian *bishop score*

FAKTOR	SKOR			
	0	1	2	3
Bukaan (cm)	Tertutup	1-2 cm	3-4 cm	> 5
Panjang serviks (cm)	>4 cm	3-4 cm	1-2 cm	<1 cm
Konsistensi	Kenyal	Rata-rata	Lunak	-
Turunnya kepala (cm dari spina ishiadika)	-3	-2	-1	+1,+2
Turunnya kepala (dengan palpasi abdominal menurut system persalinan)	4/5	3/5	2/5	1/5

(Fadlun, Feryanto, 2013: 92).

Bishop score >5 yaitu induksi persalinan, cara induksi persalinan adalah:

- 1) Menggunakan tablet misoprostol/cytotec yaitu 25-50 mg yaitu diletakkan di forniks posterior setiap 6-8 jam hingga munculnya his/kontraksi.
- 2) Menggunakan oksitosin intravena yaitu infus oksitosin yang mengandung 10-20 unit ekuivalen dengan 10.000-20.000 mU dicampur dengan 100 ml larutan Ringer Laktat, masing-masing menghasilkan konsistensi oksitosin 10-20 Mu/ml.

Bishop score < 5 yaitu:

- 1) Pemantauan janin dengan prafi biofisik, *Nonstress test* (NST), *Contractions Stress Test* (CST).
- 2) Volume ketuban normal, NST reaktif yaitu diulangi 2x/ minggu.
- 3) Volume ketuban normal, NST non reaktif, CST positif yaitu dilakukan SC.

- 4) Volume ketuban normal, NST non reaktif dan CST negative yaitu dilakukan pengulangan CST dalam 3 hari.
- 5) Oligohidramnion (kantong amnion <2cm) yaitu dilakukan SC.
- 6) Deselerasi variable yaitu pematangan serviks dan induksi persalinan.
- 7) Pematangan serviks dapat dilakukan kateter *voley*, oksitosin, prostaglandin, pemecahan selaput ketuban.
- 8) Persalinan per vaginam yaitu ibu miring ke kiri, berikan oksigen, monitor DJJ, induksi persalinan dengan tetes pitosin (jika tidak ada kontraindikasi dan belum ada tanda hipoksia *intrauterine*), tetes pitosin dinaikkan jangan melebihi 2 Mu/menit atau dinaikkan dengan interval 30 menit, amniotomi pada fase aktif, infus intraamniotik dengan 300-500 mL NaCl hangat selama 30 menit yaitu untuk mengatasi oligohidramnion dan mekonium, konfirmasi kesejahteraan janin. Dilakukan *Sectio Caesaria*, jika gawat janin (deselerasi lambat, pewarnaan meconium), gerakan janin abnormal (<5kali/20 menit), *contraction stress test* (CST), berat badan >4000 gr, malposisi, malpresentasi, partus >18 jam, bayi belum lahir (Fadlun, Feryanto, 2013: 92). Dilakukan vakum ekstraksi, syarat vakum (Manuaba, 2003) yaitu:
 - a) Pembukaan minimal 5
 - b) Ketuban negative atau dipecahkan
 - c) Anak hidup, letak kepala atau bokong
 - d) Penurunan minimal H II
 - e) His dan reflex mengejan baik.

C. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir Dengan Persalinan PostTerm

1. Pengertian Bayi Baru Lahir Postterm

Bayi baru lahir postterm adalah bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan >42 minggu, tanpa memperhatikan berat badan (Nugroho, 2013:142).

2. Ciri- Ciri Bayi Postterm

- a. Biasanya lebih berat dari bayi matur (>4000 gram).
- b. Tulang rusuk dan sutura kepala lebih keras dari bayi matur.
- c. Rambut lanugo hilang atau sangat kurang.
- d. Kuku-kuku panjang.
- e. Rambut kepala agak tebal.
- f. Kulit agak pucat dengan deskuamasi epitel.

Tidak semua neonatus dari kehamilan lewat bulan menunjukkan postterm, tergantung dengan fungsi plasenta. Umumnya didapat sekitar 10-2% neonatus dengan tanda postterm pada kehamilan serotinus. Adapun tingkatannya antara lain:

- 1) Stadium I : Kulit kehilangan verniks caseosa dan terjadi maserasi sehingga kulit menjadi kering, rapuh dan mudah mengelupas.
- 2) Stadium II : Seperti stadium 1, namun disertai dengan pewarnaan meconium (kehijauan) di kulit.
- 3) Stadium III : Seperti stadium satu namun disertai dengan pewarnaan kekuningan pada kuku, kulit dan tali pusat (Nugroho, 2013: 203).

3. Komplikasi Pada Bayi Baru Lahir Postterm

- a. Gawat janin

Gawat janin akan terjadi bila janin tidak menerima oksigen cukup, sehingga mengalami hipoksia. Situasi ini dapat terjadi kronik (jangka panjang)

atau akut. Tanda gawat janin, djg dalam proses persalinan bervariasi dan akan kembali normal dalam beberapa waktu. Bila djg tidak kembali normal setelah kontraksi ini merupakan gawat janin (Prawirohardjo, 2014: 620).

b. Asfiksia

Asfiksia neonatorum merupakan keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, sehingga bayi tidak dapat mengeluarkan zat asam arang pada tubuhnya. Permasalahan yang terjadi pada kehamilan lewat waktu adalah plasenta yang tidak sanggup memberikan nutrisi dan pertukaran karbon dioksida sehingga janin mempunyai resiko asfiksia sampai kematian dalam rahim.

Semakin menurunnya sirkulasi darah menuju sirkulasi plasenta dapat mengakibatkan pertumbuhan janin makin lambat, air ketuban makin mengental, berkurangnya nutrisi dan oksigen ke janin yang menimbulkan asfiksia dan sewaktu-waktu dapat meninggal dalam rahim, saat persalinan janin lebih mudah mengalami asfiksia (Vivian, 2013). Asfiksia terbagi 3 yaitu :

1) Asfiksia berat

- a) Frekuensi jantung kecil, yaitu <40 kali permenit.
- b) Tidak ada usaha napas.
- c) Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada.
- d) Bayi tidak dapat memberikan reaksi jika diberikan rangsangan.
- e) Bayi tampak pucat.

2) Asfiksia sedang

- a) Frekuensi jantung menurun menjadi 60-80 kali permenit
- b) Usaha napas lambat
- c) Tonus otot biasanya dalam keadaan baik

- d) Bayi masih bisa bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan
 - e) Bayi tampak sianosis
- 3) Asfiksia ringan
- a) Takipnea dengan napas lebih dari 60 kali permenit
 - b) Bayi tampak sianosis
 - c) Bayi merintih
 - d) Adanya pernapasan cuping hidung
 - e) Bayi kurang aktivitas.

Asfiksia biasa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ibu, plasenta, fetus dan neonatus.

1. Ibu

Apabila mengalami hipoksia, maka janin juga akan mengalami hipoksia yang dapat berkelanjutan menjadi asfiksia dan komplikasi lain.

2. Placenta

Pertukaran gas antara ibu dan janin dipengaruhi oleh luas dan kondisi placenta misalnya *solusio placenta*, *placenta previa* dll (Fadlun, Feryanto, 2013: 94).

3. Fetus

Kompresi umbilicul akan dapat menyebabkan terganggunya aliran darah dalam pembuluh darah umbilicus dan menghambat pertukaran gas antara ibu dan janin (Fadlun, Feryanto, 2013: 94).

4. Neonatus

Depresi pusat pernapasan bada bayi baru lahir dapat terjadi karena beberapa hal berikut:

- g. Pemakaian anastesi yang berlebihan.
- h. Trauma yang terjadi sealama persalinan.

- i. Kelainan kongenital pada bayi.

4. Penanganan Bayi Baru Lahir Dengan Postterm

Langkah-langkah penanganan bayi baru lahir postterm dengan Standar Operasional Prosedur.

- a. Keringkan secepatnya dengan handuk bersih.
- b. Mengganti kain yang basah dengan kain kering.
- c. Kepala bayi ditutupi topi.
- d. Berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan.
- e. Berikan infus dextrose 10% dan bikarbonas natricus 1,5% 4:1. Hari 1 60cc/kg/hari, Hari II 70cc/kg/hari.
- f. Memperhatikan suhu tubuh yaitu dengan menempatkan bayi dalam *incubator*.
- g. Memperhatikan pencegahan infeksi yaitu dengan memperhatikan teknik pencegahan infeksi salah satunya dengan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi.
- h. Pengawasan nutrisi/ASI pada bayi baru lahir sesuai dengan kebutuhannya, berikan melalui sonde/tetes ASI.
- i. Pengawasan berat badan dengan ketat karena berat badan berkaitan dengan status gizi/nutrisi bayi yang berhubungan dengan daya tahan bayi (Prawirohardjo, 2014: 692-695).

Tindakan yang dapat dilakukan pada bayi asfiksia neonatorum adalah sebagai berikut:

- 1) Bersihkan jalan napas dengan penghisap lender atau kasa steril.
- 2) Potong tali pusat dengan teknik aseptik dan antiseptik.
- 3) Segera keringkan badan bayi dengan handuk/kain bersih dan kering.

- 4) Nilai status pernapasan. Lakukan tindakan berikut jika ditemukan tanda-tanda asfiksia.
- 5) Segera baringkan dengan kepala bayi sedikit ekstensi dan penolong berada disisi kepala bayi.
- 6) Miringkan kepala bayi.
- 7) Bersihkan mulut bayi dengan kasa yang dibalut pada jari telunjuk.
- 8) Isap cairan dari mulut dan hidung.
- 9) Lanjutkan menilai status pernapasan

Nilai status pernapasan apabila masih ada tanda asfiksia, caranya dengan menggosok punggung bayi (melakukan rangsangan taktil). Bila tidak ada perubahan, segera beri napas buatan (Vivian, 2013).

5. Penanganan Bayi Baru Lahir Asfiksia Dengan Resusitasi

- a. Letakkan bayi di lingkungan yang hangat, kemudian keringkan tubuh bayi dan selimuti tubuh bayi untuk mengurangi evaporasi.
- b. Sisihkan kain yang basah kemudian tidurkan bayi terlentang pada alas yang datar.
- c. Ganjal bahu dengan kain setinggi 1 cm (*snifing positor*).
- d. Hisap lender dengan penghisap lender de lee dari mulut, apabila mulut sudah bersih, kemudian lanjutkan ke hidung.
- e. Lakukan rangsangan taktil dengan cara menyentil telapak kaki bayi dan mengusap-usap punggung bayi.
- f. Nilai pernapasan. Jika napas spontan, lakukan penilaian denyut jantung selama 6 detik, hasil kalikan 10. Denyut jantung > 100 x / menit, nilai warna kulit jika merah / sinosis penfer lakukan observase, apabila biru berikan oksigen . Denyut jantung < 100 x/ menit lakukan Ventilasi Tekanan Positif (VTP).

- g. Jika pernapasan sulit, (megap-megap) lakukan ventilasi tekanan positif.
- h. Ventilasi tekanan positif / PPV dengan memberikan O₂ 100% melalui ambubag atau masker, masker harus menutupi hidung dan mulut tetapi tidak menutupi mata, jika tidak ada ambubag, beri bantuan dari mulut ke mulut, kecepatan PPV 40-60 x / menit.
- i. Setelah 30 detik, lakukan penilaian denyut jantung selama 6 detik, hasil kalikan 10. Bila 100 hentikan bantuan napas, observasi napas spontan. 60-100 ada peningkatan denyut jantung, teruskan pemberian PPV, 60-100 dan tidak ada peningkatan denyut jantung, lakukan PPV, disertai kompresi jantung. < 10 x/ menit, lakukan PPV disertai kompresi jantung.
- j. Perbandingan kompresi jantung dengan ventilasi adalah 3 : 1, ada 2 cara kompresi jantung: Kedua ibu jari menekan sternum dan tangan lain menahan belakang tubuh bayi.
- k. Lakukan penilaian denyut jantung setiap 30 detik setelah kompresi dada. denyut jantung 80x./menit kompresi jantung dihentikan, lakukan PPV sampai denyut jantung > 100x/ menit dan bayi dapat nafas spontan .jika denyut jantung 0 atau > 10x/ menit, lakukan pemberian obat epineprin 1; 10.000 dosis 0,2 – 0,3 mL /kg BB secara IV.
- l. Lakukan penilaian denyut jantung janin , jika > 100 x / menit hentikan obat . jika denyut jantung < 80 x / menit ulangi pemberian epineprin sesuai dosis diatas tiap 3 – 5 menit.
- m. Lakukan penilaian denyut jantung, jika denyut jantung tetap / tidak respon terhadap di atas dan tanpa ada hipovolemi beri bikarbonat dengan dosis 2 MEQ /kg BB secara IV selama 2 menit (Nadyah, 2013: 99-100).

D. Tinjauan Islam Tentang Manajemen Asuhan Persalinan

Setiap wanita yang hendak melahirkan mengalami cobaan yang begitu berat, apalagi ketika mengalami kesulitan ketika melahirkan, oleh karena itu Allah mengabadikan perjuangan seorang wanita (ibu) selama kehamilan dan persalinannya. Sebagaimana dalam Q.S Luqman / 31:14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya :

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua Orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Kementrian Agama RI, 2014: 412).

Sementara ayat yang menceritakan tentang rasa sakit dalam persalinan dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Maryam/ 19: 22-23.

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا
لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا (٢٣)

Terjemahnya :

Maka Maryam mengandungnyalah, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma, dia berkata “aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan” (Kementrian Agama RI, 2014: 306).

Dalam ayat diatas, menunjukkan bahwa Maryam mengandung dan melahirkan nabi Isa sebagaimana seorang Nabi biasa yang mengandung dan melahirkan anaknya. Hal ini jelas membuktikan bahwa Nabi Isa yang berkedudukan sebagai Rasul hanyalah manusia biasa, akan tetapi Allah menunjukkan kebesarannya dengan proses kehamilan dan persalinan yang diberikan melalui Maryam yang telah mengandung tanpa ada pembuahan terlebih dahulu (Shihab, 2009: 422).

Begitu luar biasanya Allah SWT yang memberikan mukjizat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Ahqaf / 46: 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
 أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
 فِي ذُرِّيَّتِي ط إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya :

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa : “Ya Tuhanku,tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi ,berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri (Kementerian Agama RI, 2014: 504).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu alasan kenapa Allah memberi wasiat kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya adalah karena proses persalinan yang dialami ibu merupakan proses yang sangat

berat, pengaruh kontraksi rahim ketika bayi ingin lahir, menyebabkan ibu merasakan sangat kesakitan, bahkan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan kematian, karena perjuangan ibu ketika melahirkan dan resiko yang sangat besar yang ditanggung seorang ibu.

Nabi cukup bijaksana dan memberi empati kepada ibu yang meninggal karena melahirkan sebagai syahid. Setara dengan perjuangan jihad di medan perang. Penghargaan itu diberikan Nabi sebagai rasa simpati karena musibah yang dialami dan juga beratnya resiko kehamilan dan melahirkan bagi seorang ibu (Shihab,2009: 401).

Tidak hanya itu, terdapat pula hadist tentang kemuliaan seorang ibu yang mengalami 3 macam kepayahan, yang pertama adalah hamil, kemudian melahirkan dan selanjutnya menyusui. Karena itu kebaikan kepada ibu tiga kali lebih besar daripada kepada ayah, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟

قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ

Dari Abu Hurairah radiyallahu' anhu, beliau berkata” seseorang datang kepada Rasulullah shallahu' alaihi wasallam dan berkata ,’wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? ’Nabi sallallahu' alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’, dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi sallallahu' alaihi wasallam menjawab , ‘Ibumu!’ orang tersebut bertanya kembali, ‘kemudian siapa lagi? ‘ Nabi sallallahu' alaihi wasallam menjawab ‘Ibumu!’ kemudian orang tersebut

bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Beliau menjawab, ‘Kemudian Ayahmu.’ (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548).

Imam Al- Qurthubi menjelaskan, ”Hadist tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah, Nabi sallallahu’ alaihi waallam menyebutkan kata itu sebanyak tiga kali, sementara kata ayah hanya satu kali. Bila hal itu sudah dimengerti, maka realitas lain bias menguatkan pengertian diatas. Karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat merawat dan menyusui anak, hanya dialami oleh seorang ibu, seorang ayah tidak memilikinya. Hormati ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkanmu dengan kasih sayangnya.

Tidak hanya menggambarkan kondisi ibu disaat sedang mengandung hingga menjelang melahirkan, Islam juga menggambarkan tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh seorang bidan dalam melakukan manajemen asuhan. Dalam Islam, sebaiknya kita memosisikan diri untuk beribadah kepada Allah melalui profesinya. Sebagai seorang muslim, seorang bidan harus menunjukkan dirinya professional menjalankan tugas penuh tanggung jawab dan diatas segalanya adalah niat ibadah semata-mata kepada Allah SWT. Seorang bidan wajib mensyukuri nikmat ilmu profesinya karena dari situlah seorang bidan bisa beramal seluas-luasnya baik dalam konteks *Hablumminallah wa Hablumminannas* (hubungan jalinan kepada Allah dan Manusia)

Selain itu, profesi bidan banyak berhubungan dengan manusia dalam arti individu, keluarga dan masyarakat, maka lewat profesinya memungkinkan hal ini dijadikan sebagai sarana perluasan hubungan

Ukhuwah Islamiyah. Setiap bidan juga hendaknya meningkatkan kualitas intelektual, memperluas wawasan keilmuan dan referensi untuk menunjang karier terutama tuntutan perkembangan ilmu, teknologi dan informasi. Seorang bidan juga harus mampu menanamkan keyakinan dalam diri bahwa apa yang dilakukannya mampu dipertanggungjawabkan konsekuensinya di akhirat kelak. Oleh karena itu berbuat yang *ahsan* (terbaik) dalam menjalankan profesi dari waktu ke waktu.

Dengan melakukan upaya-upaya sebagai bentuk kewajiban, bidan mampu berperan aktif serta memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya pada ibu bersalin yang membutuhkan pertolongan dan yang paling penting dimiliki seorang bidan dalam menjalankan tugasnya adalah sifat *tawaddu'* (merendahkan diri) demi memberikan pelayanan yang baik bagi kliennya.

E. Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Persalinan Postterm

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI), manajemen kebidanan adalah pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Menurut DepKes RI, Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Menurut Helen Varney, Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan berfokus pada klien.

Manajemen kebidanan adalah suatu metode proses berfikir logis sistematis dalam memberi asuhan kebidanan agar menguntungkan kedua belah pihak baik klien maupun pemberi asuhan. Oleh karena itu, manajemen kebidanan merupakan alur berfikir bagi seorang bidan dalam memberikan arah /kerangka dalam menangani kasus yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Langkah- Langkah Dalam Manajemen Kebidanan

7 langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney

a. Langkah I pengumpulan data dasar

Pada tahap ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Tahap ini merupakan langkah awal untuk menentukan langkah berikutnya sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus dihadapi yang akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya. Cara memperoleh data sebagai berikut:

- 1) Dilakukan untuk mendapatkan biodata, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas, bio-psikososial-spiritual, serta pengetahuan klien.
- 2) Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital.
- 3) Pemeriksaan khusus (Inspeksi, palpasi , auskultasi dan perkusi).

- 4) Pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi/USG, dan catatan terbaru serta catatan sebelumnya).

Adapun keluhan yang biasa dikatakan oleh pasien yang mengalami persalinan postterm seperti: mengatakan bahwa ibu merasa cemas karena kehamilannya sudah lewat bulan, merasakan nyeri pada perut tembus belakang. Pada kasus persalinan postterm didapat data subjektif usia kehamilan >42 minggu yang dapat dihitung berdasarkan:

- a) Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT), dihitung menggunakan rumus *neegle*, jika umur kehamilan >42 minggu dan tidak sesuai dengan tafsiran persalinan maka besar kemungkinan terjadi persalinan postterm.
- b) Tinggi Fundus Uteri (TFU), pemeriksaan tinggi fundus uteri adalah satu pendukung dari diagnosis persalinan postterm. Jika pembesaran uterus lebih besar dari dugaan usia kehamilan normal, maka kemungkinan terjadi usia kehamilan lebih tua dari taksiran.
- c) Tafsiran Berat Janin (TBJ), pada kehamilan, normalnya akan terjadi penurunan BB janin pada umur kehamilan 36 minggu karena perubahan anatomi yang besar pada plasenta, namun pada kehamilan postterm seringkali berat janin bertambah jika placenta masih berfungsi sehingga TBJ makin bertambah dan kemungkinan akan terjadi makrosomia.
- d) *Ultrasonografi* (USG), Pemeriksaan USG merupakan suatu media diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempelajari morfologi dan fungsi suatu organ berdasarkan gambaran eko dari gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ. Pemeriksaan inilah yang mendukung diagnosis persalinan postterm karena pada saat pemeriksaan USG dilihat ukuran diameter biparietal dan lingkaran kepala untuk menentukan usia kehamilan, ukuran plasenta, jumlah cairan amnion, berat janin.

b. Langkah II Interpretasi data dasar

Pada langkah ini dilakukan indentifikasi terhadap diagnosis atau masalah

berdasarkan interpretasi atas data-data yang telah dikumpulkan. Sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Diagnosa persalinan postterm dapat ditegakkan berdasarkan usia kehamilan, usia kehamilan dapat diketahui berdasarkan hari pertama haid terakhir, tafsiran berat janin, dan tinggi fundus uteri.

Pada pemeriksaan USG dapat diketahui kondisi janin, ukuran diameter biparietal dan lingkaran kepala untuk menentukan usia kehamilan, ukuran placenta, jumlah cairan amnion, berat janin (Sarwono, 2011).

Berdasarkan usia gestasi dan berat badan lahir kemungkinan yang dapat terjadi pada bayi menurut grafik *lubcheo* yaitu Kecil Masa Kehamilan (KMK), Sesuai Masa Kehamilan (SMK), besar untuk masa kehamilan (BMK).

c. Langkah III identifikasi diagnosis atau masalah potensial

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial yang lain berdasarkan beberapa masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi (Yulifah, 2014:133).

Pada persalinan postterm masalah- masalah yang dapat terjadi pada ibu adalah kala I memanjang, partus lama, Perdarahan postpartum yaitu atonia uteri kerana janin besar. sedangkan pada janin kemungkinan masalah yang dapat terjadi jika mengalami persalinan postmatur adalah bayi dapat mengalami gawat janin, gawat janin terjadi bila janin tidak menerima O₂ cukup, sehingga mengalami hipoksia. Situasi ini dapat terjadi kronik (jangka waktu panjang) atau akut. Tanda gawat janin, djj dalam proses persalinan

bervariasi dan akan kembali normal dalam beberapa waktu. Bila DJJ tidak kembali normal setelah

kontraksi ini merupakan tanda gawat janin, Asfiksia mekonium, merupakan keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, sehingga bayi tidak dapat memasukkan oksigen dan

tidak dapat mengeluarkan zat asam arang dari tubuhnya.

d. Langkah IV tindakan segera/ kolaborasi

Langkah yang dilakukan seorang bidan dengan melakukan identifikasi dan menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnose dan masalah yang ditegakkan. Kegiatan yang dilakukan bidan dalam langkah ini adalah konsultasi, kolaborasi, dan melakukan rujukan.

Pada persalinan postterm tindakan segera yang dilakukan oleh bidan adalah dengan melakukan kolaborasi dengan dokter obgyn untuk mengantisipasi terjadinya komplikasi – komplikasi terhadap ibu seperti pemberian oksitosin untuk mencegah terjadinya atonia uteri dan penanganan perdarahan post partum berupa pemasangan infus dan transfusi darah jika diperlukan. Selain kolaborasi dengan dokter obgyn, dalam persalinan postterm juga dilakukan kolaborasi dengan dokter anak untuk memberikan penanganan segera setelah bayi lahir pada bayi postterm, selain itu dipersiapkan alat resusitasi bayi seperti penyediaan O₂, suction, infant warmer, dan inkubator. Jika persalinan postterm yang ditolong oleh bidan di BPS maupun puskesmas mengalami komplikasi yang diluar kompetensi (wewenang) bidan, maka tindakan segera yang dilakukan oleh bidan adalah memperbaiki keadaan umum ibu dan bayi, setelah itu kolaborasi dengan dokter

dengan cara memberikan surat rujukan untuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap dan memadai

e. Langkah V intervensi (perencanaan)

Melakukan perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah sesuai dengan langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang diberikan harus disetujui oleh pasien untuk menentukan apakah tindakan yang telah direncanakan bersedia untuk dijalankan atau tidak. Rencana asuhan persalinan postterm yaitu:

- 1) Merencanakan pemantauan DJJ, nadi, his tiap 30 menit, dan memastikan semuanya dalam batas normal.
- 2) Merencanakan pemantauan kondisi janin dan keadaan yang membahayakan janin dengan cara pemeriksaan kardiografi seperti *nonstress test* (NST) dan *contraction stress test* untuk mengetahui kesejahteraan janin sebagai reaksi terhadap gerakan janin atau kontraksi uterus dan pemeriksaan USG untuk menentukan besar janin, denyut jantung janin, gangguan pertumbuhan janin, keadaan dan derajat kematangan plasenta, jumlah (indeks cairan amnion dan kualitas air ketuban (Fadlun, Feryanto, 2013: 90-92).
- 3) Merencanakan pemantauan kemajuan persalinan, pada persalinan postterm kemungkinan terjadi makrosomia sehingga dapat menyebabkan terjadinya kala I memanjang, kala II lama, perdarahan postpartum.
- 4) Merencanakan tehnik pengurangan nyeri dengan memberikan terapi murottal dan ayat suci Al-Qur'an.
- 5) Merencanakan anjuran agar senantiasa berdzikir dan bertawakkal kepada Allah Swt agar diberikan kelancaran dalam proses persalinan.

- 6) Merencanakan pemeriksaan serviks dengan skor bishop untuk menilai kematangan serviks dan responnya terhadap induksi persalinan, jika skor bishop rendah, artinya serviks belum matang dan memberikan angka kegagalan yang lebih tinggi jika dilakukan induksi persalinan.
 - 7) Merencanakan pemberian oksitosin sesuai anjuran dokter jika serviks sudah matang.
 - 8) Merencanakan asuhan persalinan sesuai APN, asuhan dilakukan untuk mencegah komplikasi lain akibat persalinan postterm.
 - 9) Merencanakan penanganan bayi baru lahir dengan persalinan postterm yaitu oksigen, *suction*, *infant warmer*, *incubator*, dan bedah sesar bila sewaktu-waktu terjadi kegawatdaruratan janin.
 - 10) Merencanakan penanganan asfiksia mekonium dengan cara mengeringkan, bebaskan jalan napas, rangsangan taktil dan menghangatkan.
- f. Langkah VI Implementasi

Pelaksanaan dari semua rencana sebelumnya, pelaksanaan pada persalinan postterm dapat dilakukan oleh bidan secara mandiri maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, rencana asuhan persalinan dengan postterm yaitu:

- 1) Melakukan pemantauan DJJ, nadi, dan his tiap 30 menit serta memastikan bahwa semuanya dalam batas normal.
- 2) Pemantauan kondisi janin dan keadaan yang membahayakan janin dengan cara pemeriksaan kardiografi seperti *nonstress test* (NST) dan *contraction stress test* (CST) untuk mengetahui kesejahteraan janin sebagai reaksi terhadap gerakan janin atau kontraksi uterus dan pemeriksaan USG untuk menentukan besar janin, denyut jantung janin,

gangguan pertumbuhan janin, keadaan dan derajat kematangan plasenta, jumlah (indeks cairan amnion dan kualitas air ketuban) (Fadlun, Feryanto, 2013: 90-92).

- 3) Melakukan pemantauan kemajuan persalinan, pada persalinan postterm kemungkinan terjadi makrosomia sehingga dapat menyebabkan terjadinya kala I memanjang, kala II lama, perdarahan postpartum.
- 4) Melakukan teknik pengurangan nyeri dengan memberikan terapi murottal dan ayat suci Al-Qur'an.
- 5) Memberikan anjuran agar senantiasa berdzikir dan bertawakkal kepada Allah Swt agar diberikan kelancaran dalam proses persalinan.
- 6) Melakukan pemeriksaan serviks dengan skor bishop untuk menilai kematangan serviks dan responnya terhadap induksi persalinan, jika skor bishop rendah, artinya serviks belum matang dan memberikan angka kegagalan yang lebih tinggi jika dilakukan induksi persalinan.
- 7) Melakukan pemberian oksitosin sesuai anjuran dokter jika serviks sudah matang.
- 8) Melakukan asuhan persalinan sesuai APN, asuhan dilakukan untuk mencegah komplikasi lain akibat persalinan postterm.
- 9) Melakukan penanganan bayi baru lahir dengan persalinan postterm yaitu oksigen, *suction*, *infant warmer*, *incubator*, dan bedah sesar bila sewaktu-waktu terjadi kegawatdaruratan janin.
- 10) Melakukan penanganan asfiksia mekonium dengan cara mengeringkan, bebaskan jalan napas, rangsangan taktil, menghangatkan dan melakukan resusitasi.

g. Langkah VII Evaluasi

Melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Setelah dilakukan asuhan persalinan postterm, hasilnya ibu dengan keadaan yang baik, bayi dalam kondisi normal, persalinan berjalan lancar sesuai dengan asuhan yang diberikan. Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan persalinan postterm pada ibu: masalah/ komplikasi yang terjadi pada ibu seperti partus lama, perdarahan postpartum, *inversia uteri* dapat teratasi dan ibu dalam keadaan umum baik. Sedangkan pada bayi, setelah dilakukan penatalaksanaan asuhan bayi postterm, masalah/komplikasi seperti aspirasi mekonium, asfiksia, gawat janin bahkan meninggal dapat teratasi dan bayi dalam keadaan umum baik (Varney dkk, 2002:31).

3. Pendokumentasian Manajemen Asuhan Kebidanan

Dokumentasi kebidanan adalah suatu sistem pencatatan atau pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan pasien dan semua kegiatan yang dilaksanakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Pendokumentasian atau catatan manajemen kebidanan diterapkan dalam metode SOAP. Dokumentasi SOAP merupakan urutan langkah-langkah yang dapat membantu mengatur pola pikir dalam memberikan asuhan secara menyeluruh. SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment, Planning) yaitu:

a. Subjektif

Subjektif merupakan hasil pengumpulan data pasien yang diperoleh melalui anamnesis, data yang diperoleh melalui wawancara, pada persalinan postterm dapat diperoleh data subjektif yaitu keluhan bahwa kehamilannya sudah lewat bulan, HPHT, *menarche*, riwayat persalinan sebelumnya, riwayat penyakit menular dan menurun lainnya.

b. Objektif

Objektif merupakan pendokumentasian dari data hasil observasi melalui pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang, (pemeriksaan laboratorium) yang meliputi: Keadaan umum, Kesadaran, Pemeriksaan TTV,HTP, Pemeriksaan head to toe, pemeriksaan dalam, Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan Hb, Albumin, dan reduksi.

c. *Assesment*

Assesment merupakan pendokumentasian berdasarkan data yang terkumpul kemudian dibuat kesimpulan meliputi diagnosis, antisipasi atau masalah potensial tentang persalinan postterm.

d. *Planning*

Planning merupakan rencana tindakan yang akan diberikan termasuk asuhan mandiri, kolaborasi, serta konseling untuk tindak lanjut.

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI
PADA NY”N “ DENGAN PERSALINAN POSTTERM
DI RUMAH SAKIT SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 17 JULI 2018

No. Register : 508xxx
Tanggal Masuk : 17 Juli 2018 Jam : 13.40 Wita
Tanggal Pengkajian : 17 Juli 2018 Jam : 13.40 Wita
Tanggal Partus : 17 Juli 2018 Jam : 16.40 Wita
Pengkaji : Eka Riska

KALA I

Langkah 1 : Identifikasi Data Dasar

A. Identitas Isteri / Suami

Nama : Ny” N” / Tn “R”
Umur : 27 tahun / 30 tahun
Nikah : 1x
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT/ Petani
Alamat : Parigi

B. Data Biologis

1. Keluhan utama : Sakit perut tembus belakang disertai pelepasan lendir dan darah sejak jam 08.00 wita.

2. Riwayat keluhan utama :
 - a. Mulai dirasakan sejak tanggal 17 Juli 2018 jam 08.00 Wita
 - b. Sifat keluhan hilang timbul.
 - c. Lokasi keluhan dari perut bahagian bawah tembus kebelakang.
 - d. Belum ada pengeluaran air.
 - e. Ibu mendapat haid terakhir tanggal 15 September 2017
3. Riwayat kesehatan :
 - a. Ibu mengatakan mendapatkan suntikan TT di puskesmas Parigi sebanyak 2 kali
TT 1 : 20 Oktober 2017
TT II: 23 november 2017
 - b. Ibu tidak pernah menderita penyakit yang serius (hipertensi, jantung, DM, dll).
 - c. Ibu sebelumnya tidak pernah di opname.
 - d. Tidak ada riwayat trauma.
 - e. Tidak ada riwayat operasi.
 - f. Tidak ada riwayat alergi.
 - g. Tidak pernah mengkonsumsi alkohol, rokok, dan obat- obatan tanpa resep dokter.
 - h. Tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun dalam keluarga
4. Riwayat reproduksi :
 - a. Riwayat haid
 - 1) *Menarche* : 14 tahun
 - 2) Siklus haid : 28-30 hari.
 - 3) Durasi : 5-7 hari

- 4) Perlangsungan normal
- b. Riwayat ginekologi
 - 1) Ibu tidak menderita penyakit kelamin.
 - 2) Tidak ada riwayat PMS.
- c. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB
- d. Riwayat kehamilan sekarang
 - 1) G1 P0 A0
 - 2) HPHT tanggal 15 September 2017
 - 3) Usia kehamilan \pm 10 bulan
 - 4) HTP tanggal 23 Juni 2018
 - 5) Kunjungan ANC 6 kali
 - 6) Ibu mulai merasakan pergerakan janinnya yang pertama kali saat usia kehamilan \pm 4 bulan.
 - 7) Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat pada bagian perutnya.
 - 8) Selama hamil, ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat.
5. Riwayat sosial ekonomi
 - a. Menikah pada usia 26 tahun
 - b. Keluarga sangat senang dengan kehamilan ibu.
 - c. Ibu mengonsumsi buah-buahan dan susu.
 - d. Ibu dan keluarganya ingin persalinannya ditolong oleh bidan.
6. Pemeriksaan fisik
 - a. Pemeriksaan fisik umum
 - 1) Tampak meringis kesakitan saat ada his.

2) Keadaan emosi ibu stabil.

3) Kesadaran composmentis.

4) TTV : TD = 100 / 60 mmHg N = 80x / i

S = 36,7 °C P = 20x / i

5) Inspeksi – Palpasi – Auskultasi

a) Wajah :

Tidak ada oedema, tidak ada topeng kehamilan, ekspresi wajah ibu meringis menahan sakit.

b) Mata :

Bersih, konjungtiva merah muda, sklera tidak icterus.

c) Mulut dan gigi

Bersih, tidak gigi yang lubang, tidak ada gigi yang tanggal, ada karies, tidak ada sariawan, lidah tidak kotor, gigi tampak putih, mukosa bibir lembab.

d) Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada pembesaran pembesaran vena jugularis.

e) Payudara

Simetris kiri dan kanan, tampak hiperpigmentasi areola mammae, putting susu menonjol, tidak teraba benjolan, tidak ada nyeri tekan pada waktu palpasi.

f) Abdomen

1) Tampak adanya striae livida, dan linea nigra, tonus otot perut ibu tegang, tidak ada bekas luka operasi.

2) Periksa Leopold

a) Leopold I : 3 jrbpx, 35 cm, bokong

Leopold II : puki

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP ,2/5

Lingkar perut : 95 cm

TBJ : $35 \times 95 = 3325$ gram

b) Auskultasi DJJ terdengar jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/ menit, secara teratur.

c) His kurang baik 2 x dalam 10 menit dengan durasi 10-15detik).

g) Vulva / Anus

Tampak pelepasan lendir dan darah bercampur air ketuban, tidak ada varices, tidak ada oedema, dan tidak ada hemoroid.

VT I tanggal 17 juli 2018 oleh bidan Eda/ Eka Riska

Vagina dan vulva : Normal

Portio : Tipis

Ketuban : Utuh

Pembukaan : 8 cm

Persentase : UUK kiri depan

Hodge : III

Moulase : 0

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah

h) Ekstremitas bawah

Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices, tidak ada oedema pada tungkai bawah.

i) Pemeriksaan lab

HB : 12 %

Protein Urine : - (negatif)

HIV : - (negatif)

C. Data Psikososial

Reaksi emosional selama persalinan

1. Ibu tidak mempersalahkan jenis kelamin anaknya.
2. Ibu sangat bahagia menantikan kelahiran bayinya.
3. Suami dan keluarga menunggu dan memberikan dukungan selama persalinan.

D. Data Spiritual

1. Selama persalinan ibu berserah diri kepada Tuhan.
2. Suami dan keluarga berdoa untuk keselamatan ibu dan anaknya.

Langkah II : Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Diagnosa : G I P 0 A 0 , gestasi 43 minggu 4 hari, situs memanjang, intrauterine, tunggal, hidup, keadaan ibu baik, keadaan janin baik, inpartu kala 1 fase aktif.

Masalah : persalinan postterm

1. G I P O A 0

Data subjektif :

Ibu mengatakan ini kehamilan yang pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya.

Data Objektif : Tonus otot tegang, tampak striae livid, dan linea nigra.

Palpasi abdomen :

Leopold I : 3 jrbpx, 35 cm, Bokong,

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 2/5

LP : 95 cm

TBJ : $35 \times 95 = 3325$ gram

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/i

Analisis dan Interpretasi Data

Ibu mengatakan kehamilan yang pertama dan tidak pernah keguguran ditunjang dengan tonus otot perut yang masih tegang karena belum mengalami peregangan sebelumnya.

Striae livid merupakan jaringan perut yang timbul karena pecahnya pembuluh darah perifer pada perut akibat peregangan pada dinding perut ibu berupa garis coklat dari perut sampai simpisis selama kehamilan (Sarwono, 2010).

Berdasarkan pemeriksaan abdomen dengan cara palpasi ditemukan adanya bagian-bagian janin dan djj. Hal ini menandakan ibu sedang hamil (Elisabeth, 2013).

2. Gestasi 43 minggu 4 hari

Data Subjektif :

- a. Ibu mengatakan kehamilannya lewat bulan
- b. Ibu datang tanggal 17 juli 2018.
- c. Ibu mengatakan HPHT tanggal 15 September 2017

Data Objektif : Leopold 1 : Tfu 3 jrbpx

Analisis dan Interpretasi Data

Dari HPHT tanggal 15 september 2017 Sampai tanggal 17 juli 2018 Maka gestasi 43 minggu 4 hari

Setelah memasuki umur kehamilan aterm, TFU dipengaruhi oleh masuknya bagian terendah janin dalam pintu atas panggul, pada primi terjadi pada permulaan persalinan, hal ini dipengaruhi oleh tekanan cairan intrauterine dan tekanan langsung fundus pada bokong.

3. Situs memanjang

Data Subjektif :

Ibu mengatakan janinnya bergerak kuat di sebelah kanan

Data Objektif :

Palpasi abdomen

Leopold I : 3 jrbpx, 35 cm, Bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 2/5

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/i

Analisis dan Interpretasi Data

Pada palpasi Leopold II, disatu sisi teraba struktur dan resisten adalah punggung dan disisi lain terdapat bagian-bagian kecil dari janin. Bunyi jantung janin terdengar lebih jelas dibagian sisi kiri ibu, sumbu panjang janin memanjang terhadap sumbu panjang ibu.

4. Intra Uterin

Data Subjektif :

Ibu mengatakan tidak pernah mengalami nyeri perut yang hebat.

Data Objektif :

Palpasi abdomen

Leopold I : 3 jrbpx, 35 cm, Bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 2/ 5

Tidak ada nyeri tekan saat palpasi.

Analisis dan Interpretasi Data

Pembesaran perut sesuai usia kehamilan, janin dapat diraba saat palpasi serta tidak ada nyeri perut yang hebat dan tidak ada nyeri tekan, hal ini menandakan kehamilan ibu intrauterine (sarwowno, 2010).

5. Tunggal

Data Subjektif : Ibu mengatakan pergerakan janin lebih sering disebelah kanan

Data Objektif : Palpasi abdomen

Leopold I : 3 jrbpx, 35 cm, Bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV :BDP, 2/5

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/i

Analisis dan Interpretasi Data

Pembesaran perut sesuai usia kehamilan, dan pergerakan janin hanya pada satu tempat dan auskultasi DJJ hanya terdengar pada kuadran kiri bawah saja. Ini menandakan kehamilan tunggal (Manuaba, 2008).

Palpasi leopold I teraba bokong, dan leopold III teraba satu kepala. Ini merupakan kehamilan tunggal.

6. Hidup

Data Subjektif :

Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat terutama pada sebelah kanan

Data Objektif :

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/i

Analisis dan Interpretasi Data

Adanya pergerakan janin yang dirasakan ibu dan DJJ terdengar menandakan janin hidup.

7. Keadaan ibu baik

Data Subjektif : Ibu merasa tidak pusing

Data Objektif :

- a. Tanda-tanda vital (TTV)

TD = 110/60 mmHg	N=80x/i
S = 36,7°C	P= 20x/i
- b. Kesadaran ibu kompesmentis (kesadaran penuh)
- c. Konjungtiva merah muda
- d. Tidak ada oedema

Analisis dan Interpretasi Data

Tanda- tanda vital ibu dalam batas normal, dan kesadaran ibu komposmentis, dan tidak ada oedema menandakan ibu tidak mengalami preeclampsia/eklampsia, dan konjungtiva merah muda normal menandakan ibu tidak anemis.

8. Keadaan janin baik

Data Subjektif : Ibu mengatakan janinnya bergerak kuat.

Data Objektif :

- a. Auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/i secara teratur.
- b. Pemeriksaan VT Moulase : tidak ada

Analisis dan Interpretasi Data

pergerakan janin yang kuat dan auskultasi DJJ yang terdengar jelas dan teratur menandakan janin dalam keadaan baik.

Pada pemeriksaan VT, moulase (penyusupan) ditemukan : 0 (tidak ada). Hal ini menandakan bahwa tulang- tulang kepala janin terpisah sehingga bayi dapat menyesuaikan diri dengan bagian keras panggul ibu (Sarwono, 2011).

9. Inpartu kulan I fase aktif

Data Subjektif :

Ibu mengatakan sakit perut tembus belakang disertai dengan pengeluaran lendir dan darah bercampur air ketuban.

Data Objektif :

- a. Kontraksi uterus (2x dalam 10 menit, durasi 10-15 detik).
- b. Penurunan kepala hodge III
- c. Pembukaan 8 cm
- d. Pelepasan lendir dan darah

Analisis dan Interpretasi Data

Tanda- tanda inpartu adalah sakit perut tembus belakang disertai pelepasan lendir dan darah. Lendir berasal dari servikalis karena servik mulai membuka dan mendatar.

Pembukaan serviks fase laten, dimulai sejak awal kontraksi, yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap sampai dengan pembukaan kurang dari 4 dan fase aktif dimulai dari pembukaan 4-10 cm dan adanya penurunan bagian terendah janin (Elisabeth, 2015).

Pada pemeriksaan dalam, posisi kepala hampir sejajar panggul dengan melalui spina isiadica(Nuraisah dkk, 2014).

Langkah III : Antisipasi Adanya Masalah Potensial

Antisipasi terjadinya gawat janin dan kala I memanjang.

Analisis dan Interpretasi Data

Gawat janin terjadi bila janin tidak menerima oksigen cukup, sehingga mengalami hipoksia, situasi ini dapat terjadi kronik (jangka panjang) atau akut. Tanda gawat janin, djj dalam proses persalinan

bervariasi, dan akan kembali normal dalam beberapa waktu. Bila djj tidak kembali normal setelah kontraksi ini merupakan tanda gawat janin (Saifuddin, 2010).

Kala I memanjang, kala I memanjang biasanya banyak terjadi pada primigravida, khususnya primigravida tua, faktor herediter dan faktor emosi (ketakutan dan lain-lain) yang sering kali menyebabkan terjadinya kala I memanjang, dalam menghadapi masalah tersebut, keadaan ibu harus diawasi dengan seksama.

Normal pembukaan serviks pada primipara adalah kurang dari 1,2 cm perjam atau penurunan kepala kurang dari 1 cm perjam, untuk multipara, normalnya pembukaan serviks kurang dari 1,5 perjam atau penurunan kepala kurang dari 2 cm perjam (Sarwono, 2011).

Langkah IV : Evaluasi Perlunya Tindakan Kolaborasi

Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian oksitosin

Hasil : dokter menganjurkan pemberian oksitosin 5 U/L dimasukkan kedalam larutan dextrose 5% diberikan secara infus intravena dengan jumlah tetesan 8 tetes/menit, dan selanjutnya dinaikkan 4 tetes tiap 30 menit jika tidak ada kemajuan persalinan.

Langkah V : Intervensi/ Rencana Tindakan

Diagnosis : Perlangsungan kala I

Tujuan :

1. Kala I berlangsung normal
2. Kondisi ibu dan janin baik
3. Kontraksi uterus baik
4. Ibu mendapat dukungan psikologi dari petugas dan keluarga

Kriteria :

1. Kala I berjalan kurang dari 10 jam
2. TTV ibu dalam batas normal dan Denyut Jantung Janin (DJJ) normal 120-160 x/i dan tidak ada moulase
3. Kontraksi uterus kuat dan teratur
4. Ibu memilih posisi yang menguntungkan dan nyaman

Rencana Tindakan :

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa pembukaan 8 cm, keadaan ibu dan janin baik

Rasional : dengan memberikan ibu penjelasan mengenai hasil pemeriksaan maka ibu dapat mengetahui bagaimana keadaan kesehatannya, janin dan persalinannya.

2. Jelaskan penyebab nyeri

Rasional : agar klien dapat mengerti dan memahami rasa nyeri yang dirasakan sehingga dapat beradaptasi.

3. Ajarkan ibu tehnik relaksasi apabila ada HIS dan berikan terapi murottal untuk mengurangi nyeri

Rasional : agar nyeri yang dirasakan ibu berkurang

4. Pantau djj, his, nadi setiap 30 menit, suhu dan tekanan darah setiap 4 jam

Rasional : untuk mengetahui keadaan ibu dan janin.

5. Lakukan pemeriksaan dalam setiap 4 jam atau jika ada indikasi

Rasional : untuk mengetahui kemajuan persalinan

6. Lakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan dan infus Dextrose

Rasional : untuk memperbaiki keadaan umum dan agar tidak terjadi dehidrasi

7. Berikan intake cairan dan nutrisi pada ibu

Rasional : dengan energy yang adekuat dapat memberikan energy bagi otot ibu sehingga ibu mempunyai kekuatan, yaitu kekuatan untuk meneran, sehingga persalinan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya dehidrasi.

8. Sarankan ibu untuk berkemih sesering mungkin

Rasional : kandung kemih yang penuh dapat menekan majunya kepala dan juga memberikan rasa tidak nyaman pada ibu

9. Berikan dukungan emoisonal, beritahu keluarga untuk memdampingi dan menjelaskan pentingnya pendampingan

Rasional : dapat mengurangi ketegangan sehingga dapat menerima proses persalinan

10. Anjurkan ibu untuk tidur miring kiri

Rasional : tidur miring kiri dapat membantu mempercepat turunnya bagian terendah janin dan suplai oksigen kejanin tidak terhambat.

11. Lakukan pendokumentasian dengan menggunakan partograf

Rasional : agar dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rencana asuhan selanjutnya

Langkah VI : Implementasi/ Tindakan

Tanggal 17 Juli 2018 Pukul 13.40 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa sementara proses persalinannya berlangsung normal dan kurang lebih 10 jam kemudian apabila his adekuat diharap pembukaan sudah lengkap

2. Mengkaji tingkat nyeri, menjelaskan bahwa nyeri yang dirasakan akibat adanya kontraksi uterus,
3. Mengajarkan ibu teknik relaksasi apabila ada HIS yaitu dan mengajarkan kepada ibu untuk menarik napas lewat hidung, dan menghembuskan perlahan lewat mulut seperti sedang meniup-niup dan berikan terapi murottal untuk mengurangi nyeri.

Hasil : ibu merasa nyaman dan nyeri berkurang

4. Memantau kemajuan persalinan (his, djj, nadi, pernapasan, setiap 30 menit, suhu dan TD setiap 4 jam atau jika ada indikasi).

Hasil :

- a. Jam 13.40 Wita his 2x10 menit, durasi 10-15 detik, DJJ 132x/i, N: 80x/I, TD: 100/60 mmHg, suhu 36,7°C, P: 20x/i, 8 tetes / menit
- b. Jam 14.10 wita his 3x10 menit, durasi 15-20 detik, DJJ 134x/i, N: 80x/i, 12 tetes / menit
- c. Jam 14.40 wita his 3x10 menit durasi 20-25 detik, DJJ 134x/i , N: 80x/i, 16 tetes / menit
- d. Jam 15.10 wita his 4x10 menit durasi 25-30 detik, DJJ 136x/i, N: 80x/i, 20 tetes / menit
- e. Jam 15.40 Wita his 4x 10 menit, durasi 40-45 detik, DJJ 136x/i, N: 80x/i, 20 tetes/ menit.
- f. Jam 16.10 Wita his 5x 10 menit, durasi 40-45 detik, DJJ 138x/i, N : 82x/i, 20 tetes/ menit.

5. Melakukan pemeriksaan dalam

- a. VT I tanggal 17 Juli 2018 jam 13.40 Wita oleh bidan Eda/Eka

Riska

Vulva dan vagina : Normal
 Portio : Tipis
 Ketuban : Utuh
 Pembukaan : 8 cm
 Persentase : UUK kiri depan
 Hodge : III
 Moulase : 0
 Penumbungan : Tidak ada
 Kesan panggul : Normal
 Pelepasan : Lendir dan darah

- b. VT II tanggal 17 Juli 2018 jam 15.40 Wita oleh bidan Eda/Eka

Riska

Vulva dan vagina : Normal
 Portio : Tipis
 Ketuban : Utuh
 Pembukaan : 9 cm
 Persentase : UUK kiri depan
 Hodge : III
 Moulase : 0
 Penumbungan : Tidak ada
 Kesan panggul : Normal
 Pelepasan : Lendir dan darah

c. VT III tanggal 17 Juli 2018 jam 16.10 Wita oleh bidan Eda/Eka

Riska

Vulva dan vagina	: Normal
Portio	: Melesap
Ketuban	: Keruh, bercampur mekonium
Pembukaan	: 10 cm
Persentase	: UUK depan
Hodge	: IV
Moulase	: 0
Penumbungan	: Tidak ada
Kesan panggul	: Normal
Pelepasan	: Lendir, darah, ketuban

6. Melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian infus dextrose 5 % dengan drips oksitosin 5 IU dengan jumlah 8 tetes/menit dan dinaikkan 4 tetes tiap 30 menit

Hasil: dokter menginstruksikan pemberian oksitosin 5 IU dengan jumlah tetesan 8 tetes/menit dan selanjutnya dinaikkan 4 tetes setiap 30 menit jika tidak ada kemajuan.

7. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum bila tidak ada his.

8. Memberi dukungan emosional

9. Menganjurkan ibu untuk tidur miring kiri

10. Mendokumentasikan hasil asuhan dengan menggunakan partograf

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 17 juli 2018 Jam 16.10 Wita

1. Kala I fase aktif berlangsung normal ditandai dengan

a. Kala I kurang dari 10 jam

- b. His adekuat (5x dalam 10 menit durasi 40 – 45 detik)
2. Kondisi ibu dan janin baik ditandai dengan DJJ : terdengar jelas, kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/i secara teratur.
3. Keadaan ibu baik dengan TTV dalam batas normal

TD	: 100/60 mmHg	N	: 80x/i
P	: 20x/i	S	: 36,7°C
4. Ibu mengatakan ada dorongan kuat untuk meneran dan perasaan ingin BAB
5. Pemeriksaan dalam (VT III) jam 16.10 Wita : pembukaan lengkap, persentase uuk depan, Hodge IV, molase tidak ada, pelepasan lendir dan darah bercampur air ketuban.

KALA II

Langkah 1 : Identifikasi Data Dasar

Data Subjektif :

1. Ibu mengatakan sakit perut semakin kuat
2. Ibu mengatakan adanya dorongan kuat
3. Ibu mengatakan ingin buang air besar (BAB) dan ada tekanan pada anus

Data Objektif :

1. Perineum menonjol
2. Vuya dan anus membuka
3. Kontraksi uterus 5 x dalam 10 menit durasi 45-50 detik
4. DJJ terdengar jelas, kuat dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi =138x/ menit secara teratur

5. VT III tanggal 17 Juli 2018 jam 16.10 wita Oleh bidan “ Eda“ / Eka Riska: pembukaan lengkap, presentase uuk depan, dan pelepasan lendir dan darah bercampur air ketuban.

Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa aktual : perlangsungan kala II

Data Subjektif :

1. Ibu mengatakan ingin BAB dan ada tekanan pada anus
2. Ibu mengatakan ada dorongan yang kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan nyerinya bertambah dan semakin kuat.

Data Objektif :

1. Perineum menonjol
2. Vulva dan anus membuka
3. Kontraksi uterus 5 x dalam 10 menit, durasi 45-50 detik
4. DJJ terdengar jelas,kuat dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit secara teratur.
5. VT II tanggal 17 Juli 2018 jam 16.10 wita Oleh bidan “ Eda “ / Eka Riska: pembukaan lengkap, presentase uuk depan, dan pelepasan lendir dan darah bercampur air ketuban.

Analisis dan interpretasi data

Dengan adanya penekanan pada rektum memberi rangsangan pada ibu untuk BAB dan membuat anus terbuka.

Dengan adanya his yang adekuat menyebabkan segmen bawah rahim berkontraksi dan mendorong janin turun kebawah segman bawah rahim yang tertarik keatas sehingga terjadi dilatasi dan relksasi sehingga membentuk saluran jalan lahir (Manuaba, 2008).

Rasa nyeri yang timbul disertai tekanan pada anus dan rasa ingin meneran dan BAB pada ibu yang berlangsung secara refleks merupakan tanda-tanda gejala kala 2.

Langkah III : Antisipasi Masalah / Diagnosa Potensial

Masalah potensial : antisipasi terjadinya ruptur perineum dan kala 2 lama, asfiksia mekonium.

Data Subjektif :

1. Ibu merasakan ada tekanan pada anus
2. Ibu merasa adanya dorongan yang kuat untuk meneran

Data Objektif :

1. Ibu terlihat kelelahan
2. Vulva dan anus membuka
3. Perineum menonjol dan tanpak kaku.

Analisa dan interpretasi data

Keinginan untuk meneran merupakan refleks yang ditimbulkan oleh karena adanya penekanan kepala bayi pada dinding vagina dan rektum.

Persalinan yang lama dapat mengakibatkan tidak seimbangny cairan elektrolit serta kekurangan cadangan glukosa sehingga mengakibatkan kelelahan. Kondisi kelelahan akan mengakibatkan kontraksi uterus kurang adekuat sehingga mengakibatkan persalinan lama. Kala II dikatakan memanjang jika pembukaan serviks lengkap, ibu ingin mendedan, tetapi tidak ada kemajuan persalinan selama lebih dari 2 jam (Oxorn, 2010).

Adanya bagian terendah janin pada jalan lahir tampak pada perineum yang menonjol sehingga terjadi peregangan otot yang dapat mengakibatkan ruptur tidak adekuat selain itu perineum yang kaku dapat menjadi penyebab ruptur perineum.

Asfiksia mekonium terjadi jika janin mengalami stress selama proses persalinan berlangsung dan sering terjadi pada bayi postterm. Selama persalinan berlangsung, bayi bisa mengalami kekurangan oksigen, hal ini menyebabkan meningkatnya gerakan usus dan pencedoran otot anus, sehingga menyebabkan mekonium dikeluarkan kedalam cairan ketuban, jika bayi masih berada di dalam rahim dan bayi menghirup nafasnya yang pertama maka campuran air ketuban dan mekonium tersebut terhirup kedalam paru-paru.

Langkah IV : Evaluasi Tindakan Segera/Kolaborasi

Tidak ada indikasi

Langkah V : Rencana Tindakan

Tujuan:

1. Kala II berlangsung normal
2. Bayi lahir normal

Kriteria:

1. Kontraksi uterus baik
2. TTV dalam batas normal
3. Bayi lahir dalam 30 menit, segera menangis dan bernapas spontan
4. Tidak terjadi asfiksia dan hipotermi

Intervensi

1. Melihat adanya tanda gejala kala dua.

Rasional : agar dapat mengetahui apakah sudah dapat memimpin persalinan atau belum.

2. Persiapkan alat peralatan dan alat perlindungan diri

Rasional : mempersiapkan diri dan mencegah infeksi silang

3. Memakai celemek plastik.

Rasional : mencegah infeksi silang

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dgn sabun & air mengalir.

Rasional : mencegah infeksi silang

5. Menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Rasional : mencegah infeksi silang

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakan kembali kedalam wadah partus set.

Rasional : menyiapkan peralatan dalam keadaan siap pakai

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang (DTT), dengan gerakan vulva ke perineum.

Rasional : mencegah infeksi

8. Melakukan pemeriksaan dalam – pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

9. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5 %, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

Rasional : mencegah infeksi silang

10. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai – pastikan DJJ dalam batas normal (120 – 160 x/menit).

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin

11. Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

Rasional : agar ibu mengetahui dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan.

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman)

Rasional : dapat membantu proses persalinan

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Rasional : memperlancar berlangsungnya proses persalinan.

14. Menganjurkan ibu tidur miring dan atau mengambil posisi nyaman,

Rasional : dapat membantu penurunan kepala janin.

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Rasional : untuk mengeringkan tubuh bayi

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu

Rasional : sebagai alas untuk menyokong perineum

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.

Rasional : mempersiapkan alat dalam keadaan siap pakai

18. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.

Rasional : untuk mencegah infeksi.

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5–6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu melindungi perineum dengan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan

belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).

Rasional : agar tidak terjadi ruptur perineum

20. Memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Rasional : memeriksa adanya lilitan tali pusat untuk mencegah bayi dari asfiksia dan kematian janin.

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Rasional : menghilangkan torsi pada leher

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal. Mengajukan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Rasional : untuk membantu pengeluaran tubuh bayi agar tidak terjadi rupture perineum

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Rasional : membantu pengeluaran tubuh bayi seluruhnya

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin).

25. Melakukan penilaian selintas :

- a. bayi menangis kuat dan bernapas tanpa kesulitan
- b. bayi bergerak aktif

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering. Membiarkan bayi atas perut ibu.

Rasional : agar bayi tidak hipotermi

27. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Rasional : untuk mengetahui ada tidaknya kehamilan ganda.

28. Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 IU secara IM (intramaskuler) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin).

30. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Rasional : untuk menentukan batas tali pusat yang akan di potong

31. Dengan satu tangan. Pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

32. Mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.

33. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi

Rasional : untuk mencegah agar tidak hipotermi karena hilangnya panas.

Langkah VI : Implementasi

Tanggal 17 Juli 2018 jam 16.10 Wita

1. Melihat Adanya Tanda Persalinan Kala Dua
 - a. Dorongan kuat untuk meneran
 - b. Tekanan pada anus
 - c. Perineum menonjol
 - d. Vulva dan anus membuka
2. Menyiapkan peralatan persalinan dan perlindungan diri
 - a. **Partus set**
 - 1) 2 buah kelm kocher
 - 2) 1 buah setengah kocher
 - 3) Gunting tali pusat
 - 4) Gunting episiotomi
 - 5) Penjepit tali pusat
 - 6) De lee
 - 7) Handscoon steril
 - 8) Kasa secukupnya

b. Obat-obatan

- 1) Oksitosin
- 2) Vit.k
- 3) Hb0

c. Alat resusitasi

- 1) *Suction*
- 2) *Infant warmer*
- 3) O₂(tabung oksigen)

d. Hecting set

- 1) Pinset anatomi
- 2) Pinset cirurgi
- 3) Needle holder
- 4) Jarum/catgut

e. APD

- 1) Celemek
- 2) Sepatu boot
- 3) Masker
- 4) Kaca mata
- 5) Penutup kepala
- 6) Handuk bersih

f. Peralatan lainnya

- 1) Alat TTV
- 2) Lenecc/dopler

- 3) Timbangan bayi
 - 4) Kantong plastic
 - 5) Wadah air dtt
 - 6) Wadah air clorin 0,5%
 - 7) Tempat sampah
 - 8) Pakaian ibu dan bayi
 - 9) Cairan infuse Dextrose 5%
 - 10) Infuse set, kain bersih
 - 11) Under pad
3. Memakai celemek plastik.
 4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dgn sabun & air mengalir.
 5. Menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yg akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.
 6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakan kembali kedalam wadah partus set.
 7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang (DTT), dengan gerakan vulva ke perineum.
 8. Melakukan pemeriksaan dalam – pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Hasil : VT III tanggal 17 Juli 2018 jam 16. 10 Wiita Oleh bidan “ Eda“ / Eka Riska pembukaan lengkap, presentase uuk depan, dan pelepasan lendir dan darah bercampur air ketuban.

9. Mencilupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.
10. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai – pastikan DJJ dalam batas normal (120 – 160 x/menit).

Hasil : terdengar jelas ,kuat dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/mnt secara teratur.

11. Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).
13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.
14. Menganjurkan ibu untuk tidur miring kiri atau mengambil posisi nyaman.
15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.
16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu
17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.
18. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.
19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melindungi perineum dngan satu tangan, dan tangan

yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).

20. Setelah kepala keluar menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Hasil: tidak ada lilitan tali pusat

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental. Mengajukan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Hasil : bayi lahir tanggal 17 Juli 2018 jam 16 40 Wita ,dengan jenis kelamin : laki laki.

25. Melakukan penilaian selintas :

Hasil : bayi tidak segera menangis, usaha nafas lambat, gerakan hampir tidak ada, kulit kebiruan, kering, mudah mengelupas, disertai ada mekonium dikulit.

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering.
27. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Hasil : bayi tunggal

28. Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitasin agar uterus berkontraksi baik.
29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM (intramaskuler) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin).
30. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.
31. Dengan satu tangan. Pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.
32. Mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.
33. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Langkah VII Evaluasi

Tanggal 17 Juli 2018 jam 16. 40 wita

1. Kala 2 berlangsung normal :
 - a. Bayi lahir spontan, tidak segera menangis, kulit kebiruan, bayi dalam keadaan lemah, pergerakan kurang aktif pada tanggal 17 Juli 2018 jam 16. 40 Wita
 - b. Kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras
 - c. TFU setinggi pusat
2. Jumlah perdarahan kurang lebih 140 cc, plasenta belum lepas

KALA III

Langkah 1 : Identifikasi Data Dasar

Data Subjektif : Ibu merasa senang dengan melahirkan bayinya.

Data Objektif :

- a. Bayi lahir spontan dan tidak segera menangis pada tanggal 17 Juli 2018 jam 16.40 wita
- b. TFU setinggi pusat
- c. Kontraksi uterus baik
- d. Perdarahan kurang lebih 140cc
- e. Plasenta belum lahir

Langkah II Identifikasi Diagnosa /Masalah Aktual

Diagnosa : perlangsungan kala III

Data Subjektif : Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya

Data Objektif :

- a. Kontraksi uterus baik
- b. TFU setinggi pusat
- c. Pendarahan kurang lebih 140cc

- d. Plasenta belum terlepas

Analisa dan interpretasi data

Setelah bayi lahir uterus berkontraksi yang menyebabkan penciutan Permukaan kovem uteri dan tampak placenta, akibatnya plasenta akan terlepas dari tempat tertanamnya.

Langkah III : Antisipasi Masalah Potensial

Masalah potensial : antisipasi terjadinya rest plasenta

Langkah IV : Tindakan Segera Kolaborasi

Tidak ada data yang menunjang

Langkah V : Rencana Tindakan

Diagnosa : Perlangsungan kala III

Tujuan :

- a. Kala III berlangsung normal
- b. Pendarahan \pm 140 cc

Kriteria :

- a. Lamanya kala III kurang dari \pm 10 menit
- b. Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap
- c. Kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras
- d. Tidak terjadi pendarahan lebih dari 500cc

Intervensi

1. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Rasional : dapat memudahkan dalam PTT

2. Letakan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi. Tangan lain meregangkan tali pusat.
3. Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah

doroskrainal. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

4. Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso-kranial).

Rasional : memudahkan plasenta keluar sesuai kurve jalan lahir hingga tampak pada vulva.

5. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu (terasa ada tahanan), pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.
6. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Rasional : masase akan membantu kontraksi uterus

7. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia. : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban dapat menyebabkan terjadinya perdarahan kemudian memasukkannya dalam kantong plastik dapat mencegah infeksi silang.

Langkah VI : Implementasi

Tanggal 17 Juli 2018 jam 16. 43 wita

1. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva
Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi. Tangan lain meregangkan tali pusat.
2. Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah doroskrainal. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.
3. Letakan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi. Tangan lain meregangkan tali pusat.
4. Melakukan peregang dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso-kranial).
5. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu (terasa ada tahanan), pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Hasil: plasenta lahir jam 16.50 wita.

6. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

7. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 17 Juli 2018 jam 16.50 wita

1. Kala III berlangsung normal di tandai dengan
 - a. Lama kala III kurang dari 15 menit
 - b. Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap
 - c. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
 - d. TFU setinggi pusat.
2. Pendarahan tidak lebih dari 500cc
3. Terjadi ruptur perineum tingkat II
4. Keadaan ibu baik
tanda-tanda vital dalam batas normal
TD : 110/70mmHg P : 20x/menit

N : 78 x/menit

S : 37 °C

KALA IV

Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Data Subjektif : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

Data Objektif :

- a. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
- b. TFU setinggi pusat
- c. Plasenta lahir lengkap jam 16.50 wita
- d. TTV :

TD : 110/70 mmHg P: 20 x/i

N : 78 x/i S: 37 °C

Langkah II : Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Diagnosa : perlangsungan kala IV

Data Subjektif : Ibu mengatakan lelah saat persalinan

Data Objektif :

a. Placenta lahir lengkap jam 16.50 wita

b. Pendarahan kurang lebih 140cc

c. TTV :

TD : 110 / 70mmHg P : 20x / menit

N : 78 x / menit S : 37 °C

Analisa dan interpretasi data

Kala IV adalah kala pengawasan selama 2 jam setelah bayi dan plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap bahaya persalinan pendarahan postpartum.

Setelah placenta terlepas dengan demikian fundus terdorong ke atas serta bentuk uterus menjadi bulat dan keras.

Langkah III : Antisipasi Masalah Potensial

Masalah potensial : antisipasi terjadinya pendarahan post partum

Data Subjektif : ibu merasa lelah

Data Objektif :

a. Placenta lahir lengkap

b. TFU setinggi pusat

c. kontraksi uterus baik

d. pendarahan kurang lebih 140cc

e. TTV :

TD : 110 /70 mmHg

P : 20x / menit

N : 78 x / menit

S : 37 °C

Analisa dan interpretasi data

Kala IV adalah masa pengawasan selama 2 jam selama placentia lahir yang membutuhkan Pengawasan yang intensif, karena periode ini masih sangat rentan terjadinya perdarahan.

Langkah IV : Tindakan Segera / Kolaborasi

Tidak ada indikasi atau data yang menunjang untuk di lakukan tindakan segera.

Langkah V : Rencana Tindakan

Diagnosa : perlangsungan kala IV

Tujuan : kala IV berlangsung normal

Kriteria :

1. Kontraksi uterus baik
2. Tidak terjadi perdarahan
3. Keadaan ibu baik

Tujuan :

1. Kontraksi baik teraba keras dan bundar
2. Perdarahan tidak lebih dari 500 cc
3. TTV dalam batas normal

Intervensi

1. Evaluasi kemungkinan robekan pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila robekan menyebabkan perdarahan.

Rasional : robekan pada jalan lahir akan menyebabkan perdarahan aktif

2. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Rasional : uterus yang berkontraksi menandakan kala IV berlangsung normal

3. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.
4. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan Vit.k intramaskuler di paha kiri anterolateral.

Rasional : untuk mengetahui keadaan bayi dan pemberian vit K yaitu untuk mencegah perdarahan otak, dan tetes mata untuk mencegah infeksi mata

5. Setelah satu jam pemberian Vit.k berikan suntikan imunisasi Hepatitis B di paha kanan anterolateral.

Rasional : hepatitis B untuk memberi kekebalan pada tubuh bayi

6. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.

Rasional : kontraksi uterus yang baik menandakan kala IV berlangsung normal

7. Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

Rasional : untuk memancing munculnya kontraksi yang dapat membantu menghentikan perdarahan

8. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.

Rasional : untuk memastikan apakah perdarahan normal/tidak

9. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.

Rasional : untuk memastikan keadaan ibu tetap dalam keadaan baik

10. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik.
11. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi. **Rasional** : larutan clorin dapat membunuh bakteri
12. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.
13. Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai memakai pakaian bersih dan kering.
Rasional : memberikan rasa nyaman pada ibu dan mencegah infeksi.
14. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.
Rasional : agar dapat memulihkan tenaga ibu yang telah keluar saat bersalin
15. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.
Rasional : mencegah infeksi silang
16. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5% gr.
Rasional : sebagai tindakan desinfeksi sarung tangan
17. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Rasional : merupakan dekontaminasi agar tidak terkontaminasi dengan bakteri
18. Melengkapi partograf.
Rasional : sebagai catatan pemantauan persalinan.

Langkah VI : Implementasi

Tanggal 17 Juli 2018 jam 17.05 Wita

1. Mengevaluasi kemungkinan robekan pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila robekan menyebabkan perdarahan.
2. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.
3. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.
4. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.

Hasil: - BBL : 3340 gram - PBL : 51cm

- Lk: 32 cm , Ld: 31 cm , Lp: 31 cm , Lila: 11 cm

- Vit.k telah disuntikkan jam 18.15 wita

5. Setelah satu jam pemberian vitamin K1 berikan suntikan imunisasi Hepatitis B di paha kanan anterolateral.
6. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam. Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
7. Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
8. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.
9. Memeriksa tekanan darah nadi ,suhu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.
- 10.

Hasil :

Tabel 1.2 observasi TTV

Waktu	Tekanan Darah	Suhu	Nadi	Tfu	Kandung Kemih	kontraksi	Perdarahan
17.05	110/70 mmHg	36,9°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 40 cc
17.20	110/70 mmHg	36,9°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 40 cc
17.35	110/70 mmHg	37°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 20 cc
17.50	110/70 mmHg	37°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 20 cc
18.20	110/70 mmHg	37°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 10 cc
18.50	110/70 mmHg	37°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 10 cc

Sumber : Data Primer Tahun 2018

11. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik.
12. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.
13. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.
14. Membersihkan ibu dengan menggunakan air DDT. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.
15. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.
16. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.
17. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

18. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian keringkan

19. Melengkapi partograf

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal : 17 Juli 2018 jam : 19.00 Wita

1. Kala IV berlangsung normal, di tandai dengan

- a. kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
- b. jumlah pendarahan kurang lebih 140cc
- c. TTV dalam batas normal

TD = 110 / 70mmHg N = 78 x/ menit

P = 20x /menit S = 37°C

Hecting perineum derajat /tingkat II dengan anestesi

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
PADA NY “N” GESTASI 43 MINGGU 4 HARI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TGL 17 JULI 2018**

No. Register : 508xxx

Tanggal Masuk : 17 Juli 2018 Jam : 13.40 Wita

Tanggal Partus : 17 Juli 2018 Jam : 16.40 Wita

Tanggal Pengkajian : 17 Juli 2018 Jam : 13.40 Wita

Pengkaji : Eka Riska

Identitas Isteri / Suami

Nama : Ny “ N” / Tn “ R”

Umur : 27 thn / 30 thn

Nikah : 1x

Suku : Makassar / Makassar

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Petani

Alamat : Parigi

KALA I

Data Subjektif (S)

- a. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan yang pertama
- b. Ibu mengatakan HPHT tanggal 15 September 2017
- c. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat disebelah kanan perut ibu
- d. Ibu merasakan pergerakan janinnya pertama kali diusia kehamilan \pm 4 bulan.

- e. Ibu mengatakan umur kehamilannya lewat bulan
- f. Ibu telah mendapat imunisasi TT sebanyak 2 kali
TT I : 20 Oktober 2017
TT II: 23 November 2017
- g. Ibu mengatakan sakit perut tembus kebelakang sejak pukul 08.00 Wita
- h. Ibu mengatakan ada pelepasan lendir bercampur dengan darah sejak jam 08.00 Wita
- i. Ibu mengatakan sakitnya hilang timbul dan mempengaruhi aktivitasnya
- j. Ibu tidak pernah menderita penyakit serius.

Data Objektif (O)

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. HPHT tanggal 15 september 2017
- c. Pemeriksaan fisik umum
 - 1) Ibu tampak meringis kesakitan saat timbul his
 - 2) Keadaan emosi ibu stabil
 - 3) Kesadaran composmentis
 - 4) TTV : TD= 100/60 mmHg S= 36,7°C
N = 80x/ i P= 20x/ i
 - 5) Inspeksi – Palpasi – Auskultasi terfokus
 - a) Wajah : tidak edema, tidak ada topeng kehamilan, ekspresi wajah ibu meringis menahan sakit.
 - b) Mata : bersih, conjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus.
 - c) Mulut dan gigi : bersih, tidak ada gigi yang lubang, tidak ada

gigi yang tanggal, ada karies, tidak ada sariawan, lidah tidak kotor gigi tampak putih, mukosa bibir lembab.

- d) Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada pembesaran vena jugularis.
- e) Payudara : Simetris kiri dan kanan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak teraba benjolan, tidak ada nyeri tekan pada waktu palpasi.
- f) Abdomen : Tampak adanya striae livida, dan linea nigra, tonus otot perut ibu tegang, tidak ada bekas luka operasi.

Pemeriksaan Leopold :

Leopold I : 3 jbpx, 35 cm, bokong

Leopold II : punggung kiri

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 2/5

Lingkar perut: 95 cm

TBJ: 35 cm x 95 cm= 3325 gram

Auskultasi DJJ terdengar jelas di kuadran kiri bawah perut

ibu dengan frekuensi 132 x / mnt, secara teratur

His (2 x dalam 10 menit dengan durasi 10 - 15 detik).

- g) Vulva / Anus : Tampak pelepasan lendir dan darah , tidak ada varises, tidak ada oedema, dan tidak ada hemoroid pada anus.

Pemeriksaan dalam: VT I tanggal 17 Juli 2018 jam 13.40 wita

oleh bidan Eda/ Eka Riska

Vagina dan vulva : Normal

Portio : Tipis

Ketuban : Utuh

Pembukaan : 8 cm

Presentase : UUK kiri depan

Hodge : H- III

Molase : 0

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir dan darah

h) Ekstremitas bawah : Simetris kiri dan kanan, Tidak ada varises,
Tidak ada edema pada tungkai bawah.

i) pemeriksaan lab

HB : 12 %

Protein urine : Negatif

HIV : Negatif

HbSAg: Non Reaktif

Assesment (A)

Diagnosa : GI P0 A0, gestasi 43 minggu 4 hari, situs memanjang, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala 1 fase aktif dengan persalinan postterm.

Planning (P)

Tanggal 17 Juli 2018 jam 13.50 Wita.

- a. Menyampaikan Hasil pemeriksaan pada ibu bahwa sementara proses persalinannya berlangsung normal dan kurang lebih 10 jam kemudian apabila his adekuat diharap pembukaan sudah lengkap.

Hasil : Hasil pemeriksaan telah disampaikan

- b. Mengkaji tingkat nyeri, menjelaskan bahwa nyeri yang dirasakan akibat adanya kontraksi uterus, dan mengajarkan pada ibu untuk menarik nafas lewat hidung dan menghembuskan secara perlahan melalui mulut serta memberikan terapi murottal untuk mengurangi nyeri.

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukan bila ada his.

- c. Memantau kemajuan persalinan (his, djj, nadi, pernapasan, setiap 30 menit, suhu & tekanan darah setiap 4 jam atau jika ada indikasi).

Hasil:

- 1) Jam 13.40 wita his 2 x 10 m enit durasi 10 – 15 detik, djj 132x/i,
N: 78 x/I, TD : 100/60 mmHg, S : 36,7°C, 8 tetes/ menit
- 2) Jam 14.10 wita his 3 x 10 menit durasi 15 – 20 detik,djj 134x/I,
N: 80 x/i, 12 tetes/ menit
- 3) Jam 14.40 wita his 3 x 10 menit durasi 20 – 25 detik, djj 134x/i,
N: 80 x/i, 16tetets/ menit.
- 4) Jam 15. 10 wita his 4 x 10 menit durasi 25 – 30 detik, djj 136x/i,
N: 80x/i, 20 tetes/ menit.

5) Jam 15. 40 wita his 4 x 10 menit durasi 40- 45 detik, djj 136 x/i,
N: 80 x/i, 20 tetes/ menit.

6) Jam 16. 10 wita his 5 x 10 menit durasi 40 – 45 detik, djj 138x/ i, N
: 80 x/i, 20 tetes/ menit

d. Melakukan pemeriksaan dalam

1) VT I tanggal 17 Juli 2018 jam 13.40 wita Oleh bidan “ Eda“ / Eka
Riska.

Vagina dan vulva : normal

Portio : tipis

Ketuban : utuh

Pembukaan : 8 cm

Presentase : uuk kiri depan

Hodge : H III

Moulase : O

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir dan darah

2) VT II tanggal 17 Juli 2018 jam 15.40 wita Oleh bidan “ Eda“ /
Eka Riska.

Vagina dan vulva : normal

Portio : tipis

Ketuban : utuh

Pembukaan : 9 cm

Presentase : uuk kiri depan

Hodge : H III

Moulase : 0

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir dan darah

3) VT III tanggal 17 Juli 2018 jam 16.10 wita Oleh bidan “ Eda “ /

Eka Riska.

Vagina dan vulva : normal

Portio : melelap

Ketuban : keruh, bercampur mekonium

Pembukaan : 10 cm

Presentase : uuk depan

Hodge : H IV

Moulase : 0

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir dan darah bercampur air ketuban.

- e. Melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemasangan infus dextros 5% dengan drips oksitosin 5 IU dengan jumlah tetesan 8 tetes/menit dan di naikkan 4 tetes tiap 30 menit jika tidak ada kemajuan

Hasil: dokter menginstruksikan pemberian oksitosin 5 IU dengan jumlah tetesan 8 tetes/menit dan selanjutnya dinaikkan 4 tetes setiap 30 menit jika tidak ada kemajuan.

- f. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum bila tidak ada his

Hasil : ibu mau makan nasi 3 sendok dan air ½ gelas.

- g. Mengusahakan agar kandung kemih kosong

Hasil : telah dilakukan kateter dan kandung kemih kosong.

- h. Memberi dukungan emosional

Hasil : ibu siap secara fisik dan mental dalam menghadapi persalinan.

- i. Menganjurkan ibu untuk tidur miring kiri

Hasil: Ibu bersedia melakukannya.

- j. Mendokumentasikan hasil asuhan dengan menggunakan partograf

Hasil: Partograf telah di isi.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KALA II

Data Subjektif (S)

- a. Ibu mengatakan ada dorongan untuk meneran.
- b. Ibu merasa ada tekanan pada anus dan vagina.
- c. Ibu merasa ingin BAB.
- d. Ibu mengatakan sakitnya bertambah kuat dan tembus kebelakang

Data Objektif (O)

- a. Keadaan umum ibu baik.
- b. Tampak ibu ingin meneran.
- c. Perineum menonjol.
- d. Vulva / anus membuka.
- e. Pemeriksaan dalam (VT III) jam 16.10 wita : pembukaan lengkap, presentase uuk depan, Hodge IV, molase tidak ada, pelepasan lendir dan darah bercampur air ketuban.

Assesment (A)

Perlangsungan Kala II dengan persalinan posterm.

Planning (P)

Tanggal 17 Juli 2018 jam 16.10 wita

1. Melihat adanya tanda dan gejala persalinan
 - a. Dorongan kuat untuk meneran
 - b. Tekanan pada anus
 - c. Perineum menonjol
 - d. Vulva dan anus membuka

Hasil : Tanda dan gejala kala II sudah terlihat

2. Menyiapkan peralatan persalinan dan perlindungan diri

a. Partus set :

- 1) 2 buah kelm kocher
- 2) 1 buah setengah kocher
- 3) Gunting tali pusat
- 4) Gunting episiotomi
- 5) Penjepit tali pusat
- 6) De lee
- 7) Handscoon steril
- 8) Kasa secukupnya

b. Obat-obatan

- 1) Oksitosin
- 2) Vit.k
- 3) Hb0

c. Alat resusitasi

- 1) *Suction*
- 2) *Infant warmer*
- 3) O2(tabung oksigen)

d. Hecting set

- 1) Pinset anatomi
- 2) Pinset cirurgi
- 3) Needle holder
- 4) Jarum/catgut

e. APD

- 1) Celemek
- 2) Sepatu boot
- 3) Masker
- 4) Kaca mata
- 5) Penutup kepala
- 6) Handuk bersih

f. Peralatan lainnya

- 1) Alat TTV
 - 2) Lenecc/dopler
 - 3) Timbangan bayi
 - 4) Kantong plastic
 - 5) Wadah air dtt
 - 6) Wadah air clorin 0,5%
 - 7) Tempat sampah
 - 8) Pakaian ibu dan bayi
 - 9) Cairan infuse Dextrose 5%, Infuse set, kain bersih Under pad
3. Memakai celemek plastik.
Hasil : celemek telah dipakai
4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dgn sabun & air mengalir.
Hasil : tangan sudah bersih dan kering
5. Menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yg akan digunakan untuk pemeriksaan dalam

Hasil : sarung tangan dipakai di tangan kanan

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakan kembali kedalam wadah partus set.

Hasil : oksitosin telah di simpan dalam bak partus

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang (DTT), dengan gerakan vulva ke perineum.

Hasil : vulva dan perineum telah bersih.

8. Melakukan pemeriksaan dalam – pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Hasil : Pemeriksaan dalam (VT III) jam 16.10 wita : pembukaan lengkap, presentase uuk depan, Hodge IV, molase tidak ada, pelepasan lendir dan darah bercampur air ketuban.

9. Mencilupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

Hasil : sarung tangan telah direndam di larutan clorin

10. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai – pastikan DJJ dalam batas normal (120 – 160 x/menit).

Hasil : terdengar jelas ,kuat dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/mnt secara teratur

11. Memberi tahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

Hasil : ibu telah diberi tahu

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Hasil: keluarga ibu bersedia membantu

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Hasil : ibu meneran dengan baik

14. Menganjurkan ibu untuk tidur miring atau mengambil posisi yang nyaman

Hasil: ibu bersedia melakukannya

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Hasil : handuk telah diletakkan

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu

Hasil: kain bersih yang dilipat 1/3 bagian telah diletakkan di bawah bokong ibu.

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan.

Hasil: tutup partus set dibuka dan alat dan bahan lengkap

18. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan.

Hasil: sarung tangan di pakai dikedua tangan

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melindungi perineum dngan satu tangan, dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).

Hasil : kepala bayi telah lahir

20. Setelah kepala keluar menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Hasil: tidak ada lilitan tali pusat

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Hasil: bayi telah melakukan putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental. Menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Hasil: bahu depan dan bahu belakang telah lahir

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Hasil: lengan ,badan dan siku lahir

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan ari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Hasil : bayi lahir tanggal 17 Juli 2018 jam 16.40 wita, dengan jenis kelamin : laki – laki

25. Melakukan penilaian sepintas

Hasil : bayi tidak segera menangis, usaha nafas lambat, gerakan hampir tidak ada, kulit kebiruan, kering, mudah mengelupas, disertai ada mekonium dikulit.

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering.

Hasil: kain basah telah diganti kain kering

27. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Hasil : bayi tunggal

28. Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Hasil: ibu telah diberu tahu

29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 IU IM (intramaskuler) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin).

Hasil: telah di suntik oksitosin

30. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Hasil: tali pusat telah dijepit.

31. Dengan satu tangan. Pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Hasil: tali pusat telah di potong

32. Mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.

Hasil: tali pusat menggunakan klem penjepit tali pusat plastik.

33. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Hasil: ibu dan bayi telah diselimuti.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KALA III

Data Subjektif (S)

Ibu merasa senang dengan kelahiran bayinya

Data Objektif (O)

1. Bayi lahir tanggal 17 Juli 2018 jam 16.40 Wita dengan jenis kelamin laki laki, bayi tidak segera menangis, usaha nafas lambat, gerakan hampir tidak ada, kulit kebiruan, kering, mudah mengelupas, disertai ada mekonium dikulit.
2. TTV :

TD: 110/70 mmHg	N :80 x/i
P : 20 x/I	S : 36,7°C
3. Kontraksi uterus baik (teraba bundar dan keras)
4. TFU setinggi pusat

Assesment (A)

Perlangsungan Kala III

Planning (P)

Tanggal 17 Juli 2018 jam 16.40 Wita

1. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva
Hasil: klem berjarak 5-10 cm dari vulva.
2. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simpisis, untuk mendeteksi. Tangan lain meregangkan tali pusat.
Hasil : tangan di atas simpisis dan tangan lain meregangkan
3. Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah doroskrainal. Jika plasenta tidak lahir setelah 30–40 detik, hentikan

penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Hasil : peregangn berhasil

4. Melakukan peregangn dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso-kranial).

Hasil: peregangn dan dorso cranial dilakukan

5. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu (terasa ada tahanan), pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Hasil: plasenta lahir jam 16.50 wita

6. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Hasil: Masase telah dilakukan

7. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Hasil: plasenta lahir dengan kotiledon dan selaput lengkap, plasenta telah di masukan ke tempat sampah yang disediakan

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KALA IV

Data Subjektif (S)

Ibu mengatakan lelah setelah persalinannya tanggal 17 Juli 2018 jam 16.40 wita.

Data Objektif (O)

1. Kala III berlangsung \pm 10 menit
2. Plasenta lahir lengkap jam 16.50 wita
3. Kontraksi uterus baik (teraba bundar dan keras).
4. TFU setinggi pusat
5. Perdarahan \pm 140 cc.
6. TTV :

TD = 110 / 70 mmHg	S = 37°c
N = 78 x / i	P = 20 x / i

Assesment (A)

Perlangsungan Kala IV

Planning (P)

Tanggal 17 Juli 2018 jam 16.50 wita.

1. Evaluasi kemungkinan robekan pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila robekan menyebabkan perdarahan.
Hasil : terjadi ruptur perineum tingkat II.
2. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.
Hasil : uterus berkontraksi baik, teraba keras dan bundar
3. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.
Hasil : bayi berada di dalam sinaran infant warmer

4. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.

Hasil: BBL : 3340 gram, PBL : 51 cm, LK: 32 cm , LD: 31 cm , LP: 31 cm , LILA: 11 cm, Vit.K telah disuntikkan jam 18.15 wita

5. Setelah satu jam pemberian vitamin K1 berikan suntikan imunisasi Hepatitis B di paha kanan anterolateral.

Hasil : Hb0 telah disuntikkan jam 19.15 wita

6. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.

Hasil : telah dilakukan pemantauan

7. Mengajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.

Hasil: telah dilakukan evaluasi

9. Memeriksa tekanan darah nadi ,suhu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.

Hasil :

Tabel 1.3 Observasi TTV

Waktu	Tekanan Darah	Suhu	Nadi	Tfu	Kandung Kemih	kontraksi	Perdarahan
17.05	110/70 mmHg	36,9°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 40 cc
17.20	110/70 mmHg	36,9°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 40 cc
17.35	110/70 mmHg	37°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 20 cc
17.50	110/70 mmHg	37°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 20 cc
18.20	110/70 mmHg	37°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 10 cc
18.50	110/70 mmHg	37°C	78x/i	1 jrbpst	Kosong	Baik	± 10 cc

Sumber : Data Primer Tahun 2018

10. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik.

Hasil: bayi bernafas dengan baik

11. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

Hasil: semua peralatan telah direndam

12. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

Hasil: bahan – bahan yang terkontaminasi telah dibuang

13. Membersihkan ibu dengan menggunakan air DDT. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai memakai pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu telah dibersihkan engan air DTT dan pakaian ibu telah diganti.

14. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.

Hasil: ibu sudah merasa nyaman.

15. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

Hasil: tempat bersalin telah didekontaminasi

16. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%

Hasil: sarung tangan telah direndam

17. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian keringkan

Hasil: tangan sudah bersih dan kering

18. Melengkapi partograf

Hasil: partograf telah di lengkapi

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL
HARI PERTAMA PADA NY”N” DENGAN NYERI ABDOMEN
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 17 JULI 2018**

No.Register : 508xxx

Tanggal Masuk : 17 Juli 2018 Jam : 13.40 Wita

Tanggal Partus : 17 Juli 2018 Jam : 16.40 Wita

Tanggal Pengkajian : 17 Juli 2018 Jam : 19.30 Wita

Nama Pengkaji : Eka Riska

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “N”/ Tn “ R”

Umur : 27 thn/ 30 thn

Nikah : 1x

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam/ Islam

Pendidikan : SMA/ SMA

Pekerjaan : IRT/ Petani

Alamat : Parigi

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan nyeri abdomen bagian bawah sejak 3 jam yang lalu, sifat keluhan hilang timbul.
2. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 17 Juli 2018 jam 16.40 Wita dengan jenis laki-laki.
3. Hari pertama haid terakhir tanggal 15 September 2017
4. Ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya
5. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD selama 1 jam dan dibantu oleh bidan
6. Ibu belum BAB dan sudah BAK
7. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, DM, jantung, dan penyakit lainnya

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan TTV

TD : 120/80 mmHg

S : 37,2°C

N : 80x/i

P : 20x/i

4. Pemeriksaan fisik

Wajah : tidak pucat, tidak oedema, tidak ada nyeri tekan

Mata : simetris, sklera putih, konjungtiva merah muda

Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid, limfe

Payudara : simetris, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, ada pengeluaran ASI saat puting dipencet

Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU 1 jrbpst, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, kandung kemih kosong

Genetalia : ada jahitan pada perineum, tampak pengeluaran darah 140 cc, ibu masih memakai popok, tidak ada oedema, tidak ada avarices dan tidak ada tanda- tanda infeksi.

Ekstremitas atas : terpasang infus di tangan kiri ibu 24 tetes permenit

Ekstremitas bawah : tidak ada oedema, tidak ada avarices, tidak ada nyeri tekan

Assesment (A)

Ny”N” P1 A0, Postpartum hari pertama dengan nyeri abdomen

Planning (P)

Tanggal 17 Juli 2018 jam 19.40 Wita

1. Menjelaskan pada ibu penyebab nyeri abdomen, yaitu pada saat hamil, rahim membesar sesuai ukuran yang dikandung, saat bayi lahir maka perlahan-lahan Rahim akan menyusut dan mengecil sehingga sebesar buah pir kecil. Proses kembalinya ke bentuk semula dari rahim, maka disertai dengan rasa kram pada perut disebut dengan kontraksi, uterus yang segera mengecil dan pembuluh darah yang terbuka saat terlepasnya placenta dapat

segera menutup kembali sehingga tidak terjadi perdarahan yang banyak, nyeri seperti ini makin terasa saat menyusui, ibu tidak perlu cemas, karena dengan adanya rangsangan hisapan bayi, maka keluar hormone oksitosin yang membantu kontraksi Rahim, gunakan gurita yang nyaman, lakukan relaksasi napas bila keram dan nyeri muncul.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan

2. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus yaitu dengan meletakkan satu tangan diatas perut ibu, lalu tekan dan putar secara terus menerus searah jarum jam sampai perut ibu terasa keras dan bundar

Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukan

3. Mengajarkan ibu untuk mobilisasi dini agar memperlancar pengeluaran lochia mencegah infeksi, mempercepat involusi uteri, memperlancar fungsi alat perkemihan serta meningkatkan kelancaran peredaran darah

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan

4. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin agar produksi asi lancar dan bayi mendapatkan asupan nutrisi, mengingat ASI begitu kaya akan manfaat seperti antibodi, maka bayi harus disusui minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat-obatan :

- a. Asam mefenamat 2x1
- b. Vitamin A 1x1

Hasil : telah dilakukan

6. Memberikan penjelasan mengenai manfaat ASI yaitu
 - a. ASI kaya akan zat penting yang dibutuhkan bayi seperti DHA, AA, Omega 6, laktosa, protein, laktobasillus, vitamin A, kolostrum, lemak, dan zat besi.
 - b. ASI memberikan kekebalan tubuh optimal untuk system imun bayi
 - c. ASI memberikan kekebalan tubuh optimal untuk system imun bayi
 - d. ASI sebagai sarana mendekatkan ibu dan bayinya
 - e. ASI tidak basi dan selalu segar serta higienis

Hasil : ibu mengerti

7. Memberikan konseling tentang
 - a. Nutrisi
Gizi yang dibutuhkan ibu yaitu makanan sehat dan seimbang yang mengandung lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, kalsium, seperti nasi, ikan, daging, telur, tempe, tahu, buah-buahan, kacang-kacangan dan banyak ,mengonsumsi air putih untuk memperbanya produksi ASI.
 - b. Personal hygiene
Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri, seperti mandi dan gosok gigi minimal 2x sehari, mengganti celana dalam / tiap kali dirasa lembab dan basah

c. Istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup seperti tidur malam minimal 6 jam, dan tidur siang minimal 2jam

d. Perawatan tali pusat

Untuk menjaga tali pusat agar tetap kering dan bersih, dibersihkan dengan kasa steril, yang dibasahi alcohol atau air matang yang bersih yang dimulai dari pangkal sampai ujung tali pusat, tali pusat dibiarkan terbuka dan kering dengan sendirinya tanpa diberi salep ataupun betadin

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Menganjurkan dan mengajarkan ibu untuk mempertahankan suhu tubuh bayi agar tidak mudah kehilangan suhu tubuh bayi seperti selalu membedong bayi. Bayi senantiasa dipakaikan pakaian bersih, kering, dan hangat dan selimuti bayi.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

9. Menjelaskan kepada ibu tentang kontrasepsi

a. Kondom yaitu selubung tipis dari karet yang berguna sebagai sarung penis yang sedang ereksi selama berhubungan dan menghalangi sperma masuk ke vagina dan membantu mencegah kehamilan, kekurangan: dapat bocor yang menyebabkan fungsi tidak efektif

b. Implant yaitu alat kontrasepsi berbentuk batang kecil yang dipasang di lengan bagian atas yang berfungsi untuk mencegah

kehamilan dan aman bagi ibu menyusui, kekurangan : menstruasi yang tidak teratur, tidak dapat digunakan bagi yang menderita diabetes, penyakit liver dan osteoporosis, dapat memicu iritasi, serta rasa tidak nyaman diarea lengan yang dipasang.

- c. IUD/AKDR yaitu kontrasepsi yang ditempatkan dalam rahim untuk menunda kehamilan dan jarak persalinan serta menjamin perlindungan jangka panjang serta aman bagi ibu yang menyusui, kekurangan : peningkatan aliran menstruasi, bercak berulang, kemungkinan mengalami sakit punggung.
- d. Suntik KB 3 bulan merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan menyuntikkan hormone progestin pada lengan bagian atas setiap 3 bulan sekali, kekurangan : penggunaan jangka panjang dapat menurunkan kepadatan tulang.
- e. PIL KB yaitu pil yang dikonsumsi rutin setiap hari,kekurangan : dapat menyebabkan bercak diantara menstruasi, mual, sakit kepala dan tidak cocok bagi wanita yang pelupa

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR
PADA BAYI NY”N” DENGAN ASFIKZIA SEDANG
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 17 JULI 2018

No. Register : 508xxx

Tanggal Lahir : 17 Juli 2018 Jam : 16.40 Wita

Tanggal Pengkajian : 17 Juli 2018 Jam : 17.45 Wita

Nama Pengkaji : EKA RISKHA

Identitas Bayi

Nama : by Ny” N “

Tempat tanggal lahir : RSUD Syekh Yusuf Gowa

Umur : 0 hari

Anak ke : 1

Jenis kelamin : laki- laki

Identitas Orang Tua

Nama : Ny “ N “/ Tn “ R “

Umur : 27 tahun/ 30 tahun

Nikah : 1x

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam/ Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Perkerjaan : IRT/ petani

Alamat : Parigi

Data Subjektif (S)

1. Hari pertama haid terakhir tanggal 15 September 2017
2. Ibu melahirkan tanggal 17 Juli 2018 jam 16.40 wita
3. Usia kehamilan pada saat melahirkan yaitu \pm 10 bulan
4. Jenis kelamin bayi laki-laki

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran compesmentis
3. Gestasi kehamilan pada saat melahirkan yaitu 43 minggu 4 hari
4. Penilaian sepintas segera setelah lahir, bayi dalam keadaan lemah, tidak langsung menangis, badan biru, pergerakan kurang aktif
5. Apgar score 5/7, diperiksa oleh bidan Eda/ Eka Riska

Tabel 1.4 penilaian *Apgar Score*

Yang dinilai	0	1	2	Menit 1	Menit 5
Appearance (warna kulit)	Badan biru pucat	Ekstrimitas Biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
Pulse	Tidak ada	<100x/i	>100x/i	0	2
Grimace	Tidak ada	Merintih	Batuk/bersin	2	1
Activity	Tidak ada	Fleksi ekstrimitas	Bergerak aktif	1	1
Respiratory	Tidak ada	Lemah, tak teratur	Menangis kuat	1	1
Jumlah				5	7

Sumber : Data Primer Tahun 2018

6. Pemeriksaan antropometri

BBL : 3340 gram

PBL : 51 cm

LK : 32 cm

LD : 31 cm

LP : 31 cm

Lila : 11 cm

7. Pemeriksaan tanda-tanda vital

HR : 142x/i

S : 36,8°C

RR : 44x/i

8. Pemeriksaan fisik

Mata : simetris, sklera putih, konjungtiva merah muda

Abdomen : tampak tali pusat masih basah, dan masih diikat dengan penjepit tali pusat

Genetalia : terdapat 2 testis yang dibungkus skrotum dan penis

Anus : ada lubang anus

Ekstremitas : simetris, lengkap, gerakan lemah

9. Eliminasi

BAB : -

BAK : -

Assesment (A)

Bayi Ny” N“, Lahir spontan, BLB, SMK dengan asfiksia sedang

Planning (P)

Tanggal 17 Juli 2018 jam 18.00 wita

1. Memberitahu ibu mengenai hasil pemeriksaan
Hasil : ibu mengerti
2. Memberitahu ibu dan keluarga untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi
Hasil : ibu dan keluarga mengerti, cuci tangan telah dilakukan
3. Mengajarkan kepada ibu cara mempertahankan suhu tubuh bayi dengan mbedong bayi dan menyalakan lampu sorot
Hasil : bayi telah dibedong dan dihangatkan dengan lampu sorot
4. Melakukan pembebasan jalan napas dan lendir menggunakan delee
Hasil : jalan napas sudah dibersihkan delee
5. Melakukan rangsangan taktil dengan cara menepuk atau menyentil telapak kaki, menggosok perut, dada, punggung, biarkan bayi tetap berada dalam infant warmer untuk menjaga suhu bayi.
Hasil : tindakan telah dilakukan
6. Melakukan penilaian bayi
 - a. Memperhatikan dan menilai pernapasan bayi
 - b. Menghitung frekuensi selama 1 menit
 - c. Menilai warna kulit**Hasil** : tindakan telah dilakukan
7. Mengajarkan pada ibu tentang cara merawat tali pusat
 - a. Bersihkan dengan kasa steril yang telah dibasahi air matang, dimulai dari bagian pangkal tali pusat sampai bagian ujung, setelah itu keringkan dan biarkan terbuka

- b. Usahakan popok atau celana bayi tidak mengenai tali pusat agar tidak terjadi iritasi

Hasil : ibu mengerti tentang cara merawat tali pusat

- 8. Menganjurkan agar ibu tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya, yang memiliki manfaat

- a. Meningkatkan system imun bayi
- b. Melindungi bayi dari berbagai macam penyakit
- c. ASI tidak basi dan tetap higienis
- d. Meningkatkan tali kasih antara ibu dan bayi

Hasil : ibu mengerti dan bersedia memberikan ASI eksklusif

- 9. Memberitahu kepada ibu tentang tanda bahaya infeksi pada bayi yaitu

- a. Pernapasan sulit / lebih dari 60 kali permenit
- b. Suhu tubuh $< 36,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $> 37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- c. Bayi biru, pucat dan memar
- d. Rewel dan muntah
- e. Tali pusat merah, bengkak, serta keluar cairan berbau busuk dan berdarah
- f. Tidak BAB dalam 3 hari dan tidak BAK dalam 24 jam
- g. Kejang dan menggigil

Hasil : ibu mengerti dan mengetahui tanda bahaya infeksi pada bayi

- 10. Menganjurkan ibu agar tetap menjaga kebersihan bayinya dan mengganti popok tiap kai lembab/ basah.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis akan menguraikan tentang kesenjangan antara hasil studi pada pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan pada klien Ny” N “ dengan kasus persalinan postterm di ruangan IRD Maternal RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tanggal 17 Juli 2018 jam 13.40 wita, pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi agar tindakan direncanakan berdasarkan rasional yang relevan yang dapat dianalisa secara teoritis untuk memudahkan memahami kesenjangan dan kesesuaian yang terjadi pada kasus ini.

A. Kala I

1. Langkah I Identifikasi Data Dasar

Langkah 1 dilakukan dengan cara pengumpulan data dasar untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap untuk membuat kesimpulan tentang normalnya kehamilan tersebut. Rencana yang rasional untuk memantau persalinan dapat ditegakkan berdasarkan kepentingan ibu dan janin. Jika tidak ditemukan kelainan ibu harus diyakini bahwa kehamilannya dalam keadaan normal.

Pengkajian data pada kasus Ny”N” didapatkan bahwa ibu masuk pada tanggal 17 Juli 2018 jam 13.40 wita dengan keluhan sakit perut tembus belakang disertai pelepasan lendir dan darah dirasakan sejak tanggal 17 Juli 2018 jam 08.00 wita sampai sekarang dan sifatnya hilang timbul. Hamil yang pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya. Ibu mengatakan kehamilannya sudah lewat bulan, mendapat haid pertama haid terakhir tanggal 15 September 2017 pergerakan janinnya kuat di sebelah kanan.

Hal ini sesuai dengan Teori yang menyebutkan bahwa tanda-tanda inpartu adalah sakit perut tembus belakang disertai pelepasan lendir dan darah dan terkadang keluar air ketuban dengan sendirinya. Lendir berasal dari servikalis kanalis disebabkan karena serviks mulai membuka data mendatar (Rukiyah, 2009).

Usia kehamilan aterm (37-42 minggu) akan mulai timbul tanda persalinan: terjadinya his persalinan, pengeluaran lendir dan darah, pengeluaran cairan, kehamilan aterm menunjukkan bahwa janin telah siap untuk dilahirkan, selain itu plasenta sebagai salah satu organ yang mendukung perkembangan janin telah menua dan fungsinya mulai menurun sesuai dengan tuanya kehamilan (Sarwono, 2011).

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, ibu tidak mengalami anemia, kehamilan tunggal, intrauterin, situs memanjang, TFU 3 jrbpx, 35cm, sudah BDP (bergerak dalam panggul) dengan perlimaan 2/5, keadaan janin baik ditandai dengan djj dalam batas normal. Hasil pemeriksaan dalam jam 13.40 wita didapatkan pembukaan 8 cm, Hodge III, molase 0 (tidak ada) dan kesan panggul pada pemeriksaan dalam tidak ada yang mengindikasikan peyulit persalinan.

Sesuai dengan teori tanda-tanda inpartu dapat dilihat Pada pemeriksaan dalam yaitu didapatkan serviks yang mendatar, pembukaan jalan lahir sudah ada. Permbukaan serviks dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks yang secara bertahap serta adanya penurunan bagian terendah janin (Elisabeth, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

Menurut (Sarwono. 2011) persalinan postterm dapat diketahui dengan cara menghitung usia kehamilan yaitu di hitung berdasarkan HPHT, pemeriksaan umur kehamilan dihitung dengan menggunakan rumus neagle berdasarkan anamnesis dari haid pertama haid terakhir, jika waktu persalinan tidak sesuai dengan tafsiran persalinan menurut *neagle*, maka besar kemungkinan terjadi persalinan postterm. Sedangkan Pada kasus Ny”N” didapatkan haid pertama haid terakhir adalah 15 september 2017.

Pemeriksaan TFU juga salah satu pendukung dari diagnosis persalinan postterm. Jika pembesaran uterus lebih besar dari dugaan usia kehamilan normal, maka kemungkinan terjadi usia kehamilan lebih tua dari taksiran. Pada kasus Ny”N” TFU nya adalah 3 jrbpx, 35 cm.

Pemeriksaan tafsiran berat badan janin dapat ditentukan dengan cara lingkaran perut dikalikan dengan tinggi fundus uteri. Pada usia kehamilan >42 minggu sering sekali plasenta masih dapat berfungsi dengan baik sehingga berat janin bertambah terus sehingga TBJ semakin bertambah, hal itu memungkinkan akan terjadi makrosomia (Obsetric note, 2014). Pada kasus Ny”N” TBJ yang didapatkan 3325 gram.

Menurut (Taufan, 2012) pemeriksaan USG merupakan suatu metode diagnostik untuk mendukung diagnosis persalinan postterm. Pada pemeriksaan USG tersebut dapat dilihat usia kehamilan, ukuran plasenta, jumlah cairan amnion, dan berat janin. Sedangkan kasus Ny”N” USG tidak dilakukan karena kondisinya tidak memungkinkan.

Pada bayi, teori menyebutkan bahwa ciri-ciri bayi mengalami persalinan postterm seperti: gangguan pertumbuhan, kulit kering, keriput (hilangnya lemak sub kutan), kuku tangan dan kaki panjang, hilangnya

verniks caseosa dan lanugo, warna kekuningan atau coklat kehijauan pada kulit dan tali pusat, muka terlihat tua, rambut kepala banyak dan tebal.

Hal ini sesuai dengan Teori lain yang menyebutkan bahwa ciri-ciri bayi postterm: biasanya berat badan lebih berat dari bayi matur(>4000 gram), tulang dan sutura kepala lebih keras dari bayi matur, verniks caseosa dibadan berkurang, kuku panjang, rambut kepala tebal (Manuaba, 2008).

2. Langkah II Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Berdasarkan data subjektif dan data objektif pada kasus Ny”N” didapatkan diagnosis inpartu kala I fase aktif .Sesuai dengan teori bahwa penetapan diagnosa fase aktif berdasarkan pembukaan dimana fase laten dimulai sejak awal kontraksi sampai dengan pembukaan kurang dari 4 dan fase aktif dimulai dari pembukaan 4 sampai dengan pembukaan 10 dan adanya penurunan bagian terendah janin (Latifa, 2015).

Pada kasus Ny”N” juga didiagnosis persalinan postterm. dikatakan postterm jika kehamilan lewat waktu atau usia kehamilan lebih dari 42 minggu (Sarwono, 2011). Sedangkan data yang didapatkan pada kasus Ny”N” usia kehamilannya 43 minggu 4 hari.

Sesuai dengan teori (Nugroho, 2012) serotinus adalah kehamilan yang telah berlangsung selama 42 minggu (294 hari) atau lebih, pada siklus haid teratur dan hari pertama haid terakhir yang diketahui dengan pasti. Dan Kehamilan lewat waktu merupakan salah satu kehamilan yang beresiko. Dimana usia kehamilannya telah mencapai 42 minggu lengkap atau lebih dihitung dari hari pertama haid terakhir, yang dapat menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar

baik terhadap ibu maupun terhadap janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, melahirkan ataupun nifas (Wijayanti, 2014).

Teori lain juga menyebutkan bahwa diagnosa persalinan post matur dapat ditegakkan berdasarkan TFU, normalnya umur kehamilan 40 minggu tinggi fundus uteri 2 jari dibawah prosessus xifoideus, dan jika pembesaran uterus tidak sesuai dengan usia kehamilan maka kemungkinan terjadi usia kehamilan lebih tua dari taksisan (Obsetric note. 2014). Pada kasus Ny”N”didapatkan TFU 3jrbpx, hal ini menunjukkan bahwa besar kemungkinan terjadi usia kehamilan lebih tua.

Persalinan postterm dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan USG, yaitu: menilai usia kehamilan, derajat maturitas plasenta, jumlah air ketuban, besarnya janin, dan keadaan janin (Sujiyantini, 2009).

Sedangkan pada kasus Ny”N” tidak dilakukan pemeriksaan USG karena kondisi ibu yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan teori dan kasus yang ada, disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan teori dan praktek yang dilakukan.

3. Langkah III Antisipasi Adanya Masalah Potensial

Dalam merumuskan diagnosa/masalah potensial dengan manajemen asuhan kebidanan adalah pengambilan keputusan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin saja terjadi yang dapat membahayakan pasien.

Dalam teori menurut (Prawirohardjo, 2006) masalah potensial yang mungkin terjadi pada bayi post matur adalah gawat janin, gerakan janin berkurang, kematian janin, asfiksia mekonium, dan kelainan letak. Menurut (Widyasari, 2012) masalah potensial yang biasanya terjadi pada kala 1

yaitu kala 1 memanjang dan gawat janin. Gawat janin terjadi jika perubahan pada plasenta terjadi (disfungsi plasenta) yang menyebabkan terjadinya peningkatan penimbunan kalsium.

Pada kasus Ny”N” didapatkan tidak ada data yang menunjukkan bahwa terjadi gawat janin, hal ini di tandai dengan djj kembali normal saat kontraksi selesai.

Sesuai dengan teori bahwa Gawat janin dapat terjadi bila janin tidak menerima O₂ yang cukup sehingga mengalami hipoksia. Dan tanda gawat janin bisa dilihat jika djj dalam proses persalinan bervariasi dan akan kembali normal dalam beberapa waktu, namun jika djj tidak kembali normal setelah kontraksi ini merupakan tanda gawat janin (Prawirohardjo, 2000).

Kala 1 memanjang, biasanya banyak terjadi pada primigravida, khususnya primigravida tua, faktor herediter dan faktor emosi (ketakutan dan lain-lain) yang sering kali menyebabkan terjadinya kala 1 memanjang, dalam menghadapi masalah tersebut keadaan ibu, harus diawasi dengan seksama (Tuti, 2012). Pada kasus Ny”N” tidak didapatkan masalah yang terjadi pada ibu seperti kala 1 memanjang.

4. Langkah IV Evaluasi Perlunya Tindakan Kolaborasi

Tindakan ini di lakukan jika ditemukan adanya diagnosa potensial dan atau masalah emergency sehingga membutuhkan tindakan segera atau tindakan kolaborasi.

Menurut teori, jika mengalami komplikasi diluar wewenang bidan maka tindakan segera yang harus dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan dokter atau merujuk ke tempat pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas lengkap (Anik, 2012).

Pada kasus Ny”N” didapatkan perlunya kolaborasi dengan dokter untuk mengantisipasi komplikasi-komplikasi yang akan terjadi terhadap ibu, oleh karena itu bidan memberikan surat rujukan kepada ibu untuk melahirkan di tempat yang memiliki fasilitas lengkap, dan telah disetujui oleh ibu dan keluarga sehingga ibu dirujuk di RSUD Syekh Yusuf.

Dalam menentukan sikap lebih lanjut perlu diketahui apakah ketuban sudah pecah atau belum. Apabila ketuban pecah, maka keputusan untuk menyelesaikan persalinan tidak boleh ditunda-tunda lagi, sebaiknya dalam 24 jam setelah ketuban pecah sudah dapat di ambil keputusan apakah perlu tindakan seksio sesarea atau persalinan dapat di biarkan berlangsung terus (Sarwono, 2011).

Pada kasus Ny”N” didapatkan bahwa ibu bersedia untuk dirujuk. Karena itu bidan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian oksitosin 5 IU dimasukkan kedalam larutan dextrose diberikan secara infus intravena dengan jumlah tetesan 8 tetes/menit dan selanjutnya dinaikkan 4 tetes setiap 30 menit jika tidak ada kemajuan persalinan.

Sesuai dengan teori apabila persalinan dibiarkan berlangsung terus, tindakan segera yang dapat dilakukan yaitu melakukan kolaborasi dengan dokter obgyn untuk pemberian oksitosin 5 IU drips kedalam cairan dextrose 0,5% (Sarwono, 2010). Dan merujuk pada penelitian sebelumnya yang juga menyebutkan bahwa untuk mencegah terjadinya komplikasi, tindakan segera yang dapat dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan dokter SpOG untuk pemberian oksitosin (Dian, 2012).

Hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek yang dilakukan dan sesuai dengan fungsi bidan, bidan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam asuhan yang mandiri, kolaborasi dan

ujukan yang tepat, oleh karena itu bidan dituntut untuk mampu mendeteksi dini tanda dan gejala komplikasi kehamilan dan persalinan sesuai dengan perkembangan pelayanan kebidanan

5. Langkah V Intervensi/ Rencana Tindakan

Jika pada kasus Ny”N” ditemukan adanya masalah potensial maka langkah selanjutnya adalah membuat intervensi sesuai dengan masalah potensial yang terjadi, dengan tujuan agar dapat mengantisipasi masalah yang akan terjadi sehubungan dengan masalah yang akan dialami.

Sesuai dengan Teori yang menyebutkan bahwa pengelolaan selama persalinan postterm yaitu pemantauan yang baik terhadap ibu dan kesejahteraan janin, serta mengawasi jalannya persalinan, dan perlu disadari bahwa persalinan adalah saat paling berbahaya bagi janin yang postterm, sehingga setiap persalinan kehamilan postterm harus dilakukan pengamatan yang ketat dan sebaiknya dilaksanakan dirumah sakit dengan pelayanan operatif dan perawatan neonatal yang memadai (Sarwono, 2010).

Pada kasus Ny”N” dilakukan intervensi sesuai dengan teori, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

6. Langkah VI Implementasi

Rencana tindakan dibuat berdasarkan intervensi yang dibuat sebelumnya. Rencana tindakan yang dibuat sesuai dengan teori yaitu melakukan pemantauan his, nadi, djj setiap 30 menit, melakukan pemeriksaan dalam setiap 2-4 jam atau jika ada indikasi, serta memantau ttv dan suhu ibu setiap 4 jam (Sarwono, 2010).

Pada kasus Ny”N” didapatkan pemantauan his, nadi, djj dilakukan sesuai teori yaitu pemeriksaan VT dilakukan 2 - 4 jam setelah VT pertama jika tidak ada indikasi dan tanda-tanda vital ibu setiap jam. Pemantaun his, djj, dan nadi ibu dimulai dari jam 13.40 wita sampai jam 16.10 wita, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap, memasang infuse dextrose 5% + drips oksitosin 5U/L dan selanjutnya memantau kembali his, nadi, djj dan tetesan cairan infus sampai jam 16.10 wita, kemudian melakukan pemeriksaan dalam kembali untuk memastikan pembukaan lengkap dan ibu siap untuk dipimpin untuk mendedan.

Sesuai dengan penelitian (Wijayanti, 2014) yang menyebutkan bahwa pemantauan kemajuan persalinan dilakukan setiap 4 jam pada fase laten dan 2-4 jam pada fase aktif atau jika ada indikasi. Djj dan kontraksi uterus setiap 30 menit, tanda-tanda vital dan suhu ibu dilakukan setiap jam.

7. Langkah VII Evaluasi

Pada kasus Ny”N” didapatkan data inpartu kala 1 fase aktif dengan pembukaan lengkap jam 16.10 wita, ibu merasa ada dorongan yang kuat untuk meneran, perasaan ingin BAB, dengan his 5x dalam 10 menit durasi 40-45 detik, DJJ terdengar jelas kuat dan teratur serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

Hasil evaluasi didapatkan bahwa pembukaan sudah lengkap terjadi pada jam 16.10 wita, perlangsungan kala 1 berlangsung normal tidak mengalami gangguan ataupun penyulit, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antar teori dengan praktek.

8. Pendokumentasian SOAP

S (subjektif), menggambarkan pendokumentasian yang pengumpulan data dari pasien sesuai dengan kasus Ny”N” didapatkan bahwa ibu masuk tanggal 17 Juli 2018 jam 13.40 wita mengeluh nyeri perut tembus belakang disertai pelepasan lendir dan darah pada tanggal 17 Juli 2018 jam 08.00 wita bersifat hilang timbul.

Ibu mengatakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya, menurut ibu usia kehamilannya sudah lewat bulan, janin bergerak pertama kali dirasakan saat usia kehamilan ibu masih \pm 4 bulan dan pergerakan janinnya kuat terutama pada bagian kanan perut ibu.

O (objektif), menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dirumuskan untuk mendukung didapatkannya diagnosis .

Berdasarkan pada kasus Ny”N” didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, ttv dalam batas normal, pada pemeriksaan fisik terfokus, ibu tidak mengalami anemia. Hasil pemeriksaan abdomen didapatkan tampak adanya striae livid, dan linea nigra, tonus perut ibu tegang, tidak ada luka bekas operasi .

Pada hasil palpasi didapatkan TFU 3jrbpx, 35 cm, teraba bokong, punggung kiri, kepala, BDP dengan perlimaan 2/5, keadaan janin baik dimana DJJ dalam batas normal, pemantauan his didapatkan 2 x dalam 10 menit durasi 10 – 15 detik. Dan hasil pemeriksaan dalam tanggal 17 Juli 2018 jam 13.40 wita didapatkan pembukaan 8 cm, presentase UUK kiri depan hodge III.

A (*Assesment*), menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan data objektif.

Berdasarkan data pada kasus Ny”N” assessment yang ditegaskan yaitu GI P0 A0, umur kehamilan 43 minggu 4 hari, letak memanjang, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan janin baik, inpartu kala 1 fase aktif dengan persalinan postterm.

P (*Planning*), Menggambarkan pendokumentasian untuk tindakan (implementasi) dan evaluasi perencanaan berdasar *assessment* yang didapatkan. Berdasarkan kasus Ny”N” telah dilakukan implementasi sesuai dengan teori dengan hasil evaluasi inpartu kala 1 fase aktif dengan pembukaan 10 cm pada jam 16.10 wita, ibu mempunyai dorongan untuk meneran, terasa ingin BAB, dengan his 5 x dalam 10 menit dengan durasi 40 – 45 detik, ttv dalam batas normal, DJJ138x/ i.

B. KALA II

1. Langkah I Identifikasi Data Dasar

Pengkajian adalah mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan keadaan pasien. Dan untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan melalui anamnesis.

Data pada kasus Ny”N” didapatkan data subjektif ibu merasakan ada dorongan untuk meneran, sakit perut tembus belakang semakin kuat, ada perasaan ingin BAB. Sedangkan data objektif yang didapatkan perineum menonjol, vulva dan anus membuka, kontraksi uterus 5 x dalam 10 menit durasi 40 – 45 detik, DJJ dalam batas normal, pemeriksaan dalam tanggal 17 Juli 2018 jam 16.10 wita dengan pembukaan lengkap, uuk depan, hodge IV, molase tidak ada.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan tanda-tanda gejala kala II yaitu ibu merasa ingin meneran, ibu merasa ingin untuk BAB karena adanya tekanan pada rectum dan/atau vaginanya, perineum

menonjol, vulva-vagina dan sfingter ani membuka, (Sarwono, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

2. Langkah II Identifikasi Diagnose/ Masalah Aktual

Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data dari hasil pengkajian yang sudah ada yang akhirnya ditegakkan diagnosa dalam ruang lingkup praktek kebidanan.

Sesuai dengan teori bahwa indikasi kala II ditegakkan jika didapatkan tanda gejala kala II yaitu ibu ingin meneran bersama dengan terjadinya kontraksi, ibu merakan adanya peningkatan tekanan padaa rectum sehingga ibu merasa ingin BAB, perineum menonjol, vulva dan vagina membukan, pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala janin melalui introitus vagina (Chapman. 2006). Dan menurut (Varney, 2002) menyebutkan tanda diagnosa pasti kala 2 yaitu: telah terjadi pembukaan lengkap dan tampak bagian kepala janin membuka introitus vagina.

Pada kasus Ny”N” didapatkan tanda gejala kala 2 yaitu ibu mengatakan sakit perut semakin kuat, ibu ingin bab, perineum menonjol, vulva dan anus membuka, kontraksi uterus 5 x dalam 10 menit durasi 40 – 45 detik, DJJ dalam batas normal, pembukaan serviks lengkap. Oleh karena itu berdasarkan data dan teori yang didapatkan, ibu didiagnosis perlangsungan kala 2, hal ini membuktikan bahwa tidak ada kesenjangan teori dan praktek yang dilakukan.

3. Langkah III Identifikasi Adanya Masalah Potensial

Mengidentifikasi diagnosa potensial berdasarkan diagnosis yang ditegakkan sebelumnya, dalam hal ini antisipasi kemungkinan masalah yang akan terjadi. Dalam penelitian sebelumnya menyebutkan masalah potensial yang mungkin terjadi pada ibu postterm adalah kala II lama, dan ruptur uteri, sedangkan pada bayi masalah yang mungkin terjadi adalah asfiksia mekonium (Wijayanti, 2014).

Persalinan yang lama dapat mengakibatkan tidak seimbangnya cairan elektrolit serta kekurangan cadangan glukosa sehingga mengakibatkan kelelahan. Kondisi kelelahan akan mengakibatkan kontraksi uterus kurang adekuat sehingga mengakibatkan persalinan lama (Joseph, 2010).

Pada kasus Ny”N” didapatkan tidak ada data yang menunjukkan bahwa terjadi kala 2 lama, hal ini ditandai dengan kala 2 berlangsung selama 30 menit, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.

Dalam Teori (Oxorn, 2010) menyebutkan bahwa Kala II dikatakan memanjang jika, pembukaan serviks lengkap, ibu ingin mendedan, tetapi tidak ada kemajuan persalinan selama lebih dari 2 jam. Dan dikatakan kala II normal jika persalinan berlangsung selama 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida. Adanya bagian terendah janin pada jalan lahir tampak pada perineum yang menonjol sehingga terjadi peregangan otot yang dapat mengakibatkan ruptur tidak adekuat selain itu perineum yang kaku dapat menjadi penyebab ruptur perineum.

Asfiksia mekonium terjadi jika janin mengalami stress selama proses persalinan berlangsung dan sering terjadi pada bayi post matur. Selama persalinan berlangsung, bayi bisa mengalami kekurangan oksigen,

hal ini menyebabkan meningkatnya gerakan usus dan pengendoran otot anus, sehingga menyebabkan mekonium dikeluarkan kedalam cairan ketuban, jika bayi masih berada di dalam rahim dan bayi menghirup nafasnya yang pertama maka campuran air ketuban dan mekonium tersebut terhirup kedalam paru-paru.

Pada kasus ny”N” didapatkan bayi lahir asfiksia mekonium ditandai dengan bayi lahir tidak segera menangis, kulit kekuningan pucat, ada usaha untuk bernafas dan gerakannya tumpul tidak ada.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menyebutkan risiko yang terjadi pada bayi postterm/serotinus adalah sebagian kecil bayi postterm kecil, kurang gizi, dan asfiksia sebagai akibat dari penurunan fungsi respirasi dan nutrisi plasenta yang bertambah umurnya (Endah, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mulia dan Sulistyanyingsih, 2013) ada hubungan yang signifikan kehamilan postterm dengan kejadian asfiksia, dimana besar risikonya lebih besar terjadi asfiksia pada bayi dengan persalinan postterm dibandingkan dengan persalinan aterm.

Merujuk pada penelitian (Berawi, dkk, 2013) yang meneliti tentang hubungan kehamilan lewat waktu dengan kejadian asfiksia neonatus, dari 961 sampel yang ada diperoleh hasil bahwa asfiksia yang terjadi sangat erat hubungannya dengan kehamilan lewat bulan. Dimana semakin tua usia kehamilan ibu maka akan lebih besar menyebabkan hipoksia/asfiksia pada janin. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya jumlah air ketuban dan menurunnya fungsi plasenta.

4. Langkah IV Evaluasi Perlunya Tindakan Kolaborasi

Teori menyebutkan bahwa jika mengalami komplikasi diluar wewenang bidan maka tindakan segera yang harus dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan dokter atau merujuk ke tempat pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas yang lengkap (Maryunani, 2012).

Pada kasus pada Ny”N” didapatkan tidak ada indikasi untuk dilakukannya tindakan segera atau kolaborasi, hal ini di tandai dengan kondisi ibu baik, TTV dalam batas normal, DJJ dalam batas normal, dan pembukaan serviks sudah lengkap.

Hal ini sesuai juga dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa system rujukan dapat tercapai apabila dilakukan rujukan terencana yaitu rujukan secara dini dan tepat waktu, dan suatu tindakan segera diperlukan untuk menangani komplikasi obstetrik sehingga kesakitan dan kematian dapat dihindari dan dicegah.

Bidan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam asuhan yang mandiri, kolaborasi dan rujukan yang tepat, oleh karena itu bidan dituntut untuk mampu mendeteksi dini tanda dan gejala komplikasi kehamilan dan persalinan sesuai dengan perkembangan pelayanan kebidanan (Hellen, 2006).

5. Langkah V Intervensi/ Rencana Tindakan

Pada persalinan normal intervensi yang dilakukan adalah pemantauan partograf, observasi dan memberikan motivasi dan dukungan emosional kepada ibu.

Sesuai dengan teori yang ada, intervensi yang dilakukan untuk persalinan normal adalah lihat tanda gejala kala II, siapkan peralatan pertolongan persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan

janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, letakkan handuk bersih diatas perut ibu dan dibawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah terlihat 5-6 cm membuka vulva, periksa lilitan tali pusat, tunggu kepala sampai melakukan putaran paksi luar, kemudian lanjut melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah kedua bahu lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir letakkan bayi diatas perut ibu kemudian keringkan (Asri, 2014)

Pada kasus Ny”N” didapatkan intervensi sesuai dengan teori yang ada, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan teori dan praktek yang dilakukan.

6. Langkah VI Implementasi

Rencana asuhan dilakukan pada kasus Ny”N” sesuai dengan intervensi, berdasarkan data yang didapatkan pada kasus tersebut bahwa pembukaan lengkap jam 16.10 wita, Hodge IV, presentase kepala, uuk depan, pelepasan lendir dan darah bercampur air ketuban.

Semua alat dan obat-obatan telah disiapkan dan memimpin persalinan dilakukan pada jam 16.10 wita sampai 30 menit kemudian dan tepatnya pada tanggal 17 Juli 2018 jam 16.40 wita bayi lahir tidak segera menangis, kulit kebiruan, pucat, ada usaha untuk bernafas, dan gerakannya hampir tidak ada.

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dikerjakan sesuai dengan teori yang ada, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

7. Langkah VII Evaluasi

Pada kasus Ny”N” kala II berlangsung dengan normal yaitu 30 menit dan bayi lahir spontan dengan asfiksia sedang, nilai *apgar score* 5/7 pada tanggal 17 Juli 2018 wita dengan berat badan lahir 3340 gram, panjang badan 51 cm, jenis kelamin laki-laki, kontraksi uterus teraba keras dan bundar, TFU setinggi pusat.

Sesuai dengan teori yang menyebutkan kala 2 normal jika prosesnya berlangsung selama 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida (Oxorn, 2010). Dan menurut (Dewi, 2012) asfiksia sedang ditandai dengan frekuensi jantung 60-80 kali per menit, usaha napas lambat, tonus otot biasanya dalam keadaan baik, bayi masih bereaksi terhadap rangsangan, bayi tampak sianosis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antar teori dan praktek yang dilakukan.

8. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari S (Subjektif), yang menggambarkan tentang pendokumentasian pengumpulan data pasien melalui anamnesis, berdasarkan data pada kasus Ny”N” didapatkan bahwa ibu merasa ada dorongan untuk meneran, terasa sakit perut tembus belakang semakin kuat, dan perasaan ingin BAB.

O (Objektif), menggambarkan tentang pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya, dan pada kasus Ny”N” didapatkan kontraksi uterus 5x dalam 10 menit durasi 40 – 45 detik, DJJ dalam batas normal, tampak perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, pemeriksaan dalam pembukaan lengkap, hodge IV, presentase uuk depan.

A (*Assesment*), pendokumentasian dari hasil analisis data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi satu diagnosa/masalah, antisipasi masalah potensial, dan perlunya tindakan segera. Berdasarkan kasus Ny”N” didapatkan assesmenta perlangsungan kala II tidak ada data yang menunjukkan terjadi masalah potensial dan tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera dan tindakan kolaborasi.

P (*Planning*), pendokumentasian tindakan asuhan atau implementasi dan evaluasi dari tindakan asuhan yang diberikan berdasarkan assessment yang ditegakkan.

Pada kasus Ny”N” tindakan asuhan yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada dan mendapatkan hasil evaluasi kala II berlangsung dengan normal yaitu bayi lahir spontan, tidak segera menangis pada tanggal 17 Juli 2018 jam 16.40 wita dengan berat badan lahir 3340 gram, panjang badan 51 cm, jenis kelamin laki-laki, kontraksi uterus teraba keras dan bundar, TFU setinggi pusat, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

C. KALA III

1. Langkah 1 Identifikasi Data Dasar

Teori menyebutkan tanda-tanda terlepasnya plasenta yaitu: Kontraksi uterus baik, tinggi fundus setinggi pusat, tali pusat bertambah panjang, dan adanya semburan darah secara tiba-tiba.

Pada studi kasus Ny” N ” didapatkan data bahwa ibu merasakan nyeri perut bagian bawah, dari data objektif di dapatkan tampak ada semburan darah secara tiba-tiba, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), tinggi fundus uteri setinggi pusat dan tali pusat bertambah panjang. Hal ini menandakan bahwa data yang didapatkan sesuai dengan

teori yang ada sehingga tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

Ada beberapa prasat untuk mengetahui plasenta terlepas yaitu: Prasat Kustner, perasat ini mengatakan bahwa untuk memastikan plasenta terlepas maka dilakukan dengan cara meletakkan tangan disertai penekanan diatas simfisis, bila tali pusat tersebut masuk kembali (tali pusat memendek), berarti plasenta belum terlepas dan jika panjang tali pusat masih sama berarti plasenta sudah lepas.

Prasat Strassman, mengatakan bahwa untuk mengetahui plasenta terlepas dengan cara meregangkan atau menarik sedikit tali pusat dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri mengetok ngetok fundus uteri dan merasakan apakah ada getaran yang ditimbulkan dari gerakan tangan kiri, jika terasa ada getaran berarti plasenta sudah terlepas, Prasat Klien, untuk melakukan perasat ini, minta pasien untuk meneran, jika tali pusat tampak turun atau bertambah panjang berarti plasenta telah lepas. Dan terakhir prasat Manuaba, prasat ini dilakukan dengan cara tangan kiri memegang uterus pada segmen bawah rahim, sedangkan tangan kanan memegang dan mengencangkan tali pusat, kedua tangan ditarik berlawanan. Jika tarikan terasa ringan dan tali pusat memanjang berarti plasenta telah lepas (Latifa, 2014).

2. Langkah II Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Berdasarkan data yang subjektif dan data objektif yang didapatkan pada kasus ini, Ny”N” didiagnosis perlangsungan kala III.

Sesuai dengan teori (varney. 2007) yang menyebutkan bahwa kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau biasa disebut kala

uri (pengeluaran). Lama kala III berlangsung antara 6- 15 menit, akan tetapi normal kala III berlangsung sampai 30 menit

3. Langkah III Antisipasi Adanya Masalah Potensial

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny “N” tidak ada indikasi atau masalah potensial yang dapat di tegakkan. Dan ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa proses pengeluaran plasenta berlangsung normal dan tidak ada penyulit.

4. Langkah IV Evaluasi Perlunya Tindakan Kolaborasi

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny” N” tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera ataupun kolaborasi. Ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa proses pengeluaran plasenta dapat berlangsung normal.

5. Langkah V Intervensi/ Rencana Tindakan

Menurut teori Pemberian oksitosin dilakukan dalam satu menit pertama setelah bayi lahir, namun sebelum pemberian oksitosin hal yang harus diperhatikan adalah memastikan tidak ada bayi lain didalam uterus. Setelah itu suntikkan oksitosin secara IM pada sepertiga bagian atas paha bagian luar yang bertujuan untuk membantu pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah (Nuraisah, 2014).

Pada kasus Ny ”N” tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah dilakukan intervensi yang sesuai yaitu melakukan pemberian oksitosin, peregangan tali pusat dan masase uterus. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan intervensi yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada ,dan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

6. Langkah VI Implementasi

Pada Ny "N" dilakukan implementasi berdasarkan dengan teori yang ada yaitu melakukan pemberian oksitosin secara IM, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta, dan selanjutnya setelah plasenta lahir dilakukan masase uterus. Proses pelepasan dan penegluaran plasenta terjadi secara normal dan tidak ada penyulit, dimana plasenta lahir 10 menit setelah bayi lahir yaitu jam 16.50 wita ,dengan plasenta lahir lengkap dan perdarahan kurang lebih 140 cc.

7. Langkah VII Evaluasi

Dari implementasi yang telah dilakukan pada kasus Ny"N" didapatkan hasil pemeriksaan keadaan ibu dalam keadaan normal ditandai dengan ttv dalam batas normal, kontraksi uterus baik ditandai dengan uterus teraba keras bulat dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kala III berlangsung normal, serta tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

8. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari S (subjektif), pendokumentasian hasil pengumpulan data pasien melalui anamnesis, pada kasus Ny"N" didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri perut bagian bawah.

O (Objektif), pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik pasien dan pemeriksaan penunjang lainnya yang drumuskan dalam data fokus untuk mendukung ditegakkannya assessment, pada kasus Ny"N" didapatkan hasil pemeriksaan tampak ada semburan darah secara tiba-tiba, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat bertambah panjang.

A (*Assesment*), pendokumentasian hasil analisis data subjektif dan data objektif dalam satu identifikasi diagnosa/masalah, antisipasi terjadinya masalah potensial, dan perlunya tindakan segera, pada kasus Ny”N” didapatkan assessment perlangsungan kala III.

P (*Planning*), pendokumentasian dari hasil tindakan asuhan yang diberikan dan evaluasi dari hasil tindakan yang dilakukan. Pada kasus Ny”N” telah dilakukan tindakan asuhan sesuai dengan teori yang ada, dan hasil evaluasi didapatkan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, plasenta lahir lengkap jam 16.50wita, kontraksi uterus baik,teraba keras dan bundar, TFU 1 jari dibawah pusat, dengan perdarahan ± 140 cc.

D. Kala IV

1. Langkah I Identifikasi Data Dasar

Berdasarkan teori pada kala IV hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kontraksi uterus baik, tidak ada perdarahan pervaginam, plasenta dan selaput ketuban lengkap, kandung kemih harus kosong, dan luka diperineum harus dirawat serta melihat keadaan umum ibu dan bayi (Dewi, 2012).

Pada kasus Ny”N” didapatkan data subjektif ibu lelah setelah persalinan dan data objektif kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, TFU setinggi pusat, plasenta lahir lengkap ttv dalam batas normal.

Berdasarkan teori yang ada dan data pada kasus yang ada menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan teori dan praktek yang dilakukan.

2. Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan pada kasus Ny”N” maka diagnosis yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV, hal ini sesuai dengan teori bahwa plasenta lahir lengkap jam 16.50 wita dan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

3. Langkah III Antisiipasi Adanya Masalah Potensial

Pada kasus Ny”N” masalah potensial yang dapat terjadi adalah perdarahan postterm.

Menurut teori (dewi, 2012) kala IV merupakan kala pengawasan selama 2 jam post partum, karena kala ini sangat rentan terjadi perdarahan post partum, perdarahan biasanya terjadi karena lemahnya tonus/kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan setelah bayi dan plasenta lahir, selain itu adanya ruptur dijalan lahir, dan tidak normalnya proses pembekuan darah juga salah satu penyebab perdarahan post partum

Hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa perdarahan post partum adalah suatu kejadian mendadak dan tidak dapat diramalkan. Bukti-bukti (evidence based) saat ini menunjukkan bahwa jika petugas kesehatan yang terlatih ada, peralatan tersedia dan keamanan menyuntik terjamin dan melakukan pengelolaan aktif kala III akan mengurangi perdarahan post partum (Susiloningtyas dan Purwanti, 2012).

4. Langkah IV Evaluasi Perlunya Tindakan Kolaborasi

Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera dan atau tindakan kolaborasi, hal ini sesuai dengan teori berdasarkan data yang didapatkan bahwa kala

III berlangsung normal, kontraksi uterus baik, serta tanda-tanda vital dalamk batas normal.

5. Langkah V Intervensi/ Rencana Tindakan

Pada kasus Ny”N” intervensi yang dilakukan pada kala ini yaitu memantau tanda-tanda vital ibu, pemantauan perdarahan, kontraksi uterus, kandung kemih dan tinggi fundus uteri. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit dijam kedua, serta mengukur suhu tubuh ibu, setelah pemantauan kala IV selesai, ibu di pindahkan ke ruangan nifas.

Teori menyebutkan sebagian besar kematian ibu pada periode pasca persalinan terjadi pada 6 jam pertama setelah persalinan, kematian itu disebabkan oleh infeksi, perdarahan dan eklamsia. Oleh karena itu, pemantauan selama 2 jam pertama post partum sangat penting (Nurasiah. 2014).

6. Langkah VI Implementasi

Setelah intervensi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah implementasi sesuai dengan teori. Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny”N” implementasi yang dilakukan yaitu :memantau tanda-tanda vital ibu selama 4 kali 15 menit yaitu dimulai jam 17.05 wita sampai 17.50 wita didapatkan tekanan darah ibu dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras, kandung kemih kosong serta perdarahan $\pm 20-40$ cc, selanjutnya melakukan pemantauan 2 kali 30 menit yaitu pada jam 17.50 wita sampai 18.50 wita didapatkan tekanan darah dalam batas normal, kontraksi uterus baik, tinggi fundus 1 jari bawah pusat, kandung kemih kosong serta perdarahan ± 10 cc.

Keadaan bayi baik dengan pernapasan serta suhu dalam batas normal, serta mendokumentasikan hasil pemantauan ke dalam partograf. Selanjutnya memindahkan ibu keruang nifas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dilakukan sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa antara teori dan kasus tidak ada kesenjangan.

7. Langkah VII Evaluasi

Pada kasus Ny”N” didapatkan bahwa kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih kosong, jumlah perdarahan ± 140 cc, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kala IV berlangsung normal dan tidak ada penyulit serta tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

8. Pendokumentasian SOAP


Pendokumentasian SOAP terdiri dari subjektif, data Subjektif (S) menggambarkan pendokumentasian dengan cara pengumpulan data dari pasien melalui anamnesis. Berdasarkan pada kasus Ny”N” didapatkan bahwa ibu merasa kelelahan setelah persalinan.

Objektif (O), menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya, didapatkan data kala III berlangsung normal berlangsung ± 10 menit, plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat dengan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

Assesment (A), menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosis/masalah yang terjadi, antisipasi diagnosis/masalah potensial, dan

perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Berdasarkan data pada kasus Ny”N” maka assessment yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV.

Planning (P), menggambarkan pendokumentasian tentang rencana tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan implementasi yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi yaitu ibu dalam kondisi baik, ditandai dengan TTV dalam batas normal.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan studi kasus pada Ny”N” dengan persalinan postterm serta menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan intranatal maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny”N” dengan persalinan postterm di RSUD Syekh Yusuf. Pada kasus Ny”N” didapatkan data dasar dengan usia kehamilan 43 minggu 4 hari dan adanya pengeluaran air ketuban yang bercampur mekonium.
2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa/masalah actual pada Ny”N” dengan persalinan postterm di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018: Ny”N” masuk dengan tanda dan gejala inpartu pada usia kehamilan 43 minggu 4 hari.
3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa/masalah potensial pada Ny”N” dengan persalinan postterm di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018 diantisipasi terjadinya gawat janin, kala 1 memanjang, partus lama, asfiksia mekonium, perdarahan post partum
4. Telah dilakukan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny”N” dengan persalinan postterm di RSUD Syekh Yusuf. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat persalinan, tidak ada indikasi untuk pelaksanaan tindakan segera karena tidak ada yang mengancam nyawa ibu.
5. Telah dilakukan penyusunan rencana tindakan asuhan (intervensi) pada Ny”N” dengan persalinan postterm di RSUD Syekh Yusuf, penilaian kemajuan persalinan, kondisi ibu dan janin.

6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny”N” dengan persalinan postterm di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018. Pelaksanaan sesuai dengan intervensi dengan Bayi lahir normal setelah dipimpin selama 30 menit, dengan asfiksia sedang *apgar score: 5/7*.
7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny”N” dengan persalinan postterm di RSUD Syekh Yusuf. Kondisi ibu baik, tidak terjadi perdarahan, bayi mengalami asfiksia sedang dengan *apgar score 5/7*.
8. Telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan asuhan kebidanan pada Ny”N” dengan persalinan postterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018: semua hasil pemeriksaan dan penatalaksanaan asuhan dituliskan secara lengkap direkam medik pasien.

B. Saran

1. Bagi klien
 - a. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi dan seimbang.
 - b. Menganjurkan ibu untuk banyak istirahat
 - c. Menganjurkan agar ibu menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan genetalia
 - d. Menganjurkan ibu untuk memberikan Asi kepada bayinya sesering mungkin
2. Bagi bidan

Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memeberikan pelayanan yang sesuai sehingga dapat membantu menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)

3. Bagi institusi

Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang professional untuk menunjang pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan keterampilan bidan.



DAFTAR PUSTAKA

- Asri H dewi,dan Clevo P Cristine, *Asuhan persalinan Normal* ,Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Berawi M, Brillianingtyas L, Carolia N. *The Relationship of Postterm Pregnanciesd and Premature Infants With Neonatal Asphyxia*. <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/294/292>. (2 Juli 2018).
- Damayanti, Ika, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: Deepublish.2014.
- Depertemen Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Republik Indonesia. 2016*.
- Dewi Ratna Pudiastuti. *Asuhan Kebidanan Pada Hamil Normal dan Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2012.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, *Profil Kesehatan Kabupaten Gowa*, 2014. [http://pusdatin.kemkes.go.id/resource/download/profil/PROFIL KAB KOTA 2014/7306](http://pusdatin.kemkes.go.id/resource/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/7306). Sulesl kab Gowa 2014 (diakses tanggal 10 maret 2018).
- Fadlun dan Achmad feriyanto. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta: Salemba Medika. 2013.
- Indrayani, dkk. *Asuhan Persalinan dan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Trans Info Media. 2013.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan tajwid*. Bandung: Jawa Barat, 2014.
- Kuswanti, Ina dan Melina, Fitriani. *Askeb II Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016
- Latifa Elisabeth M.F. *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta:IN MEDIA. 2013.
- Manuaba, C. *Gawat Darurat Obstetri-Ginekologi dan Obstetri Ginekologi Sosial untuk Profesi Bidan*. Jakarta: EGC. 2008.
- Maryunani, Anik. *Asuhan kegawatdaruratan dalam Kebidanan*. Jakarta: TIM. 2012.

- Mochtar, Rustam. *Sinopsis Obstetric Fisiologi Dan Patologi*. Jakarta: EGC. 2013.
- Nadyah. *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak Dan Maternal*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo. 2013.
- Norma, nita, dkk. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013
- Nugroho, Taufan. *Obstetri Dan Ginekologi*. Yogyakarta: Nuha Medik a. 2011.
- Oxorn Harry, William R. Forte. *Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi persalinan*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2010.
- Pemerintah Kota Makassar Dinas Kesehatan. "Profil Kesehatan Kota Makassar tahun 2014" 2015.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo. 2011.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo. 2014.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo. 2015.
- Qadarshi laeli, Putri Andisetyana Hanifa. *Hubungan Kehamilan Postterm Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta. Jurnal Maternity And Neonatal - jilid 1 halaman 2.
- Ratnawati, Yusnawati Nani. *Hubungan Kehamilan Serotinus Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir*. Bantul Yogyakarta: Jurnal Kebidanan jilid 3 nomor 1 halaman 27-33.
- Sari, Eka Puspita, dkk. *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jakarta: Trans Info Media. 2014.
- Rukiyah, Yeye Ai dan Lia Yulianti. *Asuhan Kebidanan Patologi Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media. 2010.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.

Sulistiyowati, Endah. *Perbandingan Antara Nilai Apgar Pada Bayi Prematur dengan Bayi Postmatur Di Rsud Temanggung Tahun 2013.*

Susiloningtyas Is dan Yanik Purwanti. *Kajian Pengaruh Manajemen Aktif Kala III Terhadap Pencegahan Perdarahan Postpartum.*
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/73/67> . (2 Juli 2018).

Varney, Hellen. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan.* Jakarta: 2002.

Walyani Elisabeth S. *Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir.* Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015.

Widyasari, Dian. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu bersalin Ny.M G1P0A0 Umur 20 Tahun Dengan Induksi Pada Persalinan Serotinus Di Rsud Dr Moewardi Surakarta tahun 2012.*
<http://stikeskusumahusada.ac.id/digilib/files/disk1/2/01-gdl-dianwidyas-80-1-dianwid-i.pdf>.

Wijayanti, Erna dkk, *Hubungan Kehamilan Lewat Waktu Dengan Kejadian Asfiksia bayi baru lahir diRSUD dr.R.Koesma Tuban.*
[http://Ippm.stikesnu.com/wp-content/uploads/2014/02/5-jurnal-B-Erna - aileyati-Q-klik.pdf](http://Ippm.stikesnu.com/wp-content/uploads/2014/02/5-jurnal-B-Erna-aileyati-Q-klik.pdf).

Word Health Organization. *Profil Kesehatan dan Pembangunan Perempuan di Indonesia.* Bakti Husada. 2014.

Yulifah, Rita, dkk. *Konsep Kebidanan.* Jakarta Selatan: Salemba Medika. 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


PARTOGRAF




DEPARTEMEN GINJEK DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
 Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa-Telp. 824885 Fax. 424836

PARTOGRAF

No. Register: 1101010101 Nama Ibu: Ny. N Umur: 27 thn G: 2 P: 0 A: 0
 No. Puskesmas: 1101010101 Tanggal: 13/04/2020 Jam: 13.00 Alamat: Bontol
 Katuban pecah Sejak jam: 07.00 W/P mules sejak jam: 07.00 W/P



Dilatasi Uterus (cm): 4 8 10



Suhu (°C): 37.5 37.5 37.5

Urin: Protein 0 Aseton 0 Volume 100

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal: 19/07/2018
2. Nama bidan: Bidan Eka
3. Tempat persalinan: RUMAH SAKIT
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindes Rumah Sakti
 Klinik Swasta Lainnya:
4. Alamat tempat persalinan:
5. Catatan: rujuk, kala: I / II / III / IV
6. Alasan merujuk:
7. Tempat rujukan: RS
8. Pendamping pada saat menjuk:
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

- KALA I**
9. Partogram melampaui garis waspada Ya Tidak
 10. Masalah lain, sebutkan:
 11. Penatalaksanaan masalah Td:
 12. Hasilnya:

- KALA II**
13. Epistomi?
 Ya, indikasi
 14. Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
 15. Gawat Jantar: Ya, indikasi yang dilakukan
 a. 1. PERSALINAN VAGINAL
 b. 2. PERSALINAN SIKOTOMI
 Tidak
 16. Dieteksi bahu:
 Ya, indikasi yang dilakukan
 a.
 b.
 Tidak
 17. Masalah lain, sebutkan:
 18. Penatalaksanaan masalah tersebut:
 19. Hasilnya:

- KALA III**
20. Lama kala III: 3-10 menit
 21. Pemberian Oksitosin 10 U/lm?
 Ya, waktu: menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan:
 22. Pemberian ulang Oksitosin (2x)?
 Ya, alasan:
 23. Penegangan tali pusat terkendali?
 Ya
 Tidak, alasan:

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Tinggi Fundus Uterus	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Penderahan
1	11-25	110/70 mmHg	70x/m	UrbPst	Baik	1000ml	400 cc
	12-30	110/70 mmHg	70x/m	UrbPst	Baik	1000ml	400 cc
	12-35	110/70 mmHg	70x/m	UrbPst	Baik	1000ml	400 cc
	12-40	110/70 mmHg	70x/m	UrbPst	Baik	1000ml	400 cc
2	13-00	110/70 mmHg	70x/m	UrbPst	Baik	1000ml	400 cc
	13-05	110/70 mmHg	70x/m	UrbPst	Baik	1000ml	400 cc

- Masalah kala IV:
- Penatalaksanaan masalah tersebut:
- Hasilnya:

24. Masalah tidak uteri?
 Ya
 Tidak, alasan:
25. Plasenta lahir lengkap (intact) Ya Tidak
 Jika tidak lengkap, indikasi yang dilakukan:
 a.
 b.
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit: Ya Tidak
 Ya, indikasi:
 a.
 b.
 c.
27. Leptotri:
 Ya, dimana: POPITEUM
 Tidak
28. Jika lesarasi perineum, derajat: 1 2 3/4
 Indikasi:
 Perawatan dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan:
29. Atoni uteri:
 Ya, indikasi:
 a.
 b.
 c.
 Tidak
30. Jumlah perdarahan: 400 ml
31. Masalah lain, sebutkan:
32. Penatalaksanaan masalah tersebut:
33. Hasilnya:

BAYI BARU LAHIR:

34. Berat badan: 3500 gram
35. Panjang: 51 cm
36. Jenis kelamin: P L
37. Penilaian bayi baru lahir: baik / ada penyulit
38. Bayi lahir:
 Normal, indikasi:
 mengeringkan
 menghangatkan
 rangsang isral
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspirasi ingan/pucat/biru/temas/indikasi:
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 rangsang isral menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan:
39. Cacat bawaan, sebutkan:
 Hipotermi, indikasi:
 a.
 b.
 c.
40. Pemberian ASI
 Ya, waktu: jam setelah bayi lahir
 Tidak, alasan:
41. Masalah lain, sebutkan:
42. Hasilnya:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 1: Jl. PLM, 709th (Pipa) No. 36 Samar-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : B-1111- /FKJK/PP.00.9/06/2018
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 14 Juni 2018

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel.
di-

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Eka Riska
NIM : 70400115031
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Klien Dengan Persalinan Postem di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
Tempat Penelitian : RSUD Syekh Yusuf Gowa
Dosen Pembimbing : 1. Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.SiT., M.Keb.
2. dr. Andi Siti Rahmah, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wasalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :
1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 2328/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor
: B-2102/FK0K/PP.00.9/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **EKA RISKA**
Nomor Pokok : 70400110031
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. H. Yasin Limpo No. 36, Semata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah,
dengan judul :

" **MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA KLIEN DENGAN PERSALINAN POSTERIOR
RSUD SYEKH YUSUF GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Juli s/d 29 Agustus 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan
kelengkapan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 04 Juli 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Terdapat 02 (dua) rangkap
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
2. Peringkat

SNMP PTSP 08-07-2018



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938
Website : <http://p2t.kemd.sulselprov.go.id> Email : p2t_prov.sulsel@nhsos.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Masjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa - Gowa

Sungguminasa, 12 Juli 2018

Kepada

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Di-
Tempat

Nomor: 070/WP/ /BKB.P/2018
Lamp : -
Perihal: Rekomendasi Penelitian

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 2328/S.01/PTSP/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **EKA RISKA**
Tempat/Tanggal Lahir : Maros, 16 Januari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : BTN Paccinongan Harapan PA. 10 No. 21

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA KLIEN DENGAN PERSALINAN POSTERM DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA**"

Selama : 09 Juli s/d 29 Agustus 2018
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ag. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,

DRS. BAIHARUDDIN T.
Pangkat : Pembina Utama Muda
N.I.P. : 19600124 197911 1 001

- Tembusan :
1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
 2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
 3. Dekan Fak. Kesehatan dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Bertinggal.-



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN STUDY KASUS

Nomor : 177/Diklat.RSUD-SY/VIII (2018)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menearangkan bahwa :

N a m a : Eka Riska
N i m : 70400115031
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Study Kasus di Ruang Kamar Bersalin (INC) dan IGD Maternal RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Pada Ny * N * Dengan Persalinan Postterm Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa* pada Tanggal 07 Juli 2018 s/d 07 Juli 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 07 Agustus 2018

An. Ketua Diklat
Kebidanan bagian Penelitian

Dr. H. Basrah Rauf, Bsc. MMRS
NIP. 19630710 198703 2 019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Eka Riska
Nim : 70400115031
Tempat, Tanggal Lahir : Tana Takko, 16 Januari 1996
Suku : Bugis-Makassar
Asal Daerah : Maros
Agama : Islam
Alamat : Dusun Tana Takko, Desa Lebbo Tengngae,
Kec. Cenrana, Kab.Maros

B. Riwayat Pendidikan

SDN 33 Laiya : 2002 - 2008
SMPN 1 Cenrana : 2008 - 2011
SMAN 4 Bantimurung Maros : 2011 - 2014
UIN Alauddin Makasssar : 2015 - 2018