

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR
DENGAN IKTERUS NEONATORUM
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 08-24 JULI
TAHUN 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

**Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

NADA NOVA WANDA

NIM. 70400115010

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nada Nova Wanda
Nim : 70400115010
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 07 November 1997
Jurusan/Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma
Alamat : BTN Paccinongan Harapan
Judul : “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Ikterus Patologi Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 08-24 Juli Tahun 2018”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa 4 Agustus 2018

Penyusun

Nada Nova Wanda

70400115010


HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nada Nova Wanda
Nim : 70400115010
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi dengan Ikterus Neonatorum di
RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 08-24 Juli Tahun 2018

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Karya Tulis Ilmiah jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 09 Agustus 2018

Pembimbing I


Anieq Mamhi'ah Alkautzar S.ST.,M.Keb

Pembimbing II


dr. Darmawansylh, M.Kes

M A K A S S A R

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi dengan Ikterus Patologi di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 08-24 Juli 2018"**, yang disusun oleh **Nada Nova Wanda NIM: 70400115010**. Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari senin 09 Agustus 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 09 Agustus 2018 M

27 Dzulqaidah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** ()
Sekretaris : **Firdayanti, S.SiT, M.Keb** ()
Pembimbing I : **Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb** ()
Pembimbing II : **dr. Darmawansyih, M.Kes** ()
Penguji I : **dr. Andi Sitti Rahma, M. Kes** ()
Penguji II : **Nurkhalis A. Gaffar, M. Hum** ()

Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	6
E. Metode Penulisan	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir

1. Pengertian Bayi Baru Lahir Normal	11
2. Ciri-Ciri Bayi Baru Lahir Normal	12
3. Adaptasi Fisiologi Bayi Baru Lahir	13
4. Penilaian Apgar Score	16
5. Penilaian Bayi Baru Lahir	17
6. Asuhan Bayi Baru Lahir	21
7. Pemberian ASI	22
8. Bounding Attachment	23
9. Rawat Gabung	23

B. Tinjauan Khusus Tentang Ikterus

1. Pengertian	24
2. Klasifikasi	25
3. Manifestasi Klinik	26
4. Etiologi	27
5. Patofisiologi	29
6. Faktor Resiko	30
7. Resiko Yang Mungkin Terjadi	31
8. Penilaian Bayi Ikterus	31
9. Penanganan Bayi Ikterus	35

10. Luas Permukaan Fototerapi	42
11. Komplikasi	43
12. Transfusi Tukar	43
13. Mencegah Ikterus Pada Bayi	46
C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan	47
2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan	47
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)	53
D. Tinjauan Umum Bayi Baru Lahir Dalam Islam	
1. Proses Penciptaan Manusia	55
2. Pemberian ASI	60

BAB III STUDI KASUS

A. Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Ikterus Patologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa	
1. Langkah I. Identifikasi data dasar	63
2. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual	69
3. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial	72
4. Langkah IV. Tindakan Segera/ Kolaborasi	73
5. Langkah V. Rencana Tindakan	74
6. Langkah VI. Tindakan Asuhan Kebidanan	76
7. Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan	78

B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 08 Juli 2018	79
C. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 09 Juli 2018	87
D. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 12 Juli 2018	100
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 16 Juli 2018	104
F. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 24 Juli 2018	108

BAB IV PEMBAHASAN

A. Identifikasi data dasar	112
B. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual	118
C. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial	123
D. Tindakan segera/ kolaborasi	125
E. Rencana tindakan	126
F. Tindakan Asuhan Kebidanan	127
G. Evaluasi Asuhan Kebidanan	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 132

B. Saran 134

DAFTAR PUSTAKA 136




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penilaian Apgar Score	16
Tabel 2.2 : Rumus Kramer	34
Tabel 2.3 : Petunjuk Pelaksanaan Hiperbilirubinemia Berdasarkan Berat Badan Dan Bayi Baru Lahir Yang Relatif Sehat	40
Tabel 2.4 : Petunjuk Pelaksanaan Hiperbilirubinemia Pada Bayi sehat Cukup Bulan	41
Tabel 2.5 : Indikasi Transfusi tukar Berdasarkan TSB (WHO).....	45
Tabel 2.6 : Indikasi Transfusi Tukar Pada BBLR	45
Tabel 2.7 : Kunjungan	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Penilaian Bayi Ikterus 33

Gambar 2.2 : Grafik Penatalaksanaan Hiperbilirubinemia 43



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2018

Nada Nova Wanda,

Supervisor I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar

Supervisor II : Darmawansyih

"The Obstetric Care Management on Babies with Phatological Jaundice at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018"

Neonatal jaundice is a biological phenomenon arising due to the high production and low bilirubin excretion during the transition period in neonates that result in a yellow color appearing in the sclera and skin. The study is aimed at implementing the care management in an infant with pathological jaundice at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 based on 7 steps of Varney and SOAP.

The results of the case study carried out on baby "S" with pathological jaundice after the care being implemented, no hindrances were found during the care provided. Monitoring was carried out 5 times for approximately 1 month. During the maternal care, the baby's skin and sclera were yellow from July 7, 2018, the suction reflex and swallowing of the baby were weak from July 6, 2018 and at the time of the laboratory examination on July 7, 2018, the bilirubin result was 14 mg/dl, and the baby's skin and sclera were not yellow and the bilirubin levels were back to normal at the last care on July 24, 2018.

The conclusion of the case study was that 7 steps of Varney and SOAP implemented for the midwifery problem solving process had been carried out in the case of baby "S" with neonatal jaundice at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2017 and the documentation of all findings and actions carried out to baby "S" was no result of jaundice and there was no gap between the theory and the real case.

Keywords : Jaundice, 7 Steps of Varney



M A K A S S A R

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2018

Nada Nova Wanda,

Pembimbing I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar

Pembimbing II : Darmawansyih

“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Ikterus Patologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018”

Ikterus neonatorum merupakan fenomena biologis yang timbul akibat tingginya produksi dan rendahnya ekskresi bilirubin selama masa transisi pada neonatus, yang menimbulkan warna kuning yang tampak pada sklera dan kulit.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Pada Bayi Dengan Ikterus Patologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada bayi “S” dengan ikterus patologi setelah dilakukan asuhan, tidak ditemukannya hambatan selama asuhan yang diberikan. Pemantauan dilakukan sebanyak 5 kali selama kurang lebih 1 bulan. Selama dilukukannya asuhan ibu didapatkan kulit dan sklera bayi berwarna kuning sejak tanggal 07 Juli 2018, refleks hisap dan menelan bayi lemah sejak tanggal 06 Juli 2018 dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB tanggal 07 Juli 2018 hasil bilirubin 14 mg/dl dan asuhan terakhir tanggal 24 Juli 2018 kulit dan sklera bayi sudah tidak kuning dan kadar bilirubin sudah kembali normal.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada kasus By “S” dengan ikterus neonatorum di RSUS Syekh Yusuf Gowa 2017 dan dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan terhadap By “S” dengan hasil tidak terjadi kern ikterus dan tidak ditemukannya kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Kata Kunci : Ikterus, 7 Langkah Varney.

KATA PEGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, semoga rahmat, dan hidayah, selalu tercurah kepada kita semua sehingga segala aktivitas yang kita kerjakan bernilai ibadah disisi Allah SWT. Shalawat serta salam tercurah atas junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Ikterus Patologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa” dapat diwujudkan, oleh karena itu, penulis mengucapkan pujian dan rasa syukur kepada-Nya sebanyak makhluk ciptaannya, seberat Arasy-Nya dan sebanyak tinta yang dipergunakan untuk menulis kalimat-Nya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai satu-satunya ushah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian diatas bumi ini, juga kepada para sahabatnya dan orang mu'min yang senantiasa istiqomah meniti jalan ini hingga akhir zaman dengan islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya karya tulis ilmiah ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Darnawati dan Ayahanda Nasruddin yang telah tulus dan ikhlas memberikan cinta, kasih sayang, dan nasihat yang tak pernah terputus, terima kasih untuk setiap tetesan darah dan setiap bulir keringat yang jatuh demi untuk agar penulis tidak merasa kurang satu hal apapun. Terimakasih telah sabar dan selalu mendoakan kesuksesan penulis disetiap hembusan nafas tanpa lelah dan tanpa jeda agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. Dan adik penulis Alfan Siswandi yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat untuk menjadi kakak yang lebih baik.

Dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari. M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staffnya.
3. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, S.Km, M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb selaku pembimbing I yang telah memberi ilmu, semangat dan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md. Keb.
5. Ibu dr. Darmawansyih, M.Kes selaku pembimbing II yang telah memberi ilmu, semangat dan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md. Keb.
6. Ibu dr. Andi Siti Rahma M.Kes selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah.
7. Bapak Nurkholis Aggafar M.Hum selaku penguji agama yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah.
8. Kepada seluruh dosen dan staff pengajar program studi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang dan jajarannya yang telah memberi izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
10. Kepada Nenek, tante, dan om yang menyayangiku dan banyak membantu selama di Makassar.
11. Terkhusus kepada kakak yang banyak membantu, yang selalu menjaga dan tanpa kenal lelah menemani berjuang yang selalu membantuku bangun di saat jatuh, yang selalu memberikan motivasi dalam pendidikanku.

12. Kepada Sahabat tercinta The Ladye7 yang selalu menjadi penyemangat dan tak pernah luput dari ingatan meskipun terhalang jarak.
13. Kepada Teman-teman seperjuanganku Paccinongan Squad yang selalu membantu selama di Makassar dan selalu membuat lingkungan menjadi positif sehingga semangat belajar terus tumbuh.
14. Kepada Teman-teman Kebidanan A 2015, teman seperjuangan yang selalu membela dan membantu dalam keadaan apapun.
15. Kepada Teman-teman Kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2015 (Frontal15).

Akhir kata, semoga Allah senantiasa melimpahkan karunianya dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Samata-Gowa, 4 Agustus 2018

Penulis

Nada Nova Wanda



UNIVERSITAS IBN KHALDUN EFFRI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikterus neonatorum merupakan fenomena biologis yang timbul akibat tingginya produksi dan rendahnya ekskresi bilirubin selama masa transisi pada neonatus, yang menimbulkan perwarnaan kuning yang tampak pada sklera dan kulit yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin. Ikterus umumnya mulai tampak pada sklera (bagian putih mata) dan wajah, selanjutnya meluas secara sefalokaudal (dari atas kebawah) ke arah dada, perut dan ekstremitas. Pada bayi baru lahir ikterus seringkali tidak dapat dilihat pada sklera karena bayi baru lahir umumnya sulit membuka mata (Susi Widiawati, 2017 : 54).

Ikterus neonatorum dapat menimbulkan ensefalopati bilirubin (kern ikterus) yang merupakan komplikasi ikterus neonatorum yang paling berat. Selain memiliki angka mortalitas yang tinggi, juga dapat menyebabkan gejala berupa *cerebral palsy*, tuli nada tinggi, retardasi mental dan gangguan proses pertumbuhan. Peningkatan kadar bilirubin dapat diakibatkan oleh pembentukan yang berlebihan atau ada gangguan dalam pengeluaran bilirubin, ikterus pada bayi dapat bersifat fisiologis dan sebagian dapat bersifat patologis yang dikenal dengan istilah hiperbilirubinemia yang dapat mengakibatkan gangguan saraf pusat (kern ikterus) atau kematian (Sefti dan Rita, 2017 : 4) .

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan bayi dan menurut data *World Health Organization* (WHO) tahun 2012 Angka Kematian Bayi (AKB) di Dunia tahun 2012 sebesar 49 per 1.000 kelahiran hidup, *High Risk Infant* atau faktor bayi yang mempertinggi resiko kematian perinatal atau neonatal salah satunya adalah ikterus neonatorum yang merupakan penyebab kematian neonatal sekitar 20-40% dari seluruh persalinan (Susi Widiawati, 2017 : 53).

Menurut WHO 2013 angka kematian bayi 34 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dengan angka 43 per 1.000 kelahiran hidup. Di kawasan Asia Tenggara, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (WHO,2016).AKB di negara berkembang 37 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB di negara maju 5 per 1.000 kelahiran hidup. AKB di Asia Timur 11 per 1.000 kelahiran hidup, Asia Selatan 43 per 1.000 kelahiran hidup dan Asia Barat 21 per 1.000 kelahiran hidup. Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan AKB sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan Malaysia, Filipina dan Singapura, angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka dari negara-negara tersebut dimana AKB Malaysia 7 per 1.000 kelahiran hidup, Filipina 24 per 1.000 kelahiran hidup dan Singapura 2 per 1.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Dalam profil Kesehatan Indonesia tahun 2014, AKB di Indonesia sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun terjadi penurunan dari tahun 2010 yang data AKB sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup, tetapi angka tersebut jauh dari target *SustainableDevelopment Goals* (SDGs) yaitu AKB tahun 2016 sebesar 23 per

1.000 kelahiran hidup. Penyebab kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermi, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat lahir <2.500 gram), sindroma gangguan pernapasan, dan kelainan kongenital (DinKes, 2014). Penyebab utama kematian bayi di Indonesia disebabkan karena BBLR 26%, ikterus 9%, hipoglikemia 0,8%, dan infeksi neonatorum 1,8% (Kemenkes RI, 2015).

Menurut Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 presentase penyebab kematian bayi adalah pneumonia 25%, diare 21%, infeksi 19%, kelainan kongenital 15%, gizi buruk 6%, trauma 3%, campak 2%, ikterus 1%. Berdasarkan data yang diperoleh dari profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (2014) jumlah kematian bayi menjadi 1.056 atau 7,23 per 1000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan janin yang lambat, kekurangan gizi pada janin, kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR), gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar, gangguan transportasi dalam metabolisme dan gangguan dalam ekskresi (Arief dan Kristiyanasari, 2009). Sedangkan penyebab lainnya yang cukup sering adalah kejadian kurangnya oksigen dalam rahim (hipoksia uterus), trauma persalinan (*chefalhematoma, caput succedaaneum*) dan kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir (asfiksia) dan ikterus (Profil Dinas Kesehatan Sul-Sel, 2014).

Angka kematian bayi menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 adalah 8,33 per 1.000 kelahiran hidup (Dinkes, 2016). Data rekam medik di RSUD Syekh Yusuf Gowa, didapatkan pada

tahun 2015 sebanyak 5 bayi yang mengalami ikterus, pada tahun 2016 sebanyak 2 bayi mengalami ikterus, dan pada tahun 2017 sebanyak 4 bayi mengalami ikterus (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa).

Berdasarkan Kepmenkes 900 tahun 2002 tentang registrasi dan praktik bidan dan memperhatikan draft ke VI kompetensi inti bidan yang disusun oleh ICM (*International Confederation of Midwife*) Februari 1999, seorang bidan mampu memberikan asuhan yang bermutu tinggi seta komprehensif pada bayi baru lahir sampai dengan 1 bulan.

Walaupun angka kejadian ikterus neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa hanya sedikit, namun mengingat komplikasi yang dapat ditimbulkan apabila bayi ikterus tidak segera ditangani dan kadar bilirubinnya semakin tinggi, yakni dapat menyebabkan kern ikterus dimana bayi dengan keadaan ini mempunyai resiko terhadap kematian atau jika dapat bertahan hidup akan mengalami gangguan perkembangan neurologis. Pada setiap bayi yang mengalami ikterus harus dibedakan apakah ikterus yang terjadi merupakan keadaan yang fisiologik atau non-fisiologik. Selain itu perlu dimonitor apakah keadaan tersebut mempunyai kecendrungan berkembang menjadi hiperbilirubinemia berat yang memerlukan penanganan optimal mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh kejadian ikterus neonatorum pada bayi baru lahir maka perlu penanganan secara kolaborasi dari petugas kesehatan dalam pencegahan komplikasi untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Ikterus Neonatorum pada Bayi Baru Lahir sebagai Karya Tulis Ilmiah.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Adapun ruang lingkup penulisan ini adalah penerapan “Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa”

C. Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan kewenangan bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum
- b. Dirumuskan diagnosa masalah aktual yang terjadi pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum
- c. Dirumuskan diagnosa masalah potensial pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada bayi dengan Ikterus Neonatorum
- e. Direncanakan tindakan asuhan pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum
- f. Diimplementasikan tindakan asuhan kebidanan yang pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum

- g. Dievaluasi hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum
- h. Didokumentasikan semua asuhan temuan kebidanan dan tindakan yang telah diberikan pada bayi dengan Ikterus Neonatorum

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu persyaratan dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Diharapkan karya tulis ini dapat memperluas pola pikir dan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan khususnya perawatan bayi baru lahir dengan Ikterus Neonatorum.

5. Manfaat Bagi Pembaca khususnya Ibu Nifas

Sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya ibu nifas yang baru saja melahirkan bayi Ikterus.

E. Metode Penulisan

Berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan praktek serta pengalaman. Penulis memerlukan data yang objektif dan relevan dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisa dalam masalah. Metode penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Membaca dan mempelajari berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan asfiksia neonatorum sebagai dasar teoritis yang digunakan pada pembahasan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Studi Kasus

Melaksanakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui Manajemen Asuhan Kebidanan oleh Helen Varney yang meliputi 7 langkah: pengkajian, perumusan diagnosis/masalah aktual maupun potensial, pelaksanaan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan, implementasi serta evaluasi Asuhan Kebidanan pada klien dengan kasus Ikterus Neonatorum. Untuk memperoleh data/informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik :

- a. Anamnesis klien yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan ibu dan bapak klien dan keluarganya yang dapat membantu memberikan keterangan/informasi yang di butuhkan dengan dipantau oleh tenaga kesehatan.
- b. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi.

- 1) Inspeksi merupakan proses pemeriksaan dengan menggunakan mata merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi dilakukan menggunakan sentuhan atau meraba. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah sedangkan lenek digunakan untuk mendengarkan denyut jantung bayi.

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi bayi terhadap ibu, keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Studi yang mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter atau bidan.

4. Diskusi

Melakukan diskusi dengan ibu dan keluarga bayi, diskusi dengan dosen pembimbing lahan dan juga pembimbing institusi yang membantu untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang di gunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu : Pada bab I pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang bayi baru lahir, tinjauan khusus tentang ikterus, proses manajemen asuhan kebidanan dan tinjauan umum tentang

Pada bab III yaitu study kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan dan atau intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan ikterus neonatorum.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, serta semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulis.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir Normal

1. Pengertian Bayi Baru Lahir Normal

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentase belakang kepala melalui vagina, tanpa melalui alat yang pada usia 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan lahir 2.500-4.000 gram nilai apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan (Rukiyah dan Julianti, 2010).

Bayi baru lahir (Neonatus) adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. BBL memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi (menyesuaikan diri dari kehidupan intra uterin ke kehidupan ektrauterin) dan toleransi bagi BBL untuk dapat hidup dengan baik. Bayi baru lahir (Neonatus) adalah bayi usia 0-28 hari (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2010).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bayi baru lahir adalah bayi yang lahir tanpa melalui alat pada usia 37 sampai 42 minggu dengan berat antara 2.500-4000 gram, cukup bulan, langsung menangis dan tidak ada kelainan kongenital (cacat bawaan yang berat).

2. Ciri-ciri Bayi Baru Lahir Normal

- a. Berat badan 2.500-4.000 gram.
- b. Panjang badan 42-58 cm.
- c. Lingkar kepala 33-35 cm
- d. Lingkar dada 30-38 cm.
- e. Bunyi jantung pada menit pertama kurang lebih 180x/menit menurun sampai 120-160x/menit.
- f. Pernapasan bayi pada menit pertama 80x/menit menurun sampai 40x/menit.
- g. Kulit merah muda dan licin.
- h. Rambut lanugotidak terlihat, rambut kepala biasanya telah sempurna.
- i. Kuku agak panjang dan lemas, warna kemerahan.
- j. Untuk laki-laki testis sudah turun dan untuk perempuan genitalia labia mayora telah menutupi labia minora.
- k. Refleks hisap sudah terbentuk dengan baik.
- l. Refleks *moro* sudah baik, dikagetkan akan memperlihatkan gerakan tangan seperti memeluk.
- m. Refleks *graff* sudah baik, bila diletakkan suatu benda di telapak tangan maka akan menggenggam.
- n. Eliminasi, urine dan mekonium akan keluar 24 jam, pertama mekonium berwarna kecoklatan atau kehitaman. (Marmi dan Rahardjo, 2014 : 8-9).

3. Adaptasi Fisiologis BBL Terhadap Kehidupan di Luar Uterus

a. Sistem Pernapasan

Selama dalam uterus, janin mendapat oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta. Setelah bayi lahir, pertukaran gas harus melalui paru-paru bayi.

Rangsangan gerakan pernapasan pertama :

- 1) Tekanan mekanik dari torak sewaktu melalui jalan lahir (stimulasi mekanik).
- 2) Penurunan Pa O₂ dan kenaikan PaCO₂ merangsang kemoreseptor yang terletak di sinus kortikus (stimulasi kimiawi).
- 3) Rangsangan dingin di daerah muka dan perubahan suhu di dalam uterus (stimulasi sensorik).

Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 menit pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan tekanan alveoli, selain adanya surfaktan yang dengan menarik napas dan mengeluarkan napas dengan merintih sehingga udara tertahan di dalam.

b. Metabolisme

Pada jam-jam pertama energi didapatkan dari perubahan karbohidrat. Pada hari kedua, energi berasal dari pembakaran lemak. Setelah mendapat susu kurang lebih pada hari keenam, energi 60% didapatkan dari lemak dan 40% dari karbohidrat.

c. Sirkulasi Darah

Setelah bayi lahir, paru akan berkembang mengakibatkan tekanan-tekanan arteriol dalam paru menurun. Tekanan dalam jantung kanan turun, sehingga tekanan jantung kiri lebih besar daripada tekanan jantung kanan yang mengakibatkan menutupnya *foramen ovale* secara fungsional. Hal ini terjadi pada jam-jam pertama setelah kelahiran.

d. Keseimbangan Air dan Fungsi Ginjal

Tubuh BBL mengandung relatif banyak air dan kadar natrium relatif lebih besar dari kalium karena ruangan ekstraseluler luas.

Fungsi ginjal belum sempurna karena jumlah nefron masih belum sebanyak orang dewasa, ketidakseimbangan luas permukaan glomerulus dan volume tubulus proksimal dan renal *blood flow* relatif kurang bila dibandingkan orang dewasa.

e. Imunoglobulin

- 1) Pada neonatus tidak terdapat sel plasma pada sum-sum tulang dan lamia propia ilium dan apendiks.
- 2) Plasenta merupakan sawar sehingga fetus bebas dari antigen dan stres imunologis.
- 3) Pada BBL hanya terdapat gama globulin G, sehingga imunologi dari ibu dapat melewati plasenta karena berat molekulnya kecil.

f. Traktus Digestivus

Traktus digestifus relatif lebih berat dan lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa. Pada neonatus traktus digestivus mengandung zat berwarna hitam kehijauan yang terdiri dari mukopolisakarida dan disebut mekonium. Pengeluaran mekonium biasanya dalam 10 jam pertama dan dalam 4 hari biasanya tinja sudah terbentuk dan berwarna biasa.

g. Hati

Segera setelah lahir, hati menunjukkan perubahan kimia dan morfologis, yaitu kenaikan kadar protein dan penurunan kadar lemak dan glikogen. Sel hemopoetik juga mulai berkurang, walaupun memakan waktu agak lama. Enzim hati belum aktif benar pada waktu bayi lahir, daya detoksifikasi hati pada neonatus juga belum sempurna.

h. Keseimbangan Asam Basa

PH darah pada waktu lahir rendah karena glikolisis aerobik.

Dalam 24 jam neonatus telah mengkompensasi asidosis ini (Indrayani & Emma Moudy, 2013 : 310-314).

4. Penilaian Apgar Score

Apgar score adalah sebuah metode sederhana untuk secara cepat menilai kondisi kesehatan bayi baru lahir sesaat setelah melahirkan. *Apgar score* dihitung dengan menilai kondisi bayi yang baru lahir menggunakan lima kriteria sederhana dengan nilai nol, satu, dan dua. Kemudian kelima nilai kriteria tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan angka nol hingga 10. Dari hasil penilaian tersebut dapat diketahui apabila nilai apgar :

- a. Nilai 0-3 : Asfiksia berat
- b. Nilai 4-6 : Asfiksia sedang-ringan
- c. Nilai 7-10 : Normal (Nadyah, 2013 : 97).

Tabel 2.1
Penilaian Apgar Score

Nilai	0	1	2
<i>Appereance</i>	Seluruh tubuh biru	Badan merah Ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerhan
<i>Pulse (nadi)</i>	Tidak ada	< 100x permenit	>100x permenit
<i>Grimace (Refleks)</i>	Tidak ada	Perubahan mimik (Menyeringai)	Bersin/menangis
<i>Activity (tonus otot)</i>	Tidak ada	Ekstremitassedi kit fleksi	Bergerak aktif
<i>Respiration (pernapasan)</i>	Tidak ada	Lemah	Menangis kuat

(Sumber: Nadyah, 2013 : 96).

5. Penilaian Bayi Baru Lahir

a. Pemeriksaan Fisik

1) Periksa Kulit

Periksa verniks, warna kulit dan bibir, tanda lahir.

2) Periksa Kepala

Kepala ubun-ubun (raba adanya cekungan atau cairan dalam ubun-ubun), sutura (pada perabaan sutura masih terbuka), molase, periksa hubungan dalam letak dengan mata dan kepala, Ukur lingkaran kepala dimulai dari lingkaran oksipito-frontal. Kisaran normal lingkaran kepala 33-35 cm.

3) Periksa Mata

- a) Buka mata bayi dan lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau pus.
- b) Bersihkan kedua mata bayi dengan lidi kapas DTT.
- c) Periksa pupil, ukuran sama, dan reaktivitas terhadap cahaya.
- d) Berikan salep mata.

4) Pemeriksaan Telinga

Periksa hubungan letak mata dan kepala.

5) Periksa Hidung dan Mulut

Periksa bibir dan langit-langit, sumbing, refleks hisap dinilai saat bayi menyusui.

6) Periksa Leher

Periksa pembengkakan dan gumpalan.

7) Periksa Dada

(1)Perika bunyi nafas dan detak jantung.

(2)Lihat adakah tarikan dinding dada.

(3)Lihat puting susu (simetris/tidak).

8) Periksa Abdomen

a) Palpasi perut, apakah ada kelainan.

b) Keadaan tali pusat.

9) Periksa Alat Genetalia

a) Untuk bayi laki-laki, periksa apakah testis sudah berada dalam skrotum.

b) Untuk bayi perempuan periksa labia mayor dan minor, apakah vagina berlubang, uretra berlubang.

c) Amati apakah ada pseudomenorhea (cairan kental berwarna keputihan).

10) Periksa Punggung

Tubuh bayi dibalik dan punggungnya diperiksa dengan ibu jari untuk mengetahui keadaan tulang belakangnya.

11) Periksa Anus

Periksa lubang anus. Apabila bayi sudah mengeluarkan mekonium maka langkah ini tidak usah dikerjakan.

12) Periksa Bahu, Lengan dan Tangan

a) Sentuh telapak tangan bayi dengan jari dan hitung jumlah jari tangan bayi.

b) Bayi akan menggenggam tangan kuat-kuat sehingga tubuhnya bisa terangkat naik.

13) Periksa Tungkai dan Kaki

a) Kaki bayi ditekuk dan diputar perlahan.

b) Untuk mengetahui keadaan sumbu panggul (Indrayani dan Emma Moudy, 2013 : 329-333).

14) Pemeriksaan Refleks

a) Lakukan Pemeriksaan Reflek *Glabella*

(1) Ketuk daerah pangkal hidung secara pelan dengan menggunakan jari telunjuk.

(2) Bayi akan mengedipkan mata pada 4 sampai 5 ketukan pertama

b) Lakukan Pemeriksaan Reflek *Rooting*

(1) Sentuh pipi atau mulut bayi dengan menggunakan jari tangan.

(2) Bayi akan menoleh ke arah stimulus dan membuka mulutnya.

c) Lakukan Pemeriksaan Reflek Menghisap dan Menelan pada

Bayi. Masukkan sebagian besar areola mammae ke dalam mulut bayi. Amati bayi menyusu.

d) Lakukan pemeriksaan Reflek *Tonikneck*

Tengkurapkan bayi, bayi akan menoleh ke samping /kebelakang

Baringkan bayi, seolah-olah akan mengangkat bayi, bayi akan mengangkat kepala/leher tegak.

e) Lakukan Pemeriksaan Reflek *Moro*

- (1) Gendong bayi dalam posisi setengah duduk dengan sudut 30 derajat di atas permukaan meja pemeriksaan, kemudian biarkan kepala jatuh ke belakang.
- (2) Bayi akan menunjukkan respon berupa memeluk dengan abduksi dan ekstensi dari ekstremitas atas yang cepat dan diikuti dengan aduksi yang lebih lambat dan kemudian timbul fleksi.

f) Lakukan Pemeriksaan Reflek *Babinsky*

Gores telapak kaki, dimulai dari tumit, gores sisi lateral telapak kaki ke arah atas kemudian gerakkan jari sepanjang telapak kaki. Bayi akan menunjukkan respon berupa semua jari kaki hiperekstensi dengan ibu jari dorsifleksi.

g) Lakukan Pemeriksaan Reflek Berjalan

- (1) Pegang bayi secara vertikal, biarkan salah satu kaki bayi menyentuh permukaan meja.
- (2) Bayi akan menunjukkan respon berupa gerakan berjalan, kaki akan bergantian fleksi dan ekstensi (Indrayani dan Emma Moudy, 2013 : 329-333).

6. Asuhan Bayi Baru Lahir

a. Pencegahan Infeksi

Sebelum menangani bayi baru lahir, pastikan penolong telah menerapkan upaya pencegahan infeksi antara lain :

- 1) Cuci tangan secara efektif sebelum bersentuhan dengan bayi.
- 2) Gunakan sarung tangan yang bersih pada saat menangani bayi yang belum dimandikan.
- 3) Pastikan semua peralatan dan bahan yang digunakan telah di desinfeksi atau disterilkan.
- 4) Pastikan semua pakaian, handuk, selimut dan kain yang digunakan untuk bayi dalam keadaan bersih.

b. Penilaian

Segera setelah lahir, letakkan bayi di atas kain bersih dan kering yang sudah disiapkan di atas perut ibu. Apabila tali pusat pendek, maka letakkan bayi diantara kedua kaki ibu ibu, pastikan tempat tersebut dalam keadaan bersih dan kering.

Segera lakukan penilaian awal pada bayi baru lahir :

- 1) Apakah bayi bernapas atau menangis kuat tanpa kesulitan ?
- 2) Apakah bayi bergerak aktif ?
- 3) Bagaimana warna kulit, apakah berwarna kemerah-merahan ataukah ada sianosis ?

Apabila bayi mengalami kesulitan bernapas maka lakukan tindakan resusitasi (Indrayani dan Emma Moudy, 2013 : 315).

c. Merawat Tali Pusat

- 1) Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk membersihkan darah dan sekresi lainnya.
- 2) Bilas tangan dengan air DTT.
- 3) Keringkan dengan handuk atau kain bersih dan kering.
- 4) Ikat tali pusat dengan jarak sekitar 1 cm dari pusat bayi. Gunakan benang atau klem penjepit tali pusat .
- 5) Jangan membubuhkan apapun pada tali pusat.
- 6) Lipat popok di bawah ikatan tali pusat
- 7) Bersihkan tali pusat dengan air bersih serta keringkan dengan kain bersih
- 8) Apabila tali pusat berwarna merah atau bernanah atau berdarah atau berbau, maka segera bawa bayi ke pusat pelayanan kesehatan.

7. Pemberian ASI

Asi sebagai makanan alamiah adalah makanan terbaik yang dapat diberikan oleh seorang ibu pada anak yang baru dilahirkannya. Komposisinya berubah sesuai dengan kebutuhan bayi pada setiap saat, yaitu kolostrum pada dari pertama sampai 4-7 hari, dilanjutkan dengan ASI peralihan sampai 3-4 minggu, selanjutnya ASI matur. Selain itu, ASI juga mengandung zat pelindung yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi (Prawirohadjo, 2014 : 376).

Semakin sering bayi menghisap puting susu maka akan semakin banyak prolaktin dan ASI yang diproduksi. Penerapan Inisiasi Menyusui

Dini (IMD) akan memberikan dampak positif bagi bayi, antara lain menjsalin dan memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, memberikan kekebalan pasif yang segera kepada bayi melalui kolostrum, merangsang kontaksi uterus (Indrayani dan Emma Moudy, 2013 : 320-321).

8. *Bounding Attachment*

Bounding attachment adalah suatu ikatan khusus yang dikarakteristikkan dengan kualitas-kualitas yang terbentuk dalam hubungan orang tua dan bayi. *Bounding attachment* adalah kontak awal antara ibu dan bayi setelah kelahiran, untuk memberikan kasih sayang yang merupakan dasar interaksi antara keduanya.

9. Rawat Gabung

Rawat gabung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar antara ibu dan bayi terjadi proses lekat akibat sentuhan antara ibu dan bayi. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan psikologis bayi selanjutnya, karena kehangatan suhu ibu merupakan stimulasi mental yang mutlak dibutuhkan oleh bayi.

B. Tinjauan Khusus Tentang Ikterus

1. Pengertian

- a. Ikterus neonatorum merupakan keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh warna kuning pada kulit dan sklera akibat akumulasi bilirubin tak terkonjugasi berlebihan. Ikterus secara klinis akan mulai tampak pada bayi baru lahir bila kadar bilirubin darah 5-7 mg/dL. Ikterus selama usia minggu pertama terdapat pada sekitar 60% bayi cukup bulan dan 80% bayi pretrem (Susi Widiawati, 2017 : 54).
- b. Ikterus neonatorum adalah suatu keadaan bayi baru lahir dimana kadar bilirubin serum total lebih dari 10mg% pada minggu pertama ditandai dengan ikterus, dikenal dengan ikterus neonatorum yang bersifat patologis atau hiperbilirubinemia. Ikterus adalah gejala diskolorasi kuning pada kulit, konjungtiva dan mukosa akibat penumpukan bilirubin (Siti dan Wahyuni, 2017 : 78).
- c. Ikterus neonatorum adalah gambaran klinis berupa pewarnaan kuning pada kulit dan mukosa karena adanya deposisi produk akhir katabolisme heme yaitu bilirubin (Pohlman dkk, 2015 : 97).
- d. Ikterus neonatorum merupakan fenomena biologis yang timbul akibat tingginya produksi dan rendahnya ekskresi bilirubin selama masa transisi pada neonatus. Pada neonatus produksi bilirubin 2 sampai 3 lebih tinggi dari pada orang dewasa normal. Hal ini dapat terjadi karena jumlah eritrosit pada neonatus lebih banyak dan usianya lebih pendek. Banyak bayi baru lahir bayi kecil (bayi dengan berat lahir <

2500 gram atau usia gestasi < 37 minggu) mengalami ikterus pada minggu pertama kehidupannya (Fajria, 2014 : 39).

- e. Hiperbilirubinemia merupakan salah satu fenomena klinis yang paling sering di temui pada bayi baru lahir dimana terjadi peningkatan kadar bilirubin dalam darah >5mg/dL yang secara klinis ditandai oleh adanya ikterus dengan faktor penyebab fisiologik dan non-fisiologik (Mathindas dkk, 2013 : S4).

Menurut beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ikterus merupakan menguningnya sklera, kulit, atau jaringan lainnya akibat adanya penimbunan bilirubin dalam tubuh. Keadaan ini merupakan tanda penting dari penyakit hati atau kelainan fungsi hati, saluran empedu dan penyakit darah.

2. **Klasifikasi Ikterus**

a. Ikterus Fisiologi

- 1) Warna kuning akan timbul pada hari ke-2 atau ke-3 dan tampak jelas pada hari ke 5-6 dan menghilang pada hari ke-10.
- 2) Bayi tampak biasa, minum baik, berat badan naik biasa.
- 3) Kadar bilirubin serum pada bayi cukup bulan tidak lebih dari 12mg/dL, dan pada BBLR 10mg/dL dan akan akan hilang pada hari ke-14.

b. Ikterus Patologi

- 1) Ikterus timbul pada 24 jam pertama kehidupan, serum bilirubin total lebih dari 12mg/dL dan menetap lebih dari 10 hari

- 2) Peningkatan bilirubin 5mg/dL atau lebih dari 24 jam.
- 3) Konsentrasi serum bilirubin melebihi 10mg/dL pada bayi kurang bulan dan 12,5mg/dL pada bayi cukup bulan.
- 4) Ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompatibilitas darah, defisiensi enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD), dan sepsis) (Fajria, 2014 : 39-40).
- 5) Warna kuning pada kulit dan sklera menetap lebih dari 10 hari.

3. Manifestasi Klinik

Tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia :

- a. Letargi (lemas).
- b. Kehilangan berat badan sampai 5% selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori.
- c. Feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejang.
- d. Tidak mau menghisap.
- e. Pembesaran pada hati.
- f. Tampak ikterus : sklera, kuku, kulit, dan membran mukosa
- g. Muntah, anoreksia, warna urine gelap, warna tinja gelap.
- h. Tidak mau minum.
- i. Epistotonus (posisi tubuh bayi melengkung).

Ikterus dapat ada pada saat lahir atau muncul pada setiap saat selama masa neonatus, bergantung pada keadaan yang menyebabkannya.

Ikterus biasanya mulai dari muka dan ketika kadar serum bertambah ,

turun ke abdomen kemudian kaki. Bayi baru lahir akan tampak kuning apabila kadar bilirubin serumnya kira-kira 6mg/dl.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan derajat kuning pada BBL menurut kramer adalah dengan jari telunjuk ditekan pada tempat-tempat yang tulangnya menonjol seperti tulang hidung, dada, lutut (Fajria, 2014 : 40).

4. Etiologi

Etiologi ikterus pada bayi baru lahir dapat berdiri sendiri ataupun disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

- a. Produksi yang berlebihan, lebih dari kemampuan bayi untuk mengeluarkannya, misalnya pada hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, ABO, defisiensi enzim G6PD, *pyruvate kinase*, perdarahan tertutup, dan sepsis.
- b. Gangguan dalam proses *uptake* dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim *glucoronil transferase* (*criggler najjar syndrome*). Penyebab lain adalah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam *uptake* bilirubin ke sel-sel hepar.
- c. Gangguan dalam transportasi. Bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut ke hepar. Ikatan bilirubin dalam albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obat, misalnya : *salisilat*, dan

sulfaforazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak.

- d. Gangguan dalam eksresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau di luar hepar. Kelainan di luar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar.
- e. Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat mengakibatkan hiperbilirubinemia *unconjugated* akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterohepatik.
- f. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI) kurang lancar. Ikterus akibat ASI kurang lancar merupakan *unconjugated* hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Hal ini untuk membedakan ikterus pada bayi yang disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagian bahan yang terkandung dalam ASI (*beta glucoronidase*) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat, dan kemudian akan direabsorpsi oleh usus karena pada hari pertama kehidupan produksi ASI belum banyak sehingga masih didapati tingginya kadar bilirubin dalam tubuh bayi, kurangnya pemberian ASI yang masuk ke usus juga mempengaruhi proses pembuangan bilirubin dari dalam tubuh. Pengobatannya yaitu bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan

meningkatkan frekuensi pemberiannya (Marmi dan Rahardjo, 2014 : 278-279).

5. Patofisiologi

Sel-sel darah merah yang telah tua dan rusak akan dipecah menjadi bilirubin, yang oleh hati akan dimetabolisme dan dibuang melalui feses. Di dalam usus juga terdapat banyak bakteri yang mampu mengubah bilirubin sehingga mudah dikeluarkan oleh feses. Hal ini terjadi secara normal pada orang dewasa. Pada bayi baru lahir, jumlah bakteri pemetabolisme bilirubin ini masih belum mencukupi sehingga ditemukan bilirubin yang masih beredar dalam tubuh tidak dibuang bersama feses. Begitu pula di dalam usus bayi terdapat enzim *glukorinil transferase* yang mampu mengubah bilirubin dan menyerap kembali bilirubin ke dalam darah sehingga makin memperparah akumulasi bilirubin dalam badannya. Akibatnya pigmen tersebut akan disimpan di bawah kulit, sehingga kulit bayi menjadi kuning. Biasanya dimulai dari wajah, dada, tungkai dan kaki menjadi kuning. Biasanya hiperbilirubinemia akan menghilang pada minggu pertama. Kadar bilirubin yang sangat tinggi biasanya disebabkan pembentukan yang berlebih atau gangguan pembuangan bilirubin. Kadang pada bayi cukup umur yang diberi ASI, kadar bilirubin meningkat secara progresif pada minggu pertama, keadaan ini disebut *jaundice* ASI, jika kadar bilirubin sangat tinggi mungkin perlu dilakukan terapi yaitu terapi sinar dan transfusi tukar (Maryunani, 2014 : 103-104).

Sebagian besar neonatus mengalami peningkatan kadar bilirubin indirek pada hari-hari pertama kehidupan. Hal ini terjadi karena terdapatnya proses fisiologik tertentu pada neonatus. Proses tersebut antara lain karena tingginya kadar eritrosit neonatus, usia hidup eritrosit yang lebih pendek (80-90 hari), dan belum matangnya fungsi hepar (Rukiyah dan Yulianti, 2012 : 270).

6. Faktor Resiko

a. ASI yang kurang

Bayi yang tidak mendapat ASI cukup dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk memproses pembuangan bilirubin dari dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI karena pada hari pertama kehidupan produksi ASI belum banyak sehingga masih didapati tingginya kadar bilirubin dalam tubuh bayi. Peningkatan jumlah sel darah merah

b. Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh bayi yang memiliki golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit (antara lain eliptosis) atau mendapat transfusi darah ; kesemuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia.

c. Infeksi/Inkompabilitas ABO-Rh

Berbagai infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin di dalam rahim dapat meningkatkan risiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubella dan sepsis (Mathindas dkk, 2013, S7).

7. Risiko Yang Mungkin Terjadi Akibat Ikterus, meliputi :

- a. Kurang asupan nutrisi, cairan.
- b. Kern ikterus : mengacu pada ensefalopati bilirubin yang berasal dari deposit bilirubin terutama pada batang otak (*brainstem*) dan *nucleusserebrobasal*. Kern ikterus bisa terjadi pada bayi tertentu tanpa disertai jaundis klinis, tetapi umumnya berhubungan langsung pada kadar bilirubin total dalam serum.
- c. Gangguan rasa aman dan nyaman akibat pengobatan: pangku bayi ajak komunikasi secara verbal, usahakan bayi tidak kepanasan atau kedinginan, jaga kebersihannya, dan cegah infeksi.
- d. Gagal ginjal (Rochman dkk, 2014).

8. Penilaian bayi ikterus

- a. Pengamatan ikterus kadang-kadang agak sulit apalagi dalam cahaya buatan. Paling baik pengamatan dilakukan dalam cahaya matahari dan dengan menekan sedikit kulit yang akan diamati untuk menghilangkan warna karena pengaruh sirkulasi darah. Secara klinis ikterus pada bayi dapat dilihat segera setelah lahir atau beberapa hari kemudian. Pada bayi dengan peninggian bilirubin


indirek, kulita tampak berwarna kuning terang sampai jingga, sedangkan pada penderita dengan gangguan obstruksi empedu warna kuning kulit tampak kehijauan. Penilaian ini sangat sulit dikarenakan ketergantungan dari warna kulit bayi sendiri.

Lakukan penjemuran (sinar matahari pada pukul 07.00-09.00 selama 15-30 menit); periksa kadar bilirubin darah, jika hasilnya di bawah 7mg%, ulangi keesokan harinya; berikan banyak minum, jika hasil bilirubin 7mg% atau lebih, segera rujuk ke dokter (Rukiyah dan Yulianti, 2012 : 271).

Cara menegakkan diagnosa pada bayi baru lahir, antara lain sebagai berikut :

- 1) Keluhan subjektif yaitu bayi berwarna kuning pada muka dan sebagian tubuhnya dan kemampuan menghisap bayi lemah (Williamson dan Kenda 2013 : 111-113).
- 2) Pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan yang dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan hasil bayi berwarna kuning serta pemeriksaan reflek bayi (Williamson dan Kenda 2013 : 111-113).
- 3) Pemeriksaan penunjang laboratorium yaitu pemeriksaan golongan darah, uji *coombs* direk, uji *coombs* indirek, kadar bilirubin total dan direk, darah periksa lengkap dengan diferensial, protein serum total, dan glukosa serum (Kosim, 2012). Cara untuk menentukan derajat ikterus yang merupakan resiko terjadinya *kern icterus*, salah satunya dengan cara klinis (*rumus kramer*) yang dilakukan di

bawah sinar biasa (*day light*). Daerah kulit bayi yang berwarna kuning untuk penerapan rumus Kramer seperti di bawah ini :



Gambar 2.1

(Sumber: Marmi dan Rahardjo , 2014 : 280).

Keterangan :

1. Kepala dan leher.
2. Daerah 1(+) badan bagian atas.
3. Daerah 1, 2 (+) badan bagian bawah dan tungkai.
4. Daerah 1, 2, 3 (+) lengan dan kaki di bawah lutut.
5. Daerah 1, 2, 3, 4 (+) telapak tangan dan kaki.

Tabel 2.2
Rumus Kramer

Daerah Gambar	Luas Ikterus	Kadar Bilirubin
1	Kepala dan leher	5
2	Daerah 1 (+) badan bagian atas	9
3	Daerah 1,2 (+) badan bagian bawah dan tungkai	11
4	Daerah 1,2,3 (+) lengan dan kaki di bawah dengkul	12
5	Daerah 1,2,3,4 (+) tangan dan kaki	>12,5

(Sumber:Marni dan Rahardjo, 2014 :280)

b. Pemeriksaan Diagnostik

- 1) Uji *coombs* direk : Untuk menentukan diagnosis penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, hasil positif mengindikasikan sel darah merah bayi telah terpajan (di selimuti antibodi).
- 2) Uji *coombs* indirek :Mengukur jumlah antibodi Rh positif dalam darah ibu.
- 3) Golongan darah bayi dan ibu : mengidentifikasi inkompabilitas ABO.
- 4) Kadar bilirubin total dan direk : kadar direk (terkonjugasi) bermakna jika melebihi 1,0-1,5mg/dL yang mungkin dihubungkan dengan sepsis. Kadar indirek (tidak terkonjugasi) tidak boleh melebihi peningkatan 5mg/dL dalam 24 jam atau tidak lebih dari 20mg/dL pada bayi cukup bulan atau 15mg/dL pada bayi preterm (tergantung berat badan).

- 5) Serum total : kadar kurang dari 3,0 mg/dL menandakan penurunan kapasitas ikatan, terutama pada bayi preterm.
- 6) Glukosa serum : kadar dextrosit mungkin kurang dari 45% glukosa darah lengkap kurang dari 3mg/dL atau tes glukosa serum kurang dari 40mg/dL bila bayi baru lahir hipoglikemia dan mulai menggunakan simpanan lemak dan melepaskan asam lemak.
- 7) Hitung darah lengkap : hemoglobin darah (HB) mungkin rendah (kurang dari 14mg/dLz) karena hemolisis hematokrit (HT) mungkin meningkat (kurang dari 45%) dengan hemolisis dan anemia berlebihan (Marmi dan Rahardjo, 2012).

9. Penanganan bayi ikterus

a. Ikterus Fisiologi

- 1) Mempercepat metabolisme pengeluaran bilirubin dengan *early breast feeding* yaitu menyusui bayi dengan ASI. Pemberian makanan dini dapat mengurangi terjadinya ikterus fisiologik pada neonatus, karena dengan pemberian makanan yang dini itu terjadi pendorongan gerakan usus dan mekonium lebih cepat dikeluarkan, sehingga peredaran enterohepatik bilirubin berkurang. Bilirubin dapat dipecah jika bayi banyak mengeluarkan feses dan urine. Untuk itu bayi harus mendapat cukup ASI, seperti yang diketahui ASI memiliki zat-zat terbaik bagi bayi yang dapat memperlancar BAB dan BAK. Akan tetapi pemberian ASI juga harus di bawah pengawasan dokter. Untuk mengurangi terjadinya ikterus dini bayi

diletakan di atas dada ibu selama 30-60 menit, posisi bayi pada payudara harus benar, berikan kolostrum karena dapat membantu untuk membersihkan mekonium segera. Mekonium yang mengandung bilirubin tinggi bila tidak segera dikeluarkan, bilirubinnya dapat diabsorpsi kembali sehingga meningkatkan kadar bilirubin dalam darah, bayi jangan diberi air putih, air gula atau apapun sebelum ASI keluar karena akan mengurangi asupan susu, memonitor kecukupan produksi ASI dengan melihat buang air kecil bayi paling kurang 6-7 kali sehari dan buang air besar paling kurang 3-4 kali sehari (Yuliawati, Ni Eka dkk, 2018 : 523).

2) Terapi sinar matahari

Terapi sinar biasanya dianjurkan setelah bayi selesai dirawat di rumah sakit. Dengan menjemur selama setengah jam dengan posisi berbeda. Lakukan pada jam 07.00-09.00 karena pada saat inilah waktu dimana sinar ultraviolet cukup efektif mengurangi kadar bilirubin, tutup mata dan bagian alat kelamin bayi serta menghindari posisi yang membuat bayi melihat langsung ke arah matahari yang dapat merusak matanya karena cahaya matahari khususnya sinar ultraviolet dapat memicu serangkaian reaksi kimia sel-sel pada mata yang pada akhirnya beresiko merusak kemampuan sel-sel mata dalam merespon objek visual (Williamson dan Kenda, 2013 : 109-110).

b. Ikterus Patologi

1) Fototerapi

Terapi sinar fototerapi dilakukan selama 24 jam atau setidaknya kadar bilirubin dalam darah kembali ke ambang batas normal. Dengan fototerapi bilirubin dalam tubuh bayi dapat dipecah dan menjadi mudah larut dalam air tanpa harus diubah terlebih dahulu oleh organ hati dan dapat dikeluarkan melalui urine dan feses sehingga kadar bilirubin menurun (Marmi dan Rahardjo, 2014 : 285).

Di samping itu pada terapi sinar fototerapi ditemukan peninggian konsentrasi bilirubin indirek dalam cairan empedu duodenum dan menyebabkan bertambahnya pengeluaran cairan empedu ke dalam usus sehingga peristaltik usus meningkat dan bilirubin akan keluar bersama feses. Terapi sinar juga berupaya menjaga kadar bilirubin agar tidak terus meningkat sehingga menimbulkan resiko yang lebih fatal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sinar fototerapi, yaitu :

a) Jenis Lampu

Dari beberapa studi menunjukkan lampu flourusen biru lebih efektif dalam menurunkan bilirubin, tetapi karena lampu *flouresen* cahaya biru dapat mengubah warna bayi, yang lebih disukai adalah lampu *flouresen* cahaya normal dengan

spektrum 420-460 nm agar kulit bayi dapat diobservasi baik mengenai warnanya (*jaundis, palor, sianosis*) ataupun kondisi lainnya. Agar hasil efektif kulit harus terpajang penuh dari sumber sinar dengan jumlah adekuat. Apabila kadar bilirubin meningkat dengan cepat maka dianjurkan menggunakan fototerapi dosis ganda atau intensif, teknik ini menggunakan lampu *overhead* konvensional sementara bayi berbaring dalam selimut serat optik. Hasil terbaik terjadi pada 24 sampai 48 jam pertama fototerapi.

Fototerapi intensif adalah fototerapi dengan menggunakan sinar bluegreen spectrum (panjang gelombang 430-490 nm) dengan kekuatan paling kurang 30 uW/cm² di periksa dengan radiometer atau diperkirakan dengan menempatkan bayi di bawah sumber sinar. Bila konsentrasi bilirubin tidak menurun pada bayi yang mendapat fototerapi intensif, kemungkinan besar terjadi proses hemolisis.

b) Pelaksanaan pemberian terapi sinar

- 1) Tempatkan bayi di bawah sinar fototerapi.
- 2) Bila berat bayi 2 kg atau lebih, tempatkan bayi dalam keadaan telanjang pada basinet. Tempatkan bayi yang lebih kecil dalam inkubator.

3) Letakkan bayi sesuai petunjuk pemakaian alat dari pabrik.

Tutupi mata bayi dengan penutup mata, pastikan lubang hidung bayi tidak tertutup. Jangan tempelkan penutup mata dengan selotip. Balikkan bayi setiap 3 jam.

4) Motivasi ibu untuk menyusui bayinya dengan ASI paling tidak setiap 3 jam. Selama menyusui, pindahkan bayi dari unit terapi sinar dan lepaskan penutup mata.

5) Bila bayi menerima cairan per IV atau ASI yang telah dipompa, tingkatkan volume cairan atau ASI sebanyak 10% volume total per hari selama bayi masih diterapi sinar.

6) Bila bayi sedang menerima oksigen, matikan terapi sinar sebentar untuk mengetahui apakah bayi mengalami sianosis sentral (lidah dan bibir biru). Ukur suhu bayi dan suhu udara di bawah sinar terapi setiap 3 jam.

7) Ukur kadar bilirubin serum setiap 12 jam atau sekurang-kurangnya sekali dalam 24 jam.

8) Hentikan terapi sinar bila kadar bilirubin $<13\text{mg/dL}$ (Fajria, 2014 : 41).

Tabel 2.3
Petunjuk Penatalaksanaan Hiperbilirubinemia Berdasarkan Berat Badan
Dan Bayi Baru Lahir Yang Relatif Sehat

Kadar Bilirubin Total Serum (mg/dL)				
Berat Badan Kurang Bulan	Sehat		Sakit	
	Fototerapi	Transfusi Tukar	Fototerapi	Transfusi Tukar
<1000g	5-7	Bervariasi	4-6	Bervariasi
1001-1500g	7-10	Bervariasi	6-8	Bervariasi
1501-2000g	10-12	Bervariasi	8-10	Bervariasi
2001-2500g	12-15	Bervariasi	10-12	Bervariasi
Cukup bulan >2500g	15-18	20-25	12-15	18-20

(Sumber : Kosim dkk, 2012)

Bayi dengan berat lahir kurang dari 1.000 gram, memulai fototerapi sebesar 5-6mg/dL pada usia 24 jam, kemudian meningkat secara bertahap sampai usia 4 hari. Efisiensi fototerapi tergantung pada jumlah bilirubin yang diradiasi. Penyinaran area kulit permukaan lebih besar lebih efisien daripada penyinaran daerah kecil, dan efisiensi meningkat fototerapi dengan konsentrasi bilirubin serum.

Tabel 2.4
Petunjuk Penatalaksanaan Hiperbilirubinemia Pada Bayi Sehat Cukup
Bulan

Usia (Jam)	Kadar Bilirubin Total Serum (mg/dL[umol/L])			
	Pertimbangan Fototerapi	Fototerapi	Transfusi Tukar Jika Fototerapi Intensif	Transfusi Tukar & Fototerapi Intensif
25-48	≥12 (170)	≥ (260)	≥20 (340)	≥25 (430)
49-72	≥15 (260)	≥ (310)	≥25 (430)	≥25 (510)
>72	≥17 (290)	≥(340)	≥25 (430)	≥25 (510)

(Sumber : Kosim dkk, 2012)


Ikterus yang timbul pada usia 25-48 jam pasca kelahiran, fototerapi dianjurkan bila kadar bilirubin serum total > 12mg/dL (170mmol/L). Fototerapi harus dilaksanakan bila kadar bilirubin serum total ≥15mg/dL (260mmol/L). Bila fototerapi 2x24 jam gagal menurunkan kadar bilirubin serum total <20mg/dL (340mmol/L), dianjurkan untuk dilakukan transfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total 20mg/dL (>340mmol/L), dianjurkan untuk dilakukan transfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total >15mg/dL (>260mmol/L) pada 25-48 jam pasca kelahiran, mengindikasikan perlunya pemeriksaan laboratorium ke arah penyakit hemolisis. Usia 49-72 jam pasca kelahiran, fototerapi dianjurkan bila kadar bilirubin serum total >15mg/dL (>260mmol/L). Fototerapi harus dilaksanakan bila kadar bilirubin serum total 18mg/dL (310mmol/L), dianjurkan untuk dilakukan transfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total >25mg/dL (>430mmol/L) pada 49-72 jam pasca kelahiran, fototerapi harus dilaksanakan bila kadar bilirubin serum total >17mg/dL

(290mmol/L). Bila fototerapi 2 x 24 jam gagal menurunkan kadar bilirubin serum total <20 untuk di lakukan transfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total sudah mencapai >20mg/dL (>340 mmol/L) dilakukan fototerapi sambil mempersiapkan tindakan transfusi tukar. Bila kadar bilirubin serum total >25mg/dL (>430mmol/L) pada usia > 72 jam pasca kelahiran, masih dianjurkan untuk pemeriksaan laboratorium ke arah penyakit hemolisis.

10. Luas permukaan fototerapi

Hal penting dalam pelaksanaan praktis dari fototerapi termasuk pengiriman energi dan memaksimalkan luas permukaan yang tersedia harus mempertimbangkan bahwa bayi harus telanjang kecuali popok dan mata harus ditutup untuk mengurangi resiko kerusakan retina. Bila menggunakan lampu sorot, pastikan bahwa bayi ditempatkan di pusat lingkaran cahaya, karena *photoenergy* tetes dari arah perimeter lingkaran. Amati bayi erat untuk memastikan bahwa bayi tidak bergerak jauh dari daerah energy tinggi. Lampu sorot mungkin lebih tepat untuk bayi prematur kecil daripada yang lebih besar jangka dekat bayi.

Secara umum penatalaksanaan hiperbilirubinemia pada bayi berat lahir rendah digambarkan grafik sebagai berikut :



Gambar 2.2

(Sumber : Lissauer dan Avroy, 2013 : 154)

11. Komplikasi Fototerapi

Komplikasi fototerapi pada bayi meliputi tinja lembek, kepanasan, dehidrasi dan sindrom bayi perunggu (perubahan kulit bayi coklat keabu-abuan dan gelap), denyut jantung dan pernapasan tidak teratur (Fajria, 2014 : 42).

12. Transfusi Tukar

Dilakukan apabila fototerapi tidak dapat mengendalikan kadar bilirubin dengan tujuan mencegah peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Transfusi tukar merupakan cara yang dilakukan dengan tindakan pengambilan darah dari donor dalam jumlah yang sama yang dilakukan berulang-ulang sampai sebagian besar darah pasien tertukar. Pemberian transfusi tukar dilakukan apabila kadar bilirubin 20mg/dL, kenaikan kadar bilirubin yang cepat yaitu 0,3-1 mg/jam, anemia berat dengan

gejala gagal jantung dan kadar hemoglobin tali pusat 14mg/dL, dan uji *coombs* direk positif.

Cara pelaksanaan transfusi tukar

- a. Dianjurkan pasien bayi berpuasa 3-4 jam sebelum transfusi tukar .
- b. Pasien disiapkan di kamar khusus.
- c. Pasang lampu pemanas dan arahkan kepada bayi. Baringkan pasien dalam keadaan telentang, buka pakaian pada daerah perut, tutup mata dengan kain tidak tembus cahaya.
- d. Lakukan transfusi tukar dengan protap.
- e. Lakukan observasi keadaan umum pasien, catat jumlah darah yang keluar dan masuk.
- f. Atur posisi setiap 6 jam.
- g. Lakukan pengawasan adanya perdarahan tali pusat.
- h. Periksa kadar hemoglobin dan bilirubin tiap 12 jam (Fajria, 2014 : 42).

Tabel 2.5
Indikasi Transfusi Tukar Berdasarkan TSB (WHO)

Usia (Hari)	BCB sehat (mg/dL)	Bayi dengan faktor resiko (mg/dL)
1	15	13
2	25	15
3	30	20
≤4	30	20

Sumber : (Usman, Ali, 2014)

Tabel 2.6
Indikasi Transfusi Tukar pada BBLR

Berat Badan (gram)	Kadar Bilirubin (mg/dL)
<1000	10-12
1000-1500	12-15
1500-2000	15-18
2000-2500	18-20

Sumber : (Usman, Ali, 2014)

Darah yang digunakan sebagai darah pengganti (donor darah) ditetapkan berdasarkan penyebab hiperbilirubinemia. Adapun darah donor yang digunakan untuk transfusi tukar :

- a) Darah yang digunakan golongan O
- b) Gunakan darah baru (usia < 7 hari), *wholee blood*.
- c) Pada penyakit hemolitik Rhesus, jika darah dipersiapkan sebelum dipersiapkan sebelum persalinan harus golongan O dengan Rhesus (-), lakukan *cross match* terhadap ibu. Jika darah dipersiapkan setelah kelahiran, caranya sama, hanya *cross match* dengan bayinya.
- d) Pada inkompatibilitas ABO, darah donor harus golongan O, Rhesus (-) atau Rhesus yang sama dengan ibu atau bayinya. *Cross match* terhadap

ibu dan bayi yang mempunyai titer rendah antibodi anti A dan anti B. Biasanya memiliki eritrosit golongan O dengan plasma AB, untuk memastikan bahwa tidak ada antibodi anti A dan anti B yang muncul.

- e) Pada penyakit hemolitik isimun yang lain, darah donor tidak boleh berisi antigen tersensitisasi dan harus di *cross match* terhadap ibu. Pada hiperbilirubinemia non imun, lakukan *typing* dan *cross match* darah donor terhadap plasma dan eritrosit pasien/bayi.
- f) Transfusi tukar memakai 2 kali volume darah (2 kali *exchange*), yaitu 160 ml/kgBB sehingga akan diperoleh darah baru pada bayi yang dilakukan transfusi tukar sekitar 87% (Usman,Ali, 2014).

13. Mencegah Ikterus Pada Bayi

Ikterus dapat dicegah sejak masa kehamilan dengan cara pengawasan yang baik dan pemeriksa kehamilan yang teratur untuk mencegah sedini mungkin terjadinya infeksi pada janin dan hipoksia, misalnya karena kesulitan jalan lahir dan lilitan tali pusat. Setelah lahir anak sebaiknya dibiasakan dijemur di bawah sinar matahari pagi sekitar jam 7-8 pagi selama 15 menit dengan membuka pakaiannya.

C. Proses Manajemen Asuhan kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah suatu proses pemecahan masalah dalam kasus kebidanan yang dilakukan secara sistematis, diawali dari pengkajian data (data subjektif dan objektif) dianalisis sehingga didapatkan diagnosa kebidanan aktual dan potensial, masalah dan kebutuhan, adanya perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Adapun 7 langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney adalah :

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar)

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien. Memilih informasi data yang tepat diperlukan analisa suatu situasi yang menyangkut manusia yang rumit karena sifat manusia yang kompleks.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara :

1) Anamnesa, meliputi :

Melakukan tanggung jawab untuk memperoleh data meliputi biodata pasien, keluhan utama waktu masuk, riwayat penyakit, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu dan sekarang dan riwayat operasi.

Pada kasus ikterus neonatorum orang tua bayi akan mengeluh kulit dan mata bayinya terlihat kuning, mungkin juga akan disertai dengan keluhan lainnya seperti perut membuncit, kemampuan menghisap bayi lemah dan tidak mau menyusui yang akan membuat produksi bilirubin makin tinggi karena kurangnya intake ASI yang dapat mempengaruhi usus untuk memproses pembuangan bilirubin dari tubuh bayi.

2) Pemeriksaan Fisik

Keadaan umum pasien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara inspeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Pada kasus ikterus neonatorum kulit dan sklera bayi terlihat kuning, perut bayi terlihat buncit atau kembung, refleks hisap bayi lemah terjadi pembesaran hati dan kadar bilirubin dalam darah akan meningkat pada bayi cukup bulan lebih dari 12 mg/dL dan pada bayi kurang bulan lebih dari 10 mg/dL.

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual)

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi atas data-data dan kebutuhan klien yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan

diagnosa dan masalah yang spesifik. Pada langkah ini bidan harus berfikir kritis agar diagnosa yang ditegakkan benar-benar tepat.

Kasus ikterus neonatorum ditetapkan berdasarkan data dasar yang dikumpulkan bahwa bayi tersebut kulit dan skleranya terlihat kuning, pembesaran pada perut dan hati dan kadar bilirubin dalam darahnya meningkat, pada bayi cukup bulan lebih dari 12 mg/dL dan pada bayi BBLR lebih dari 10 mg/dL. Menganjurkan ibu untuk tetap sabar dan berdoa untuk bayinya.

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa atau masalah potensial. Hal ini berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Pada kasus ikterus neonatorum masalah yang bisa timbul jika ikterus neonatorum ini tidak dapat diatasi dan kadar bilirubinnya semakin tinggi adalah kern ikterus yang merupakan kerusakan otak yang diakibatkan perlangketan bilirubin indirek pada otak yang dapat menyebabkan kematian. Menganjurkan orang tua untuk tetap sabar dan berkhuznudzon kepada Allah SWT.

d. Langkah IV (Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi)

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan.

Pada kasus ikterus neonatorum diperlukan adanya tindakan segera dan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk penanganan lebih lanjut seperti memantau keadaan umum dan tanda-tanda vital, memberikan intake ASI, melakukan fototerapi, dan memeriksa kadar bilirubin bayi, Menganjurkan orang tua untuk tetap ikhlas dan meminta kepada Allah agar bayinya diberi kesembuhan.

e. Langkah V (Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, dan pada langkah ini reformasi/data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi.

Pada kasus ikterus neonatorum rencana asuhan yang diberikan adalah mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, memberi intake ASI, memeriksa kadar bilirubin dengan pemeriksaan laboratorium normalnya tidak lebih dari 5 mg/dL, pada bayi dengan ikterus fisiologi dianjurkan untuk menjemur bayi pada sinar matahari pagi pada jam 07.00-08.00 selama 15 sampai 30 menit dengan menutup mata dan alat kelamin bayi serta menghindari posisi yang membuat bayi melihat langsung kearah sinar matahari dan pada kasus ikterus patologi melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi. Orang tua diminta untuk tetap sabar dan berdoa yang terbaik untuk bayinya.

f. Langkah VI (Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan)

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien, atau anggota tim kesehatan lain. Meskipun bidan tidak melakukannya sendiri tetapi bidan tetap memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya untuk meningkatkan mutu dan asuhan pada bayi dengan ikterus neonatorum, Menganjurkan orang tua untuk terus berikhtiar dan sabar dalam mendampingi bayinya.

g. Langkah VII (Evaluasi)

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang telah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah diidentifikasi masalah dalam diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang sesuai dengan masalah dan diagnosis pasien, juga benar pelaksanaannya. Selain melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang di berikan, bidan juga dapat mengevaluasi proses asuhan yang telah diberikan. Dengan harapan, hasil evaluasi proses sama dengan hasil evaluasi secara keseluruhan. Seperti pada kasus ikterus neonatorum diharapkan dapat terlaksana seperti : kebutuhan terpenuhi, kadar bilirubin menurun, kondisi umum bayi baik, refleks menghisap dan refleks gerak baik. Orang tua bayi diminta untuk tetap berdoa untuk kesembuhan bayinya.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pola pikir yang digunakan oleh bidan dalam asuhan kebidanan mengacu pada langkah Varney dan proses dokumentasi asuhan kebidanan menggunakan Subjektif, Objektif, Assesment, Planning (SOAP) dengan melampirkan catatan perkembangan.

- a. **S** (Subjektif) merupakan hasil anamnesis, baik informasi langsung dari klien ataupun keluarga pasien.
- b. **O** (Objektif) merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik secara *head to toe* dan pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium baik darah, urine, tinja, dan cairan tubuh)
- c. **A** (Assesment) merupakan penegakan diagnosa aktual maupun potensial dan menentukan kebutuhan dan merupakan hasil analisis dan interpretasi data subjektif maupun objektif dalam identifikasi diagnosa/masalah antisipasi diagnosis/masalah potensial dan perlunya tindakan segera oleh bidan atau rujukan.
- d. **P** (Planning) merupakan seluruh penatalaksanaan diagnosa kebidanan yang telah ditegakkan, sesuai dengan kebutuhan yang telah disusun (Frisca tresnawati, 2013 : 181-186).

Adapun planning yang dapat dilakukan pada bayi dengan ikterus neonatorum adalah :

Kunjungan I : Menanyakan keluhan orang tua tentang keadaan bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi tanda-tanda vital bayi, menimbang berat badan, menjaga kehangatan bayi, menjaga *personal hygiene* dan memberikan *intake* cairan dan nutrisi seperti ASI sesuai kebutuhan bayi. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk menilai kadar bilirubin bayi dan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk penanganan lebih lanjut seperti mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, memberi *intake* ASI, memeriksa kadar bilirubin dengan pemeriksaan laboratorium normalnya tidak lebih dari 5 mg/dL dan melakukan fototerapi untuk bayi dengan ikterus patologi.

Kunjungan II : Menanyakan kepada orang tua tentang keluhan terhadap keadaan bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi tanda-tanda vital bayi, menimbang berat badan, menjaga kehangatan bayi, menjaga *personal hygiene* bayi dan memberi *intake* cairan dan nutrisi pada bayi seperti ASI sesuai kebutuhan bayi. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk menilai kadar bilirubin bayi dan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk penanganan lebih lanjut.

Kunjungan III : Yang dilakukan pada kunjungan ketiga sama dengan yang dilakukan pada kunjungan kedua.

Kunjungan IV : Menanyakan kepada orang tua tentang keadaan bayinya, menilai keadaan umum, mengobservasi tanda-tanda vital bayi, menimbang berat badan bayi, menjaga kehangatan bayi, menjaga *personal hygiene* bayi dan memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua bayi.

D. Tinjauan Umum Bayi Baru Lahir Dalam Islam

1. Proses Penciptaan Manusia

Al-Qur'an, kitab suci yang sempurna telah memuat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses penciptaan manusia dengan begitu jelas, sejak dari bentuk nutfah sampai menjadi manusia sempurna.

Seperti yang telah dibahas dalam (Q.S. Al-Hajj/22 : 5)

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ
 مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ
 فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا
 أَشَدَّكُمْ^ط وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
 لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا
 عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya :

“Wahai manusia ! Jika kamu meragukan (hari) Kebangkitan maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami mengeluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan (adapula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.” (Kemenag RI, 2014 : 332).

Pada ayat ini Allah menerangkan proses kejadian manusia di dalam rahim ibunya dan kehidupan manusia setelah ia lahir sampai mati sebagai berikut:

Allah telah menciptakan manusia pertama yaitu adam a.s, adalah dari tanah. Kemudian dari Adam diciptakan istrinya Hawa, dari kedua jenis ini berkembang biak manusia dalam proses yang banyak. Dan dapat pula berarti bahwa manusia diciptakan Allah berasal dari sel mani, yaitu perkawinan sperma laki-laki dengan ovum di dalam rahim wanita. Kedua sel itu berasal dari darah, darah berasal dari makanan yang di makan manusia. Makanan manusia ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan ada yang dari binatang ternak atau hewan-hewan yang lain. Semuanya itu berasal dari tanah sekalipun telah melalui proses. Karena itu tidak salah apabila manusia dikatakan berasal dari tanah.

Pada ayat ini Allah menemukakan petunjuk tentang adanya hari kebangkitan dengan mengemukakan dua macam alasan. Pertama berhubungan dengan proses kejadian manusia dan yang kedua berhubungan dengan proses kehidupan dan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Proses kejadian manusia di dalam rahim ibunya dan kehidupan dari lahir sampai mati sebaagai berikut :

- 1) Allah telah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam as, dari tanah. Kemudian dari ada diciptakan istrinya Hawa, dan dari kedua makhluk itu berkembangbiaklah manusia melalui proses yang cukup panjang. Dapat pula berarti manusia diciptakan melalui pembuahan ovum oleh sperma di dalam rahim perempuan. Kedua sel itu berasal dari darah, darah berasal dari makanan yang dimakan oleh manusia, dan makanan manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan dan ada yang berasal dari binatang ternak atau hewan-hewan lain. Semuanya itu berasal dari tanah sekalipun telah melalui beberapa proses. Karena itu tidak salah jika dikatakan manusia bahwa manusia berasal dari tanah.
- 2) Dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia itu berasal dari *nutfah*, yang dimaksud dengan *nutfah* ialah *zygot*, yaitu *ovum* yang sudah dibuahi oleh sperma.
- 3) *Alaqah* yaitu *zygot* yang sudah menempel di rahim perempuan.
- 4) *Mudhgah*, yaitu *alaqah* yang telah terbentuk kumpulan sel-sel daging, sebesar yang dikunyah (*mudhgah* artinya mengunyah). *Mudhgah* itu ada yang tumbuh sempurna, tidak cacat dan ada pula yang tumbuh

tidak sempurna dan cacat. Kejadian sempurna dan tidak sempurna dan tidak sempurna yang menimbulkan kesempurnaan fisik manusia, cacat atau keguguran. Proses kejadian *nutfah* ini menjadi *alaqah* adalah empat puluh hari, dari *alaqah* menjadi *mudghah* juga empat puluh hari. Kemudian setelah lewat empat puluh hari itu, Allah meniupkan roh, menetapkan rezeki, amal, bahagia dan sengsara, menetapkan ajal dan sebagainya, sebagaimana tersebut dalam hadist :

Sesungguhnya penciptaan seseorang diantara kamu disatukan dalam perut ibunya selama 40 malam dalam bentuk *nutfah* kemudian menjadi *alaqah* selama itu pula menjadi *mudghah*. Kemudian Allah mengutus malaikat, lalu meniupkan roh ke dalamnya, maka (malaikat itu) diperintahkan menulis empat kalimat, yaitu menuliskan rezekinya, amalnya, ajalnya, bahagia atau sengsara (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud).

- 5) Kemudian janin itu dikandung ibunya selama waktu yang ditentukan oleh Allah. Masa kandungan normal adalah sembilan bulan sepuluh hari, sekurang-kurangnya usia kandungan adalah enam bulan, sebagaimana dipahami dari ayat bahwa lama mengandung dan menyusui itu tiga puluh bulan, sedangkan lama menyusui saja dua tahun atau dua puluh empat bulan.
- 6) Selanjutnya datanglah waktu kelahiran. Bayi dari hari ke hari tumbuh menjadi kanak-kanak.

- 7) Kanak-kanak terus tumbuh menjadi dewasa sampai kondisi sempurna, baik jasmani maupun rohani.
- 8) Diantara manusia ada yang meninggal sebelum kondisi ideal itu. Tetapi ada manusia yang baru meninggal setelah usia lanjut sampai pikun sehingga tidak dapat mengingat apa-apa lagi.

Kemudian manusia menjadi tua, bertambah lama bertambah lemah, seakan kembali ke masa anak-anak dan menjadi pikun, akhirnya iapun meninggalkan dunia yang fana ini ; ada diantara manusia yang meninggal sebelum mencapai umur dewasa, ada pula yang meninggal diwaktu dewasa, dan ada yang diberikan Allah umur lanjut sampai tua.

Proses perkembangan manusia sejak lahir, menjadi dewasa, dan menjadi tua ini dilukiskan dalam firman Allah dalam (Q.S. Ar Rum/30 : 54)

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾

Terjemahnya :

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu, menjadi kuat, kemudian dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.(Kemenag RI, 2014 : 410).

2. Pemberian ASI

Salah satu bentuk perwujudan perhatian orang tua terhadap kesehatan anak adalah dengan memperhatikan kebutuhan mereka dikala bayi, yakni dengan memberikan ASI oleh seorang ibu kepada anaknya.

Seperti yang telah dibahas dalam (Q.S. Al-Baqarah/2 : 233)

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya :

“Dan ibu – ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu meberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan..”(Kemenag RI, 2014 : 37).

Allah mewajibkan ibu untuk menyusui si anak selama dua tahun penuh. Karena dia mengetahui bahwa masa ini merupakan waktu yang

paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak. “*yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*” Pembahasan tentang kesehatan dan jiwa sekarang telah menetapkan bahwa masa dua tahun itu merupakan kebutuhan yang vital bagi pertumbuhan anak, baik mengenai kesehatan ataupun mentalnya (Quthb, Sayyid, 2008 : 302).

ASI menumbuhkan tulang dan daging, Ibnu Mas’ud rodhiyallohu anhu berkata :

لَارْضَاعًا إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعِظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

Terjemahnya: :
 “Tidaklah dikatakan penyusuan kecuali apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging” (HR. Abu Dawud no. 2059, dishohihkan al-Albani. Yakni secara mauquf dengan syaeahid-nya pada riwayat Ahmad, ad-Daruquthni dan al-Baihaqi).

Muhammad Rasyid Ridho menjelaskan permulaan ayat 233 surah al-Baqarah tersebut memberi pengertian bahwa masa menyusui yang sempurna adalah dua tahun, ditinjau dari aspek pemeliharaan anak yang ketika itu masih lemah kondisinya dan berdasarkan prinsip bahwa air susu ibu merupakan makanan yang paling sesuai bagi setiap bayi dalam masa ini. Sayyid Quthb menambahkan, bahwa perintah menyusui selama dua tahun penuh, merupakan waktu yang ideal, baik ditinjau dari kesehatan fisik, jiwa, dan mental spiritual anak. Sebagai timbal balik dari

melaksanakan kewajiban menyusui bagi ibu terhadap anaknya, maka ayah berkewajiban memberi nafkah (makan dan minum), dan pakaian kepada ibu secara patut dan baik, sehingga ibu dapat menyusui anaknya secara optimal, dan kesehatan diri ibu tetap terjaga. Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang baik (Quthb, Sayyid, 2008 : 302).

Allah memerintahkan kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Sebab pada masa ini anak-anak masih membutuhkan air susu ibu. Seorang ibu ketika menyusui anaknya, ia tidak sekedar menyusui, melainkan dengan penuh perasaan dan kelembutan, kasih sayang dan belaian. Menyusui bayi dapat memperkuat hubungan yang akrab dan erat antar ibu dan anak. Selain ASI yang dapat menjadi salah satu penanganan pada bayi ikterus, dapat juga dilakukan dengan sinar matahari. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا

تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

Terjemahnya :

“ Kerjakan shalat subuh kemudian tinggalkan shalat hingga matahari terbit, sampai matahari meninggi. Ketika matahari terbit, ia terbit diantara dua tanduk setan, saat itu orang-orang kafir sedang bersujud”. (HR. Muslim no. 832).

Selain banyaknya manfaat shalat dhuha dan waktu yang ditetapkan untuk shalat dhuha dengan salah satu penanganan bayi ikterus dengan terapi sinar

matahari yang memiliki kaitan karena waktu yang telah ditetapkan untuk shalat dhuha sama seperti waktu yang tepat untuk pemberian sinar matahari pada bayi yang memiliki banyak manfaat pada bayi salah satunya sebagai salah satu penanganan untuk bayi ikterus.

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR DENGAN IKTERUS PATOLOGI DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TANGGAL 08 JULI – 23 JULI 2018

No.Register : 50xxxx
Tanggal MRS : 07 Juli 2018 Pukul : 13.00 WITA
Tanggal Lahir : 29 Juni 2018 Pukul : 13.37 WITA
Tanggal Pengkajian : 08 Juli 2018 Pukul : 11.30 WITA
Nama Pengkaji : Nada Nova Wanda

A. Langkah I (Identifikasi data dasar)

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "S"
Tanggal Lahir : 29 Juni 2018
Umur : 10 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak ke : Pertama

b. Orang Tua

Nama : Ny. "S" / Tn. "Z"
Umur : 20 tahun / 20 tahun
81
Nikah/ Lamanya : 1 x / ±1 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : BTN Taman Tirta

2. Keluhan Utama

- a. Ibu pasien mengatakan kekhawatiran dengan kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 07 Juli 2018
- b. Ibu pasien mengatakan bahwa bayinya malas menyusui sejak tanggal 06 Juli 2018

3. Riwayat Obstetri

- a. Ibu pasien mengatakan ini merupakan anaknya yang pertama dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya.
- b. Ibu pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 11 Oktober 2017.
- c. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah sakit dan menderita penyakit apapun.
- d. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah mengkonsumsi obat apapun kecuali tablet penambah darah dari bidan.

4. Riwayat Persalinan

- a. Ibu pasien mengatakan melahirkan bayinya pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 13:37 WITA, di RSUD Syekh Yusuf Gowa, ditolong oleh dokter, secara operasi sesar, bayi lahir tunggal, berat badan lahir 3.100 gram dan panjang badan 50 cm, keadaan bayi baru lahir segera menangis dan warna kulit bayi kemerahan.

5. Riwayat Kesehatan Keluarga

- a. Ibu pasien mengatakan dalam keluarga tidak ada penyakit menurun seperti DM, Hipertensi dan tidak ada penyakit menular seperti TBC, Hepatitis dan riwayat PMS.
- b. Ibu pasien mengatakan dirinya sebelumnya tidak pernah mengalami penyakit kuning.

6. Riwayat Kesehatan Pasien di Rumah Sakit

Perawat perinatology di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengatakan KU bayi lemah, reflek menghisap lemah, kulit bayi berwarna kuning, bayi dirawat di *infant warmer*.

7. Pola Kebiasaan Pasien

a. Pola Nutrisi

Jenis nutrisi yang diberikan adalah ASI dan susu formula sebanyak 40 cc setiap 3 jam sekali secara oral dengan cara disendoki.

b. Pola Eliminasi

Pasien BAK rata-rata 5–7 kali dalam sehari, warna jernih dan BAB 4-5 kali sehari, warna kuning dempul.

c. Pola Aktifitas

Gerakan pasien cukup aktif

d. Pola Kebersihan Diri

Pasien diwashlap sebanyak 1 kali sehari tiap pagi hari.

e. Pola Istirahat

Pasien tidur dalam sehari rata-rata ± 19 jam yaitu tidur malam ± 10 jam dan tidur siang ± 9 jam.

8. Riwayat Psikologis, Sosial dan Ekonomi Orang Tua

a. Ekspresi wajah ibu dan keluarga nampak cemas.

b. Ibu menggunakan KIS untuk membayar biaya perawatan.

9. Data Spiritual Orang Tua

- a. Ibu dan keluarga berdoa kepada Allah SWT agar bayinya selamat.
- b. Ibu dan keluarga rajin mengerjakan shalat 5 waktu.

10. Pemeriksaan

- a. KU bayi lemah.
- b. Kesadaran komposmentis.
- c. Gestasi 37 minggu 2 hari
- d. Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 120x/i

Pernapasan : 46x/i

Suhu : 36,8°C

- e. Pemeriksaan *Head to Toe*

Kepala : Rambut tipis, berwarna hitam dan tidak ada *caput succedaneum*.

Wajah : Tidak ada oedema.

Mata : Konjungtiva merah muda, sklera ikterik.

Hidung : Tidak ada sekret.

Mulut : Bibir kering, tidak ada kelainana.

Telinga : Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen.

Leher : Tidak ada benjolan .

Dada : Pernapasan sesuai gearakan dada.

Abdomen	: Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi.
Genetalia	: Testis sudah turun semua, terdapat lubang pada penis
Anus	: Terdapat lubang pada anus.
Ekstremitas	: Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan, terpasang infus dextrosa 10% 15 TPM pada tangan sebelah kiri.
Kulit	: Nampak kuning.
f. Refleks	
Refleks <i>moro</i>	: Kuat, apabila dikagetkan lengan kaki terangkat.
Refleks <i>grasping</i>	: Kuat, apabila benda diletakkan di telapak kaki bayi secara spontan bayi akan menggenggam.
Refleks <i>suckhing</i>	: Lemah, pada saat diberi susu tidak dapat menghisap secara aktif.
Refleks <i>rooting</i>	: Lemah, apabila menyentuh pipi bayi akan menoleh sentuhan.
Refleks <i>swallowing</i>	: Lemah, bayi tidak dapat menelan

secara aktif.

g. Pengukuran Antropometri

BBS : 2.900 gram

PBL : 50 cm

LK : 34 cm

LD : 36 cm

LP : 35 cm

LILA : 11 cm

h. Eliminasi

Urin : Sehari BAK 8-10 kali

Mekonium : Sehari 4-6 kali, warna kuning
dempul, konsistensi lembek.

i. Pemeriksaan Penunjang

Tanggal 08 Juli 2018

Bilirubin direk : Reagen di LAB tidak tersedia.

Bilirubin indirek : Reagen di LAB tidak tersedia.

Bilirubin total : 14 mg/dl (normalnya tidak lebih
dari 5 mg/dl).

B. Langkah II (Identifikasi diagnosa atau masalah aktual)

1. Diagnosa aktual : Bayi "S", Bayi cukup bulan (BCB), sesuai masa kehamilan (SMK), dengan ikterus patologi.

a. BCB, SMK

Data dasar

Data subjeektif:

- 1) Ibu mengatakan HPHT tanggal 11 Oktober 2017.
- 2) Ibu mengatakan di operasi tanggal 29 Juni 2018.

Data objektif :

- 1) BBL : 3.100 gram
- 2) PBL : 50 cm

Analisa dan interpretasi data :

- 1) Bayi cukup bulan adalah bayi yang dilahirkan dengan usia gestasi 37-42 minggu (Sarwono, 2014 : 414). Dari hasil pengkajian pada kasus bayi “S” hari pertama haid terakhir ibu pada tanggal 11 Oktober 2017 sampai bayi lahir tanggal 2018 berarti bayi lahir pada usia kehamilan 37 minggu 2 hari sehingga bayi termasuk dalam Bayi Cukup Bulan (BCB).
- 2) Bayi lahir sesuai dengan masa kehamilan adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir 2.500-4.000 gram dengan usia gestasi 37-42 minggu (Sarwono, 2014 : 414). Dari hasil pengkajian pada kasus bayi “S” lahir pada usia kehamilan 37 minggu 2 hari dengan berat badan lahir 3.100 gram. Berdasarkan kurva pertumbuhan berat badan bayi “S” dengan

usia kehamilan 37 minggu 2 hari sudah Sesuai Masa Kehamilan (SMK).

b. Ikterus Patologi

Data dasar

Data subjektif :

- 1) Ibu pasien mengatakan kulit bayinya terlihat kuning.
- 2) Refleks menghisap dan menelan lemah
- 3) Hasil pemeriksaan LAB pada tanggal 07 Juli 2018

Bilirubin direk : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin indirek : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 14 mg.

Analisa dan interpretasi data :

Ikterus patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut hiperbilirubinemia (Marmi dan Rahardjo, 2012 : 277).

Adapun tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia adalah : kulit kuning, sklera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg% pada neonates yang cukup bulan dan 12,5 mg% pada neonatus yang kurang bulan, kehilangan berat badan sampai 5% selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit, feses yang berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejang, epistotonus, terjadi

pembesaran hati, tidak mau minum, letargi, refleks hisap dan menelan lemah (Maryunani, 2014 : 104).

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi “S” didapatkan kulit bayi nampak kuning, bayi malas minum yang ditandai dengan refleks menghisap dan menelan bayi lemah dan kadar bilirubin total bayi 14 gr/dl artinya bayi tersebut mengalami hiperbilirubinemia.

2. Masalah aktual : gangguan pemenuhan nutrisi

Data dasar

Data subjektif :

Ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusu sejak tanggal 06 Juli 2018.

Data objektif :

Refleks hisap dan menelan bayi lemah.

Analisa dan interpretasi data :

Masalah yang sering dijumpai pada bayi dengan hiperbilirubinemia adalah bayi tidak mau minum ASI, refleks hisap dan menelan lemah. Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi “S” bayi malas minum refleks hisap dan menelannya lemah.

C. Langkah III (Identifikasi diagnosa atau masalah potensial)

1. Diagnosa potensial : Kern ikterus

Data subjektif :

- a. Ibu pasien mengatakan kulit bayinnya terlihat kuning
- b. Ibu pasien mengatakan bayinya malas minum

Data objektif :

- a. Kulit bayi terlihat kuning
- b. Refleks menghisap dan menelan lemah
- c. Hasil pemeriksaan LAB pada tanggal 07 Juli 2018

Bilirubin direk : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin indirek : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 14 mg/dl.

Analisa dan interpretasi data :

Apabila bayi dengan hiperbilirubinemia tidak ditangani dengan baik dan kadar bilirubinnya semakin tinggi maka akan menimbulkan komplikasi yang membahayakan karena bilirubin dapat menumpuk di otak yang disebut dengan kern ikterus.

D. Langkah IV (Perlunya tindakan segera atau kolaborasi)

Kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk fototerapi dan pemberian obat-obatan.

E. Langkah V (Merencanakan asuhan yang menyeluruh)

Diagnosa aktual : Bayi "S", BCB, SMK, dengan ikterus patologi

Masalah aktual : Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi

Tujuan : Ikterus patologi dan masalah gangguan pemenuhan nutrisi bayi teratasi.

Kriteria :

1. KU bayi baik
2. Tanda-tanda vital dalam batas normal :

Frekuensi jantung : 120-160x/i

Pernapasan : 40-60x/i

Suhu : 36,5-37,5°C

3. Refleks hisap dan menelan kuat
4. Kulit bayi tidak kuning

Intervensi tanggal 08 Juli 2018, pukul : 11.30 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi
Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi
2. Observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam
Rasional : untuk memantau keadaan pasien dan mencegah terjadinya komplikasi.
3. Berikan intake ASI sesering mungkin dan susu formula 40 cc tiap 3 jam
Rasional : Untuk menurunkan kadar bilirubin dengan memberikan cukup ASI atau susu formula ($400/10 = 40$) karena bilirubin dapat pecah jika bayi banyak mengeluarkan feses dan urin.
4. Jaga kehangatan bayi
Rasional : Untuk mempertahankan suhu bayi.

5. Lakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter.

Ampicillin 135mg/ 12 jam/ IV

Gentamicin 13mg/ 24 jam/ IV

Rasional : Sebagai antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi pada Bayi.

6. Lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melakukan tindakan fototerapi

Rasional : Untuk menurunkan kadar bilirubin dengan mengubah bilirubin menjadi bentuk larut dalam air untuk disekresikan melalui empedu atau urin.

7. Berikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "S" tentang kondisi bayi "S" saat ini.

Rasioanal : Untuk meningkatkan pemahaman, menurunkan rasa agar keluarga mengetahui kondisi bayi "S" saat ini.

8. Lakukan *informat consent* atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi.

Rasional : Sebagai bukti tertulis keluarga menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan.

9. Lakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi Selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Rasional : untuk menurunkan kadar bilirubin dan mengubah bilirubin menjadi bentuk larut dalam air untuk disekresikan melalui empedu atau urin.

F. Langkah VI (Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan)

Tanggal 08 Juli 2018, pukul : 11.30 WITA

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

Hasil : terlaksana, tangan telah dicuci.

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi lemah

Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 124x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 36,8 °C

3. Memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam

Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake ASI 40 cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki.

4. Menjaga kehangatan bayi

Hasil : Terlaksana, mengganti popok dan baju bayi jika basah.

5. Melakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter

Ampicilin 135mg/ 12 jam/ IV

Gentamicin 13mg/ 24 jam/ IV

Hasil : Telah diberikan secara IV

6. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak

Hasil : Terlaksana, dokter spesialis anak menginstruksikan untuk melakukan tindakan fototerapi.

7. Memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi “S” tentang kondisi bayi “S” saat ini.

Hasil : Terlaksana, ibu pasien mengerti

8. Melakukan *informed consent* atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi.

Hasil : Terlaksana, pihak keluarga menyetujui untuk tindakan fototerapi.

9. Melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Hasil : Terlaksana, pasien telah diletakkan tanpa mengenakan pakaian di bawah sinar fototerapi, tutup mata dan alat kelamin bayi dengan menggunakan kain kasa.

G. Langkah VII (Evaluasi)

Tanggal 08 Juli 2018, pukul : 16.30 WITA

1. KU bayi sedang

2. Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 126x/i

Pernapasan : 48x/i

Suhu : 36,9°C

3. Kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi ditandai dengan bayi minum ASI 40cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki.
4. Popok dan baju bayi sudah di ganti

5. Telah diberikan injeksi ampisilin atas instruksi dokter 135mg/ 12 jam/ IV dan injeksi gentamicin 13mg/ 24 jam/ IV
6. Tindakan fototerapi masih dilakukan.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI
PATOLOGI PADA BY. "S" DENGAN IKTERUS PATOLOGI**

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 08 JULI 2018

No. Register : 50xxxx

Tanggal MRS : 07 Juli 2018 Pukul : 13.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 08 Juli 2018 Pukul : 11.30 WITA

Nama Pengkaji : Nada Nova Wanda

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : Bayi "S"

Tanggal Lahir : 29 Juni 2018

Umur : 10 hari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak Ke : Pertama

b. Orang Tua

Nama : Ny. "S"/Tn. "Z"

Umur : 20 tahun/ 20 tahun

Nikah/Lamanya : 1x/ ± 1 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : BTN Taman Tirta

Data Subjektif (S)

1. Ibu pasien mengatakan kekhawatiran dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 07 Juli 2018
2. Ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusu sejak tanggal 06 Juli 2018
3. Ibu pasien mengatakan memberikan bayinya ASI dan dibantu susu formula sesering mungkin
4. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien merupakan anaknya yang pertama dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya.
5. Ibu pasien mengatakan melahirkan bayinya yang pertama pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 13.37 WITA, di RSUD Syekh Yusuf

Gowa, ditolong oleh dokter, secara operasi sesar, bayi lahir tunggal, keadaan bayi baru lahir menangis dan kulit bayi kemerahan.

6. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah sakit dan tidak menderita penyakit apapun.
7. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak mengkonsumsi obat apapun selain yang diberikan bidan.
8. Ibu pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 11 Oktober 2018
9. Ibu pasien mengatakan dalam keluarga tidak ada penyakit menurun dan tidak ada riwayat PMS.
10. Perawat perinatologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengatakan KU bayi lemah, refleks menghisap kurang kuat, kulit bayi berwarna kuning, bayi dirawat di *infant warmer*.
11. Ibu pasien mengatakan menggunakan KIS untuk biaya perawatan.
12. Ibu pasien berdoa kepada Allah SWT agar bayinya selamat.

Data Objektif (O)

1. KU bayi lemah
2. Kesadaran composmentis
3. Gestasi 37 minggu 2 hari
4. Tanda-tanda vital :
 - Frekuensi jantung: 128x/i
 - Pernapasan : 46x/i
 - Suhu : 36,6 °C

5. Pemeriksaan *head to toe*

Kepala : Rambut tipis berwarna hitam dan tidak ada *caput*

Sucsadenum

Wajah : Tidak ada oedema

Mata : Kunjungtiva merah muda, sklera

ikterik.

Hidung : Tidak ada polip dan sekret

Mulut : Bibir kering, tidak ada kelainan

Telinga : Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen

Leher : Tidak ada benjolan.

Dada : Pernapasan sesuai gerakan dada.

Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Genetalia : Testis sudah turun semua, terdapat lubang pada penis

Anus : Terdapat lubang pada anus.

Ekstremitas atas : Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan, terpasang infus dextrosa 10 % 15 TPM pada tangan sebelah kanan.

Ekstremitas bawah: Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan.

Kulit : Nampak kuning.

6. Refleks

Refleks *moro* : Kuat, apabila dikagetkan lengan kaki

terangkat.

Refleks *grasping* : Kuat, apabila benda diletakkan di telapak kaki bayi secara spontan bayi akan menggenggam.

Refleks *suckhing* : Lemah, pada saat diberi susu tidak dapat menghisap secara aktif.

Refleks *rooting* : Lemah, apabila menyentuh pipi bayi akan menoleh sentuhan.

Refleks *swallowin*: Lemah, bayi tidak dapat menelan secara aktif.

7. Pengukuran Antropometri

BBS : 2.900 gram

PBS : 50 cm

LK : 34 cm

LD : 36 cm

LP : 35 cm

LILA : 11 cm

8. Eliminasi

Urin : Sehari BAK 8-10 kali.

Mekonium : Sehari 4-6 kali, warna kuning dempul, konsistensi lembek.

9. Pemeriksaan Penunjang

Tanggal 07 Juli 2018

Bilirubin direk : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin indirek : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 14 mg/dl.

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Bayi "S", BCB,SMK, dengan ikterus
Patologi.

Masalah aktual : Gangguan kebutuhan pemenuhan nutrisi

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya kern ikterus

Lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi dan pemberian obat-obatan.

Planning (P)

Tanggal 08 Juli 2018, pukul : 14.30 WITA

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

Hasil : terlaksana, tangan telah dicuci.

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi lemah

Tanda-tanda vital :

Frekuensi jantung : 120x/i

Pernapasan : 46x/i

Suhu : 36,8 °C

3. Memberikan intake ASI sesering mungkin atau susu formula tiap 3 jam
Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake ASI
4. Menjaga kehangatan bayi
Hasil :Pakaian bayi tetap terpasang saat tidak di fototerapi dan popok bayi telah diganti.
5. Melakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter
Ampicilin 135mg/ 12 jam/ IV
Gentamicin 13mg/ 24 jam/ IV
Hasil : Telah diberikan secara IV
6. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak
Hasil : Terlaksana, dokter spesialis anak menginstruksikan untuk melakukan tindakan fototerapi.
7. Memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "S" tentang kondisi bayi "S" saat ini.
Hasil : Terlaksana, ibu pasien mengerti
8. Melakukan *informed consent* atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi.
Hasil : Terlaksana, pihak keluarga menyetujui untuk tindakan fototerapi.
9. Melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Hasil : Terlaksana, pasien telah diletakkan tanpa mengenakan pakaian di bawah sinar fototerapi, tutup mata dan alat kelamin bayi dengan menggunakan kain kasa.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI
PATOLOGI PADA BY. "S" DENGAN IKTERUS PATOLOGI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 09 JULI 2018**

No. Register : 50xxxx

Tanggal MRS : 07 Juli 2018

Pukul : 13.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 09 Juli 2018

Pukul : 15.15 WITA

Nama Pengkaji : Nada Nova Wanda

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "S"

Tanggal Lahir : 29 Juni 2018

Umur : 11 hari
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Anak ke : Pertama

b. Orang Tua

Nama : Ny. "S"/Tn. "Z"
 Umur : 20 tahun/20 tahun
 Nikah/Lamanya : 1x/± 1tahun
 Suku : Makassar/Makassar
 Agama : Islam/Islam
 Pendidikan : SMA/SMA
 Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
 Alamat : BTN Taman tirta

Data Subjektif (S)

1. Perawat perinatologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengatakan KU bayi sedang, kulit dan sklera bayi masih kuning.
2. Perawat perinatologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengatakan bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek dan warna kuning dempul dan BAK berwarna kuning jernih.

Data Objektif (O)

1. KU bayi sedang
2. Tanda-tanda vital :
 Frekuensi Jantung : 122x/i
 Pernapasan : 48x/i

- Suhu : 36,8 °C
3. BBS : 2.900 gram
4. Pemeriksaan fisik terfokus
- Kepala : Rambut tipis, berwarna hitam dan tidak ada benjolan
- Mata : Konjungtiva merah muda, sklera nampak kuning.
- Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada.
- Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi.
- Ekstremitas atas : Terpasang infus dextrosa 10%, 15 TPM pada tangan sebelah kanan.
- Kulit : Nampak Kuning.
5. Refleks
- Refleks *suckhing* : Mulai kuat
- Refleks *rooting* : Mulai kuat
- Refleks *swallowing* : Mulai kuat
6. Eliminasi
- BAB (+) warna kuning dempul, konsistensi lembek.
- BAK (+) warna kuning jernih.

Assesment (A)

- Diagnosa aktual : Bayi Ny. "S" dengan ikterus patologi
- Diagnosa potensial : Potensi terjadinya kern Ikterus

Planning (P)

Tanggal 09 Juli 2018, pukul : 18.15 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi sedang

Tanda-tanda vital :

Frekuensi Jantung : 120x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 36,8 °C

3. Memberikan intake ASI sesering mungkin atau susu formula tiap 3 jam

Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake ASI

4. Menjaga kehangatan bayi

Hasil : Terlaksana, pakaian dan popok bayi telah diganti

5. Melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Hasil : Bayi di fototerapi dengan tidak memakai baju, mata dan alat kelamin di tutupi kain kasa.

6. Mengobservasi BAB dan BAK bayi

Hasil : Bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek dan berwarna kuning dempul dan BAK berwarna jernih.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI
PATOLOGI PADA BY. "S" DENGAN IKTERUS PATOLOGI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 12 JULI 2018**

No. Register : 50xxxx

Tanggal MRS : 07 Juli 2018 Pukul : 13.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 12 Juli 2018 Pukul : 15.00 WITA

Nama Pengkaji : Nada Nova Wanda

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "S"

Tanggal Lahir : 29 Juni 2018

Umur : 14 hari
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Anak ke : Pertama

b. Orang Tua

Nama : Ny. "S"/Tn. "Z"
 Umur : 20 tahun/20 tahun
 Nikah/Lamanya : 1x/±1 tahun
 Suku : Makassar/Makassar
 Agama : Islam/Islam
 Pendidikan : SMA/SMA
 Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
 Alamat : BTN Taman tirta

Data Subjektif (S)

1. Perawat Perinatologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengatakan KU bayi sedang, bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek dan BAK berwarna kuning jernih.
2. Perawat Perinatologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengatakan kadar bilirubin bayi "S" sudah turun berdasarkan pemeriksaan LAB pada tanggal 12 Juli 2018 yaitu kadar bilirubin total 5,8 mg/dl.

Data Objektif (O)

1. KU bayi sedang
2. Tanda-tanda vital :
 Frekuensi Jantung : 126x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 36,6 °C

3. BBS : 2.910 gram

4. Pemeriksaan fisik terfokus

Kepala : Rambut tipis, berwarna hitam dan tidak ada benjolan

Mata : Konjungtiva merah muda, sklera mulai memutih

Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada

Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi

Ektremitas atas : Terpasang infus dextrosa 10%, 15 TPM pada tangan sebelah kanan

Kulit : Sudah mulai kemerahan

5. Refleksi

Refleksi *suckhing* : Kuat

Refleksi *rooting* : Kuat

Refleksi *swallowing* : Kuat

6. Eliminasi

BAB (+) warna kuning dempul, konsistensi lembek

BAK (+) warna kuning jernih

7. Pemeriksaan LAB

Pada tanggal 12 Juli 2018

Bilirubin total : 5,8 mg/dl

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Bayi Ny. "S: dengan ikterus patologi

Diagnosa potensial : Potensial terjadinya kern ikterus

Planning (P)

Tanggal 12 Juli 2018, pukul : 18.00 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi dan TTV tiap 3 jam

Hasil : KU bayi sedang

Tanda-tanda vital :

Frekuensi Jantung : 130x/i

Pernapasan : 46x/i

Suhu : 36,6°C

3. Memberikan intake ASI sesering mungkin atau susu formula tiap 3 jam

Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake susu formula 40 cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki

4. Menjaga kehangatan bayi

Hasil : Pakaian bayi tetap terpasang saat tidak di fototerapi dan popok bayi telah diganti.

5. Melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Hasil : Bayi di fototerapi tanpa menggunakan pakaian, mata dan alat kelamin ditutup dengan kain kasa.

6. Mengobservasi BAB dan BAK bayi

Hasil : Bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek dan berwarna kuning dempul dan BAK berwarna kuning jernih.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI
PATOLOGI PADA BY. “S” DENGAN IKTERUS PATOLOGI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 16 JULI 2018**

No. Register : 50xxxx

Tanggal MRS : 07 Juli 2018 Pukul : 13.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 16 Juli 2018 Pukul : 11.00 WITA

Nama Pengkaji : Nada Nova Wanda

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. “S”

Tanggal Lahir : 29 Juni 2018

Umur : 18 hari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak ke : Pertama

b. Orang Tua

Nama : Ny. "S"/Tn. "Z"

Umur : 20 tahun/20 tahun

Nikah/Lamanya : 1x/±1 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : BTN Taman tirta

Data Subjektif (S)

- 1) Perawat perinatologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengatakan KU bayi sudah baik, kadar bilirubinnya sudah normal, kulitnya sudah tidak kuning dan infusnya sudah dilepas.
- 2) Perawat perinatologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa mengatakan bayinya sudah di washlap dan ditimbang dengan BBS 2.920 gram.

Data Objektif (O)

- 1) KU bayi baik
- 2) Tanda-tanda vital :
Frekuensi Jantung : 130x/i

- Pernapasan : 44x/i
- Suhu : 36,8 °C
- 3) BBS : 2.920 gram
- 4) Pemeriksaan fisik terfokus
- Kepala : Rambut tipis, berwarna hitam dan tidak ada benjolan
- Mata : Konjungtiva merah muda, sklera nampak putih
- Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada
- Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi
- Ekstremitas atas: Tidak ada kelainan, infus sudah dilepas
- Kulit : Nampak kemerahan
- 5) Refleks
- Refleks *suckhing* : Kuat
- Refleks *rooting* : Kuat
- Refleks *swallowing* : Kuat
- 6) Eliminasi
- BAB (+) warna kuning dempul, konsistensi lembek
- BAK (+) warna kuning jernih
- 7) Pemeriksaan LAB
- Tanggal 16 Juli 2018
- Bilirubin total : 1,25 mg/dl

Assesment (A)

Bayi Ny. "S" dengan keadaan normal

Planning (P)

Tanggal 16 Juli 2018, pukul : 14.00 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

2. Mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital

Hasil : KU bayi baik

Tanda-tanda vital :

Frekuensi Jantung : 128x/i

Pernapasan : 48x/i

Suhu : 36,8°C

3. Mendampingi visite dokter spesialis anak

Hasil : Terlaksana, bayi telah diperbolehkan pulang

4. Memberitahu orang tua bayi bahwa hari ini bayinya sudah diperbolehkan pulang

Hasil : Terlaksana, orang tua bayi nampak senang dengan informasi yang disampaikan tentang kondisi bayinya

5. Memberikan *Health Education* pada orang tua bayi mengenai :

- a. Pemberian ASI

- b. Pencegahan Ikterus

- c. Pencegahan hipotermi

- d. Tanda-tanda bayi sakit

- e. *Personal hygiene*

f. Imunisasi

Hasil : Ibu mengerti, dan bersedia mengikuti saran yang diberikan

KUNJUNGAN DI RUMAH NY. "S"**TANGGAL 24 JULI 2018**

Tanggal Lahir : 29 Juni 2018 Pukul : 13.37 WITA

Tanggal Pengkajian : 24 Juli 2018 Pukul : 16.30 WITA

Nama Pengkaji : Nada Nova Wanda

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By. "S"

Tanggal Lahir : 29 Juni 2018

Umur : 26 hari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak ke : Pertama

b. Orang Tua

Nama : Ny. "S"/Tn. "Z"

Umur : 20 tahun/20 tahun

Nikah/Lamanya : 1x/±1 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : BTN Taman tirta

Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan senang karena bayinya sudah sehat
- 2) Ibu mengatakan warna kuning pada kulit dan mata bayi sudah tidak muncul lagi
- 3) Ibu mengatakan bayinya sudah sering minum susu

Data Objektif (O)

- 1) KU bayi baik
- 2) Tanda-tanda vital :

Frekuensi Jantung : 132x/i

Pernapasan : 46x/i

Suhu : 36,8 °C

- 3) Pemeriksaan fisik terfokus

Kepala : Rambut tipis, berwarna hitam dan tidak ada

benjolan

Mata : Konjungtiva merah muda, sklera nampak putih

Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada

Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi

Ekstremitas atas : Tidak ada kelainan, infus sudah dilepas

Kulit : Nampak kemerahan

4) Refleks

Refleks *suckhing* : Kuat

Refleks *rooting* : Kuat

Refleks *swallowing* : Kuat

5) Eliminasi

BAB (+) warna kuning, konsistensi lembek

BAK (+) warna kuning jernih

Assesment (A)

Bayi Ny. "S" dengan keadaan normal

Planning (P)

Tanggal 24 Juli 2018, pukul : 16.30 WITA

1) Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci

a) Menimbang bayi

Hasil : Terlaksana, BB sekarang 2.940 gram

b) Menganjurkan kepada ibu untuk tetap memberikan ASI sesering mungkin kepada bayinya

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

c) Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga kehangatan bayi dengan mengganti baju dan popok bayi apabila telah basah, selalu memberikan alas pada tempat tidur bayi dan jauhkan bayi dari kipas angin.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

d) Memberitahu ibu tanda-tanda bahaya pada bayi seperti :

1. Pernapasan sulit atau $>60x/i$
2. Suhu bayi $> 37,5^{\circ}\text{C}$ atau $<36,5^{\circ}\text{C}$
3. Kulit bayi berwarna kuning
4. Bayi tidak mau menyusu
5. Kejang
6. Tidak BAK selama 24 jam dan tidak BAB selama 3 hari

Hasil : Ibu mengerti.

e) Menganjurkan kepada ibu untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan terdekat apabila bayi mengalami salah satu tanda bahaya pada bayi.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

- f) Menganjurkan ibu untuk datang membawa bayinya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi saat bayi berusia 1 bulan.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang asuhan kebidanan pada bayi “S” dengan hiperbilirubinemia di RSUD Syekh Yusuf Gowa menggunakan manajemen asuhan kebidanan menurut Varney yang terdiri dari 7 langkah yaitu, pengumpulan data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah aktual, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, perlunya tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan asuhan yang menyeluruh, melaksanakan perencanaan dan evaluasi. Adapun penatalaksanaannya sebagai berikut :

1. Langkah I (Pengumpulan data dasar)

Pada langkah ini kita menghimpun informasi tentang klien atau orang yang meminta dan memilih informasi yang tepat diperlukan analisa yang meliputi anemia, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi "S" dengan ikterus patologi melalui anamnesa didapatkan ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 07 Juli 2018, ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 06 Juli 2018, ibu pasien mengatakan bayinya cukup bulan dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, Berat badan lahir 3.100 gram, berat badan saat pengkajian 2.900 gram, kulit dan sklera bayi terlihat kuning, refleks menghisap dan menelan lemah, dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB pada tanggal 07 Juli 2018 didapatkan hasil bilirubin total 14 mg/dl. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Pada tahap pengkajian dengan teori ikterus patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut dengan hiperbilirubinemia (Marmi dan Rahardjo, 2012 : 27). Hiperbilirubinemia adalah istilah yang dipakai untuk ikterus neonatorum setelah ada hasil laboratorium yang menunjukkan peningkatan kadar bilirubin 10 mg/dl pada bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5 mg/dl pada bayi cukup bulan. Hiperbilirubinemia merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang

menimbulkan kern ikterus yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbelakangan mental.

Adapun tanda-tanda ikterus patologi diantaranya ikterus timbul dalam 24 jam pertama kehidupan, serum bilirubin total lebih dari 12mg/dl, peningkatan bilirubin 5mg/dl atau lebih dari 24 jam, konsentrasi bilirubin serum melebihi 10mg/dl pada bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5mg/dl pada bayi cukup bulan, ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompatibilitas darah, defisiensi enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD) dan sepsis, ikterus yang disebabkan oleh bayi berat kurang dari 2.000 gram yang disebabkan karena usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun dan kehamilan pada remaja, masa gestasi kurang dari 36 minggu, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, infeksi, hipoglikemia, hiperkopia, dan hiperosmolitas darah dan sepsis (Maulidia, 2014 :40).

Etiologi ikterus pada BBL dapat berdiri sendiri ataupun disebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Produksi yang berlebihan, lebih dari kemampuan bayi untuk mengeluarkannya, misalnya pada hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, ABO, defisiensi enzim G6PD, *pyruvate kinase*, perdarahan tertutup, dan sepsis.
- b. Gangguan dalam proses *uptake* dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia dan infeksi

atau tidak terdapatnya enzim *glucoronil transferase* (*criggler najjar syndrome*). Penyebab lain adalah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam *uptake* bilirubin ke sel-sel hepar.

- c. Gangguan dalam transportasi. Bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut ke hepar. Ikatan bilirubin dalam albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obat, misalnya : *salisilat*, dan *sulfaforazole*. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak.
- d. Gangguan dalam eksresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau di luar hepar. Kelainan di luar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar.
- e. Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat mengakibatkan hiperbilirubinemia *unconjugated* akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterohepatik.
- f. Ikterus akibat kurangnya Air Susu Ibu (ASI). Ikterus akibat ASI merupakan *unconjugated* hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Hal ini untuk membedakan ikterus pada bayi yang disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagian bahan yang terkandung dalam ASI (*beta glucoronidase*) akan memecah bilirubin menjadibentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningskat, dan kemudian akan direabsorpsi oleh usus. Bayi yang mendapat ASI bila

dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang tinggi berkaitan dengan penurunan asupan pada beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya yaitu bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberiannya (Marmi dan Rahardjo, 2014 : 278-279). Dampak yang terjadi apabila bayi tidak diberi ASI adalah bayi tidak memperoleh kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan bergizi tinggi serta berkualitas, sehingga bayi mudah mengalami sakit yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan terhambat (Depkes RI, 2006).

Untuk mengendalikan kadar bilirubin pada bayi baru lahir dapat dilakukan pemberian ASI sedini mungkin dengan jumlah cairan dan kalori yang mencukupi. Pemberian ASI sedini mungkin akan meningkatkan motilitas usus. Kandungan yang dibutuhkan neonatus dalam ASI adalah antibodi, protein, karbohidrat, lemak dan vitamin, sebagai bahan yang terkandung dalam ASI yaitu beta glukoronidase akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat dan kemudian akan direabsorpsi oleh usus. Rentang frekuensi menyusui yang optimal adalah antara 8 hingga 12 kali menyusui (Rulfiah, dkk, 2013 : 95).

Menurut Bahiyatun (2009) bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara dalam 5-7 menit dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Pemberian ASI yang adekuat sangat baik

untuk bayi karena ASI mempunyai banyak manfaat untuk bayi, salah satu manfaat bayi diberi ASI adalah mampu menghadapi penyakit kuning, asalkan bayi tersebut disusui sesering mungkin (Rulfiah, dkk, 2013 : 95).

Adapun yang menjadi faktor resiko pada bayi ikterus adalah :

a. ASI yang kurang

Bayi yang tidak mendapat ASI cukup dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk memproses pembuangan bilirubin dari dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi premature yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI.

b. Peningkatan jumlah sel darah merah

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh bayi yang memiliki golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit (antara lain eliptosis) atau mendapat transfusi darah kesemuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia.

d. Infeksi Inkompabilitas ABO-Rh

Berbagai infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin di dalam rahim dapat meningkatkan risiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubella dan sepsis (Mathindas dkk, 2013, S7).

Menurut Maryunani tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia adalah kulit kuning, sklera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10mg/dl pada neonatus yang kurang bulan dan 12,5mg/dl pada neonatus yang cukup bulan, kehilangan berat badan sampai 5% selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit, feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejang, epistotonus (posisi tubuh bayi melengkung), terjadi pembesaran hati dan tidak mau minum ASI, letargi, lemas, refleks hisap dan menelan bayi lemah (Maryunani, 2014 : 104).

Ikterus dianggap patologi apabila waktu muncul lama, atau kadar bilirubin serum yang ditentukan berbeda secara bermakna dari ikterus fisiologi. Peningkatan bilirubin darah khususnya bilirubin indirek yang bersifat toksik bisa disebabkan oleh produksi yang meningkat dan ekskresi melalui hati terganggu. Berbagai faktor risiko yang merupakan penyebab dari hiperbilirubinemia bisa dari faktor ibu maupun faktor bayi. Yang sering ditemukan antara lain dari faktor maternal seperti

komplikasi kehamilan (Inkompabilitas darah ABO dan Rh) dan pemberian ASI. Faktor perinatal seperti infeksi, dan trauma lahir (*chepalhermaton*) dan faktor neonatus seperti prematuritas, rendahnya asupan ASI, hipoglikimia, dan faktor genetik. Selain itu anjurkan ibu untuk terus berdo'a kepada Allah SWT agar bayinya lekas pulih.

2. Langkah II (Identifikasi diagnosa atau masalah aktual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi "S" ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 07 Juli 2018, ibu pasien mengatakan HPHT tanggal 11 Oktober 2017 dan dioperasi tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan hasil perhitungan berarti bayi lahir pada usia kehamilan 37 minggu 2 hari sehingga bayi termasuk kategori Bayi Cukup Bulan (BCB), ibu pasien mengatakan berat badan lahir bayinya 3.100 gram, berdasarkan kurva pertumbuhan berat badan bayi "S" dengan usia

kehamilan 37 minggu 2 hari sudah Sesuai Masa Kehamilan (SMK) dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, kulit dan sklera terlihat kuning, refleks menghisap dan menelan lemah dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB tanggal 07 Juli 2018 didapatkan hasil bilirubin total 14 mg/dl. Sehingga pada kasus bayi “S” ditegakkan diagnosa bayi lahir cukup bulan, sesuai dengan masa kehamilan, ikterus patologi dengan masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Pada tahap pengkajian dengan teori pada tahap pengkajian dengan teori ikterus patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut hiperbilirubinemia (Marmi dan Rahardjo, 2012 : 27). Hiperbilirubinemia adalah istilah yang dipakai untuk ikterus neonatorum setelah ada hasil laboratorium yang menunjukkan peningkatan kadar bilirubin bayi < 37 minggu lebih dari 10 mg/dl dan pada bayi cukup bulan lebih dari 12,5mg/dl. Hiperbilirubinemia merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang menimbulkan kern ikterus yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbelakangan mental.

Etiologi ikterus pada BBL dapat berdiri sendiri ataupun disebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar etiologi itu dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Produksi yang berlebihan, lebih dari kemampuan bayi untuk mengeluarkannya, misalnya pada hemolisis yang meningkat pada

- inkompatibilitas darah Rh, ABO, defisiensi enzim G6PD, *pyruvate kinase*, perdarahan tertutup, dan sepsis.
- b. Gangguan dalam proses *uptake* dan konjugasi hepar.
Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim *glucoronil transferase* (*crigler najjar syndrome*). Penyebab lain adalah defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam *uptake* bilirubin ke sel-sel hepar.
- c. Gangguan dalam transportasi. Bilirubin dalam darah terikat oleh albumin kemudian diangkut ke hepar. Ikatan bilirubin dalam albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat-obat, misalnya : *salisilat*, dan *sulfaforazole*. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak.
- d. Gangguan dalam eksresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau di luar hepar. Kelainan di luar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar.
- e. Obstruksi saluran pencernaan (fungsional atau struktural) dapat mengakibatkan hiperbilirubinemia *unconjugated* akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi enterohepatik.
- f. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI). Ikterus akibat ASI merupakan *unconjugated* hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya

terlambat (biasanya menjelang hari ke 6-14). Hal ini untuk membedakan ikterus pada bayi yang disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagian bahan yang terkandung dalam ASI (*beta glucoronidase*) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat, dan kemudian akan di reabsorpsi oleh usus. Bayi yang mendapat ASI bila dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula, mempunyai kadar bilirubin yang tinggi berkaitan dengan penurunan asupan pada beberapa hari pertama kehidupan. Pengobatannya yaitu bukan dengan menghentikan pemberian ASI melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberiannya (Marmi dan Rahardjo, 2014 : 278-279).

Adapun yang menjadi faktor resiko pada bayi ikterus adalah :

a. ASI yang kurang

Bayi yang tidak mendapat ASI cukup dapat bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk memproses pembuangan bilirubin dari dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi pada bayi premature yang ibunya tidak memproduksi cukup ASI.

b. Peningkatan jumlah sel darah merah

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Sebagai contoh bayi yang memiliki golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat abnormalitas eritrosit (antara lain eliptositosis)

atau mendapat transfusi darah ; kesemuanya beresiko tinggi akan mengalami hiperbilirubinemia.

c. Infeksi Inkompabilitas ABO-Rh

Ber macam infeksi yang dapat terjadi pada bayi atau ditularkan dari ibu ke janin di dalam rahim dapat meningkatkan resiko hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubela dan sepsis (Mathindas dkk, 2013, S7).

Menurut Maryunani tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia adalah kulit kuning, sklera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg/dl pada neonatus yang kurang bulan (BBLR) dan 12,5 mg/dl pada neonatus cukup bulan, kehilangan berat badan sampai 5% selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit, feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejang, epistotonus (posisi bayi melengkung), terjadi pembesaran hati, tidak mau minum ASI, letargi, refleks hisap dan menelan lemah (Maryunani, 2014 : 104). Menganjurkan ibu untuk tetap sabar dan berdoa untuk bayinya.

3. Langkah III (Identifikasi diagnosa atau masalah potensial)

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila

memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila masalah potensial terjadi.

Pada kasus bayi “S” telah dilakukan observasi penanganan umum dan penanganan segera dengan terapi sinar sehingga masalah potensial (kern ikterus) tidak muncul. Hal ini dikarenakan penanganan yang tepat dan baik dan pada pemeriksaan kadar bilirubin semakin hari semakin menurun. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Apabila ikterus patologi tidak ditangani dengan baik dan kadar bilirubinnya semakin tinggi maka akan menimbulkan komplikasi yang membahayakan karena bilirubin dapat menumpuk di otak yang disebut dengan kern ikterus. Hiperbilirubinemia merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang dapat menimbulkan kern ikterus yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Kondisi hiperbilirubinemia yang tak terkontrol dan kurang penanganan yang baik dapat menimbulkan komplikasi yang berat seperti kern ikterus akibat efek toksik bilirubin pada sistem saraf pusat. Salah satu penyebab mortalitas pada bayi baru lahir adalah kern ikterus yang merupakan komplikasi ikterus neonatorum yang paling berat yang mendapatkan gejala sisa berupa *cerebral palsy*, tuli nada tinggi, paralisis, dan displasia dental yang sangat mempengaruhi kualitas hidup (Maulida, Luluk Fajria, 2014 : 39).

Diharapkan penatalaksanaan yang baik dari tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya hiperbilirubinemia yaitu dengan adanya pengawasan antenatal yang baik serta pertolongan persalinan yang aman dan berpedoman pada asuhan sayang ibu sehingga mampu menurunkan angka kejadian ikterus neonatorum, karena jika tidak ditanggulangi dengan baik maka bayi hiperbilirubinemia akan meninggal dan dampak yang terjadi apabila bayi mengalami hiperbilirubinemia dapat mengalami keterbelakangan mental. Menganjurkan orang tua untuk tetap sabar dan senantiasa berkhuznudzon kepada Allah SWT.

4. Langkah IV (Perlunya tindakan segera atau kolaborasi)

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter dan juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain.

Pada kasus bayi "S" dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya kuning sejak tanggal 07 Juli 2018, ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak 06 Juli 2018, ibu pasien mengatakan bayinya cukup bulan dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, kulit dan sklera bayi terlihat kuning, refleks menghisap dan menelan bayi lemah sejak tanggal 06 Juli 2018, dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB pada tanggal 07 Juli 2018 didapatkan hasil bilirubin total 14 gr/dl dan dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan fototerapi dan pemberian

obat-obatan. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lapangan. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan yang paling tepat. Pada kasus ikterus neonatorum diperlukan adanya tindakan segera dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi (Mufdillah, dkk, 2012 : 111-119). Mengajukan orang tua untuk tetap ikhlas dan meminta kepada Allah agar bayinya diberi kesembuhan.

5. Langkah V (Merencanakan asuhan menyeluruh)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi dan pada langkah ini reformasi data yang tidak lengkap bisa dilengkapi. Perencanaan ini disusun berdasarkan diagnosa, masalah dan kebutuhan.

Pada kasus bayi "S" dengan ikterus patologi perencanaan yang dilakukan antara lain: cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, observasi KU dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan intake ASI atau susu formula 40 cc setiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, lakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter, ampisilin 135 mg/12 jam/IV dan injeksi gentamicin 13 mg/24 jam/IV, lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melakukan tindakan fototerapi, memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "S" saat ini, lakukan *informed consent* atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk

dilakukan tindakan fototerapi, lakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam). Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Pada kasus bayi dengan ikterus patologi rencana asuhan yang dilakukan adalah observasi KU umum yang bertujuan untuk memantau agar keadaan bayi tidak mencapai nilai yang menimbulkan kern ikterus, penuhi kebutuhan nutrisi secara baik karena bayi malas minum serta mencegah bayi dehidrasi karena pengaruh sinar lampu, kolaborasi dengan dokter spesialis anak, observasi BAB dan BAK, juga lingkungan sekitar bayi dijaga agar tetap bersih dan hangat (Mufdillah, dkk, 2012 : 111-19).

Perencanaan asuhan yang dilakukan pada bayi dengan hiperbilirubinemia adalah fototerapi transfusi tukar, fototerapi bila neonatus dipapar dengan cahaya berintensitas tinggi, tindakan ini dapat menurunkan bilirubin dalam kulit dan transfusi tukar digunakan untuk mengatasi anemia akibat eritrosit yang rentan terhadap antibodi eritrosit maternal, menghilangkan eritrosit yang tersensitisasi, mengeluarkan bilirubin serum, serta meningkatkan albumin yang masih bebas bilirubin dan meningkatkan keterikatannya dengan bilirubin (Mathindas, dkk, 2013 : S8). Orang tua diminta untuk tetap sabar dan berdoa yang terbaik untuk bayinya.

6. Langkah VI (Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan)

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman.

Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota kesehatan yang lain.

Pada kasus bayi “S” dengan kasus ikterus patologi, penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2018 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, memberi intake ASI atau susu formula 40 cc tiap 3 jam, menjaga kehangatan, melakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter, ampisilin 135 mg/12 jam/IV dan injeksi gentamicin 13 mg/24 jam/IV dan melakukan kolaborasi dokter spesial anak untuk tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selaa 24 jam dan istirahat 2 jam). Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2018 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, memberi intake ASI atau susu formula 40 cc tiap 3 jam, menimbang berat badan bayi untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan, dan tetap melakukan tindakan fototerapi. Penatalaksanaan tanggal 12 Juli 2018 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, memberikan intake ASI atau susu formula 40 cc tiap 3 jam, menimbang berat badan untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan bayi, dan tetap melakukan tindakan fototerapi. Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2018 cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, mendampingi visite dokter spesialis

anak dan bayi sudah dianjurkan untuk pulang, memberitahu keluarga bayi bahwa bayi sudah dianjurkan untuk pulang, memberikan HE pada orang tua bayi. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata. Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri tetapi bidan tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan mutu dan asuhan pada bayi dengan ikterus patologi. Pada tahap ini penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari keluarga pasien dan dukungan dari petugas kesehatan di ruangan perinatologi Syekh Yusuf Gowa.

Pelaksanaan yang dilakukan pada bayi dengan ikterus patologi adalah fototerapi, transfusi tukar dan pemberian ASI secara optimal. Fototerapi adalah sinar yang diberikan pada bayi untuk mengubah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam air untuk disekresikan melalui empedu atau urin sedangkan transfusi tukar dilakukan apabila fototerapi tidak dapat mengendalikan kadar bilirubin. Transfusi tukar merupakan cara yang dilakukan dengan tujuan mencegah peningkatan kadar bilirubin dalam darah, pemberian transfusi tukar apabila kadar bilirubin 20 mg/dl, kenaikan kadar bilirubin yang cepat yaitu 0,3-1 mg/jam, anemia berat dengan gejala gagal jantung. Pemberian ASI secara optimal perlu diingat bahwa bilirubin dapat dipecah apabila bayi mengeluarkan feses dan urin. Sehingga pemberian ASI harus diberikan karena ASI sangat efektif dalam

memperlancar BAB dan BAK. Namun demikian, pemberiannya harus tetap dalam pengawasan dokter (Maulida, Luluk Fajria, 2014 : 41-43).

Diharapkan penatalaksanaan yang baik dari tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya hiperbilirubinemia dengan pengawasan antenatal yang baik serta pertolongan persalinan yang aman dan berpedoman pada asuhan sayang ibu sehingga mampu menurunkan angka kejadian ikterus neonatorum, karena jika tidak ditanggulangi dengan baik maka bayi hiperbilirubinemia akan meninggal dan dampak yang terjadi apabila mengalami hiperbilirubinemia dapat mengalami keterbelakangan mental. Mengajarkan orang tua untuk terus berikhtiar dan sabar dalam mendampingi bayinya.

7. Langkah VII (Evaluasi)

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis.

Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada bayi "S" dengan ikterus patologi dengan 5 kali kunjungan pertama tanggal 08 Juli 2018, masalah yang dialami klien akan diatasi dengan memberikan nutrisi ASI dan susu formula untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi dengan cara disendoki untuk merangsang refleks hisap dan menelan pada bayi serta melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan fototerapi dan pemberian obat-obatan. Kemudian evaluasi pada

kunjungan kedua tanggal 09 Juli 2018 KU bayi sedang, refleks hisap dan menelan bayi sudah mulai kuat, kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi dan tindakan fototerapi masih dilakukan untuk menurunkan kadar bilirubin. Pada kunjungan ketiga tanggal 12 Juli 2018 keadaan bayi sudah mengalami kemajuan dan mulai membaik ditandai dengan sklera dan kulit bayi sudah mulai tidak dan kadar bilirubin bayi sudah menurun. Kunjungan keempat tanggal 16 Juli 2018 bayi sudah baik, refleks hisap dan menelan kuat, kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi ditandai dengan berat badan bayi naik menjadi 2.910 gram, sklera dan kulit bayi sudah tidak tidak kuning dan kadar bilirubin sudah normal dan sudah dianjurkan untuk pulang. Kunjungan kelima dilakukan dirumah ibu pasien pada tanggal 24 Juli 2018 keadaan bayi sudah baik,refleks hisap dan menelan kuat,kebutuhan nutrisi terpenuhi ditandai dengan berat badan bayi naik menjadi 2.940 gram, sklera dan kulit sudah tidak kuning. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lapangan.

Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang sesuai dengan masalah dan diagnosis klien, juga benar dalam pelaksanaannya. Disamping melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang telah diberikan, bidan juga dapat melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang telah diberikan. Dengan harapan, hasil evaluasi proses sama dengan hasil evaluasi secara keseluruhan. Pada teori bayi dengan hiperbilirubinemia keadaan yang ingin dicapai adalah KU bayi baik, kenaikan berat badan

bayi, warna kuning pada kulit bayi sudah tidak terlihat, kebutuhan cairan terpenuhi, refleks hisap baik (Mufdillah, dkk, 2012 : 111-119). Orang tua bayi diminta bayi diminta untuk tetap berdoa untuk kesembuhan bayinya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah penulis dapatkan dalam studi kasus dan pembahasan pada asuhan kebidan pada bayi “S” dengan ikterus patologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang mungkin dapat berguna untuk peningkatan pelayanan asuhan kebidanan khususnya pada bayi dengan hiperbilirubinemia.

A. KESIMPULAN

1. Dalam melakukan pengumpulan data dasar pada bayi “S” dengan ikterus patologi dilaksanakan dengan mengumpulkan data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara dimana ibu pasien mengatakan kulit bayinya kuning dan malas minum susu, data objektif diperoleh dari pemeriksaan fisik seperti kulit bayi dan sklera bayi tampak kuning, refleks hisap dan menelan bayi lemah

serta data penunjang yang diperoleh dari pemeriksaan LAB yaitu bilirubin total 14 mg/dl.

2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual dilakukan dengan pengumpulan data secara teliti dan akurat, sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada bayi "S", BCB, SMK dengan ikterus patologi yang disertai dengan masalah kekurangan cairan, kebutuhan mersangsang refleks hisap dengan cara pemberian nutrisi dengan menggunakan sendok.
3. Diagnosa potensial pada kasus ini tidak muncul karena penanganan yang cepat dan tepat.
4. Perlunya tindakan segera dan kolaborasi dalam langkah ini dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam) dan memenuhi kebutuhan cairan yaitu 40 cc per 3 jam.
5. Merencanakan asuhan yang menyeluruh, pada kasus ini rencana asuhan yang dilakukan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, lakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter ampicilin 135 mg/12 jam/IV dan gentamicin 13 mg/24 jam/IV, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk

melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam).

6. Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan pada bayi "S" merupakan pelaksanaan dari rencana tindakan.
7. Evaluasi, setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 5 hari pada kasus bayi "S" dengan ikterus patologi didapat hasil KU bayi baik, refleks menghisap dan menelan kuat, sklera dan kulit bayi sudah tidak kuning, kebutuhan nutrisi tercukupi, berat badan bayi naik menjadi 2.910 gram, dan kadar bilirubin menurun.
8. Penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lapangan.

B. SARAN

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus, penulis memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi rumah sakit

Diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan asuhan pada bayi agar dapat mempercepat proses penyembuhan khususnya pada bayi dengan ikterus patologi dan mencegah terjadinya komplikasi.

2. Bagi pendidikan

Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan menambah referensi sehingga dapat membantu penulis atau mahasiswa yang akan mengamil kasus yang sama.

3. Bagi profesi

Meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi bayi dengan ikhterus patologi secara cepat, tepat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2012*
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar : SIK, 2016.
- Ernawati, dkk. Hubungan Antara Induksi Oksitosin Dan Pemberian ASI Terhadap Kejadian Ikhterus Neonatorum Di RSUD DR. Soewandi Surabaya. Prosiding
- Indrayani, Emma Moudy. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. CV. Trans Info Media: Jakarta Timur. 2013.
- Ibnu, Katsir. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Ibnu Katsir. Kakarta. 2010..
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tajwid*. Bandung: Jawa Barat, 2014.

- Khadijah, dkk. *Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Ikterus Fisiologi Pada Bayi Baru Lahir Di RSUD DR. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin*. *Dinamika Kesehatan*: Vol.6, No.2. Desember 2015.
- Kementrian Kesehatan RI : *Profil Kesehatan Indonesia*, 2016.
- Lissauer, Avroy A. Fanaroff. *Selayang Neonatologi*. Indeks: Jakarta Barat. 2013.
- Lubis, Bugis Mardina, dkk. *Rasio Bilirubin Albumin Pada Neonatus Dengan Hiperbilirubinemia*. *Sari Pediatri* : Vol.14, No.5. Februari 2013.
- Lockhart Anita. *Neonatus Normal & Patologi*. Binarupa Aksara: Tangerang Selatan. 2014.
- Luluk Fajria. *Ikterus Neonatorum* : PROFESI Vol.10, No.3 September 2013-Februari 2014.
- Marmi, Rahardjo. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah*. Pus Pelajar: Yogyakarta. 2016.
- Mathindas, Stefry, dkk. *Hiperbilirubinemia Pada Neonatus* : *Jurnal Biomedik*. Vol.5, No. 1, S4-10. Maret 2013.
- Nadyah. *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak Dan Maternal*. Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar. 2013.
- Nur Musriah. *Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Ikterus Fisiologis Di BPS NY. Sri Purweni Mrican Kota Kendari*: *JuKe* Vol.1, No.1 Januari-Juni 2017.
- Novianti, dkk. *Pengaruh Field Massage sebagai Terapi Adjuvan terhadap Kadar Bilirubin Serum Bayi Hiperbilirubinemia*: *JKP* Vol.5, No.3 Desember 2017.
- Puspitosari, dkk. *Pengaruh Paparan Sinar matahari Pagi Terhadap Tanda Ikterus Pada Ikterus Neonatorum Fisiologis*: *Jurnal Kedokteran Brawijaya* Vol.XXII, No.3 Desember 2006.
- Prawirohardjo. *Ilmu Kebidanan*. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirahardjo: Jakarta. 2014.
- Pholman, Mercedes Naaharani, dkk. *Hubungan Inisiasi menyusui Dini Dengan Ikterus Neonatorum Di RSUD Wates Yogyakarta* . *Media Ilmu Kesehatan*: Vol.4, No.2 Agustus 2015.

- Putri Dewi , Rita Rositawati. *Hubungan BBLR dan Asfiksia Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum* : Jurnal Obstetika Scientia. Vol.4, No.2 2016-2017.
- Pusprani, Tri Ariguntar W,dkk. *Gambaran Kadar Bilirubin Pada Ikterus Neonatorum Sebelum Dan Pasca Fototerapi Di Rumah Sakit Pertamina Cirebon Periode Januari-Agustus 2014* : Ibnu Sina Biomedik. Vol.1, No.2 2017.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani : Depok. 2008
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Penerbit Lentera Hati: Jakarta. 2002.
- Rukiyah, Lia Yulianti. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. CV.Trans Info Media: Jakarta Timur. 2012.
- Sulistijono, Inga Gebyarani, dkk. *Pengaruh Karakteristik Demografis, Klinis dan Laboratorium pada Neonatus dengan Hiperbilirubinemia* : Jurnal Kedokteran Brawijaya. Vol.26, No.4 Agustus 2011.
- Susi Wdiawati. *Hubungan sepsis neonatorum, BBLR dan asfiksia dengan kejadian ikterus pada bayi baru lahir* : Riset Informasi Kesehatan. Vol.6, No.1 Juni 2017.
- Williamson, Kenda. *Buku Ajar Asuhan Neonatus. Buku Kedokteran* : Jakarta. 2013
- Yuliawati, Ni Putu Eka Sadiwati,dkk. *Studi Komparatif Kadar Bilirubin Pada Bayi Baru Lahir Dengan Fototerapi Yang Diberikan ASI Eksklusif Di RST Malang* : Nursing News : Vol.3, No.1, 2018.



UNIVERSITAS IBN KHALDUN EFFRI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 1: Jl. H.M. Yosip Lampa No. 36 Samar Gowa Telp: (0411) 841879 Fax: (0411) 8221400

Nomor : B-1169 /FKIK/PP.00.9/08/2018

Gowa, 27 Agustus 2018

Lamp :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq, Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sui-Sel.

di-

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian/Pengambilan Kasus:

Nama : Nadia Nova Wanda
NIM : 70400115010
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Ikterus Patologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.
Tempat Penelitian : RSUD Syekh Yusuf Gowa
Dosen Pembimbing : 1. Anieq Mumtiah Aikaukar, S.SiT., M.Keb.
2. dr. Darmawansyah, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.

M A K A S S A R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8866/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor: B-1961.A/FKIK/PP.00.9/06/2018 tanggal 24 Juni 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NADA NOVA WANDA
Nomor Pokok : 70400114010
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 63, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR DENGAN IKTERUS NEONATORIUM DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2018"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Juli s/d 21 Agustus 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 26 Juni 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
2. Paringgal.

M A K A S S A R



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN STUDY KASUS

Nomor : 175/Diklat.RSUD-SY/VIII /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Nada Nova Wanda
N i m : 70400115010
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Study Kasus di Ruang Perinatologi RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul * *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Ikterus Neonatorum Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa* pada Tanggal 08 Juli 2018 S/D 24 Juli 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 07 Agustus 2018

An. Ketua Diklat
Koordinator bagian Penelitian


Dra. Hj. Ramlah Raut, Bsc. MMRS
Nid. 19630710 198703 2 019



RIWAYAT HIDUP

Nada Nova Wanda, dilahirkan di Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Putri pertama pasangan Ayahanda Nasruddin dan Ibunda Darnawati.

Jenjang pendidikan yang pernah dilalui oleh penulis adalah :

Tamatan SD Negeri 2 Langam Kec. Lopok, Kab. Sumbawa Besar tahun 2009, Tamatan SMP Negeri 1 Lopok tahun 2012, Tamatan SMA Negeri 1 Lape tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studinya pada Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pengalaman organisasi internal kampus :

1. Anggota Dewan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Divisi Penalaran dan Keilmuan Periode 2016-2017.
2. Wakil ketua I Himpunan Mahasiswa Diploma Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2017-2018.

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR
DENGAN IKTERUS NEONATORUM DI RSUD SYEKH YUSUF
GOWA TANGGAL 08-24 JULI TAHUN 2018**

Nada Nova Wanda¹, Anieq Mumthi'ah Alkautzar², Darmawansyih³

Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin
Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (Kampus 1), Jl. Sultan Alauddin
No. 36 Samata Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. (0411)
841879

Email : nadanova.w@gmail.com

ABSTRAK

Ikterus neonatorum merupakan fenomena biologis yang timbul akibat tingginya produksi dan rendahnya ekskresi bilirubin selama masa transisi pada neonatus, yang menimbulkan warna kuning yang tampak pada sklera dan kulit.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Pada Bayi Dengan Ikterus Patologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada bayi "S" dengan ikterus patologi setelah dilakukan asuhan, tidak ditemukannya hambatan selama asuhan yang diberikan. Pemantauan dilakukan sebanyak 5 kali selama kurang lebih 1 bulan. Selama dilakukannya asuhan ibu didapatkan kulit dan sklera bayi berwarna kuning sejak tanggal 07 Juli 2018, refleks hisap dan menelan bayi lemah sejak tanggal 06 Juli 2018 dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB tanggal 07 Juli 2018 hasil bilirubin 14 mg/dl dan asuhan terakhir tanggal 24 Juli 2018 kulit dan sklera bayi sudah tidak kuning dan kadar bilirubin sudah kembali normal.


Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada kasus By "S" dengan ikterus neonatorum di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2018 dan dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan terhadap By "S" dengan hasil tidak terjadi kern ikterus dan tidak ditemukannya kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Kata Kunci : Ikterus, 7 Langkah Varney.

ABSTRAC

Neonatal jaundice is a biological phenomenon arising due to the high production and low bilirubin excretion during the transition period in neonates that result in a yellow color appearing in the sclera and skin. The study is aimed at implementing the care management in an infant with phatological jaundice at Syeh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 based on 7 steps of Varney and SOAP. The results of the case study carried out on baby "S" with phatological jaundice after the care being implemented, no hidrances were found during the care provided. Monitoring was carried out 5 times for approximately 1 month. During the maternal care the baby's skin and sclera were yellow from July 7, 2018, the suction reflex and swallowing of the baby were wea from July 6, 2018 and at the time of the laboratory examination on July 7, 2018, the bilirubin result was 14 mg/dl, and the baby's skin and sclera were not yellow and the bilirubin levels were back to normal at the last care on July 24, 2018. The conclusion of the case study was that 7 steps of Varney and SOAP implemented for the midwifery problem solving process had been carried out in the case of baby "S" with neonatal jaundice at Syeh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 and the documentation of all findings and actions carried out to baby "S" was no result of jaundice and there was no gap between the theory and the real case.

Keywords : Jaundice, 7 Steps of Varney.



PENDAHULUAN

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan bayi dan menurut data *World Health Organization* (WHO) tahun 2012 Angka Kematian Bayi (AKB) di Dunia tahun 2012 sebesar 49 per 1.000 kelahiran hidup, *High Risk Infant* atau faktor bayi yang mempertinggi resiko kematian perinatal atau neonatal salah satunya adalah ikterus neonatorum yang merupakan penyebab kematian neonatal sekitar 20-40% dari seluruh persalinan (Susi Widiawati, 2017 : 53).

Angka kematian bayi menurut jenis kelamin, kecamatan, dan puskesmas provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 adalah 8,33 per 1.000 kelahiran hidup (Dinkes, 2016). Data rekam medik di RSUD Syekh Yusuf Gowa, didapatkan pada tahun 2015 sebanyak 5 bayi yang mengalami ikterus, pada tahun 2016 sebanyak 2 bayi mengalami ikterus, dan pada tahun 2017 sebanyak 4 bayi mengalami ikterus (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa).

Ikterus neonatorum merupakan fenomena biologis yang timbul akibat tingginya produksi dan rendahnya ekskresi bilirubin selama masa transisi pada neonatus, yang menimbulkan perwarnaan kuning yang tampak pada sklera dan kulit yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin. Ikterus umumnya mulai tampak pada sklera (bagian putih mata) dan wajah, selanjutnya meluas secara sefalokaudal (dari atas ke bawah) ke arah dada, perut dan ekstremitas. Pada bayi baru lahir ikterus seringkali tidak dapat dilihat pada sklera karena bayi baru lahir umumnya sulit membuka mata (Susi Widiawati, 2017 : 54).

Ikterus neonatorum dapat menimbulkan ensefalopati bilirubin (kern ikterus) yang merupakan komplikasi ikterus neonatorum yang paling berat. Selain memiliki angka mortalitas yang tinggi, juga dapat menyebabkan gejala berupa *cerebral palsy*, tuli nada tinggi, retardasi mental dan gangguan proses pertumbuhan. Peningkatan kadar bilirubin dapat diakibatkan oleh pembentukan yang berlebihan atau ada gangguan dalam pengeluaran

bilirubin, ikterus pada bayi dapat bersifat fisiologis dan sebagian dapat bersifat patologis yang dikenal dengan istilah hiperbilirubinemia yang dapat mengakibatkan gangguan saraf pusat (kern ikterus) atau kematian (Sefti dan Rita, 2017 : 4). Pada setiap bayi yang mengalami ikterus harus dibedakan apakah ikterus yang terjadi merupakan keadaan yang fisiologik atau non-fisiologik. Selain itu perlu dimonitor apakah keadaan tersebut mempunyai kecenderungan berkembang menjadi hiperbilirubinemia berat yang memerlukan penanganan optimal mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh kejadian ikterus neonatorum pada bayi baru lahir maka perlu penanganan secara kolaborasi dari petugas kesehatan dalam pencegahan komplikasi untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia

METODE

Melaksanakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui Manajemen Asuhan Kebidanan oleh Helen Varney yang

meliputi 7 langkah: pengkajian, perumusan diagnosis/masalah aktual maupun potensial, pelaksanaan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan, implementasi serta evaluasi Asuhan Kebidanan pada klien dengan kasus Ikterus Neonatorum. Untuk memperoleh data/informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik : 1) Anamnesis klien yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan ibu dan bapak klien dan keluarganya yang dapat membantu memberikan keterangan/informasi yang dibutuhkan dengan dipantau oleh tenaga kesehatan. 2) Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. 3) mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter atau bidan.

HASIL

Langkah I (Pengumpulan data dasar)

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi "S" dengan ikterus patologi melalui anamnesa

didapatkan ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 07 Juli 2018, ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak tanggal 06 Juli 2018, ibu pasien mengatakan bayinya cukup bulan dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, Berat badan lahir 3.100 gram, berat badan saat pengkajian 2.900 gram, kulit dan sklera bayi terlihat kuning, refleks menghisap dan menelan lemah, dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB pada tanggal 07 Juli 2018 didapatkan hasil bilirubin total 14 mg/dl. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Langkah II (Identifikasi diagnosa atau masalah aktual)

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi "S" ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 07 Juli 2018, ibu pasien mengatakan HPHT tanggal 11 Oktober 2017 dan dioperasi tanggal

29 Juni 2018 berdasarkan hasil perhitungan berarti bayi lahir pada usia kehamilan 37 minggu 2 hari sehingga bayi termasuk kategori Bayi Cukup Bulan (BCB), ibu pasien mengatakan berat badan lahir bayinya 3.100 gram, berdasarkan kurva pertumbuhan berat badan bayi "S" dengan usia kehamilan 37 minggu 2 hari sudah Sesuai Masa Kehamilan (SMK) dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, kulit dan sklera terlihat kuning, refleks menghisap dan menelan lemah dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB tanggal 07 Juli 2018 didapatkan hasil bilirubin total 14 mg/dl. Sehingga pada kasus bayi "S" ditegakkan diagnosa bayi lahir cukup bulan, sesuai dengan masa kehamilan, ikterus patologi dengan masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Langkah III (Identifikasi diagnosa atau masalah potensial)

Pada kasus bayi "S" telah dilakukan observasi penanganan umum dan penanganan segera

dengan terapi sinar sehingga masalah potensial (kern ikterus) tidak muncul. Hal ini dikarenakan penanganan yang tepat dan baik dan pada pemeriksaan kadar bilirubin semakin hari semakin menurun. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Langkah IV (Perlunya tindakan segera atau kolaborasi)

Pada kasus bayi "S" dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya kuning sejak tanggal 07 Juli 2018, ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusui sejak 06 Juli 2018, ibu pasien mengatakan bayinya cukup bulan dan pada saat dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, kulit dan sklera bayi terlihat kuning, refleks menghisap dan menelan bayi lemah sejak tanggal 06 Juli 2018, dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB pada tanggal 07 Juli 2018 didapatkan hasil bilirubin total 14 gr/dl dan dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan fototerapi dan pemberian obat-obatan. Sehingga

pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lapangan.

.Langkah V (Merencanakan asuhan yang menyeluruh)

Pada kasus bayi "S" dengan ikterus patologi perencanaan yang dilakukan antara lain: cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, observasi KU dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan intake ASI atau susu formula 40 cc setiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, lakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter, ampicilin 135 mg/12 jam/IV dan injeksi gentamicin 13 mg/24 jam/IV, lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melakukan tindakan fototerapi, memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "S" saat ini, lakukan *informed consent* atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi, lakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam). Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Langkah VI (Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan)

Pada kasus bayi "S" dengan kasus ikterus patologi, penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2018 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, memberi intake ASI atau susu formula 40 cc tiap 3 jam, menjaga kehangatan, melakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter, ampicilin 135 mg/12 jam/IV dan injeksi gentamicin 13 mg/24 jam/IV dan melakukan kolaborasi dokter spesial anak untuk tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selaa 24 jam dan istirahat 2 jam). Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2018 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, memberi intake ASI atau susu formula 40 cc tiap 3 jam, menimbang berat badan bayi untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan, dan tetap melakukan tindakan fototerapi. Penatalaksanaan

tanggal 12 Juli 2018 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, memberikan intake ASI atau susu formula 40 cc tiap 3 jam, menimbang berat badan untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan bayi, dan tetap melakukan tindakan fototerapi. Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2018 cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, mendampingi visite dokter spesialis anak dan bayi sudah dianjurkan untuk pulang, memberitahu keluarga bayi bahwa bayi sudah dianjurkan untuk pulang, memberikan HE pada orang tua bayi. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Langkah VII (Evaluasi)

Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada bayi "S" dengan ikterus patologi dengan 5 kali kunjungan pertama tanggal 08 Juli 2018, masalah yang dialami klien akan diatasi dengan memberikan nutrisi ASI dan susu formula untuk

memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi dengan cara disendoki untuk merangsang refleks hisap dan menelan pada bayi serta melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan fototerapi dan pemberian obat-obatan. Kemudian evaluasi pada kunjungan kedua tanggal 09 Juli 2018 KU bayi sedang, refleks hisap dan menelan bayi sudah mulai kuat, kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi dan tindakan fototerapi masih dilakukan untuk menurunkan kadar bilirubin. Pada kunjungan ketiga tanggal 12 Juli 2018 keadaan bayi sudah mengalami kemajuan dan mulai membaik ditandai dengan sklera dan kulit bayi sudah mulai tidak dan kadar bilirubin bayi sudah menurun. Kunjungan keempat tanggal 16 Juli 2018 bayi sudah baik, refleks hisap dan menelan kuat, kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi ditandai dengan berat badan bayi naik menjadi 2.910 gram, sklera dan kulit bayi sudah tidak kuning dan kadar bilirubin sudah normal dan sudah dianjurkan untuk pulang. Kunjungan kelima dilakukan dirumah ibu pasien pada tanggal 24

Juli 2018 keadaan bayi sudah baik,refleks hisap dan menelan kuat,kebutuhan nutrisi terpenuhi ditandai dengan berat badan bayi naik menjadi 2.940 gram, sklera dan kulit sudah tidak kuning. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lapangan.

KESIMPULAN

1. Dalam melakukan pengumpulan data dasar pada bayi "S" dengan ikterus patologi dilaksanakan dengan mengumpulkan data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara dimana ibu pasien mengatakan kulit bayinya kuning dan malas minum susu, data objektif diperoleh dari pemeriksaan fisik seperti kulit bayi dan sklera bayi tampak kuning, refleks hisap dan menelan bayi lemah serta data penunjang yang diperoleh dari pemeriksaan LAB yaitu bilirubin total 14 mg/dl.

2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual dilakukan dengan pengumpulan data secara teliti dan akurat, sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada bayi "S", BCB, SMK dengan ikterus patologi yang

disertai dengan masalah kekurangan cairan, kebutuhan mersangsang refleks hisap dengan cara pemberian nutrisi dengan menggunakan sendok.

3. Diagnosa potensial pada kasus ini tidak muncul karena penanganan yang cepat dan tepat.

4. Perlunya tindakan segera dan kolaborasi dalam langkah ini dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam) dan memenuhi kebutuhan cairan yaitu 40 cc per 3 jam.

5. Merencanakan asuhan yang menyeluruh, pada kasus ini rencana asuhan yang dilakukan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, lakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter ampicilin 135 mg/12 jam/IV dan gentamicin 13 mg/24 jam/IV, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam

(fototerapi diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam).

6. Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan pada bayi "S" merupakan pelaksanaan dari rencana tindakan.

7. Evaluasi, setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 5 hari pada kasus bayi "S" dengan ikterus patologi didapat hasil KU bayi baik, refleks menghisap dan menelan kuat, sklera dan kulit bayi sudah tidak kuning, kebutuhan nutrisi tercukupi, berat badan bayi naik menjadi 2.910 gram, dan kadar bilirubin menurun.

8. Tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lapangan.

SARAN

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus, penulis memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi rumah sakit

Diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan asuhan pada bayi agar dapat mempercepat proses penyembuhan khususnya pada bayi dengan ikterus

patologi dan mencegah terjadinya komplikasi.

2. Bagi pendidikan

Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan menambah referensi sehingga dapat membantu penulis atau mahasiswa yang akan mengamil kasus yang sama.

3. Bagi profesi

Meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi bayi dengan ikterus patologi secara cepat, tepat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan* 2012

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar : SIK, 2016.

Ernawati, dkk. Hubungan Antara Induksi Oksitosin Dan Pemberian ASI Terhadap Kejadian Ikhterus Neonatorum Di RSUD DR.

Soewandi Surabaya.
Prosiding

Indrayani, Emma Moudy. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. CV. Trans Info Media: Jakarta Timur. 2013.

Ibnu, Katsir. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Ibnu Katsir. Kakarta. 2010..

Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Taj* Bandung: Jawa Barat, 2014.

Khadijah, dkk. *Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Ikterus Fisiologi Pada Bayi Baru Lahir Di RSUD DR. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin*. Dinamika Kesehatan: Vol.6, No.2. Desember 2015.

Kementrian Kesehatan RI : *Profil Kesehatan Indonesia*, 2016.

Lissauer, Avroy A. Fanaroff. *Selayang Neonatologi*. Indeks: Jakarta Barat. 2013.

Lubis, Bugis Mardina, dkk. *Rasio Bilirubin Albumin Pada Neonatus Dengan*

- Hiperbilirubinemia.* Sari
Pediatri : Vol.14, No.5.
Februari 2013.
- Lockhart Anita. *Neonatus Normal & Patologi.* Binarupa Aksara: Tangerang Selatan. 2014.
- Luluk Fajria. *Ikterus Neonatorum : PROFESI* Vol.10, No.3
September 2013-Februari
2014.
- Marmi, Rahardjo. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2016.
- Mathindas, Stefry, dkk.
Hiperbilirubinemia Pada Neonatus : Jurnal Biomedik.
Vol.5, No. 1, S4-10. Maret
2013.
- Nadyah. *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak Dan Maternal.* Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar. 2013.
- Nur Musriah. *Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Ikterus Fisiologis Di BPS NY. Sri Purweni Mrican*
Kota Kendari: JuKe Vol.1,
No.1 Januari-Juni 2017.
- Novianti, dkk. *Pengaruh Field Massage sebagai Terapi Adjuvan terhadap Kadar Bilirubin Serum Bayi Hiperbilirubinemia: JKP*
Vol.5, No.3 Desember 2017.
- Puspitosari, dkk. *Pengaruh Paparan Sinar matahari Pagi Terhadap Tanda Ikterus Pada Ikterus Neonatorum Fisiologis: Jurnal Kedokteran Brawijaya* Vol.XXII, No.3
Desember 2006.
- Prawirohardjo. *Ilmu Kebidanan.* PT Bina Pustaka Sarv
Prawirahardjo: Jakarta. 2014.
- Pholman, Mercedes Naaharani, dkk,
Hubungan Inisiasi menyusui Dini Dengan Ikterus Neonatorum Di RSUD Wates Yogyakarta . Media Ilmu Kesehatan: Vol.4, No.2
Austus 2015.
- Putri Dewi , Rita Rositawati. *Hubungan BBLR dan Asfiksia Dengan Kejadian Ikterus Neonatorum : Jurnal*

- Obstretika Scientia. Vol.4, No.2 2016-2017.
- Pusprani, Tri Ariguntar W,dkk. *Gambaran Kadar Bilirubin Pada Ikterus Neonatorum Sebelum Dan Pasca Fototerapi Di Rumah Sakit Pertamina Cirebon Periode Januari-Agustus 2014* : Ibnu Sina Biomedik. Vol.1, No.2 2017.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani : Depok. 2008
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Penerbit Lentera Hati: Jakarta. 2002.
- Rukiyah, Lia Yulianti. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. CV.Trans Info Media: Jakarta Timur. 2012.
- Sulistijono, Ingga Gebyarani, dkk. *Pengaruh Karakteristik Demografis, Klinis dan Laboratorium pada Neonatus dengan Hiperbilirubinemia* : Jurnal Kedokteran Brawijaya. Vol.26, No.4 Agustus 2011.
- Susi Wdiawati. *Hubungan sepsis neonatorum, BBLR dan asfiksia dengan kejadian ikterus pada bayi baru lahir* : Riset Informasi Kesehatan. Vol.6, No.1 Juni 2017.
- Williamson, Kenda. *Buku Ajar Asuhan Neonatus. Buku Kedokteran* : Jakarta. 2013
- Yulawati, Ni Putu Eka Sadiwati,dkk. *Studi Komparatif Kadar Bilirubin Pada Bayi Baru Lahir Dengan Fototerapi Yang Diberikan ASI Eksklusif Di RST Malang* : Nursing News : Vol.3, No.1, 2018.