

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY “N”
DENGAN USIA KEHAMILAN PRETERM DI RSUD SYEKH
YUSUF GOWA TANGGAL 01 JULI 2018**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya
Diploma Kebidanan di Universitas Islam Negeri
(UIN Alauddin Makassar)**

Oleh

INDAH

NIM : 70400115005

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah

Nim : 70400115005

TTL : Sengkang, 23 Agustus 1997

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma

Alamat : Jl. Sultan Alauddin II, Lr III/II

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "N"
dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf
Gowa Tanggal 01 Juni 2018

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia adalah duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 06 Agustus 2018
24 Dzul-Qa'idah 1439 H

Penulis



INDAH

NIM : 70400115005


HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Indah
Nim : 70400115005
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "N" dengan
Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01
Juni 2018


Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar
Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 06 Agustus 2018
24 Dzul-Qa'idah 1439 H

Pembimbing I


Firdayanti, S.S.T., M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 0001

Pembimbing II


dr. Nadyah, M. Kes
NIP : 19790417 200801 2 018

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny"N" dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juli 2018". Yang disusun oleh Indah NIM : 70400115005, Mahasiswa jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Agustus 2018 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 06 Agustus 2018
24 Dzul-Qa'idah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc ()
Sekretaris : Dr. Hj. Sitti Saleha., S.SiT.,SKM.,M.Keb ()
Pembimbing I : Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb ()
Pembimbing II : dr. Nadyah Haruna, M.Kes ()
Penguji I : dr. Dewi Setiawati, Sp.OG.,M.Kes ()
Penguji II : Prof. Dr. Muchtar Lutfi., M.Pd ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah swt. Yang Maha Kuasa, Maha Pencipta alam semesta beserta seluruh isinya dengan begitu sempurna. Zat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta kasih sayang-Nya lah sehingga penulis dapat menyusun KTI dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juni 2018”. KTI ini diajukan kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan.

Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah saw. serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang menjadi panutan bagi umat Islam, yang senantiasa menjadi suri teladan dan membawa ajaran yang begitu sempurna. Nabi yang telah memberikan pencerahan akan kebenaran kepada seluruh umat manusia di muka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny”N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juni 2018”**. Karya

Tulis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu masukan, kritikan, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Cinta dan penghormatan kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, ayahanda H. Iskandar dan Ibunda Indo Intang, mereka adalah orang pertama yang memberikanku kasih sayang, cinta, perhatian, doa dan bimbingan yang begitu besar, serta dasar hidup yang senantiasa ditanamkan sejak kecil. Kedua kakakku serta keluarga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dari awal sampai sekarang yang membuatku semakin berjuang untuk mencapai gelar ini.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. H. Andi Army Nurdin, M.Sc beserta seluruh staf administrasi.
3. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., S.KM., M.Keb selaku ketua prodi Kebidanan dan sekaligus sebagai penasihat akademik yang telah memberikan banyak

bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Amd.Keb.

4. Ibunda Firdayanti, S.Si.T., M.Keb sebagai pembimbing I, yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dan telah ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Ibunda dr. Nadyah, M.Kes sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dan telah ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibunda dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ayahanda Prof. Dr. Muchtar Lutfi, M.Pd selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
9. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sarana sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Selatan yang telah memberikan rekomendasi penelitian kepada peneliti.

11. Bapak Bupati kabupaten Gowa yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
12. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa yang telah memberikan izin kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
13. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2015 serta kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu semoga semua perjuangan kita sebagai amal baik di sisi-Nya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata, 06 Agustus 2018
24 Dzul-Qa'idah 1439 H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penulis

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Indah
NIM : 70400115005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang.....	1
2. Ruang Lingkup Pembahasan	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	8
5. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum tentang Persalinan	10
1. Pengertian Persalinan	10
2. Tujuan Asuhan Persalinan.....	11
3. Penyebab Terjadinya Persalinan.....	11

4. Tanda-tanda Mulainya Persalinan	13
5. Tahap-tahap dalam Proses Persalinan	14
6. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan	17
7. Mekanisme Persalinan	20
B. Tinjauan Khusus tentang Persalinan Preterm	22
1. Pengertian Persalinan Preterm	22
2. Etiologi Persalinan Preterm	22
3. Klasifikasi Persalinan Preterm	23
4. Tanda dan Gejala Persalinan Preterm	24
5. Patofisiologi Persalinan Preterm	24
6. Diagnosis Persalinan Preterm	26
7. Prognosis/Komplikasi Persalinan Preterm	26
8. Dampak Persalinan Preterm	28
9. Penanganan Persalinan Preterm	29
C. Tinjauan Asuhan Kebidanan Persalinan Preterm	44
1. Pengertian Managemen Asuhan Kebidanan	44
2. Langkah-langkah Managemen Kebidanan	44
BAB III STUDI KASUS.....	57
1. Kala I.....	57
2. Kala II	85
3. Kala III	102
4. Kala IV	108

BAB IV PEMBAHASAN.....	119
1. Kala I.....	119
2. Kala II	132
3. Kala III	140
4. Kala IV	143
BAB V PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his	74
Tabel 2 : Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his	75
Tabel 3 : Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his	81
Tabel 4 : Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his	82
Tabel 5 : Pemantauan Kala IV	117



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I :Partograf
- Lampiran II :Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran II :Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa
- Lampiran III :Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
- Lampiran IV :Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
- Lampiran V :Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Lampiran VI :Daftar riwayat hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, 06 AGUSTUS 2018

Nama : Indah

Nim : 70400115005

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juli 2018

Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi dari dalam uterus pada umur kehamilan 37–42 minggu dengan ditandai adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya penipisan dan dilatasi *serviks*. Terjadinya persalinan normal bukan berarti tidak ada komplikasi, tetapi melainkan banyak kemungkinan hal yang bisa terjadi. Salah satu komplikasinya adalah persalinan preterm.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juni 2018 sesuai dengan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Penatalaksanaan Asuhan Persalinan Preterm pada Ny “N” yaitu dilakukan dengan pemberian asuhan yang sesuai standar operasional prosedur serta melakukan upaya pencegahan komplikasi terutama terjadinya gawat janin, partus lama, perdarahan postpartum, hipotermi, asfiksia dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) serta dilakukannya pemantauan dan asuhan dari kala I sampai kala IV.

Kesimpulan dari kasus yaitu asuhan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemantauan dan analisa data pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018 yakni dari kala I sampai kala IV, tidak ditemukannya komplikasi pada ibu ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal, serta bayi mengalami asfiksia ringan disertai BBLR.

Kata Kunci : Persalinan Preterm, 7 Langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 06, 2018

Name : Indah
Student Reg. No. : 70400115005
Title : The Intranatal Midwifery Care Management on Mrs. "N" with the Preterm Gestational Age at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital, Date July 01, 2018

Normal childbirth is the process of releasing the conception results from the uterus at 37-42 weeks of gestation marked by uterine contraction causing the thinning and dilatation of the cervix. The occurrence of normal childbirth does not mean there are no complications, but many possibilities can occur. One of the complications is preterm labor.

The research was a case study with the Intranatal Midwifery Care Management approach on Mrs. "N" with the Preterm Gestational Age at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 based on Varney's 7 steps and documentation in the form of SOAP.

The Preterm Labor Care Management on Mrs. "N" was carried out by providing an appropriate care based on the standard operating procedures and taking measures to prevent complications, particularly the occurrence of fetal distress, prolonged labor, postpartum hemorrhage, hypothermia, asphyxia and Low Birth Weight (LBW) as well as conducted a monitoring and upbringing from stage I to IV.

The conclusion of the case was that the Varney's 7-step care and documentation in the form of SOAP performed on the midwifery problem-solving process were carried out in the form of monitoring and data analysis on Mrs. "N" with the Preterm Gestational Age at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018, namely from the first to fourth stage, the absence of complications on the mother was characterized by vital signs within normal limits, and the baby had mild asphyxia with LBW.

Keywords : Preterm Labor, Varney's 7 Steps



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar yang terjadi pada kehamilan yang cukup bulan (37–42 minggu) dengan ditandai adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya penipisan, dilatasi *serviks*, dan mendorong janin keluar melalui jalan lahir dengan presentase belakang kepala tanpa alat atau bantuan (lahir spontan) serta tidak ada komplikasi pada ibu dan janin (Eka Puspita, 2014).

Terjadinya persalinan normal bukan berarti tidak ada permasalahan dalam persalinan, tetapi melainkan banyak kemungkinan hal yang bisa terjadi dimana dinamakan dengan komplikasi pada saat persalinan. Komplikasi persalinan adalah kondisi dimana ibu dan janinnya terancam yang disebabkan oleh gangguan langsung saat persalinan serta menjadi salah satu penyebab terjadinya kematian ibu bersalin maupun janinnya.

Adapun beberapa komplikasi yang terjadi pada saat persalinan di antaranya Ketuban pecah dini (KPD), persalinan *preterm*, kehamilan *postmatur*, malposisi dan malpresentasi, *pre-eklampsia* dan *eklampsia*, kehamilan kembar (*gemelli*), dan *distosia* bahu. Hal ini dapat menyebabkan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) pada saat persalinan.

Menurut laporan World Health Organization (WHO) tahun 2014 bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia mencapai 289.000 jiwa. Dimana terbagi atas beberapa Negara, antara lain Amerika Serikat 9.300 jiwa, Afrika Utara 179.000 jiwa dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Angka kematian ibu di Negara-Negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 190 jiwa, Vietnam 49 jiwa, Thailand 26 jiwa, Brunei 27 jiwa, Malaysia 29 jiwa. Sebagian besar kematian ibu terjadi di negara berkembang karena kurang mendapat akses pelayanan kesehatan, kekurangan fasilitas, terlambatnya pertolongan persalinan disertai keadaan social ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah (WHO, 2014).

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator untuk mencerminkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta cerminan dari status kesehatan suatu negara. Hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015, AKI yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup yang mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB sendiri menurut survey penduduk antar sensus (SUPAS) pada tahun 2015 yaitu 22,23 per 100.000 kelahiran hidup, yang artinya sudah mencapai target MDG 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup (KemenKes, 2016).

Indonesia masih tergolong tinggi pada Negara-negara di ASEAN (Association South East Asian Nation) dan menjadi salah satu Negara yang menjalankan program Milleneum Development Goals (MDG's), memiliki

target menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 20 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016, AKI mencapai 153 orang per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB terbanyak (48%) terjadi pada bulan pertama atau masa neonatus, dan penyebab terbanyak (44%) kematian neonatus adalah prematuritas. Demikian juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, AKI yang didapatkan sebanyak 14 orang atau 111 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB yang dilaporkan sebanyak 87 kematian Neonatal (7 per 1000 kelahiran), 16 kematian Bayi (1 per 1000 kelahiran) terjadi pada tahun 2015 (DinKese, 2016).

Penyebab terjadinya kematian bayi dan balita serta berbagai komplikasi yang tinggi pada masa neonatus, sebagian besar disebabkan karena gangguan pernapasan dan prematuritas. Prematuritas atau persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan 20 sampai 36 minggu. Mekanisme terjadinya persalinan preterm dimulai dengan adanya kontraksi uterus dan *dilatasi serviks* serta ketuban pecah, kejadian ini sebagai keadaan patologis (Nur Mukmin, 2016).

Angka kejadian persalinan preterm pada umumnya adalah sekitar 6-10%. Hanya 1,5% persalinan terjadi pada umur kehamilan kurang dari 32 minggu dan 0,5% pada kehamilan kurang dari 28 minggu. Secara biologis, mekanisme persalinan preterm disebabkan oleh *hipoksia*, *stress oksidatif*, dan

infeksi maternal. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) menyatakan bahwa bayi premature adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu atau kurang. Adapun faktor penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan 40-60%, *preeklampsia* 20-30%, infeksi 20-30% serta kejadian ketuban pecah dini (KPD) yang tidak segera mendapatkan penanganan sehingga KPD menjadi masalah yang serius yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal serta menyebabkan infeksi pada ibu (Zainal Alim, Yeni Agus Safitri, 2016).

Permasalahan yang terjadi pada persalinan preterm bukan saja pada kematian perinatal, melainkan bayi *prematum* ini sering pula disertai dengan kelainan seperti RDS (*Respiratory Distress Syndrome*), perdarahan dan kelainan neorologik karena persalinan dan kelahiran prematur masih merupakan komplikasi berbahaya dengan akibat yang signifikan pada ibu dan bayi baru lahir (Prawirohardjo, 2014).

Kesulitan utama dalam persalinan preterm adalah perawatan bayi preterm, yang semakin muda usia kehamilannya semakin besar morbiditas dan mortalitas. Menurut Saifuddin (2007) faktor yang menimbulkan terjadinya persalinan preterm seperti faktor maternal yang meliputi riwayat premature sebelumnya, umur ibu, paritas, *plasenta previa*, kelainan serviks (*serviks inkompetensi*), *hidramnion*, infeksi intraamnion, hipertensi dan trauma. Faktor janin diantaranya kehamilan kembar (*gemelli*), kematian janin dalam rahim/Intra Uterin Fetal Death (*IUFD*), dan cacat bawaan (kelainan

kongenital), serta faktor perilaku meliputi ibu yang merokok dan minum alkohol (Tri Anasari, 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa menunjukkan jumlah persalinan pada periode 2015 yaitu 1.804 persalinan yang diantaranya terdapat 65 (3,60%) kasus persalinan preterm. Pada tahun 2016 yaitu 1.578 persalinan yang diantaranya 90 (5,70%) kasus persalinan preterm, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 2.642 persalinan yang diantaranya terdapat 87 (0,52%) kasus persalinan preterm (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf, 2017).

Upaya dalam menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, perlu dilakukan upaya pencegahan terjadinya kejadian persalinan preterm di masa yang akan datang, salah satu diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan ketat dan membutuhkan program yang terarah dalam memberikan edukasi dan penanganan medik yang tepat terhadap faktor-faktor resiko yang memicu terjadinya proses persalinan preterm, agar mendapat asuhan persalinan yang aman dan memuaskan. Sehingga perlu dilakukan asuhan pada ibu hamil untuk mendeteksi dini terjadinya persalinan preterm karena diagnosis yang cepat dan penanganan yang adekuat dapat menyelamatkan janin.

Maka dari itu, berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan tinjauan kasus untuk membahas masalah persalinan preterm

dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “N” dengan Usia kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juni 2018”.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup dalam studi kasus tersebut adalah Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juni 2018.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dilaksanakannya asuhan kebidanan pada kasus persalinan preterm dengan manajemen asuhan kebidanan sesuai standar dan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

a. Dilaksanakannya pengkajian dan analisis data dasar pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.

b. Dilaksanakannya perumusan diagnosa atau masalah aktual pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.

c. Dilaksanakannya perumusan diagnosa atau masalah potensial pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.

- d. Dilaksanakannya pengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.
- e. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.
- f. Dapat melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.
- g. Dilaksanakannya evaluasi tindakan asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.
- h. Dilaksanakannya pendokumentasian hasil temuan asuhan kebidanan pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian pada kasus ini adalah :

1. Manfaat Ilmiah

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan khususnya persalinan preterm serta sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah dan instansi terkait dengan faktor yang

mempengaruhi terjadinya persalinan preterm sehingga petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan dan konseling untuk mengantisipasi komplikasi kehamilan dan persalinan, serta bagi dinas kesehatan dapat melihat dari berbagai segi faktor yang terkait dengan kesehatan.

3. Manfaat bagi Institusi

Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu hasil penemuan dan kajian serta bahan acuan atau pedoman bagi institusi jurusan kebidanan untuk penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sehingga dapat mengaplikasikannya dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan persalinan preterm.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Penulis membaca dan mempelajari literatur–literatur yang relevan dengan kasus persalinan preterm dalam pembahasan karya tulis ilmiah.

2. Studi Kasus

Melaksanakan studi kasus pada ibu bersalin dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengumpulan data, analisa dan perumusan diagnosa/masalah aktual dan

potensial, perencanaan tindakan, evaluasi dan pendokumentasian terhadap asuhan kebidanan pada ibu dengan persalinan preterm.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber pada catatan medik klien, baik dari bidan, dokter, maupun data penunjang lainnya yang dapat menjadi kontribusi menyelesaikan penulisan.

4. Diskusi

Mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan, pembimbing dan institusi yang mengenai klien dengan persalinan preterm demi kelancaran karya tulis ilmiah ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang persalinan

1. Pengertian persalinan

Persalinan dapat didefinisikan secara medis sebagai kontraksi uterus yang teratur dan semakin kuat, menciptakan penipisan dan dilatasi *serviks* di sepanjang waktu, yang menimbulkan dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui jalan lahir melawan resistansi jaringan lunak, otot, dan struktur tulang panggul (Betsy B.Kennedy, 2013).

Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan (37-42 minggu) atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta selaput janin dari tubuh ibu atau proses pengeluaran produk konsepsi yang viable melalui jalan lahir (Dewi Setiawati, 2013).

Persalinan normal adalah persalinan dengan presentase belakang kepala yang berlangsung secara spontan dengan lama persalinan dalam batas normal, beresiko rendah sejak awal persalinan hingga partus dengan masa gestasi 37-42 minggu (World Health Organization).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa persalinan normal adalah proses pengeluaran seluruh hasil konsepsi yang terjadi pada kehamilan 37-42 minggu tanpa disertai komplikasi baik pada ibu maupun janinnya dengan lahir spontan.

2. Tujuan asuhan persalinan

Salah satu hal penting dalam proses persalinan adalah asuhan intrapartum, yang bertujuan untuk meningkatkan jalan lahir yang aman bagi ibu dan bayi, meminimalkan resiko pada ibu dan bayi, dan meningkatkan hasil kesehatan yang baik dan pengalaman yang positif.

Tujuan dari asuhan persalinan normal adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perilaku coping ibu
- b. Memberikan lingkungan yang aman bagi ibu dan janin
- c. Mendukung ibu dan keluarganya melewati pengalaman persalinan dan melahirkan
- d. Memenuhi keinginan dan pilihan ibu selama persalinan ketika memungkinkan
- e. Memberikan tindakan rasa nyaman dan meredakan nyeri jika perlu
- f. Memberikan ketenangan dan informasi, yang disertai dengan perhatian terhadap kebutuhan budaya ibu dan keluarga
- g. Untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya (Eka Puspita, 2014).

3. Penyebab terjadinya persalinan

Teori terjadinya persalinan merupakan teori yang kompleks, dimana faktor-faktor, hormonal, prostaglandin, struktur uterus, sirkulasi uterus, pengaruh syaraf dan nutrisi memegang peranan. Perubahan biokimia dan biofisika telah banyak mengungkapkan bagaimana

dimulainya suatu persalinan karena menurunnya kadar hormon estrogen dan progesterone 1-2 minggu sebelum persalinan (Firdayanti, Arifuddin Ahmad, 2007)

Beberapa teori yang menyatakan penyebab terjadinya proses persalinan, antara lain :

a. Teori penurunan kadar *prostaglandin*

Progesteron merupakan hormon yang berperan penting untuk mempertahankan kehamilan. Hormon ini meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu, tapi pada akhir kehamilan terjadi penurunan kadar progesteron yang mengakibatkan peningkatan kontraksi uterus karena adanya sintesa prostaglandin di uterus.

b. Teori penurunan *progesteron*

Progesteron merupakan hormon penting dalam menjaga kehamilan tetap terjadi hingga masa persalinan. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta, yang akan berkurang seiring terjadinya penebaran plasenta yang terjadi pada usia kehamilan 28 minggu, dimana terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu.

c. Teori rangsangan *estrogen*

Hormon *estrogen* merupakan hormon yang dominan saat hamil. Hormon ini memiliki dua fungsi, yaitu meningkatkan sensitivitas otot rahim dan memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti

rangsangan *oksitosin*, rangsangan *prostaglandin* dan rangsangan mekanis.

d. Teori reseptor *oksitosin* dan kontraksi *Braxton hicks*

Oksitosin adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis parts posterior. Perubahan keseimbangan *estrogen* dan *progesterone* dapat mengubah sensitivitas otot rahim sehingga terjadi *Braxton hicks*. Menurunnya konsentrasi *progesterone* akibat tuanya kehamilan, menyebabkan *oksitosin* meningkat sehingga persalinan dapat dimulai.

4. Tanda-tanda mulainya persalinan

Adapun tanda-tanda permulaan persalinan, sebagai berikut :

a. *Lightening*

Menjelang minggu ke 36 kehamilan, tanda pada primigravida adalah terjadinya penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul yang disebabkan karena *Braxton hicks*, ketegangan dinding perut, ketegangan *ligamentum rotundum*, dan gaya berat janin dimana kepala ke arah bawah. Berbeda dengan multipara yang gambarannya tidak begitu jelas kepala janin baru masuk pintu atas panggul menjelang persalinan.

b. Terjadinya his atau kontraksi

Saat kehamilan trimester pertama uterus akan sering mengalami kontraksi ringan. Pada trimester kedua dapat dideteksi dengan

pemeriksaan bimanual, serta saat trimester ketiga biasanya kontraksi ini sangat jarang dan meningkat pada satu atau dua minggu sebelum persalinan. Dengan semakin tuanya kehamilan, pengeluaran *estrogen* dan *progesteron* semakin berkurang, sehingga *oksitosin* dapat menimbulkan kontraksi yang lebih sering atau biasa disebut his palsu. His yang menimbulkan pembukaan *serviks* dengan kecepatan tertentu disebut his efektif (Eka Puspita, 2014).

c. *Bloody Show*

Lendir disekresi sebagai hasil *proliferasi* kelenjar lendir *serviks* pada awal kehamilan. Lendir mulanya menyumbat leher rahim, sumbatan yang tebal pada mulut rahim terlepas, sehingga menyebabkan keluarnya lendir yang berwarna kemerahan bercampur darah dan terdorong keluar oleh kontraksi yang membuka mulut rahim yang menandakan bahwa mulut rahim menjadi lunak dan membuka. Keluarnya lendir bercampur darah ini berasal dari pembukaan *kanalis servikalis*, sedangkan terjadinya pengeluaran darah disebabkan oleh robeknya pembuluh darah ketika *serviks* membuka (Elisabet Siwi Walyani, 2015).

d. *Dilatasi dan effacement*

Dilatasi adalah terbukanya *kanalis servikalis* secara berangsur-angsur akibat pengaruh his. *Effacement* adalah pendataran atau pemendekan *kanalis servikalis* yang semula panjang 1–2 cm menjadi

hilang sama sekali, sehingga tinggal hanya *ostium* yang tipis seperti kertas.

5. Tahap-tahap dalam proses persalinan

Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 fase atau kala, yaitu :

a. Kala I

Kala I sebagai kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol sampai lengkap (10 cm). pada permulaan his kala pembukaan yang berlangsung tidak begitu kuat sehingga ibu masih bisa berjalan-jalan. Proses pembukaan serviks sebagai akibat his dibagi menjadi 2 fase, yaitu :

1) Fase Laten

Berlangsung selama 7-8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm.

2) Fase aktif

Berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 bagian fase, yaitu :

a) Fase Akselerasi, dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.

b) Fase Dilatasi Maksimal (*steady*), dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.

c) Fase Deselerasi, pembukaan menjadi lambat sekali dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap.

b. Kala II

Kala II sebagai kala pengeluaran. Kala ini dimulai dengan pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. Pada pengeluaran janin, *histerkoordinir*, kuat, cepat dan lebih lama kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekanan otot dasar panggul yang secara *reflekstoris* menimbulkan mencedan. Karena tekanan pada *rectum*, ibu merasa seperti ingin buang air besar, anus terbuka saat ada his, kepala janin mulai kelihatan, *vulva* membuka dan *perineum* menonjol dengan *his*, serta dipimpin mencedan maka lahirlah kepala, diikuti oleh seluruh badan janin. Kala II pada *primigravida* 1½ -2 jam dan *multigravida* ½-1 jam.

c. Kala III

Setelah kala II, kontraksi uterus berhenti sekitar 5–10 menit. Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. *Uterus* terasa keras dengan *fundus uteri* setinggi pusat dan berisi *plasenta* yang tebal 2 kali dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, timbul *his* pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5-10 menit seluruh *plasenta* terlepas, terdorong ke dalam *vagina* dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas *simpisis* atau *fundus uteri* seluruh proses biasanya berlangsung 5-10 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran *plasenta* disertai dengan pengeluaran lendir kira-kira 100-200 cc (Dewi Setiawati, 2013).

d. Kala IV

Kala IV untuk melakukan observasi karena perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Pada saat proses persalinan berlangsung, ada beberapa hal yang harus diamati, diawasi oleh tenaga kesehatan (bidan dan dokter) yaitu nyeri, lama pembukaan, lama meneran, robekan *perineum*, lama pelepasan *plasenta* dan *volume* perdarahan. Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam disebut periode immediate postpartum. Pada masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya pendarahan karena atonia uteri. Oleh karena itu, bidan dengan teratur harus melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lochea, tekanan darah, dan suhu (Siti Saleha, 2009).

6. Faktor yang mempengaruhi persalinan

Proses persalinan dapat berjalan normal jika dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ibu (*power, passage, psikologis*), faktor janin, plasenta, dan air ketuban (*passenger*), serta faktor penolong persalinan.

a. Tenaga (*Power*)

Kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan adalah *his*, kontraksi otot-otot perut, kontraksi *diafragma*, dan aksi dari ligament.

1) His atau Kontraksi uterus

His/Kontraksi uterus adalah kontraksi otot-otot uterus dalam persalinan. *His* adalah gelombang kontraksi ritmis otot polos dinding uterus yang dimulai dari daerah *fundus uteri* dimana *tuba*

fallop memasuki dinding uterus. Pada waktu kontraksi, otot-otot *rahim* menguncup sehingga menjadi lebih kecil serta mendorong janin dan kantong amnion ke arah segmen bawah rahim dan *serviks*. Perubahan yang terjadi akibat *his* adalah pada uterus teraba keras/padat karena kontraksi. Tekanan hidrostatik air ketuban dan tekanan *intrauterine* naik serta menyebabkan *serviks* menjadi mendatar (*effacement*) dan terbuka (*dilatasi*).

2) Kekuatan mengedan ibu

Yang paling menentukan dalam tahapan ini adalah proses mengejan ibu yang dilakukan dengan benar, baik dari segi kekuatan maupun keteraturan. Ibu harus mengejan sekuat mungkin seiring dengan instruksi yang diberikan. Biasanya ibu diminta menarik napas panjang dalam beberapa kali saat kontraksi terjadi lalu buang secara perlahan. Ketika kontraksi mencapai puncaknya, doronglah janin dengan mengejan sekuat mungkin. Tenaga mengejan ini hanya dapat berhasil ketika kala I pembukaan sudah lengkap dan paling efektif sewaktu kontraksi rahim/uterus.

b. *Passenger* (Janin, plasenta, dan air ketuban)

1) Janin

Janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin. Selama janin dan plasenta berada dalam rahim

belum tentu pertumbuhannya normal, adanya kelainan genetik dan kebiasaan ibu yang buruk dapat menjadikan pertumbuhannya tidak normal (Elisabet Siwi Walyani, 2015).

2) Plasenta

Plasenta berbentuk bundar atau oval, ukuran diameter 15-20 cm tebal 2-3 cm, berat 500-600 gram. Plasenta pun demikian harus melewati jalan lahir sehingga bisa dianggap bagian dari penumpang yang menyertai janin. Plasenta biasanya terlepas dalam 4-5 menit setelah bayi lahir, mungkin pelepasan setelah bayi lahir. Dan juga selaput janin menebal dan berlipat-lipat karena pengecilan dinding rahim karena adanya kontraksi dan retraksi rahim terlepas dan sebagian karena tarikan waktu plasenta lahir. Jadi secara singkat faktor yang sangat penting dalam pelepasan plasenta adalah retraksi dan kontraksi otot-otot rahim setelah bayi lahir.

3) Air ketuban

Amnion pada kehamilan aterm merupakan suatu *membran* yang kuat dan ulet tetapi lentur. *Amnion* adalah jaringan yang menentukan hampir semua kekuatan regangan *membran* janin yang mencegah ruptur atau robekan. Seiring dengan penambahan usia kehamilan, aktifitas organ tubuh juga mempengaruhi cairan ketuban. Saat usia kehamilan >25 minggu, rata-rata air ketuban dalam rahim

239 ml, yang kemudian meningkat menjadi 984 ml pada usia kehamilan 33 minggu (Elisabet Siwi Walyani, 2015).

4) Jalan Lahir (*passage*)

Passage merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, *serviks*, dan vagina.

7. Mekanisme persalinan

Sebenarnya mekanisme persalinan mengacu pada bagaimana janin menyesuaikan dan meloloskan diri dari panggul ibu, yang meliputi:

a. Turunnya kepala janin

Kepala janin mengalami penurunan terus-menerus dalam jalan lahir sejak kehamilan trimester III, antara lain masuknya bagian terbesar janin kedalam pintu atas panggul (PAP) yang pada primigravida 38 minggu atau selambat-lambatnya awal kala II.

b. *Fleksi*

Setelah kepala janin berada dalam sikap *fleksi*, dan disertai dengan adanya his dan tahan dari dasar panggul yang makin besar, maka kepala janin makin turun dan semakin *fleksi* sehingga dagu janin menekan pada dada dan belakang kepala (*oksiput*) menjadi bagian bawah. Terjadinya *fleksi* maksimal pada janin dapat menyesuaikan diri dengan ukuran panggul ibu terutama bidang sempit panggul yang ukuran melintang 10 cm.

c. Rotasi dalam/putaran paksi dalam

Makin turunnya kepala janin dalam jalan lahir, kepala janin akan berputar sedemikian rupa sehingga diameter terpanjang rongga panggul atau diameter *anterior posterior* kepala janin akan bersesuaian dengan diameter terkecil *anterior posterior* pintu bawah panggul (PBP). Hal ini mungkin karena kepala janin bergerak spiral atau seperti sekrup sewaktu turun dalam jalan lahir. Bahu tidak berputar bersama-sama dengan kepala akan membentuk sudut 45°. Keadaan ini disebut dengan putaran paksi dalam dan ubun-ubun kecil berada dibawah simpisis.

d. *Ekstensi*

Setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai didasar panggul, terjadilah *ekstensi* atau *depleksi* dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada PBP mengarah kedepan dan ke atas, sehingga kepala harus mengadakan *ekstensi* untuk melaluinya kalau tidak terjadi *ekstensi* maka kepala akan tertekan pada pertemuan dan menembusnya. Dengan *ekstensi* ini maka *sub.oksiput* bertindak sebagai *hipomochlin* (sumbu putar). Kemudian larilah berturut-turut *sinsiput* (puncak kepala), dahi, hidung, mulut, dan akhir dagu.

e. Rotasi luar/putaran paksi luar

Setelah *ekstensi* kemudian diikuti dengan putaran paksi luar yang pada hakikatnya kepala janin menyesuaikan kembali dengan sumbu panjang bahu, sehingga sumbu panjang bahu dengan sumbu panjang kepala janin berada pada satu garis lurus.

f. Ekspulsi

Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai dibawah *sympisis* dan *hipomochilin* untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu belakang menyusul dan selanjutnya seluruh tubuh bayi lahir searah dengan paksi jalan lahir (Naomy Marie Tando, 2013).

B. Tinjauan Khusus tentang Persalinan Preterm

1. Pengertian persalinan preterm

Persalinan preterm merupakan kejadian kontraksi uterus secara teratur yang menyebabkan penipisan atau *dilatasi serviks* sebelum kehamilan berusia lengkap 37 minggu (Janet Medforth, 2012).

Persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu (antara 20-37 minggu) atau dengan berat janin kurang dari 2500 gram (Dhina Novi Ariana, 2012).

Jadi dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persalinan preterm adalah persalinan yang diawali dengan terjadinya kontraksi uterus usia kehamilan 20-37 minggu dengan berat janin kurang dari 2500 gram.

2. Etiologi persalinan preterm

Beberapa faktor yang berkaitan dengan kejadian persalinan preterm antara lain :

- a. *Hipertensi*
- b. Usia ibu < 18 tahun atau > 40 tahun
- c. Perkembangan janin terhambat


- d. *Solusio plasenta* dan *Plasenta previa*
 - e. Ketuban pecah dini
 - f. *Infeksi intrauterine*
 - g. *Serviks inkompetens*
 - h. Kehamilan ganda (*gemelli*)
 - i. Riwayat persalinan preterm sebelumnya
 - j. Kurang gizi
 - k. Merokok (Tri Anasari, 2016).
3. Klasifikasi persalinan preterm
- a. Usia kehamilan 32–36 minggu disebut dengan persalinan prematur (*preterm*).
 - b. Usia kehamilan 28–32 minggu disebut persalinan sangat prematur (*very preterm*).
 - c. Usia kehamilan 20–27 minggu disebut persalinan ekstrim prematur (*extremely preterm*) (World Health Organization).
4. Tanda dan gejala persalinan preterm
- a. Pecahnya selaput ketuban yang menjadi tanda awal terjadinya persalinan preterm.
 - b. Terjadi pada usia kehamilan 22–37 minggu.
 - c. Presentase janin rendah sampai mencapai *spina ishiadika*.
 - d. Adanya nyeri pada punggung bawah (*low back pain*).


- e. Perdarahan bercak.
 - f. Perasaan menekan daerah *serviks* (perubahan *serviks* yang progresif)
 - g. Kontraksi yang berulang (2-3 kali dalam 10 menit)
 - h. Pemeriksaan *serviks* menunjukkan telah terjadi pembukaan >2 cm serta penipisan 50–80% (Prawirohardjo, 2014).
5. Patofisiologi persalinan preterm

Persalinan preterm terjadi karena disebabkan turunnya kadar hormon *progesteron* dan juga adanya peran mediator *inflamasi*. *Progesteron* berperan untuk menekan kontraksi *myometrium* dan menghambat produksi *prostaglandin*. Mediator *inflamasi* (*sitokin*) berasal dari infeksi dan perdarahan *intrauterin* karena terjadinya kontraksi *uterus*, pecah ketuban dan pematangan *serviks*. Enzim *sitokin* dan *prostaglandin*, *ruptur membran*, ketuban pecah, aliran darah ke plasenta berkurang mengakibatkan nyeri dan aktifitas yang menimbulkan kontraksi uterus sehingga menyebabkan persalinan prematur.

Bagan 1.1

Bagan patofisiologi persalinan preterm





Sumber : Sarwono Prawirohardjo, 2014

6. Diagnosis persalinan preterm

Diagnosis suatu persalinan preterm didasarkan atas gejala klinis yang ditandai dengan suatu kontraksi rahim yang teratur dengan interval <5–8 menit pada kehamilan 20–37 minggu, yang disertai dengan beberapa gejala. Pada kehamilan 28-34 minggu apabila ditemukan tanda-tanda

adanya kontraksi uterus 3 kali/lebih per menit, penipisan *serviks* >50% dapat diperkirakan bahwa persalinan akan terjadi dalam waktu 6 jam sampai dengan 11 hari (Fadlun, 2013).

7. Prognosis/komplikasi persalinan preterm

Komplikasi bisa terjadi pada ibu maupun bayinya, yakni :

a. Terhadap ibu

Distress maternal harus dicegah karena memburuknya kondisi wanita/ibu akan mempengaruhi keadaan ibu dan janin yang belum lahir. Memperhatikan asuhan nutrisi pada ibu sejak awal persalinan dan segera mencari bantuan dokter jika persalinan tidak mengalami kemajuan.

b. Terhadap bayi

1) Mudah terkena infeksi

Bayi prematuritas mudah sekali mengalami infeksi karena daya tahan tubuh masih lemah, kemampuan leukosit masih kurang dan pembentukan antibody belum sempurna. Oleh karena itu tindakan preventif sudah dilakukan sejak antenatal sehingga tidak terjadi persalinan dengan prematuritas.

2) Asfiksia

Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat segera bernapas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Hal ini disebabkan oleh

hipoksia janin dalam uterus dan hipoksia ini berhubungan dengan faktor-faktor yang timbul dalam kehamilan, persalinan, atau segera setelah bayi lahir. Akibat-akibat akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak dilakukan dengan sempurna (Nadyah, 2013).

Asfiksia terbagi atas 3 yaitu :

a) Asfiksia berat (Nilai APGAR 0-3)

1. Frekuensi jantung kecil, yaitu <40 kali per menit.
2. Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada.
3. Tidak ada usaha napas.
4. Bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna kelabu.
5. Bayi tidak dapat memberikan reaksi jika diberikan rangsangan.
6. Terjadi kekurangan oksigen yang berlanjut sebelum atau sesudah persalinan.

b) Asfiksia sedang (nilai APGAR 4-6)

1. Frekuensi jantung menurun menjadi 60-80 kali per menit.
2. Tonus otot biasanya dalam keadaan baik.
3. Usaha napas lambat.
4. Bayi tampak sianosis.
5. Bayi masih bisa bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan.

6. Tidak terjadi kekurangan oksigen yang bermakna selama proses persalinan.

c). Asfiksia ringan (nilai APGAR 7-10)

1. Takipnea dengan napas lebih dari 60 kali per menit.
2. Adanya retraksi sela iga.
3. Bayi tampak sianosis.
4. Bayi merintih.
5. Adanya pernapasan cuping hidung.
6. Bayi kurang aktivitas.
7. Dari pemeriksaan auskultasi diperoleh hasil *ronchi*, *rales*, *wheezing* positif (Vivian, 2014).

8. Dampak persalinan preterm

- a. Bayi dapat memiliki gangguan fisik maupun intelektualnya dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan dengan waktu yang cukup bulan.
- b. Gangguan respirasi (*respiratory*) yang terjadi pada umur kurang dari umur 1 bulan.
- c. Anoksia dan hipotermi
- d. Bayi berat lahir rendah (BBLR)
- e. Perdarahan *intraknial*

Hal ini terjadi karena lunaknya tulang tengkorak dan immaturitas jaringan otak, sehingga bayi preterm lebih rentan terdapat kompresi kepala (Verdani Leoni Edrin, 2014).


9. Penanganan persalinan preterm


Untuk mengurangi resiko terjadinya persalinan preterm dapat dilakukan sejak dini sebelum munculnya tanda-tanda persalinan. Diawali dengan pengenalan yang beresiko untuk diberi penjelasan dan dilakukan penilaian klinis terhadap persalinan preterm serta pengenalan kontraksi sedini mungkin, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Pemeriksaan *serviks* tidak lazim dilakukan pada kunjungan antenatal, sebenarnya pemeriksaan itu sangat bermanfaat cukup besar dalam meramalkan terjadinya persalinan preterm. Bila didapatkan serviks pendek (<1 cm) disertai dengan pembukaan yang merupakan tanda *inkompetensi serviks*, mempunyai resiko terjadinya persalinan preterm 3–4 kali.

Berikut ini bagan penatalaksanaan terhadap persalinan preterm, sebagai berikut :

Bagan 1.2

Bagan penatalaksanaan persalinan prematur





Sumber : Sarwono Prawirohardjo, 2014

Adapun penatalaksanaan persalinan preterm, antara lain :

1) Tatalaksana umum

Tatalaksana umum mencakup pemberian *tokolitik*, *kortikosteroid*, dan antibiotika *profilaksis*.

2) Tatalaksana khusus

a) Jika ditemui salah satu dari keadaan berikut ini, tokolitik tidak perlu diberikan dan bayi dilahirkan secara pervaginam atau perabdominam sesuai kondisi kehamilan.

1. Usia kehamilan di bawah 24 dan di atas 34 minggu
2. Pembukaan >3 cm
3. Ada tanda koriomnionitis (infeksi intrauterine), pre-eklampsia, atau perdarahan aktif.
4. Ada gawat janin
5. Janin meninggal atau adanya kelainan kongenital yang kemungkinan hidupnya kecil.

b) Lakukan terapi konservatif (ekspetan) dengan *tokolitik*, *kortikosteroid*, dan antibiotika jika syarat berikut ini terpenuhi :

1. Usia kehamilan antara 24-34 minggu
2. Dilatasi serviks kurang dari 3 cm
3. Tidak ada *koriomnionitis* (infeksi intrauterine), pre-eklampsia, atau perdarahan aktif.
4. Tidak ada gawat janin.

c) Tokolitik hanya diberikan pada 48 jam pertama untuk memberikan kesempatan pemberian kortikosteroid. Obat-obat tokolitik yang digunakan adalah :

1. *Nifedipin* : 3x10 mg per oral, atau

2. *Terbutalin sulfat* 1000 µg (2 ampul) dalam 500 ml infus NaCl 0,9% dengan dosis awal pemberian 10 tetes/menit tiap 15 menit hingga kontraksi hilang, atau
 3. *Salbutamol* :dosis awal 10 mg IV dalam 1 liter cairan infus 10 tetes/menit. Jika kontraksi masih ada, naikkan kecepatan 10 tetes/menit setiap 30 menit sampai kontraksi berhenti atau denyut nadi >120/menit kemudian dosis dipertahankan hingga 12 jam setelah kontraksi hilang.
- d) Berikan *kortikosteroid* untuk pematangan paru janin. Obat pilihannya adalah :
1. *Deksametason* 6 mg IM setiap 12 jam sebanyak 4 kali, atau
 2. *Betametason* 12 mg IM setiap 24 jam sebanyak 2 kali
- e) Antibiotika *profilaksis* diberikan sampai bayi lahir. Pilihan antibiotika yang rutin diberikan untuk persalinan preterm (untuk mencegah infeksi *streptokokus grup B*) adalah :
1. *Ampisilin* : 2 g IV setiap 6 jam, atau
 2. *Penisilin G*: 2 juta unit IV setiap 6 jam, atau
 3. *Klindamisin* : 3x300 mg PO (jika alergi terhadap penisilin)
- f) Antibiotika yang diberikan jika persalinan preterm disertai dengan ketuban pecah dini adalah *eritromisin* 4x400 mg per oral.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah persalinan preterm antara lain sebagai berikut :

- a. Hindari kehamilan pada ibu terlalu muda (<17 tahun) dan jarak kehamilan terlalu dekat.
- b. Menggunakan kesempatan pemeriksaan kehamilan agar memperoleh pelayanan antenatal yang baik.

Memeriksa kehamilan secara rutin untuk mencegah adanya gangguan pada pertumbuhan janin. Pemeriksaan rutin berguna untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang bisa terjadi pada janin. Dengan pendeteksian lebih awal akan memudahkan dalam penanganan sehingga kelahiran prematur bisa dicegah.

- c. Hindari gaya hidup dan pola makan sehari-hari yang tidak sehat

Pola makan dan gaya hidup yang tidak tepat seperti merokok, minum alkohol maupun mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba (*narkotik*). Dengan demikian, untuk mencegah persalinan prematur, salah satunya adalah dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan halal selama kehamilan serta asupan nutrisi berupa asam folat untuk perkembangan janin, mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, daging tanpa lemak, ikan dan jenis makanan sehat lainnya serta perbanyak minum air putih minimal 8 gelas untuk mencegah resiko terjadinya dehidrasi.

- d. Hindari kerja berat dan kebersihan lingkungan sekitar.

Selain dari menjaga pola hidup sehat dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk, ibu hamil juga dianjurkan olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup serta hindari stress yang berlebihan. Sehingga suami maupun keluarga berperan penting dalam memberikan dukungan spiritual dan psikologi agar ibu hamil tetap tenang, sabar dan ikhlas semasa kehamilan serta perbanyak bersujud dan berdoa agar proses persalinan nantinya dilancarkan tanpa ada komplikasi yang menyertai. Disamping itu, ibu hamil tetap memperhatikan lingkungan tempat tinggal. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman, sebaliknya lingkungan yang buruk sangat rentan infeksi pada janin.

Untuk perawatan bayi preterm baru lahir perlu diperhatikan keadaan umum, biometri, kemampuan bernapas, kelainan fisik, dan kemampuan minum. Keadaan kritis bayi prematur adalah kedinginan, pernapasan yang tidak adekuat, atau trauma. Suasana hangat diperlukan untuk mencegah hipotermi pada neonatus (suhu badan di bawah 36,5 °C), bila mungkin bayi sebaiknya dirawat dengan cara metode Kanguru untuk menghindarkan *hipotermi*. Kemudian dibuat perencanaan pengobatan dan asupan cairan. ASI diberikan lebih sering, tetapi bila tidak mungkin, diberikan dengan sonde atau dipasang infus. Semua bayi baru lahir harus mendapat nutrisi sesuai dengan kemampuan dan kondisi bayi (Sudarti, Afroh Fauziah,2012).

Untuk mencegah morbiditas dan mortalitas neonatus dalam persalinan preterm, adalah sebagai berikut :

a. Menghambat proses persalinan preterm dengan pemberian *tokolisis*

Pemberian tokolisis masih perlu dipertimbangkan bila dijumpai kontraksi uterus yang regular dengan perubahan *serviks* karena beberapa obat yang telah dipakai untuk menghambat persalinan tidak ada yang benar-benar efektif.

Tujuan pemberian *tokolisis* dalam persalinan preterm adalah :

- 1) Mencegah mortalitas dan morbiditas pada bayi premature.
- 2) Memberi kesempatan bagi terapi *kortikostereoid* untuk *menstimulir surfaktan paru janin*.
- 3) Memberi kesempatan *transfer intrauterine* pada fasilitas yang lebih lengkap
- 4) Optimalisasi personel.

Beberapa macam obat yang dapat digunakan sebagai tokolisis, adalah :

- 1) *Kalsium antagonis* : *Nifedipin* 10 mg/oral diulang 2–3 kali/jam, dilanjutkan tiap 8 jam sampai kontraksi hilang. Obat dapat diberikan lagi jika timbul kontraksi berulang.
- 2) Obat *-mimetik* : seperti *terbutalin*, *ritrodin*, *isoksuprin*, *salbutamol* dapat digunakan, akan tetapi *nifedipin* mempunyai efek samping lebih kecil.

- 3) *Sulfas magnesikus* dan *antiprostaglandin*
- 4) (*Indometasin*): jarang dipakai karena efek samping pada ibu dan janin.
- 5) Untuk menghambat proses persalinan preterm selain *tokolisis*, dianjurkan membatasi aktivitas atau tirah baring.

b. Pematangan surfaktan paru janin dengan *kortikosteroid*

Pemberian terapi ini untuk pematangan surfaktan paru janin, menurunkan insidensi RDS (*Respiratory Distress Syndrome*), mencegah perdarahan *intreventrikular*, yang akhirnya menurunkan kematian neonatus. *Kortikosteroid* perlu diberikan jika usia kehamilan <35 minggu. Obat yang diberikan ini adalah *deksametason* atau *betametason*. Pemberian steroid ini tidak diulang karena resiko terjadinya pertumbuhan janin terhambat.

Pemberian siklus tunggal *kortikosteroid* adalah :

- 1) *Betametason* : 2 x 12 mg i.m dengan jarak pemberian 24 jam
- 2) *Deksametason* : 4 x 6 mg i.m dengan jarak pemberian 12 jam

c. Dilakukan pencegahan terhadap infeksi jika diperlukan (antibiotika)

Antibiotika hanya diberikan jika ibu hamil beresiko terjadinya infeksi seperti pada kasus ketuban pecah dini (KPD). Obat diberikan per oral, yang dianjurkan adalah : *eritromisin* 3 x 500 mg selama 3 hari. Obat pilihan lain adalah *ampisilin* 3 x 500 mg selama 3 hari atau dapat

menggunakan antibiotika lain seperti *klindamisin*. Tidak dianjurkan pemberian *ko-amosiklaf* karena resiko NEC (*Necrotizing Enterocolitis*).

d. Penanganan bayi baru lahir

- 1) Bebaskan jalan napas dilakukan dengan menghisap lendir menggunakan deele.
- 2) Mengeringkan bayi.
- 3) Mencegah kehilangan suhu tubuh.
- 4) Mencegah infeksi.

e. Resusitasi pada bayi

Persiapan resusitasi

1) Persiapan keluarga

Sebelum menolong persalinan, terlebih dahulu diskusikan pada keluarga mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kepada ibu dan bayi.

2) Persiapan tempat

Gunakan tempat yang hangat dan terang, tempat resusitasi hendaknya rata, bersih, keras dan kering. Kondisi rata diperlukan untuk mengatur posisi kepala bayi.

3) Persiapan alat

- a. 2 helai kain atau handuk
- b. Bahan ganjal bahu
- c. Deele

- d. Tabung dan sungkup
 - e. Sarung tangan
- 4) Persiapan diri
- a. Memakai APD
 - b. Lepaskan semua perhiasan dan mencuci tangan
 - c. Gunakan sarung tangan
 - d. Kotak alat resusitasi

Tahapan-tahapan dalam melakukan resusitasi :

1) Rangsangan taktil

Dilakukan dengan menepuk-nepuk atau menyentil telapak kaki bayi atau mengosok-gosok punggung bayi.

2) Ventilasi tekanan positif (VTP)

VTP dilakukan dengan sungkup dan balon resusitasi atau dengan sungkup dan tabung. Kecepatan ventilasi 40-60 kali per menit.

a. Frekuensi jantung >100

Dilakukan rangsangan taktil untuk merangsang frekuensi dan dalamnya pernapasan. VTP dihentikan

b. Frekuensi jantung 60-100

Lanjutkan VTP

c. Frekuensi jantung <60

Lanjutksn VTP dan mulai kompresi dada

d. Kompresi dada

Kompresi dilakukan di 1/3 bagian bawah tulang dada dibawah garis khayal yang menghubungkan kedua puting susu bayi. Rasio kompresi dada dan VTP dalam 1 menit adalah 90 kompresi dada dan 30 VTP (rasio 3:1). Dengan demikian kompresi dilakukan 3 kali dalam 1 ½ detik dan ½ detik untuk 1 kali ventilasi.

e. Memberikan obat-obatan

Pemberian obat-obatan dilakukan setelah usaha VTP dan kompresi dada tidak berhasil. Obat pertama yang diberikan adalah Epinefrin dosis 0,1-0,3 ml/kg/IV.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, masalah yang terjadi dalam masa kehamilan yakni salah satu komplikasinya adalah persalinan preterm dimana kejadian ini akan berdampak pada ibu maupun janinnya. Menurut para ulama tentang persalinan preterm yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 8, sebagai berikut :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادَنَّ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
 Terjemahnya :

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam

rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya (Departemen Agama RI).

Ayat ini termasuk salah satu pembuktian kekuasaan Allah swt. kini diuraikan ilmu-Nya yang sangat luas mencakup segala yang kecil dan yang besar. Tuhan Yang Maha Mengetahui-lah yang menentukan juga jenis ayat atau mukjizat yang diturunkannya kepada setiap rasul.

Salah satu objek pengetahuan-Nya adalah tentang kandungan. *Allah swt.* sejak dulu, sekarang, dan terus menerus, *mengetahui* keadaan janin sejak masih berbentuk sperma. Allah swt. mengetahui juga *apa yang dikandung oleh setiap perempuan* setelah pertemuan sperma dan ovum yang kemudian menempel di dinding rahim. Allah swt. mengetahui bukan saja jenis kelaminnya, tetapi berat badan dan bentuknya, keindahan dan keburukannya, usia dan rezekinya, masa kini dan masa depannya. *Dan Allah* mengetahui juga *apa*, yakni sperma serta ovum, yang *berkurang di dalam rahim* yang dapat mengakibatkan janin lahir cacat atau keguguran *dan Allah swt.* juga mengetahui apa yang *bertambah*, yakni tumbuh atau yang dalam keadaan kembar. *Dan segala sesuatu*, baik menyangkut kandungan maupun selain kandungan, pada *sisi-Nya* ada ukuran yang sangat teliti, baik dalam kualitas, kuantitas, maupun kadar, waktu dan tempatnya. Oleh karena itu, hanya *Allah-lah Yang Mengetahui semua yang gaib dan yang tampak, Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi* sehingga pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang gaib bagi-Nya.

Kata (تَغِيضُ) dipahami oleh al-Biqa'i dalam arti *berkurangnya sesuatu yang cair yang terdapat di suatu tempat yang sangat dalam*. Dari sini, ulama tersebut memahami penggalangan ayat tersebut dalam arti bahwa Allah swt. mengetahui penambahan cairan yang terdapat dalam rahim atas cairan yang ada sebelumnya yang merupakan unsur kelahiran dan yang kemudian dapat berakibat lahirnya anak kembar. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan (وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ) *apa yang berkurang di dalam rahim* dalam arti waktu yang berkurang dari masa kehamilan normal (kurang dari sembilan bulan) dengan yang *berlebih* adalah kelebihan dari masa normal itu (M. Quraish Shihab, 2002).

Kehamilan dan persalinan semua sudah diatur oleh Allah swt. kita hanya sebagai hamba (makhluk) ciptaan Allah swt. patut mensyukurinya. Begitu pula dengan seorang ibu sudah berkorban dan rela meluapkan semua tenaganya pada saat mengandung, akan tetapi Allah lah yang sudah mengatur segala-Nya, ibu hanya bertawakal dan ikhtiar dalam menghadapi kehamilan dan persalinan serta nifasnya.

Berdasarkan hikmah yang bisa diaplikasikan terhadap keluarga yaitu peran suami juga sangat penting dalam memberikan dukungan dan support kepada istrinya karena psikologis seorang ibu sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu maupun pertumbuhan janinnya. Suami dan keluarga seharusnya selalu mendampingi dan memberikan dukungan dan

melarangnya untuk berpikir yang hal-hal mitos yang beredar di lingkungan masyarakat yang bisa mempengaruhi psikologi ibu.

Mengingat akan pengorbanan seorang ibu saat dikandung dan dilahirkan sangatlah membuat kita semakin ingin berbakti kepada orang tua. Seperti firman Allah swt. dalam surah Al-Lukman ayat 14, sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِيَ عَامَيْنِ
أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya :

Dan Kami Perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapih dalam usia dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu (Departemen Agama RI).

Dalam konteks ayat ini Ibn Asyur mengemukakan riwayat bahwa Luqman ketika menyampaikan nasehat ini kepada anaknya, dia menyampaikan juga bahwa “Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku rela kepadamu, sehingga Dia tidak mewasiatkan aku kepadamu, tetapi Dia belum menjadikan engkau rela kepadaku, maka Dia mewasiatkanmu berbakti kepadaku.”

Kandungan ayat ini menyatakan : *Dan Kami wasiatkan* yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua *manusia menyangkut kedua orang ibu-bapaknya*, Pesan kami disebabkan karena *ibunya telah*

mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah malam, ketika saat manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapikannya dan penyapiannya di dalam dua tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak. Ini jika orang tuanya ingin menyempurnakan penyusuan. Wasiat kami itu adalah : *Bersyukurlah kepada-Ku!* Karena Aku yang menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagiaan kamu, dan bersyukur pulalah *kepada dua orang ibu bapak kamu* karena mereka yang Aku jadikan perantara kehadiran kamu di pentas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak kamu lakukan karena *hanya kepada-Kulah* - tidak kepada selain Aku – *kembali kamu* semua wahai manusia, untuk kamu pertanggungjawabkan kesyukuran itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Dengan demikian sepatutnya kita berbakti kepada orang tua karena keridhaan Allah swt. tergantung keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah swt. tergantung kemurkaan orang tua. Dari kedua ayat tersebut selalu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini semuanya sudah ada batasnya sesuai dengan kehendak-Nya. Allah swt. Yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi beserta isinya serta di-Lah mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini yang diciptakan

untuk umat-Nya sendiri. Maka sepatutnya kita harus bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan.

C. Tinjauan Asuhan Kebidanan Persalinan Preterm

1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien. Manajemen kebidanan adalah metode yang digunakan oleh bidan dalam menentukan dan mencari langkah-langkah pemecahan masalah serta melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasiennya dari gangguan kesehatan.

2. Langkah-langkah manajemen kebidanan

Langkah-langkah asuhan kebidanan menurut Varney (1997) yaitu:

a. Langkah I : Pengumpulan data dasar

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien yang meminta asuhan. Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu, Observasi, Wawancara dan Pemeriksaan. Secara garis besar diklasifikasikan sebagai data subyektif dan data obyektif.

Untuk memperoleh data dilakukan :

Anamnesa meliputi : melakukan tanya jawab kepada ibu untuk memperoleh data meliputi riwayat kesehatan, riwayat reproduksi, riwayat haid, riwayat obstetrik, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi.

Berdasarkan anamnesa didapatkan data subjektif, yakni Ibu datang dengan keluhan nyeri perut tembus belakang yang disertai dengan pelepasan lendir dan darah serta ada dorongan untuk meneran dengan umur kehamilan <37 minggu yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi umum, keadaan sosial ekonomi rendah, kurang gizi, anemia, perokok berat serta faktor umur. Pada kasus persalinan preterm didapatkan data subjektif kehamilan ibu <37 minggu. Usia kehamilan bisa ditentukan berdasarkan hari pertama haid terakhir, pergerakan janin pertama kali, mengukur tinggi fundus uteri pada saat pemeriksaan fisik. Bahkan pemeriksaan fisik pada saat *palpasi* bisa menentukan tafsiran berat janin.

Pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) yang merupakan suatu metode diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempelajari morfologi dan fungsi suatu organ. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis khususnya pada kasus persalinan preterm, pecahnya selaput ketuban yang menjadi tanda awal

terjadinya persalinan preterm serta pada pemeriksaan fisik menunjukkan telah terjadi pembukaan >2 cm serta penipisan 50-80%.

b. Langkah II : Interpretasi Diagnosa dan Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atau data–data yang dikumpulkan berdasarkan interpretasi yang benar atau data–data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasi sehingga dapat menemukan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan masalah dan diagnosa keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis melainkan tetap membutuhkan penanganan.

Diagnosis persalinan preterm dapat ditegakkan berdasarkan usia kehamilan. Usia kehamilan dapat diketahui berdasarkan hari pertama haid terakhir, pergerakan janin pertama kali serta pengukuran tinggi fundus uteri. Untuk memastikan usia kehamilan preterm serta taksiran berat janin dapat juga dipastikan dengan pemeriksaan *ultrasonografi* (USG). Masalah yang bisa muncul serta menjadi ancaman terjadinya persalinan preterm seperti pecahnya selaput ketuban, presentase janin rendah, adanya nyeri punggung bawah, perdarahan bercak, perasaan menekan daerah *serviks* serta terjadinya kontraksi yang berulang (2-3 kali dalam 10 menit).

c. Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau Masalah Potensial

Pada langkah ini mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman serta bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila masalah atau diagnosa potensial ini benar-benar terjadi.

Pada persalinan preterm masalah-masalah yang bisa terjadi pada ibu yaitu infeksi intrapartum, *solusio plasenta*, *plasenta previa*, *hemorrhagi antepartum*, *polihidramnion* serta ketuban pecah dini. Pecahnya selaput ketuban menjadi tanda awal terjadinya kontraksi. Dan jika pecah ketuban sebelum waktunya bisa menimbulkan komplikasi infeksi maternal maupun neonatal, persalinan prematur, *hipoksia*, *deformitas janin*, partus lama, infeksi pada masa nifas, serta meningkatkan kejadian seksio caesarea. Hal ini terjadi karena kurangnya air ketuban bisa menekan pada tali pusat sehingga terjadi hipoksia pada janin, kompresi muka dan anggota badan janin, serta terbukanya jalan masuk infeksi sehingga hormon prostaglandin merangsang kontraksi uterus. Masalah lain yang bisa terjadi yaitu perdarahan postpartum yang disebabkan oleh lain hal seperti setelah bayi dan plasenta lahir terjadi perdarahan yang masih aktif.

Dampak yang bisa ditimbulkan pada bayi baru lahir adalah bayi dapat memiliki gangguan fisik maupun intelektualnya dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan dengan waktu yang cukup bulan, gangguan respirasi yang terjadi pada umur kurang dari 1 bulan, serta *anoksia* karena lunaknya tulang tengkorak dan immaturitas jaringan otak, sehingga bayi preterm lebih rentan terhadap kompresi kepala.

Bayi baru lahir preterm belum dapat menstabilkan suhu tubuhnya dengan sendirinya seperti bayi baru lahir normal lainnya sehingga rentan terjadi *hipotermi*, serta organ-organ yang belum matur pada bayi baru lahir preterm berpotensi mengakibatkan kelainan pada otak sehingga dapat menimbulkan kejang pada bayi baru lahir preterm. Hal ini dikarenakan bayi seharusnya masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam rahim, serta disebabkan karena beberapa faktor sehingga harus terlahir dan hidup diluar rahim.

- d. Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera

Beberapa data yang menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data yang menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Mungkin juga memerlukan

konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pada pasien yang paling tepat.

Dalam persalinan preterm diperlukan kolaborasi dengan dokter kandungan untukantisipasi terjadinya komplikasi terhadap ibu yaitu dengan pemberian antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi intrapartum, pemberian *kortikosteroid* untuk pematangan paru dan penanganan perdarahan postpartum berupa pemasangan infus dan transfusi darah serta pemberian obat *oksitosik*. Selain kolaborasi dengan dokter kandungan dalam persalinan preterm juga perlu dilakukan kolaborasi dengan dokter anak. Untuk memberikan pertolongan pertama pada bayi baru lahir preterm. Penyediaan O₂, suction, infant warmer dan persiapan incubator serta obat-obat.

e. Langkah V : Merencanakan Asuhan yang Komprehensif/Menyeluruh

Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dilengkapi. Pada langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Suatu rencana asuhan harus sama-sama disetujui oleh bidan maupun pasien agar efektif, karena pada akhirnya pasien yang akan menentukan apakah tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu pada langkah ini diperlukan

diskusi antara tenaga kesehatan dengan pasien mengenai semua rencana tindakan termasuk penegasan dan persetujuan.

Merencanakan pemantauan DJJ, nadi, dan his tiap 30 menit. Memastikan DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit), Nadi (60-100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat. Merencanakan pemberian *kortikosteroid* yang bertujuan untuk pematangan paru pada janin. Perencanaan asuhan persalinan normal sesuai dengan APN. Merencanakan penanganan bayi baru lahir dengan cara bebaskan jalan napas, mengeringkan bayi, mencegah *hipotermi* dan mencegah infeksi, serta penyediaan suction, O₂, Infant warmer dan incubator untuk persiapan kemungkinan akan terjadi pada bayi baru lahir preterm.

Jika didapatkan persalinan preterm maka lakukan rehidrasi dan tirah baring serta lakukan terapi konservatif sesuai dengan usia kehamilan. Apabila usia kehamilan 32-34 minggu, berikan tokolitik, terapi kortikosteroid, dan pemberian antibiotik. Dan jika usia kehamilan >35 minggu, sudah ada pembukaan serviks >3 cm, terdapat gawat janin dan perdarahan maka lakukan persalinan pervaginam. Akan tetapi jika ada kontraindikasi maka persalinan berakhir dengan *seksio caesarea*.

Demikian juga halnya jika didapatkan ibu inpartu dengan ketuban pecah dini maka berikan antibiotik, batasi pemeriksaan dalam, lakukan observasi tanda indikasi dan fetal distress. Jika usia kehamilan preterm maka lakukan observasi dan pemberian kortikosteroid. Dan jika

usia kehamilan aterm tanpa ada indikasi lakukan persalinan pervaginam, akan tetapi jika ada kelainan obstetrik dan terdapat kontraindikasi untuk tidak memungkinkan terjadinya persalinan pervaginam sehingga dilakukan dengan seksio caesarea.

f. Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Pada langkah ini rencana asuhan mnyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah ke-5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, bidan tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi ini bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi serta bertanggung terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut.

Memantau DJJ, nadi, dan his tiap 30 menit. Memastikan DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit), Nadi (60-100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat. Pemberian *kortikosteroid* yang bertujuan untuk pematangan paru pada janin. Melakukan asuhan persalinan normal sesuai dengan APN. Melakukan penanganan bayi baru lahir dengan cara bebaskan jalan napas, mengeringkan bayi,

mencegah hipotermi dan mencegah infeksi, serta melakukan pertolongan pertama pada bayi baru lahir preterm untuk persiapan kemungkinan akan terjadi pada bayi baru lahir preterm. Penyediaan suction, O₂, Infant warmer dan incubator.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa.

Managemen kebidanan ini merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses managemen untuk mengidentifikasi mengapa proses managemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan berikutnya.

Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan persalinan pada ibu, kemungkinan akan terjadi perdarahan postpartum, partus lama, infeksi pada masa nifas. Begitu juga halnya dengan yang bisa terjadi pada bayinya yaitu kemungkinan terjadi hipotermi, asfiksia, kejang dan berat badan lahir rendah.

Pendokumentasian managemen kebidanan

Dokumentasi kebidanan adalah suatu sistem pencatatan atau pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan reproduksi dan semua kegiatan yang dilaksanakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan.

Dokumentasi SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh.

SOAP (subjektif, objektif, assesment, planning)

1. Subjektif

- a. Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis.
- b. Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien (ekspresi mengenai kekhawatiran dan keluhannya).

2. Objektif

- a. Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien
- b. Hasil pemeriksaan laboratorium / pemeriksaan diagnostik lain
- c. Informasi dari keluarga atau orang lain.

3. Assesment

- a. Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) data subjektif dan objektif.
- b. Diagnosis/masalah aktual
- c. Diagnosis/masalah potensial

d. Antisipasi diagnosis/masalah potensial/tindakan segera.

4. Planning

Pendokumentasian tindakan implementasi dan evaluasi, meliputi : asuhan mandiri, kolaborasi, tes diagnostic/laboratorium, konseling dan tindakan lanjut (follow up).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2015
PERAWATAN IBU HAMIL BERSALIN DENGAN KEHAMILAN PRETERM
(KURANG DARI 37 MINGGU)

Pengertian : Melakukan penanganan ibu bersalin dengan kehamilan <37 minggu

Tujuan : Mencegah morbiditas dan mortalitas pada bayi

Mempertahankan kondisi BBLR seoptimal mungkin

Prosedur : I. Prosedur persiapan

Persiapan pasien :

Keluarga diberitahu tentang maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan

Persiapan alat :

1. Lembar observasi
2. Partograf
3. Tensimeter, termometer
4. Timbangan bayi
5. Muscus section
6. Dopler
7. 1 set partus set dan hecing set
8. Obat-obatan yang diperlukan untuk ibu dan bayi
9. Infant warmer
10. Resusitasi set dewasa dan bayi
11. Status pasien
12. APD lengkap

II. Prosedur Pelaksanaan :

1. Ucapkan salam
2. Lakukan identifikasi
3. Lakukan cuci tangan
4. Pakai APD
5. Jelaskan kondisi kehamilan dan janin saat ini
6. Jelaskan kemungkinan resiko terhadap janin
7. Siapkan segala perlengkapan dan perawatan untuk pertolongan dan perawatan bayi dengan berkoordinasi dengan ruang neonatus
8. Kolaborasi dengan dokter obgyn dan dokter anak
9. Bereskan peralatan
10. Lakukan cuci tangan
11. Catat hasil observasi dan semua tindakan pada dokumen rekam medis.



BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY "N"
DENGAN USIA KEHAMILAN PRETERM DI RSUD
SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2018

No. register : xxxxxx
Tgl masuk : 01 Juli 2018, jam : 15.45 WITA
Tgl pengkajian : 01 Juli 2018, jam : 15.45 WITA
Tgl partus : 01 Juli 2018, jam : 22.25 WITA
Pengkaji : INDAH

KALA I

Langkah I : Pengumpulan data dasar

A. Identitas istri/suami

1. Nama : Ny "N" /Tn "M"
2. Umur : 26 tahun / 26 tahun
3. Nikah/lamanya : 1x / \pm 1 tahun
4. Suku : Makassar / Makassar
5. Agama : Islam / Islam
6. Pendidikan : SMA / SMA
7. Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
8. Alamat :Lambengi (Pallangga)

B. Data Biologis atau Fisiologis

1. Keluhan utama : Sakit perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 01 Juli 2018, jam 13.00 WITA dan pada jam 14.30 WITA dirasakan ada pelepasan air.

2. Riwayat Keluhan Utama

a. Sifat nyeri hilang timbul

b. Mules dirasakan dari perut tembus belakang dialami sejak tanggal 01 Juli 2018, jam : 07.30 WITA.

c. Usaha ibu mengatasi nyeri dengan mengelus-elus perut dan punggungnya

C. Riwayat Kesehatan yang lalu

1. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit asma, DM, hipertensi dan jantung

2. Ibu tidak memiliki riwayat alergi makanan dan obat-obatan

3. Ibu tidak pernah menderita penyakit yang harus dioperasi

4. Ibu tidak pernah menderita penyakit yang mengharuskan untuk rawat inap

D. Riwayat Kesehatan Keluarga

1. Ibu dan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit menular

2. Ibu dan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit keturunan/genetik

3. Ibu dan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit asma, hipertensi, jantung dan diabetes melitus

E. Riwayat Reproduksi

1. Riwayat menstruasi

Menarcho : ± 13 tahun

Siklus :28-30 hari
Durasi : 5-7 hari
Dismenorea : tidak pernah

2. Riwayat Kehamilan Sekarang

a. G1P0A0

b. Hari pertama haid terakhir (HPHT) : 31 Oktober 2017

c. Hari taksiran persalinan (HTP) : 7 Agustus 2018

d. Ibu mengatakan pergerakan janinnya dirasakan sejak usia kehamilan ± 5 bulan dan dominan terasa pada sebelah kanan perut ibu

e. Ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang ± 7 bulan

f. Antenatal care (ANC) : 6 x di Puskesmas Bontomarannu

Trimester I : 1 kali kunjungan

Trimester II : 2 kali kunjungan

Trimester III : 3 kali kunjungan

g. Imunisasi tetanus toxoid (TT) : TT₁ tanggal 18 Desember 2017

TT₂ tanggal 26 Februari 2018

3. Riwayat ginekologi

Tidak pernah mengalami kelainan ginekologi

4. Riwayat KB

Tidak pernah menjadi akseptor KB dalam bentuk apapun

F. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1. Pola nutrisi

Kebiasaan :

- a. Pola makan : nasi, sayur, lauk
- b. Frekuensi : 3 kali dalam sehari
- c. Kebutuhan minum : 6-7 gelas air putih sehari
1 gelas susu hamil perhari
- d. Selama inpartu ibu makan 1 kali dan minum sesuai kebutuhan.

2. Pola eliminasi

Kebiasaan BAB 1 kali sehari, BAK 3-4 kali sehari. Selama inpartu belum pernah BAB dan lebih sering BAK.

3. Pola istirahat

Kebiasaan ibu tidur siang 1-2 jam sehari dan tidur pada malam hari 6-8 jam.

Selama inpartu ibu tidak pernah tidur.

G. Pemeriksaan fisik

1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran komposmentis
- c. Tinggi badan : 155 cm
- d. Berat badan
Sebelum hamil : 45 kg
Sekarang : 51 kg
- e. LILA : 24 cm

f. Tanda-tanda Vital

TD :100/70 mmHg

N :78 x/menit

S : 36,5⁰C

P :22 x/menit

g. Pemeriksaan fisik terfokus

1. Mata

Simetris kiri dan kanan, sklera putih, conjungtiva merah muda

2. Leher

Tidak ada pembesaran vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan kelenjar tiroid

3. Payudara

Simetris kiri dan kanan, tampak hyperpigmentasi pada areola mammae, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ada pengeluaran colostrum saat dipencet.

4. Abdomen

Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra.

Leopold I : TFU 28 cm, 3 jari atas pusat, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

LP : 89 cm

TFU : 28 cm

TBJ : TFU x LP = 28 x 89 cm

DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/menit dan teratur.

His : 2 kali dalam 10 menit, durasi 20-25 detik

5. Genitalia

Tidak ada oedema, tidak varices, tampak pengeluaran lendir dan darah

VT I tanggal 01 Juli 2018, jam 15.45 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : tebal

Pembukaan : 3 cm

Ketuban : jernih

Presentase : uuk kanan lintang

Penurunan : Hodge I

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

6. Ekstremitas

Simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema, tidak varices, dan tidak nyeri tekan

H. Riwayat sosial ekonomi

1. Ibu adalah ibu rumah tangga
2. Ibu mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangganya
3. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga

I. Data psikologi

1. Suami dan keluarga senang dengan kehamilannya
2. Keluarga menunggu selama proses persalinannya
3. Ibu tidak pernah memperlakukan jenis kelaminnya anaknya

J. Data Spritual

Ibu dan keluarga selalu berdoa dan berdzikir semoga persalinannya berjalan dengan lancar sehingga ibu dan bayinya sehat dan selamat.

Langkah II : Interpretasi Diagnosa dan Masalah Aktual

Diagnosa : G1P0A0, gestasi 34 minggu 5 hari, situs memanjang, intrauterine, tunggal, hidup, keadaan ibu baik, janin baik, kala 1 fase laten.

Masalah : kecemasan

1. G1P0A0

DS :

- a. Ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
- b. Ibu merasakan pergerakan janinnya sejak usia kehamilan \pm 5 bulan dan sampai sekarang

DO:

- a. Tonus otot tampak kencang, tampak linea nigra dan striae livide

b. Palpasi abdomen

Leopold I : TFU 28 cm, 3 jari atas pusat, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV: BDP, 4/5

c. Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/ menit dan teratur

Analisa dan interpretasi data

- a. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama, pada pemeriksaan abdomen tonus otot perut tegang karena adanya pembesaran perut
- b. Tonus otot tegang tampak striae livide yaitu jaringan perut terbentuk karena pecahnya pembuluh darah perifer akibat peregangan abdomen selama kehamilan
- c. Berdasarkan pemeriksaan abdomen dengan cara palpasi ditemukan adanya bagian-bagian janin dan DJJ, hal ini menandakan ibu sedang hamil (Prawirohardjo, 2014).

2. Gestasi 34 minggu 5 hari

DS :

- a. Ibu mengatakan haid terakhirnya tanggal 31 Oktober 2018
- b. Ibu mengatakan umur kehamilannya \pm 7 bulan
- c. Ibu mengatakan pergerakan janin dirasakan sejak usia kehamilan \pm 5 bulan

DO :

- a. HTP tanggal 7 Agustus 2018
- b. Leopold 1: TFU 28 cm, 3 jari atas pusat, bokong
- c. Tanggal pengkajian 1 Juli 2018

Analisa dan interpretasi data

- a. Dari HPHT tanggal 31 Oktober 2018 sampai pengkajian 1 Juli 2018 maka umur kehamilan ibu 34 minggu 5 hari.
 - b. Menurut rumus Mc.Donald : ukuran TFU (cm) $\times \frac{2}{7} = 28 \times \frac{2}{7} = 8$ bulan (kehamilan dalam bulan)
 - c. Dari hasil pemeriksaan leopold I, didapatkan TFU 28 cm, 3 jari atas pusat sesuai dengan usia gestasi 34 minggu 5 hari.
3. Situs memanjang

DS : ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat terutama di sebelah kiri perut ibu

DO : palpasi : Leopold I : TFU 28 cm, 3 jari atas pusat, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/menit dan teratur.

Analisa dan interpretasi data

Terabanya bagian besar janin adalah bokong pada fundus dan kepala teraba di bagian terendah, DJJ terdengar jelas pada kuadran bawah serta gerakan janin dirasakan ibu pada salah satu sisi perut ibu sesuai dengan sumbu panjang ibu maka janin dalam keadaan letak memanjang (Prawirohardjo, 2014).

4. Intrauterine

DS : Ibu mengatakan janinnya bergerak kuat

Ibu mengatakan tidak pernah mengalami nyeri perut hebat selama hamil

DO :Ibu tidak merasa nyeri saat di palpasi

Pada palpasi didapatkan :

Leopold I : TFU 28 cm, 3 jari atas pusat, bokong

Leopold II: Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

Analisa dan interpretasi data :

Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, janin dapat teraba saat palpasi serta tidak ada nyeri perut yang hebat dan tidak ada nyeri tekan, menandakan kehamilan ibu intrauterine.

5. Tunggal

DS :Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat terutama di sebelah kiri perut ibu

DO : palpasi : Leopold I : TFU 28 cm, 3 jari atas pusat, bokong

Leopold II: Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV: BDP, 4/5

Analisa dan interpretasi data :

Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, teraba satu bokong, satu punggung satu kepala dan terdengar satu jantung janin pada satu titik serta pergerakan janin pada salah satu sisi perut ibu menandakan janin tunggal.

6. Hidup

DS :Ibu mengatakan janinnya kuat bergerak di bagian kiri perut ibu

Pergerakan janinnya dirasakan sejak usia kehamilan ± 5 bulan

DO : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/menit dan teratur.

Analisa dan interpretasi data :

Salah satu tanda pasti janin hidup adalah dengan adanya pergerakan janin dan terdengarnya DJJ.

7. Keadaan ibu baik

DS : Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit asma, DM, hipertensi dan jantung sebelum dan selama hamil.

DO :

- a. Keadaan umum ibu baik dan Kesadaran komposmentis
- b. Sklera putih, konjungtiva merah muda, tidak ada oedema pada wajah dan tungkai.
- c. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg

N : 78 x/menit

S : 36,5⁰C

P :22 x/menit

Analisa dan interpretasi data

Pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan dimana tidak ada tanda-tanda preeklampsia atau eklampsia, anemia, konjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada oedema pada wajah dan tungkai, serta pemeriksaan TTV dalam batas normal menandakan ibu dalam keadaan baik.

8. Keadaan janin baik

DS :Ibu merasakan pergerakan janinnya sejak usia kehamilan ± 5 bulan dan sampai sekarang

Ibu mengatakan janinnya bergerak kuat lebih dari 12 kali dalam sehari

DO :DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/menit dan teratur.

Analisa dan interpretasi data

DJJ dalam batas normal yaitu 120-160 x/menit, pergerakan janin yang dirasakan ibu serta pertumbuhan dan perkembangan perut ibu yang sesuai dengan umur kehamilan menandakan janin dalam keadaan baik.

9. Inpartu kala 1 fase laten

DS : ibu mengatakan sakit perut tembus belakang disertai pengeluaran lendir dan darah disertai adanya pelepasan air.

DO :

a. Kontraksi uterus baik, his 2x dalam 10 menit durasi 20-25 detik

b. VT I tanggal 01 juli 2018, jam 15.45 WITA

Vulva dan vagina : normal
 Portio : tebal
 Pembukaan : 3
 Penurunan : Hodge I
 Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

Analisa dan interpretasi data

- a. Lendir yang bercampur darah berasal dari serviks karena serviks mulai membuka dan mendatar
- b. Ibu dikatakan inpartu karena adanya rasa sakit karena his yang disertai keluarnya lendir bercampur darah, kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya, serta pada saat pemeriksaan dalam serviks mendatar dan pembukaan telah ada.
- c. Dikatakan fase laten pada saat pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 1-3 cm.

Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau Masalah Potensial

1. Gawat janin

DS: ibu mengatakan pergerakan janinnya dirasakan ± 12 kali/hari dan sampai sekarang

DO : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/menit dan teratur.

Analisa dan interpretasi data

Gawat janin terjadi jika janin tidak mendapatkan O₂ yang cukup sehingga terjadi hipoksia, tanda gawat janin adalah DJJ bervariasi dan akan kembali normal dalam beberapa waktu, jika DJJ tidak kembali normal setelah kontraksi ini merupakan

tanda gawat janin. Disebut gawat janin, bila ditemukan DJJ di atas 160 x/menit atau di bawah 100 x/menit, denyut jantung tidak teratur (Prawirohardjo, 2014)

2. Partus lama

DS: ibu mengatakan sakit semakin kuat dan sering serta ada dorongan untuk meneran

DO : kontraksi uterus adekuat, his 5 kali dalam 10 menit durasi 50-55 detik

Pada pemeriksaan abdomen, Leopold IV : BDP, 0/5 didapatkan bagian terendah janin adalah kepala serta kesan panggul normal saat dilakukan pemeriksaan dalam.

Analisa dan interpretasi data

Partus lama didefinisikan sebagai persalinan abnormal, yang disebabkan karena kelainan his yang berarti his yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya sehingga persalinan mengalami hambatan atau kemacetan, kelainan janin meliputi kelainan letak yang menyebabkan persalinan mengalami gangguan, dan kelainan jalan lahir adalah kelainan dalam ukuran atau bentuk jalan lahir bisa menghalangi kemajuan persalinan atau mengalami kemacetan.

3. Infeksi maternal

DS : ibu dapat beradaptasi dengan nyeri dengan mengelus-elus perut dan pinggangnya

DO: keadaan umum ibu baik ditandai dengan pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Analisa dan interpretasi data

Peningkatan resiko infeksi maternal adalah pemeriksaan dalam berkali-kali yang memicu masuknya kuman dari luar. Jika ketuban sudah pecah maka batasi pemeriksaan dalam (Prawirohardjo, 2014).

Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera

Tidak ada data yang menunjang

Langkah V : Merencanakan Asuhan yang Komprehensif/Menyeluruh

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala I

Diagnos potensial : Potensial terjadi infeksi maternal

Tujuan :

1. Kala I berlangsung normal
2. Keadaan ibu dan janin baik

Kriteria :

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
1. Kontraksi uterus adekuat
 2. His 5x dalam 10 menit durasi 50-55 detik
 3. Fase aktif tidak lebih dari 12 jam
 4. Ibu dapat beradaptasi dengan nyeri
 5. Tidak ada tanda-tanda infeksi
 6. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg

N : 78 x/menit

S : 36,5⁰C

P : 22 x/menit

7. DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/menit dan teratur

Rencana tindakan

1. Menjelaskan penyebab nyeri

Rasional : agar ibu dapat mengetahui dan mengerti apa penyebab nyeri dan dapat beradaptasi dengan nyeri yang dirasakan

2. Menganjurkan kepada ibu berbaring miring ke kiri

Rasional : miring kiri dapat mencegah tertekannya vena cava inferior yang dapat mengakibatkan aliran darah terhambat sehingga berbaring miring ke kiri aliran darah meningkat dan oksigen ke plasenta janin lancar

3. Menganjurkan kepada ibu minum di sela kontraksi

Rasional : dengan pemberian hidrasi oral kepada ibu akan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga tidak terjadi dehidrasi dan kelelahan serta tindakan ini jugaantisipasi terhadap pemakaian cadangan kalori yang berlebihan

4. Memantau DJJ, nadi dan his tiap 30 menit, tekanan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam.

Rasional : untuk memantau keadaan ibu dan janin serta kemajuan persalinan.

5. Bersihkan vulva dengan kapas savlon sebelum melakukan pemeriksaan dalam untuk mencegah terjadinya infeksi

Rasional : untuk mencegah masuknya kuman ke jalan lahir yang dapat menyebabkan infeksi

6. Memberikan support dan motivasi kepada ibu

Rasional : agar semangat dan siap fisik serta mental dalam menghadapi persalinan.

7. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir kepada Allah swt. agar saat proses persalinan dimudahkan dan berlangsung dengan normal.

Rasional : agar senantiasa ibu tetap mengingat kepada Allah swt.

8. Menganjurkan ibu tetap menjaga kebersihan dirinya serta meminta keluarga untuk tetap mendampingi ibu sampai pada saat persalinan.

Rasional : untuk memberikan kenyamanan kepada ibu

9. Melakukan pemasangan infus RL

Rasional : sebagai media untuk pemberian obat melalui intravena

10. Melakukan pemberian obat antibiotik (cefotaxime) secara IV

Rasional : digunakan untuk mencegah infeksi

11. Memantau kemajuan persalinan dengan partograf

Rasional : pemantauan dengan partograf merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan membantumenilai kemajuan persalinan dan pembukaan, keadaan ibu dan janin serta memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rencana asuhan selanjutnya

Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Tanggal 1 Juli 2018, jam : 22.15 WITA

1. Menjelaskan penyebab nyeri yang dirasakan ibu karena adanya dorongan kepala janin dari atas ke bawah (tertekannya ujung-ujung saraf saat uterus berkontraksi)

Hasil : ibu sudah mengerti dengan penjelasan yang diberikan

2. Mengajarkan kepada ibu berbaring miring

Hasil : ibu sesekali miring kiri atau kanan

3. Mengajarkan kepada ibu untuk makan dan minum di sela kontraksi

Hasil : ibu bersedia melakukannya

4. Memantau DJJ pada janin tiap 30 menit, his, nadi tiap 30 menit, tekanan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam pada ibu

Tabel 1.1
Pantauan His, DJJ, Tekanan Darah, Nadi dan Suhu

Waktu	DJJ	TD	Nadi	Suhu	His
16.15 WITA	134 x/i		78 x/i		2 x dalam 10 menit (20-25 detik)
16.45 WITA	138 x/i		76x/i		2 x dalam 10 menit (25-30 detik)

17.15 WITA	134 x/i		76 x/i		3 x dalam 10 menit (25-30 detik)
17.45 WITA	134 x/i		78 x/i		3 x dalam 10 menit (25-30 detik)
18.15 WITA	132 x/i		74 x/i		3 x dalam 10 menit (30-35 detik)
18.45 WITA	132 x/i		78 x/i		3 x dalam 10 menit (30-35 detik)
19.15 WITA	134 x/i		74 x/i		3 x dalam 10 menit (30-35 detik)
19.45 WITA	134 x/i	100/70 mmHg	78 x/i	36,8°C	3 x dalam 10 menit (35-40 detik)

Sumber : Data Primer

5. Melakukan VT II pada jam 19.45 WITA

Vulva dan vagina : normal
 Portio : tipis
 Pembukaan : 8 cm
 Ketuban : jernih
 Presentase : uuk kanan depan
 Penurunan : Hodge III
 Molase : tidak ada
 Penumbungan : tidak ada
 Kesan panggul : normal
 Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

6. Melanjutkan pemantauan DJJ pada janin tiap 30 menit, his, nadi tiap 30 menit, tekanan darah, suhu dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam pada ibu.

Tabel 1.2

Pemantauan His, DJJ, Tekanan Darah, Nadi Dan Suhu

Waktu	DJJ	TD	Nadi	Suhu	His
20.15 WITA	134 x/i		78 x/i		3 x dalam 10 menit (35-40 detik)
20.45 WITA	138 x/i		76x/i		4 x dalam 10 menit (40-45 detik)
21.15 WITA	134 x/i		76 x/i		4 x dalam 10 menit (40-45 detik)
21.45 WITA	134 x/i		78 x/i		4 x dalam 10 menit (45-50 detik)
22.15 WITA	132 x/i		74 x/i		5 x dalam 10 menit (50-55 detik)

Sumber : Data Primer

VT III jam 22.15 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : melelap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : kering

Presentase : uuk depan

Penurunan : Hodge IV

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah

7. Memberikan support dan motivasi kepada ibu

Hasil : ibu merasa tenang dan nyaman

8. Menganjurkan ibu senantiasa berdoa dan berdzikir kepada Allah swt. agar pada saat persalinan berlangsung dengan normal.

Hasil : ibu senantiasa berdoa dan berdzikir untuk senantiasa mengingat kepada Allah swt.

9. Menganjurkan ibu mengganti sarungnya yang kotor

Hasil : ibu telah memakai sarung yang bersih

10. Melakukan pemasangan infus RL

Hasil : telah terpasang infus RL 28 tpm

11. Melakukan injeksi antibiotik(cefotaxime)

Hasil : diberikan cefotaxime 1 amp/12 jam/IV

12. Memantau kemajuan persalinan dengan partograf

Hasil : Pemantauan dengan partograf merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan membantumenilai kemajuan persalinan dan pembukaan, keadaan ibu dan janin serta memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rencanaasuhan selanjutnya.

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 01 Juli 2018, jam : 22.15 WITA

1. Kala 1 berlangsung normal ditandai dengan his adekuat 5x dalam 10 menit durasi 50-55 detik dengan ibu beradaptasi dengan nyerinya
2. Tidak terjadi infeksi ditandai dengan tidak ada tanda-tanda infeksi
3. Keadaan ibu dan janin baik, ditandai dengan denyut jantung janin terdengar jelas dengan frekuensi 134 x /menit

4. Ibu mengatakan ada tekanan pada anus dan ingin BAB
5. Ibu mengatakan ada dorongan untuk meneran
6. Ibu mengatakan sakitnya bertambah dan tembus kebelakang
7. Tampak perineum menonjol, vulva dan anus membuka
8. Tampak ibu ingin meneran.

SOAP KALA I

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan nyeri perut tembus belakang sejak tanggal 01 Juli 2018, jam 07.30 WITA
2. Ibu mengatakan pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 01 Juli 2018, jam 13.00 WITA, serta ada pelepasan air sejak tanggal 01 Juli 2018, 14.30 WITA
3. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
4. Ibu mengatakan haid terakhirnya tanggal 30 Oktober 2018
5. Ibu mengatakan usia kehamilannya \pm 7 bulan
6. Ibu mengatakan pergerakan janinnya dominan terasa pada sebelah kanan perut ibu dan dirasakan sejak usia kehamilan \pm 5 bulan.
7. Ibu mengatakan sudah mendapatkan suntikan TT di Puskesmas Bontomarannu 2 kali
TT₁ tanggal 18 Desember 2017
TT₂ tanggal Februari 2018
8. Ibu melakukan kunjungan anc sebanyak 6 kali di Puskesmas Bontomarannu
9. Ibu tidak pernah menderita penyakit asma, DM, hipertensi dan jantung.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HTP : 7 Agustus 2018
4. Gestasi : 34 minggu 5 hari
5. Pemeriksaan Antropometri
 - BB : 45 kg
 - TB : 155 cm
 - LILA : 24 cm
6. Pemeriksaan TTV
 - TD : 100/70 mmHg
 - N : 72 x/menit
 - S : 36,5⁰C
 - P : 22 x/menit
7. Pemeriksaan fisik terfokus
 - a. Mata

Simetris kiri dan kanan, sklera putih, conjungtiva merah muda
 - b. Leher

Tidak ada pembesaran vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan kelenjar tiroid
 - c. Payudara

Simetris kiri dan kanan, tampak hyperpigmentasi pada areola mammae, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ada pengeluaran colostrum saat dipencet.

d. Abdomen

Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra, dan striae livide

Leopold I : TFU 28 cm, 3 jari atas pusat, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

LP : 89 cm

TFU : 28 cm

TBJ : $TFU \times LP = 28 \times 89$ cm

DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 136 x/menit dan teratur.

His : 2 kali dalam 10 menit, durasi 20-25 detik

e. Genitalia

Tidak ada oedema, tidak varices, tampak pengeluaran lendir dan darah, dan air ketuban.

VT I tanggal 01 Juli 2018, jam 15.45 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : tebal

Pembukaan : 3 cm

Ketuban : jernih

Presentase : uuk kanan lintang
 Penurunan : Hodge I
 Molase : tidak ada
 Penumbungan : tidak ada
 Kesan panggul : normal
 Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

f. Ekstremitas

Simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema, tidak varices, dan tidak nyeri tekan

ASSESSMENT (A)

G1P0A0, gestasi 34 minggu 5 hari, situs memanjang, intrauterine, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, kala 1 fase laten.

PLANNING (P)

1. Menjelaskan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan
2. Menganjurkan kepada ibu untuk BAB dan BAK
3. Menganjurkan kepada ibu untuk menarik napas ketika terjadi kontraksi
4. Menganjurkan kepada ibu untuk makan dan minum di sela-sela kontraksi
5. Memantau DJJ pada janin tiap 30 menit, tekanan darah, suhu, nadi dan his tiap 30 menit dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam pada ibu.

Tabel 1.1

Pemantauan His, DJJ, Tekanan Darah, Nadi dan Suhu

Waktu	DJJ	TD	Nadi	Suhu	His
-------	-----	----	------	------	-----

16.15 WITA	134 x/i		78 x/i		2 x dalam 10 menit (20-25 detik)
16.45 WITA	138 x/i		76x/i		2 x dalam 10 menit (25-30 detik)
17.15 WITA	134 x/i		76 x/i		3 x dalam 10 menit (25-30 detik)
17.45 WITA	134 x/i		78 x/i		3 x dalam 10 menit (25-30 detik)
18.15 WITA	132 x/i		74 x/i		3 x dalam 10 menit (30-35 detik)
18.45 WITA	132 x/i		78 x/i		3 x dalam 10 menit (30-35 detik)
19.15 WITA	134 x/i		74 x/i		3 x dalam 10 menit (30-35 detik)
19.45 WITA	134 x/i	100/70 mmHg	78 x/i	36,8 ⁰ C	3 x dalam 10 menit (35-40 detik)

Sumber : Data Primer

6. Melakukan VT II tanggal 01 Juli 2018, jam 19.45 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : tipis

Pembukaan : 8 cm

Ketuban : jernih

Presentase : uuk kanan depan

Penurunan : Hodge III

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

7. Melanjutkan pemantauan DJJ pada janin tiap 30 menit, tekanan darah, suhu, nadi dan his tiap 30 menit dan kemajuan persalinan tiap 2-4 jam pada ibu.

Tabel 1.2

Pemantauan His, DJJ, Tekanan Darah, Nadi Dan Suhu

Waktu	DJJ	TD	Nadi	Suhu	His
20.15 WITA	134 x/i		78 x/i		3 x dalam 10 menit (35-40 detik)
20.45 WITA	138 x/i		76x/i		4 x dalam 10 menit (40-45 detik)
21.15 WITA	134 x/i		76 x/i		4 x dalam 10 menit (40-45 detik)
21.45 WITA	134 x/i		78 x/i		4 x dalam 10 menit (45-50 detik)
22.15 WITA	132 x/i		74 x/i		5 x dalam 10 menit (50-55 detik)

Sumber : Data Primer

VT III 01 Juli 2018, jam 22.15 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : kering

Presentase : uuk depan

Penurunan : Hodge IV

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir dan darah

8. Memberikan support dan motivasi kepada ibu
9. Menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir kepada Allah swt. agar pada saat persalinan berlangsung normal.
10. Menganjurkan ibu memilih posisi yang nyaman, tidur miring kiri atau kanan
11. Melakukan pemasangan infus RL
12. Memberikan injeksi cefotaxime
13. Memantau kemajuan persalinan dengan partograf

KALA II

Langkah I : Pengumpulan data dasar

DS :

1. Ibu mengatakan sakitnya semakin kuat dan sering
2. Ibu mengatakan ada dorongan yang kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan ada tekanan pada anus dan rasa ingin meneran
4. Ibu mengatakan adanya pelepasan air banyak

DO :

1. His 5x dalam 10 menit durasi 50-55"
2. Perineum menonjol
3. Vulva dan anus membuka
4. DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 134 x/menit dan teratur.
5. VT III tanggal 1 Juli 2018, jam 22.15 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : kering

Presentase : uuk depan

Penurunan : Hodge IV

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah

Langkah II : Interpretasi Diagnosa dan Masalah Aktual

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala II

DS :

1. Ibu mengatakan sakitnya semakin kuat dan sering
2. Ibu mengatakan ada dorongan yang kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan ada tekanan pada anus dan rasa ingin BAB
4. Ibu mengatakan adanya pelepasan air banyak

DO :

1. His 5x dalam 10 menit durasi 50-55"
2. Perineum menonjol
3. Vulva dan anus membuka

4. DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 134 x/menit

5. VT III tanggal 1 Juli 2018, jam 22.15 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : kering

Presentase : uuk depan

Penurunan : Hodge IV

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah

Analisa dan interpretasi data :

- a. Serviks uteri berdilatasi sehingga membentuk suatu saluran yang akan dilewati bayi sampai mencapai dasar panggul (dilatasi sempurna). Hal ini mengakibatkan tekanan hebat pada otot dasar panggul dan bagian terendah janin menekan fleksus syaraf yang mengakibatkan rasa nyeri yang bertambah.
- b. Dengan adanya his yang adekuat mengakibatkan segmen atas rahim (SAR) berkontraksi mendorong janin turun ke segmen bawah rahim (SBR), segmen bawah tertarik ke atas menjadi dilatasi relaksasi sehingga membuat suatu saluran jalan lahir.

Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau Masalah Potensial

1. Asfiksia neonatorum

DS : ibu mengatakan usia kehamilannya ± 7 bulan

DO : HPHT tanggal 31 Oktober 2018

HTP tanggal 7 Agustus 2018

Analisa dan interpretasi data :

Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi tidak bisa bernapas spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan O_2 dan semakin meningkatnya CO_2 yang menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan lanjut (Nugroho, 2015).

2. Hipotermi

DS : ibu mengatakan umur kehamilannya ± 7 bulan

DO : suhu bayi baru lahir $36,3^{\circ}C$

Analisa dan interpretasi data :

Berat badan dibawah 2500 gram lebih mudah kehilangan panas melalui evaporasi, konduksi, konveksi dan radiasi karena bayi baru lahir tidak dapat mengatur temperature tubuhnya secara memadai dan dapat dengan cepat kedinginan. Jika kehilangan panas tidak segera diatasi maka dapat terjadi hipotermi.

3. Berat badan lahir rendah

DS : ibu mengatakan umur kehamilannya ± 7 bulan

DO : berdasarkan taksiran berat janin pada saat pemeriksaan abdomen adalah 2490 gram.

Analisa dan interpretasi data :

Berat badan lahir rendah adalah bayi baru lahir yang berat badan lahirnya kurang dari 2500 gram dengan masa gestasi <37 minggu (Viviana Nanny, 2011).

Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera

Dilakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan pertolongan pertama pada bayi baru lahir preterm

Langkah V : Merencanakan Asuhan yang Komprehensif/Menyeluruh

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala II

Diagnosa potensial : Potensial terjadi hipotermi

Potensial terjadi BBLR

Potensial terjadi asfiksia

Tujuan : Kala II berlangsung normal

Kriteria :

1. Kala II berlangsung tidak lebih dari 1-2 jam
2. Bayi lahir dalam waktu 30 menit, napas spontan dan segera

menangis, BB : 2300 gram, PB : 46 cm, A/S : 7/10

3. Keadaan umum ibu baik

4. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg

N : 74 x/menit

S : 36,5°C

P : 22x/menit

Intervensi tanggal 1 Juli 2018, jam : 22.15 WITA

1. Melihat adanya tanda dan gejala kala II

(dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka).

Rasional : untuk mengetahui apakah sudah memimpin persalinan

2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan diantaranya menghisap oksitosin 1 ampul 10 IU

Rasional : untuk mempersiapkan peralatan siap pakai jika sudah pembukaan lengkap

3. Memastikan tangan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai handscoon, memakai celemek, membersihkan vulva dan perineum dengan kapas savlon, mencelupkan handscoon secara terbalik ke dalam larutan clorin 0,5 %

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

4. Melakukan pemeriksaan dalam

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

5. Mendengarkan DJJ disela berkontraksi

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin

6. Memberitahu kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik

Rasional : agar ibu tidak khawatir dengan keadaan janinnya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan.

7. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu yang baik dan nyaman untuk meneran
Rasional : dapat membantu proses persalinan
8. Melakukan pimpinan meneran jika ada kontraksi
Rasional : memperlancar berlangsungnya proses persalinan
9. Memasang handuk bersih di atas perut ibu jika terlihat kepala janin membuka vulva 5-6 cm
Rasional : untuk mengeringkan tubuh janin
10. Meletakkan underpad di bawah bokong ibu
Rasional : sebagai alat pengalas ibu
11. Membuka bak partus
Rasional : menyiapkan alat dalam keadaan siap pakai
12. Menyiapkan suction, infant warmer/incubator
Rasional : untuk memberikan pertolongan terhadap bayi jika terjadi asfiksia dan hipotermi
13. Memakai handscoon steril pada kedua tangan
Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang
14. Melakukan episiotomy
Rasional : untuk memperluas jalan lahir dan mengurangi tekanan pada kepala bayi
15. Memimpin persalinan dengan melindungi perineum dan menahan puncak kepala agar tidak terjadi defleksi maksimal

Rasional : dengan menyokong perineum dapat mengurangi dan mencegah rupture perineum

16. Memeriksa adanya lilitan tali pusat

Rasional : lilitan tali pusat dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin

17. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar

Rasional : menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putaran paksi dalam

18. Meletakkan tangan secara biparietal dengan hati-hati, gerakan tangan ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior dan gerakkan tangan ke atas untuk melahirkan bahu posterior

Rasional : membantu pengeluaran bahu agar tidak terjadi robekan perineum

19. Melahirkan kepala, leher dan bahu dengan sanggah susur

Rasional : mengendalikan pengeluaran bayi

20. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk diantara kedua kaki.

Rasional : dengan sanggah susur dapat mencegah ruptur perineum dan trauma pada bayi

21. Meletakkan bayi di atas perut ibu lalu lakukan penilaian sepiantas

Rasional : untuk menilai bayi segera setelah lahir

22. Mengeringkan seluruh badan bayi dengan kain bersih dan kering

Rasional : untuk mencegah bayi hipotermi

23. Memeriksa fundus uteri

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal

24. Meminta izin pada ibu untuk disuntik oksitosin

Rasional : untuk memberitahu ibu tindakan yang akan dilakukan

25. Menyuntikkan oksitosin 10 IU

Rasional : untuk membantu kontraksi uterus

26. Menjepit tali pusat

Rasional : untuk menentukan batas tali pusat yang akan dipotong

27. Memotong tali pusat

Rasional : memotong tali pusat akan memutuskan hubungan bayi dan ibu dan membantu proses pernapasan dan sistem sirkulasi dan agar darah dari tali pusat tidak mengalir.

28. Memeriksa robekan jalan lahir

Rasional : untuk mencegah terjadinya perdarahan aktif

29. Memberi topi pada bayi dan diselimuti kain hangat

Rasional : untuk menjaga kehangatan bayi

Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Tanggal 1 Juli 2018, jam : 22.15 WITA

1. Melihat adanya tanda dan gejala kala II

Hasil : dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka, dan merasa ingin meneran.

2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan

Hasil : alat dan bahan persalinan sudah lengkap

3. Memakai celemek

Hasil : celemek telah dipakai

4. Memastikan tangan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

Hasil : cuci tangan telah dilakukan

5. Memakai handscoon

Hasil : handscoon telah dipakai

6. Menghisap oksitosin 1 ampul 10 IU dengan satu tangan

Hasil : oksitosin telah dihisap pada spoit 3 cc

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas savlon

Hasil : vulva dan perineum telah dibersihkan

8. Melakukan pemeriksaan dalam (VT) jam 22.15 WITA

Hasil: pembukaan sudah lengkap

9. Mencilupkan handscoon secara terbalik ke dalam larutan clorin 0,5 %

Hasil : handscoon telah dicelupkan

10. Mendengarkan DJJ jika tidak berkontraksi

Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 134 x/menit dan teratur

11. Memberitahu kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik

Hasil : ibu sudah mengerti dan merasa tenang

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu yang baik untuk meneran

Hasil : keluarga siap membantu

13. Melakukan pimpinan meneran jika ada kontraksi

Hasil : pimpinan meneran dilakukan jika ada kontraksi

14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman

Hasil : ibu sudah mengambil posisi yang nyaman untuk meneran

15. Memasang handuk bersih di atas perut ibu jika terlihat kepala janin membuka vulva 5-6 cm

Hasil : handuk bersih telah dipasang di atas perut ibu

16. Meletakkan underpad di bawah bokong ibu

Hasil : underpad telah dipasang

17. Membuka bak partus untuk memastikan kelengkapan alat

Hasil : alat dan bahan sudah lengkap

18. Menyiapkan suction, infant warmer/incubator

Hasil : alat suction, infant warmer/incubator telah siap

19. Memakai handscoon steril pada kedua tangan

Hasil : handscoon telah dipakai

20. Memimpin persalinan dengan melindungi perineum dan tahan puncak kepala

Hasil : menyokong kepala bayi agar tidak terjadi defleksi maksimal

21. Memeriksa adanya lilitan tali pusat

Hasil : tidak ada lilitan tali pusat

22. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar

Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar

23. Meletakkan tangan secara biparietal dengan hati-hati, gerakan tangan ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior dan gerakkan tangan ke atas untuk melahirkan bahu posterior
Hasil : bahu bayi telah lahir
24. Melahirkan kepala, leher dan bahu dengan sanggah susur
Hasil : badan bayi telah lahir
25. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk diantara kedua kaki.
Hasil : bayi lahir spontan, segera menangis pada tanggal 01 Juli 2018, jam 22.25
WITA dengan JK : perempuan, BB : 2300 gram, PB : 46 cm, Apgar Score : 7/10
26. Meletakkan bayi di atas perut ibu lalu lakukan penilaian sepiantas
Hasil : Bayi menangis kuat dan bergerak aktif
Badan bayi kemerah-merahan dan bernapas tanpa kesulitan
27. Mengeringkan seluruh badan bayi dengan kain bersih dan kering
Hasil : bayi telah dikeringkan dengan kain bersih
28. Memeriksa fundus uteri
Hasil : TFU setinggi pusat yang berarti janin tunggal
29. Meminta izin pada ibu untuk disuntik oksitosin
Hasil : ibu bersedia disuntik
30. Menyuntikkan oksitosin 10 IU
Hasil : ibu telah disuntik oksitosin
31. Menjepit tali pusat

Hasil : tali pusat telah dijepit

32. Memotong tali pusat

Hasil : tali pusat telah dipotong

33. Memeriksa robekan jalan lahir

Hasil : terdapat ruptur perineum tingkat I

34. Memberi topi pada bayi dan ibu diselimuti kain hangat

Hasil : tindakan telah dilakukan

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 01 Juli 2018

1. Kala II berlangsung selama 10 menit
2. Bayi lahir dalam waktu 30 menit, napas spontan dan segera menangis
3. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
4. TFU setinggi pusat
5. Ibu mengatakan nyeri perut
6. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya
7. Perdarahan \pm 100 cc
8. Plasenta belum terlepas

SOAP KALA II

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan sakitnya semakin kuat dan sering
2. Ibu mengatakan ada dorongan yang kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan ada tekanan pada anus dan rasa ingin meneran

- Ibu mengatakan adanya pelepasan air banyak

DATA OBJEKTIF (O)

- Perineum menonjol
- Vulva dan anus membuka
- VT tanggal 1 juli 2018, jam 22.15 WITA

Vulva dan vagina : normal

Portio : melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : kering

Presentase : uuk depan

Penurunan : Hodge IV

Molase : tidak ada

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah

ASSESMEN (A)

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala II

Diagnosa potensial : Potensial terjadinya hipotermi

Potensial terjadinya BBLR

PLANNING (P)

- Melihat adanya tanda dan gejala kala II

Hasil : Dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka serta merasa ingin meneran.

2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan

- Partus set	- hecing set
Klem kocher	nald voerder
½ kocher	pinset anatomi
Gunting tali pusat	gunting benang
Gunting episitomi	benang
Penjepit tali pusat	cutgut
Kateter	Kasa
Handscoon	air DTT
kapas DTT	larutan clorin
tempat sampah	tensimeter
stetoskop	deele
dopler	underpad
obat	cairan infus
oksitosin	lidocain
salep mata	vit.k
HbO	Dexametason

Hasil : alat dan bahan sudah lengkap

3. Memakai celemek

Hasil : Celemek telah dipakai

4. Memastikan tangan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

Hasil : Cuci tangan telah dilakukan

5. Memakai handsoon

Hasil : Handscoon telah dipakai

6. Menghisap oksitosin 1 ampul 10 IU dengan satu tangan

Hasil : oksotodin telah dihisap ke dalam spoit 3 cc

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas savlon\

Hasil : Vulva dan perineum telah dibersihkan

8. Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 1 juli 2018, jam 22.15 WITA

Hasil : pembukaan sudah lengkap

9. Mencelupkan handscoon secara terbalik ke dalam larutan clorin 0,5 %

Hasil : Handscoon telah dicelupkan

10. Mendengarkan DJJ jika tidak berkontraksi

Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 134 x/menit dan teratur.

11. Memberitahu kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik

Hasil : Ibu sudah mengerti

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu yang baik untuk meneran

Hasil : Keluarga siap membantu

13. Melakukan pimpinan meneran jika ada kontraksi

Hasil : Pimpinan Meneran telah dilakukan

14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman

Hasil : Ibu sudah berada dalam posisi untuk meneran

15. Memasang handuk bersih di atas perut ibu jika terlihat kepala janin membuka vulva 5-6 cm

Hasil : Tindakan telah dilakukan

16. Meletakkan underpad di bawah bokong ibu

Hasil : Tindakan telah dilakukan

17. Membuka bak partus

Hasil : Alat dan bahan sudah lengkap

18. Memakai handscoon steril pada kedua tangan

Hasil : handscoon telah dipakai

19. Memimpin persalinan dengan melindungi perineum dan tahan puncak kepala

Hasil : Kepala bayi sudah lahir

20. Memeriksa adanya lilitan tali pusat

Hasil : Tidak ada lilitan tali pusat

21. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan

Hasil : Kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar

22. Meletakkan tangan secara biparietal dengan hati-hati, gerakan tangan ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior dan gerakkan tangan ke atas untuk melahirkan bahu posterior

Hasil : Bahu bayi telah lahir

23. Melahirkan leher, bahu dan badan bayi dengan sanggah susur

24. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk diantara kedua kaki.

Hasil : bayi lahir spontan jam : 22.25 WITA, BB : 2300 gram, PB : 46 cm,

25. Meletakkan bayi di atas perut ibu lalu lakukan penilaian sepiantas

Hasil : Bayi menangis kuat dan bernapas tanpa kesulitan

Badan bayi kemerah-merahan dan bergerak aktif

26. Mengeringkan seluruh badan bayi dengan kain bersih dan kering

Hasil : Tindakan telah dilakukan

27. Memeriksa fundus uteri

Hasil : TFU setinggi pusat yang berarti janin tunggal

28. Meminta izin pada ibu untuk disuntik oksitosin

Hasil : Ibu sudah mengerti

29. Menyuntikkan oksitosin 10 IU di 1/3 lateral pada paha ibu

Hasil : Ibu telah disuntik

30. Menjepit tali pusat

Hasil : Tali pusat telah dijepit

31. Memotong tali pusat

Hasil : Tali pusat telah dipotong

32. Memeriksa robekan jalan lahir

Hasil : terdapat ruptur perineum tingkat I

33. Memberi topi pada bayi dan bayi diselimuti kain hangat

Hasil : Tindakan telah dilakukan

KALA III

Langkah I : Pengumpulan data dasar

DS :

1. Ibu mengatakan nyeri perut
2. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya

DO :

1. Bayi lahir spontan pada tanggal 01 Juli 2018, jam 22.25 WITA dengan JK : perempuan, BB : 2300 gram, PB : 46 cm
2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. TFU teraba 1 jrbpst
4. Perdarahan \pm 200 cc
5. Tampak semburan darah tiba-tiba
6. Tampak tali pusat di depan vulva
7. Plasenta belum terlepas

Langkah II : Interpretasi Diagnosa dan Masalah Aktual

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala III

Diagnosa potensial : Potensial terjadinya retensio plasenta dan rest plasenta

DS : ibu mengatakan nyeri perut

DO :

1. Bayi lahir spontan, segera menangis pada tanggal 01 Juli 2018, jam 22.25 WITA dengan JK : perempuan, BB : 2300 gram, PB : 46 cm, Apgar Score 7/10

2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. TFU teraba 1 jrbpst
4. Perdarahan ± 200 cc
5. Tampak tali pusat di depan vulva

Analisa dan interpretasi data

- a. Dalam waktu 5-10 menit seluruh plasenta terlepas, terdorong kedalam vagina dan akan lahir spontan
- b. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda uterus menjadi bundar, uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim, tali pusat bertambah panjang dan terjadi perdarahan/adanya semburan darah tiba-tiba.

Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau Masalah Potensial

Tidak ada indikasi untuk ditegakkannya diagnosa/masalah potensial

Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera

Tidak ada indikasi untuk dilakukannya tindakan segera/emergency

Langkah V : Merencanakan Asuhan yang Komprehensif/Menyeluruh

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala III

Diagnosa potensial : Potensial terjadinya retensio plasenta dan rest plasenta

Tujuan : kala III berlangsung normal

Kriteria :

1. Perdarahan tidak lebih dari 500 cc

2. Plasenta lahir 30 menit
3. Plasenta dan selaputnya lahir lengkap

Intervensi

Tanggal 1 Juli 2018, jam 22:25 WITA

1. Memindahkan klem tali pusat hingga 5-6 cm dari depan vulva jika tali pusat bertambah panjang serta meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem
Rasional : proses peregangan tali pusat terkendali
2. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial
Rasional : untuk memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya
3. Meregangkan tali pusat ke arah atas dan ke bawah
Rasional : memudahkan plasenta keluar sesuai kurva jalan lahir hingga tampak di vulva
4. Menjemput plasenta dengan kedua tangan, jika plasenta sudah tampak di depan vulva lahirkan plasenta dengan searah jarum jam
Rasional : agar plasenta dan selaputnya lahir lengkap
5. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap
Rasional : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban akan menyebabkan perdarahan
6. Memeriksa adanya robekan jalan lahir
Rasional : untuk mencegah terjadinya perdarahan aktif

Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Tanggal 1 Juli 2018 , jam 22:25 WITA

1. Memindahkan klem tali pusat hingga 5-6 cm dari depan vulva, jika tali pusat bertambah panjang serta meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem

Hasil : Klem telah dipindahkan

2. Meregangkan tali pusat ke arah atas dan ke bawah saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial

Hasil : Dorso cranial telah dilakukan

3. Menjemput plasenta dengan kedua tangan jika plasenta sudah tampak di depan vulva

Hasil : Plasenta telah tampak di vulva

4. Melahirkan plasenta dengan memutar searah jarum jam

Hasil : Plasenta lahir 22.30 WITA

5. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap

Hasil : plasenta, selaput ketuban dan kotiledon lahir lengkap

6. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Hasil : ruptur perineum tingkat 1

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 1 Juli 2018, jam 22: 30 WITA

1. Kala III \pm 5 menit
2. Plasenta dan selaputnya lahir lengkap

3. TFU 1 jrbpst
4. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
5. Perdarahan \pm 200 cc
6. Ibu mengatakan lelah setelah proses persalinan

7. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg
 N : 72 x/menit
 S : 36,5⁰C
 P : 22x/menit

SOAP KALA III

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan nyeri perut
2. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya

DATA OBJEKTIF (O)

1. Bayi lahir spontan pada tanggal 01 Juli 2018, jam 22.25 WITA dengan JK : perempuan, BB : 2300 gram, PB : 46 cm serta Apgar Score 7/10
2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. TFU teraba 1 jrbpst
4. Perdarahan \pm 200 cc
5. Plasenta belum terlepas
6. Tampak tali pusat di depan vulva

ASSESSMENT (A)

Perlangsungan kala III, antisipasi terjadinya retensio plasenta dan rest plasenta

PLANNING (P)

Tanggal 1 Juni 2018, jam 22:25 WITA

1. Memindahkan klem tali pusat hingga 5-6 cm dari depan vulva, jika tali pusat bertambah panjang serta meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem

Hasil : Klem telah dipindahkan

2. Meregangkan tali pusat ke arah atas dan ke bawah saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial

Hasil : Dorso cranial telah dilakukan

3. Menjemput plasenta dengan kedua tangan jika plasenta sudah tampak di depan vulva

Hasil : Plasenta telah tampak di vulva

4. Melahirkan plasenta dengan memutar searah jarum jam

Hasil : Plasenta lahir 22.30 WITA

5. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap

Hasil : plasenta, selaput ketuban dan kotiledon lahir lengkap

6. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Hasil : Ruptur perineum tingkat 1

KALA IV

Langkah I : Pengumpulan data dasar

DS : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO :

1. Kala III berlangsung \pm 5 menit
2. Plasenta lahir lengkap jam 22.30 WITA
3. TFU 1 jrbpst
4. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. Perdarahan \pm 200 cc
6. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg

N : 72 x/menit

S : 36,5⁰C

P : 22x/menit

Langkah II : Interpretasi Diagnosa dan Masalah Aktual

Diagnosa aktual : Perlangungan kala IV

DS : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO :

1. Kala III berlangsung \pm 5 menit
2. Plasenta lahir lengkap jam 22.30 WITA
3. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg

N : 72 x/menit

S : 36,5⁰C

P : 22x/menit

Analisa dan interpretasi data :

1. Setelah plasenta dan selaput ketuban lahir menandakan bahwa telah masuk kala IV
2. Perdarahan yang terjadi saat kontraksi uterus baik, biasanya karena adanya robekan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan inspeksi pada vulva, vagina dan serviks dengan ciri warna darah yang merah segar.

Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau Masalah Potensial

Antisipasi terjadinya perdarahan postpartum

DS : Ibu mengatakan lelah setelah melahirkan

DO : Plasenta lahir lengkap jam 22.30 WITA dengan perdarahan ± 200 cc

Analisa dan interpretasi data

Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah lebih dari 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000 cc setelah persalinan abdominal. Diagnosis perdarahan postpartum dapat ditegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak, bergumpal dan pada palpasi fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih.

Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera

Tidak ada indikasi untuk dilakukan tindakan segera

Langkah V : Merencanakan Asuhan yang Komprehensif/Menyeluruh

Diagnosa : Perlangsungan kala IV

Masalah aktual : Kelelahan

Tujuan : kala IV berlangsung normal

Kriteria :

1. TFU 1 jrbpst
2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. Ibu merasa lelah setelah melahirkan
4. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg

N : 72 x/menit

S : 36,5⁰C

P : 22x/menit

Intervensi tanggal 1 Juli 2018, jam 22.30 WITA

1. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik
Rasional : untuk memantau kontrakasi uterus
2. Membiarkan bayi melakukan IMD selama 1 jam
Rasional : untuk melakukan kontak skin to skin dengan ibunya.
3. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K
Rasional : untuk mengetahui apakah bayi lahir normal atau tidak
4. Memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah pemberian vitamin K
Rasional : memberikan hepatitis

5. Melakukan pemantauan kontraksi uterus, menilai tinggi fundus uteri, evaluasi jumlah perdarahan dan kandung kemih tiap 30 menit pada jam pertama dan jam kedua serta pemantauan tanda-tanda vital ibu
Rasional : kontraksi uterus yang baik menandakan kala IV berlangsung normal
6. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi
Rasional : agar ibu dan keluarga mengetahui bagaimana kontraksi uterus yang baik dan dapat melakukannya sendiri
7. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi
Rasional : untuk mengetahui keadaan umum bayi
8. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit serta membuang bahan-bahan yang terkontaminasi
Rasional : untuk mencegah infeksi silang
9. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir dan air ketuban dengan air DTT
Rasional : untuk memberikan rasa nyaman pada ibu dan mencegah infeksi silang
10. Memastikan ibu merasa nyaman serta memberitahu keluarga untuk memberikan makan dan minum kepada ibu
Rasional : makan dan minum akan mengembalikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinan sehingga ibu tidak merasa kelelahan
11. Mendekontaminasi tempat tidur dan membersihkan handscoon dengan larutan clorin 0,5 %
Rasional : untuk mencegah infeksi silang

12. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir

Rasional : agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri

13. Melengkapi partograf

Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Tanggal 1 Juli 2018, jam 22.30 WITA

1. Memeriksa kontraksi uterus dan robekan jalan lahir

Hasil : kontraksi uterus teraba keras dan bundar, serta terdapat ruptur perineum tingkat I

2. Membiarkan bayi tetap melakukan IMD selama 1 jam

Hasil : bayi sedang melakukan IMD

3. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K

Hasil : BB : 2300 gram

PB : 46 cm

Salep mata dan vit.K telah diberikan

4. Memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah pemberian vitamin K

Hasil : bayi telah disuntik HbO setelah 1 jam penyuntikkan vit. K

5. Melakukan pemantauan kontraksi uterus, menilai tinggi fundus uteri, evaluasi jumlah perdarahan dan kandung kemih tiap 30 menit pada jam pertama dan jam kedua serta pemantauan tanda-tanda vital ibu

Hasil :

Tabel 1.3

Pemantauan Kala IV

Waktu	TFU	Kontraksi	Kandung Kemih	Perdarahan	Tekanan Darah	Nadi	Suhu
22.45 WITA	1 jrbpst	Baik	± 50 cc	± 30 cc	100/70 mmHg	72 x/menit	36,9 °C
23.00 WITA	1 jrbpst	Baik	Kosong	± 30 cc	100/70 mmHg	72 x/menit	
23.15 WITA	1 jrbpst	Baik	Kosong	± 30 cc	100/70 mmHg	76 x/menit	
23.30 WITA	1 jrbpst	Baik	Kosong	± 25 cc	100/70 mmHg	72 x/menit	
00.00 WITA	1 jrbpst	Baik	Kosong	± 20 cc	100/70 mmHg	78 x/menit	36,6 °C
00.30 WITA	1 jrbpst	Baik	Kosong	± 15 cc	100/70 mmHg	74 x/menit	

Sumber : Data Primer

6. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase dan menilai Kontraksi
 Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya
7. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi
 Hasil : bayi bernapas dengan baik, yaitu 48 x/menit, serta suhu 36,3 °C
8. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 %
 Hasil : alat sudah direndam kedalam larutan clorin 0.5 %
9. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi
 Hasil : bahan yang terkontaminasi telah dibuang ke dalam tempat yang disediakan

10. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir, air ketuban dengan air DTT
11. Hasil : ibu telah dibersihkan dari sisa darah, lendir, air ketuban
12. Memastikan ibu merasa nyaman serta memberitahu keluarga untuk memberikan makan dan minum kepada ibu
Hasil : ibu sudah merasa nyaman
13. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan clorin 0,5 %
Hasil : tempat tidur telah dibersihkan
14. Membersihkan handscoon dengan larutan clorin 0,5 % secara terbalik
Hasil : handscoon telah dicelupkan
15. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
Hasil : cuci tangan telah dilakukan
16. Melengkapi partograf
Hasil : partograf telah dilengkapi

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 1 Juli 2018, jam 22.30 WITA

1. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
2. TFU 1 jrbpst
3. Jumlah perdarahan \pm 150 cc
4. Pemeriksaan TTV

TD	: 100/70 mmHg
N	: 74 x/i
S	: 36,5 ⁰ C

P :22x/i

5. Ibu sudah merasa nyaman
6. Kesadaran komposment

SOAP KALA IV

DATA SUBJEKTIF (S)

Ibu mengatakan lelah setelah melahirkan

DATA OBJEKTIF (O)

1. Kala III berlangsung ± 5 menit
2. Plasenta lahir lengkap jam 22.30 WITA
3. TFU 1 jrbpst
4. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. Perdarahan ± 150 cc
6. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg

N : 78 x/menit

S : 36°C

P : 22 x/menit

ASSESMENT (A)

Perlangsungan kala IV, perdarahan postpartum

PLANNING (P)

1. Memeriksa kontraksi uterus dan robekan jalan lahir

Hasil : kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar serta terdapat ruptur perineum tingkat I

2. Membiarkan bayi tetap melakukan IMD selama 1 jam

Hasil : bayi sudah melakukan IMD

3. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K

Hasil : BB : 2300 gram

PB : 46 cm

Salep mata dan vit.K telah diberikan

4. Memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah pemberian vitamin K

Hasil : bayi di imunisasi HbO setelah 1 jam pemberian vit.K

5. Melakukan pemantauan kontraksi uterus, menilai tinggi fundus uteri, evaluasi jumlah perdarahan dan kandung kemih tiap 30 menit pada jam pertama dan jam kedua serta pemantauan tanda-tanda vital ibu

Hasil :

Tabel 1.3

Pemantauan Kala IV

Waktu	TFU	Kontraksi	Kandung Kemih	Perdarahan	Tekanan Darah	Nadi	Suhu
22.45 WITA	1 jrbpst	Baik	± 50 cc	± 30 cc	100/70 mmHg	72 x/menit	36,9 °C
23.00 WITA	1 jrbpst	Baik	Kosong	± 30 cc	100/70 mmHg	72 x/menit	

23.15 WITA	1 jrbpst	Baik	Kosong	± 30 cc	100/70 mmHg	76 x/menit	
23.30 WITA	1 jrbpst	Baik	Kosong	± 25 cc	100/70 mmHg	72 x/menit	
00.00 WITA	1 jrbpst	Baik	Kosong	± 20 cc	100/70 mmHg	78 x/menit	36,6 °C
00.30 WITA	1 jrbpst	Baik	Kosong	± 15 cc	100/70 mmHg	74 x/menit	

Sumber : Data Primer

6. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase dan menilai kontraksi

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi

Hasil : bayi bernapas dengan baik, yaitu 48 x/menit, serta suhu 36,3 °C

8. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit serta membuang bahan-bahan yang terkontaminasi

9. Membersihkan ibu dari sisa darah, lendir dan air ketuban dengan air DTT

10. Memastikan ibu merasa nyaman serta memberitahu keluarga untuk memberikan makan dan minum kepada ibu

11. Mendekontaminasi tempat tidur serta membersihkan handscoon dengan larutan clorin 0,5 %

12. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir

13. Melengkapi partograf



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan intranatal pada Ny”N” dengan Usia kehamilan preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tanggal 1 Juli 2018. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus yang dapat dianalisa secara teoritis untuk memudahkan memahami kesenjangan dan kesesuaian yang terjadi pada kasus ini.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney yakni : pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau

kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Kala I

Pada langkah 1 ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien secara lengkap. Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu : Observasi, Wawancara dan pemeriksaan. Secara garis besar diklasifikasikan sebagai data subjektif dan objektif. Maka dari itu dibutuhkan anamnesa terhadap klien seperti melakukan tanya jawab kepada ibu untuk memperoleh data meliputi riwayat kesehatan, riwayat reproduksi, riwayat haid, riwayat obstetrik, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi.

Berdasarkan anamnesa didapatkan data subjektif terhadap Ny”N” yakni ibu masuk pada tanggal 1 Juli 2018 jam 15.45 WITA dengan keluhan sakit perut tembus belakang sejak tanggal 1 Juli 2018 jam 07.30 WITA dengan adanya pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 1 Juli 2018 jam 13.00 WITA disertai pelepasan air sejak jam 14.30 WITA dan sifat nyeri dirasakan hilang timbul. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran. HPHT tanggal 31 Oktober 2017, ibu mengatakan usia kehamilannya ± 7 bulan, pergerakan janinnya kuat terasa pada sebelah kanan perut ibu. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali di Puskesmas Bontomarannu dan mendapat suntik TT sebanyak 2 kali, ibu tidak pernah menderita penyakit asma, DM, hipertensi dan

jantung serta ibu dan keluarga tidak memiliki penyakit menular dan penyakit keturunan/genetik serta ibu tidak pernah menjadi akseptor KB dalam bentuk apapun.

Pada umumnya pasien inpartu akan mengalami nyeri perut bagian bawah yang menjalar ke pinggang dikarenakan adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya penipisan atau dilatasi serviks. Hal ini juga sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa tanda-tanda persalinan meliputi terjadinya his yang menimbulkan pembukaan serviks. Lendir disekresi sebagai hasil proliferasi kelenjar lendir serviks. Keluarnya lendir ini karena timbulnya kontraksi yang membuka mulut rahim menjadi lunak dan membuka. Keluarnya lendir bercampur darah ini berasal dari pembukaan *kanalis servikalis*, sedangkan terjadinya pengeluaran darah disebabkan oleh robeknya pembuluh darah ketika *serviks* membuka (Elisabet Siwi Walyani, 2015).

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmetis, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 72 x/menit, suhu 36,5 °C dan pernapasan 22 x/menit. Kedua konjungtiva mata merah muda dan sklera putih, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak hyperpigmentasi pada areola mammae. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan leopold I didapatkan TFU 28 cm, 3 jari atas pusat, teraba bokong, leopold II PUKA, leopold III kepala, leopold IV bergerak dalam panggul (BDP), 4/5, lingkar perut 89 cm dengan taksiran berat janin 2492 gram. Keadaan janin baik ditandai dengan DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri

bawah perut ibu dengan frekuensi 134 x/menit, his 2 kali dalam 10 menit, durasi 20-25 detik, intrauterine, tunggal dan hidup.

Hasil pemeriksaan dalam pada tanggal 1 Juli 2018 jam 15.45 WITA didapatkan vulva dan vagina normal, portio tebal, pembukaan 3 cm, ketuban pecah, presentasi uuk kanan lintang, penurunan hodge 1, molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir, darah dan air ketuban. Selanjutnya dilakukan observasi kemajuan DJJ dan his tiap 30 menit dan observasi kemajuan persalinan tiap 4 jam pada kala I. Hasil pemeriksaan usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus neagle, mulai dari HPHT sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 34 minggu 5 hari.

Hasil pemeriksaan usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus neagle, mulai dari HPHT sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 34 minggu 5 hari. Pada pemeriksaan abdomen, tampak adanya linea nigra yang menandakan ibu primigravida, terdapatnya DJJ dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda pasti kehamilan (Prawirohardjo, 2014).

Pengukuran tinggi fundus uteri merupakan salah satu pendukung diagnosis persalinan preterm. Jika pembesaran uterus lebih kecil dari dugaan usia kehamilan normal, maka kemungkinan terjadi usia kehamilan lebih muda dari taksiran. Pada kasus Ny”N” didapatkan TFU 3 jari atas pusat. Pada pemeriksaan TBJ ditentukan dengan cara lingkaran perut dikalikan dengan tinggi fundus uteri. Pada persalinan

preterm dengan berat janin kurang dari 2500 gram (Dhina Novi Ariana, 2012). Pada kasus Ny”N” TBJ didapatkan 2492 gram.

Pada kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Pada saat palpasi teraba satu kepala satu punggung, satu bokong, terdengar satu jantung janin pada satu titik serta pergerakan janin pada salah satu sisi perut ibu. Dirasakan pergerakan janin kuat ± 10 kali dalam sehari dan pada saat auskultasi didengarnya denyut jantung janin merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin dalam keadaan baik ditandai dengan DJJ terdengar jelas dan teratur dengan frekuensinya antara 120-160 x/menit serta dapat dilihat dari pembesaran perut ibu menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014).

Pada persalinan kala I yang ditandai dengan adanya his atau kontraksi seperti sakit perut tembus belakang, his yang semakin kuat dan sering, mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks. Selain his, persalinan juga ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dari kanalis servikalis. Persalinan juga dapat disebabkan oleh pengeluaran cairan ketuban, meliputi adanya *bloody show*, peningkatan rasa sakit, perubahan bentuk serviks, pendataran serviks, pembukaan serviks (dilatasi), pengeluaran cairan yang banyak atau selaput ketuban yang pecah dengan sendirinya (Siti Aisyah, 2012).

Pemeriksaan USG ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis khususnya pada kasus persalinan preterm, pecahnya selaput ketuban yang menjadi tanda awal terjadinya persalinan preterm serta pada pemeriksaan fisik menunjukkan telah

terjadi pembukaan >2 cm serta penipisan 50-80% (Prawirohardjo, 2014). Pada kasus Ny”N” tidak dilakukan pemeriksaan USG karena keadaan yang tidak memungkinkan.

Tindakan yang dilakukan yaitu memantau kemajuan persalinan dengan mengobservasi his dan pembukaan serviks. Memberitahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan menjelaskan penyebab nyeri yang dirasakan ibu, mendampingi ibu selama proses persalinan, menganjurkan ibu untuk miring kiri atau kanan sebagai tehnik relaksasi atau dengan menarik napas lewat hidung dan menghembuskan lewat mulut, mengobservasi his, melakukan pemeriksaan dalam, menganjurkan keluarga untuk memberi minum, support dan motivasi kepada ibu ketika tidak ada kontraksi.

Demikian juga dianjurkan keluarga untuk memberikan dukungan psikologis dan spritual kepada ibu dengan senantiasa mengingatkan untuk berdoa dan berdzikir kepada Allah swt. agar segala kesulitan yang dialami dimudahkan karena atas izin-Nya, serta diberikan kesabaran dan ketabahan hati serta kemudahan dalam proses persalinan, mengajarkan ibu untuk meneran ketika ada his, menyiapkan peralatan persalinan.

Pada langkah II data dasar yang sudah dikumpulkan di interpretasi sehingga dapat menemukan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan masalah dan diagnosa keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis melainkan tetap membutuhkan penanganan.

Berdasarkan hasil pengkajian pada kasus Ny”N” didapatkan data subjektif dan objektif menunjukkan bahwa diagnosis inpartu kala I fase laten dengan Usia Kehamilan Preterm.

Masalah yang bisa muncul serta menjadi ancaman terjadinya persalinan preterm seperti pecahnya selaput ketuban, presentase janin rendah, adanya nyeri punggung bawah, perdarahan bercak, perasaan menekan daerah *serviks* serta terjadinya kontraksi yang berulang (2-3 kali dalam 10 menit). Demikian pada hasil pengamatan didapatkan keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Begitu juga pada saat pemeriksaan dalam, didapatkan cairan dan selaput ketuban sudah tidak ada lagi.

Persalinan preterm adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu (antara 20-37 minggu) atau dengan berat janin kurang dari 2500 gram (Dhina Novi Ariana,2012). Diagnosis persalinan preterm dapat ditegakkan berdasarkan usia kehamilan. Usia kehamilan dapat diketahui berdasarkan hari pertama haid terakhir pergerakan janin pertama kali serta pengukuran tinggi fundus uteri. TFU normal pada umur kehamilan 37-40 minggu pada persalinan preterm adalah 2 jari dibawah prosessus xypoideus. Pada kasus Ny “N” didapatkan TFU 3 jari atas pusat. Hal ini menunjukkan bahwa usia kehamilan belum aterm jika dilihat berdasarkan pengukuran tinggi fundus uteri.

Dilihat dari keadaan ibu dengan kondisi usia kehamilan tidak cukup bulan atau preterm maka peran seorang bidan yaitu tetap memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dan keluarga dengan senantiasa berdoa dan

berdzikir kepada Allah swt. serta memberikan pemahaman yang logis dari mitos-mitos yang beredar dari kalangan masyarakat awam agar segala kesulitan yang dialami dimudahkan karena atas izin-Nya, serta diberikan kesabaran dan ketabahan hati serta kemudahan dalam proses persalinan. Dengan diberikan dukungan kepada ibu dan keluarga semata-mata untuk menjadikan hati ibu tenang dan siap fisik dan mental dalam menghadapi persalinan.

Pada langkah III, membutuhkan antisipasi apabila memungkinkan dilakukan pencegahan. Dalam mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul pada kala I. Masalah potensial yang bisa terjadi pada persalinan preterm yakni dikarenakan diabetes melitus, preeklampsia dan eklampsia, infeksi saluran kemih, polihidramnion, riwayat persalinan preterm sebelumnya, inkompetensi serviks, pemakaian obat-obatan, perokok berat, kelainan kongenital, hemoragi antepartum, solusio plasenta dan plasenta previa serta adanya ketuban pecah dini (Janet Medforth, 2014).

Berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapatkan pada kasus Ny "N" komplikasi yang terjadi adalah pecahnya ketuban sebelum masuk pada fase aktif. Pecahnya ketuban menimbulkan komplikasi infeksi pada maternal dan neonatal (infeksi intrapartum), persalinan prematur terjadi karena adanya kontraksi serta aktivitas prostaglandin meningkat sehingga terjadi kolagenase jaringan yang akhirnya ketuban tipis dan mudah pecah spontan, partus lama karena his berkurang

dan ketuban sudah pecah mengakibatkan penurunan janin terhambat, infeksi pada masa nifas serta meningkatkan seksio caesarea.

Adanya infeksi jalan lahir karena jalan lahir terbuka, maka dapat terjadi infeksi pada ibu apabila terlalu sering dilakukan pemeriksaan dalam. Bukan hanya pada ibunya, akibat persalinan preterm bisa berpengaruh pada janinnya yaitu gawat janin. Gawat janin ditandai dengan DJJ dalam proses persalinan bervariasi dan tidak kembali normal dalam beberapa waktu setelah kontraksi. Terjadinya persalinan preterm karena disebabkan oleh beberapa akibat komplikasi tersebut (Budi rahayu, 2017). Pada kasus Ny "N" tidak ada data yang menunjukkan bahwa terjadi gawat janin karena DJJ dalam batas normal yaitu frekuensi 136 x/menit terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu setelah kontraksi.

Masalah-masalah yang bisa terjadi dari persalinan preterm ini maka ibu dan keluarga berhak untuk mengetahuinya, oleh karena itu bidan berperan untuk tetap memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dan keluarga agar tetap berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT. agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi dan memberikan pemahaman bahwa Allah swt. tidak memberikan cobaan kepada umatnya diluar batas kemampuan umatnya sendiri. Dengan dukungan ini ibu yakin dengan ikhtiar serta tawakal pasti bisa dan mampu melewati persalinannya dengan lancar.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Lusiya Wijayanti menggunakan penelitian analitik observasional dengan cross sectional dengan sampel 90 orang

ibu yang mengatakan bahwa ibu bersalin dengan KPD 18 (20%), tidak KPD 72 (80%), dan prematur 12 (13,3%), serta tidak premature 78 (86,6%).

Berdasarkan kasus pada Ny “N” tidak didapatkan data penunjang terjadinya diagnosa potensial dan tidak ada tindakan segera yang perlu dilakukan karena dalam pemantauan persalinan tidak ada tindakan yang membutuhkan tindakan segera. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dilengkapi. Pada langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Suatu rencana asuhan harus sama-sama disetujui oleh bidan maupun pasien agar efektif, karena pada akhirnya pasien yang akan menentukan apakah tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu pada langkah ini diperlukan diskusi antara tenaga kesehatan dengan pasien mengenai semua rencana tindakan termasuk penegasan dan persetujuan.

Berdasarkan teori pengelolaan selama persalinan preterm yaitu pemantauan terhadap keadaan ibu dan janin, pemantauan kontraksi, istirahat dengan posisi miring ke kiri untuk peredaran darah ke uterus serta tidak dianjurkan lagi jalan-jalan akibat ketuban sudah pecah, pemberian cairan dan memperhatikan kebutuhan energi. Pada kasus Ny “N” rencana asuhan yang diterapkan yaitu pemantauan tekanan darah dan suhu tiap 4 jam, pemantauan DJJ, nadi dan his tiap 30 menit dan pemantauan kemajuan persalinan tiap 4 jam atau tiap 2 jam jika terdapat indikasi.

Pada kasus Ny “N” penanganan yang diperhatikan adalah pemantauan keadaan ibu meliputi tekanan darah dan suhu tiap 4 jam, pemantauan keadaan janin dengan memantau DJJ dan kontraksi tiap 30 menit. Ibu dianjurkan untuk miring ke kiri untuk peredaran darah ke uterus serta perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi pada ibu.

Rencana tindakan yang dibuat sesuai dengan teori yakni memantau tekanan darah dan suhu tiap 4 jam, memantau DJJ dan his tiap 30 menit serta memantau kemajuan persalinan tiap 4 jam atau tiap 2 jam jika terdapat indikasi.

Berdasarkan kasus Ny “N” pemantauan DJJ, nadi dan his tiap 30 menit dimulai dari jam 15.45 WITA, dilakukan pemeriksaan dalam pertama pada jam 15.45 WITA didapatkan pembukaan 3 cm, ketuban pecah, presentase uuk kanan lintang, penurunan hodge I, pelepasan lendir dan darah disertai pelepasan air. Dilanjutkan pemantauan DJJ, nadi, his tiap 30 menit pada jam 16.15 WITA sampai jam 19.45 WITA, dilakukan VT II pada jam 19.45 WITA didapatkan pembukaan 8 cm, ketuban pecah, presentase uuk kanan depan, penurunan hodge III, pelepasan lendir dan darah. Pemantauan DJJ, nadi dan his tiap 30 menit pada 20.15 WITA sampai 22.15 WITA, dilakukan VT III pada jam 22.15 WITA didapatkan pembukaan 10 cm, ketuban kering, presentase uuk depan, penurunan hodge IV, pelepasan lendir dan darah. Pada jam 22.15 WITA pembukaan sudah lengkap dan ibu siap untuk dilakukan pimpinan meneran.

Pemantauan dilakukan sesuai dengan teori yaitu pemantauan tekanan darah dan suhu tiap 4 jam, pemantauan DJJ, hid dan nadi dilakukan tiap 30 menit

serta pemeriksaan dalam dilakukan setiap 4 jam atau 2 jam jika terdapat indikasi. Pada langkah selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan. Pada kasus Ny “N” sudah pembukaan lengkap pada jam 22.15 WITA, ibu merasa ada dorongan yang kuat untuk meneran, merasa ingin BAB, tekanan pada anus dan his 5 kali dalam 10 menit durasi 50-55 detik dan DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 134 x/menit dan teratur, dan keadaan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

Evaluasi yang diperoleh pada kasus Ny “N” yaitu pada kala I berlangsung \pm 6 jam, keadaan ibu dan janin baik, dan tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi. Dengan demikian seorang bidan harus tetap memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dan keluarga sangat penting agar tetap tenang dalam menghadapi persalinannya yaitu dengan memperbanyak berdoa, berdzikir, istighfar, membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data ini didapatkan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan anamnesis serta melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap kasus Ny”N” didapatkan data subjektif bahwa ibu masuk pada tanggal 1 Juni 2018 jam : 15.45 WITA dengan keluhan sakit perut tembus belakang sejak tanggal 1 Juni 2018 jam 07.30 WITA, pengeluaran lendir dan darah sejak jam 13.00 WITA, disertai pelepasan air sejak jam 14.30 WITA dan sifat nyerinya hilang timbul. Ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya, HPHT tanggal 31 Oktober 2017, ibu mengatakan usia

kehamilannya ± 7 bulan, pergerakan janinnya kuat terasa pada perut sebelah kiri perut ibu.

Ibu melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali di Puskesmas Bontomarannu dan mendapat suntik TT sebanyak 2 kali, tidak pernah mengalami penyakit asma, DM, hipertensi dan jantung, ibu dan keluarga tidak memiliki penyakit menular dan penyakit keturunan/genetik, serta ibu tidak pernah menjadi akseptor KB.

Berdasarkan data objektif pada Ny "N" didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi : 78 x/menit, suhu : 36,5 °C, pernapasan : 22x/menit, kedua konjungtiva mata merah muda dan sklera putih, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak hyperpigmentasi pada areola mammae. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan leopold I didapatkan TFU 28 cm, 3 jari atas pusat, teraba bokong, leopold II PUKA, leopold III kepala, leopold IV bergerak dalam panggul (BDP), 4/5, lingkar perut 89 cm dengan taksiran berat janin 2492 gram. Keadaan janin baik ditandai dengan DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 134 x/menit, his 2 kali dalam 10 menit, durasi 20-25 detik, intrauterine, tunggal dan hidup.

Hasil pemeriksaan dalam pada tanggal 1 Juni 2018 jam 15.45 WITA didapatkan vulva dan vagina normal, portio tebal, pembukaan 3 cm, ketuban pecah jernih, presentase uuk kanan lintang, penurunan hodge I, molase dan

penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Assessment didapatkan dari hasil analisa dan interpretasi data dari subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosa/masalah yang terjadi, antisipasi diagnosa/masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap kasus Ny”N” maka diagnosa yang ditegakkan adalah perlangsungan kala II, diagnosa potensial yang didapatkan yaitu antisipasi terjadinya asfiksia, hipotermi dan BBLR. Dan dilakukan kolaborasi dengan dokter anak untuk memberikan pertolongan pertama pada bayi baru lahir preterm.

Planning mencakup tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan sesuai diagnosa. Berdasarkan implementasi dan intervensi yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi didapatkan inpartu kala I fase laten dengan pembukaan 10 cm pada jam 22.15 WITA, ibu mempunyai dorongan untuk meneran, terasa ingin BAB, his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik, DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 134 x/menit serta tanda-tanda vital dalam batas normal, serta telah diberikan dukungan psikologi dan spiritual pada ibu dan keluarga seperti memperbanyak istighfar, berdoa, berdzikir dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran agar tetap tenang dalam menghadapi persalinannya.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kala I. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

B. Kala II

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan pada Ny”N” didapatkan data subjektif, ibu merasakan ada dorongan kuat untuk meneran, sakitnya datang semakin kuat dan sering. Dan berdasarkan data objektif didapatkan perineum menonjol, vulva dan vagina membuka. DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit, his 5 kali dalam 10 menit durasi 50-55 detik, pemeriksaan dalam pada jam 22.15 WITA didapatkan pembukaan 10 cm, ketuban pecah, presentasi uuk depan, penurunan hodge IV, molase dan penumbungan tidak ada.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi di introitus vagina merupakan tanda pasti masuk kala II. Sedangkan teori mengatakan bahwa kala II dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahir bayi, tanda dan gejala kala II yaitu kontraksi uterus semakin kuat dan sering dan timbul rasa ingin mengedan menyebabkan vulva terbuka dan perineum menonjol, karena perineum bersifat elastis, perineum menonjol menyebabkan bagian terbawah janin terlihat di vulva, karena ada his dan tenaga mengedan menyebabkan bagian terbawah janin dapat dilahirkan (Aini Oktariana, 2012).

Berdasarkan pengkajian pada kala II pada kasus Ny “N” didapatkan data subjektif ibu merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran. Sedangkan data objektif didapatkan tampak perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviks telah lengkap. Meskipun ibu mules dari perut tembus belakang serta semakin kuat dan sering, ibu tetap dianjurkan berdzikir dengan ucapan istigfar dengan senantiasa mengingat kepadanya karena tidak ada kekuatan dan kehendak melainkan hanya dari Allah swt.

Bayi baru lahir preterm belum dapat menstabilkan suhu tubuhnya dengan sendirinya seperti bayi baru lahir normal lainnya sehingga rentan terjadi *hipotermi*, serta organ-organ yang belum matur pada bayi baru lahir preterm berpotensi mengakibatkan kelainan pada otak sehingga dapat menimbulkan kejang pada bayi baru lahir preterm. Hal ini dikarenakan bayi seharusnya masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam rahim, serta disebabkan karena beberapa faktor sehingga harus terlahir dan hidup diluar rahim. Pada kasus Ny “N” dilakukan kolaborasi dengan dokter anak untuk memberikan pertolongan pertama pada bayi baru lahir preterm.

Berdasarkan teori intervensi yang dilakukan terhadap persalinan preterm pada kala II yaitu : melihat tanda dan gejala kala II, siapkan alat dan bahan persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, letakkan handuk bersih di atas perut ibu dan di bawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah terlihat membuka vulva 5-10 cm, periksa lilitan tali pusat, tunggu kepala bayi sampai

melakukan putaran paksi luar kemudian lanjutkan melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah kedua bahu bayi lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir bebaskan jalan napas, keringkan dan lakukan penilaian sepiantas, jepit dan potong tali pusat. Bayi IMD dengan posisi tengkurap agar tidak bayi tidak kehilangan suhu tubuh.

Pada kala II ditandai dengan ibu merasakan nyeri perut yang semakin kuat dan sering, ada dorongan untuk meneran, dan merasa ingin BAB, perineum menonjol dan vulva membuka, didapatkan pembukaan sudah lengkap saat dilakukan pemeriksaan dalam pada jam 22.15 WITA. Asuhan yang diberikan adalah melakukan pimpinan meneran saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran pada jam 22.20 WITA, pimpinan meneran dilakukan selama \pm 10 menit. Ibu tetap diingatkan untuk berdzikir dan membaca basmalah apabila ada keinginan untuk mengedan agar diberikan kemudahan semata-mata untuk tetap bersandar kepada-Nya.

Masalah potensial yang dapat terjadi pada persalinan preterm yaitu asfiksia merupakan keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Hipotermi yaitu suhu bayi $<36,5^{\circ}\text{C}$ serta kaki dan tangan teraba dingin. Bayi berat lahir rendah yaitu berat badan pada bayi baru lahir <2500 gram (Prawirohardjo, 2014).

Asfiksia adalah merupakan keadaan dimana bayi tidak dapat segera bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Hal ini erat kaitannya dengan

hipoksi pada janin dalam uterus. Hipoksia ini berhubungan dengan faktor-faktor yang timbul dalam kehamilan, persalinan atau segera lahir (Nugroho, 2015).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Vina Oktavionita ditemukan bahwa bayi yang BBLR mengalami keadaan tidak asfiksia sebanyak 83 bayi (35,8%), sedangkan yang asfiksia sebanyak 27 (11,6%). Berdasarkan ukuran Rasio Prevalensi (RP) menunjukkan bahwa kejadian asfiksia untuk bayi kurang bulan adalah sebesar 11,6% dan bayi cukup bulan 9,9%. Penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan kejadian asfiksia antara bayi kurang bulan dan bayi cukup bulan dilihat berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai p-value >0,05.

Hipotermi terjadi karena sistem pengaturan suhu tubuh belum matang pada bayi yang baru lahir preterm disebabkan karena organ yang belum matur dan belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa bayi yang lahir preterm mengalami suhu tubuh yang tidak stabil karena tidak dapat menghasilkan panas yang cukup sebab kekurangan lemak tubuh. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ditemukan bayi lahir preterm terjadi peningkatan resiko ketidakstabilan suhu tubuh dikarenakan kekurangan lemak tubuh (Sari Pediatri, 2012).

Bayi berat lahir rendah adalah bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia kehamilan. Bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram atau sama dengan 2500 gram disebut prematur dengan masa gestasi <37 minggu (Vivian Nanny Lia Dewi, 2011). Berdasarkan hasil

penelitian Vina Oktavionita dengan menggunakan 232 responden bayi dengan BBLR pada tahun 2015 dan 2016 yang dipilih dengan teknik *Quota Sampling* yaitu pengambilan sampel dan ini menunjukkan bahwa bayi berat lahir rendah dimana bayi kurang bulan yang BBLR sebanyak 110 (47,4%) dibandingkan bayi cukup bulan yang BBLR sebanyak 122 bayi (52,6%)

Pada kasus Ny "N" didapatkan bayi lahir spontan dengan presentasi belakang kepala tanggal 1 Juli 2018 jam 22.25 WITA dengan jenis kelamin perempuan dengan BB : 2300 gram, PB : 46 cm. Setelah bayi lahir cek fundus uteri untuk memastikan kehamilan tunggal, kemudian memberitahu ibu untuk penyuntikan oksitosin, suntik oksitosin. Setelah ibu melewati proses persalinan, ibu diingatkan untuk bersyukur atas nikmat keselamatan yang diberikan dan senantiasa menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi karena segala sesuatu itu semuanya terjadi atas rencana Allah swt kepada umat-Nya.

Pada kasus Ny "N" didapatkan bayi dengan apgar score 7/10, suhu 36,5 °C, berat badan lahir 2300 gram. Bayi berat lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan <2500 gram tanpa memandang masa kehamilan. Bayi dengan berat badan lahir <2500 gram atau sama dengan 2500 gram disebut prematur.

Pada langkah IV ini tidak dilakukan tindakan segera atau kolaborasi. Tindakan ini diambil berdasarkan indikasi yang ditemukan pada langkah sebelumnya. Pada kasus Ny "N" berlangsung normal tanpa ada penyulit, bayi lahir spontan tanggal 1 Juli 2018 jam 22.25 WITA, menangis kuat, bernapas tanpa bantuan dan bergerak aktif.

Pada langkah selanjutnya, berdasarkan intervensi yang dilakukan meliputi melihat ada tanda dan gejala kala II, siapkan alat dan bahan persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, dan menganjurkan untuk membaca basmalah saat mulai mengedan, letakkan handuk bersih di atas perut ibu dan underpad di bawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah membuka vulva 5-6 cm, periksa lilitan tali pusat, tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan, kemudian melanjutkan melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah kedua bahu bayi lahir dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir jepit dan potong tali pusat kemudian bersihkan badan bayi lalu lakukan penilaian sepintas, dan segerakan untuk IMD.

Inisiasi Menyusu Dini ini untuk menjalin kasih sayang antara ibu dan bayi, selain itu agar bayi tetap mempertahankan suhu tubuh dan menciptakan ikatan batin sambil bayi berada dipelukan ibunya, ibu dianjurkan untuk membisikan kalimat-kalimat tauhid kepada bayinya agar kelak menjadi anak yang solehah.

Pada kasus Ny "N" intervensi sesuai dengan teori yang ada hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan. Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus ini pembukaan sudah lengkap pada jam 22.15 WITA, ketuban pecah, presentase uuk depan, penurunan hodge IV, molase tidak ada, pelepasan lendir, darah serta air ketuban. Alat dan bahan persalinan telah disiapkan dan pimpinan persalinan dilakukan pada pukul 22.15 WITA, bayi lahir pada tanggal 1 Juli 2018 jam 22.25 WITA, segera menangis, dan

bergerak aktif. Bayi lahir perempuan dengan berat badan lahir 2300 gram, panjang badan 46 cm.

Hasil evaluasi pada kasus Ny “N” kala II berlangsung normal yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 1 Juli 2018 jam 22.25 WITA, segera menangis, dan bergerak aktif dengan berat badan lahir 2300 gram, panjang badan 46 cm. Tinggi fundus uteri setinggi pusat. Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan pada Ny “N” di kala II tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data ini didapatkan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan anamnesis serta melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Pada kasus Ny”N” didapatkan data subjektif bahwa ibu mengatakan sakitnya semakin kuat dan sering, merasa ada dorongan yang kuat untuk meneran, ada tekanan pada anus dan rasa ingin meneran, serta ada pelepasan air.

Berdasarkan data objektif didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit durasi 50-55 detik, DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit, perineum menonjol, vulva dan anus membuka, meningkatnya produksi pengeluaran lendir bercampur darah dan pada pemeriksaan tanda pasti kala II ditentukan melalui pemeriksaan dalam yang dilakukan jam 22.15 WITA didapatkan pembukaan sudah lengkap, presentase uuk depan, penurunan hodge IV.

Assessment didapatkan dari hasil analisa dan interpretasi data dari subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosa/masalah yang terjadi, antisipasi

diagnosa/masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap kasus Ny”N” maka diagnosa yang ditegakkan adalah perlangsungan kala II, diagnosa potensial yang didapatkan yaituantisipasi terjadinya asfiksia, hipotermi dan BBLR.

Planning mencakup tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan berdasarkan diagnosa. Berdasarkan implementasi yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi didapatkan kala II berlangsung normal yaitu bayi lahir spontan segera menangis pada tanggal 1 Juni 2018 jam 22.25 WITA dengan jenis kelamin perempuan, BB : 2300 gram, PB : 46 cm dan A/S : 7/10, tinggi fundus uteri setinggi pusat. Selama pimpinan meneran dilakukan ibu senantiasa bersikap tenang, berdoa dan berdzikir serta membaca basmalah saat mulai meneran agar persalinannya dilancarkan.

C. Kala III

Berdasarkan teori yang didapatkan asuhan persalinan kala III dimulai segera setelah bayi sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Tanda-tanda terlepasnya plasenta yaitu perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, tali pusat memanjang, tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva, semburan darah tiba-tiba (Walyani, 2015).

Dari pengkajian data asuhan perlangsungan kala III pada Ny”N” didapatkan data subjektif ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri pada perut bagian bawah, ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya serta

senantiasa bersyukur kepada Allah swt. karena persalinannya berjalan dengan lancar. Sedangkan data objektif yang didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu tampak ada semburan darah secara tiba-tiba, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat dan tali pusat bertambah panjang.

Perlangsungan kala III dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit, sehingga diagnosa dapat ditegakkan berdasarkan pada data subjektif dan objektif. Pada kasus Ny "N" tidak ada indikasi atau masalah potensial yang dapat ditegakkan karena proses pelepasan plasenta berlangsung normal tanpa ada penyulit. Dan tidak terdapat data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera atau kolaborasi sehingga proses pelepasan plasenta berlangsung normal tanpa ada penyulit.

Pada kasus Ny "N" dilakukan intervensi yang sesuai yaitu pemberian oksitosin, peregangan tali pusat dan masase uterus. Periksa tinggi fundus uteri untuk memastikan tidak ada janin, pemberian oksitosin dilakukan setelah 1 menit bayi lahir. Setelah itu, suntikkan oksitosin secara IM di sepertiga bagian atas paha ibu dan segera lakukan IMD.

Pada kasus Ny "N" melakukan pemberian oksitosin secara IM, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta, lakukan masase uterus setelah plasenta lahir. Proses pelepasan dan pengeluaran plasenta berlangsung normal tanpa penyulit. Plasenta lahir 5 menit setelah bayi lahir yaitu jam 22.30 WITA, plasenta lahir lengkap dengan kotiledon dan selaput ketuban

utuh, perdarahan ± 200 cc dan segera dilakukan IMD untuk mencegah terjadinya hipotermi.

Berdasarkan hasil penelitian Heny Ekawati menggunakan tehnik sampling dengan sampel 21 bayi dengan menyatakan bahwa pelaksanaan IMD yang diberikan pada bayi baru lahir selama ± 1 jam setelah bayi lahir memberikan pengaruh terhadap perubahan suhu tubuh bayi terutama pada bayi yang lahir dengan suhu kurang dari suhu normal. Setelah dilakukan IMD kenaikan suhu antara 1° - 3° C. Hal ini sesuai dengan hasil uji statistic menunjukkan nilai $Z = -3.317$ dan $P\text{-Sign} = 0,001$ dimana $P\text{-sign} < 0,05$ artinya pelaksanaan IMD berpengaruh terhadap perubahan suhu tubuh bayi baru lahir (Heny Ekawati, 2015).

Pada kasus Ny”N” didapatkan hasil pemeriksaan dalam keadaan normal ditandai dengan uterus teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat yang berarti kala III berlangsung normal, serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data ini didapatkan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan anamnesis serta melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Pada kasus Ny”N” didapatkan data subjektif bahwa ibu mengatakan merasa lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri pada perut bagian bawah. Data objektif didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu semburan darah tiba-tiba, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat dan tali pusat bertambah panjang, kala III berlangsung ± 5 menit, plasenta lahir lengkap pada jam 22.30 WITA.

Assessment didapatkan dari hasil analisa dan interpretasi data dari subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosa/masalah yang terjadi, antisipasi diagnosa/masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Pada kasus Ny”N” maka diagnosa yang ditegakkan adalah perlangsungan kala III.

Planning mencakup tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan berdasarkan diagnosa. Berdasarkan implementasi yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi yaitu ibu dalam keadaan baik, plasenta lahir lengkap pada jam 22:30 WITA, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, TFU 1 jari bawah pusat dengan perdarahan ± 150 cc, ibu senantiasa bersyukur kepada Allah swt. karena persalinannya berjalan dengan lancar.

D. Kala IV

Pada kasus Ny”N” didapatkan data subjektif ibu lelah setelah persalinan dan data objektif kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, TFU 1 jari bawah pusat, plasenta lahir lengkap, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi : 76 x/menit, suhu : 36,8 °C dan pernapasan : 22 x/menit.

Berdasarkan teori pada kala IV hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kontraksi uterus baik, pemeriksaan serviks, vagina dan perineum untuk mengetahui terjadinya laserasi jalan lahir yang dapat diketahui adanya perdarahan setelah persalinan. Tanda-tanda vital ibu dan keadaan bayi (Kuswanti, 2014).

Berdasarkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan pada kasus Ny”N” maka diagnosis yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV, hal ini sesuai dengan teori bahwa plasenta lahir lengkap jam 22.30 WITA, dengan

tekanan darah 100/70 mmHg, nadi : 72 x/menit, pernapasan : 20 x/menit dan suhu : 36,6 °C. Pada kasus Ny “N” masalah potensial yang dapat terjadi adalah perdarahan postpartum. Dalam kala IV dinamakan dengan kala pengawasan selama 2 jam postpartum, pada kala ini rentan terjadi perdarahan postpartum. Perdarahan biasanya terjadi karena lemahnya tonus otot/kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan setelah bayi dan plasenta lahir, selain itu adanya ruptur perineum di jalan lahir, dan tidak normalnya proses pembekuan darah.

Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau tindakan kolaborasi. Hal ini sesuai dengan teori berdasarkan data yang didapatkan bahwa kala III berlangsung normal, kontraksi uterus baik, dengan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi : 72 x/menit, pernapasan : 20 x/menit dan suhu : 36,6 °C. Pada kasus Ny “N” intervensi yang dilakukan adalah memantau tanda-tanda vital ibu, pemantauan perdarahan, kontraksi uterus, kandung kemih dan tinggi fundus uteri. Pemantauan dilakukan tiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua, serta mengukur suhu tubuh ibu tiap 1 jam pertama dan 1 jam kedua. Setelah dilakukan pengawasan selama 2 jam ibu dipindahkan ke ruangan nifas.

Pada kala IV persalinan dimulai setelah plasenta lahir. Ibu mengatakan setelah melahirkan. Tanda-tanda vital ibu yaitu : tekanan darah : 100/700 mmHg, nadi : 76 x/menit, pernapasan : 20 x/menit serta suhu 36,6 °C. Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny “N” Implementasi yang dilakukan yaitu

memantau tanda-tanda vital ibu selama 2 jam postpartum. Jam 22.45 WITA didapatkan tekanan darah ibu tidak meningkat dari jam pertama tekanan darah 100/70 mmHg dan pada jam kedua tetap menjadi 100/70 mmHg.

Teori mengatakan salah satu penyebab kematian ibu pada waktu nifas adalah perdarahan postpartum. Kematian ibu disebabkan oleh infeksi, perdarahan dan atonia uteri. Maka dengan demikian, pemantauan sangat penting selama 2 jam postpartum (Fika Nurul hidayat, 2012)

Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, meminta keluarga untuk membantu ibu memberi makan dan minum kepada ibu, mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus, menganjurkan ibu dan keluarga berdoa serta berdzikir kepada Allah swt. agar anaknya menjadi anak yang shalehah kelak dan senantiasa bersyukur karena sudah diberikan kelancaran pada saat persalinan. Pada kasus Ny”N” didapatkan kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih kosong, jumlah perdarahan ± 150 cc. Hasil evaluasi ini membuktikan bahwa kala IV berlangsung normal dan tidak ada penyulit serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data ini didapatkan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan anamnesis serta melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Pada kasus Ny”N” didapatkan data subjektif bahwa ibu mengatakan merasa lelah setelah melahirkan. Berdasarkan data objektif diperoleh data yaitu Kala III berlangsung ± 5 menit, plasenta lahir lengkap pada jam 22.30 WITA, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar,

tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, perdarahan ± 150 cc, tanda-tanda vital dalam batas normal yakni tekanan darah : 100/70 mmHg, nadi : 78 x/menit, suhu : 36,8 °C. Pemantauan dilanjutkan selama 2 jam postpartum.

Assessment didapatkan dari hasil analisa dan interpretasi data dari subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosa/masalah yang terjadi, antisipasi diagnosa/masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Pada kasus Ny”N” maka diagnosa yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV.

Planning mencakup tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan berdasarkan diagnosa. Berdasarkan implementasi yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi yaitu ibu dalam keadaan baik, ditandai dengan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal. ibu dan keluarga berdoa serta berdzikir kepada Allah swt. agar anaknya menjadi anak yang shalehah kelak dan senantiasa bersyukur karena sudah diberikan kelancaran pada saat persalinan.



BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung dari lahan praktek melalui studi kasus tentang Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny “N” Dengan Usia Kehamilan Preterm Di RSUD Syekh Yusuf Gowa, sehingga penulis menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan intranatal maka dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. KESIMPULAN

1. Asuhan kebidanan pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018. Asuhan ini dilakukan dengan tehnik pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian dan analisa data dasar. Pada kasus Ny”N” didapatkan data dasar dengan usia kehamilan 34-36 minggu dan adanya pengeluaran lendir dan darah disertai pelepasan air.
2. Diagnosa Ny”N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 ditegakkan berdasarkan adanya keluhan yaitu nyeri pada perut bagian bawah tembus belakang, yang ditandai adanya pengeluaran lendir dan darah disertai pelepasan air. Sifat nyeri yang dirasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan kuat, serta pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviks 3 cm.
3. Pada Ny”N” masalah potensial yang bisa terjadi yaitu kemungkinan terjadinya infeksi jalan lahir yang disebabkan karena adanya pembukaan

serviks dan sudah ada pelepasan air ketuban. Diantisipasi terjadinya gawat janin, asfiksia, hipotermi, BBLR dan perdarahan postpartum.

4. Pada Ny”N” diperlukan tindakan segera dan kolaborasi bersama dokter anak dengan tindakan pertolongan pertama dan perawatan bayi baru lahir preterm.
5. Rencana tindakan yang telah disusun pada Ny”N” agar ibu mendapatkan penanganan yang bersih dan aman. Intervensi yang dilakukan dengan pemantauan persalinan dengan partograf, perencanaan persalinan dengan hati-hati, pertolongan dan penanganan bayi baru lahir preterm.
6. Tindakan yang dilakukan pada Ny”N” sesuai dengan intervensi yaitu bayi lahir pada jam 22.25 WITA dengan BB : 2300 gram, PB : 46 cm, A/S : 7/10
7. Tindakan evaluasi pada Ny”N” telah diberikan asuhan semaksimal mungkin dan sesuai standar pelayanan/rencana asuhan kebidanan serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi. Kondisi ibu baik dan tidak terjadi perdarahan postpartum.
8. Tindakan yang dilakukan pada Ny “N” didokumentasikan dalam bentuk SOAP sesuai dengan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney.

B. SARAN

Berdasarkan tingkat resiko yang dapat disebabkan oleh persalinan preterm maka penulis menyarankan :

1. Bagi klien
 - f. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang.

- g. Menganjurkan ibu untuk banyak istirahat pasca melahirkan
- h. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygienenya terkhusus pada organ genetaliaanya.
- i. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya sesering mungkin dan tetap memperhatikan keadaan bayinya.
- j. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi obat secara teratur sesuai instruksi yang diberikan.

2. Bagi Bidan

Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional sehingga dapat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian kematian bayi (AKB).

3. Bagi institusi

Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang profesional untuk menunjang pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan keterampilan bidan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. Aini Oktaria : / *Jurnal Midpro*. Perbedaan Kejadian Ketuban Pecah Dini antara Primipara dan Multipara, Universitas Islam Lamongan edisi 1 2012
- Alim, Zainal. Yeni Agus Safitri : / *Jurnal Hesti Wira Sakti*. Faktor yang mempengaruhi Ketuban Pecah Dini pada Ibu Hamil Trimester III di Rumah Sakit Bantuan Lawang, Vol.4 No. 1 April 2016
- Anasari, Tri. Ika Pantiawati : / *Jurnal Kebidanan*. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Persalinan Preterm di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Vol. VIII No. 01 Juni 2016
- Asmalia, Resy. Waspodo : / *Syifa’ Medika*. Pengaruh Ibu Perokok Pasif terhadap Kelahiran Bayi Prematur di Kota Palembang, Vol.7 No. 1 September 2016
- Azam, Azmeena,dkk : / *The Profesional Medical Journal*. Premature Ruptur Of Membranes. 2018, 25(2) : 168-172. DOI: 10.29309/TPMJ/18.4219
- Budi, Rahayu. Ayu Novita Sari : / *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*. Studi Deskriptif Penyebab Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) pada ibu bersalin Vol.5 No. 2 tahun 2017
- Buku Saku. Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Edisi Pertama 2013
- Departemen Agama RI. 2012. Al-qur’an Tajwid dan Terjemahan. CV : Penerbit Diponegoro.
- Ekawati, Heni. Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini (IMD) terhadap Perubahan Suhu Tubuh pada Bayi Baru Lahir Di Klinik Bersalin Mitra Husada Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, Vol. 07, No. 01, April 2015
- Fadlun, feryanto Ahmad. 2013. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Jakarta : Salemba Medika.
- Firdayanti, Arifuddin Ahmad, *Buku Daras Persalinan (Askeb II)*. Alauddin University Press, 2007.
- Fortner, Kimberly B, dkk : / *Plos One*. Bacteria Localization and Chorion Thinning among Preterm Premature Rupture of Membranes, Vol.9 Issue 1 e83338 January 2014

- Habibah, Umi. Andrea Vanesa. Dedeh Kurniasih : / Karakteristik Ibu Bersalin dengan Ketuban Pecah Dini di Stikes Binawan, Jakarta. Vol. 1 Maret 2015
- Janet, Medforth, dkk. *Kebidanan Oxford*. Jakarta : EGC. 2014
- Kementerian Kesehatan RI. Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Edisi Pertama 2013
- Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2017
- Kuswanti, Ina dan Fitria Melina. *Akeb II Persalinan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014
- Kennedy, Besty B, Donna Jean Ruth, e. Jean Martin. 2013. *Managemen Intrapartum* Edisi 4. Jakarta : EGC
- Lisda, Handayani. Rizky Amalia. Eliya Sumarni : / *Dinamika Kesehatan*. Hubungan Pola Seksual Ibu Hamil dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD H.Moch Ansari Saleh Banjarmasin, Vol.8 No. 1 Juli 2017
- Maita, Liva : / *Jurnal Kesehatan Komunitas*. Faktor Ibu yang Mempengaruhi Persalinan Prematur di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Vol.2 No. 1 November 2012
- Marie tando, Naomy. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta : Penerbit In Media, 2013
- Masrurroh, Kunsianah : / *Jurnal Ilmu Kesehatan*. Kajian Deteksi Faktor Resiko Ibu Hamil melalui Uji Coba Implementasi Model Pelayanan Maternitas “One Student One Client” di Kabupaten Kendal, Vol. 7 No. 2 Januari 2017
- Nadyah, *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal*. Alauddin University Press, 2013
- Nugroho, PMC, 2015, *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*. Tingkat Keparahan Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Berat Lahir Rendah, , p.44
- Padila. M. Amin. Rizki : / *Jurnal Keperawatan Silampari*. Pengalaman Ibu dalam Merawat Bayi Preterm yang pernah Dirawat Di Ruang Neonatus Care Unit Kota Bengkulu, Vol.1 No. 2 Januari – Juni 2018
- Prawirahardjo, Sarwono. 2014. *Ilmu Kebidanan* Cetakan keempat. Jakarta : PT Bina Pustaka
- Sari, eka puspita, kurnia dwi rimandini. 2014. *Asuhan Kebidanan pada Persalinan* Cetakan 1. Jakarta : Trans Info Medika

- Saleha, Siti. 2009. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*. Jakarta : Salemba Medika.
- Shihab,M.Quraish. *Pesan, kesan, dan keserasian Al-qur'an* (Tafsir Al Misbah). Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Siwi Walyani,Elisabeth. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*.Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2015
- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Alauddin University Press, 2013
- Sudarti,Afroh Fauziah. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, dan Balita*.Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika. 2012.
- Sven Cnattingius,dkk : / *Maternal Obesity and Risk of Preterm Delivery*, Vol.309 No. 22 june 2013
- Ulfah, Aulia.Ariadi.Elmatris : / *Jurnal Kesehatan Andalas*. Hubungan Antara Anemia pada Ibu hamil dengan Kejadian Persalinan Preterm di RSUP M.Djamil tahun 2017
- Wahyuni, Rini. Siti Rohani : / *Jurnal Ilmu Kesehatan*. Faktor–Faktor yang mempengaruhi Persalinan Preterm, Vol.2 No.1 2017
- Walyani, Elisabeth Siwi. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015
- Wijaya, Lusiya. 2014. *Hubungan Antara Ketuban Pecah Dini dengan Kejadian Persalinan Prematur di Puskesmas Grabagan Kabupaten Tuban*.




DEPARTEMEN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN


Kampus II : JL. Sultan Alauddin No.36 Samata – Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

PARTOGRAF

No. Register: XXXXXXXXXX Nama Ibu: Ny. N* Umur: 26 tahun G: 1 P: 0 A: 0
 No. Puskesmas: Tanggal: 1 Juli 2018 Jam: 15.55 WITA Alamat: Pjn xxx
 Ketuban pecah: Sejak jam: 14.30 WITA mules sejak jam: 07.30 WITA




Air ketuban	3	K
Penyusutan	0	0



Oksigenasi Utl. fetus/menit: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Obat dan Cairan IV: Tersesang infus RL 2015 WTA



Suhu: C 36.8

Urin: Protein
 Aseton
 Volume 150 Cl

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal: 01 Juli 2018
2. Nama bidan: _____
3. Tempat Persalinan:
 - Rumah Ibu Puskesmas
 - Polindes Rumah Sakit
 - Klinik Swasta Lainnya: _____
4. Alamat tempat persalinan: _____
5. Catatan: rujuk, kala: I/II/III/IV
6. Alasan merujuk: _____
7. Tempat rujukan: _____
8. Pendamping pada saat merujuk:
 - Bidan Teman
 - Suami Dukun
 - Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada: / T
10. Masalah lain, sebutkan: _____
11. Penatalaksanaan masalah tsb: _____
12. Hasilnya: _____

KALA II

13. Episiotomi:
 - Ya, Indikasi _____
 - Tidak
14. Pendamping pada saat persalinan:
 - Suami Teman Tidak ada
 - Keluarga Dukun
15. Gawat Janin:
 - Ya, tindakan yang dilakukan:
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
 - Tidak
16. Distosis bahu:
 - Ya, tindakan yang dilakukan:
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
 - Tidak
17. Masalah lain, sebutkan: _____
18. Penatalaksanaan masalah tersebut: _____
19. Hasilnya: _____

KALA III

20. Lama kala III: _____ menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U in ?
 - Ya, waktu: _____ menit sesudah persalinan
 - Tidak, alasan: _____
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x)?
 - Ya, alasan: _____
 - Tidak
23. Ponegangan tali pusat terkendal ?
 - Ya
 - Tidak, alasan: _____

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Pendarahan
1	22.45	100/70 mmHg	72 x/l	36.5 cm	1 gbrst	baik	30 cc
	23.00	100/70 mmHg	72 x/l		1 gbrst	baik	30 cc
	23.15	100/70 mmHg	76 x/l		1 gbrst	baik	30 cc
	23.30	100/70 mmHg	72 x/l		1 gbrst	baik	30 cc
2	00.00	100/70 mmHg	78 x/l	36.6 cm	1 gbrst	baik	30 cc
	00.30	100/70 mmHg	74 x/l		1 gbrst	baik	30 cc

Masalah kala IV: _____
 Penatalaksanaan masalah tersebut: _____
 Hasilnya: _____

24. Mesege fundus uteri ?
 - Ya
 - Tidak, alasan: _____
25. Plasenta lahir lengkap (intact)? Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan:
 - a. _____
 - b. _____
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit: Ya / Tidak
 - Ya, tindakan:
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
 - Tidak
27. Laserasi:
 - Ya, dimana: _____
 - Tidak
28. Jika laserasi perineum, derajat: fy 2/3/4
 Tindakan:
 - Perawatan, dengan / tanpa anestesi
 - Tidak dijahit, alasan: _____
29. Atoni uteri:
 - Ya, tindakan:
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
 - Tidak
30. Jumlah perdarahan: 350 ml
31. Masalah lain, sebutkan: _____
32. Penatalaksanaan masalah tersebut: _____
33. Hasilnya: _____

BAYI BARU LAHIR:

34. Berat badan: 3500 gram
35. Panjang: 56 cm
36. Jenis kelamin: L
37. Perilaian bayi baru lahir: baik / ada penyulit
38. Bayi lahir:
 - Normal tindakan:
 - mengeringkan
 - menghangatkan
 - rangsang takti
 - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 - Asfiksia ringan/pucat/biru/lemas/tindakan:
 - mengeringkan bebaskan jalan napas
 - rangsang takti menghangatkan
 - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 - lain - lain sebutkan: _____
 - Cacat bawaan, sebutkan: _____
 - Hipotermi, tindakan:
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
39. Pemberian ASI:
 - Ya, waktu: 1 jam setelah bayi lahir
 - Tidak, alasan: _____
40. Masalah lain, sebutkan: _____
 Hasilnya: _____



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : Jl. HM. Yasin Lempu No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-~~12~~2/FKIK/PP.00.9/ 05 /2018

Gowa, 25 Mei 2018

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa

di-
 Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Indah
NIM	: 70400115005
Judul	: Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ibu Dengan Ketuban Pecah Dini Dalam Usia Kehamilan Preterm.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan Data Awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasamanya baiknyanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

An. Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

ALAUDDIN
MAKASSAR



Prof. Dr. Mushtar Luffi, M.Pd.
 NIP. 19640706 199103 1 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Masjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 26 Juni 2018

Kepada

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa

Nomor: 070/ 875 /BKB.P/2018

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di

Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
 Nomor: 8238/S.01/PTSP/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bawha yang tersebut di bawah ini:

Nama : Indah
 Tempat/Tanggal Lahir : Tonrong Lagesi, 23 Agustus 1997
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Simata

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL DALAM USIA KEHAMILAN PRETERM DENGAN KETUBAN PECAH DINI"**

Selama : 22 Juni s/d 22 Juli 2018
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/ Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menikuti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati/ Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimohon diarahkan bantuan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Bertinggal-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8238/S.01/PTSP/2018
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1963/FKIK/PP 99.9/0/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa / peneliti dibawah ini:

Nama : INDAH
 Nomor Pokok : 70400115005
 Program Studi : Kebidanan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36. Samata Sungguminasa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL DALAM USIA KEHAMILAN PRETERN DENGAN KETUBAN PECAH DINI"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Juni s/d 22 Juli 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 22 Juni 2018

A. H. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. Peninggal

SMAP PTSP 22-06-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://p2tbpmd.su.selprov.go.id> Email : p2t_provysulsel@yahoo.com
 Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
 JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN STUDY KASUS

Nomor : 114/Diklat.RSUD-SY/VII /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa :

N a m a : Indah
 N i m : 70400115005
 Institusi : Akbid UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Study Kasus di Ruang Kamar Bersalin(INC) dan IGD Maternal RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny N " Dalam Usia Kehamilan Preterm Dan KPD Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018* pada Tanggal 22 Juni 2018 S/D 20 Juli 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 20 Juli 2018

ALA UDDIN
MAKASSAR

An. Ketua Diklat
 Koordinator bagian Penelitian
Dra. Hj. Ramlah Rauf, Bsc. MMRS
 Nip. 19630710 198703 2 019

BIODATA PENULIS



1. Identitas Peneliti

Nama lengkap : Indah
 NIM : 70400115005
 Jenis Kelamin : Perempuan
 TTL : Tonrong Lagosi, 23 Agustus 1997
 Agama : Islam
 Alamat : Samata
 No.Hp : 085218322011
 Email : indhaiskandar97@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003-2009 : SDN 381 Lagosi, Kec.Pammana, Kab.Wajo
2. Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 2 Bola, Kec.Bola, Kab.Wajo
3. Tahun 2012-2015 : MA As'adiyah Puteri Pusat Sengkang, Kab.Wajo
4. Tahun 2015-2018 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sul-Sel