


**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA Ny "R"
GESTASI 38-40 MINGGU DENGAN ANEMIA PERSALINAN
DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 05 JULI 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya (Amd. Keb)
Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
ALA UDDIN
M A K A S S A R
NURMAWATI
NIM : 70400115015

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURMAWATI
NIM : 70400115015
Tempat/ tgl Lahir : Moyo, 29 September 1996
Jurusan/ Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Btn. Paccinongan Harapan Kelurahan Paccinongan
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “R”
Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di
RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 05 Juli 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau sepenuhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, 26 Juli 2018

Penyusun

NURMAWATI
NIM : 70400115015

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurmawati
Nim : 70400115015
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "R" Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 05 Juli 2018

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R


Samata-Gowa, 26 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M. Keb
NIP : 1976126200604 2 001

Pembimbing II



dr. Nadyah, M. Kes
NIP : 19790417 200801 2 018

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 05 Juli 2018”**, yang disusun oleh **Nurmawati NIM: 70400115015**. Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari senin 06 Agustus 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 08 Agustus 2018 M
26 Dzulqaidah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc.** (.....)

Sekretaris : **Firdayanti, S.SiT, M.Keb.** (.....)

Pembimbing I : **Dr. Hj. Sitti Saleha., S.SiT., SKM.,M.Keb.** (.....)

Pembimbing II : **dr. Nadyah, M.Kes.** (.....)

Penguji I : **Nurfaizah Alza, S. SiT, M. Keb.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Supardin, M. Hi.** (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji hanya bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat berniat ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menggelarkan permadani keislaman bagi umat manusia di muka bumi terutama bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 05 Juli 2018”**. Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Kasih sayang dan penghormatan yang tak terkira kepada sesosok perempuan hebat yang menjadi ibu sekaligus ayah bagi saya ibunda Saleha, yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, bimbingan dan pelajaran hidup yang

begitu besar untuk saya. Dan juga kepada kakak-kakak saya Nurhayati, Nurbaer, Arifin dan Sirajuddin.

Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc beserta seluruh staf administrasi
3. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M. Keb selaku ketua Prodi Kebidanan dan sebagai pembimbing utama yang telah meluangkan waktu demi membimbing serta memberikan saran dan arahan bagi penulis
4. Ibu dr. Nadyah, M. Kes selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu demi membantu, membimbing, serta memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
5. Ibu Nurfaizah Alza, S. SiT, M. Keb, selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
6. Bapak Dr. H. Supardin, M. Hi selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
7. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah meberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi

8. Direktur dan petugas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin serta membantu penulis da pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
9. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya angkatan 2015 serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik di sisi Allah swt.

Akhir kata penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata-Gowa, 26 Juli 2018

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Nurmawati
Nim : 70400115015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penulisan.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TEORI	
A. Konsep Dasar Persalinan Normal.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Anemia.....	24

C. Tinjauan Islam tentang Manajemen Asuhan Persalinan.....	31
D. Konsep Dasar Manajemen Asuhan Kebidanan.....	36
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan SOAP.....	44
F. Standar Operasional Prosedur (SOP) Asuhan Persalinan Normal RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	46
BAB III STUDI KASUS	
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 Langkah Varney.....	59
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan.....	108
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Kala I.....	130
B. Kala II.....	141
C. Kala III.....	146
D. Kala IV.....	151
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Observasi Tanda-Tanda Vital.....	78
Tabel 1.2 Observasi Djj dan His.....	78
Tabel 1.3 Pemeriksaan Apgar Skor.....	92
Tabel 2.1 Observasi TFU.....	104
Tabel 2.2 Observasi Kontraksi Uterus dan Kandung Kemih.....	104
Tabel 2.3 Jumlah perdarahan.....	105
Tabel 2.4 Observasi TTV.....	105



DAFTAR SINGKATAN

AKI	Angka Kematian Ibu
DJJ	Denyut Jantung Janin
DTT	Desinfeksi Tingkat Tinggi
Hb	Hemoglobin
HPHT	Hari Pertama Haid Terakhir
HTP	Hari Taksiran Persalinan
PMS	Penyakit Menular Seksual
PX	<i>Prosessus Xipoides</i> . Bagian bawah tulang dada yang berbentuk seperti ujung atau taju pedang
SAR	Segmen Atas Rahim
SBR	Segmen Bawah Rahim
TBC	<i>Tubercuolosis</i>
TBJ	Taksiran Berat Janin
TT	Tetanus Toxid
USG	<i>Ultrasonografi</i>
UUK	Ubun-Ubun Kecil
VT	Vadinal Tousche. Pemeriksaan dalam melalui alat kelamin wanita.
WHO	<i>Word Health Organization</i> atau Organisasi Kesehatan Dunia, adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional
WITA	Waktu Indonesia Tengah

DAFTAR ISTILAH

APGAR skor	Nilai apgar, suatu metode praktis yang digunakan untuk menilai keadaan bayi sesaat setelah dilahirkan apakah mengalami asfiksia atau tidak
<i>Assesment</i>	Penilaian klinis
<i>Corpus uteri</i>	Bagian uterus atau rahim yang utama dan terbesar
<i>Degenerasi</i>	Suatu perubahan keadaan secara fisika dan kimia dalam sel, jaringan atau organ yang bersifat menurunkan efisiensinya
<i>Fleksus</i>	Anyaman atau jalinan antara struktur misalnya anyaman serat saraf atau pembuluh darah
<i>Handcoon</i>	Sarung tangan yang biasa digunakan oleh tenaga medis
HbSAg	Antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B aktif
<i>Hecting set</i>	Perlengkapan jahit yang digunakan oleh tenaga medis
His	Kontraksi uterus
Iskemia	Ketidakcukupan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh
<i>Linea nigra</i>	Garis hitam yang terbentang diatas simpisis sampai ke pusat
<i>Menarche</i>	Menstruasi yang datang pertama kali pada seorang wanita yang menginjak usia remaja
<i>Planning</i>	Rencana tindakan
SC (<i>Sectio Caesarea</i>)	Tindakan pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus dan dilakukan oleh spesialis bedah obstetri dan ginekologi

<i>Sirkulasi utero plasenter</i>	Aliran darah di mana janin bertukar nutrisi dan produk limbah dengan ibu
<i>Spingter ani</i>	Cincin serat otot pada pembukaan rektum yang mengendalikan pembukaan dan penutupan anus
<i>Streae albicans</i>	Garis-garis yang berwarna putih pada ibu multigravida dan biasanya terdapat pada perut, payudara dan paha
<i>Trofoblas</i>	Sel pada bagian tepi ovum (sel telur) yang telah dibuahi dan nantinya akan melekat di dinding rahim hingga berkembang menjadi plasenta serta membran yang memberi makan hasil pembuahan
<i>Underped</i>	Pengalas/perlak biasa digunakan dalam persalinan untuk menyerap cairan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Partograf	160
Lampiran IV	: Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (kepala Balitbanda Sulawesi Selatan)	162
Lampiran V	: Surat Izin atau Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa	1163
Lampiran VI	: Surat Izin atau Rekomendasi Penelitian dari Bupati Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa	164
Lampiran VII	: Surat keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Gowa	165
Lampiran VIII	: Daftar Riwayat Hidup	166

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH JULI 2018

Nama : Nurmawati
Nim : 70400115015
Pembimbing 1 : Hj. Sitti Saleha
Pembimbing 2 : Nadyah
Judul : **Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “R”
Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di
RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 05 Juli
2018**

Persalinan memiliki resiko bagi ibu maupun janin terutama jika persalinan dengan anemia. Resiko yang dapat terjadi pada ibu dengan anemia pada persalinan adalah pada kala I dan kala II berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan dan operasi kebidanan, pada kala III (kala uri) dapat diikuti retensio plasenta, post partum hemoragik karena atonia uteri, sedangkan pada kala IV dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri.

Karya Tulis Ilmiah adalah studi kasus yang bertujuan untuk melaksanakan asuhan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny “R” dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2018 sesuai dengan 7 Langkah Varney dan SOAP. Berdasarkan manajemen asuhan pada kasus ini keadaan ibu dan bayi baik, serta tidak terjadi komplikasi pada masa persalinan maupun pasca persalinan.

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemantauan dan analisa data Ny “R” dengan anemia pada persalinan di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018 proses persalinan kala I sampai IV berlangsung normal, tanpa komplikasi, bayi lahir spontan dengan jenis kelamin perempuan, plasenta lahir kesan lahir lengkap dan telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “R” dengan hasil tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

Kata kunci : persalinan, anemia, langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTEMENT
ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER JULY 2018

Name : Nurmawati
Student Reg. No. : 70400115015
Title : Management of Intranatal Care Midwifery on Mrs "R"
Gestation 38-40 Weeks With Anemia in Childbirth at
RSUD Syekh Yusuf on July 05, 2018

Childbirth has a risk for both mother and fetus, especially if labor with anemia. The risk that can occur in mothers with anemia in childbirth is in the first and second stages of a long time so that it can be tiring and often requires obstetric surgery and action, at the third stage (uri stage) can be followed by placental retention, post hemorrhagic partum due to uterine atony, whereas in the fourth stage secondary postpartum bleeding can occur and uterine atony.

Scientific Writing is a case study that aims to carry out the care of Intranatal Obstetric Care Management in Mrs. "R" with Childbirth Anemia in Syekh Yusuf Hospital in 2018 in accordance with 7 Steps of Varney and SOAP. Based on care management in this case the condition of the mother and baby is good, and there are no complications during labor or postpartum.

The conclusion of the case is that 7 steps of Varney and SOAP used for obstetric problem solving process have been carried out in the form of monitoring and data analysis Ny "R" with anemia at delivery in Syekh Yusuf Regional Hospital in 2018. babies born spontaneously with female gender, placenta born impression born complete and documentation of all findings and actions that have been carried out in Mrs. "R" with results not found gaps between theory and case.

Keywords: labor, anemia, Varney steps



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anemia adalah suatu keadaan *hemoglobin* (Hb) dalam darah kurang dari normal, berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan kehamilan (WHO, 2013). Dalam pendapat lain anemia adalah kondisi dimana berkurangnya sel darah merah (*eritrosit*) dalam *sirkulasi* darah atau masa *hemoglobin* sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan (Retnorini, dkk, 2017), sedangkan definisi anemia yang diterima secara umum adalah kadar Hb <12,0 gram per 100 ml (12g/dL) untuk wanita tidak hamil dan <10,0 gram per 100 ml (10 g/dL) untuk wanita hamil (Herlina, 2013).

Penyebab anemia dalam kehamilan adalah karena *defisiensi zat besi (Fe)* yang dapat disebabkan oleh kekurangan bermacam nutrisi penting dalam pembentukan hemoglobin. *Defisiensi Fe* yang umum terjadi di dunia merupakan penyebab utama terjadinya anemia gizi. Anemia *defisiensi besi* merupakan salah satu gangguan yang paling sering terjadi terutama selama kehamilan (Retnorini, 2017).

Kekurangan zat besi sejak sebelum kehamilan bila tidak diatasi dapat mengakibatkan ibu hamil menderita anemia. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko kematian pada saat melahirkan, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, janin dan ibu mudah terkena infeksi, keguguran dan meningkatkan resiko

bayi lahir *prematuur* (Kemenkes RI, 2015), dan komplikasi lain yang dapat ditimbulkan dari anemia dalam persalinan yang meliputi *atonia uteri*, *retensio plasenta*, partus lama dan perdarahan post partum merupakan bentuk dari tidak baiknya kontraksi rahim. *Atonia uteri* adalah kegagalan mekanisme kontraksi dan retraksi serat-serat *miometrium*, keadaan ini penyebab utama perdarahan post partum (Rudiyanti dan Diana, 2014).

Kekurangan kadar *hemoglobin* dalam darah mengakibatkan kurangnya oksigen yang dibawah ke sel tubuh maupun sel otak dan uterus. Jumlah oksigen dalam darah yang kurang menyebabkan disfungsi sel untuk *meregenerasi*. Pengaruh anemia saat persalinan dapat berupa gangguan his, partus lama dan perdarahan karena *atonia uteri*. Selain itu bahaya anemia selama persalinan kurangnya kekuatan saat mengejan, kala I dapat berlangsung lama sehingga dapat terjadi partus terlantar, kala II berlangsung lama sehingga dapat melelahkan, saat kala uri dapat diikuti *retensio plasenta* dan perdarahan post partum karena *atonia uteri*, kala IV terjadi perdarahan post partum sekunder dan *atonia uteri* (Rudiyanti dan Diana, 2014).

Anemia dialami oleh 85% wanita yang melahirkan pervaginam. Anemia perlu mendapatkan perhatian karena dapat menyebabkan disfungsi organ reproduksi wanita, sebagai sumber perdarahan, dan sumber atau jalan keluar masuknya infeksi, yang kemudian dapat menyebabkan kematian karena perdarahan atau *sepsis* (Manuaba dalam Rudi dkk, 2014). Dengan adanya komplikasi tersebut akan mengakibatkan *mortalitas* (kematian) dan *morbilitas*

(kesakitan) ibu yang dapat menjadi faktor-faktor peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan kualitas pelayanan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas. Diseluruh dunia diperkirakan 216 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH), tercatat 93 negara yang dilaporkan mengalami kemajuan signifikan. Namun badan kesehatan dunia juga mengungkapkan total hanya 9 negara saja yang benar-benar mencapai target perserikatan bangsa-bangsa (PBB), yaitu sedikitnya 75% yaitu Bhutan, Cabo, Verde, Kamboja, Iran, Laos, Mangolia, Rwanda, dan Timor Leste (WHO, 2015).

Angka Kematian Ibu (AKI) di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 214 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 170 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 60 per 100.000 kelahiran hidup dan Malaysia 30 per 100.000 kelahiran hidup dan Indonesia menempati urutan tertinggi di Asia Tenggara (WHO, 2014).

Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) di Indonesia AKI mengalami penurunan dari 359/100.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2012 menjadi 305/100.000 KH pada tahun 2015. Penyebab kematian ibu yakni perdarahan (35,2%), hipertensi (27,1%), infeksi (7,3%), partus lama (1,8%), dan abortus (4,7%) (Profil Kesehatan Indonesia, 2016).

Berdasarkan Profil Kesehatan Sulawesi Selatan, AKI mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu 138/100.000 KH atau (93,20%) meningkat menjadi 149/100.000 KH atau (99,38%) pada tahun 2015. Penyebab AKI terdiri dari perdarahan (41,61%), hipertensi dalam kehamilan (21,48%), infeksi (4,03%), gangguan sistem peredaran darah (8,72%), gangguan metabolik (2,01%), dan penyebab lain (22,15%) (Profil Kesehatan Sulsel, 2015 dan 2017).

Kejadian anemia di Indonesia relatif tinggi yaitu 63,5 %, yang setiap daerah mempunyai variasi berbeda, anemia merupakan salah satu penyebab persalinan lama sebagaimana hasil penelitian yang dikemukakan oleh Ratna Arista Dwi Andriani tahun 2016 menunjukkan terdapat hubungan anemia pada kehamilan dengan inpartu kala II lama (Andriani, 2016).

Berdasarkan data rekam medik Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa menunjukkan jumlah persalinan pada periode 2015 yaitu 1.804 yang diantaranya terdapat 23 (1,27%) kasus persalinan dengan anemia pada persalinan, pada tahun 2016 yaitu 1.578 persalinan yang diantaranya 19 (1,20%) dengan anemia pada persalinan, dan pada tahun 2017 tercatat 2.642 persalinan yang diantaranya 13 (0,49%) kasus dengan anemia pada persalinan (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, 2017).

Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh kejadian anemia pada persalinan maka perlu penanganan secara kolaborasi dari petugas kesehatan dalam pencegahan komplikasi untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di

Indonesia maka penulis tertarik untuk menerapkan asuhan kebidanan dengan tujuan pencegahan komplikasi yang ditimbulkan dari anemia dalam persalinan..

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup karya tulis ilmiah ini meliputi manajemen asuhan kebidanan intranatal pada ibu dengan anemia pada persalinan.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Melaksanakan pengumpulan data dasar, pengkajian pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- b. Melaksanakan identifikasi diagnosa/masalah aktual pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- c. Melaksanakan pengidentifikasian diagnosa/masalah potensial yang kemungkinan timbulnya pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

- d. Melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- e. Melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana tindakan asuhan yang menyeluruh pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- f. Melaksanakan tindakan asuhan yang menyeluruh pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- g. Melaksanakan evaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
- h. Mendokumentasikan hasil pada Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia pada Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat bagi Penulis

- a. Penulisan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru dalam pemberian asuhan kebidanan terhadap klien dengan anemia dalam persalinan.

- b. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

2. Manfaat bagi Pembaca

Sumber informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca tentang anemia dalam persalinan.

3. Manfaat bagi Institusi

Sebagai literatur dan referensi bagi mahasiswa kebidanan dalam rangka peningkatan pengetahuan.

4. Manfaat bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi supaya dapat mengurangi mortalitas dan morbiditas pada persalinan dan memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada klien dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan dengan anemia pada persalinan.

E. Metode Penulisan

Berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan praktek serta pengalaman. Penulis memerlukan data yang objektif dan relevan dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisa dalam masalah. Adapun metode penulisan proposal ini adalah :

1. Studi kepustakaan

Membaca dan mempelajari berbagai buku dan literature yang berkaitan dengan anemia dalam persalinan dan partus lama sebagai dasar teoritis yang digunakan pada pembahasan proposal ini.

2. Studi Kasus

Melaksanakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui Manajemen Asuhan Kebidanan oleh Helen Varney yang meliputi 7 langkah: pengkajian, perumusalan diagnosis/ masalah actual maupun potensial, pelaksanaan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan, implementasi dan evaluasi Asuhan Kebidanan pada ibu dengan kasus Anemia pada Persalinan. Untuk memperoleh data/ informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik :

- a. Anamnesis klien yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan ibu dan keluarga yang dapat membantu memberikan keterangan/ informasi yang dibutuhkan dengan dipantau oleh tenaga kesehatan
- b. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.
 - 1) Inspeksi merupakan proses pemeriksaan dengan melakukan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
 - 2) Palpasi dilakukan menggunakan sentuhan dan meraba. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.

- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah sedangkan lenek digunakan untuk mendengar denyut jantung janin.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungan.

3. Studi Dokumentasi

Studi yang mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter atau bidan.

4. Diskusi

Melakukan diskusi dengan ibu dan keluarga, diskusi dengan dosen pembimbing lahan dan juga pembimbing institusi yang membantu untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini adalah: Pada bab I pendahuluan, akan menguraikan tentang latar Belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang persalinan normal, anemia dan partus lama, tinjauan islam manajemen asuhan persalinan, dan manajemen asuhan kebidanan dengan anemia pada persalinan, serta pendokumentasian manajemen kebidanan.

Pada bab III yaitu study kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah Varvey yaitu identifikasi dasar, identifikasi diagnose/ masalah actual, identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi rencana tindakan dan atau intervensi, implementasi dan evaluasi serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu dengan anemia pada persalinan.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, dan semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat literature ilmiah yang telah di telah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Persalinan Normal

1. Pengertian Persalinan

- a. Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan yang cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentase belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam produk konsepsi dikeluarkan sebagai akibat kontraksi teratur, progresif, sering dan kuat yang nampaknya tidak saling berhubungan bekerja dalam keharmonisan untuk melahirkan bayi (Walyani, 2015: 5).
- b. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Kuswanti, 2014: 1).
- c. WHO mendefinisikan persalinan normal seperti spontan pada saat bersalin, beresiko rendah pada awal persalinan dan apaa yang terssisa hingga seluruh persalinan selesai. Bayi lahir spontan diposisi titik antara 37 dan 42 minggu hingga selesai proses kehamilan. Hingga selesai proses kehamilan. Setelah kelahiran ibu dan bayi berada dalam kondisi baik (Damayanti, 2014: 2).
- d. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil kosepsi yang dapat hidup diluar uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan normal atau persalinan spontan adalah bila bayi lahir dengan letak belakang kepala

tanpa melalui alat-alat atau pertolongan istimewa serta tidak melukai ibu dan bayi, dan umumnya berlangsung dalam kurang dari 24 jam. (Wiknjosarto dalam Oktarina, 2016: 2)

- e. Persalinan adalah suatu proses yang dimulai dengan adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya dilatasi progresif dari serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta dan proses tersebut merupakan proses alamiah (Rohani dalam Oktarina, 2016: 2).
- f. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus dari dalam vagina ke dunia luar (Prawirohardjo, 2014)

2. Jenis- jenis Persalinan

Berdasarkan proses berlangsungnya persalinan dibedakan sebagai berikut :

a. Persalinan spontan

Yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir

b. Persalinan buatan

Yaitu persalinan yang berlangsung dengan bantuan tenaga dari luar misalnya ekstraksi dari forceps/ vakum, atau dilakukan operasi *Section Caesarea*.

c. Persalinan anjuran

Yaitu persalinan yang berlangsung bila kekuatan yang diperlukan untuk persalian ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan misalnya pemberian pitocin dan prostaglandin (Damayanti, 2014: 4; Oktarina, 2016:2; Prawirohardjo, 2014).

3. Sebab-Sebab Dimulainya Persalinan

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti, sehingga menimbulkan beberapa teori :

a. Teori penurunan kadar hormon *progesteron*

Pada akhir kehamilan terjadi penurunan kadar *progesteron* yang mengakibatkan peningkatan kontraksi uterus karena *sintesa prostaglandin* di *chorioamniotomi*.

b. Teori rangsangan *estrogen*

Estrogen menyebabkan *iritabilitas miometrium*, *estrogen* memungkinkan *sintesa prostaglandin* pada *desidua* dan selaput ketuban sehingga menyebabkan kontraksi uterus (*miometrium*).

c. Teori reseptor *oksitosin* dan kontraksi *braxton hicks*

Kontraksi persalinan tidak terjadi secara mendadak, tetapi berlangsung lama dengan persiapan semakin meningkatnya *reseptor oksitosin*. *Oksitosin* adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar *hipofisis pars posterior* yang berfungsi sebagai kontraksi. *Distribusi reseptor oksitosin*, dominan pada fundus dan korpus uteri yang akan

mendorong pengeluaran fetus, dan semakin berkurang jumlahnya pada sekmen bawah rahim dan bahkan tidak banyak dijumpai pada serviks uteri.

d. Teori keregangan

Rahim yang semakin besar dan meregang akan menyebabkan *iskemia* (ketidak cukupan suplay darah ke jaringan atau organ) ke otot-otot rahim, sehingga mengganggu *sirkulasi utero plasenter*.

e. Teori fetal membran

Meningkatnya hormon *estrogen* menyebabkan terjadinya *esterified* yang menghasilkan *atrachnoid acid* yang bekerja untuk pembentukan *prostaglandin* yang mengakibatkan kontraksi *miometrium*.

f. Teori plasenta yang menua

Pada umur khamilan 40 minggu mengakibatkan sirkulasi pada plasenta menurun segera terjadi *degenerasi trofoblas* maka akan terjadi penurunan produksi hormon.

g. Teori tekanan serviks

Fetus yang berpresentasi baik dapat merangsang akhir syaraf sehingga serviks menjadi lunak dan terjadi *dilatasi internum* yang mengakibatkan SAR (Segment Atas Rahim) dan SBR (Segment Bawah Rahim) bekerja berlawanan sehingga terjadi kontraksi dan retraksi (Oktarina, 2016: 4; Saleha, 2012).

4. Tahapan Persalinan

Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 kala yaitu :

a. Kala I

Kala I disebut juga dengan kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai 10 cm (pembukaan lengkap). Pada permulaan his, kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga parturien masih dapat berjalan-jalan. Proses pembukaan serviks sebagai akibat his dibagi menjadi 2 fase yaitu:

1) Fase laten

Berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm

2) Fase aktif

Fase aktif dibagi menjadi 3 fase lagi yaitu :

(a) *Fase akselerasi*, dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 5cm

(b) *Fase dilatasi maksimal*, dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.

(c) *Fase deselerasi*, pembukaan menjadi lambat sekali, dalam waktu 2 jam dari pembukaan 9 cm menjadi 10 cm (pembukaan lengkap).

Kala I selesai apabila pembukaan serviks telah lengkap. Pada primigravida yang berlangsung 12-14 jam sedangkan pada multigravida berlangsung 6-8 jam. (Prawirohardjo, 2014), dan berdasarkan Kurve

Friedman di perhitungkan pembukaan primigravida 1 cm per jam dan pembukaan multigravida 2 cm per jam.

b. Kala II (kala pengeluaran bayi)

- 1) Kala II adalah kala pengeluaran bayi, yang dimulai dari pembukan lengkap sampai dengan lahirnya bayi.
- 2) Uterus dengan kekuatan hisnya ditambah dengan kekuatan meneran ibu akan mendorong bayi hingga dilahirkan
- 3) Lamanya proses ini berlangsung selama 1 ½ - 2 jam pada primigravida dan ½ - 1 jam pada multigravida.
- 4) Diagnosis persalinan kala II ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan dalam (VT) untuk memastikan pembukaan sudah lengkap dan kepala janin sudah tampak divulva 5-6 cm.
- 5) Tanda gejala kala II yaitu dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol dan vulva membuka.

c. Kala III (pelepasan plasenta)

- 1) Kala III adalah waktu untuk pelepasan dan pengeluaran plasenta
- 2) Berlangsung setelah kala II yang tidak lebih dari 30 menit, kontraksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit
- 3) Dengan lahirnya bayi dan proses retraksi uterus, maka plasenta lepas dari lapisan *Nitabusch*
- 4) Tanda-tanda terlepasnya plasenta, yaitu
 - (a) Uterus menjadi berbentuk bundar

- (b) Uterus terdorong ke atas, karena plasenta ke segment bawah rahim
 - (c) Tali pusat semakin panjang
 - (d) Terjadinya perdarahan atau adanya semburan darah
- 5) Pengeluaran plasenta dilakukan dengan dorso cranial pada fundus uteri
- d. Kala IV (kala observasi)

Kala IV dilakukan karena perdarahan post partum paling sering terjadi pada 2 jam pertama setelah persalinan. Adapun yang harus diperhatikan pada kala IV adalah :

- 1) Tanda-tanda vital
- 2) Kontraksi uterus
- 3) Tinggi fundus uteri
- 4) Kandung kemih
- 5) Perdarahan (Oktarina, 2013: 13-15)

5. Mekanisme Persalinan

Dalam mekanisme persalinan normal terjadi gerakan-gerakan penting dari janin, yaitu penurunan, fleksi, putaran paksi dalam (rotasi internal), ekstensi, putaran paksi luar (rotasi eksternal), dan ekspulsi.

a. Penurunan

Pada primipara kepala janin turun dalam rongga panggul, masuk ke PAP pada akhir minggu 36 kehamilan sedangkan pada multipara terjadi saat mulainya persalinan. Masuknya kepala janin melintasi PAP dapat dalam keadaan *sinklitismus* atau *asinklitismus*, juga dalam keadaan

melintang atau serong, dengan fleksi ringan (dengan diameter kepala janin oksitofrontalis 11,75 cm) atau fleksi sedang (dengan diameter kepala janin terjadiselama suboksipitofrontalis 11,25 cm). Penurunan kepala janin terjadi selama persalinan karena daya dorong dari kontraksi dan posisi serta peneranan (selama kala II) oleh ibu. *Fiksasi (engagement)* ialah tahap penurunan pada waktu diameter biparietal dari kepala janin telah masuk panggul ibu (Lailiyana, 2012:50).

b. Fleksi

Semakin turun ke rongga panggul, kepala janin semakin fleksi, sehingga mencapai fleksi maksimal (biasanya di Horge III) dengan ukuran diameter kepala janin yang terkecil, yaitu diameter *suboksipitobregmatika* (9,5 cm). menurut Hukum Kopper, fleksi kepala janin terjadi akibat sumbu kepala janin yang *eksentrik* atau tidak simetris, dengan sumbu lebih mendekati sub oksiput, maka tahanan oleh jaringan di bawahnya terhadap kepala yang akan menurun, menyebabkan kepala mengadakan fleksi di dalam rongga panggul. Fleksi sangat penting dalam penurunan selama kala II.

Melalui fleksi ini, diameter dari kepala janin dapat masuk ke dalam panggul dan terus menuju dasar panggul. Pada saat kepala berada di dasar panggul tekanannya akan meningkat sehingga akan terjadi fleksi yang bertambah besar yang sangat diperlukan agar diameter terkecil dapat terus turun (Saleha, 2012).

c. Putaran paksi dalam

Kepala yang turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke arah depan. Akibat kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intra-uterin yang disebabkan oleh his yang berulang-ulang, kepala mengadakan rotasi atau putaran paksi dalam, yaitu UUK memutar kearah depan (UUK berada di bawah simpisis).

d. Ekstensi

Setelah kepala janin berada didasar panggul dan UUK berada di bawah simpisis sebagai *hipomoklion*, kepala mengadakan gerakan defleksi/ekstensi untuk dapat dilahirkan, maka lahirlah berturut-turut UUB, dahi, muka dan akhirnya dagu.

e. Putaran paksi luar

Setelah kepala janin lahir, kepala segera mengadakan rotasi (putaran paksi luar), yaitu gerakan kembali sebelum putaran paksi dalam terjadi untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung anak.

f. Ekspulsi

Setelah kepala lahir, bahu akan berada dalam posisi depan belakang. Selanjutnya bahu depan dilahirkan terlebih dahulu baru kemudian bahu belakang. Menyusul trochanter depan terlebih dahulu, kemudian trchanter belakang. Maka lahirlah bayi seluruhnya (ekspulsi) (Firdayanti, 2007; Lailiyana, 2012: 51).

6. Faktor yang Berperan dalam Proses Persalinan

a. Faktor jalan lahir (Passage)

Passage atau jalan lahir merupakan salah satu faktor yang berperan dalam proses persalinan. Jalan lahir terdiri atas bagian keras tulang-tulang panggul (rangka panggul) dan bagian lunak (otot-otot, jaringan-jaringan dan ligament-ligamen) (Kuswanti, 2016: 14).

Adapun bentuk panggul seperti yang dikemukakan Caldwell-Moloy ada 4 bentuk dasar panggul ialah :

(1) Panggul gynecoid

Panggul paling baik untuk wanita, bentuk PAP hampir bulat. Panjang diameter *antero-posterior* kira-kira sama dengan diameter *transversal*. Ditemukan pada 45% wanita.

(2) Panggul android

Bentuk PAP hampir segitiga. Umumnya pria mempunyai jenis seperti ini, panjang diameter *antero-posterior* hampir sama dengan diameter *transfersal*, akan tetapi yang terakhir ini jauh lebih mendekati sacrum. Dengan demikian bagian belakangnya pendek dan gepeng, sedangkan bagian depannya menyempit ke muka, dan ditemukan 15% wanita.

(3) Panggul anthropoid

Bentuk PAP agak lonjong, seperti telur. Panjang diameter *antero-posterior* lebih besar dari pada diameter *transversal*, ditemukan pada 35% wanita.

(4) Panggul platypelloid

Jenis ini adalah jenis ginekoid yang menyempit pada arah muka belakang. Ukuran melintang jauh lebih besar dari pada ukuran muka belakang, ditemukan pada 5% wanita (Kuswanti, 2016: 24).

b. Passenger (Janin, plasenta, dan air ketuban)

Adapun faktor yang berhubungan dengan interaksi janin dalam rahim yaitu :

1) Janin

(a) Sikap (*attitude/ habitus*)

Sikap adalah hubungan bagian tubuh janin yang satu dengan bagian yang lain. Sikap menunjukkan bagian-bagian janin dengan sumbu janin, biasanya terhadap tulang punggungnya. Janin biasanya dalam sikap fleksi dimana kepala, tulang punggung dan kaki dalam keadaan fleksi, serta lengan bersilang di dada.

(b) Letak (*lie/situs*)

Letak janin adalah bagaimana sumbu janin berada terhadap sumbu ibu. Misalnya, letak lintang dimana sumbu janin tegak lurus

terhadap sumbu ibu, letak membujur dimana sumbu janin sejajar dengan sumbu ibu, ini bisa letak kepala atau letak sungsang.

(c) Presentasi (presentation)

Presentasi digunakan untuk menentukan bagian janin yang ada di bagian bawah rahim, yang dijumpai pada palpasi atau pada pemeriksaan dalam. Misalnya presentasi kepala, bokong, bahu, dan lain-lain.

(d) Posisi (position)

Posisi merupakan indikator untuk menetapkan arah bagian terbawah janin apakah sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang terhadap sumbu ibu. Misalnya pada letak belakang kepala (LBK) ubun-ubun kecil (UUK) kiri depan, UUK kanan belakang. Dan bagian terbawah janin menjadi indikator penentu presentasi (Kuswanti, dkk, 2016: 27-28).

2) Plasenta

Plasenta berbentuk bundar atau oval, ukuran diameter 15-20 cm, tebal 2-3 cm dengan berat 500-600 gram. Plasenta harus melewati jalan lahir sehingga dapat dianggap sebagai bagian dari passenger yang menyertai janin. Plasenta biasanya terlepas dalam 4-5 menit setelah bayi lahir. Dan juga selaput janin menebal dan terlipat-lipat karena pengecilan dinding rahim karena adanya kontraksi dan retraksi rahim terlepas dan sebagian karena tarikan waktu plasenta lahir. Jadi

secara singkat faktor yang berperan penting dalam pelepasan plasenta adalah retraksi dan kontraksi otot-otot rahim setelah bayi lahir (Tando, 2013: 24).

3) Air ketuban (Amnion)

Amnion adalah jaringan yang menentukan hampir semua kekuatan regangan membran janin yang mencegah rupture atau robekan. Seiring dengan pertambahan usia kehamilan, aktifitas tubuh juga mempengaruhi cairan ketuban. Saat usia kehamilan mulai memasuki usia kehamilan 25 minggu, rata-rata air ketuban dalam rahim 239 ml, yang kemudian meningkat menjadi 984 ml pada usia kehamilan 33 minggu. Amnion pada kehamilan aterm merupakan suatu membran yang kuat dan ulet tetapi lentur (Firdayanti, 2007).

c. Power (Kekuatan)

1. His (Kontraksi uterus)

Power atau kekuatan adalah tenaga ibu yang digunakan untuk dapat membuka serviks dan mendorong janin ke bawah. Dalam proses persalinan yang terdiri dari his dan kontraksi uterus dan untuk meneran. Power merupakan kekuatan utama ibu yang dihasilkan oleh adanya kontraksi dan retraksi otot-otot rahim. Perubahan yang terjadi akibat his adalah pada uterus teraba keras dan padat karena kontraksi. Tekanan hidrostatis air ketuban dan tekanan intrauterine naik serta

menyebabkan serviks menjadi mendatar (*effecment*) dan terbuka (*dilatasi*) (Tando, 2013: 26).

B. Tinjauan Umum tentang Anemia

1. Definisi Anemia

- a. Anemia adalah kondisi dimana berkurangnya sel darah merah (eritrosit) dalam sirkulasi darah atau massa hemoglobin sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan (Tarwono dan Wasnidar dalam Retnorini, 2017).
- b. Anemia adalah penurunan kadar hemoglobin kurang dari 11 gr/dl selama kehamilan pada trimester 1 dan ke 3, dan kurang dari 10 gr/dl selama post partum dan trimester 2 (Retroniri, 2017).
- c. Menurut Syaifuddin tahun 2002 bahwa anemia di dalam kehamilan bila kondisi ibu dalam kadar Hb dibawah 11,95 gr% pada trimester I dan III atau kadar Hb kurang dari 10,5 gr% pada trimester II. Nilai batas tersebut dan perbedaannya dengan kondisi wanita tidak hamil terjadi karena hemodilusi, terutama pada trimester II (Andriani, 2016).
- d. Menurut Varney 2007 anemia itu sendiri merupakan penurunan jumlah sel darah merah atau penurunan konsentrasi hemoglobin di dalam sirkulasi darah. Definisi anemia yang diterima secara umum adalah kadar Hb <12,0 gram per 100 ml (12 gr/dl) untuk wanita tidak hamil dan <10,0 gram per 100 ml (10 gr/dl) untuk wanita hamil (Herlina, 2014).

- e. Anemia adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam darahnya kurang dari 12 gr% (Wiknjosastro, 2002).
- f. Anemia adalah suatu kondisi yang terjadi ketika jumlah sel darah merah (eritrosit) dan/atau jumlah hemoglobin yang ditemukan dalam sel darah merah menurun dibawah normal. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang membawa oksigen ke jaringan tubuh. Tanpa kecukupan pasokan oksigen, banyak jaringan dan organ dalam tubuh dapat terganggu. Anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk kelelahan dan stress pada organ tubuh (Proverawati dalam Marmi, 2014).

2. Patofisiologi Anemia pada Kehamilan

Pada kehamilan darah akan bertambah banyak atau lazim disebut *hidremia* atau *hipervolemia*. Akan tetapi, bertambahnya sel darah kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma sehingga terjadi pengenceran darah. Perbandingan tersebut yaitu : plasma 30%, sel darah 18%, dan haemoglobin 19%. Terjadinya pengenceran darah dalam kehamilan sudah dimulai sejak kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya dalam kehamilan antara 32 dan 36 minggu.

Secara fisiologi, pengenceran darah ini untuk membantu meringankan kerja jantung yang semakin berat dengan adanya kehamilan. Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut bahkan tidak jarang keduanya saling berinteraksi (Marmi, 2014: 51)

3. Tanda dan Gejala Anemia

Secara klinis dapat dilihat ibu lemah, pucat, mudah pingsan, mata berkunang-kunang, sementara pada tekanan darah masih dalam batas normal, perlu dicurigai anemia defisiensi. Untuk menegakkan diagnose dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan melakukan pemeriksaan kadar Hb.

Bila terjadi anemia, kerja jantung akan dipacu lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke semua organ tubuh, akibatnya penderita sering berdebar dan jantung cepat lelah. Gejala lain adalah lemas, letih, mata berkunang-kunang, mengantuk, selaput lendir, kelopak mata dan kuku pucat (Marmi, 2014: 53).

4. Klasifikasi Anemia

a. Anemia defisiensi besi

Adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Anemia defisiensi disebabkan oleh rendahnya asupan zat besi, gangguan absorpsi, serta kehilangan zat besi akibat perdarahan menahun.

b. Anemia megaloblastik

Adalah anemia karena defisiensi asam folat, jarang sekali terjadi karena defisiensi vitamin B hal ini erat hubungannya dengan defisiensi makanan.

c. Anemia hipoplastik

Adalah anemia yang disebabkan oleh sum-sum tulang kurang mampu membuat sel-sel darah baru. Etiologi anemia hipoplastik karena

kehamilan hingga saat ini belum diketahui dengan pasti, kecuali yang disebabkan sepsis, sinar roentgen, racun dan, lain-lain.

d. Anemia hemolitik

Adalah anemia yang disebabkan penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat dari pembuatannya. Gejala utama adalah anemia dengan kelainan-kelainan gambaran darah, kelelahan, kelemahan, serta gejala komplikasi bila terjadi kelainan pada organ-organ vital. Wanita dengan anemia hemolitik sukar menjadi hamil, apabila ia hamil maka anemianya biasanya menjadi lebih berat (Marmi, 2014: 53).

5. Faktor Penyebab Anemia

Penyebab anemia adalah :

- a. Kurang gizi (malnutrisi)
- b. Kurang zat besi
- c. Malabsorpsi
- d. Kehilangan darah banyak seperti persalinan yang lalu, haid dan lain-lain
- e. Penyakit kronik seperti TBC paru, cacing usus, malaria dan lain-lain (Marmi, 2014:51).

Anemia yang paling sering terjadi dalam kehamilan dan persalinan adalah anemia defisiensi zat besi yaitu anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan ini disebabkan karena kurang masuknya unsur zat besi dalam makanan dan gangguan reabsorpsi. Dalam kehamilan, jumlah darah

bertambah (*hyperemia/ hipervolumia*) karena itu terjadi pengenceran darah karena sel-sel darah tidak sebanding pertambahannya dengan plasma darah. Secara fisiologis pengenceran darah ini adalah untuk membantu meringankan kerja jantung (Proverawati dalam Marmi, 2014: 52).

5. Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Anemia

a. Pendidikan Ibu

Semakin baik tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik pula pola pikir yang terbentuk. Adanya pola pikir tersebut akan membuat seseorang akan terbuka hal-hal yang baru dan mampu menerima informasi dengan baik. Hal ini akan mempengaruhi terbentuknya pengetahuan, sikap maupun perilaku menjadi lebih baik. Pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan dan pengetahuan akan menghasilkan perubahan (Ridayanti, 2012). Pengetahuan ibu akan berpengaruh terhadap pola konsumsi makanan termasuk zat besi dan kekurangannya zat besi dalam waktu yang relative lama akan menyebabkan terjadinya anemia (Aundrey, 2016: 970).

b. Status ekonomi

Tingkat ekonomi yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu selama hamil sangat mempengaruhi kehamilan ibu. Jika seorang ibu yang berada dalam keluarga yang berkecukupan maka ia akan dapat memenuhi kebutuhannya selama hamil. Dan pada ibu yang

kurang mengkonsumsi terutama zat besi maka akan rentan untuk mengalami kejadian anemia (Aundrey, 2016: 970).

c. Pemeriksaan kehamilan (kunjungan ANC)

Salah satu tujuan pada Antenatal Care (ANC) adalah untuk mengenal dan menangani penyakit yang menyertai kehamilan (Manuabab, 2007). Cakupan pelayanan Antenatal Care dapat dipantau melalui kunjungan ibu hamil. Pada pemeriksaan kehamilan (ANC) ibu mendapatkan penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan seperti penyuluhan gizi dan makanan juga mendapatkan tablet tambah darah yang akan memperkecil terjadinya anemia.

d. Kepatuhan mengkonsumsi suplement zat besi

Konsumsi tablet besi secara baik memberi peluang terhindarnya ibu hamil dari anemia. Namun pada kenyataannya masih ada ibu hamil yang tidak patuh dan sadar untuk meminum tablet Fe dengan alasan bentuk obat yang besar, warna obat, rasa dan efek samping dari tablet zat besi seperti nyeri lambung, mual, muntah, konstipasi dan diare.

6. Dampak Anemia pada Persalinan

Anemia pada persalinan/ inpartu dapat menyebabkan : gangguan his baik primer maupun sekunder, janin akan lahir dengan anemia, persalinan dengan tindakan yang disebabkan karena ibu cepat lelah. Pengaruh anemia terhadap persalinan :

a. Gangguan his kekuatan mengejan

His yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya menyebabkan kerintangan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap persalinan, tidak dapat diatasi sehingga persalinan mengalami hambatan atau kemacetan (Prawirohardjo, 2014: 562).

Dengan adanya kejadian anemia akan mengakibatkan kelainan his dengan kekuatan yang lemah atau tidak adekuat untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong janin keluar. Disini frekuensi his lemah atau frekuensinya jarang disebut dengan *inersia uteri hipotonik*. Inersia uteri hipotonik terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Inersia uteri primer yaitu terjadi pada permulaan fase laten, sejak awal memang telah terjadi his yang tidak adekuat, sehingga sering sulit untuk memastika apakah penderita telah memasuki keadaan inpartu atau belum.
- 2) Inersia uteri sekunder yaitu terjadi pada fase aktif kala I atau kala II. Permulaan his baik, kemudian pada keadaan selanjutnya terdapat gangguan.

b. Pada kala I dapat berlangsung lama dan terjadi partus lama

c. Pada kala II berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan dan operasi kebidanan.

d. Pada kala III (kala uri) dapat diikuti retensio plasenta, post partum hemoragik karena atonia uteri.

- e. Pada kala IV dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri (Aundrey, 2016; Retrorini, 2017).

7. Penatalaksanaan Anemia pada Persalinan

- a. Apabila diagnosa anemia telah ditegakkan, lakukan pemeriksaan apusan darah tepi darah perifer lengkap untuk melihat morfologi sel darah merah
- b. Pasang infus RL 20 tetesan/ menit
- c. Pemberian oksigen 3 liter/ jam
- d. Lakukan tranfusi darah untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi:
 - (1) Kadar Hb < 7 g/dl atau kadar hematokrik < 20%
 - (2) Kadar Hb >7g/dl dengan gejala klinik : pusing, pandangan berkunang-kunang, atau takikardi (frekuensi nadi > 100x permenit)
- e. Lakukan penilaian pertumbuhan dengan kesejahteraan janin dengan pemeriksaan USG (Marmi, 2014: 54).

C. Tinjauan Islam tentang Manajemen Asuhan Persalinan

Setiap ibu yang hendak melahirkan tentu akan mengalami cobaan yang begitu berat dengan rasa sakit yang dirasakan. Oleh karena itu Allah swt.mengabadikan perjuangan seorang wanita (ibu) selama kehamilan dan persalinannya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Luqman/31: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
 اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun [1180]. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2015: 412).

Asbabun Nuzul ayat di atas

Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah , semua ayat-ayatnya Makiyah. Ayat 13 dan 14 surat Luqman turun sepaket dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yakni ayat 12 dan 15 tentang kisah Luqman. Kisah ini diawali dengan pendahuluan yang termakjub pada ayat ke-12. Pada ayat tersebut dijelaskan profil Luqman yang diberikan hikmah dan dengan hikmah tersebut ia dapat mengajarkan langkah-langkah agar mampu bersyukur. Jika orang bersyukur maka keuntungannya untuk dirinya sendiri, sedangkan siapa yang kufur, Allah swt. pun tidak rugi. Ayat berikutnya merupakan rincian atau langkah-langkah penanaman hikmah agar menjadi hamba yang bersyukur. Ayat 13 -14 merupakan sisipan atau jumlah *i'tiradiyyah* ditengah kisah Luqman.

Para mufassir sepakat diantaranya Ibnu Katsir, al-Maraghi dan Wahbah Zuhaily- bahwa ayat ini turun pada kisah Sa'ad bin Abi Waqash dengan ibunya. Dalam kasus tersebut Ibu Sa'ad bin Abi Waqash yang bernama Hamnah

binti Abi Sufyan menolak keputusan anaknya untuk masuk Islam. Dan Hamnah mengatakan “Wahai Sa’ad telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong (kepada agama Muhammad). Demi Allah swt. aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus, aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad saw. dan kembali kepada agamamu sebelumnya.”

Sa’ad adalah anak lelaki yang paling dicintainya tetapi Sa’ad enggan untuk itu, dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, minum serta tidak berteduh sehingga Sa’ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa’ad datang menemui Nabi Muhammad saw. dan mengadukan sikap ibunya kepadanya maka turunlah ayat ini.

Diriwayatkan pula oleh Abu Sa’ad bin Abu Bakar al Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya’la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Khutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa al Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Samak bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus’ab bin Sa’ad bin Abi Waqash dari ayahnya berkata, “Ayat ini turun tentang diriku.” Lalu dia berkata, “Ibu Sa’ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya (Sa’ad) mengingkari agama (Islam). Dia tidak makan dan minum, ibu berada dalam keadaan seperti itu selama tiga hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah swt. : “Dan Kami

perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya.” (HR. Muslim dari Abu Khutsaimah).

Ayat diatas dan ayat berikutnya Allah swt. sisipkan Al-Qur'an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah swt., dan memang, Al-Qur'an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah swt. dan berbakti kepada kedua orang tua.

Thahir Ibn 'Asyur berpendapat bahwa jika kita menyatakan bahwa Luqman bukan seorang Nabi, ayat ini adalah sisipan yang sengaja diletakkan setelah wasiat Luqman yang lalu tentang keharusan mengesakan Allah swt. dan mensyukuri-Nya. Dengan sisipan ini, Allah swt. menggambarkan bahwa betapa Dia sejak dini telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hamba-Nya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan demikian, anugerah ini mencakup Luqman sebagai ganjaran atas perhatiannya memulai nasihatnya kepada anaknya agar memperhatikan hak Allah swt., jangan sampai diperseketukan. Disini, Allah swt. menunjukkan bahwa Dia bersegera mendahului siapapun untuk memberi anugerah kebajikan terhadap siapa yang memberi perhatian terhadap hak-Nya. Pendapat ini dikuatkan oleh disandingkannya perintah bersyukur kepada Allah swt. dengan penghormatan kepada kedua orang tua (Shibad, 2009: 299-201).

Kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara langsung atau tidak, yang jelas ayat di atas bagaikan menyatakan: Dan Kami wasiatkan,

yakni berpesan dengan amat kukuh, kepada semua manusia menyangkut kedua orang ibu bapaknya, pesan ini disebabkan karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu, dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyusakannya setiap saat, bahkan di tengah malam ketika saat manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapihnya di dalam dua tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak.

Dan wasiat untuk bersyukur kepada Allah swt. karena Allah swt. yang menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagiaan kamu, dan bersyukur pulalah kepada dua orang ibu bapak karena mereka yang dijadikan perantara kehadiran kita di atas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak dilakukan karena hanya kepada Allah kita akan kembali dan semua untuk dipertanggung jawabkan.

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw. menegaskan tentang perintah Allah swt. untuk memperlakukan orang tua sebaik-baiknya karena akan memberikan keberkahan dan ridho Allah swt.. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

رَضَى اللَّهُ فِي رَضَى الْوَالِدَيْنِ وَ سَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطُ الْوَالِدَيْنِ (اخرجه الترمذي وصححه ابن

Artinya:

Dari Abdullah bin 'Amrin bin Ash r.a. ia berkata, Nabi SAW telah bersabda: " Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua".(HR. At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan AlHakim)

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu alasan kepada Allah memberi wasiat kepada manusia agar berbakti pada kedua orang tua atas perjuangan yang telah dipertaruhkan oleh orang tuanya. Karena perjuangan ibu ketika melahirkan dan resiko yang sangat berat yang ditanggung oleh seorang ibu. Dan Allah begitu bijaksananya memberikan nilai dari perjuangan ibu yang meninggal pada saat melahirkan sebagai mati syahid.

D. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Anemia pada Persalinan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat (Depkes RI, 2016). Dapat disimpulkan bahwa manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasi pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan,

keterampilan dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien.

Proses manajemen ini terdiri dari 7 langkah berurutan dimana disetiap langkah disempurnakan secara periodik, proses ini dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Dengan adanya proses manajemen asuhan kebidanan ini maka akan mempermudah untuk dapat mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan suatu asuhan yang aman dan efektif.

a. Langkah-langkah dalam Manajemen Kebidanan

1) Langkah I : Pengumpulan data dasar

Pada tahap ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Tahap ini merupakan langkah awal untuk menentukan langkah berikutnya sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi dan akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya. Cara memperoleh data yaitu:

(a) Anamnesa dengan tanya jawab untuk memperoleh biodata meliputi: riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, nifas, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial, ekonomi, psikososial, spiritual serta pengetahuan klien meliputi: HPHT, pergerakan janin, umur kehamilan, sakit perut tembus belakang sejak kapan dan adanya pelepasan lendir dan darah.

- (b) Pemeriksaan fisik meliputi: pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan klien yang dilakukan secara inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi meliputi: Leopold I (mengetahui TFU, usia kehamilan dan bagian yang berada diatas fundus), Leopold II (mengetahui bagian yang janin yang berada di sisi kiri dan kanan perut ibu), Leopold III (mengetahui bagian tereendah janin), Leopold IV (mengetahui sejauh mana bagian terendah janin masuk ke PAP). Dan auskultasi dengan menggunakan lenek atau dopler untuk mendengar bunyi denyut jantung janin.
- (c) Pemeriksaan penunjang meliputi: pemeriksaan laboratorium (HB, Albumin, Reduksi), Ultrasonografi (USG), dan catatan terbaru sebelumnya.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya dengan kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Adapun keluhan yang biasa dikatakan oleh pasien yang mengalami anemia dalam persalinan yaitu: ibu merasa lelah, lemah dan pucat. Secara klinis dapat dilihat dengan tubuh yang pucat dan tampak lemah. Dan untuk memastikan pasien dengan anemia maka dilakukan pemeriksaan Hemoglobin dan pemeriksaan darah tepi. Pemeriksaan Hemoglobin dengan spektrofotometri merupakan standar.

Selain hal di atas, yang perlu diperhatikan adalah kondisi psikologis ibu yang juga menjadi faktor terjadinya anemia pada

persalinan. Seperti adanya konflik dengan suami atau keluarga, kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ekonomi dan pekerjaan, ketakutan menghadapi persalinan dengan baik, serta adanya ketakutan dan kekhawatiran yang tinggi akan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Sehingga ibu membutuhkan perhatian dan support dari orang sekitarnya agar tidak cemas dan khawatir dengan kondisinya saat itu dengan selalu mengingatkan kepada ibu agar senantiasa mengingat Allah swt. yaitu memperbanyak doa dzikir agar dimudahkan dalam persalinannya.

2) Langkah II : Interpretasi data dasar

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi atas data-data yang telah dikumpulkan. Sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik.

Ibu hamil dikatakan anemia bila kadar hemoglobin atau darah merah kurang dari 11 gr%. Menurut World Health Organization (WHO) anemia pada ibu hamil adalah kondisi ibu dengan kadar Hb 11 gr%. Ibu hamil dengan anemia sangat bervariasi yaitu: tidak anemia: Hb >11 gr%, anemia ringan: Hb 9-10,9 gr%, anemia berat: Hb <7gr%.

Bidan harus mampu mengenali tanda dan gejala dari anemia pada persalinan agar dapat melakukan asuhan kebidanan yang sesuai, kolaborasi dan komprehensif terhadap ibu. Dalam melakukan asuhan

hendaklah selalu berdoa kepada Allah agar asuhan yang diberikan dapat meringankan keluhan ibu sehingga ibu dapat merasa lebih baik.

3) Langkah III : Identifikasi diagnosa atau masalah potensial

Langkah ini mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial yang lain berdasarkan beberapa masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila mungkin diberikan pencegahan. Sambil mengamati klien, bidan diharapkan bersiap-siap apabila terjadi masalah potensial. Selain itu bidan dapat memberikan pemahaman kepada ibu bahwa kehamilan dan persalinan adalah anugrah dari Allah swt. dengan diberikan kepercayaan tersebut ibu mampu menghadapi dan bersabar dengan keluhan yang dirasakannya.

Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu yang mengalami anemia pada persalinan yaitu : gangguan his-kekuatan mengejan sehingga terjadi partus lama, Kala I dapat berlangsung lama dan terjadi partus terlantar, Kala II berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan, Kala III dapat diikuti retensio plasenta dan perdarahan post partum akibat atonia uteri, Kala IV dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri.

4) Langkah IV : Tindakan segera / kolaborasi

Langkah yang dilakukan seorang bidan dengan melakukan identifikasi dan menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnosa dan masalah yang

ditegakkan. Kegiatan yang dilakukan bidan dalam langkah ini adalah konsultasi, kolaborasi dan melakukan rujukan.

Dalam kasus anemia dalam persalinan tindakan segera yang dilakukan bidan adalah dengan pemasangan infuse cairal RL 20 tpm yang berguna untuk memperbaiki keadaan ibu yang lemah dan melakukan kolaborasi dengan dokter obgyn untuk mengantisipasi komplikasi-komplikasi terhadap ibu dan janin, menganjurkan ibu untuk beristigfar dan berdoa kepada Allah swt. serta tidak menjadikan keluhannya saat ini menjadi beban sehingga tidak semakin memperburuk kondisi ibu.

5) Langkah V : Intervensi (Perencanaan)

Melakukan perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah sesuai dengan langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang diberikan harus disetujui oleh pasien untuk menentukan apakah tindakan yang telah direncanakan bersedia untuk dijalankan atau tidak. Rencana asuhan persalinan dengan anemia yaitu :

- (a) Merencanakan pendekatan terapeutik kepada ibu dan keluarga dengan memberikan motivasi dan dukungan emosional dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan memperbanyak dzikir, istigfar, membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an agar ibu lebih tenang dan tidak terlalu memfokuskan pikirannya dengan kondisinya saat ini.

- (b) Merencanakan pemantauan Djj, nadi, dan his setiap 30 menit dan tekanan darah, suhu setiap 2-4 jam dan untuk memastikan semuanya dalam batas normal.
 - (c) Merencanakan pemantauan kemajuan persalinan pada ibu anemia dalam persalinan kemungkinan terjadinya gangguan his tidak adekuat, partus lama, retensio plasenta, perdarahan postpartum dan atonia uteri.
 - (d) Merencanakan pemasangan cairan intravena (intravenous fluids) sebagai upaya profilaksis (tindakan pencegahan) pada pasien yang tidak stabil dan pemberian obat melalui intravena.
 - (e) Merencanakan pemberian oksitosin sesuai anjuran dokter jika kemajuan peningkatan kontraksi secara teratur.
 - (f) Merencanakan asuhan persalinan sesuai APN, asuhan dilakukan untuk mencegah komplikasi lain akibat anemia dalam persalinan.
- 6) Langkah VI : Implementasi
- Pelaksanaan dari semua rencana sebelumnya, pelaksanaan pada ibu anemia pada persalinan dapat dilakukan oleh bidan secara mandiri maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, rencana asuhan persalinan pada ibu dengan anemia pada persalinan yaitu :
- (a) Melaksanankan pendekatan terapeutik kepada ibu dan keluarga dengan memberikan motivasi dan dukungan emosional dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan memperbanyak dzikir, istigfar, membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an

agar ibu lebih tenang dan tidak terlalu memfokuskan pikirannya dengan kondisinya saat ini.

- (b) Melaksanakan pemantauan Djj, nadi dan his setiap 30 menit dan tekanan darah, suhu setiap 2-4 jam dan untuk memastikan semuanya dalam batas normal
- (c) Melaksanakan pemantauan kemajuan persalinan pada ibu anemia dalam persalinan kemungkinan terjadinya gangguan his tidak adekuat, partus lama, retensio plasenta, perdarahan post partum dan atonia uteri
- (d) Melaksanakan pemasangan cairan intravena (intravenous fluids) sebagai upaya profilaksis (tindakan pencegahan) pada pasien yang tidak stabil dan pemberian obat melalui intravena
- (e) Melaksanakan pemberian oksitosin sesuai anjuran dokter jika kemajuan peningkatan kontraksi secara teratur
- (f) Melaksanakan asuhan persalinan sesuai APN, asuhan dilakukan untuk mencegah komplikasi lain akibat anemia dalam persalinan.

7) Langkah VII : Evaluasi

Langkah terakhir dalam manajemen kebidanan yaitu melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Setelah dilakukan asuhan persalinan dengan anemia pada persalinan, hasilnya ibu dengan keadaan baik bayi dalam kondisi normal, persalinan berjalan lancar sesuai dengan asuhan yang diberikan.

Setelah dilakukan asuhan persalinan dengan anemia pada ibu : masalah/ komplikasi pada ibu dapat teratasi dan ibu serta bayinya dalam keadaan umum baik.

E. Pendokumentasian Manajemen Kebidanan

Dokumentasi kebidanan adalah suatu sistem pencatatan atau pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan pasien dan semua kegiatan yang dilaksanakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan.

Pendokumentasian atau catatan manajemen kebidanan diterapkan dengan metode SOAP. Dokumentasi SOAP merupakan urutan langkah-langkah yang dapat membantu kita mengatur pola pikir dalam memberikan asuhan secara menyeluruh. SOAP (subjektif, objektif, assesment, planning).

S (Subjektif)

Subjektif adalah hasil pengumpulan data pasien yang diperoleh melalui anamnesa atau wawancara.

O (Objektif)

Objektif adalah pendokumentasian dari data hasil observasi melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium).

A (Assesment)

Assesment adalah pendokumentasian berdasarkan data yang terkumpul kemudian di buat kesimpulan yang meliputi diagnosa, antisipasi atau masalah potensial tentang anemia dalam persalinan yang disertai partus lama.

P (Planning)

Planning adalah rencana tindakan yang akan di berikan termasuk asuhan mandiri, kolaborasi serta konseling untuk tindakan lanjut.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ASUHAN PERSALINAN NORMAL
DI RSUD SYEKH YUSUF

Pengertian : Persalinan yang di tolong dengan kekuatan ibu sendiri tanpa menggunakan alat/ bantuan

Tujuan :

1. Memberikan asuhan sayang ibu selama kala I persalinan
2. Mempersiapkan ibu dan alat persalinan
3. Menggunakan alat dan analisis hasil pencatatan pada partograf
4. Mengenali secara dini berbagai masalah dan penyakit yang mungkin terjadi pada kala I persalinan
5. Membuat keputusan klinik, memberikan tindakan dengan terapi pada kala I persalinan

Prosedur :

I. Persiapan pasien persalinan

1. Mempersiapkan ruangan persalinan dan kelahiran bayi
 - a. Air DTT
 - b. Klorin 0,5 %
2. Mempersiapkan perlengkapan bahan- bahan dan obat-obatan yang di perlukan

II. Memberikan asuhan sayang ibu

1. Menyapa ibu dengan ramah dan sopan, bersikap dan bertindak tenang, berikan dukungan
2. Menuntun doa kala I
3. Menghadirkan suami atau keluarga terdekat
4. Menjawab setiap pertanyaan ibu dan anggota keluarga
5. Membantu mengatur posisi sesuai keinginannya
6. Memberikan minum dan makan apabila ibu menghendaki
7. Melakukan pencegahan infeksi
8. Mengosongkan kandung kemih
9. Melakukan observasi HIS dan DJJ kala I
 - a. Fase laten setiap 1 jam
 - b. Fase aktif setiap ½ jam
10. Menilai kemajuan persalinan tiap 4 jam
11. Mencatat hasil observasi HIS dan DJJ serta kemajuan persalinan di prtograf pada inpartu kala I fase aktif

PENANGANAN KALA II PERSALINAN

Pengertian : Penanganan persalinan yang dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap (10 cm) sampai dengan lahirnya bayi

Tujuan :

1. Menilai kemajuan persalinan
2. Menilai kondisi janin dan ibu selama kala II

Prosedur :

I. Persiapan pasien

1. Ucapkan salam “Assalamualaikum” ketika bertemu dengan pasien atau keluarga pasien
2. Ciptakan suasana yang nyaman dengan wajah tersenyum
3. Perkenalkan diri dan jelaskan peran dan tugas anda (nama, unit kerja dan maksud)
4. Sapa nama pasien “bapak/ibu (nama pasien)” sambil mencocokkan dengan gelang identitas pasien
5. Sampaikan informasi berkaitan dengan yang akan dilakukan
6. Lakukan verifikasi kepada pasien dan atau keluarga bahwa mereka telah memahami
7. Informasi yang disampaikan dengan cara bertanya “apakah bapak/ibu sudah paham?”
8. Sebelum memberikan atau melakukan tindakan, petugas agar membaca “basmalah” bersama-sama pasien dan atau keluarga pasien
9. Anjurkan keluarga untuk mendampingi pasien selama persalinan dan kelahiran
10. Anjurkan keluarga untuk terlibat dalam asuhan ibu, memberikan dukungan, membantu ibu untuk berganti posisi, melakukan pijatan, memberikan minum.

II. Prosedur pelaksanaan

1. Membersihkan perineum ibu
2. Menganjurkan ibu untuk mengosongkan rectum dan kandung kemih / berkemih dan BAB
3. Amniotomi
 - 1) Cucilah tangan dengan sabun dan air bersih dan mengalir
 - 2) Gunakan sarung tangan steril pada tangan yang akan melakukan pemeriksaan dalam
 - 3) Jelaskan pada ibu bahwa akan dilakukan pemeriksaan dalam
 - 4) Lakukan pemeriksaan dalam secara hati-hati untuk memastikan bahwa pembukaan sudah lengkap (10 cm), buka sarung tangan dengan tata cara pencegahan infeksi
 - 5) Jika pembukaan belum lengkap, tentramkan ibu dan bantulah ibu mendapatkan posisi yang lebih nyaman
 - 6) Jika ibu merasakan ingin meneran tetapi pembukaan serviks belum lengkap beri semangat dan ajarkan cara bernafas cepas selama kontraksi berlangsung. Bantu ibu memperoleh posisi yang nyaman dan beritahukan untuk menahan diri untuk meneran hingga penolong memberitahukan saat yang tepat untuk ibu
 - 7) Jika pembukaan sudah lengkap dan ibu merasa ingin meneran, bantu ibu untuk mengambil posisi nyaman untuk meneran beri semangat dan anjurkan untuk mulai meneran sesuai dengan dorongan

alamiahnya. Catata pemeriksaan dalam partograf dan terus pantau DJJ setiap 5 menit, pastikan bahwa ibu beristirahat di antara kontraksi

- 8) Jika pembukaan sudah lengkap tetapi ibu tidak ada dorongan untuk meneran, bantu ibu memperoleh posisi yang nyaman (bila masih mapu anjurkan untuk berjalan-jalan)
- 9) Posisi berdiri dapat membantu menurunkan bayi yang berlanjut dengan dorongan untuk meneran. Ajarkan cara bernafas selama kontraksi berlangsung. Pantau kondisi ibu dan bayi (lihat pedoman fase aktif persalinan) pantau DJJ setiap 5-10 menit.
- 10) Stimulasi puting susu mungkin dapat meningkatkan kekuatan dan kualitas kontraksi.
- 11) Jika ibu tetap tidak ada dorongan untuk meneran setelah 60 menit pembukaan lengkap, anjurkan ibu untuk mulai meneran di setiap puncak kontraksi. Anjurkan ibu mengubah posisinya secara teratur, tawarkan minum pantau DJJ setiap 5-10 menit. Lakukan stimulasi puting susu untuk memperkuat kontraksi.
- 12) Jika bayi tidak lahir setelah 60 menit upaya tersebut di atas atau jika kelahiran bayi tidak segera akan terjadi, pertimbangkan kemungkinan CPD.

- 13) Jika ibu berbaring miring atau setengah duduk, ibu mungkin merasa lebih mudah untuk meneran jika ia menarik lutut ke arah dada dan menempelkan dagu ke dada.
- 14) Anjurkan ibu untuk tidak mengangkat bokong saat meneran
- 15) Saat kepala bayi mendorong atau membuka vulva sekitar 5-6 cm letakkan kain atau handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi segera setelah lahir. Letakkan kain bersih dan kering yang dilipat 1/3-nya di bawah bokong ibu.
- 16) Jika ibu berbaring miring atau setengah duduk, ibu mungkin merasa lebih mudah untuk meneran jika ia menarik lutut ke arah dada dan menempelkan dagu ke dada.
- 17) Lindungi perineum dengan satu tangan (di bawah kain bersih dan kering) dan letakkan tangan yang lain pada kepala bayi.
- 18) Berikan tekanan yang lembut keras pada kepala bayi dengan menggunakan tangan lainnya dan biarkan kepala bayi keluar secara bertahap di bawah tangan tersebut.
- 19) Pertahankan perineum pada saat kepala keluar dan dilahirkan
- 20) Setelah kepala bayi lahir mintalah ibu berhenti meneran dan bernafas cepat.
- 21) Raba leher bayi apakah ada lilitan tali pusat, jika ada (tali pusat longgar) lepaskan melewati kepala bayi, jika tali pusat meliliti leher

bayi dengan erat klem di dua tempat dan potong tali pusat diantara 2 klem tersebut.

- 22) Setelah menyeka mulut dan hidung bayi hingga bersih dan memeriksa tali pusat, tunggu hingga terjadi kontraksi berikutnya dan awasi rotasi spontan kepala bayi.
- 23) Setelah rotasi esternal, letakkan satu tangan pada masing-masing sisi kepala bayi beritahukan pada ibu untuk meneran pada kontraksi berikutnya.
- 24) Usap muka bayi dengan kain atau kassa bersih untuk membersihkan mulut dan hidung bayi dan lendir dan darah.
- 25) Jangan melakukan penghisapan secara rutin pada mulut dan hidung bayi, tapi jika cairan mengandung mekonium lakukan penghisapan secara hati-hati dengan penghisap lendir De Lee Steril. Selalu hisap mulut bayi lebih dahulu sebelum menghisap hidungnya.
- 26) Lakukan tarikan perlahan kearah bawah dan luar secara lembut (kearah tulang punggung ibu) hingga bahu anterior tampak diluar aratus pubis.
- 27) Angkat kepala bayi kearah atas dan luar (mengarah ke langit-langit) untuk melahirkan bahu posterior bayi.
- 28) Saat bahu (posterior) kepala bayi kearah perineum dan biarkan bahu dan bagian tangan bayi lahir ke tangan penolong.

- 29) Gunakan jari-jari tangan yang sama untuk mengendalikan kelahiran siku dan tangan pada sisi posterior bayi pada saat melewati perineum.
- 30) Gunakan jari-jari tangan yang berada di belakang (posterior) untuk menahan tubuh bayi saat lahir.
- 31) Gunakan tangan bagian depan (anterior) untuk melahirkan bahu anterior dan untuk mengendalikan kelahiran siku dan tangan anterior bayi.
- 32) Setelah kelahiran tubuh dan lengan, sisipkan tangan bagian depan (anterior) di punggung kearah bokong dan kaki bayi untuk menahan laju kelahiran bayi saat kaki lahir.
- 33) Sisipkan jari telunjuk dari tangan yang sama diantara kaki bayi, pegang dengan mantap bagian mata kaki bayi dan baru lahirkan kakinya secara hati-hati.
- 34) Baringkan bayi diatas kain atau handuk yang terletak di perut ibu sehingga kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya.
- 35) Segera keringkan dan rangsang bayi dengan kain atau selimut di atas perut ibu. Pastikan bahwa bagian kepala bayi tertutup dengan baik
- 36) Memotong tali pusat dengan menggunakan gunting, klem tali pusat 3 cm dari pusat bayi, lakukan pengurutan pada tali pusat dari klem ini kearah ibu dan kemudian pasang klem kedua pada sisi ibu 2 cm dari klem pertama, oleskan bethadin pada tali pusat perut ibu

- 37) Potong tali pusat diantara kedua klem tersebut dengan tangan kiri penolong melindungi bayi
- 38) Jepit tali pusat dengan menggunakan klem steril lalu bungkus dengan kain kasa steril
- 39) Dekontaminasi
- 40) Beri kesempatan pasien dan atau keluarga untuk bertanya terkait maksud dan tujuan pemeriksaan/ tindakan (apakah masih ada yang ingin ditanyakan ?)
- 41) Tawarkan bantuan kembali “apakah masih ada yang dapat saya bantu ?”, dan “jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuan, silahkan tekan tombol, bel atau mendatangi ners station”
- 42) Ucapkan “terima kasihbapak/ ibu semoga semuanya dapat berjalan dengan baik, Amin”
- 43) Ucapkan salam “Assalmualikum wr. wb”

MANAJEMEN AKTIF KALA III

Pengertian : Suatu tindakan melahirkan plasenta secara aktif yaitu dengan segera memberikan oksitosin 10 unit segera setelah bayi lahir dan melakukan traksiter kendali pada tali pusat agar separasi plasenta segera di inisiasi.

Tujuan : Menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga dapat mempersingkat waktu, mencegah perdarahan paska persalinan dan mengurangi kehilangan darah kala III persalinan.

Prosedur :

I. Persiapan alat

1. Jarum 3 cc
2. Medikamenta, oksitosin 10 unit IU
3. Sarung tangan 2 buah
4. Klem kocher/ Kelly 2 buah
5. Mangkok plasenta
6. Umbilical klem kasa
7. Povidan iodine

II. Persiapan pasien

1. Bantuan pasien dalam posisi litotomi
2. Secara lembut melakukan palpasi abdomen dengan dialasi kain bersih untuk menentukan apakah ada janin lain
3. Memberikan oksitosin 10 IU IM segera
4. Pegang klem dan tali pusat dengan lembut, dan tunggu sampai kontraksi berikutnya. Jika perlu pindahkan klem lebih dekat ke perineum pada saat tali pusat
5. Pada saat kontraksi berikutnya terjadi, ulangi penegangan tali pusat terkendali dan tekanan dorso cranial pada korpus uteri secara serentak. Ikuti langkah tersebut setiap kontraksi sehingga terasa plasenta terlepas dari dinding uterus

6. Setelah plasenta terpisah, anjurkan ibu untuk meneran agar plasenta terdorong keluar melalui introitus vagina (tetap tegangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai). Dengan uterus melepaskan plasenta yang telah terpisah dari dinding uterus akan mencegah kehilangan darah yang tidak perlu
7. Jika selaput ketuban robek dan tertinggal di jalan lahir, saat melahirkan plasenta mdengan hati-hati periksa vagina dan serviks dengan seksama. Gunakan jari atau klem steril atau forsep untuk mengeluarkan selaput ketuban yang teraba
8. Dekontaminasi

MANAJEMEN AKTI KALA IV

Pengertian : Pengawasan yang dilakukan setelah plsentia lahir sampai jam post partum

Tujuan :


1. Memantau keadaan ibu dan bayi
2. Mengenali dan mengatasi penyulit yang timbul

Prosedur :

1. Menilai perdarahan
 - a. Memeriksa kedua sisi plsentia baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantung selama 15 menit

- b. Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif
2. Melakukan prosedur pasca persalinan
 - a. Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik. Mengevaluasi perdarahan pervaginam
 - b. Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5 % membilas kedua tangan dengan air DTT dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering
 - c. Meningkatkan klem tali pusat desinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati di sekeliling tali pusat
 - d. Mengikat satu lagi simpul mati di bagian tali pusat yang bersebrangan dengan simpul mati yang pertama
 - e. Melepaskan klem bedah dan meletakkannya di dalam larutan klorin 0,5 %
 - f. Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. Memastikan handuk atau kainnya bersih dan kering
 - g. Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI
3. Evaluasi
 - a. Mengajar pada ibu / keluarga bagaimana melakukan massase uterus dan memeriksa kontraksi uterus
 - b. Mengevaluasi kehilangan darah

- c. Memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan 30 menit selama jam kedua pasca persalinan
- d. Memeriksa suhu tubuh ibu setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan
- e. Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang normal



BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY R
GESTASI 38-40 MINGGU DENGAN ANEMIA
DI RSUD SYEKH YUSUF
TANGGAL 5 JULI 2018

No. Registrasi : 502XXX
Tanggal masuk : 05 Juli 2018 Jam : 07.50 WITA
Tanggal Pengkajian : 05 Juli 2018 Jam : 07.50 WITA
Tanggal Partus : 05 Juli 2018 Jam : 12.25 WITA
Nama Pengkaji : Nurmawati

KALA 1

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identits Ibu/Suami

Nama : Ny. "R" / Tn. "A"
Umur : 24 tahun / 26 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / 4 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Biringkalloro (Pallangga)

2. Data Biologis/Fisiologis

a. Keluhan Utama

Ibu mengeluh nyeri perut tembus ke belakang yang disertai pelepasan lendir dan darah.

b. Riwayat Keluhan Utama

- 1) Ibu merasakan nyeri perut tembus ke belakang disertai pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 04 Juli 2018 pukul 18.00 wita.
- 2) Sifat nyeri hilang timbul dan tidak ada pengeluaran air ketuban dari jalan lahir.
- 3) Usaha klien untuk mengatasi keluhannya dengan mengelus-elus perut dan pinggangnya.
- 4) Selain keluhan tersebut ada keluhan lain yang menyertai ibu yaitu pusing pada kepala dan merasa lelah

3. Riwayat Menstruasi

- a. Menarce : 13 tahun
- b. Siklus haid : 28-30 hari
- c. Lama haid : 6-7 hari
- d. Dismenorrhea : tidak ada

4. Riwayat Kehamilan Sekarang

- a. Ini merupakan kehamilan ibu yang kedua dan tidak pernah mengalami keguguran sebelumnya
- b. Hari pertama haid terakhir (HPHT) tanggal 06 Oktober 2017

- c. Hari taksiran persalinan (HTP) tanggal 13 Juli 2018
- d. Umur kehamilan sekarang \pm 9 bulan.
- e. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil
- f. Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat di bagian sebelah kiri perut ibu sejak bulan Maret 2018 pada usia kehamilan 5 bulan
- g. Antenatal care (ANC) 8 kali di Puskesmas Pallangga
- h. Imunisasi tetanus toksoid (TT) di Puskesmas Pallangga
TT I tanggal 12 Maret 2018
TT II tanggal 10 April 2018
- i. Keluhan selama kehamilan
 - 1) Trimester I : ibu mengalami mual muntah di pagi hari
 - 2) Trimester II : tidak ada keluhan
 - 3) Trimester III : ibu mengeluh sering kencing dan nyeri perut bagian bawah
- j. Selama hamil ibu jarang mengonsumsi tablet merah yang diberikan bidan karena ibu tidak menyukai baunya yang membuat ibu mual.

5. Riwayat Kehamilan dan Persalinan yang Lalu

Anak pertama ibu lahir pada tahun 2015 pada usia kehamilan 9 bulan, ibu melahirkan secara normal/ spontan yang ditolong oleh bidan di Puskesmas Pallangga, dengan keadaan anak hidup yang berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan lahir 2800 gram dan panjang badan lahir 47 cm.

6. Riwayat Nifas yang Lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresi setelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas seperti keluar cairan yang berbau busuk, pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui anak pertamanya secara eksklusif selama 6 bulan dan ditambah makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan.

7. Riwayat Kesehatan yang Lalu

- a. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit seperti jantung, asma, hipertensi, diabetes militus (DM).
- b. Ibu tidak memiliki penyakit menular seperti tubercuolosis (TBC), malaria, hepatitis, dan Penyakit Menular Seksual (PMS).
- c. Ibu tidak memiliki riwayat alergi terhadap makanan maupun obat-obatan.
- d. Ibu tidak memiliki riwayat operasi dan juga tidak pernah di opname di rumah sakit maupun di puskesmas

8. Riwayat Kesehatan Keluarga

- a. Tidak ada riwayat penyakit menular seperti tubercuolosis (TBC), malaria, hepatitis, dan penyakit menular seksual (PMS).
- b. Tidak ada riwayat penyakit seperti jantung, asma, hipertensi, dan diabetes militus (DM).

9. Riwayat Ekonomi

- a. Ibu mengatakan kebutuhan biaya sehari-hari dalam keluarganya mencukupi

- b. Ibu mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga

10. Riwayat Psikososial

- a. Ibu menikah 1 kali dengan suami yang sekarang dan sudah \pm 4 tahun lamanya
- b. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga
- c. Ibu dan keluarga bahagia dengan kehamilannya
- d. Keluarga menunggu selama proses persalinan
- e. Ibu tidak pernah mempermasalahkan jenis kelamin anaknya

11. Riwayat Spiritual

- a. Ibu dan suami rajin melaksanakan ibadah.
- b. Ibu dan keluarga selalu berdoa semoga persalinannya berjalan dengan lancar sehingga ibu dan bayinya sehat dan selamat

12. Riwayat KB

Sejak kelahiran anak pertamanya yaitu pada tahun 2015 ibu mulai menjadi akseptor KB depomedroksi progestin asetat/ suktik 3 bulan dan ibu berhenti pada tahun 2017 karena ingin hamil lagi.

13. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- a. Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan :

- 1) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- 2) Frekuensi : 3 kali sehari

3) Kebutuhan minum : 6-8 gelas perhari air putih dan 2 gelas perhari susu hamil

Selama Inpartu :

Ibu makan hanya sedikit dan lebih banyak minum.

b. Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan :

- 1) BAK : 5-6 kali sehari, berwarna kuning dan berbau amonik
- 2) BAB : 1 kali sehari dengan konsistensi padat, berwarna kuning

Selama inpartu :

Ibu BAK di tempat tidur karena sudah dipasang popok dan ibu belum BAB (ibu terakhir BAB pada pukul 17.00 wita di rumah).

c. Personal hygiene

Kebiasaan :

- 1) Mandi, 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- 2) Sikat gigi, 2 kali (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi
- 3) Keramas, 3 kali seminggu dengan menggunakan sampo
- 4) Mengganti pakaian, 2 kali sehari

Selama inpartu :

Ibu belum mandi dan sikat gigi

d. Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan :

Tidur siang tidak teratur dan tidur malam 6-8 jam.

Selama inpartu :

Ibu tidak pernah tidur

3. Pemeriksaan Fisik

a. Keadaan umum lemah

b. Kesadaran composmentis

c. Tanda-tanda vital

TD : 90/70 mmHg P : 22 x/menit

N : 80 x/menit S : 36,7°C

d. Inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi

1) Kepala

Inspeksi : rambut hitam, keadaan kulit kepala bersih, tidak ada ketombe

Palpasi : tidak ada oedema dan nyeri tekan

2) Wajah

Inspeksi : tidak ada coloasma

Palpasi : tidak ada oedema dan tidak ada nyeri tekan

3) Mata

Inspeksi : konjungtiva pucat, sclera putih dan tidak kuning

4) Hidung

Inspeksi : bersih, tidak ada secret, dan tidak ada polip

5) Mulut

Inspeksi : bibir lembab, keadaan mulut bersih, tidak ada caries dan gigi tanggal

6) Telinga

Inspeksi : tidak ada serumen

7) Leher

Inspeksi : tidak ada pembengkakan pada leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis

8) Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, bentuk dan ukuran yang sama, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae

Palapsi : tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan, terdapat colostrum saat puting dipencet.

9) Abdomen

Inspeksi : tidak ada bekas operasi, tampak pembesaran perut sesuai usia kehamilan, tampak linea nigra, striae alba

Palpasi :

Leopold I : TFU 2 jrbpx, 34 cm, bokong

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

LP : 92 cm

TBJ : $TFU \times LP = 34 \times 92 = 3.128$ gram

Auskultasi : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah
perut ibu dengan frekuensi 132 x/ menit dan teratur

HIS : 2 kali dalam 10 menit durasi 20-25 detik

9) Genetalia

Inspeksi : keadaan genetalia tampak bersih, tidak ada varises,
oedema, tidak ada pembesaran kelenjar bartholini,
dan tampak pengeluaran lendir dan darah

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 05 Juli 2018 pukul: 08.00

WITA

- a) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b) Portio : tipis
- c) Pembukaan : 6 cm
- d) Ketuban : utuh
- e) Presentase : UUK lintang kanan
- f) Penurunan : hodge II

- g) Molase : tidak ada
- h) Penumbungan : tidak ada
- i) Kesan panggul : normal
- j) Pelepasan : lendir dan darah
- 10) Anus
- Inspeksi : tidak ada hemoroid
- 11) Ekstremitas
- Inspeksi : simetris kiri dan kanan
- Palpasi : tidak ada oedema pada tungkai, tidak ada varices,
tidak ada nyeri tekan
- Perkusi : terdapat refleks patella kiri dan kanan.
- 12) Pemeriksaan penunjang
- Laboratorium : Tanggal 05 Juli 2018 jam 08.00 WITA
- Hb : 8,9 gr/dL
- Albumin : negatif
- Reduksi : negatif
- HbSAg : NR

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA MASALAH AKTUAL

GII PI A0, gestasi 38 minggu 6 hari, situs memanjang, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan ibu lemah, keadaan janin baik, inpartu kala I fase aktif dengan anemia.

1. GIIPIA0

DS : ibu mengatakan ini kehamilan yang kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya, ibu merasakan adanya pergerakan janin sejak bulan Maret 2018 pada usia kehamilan 5 bulan.

DO : tampak pembesaran perut sesuai usia kehamilan, tampak linea nigra, striae alba, terdapat denyut jantung janin dan otot perut telah kendor dan pada pemeriksaan Leopold didapatkan hasil:

Leopold I : TFU 2 jrbpx, 34 cm, bokong

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit dan teratur

Analisis dan interpretasi data

Pada pemeriksaan kulit perut tampak adanya linea nigra, striae alba yang menandakan kehamilan yang kedua, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat di palpasi hal ini merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan, serta otot perut yang kendor menandakan perut ibu sudah pernah mengalami peregangan sebelumnya (Prawirohardjo, 2014: 179).

2. Gestasi 38 minggu 6 hari

DS : HPHT tanggal 06 Oktober 2017

DO : pemeriksaan Leopold 1 tinggi fundus uteri 2 jari di bawah *proessus xhipoideus*, dan hari taksiran persalinan tanggal 13 Juli 2018.

Analisis dan Interpretasi Data

Dari hasil pemeriksaan dilihat dari rumus Negle mulai dari HPHT tanggal 06 Oktober 2017 sampai tanggal pengkajian maka umur kehamilan ibu 38 minggu 6 hari (Prawirohardjo, 2014: 279)

3. Situs Memanjang

DS : ibu mengatakan janinnya bergerak kuat pada bagian sebelah kiri perut ibu

DO : pada palpasi Leopold didapatkan hasil :

Leopold I : TFU 2 jrbpx, 34 cm, bokong

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit dan teratur.

Analisis dan Interpretasi Data

Dengan teraba bagian besar janin yaitu bokong pada fundus ibu dan kepala pada bagian terendah, DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dan gerakan janin yang dirasakan pada salah satu perut ibu

menunjukkan bahwa sumbu panjang janin sejajar dengan sumbu panjang ibu (Prawirohardjo, 2014: 205-206).

4. Intrauterin

DS : ibu merasakan janinnya bergerak dengan kuat dan ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya.

DO : ibu tidak merasakan nyeri perut pada saat di palpasi, TFU sesuai umur kehamilan dan pada palpasi leopold teraba bagian-bagian janin yaitu:

Leopold I : TFU 2 jrbpx, 34 cm, bokong

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

Analisis dan Interpretasi Data

Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah *kavum uteri* dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai dengan aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Janin yang berada dalam korpus uteri disebut dengan kehamilan intrauterin.

5. Tunggal

DS : ibu merasakan pergerakan janinnya kuat pada satu sisi perut ibu yaitu sisi kiri perut ibu

DO : pembesaran perut sesuai usia kehamilan, pada palpasi abdomen di dapatkan hasil Leopold yaitu

Leopold I : TFU 2 jrbpx, 34 cm, bokong

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

Pada auskultasi hanya terdapat satu denyut jantung janin (DJJ) yaitu terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit serta tinggi fundus uteri sesuai dengan umur kehamilan.

Analisis dan Interpretasi Data

Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, dan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada satu kuadran perut ibu (Oktarina, 2016: 9).

6. Hidup

DS : ibu merasakan pergerakan janinnya aktif, dan kuat sejak bulan Maret 2018 pada usia kehamilan 5 bulan sampai sekarang.

DO : pada auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit.

Analisis dan Interpretasi Data

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantung teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu 1 kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014: 285).

7. Keadaan ibu lemah

DS : ibu mengeluh kepalanya pusing, merasa lelah

DO : tanda-tanda vital dalam batas normal, dengan konjungtiva pucat, sclera putih dan tidak ikterus serta tidak ada oedema dan nyeri tekan.

Dengan pemeriksaan laboratorium yaitu hemoglobin 8,9 gr/dL

Analisis dan Interpretasi Data

Pada pemeriksaan fisik di dapatkan hasil pemeriksaan dimana terdapat adanya tanda dan gejala anemia seperti ibu merasa lelah dan letih dengan konjungtiva pucat dan hasil pemeriksaan hemoglobin 8,9 gr/dL.

8. Keadaan janin baik

DS : ibu merasakan pergerakan janin aktif, kuat sejak bulan Maret 2018 pada usia kehamilan 5 bulan sampai dengan sekarang

DO : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit dan teratur

Analisis dan Interpretasi Data

Pergerakan janin yang kuat dan sering serta denyut jantung janin (DJJ) yang terdengar jelas, kuat dengan frekuensi 132 x/menit dan teratur, menandakan keadaan janin dalam keadaan baik, dimana dinilai dari normal DJJ yaitu 120-160 x/menit (Prawirohardjo, 2014: 222).

9. Inpartu kala I fase aktif

DS : ibu mengatakan nyeri perut tembus ke belakang yang dirasakan sejak tanggal 04 juli 2018 pukul 18.00 wita dan ibu mengatakan adanya pengeluaran lendir dan darah sejak hari yang sama.

DO : tampak pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 05 juli 2018 pukul 08.00 wita, kontraksi uterus 2 x dalam 10 menit dengan durasi 25-30 detik.

Hasil pemeriksaa dalam (VT) tanggal 05 juli 2018 pukul 08.00 WITA oleh mahasiswa "N"

- 1) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- 2) Portio : tipis
- 3) Pembukaan : 6 cm
- 4) Ketuban : utuh
- 5) Presentase : UUK lintang kanan
- 6) Penurunan : hodge II
- 7) Molase : tidak ada
- 8) Penumbungan : tidak ada

9) Keasan panggul : normal

10) Pelepasan : lendir dan darah

Analisis dan Interpretasi Data

Nyeri perut yang terjadi karena terbukanya mulut rahim di sertai peregangan otot polos rahim yang menimbulkan nyeri karena adanya penekanan pada ujung syaraf sewaktu uterus berkontraksi. Kontraksi uterus yang terjadi secara teratur dan teraba portio lunak dan tipis serta pembukaan 6 cm merupakan kala I fase aktif yang dimulai dari pembukaan 4-10 cm.

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Potensial terjadinya partus lama

DS : ibu mengatakan kepalanya pusing dan merasa lelah dan letih

DO : pada pemeriksaan fisik tampak konjungtiva pucat dan pemerikaan penunjang laboratorium dengan hemoglobin 8,9 g/dL.

Analisis dan Interpretasi Data

Dengan kurangnya kadar *hemoglobin* dalam darah mengakibatkan kurangnya oksigen yang dibawah ke sel tubuh maupun sel otak dan uterus. Jumlah oksigen dalam darah yang kurang menyebabkan disfungsi sel untuk *meregenerasi* dan mengakibatkan otot untuk berelaksasi dan selama persalinan akan mengakibatkan kurangnya kekuatan ibu saat mengejan sehingga dapat melelahkan dan mengakibatkan terjadinya partus lama (Andriani, 2016).

D. LANGKAH IV : IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

Kolaborasi dengan dokter obgine untuk pemasangan infuse RL 500 ml dan pemberian drip oksitosin ½ ampuls dalam 500 ml RL dengan 8 tetes pada 30 menit pertama dinaikkan 4 tetes tiap 30 menit, dan dipertahankan pada tetesan 40.

E. LANGKAH V, RENCANA TINDAKAN

Diagnosa aktual : perlangsungan kala I fase aktif dengan anemia

Diagnosa potensial : potensial terjadinya partus lama

Tujuan : kala I berlangsung normal

Kriteria :

1. Kontraksi uterus adekuat
2. Fase aktif tidak lebih dari 12 jam
3. Ibu dapat beradaptasi dengan nyeri
4. Pemeriksaan TTV dalam batas normal
5. DJJ dalam batas normal

1. Beritahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa keadaan ibu lemah namun keadaan janin baik

Rasional : Agar ibu dan keluarga mengetahui keadaan ibu dan janin..

2. Memberikan support pada ibu dengan menganjurkan ibu untuk berzikir mendengar dan membaca ayat suci Al-Qur'an agar memberikan suasana yang tenang bagi ibu.

Rasional : Dengan support yang diberikan pada ibu sebagai semangat agar ibu lebih optimis dalam menghadapi persalinan.

3. Pemasangan infus RL

Rasional : Sebagai media untuk memberikan obat melalui intravena

4. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian drip oksitosin $\frac{1}{2}$ ampus dalam 500 ml RL

Rasional : Oksitosin yang akan berfungsi untuk memperbaiki kontraksi

5. Observasi tanda-tanda vital setiap 30 menit kecuali tekanan darah dan suhu setiap 2-4 jam

Rasional : Observasi tanda-tanda untuk memantau keadaan ibu.

6. Observasi DJJ dan his setiap 30 menit

Rasional : Saat ada kontraksi uterus DJJ dapat berubah sesaat sehingga apabila ada perubahan dapat diketahui dengan cepat dan dapat dilakukan tindakan secara cepat dan tepat.

7. Observasi kemajuan persalinan dengan pemeriksaan dalam (VT) setiap 2-4 jam

Rasional : untuk memantau kemajuan persalinan dan mempermudah melakukan tindakan.

8. Ajarkan ibu teknik relaksasi dan pengaturan nafas pada saat kontraksi, ibu menarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi.

Rasional : Teknik relaksasi memberikan rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri dan memberikan suplei oksigen yang cukup ke janin.

9. Anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya secara rutin selama persalinan

Rasional : Kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhi kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar dan menghalangi penurunan kepala janin serta memberikan perasaan yang tidak nyaman pada ibu.

10. Memberikan intake minuman dan makanan pada ibu

Rasional : Agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran

11. Mendokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

Rasional : Merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan memudahkan pengambilan keputusan klinik

12. Observasi tanda dan gejala kala II

Rasional : Untuk mengetahui kapan ibu memasuki tahap II persalinan.

F. LANGKAH VI. PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 05 juli 2018

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
2. Memberikan support pada ibu dengan mengaSnjurkan ibu untuk berzikir mendengar dan membaca ayat suci Al-Qur'an agar memberikan suasana yang tenang bagi ibu

3. Pemasangan infus dan pemberian drip oksitosin $\frac{1}{2}$ ampuls dalam 500 ml RL yang bertujuan untuk memperbaiki kontraksi dengan 8 tetes pada 30 menit pertama dan dinaikkan 4 tetes setiap 30 menit dan dipertahankan pada tetesan 40 telah dipasang pada pukul 80.15 WITA.

4. Mengobservasi tanda-tanda vital

Tabel 1.1 Observasi Tanda-Tanda Vital

No	Waktu	Tekanan Darah	Nadi	Pernapasan	Suhu
1.	08.30 WITA		80 x/menit	20 x/menit	
2.	09.00 WITA		82 x/menit	22 x/menit	
3.	09.30 WITA		82 x/menit	22 x/menit	
4.	10.00 WITA	90/70 mmHg	82 x/menit	20 x/menit	36,7°C
5.	10.30 WITA		80 x/menit	20 x/menit	
6.	11.00 WITA		80 x/menit	20 x/menit	
7.	11.30 WITA		80 x/menit	22 x/menit	
8.	12.00 WITA	90/70 mmHg	80 x/menit	22 x/menit	36,7°C

Sumber data : Primer

5. Mengobservasi DJJ, his setiap 30 menit

Tabel 1.2 Observasi DJJ Dan His

No	Waktu	DJJ	His
1.	08.30 WITA	132 x/menit	2 x dalam 10 menit (25-30 detik)
2.	09.00 WITA	134 x/menit	3 x dalam 10 menit (30-35 detik)
3.	09.30 WITA	132 x/menit	3 x dalam 10 menit (30-35 detik)
4.	10.00 WITA	132 x/menit	4 x dalam 10 menit (35-40 detik)
5.	10.30 WITA	136 x/menit	4 x dalam 10 menit (35-40 detik)
6.	11.00 WITA	136 x/menit	4 x dalam 10 menit (40-45 detik)
7.	11.30 WITA	132 x/menit	4 x dalam 10 menit (40-45 detik)
8.	12.00 WITA	132 x/menit	5 x dalam 10 menit (40-50 detik)

Sumber data: Primer

6. Melakukan pemeriksaan dalam (VT) tanggal 05 juli 2018 pukul 12.00 WITA oleh mahasiswa "N"

- a) Keadaan vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b) Portio : melelap
- c) Pembukaan : 10 cm
- d) Ketuban : jernih
- e) Presentase : UUK depan
- f) Penurunan : Hodge IV
- g) Molase : tidak ada
- h) Penumbungan : tidak ada
- i) Kesan panggul : normal
- j) Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

7. Mengajarkan ibu teknik relaksasi dan pengaturan nafas pada saat kontraksi, ibu menarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama persalinan

8. Menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya secara rutin selama persalinan

9. Memberikan intake cairan dan makanan pada ibu

10. Mendokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

11. Mengobservasi tanda dan gejala kala II

- a. Ibu merasakan dorongan untuk meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi

- b. Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum dan atau vaginanya
- c. Perineum menonjol
- d. Vulva vagina dan *sfincter ani* membuka
- e. Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur dengan darah
- f. Tampak rambut bayi pada vulva

G. LANGKAH VII, EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal : 05 juli 2018 jam 12.00 wita

1. Ibu mengerti bahwa keadaannya dan janinnya saat ini dalam keadaan baik, sehingga ibu lebih tenang dan kecemasan ibu berkurang
2. Keadaan ibu dan janin baik yang ditandai dengan :
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal

TD : 90/70 mmHg	P : 22 x/menit
N : 80 x/menit	S : 36,7 ⁰ C
 - b. DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit dan teratur.
 - c. Ibu sudah makan, jenis roti 1 potong dan minum air putih dan 3 kotak teh kotak
 - d. Ibu mengerti dan sudah mampu melakukan teknik relaksasi
 - e. Ibu tidak ingin berkemih dan kandung kemih ibu kosong
3. Kala 1 fase aktif berlangsung ditandai dengan:
 - a) His yang adekuat 5 x dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik

- b) Adanya tekanan pada anus, rektum, dan vagina, perineum menonjol, *sfincter ani* membuka dan terdapat pengeluaran air ketuban
 - c) Dinding vagina licin, portio tidak teraba, pembukaan lengkap 10 cm, dan penurunan kepala Hodge IV UUK depan, air ketuban jernih dan tidak ada molase
4. Tidak ada tanda-tanda infeksi
 5. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan di partograf.

KALA II

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS :

1. Ibu mengatakan sakit semakin kuat
2. Ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan adanya tekanan pada anus dan rasa ingin meneran
4. Ibu mengatakan adanya pengeluaran air ketuban dari jalan lahir

DO :

1. His 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik
2. Perineum menonjol
3. Vulva dan anus membuka
4. DJJ terdengar jelas pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit dan teratur
5. Pemeriksaan dalam (VT) tanggal 05 juli 2018 jam 12.00 wita

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : jernih
 Presentase : UUK depan
 Penurunan : hodge IV

B. LANGKAH II : MENETAPKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : perlangsungan kala II

DS :

1. Ibu mengatakan sakit semakin kuat
2. Ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan adanya tekanan pada anus dan rasa ingin meneran
4. Ibu mengatakan adanya pengeluaran air ketuban dari jalan lahir

DO :

1. His 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik
2. Perineum menonjol
3. Vulva dan anus membuka
4. DJJ terdengar jelas pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit dan teratur

Pemeriksaan dalam (VT) tanggal 05 juli 2018 jam 12.00 WITA

Pembukaan : 10 cm
 Ketuban : jernih
 Presentase : UUK depan
 Penurunan : horge IV

Analisis dan Interpretasi data :

- a. Serviks uteri berdilatasi sehingga membentuk suatu saluran yang akan dilewati bayi sampai mencapai dasar panggul (dilatasi sempurna). Hal ini mengakibatkan tekanan hebat pada otot dasar panggul dan bagian terendah janin menekan *fleksus syaraf* yang mengakibatkan rasa nyeri yang bertambah
- b. Dengan adanya his yang adekuat mengakibatkan segmen atas rahim (SAR) berkontraksi mendorong janin turun ke segmen bawah rahim (SBR), segmen bawah tertarik ke atas menjadi dilatasi relaksasi sehingga membuat suatu saluran dalam rahim (Prawirohardjo, 2014).

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

1. Asfiksia neonatorum

DS : ibu mengatakan pusing dan kelelahan

DO : pemeriksaan fisik mata dengan konjungtiva pucat dan pemeriksaan
Hb : 8,9 gr/dL

Analisis dan Interpretasi data

Asfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi tidak bisa bernafas spontan dan teratur. Ketika ibu mengalami anemia maka akan mempengaruhi sirkulasi darah ibu ke janin sehingga janin tidak mendapatkan sirkulasi oksigen dengan baik dan hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya asfiksia neonatorum.

2. Perdarahan intrapartum

DS : ibu mengatakan pusing dan kelelahan

DO : pemeriksaan fisik mata dengan konjungtiva pucat dan pemeriksaan

Hb : 8,9 gr/dL

Analisis dan interpretasi data

Kekurangan kadar hemoglobin dalam darah akan mempengaruhi kontraksi uterus yang terjadi, dikarenakan pada uterus berelaksasi inilah mengakibatkan perdarahan intrapartum karena inersi uteri.

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENSI

Dilakukan kolaborasi dengan dokter obgine untuk memberikan tindakan segera apabila terjadi komplikasi.

E. LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa aktual : perlangsungan kala II

Diagnosa potensial :

Potensial terjadinya asfiksia neonatorum

Potensial terjadinya perdarahan intrapartum

Tujuan : kala II berlangsung normal

Kriteria :

- a. Kala II berlangsung tidak lebih dari 1-2 jam
- b. Bayi lahir dalam waktu 30 menit, napas spontan dan segera menangis
- c. Keadaan umum baik ditanda dengan tanda-tanda vital dalam batas normal :

1) Tekanan Darah: (N: sistol 60-90mmHg dan diastole 90-120 mmHg)

2) Nadi : (N: 60-90 x/menit)

3) Pernapasan : (N: 16-24 x/menit)

4) Suhu : (N: 36,5-37,5⁰C)

d. Jumlah darah tidak lebih dari 500 ml.

Intervensi tanggal 05 juli 2018

1. Lihat tanda dan gejala kala II

Rasional : dapat mengetahui apakah ibu sudah dapat dipimpin persalinan

2. Siapkan peralatan pertolongan termasuk oksitosin dan spoit

Rasional : untuk mempersiapkan peralatan siap pakai dan agar tidak kerepotan bila pembukan telah lengkap

3. Pakai celemek

Rasional : mempersiapkan diri sebelumnya untuk mencegah terjadinya infeksi silang dan tidak kerepotan bila pembukan telah lengkap

4. Pastikan lengan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

5. Pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

6. Isi spoit dengan oksitosin 10 IU dengan satu tangan

Rasional : menyiapkan peralatan dalam keadaan siap pakai

7. Bersihkan vulva sampai perineum

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

8. Lakukan pemeriksaan dalam

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

9. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan klorin 0,5 % kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

10. Dengar denyut jantung janin setelah uterus tidak berkontraksi

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin

11. Beritahu ibu bahwa pembukaan telah lengkap dan keadaan janin baik

Rasional : agar ibu tidak khawatir dengan keadaan janinnya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan

12. Minta bantuan keluarga untuk membantu ibu menyiapkan posisi untuk meneran

Rasional : dapat membantu proses persalinan

13. Pimpinlah ibu meneran saat ada his

Rasional : memperlancar berlangsungnya proses persalinan

14. Bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman

Rasional : dapat membantu dalam proses persalinan

15. Anjurkan ibu untuk miring ke kiri apabila belum ingin meneran, dan meneran pada puncak kontraksi

Rasional : memperlancar proses persalinan

16. Pasang handuk bersih di atas perut ibu pada saat kepala janin terlihat di depan vulva dengan diameter 5-6 cm

Rasional : untuk mengeringkan tubuh janin

17. Letakkan duk 1/3 bagian di bawah bokong ibu

Rasional : sebagai alat untuk menyokong bayi

18. Buka bak partus

Rasional : menyiapkan alat dalam keadaan siap pakai

19. Pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi (DTT) pada kedua tangan

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

20. Pimpinan persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala

Rasional : dengan menyokong perineum dapat mengurangi dan mencegah ruptur perineum

21. Periksa adanya lilitan tali pusat

Rasional : lilitan tali pusat dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin

22. Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar

Rasional : menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putaran paksi dalam

23. Letakkan tangan secara biparietal tarik secara berhati-hati ke bawah untuk melahirkan bahu agar tidak terjadi robekan perineum

Rasional : membantu pengeluaran bahu agar tidak terjadi robekan perineum

24. Lahirkan badan bayi dengan sanggah susur

Rasional : dengan sanggah susur dapat mencegah rupture perineum dan trauma pada bayi

25. Telusuri punggung, bokong dan tungkai bayi

Rasional : mengendalikan pengeluaran bayi

26. Jepit tali pusat

Rasional : untuk menentukan batas tali pusat yang akan dipotong

27. Potong tali pusat

Rasional : dengan memotong tali pusat akan memutuskan hubungan bayi dan ibu dan membantu proses pernapasan dan sistem sirkulasi dan agar darah dari tali pusat tidak mengalir

28. Letakkan bayi diatas perut ibu dan lakukan penilaian spintas

Rasional : untuk memastikan keadaan bayi baik

29. Keringkan tubuh bayi dan letakkan diatas perut ibu

Rasional : memberikan bounding attecmenth antara ibu dan bayi

30. Nilai ballard score bayi

Rasional : untuk menilai usia gestasi bayi

F. LANGKAH VI, IMPLEMENTASI

Implementasi tanggal 05 juli 2018

1. Melihat tanda dan gejala kala II
2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan seperti:
 - a. Alat Perlindungan Diri (APD) : penutup kepala, masker, kacamata, celemek, sepatu tertutup (sepatu *boot*).

- b. Partus set : *handcoon* steril, 2 buah klem kocher, ½ kocher, 1 buah gunting episiotomy, 1 buah gunting tali pusat, 1 buah kateter nelaton, kasa steril, pengisap lendir dan penjepit tali pusat.
- c. On steril : 2 buah handuk kering dan bersih, pakaian bersih ibu dan bayi meliputi baju, pembalut, sarung, celana dalam, pakaian bayi, popok, topi/tutup kepala, sarung tangan/kaki, kain selimut untuk membedong.
- d. Heacting set : 1 buah pinset sirurgi, 1 buah pinset anatomi, nal puder, 2 buah jarum (1 jarum circle dan 1 jarum VI circle), gunting benang, benang cromatic, 1 pasang sarung tangan steril.
- e. Obat-obatan esensial : lidocain 1 ampuls, oksytosin 10 IU 1 ampuls, cairan RL, infus set 5.1, spoit 3 cc, meteregin 1 ampuls.
- f. Peralatan lain : larutan klorin 0,5%, air DTT, kantong plastik, tempat sampah kering dan basah, safety box, bengkok, was lap dan tempat plasenta.

Menyiapkan tempat, penerangan dan lingkungan untuk kelahiran bayi, dengan memastikan ruangan sesuai kebutuhan bayi baru lahir, meliputi ruangan bersih, hangat, pencahayaan cukup dan bebas dari tiupan angin.

3. Memakai celemek
4. Memastikan tangan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir
5. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi
6. Mengisi spoit dengan oksitosin 10 IU dengan satu tangan

7. Membersihkan vulva sampai ke perineum
8. Melakukan pemeriksaan dalam (VT) tanggal 05 juli 2018 pukul 12.00 WITA
 - a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 - b. Portio : melesap
 - c. Pembukaan : 10 cm
 - d. Ketuban : jernih
 - e. Presentase : UUK depan
 - f. Penurunan : hodge IV
 - g. Molase : tidak ada
 - h. Penumbungan : tidak ada
 - i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban
9. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5 % kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit
10. Mendengar denyut jantung janin setelah uterus tidak berkontraksi
11. Memberitahu ibu bahwa pembukaan telah lengkap dan keadaan janin baik
12. Meminta bantuan keluarga untuk membantu ibu menyiapkan posisi ibu untuk meneran
13. Memimpin ibu meneran pada saat ada his
14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman
15. Menganjurkan ibu untuk miring ke kiri apabila belum ingin meneran, dan meneran pada puncak kontraksi

16. Memasang handuk bersih di atas perut ibu pada saat kepala janin terlihat di depan vulva 5-6 cm
 17. Meletakkan duk 1/3 bagian di bawah bokong ibu
 18. Membuka bak partus
 19. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan
 20. Memimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala
 21. Memeriksa adanya lilitan tali pusat
 22. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar
 23. Meletakkan tangan secara biparietal secara hati-hati ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu posterior
 24. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur
 25. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk dan jari tengah diantara 2 tungkai
- Hasil : semua badan bayi lahir spontan, pada pukul 12.25 WITA, berjenis kelamin perempuan
26. Menjepit tali pusat
 27. Memotong tali pusat
 28. Meletakkan bayi di atas perut ibu dan melakukan penilaian spintas

Hasil : pemeriksaan apgar skor oleh bidan Salma dan mahasiswa "N"

Tabel 1.3 Pemeriksaan Apgar Skor

Penilaian	Skor		Menit	Menit
	1	2	1	5
Appearance (Warna Kulit)	Ekstremitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
Pulse (Denyut Jantung)	<100 x/menit	>100 x/menit	2	2
Grimace (Refleks)	Menangis	Batuk dan bersin	1	2
Activity (Tonus Otot)	Ekstremitas fleksi	Bergerak aktif	2	2
Respiration (Pernapasan)	Lemah dan tidak teratur	Kuat dan teratur	2	2
	Jumlah		8	10

Sumber data : Primer

29. Mengeringkan tubuh bayi dan meletakkan di atas perut ibu

30. Menilai skala ballard bayi

Hasil : kulit 2, lanugo 3, daris plantar 2, payudara 3, mata telinga 2, genitalia 3, sikap tubuh 3, pergelangan tangan 4, lekol lengan 3, sudut popital 4, tanda selempang 4, tumit ke kuping 3. Skor 37 dengan tafsiran usia gestasi 38-40 minggu.

G. LANGKAH VII, EVALUASI

Diagnosa : perlangsungan kala II

Evaluasi tanggal 05 juli 2018

1. Kala II berlangsung \pm 25 menit

2. Bayi lahir spontan tanggal 05 juli 2018 jam 12.25 WITA, berjenis kelamin perempuan, A/S: 8/10.
3. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
4. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
5. Ibu mengatakan nyeri perut
6. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya
7. Perdarahan \pm 200 ml
8. Plasenta belum terlepas

KALA III

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS :

- a. Ibu mengatakan nyeri perut
- b. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya

DO :

- a. Bayi lahir spontan tanggal 05 juli 2018 jam 12.25 WITA, berjenis kelamin perempuan, A/S: 8/10
- b. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
- c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
- d. Tampak semburan darah tiba-tiba
- e. Tampak tali pusat di depan vulva
- f. Plasenta belum terlepas

B. LANGKAH II, MENETAPKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : perlangsungan kala III

DS : ibu mengatakan nyeri perut

DO :

- a. Bayi lahir spontan tanggal 05 juli 2018 jam 12.25 WITA, JK: perempuan, A/S: 8/10
- b. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
- c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
- d. Nampak semburan darah tiba-tiba
- e. Tampak tali pusat di depan vulva
- f. Plasenta belum terlepas

Analisis dan Interpretasi data

1. Dalam waktu 5-10 menit seluruh plasenta terlepas, terdorong ke dalam vagina dan akan lahir spontan
2. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda: uterus menjadi bundar, uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim, tali pusat bertambah panjang dan terjadi perdarahan/adanya semburan darah secara tiba-tiba.

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya retensio plasenta dan rest plasenta

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tidak ada indikasi untuk dilakukan tindakan segera/kolaborasi

E. LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnos aktual : perlangsungan kala III

Diagnose potensial : -

Tujuan : kala III berlangsung normal

Kriteria :

- a. Perdarahan tidak lebih dari 500 ml
- b. Lamanya kala III 30 menit
- c. Plasenta dan selaput lahir lengkap
- d. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar

Intervensi :

Tanggal 05 juli 2018

31. Periksa fundus uteri

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

32. Memberitahu ibu akan di suntik

Rasional : agar ibu mengetahui tindakan yang akan dilakukan

33. Menyuntik oxytosin 10 IU

Rasional : akan membantu kontraksi uterus

34. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5 cm dari vulva, jika tali pusat bertambah panjang

Rasional : proses peregangan tali pusat terkendali

35. Letakkan tangan kiri di atas simpisis untuk menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem

Rasional : proses peregangan tali pusat terkendali

36. Regangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial

Rasional : dengan begitu akan memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

37. Jika tali pusat bertambah panjang tali pusat diregangkan ke atas dan ke bawah

Rasional : dengan meregangkan ke atas dan ke bawah memudahkan plasenta keluar sesuai kurva jalan lahir hingga tampak di vulva

38. Setelah plasenta tampak di depan vulva jemput plasenta dengan kedua tangan lalu putar dan lahirkan plasenta searah jarum jam

Rasional : agar plasenta dan selaput lahir lengkap

39. Lakukan masase pada fundus uteri

Rasional : masase akan merangsang kontraksi uterus

40. Periksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap

Rasional : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban akan menyebabkan perdarahan

41. Periksa adanya robekan jalan lahir

Rasional : robekan jalan lahir akan menyebabkan perdarahan aktif

42. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik

Rasional : uterus yang berkontraksi dengan baik menandakan kala III berlangsung normal

43. Lakukan penimbangan, pengukuran, pemberian salep mata dan vitamin K

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi lahir normal atau tidak. Pemberian vitamin K untuk mencegah terjadinya perdarahan otak pada bayi.

Dan pemberian salep mata untuk mencegah terjadinya infeksi

44. Memberikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam penyuntikan vitamin K

Rasional : memberikan kekebalan tubuh terhadap virus hepatitis

F. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 05 juli 2018

31. Memeriksa fundus uteri
32. Memberitahu ibu akan di suntik
33. Menyuntik oxytosin 10 IU pada 1/3 antero lateral paha ibu
34. Memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5 cm dari vulva, jika tali pusat bertambah panjang
35. Meletakkan tangan kiri di atas simpisis untuk menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem
36. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus kearah dorso cranial
37. Setelah plasenta tampak di depan vulva jemput plasenta dengan kedua tangan lalu putar dan lahirkan plasenta searah jarum jam

Hasil : plasenta lahir pukul 12.35 WITA

38. Melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok-gosok fundus secara sirkulen
39. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap

Hasil : plasenta, selaput ketuban dan kotiledon lahir lengkap

40. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Hasil : terdapat robekan perineum tingkat II dan telah dilakukan penjahitan dengan teknik jelujur

41. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik

Hasil : uterus berkontraksi dengan baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri teraba 1 jari di bawah pusat

42. Melakukan penimbangan, pengukuran, pemberian salep mata dan vitamin K

Hasil :

- a. BBL : 2700 gram
- b. PBL : 47 cm
- c. LK : 35 cm
- d. LD : 34 cm
- e. LP : 34 cm
- f. Lila : 10 cm
- g. Anus : (+)
- h. Salep mata telah diberikan dan vitamin K telah di suntikkan

43. Memberikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam penyuntikan vitamin K

Hasil : injeksi hepatitis telah diberikan

G. LANGKAH VII : EVALUASI

Evaluasi tanggal 05 juli 2018

1. Kala III berlangsung normal
2. Perdarahan \pm 150 ml
3. Plasenta dan selaput lahir lengkap
4. Kala III berlangsung \pm 10 menit
5. Ibu mengatakan lelah setelah proses persalinan
6. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
7. Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat
8. Tanda-tanda vital

TD	: 100/70 mmHg	Pernapasan	: 22 x/menit
Nadi	: 80 x/menit	Suhu	: 36,7 ⁰ C

KALA IV

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS : ibu mengatakan lelah setelah melahirkan

- DO :
- a. Kala III berlangsung \pm 10 menit
 - b. Plasenta lahir lengkap pukul : 12.35 WITA
 - c. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat
 - d. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
 - e. Perdarahan \pm 150 ml
 - f. Tanda-tanda vital

TD : 100/70 mmHg Pernapasan : 22 x/menit

Nadi : 80 x/ menit Suhu : 36, 7⁰C

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : perlangsungan kala IV

DS : ibu mengatakan lelah setelah persalinan

DO :

- a. Kala III berlangsung ± 10 menit
- b. Plasenta lahir lengkap pukul : 12.35 WITA
- c. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat
- d. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
- e. Perdarahan ± 150 ml
- f. Tanda-tanda vital

TD : 100/70 mmHg Pernapasan : 22 x/menit

Nadi : 80 x/ menit Suhu : 36, 7⁰C

Analisa dan interpretasi data

1. Setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, itu menandakan bahwa telah masuk kala IV yaitu kala pengawasan selama 2 jam
2. Perdarahan yang terjadi saat kontraksi uterus baik, biasanya karena adanya robekan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan inspeksi pada vulva, vagina dan serviks dengan ciri warna darah yang merah segar dan pulpasif sesuai dengan denyut nadi (Prawirohardjo, 2014).

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya perdarahan post partum

Analisa dan interpretasi data:

1. Perdarahan post partum adalah kehilangan darah lebih dari 500 ml yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000 ml setelah persalinan abdominal
2. Diagnosis perdarahan post partum dapat ditegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak, menggumpal dan pada palpasi fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih (Prawirohardjo, 2014).

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tidak ada indikasi untuk dilakukan tindakan segera/ kolaborasi

E. LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnose : perlangsungan kala IV

Masalah aktual : kelelahan

Tujuan : kala IV berlangsung normal

Kriteria:

1. Tidak terjadi perdarahan
2. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
3. Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal

TD : sistol 60-90 mmHg dan diastole 90-120 mmHg

Pernapasan : 16-24 x/menit

Nadi : 60-90 x/menit

Suhu : 36,5-37,5⁰C

5. Pernapasan dan suhu bayi dalam batas normal

Pernapasan : 40-60 x/menit

Suhu : 36,5-37,5⁰C

Intervensi tanggal 05 juli 2018

45. Lakukan pemeriksaan tinggi fundus

Rasional : untuk memastikan involusi uteri berlangsung baik

46. Lakukan pemantauan kontraksi uterus 3-5 menit dalam 10 menit pertama kemudian setiap 15 menit pada 1 jam berikutnya dan 30 menit pada 1 jam kedua.

Rasional : kontraksi uterus yang baik menandakan kala IV berlangsung normal

47. Ajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana cara masase uterus dan menilai kontraksi

Rasional : agar ibu dan keluarga mengetahui bagaimana kontraksi uterus yang baik dan dapat melakukannya sendiri

48. Evaluasi jumlah perdarahan

Rasional : untuk mengantisipasi terjadinya perdarahan

49. Periksa tanda-tanda vital ibu

Rasional : untuk mengetahui keadaan umum ibu

50. Nilai pernapasan dan suhu tubuh bayi

Rasional : untuk mengetahui keadaan umum bayi

51. Rendam alat dalam larutan klorin 0,5 % selama 10 menit

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

52. Buang bahab-bahan yang terkontaminasi

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

53. Bersihkan ibu dari sisa darah, lendir dan ketuban dengan ait DTT

Rasional : memberikan rasa nyaman pada ibu dan mencegah infeksi

54. Pastikan ibu merasa nyaman, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum

Rasional : dengan makan dan minum akan mengembalikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinan sehingga stamina ibu dapat terjaga

55. Dekontaminasi tempat tidur dengan larutan desinfeksi tingkat tinggi

Hasil : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

56. Bersihkan sarung tangan dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 % secara terbalik

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang

57. Cuci tangan dengan sabun di bawah air bersih yang mengalir

Rasional : mencuci tangan merupakan dekontaminasi agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri

58. Melengkapi partograf

F. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 05 juli 2018

45. Melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri

Tabel 2.1 Observasi TFU

Waktu	Tinggi Fundus Uteri
12.50 WITA	2 jrbpst
13.05 WITA	2 jrbpst
13.20 WITA	2 jrbpst
13.35 WITA	2 jrbpst
14.05 WITA	2 jrbpst
14.35 WITA	2 jrbpst

Sumber data : Primer

46. Melakukan pemantauan kontraksi uterus

Tabel 2.2 Observasi Kontraksi Uterus Dan Kandung Kemih

Waktu	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih
12.50 WITA	Baik	Kosong
13.05 WITA	Baik	Kosong
13.20 WITA	Baik	Kosong
13.35 WITA	Baik	Kosong
14.05 WITA	Baik	Kosong
14.35 WITA	Baik	Kosong

Sumber data : Primer

47. Mengajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana cara masase uterus dan menilai kontraksi

Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

48. Mengevaluasi jumlah perdarahan

Tabel 2.3 Observasi Jumlah Perdarahan

Waktu	Perdarahan
12.50 WITA	± 30 ml
13.05 WITA	± 20 ml
13.20 WITA	± 20 ml
13.35 WITA	± 20 ml
14.05 WITA	± 10 ml
14.35 WITA	± 10 ml

Sumber data : Primer

49. Memeriksa tanda-tanda vital ibu

Tabel 2.4 Observasi TTV

Waktu	Tekanan Darah	Nadi	Pernapasan	Suhu
12.50 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	22 x/menit	36,7 ⁰ C
13.05 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	22 x/menit	
13.20 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	22 x/menit	
13.35 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	20 x/menit	
14.05 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	20 x/menit	36,7 ⁰ C
14.35 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	22 x/menit	

Sumber data : Primer

50. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi

Hasil :

Pernapasan : 48 x/menit

Suhu : 36⁰C

51. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit

52. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi

53. Mersihkan ibu dari sisa darah, lendir dan ketuban dengan air DTT

54. Memastikan ibu merasa nyaman, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum
55. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan desinfeksi tingkat tinggi
56. Membersihkan sarung tangan dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 % secara terbalik
57. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air bersih yang mengalir
58. Melengkapi partograf

G. LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 05 juli 2018

1. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
2. Tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat
3. Jumlah perdarahan ± 110 ml
4. Keadaan umum baik yang ditandai dengan

TD : 100/70 mmHg

P : 22 x/menit

N : 80 x/menit

S : 36,7^{0C}

5. Ibu sudah merasa nyaman
6. Kesadaran composmentis

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
PADA NY. R GESTASI 38-40 MINGGU DENGAN ANEMIA
DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 05 JULI 2018

No. Registrasi : 502XXX
Tanggal masuk : 05 Juli 2018 Jam: 07.50 WITA
Tanggal Pengkajian : 05 Juli 2018 Jam: 07.50 WITA
Tanggal Partus : 05 Juli 2018 Jam: 12.25 WITA
Nama Pengkaji : Nurmawati

KALA 1

Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny. "R" / Tn. "A"
Umur : 24 tahun / 26 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / 4 tahun
Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Biringkalloro Pallangga

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengeluh nyeri perut tembus ke belakang sejak tanggal 04 juli 2018 jam 18.00 WITA

2. Ibu mengatakan sakit yang dirasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering
3. Ibu merasakan adanya pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 04 juli 2018 jam 18.00 WITA
4. Ibu tidak merasakan adanya pengeluaran air ketuban dari jalan lahir
5. Ibu merasa kepalanya pusing dan merasa lemas
6. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan keduanya dan tidak pernah keguguran sebelumnya
7. Hari pertama haid terakhir ibu tanggal 06 Oktober 2017
8. Ibu mengatakan umur kehamilan sekarang \pm 9 bulan
9. Ibu mengatakan telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 8 kali di Puskesmas Pallangga yaitu 2 kali pada trimester I, 2 kali pada trimester II, dan 4 kali pada trimester III
10. Ibu mengatakan selama hamil jarang mengonsumsi tablet Fe karena baunya yang tidak enak dan membuat mual
11. Ibu mengatakan nafsu makan baik dan tidak ada pantangan
12. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit serius
13. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, asma, diabetes militus, dan penyakit menular lainnya seperti *Tubercuolosis* (TBC), malaria, hepatitis, dan penyakit menular seksual (PMS).
14. Ibu mengatakan tidak pernah di rawat di Puskesmas dan di rumah sakit

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum lemah
2. Kesadaran *composmentitis*
3. Tanda-tanda vital

TD	: 90/70 mmHg	P	: 22 x/menit
N	: 80 x/menit	S	: 36,7°C

4. Pemeriksaan fisik

- a. Kepala : rambut hitam, keadaan kulit kepala bersih, tidak ada oedema dan tidak ada nyeri tekan
- b. Wajah : tidak ada colozasma, tidak ada oedema dan tidak ada nyeri tekan
- c. Mata : konjungtiva pucat dan sclera putih tidak kuning
- d. Hidung : bersih, tidak ada polips dan tidak ada secret
- e. Mulut : bibir lembab, keadaan mulut bersih, tidak ada caries dan tidak ada gigi tanggal
- f. Telinga : tidak ada serumen
- g. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis
- h. Payudara : simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae, tidak ada nyeri tekan, terdapat colostrum saat puting dipencet.
- i. Abdomen : tidak ada bekas operasi, tampak pembesaran perut sesuai usia kehamilan, tampak linea nigra, striae alba

Leopold I : TFU 2 jrbpst, 34 cm, bokong

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 3/5

LP : 92 cm

TBJ : $TFU \times LP = 34 \times 92 = 3.128$ gram

DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit dan teratur

HIS : 2 kali dalam 10 menit durasi 20-25 detik

- j. Genetalia : keadaan genetalia bersih, tidak ada varises, oedema, tidak ada pembesaran kelenjar bertholini, dan tampak pengeluaran lendir dan darah

Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 05 juli 2018 jam : 08.00 WITA

- (1) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- (2) Portio : tipis
- (3) Pembukaan : 6 cm
- (4) Ketuban : utuh
- (5) Presentase : UUK kanan lintang
- (6) Penurunan : hodge II
- (7) Molase : tidak ada
- (8) Penumbungan : tidak ada
- (9) Kesan panggul : normal

(10) Pelepasan : lendir dan darah

k. Anus : tidak ada hemoroid

l. Ekstremitas: tidak ada oedema pada tungkai, tidak ada varices, tidak ada nyeri tekan dan terdapat refleks patella kiri dan kanan.

5. Pemeriksaan penunjang

Laboratorium pada tanggal 05 Juli 2018 jam 08.00 WITA

Hb : 8,9 gr/dL

Albumin : negatif

Reduksi : negatif

HbSAg : NR

ASESSMANT (A)

Diagnosa : GII PI A0, gestasi 38 minggu 6 hari, intrauterin, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu lemah, dan keadaan janin baik, inpartu kala I fase aktif dengan anemia.

Masalah potensial : antisipasi terjadinya partus lama

PLANNING (P)

Tanggal : 05 juli 2018

1. Menjelaskan pada ibu penyebab nyeri yang dirasakan yaitu adanya penekanan pada ujung-ujung syaraf dan ketegangan uterus saat berkontraksi

Hasil : telah dijelaskan dan ibu mengerti

2. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu dan janin lemah karena ibu mengalami anemia yaitu kadar hemoglobin dalam darah berkurang yang mengakibatkan ibu pusing, pucat dan kelelahan

Hasil : ibu mengerti

3. Memberikan support pada ibu dengan menganjurkan ibu untuk berzikir mendengar dan membaca ayat suci Al-Qur'an agar memberikan suasana tenang pada ibu

Hasil : ibu merasa tenang

4. Mengajarkan ibu teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi dengan cara ibu menarik napas panjang melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk miring ke kiri agar suplai oksigen ke janin menjadi lancar

Hasil : ibu bersedia melakukannya yaitu mengambil posisi miring ke kiri

6. Menganjurkan ibu makan dan minum di sela-sela kontraksi agar ibu memiliki tenaga untuk mengejan

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan dan ibu makan dan minum di sela-sela kontraksi

7. Pemasangan infuse RL 500 ml

Hasil : infuse telah terpasang

8. Berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian drip oksitosin $\frac{1}{2}$ ampus dalam 500 ml RL yang bertujuan untuk memperbaiki kontraksi dengan 8 tetes pada 30 menit pertama dan dinaikkan 4 tetes setiap 30 menit dan dipertahankan pada tetesan 40.

Hasil : drip oksitosin telah diberikan pada jam : 08.15 wita.

9. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 30 menit sedangkan tekanan darah dan suhu setiap 2-4 jam

Tabel 1.1 Observasi Tanda-Tanda Vital

No	Waktu	Tekanan Darah	Nadi	Pernapasan	Suhu
1.	08.30 WITA		80 x/menit	20 x/menit	
2.	09.00 WITA		82 x/menit	22 x/menit	
3.	09.30 WITA		82 x/menit	22 x/menit	
4.	10.00 WITA	90/70 mmHg	82 x/menit	20 x/menit	36,7 ⁰ C
5.	10.30 WITA		80 x/menit	20 x/menit	
6.	11.00 WITA		80 x/menit	20 x/menit	
7.	11.30 WITA		80 x/menit	22 x/menit	
8.	12.00 WITA	90/70 mmHg	80 x/menit	22 x/menit	36,7 ⁰ C

Sumber data : Primer

10. Mengobervasi his, DJJ, nadi setiap 30 menit

Hasil :

Tabel 1.2 Observasi DJJ Dan His

No	Waktu	DJJ	His
1.	08.30 WITA	132 x/menit	2 x dalam 10 menit (25-30 detik)
2.	09.00 WITA	134 x/menit	3 x dalam 10 menit (30-35 detik)
3.	09.30 WITA	132 x/menit	3 x dalam 10 menit (30-35 detik)
4.	10.00 WITA	132 x/menit	4 x dalam 10 menit (35-40 detik)
5.	10.30 WITA	136 x/menit	4 x dalam 10 menit (35-40 detik)
6.	11.00 WITA	136 x/menit	4 x dalam 10 menit (40-45 detik)
7.	11.30 WITA	132 x/menit	4 x dalam 10 menit (40-45 detik)
8.	12.00 WITA	132 x/menit	5 x dalam 10 menit (40-50 detik)

Sumber data: Primer

11. Melakukan pemeriksaan dalam (VT) tanggal 05 juli 2018 jam 12.00 WITA

Hasil :

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : melelap
- c. Pembukaan : 10 cm
- d. Ketuban : jernih
- e. Presentase : UUK depan
- f. Penurunan : hodge IV
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

12. Mendokumentasikan hasil di partograf

Hasil : telah didokumentasikan di partograf

KALA II

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan sakit yang dirasakan semakin kuat dan tembus ke belakang
2. Ibu mengatakan ingin BAB dan ibu merasakan adanya tekanan pada anus
3. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk meneran
4. Ibu mengatakan adanya pelepasan air yang banyak

DATA OBJEKTIF (O)

1. His 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik
2. Perineum menonjol
3. Vulva dan anus membuka
4. Denyut jantung janin terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut
ibu dengan frekuensi 132 x/menit dan teratur
5. Pemeriksaan dalam (VT) tanggal 05 juli 2018 jam 12.00 WITA
 - a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
 - b. Portio : melesap
 - c. Pembukaan : 10 cm
 - d. Ketuban : jernih
 - e. Presentase : UUK depan
 - f. Penurunan : hodge IV
 - g. Moolase : tidak ada

- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

ASESSMENT (A)

Perlangsungan kala II

PLANNING

Tanggal: 05 juli 2018 jam 12.00 WITA

1. Melihat tanda dan gejala kala II

Hasil : vulva dan vagina membuka, perineum menonjol, tampak tekanan pada anus, ibu tampak ingin meneran

2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan

Hasil :

- a. Alat Perlindungan Diri (APD) : penutup kepala, masker, kaca mata, celemek, sepatu tertutup (sepatu *boot*).
- b. Partus set : *handcoon* steril, 2 buah klem kocher, ½ kocher, 1 buah gunting episiotomy, 1 buah gunting tali pusat, 1 buah kateter nelaton, kasa steril, pengisap lendir dan penjepit tali pusat.
- c. On steril : 2 buah handuk kering dan bersih, pakaian bersih ibu dan bayi meliputi baju, pembalut, sarung, celana dalam, pakaian bayi, popok, topi/tutup kepala, sarung tangan/kaki, kain selimut untuk membedong.

- d. Heacting set : 1 buah pinset sirurgi, 1 buah pinset anatomi, nal pudet, 2 buah jarum (1 jarum circle dan 1 jarum VI circle), gunting benang, benang cromatic, 1 pasang sarung tangan steril.
- e. Obat-obatan esensial : lidocain 1 ampuls, oksytosin 10 IU 1 ampuls, cairan RL, infus set 5.1, spoit 3 cc, meteregin 1 ampuls.
- f. Peralatan lain : larutan clorin 0,5%, air DTT, kantong plastic, tempat sampah kering dan basah, safety box, bengkok, was lap dan tempat plasenta.

Menyiapkan tempat, penerangan dan lingkungan untuk kelahiran bayi, dengan memastikan ruangan sesuai kebutuhan bayi baru lahir, meliputi ruangan bersih, hangat, pencahayaan cukup dan bebas dari tiupan angin.

3. Memakai celemek

Hasil : celemek telah terpasang

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir

Hasil: cuci tangan telah dilakukan

5. Memakai sarung tangan desinfeksi tinggal tinggi

Hasil : sarung tangan telah terpasang

6. Mengisi spoit dengan oksitosin 10 IU dengan satu tangan

Hasil : oksitosin dalam spoit telah siap

7. Membersihkan vulva sampai ke perineum

Hasil : telah dilakukan

8. Melakukan pemeriksaan dalam (VT) tanggal 05 juli 2018 pukul 12.00 WITA

Hasil :

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : melesap
- c. Pembukaan : 10 cm
- d. Ketuban : jernih
- e. Presentase : UUK depan
- f. Penurunan : hodge IV
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, daaraah dan air ketuban

9. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan klorin 0,5 % kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit

Hasil : telah dilakukan

10. Mendengar denyut jantung janin setelah uterus tidak berkontraksi

Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 x/menit dan teratur

11. Memberitahu ibu bahwa pembukaan telah lengkap dan keadaan janin baik

Hasil : ibu mengerti

12. Meminta bantuan keluarga untuk membatu ibu menyiapkan posisi ibu untuk meneran

Hasil : keluarga bersedia membantu

13. Memimpin ibu meneran pada saat ada his

Hasil : telah dilakukan

14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman

Hasil : telah dilakukan

15. Menganjurkan ibu untuk miring ke kiri apabila belum ingin meneran, dan meneran pada puncak kontraksi

Hasil : ibu memilih miring ke kiri

16. Memasang handuk bersih di atas perut ibu pada saat kepala janin terlihat di depan vulva 5-6 cm

Hasil : telah dilakukan

17. Meletakkan duk 1/3 bagian di bawah bokong ibu

Hasil : telah dilakukan

18. Membuka bak partus

Hasil : alat dan bahan persalinan lengkap

19. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan

Hasil : handcoon telah terpasang

20. Memimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala

Hasil telah dilakukan

21. Memeriksa adanya lilitan tali pusat

Hasil : tidak ada lilitan tali pusat

22. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar

Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar secara sempurna

23. Meletakkan tangan secara biparietal secara hati-hati gerakkan tangan ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu posterior

Hasil : kedua bahu bayi lahir secara biparietal

24. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur

Hasil : badan bayi telah lahir

25. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk dan jari tengah diantara 2 tungkai

Hasil : seluruh badan bayi lahir spontan, pada pukul 12.25 WITA, berjenis kelamin perempuan

26. Menjepit tali pusat

Hasil : tali pusat telah dijepit pada 3 cm dari umbicus bayi dan 2 cm dari klem pertama

27. Memotong tali pusat

Hasil : tali pusat telah dipotong

28. Meletakkan bayi diatas perut ibu dan melakukan penilaina spintas

Hasil :

Tabel 1.3 Pemeriksaan Apgar Skor

Penilaian	Skor		Menit	Menit
	1	2	1	5
Appearance (Warna Kulit)	Ekstremitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
Pulse (Denyut Jantung)	<100 x/menit	>100 x/menit	2	2
Grimace (Refleks)	Menangis	Batuk dan bersin	1	2
Activity (Tonus Otot)	Ekstremitas fleksi	Bergerak aktif	2	2
Respiration (Pernapasan)	Lemah dan tidak teratur	Kuat dan teratur	2	2
	Jumlah		8	10

Sumber data : Primer

29. Mengeringkan tubuh bayi dan meletakkan di atas perut ibu

Hasil : telah dilakukan

30. Menilai skala ballard bayi

Hasil : kulit 2, lanugo 3, daris plantar 2, payudara 3, mata telinga 2, genitalia 3, sikap tubuh 3, pergelangan tangan 4, lekuk lengan 3, sudut popital 4, tanda selempang 4, tumit ke kuping 3. Skor 37 dengan tafsiran usia gestasi 38-40 minggu.

KALA III

DATA SUBJEKTIF (S)

- a. Ibu mengatakan nyeri perut
- b. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya

DATA OBJEKTIF (O)

- a. Bayi lahir spontan, tanggal 05 juli 2018 jam: 12.25 WITA, berjenis kelamin perempuan, A/S : 8/10
- b. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
- c. Tinggi fundus uteri teraba 1 jari di bawah pusat
- d. Perdarahan \pm 150 ml
- e. Plasenta belum terlepas
- f. Tampak tali pusat di depan vulva

ASESSMENT (A)

Perlangsungan kala III

PLANNING (P)

Tanggal 05 juli 2018

31. Memeriksa fundus uteri

Hasil : TfU setinggi pusat yang berarti janin tunggal

32. Memberitahu ibu akan di suntik

Hasil : ibu bersedia di suntik

33. Menyuntik oxytosin 10 IU

Hasil : ibu telah disuntik oxytosin

34. Memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5 cm dari vulva, jika tali pusat bertambah panjang
35. Meletakkan tangan kiri di atas simpisis untuk menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem
Hasil : telah dilakukan
36. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus kearah dorso cranial
Hasil : telah dilakukan
37. Setelah plasenta tampak di depan vulva jemput plasenta dengan kedua tangan lalu putar dan lahirkan plasenta searah jarum jam
Hasil : plasenta lahir pukul 12.35 WITA
38. Melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok-gosok fundus secara sirkulen
Hasil : telah dilakukan
39. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap
Hasil : plasenta, selaput ketuban dan kotiledon lahir lengkap
40. Memeriksa adanya robekan jalan lahir
Hasil : terdapat robekan perineum tingkat II dan telah dilakukan penjahitan dengan teknik jelujur
41. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik
Hasil : uterus berkontraksi dengan baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri teraba 1 jari di bawah pusat

42. Melakukan penimbangan, pengukuran, pemberian salep mata dan vitamin K

Hasil :

- a. BBL : 2700 gram
- b. PBL : 47 cm
- c. LK : 35 cm
- d. LD : 34 cm
- e. LP : 34 cm
- f. Lila : 10 cm
- g. Anus : (+)
- h. Salep mata telah diberikan dan vitamin K telah di suntikkan

43. Memberikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam penyuntikan vitamin K

Hasil : injeksi hepatitis telah diberikan

KALA IV

DATA SUBJEKTIF (S)

Ibu mengatakan lelah setelah proses persalinan

DATA OBJEKTIF (O)

- a. Kala III berlangsung \pm 10 menit
- b. Plasenta lahir lengkap pukul: 12.35 wita
- c. Tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat
- d. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
- e. Perdarahan \pm 150 ml
- f. Ibu tampak kelelahan

g. Tanda-tanda vital

TD : 100/70 mmHg Pernapasan : 22x/menit

Nadi : 80 x/menit Suhu ; 36,7⁰C

ASESSMENT (A)

Perlangsungan kala IV

PLANNING (P)

Tanggal 05 juli 2018

45. Melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri

Hasil :

Tabel 2.1 Observasi TFU

Waktu	Tinggi fundus uteri
12.50 WITA	2 jrbpst
13.05 WITA	2 jrbpst
13.20 WITA	2 jrbpst
13.35 WITA	2 jrbpst
14.05 WITA	2 jrbpst
14.35 WITA	2 jrbpst

Sumber data : Primer

46. Melakukan pemantauan kontraksi uterus

Hasil :

Tabel 2.2 Observasi Kontraksi Uterus Dan Kandung Kemih

Waktu	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih
12.50 WITA	Baik	Kosong
13.05 WITA	Baik	Kosong
13.20 WITA	Baik	Kosong
13.35 WITA	Baik	Kosong
14.05 WITA	Baik	Kosong
14.35 WITA	Baik	Kosong

Sumber data : Primer

47. Mengajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana cara masase uterus dan menilai kontraksi

Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

48. Mengevaluasi jumlah perdarahan

Hasil :

Tabel 2.3 Observasi Jumlah Perdarahan

Waktu	Perdarahan
12.50 WITA	± 30 ml
13.05 WITA	± 20 ml
13.20 WITA	± 20 ml
13.35 WITA	± 20 ml
14.05 WITA	± 10 ml
14.35 WITA	± 10 ml

Sumber data : Primer

49. Memeriksa tanda-tanda vital ibu

Hasil :

Tabel 2.4 Observasi TTV

Waktu	Tekanan Darah	Nadi	Pernapasan	Suhu
12.50 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	22 x/menit	36,7 ⁰ C
13.05 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	22 x/menit	
13.20 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	22 x/menit	
13.35 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	20 x/menit	
14.05 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	20 x/menit	36,7 ⁰ C
14.35 WITA	100/70 mmHg	80 x/menit	22 x/menit	

Sumber data : Primer

50. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi

Hasil :

Pernapasan : 48 x/menit

Suhu : 36⁰C

51. Merendam alat dalam larutan klorin 0,5 % selama 10 menit

Hasil : telah dilakukan

52. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi

Hasil : telah dilakukan

53. Mersihkan ibu dari sisa darah, lendir dan ketuban dengan air DTT

Hasil : telah dilakukan

54. Memastikan ibu merasa nyaman, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum

Hasil : keluarga bersedia membantu

55. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan desinfeksi tingkat tinggi

Hasil : telah dilakukan

56. Membersihkan sarung tangan dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 % secara terbalik

Hasil : telah dilakukan

57. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air bersih yang mengalir

Hasil : telah dilakukan

58. Melengkapi partograf

Hasil : partograf telah dilengkapi



BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang kesesuaian dan kesenjangan antara teori hasil studi pada penerapan dan pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny "R" dengan kasus anemia pada persalinan di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 05 Juli 2018. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus yang bertujuan agar tindakan direncanakan berdasarkan rasional yang relevan yang dapat dianalisis secara teoritis untuk memudahkan memahami kesenjangan dan kesesuaian yang terjadi pada kasus.

Asuhan ini dilakukan selama satu hari yang dimulai saat pasien masuk di Rusah Sakit sampai pasien pindah ke ruang nifas, dimana asuhan yang dilakukan berlanjut pada proses pengakhiran kehamilan yang mencakup kala I-IV persalinan.

Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney yaitu : pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanaan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. KALA I

1. Langkah I : identifikasi data dasar

Teori mengatakan bahwa langkah 1 dilakukan dengan cara mengumpulkan data dasar untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap

untuk membuat kesimpulan tentang normalnya kehamilan tersebut. Rencana yang rasional untuk memantau persalinan dapat ditegakkan berdasarkan kepentingan ibu dan janin. Jika tidak ditemukan kelainan ibu harus diyakini bahwa kehamilannya dalam keadaan normal.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan bahwa ibu masuk pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 07.50 WITA dengan keluhan sakit perut tembus ke belakang disertai pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 04 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai sekarang dan sifatnya hilang timbul, selain itu ada keluhan lain yang menyertai ibu pusing pada kepala dan merasa lemas. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan keduanya dan tidak pernah keguguran sebelumnya, hari pertama haid terakhir tanggal 06 Oktober 2017, ibu mengatakan usia kehamilan sekarang \pm 9 bulan, pergerakan janin kuat terasa pada sebelah kiri perut ibu. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 8 kali di Puskesmas Pallangga dan mendapat suntikan suntik TT sebanyak 2 kali, tidak pernah dan tidak sedang mengalami tanda bahaya kehamilan, tidak memiliki riwayat penyakit menular dan menurun dalam keluarganya dan sebelumnya menjadi akseptor KB suntik 3 bulan selama 2 tahun.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa tanda-tanda persalinan meliputi terjadinya his persalinan yang belum terlalu kuat sehingga ibu/wanita masih dapat berjalan-jalan. Secara klinis dapat dinyatakan mulai terjadi partus jika timbul his dan wanita tersebut mengeluarkan lendir yang

bersemu darah (bloody show). Lendir yang bersemuh darah ini berasal dari lendir kanalis servikalis karena serviks mulai membuka atau mendatar, sedangkan darah berasal dari pembuluh-pembuluh kapiler yang berada disekitar canalis servikalis tersebut pecah karena pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka.

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold I tftu 2 jrbpx, 34 cm, teraba bokong, Leopold II puka, Leopold III kepala, Leopold IV bergerak dalam panggul (BDP) 3/5. Keadaan janin baik ditandai dengan DJJ dalam batas normal, lingkaran perut 92 cm, taksiran berat janin 3.128 gram, his 2 kali dalam 10 menit durasi 25-30 detik. Hasil pemeriksaan dalam pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 08.00 WITA didapatkan keadaan vulva dan vagina tidak ada kelainan, portio tipis, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, presentasi uuk kanan lintang, penurunan Hodge II, moulage 0, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir dan darah. Selanjutnya dilakukan observasi denyut jantung janin dan his setiap 30 menit dan observasi kemajuan persalinan tiap 4 jam pada kala II.

Pada wanita hamil darah akan bertambah banyak atau lazim disebut *hidremia* atau *hipervolemia*. karena itu terjadi pengenceran darah karena sel darah tidak sebanding pertambahannya dengan plasma darah. Secara fisiologis pengenceran darah ini adalah untuk membantu meringankan kerja

jantung (Proverawati dalam Marmi, 2014: 52). Dengan adanya hal demikian dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu suatu metode diagnosis dengan pemeriksaan kadar hemoglobin atau molekul protein dalam sel darah merah yang akan membawa oksigen ke seluruh jaringan. Pada kasus Ny “R” dilakukan pemeriksaan laboratorium hemoglobin dengan kadar Hb: 8,9 gr/dL.

Selain itu pemberian support dan memperhatikan kondisi psikologis ibu agar tidak cemas dan khawatir dengan kondisinya saat ini menganjurkan ibu agar senantiasa mengingat Allah swt. yaitu memperbanyak doa, dzikir agar dimudahkan dalam persalinannya.

2. Langkah II : identifikasi diagnosa/ masalah aktual

Berdasarkan data subjektif dan data objektif pada kasus Ny “R” didapatkan diagnosis inpartu kala I fase aktif dengan anemia sedang

Sesuai dengan teori penetapan fase aktif berdasarkan pembukaan serviks, dimana fase laten dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap kurang dari 4 cm dan fase aktif dimulai sejak pembukaan serviks 4-10 cm dan pada umumnya frekuensi dan lama kontraksi uterus meningkat (Oktarina, 2016: 13).

Anemia adalah suatu kondisi yang terjadi ketika jumlah sel darah merah (eritrosit) dan/atau jumlah hemoglobin yang ditemukan dalam sel darah merah menurun dibawah normal. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang membawa oksigen ke jaringan tubuh. Tanpa kecukupan pasokan oksigen, banyak

jaringan dan organ dalam tubuh dapat terganggu. Anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk kelelahan dan stress pada organ tubuh (Proverawati dalam Marmi, 2014).

Komplikasi lain yang dapat ditimbulkan dari anemia dalam persalinan yang meliputi *atonia uteri*, *retensio plasenta*, partus lama dan perdarahan post partum merupakan bentuk dari tidak baiknya kontraksi rahim. *Atonia uteri* adalah kegagalan mekanisme kontraksi dan retraksi serat-serat *miometrium*, keadaan ini penyebab utama perdarahan post partum (Rudiyanti dan Diana, 2014).

Diagnosis anemia pada persalinan ditegakkan dengan pemeriksaan fisik dengan keadaan ibu lemah, konjungtiva pucat dan dilakukan pemeriksaan laboratorium hemoglobin 8,9 gr/dL normalnya pada wanita hamil kadar hemoglobin dalam darah yaitu 11 gr/dl selama kehamilan pada trimester 1 dan ke 3, dan 10 gr/dl selama post partum dan trimester 2 (Retroniri, 2017).

Bidan harus mampu mengenali tanda dan gejala dari anemia pada persalinan agar dapat melakukan asuhan kebidanan yang sesuai, kolaborasi dan komprehensif terhadap ibu. Dalam melakukan asuhan hendaklah selalu berdoa kepada Allah agar asuhan yang diberikan dapat meringankan keluhan ibu sehingga ibu dapat merasa lebih baik.

3. Langkah III : antisipasi diagnosa/masalah potensial

Teori mengatakan masalah potensial yang dapat terjadi pada kasus anemia dalam persalinan yaitu partus terlantar karena dengan kurangnya kadar *hemoglobin* dalam darah mengakibatkan kurangnya oksigen yang dibawah ke sel tubuh maupun sel otak dan uterus. Jumlah oksigen dalam darah yang kurang menyebabkan disfungsi sel untuk *meregenerasi* dan mengakibatkan otot untuk berelaksasi dan selama persalinan akan mengakibatkan kontraksi uterus melemah dan kurangnya kekuatan ibu saat mengejan sehingga dapat melelahkan (Tando, 2013: 26).

Berdasarkan data dalam penerapan asuhan kebidanan pada Ny “R” didapatkan data yang menunjukkan terjadinya partus terlantar dengan kontraksi uterus yang melemah dan keadaan ibu lemah.

Sambil mengamati klien, bidan diharapkan bersiap-siap apabila terjadi masalah potensial. Selain itu bidan dapat memberikan pemahaman kepada ibu bahwa kehamilan dan persalinan adalah anugrah dari Allah swt. dengan diberikan kepercayaan tersebut ibu mampu menghadapi dan bersabar dengan keluhan yang dirasakannya.

4. Langkah IV : Identifikasi perlunya tindakan segera/ kolaborasi

Tindakan ini dilakukan jika ditemukan adanya diagnosa potensial atau masalah emergency sehingga membutuhkan tindakan segera atau tindakan kolaborasi. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan data yang menunjang yaitu pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk dilakukan tindakan kolaborasi dengan dokter Obgyn untuk

mengantisipasi komplikasi-komplikasi terhadap ibu dan janin, menganjurkan ibu untuk beristigfar dan berdoa kepada Allah swt. serta tidak menjadikan keluhannya saat ini menjadi beban sehingga tidak semakin memperburuk kondisi ibu.

5. Langkah V : Rencana tindakan

Pada langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh dimana asuhan ini ditentukan oleh langkah sebelumnya. Jika terdapat diagnosa potensial maka dilakukan rencana asuhan sesuai dengan diagnosa.

Merencanakan pendekatan terapeutik kepada ibu dan keluarga dengan memberikan motivasi dan dukungan emosional dengan lebih mendekati diri kepada Allah swt. dengan memperbanyak dzikir, istigfar, membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an agar ibu lebih tenang dan tidak terlalu memfokuskan pikirannya dengan kondisinya saat ini.

Berdasarkan teori asuhan anemia pada persalinan yaitu pemantauan terhadap ibu dan kesejahteraan janin, pemantauan kontraksi, pemasangan infuse RL 20 tpm, pemberian drip oksitosin ½ ampul dalam 500 ml RL, pemberian oksigen 3 liter per jam, melakukan transfusi darah untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi: Kadar Hb < 7 g/dl atau kadar hematokrit < 20% atau kadar Hb >7g/dl dengan gejala klinik : pusing, pandangan berkunang-kunang, atau takikardi (frekuensi nadi > 100x permenit), melakukan penilaian pertumbuhan dengan kesejahteraan janin dengan pemeriksaan USG (Marmi, 2014: 54).

Dalam penanganan anemia pada persalinan yang perlu diperhatikan adalah pemantauan keadaan ibu yang meliputi tekanan darah dan suhu yang diukur setiap 4 jam , pemantauan keadaan janin dengan memantau denyut jantung, nadi dan kontraksi tiap 30 menit. Pemberian oksitosin yang bertujuan untuk memperbaiki kontraksi uterus .

6. Langkah VI : Pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan

Rencana tindakan dibuat berdasarkan intervensi yang dibuat sebelumnya. Rencana tindakan dibuat sesuai dengan teori yaitu memasang infuse yang di drips $\frac{1}{2}$ ampuls oksitosin dalam 500 ml RL, memantau tekanan darah dan suhu setiap 4 jam, memantau DJJ, nadi, dan his setiap 30 menit serta memantau kemajuan persalinan setiap 2-4 jam.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan telah diberikan pendekatan terapeutik kepada ibu dan keluarga dengan memberikan motivasi dan dukungan emosional dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan memperbanyak dzikir, istigfar, membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur’an agar ibu lebih tenang dan tidak terlalu memfokuskan pikirannya dengan kondisinya saat ini.

Pemasangan infuse dengan drips oksitosin $\frac{1}{2}$ ampuls dalam 500 ml RL, pemantauan DJJ, nadi dan his setiap 30 menit dimulai dari pukul 08.00 wita, dilakukan pemeriksaan pertama pukul 08.00 wita didapatkan pembukaan 6 cm, ketuban utuh, presentasi uuk kanan lintang, penurunan hodge II, pelepasan lendir dan darah. Dilanjutkan pemantauan djj, nadi dan his pada

pukul 08.30 sampai 12.00 WITA, melakukan VT II pada pukul 12.00 WITA, didapatkan pembukaan 10 cm, ketuban jernih, presentase uuk depan, penurunan horge IV, pelepasan air ketuban dan darah. Dan ibu siap untuk dilakukan pimpinaan meneran.

Pada kasus Ny "R" pemantauan dilakukan sesuai dengan teori yaitu pemantauan tekanan darah dan suhu tubuh dilakukan tiap 4 jam, pemantauan his, djj, nadi dilakukan setiap 30 menit. Pemeriksaan VT dilakukan setiap 4 jam.

7. Langkah VII : Evaluasi hasil asuhan kebidanan

Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "R" di dapatkan data inpartu kala I fase aktif dengan pembukaan lengkap pada pukul 12.00 WITA, ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran, perasaan ingin BAB, djj terdengar kuat dan teratur dengan frekuensi 132 x/menit, his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

Hasil evaluasi didapatkan bahwa pembukaan sudah lengkap pada pukul 12.00 WITA, perlangsungan kala I dengan anemia.

8. Pendokumentasian

Pendokumentaasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapatkan dari pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan bahwa ibu masuk pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 07.50 WITA dengan keluhan sakit perut tembus ke belakang disertai pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 04 Juli 2018 pukul 18.00 WITA sampai sekarang dan sifatnya hilang timbul, dan keluhan lain yang menyertai ibu pusing pada kepala dan merasa lemas. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan keduanya dan tidak pernah keguguran sebelumnya, hari pertama haid terakhir tanggal 06 Oktober 2017, ibu mengatakan usia kehamilan sekarang \pm 9 bulan, pergerakan janin kuat terasa pada sebelah kiri perut ibu.

Ibu telah melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 8 kali di Puskesmas Pallangga dan mendapat suntikan suntik TT sebanyak 2 kali, tidak pernah dan tidak sedang mengalami penyakit serius, tidak memiliki riwayat penyakit menular dan menurun dalam keluarganya dan sebelumnya menjadi akseptor KB suntik 3 bulan selama 2 tahun.

Data objektif yang meliputi data yang didapatkan dari pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan bahwa keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold I tfu 2 jrbpx, 34 cm, teraba bokong, Leopold II

puka, Leopold III kepala, Leopold IV bergerak dalam panggul (BDP) 3/5. Keadaan janin baik ditandai dengan DJJ dalam batas normal, lingkaran perut 92 cm, taksiran berat janin 3.128 gram, his 2 kali dalam 10 menit durasi 25-30 detik. Hasil pemeriksaan dalam pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 08.00 WITA didapatkan keadaan vulva dan vagina tidak ada kelainan, portio tipis, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, presentasi uuk kanan lintang, penurunan Hodge II, moulage 0, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir dan darah. Serta pemeriksaan laboratorium hemoglobin dengan kadar Hb: 8,9 gr/dL.

Assessment yaitu hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "R" ditegakkan diagnosa GII PI A0, gestasi 38-40 minggu situs memanjang, intrauterine, tunggal, hidup, keadaan janin baik, ibu lemah, kala I fase aktif dengan anemia.

Planning menggambarkan pendokumentasian untuk rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang didapatkan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "R" telah dilakukan intervensi dan implementasi sesuai dengan teori dengan hasil evaluasi inpartu kala I fase aktif dengan anemia dan pembukaan 10 cm pada pukul 12.00 WITA, ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran, terasa ingin BAB dengan his 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik, djj dalam batas normal, serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

B. KALA II

1. Langkah I

Pengkajian adalah mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan keadaan pasien. Dan untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan dengan menggunakan anamnesis.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "R" didapatkan data subjektif ibu merasakan adanya dorongan yang kuat untuk meneran dan ibu merasa ingin BAB. Sedangkan data objektif yang didapatkan perineum menonjol, vulva, vagina dan anus membuka. Djj dalam batas normal, his 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik, pemeriksaan dalam pada pukul 12:00 WITA didapatkan pembukaan 10 cm, ketuban jernih, presentasi uuk depan, penurunan hodge IV, molage 0, pelepasan air ketuban dan darah.

Teori mengatakan tanda gejala kala II, yaitu ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rectum dan atau vaginanya, perineum menonjol, vulva, vagina dan sfingter ani membuka, meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah (Nurasiah dkk, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

2. Langkah II

Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data dari hasil pengkajian yang sudah ada yang akhirnya ditegakkan diagnosa dalam ruang lingkup praktek kebidanan.

Berdasarkan teori perlangsungan kala II dapat ditegakkan jika didapatkan tanda gejala kala II, yaitu ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan ada peningkatan pada rectum/vagina, perineum tampak menonjol, vulva vagina spingterani membuka, meningkatnya pengeluaran lendir dan darah (Oktarina, 2016: 14).

Pada kasus Ny "R" didapatkan tanda gejala kala II, yaitu ibu mengatakan sakit perut semakin kuat, ibu ingin BAB, perineum tampak menonjol, vulva, vagina dan anus membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik, djj dalam batas normal, pembukaan serviks lengkap. Berdasarkan tanda dan gejala dapat ditegakkan ibu sedang dalam perlangsungan kala II.

Diagnosa kala II dapat ditegakkan atas dasar hasil pemeriksaan dalam yang menunjukkan pembukaan serviks telah lengkap dan terlihat bagian kepala bayi pada introitus vagina atau kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm.

3. Langkah III

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny “R” tidak ada indikasi atau masalah potensia yang dapat ditegakkan. Dan ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa proses kala II berlangsung normal dengan bayi lahir lengkap pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 12.25 WITA berjenis kelamin perempuan dengan Apgar Skor 8/10.

4. Langkah IV

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny “R” tidak ada indikasi atau masalah potensial yang dapat ditegakkan. Dan ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa perlangsungan kala II berlangsung normal dan tidak ada penyulit.

5. Langkah V

Berdasarkan teori intervensi yang dilakukan terhadap persalinan dengan anemia pada persalinan, yaitu lihat tanda gejala kala II, siapkan alat pertolongan persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, letakkan handuk bersih diatas perut ibu dan dibawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah terlihat membuka vulva 5-10 cm, lindungi perineum dan menahan kepala terjadi ekstensi maksimal, periksa lilitan tali pusat, tunggu kepala bayi sampai melakukan putaran paksi luar, kemudian lanjutkan melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah

kedua bahu lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi, setelah bayi lahir jepit dan potong tali pusat, lakukan penilaian spintas dan lakukan persalinan ballard score oleh bidan.

Pada kasus Ny “R” intervensi sesuai dengan teori yang ada hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

6. Langkah VI

Implementasi dilakukan pada kasus Ny “R” sesuai dengan intervensi, berdasarkan data yang didapatkan pada kasus tersebut bahwa pembukaan lengkap pada pukul 12:00 WITA, ketuban jernih, presentasi uuk depan, penurunan hodge IV, molage 0, pelepasan air ketuban dan darah.

Semua alat dan obat-obatan telah disiapkan dan pimpinan persalinan dilakukan pada pukul 12:00 WITA, bayi lahir pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 12.25 WITA bayi lahir segera menangis, ekstremitas biru, bernapas dengan baik dan gerakan aktif. Bayi perempuan dengan berat badan lahir 2.700 gram, panjang badan 47 cm. Nilai ballard score 37 taksiran umur kehamilan 38-40 minggu.

7. Langkah VII

Pada kasus Ny “R” kala II berlangsung dengan normal, yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 12.25 WITA segera

menangis, dengan berat badan lahir 2700 gram, panjang badan 47 cm, jenis kelamin perempuan, tinggi fundus uteri setinggi pusat.

8. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari subjektif yang mencakup data yang didapatkan dari pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "R" didapatkan bahwa ibu merasa adanya dorongan yang kuat untuk meneran, sakit perut tembus belakang terasa semakin kuat dan perasaan ingin BAB.

Data objektif mencakup data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "R" didapatkan kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik, djj dalam batas normal, tampak perineum menonjol, vulva vagina dan anus membuka, pada pemeriksaan dalam yang dilakukan pada pukul 12:00 WITA didapatkan pembukaan lengkap, presentasi uuk depan penurunan hodge IV, molage tidak ada, pelepasan air ketuban dan darah.

Assesment merupakan hasil analisis data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi masalah/diagnosa, antisipasi masalah potensial dan perlunya tindakan segera. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "R" didapatkan assesment perlangsungan kala II,

Planning meliputi tindakan asuhan atau implementasi dan evaluasi dari tindakan yang diberikan berdasarkan assesment yang ditegakkan.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” tindakan asuhan yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada dan mendapatkan hasil evaluasi kala II berlangsung dengan normal, yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 12:25 WITA segera menangis dengan berat badan lahir 2700 gram, panjang badan 47 cm, jenis kelamin perempuan, tinggi fundus uteri setinggi pusat.

B. KALA III

1. Langkah I

Berdasarkan teori yang didapatkan tanda-tanda terlepasnya plasenta yaitu perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, sebelum bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh tinggi fundus biasanya di bawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga atau seperti buah pear atau alpukat dan fundus teraba di atas pusat. Tali pusat memanjang, tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva. Semburan darah mendadak dan singkat, apabila kumpulan darah (retro plasental pooling) dalam ruang diantara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungnya maka darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas (Walyani, 2015).

Pada kasus Ny “R” didapatkan ibu merasakan nyeri perut bagian bawah, dari data objektif didapatkan tampak ada semburan darah secara tiba-

tiba, kontraksi uterus teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat dan tali pusat bertambah panjang.

Ada beberapa perasat untuk mengetahui plasenta terlepas yaitu: perasat kutner, perasat ini mengatakan bahwa untuk memastikan plasenta terlepas di atas simfisis, bila tali pusat tersebut masuk kembali (tali pusat memendek), berarti plasenta belum terlepas dan jika panjang tali pusat masih sama berarti plasenta belum terlepas dan jika panjang tali pusat masih sama berarti plasenta sudah terlepas.

Perasat Strassman, mengatakan bahwa untuk mengetahui plasenta terlepas dengan cara meregangkan atau menarik sedikit tali pusat dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri mengetok-ngetok fundus uteri dan merasakan apakah ada getaran yang ditimbulkan dari gerakan tangan kiri, jika terasa ada getaran berarti plasenta sudah terlepas.

Perasat klien, melakukan perasat ini, minta pasien untuk meneran, jika tali pusat tampak turun atau bertambah panjang berarti plasenta telah terlepas.

Perasat Manuaba, perasat ini dilakukan dengan cara tangan kiri memegang uterus pada segmen bawah rahim, sedangkan tangan kanan memegang dan mengencangkan tali pusat, kedua tangan ditarik berlawanan. Jika tarikan terasa ringan dan tali pusat memanjang berarti plasenta telah lepas (Walyani, 2015).

2. Langkah II

Berdasarkan teori kala III dimulai segera setelah lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir uterus teraba keras.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny”R” berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapatkan ditegakkan diagnosis perlangsungan kala III.

3. Langkah III

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny”R” tidak ada indikasi atau masalah potensial yang dapat ditegakkan, dan ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa proses pengeluaran plasenta berlangsung normal dan tidak ada penyulit.

4. Langkah IV

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny”R” tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera atau kolaborasi. Ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa proses pengeluaran plasenta dapat berlangsung normal.

5. Langkah V

Berdasarkan diagnosis pada kasus Ny”R” tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah dilakukan intervensi yang sesuai yaitu melakukan pemberian oksitosin, peregang tali pusat dan masase uterus.

Pemberian oksitosin dilakukan dalam waktu satu menit pertama setelah bayi lahir, namun sebelum pemberian oksitosin hal yang harus diperhatikan adalah memastikan tidak ada bayi lain di dalam uterus. Setelah itu suntikkan oksitosin secara IM pada sepertiga bagian atas paha bagian luar yang bertujuan untuk membantu pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah.

6. Langkah VI

Pada Ny "R" dilakukan implementasi berdasarkan teori yaitu melakukan pemberian oksitosin secara IM, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta lahir dilakukan masase uterus. Proses pelepasan dan pengeluaran plasenta terjadi secara normal dan tidak ada penyulit, dimana plasenta lahir 10 menit setelah bayi lahir yaitu jam 12.35 WITA, plasenta lahir lengkap dengan kotiledon dan selaput ketuban utuh, perdarahan kurang lebih 150 cc.

7. Langkah VII

Dari implementasi yang telah dilakukan pada kasus Ny"R" didapatkan hasil pemeriksaan keadaan ibu dalam keadaan normal ditandai dengan uterus teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kala III berlangsung normal, serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

8. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif, pendokumentasian hasil pengumpulan data pasien melalui anamnesis, pada kasus Ny "R" didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri perut bagian bawah.

Objektif yaitu dari hasil pemeriksaan fisik pasien dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Pada kasus Ny"R" didapatkan hasil pemeriksaan tampak ada semburan darah secara tiba-tiba, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat bertambah panjang.

Assesment merupakan hasil analisis data subjektif dan data objektif dalam suatu identifikasi diagnosa/masalah, antisipasi terjadinya masalah potensial, dan perlunya tindakan segera, pada kasus Ny"R" didapatkan assesment perlangsungan kala III.

Planning merupakan hasil dari tindakan asuhan yang diberikan dan evaluasi dari hasil tindakan yang telah dilakukan. Pada kasus Ny "R" telah dilakukan tindakan asuhan sesuai dengan teori yang ada, dan hasil evaluasi didapatkan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, plasenta lahir lengkap pada pukul 12.35 WITA, kontraksi baik teraba keras dan bundar, TFU 1 jari di bawah pusat, dengan perdarahan kurang lebih 150 cc.

D. KALA IV

1. Langkah I

Pada kasus Ny “R” didapatkan data subjektif ibu lelah setelah persalinan dan data objektif kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, TFU 1 jari bawah pusat, plasenta lahir lengkap, ttv dalam batas normal.

Berdasarkan teori pada kala IV hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kontraksi uterus baik, pemeriksaan serviks, vagina dan perenium hal ini berguna untuk mengetahui terjadinya laserasi (adanya robekan) yang dapat diketahui dari adanya perdarahan pasca persalinan. Tanda – tanda vital, keadaan ibu dan keadaan janin (Kuswanti, 2014).

2. Langkah II

Berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapatkan pada kasus Ny“ ”maka diagnosis yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV, hal ini dengan teori bahwa plasenta lahir lengkap jam 12.35 WITA dan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

3. Langkah III

Pada kasus Ny “R” masalah potensial yang dapat terjadi adalah perdarahan post partum.

4. Langkah IV

Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau tindakan kalaborasi, hal ini sesuai dengan teori berdasarkan data yang didapatkan bahwa kala III

berlangsung normal, kontraksi uterus baik, serta tanda- tanda vital dalam batas normal.

5. Langkah V

Pada kasus Ny“ R” intervensi yang dilakukan pada kala ini yakni memantau tanda – tanda vital ibu, pemantauan perdarahan, kontraksi uterus, kandung kemih dan tinggi fundus uteri. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua, serta mengukur suhu tubuh ibu, setelah pemantauan kala IV selesai, ibu dipindahkan keruangan nifas.

Teori mengingatkan sebagian besar kematian ibu pada periode pasca persalinan terjadi pada 6 jam pertama setelah persalinan, kematian itu disebabkan oleh infeksi, perdarahan dan eklampsia. Oleh karena itu, pemantauan selama 2 jam pertama post partum sangat penting (Saleha, 2013).

6. Langkah VI

Setelah intervensi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah implementasi sesuai dengan teori. Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny ”R” implementasi yang dilakukan yaitu memantau tanda- tanda ibu selama 4 kali 15 menit yaitu mulai jam 12.50 WITA sampai 13.35 WITA didapatkan tekanan darah ibu dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, kandung kemih kosong serta perdarahan kurang lebih 20-40 cc, selanjutnya melakukan pemantauan 2 kali 30 menit yaitupada jam 13.35 WITA sampai 14.35 WITA didapatkan tekanan darah dalam batas normal,

kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih kosong, serta perdarahan kurang lebih 10-20 cc. Keadaan bayi baik dengan pernapasan serta suhu dalam batas normal, serta mendokumentasikan hasil pemantauan kedalam partograf. Selanjutnya ibu dipindahkan keruang nifas.

7. Langkah VII

Pada kasus Ny "R" didapatkan bahwa kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih kosong, jumlah perdarahan kurang lebih 110 cc, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kala IV berlangsung normal dan tidak ada penyulit serta tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

8. Pendokumentasian SOAP.

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yaitu data yang diperoleh dari pasien dengan cara pengumpulan data dari pasien melalui anamnesis, berdasarkan kasus Ny "R" didapatkan bahwa ibu merasa kelelahan setelah persalinannya.

Objektif merupakan hasil dari pemeriksaan fisik dari hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan, didapatkan data kala III berlangsung normal berlangsung kurang lebih 10 menit, plasenta dengan kotiledon dengan selaput ketuban utuh, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat dengan tanda vital ibu dalam batas normal.

Assasment hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosis / masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kalaborasi, berdasarkan kasus Ny “R” maka assessment yang ditegakan adalah perlangsungan kala IV.

Planning meliputi tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan implemantasi yang dilakukan sesuai dengan teori maka evaluasi yaitu ibu dalam keadaan baik, ditandai dengan tanda- tanda vital dalam batas normal.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan studi kasus pada Ny “R” dengan anemia pada persalinan serta menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan intranatal maka dapat menarik kesimpulan yaitu :

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny “R” dengan anemia pada persalinan di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018. Pada kasus Ny. “R” didapatkan data dasar dengan Hemoglobin 8,9 gr/dL.
2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa/ masalah aktual pada Ny “R” dengan anemia pada persalinan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Ny. “R” masuk dengan tanda dan gejala inpartu dan keluhan lain yang menyertai pusing pada kepala dan merasa lemas.
3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa/ masalah potensial pada Ny “R” dengan anemia pada persalinan di RSUD Syekh Yusuf Gowa diantisipasi terjadinya partus terlantar dan asfiksia neonatorum, *atonia uteri*, *retensio plasenta*, partus lama dan perdarahan post partum.
4. Telah dilakukan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “R” dengan anemia pada persalinan di RSUD Syekh Yusuf. Kolaborasi dilakukan bersama dokter obgyne untuk tindakan pencegahan
5. Telah dilakukan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan anemia pada persalian di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun

2018. Intervensi dilakukan dengan pemantaauan persalinan dengan partograf , pemberian infuse RL drips oksitosin ½ ampuls dalam 500 ml, perencanaan persalinan dengan hati-hati.

6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan anemia pada persalian di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018. Telah dilakukan sesuai dengan intervensi, bayi lahir pada pukul 12.25 wita berjenis kelamin perempuan, berat badan lahir 2700 gram, panjang badan 47 cm dan apgar skor 8/10.
7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidana pada Ny “R” dengan anemia pada persalinan di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018. Konsisi ibu baik dan tidak terjadi perdarahan post partum.

B. SARAN

Berdasarkan tingkat resiko yang dapat disebabkan oleh anemia pada persalinan maka penulis menyarankan :

1. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya anemia pada persalinan dengan pelayanan antenatal care yang sesuai standar
2. Mengenali sedini mungkin komplikasi-komplikasi pada kehamilan dan upaya penanganan.
3. Melakukan pertolongan anemia pada persalinan dengan baik yaitu salah satunya dengan menjalin hubungan saling percaya yang baik dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Dwi : *Hubungan Anemia pada Kehamilan dengan Inpartu Kala II Lama*, Jurnal Ilmiah Kesehatan, Surabaya Vol. 9 No. 1, Februari 2016.
- Aundrey, dkk: *Hubungan Antara Status Anemia Ibu Hamil Trimester III dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Halmahera*, Jurnal Kedokteran Diponegoro, Semarang Vol. 5. No. 4, Oktober 2016.
- Damayanti, Ika, dkk, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan*, 2015 dan 2017
- Firdayanti, Arifuddin Ahmad, *Buku Dasar Persalinan (Askeb II)*, Alauddin University Press, 2007.
- Herlina: *Hubungan Anemia dan Partus Lama dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di RSUD Pringsewu*, Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai, Vol. VII, No. 1, Edisi Juni 2014.
- Indrayani, dkk, *Asuhan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*, Jakarta: CV. Trans Info Media, 2013
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2015.
- Kementrian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia*, 2016
- Kuswanti, Ina. Melina Fitriani, *Askeb II Persalinan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Lailiyaana, dkk, *Asuhan Persalinan Neonatal dan Bayi Baru Lahir*, Jakarta: Pustaka Medika, 2012.

- Marmi, dkk, *Asuhan Kebidanan Patologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Kedua. 2014.
- Nadyah, *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal*, Alauddin University Press, 2013.
- Nirwan dan Zulkarnain: *Aterm Pregnancy Inpartu Singular Embrio Life Presentation Of Head With Partus Kasep*, Vol. 2. No. 3. 2014.
- Prawirohardjo, Sarwono, *Ilmu Kebidana*,. Jakarta: Pt. Bina Putaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.
- Purwaningsih dan Sitti Fatimah, *Asuhan Keperawatan Maternitas*, Yogyakarta: Nuha Medika. 2010,
- Oktarina, Mika, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Rahmawati, dkk: *Hubungan Partus Lama dan Anemia Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di Ruang VK Bersalin RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin*, Jurnal Dinamika Kesehatan, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, 2017
- Retnorini, dkk: *Pengaruh Pemberian Tablet Fe dan Sari Kacang Hijau Terhadap Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil*, Jurnal Kebidanan, Vol. 6, No. 12, April 2017.
- Rudiyanti, dkk: *Anemia Dan Kontraaksi Rahim Dalam Proses Persalinan*, Jurnal Keperawatan, Vol. X, No. 1, April 2014.
- Rudy dan Lia: *Gambaran Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di RB Nasyithoh Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi*, Jurnal Kesehatan Bhakti Husada. Tahun 2014.
- Saleha, Sitti, *Asuhan Kebidanan II Persalinan*, Alauddin University Press, 2012.

Saleha, Sitti, *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*, Jakarta: Salemba Madika, 2013.

Shihab M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, Vol. 12, Jakarta: Lentera hati, 2009.

Tando, Naumi, *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*, Jakarta: Penerbit In Media, 2013.

Walyani, Proastuti., *Asuhan Kbidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*, Yogyakarta: Pustaka Medika, 2015.

Yanti, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan*, Yogyakarta: Pustaka Rihama. 2014.








DEPARTEMEN GINJEK DAN ANAK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
 Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata - Gowa-Telp. 824885 Fax. 424836


PARTOGRAF

No. Registrar **5102121212** Nama Ibu : Ny. R. Umur : 24 tahun G. I P. I A. O
 No. Puskesmas _____ Tanggal : 05 Juli 2018 Jam : 07.50 WIB Alamat : Biringkallera
 Ketuban pecah Sejak jam _____ mules sejak jam 07.50 WIB sampai 10.00 WIB



Oksitosin U/L tetes/menit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	



Urin

Protein
Aseton
Volume

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00

DATAAN PERSALINAN

1. Tanggal: 15 Juli 2018
2. Nama Bidan:
3. Tempat Persalinan:
 - Rumah IBU Puskesmas
 - Poliklinik Rumah Sakit
 - Klinik Swasta Lainnya:
4. Alamat tempat persalinan:
5. Catatan: rujuk, kala: I/II/III/IV
6. Alasan merujuk:
7. Tempat rujukan:
8. Pendamping pada saat merujuk:
 - Bidan Teman
 - Suami Dukun
 - Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada: Y/T
10. Masalah lain, sebutkan:
11. Penatalaksanaan masalah tersebut:
12. Hasilnya:

KALA II

13. Epistoteloni:
 - Ya, indikasi
 - Tidak
14. Pendamping pada saat persalinan:
 - Suami Teman Tidak ada
 - Keluarga Dukun
15. Gaya Janin:
 - Ya, tindakan yang dilakukan:
 - a.
 - b.
 - c.
 - Tidak
16. Dislokasi bahu:
 - Ya, tindakan yang dilakukan:
 - a.
 - b.
 - c.
 - Tidak
17. Masalah lain, sebutkan:
18. Penatalaksanaan masalah tersebut:
19. Hasilnya:

KALA III

20. Lama kala III: ± 10 menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U/im?
 - Ya, waktu: menit sesudah persalinan
 - Tidak, alasan:
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x)?
 - Ya, alasan:
 - Tidak
23. Pengepungan tali pusat terkendali?
 - Ya
 - Tidak, alasan:

24. Masa fundus uteri?
 - Ya
 - Tidak, alasan:
25. Presentasi lahir lengkap (inferior) Ya Tidak
 - Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan:
 - a.
 - b.
 - c.
26. Presentasi tidak lahir > 30 menit: Ya / Tidak
 - Ya, tindakan:
 - a.
 - b.
 - c.
 - Tidak
27. Laserasi:
 - Ya, dimana: perineum
 - Tidak
28. Jika laserasi perineum, derajat: 1 2 3 / 4
 - Tindakan:
 - Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 - Tidak dijahit, alasan:
29. Atoni uteri:
 - Ya, tindakan:
 - a.
 - b.
 - c.
 - Tidak
30. Jumlah perdarahan: ± 150 ml
31. Masalah lain, sebutkan:
32. Penatalaksanaan masalah tersebut:
33. Hasilnya:

BAYI BARU LAHIR

34. Berat badan: ± 3000 gram
35. Panjang: 49 cm
36. Jenis kelamin: L (P)
37. Penilaian bayi baru lahir: baik ada penyulit
38. Bayi lahir:
 - Normal, tindakan:
 - mengeringkan
 - menghangatkan
 - rangsang taktil
 - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 - Asfiksia ringan/pucat/biru/lemas, tindakan:
 - mengeringkan bebaskan jalan napas
 - rangsang taktil menghangatkan
 - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 - lain - lain sebutkan:
 - Cacat bawaan, sebutkan:
 - Hipotermi, tindakan:
 - a.
 - b.
 - c.
39. Pemberian ASI:
 - Ya, waktu: 1 jam setelah bayi lahir
 - Tidak, alasan:
40. Masalah lain, sebutkan:
- Hasilnya:

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ka	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Suhu	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	13.50	100/70 mmHg	80 %	36.9°C	2 jempit	Baik	Kosong	± 20 ml
	13.05	100/70 mmHg	80 %		2 jempit	Baik	Kosong	± 20 ml
	13.20	100/70 mmHg	80 %		2 jempit	Baik	Kosong	± 20 ml
	13.35	100/70 mmHg	80 %		2 jempit	Baik	Kosong	± 20 ml
2	14.05	100/70 mmHg	80 %	36.9°C	2 jempit	Baik	Kosong	± 60 ml
	14.35	100/70 mmHg	80 %		2 jempit	Baik	Kosong	± 60 ml

Masalah kala IV:

Penatalaksanaan masalah tersebut:

Hasilnya:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samal-Gowa Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : B-2018-AFKIK/PP.00.9/08/2018
 Lamp : -
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 02 Juli 2018

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel.
 di-

Jl. Bougenville.No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian/Pengambilan Kasus:

Nama : Nurmawati
 NIM : 70400115015
 Program Studi : Kebidanan
 Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny X Dengan Anemia Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.
 Tempat Penelitian : RSUD Syekh Yusuf Gowa
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si., SKM., M.Keb.
 2. dr. Nadyah, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
 an. **Dekan,**
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Nur Hidayah S. Kep., Ns., M.Kes.
 NIP. 198104052006042003

Tembusan :
 1. Rektor UIN Alauddin Makassar (bidang akademik)
 2. Masing-masing Pembimbing
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Lain-lain



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **8668/S.01/PTSP/2018**
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1954, A/FKIK/PP.00.9/06/2018 tanggal 24 Juni 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURMAWATI**
 Nomor Pokok : **70400114015**
 Program Studi : **Kebidanan**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (D3)**
 Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 63, Samata Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY X DENGAN ANEMIA PADA PERSALINAN DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2018"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Juli s/d 21 Agustus 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 26 Juni 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A.M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
2. Pastinggal.





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 3 Juli 2018

Kepada

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Nomor: 070/999 /BKB.P/2018

Lamp : -

Perihal: Rekomendasi Penelitian

Di-

Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 8868/S.01/PTSP/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURMAWATI**
 Tempat/Tanggal Lahir : Moyo, 29 September 1996
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
 Alamat : BTN Paccinongan Harapan

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY X DENGAN ANEMIA PADA PERSALINAN DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2018**"

Selama : 5 Juli s/d 21 Agustus 2018
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA



Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal;



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
 JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN STUDY KASUS

Nomor : 119/Diklat.RSUD-SY/VII /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Nurmawati
N i m : 70400115015
Institusi : Akbid UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Study Kasus di Ruang Kamar Bersalin(INC) dan IGD Maternal RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny " R " Dengan Anemia Pada Persalinan Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018* pada Tanggal 05 Juli 2018 S/D 05 Juli 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 23 Juli 2018

An. Ketua Diklat
 Koordinator bagian Penelitian



Hj. Eliati Paturungi, S. Kep. Ns. M. Kep

Nip. 19690407 199103 2 008

IDENTITAS PENULIS



A. Identitas Peneliti

Nama : Nurmawati
Nim : 70400115015
Tempat, tanggal lahir : Moyo, 29 September 1996
Suku : Samawa
Asal Daerah : Sumbawa
Agama : Islam
Alamat : Desa Moyo Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa,
Provinsi Nusa Tenggara Barat

B. Riwayat Pendidikan

TK Darma Wanita Moyo Hilir : 2001-2003
SDN 1 Moyo Hilir : 2003-2009
MTS Gunung Galesa Moyo Hilir : 2009-2012
MAN 2 Sumbawa : 2012-2015
UIN Alauddin Makassar : 2015-2018