

**UJI KUALITATIF AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL DAUN  
DAN BATANG SEMBUKAN (*Paederia foetida* Linn) DENGAN METODE  
KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**NUR AMALIYAH MAHMUDA**  
**NIM. 70100114018**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nur Amaliyah Mahmuda  
Nim : 70100114018  
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 19 Januari 1996  
Jur/ Prodi Konsentrasi : Farmasi  
Fakultas/ Program : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jalan M. Yasin Limpo Samata Gowa  
Judul : Uji kualitatif aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun dan batang sembukun (*Paederia foetida* Linn) dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Nur Amaliyah Mahmuda  
**NIM: 70100114018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Uji Kualitatif Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun dan Batang Sembukan (*Paederia foetida* Linn) Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT)" yang disusun oleh Nur Amaliyah Mahmuda, NIM: 70100114018, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 20 Agustus 2018 M** yang bertepatan dengan **8 Dzulhijjah 1439 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 20 Agustus 2018 M  
8 Dzulhijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M. Sc. (.....)  
Sekretaris : Hacia, S. Si., M. Si. (.....)  
Pembimbing I : Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt. (.....)  
Pembimbing II: Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt (.....)  
Penguji I : Karlina Amir Tahir, S. Si., M. Si., Apt. (.....)  
Penguji II : Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., MA (.....)

Dekan,



Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M. Sc.  
NIP. 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah nikmat kesehatan, kekuatan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Rasa syukur yang tak terhingga kepadaNya atas segala hidayah dan karunia yang penulis dapatkan. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau dan sahabat beliau.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ‘sarjana farmasi’ di bidang farmasi. Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan ke depannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Penulis sadari, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Banyak terima kasih penulis haturkan kepada pihak yang telah membantu selama penulis menjalani pendidikan kuliah hingga selesainya. Terima kasih yang setulusnya kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Drs Aminullah Sir, M.pd.I dan Ibundaku tercinta Dra. Wahdaniar Achmad atas segala doa, kesabaran, kegigihan dan dorongannya serta pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Kepada Kakak-kakak, adik-adik serta keluargaku, terima kasih untuk semangat, dukungan dan senyuman terindah kalian.

Terima kasih pula kepada Bapak/Ibu

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan (bidang akademik), Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan (bidang administrasi dan keuangan), dan Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku

Wakil Dekan (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., selaku sekretaris jurusan Farmasi sekaligus Pembimbing I penelitian bagi Penulis telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
6. Bapak Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt selaku pembimbing II penelitian bagi penulis yang sangat banyak memberi saran dan arahan selama penelitian.
7. Ibu Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt, selaku penguji Kompetensi.
8. Ibu Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., MA, selaku penguji dan pembimbing agama dalam penyusunan skripsi penelitian bagi penulis.
9. Keluarga besar Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar angkatan 2014 “GALENICA” keluarga kedua dan teman seperjuangan, terima kasih atas dukungan, semangat, dan motivasi kalian semua tanpa terkecuali.
10. Untuk Ika, Nisa, Lia, Tenri dan Afiani kalian yang selalu ada dalam keadaan apapun terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat dan motivasi kalian.
11. Untuk Ira, Mutia, Fira, Kimi, Hasma ,Ikky, Lilis, Egi, Izzah dan teman-teman seperjuangan dilaboratorium Biologi farmasi terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat dan motivasi kalian.
12. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 57 Sinoa, terkhusus untuk Desa Bonto Maccini, terima kasih atas kebersamaan serta motivasi satu sama lain dalam penyelesaian skripsi.
13. Keluarga besar jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan selama penulis selama menempuh pendidikan, kakak-kakak 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010, 2011, 2012, 2013 serta adik-adik angkatan 2015, 2016, 2017.

14. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pada penulis selama ini.


Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini mendapat ridha dari Allah swt. dan memberi manfaat bagi masyarakat dan penikmat ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis sendiri. Aamiin ya Rabbal Aalamin.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penyusun,

**Nur Amaliyah Mahmuda**

**NIM: 70100114018**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Definisi Operasional .....	5
E. Kajian Pustaka .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Uraian Tanaman.....	8
1. Klasifikasi Tanaman .....	8
2. Nama Daerah .....	9
3. Deskripsi Tanaman .....	9
4. Kandungan Tanaman .....	10
5. Khasiat Tanaman.....	10
B. Antioksidan .....	11
C. Radikal Bebas .....	14
D. DPPH (1,1-Difenyl-2-Pikrilhidrazil) .....	17
E. Kromatografi Lapis Tipis .....	18

F. Fenol .....	20
1. Senyawa Fenol .....	20
2. Persebaran .....	21
3. Biosintesis .....	21
G. Ekstraksi .....	22
H. Maserasi .....	23
I. Tinjauan Islam .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
1. Lokasi Penelitian .....	30
2. Waktu Penelitian .....	30
C. Pendekatan Penelitian .....	30
D. Sampel .....	30
E. Instrumen Penelitian .....	30
1. Alat .....	30
2. Bahan .....	31
F. Prosedur Kerja .....	31
1. Penyiapan Sampel .....	31
2. Ekstraksi Sampel .....	31
3. Uji Kualitatif Antioksidan .....	32
4. Uji Identifikasi Senyawa Golongan .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian .....	35
B. Pembahasan .....	37
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	43



<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>47</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Hasil Ekstraksi .....	35
2. Hasil uji kualitatif antioksidan.....	35
3. Hasil Pengamatan Identifikasi Golongan Senyawa .....	36



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Sembukan ( <i>Paederia foetida</i> Linn).....	8
2. Morfologi Tanaman Sembukan <i>Paederia foetida</i> Linn).....	53
3. Penyiapan Sampel.....	53
4. Ekstraksi Sampel.....	53
5. Profil KLT ekstrak sembuka ( <i>Paederia foetida</i> Linn).....	56
6. Uji kualitatif Antioksidan .....	58
7. Hasil penyemprotan DPPH .....	59
8. Uji golongan kandungan senyawa sembukan.....	60
9. Hasil uji golongan kandungan senyawa Sembukan .....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Alur Penelitian .....	47
2. Uji Kualitatif Antioksidan Daun dan Batang Sembukan.....	48
3. Penyiapan Larutan DPPH .....	48
4. Uji Identifikasi Golongan Daun Sembukan.....	49
5. Uji Identifikasi Golongan Batang Sembukan .....	50
6. Perhitungan Persen Rendamen .....	51
7. Perhitungan larutan DPPH.....	52
8. Gambar.....	53



**Nama** : Nur Amaliyah Mahmuda  
**Nim** : 70100114018  
**Judul** : Uji Kualitatif Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun dan Batang Sembukan (*Paederia foetida* Linn) dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

---

### ABSTRAK

Penelitian Uji kualitatif aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn) dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT) telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi antioksidan dari daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn). Daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn) diekstraksi lalu didapatkan ekstrak kental daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn) kemudian diuji secara kualitatif antioksidan dengan pereaksi DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil) dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Disamping itu juga dilakukan uji golongan senyawa untuk mengetahui golongan senyawa apa yang terkandung dalam daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)

Hasil analisis menunjukkan bahwa daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn) memiliki potensi sebagai antioksidan dan mengandung senyawa golongan fenol, flavanoid dan steroid

**Kata kunci** : Antioksidan, Daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn), DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil), Kromatografi lapis tipis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Name** : Nur Amaliyah Mahmuda  
**Number** : 70100114018  
**Title** : **Qualitative test research on the antioxidant activity of ethanol extract of leaves and stem of sembukan (*Paederia foetida* Linn) with thin layer chromatography method**

---

### **ABSTRACT**

Qualitative test research on the antioxidant activity of ethanol extract of leaves and stem of sembukan (*Paederia foetida* Linn) with thin layer chromatography method was carried out. This research was conducted to determine whether there is an antioxidant potential of the leaves and stem of sembukan (*Paederia foetida* Linn). Dried leaves and stem is extracted and a thick extract were obtained and then tested it with qualitative antioxidant thin layer with DPPH reagent (1,1- Definil-2-pikrilhidrazil) with thin layer cromatography.

In addition, the reasearch also carried out group compound test to determine what group of compounds contained in leaves and stem of sembukan (*Paederia foetida* Linn). The result of analysis shows that the leaves and stem of sembukan (*Paederia foetida* linn) is had antioxidant potential, and contained phenol, flavanoid, and steroid group compound.

**Keywords** : **Antioxidant, Leaves and stem of sembukan (*Paederia foetida* linn), DPPH (1,1- Diphenil-2-phikrilhidrazil), Thin layer chromatography**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Pola kehidupan manusia saat ini telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan waktu. Pola hidup yang sangat berubah adalah pola gaya hidup termasuk pola makan. Pola makan yang tidak sehat disertai sering terpaparnya zat berbahaya ke dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit dan kondisi degeneratif. Sebagian besar penyakit diawali oleh reaksi oksidasi berlebih dalam sel tubuh manusia. Radikal bebas dalam jumlah normal bermanfaat bagi kesehatan misalnya, memerangi peradangan, membunuh bakteri, dan mengendalikan tonus otot polos pembuluh darah serta organ-organ dalam tubuh sementara dalam jumlah berlebih mengakibatkan stress oksidatif. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan oksidatif mulai dari tingkat sel, jaringan, hingga keorgan tubuh yang mempercepat terjadinya proses penuaan dan munculnya penyakit (Euis, 2018).

Dewasa ini, dunia kedokteran dan kesehatan banyak membahas tentang radikal bebas (*free radical*) dan antioksidan. Hal ini terjadi karena sebagian besar penyakit diawali oleh adanya reaksi oksidasi yang berlebih di dalam tubuh. Tampaknya, oksigen merupakan sesuatu yang paradoksial dalam kehidupan. Reaksi oksidatif terjadi setiap saat. Ketika kita bernapas pun terjadi reaksi oksidasi. Reaksi ini mencetuskan terbentuknya radikal bebas yang sangat aktif, yang dapat merusak struktur serta fungsi sel. Namun, reaktivitas radikal bebas itu dapat dihindari oleh sistem antioksidan yang melengkapi sistem kekebalan tubuh (Hery, 2007).

Radikal bebas dapat didefinisikan sebagai suatu atom atau molekul yang reaktif yang memiliki elektron tidak berpasangan dan menginduksi radikal bebas. *Reactive oxygen species* secara luas diyakini terlibat sebagai penyebab berbagai penyakit seperti penuaan dini, kanker, penyakit jantung koroner, penyakit alzheimer, gangguan neurodegeneratif, aterosklerosis, katarak dan termasuk peradangan yang ditunjukkan dengan tanda-tanda stress oksidatif (Battu et al, 2011).

Stres oksidatif (Radikal bebas) dapat dikurangi dengan pemberian tambahan antioksidan. Antioksidan yang erat berkaitan dengan pencegahan penyakit degeneratif seperti kardiovaskular, neurologis, kanker dan stress oksidatif dan disfungsi (SZollosi, 2002).

Antioksidan berfungsi untuk menetralkan radikal bebas sehingga diharapkan dengan pemberian antioksidan tersebut dapat mencegah terjadinya kerusakan tubuh dan timbulnya penyakit degeneratif. Pemilihan antioksidan alami menjadi perhatian masyarakat karena telah ditemukannya efek samping pada antioksidan sintetik yang bersifat karsinogenik jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dalam jumlah yang berlebihan (Zuhra dkk, 2008).

Gaya hidup kembali ke alam (*back to nature*) menjadi tren saat ini sehingga masyarakat kembali memanfaatkan berbagai bahan alam, termasuk pengobatan dengan tumbuhan obat. Tanaman obat merupakan suatu komponen penting dalam pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional dipilih sebagai suatu alternatif jika pengobatan medis tidak membuahkan hasil. Perkembangan pengobatan didasarkan



pada bukti hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam setiap tumbuhan terkandung reseptor, struktur kimia, dan hormon yang sama dengan manusia (Utami,2008).

Indonesia dikenal sebagai gudang tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Penggunaan berbagai jenis tumbuhan di Indonesia sebagai tanaman obat tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat jauh sebelum perkembangan obat-obatan sintetik. Penggunaan obat-obatan tradisional kembali meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari penggunaan obat-obatan sintetik sehingga masyarakat banyak yang beralih dari mengkonsumsi obat-obatan sintetik ke obat-obatan tradisional (Ridho, 2013).

Daun sembukan tumbuh liar di lapangan terbuka seperti pada pagar ataupun pada tebing sungai, Tumbuhan berhabitus di semak, memanjat, dapat mengeluarkan bau busuk yang kuat ketika diremas. Batang membelit ke kanan pada batang tumbuhan lain (Depkes RI, 2011).

Tanaman ini mengandung senyawa kimia yaitu pada batang dan daun mengandung asperuloside, deacetylasperuloside, scandoside, paederosid, paederosidic acid, gama-sitosterol, arbutin, oleanolic acid, dan minyak menguap. Rasanya manis, lama-lama terasa sedikit pahit dan netral (Utami, 2008; 65).

Banyak disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Allah SWT telah menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dimuka bumi ini dan dimana tumbuh-tumbuhan merupakan

salah satu karunia besar dan menganjurkan orang-orang beriman agar mengambil manfaat dari mereka dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya baik untuk dikonsumsi maupun untuk digunakan sebagai pengobatan tugas manusia mencari dan meneliti manfaat dari tumbuhan tersebut, karena Allah SWT tidak menciptakan segala sesuatu tanpa ada manfaat didalamnya.

Berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa resiko penyakit kronis akibat senyawa radikal bebas dapat dikurangi dengan memanfaatkan peran senyawa anti oksidan seperti vitamin C, E, A, karoten, asam-asam fenol, polifenol dan flavonoid (Prakash 2001, Okawa et al., 2001). Karakter utama senyawa antioksidan adalah kemampuannya untuk menangkap dan menstabilkan radikal bebas (Prakash, 2001).

Berdasarkan kandungan kimia yang terdapat dalam daun dan batang tanaman semburan yaitu senyawa golongan fenol dan berpotensi sebagai antioksidan maka dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya senyawa antioksidan yang terdapat dalam daun dan batang semburan (*Paederia foetida* Linn).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kandungan senyawa ekstrak etanol daun dan batang semburan (*Paederia foetida* Linn)?
2. Apakah ekstrak etanol daun dan batang semburan (*Paederia foetida* Linn) memiliki potensi sebagai antioksidan ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol daun batang sembung (*Paederia foetida* Linn).
- b. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol daun dan batang sembung (*Paederia foetida* Linn) memiliki potensi antioksidan.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah informasi ilmiah, pengetahuan serta gambaran kepada penulis dan masyarakat luas terutama dalam penemuan senyawa metabolik sekunder.

## D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Definisi Operasional

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul, dengan demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan.
- b. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai.
- c. Etanol adalah senyawa kimia dengan rumus kimia  $C_2H_6O$ .
- d. Senyawa fenol merupakan golongan metabolit sekunder. Istilah senyawa fenol digunakan untuk senyawa yang memiliki cincin aromatik dan satu atau dua gugus hidroksil.

- e. Antioksidan adalah zat yang dapat melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas atau *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang terbentuk sebagai hasil dari metabolisme oksidatif yaitu hasil dari reaksi-reaksi kimia dan proses metabolik yang terjadi dalam tubuh.
- f. Metode Kromatografi Lapis Tipis adalah metode yang menggunakan plat KLT yang kemudian disemprot dengan menggunakan DPPH

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Laboratorium Fitokimia dan laboratorium Kimia analisis jurusan farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### E. Kajian Pustaka

Penelitian oleh Vikas kumar, dkk, 2009 “Pharmacognostical and Phytochemical study on the leaves of *Paederia foetida* Linn” Dibrugarh University, India pada tahun 2009, mengatakan bahwa Kandungan senyawa semburan antara lain, karbohidrat, protein, Asam amino, tanin, fenolik, flavonoid, steroid dan saponin

Penelitian oleh Sofnie marusin dkk, 2012 “Potensi sifat antioksidan pada 10 jenis ekstrak dari family Rubiaceae (*The potential antioxidant of 10 types extract of Rubiaceae*)” dalam jurnal ini disimpulkan bahwa metode yang digunakan tiosionat yang dikembangkan oleh Kikuzaki *et al* (1999) dengan menggunakan asam linoleate, asam sulfat, ferosulfat dan ammonium tiosianida. Dari hasil uji antioksidan

menggunakan metode tiosionat 10 tanaman dengan family rubiaceae ada 4 sampel yang berpotensi sebagai antioksidan yaitu kulit kayu *A. macrophyluss*, kulit kayu *W. glabarta*, kulit kayu *G. speciose* dan daun *Paederia foetida* Linn.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rini pramesti dengan judul “Aktivitas Antioksidan Ekstrak Rumpun Laut *Caulerpaserrulata* Dengan Metode DPPH (*1,1 difenil 2 pikrilhidrazil*)” yang diekstraksi secara maserasi dengan metanol yang kemudian diuji Peredaman Radikal Bebas Untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak *C. serrulata* secara kualitatif. Uji ini menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan cara menotolkan ekstrak pada plat KLT kemudian dielusi dengan kloroform. Plat KLT dikeringkan dan disemprot dengan larutan 0,004% *1,1-difenil-2-pikrilhidrazil* (DPPH) dalam metanol. Setelah 30 menit plat KLT diamati, uji positif sebagai antioksidan apabila terjadi perubahan warna pada plat KLT dari warna ungu berubah putih kekuningan dengan latar ungu disekitar spot. Hasil uji aktivitas antioksidan dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi semakin tinggi pula tingkat inhibisi.

Penelitian oleh Djoko parwanto, dkk. “ Uji Aktivitas Antioksidan Dan Sitotoksisitas Fraksi Daun Kentutan (*Paederia Foetida L.*)” Program Studi Kimia Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Tahun 2015 Menyatakan Bahwa Hasil Skrining Fitokimia Dan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) menunjukkan bahwa semua fraksi mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, polifenol, dan terpenoid. fraksi metanol pada penelitian ini telah diketahui memiliki kandungan total fenol dan LC50

paling baik yaitu sebesar 37,960  $\mu\text{g}/\text{mg}$  dan 39,836. sedangkan pada fraksi n-heksana memiliki nilai  $\text{lc}_{50}$  paling baik yaitu sebesar 291,031. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fraksi-fraksi daun sembukan berpotensi sebagai antioksidan dan sitotoksisitas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tanaman



Gambar 1. Sembukan (*Paederia foetida* Linn)

#### 1. Klasifikasi Tanaman

Regnum : Planthae  
Divisio : Spermatophyta  
Sub divisio : Angiospermae  
Class : Dicotyledoneae  
Ordo : Asteridae  
Famili : Rubiaceae  
Genus : Paederia  
Spesies : *Paederia foetida* Linn.

(FMIPA UNM, 2018).

## 2. Nama Daerah

**Daun kentut (Sumatera), Sembukan, Kesembukan (Jawa), Kahitutan (Sunda), Bintaos (Madura), Guni siki (Maluku)** (Depkes RI, 2011).

## 3. Deskripsi Tanaman

Tumbuhan berhabitus semak, memanjat, dapat mengeluarkan bau busuk yang kuat ketika diremas. Batang membelit ke kanan pada batang tumbuhan lain. Daun tunggal, bertangkai, duduk berkarang atau tersebar; helaian daun berhadapan, berbentuk bulat telur-bulat memanjang atau lanset, pangkal daun berbentuk jantung, membulat, atau tumpul, ujung daun runcing atau meruncing, tepi daun rata, panjangnya 3-12,5 cm dan lebar 2-7 cm, permukaan atas berambut atau gundul dan berwarna coklat kehitaman, permukaan bawah berwarna kelabu kecoklatan dan berambut halus, rapat dan jarang, tulang daun menyirip dengan permukaan bawah lebih menonjol daripada permukaan atas, panjang tangkai daun 1-5 cm; daun penumpu interpetiolaris berhadapan, berbentuk segitiga lebar, tepi rata, mudah gugur.

Bunga tersusun majemuk malai, agak rapat, keluar dari ketiak daun atau ujung percabangan sepanjang 6-18 cm; mahkota bunga panjangnya 12-16 mm, bagian dalam berwarna ungu, bagian luar berwarna putih, biasanya diliputi rambut dengan lobus yang pendek, bagian tabung mahkota Vi bagian atas, cuping menggulung keluar, tepi rapuh, gundul; kelopak bergigi nyata, berbentuk segitiga. Puncaknya dihiasi dengan bunga berbentuk kerucut, kelopak dengan lobus. Benang sari: tersisip pada ketinggian yang berbeda. Putik memiliki bakal buah 2 ruang, setiap ruang 1 bakal biji, kepala putik 2, bentuk rambut panjang saling membelit. Buah berbentuk



membulat, mengkilat, berwarna merah muda kekuningan, panjang 4-6 mm, pirenese membulat, tanpa sayap, ramping (Depkes RI, 2011).

#### **4. Kandungan Tanaman**

Tanaman semburan mengandung metabolik sekunder yaitu Paederosida, glikosida iridiod, paederolon, paederon, paederin, paederenin, sitosterol, stigmasterol, alkaloid, karbohidrat, protein, asam amino dan minyak menguap (Depkes RI, 2011).

Kandungan senyawa semburan antara lain, karbohidrat, protein, amino acids, tannin, fenolik, flavonoid, steroid, mucilago and saponin (Vikas kumar, 2009; 919).

Kandungan kimia batang dan daun mengandung asperuloside, deacetylasperuloside, scandoside, paederosid, paederosidic acid, gama-sitosterol, arbutin, oleanolic acid, dan minyak menguap. Rasanya manis, lama-laama terasa sedikit pahit dan netral. (Utami, 2008).

#### **5. Khasiat Tanaman**

*Paederia foetida* Linn. yang sering dikenal sebagai semburan atau daun kentut memiliki berbagai macam khasiat dan kegunaan. Tanaman ini dapat berfungsi sebagai antirematik, penghilang rasa sakit atau analgesik, peluruh kentut, peluruh kencing (diuretik), peluruh dahak (mukolitik), penambah nafsu makan, antibiotik, antiradang, obat batuk dan pereda kejang. Selain itu juga dapat berperan sebagai obat radang usus, bronkitis, tulang patah, keseleo, perut kembung, hepatitis, disentri, luka benturan, dan obat cacing (Utami, 2008).

Semburan telah lama terdapat di Indonesia. Tanaman ini dapat dipakai sebagai obat masuk angin, sakit perut, bengkak- bengkak serta obat radang mata. Dalam buku Heyne yang ditulis tahun (1927) diuraikan bahwa sejak 1890-an

tanaman sembukan digunakan untuk mengobati penyakit kulit (Herpes), disentri, radang usus besar (proktitis) dan radang telinga tengah (Timpanitis) (Agustina, 2012).

Tanaman sembukan telah lama terdapat di Indonesia. Tanaman ini dapat dipakai sebagai obat masuk angin, sakit perut, bengkak- bengkak serta obat radang mata. Dalam buku Heyne yang ditulis tahun 1927 diuraikan bahwa sejak 1890-an tanaman sembukan digunakan untuk mengobati penyakit kulit (Herpes), disentri, radang usus besar (proktitis) dan radang telinga tengah (Timpanitis) (Agustina, 2012).

### **B. Antioksidan**

Antioksidan merupakan zat penghambat reaksi oksidasi akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan asam lemak tak jenuh, membran dinding sel, pembuluh darah, basa DNA, dan jaringan lipid sehingga menimbulkan penyakit (Widyastuti, 2010).

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menyumbangkan atau mendonorkan atom hidrogen atau proton kepada senyawa radikal bebas sehingga senyawa radikal tersebut menjadi lebih stabil. Dilihat dari sumber dimana antioksidan tersebut dapat diperoleh, antioksidan terbagi menjadi dua yakni antioksidan alami dan antioksidan buatan. Antioksidan alami dapat berasal dari buah-buahan dan tanaman, sedangkan antioksidan buatan dapat disintesis dari suatu reaksi. Penggunaan antioksidan buatan dalam jangka waktu yang panjang dan jumlah yang berlebih dapat

menyebabkan kerusakan hati. Oleh sebab itu, dewasa ini manusia cenderung memilih antioksidan dari alam seperti dari buah-buahan dan tanaman yang banyak terdapat di alam khususnya di Indonesia sendiri (Sains & Teknologi, 2017).

Antioksidan sebutan untuk zat yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan radikal. Yang termasuk ke dalam golongan zat ini antara lain, Vitamin, Polifenol, Karotin dan mineral. Secara ilmiah, zat ini sangat besar peranannya pada manusia untuk mencegah terjadinya penyakit. Antioksidan melakukan semua itu dengan cara menekan kerusakan sel yang terjadi oleh proses oksidasi radikal bebas.

Ada 3 golongan antioksidan dalam tubuh yaitu :

1. Antioksidan primer

Berfungsi mencegah pembentukan radikal bebas, misalnya transferrin, ferritin, dan albumin.

2. Antioksidan sekunder

Berfungsi menangkap radikal bebas dan menghentikan pembentukan radikal bebas, misalnya *Superoxide Dismutase* (SOD), *Glutathione Peroxidase* (GPx), Vitamin C, Vitamin E,  $\beta$ - karoten, dan lainnya.

3. Antioksidan tersier atau *repair enzyme*

Berfungsi memperbaiki jaringan tubuh yang rusak oleh radikal bebas.

(Herywinarsi,2007).

Antioksidan dapat menangkap radikal bebas sehingga dapat menghambat mekanisme oksidatif yang merupakan penyebab penyakit-penyakit kronis dan

degeneratif seperti penyakit jantung, kanker, katarak, disfungsi otak dan artritis. Mekanisme kerja antioksidan memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu memberikan atom hidrogen yang berasal dari gugus hidroksi senyawa fenol sehingga terbentuk senyawa yang stabil. Senyawa antioksidan yang termasuk kelompok ini misalnya BHA, BHT, PG, TBHQ, dan tokoferol. Antiosidan yang mempunyai fungsi utama tersebut sering disebut sebagai antioksidan primer. Antioksidan tersebut dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal lipida ( $R^*$ ,  $ROO^*$ ) atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil, sementara turunan radikal antioksidan ( $A^*$ ) tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibandingkan radikal lipida.

Fungsi kedua merupakan mekanisme fungsi sekunder antioksidan, yaitu memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan perubahan radikal lipida ke bentuk lebih stabil. Senyawa-senyawa ini mempunyai kemampuan untuk mendekomposisi hidroperoksida menjadi produk akhir yang stabil. Tipe antiosidan ini pada umumnya digunakan untuk menstabilkan polyolefin resin. Contohnya, asam tiodipropionat dan dilauriltiopropionat (Gordon, 1990).

Fungsi ketiga adalah sebagai *Oxygen scavengers*, yaitu senyawa-senyawa yang berperan sebagai pengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. Dalam hal ini, senyawa tersebut akan mengadakan reaksi dengan oksigen yang berada dalam system sehingga jumlah oksigen akan berkurang. Contoh dari senyawa-

senyawa kelompok ini adalah vitamin C (asam askorbat), askorbilpalminat, asam eritorbat, dan sulfit (Gordon, 1990).

Antioksidan dari luar dapat diperoleh dalam bentuk sintetik dan alami. Namun saat ini, antioksidan sintetik mulai dibatasi penggunaannya akibat adanya kekhawatiran terhadap efek samping yang mungkin dapat terjadi, sehingga menjadikan antioksidan alami sebagai pilihan utama dalam menangkal radikal bebas. Antioksidan diharapkan aman dalam penggunaan atau tidak toksik, efektifitas pada konsentrasi rendah, (0,01-0,02)% tersedia dengan harga cukup terjangkau, dan tahan terhadap proses pengolahan produk. Antioksidan penting dalam melawan radikal bebas, tetapi dalam kapasitas berlebih menyebabkan kerusakan sel (Kazia et al., 2017)

### ***C. Radikal bebas***

Radikal bebas adalah molekul yang sangat reaktif karena memiliki electron yang tidak berpasangan dalam orbital luarnya sehingga dapat bereaksi dengan molekul sel tubuh dengan cara mengikat elektron molekul sel tersebut (Utomo, 2011).

Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan elektron, sehingga molekul tersebut menjadi tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron dari molekul atau sel lain. Radikal bebas dapat dihasilkan dari hasil metabolisme tubuh dan factor eksternal seperti asap rokok, hasil penyinaran ultra violet, zat kimiawi dalam makanan dan polutan lain. Penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas bersifat

kronis, yaitu dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penyakit tersebut menjadi nyata. Contoh penyakit yang sering dihubungkan dengan radikal bebas adalah serangan jantung, kanker, katarak dan menurunnya fungsi ginjal. Untuk mencegah atau mengurangi penyakit kronis karena radikal bebas diperlukan antioksidan (Muchtadie, 2009).

Radikal bebas oksigen ini, yang masing-masing memiliki satu elektron tunggal, bisa menyerang dan merusak nyaris setiap molekul yang ada didalam tubuh. Radikal bebas tersebut juga sangat aktif sehingga begitu terbentuk., hanya sepersekian detik kemudian radikal ini telah menggabungkan diri dengan yang lain. Dalam penggabungan tersebut, radikal mungkin melepas elektron tunggalnya atau menangkap satu elektron yang tidak berpasangan dan dengan demikian beralih menjadi sebuah radikal lain (Youngson, 2005).

Radikal bebas pada dasarnya adalah molekul yang pada orbital terluarnya terdapat elektron yang tidak berpasangan sehingga menjadikannya sangat reaktif. Radikal ini apabila masuk kedalam tubuh cenderung mengadakan reaksi berantai yang dapat memicu kerusakan-kerusakan yang berlanjut dan terus-menerus. Radikal bebas yang masuk kedalam tubuh pada dasarnya dapat diatasi oleh antioksidan endogen yang terdapat didalam tubuh. Akan tetapi, radikal bebas juga dapat mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor stress, radiasi, asap rokok dan polusi lingkungan sehingga sistem pertahanan tubuh yang ada tidak memadai,

sehingga tubuh memerlukan tambahan antioksidan dari luar yang dapat melindungi dari serangan radikal bebas (Sains & Teknologi, 2017).

Pembentukan radikal bebas akan dinetralisir oleh antioksidan yang diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang berimbang (Khairah, 2010: 3).

Sumber radikal bebas ada yang bersifat internal yaitu dari dalam tubuh dan ada yang bersifat eksternal dari luar tubuh.

#### 1). Radikal bebas internal

Radikal bebas internal berasal dari oksigen yang kita hirup. Oksigen yang biasa kita hirup merupakan penopang utama kehidupan karena menghasilkan banyak energi namun hasil lain dari reaksi pembentukan energi tersebut akan menghasilkan *Reactive Oxygen Species* (ROS). Metabolisme aerobik yang merupakan proses penting kehidupan organisme selalu diikuti oleh terbentuknya radikal bebas. Radikal bebas terbentuk saat proses sintesis energi oleh mitokondria atau proses dekoksifikasi yang melibatkan enzim sitokrom P<sub>450</sub> di hati. Seperti diketahui proses metabolisme terjadi karena teroksidasinya zat-zat makanan yang dikonversi menjadi senyawa pengikat energi (adenosine triphosphat) dengan bantuan oksigen. Dalam proses oksidasi itu terbentuk juga radikal bebas (ROS) yaitu anion superoksida dan hidroksil radikal (Khairah, 2010).

#### 2). Radikal bebas eksternal

Sumber radikal bebas eksternal dapat berasal dari polusi udara, alkohol, rokok, radiasi sinar UV, obat-obatan tertentu seperti anastesi, peptisida, sinar X dan

kemoterapi. Radikal bebas juga dihasilkan dari proses pengolahan makanan yang berlebihan. Beberapa cara pengolahan makanan yang akrab dengan kehidupan sehari-hari adalah menggoreng, membakar atau memanggang. Proses pengolahan makanan dengan cara menggoreng, membakar atau memanggang dengan suhu yang terlalu tinggi, terutama pada makanan hewani berkadar protein dan lemak tinggi sebaiknya tidak sering dilakukan karena akan menimbulkan dampak terbentuknya radikal bebas. Minyak goreng yang dipakai berkali-kali sampai berwarna coklat kehitaman dan berbau tengik, dapat menjadi penyebab timbulnya radikal bebas pada makanan yang digoreng. Minyak goreng yang sudah rusak tersebut tidak layak dipakai lagi karena dapat melepaskan senyawa peroksida dan epoksida yang bersifat karsinogenik (Kataren, 2005). Zat pengawet makanan seperti formal- dehid/formalin pada tahu, zat warna tekstil seperti rhodamin pada sirup, ternyata dapat merangsang terbentuknya radikal bebas (Nadelus, 2007).

#### **D. *1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)***

Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) adalah suatu senyawa radikal nitrogen. DPPH akan mengambil atom hidrogen yang terdapat dalam suatu senyawa, misalnya senyawa fenol. Mekanisme terjadinya reaksi DPPH ini berlangsung melalui transfer elektron. Larutan DPPH yang berwarna ungu memberikan serapan absorbansi maksimum pada 517 nm. Larutan DPPH ini akan mengoksidasi senyawa dalam ekstrak tanaman. Proses ini ditandai dengan memudarnya warna larutan dari ungu menjadi kuning (Prakash, 2001).



Metode DPPH mudah digunakan, cepat, dan cukup teliti serta mudah untuk mengukur kapasitas antioksidan dengan menggunakan radikal bebas DPPH. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel padatan, larutan untuk komponen antioksidan tertentu. Elektron bebas dalam radikal DPPH memberikan absorbansi maksimum pada 517 nm dan berwarna ungu (Prakash, 2010).

Prinsip metode penangkapan radikal adalah pengukuran penangkapan radikal bebas sintetik dalam pelarut organik polar seperti etanol atau metanol pada suhu kamar oleh suatu senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan. Proses penangkapan radikal ini melalui mekanisme pengambilan atom hidrogen dari senyawa antioksidan oleh radikal bebas, sehingga radikal bebas menangkap satu elektron dari antioksidan. Radikal bebas sintetik yang digunakan DPPH. Senyawa DPPH bereaksi dengan senyawa antioksidan melalui pengambilan atom hidrogen dari senyawa antioksidan untuk mendapatkan pasangan elektron (Pokorni, 2001).

#### **E. Kromatografi lapis tipis (KLT)**

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan kromatografi kolom pada prinsipnya sama. Apabila suatu cuplikan yang merupakan campuran dari beberapa komponen yang diserap lemah oleh adsorben akan keluar lebih cepat bersama eluen, sedangkan komponen yang diserap kuat akan keluar lebih lama. KLT merupakan suatu teknik pemisahan dengan menggunakan adsorben (fase stasioner) berupa lapisan tipis seragam yang disalutkan pada permukaan bidang datar berupa lempeng kaca, pelat

aluminium, atau pelat plastik. Pengembangan kromatografi terjadi ketika fase gerak tertapis melewati adsorben (Mukhriani, 2014).

Kromatografi merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk memisahkan dan memurnikan komponen-komponen dari campuran lainnya. Pemisahan komponen-komponen itu terjadi atas dasar distribusi dua fase, yaitu fase diam yang sering disebut adsorben dan fase gerak atau cairan pengelusi. Kromatografi yang biasa digunakan adalah kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, kromatografi kolom, dan kromatografi gas (Sastroamidjojo, 2001).

Kromatografi lapis tipis (KLT) memiliki beberapa kelebihan, yaitu pemisahan senyawa yang amat berbeda, seperti senyawa organik alam dan senyawa organik sintetik, kompleks anorganik-organik, dan bahkan ion anorganik, dapat dilakukan dalam beberapa menit dengan alat yang harganya tidak terlalu mahal. Selain itu, pelarut dan cuplikan yang digunakan jumlahnya sedikit (Sastroamidjojo, 2000).

Fase diam yang digunakan dalam KLT adalah bahan penyerap. Penyerap yang umum adalah silika gel, aluminium oksida, selulosa, kiselgur, selulosa danturunannya. Dua sifat yang penting dari penyerap adalah besar partikel dan homogenitasnya, karena adhesi terhadap penyokong sangat tergantung pada hal tersebut. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam hal efisiensinya dan resolusinya (Nurdia, 2017).

Bercak pemisahan pada KLT umumnya merupakan bercak yang tidak berwarna. Berikut adalah cara-cara kimiawi untuk mendeteksi bercak (Rohman, 2007):

1. Menyemprot lempeng KLT dengan reagen kromogenik yang akan bereaksi secara kimia dengan seluruh solut yang mengandung gugus fungsional tertentu sehingga bercak menjadi berwarna. Kadang-kadang lempeng dipanaskan terlebih dahulu untuk mempercepat reaksi pembentukan warna dan intensitas warna bercak.
2. Mengamati lempeng di bawah lampu UV 254 atau 366 untuk menampakkan solut sebagai bercak yang gelap atau bercak yang berfluoresensi terang pada dasar yang berfluoresensi seragam.
3. Menyemprot lempeng dengan asam sulfat pekat atau asam nitrat pekat lalu dipanaskan untuk mengoksidasi solut-solut organik yang akan nampak sebagai bercak hitam sampai kecoklat-coklatan.
4. Memaparkan lempeng dengan uap iodium dalam chamber tertutup.
5. Melakukan scanning pada permukaan lempeng dengan sitometer, suatu instrumen yang dapat mengukur intensitas radiasi yang direfleksikan dari permukaan lempeng ketika disinari dengan lampu UV atau lampu sinar tampak.

#### **F. Fenol**

Golongan metabolit sekunder. Istilah senyawa fenol digunakan untuk senyawa aromatik. Senyawa fenol yang memiliki gugus hidroksil lebih dari dua

disebut dengan polifenol, sebagai contoh kelompok tanin, flavonoid, melanin, lignin. (Endang hanani, 2014).

### 1. Senyawa fenol

Senyawa fenol murni dapat menimbulkan rasa panas seperti terbakar jika bersentuhan dengan kulit. Hidrokunion merupakan salah satu senyawa fenol yang penyebarannya dalam tumbuhan cukup luas. Fenol sederhana yang lain seperti orsinol, katekol, pirogallol, floroglusinol, keberadaanya lebih terbatas. Fenol bebas reaktif jarang terdapat dalam tumbuhan, umumnya senyawa fenol berikatan dengan gula membentuk glikosida yang lebih mudah larut dalam air. Senyawa fenol dengan protein membentuk glikosida yang lebih mudah larut dalam air.

Senyawa fenol dengan protein membentuk kompleks (melalui ikatan hidrogen) yang dapat mengakibatkan kerja enzim terhambat. Sering kali proses ekstraksi tidak berhasil dilakukan untuk memperoleh senyawa fenol karena kepekaannya terhadap enzim oksidase, seperti fenolase. Oleh pengaruh cahaya dan udara warna senyawa fenol secara perlahan menjadi gelap. Senyawa fenol yang sudah diketahui adalah sebagai pembangun dinding sel, pigmen bunga dan enzim. Contoh enzim yang termasuk dalam senyawa fenol antara lain asam indol-3-asetat oksidase, glukosa-6-fosfat dehidrogenase, dan beberapa enzim peroksidase. Beberapa senyawa fenol bersifat toksik terhadap beberapa serangga/hama, seperti yang terdapat dalam suku Anacardiaceae karena senyawa *o*-difenol dengan rantai samping panjang tidak jenuh. Sering kali senyawa fenol juga mengandung gugus karboksilat sehingga disebut asam

fenolat. Beberapa contoh asam fenolat adalah asam salisilat, siringat, *p*-hidroksibenzoat, vanilat, protokatekuat (Endang hanani).

## 2. Persebaran

Senyawa fenol tersebar luas pada dunia tumbuhan, terutama dalam tumbuhan yang memiliki senyawa aromatik. Strukturnya dimulai dari yang sederhana dengan satu cincin aromatik hingga kompleks merupakan polimer, sebagai contoh tanin dan lignin. Beberapa asam fenolat umumnya tersebar luas dalam tumbuhan angiospermae, sebagai contoh asam *p*-hidroksibenzoat, protokatekuat, vanilat dan siringat. Persebaran asam salisilat lebih terbatas yaitu pada suku Ericacea. Sering kali senyawa fenol diperoleh sebagai hasil degradasi/penguraian, contohnya melanin (suatu polimer fenol alam) pada degradasi bisa menghasilkan katekol. Senyawa fenol sederhana juga dapat terjadi karena adanya degradasi flavonoid dan fenol kompleks. Beberapa senyawa fenol juga merupakan komponen minyak atsiri, contohnya timol dan kreskol dalam minyak atsiri *Thymus vulgaris*, katekol (*o*-dihidroksibenzena), dalam bentuk bebas terdapat dalam biji kola dan asam salisilat dalam daun *Gaultheria* spp (Endang hanani, 2014).

## 3. Biosintesis

Senyawa *L*-fenilalanin dan *L*-tirosin merupakan suatu prekursor untuk banyak senyawa yang terdapat dalam bahan alam. Dalam tumbuhan sering kali tahap pertama adalah terjadinya eliminasi amonia pada rantai samping sehingga terbentuk asam sinamat, sedangkan dari *L*-tirosin terbentuk asam *p*-kumarat. Asam sinamat terbentuk

sebagai akibat aktivitas enzim *phenylalanine ammonia lyase* (Pal). Pembentukan asam kumarat dengan proses transformasi dari *L*-tirosin merupakan proses yang terbatas, terutama pada suku Graminae. Adanya enzim *tyrosine ammonia lyase* (TAL) dalam suku Gramine masih menjadi perdebatan.

Ada pendapat bahwa asam kumarat terbentuk dari hidrosilasi asam sinamat dalam reaksi sitokrom P-450, dan sebgai *L*-tirosin membentuk senyawa alkaloid. Selanjutnya dari asam kumarat terjadi asam kafeat, ferulat, dan sinapat. Asam-asam tersebut terdapat dalam bentuk bebas atau teresterifikasi dengan asam kuinat sebagai asam klorogenat, dengan glukosa sebagai sinamoil-glukosa, dan dengan kolin membentuk sinapin (Endang hanani, 2014).

### **G. Ekstraksi**

Ekstraksi atau penyarian merupakan proses pemisahan senyawa dari matriks atau simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Peran ekstraksi dalam analisis fitokimia sangat penting karena sejak tahap awal hingga akhir menggunakan proses ekstraksi, termasuk fraksinasi dan kemurnian (Endang, 2014).

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan (Mukhriani, 2014).

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Dirjen POM, 1995).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Dirjen POM, 2000).

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya (Sarker SD, dkk., 2006):

- a) Senyawa bioaktif yang tidak diketahui
- b) Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme
- c) Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural.

#### **H. Maserasi**

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut

dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Seidel V. 2006).

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stinak, dan lain-lain (Dirjen POM, 1986)

Maserasi dapat diklasifikasikan berdasarkan ( Dirjen POM, 1986)

a. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemansan lemah, yaitu pada suhu antara 40-50°C. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan.

b. Maserasi dengan mesin pengadukan adalah maserasi yang dilakukan dengan menggunakan mesin pengadukan yang berputar terus-menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam.

c. Remaserasi adalah penyarian dimana cairan penyari dibagi menjadi 2. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah disaring, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua.



d. Maserasi melingkar adalah penyarian yang digunakan dengan cairan penyarian yang selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya.

e. Maserasi melingkar bertingkat adalah metode penyarian yang menggunakan peralatan yang hampir sama dengan maserasi melingkar, tetapi dengan jumlah bejana penambang yang disesuaikan dengan keperluan (lebih banyak).

### **I. Tinjauan Islam tentang Khasiat Tumbuhan**

Islam senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan karena sesungguhnya ilmu Allah sangatlah luas. Hal inilah yang mendorong umat muslim untuk mengenal banyak ilmu salah satunya adalah ilmu pengobatan yang menggunakan bahan alam khususnya tumbuhan. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah Swt. di muka bumi ini tidak ada yang percuma, semua memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing, tidak terkecuali dengan tumbuhan, sesungguhnya Allah Swt. telah menjadikan di muka bumi beraneka ragam tumbuhan yang baik, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Luqman/31: 10

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik (Kementerian Agama RI. 2013).

Menurut Quraisy shihab dalam tafsir al-misbah volume 10, ayat di atas menyatakan: *Dia menciptakan langit* yang demikian tinggi dan *besar tanpa tiang* yang kamu melihatnya dengan mata kepala seperti itu, dan *dia meletakkan di permukaan bumi yang merupakan hunian kamu gunung-gunung yang sangat kukuh* sehingga tertancap kuat, supaya ia, yakni bumi itu, *tidak guncang bersama kamu*, kendati ia lonjong dan terus berputar, dan dia mengembangbiakkan di sana segala jenis binatang yang berakal, menyusui, bertelur, melata dan lain-lain. *Dan kami turunkan air hujan dari langit*, baik yang cair maupun yang membeku. *Lalu kami tumbuhkan padanya* setelah pencampuran tanah dengan air yang turun itu, segala macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik (Shihab, 2002).

QS. Al-syu'ara/26: 7 juga mengukuhkan dan menegaskan hal yang senada dengan ayat di atas:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

*Terjemahnya:*

Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik ? (Kementerian Agama RI, 2009 : 371).

Menurut Quraisy Shihab dalam Tafsir al-Misbah volume 10 yang disusunnya, ayat ini membuktikan -melalui uraiannya- keniscayaan keesaan Allah Swt. Karena aneka tumbuhan yang terhampar dipersada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaanya konstan. Itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Di sisi lain tanah yang gersang melalui hujan yang diturunkan-Nya

menghidupkan yang mati. Demikian juga manusia yang mati dan telah terkubur di bumi, Allah memiliki kuasa untuk menghidupkan mereka kembali. Serupa dengan menghidupkan pepohonan yang tumbuh ditanah yang gersang itu (Shihab, 2002).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menciptakan kehidupan diatas muka bumi ini begitu lengkap untuk kita pergunakan sebaik mungkin sebagai bekal kita hidup. Allah SWT senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk memperhatikan apa yang ada dibumi berbagai macam tumbuhan yang Allah SWT tumbuhkan dibumi yang dimana kita sebagai manusia dapat mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral.

Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap mengandung zat aktif dari variatif yang telah diciptakan Allah swt, dengan hikmah dan takdir-Nya. Potensi tumbuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak potensi yang lain adalah membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri dan mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan (Mukhriani, 2014).

Sebagaimana Rasulullah Saw juga memerintahkan kita untuk berobat bila terkena penyakit, sebagaimana dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّزَيْزِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ  
حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

*Artinya:*

“Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad alZubairiy menceritakan kepada kami, Umar bin Sa‘id bin Abi Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha‘ bin Abi Rabah menceritakan kepadaku, dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi saw. dia bersabda: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari: 5678) (Sunarto, 2010).

Maksud hadits tersebut adalah, apabila seseorang diberi obat yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya, dan waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, maka dengan seizin-Nya orang sakit tersebut akan sembuh. Dan Allah akan mengajarkan pengobatan tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki.

Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

*Artinya:*

“Telah menceritakan kepada kami [Harun bin Ma'ruf] dan [Abu Ath Thahir] serta [Ahmad bin 'Isa] mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb]; Telah mengabarkan kepadaku ['Amru] yaitu Ibnu Al Harits dari ['Abdu Rabbih bin Sa'id] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla” (HR. Muslim) (Sunarto, 2010).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jenis, dan klasifikasi penyakit akan semakin banyak ditemukan dan penemuan obat baru juga akan

semakin bertambah. Allah Swt yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Oleh karena itu, banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama digunakan sebagai obat maka Rasulullah memerintahkan kita untuk berobat bila mengidap suatu penyakit. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah yang memberi kesembuhan. Akan tetapi, Allah Swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya sehingga mendorong kesembuhan bagi yang mengidap penyakit.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu eksperimen laboratorium berdasarkan pada model penelitian true eksperimental

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia dan kimia analisis Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan pada Mei - Juli 2018

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

#### **D. Sampel**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun dan batang (*Paederia foetida* Linn) yang diambil dari Kabupaten gowa Kecamatan Sombaopu.

#### **E. Instrumen Penelitian**

##### **1. Alat**

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, bejana maserasi, botol coklat, chamber, cawan porselin, erlenmeyer, gelas ukur 100 ml (*pyrex*<sup>®</sup>), gelas kimia 250 ml (*pyrex*<sup>®</sup>), pipa kapiler, rotary evaporator (*ika*<sup>®</sup>) dan timbangan analitik.

## 2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekstrak etanol daun dan batang sembuk ( *Paederia foetida* Linn), etanol, N -heksan, etil asetat, pereaksi  $H_2SO_4$ , pereaksi  $AlCl_3$ , pereaksi dragendorf, pereaksi  $FeCl_3$ , dan Liebermen Buchard, DPPH.

## F. Prosedur Kerja

### 1. Penyiapan Sampel

#### a) Pengambilan Sampel

Sampel berupa daun dan batang sembuk ( *Paederia foetida* Linn) yang diambil pada pagi hari pukul 09.00 Wita. Berasal dari daerah samata kecamatan sombaopu kabupaten Gowa

#### b) Pengolahan Sampel

Setelah dipetik daun dan batang ( *Paederia foetida* Linn) disortasi basah dan dibersihkan dengan air yang mengalir untuk membersihkan debu serta kotoran lain yang menempel, kemudian dibilas hingga bersih dan ditiriskan, setelah ditiriskan sampel dirajang kemudian dimasukkan kedalam lemari pengering di tandai sampai terjadinya perubahan warna.

### 2. Ekstraksi Sampel

Ekstraksi sampel menggunakan metode maserasi dimulai dengan daun dan batang sembuk ( *Paederia foetida* Linn) dipotong kecil-kecil dan dimasukkan kedalam lemari pengering, sebanyak 200 gram dan batang sebanyak 150 gram dan

dimasukkan ke dalam 2 toples masing-masing 1 toples untuk daun dan batang, sampel dibasahi dan direndam menggunakan pelarut etanol 96%, dan ditutup menggunakan aluminium foil dan dengan penutup toples. Dibiarkan sampel terendam selama  $\pm 3 \times 24$  jam sesekali diaduk, lalu dilakukan proses penyarian setelah  $\pm 3 \times 24$  jam menggunakan kertas saring dan corong yang telah disumbat kapas, kemudian ditampung hasil maserasi. Lalu diuapkan dengan menggunakan alat *rotary evaporator*.

### **3. Pengujian Antioksidan secara Kualitatif dengan Metode Kromatografi**

#### **Lapis Tipis (KLT)**

##### **a. Pembuatan Larutan DPPH**

Ditimbang DPPH sebanyak 10 mg dimasukkan dalam botol coklat kemudian dilarutkan dalam 63 ml metanol p.a. Setelah DPPH larut, dibungkus dengan aluminium foil dan disimpan ditempat gelap yang terhindar dari cahaya matahari.

##### **b. Uji Aktivitas Antioksidan**

Pada plat KLT diberi tanda batas atas dan batas bawah. Pada batas bawah diberikan jarak antar sampel 1 cm dan pada jarak atas 0.5 cm. Sampel ekstrak etanol daun dan batang sembung (*Paederia foetida* Linn) ditotolkan pada plat KLT menggunakan pipa kapiler. Proses elusi dilakukan dengan cara plat KLT dimasukkan dalam chamber yang telah berisi eluen yakni N- heksan : etil asetat (6:1) dan telah dijenuhkan. Eluen dibiarkan terelusi hingga mencapai batas plat yang telah ditandai sebelumnya. Setelah selesai, plat KLT dikeluarkan dari chamber dan diamati dibawah



lampu UV 366 dan 254 nm. Setelah itu, plat KLT disemprotkan dengan larutan DPPH 0.4 Mm (Ghasal dan Mandal, 2012). Bercak pada plat KLT yang memiliki aktivitas antioksidan berubah menjadi warna putih kekuning dengan latar belakang warna ungu (Kuntorini dan Astuti, 2010).

#### **4. Penentuan Golongan Senyawa**

##### **a. Uji Alkaloid**

Kromatogram atau lempeng ditotolkan ekstrak etanol daun dan batang sembukun (*Paederia Foetida* Linn), kemudian disemprot dengan menggunakan pereaksi Dragendorf. Jika sampel positif mengandung alkaloid, maka akan dihasilkan warna jingga

##### **b. Uji Flavanoid**

Kromatogram atau lempeng ditotolkan ekstrak etanol daun dan batang sembukun (*Paederia Foetida* Linn), kemudian disemprot dengan menggunakan pereaksi Aluminium Klorida. Penampak noda diamati dibawah lampu UV 366 nm. Jika sampel mengandung Flavanoid maka noda akan berfluorensensi menjadi warna kuning.

##### **c. Uji Fenolik**

Kromatogram atau lempeng ditotolkan ekstrak etanol daun dan batang sembukun (*Paederia Foetida* Linn), kemudian disemprot dengan menggunakan pereaksi  $FeCl_3$ . Jika sampel positif mengandung fenol, maka akan dihasilkan warna hitam-biru atau hijau kehitaman.

d. Uji Terpenoid / Steroid

Kromatogram atau lempeng ditotolkan ekstrak etanol daun dan batang sembukun (*Paederia Foetida* Linn), kemudian disemprot dengan menggunakan pereaksi Liebermen-Bouchard, munculnya noda yang hijau menunjukkan positif steroid dan biru menunjukkan adanya terpenoid.

e. Uji Kumarin

Kromatogram atau lempeng ditotolkan ekstrak etanol daun dan batang sembukun (*Paederia Foetida* Linn) kemudian disemprot dengan menggunakan pereaksi KOH etanolik munculnya noda berwarna merah menunjukkan adanya kumarin

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Hasil Ekstrak Daun dan Batang Sembukan

Simplisia daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn.) sebanyak daun 200 gram dan batang 150 gram diekstraksi menggunakan metode maserasi. Hasil ekstraksi daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn.) yang diperoleh dengan pelarut etanol 96% dapat dilihat pada table 1 berikut.

Table 1. Hasil ekstraksi daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn.)

Sampel	Pelarut	Berat ekstrak	% Rendamen
Daun	Etanol 96%	21,03 gram	10,515%
Batang	Etanol 96%	11,02 gram	7,34%

##### 2. Uji kualitatif antioksidan ekstrak daun dan batang sembukan

Hasil ekstrak daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn.) kemudian diidentifikasi ada atau tidaknya kandungan antioksidan didalam sampel daun dan batang tersebut. Pada uji kualitatif antioksidan ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis dengan eluen N-heksan : Etil asetat (6:1) yang kemudian disemprotkan dengan pereaksi DPPH (*1,1 difenil -2- pikrilhidrazil*).

Table 2. uji kualitatif antioksidan ekstrak etanol daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn.)

Sampel	Perlakuan	Perubahan warna	Keterangan
Daun	Disemprotkan pereaksi DPPH	Ungu menjadi warna kuning	+

Batang	Disemprotkan pereaksi DPPH	Ungu menjadi warna kuning	+
--------	-------------------------------	------------------------------	---

Keterangan :

- + = Positif
- = Tidak Positif

### 3. Hasil identifikasi golongan senyawa Daun dan Batang Sembukan

Hasil ekstrak daun dan batang kemudian sembukan (*Paederia foetida* Linn.) kemudian diuji golongan senyawa kimianya untuk mengetahui kandungan-kandungan senyawa yang ada didalam daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn.). Pada uji golongan senyawa kimia ini menggunakan metode kromatografi lapis tipis dengan eluen N-heksan : Etil asetat (6:1) yang kemudian disemprotkan dengan pereaksi yang sesuai untuk uji golongan senyawa tersebut.

Tabel 3. Uji golongan senyawa daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn.)

Pereaksi warna	Senyawa	Warna		Ket.
		Sebelum perlakuan	Setelah perlakuan	
Dragendorf	Alkaloid	Noda berwarna Kuning kehijauan	Noda berwarna Kuning kehijauan	-
Besi (III) klorida	Fenolik	Noda berwarna Kuning kehijauan	Noda berwarna Hijau kehitaman	+
Aluminuim klorida	Flavonoid	Noda berwarna Kuning kehijauan	Noda berfluorosensi kuning	+
Lieberman- Bouchard	Steroid	Noda berwarna Kuning kehijauan	Noda berwarna Hijau	+
	Triterpen	Noda berwarna Kuning kehijauan	Noda berwarna Hijau	-
Kalium hidroksida	Kumarin	Noda berwarna Kuning kehijauan	Noda berwarna Hijau	-

etanolik				
----------	--	--	--	--

Keterangan :

- + = Positif
- = Tidak Positif

## B. Pembahasan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berubahnya pola hidup masyarakat berdampak pada munculnya berbagai penyakit degeneratif. (Fitrah, Winarno, & Simanjuntak, 2017). Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik, atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik (Winarsi, 2007).

Senyawa fenolik dan flavonoid seringkali dihubungkan dengan aktifitas antioksidan. Senyawa ini dilaporkan mempunyai aktivitas antioksidan karena sifat reduksi oksidasinya. Senyawa fenolik bertindak sebagai agen pereduksi, pemberi hidrogen, dan sebagai pengelut yang potensial (Kahkonen, 1999).

Dalam penelitian uji kualitatif antioksidan ini dilakukan terhadap sampel daun dan batang sembuk (*Paederia foetida* Linn). Pengolahan sampel dilakukan dengan pengambilan sampel daun dan batang sembuk (*Paederia foetida* Linn) yang diambil pada pagi hari kemudian sampel disortasi basah dengan tujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia, setelah dilakukan sortasi basah dilakukan pencucian untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia, pencucian dilakukan dengan air

bersih yang mengalir, Setelah sampel dirajang, sampel dikeringkan dalam lemari pengering untuk mengurangi kadar airnya agar sampel tersebut tidak berjamur, serta untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu lama, setelah sampel kering sampel kemudian dimaserasi. Semakin kecil ukuran simplisia, maka luas permukaannya akan semakin luas dan pelarut dapat menarik senyawa-senyawa kimia berdasarkan tingkat kepolarannya.

Pada tahap penelitian digunakan metode maserasi. Maserasi adalah suatu proses ekstraksi dengan cara merendam sampel pada suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai sehingga dapat melarutkan analit dalam sampel, maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dikarenakan adanya perubahan konsentrasi antara larutan zat aktif dan yang ada diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa ini berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi larutan antara diluar sel dan di dalam sel (Endang, 2016). Larutan penyari atau pelarut yang digunakan adalah etanol 96%. Pemilihan pelarut etanol 96% karena etanol dapat menarik senyawa polar dan non polar, selain itu etanol juga memiliki daya ekstraksi yang luas sehingga semua metabolit sekunder dapat tersari

Pada maserasi sampel daun sembukan (*Paederia foetida* Linn.) sebanyak 200 gram sampel daun sembukan (*Paederia foetida* Linn) dimaserasi dengan penyari etanol selama 3 x 24 jam. Setiap 3 x 24 jam dilakukan pergantian cairan penyari yang

baru hal tersebut dilakukan hingga pelarut yang digunakan telah menarik senyawa kimia yang terdapat dalam sampel serta diharapkan memberikan hasil penyarian yang maksimal. Demikian pula dengan sampel batang sembung (*Paederia foetida* Linn) (150 g) dimaserasi dengan penyari etanol 96% selama 3 x 24 jam.

Filtrat dari kedua sampel yang digunakan, dipekatkan menggunakan *Rotary evaporator* dan diuapkan hingga membentuk ekstrak kental. Ekstrak yang diperoleh kemudian disimpan dalam eksikator yang berisi silika gel aktif yang dapat menyerap uap air dan mencegah rusaknya ekstrak. Dari hasil maserasi diperoleh ekstrak etanol daun sembung (*Paederia foetida* Linn) sebanyak 21,03 gram dan ekstrak etanol batang sembung (*Paederia foetida* Linn) sebanyak 11,02 gram.

Uji kualitatif antioksidan dilakukan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) dengan menggunakan metode DPPH (*1,1-difenil-2-pikrihidrazil*). Karena merupakan metode sederhana, cepat, mudah dan menggunakan sampel dalam jumlah yang sedikit dengan waktu yang singkat. DPPH (*1,1-difenil-2-pikrihidrazil*) merupakan radikal sintetik yang larut dalam pelarut polar seperti metanol, berwarna ungu gelap dan mengandung nitrogen tidak stabil dengan absoransi kuat pada panjang gelombang 515 nm. DPPH mampu menerima sebuah elektron atau radikal hidrogen untuk menjadi molekul diamagnetik yang stabil. DPPH pada uji ditangkap oleh antioksidan yang melepaskan hidrogen, sehingga membentuk DPPH tereduksi. Warna berubah dari ungu gelap menjadi memudar dan diikuti dengan penurunan serapan pada panjang gelombang 515 nm di daerah UV-Vis.

Uji kualitatif antioksidan dilakukan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) dengan menyemprotkan DPPH (*1,1-difenil-2-pikrihidrazil*). Sebelum disemprotkan dengan DPPH pertama-tama sampel daun dan batang sembuhan (*Paederia foetida* Linn) ditotol pada lempeng kromatogram lalu dielusi dengan eluen N-heksan : Etil asetat (6:1). Eluen yang digunakan yaitu N-heksan : Etil asetat (6:1) karena telah dilakukan beberapa kali elusi menggunakan pelarut yang sama dengan perbandingan yang berbeda tetapi tidak terjadi pemisahan komponen-komponen senyawa kimia yang terdapat dalam ekstrak sampel daun dan batang sembuhan (*Paederia foetida* Linn). Setelah dielusi diamati penampakan nodanya dibawa lampu UV 254 nm dan 366 nm. Pada UV 254 lempeng akan berflouresensi sedangkan sampel akan tampak berwarna gelap dan pada lampu UV 366 noda akan berflouresensidan lempeng akan berwarna. Setelah itu disemprotkan dengan larutan DPPH. Pada pengujian ekstrak etanol 96% daun dan batang sembuhan (*Paederia foetida* Linn) secara kualitatif ini sampel daun dan batang sembuhan berpotensi sebagai antioksidan alami yang berasal dari tumbuhan. Hasil positif ditandai dengan pemudaran warna dari warna ungu menjadi putih kekuningan.

Tahap selanjutnya dilakukan uji golongan kandungan senyawa kimia dari kedua ekstrak tersebut. Pada ekstrak etanol 96% daun dan batang sembuhan (*Paederia foetida* Linn) positif mengandung senyawa fenol, flavonoid, dan steroid. Uji terhadap kandungan senyawa fenol dengan menggunakan pereaksi  $\text{FeCl}_3$ . Hasil positif yang ditandai dengan perubahan warna noda dari warna kuning ke warna hijau



kehitaman. Uji golongan senyawa flavonoid menggunakan pereaksi Aluminium Klorida. Penampakan noda diamati dibawah lampu UV 366 nm. Hasil positif ditandai dengan adanya noda berfluoresensi menjadi warna kuning. Sedangkan untuk uji golongan senyawa steroid sampel ekstrak etanol 96% daun dan batang sembung (*Paederia Foetida* Linn) disempatkan dengan pereaksi Liebermen-Bouchard. Hasil positif ditandai dengan perubahan noda menjadi hijau.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jenis, dan klasifikasi penyakit akan semakin banyak ditemukan dan penemuan obat baru juga akan semakin bertambah. Allah Swt yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Oleh karena itu, banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan terutama digunakan sebagai obat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am/6: 99 yang berbunyi;

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pula) kematangannya. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

Melihat ayat ini Allah SWT sudah menjelaskan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita umat manusia salah satunya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di atas muka bumi untuk digunakan sebagai mestinya. Pada ayat di atas, Allah Swt. menjelaskan secara garis besar mengenai proses peralihan atau perkembangbiakan tumbuhan hingga tumbuhan tersebut dapat memberi manfaat bagi manusia. Di bagian akhir ayat di atas, Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan tumbuhan, karena padanya ada tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Hal ini menjadi indikasi bahwasanya manusia dianjurkan untuk senantiasa memperhatikan tumbuhan agar dapat mengambil manfaat darinya termasuk manfaat dalam bidang pengobatan. Semakin manusia giat dan tekun untuk memperhatikan dan mencari manfaat dari tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah Swt, maka akan semakin besar pula manfaat yang dapat diperoleh oleh manusia dari tumbuhan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan :

1. Ekstrak etanol 96% daun dan batang sembung (*Paederia foetida* Linn) mengandung golongan senyawa fenolik, flavonoid, dan steroid.

2. Ekstrak etanol 96% daun dan batang sembung (*Paederia foetida* Linn) setelah dilakukan pengujian secara kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis mengandung senyawa antioksidan yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari warna ungu menjadi warna putih kekuningan pada lempeng kromatografi lapis tipis

#### ***B. Saran***

Diharapkan adanya penelitian terkait pembuatan formula tabir surya tanaman sembung (*Paederia foetida* Linn) karena tanaman tersebut memiliki potensi sebagai antioksidan alami yang berasal dari alam.

## KEPUSTAKAAN


- Badan POM RI. 2011. *Acuan Obat Herbal*. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jakarta.
- Battu, G.R. Ethadi, S.R, dkk. 2011. *Evaluation of Antioxidant and Antiinflammatory Activity of Euphorbia heyneana* Spreng. Asian Pacific: Journal of Tropical Biomedicine.
- Da'i, et al. 2011. *Radical Scavenging Activity DPPH Of Curcumin Cyclic Analog And N-Heterocyclic Monoketon*. Pharmaceutical Journal of Indonesia. Vol.12.
- Djoko. Parwanto, 2015. Dkk. *Uji Aktivitas Antioksidan dan Sitotoksitas Fraksi Daun Kentutan*. Program Studi Kimia Fakultas MIPA. Universitas Tanjungpura.
- Gordon, M.H. 1990. *The Mekanism of Antioxidant Action in Vitro*. London B.J.F Hudson ed. Food Antioxidant. Elsvier Appleid Sciences.
- Hanani, endang. 2016. *Analisis fitokimia*. Buku kedokteran EGC. Jakarta.
- Heywinarsi. 2007. *Antioksidan alami dan Radikal Bebas Potensi dan Aplikasi dalam Kesehatan*. Yogyakarta: Kansius.
- Kazia, A., Lisi, F., Runtuwene, M. R. J., & Wewengkang, D. S. 2017. *Uji Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan dari Ekstrak Metanol Bunga soyogik (Saurauia bracteosa dc .),6(1)*.
- Kementrian Agama RI. 2009. *Al Qur'anul dan Terjemahnya*. CV Diponegoro. Bandung
- Kementrian Agama RI. 2013. *Al Qur'anul dan Terjemahnya*. CV Diponegoro. Bandung
- Kumar, Vikas, Dkk. 2009. *Pharmacognostical and Phytochemical study on the leaves of Paederia foetida Linn''*, India: Dibrugarh University.
- Manobjyati, Bardoloi, Dkk. 2016. *Studies on some edible herbs: Antioxidant activity, phenolic content, mineral content and antifungal properties*. Boridua, Meghalaya. India.
- Muhtadi. 2009. *Anti Penuaan Dini*. Bandung: Alfabet.

- Mukhriani, 2014. Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan*, 7(2), pp. 361-367.
- Nikken, Widyastuti. 2010. *Pengukuran Aktivitas Antioksidan dengan Metode CUPRAC*. Skripsi Bogor: FMIPA IPB.
- Nurdia. 2017. *Isolasi Dan Identifikasi Antioksidan Terhadap Daun Pedada (Sonneratia caseolaris L.)*. Jurusan Farmasi Universitas Islam Alauddin Makassar: Makassar.
- Nadelus. H. 2007. *Sehat itu Murah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Prakash, A. 2011. *Antioxidant Activity*. Medallion Laboratories : Analytical Progress Vol 19.
- Pokorni. 2001. *Antioxidant in Food. sPractical Applications*. CRC Press: New York.
- Khairah. Kuantum. 2010. *Menangkal Radikal Bebas Dengan Anti-Oksidan*. Sumatra barat: STAIN Batusangkar.
- Reni, Euis. 2018. *Pengantar Radikal Bebas dan Antioksidan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ridho, Ery Al. 2013. Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Buah Lakum (*Cayratia Trifolia*) Dengan Metode Dpph (2,2-Difenil-1-Pikrilhidrazil). Pontianak: Universitas Tanjungpura
- Sarker SD, Latif Z, & Gray AI. 2006. *Natural Products Isolation 2nd Edition*. New Jersey: Humana Press Inc.
- Sains, F., & Teknologi, D. A. N. 2017. Universitas islam negeri alauddin makassar
- Seidel V. 2006. Initial and ulkextraction. In: Sarker SD, Latif Z & Gray AI, editors. *Natural product Isolation*, 2nd ed. Totowa (Ney Jersey). Humana Press Inc.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-mishbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an volume 10*. Lentera hati. Tangerang.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *Tafsir al-mishbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an volume 3*. Lentera hati. Tangerang.
- Shihab, M. Quraish. 2011. *Tafsir al-mishbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an volume 10*. Lentera hati. Tangerang.

- Sunarto, achmad. 2010. *Ensiklopedia Tematis Al-Qur'an dan Hadist jilid 6*. Widya cahaya. Jakarta.
- Szollosi, S. 2002. *Total Antioxidan Power in Some Species of Labiatae (Adaption of FRAP Method)*. Proceedings of the 7<sup>th</sup> Hungaria Congress on Plant Physiology.
- Utami P. 2006. *Buku Pintar Tanaman Obat*. Redaksi Agromedia. Jakarta.
- Utomo A.B. 2011. *Uji Aktivitas Antioksidan Kombinasi Ekstrak Sarang Semut dan Ekstrak the hijau dengan Metode DPPH*. Jurnal Semarang: STIF.
- Wijaya, dkk. 2014. *Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan dari Daun Nasi (Phrynium capitatum ) dengan Metode DPPH*. Bali: Universitas Udayan.
- Winarsi, Hery. 2007. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas..* Yogyakarta: Kanisius.
- Youngson. 2005. *Antioksidan, Manfaat Vitamin C dan E Bagi Kesehatan*. Jakarta: Arcan.


## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Alur Penelitian




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 2. Uji Kualitatif Antioksidan ekstrak etanol daun dan batang  
sembukan**




**Lampiran 3. Pembuatan larutan uji DPPH**






**Lampiran 4. Uji golongan kandungan senyawa ekstrak etanol daun dan batang  
sembukan (*Paederia foetida* Linn)**

**a. Daun sembukan**



**b. Batang sembukan**

**Lampiran 5. Perhitungan persen rendamen**

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat ekstrak}}{\text{Berat simplisia}} \times 100\%$$

## 1. Daun

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendamen} &= \frac{\text{Berat ekstrak}}{\text{Berat simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{21,03 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 10,515\% \end{aligned}$$

## 2. Batang


$$\begin{aligned} \% \text{ Rendamen} &= \frac{\text{Berat ekstrak}}{\text{Berat simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{11,02 \text{ gram}}{150 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 7,346\% \end{aligned}$$

## Lampiran 6. Perhitungan penyiapan larutan

### 1. DPPH

$$\begin{aligned}
 0,4 \text{ Mm} &= \frac{4 \times 10^{-4} \text{ mol}}{L} \\
 &= \frac{4 \times 10^{-7} \text{ mol}}{\text{ml}} \\
 4 \times 10^{-7} \text{ mol} &= \frac{g}{BM} \\
 4 \times 10^{-7} \text{ mol} &= \frac{g}{394,32 \frac{g}{BM}} \\
 \text{Massa} &= 4 \times 10^{-7} \text{ mol. (394,32 g/mol)} \\
 \text{Massa/mL} &= 0,0001577 \text{ g} \\
 \text{Massa/100 mL} &= 0.01577 \text{ g} \\
 &= 15,77 \text{ mg}
 \end{aligned}$$

DPPH diambil sebanyak 15,77 mg dan dicukupkan volumenya hingga 100 ml menggunakan metanol p.a

**Lampiran 7. Gambar****Gambar 1. Morfologi Sembukan (*Paederia foetida* Linn)**

Keterangan : a. Sembukan (*Paederia foetida* Linn)

b. morfologi daun tanaman sembukan (*Paederia foetida* Linn)

**Gambar 2. Preparasi sampel tanaman sembukan (*Paederia foetida* Linn)**

Keterangan : a. Penimbangan sampel basah


b. Perajangan sampel Daun



**Gambar 3. Preparasi sampel**

Keterangan :

- a. Sortasi basah daun sembukan (*Paederia foetida* Linn)
- b. Sortasi basah batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)



**Gambar 3. Preparasi sampel sembukan (*Paederia foetida* Linn)**

Keterangan :

- a. Pengeringan sampel batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)
- b. Pengeringan sampel Daun sembukan (*Paederia foetida* Linn)
- c. Penimbangan sampel sembukan (*Paederia foetida* Linn)



Gambar 4. Ekstraksi sampel sembukan sembukan (*Paederia foetida* Linn)

Keterangan :


- a. Maserasi sampel daun
- b. Maserasi sampel batang



Gambar 5. Ekstraksi sampel Sembukan sembukan (*Paederia foetida* Linn)

Keterangan :


- a. Proses *Rotary evaporator*
- b. Sampel hasil *Rotary evaporator*



Gambar 7. Profil KLT ekstrak daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)

Keterangan :

- a. Sampel ekstrak etanol daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)
- b. penotolan ekstrak etanol daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)




Gambar 8. Profil KLT ekstrak daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)

Keterangan :

- a. Pengelusion ekstrak etanol daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)
- b. Hasil pengelusion daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)





Gambar 9. Profil KLT ekstrak daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)

Keterangan :

a. Hasil UV 254 ekstrak etanol daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)

b. Hasil UV 366 daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)

ALAUDDIN  
MAKASSAR




Gambar 10. Penyemprotan DPPH ekstrak daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)

Keterangan :

a. Pereaksi DPPH

b. Penyemprotan DPPH daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)



Gambar 11. Hasil penyemprotan DPPH ekstrak daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)

Keterangan :


- a. Hasil penyemprotan DPPH ekstrak etanol daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)
- b. Hasil penyemprotan DPPH ekstrak daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)



Gambar 12. Uji golongan ekstrak daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)

Keterangan :


- Pengelusian ekstrak etanol daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)
- Hasil pengelusian daun dan batang sembukan (*Paederia foetida* Linn)



Gambar 14. Hasil setelah penyemprotan

Keterangan :

- Hasil setelah disemprotkan pereaksi  $FeCl_3$  (Fenol)
- Hasil setelah disemprotkan pereaksi KOH etanolik
- Hasil setelah disemprotkan pereaksi Aluminium klorida(Flavanoid)



Gambar 15. Hasil setelah penyemprotan

Keterangan :

- a. Hasil UV 366 setelah disemprotkan pereaksi Aluminium klorida(Flavanoid)
- b. Hasil setelah disemprotkan pereaksi Dragendrof(Alkaloid)
- c. Hasil setelah disemprotkan pereaksi Liebermann-burchard(Steroid)

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Nur Amaliyah Mahmuda sering disapa Lili. Lahir di Sinjai, 19 Januari 1996. Merupakan anak kedua dari pasangan Drs. Aminullah Sir., M.pd dan Dra. Wahdaniar Achmad. Memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Aisyiyah II kemudian melanjutkan ke SDN 1 Sinjai, yang kemudian dilanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMPN 3 Sinjai. Setelah itu dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN 1 Sinjai. Setelah lulus SMA kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi tepatnya di Jurusan

Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014 “Galenica” melalui jalur SNMPTN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R