

UJI POTENSI TABIR SURYA EKSTRAK DAUN BINAHONG (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) SECARA IN VITRO



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURFAJRI INDRIANI
NIM : 70100114009

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurfajri Indriani
NIM : 70100114009
Tempat/Tanggal Lahir : Malino/09 Juli 1996
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Jl. Yusuf Bauty
Judul : Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Daun Binahong
(*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) Secara In Vitro

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa

2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

NURFAJRI INDRIANI

NIM. 70100114009

M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) Secara In Vitro” yang disusun oleh **Nurfajri Indriani, NIM: 70100114009**, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 15 Agustus 2018 M** yang bertepatan dengan **3 Dzulhijjah 1439 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 15 Agustus 2018 M
3 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc.

(.....)

Sekretaris : Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt.

(.....)

Pembimbing I : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt.

(.....)

Pembimbing II: Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt.


(.....)

Penguji I : Isriany Ismail, S. Si., M. Si., Apt

(.....)

Penguji II : Drs. H. Muh. Kurdi, M.HI.

(.....)



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia kearah yang lebih beradab dan manusiawi. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abd. Rasyid S.Sos dan Ibunda Hadawiyah yang tak henti-hentinya memberi doa yang tulus dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan dari orang-orang tercinta. Terima kasih atas doa, kasih sayang, bimbingan, dan dukungannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah mereka berikan. Mereka juga adalah

semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada mereka.

Penulis tak lupa pula menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Km., M.Kes. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan sekaligus sebagai pembimbing akademik.
7. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Isriany Ismail, S. Si., M. Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
11. Drs. H. Muh. Kurdi, M.HI. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Farmasi yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT. serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
13. Rekan, saudara, teman seperjuangan angkatan tahun 2014 “GALENICA” yang telah banyak membantu serta berjuang bersama dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang Farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN 2018
Makassar,
Penulis
M A K A S S A R

NURFAJRI INDRIANI
NIM. 70100114009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Uraian Tanaman	9
1. Klasifikasi.....	9
2. Nama Daerah.....	9
3. Deskripsi.....	9
4. Uraian Senyawa Kimia.....	10
B. Anatomi dan fisiologi kulit	10
1. Struktur Kulit.....	11

2. Warna Kulit.....	18
3. Eritema dan Pigmentasi.....	20
C. Tabir Surya.....	23
D. Sun Protected Factor (SPF)	29
E. Spektrofotometri UV-VIs	32
F. Metode Ekstraksi Bahan Alam	37
G. Tinjauan Islami	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	47
B. Lokasi Pengambilan Sampel.....	47
C. Pendekatan Penelitian	47
D. Populasi dan sampel.....	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Alat dan Bahan.....	49
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
KEPUSTAKAAN.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja Penyiapan Sampel.....	65
2. Skema Kerja Analisis Data	66
3. Gambar sampel.....	67
4. Hasil Pengukuran Persen Transmisi Eritema dan Pigmentasi	68
5. Perhitungan Nilai Transmisi Eritema (%Te) dan Pigmentasi (%Tp Serta SPF.....	77
6. Gambar Pengerjaan.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penggolongan potensi tabir surya	25
2. Faktor efektifitas fluks dan pigmentasi pada panjang gelombang 290-375 nm	28
3. Keefektifan sediaan tabir surya berdasarkan nilai SPF.....	30
4. Spektrum cahaya tampak dan warna-warna komplementer	33
5. Hasil ekstraksi daun Binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis).....	53
6. Nilai rata-rata SPF.....	53
7. Nilai Persen Transmisi Eritema Daun Binahong	53
8. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Daun Binahong	54
9. Data transmisi replikasi I 300 ppm	68
10. Data transmisi replikasi II 300 ppm	68
11. Data transmisi replikasi III 300 ppm.....	69
12. Data Transmisi replikasi I 350 ppm.....	70
13. Data Transmisi replikasi II 350 ppm.....	70
14. Data Transmisi replikasi III 350 ppm	71
15. Data Transmisi replikasi I 400 ppm.....	72
16. Data Transmisi replikasi II 400 ppm.....	72
17. Data Transmisi replikasi III 400 ppm	73
18. Data Transmisi replikasi I 450 ppm.....	74
19. Data Transmisi replikasi II 450 ppm.....	74
20. Data Transmisi replikasi III 450 ppm	75
21. Pengukuran Nilai SPF Konsentrasi 300 ppm	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Struktur Kulit.....	10
2. Gambar Daun Binahong (<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis)	67
3. Gambar Pengerjaan	81



ABSTRAK

Nama : Nurfajri Indriani
Nim : 70100114009
Judul Skripsi : Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) secara In Vitro.

Telah dilakukan penelitian tentang penentuan potensi tabir surya ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) secara *in vitro* dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Pengujian potensi tabir surya ekstrak daun binahong dilakukan dengan menghitung nilai transmisi eritema (%Te) dan transmisi Pigmentasi (%Tp), serta nilai SPF ekstrak. Hasil pengujian nilai rata – rata persen transmisi eritema (%Te) pada konsentrasi (300 ppm, 350 ppm, 400 ppm, dan 450 ppm) berturut – turut adalah 31,52%; 23,90%; 20,27%; 14,71%. Sedangkan perhitungan nilai rata–rata persen transmisi pigmentasi (%Tp) yang diperoleh pada konsentrasi (300 ppm, 350 ppm, 400 ppm, dan 450 ppm berturut-turut adalah 20,95%; 15,9%; 11,98%; 8.26%. Nilai rata-rata SPF dengan konsentrasi (300 ppm, 350 ppm, 400 ppm, dan 450 ppm) berturut-turut adalah 4,36; 5.82; 7.44; 10.45.

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) berpotensi sebagai tabir surya pada konsentrasi 450 ppm yang termasuk kategori *fast tanning* untuk proteksi eritema dan termasuk proteksi *totalblock* untuk proteksi pigmentasi, serta memiliki nilai SPF sebesar 10,45 yang termasuk proteksi maksimal.

Kata kunci: Daun binahong , Tabir surya, SPF, %Te, %Tp

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Nurfajri Indriani
NIM : 70100114009
Title : Determination Sunscreen Potential of Binahong Leaf (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) with In Vitro Method

A study has been conducted with research about the potential of sunscreen extract Binahong leaves (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) in vitro by using UV-Vis Spectrophotometer. Testing of the potential of sunscreen extract Binahong leaves was conducted by calculating the value of erythema transmission (%Te) and pigmentation transmission (%Tp), as well as the value of SPF extract. The result of the testing are the average percentage of erythema transmission (%Te) at concentrations (300 ppm, 350 ppm, 400 ppm, dan 450 ppm) respectively 31,52%; 23,90%; 20,27%; 14,71%. While the calculation of the average of percent pigmentation transmission (%Tp) which is obtained at concentration (300 ppm, 350 ppm, 400 ppm, and 450 ppm) respectively 20,95%; 15,9%; 11,98%; 8.26%. The average of SPF with concentration (300 ppm, 350 ppm, 400 ppm, and 450 ppm) respectively 4,36; 5.82; 7.44; 10.45.

The result of the research showed that the extract of Binahong leaves (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) has the potential to be a sunscreen in concentration 450 ppm including *fast tanning* category for erythema protection and including *totalblock* protection for pigmentation protection, and it has SPF value of 10,45 wich includes maximum protection.

Key word: Binahong leaves, Sunscreen, SPF, %Te, %Tp.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan paparan sinar matahari yang tinggi dan sebagian besar penduduknya bekerja diluar ruangan sehingga memerlukan suatu perlindungan kulit. Sinar matahari selain memberi manfaat juga mempunyai dampak buruk pada kulit jika terpapar secara berlebihan. Sinar ultraviolet yang disebut UVB dan UVA, kedua sinar ultraviolet ini bekerja secara sinergis sehingga dibutuhkan suatu pencegahan atau perlindungan untuk mengurangi dampak buruk pada kulit akibat radiasi tersebut (Yulianti, 2015).

Paparan sinar UV pada dasarnya memiliki manfaat dalam pembentukan vitamin D yang digunakan untuk metabolisme pembentukan tulang dan sistem imun. Selain itu, radiasi sinar UV juga dapat digunakan untuk terapi psoriasis dan vitiligo. Akan tetapi, paparan sinar matahari secara berlebih merupakan mediator eksogen utama terjadinya kerusakan pada kulit yang dapat mempercepat terjadinya penuaan dan resiko terjadinya kanker pada kulit (Isriany, 2014). Jika penyinaran matahari terjadi secara berlebihan, jaringan epidermis kulit tidak cukup mampu melawan efek negatif tersebut sehingga diperlukan perlindungan baik secara fisik dengan menutupi tubuh dan secara kimia dengan menggunakan tabir surya (Karina, 2015).

Penggunaan tabir surya merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kulit dari efek merugikan yang disebabkan oleh radiasi UV. Kemampuan suatu tabir surya dapat melindungi kulit dengan menunda eritema dinyatakan dengan *Sun Protection Factor* (SPF) (Hassan et al., 2013).

Tabir surya *chemical* umumnya bersifat *allergenic* (Cefali *et al*, 2016), yang dapat menyebabkan fotoiritasi, fotosensitasi dan dermatitis kontak (Saewan & Jimtaisong, 2013). Meskipun ada berbagai produk kosmetik *hypoallergenic* untuk kulit sensitif, produk tabir surya masih jarang ditemukan (More *et al*, 2013). Bahan aktif tabir surya dari bahan alam dapat memenuhi kebutuhan konsumen kulit sensitif terhadap kosmetika tabir surya (Warnida,2017).

Beberapa tumbuhan diketahui memiliki manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan alam untuk melindungi kulit dari dampak buruk sinar matahari Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Keanekaragaman tumbuhan Indonesia juga menjadi suatu kekayaan yang tak ternilai harganya. Menurut perkiraan badan kesehatan dunia, 80% penduduk dunia masih menggantungkan dirinya pada penggunaan obat yang berasal dari tumbuhan. Bahkan seperempat dari obat modern yang beredar di dunia berasal dari bahan aktif yang diisolasi dan dikembangkan berasal dari tumbuhan (Pandiangan, 2011).

Di dalam tumbuhan terdapat zat alami yang dapat diekstrak dan dapat bertindak sebagai sumber potensial tabir surya karena bersifat *photoprotective*. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa tanaman tidak bisa terhindar dari paparan sinar matahari karena tanaman memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Meskipun begitu, tanaman memiliki mekanisme perlindungan diri sehingga tanaman tidak mengalami kerusakan. Hal tersebut memberikan sedikit gambaran mengenai kemampuan tanaman untuk melindungi kulit melalui senyawa yang terkandung didalam tanaman yang berupa senyawa bioaktif seperti senyawa fenolik dan didukung oleh adanya senyawa yang bersifat antioksidan (Prasiddha,2016).

Penggunaan zat-zat yang bersifat antioksidan dapat mencegah berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh radiasi sinar UV, beberapa golongan senyawa aktif antioksidan seperti flavonoid, tanin, antraquinon, sinamat dan lain-lain telah dilaporkan memiliki kemampuan sebagai perlindungan terhadap sinar UV (Hogade, 2010 dalam Juliandri, 2014).

Pencarian senyawa-senyawa dari bahan alam menjadi perhatian utama sekarang ini, beberapa senyawa antioksidan dapat dihasilkan dari produk alami. Salah satu tanaman yang menghasilkan senyawa antioksidan adalah daun binahong *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis). Di Indonesia tanaman ini dikenal sebagai gendola yang sering digunakan sebagai gapura yang melingkar di atas jalan taman. Namun, manfaat dari tanaman ini belum banyak dikenal dalam masyarakat Indonesia, sehingga menarik untuk diteliti (Manoi, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih, dkk (2015) menunjukkan bahwa tumbuhan binahong *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) mengandung senyawa polifenol, flavonoid, dan saponin. Pada penelitian yang dilakukan oleh Parwati, (2014) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun binahong *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) mempunyai nilai IC50 sebesar 40,27 ppm sedangkan IC50 yang dihasilkan vitamin C sebesar 49,20 ppm. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan menangkap radikal bebas ekstrak daun binahong termasuk dalam golongan sangat kuat dikarenakan nilai IC50 yang diperoleh dari perhitungan kurang dari 50 ppm yaitu 40,27 ppm. Hal ini sesuai dengan pernyataan Molyneux dalam jurnal Parwati, 2014 bahwa tingkat kekuatan antioksidan menggunakan DPPH dapat digolongkan menurut IC50. Semakin kecil nilai IC50 berarti semakin kuat daya antioksidannya.

Berdasarkan uraian tersebut daun binahong *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) berpotensi sebagai tabir surya. Namun belum ada penelitian lebih lanjut yang menguji potensi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi daun binahong sebagai tabir surya dan menghitung nilai SPF (*Sun Protecting Factor*).

B. Rumusan Masalah

1. Berapa nilai *Sun Protecting Factor* (SPF) ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)?
2. Apakah ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) berpotensi sebagai tabir surya?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Potensi tabir surya ialah kemampuan suatu sediaan atau zat dalam menghambat penetrasi sinar UV ke dalam kulit yang dapat ditentukan berdasarkan persen transmisi eritema dan persen transmisi pigmentasi.
- b. Tabir surya merupakan suatu sediaan yang secara fisik atau kimia dapat menghambat penetrasi sinar UV ke dalam kulit.
- c. Persentase transmisi eritema/pigmentasi adalah perbandingan jumlah energi sinar UV yang diteruskan oleh sediaan tabir surya pada spektrum eritema/pigmentasi dengan jumlah faktor keefektifan eritema/pigmentasi pada tiap panjang gelombang dalam rentang 292,5-372,5 nm.
- d. *Sun Protection Factor* (SPF) merupakan indikator yang menjelaskan tentang keefektifan dari suatu produk atau zat yang bersifat UV protektor, yang dikategorikan menjadi semakin tinggi nilai SPF dari suatu produk atau zat

aktif tabir surya maka semakin efektif melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV.

- e. Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai.
- f. In vitro adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur nilai *Sun Protcting Factor* (SPF) dengan menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran dari zat atau ekstrak yang diuji.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) sebagai sampel yang akan diuji potensi sebagai tabir surya dan menetapkan nilai SPF-nya, serta menentukan jenis tabir suryanya berdasarkan data analisis yang diperoleh.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Parwati, dkk tahun 2014 berjudul “Uji aktivitas antioksidan ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dengan 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (dpph) menggunakan spektrofotometer UV-VIS” pada penelitian ini digunakan metode ekstraksi maserasi menggunakan pelarut etanol absolut, kemudian dilakukan uji pendahuluan fitokimia dan uji aktifitas antioksidan. Pada uji aktivitas antioksidan menggunakan beberapa variasi konsentrasi yaitu 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, dan 80 ppm. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) menunjukkan hasil positif terhadap golongan senyawa alkaloid, flavonoid dan tanin, dan negatif terhadap saponin. Sedangkan untuk uji aktivitas antioksidan diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol

daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) memiliki nilai IC50 sebesar 40,27 ppm hal ini menunjukkan bahwa daya antioksidan yang sangat kuat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahurrahmah tahun 2015 yang berjudul “Penentuan Potensi Tabir Surya Ekstrak Etanol Kulit buah Rambutan (*Nephelium lappaceum*)”. Pengujian potensi tabir surya pada ekstrak etanol kulit buah rambutan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan metode penentuan nilai SPF, persen transmisi eritema (% Te), dan persen transmisi pigmentasi (% Tp). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa ekstrak kulit rambutan pada konsentrasi 80 ppm memiliki nilai SPF sebesar 2,37 yang berarti memiliki potensi minimal tabir surya sementara pada konsentrasi 160 ppm nilai SPF sebesar 5,32 yang memiliki potensi tabir surya sedang. Ekstrak kulit rambutan pada konsentrasi 80 ppm memiliki potensi sebagai tabir surya dalam kategori *suntan* dengan nilai persen transmisi eritema (%Te) sebesar 16,18 dan persen transmisi pigmentasi (%Tp) sebesar 49,65. Sedangkan pada konsentrasi 160 ppm memiliki potensi tabir surya dalam kategori *total block* dengan nilai persen transmisi eritema (%Te) sebesar 3,18 dan persen transmisi pigmentasi (%Tp) sebesar 25,16.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Umrah tahun 2017 yang berjudul “Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava* L.) Berdaging Putih Secara *In Vitro*”. Pengujian potensi tabir surya pada ekstrak daun jambu biji berdaging putih menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan metode penentuan nilai SPF, persen transmisi eritema (% Te), dan persen transmisi pigmentasi (% Tp). Pengujian ini menggunakan 5 variasi konsentrasi yaitu 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm dan 250 ppm. Hasil pengukuran

menunjukkan nilai rata - rata SPF ekstrak daun jambu biji berdaging putih yang diperoleh pada konsentrasi (50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm dan 250 ppm) berturut – turut adalah 2,71; 5,75; 19,90; 42,28; dan 104,24, serta untuk hasil pengukuran transmisi eritema dan pigmentasi didapatkan pada konsentrasi 50 ppm, 100 ppm, dan 150 ppm dikategorikan sebagai *suntan*, serta pada konsentrasi 200 ppm dan 250 ppm dikategorikan sebagai *sunblock*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fadlan yang berjudul “Uji Potensi Tabir Surya Dan Nilai Sun Protecting Factor (Spf) Ekstrak Kulit Buah Delima Putih (*Punica Granatum L.*) secara *In Vitro*” tahun 2016. Pengujian potensi tabir surya ekstrak kulit buah delima putih dilakukan dengan menghitung nilai transmisi eritema %Te dan tranmisi Pigemntasi %Tp serta nilai SPF ekstrak. Pada penentuan nilai SPF, diperoleh nilai rata - rata SPF konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm berturut - turut sebesar 1,2; 1,4; 1,7; 2,1; 2,6. Sedangkan hasil yang didapatkan dari penentuan transmisi Eritema dan transmisi pigmentasi menunjukkan konsentrasi ekstrak 200 ppm termasuk dalam kategori *reguler suntan* untuk eritema dan berada dalam kategori *total block* untuk pigmentasi, dan konsentrasi 400, 600, 800, dan 1000 ppm termasuk dalam kategori *total block* untuk eritema dan pigmentasi.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui nilai *Sun Protecting Factor* (SPF) dari ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)
- b. Untuk mengetahui potensi tabir surya dari ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)

2. Manfaat Penelitian

- a. Diperoleh data ilmiah mengenai nilai *Sun Protecting Factor* (SPF) ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) sebagai tabir surya.
- b. Diketahui potensi tabir surya ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi

Regnum	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophylla
Famili	: Basellaceae
Genus	: <i>Andredera</i>
Spesies	: <i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis (Tjitrosoepomo, 2013)

2. Nama Daerah

Binahong (Indonesia), Teng san chi (Cina), Heartleaf Madeira vine, Madeira vine (Inggris) (Manoi, 2009).

3. Deskripsi

Binahong merupakan tanaman menjalar dan berumur lama, panjang dapat mencapai 5 m, batang lunak, berbentuk silindris, saling membelit, bagian dalam solid, permukaan halus, kadang membentuk semacam umbi yang melekat diketiak daun dengan bentuk tak beraturan dan bertekstur kasar. Daun tunggal, bertangkai sangat pendek, tersusun berseling, berwarna hijau, bentuk jantung, panjang 5-10 cm, lebar 3-7 cm, helaian daun tipis lemas, ujung runcing pangkal berlekuk, tepi rata, permukaan licin, bisa dimakan. Bunga majemuk berbentuk tandan, bertangkai panjang, muncul diketiak daun, mahkota berwarna krem keputih-putihan berjumlah lima helai tidak


berlekatan, panjang helai mahkota 0,5-1 cm, berbau harum. Akar berbentuk rimpang, berdaging lunak (Manoi, 2009).

4. Uraian Senyawa Fitokimia

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti, dkk., 2011 menunjukkan bahwa tumbuhan binahong mengandung senyawa fenol, flavonoid, saponin, triterpenoid, steroid dan alkaloid. Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang berpotensi sebagai antioksidan. Selanjutnya Titis, 2013 mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa alkaloid pada ekstrak daun binahong. Isolat (ekstrak etanol) alkaloid adalah senyawa betanidin ($C_{18}H_{16}N_2O_8$).

B. Anatomi dan Fisiologi Kulit

Kulit berperan sebagai lapisan pelindung tubuh terhadap pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun kimia. Meskipun kulit relatif impermeabel terhadap senyawa-senyawa kimia, namun dalam keadaan tertentu kulit dapat ditembus oleh senyawa obat atau bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek terapeutik atau efek toksik yang bersifat lokal atau sistemik. Kulit juga merupakan sawar (*barrier*) fisiologik yang penting karena mampu menahan penembusan bahan gas, cair, maupun padat, baik yang berasal dari lingkungan luar tubuh maupun komponen yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Isriany, 2013).



Gambar 1. Struktur kulit (Sumber: Kessel RG, 1998)

1. Struktur kulit

Kulit manusia tersusun atas 3 lapisan utama, dari luar ke dalam yakni epidermis (*non-viable* dan *viable* epidermis), dermis, dan endodermis. Ketiga lapisan tersebut berbeda dari segi anatomi, morfologi, senyawa penyusun, sifat dan fungsinya (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

Lapisan terluar merupakan turunan dari ectoderm yang disebut epidermis. Epidermis terhubung dengan dermis oleh taut dermo-epidermic (*dermo-epidermic junction*). Di bawah dermis terdapat lapisan hypodermis (endodermis). Setiap lapisan dilalui oleh ujung-ujung saraf dan pembuluh darah. Pembuluh darah yang perifer yang melintasi kulit mengalirkan darah sebanyak $0,3 \text{ mL/jam/cm}^3$. Total luas area pembuluh darah intrakutan yang tersedia untuk pelintasan langsung obat ke sirkulasi sistemik sejumlah 100%-200% dari area kulit. Pada kulit terserbar adneksa kulit berupa folikel rambut dan kelenjar (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

a. Epidermis

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan bervariasi antara $50 \mu\text{m}$ - 1,5 mm, tersusun dari 15-25 sel. Epidermis terbentuk dari lima lapisan sel epitelial squamosa, diantaranya yang paling umum adalah keratinosit. Keratinosit adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan keratin, protein struktural dari kulit, rambut dan kuku. Sel-sel ini diyakini terlibat dalam proses imun dengan pertama kali melepaskan immunoglobulin A dan kemudian interleukin-1, yang memicu pengaktifan sel-sel T (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

Epidermis berfungsi sebagai penghalang terpenting dari hilangnya air, elektrolit, dan atau nutrien tubuh, serta menahan masuknya senyawa asing dari luar. Lapisan epidermis terdiri dari non-viable epidermis dan viable epidermis. Secara anatomi lapisan epidermis terdiri dari 5 lapisan utama yang susunannya lebih dikenal dengan istilah 'strata'. Tersusun dari luar ke dalam berturut-turut; non-viable epidermis yaitu stratum korneum dan viable epidermis yaitu stratum lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal (germinativum). Kurang lebih setengah dari keratinosit bergerak dari lapisan sel basal ke atas memulai semua lapisan-lapisan epidermis yang lain. Sambil bergerak melalui lapisan-lapisan, strukturnya berubah dan sel-sel mulai memipih, kehilangan inti, dan akhirnya kering (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

1) Stratum korneum (lapisan tanduk; *Horny Layer*)

Stratum korneum merupakan lapisan terluar dari epidermis dan menjadi penghalang utama terhadap kehilangan senyawa endogen serta menjadi penghalang tubuh terhadap pengaruh lingkungan seperti senyawa kimia, mikroba, pelarut, radiasi, elektrik, dan termal. Lapisan ini memiliki ketebalan 10-20 μm yakni berkisar 1% - 10% dari total dalam kulit, serta berkontribusi lebih dari 80% terhadap tahanan permeabilitas kulit. Kemampuan ini cukup tinggi untuk menjaga kehilangan air transkutaneus.

Stratum korneum tersusun atas sel kulit mati dan kering, oleh karena itu disebut *nonviable* epidermis yang hanya mengandung air kurang dari 15% dan tersusun atas sedikitnya selusin lapisan sel-sel mati yang gepeng (korneosit). Sel-sel ini tersusun rapat dan saling tumpang tindih. Tiap selnya berdiameter sekitar 40 μm dengan ketebalan 0,5 μm . Sel-sel penyusun *stratum korneum* merupakan sel yang

kehilangan inti dan sitoplasmanya dipenuhi oleh filamen skleroprotein yang disebut keratin. Keratin mengandung 6 polipeptida dengan berat molekul 40.000-70.000. Sel-sel ini adalah tahap akhir dari proses diferensiasi sel epidermis yang dimulai pada stratum basal. Setelah keratinisasi berakhir, maka sel-sel hanya terdiri atas protein amorf dan fibriliar, serta membran plasma yang menebal, selanjutnya disebut sel tanduk.

Stratum korneum mengandung protein keratin yang tidak larut (70%) dan lipid (20%). Komponen inilah yang memegang peranan penting dalam mengontrol absorpsi perkutan senyawa eksogen termasuk senyawa obat. Selain itu, proses deskuamasi (pengelupasan sel) pada sel-sel stratum korneum yang berlangsung setiap 2-3 minggu mampu menghilangkan senyawa-senyawa terlarut yang teradsorpsi di *stratum corneum*.

Dibawah *stratum korneum* tersusun berturut-turut viable epidermis yaitu stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum, yang terdiri dari sel-sel hidup dan tersusun longgar (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

2) Stratum Lucidum (Lapisan bening; *Clear Layer*)

Stratum lucidum terdapat tepat dibawah stratum korneum. Lapisan ini tampak jelas pada kulit tebal dan tidak berambut pada telapak tangan dan kaki. Terdiri dari selapis sel eosinofilik, sangat gepeng atau tipis. Tampak sebagai barisan jernih yang homogen, terdiri atas beberapa lapisan keratin padat, terjalin erat, dan tanpa organel nukleus. Sitoplasma berisi eleidin yaitu protein mirip keratin namun afinitasnya berbeda dengan fosfolipid yang terikat pada proteinnya mungkin berperan dalam absorpsi perkutan karena berfungsi pula sebagai sawar (Reveire, 2006 dalam Isriany, 2013).

3) Stratum granulosum (Lapisan Berbutir; *Granular Layer*)

Stratum granulosum tersusun atas tiga sampai lima lapis sel dengan banyak granular berlamella yang mengandung keratohyalin, bagian ini berperan dalam pembentukan keratin. Jumlah dan ukuran granula tersebut terus bertambah, bergerak menuju membran sel, dan melepaskan isi lipidnya dengan cara eksositosis ke celah antara stratum korneum dan stratum granulosum. Akibatnya terbentuk sejenis lapisan pada membran sel stratum korneum. Semua sel diatas lapisan ini mati karena letaknya yang sangat jauh dari sumber nutrisi sehingga kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

4) Stratum spinosum (Spinosus atau *Prickle Layer*)

Sel-sel ini terhubung dengan sel stratum spinosum yang berdekatan dengan sel stratum basal bawahnya oleh suatu jembatan interseluler yang disebut desmosomes. Karakteristik lapisan ini adalah banyaknya filamen yang menonjol dan membedakan morfologi lapisan ini dengan epidermis lainnya. Dilapisan paling atas terdapat organel yang berikatan dengan membran, dikenal sebagai butiran pipih badan Odland. Namun badan odland paling banyak terdapat di dalam stratum granulosum (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

5) Stratum basal (*Germinatifum*)

Lapisan ini terdiri atas selapis sel kuboid atau silindris basofilis yang bertumpu pada lamina basal (membran dasar). Sel-sel melekat satu sama lain dan dengan lapisan diatasnya (stratum spinosum) yang dilekatkan oleh desmosom, serta melekat dengan lapisan dibawahnya (lamina basale) yang dilekatkan oleh hemidesmosom. Sel-sel ini merupakan asal usul dari sel-sel penyusun epidermis. Sel

ini berada pada lapisan dasar antara dermis dan sel epidermis yang hidup (aktif). Pada lapisan ini terdapat melanosit, sel langerhans, sel merkel, dan sel keratinik.

Sel melanosit adalah jenis sel kedua terbesar dari sel epidermis setelah korneosit, ditemukan pada lapisan basal. Rasio keratinosit terhadap melanosit adalah 10:1. Walaupun jumlah melanosit cukup konstan, variasi dalam warna kulit ditentukan oleh ukuran dan jumlah melanosom, atau granul pigmen, yang diproduksi oleh sel-sel ini. Baik ukuran maupun jumlah melanosom lebih tinggi pada individu yang secara alamiah berkulit gelap. Melanosom bermigrasi ke seluruh keratinosit dari epidermis dan menghasilkan pigmen warna, melanin. Individu yang memiliki kulit lebih gelap memiliki jumlah melanin yang lebih banyak daripada mereka yang berkulit terang.

Sel langerhans merupakan jenis sel ketiga terbanyak pada epidermis. Sel-sel ini ditemukan pada stratum spinosum, diatas lapisan basal. Walaupun sel-sel ini merepresentasikan 5% sel pada lapisan ini, sel-sel ini tetap terlibat dalam beberapa aktivitas signifikan, termasuk produksi interleukin-1. Sebagai bagian dari respon imun, induksi penolakan transplantasi kulit, dan pembentukan dermatitis alergi kontak.

Sel keratinik terdiri atas 2 tipe utama, yaitu pertama sel dengan fungsinya sebagai stem sel yang aktif membelah dan menghasilkan sel-sel baru, kemudian yang kedua adalah sel yang menghubungkan epidermis dengan membran dasar (membran yang memisahkan epidermis dengan dermis). Membran ini tebalnya 50-70 nm dan mengandung 2 lapisan yaitu lamina densa dan lamina lucida, terdiri dari protein utama, seperti kolagen tipe IV, laminin, nidogen, dan fibronectin. Kolagen tipe IV ini

yang berperan dalam memelihara stabilitas mekanik membran dasar (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

b. Dermis

Lapisan ini disebut juga korium, merupakan lapisan kulit yang terletak antara epidermis dan jaringan lemak subkutan. Tebal lapisan sekitar 1-4 mm, tergantung bagian tubuh. Dermis tersusun dari bahan mukopolisakarida. Pada dermis terdapat sel mast dan fibroblast. Sel mast memiliki situs reseptor untuk immunoglobulin E dan mengandung sejumlah senyawa penting, seperti zat yang bereaksi lambat pada proses anafilaksis, prostaglandin E dan histamin. Fibroblast mensintesis komponen penunjang struktural dari kulit (yaitu: serat-serat elastik, kolagen, dan serat retikulum) (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

Dermis mengandung jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen, retikulum, dan elastin yang disimpan dalam kelenjar dasar amorf dari mukopolisakarida. Serat elastik diberi nama demikian karena serat inilah yang memberi sifat elastisitas pada kulit. Komponen utama dari serat ini adalah elastin, suatu protein amorf (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa (kelenjar) kulit seperti folikel rambut, papilla rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebacea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung syaraf, juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit (sub kutis atau hipodermis) (Tranggono, 2007).

Fungsi dermis ini terutama melindungi tubuh dari luka, menjadikan epidermis lebih fleksibel, penghalang terhadap infeksi dan sebagai organ penyimpan air. Dalam

dermis terdapat kapiler darah, ujung-ujung saraf, pembuluh limfa, kelenjar keringat, folikel rambut, dan kelenjar sebacea (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

c. Endodermis (Hipodermis; Subkutan)

Hipodermis adalah lapisan terdalam dari kulit, tebalnya 0,5-2 cm tergantung pada umur, ras dan daerah merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak, penghubung antara dermis dengan jaringan lain dibawahnya seperti otot. Hipodermis kaya akan jaringan penghubung yang mengandung beberapa serat elastik. Pada beberapa bagian tubuh tertentu terdapat otot polos. Lapisan ini yang melindungi organ sebelah dalam tubuh dari benturan mekanik. Jaringan berlemak mempengaruhi regulasi panas tubuh dan memberikan efek batalan terhadap tekanan eksternal dan cedera (Walters, 2002 dalam Isriany, 2013).

Berdasarkan sifat sel-sel penyusun kulit, maka secara fisiologi, fungsi kulit adalah:

- 1) Merupakan *barrier* lingkungan yang menghalangi masuknya stimulus dari lingkungan seperti senyawa kimia, mikroba, pelarut, radiasi elektrik, dan termal.
- 2) Sawar kulit juga mencegah penguapan air yang berlebih dari dalam tubuh, serta mencegah kehilangan elektrolit dan senyawa biokimia lainnya.
- 3) Proses deskuamasi akan menghilangkan senyawa terlarut, zat-zat hasil katabolisme yang teradsorpsi pada *stratum corneum*. Dengan kata lain kulit mampu mengontrol penumpukan senyawa dan partikel pada kulit.
- 4) Kelenjar keringat mengontrol suhu tubuh dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme

- 5) Kelenjar minyak dalam folikel rambut mengeluarkan minyak yang dapat meluminiasi dan melindungi rambut
- 6) Proses diferensiasi sel-sel epidermis dapat menjamin keberadaan *stratum corneum* serta fungsi yang melekat padanya
- 7) Menghasilkan melanin yang memberi warna kulit serta melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari
- 8) Menghasilkan sistem pertahanan tubuh melalui sel langerhans dan sel lainnya
- 9) Pembuluh darah membawa nutrisi dan mengangkut produk metabolisme, fungsi immune, pengaturan suhu tubuh, dan tekanan darah
- 10) Saraf mengendalikan tekanan, nyeri dan suhu
- 11) Sistem limfa mengatur pengeluaran sisa metabolisme, tekanan jaringan dan fungsi *immune*.
- 12) Melindungi tubuh dari beturan mekanik (Isriany, 2013).

2. Warna kulit

Warna kulit sangat beragam, dari yang berwarna putih mulus, kuning, coklat, kemerahan, atau hitam. Warna kulit terutama ditentukan oleh:

- a. Oxyhemoglobin yang berwarna merah.
- b. Hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan.
- c. Melanin yang berwarna coklat.
- d. Keratohyalin yang memberikan penampakan opaque pada kulit.
- e. Lapisan-lapisan *stratum corneum* yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan (Kusantati, 2008).

Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Banyaknya pigmen melanin di dalam kulit ditentukan oleh faktor-faktor ras, individu, dan lingkungan (Kusantati, 2008).

Melanin adalah pigmen alamiah kulit yang memberikan warna coklat. Melanin dibuat dari tirosin sejenis asam amino dan dengan oksidasi tirosin diubah menjadi butiran-butiran melanin yang berwarna coklat, serta untuk proses ini perlu adanya enzim tirosinase dan oksigen. Oksidasi tirosin menjadi melanin berlangsung lebih lancar pada suhu yang lebih tinggi atau dibawah sinar ultraviolet. Jumlah, tipe, ukuran dan distribusi pigmen melanin kulit terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat di antara sel-sel basal keratinosit didalam lapisan-lapisan benih (Kusantati, 2008).

Pembentukan melanosom di dalam melanosit terjadi melalui empat tahap. Pada tahap I, premelanosom dicirikan oleh strukturnya yang speris dan matriks amorf. Selama tahap II, mereka menjadi berbentuk lebih oval dan melaninnya belum jelas. Pada tahap III, setelah aktivitas tirosinase, produksi melanin dimulai dan melanisasi berlanjut hingga tahap IV, titik dimana organel berisi melanin dengan konsentrasi tinggi. Melanosom kemudian dipindahkan sepanjang mikrotubulus ke struktur dendritik melanosit dan ditransfer ke keratinosit (Isriany,2013).

Ada 2 macam pigmen melanin dengan variasi warna yang terjadi (Tranggono, 2007):

- a) Eumelanin memberikan warna gelap, terutama hitam, coklat dan variasinya, serta mengandung nitrogen.
- b) Feomelanin memberikan warna cerah, kuning sampai merah, mengandung nitrogen dan sulfur.

3. Eritema dan pigmentasi

a. Reaksi *sunburn* (eritema)

Penyinaran sinar matahari yang singkat pada kulit dapat menyebabkan kerusakan epidermis sederhana, gejalanya biasa disebut "*Sunburn*". Sinar matahari dapat menyebabkan eritema ringan hingga luka bakar yang nyeri. Eritema umumnya akan terjadi sebelum 10-24 jam, Pada orang berkulit terang paparan energi sinar UVB sebesar $20-27 \text{ mJ/cm}^2$ akan menimbulkan eritema minimal (Pathak,1982).

Reaksi eritema ini selain disebabkan karena kerusakan sel prickle epidermis yang berakibat terjadi oedema juga terjadi pelepasan histamine like substance karena sel mast pada lapisan dermis mengalami lisis, sehingga timbul vasodilatasi. Derajat Sunburn yang ditimbulkan oleh spektrum sinar UVB berdasarkan frekuensi dan lamanya penyinaran digolongkan menjadi empat, yaitu:

1) Minimal Percetible Erythema

Pada kulit timbul warna kemerahan (merah muda) akibat kontak sinar matahari selama 20 menit

2) Vivid Erythema

Pada kulit timbul warna merah terang, tanpa disertai rasa sakit akibat kontak sinar matahari selama 50 menit

3) Painful Burn

Disamping timbul vivid erythema juga disertai rasa sakit yang ringan pada kulit akibat kontak sinar matahari selama 100 menit.

4) Blistering Burn

Disamping timbul vivid erythema juga disertai rasa sakit yang hebat sekali bahkan terjadi pengelupasan dan pelepasan kulit, akibat kontak dengan sinar matahari selama 200 menit.

b. Reaksi *Tanning* (pigmentasi)

Reaksi pigmentasi selain ditimbulkan oleh radiasi spektrum sinar UV, juga spektrum sinar tampak. Tetapi derajat pigmentasi yang ditimbulkan sangat bervariasi tergantung frekuensi dan lamanya penyinaran.

1) Immediate Tanning

Dalam waktu beberapa menit setelah kulit terkena sinar matahari, timbul warna kegelapan (pigmentasi) yang segera, dan mencapai puncaknya satu jam kemudian. Selanjutnya warna kegelapan pada kulit mulai hilang antara dua sampai empat jam kemudian. Reaksi tersebut terjadi karena fotooksidasi granul-granul melanin yang berada di permukaan lapisan epidermis kulit akibat radiasi sinar UV pada rentang panjang gelombang 300-600 nm, dan mencapai puncak pada panjang gelombang 340-360 nm.

2) Delayed Tanning

Sehari setelah kontak sinar matahari pada kulit timbul warna kegelapan. Tapi warna gelap tersebut sudah tampak satu jam setelah terkena sinar matahari dan mencapai puncak 10 jam kemudian, selanjutnya hilang antara 100-200 jam. Reaksi tersebut terjadi karena migrasi granul-granul melanin yang terdapat pada stratum basale epidermis kulit ke permukaan kulit akibat terbentuknya sel-sel melanosom baru.

3) True Tanning

Kira-kira dua sampai tiga hari setelah kontak sinar matahari pada kulit timbul warna kegelapan, dan mencapai puncak maksimal antara dua sampai tiga minggu kemudian. Warna kegelapan pada kulit hilang antara 10-12 bulan kemudian. Reaksi tersebut terjadi karena penumpukan granul-granul melanin akibat poliferasi sel-sel melanosit pada stratum basale epidermis kulit.

Eritema merupakan salah satu tanda terjadinya proses inflamasi akibat pajanan sinar UV dan terjadi apabila volume darah dalam pembuluh darah dermis meningkat hingga 38% di atas volume normal, sedangkan pigmentasi adalah perubahan warna kulit seseorang yang disebabkan adanya penyakit atau perlukaan yang bisa menimbulkan perubahan warna yang lebih gelap akibat peningkatan jumlah melanin (Yuliasuti, 2002).

Radiasi sinar UV-B yang memiliki panjang gelombang 290-320 nm menembus dengan baik stratum korneum dan epidermis yang cukup parah dan menyebabkan iritasi pada kulit sehingga disebut daerah eritema. Radiasi sinar UV-A memiliki panjang gelombang 320-400 nm menyebabkan warna coklat (tanning) pada kulit tanpa terjadi inflamasi sehingga disebut daerah pigmentasi. Meskipun sinar UV-A memiliki energi yang lebih rendah daripada sinar UV-B, tetapi kenyataannya mereka dapat menembus lebih jauh ke dalam hipodermis, menyebabkan elastosis (kekurangan dengan struktural dan elastisitas kulit) dan kerusakan kulit lainnya, yang berpotensi mengarah ke kanker kulit (Setiawan, 2010).

Kulit yang terpapar sinar matahari selama antara 6-20 jam akan menghasilkan eritema yang cepat atau lambat menimbulkan pencoklatan kulit (tanning). Tanning cepat tampak jelas 1 jam setelah kulit terpapar matahari dan kemudian akan hilang

kembali dalam waktu 4 jam. Di sini tidak tampak adanya pembentukan melanosom baru. Tanning lambat terjadi 48-72 jam setelah kulit terpapar sinar UV-A. Hal ini disebabkan oleh pembentukan melanosom-melanosom baru secara perlahan, dan baru terlihat dalam waktu 72 jam (Tranggono, 2007).

Pada orang berkulit terang paparan energi sinar UV-B sebesar 20-27 mJ/cm² akan menimbulkan eritema yang dikenal sebagai DEM atau dosis eritema minimal (Pathak, 1993).

Radiasi UV mencapai permukaan bumi dapat dibagi menjadi UV-B (290-320 nm) dan UV-A (320- 400 nm). UV-A dapat dibagi lagi menjadi UV-A I (340-400 nm) atau UV-A jauh dan UV-A II (320-340 nm) atau UV-A dekat. Faktor perlindungan matahari (SPF) didefinisikan sebagai dosis radiasi UV diperlukan untuk menghasilkan 1 dosis eritema minimal (MED) pada kulit dilindungi setelah penerapan 2 mg/cm² produk dibagi dengan radiasi UV untuk menghasilkan 1 MED pada kulit yang tidak terlindungi (Barel, 2009).

C. Tabir Surya

Sediaan tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk maksud menyerap secara efektif sinar matahari terutama di daerah gelombang ultraviolet sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit oleh sinar matahari. Tabir surya dapat dibuat dalam berbagai bentuk sediaan seperti : krim, losio, dan salep (Depkes RI, 1985).

Secara alamiah, manusia memiliki perlindungan terhadap sinar UV dengan cara pengeluaran keringat, penebalan stratum korneum dan pembentukan melanin pada epidermis. Namun pada kontak yang berlebihan paparan sinar UV yang terlalu lama menjadikan sistem alamiah tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga

menyebabkan efek yang merugikan bagi kulit. Oleh karena itu, diperlukan senyawa tabir surya untuk melindungi kulit dari radiasi UV secara langsung (Cumpelick, 1972).

Bahan aktif yang umum digunakan sebagai tabir surya dibagi menjadi dua yaitu tabir surya fisik dan tabir surya kimia. Tabir surya fisik memiliki mekanisme kerja dengan cara memantulkan dan menghamburkan radiasi sinar ultraviolet dan tidak tembus cahaya, sedangkan tabir surya kimia memiliki mekanisme kerja mengabsorpsi radiasi sinar ultraviolet (Wihelmina, 2011).

Menurut Wilkinson dan More (1982), untuk mendapatkan sediaan tabir surya yang sesuai terdapat beberapa syarat yang diperlukan, yaitu:

1. Efektif dalam menyerap sinar eretmogenik pada rentang panjang gelombang 290-320 nm tanpa menimbulkan gangguan yang akan mengurangi efisiensinya atau yang akan menimbulkan toksik atau iritasi
2. Memberikan transmisi penuh pada rentang panjang gelombang 300-400 nm untuk memberikan efek terhadap tanning maksimum.
3. Tidak mudah menguap dan resisten terhadap air dan keringat
4. Memiliki sifat-sifat mudah larut yang sesuai untuk memberikan formulasi kosmetik yang sesuai
5. Tidak berbau dan memiliki sifat-sifat fisik yang memuaskan, misalnya daya lengketnya dan lain-lain
6. Tidak menyebabkan toksik, tidak iritan, dan tidak menimbulkan sensitisasi
7. Dapat mempertahankan daya proteksinya selama beberapa jam
8. Stabil dalam penggunaan
9. Tidak memberikan noda pada pakaian

10. Tidak toksik dan dapat diterima secara dermatologis merupakan hal yang penting.

Sebagai kosmetik, tabir surya sering digunakan pada penggunaan harian pada daerah permukaan tubuh yang luas. Selain itu, tabir surya juga dapat digunakan pada bagian kulit yang telah rusak karena matahari. Tabir surya juga mungkin digunakan pada semua kelompok umur dan kondisi kesehatan yang bervariasi (Wilkinson dan More, 1982).

Menurut Lavi (2013), mekanisme proteksi tabir surya terhadap kulit dijelaskan sebagai berikut molekul bahan kimia tabir surya yang menyerap energi dari sinar UV, kemudian mengalami eksitasi dari ground state ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sewaktu molekul yang tereksitasi kembali ke kedudukan yang lebih rendah akan melepaskan energi yang lebih rendah dari energi semula yang diserap untuk menyebabkan eksitasi, maka sinar UV dari energi yang lebih tinggi setelah diserap energinya oleh bahan kimia maka akan mempunyai energi yang lebih rendah. Sinar UV dengan energi yang lebih rendah akan kurang atau tidak menyebabkan efek sunburn pada kulit.

Penggolongan tabir surya didasarkan pada persen transmisi sinar UV (Balsam, 1972).

Tabel 1. Penggolongan potensi tabir surya

Klasifikasi produk	Persen Transmisi Sinar Ultraviolet (%)	
	<i>Erythematous range</i>	<i>Tanning range</i>
Total block	<1,0	3-40
Ekstra protection	1-6	42-86
Regular suntan	6-12	45-86
Fast tanning	10-18	45-86

Tujuan preparasi tabir surya adalah untuk meminimalisir efek berbahaya dari radiasi matahari. Berdasarkan penggunaannya, tabir surya dapat diklasifikasikan menjadi:

1. *Sunburn preventife agents*, yaitu tabir surya yang mengabsorpsi 95% atau lebih radiasi UV dengan panjang gelombang 290-320 nm.
2. *Suntanning agents*, yaitu tabir surya yang mengabsorpsi sedikitnya 85% dari radiasi UV dengan rentang panjang gelombang dari 290-320 nm tetapi meneruskan sinar UV pada panjang gelombang yang lebih besar dari 320 nm dan menghasilkan *tan* ringan yang bersifat sementara. Bahan-bahan ini akan menghasilkan eritema tanpa adanya rasa sakit. Tabir surya pada kedua kategori tersebut merupakan kategori tabir surya kimia yang mengabsorpsi rentang tertentu dari radiasi UV.
3. *Opaque sunblock agents*, bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimum dalam bentuk penghalang secara fisik. Titanium dioksida dan zink oksida merupakan senyawa yang paling sering digunakan dalam kelompok ini. Titanium dioksida memantulkan dan memencarkan semua radiasi pada rentang UV-Vis (290-777 nm), sehingga dapat mencegah atau meminimalkan kulit terbakar (*sunburn*) dan pencokelatan kulit (*suntan*) (Wilkinson dan Moore, 1982).

Menurut Cumpelick (1972), Sediaan tabir surya dapat dikategorikan sebagai *sunblock* (Sediaan yang dapat menyerap hampir semua sinar UV-B dan sinar UV-A) apabila memiliki persentase transmisi eritema <1% dan persentase transmisi pigmentasi 3-40%. Jika persentase transmisi eritema 6-18% dan persentase transmisi pigmentasi 45-86% dikategorikan sebagai *suntan* atau dapat dikatakan suatu bahan

yang menyerap sebagian besar sinar UV-B dan menyerap sedikit sinar UV-A (Agustin *et.al*, 2013).

Ada beberapa cara untuk menentukan kekuatan suatu preparat tabir surya yaitu:

a. Metode SPF (*Sun Protecting Factor*)

Nilai SPF dihitung dengan terlebih dahulu menghitung luas daerah dibawah kurva serapan (AUC) dari nilai serapan pada panjang gelombang 290-400 nm. Nilai AUC dihitung menggunakan rumus berikut : (Chairns, 2008).

$$\{AUC\} = \frac{Aa+Ab}{2} \times dPa - b$$

dimana

Aa = absorbansi pada panjang gelombang a nm

Ab = absorbansi pada panjang gelombang b nm

dPa-b = selisih panjang gelombang a dan b

Nilai total AUC dihitung dengan menjumlahkan nilai AUC pada tiap segmen panjang gelombang. Nilai SPF masing-masing konsentrasi ditentukan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Log SPF} = AUC / \lambda_n - \lambda_1$$

λ_n = panjang gelombang terbesar (dengan $A > 0,05$ untuk ekstrak dengan

$A > 0,01$ untuk sediaan

λ_1 = panjang gelombang terkecil (290 nm)

Menurut FDA, sediaan yang digunakan pada penentuan nilai SPF sebanyak 2 mg/cm² yang setara dengan 2 mg/ml (Lowe, 2000).

b. Berdasarkan persen transmisi eritema (%Te) dan pigmentasi (%Tp)

Persen transmisi eritema adalah persen total fluks eritema yang diteruskan oleh bahan tabir surya. Transmisi eritema bahan tabir surya atau fluks eritema bahan tabir surya dapat ditentukan secara spektrofotometri dengan mengukur intensitas sinar yang diteruskan oleh bahan tabir surya pada panjang gelombang eritomatogenik kemudian dikalikan dengan fluks eritema/fluks pigmentasi yang terdapat pada tabel.

Tabel 2. Faktor efektifitas fluks dan pigmentasi pada panjang gelombang 290- 375 nm (Maulidia,2010 dalam Isriany, 2014).

Panjang Gelombang (nm)	Intensitas rata-rata (μWatt/cm²)	Faktor Efektifitas Tanning	Fluks <i>tanning</i> (μWatt/cm²)
290-295	1,7	0,6500	0,1105
295-300	7,0	0,9600	0,6720
300-305	20,0	0,5000	1,0000
305-310	36,5	0,0550	0,2008
310-315	62,0	0,0220	0,1364
315-320	90,0	0,0125	0,1125
Total erythema range, 290 - 320 nm			2,2322 (76,5%)
320-325	130,0	0,0083	0,1079
325-330	170,0	0,0060	0,1020
330-335	208,0	0,0045	0,0936
335-340	228,0	0,0035	0,0798
340-345	239,0	0,0028	0,0669
345-350	248,0	0,0023	0,0570
350-355	257,0	0,0019	0,0448
355-360	268,0	0,0016	0,0456
360-365	274,0	0,0013	0,0356
365-370	282,0	0,0011	0,0310
370-375	289,0	0,0008	0,0260
Total tanning range, 320 - 375 nm			0,6942 (23,7%)
Total tanning flux, 290 - 375 nm			2,9264 (100 %)

Semakin kecil suatu persen transmisi eritema dan pigmentasi suatu sediaan berarti semakin sedikit sinar UV yang diteruskan sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan tersebut memiliki aktifitas yang besar sebagai tabir matahari (Isriany,2014).

Sediaan tabir surya dapat dikategorikan sebagai *Sunblock* (sediaan yang dapat menyerap hampir semua sinar UV-B dan sinar UV-A) apabila memiliki persentase transmisi eritema <1% dan persentase transmisi pigmentasi 3–40%. Jika persentase transmisi eritema 6–18% dan persentase transmisi pigmentasi 45–86% dikategorikan sebagai *Suntan* atau dapat dikatakan suatu bahan yang menyerap sebagian besar sinar UV-B dan menyerap sedikit sinar UV-A (Cumpelik, 1972 dalam Sami, 2015).

Menurut Cumpelik (1972) dalam penentuan persentase transmisi eritema dan persentase transmisi pigmentasi dilakukan dengan mengamati nilai serapan sampel pada panjang gelombang 292,5–372,5 nm. Dari nilai serapan yang diperoleh dihitung nilai untuk 1g/L (A) dan persen transmisi (T) dengan rumus:

$$A = -\log T$$

Nilai transmisi eritema dihitung dengan cara mengalikan nilai transmisi (T) dengan faktor efektivitas eritema (Fe) pada panjang gelombang 292,5–372,5 nm. Sedangkan, nilai transmisi pigmentasi dihitung dengan cara mengalikan nilai transmisi (T) dengan faktor efektivitas pigmentasi (Fp) pada panjang gelombang 292,5–372,5 nm. Selanjutnya nilai persen transmisi eritema dan pigmentasi dihitung berdasarkan rumus % transmisi eritema yaitu:

- 1) % transmisi eritema $\frac{\Sigma T.Fe}{\Sigma Ee}$
- 2) % transmisi pigmentasi $\frac{\Sigma T.Fp}{\Sigma Ep}$ (Sami, 2015).

D. Sun Protected Factor (SPF)

Sediaan tabir surya didasarkan pada penentuan harga SPF (*Sun Protected Factor*) yang menggambarkan kemampuan produk tabir surya dalam melindungi kulit dari eritema (Stanfield, 2003). Efektivitas dari suatu sediaan tabir surya dapat ditunjukkan salah satunya adalah dengan nilai *sun protection factor* (SPF), yang di

definisikan sebagai jumlah energi UV yang dibutuhkan untuk mencapai minimal erythema dose (MED) pada kulit yang dilindungi oleh suatu tabir surya, dibagi dengan jumlah energi UV yang dibutuhkan untuk mencapai MED pada kulit yang tidak diberikan perlindungan. MED didefinisikan sebagai jangka waktu terendah atau dosis radiasi sinar UV yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya erythema (Wood & Murphy, 2000).

Harga SPF dapat ditentukan secara *in vitro* dan secara *in vivo*. Pengujian aktivitas serapan sinar UV secara *in vitro* dapat dilakukan dengan teknik spektroskopi UV yang diukur pada rentang panjang gelombang sinar UV (200- 400 nm). Nilai SPF merupakan perbandingan Minimal Erythema Dose (MED) pada kulit manusia yang terlindungi tabir surya dengan MED tanpa perlindungan tabir surya. *Sun Protection Factor* (SPF) merupakan indikator universal yang menjelaskan tentang keefektifan dari suatu produk atau zat yang bersifat UV protektor, semakin tinggi nilai SPF dari suatu produk atau zat aktif tabir surya maka semakin efektif melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV (Dutra *et al.*, 2004).

Tabel 3. Keefektifan sediaan tabir surya berdasarkan nilai SPF (Wilkinson dan Moore, 1982).

No.	Nilai SPF	Kategori Proteksi Tabir Surya
1.	2-4	Proteksi minimal
2.	4-6	Proteksi sedang
3.	6-8	Proteksi ekstra
4.	8-15	Proteksi maksimal
5.	>15	Proteksi ultra

Pengukuran nilai SPF suatu sediaan tabir surya dapat dilakukan secara *in vitro*. Metode pengukuran nilai SPF secara *in vitro* secara umum terbagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah dengan cara mengukur serapan atau transmisi radiasi UV melalui lapisan produk tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. Tipe yang

kedua adalah dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran dari tabir surya yang diuji (Gordon, 1993).

Nilai SPF didefinisikan sebagai perbandingan energi UV yang dibutuhkan untuk menghasilkan eritema minimal pada kulit yang dilindungi dengan eritema yang pada kulit yang tidak dilindungi dalam individu yang sama. Untuk contoh, seorang individu menggunakan tabir surya SPF 4 akan mengambil empat kali lama untuk mengalami eritema ketika terpapar radiasi UVB dibandingkan dengan ketika individu tidak memiliki perlindungan.

FDA mengharuskan semua tabir surya mengandung *Sun Protection Factor* (SPF). Kisaran SPF dimulai dari 2 sampai lebih dari 50, Tabir surya dianjurkan dengan paling sedikit SPF 15. Peringkat SPF tabir surya dihitung dengan membandingkan jumlah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan kulit terbakar sinar matahari pada kulit dilindungi tabir surya dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyebabkan kulit terbakar pada kulit yang tidak terlindungi (Lavi, 2013).

Tabir surya dengan SPF menyatakan lamanya kulit seseorang berada dibawah sinar matahari tanpa mengalami *sunburn*. Sedang angka SPF menyatakan berapa kali daya tahan alami kulit dilipatgandakan sehingga aman dibawah sinar matahari tanpa mengalami *sunburn* (Shovyana dkk, 2013).

Persen transmisi eritema (%Te) menggambarkan jumlah sinar matahari yang diteruskan setelah mengenai tabir surya, sehingga dapat menyebabkan eritema kulit (Kulit menjadi kemerahan). Demikian juga persen transmisi pigmentasi tabir surya sehingga dapat menyebabkan pigmentasi kulit (Kulit menjadi gelap) (Sugihartini, 2011).

E. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis spektroskopi yang sering digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Spektrofotometer ini didasarkan pada interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Apabila seberkas radiasi (cahaya) dikenakan pada cuplikan (larutan sampel), maka sebagian dari cahaya diserap oleh molekul – molekul sesuai dengan struktur dari molekul. Setiap senyawa dalam sampel memiliki tingkatan tenaga yang spesifik. Bila cahaya mempunyai perbedaan energi antara tingkatan dasar dan tingkatan tereksitasi yang mengenai cuplikan, maka elektron – elektron pada tingkatan dasar akan dieksitasi ke tingkatan tereksitasi, dan sebagian energi cahaya yang sesuai diserap dengan panjang gelombang ini. Elektron yang tereksitasikan melepaskan tenaga melalui proses radiasi panas dan akan kembali pada tingkatan dasar lagi. Perbedaan energi antara tingkat dasar dengan tingkat tereksitasi yang spesifik untuk tiap – tiap bahan/senyawa menyebabkan frekuensi yang diserap juga berbeda – beda (Sastrohamidjojo, 2001).

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 2007).

Suatu spektrofotometer UV-Vis dapat mengukur dan merekam spektrum senyawa tumbuhan dalam bentuk larutan. Spektrum tampak terentang panjang dari 400 nm (ungu) sampai 750 nm (merah), sedangkan spektrum ultraviolet terentang dari 100 nm sampai 400 nm (Fessenden, 1994).

Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembandingan (Khopkar, 2007).

Pendeteksian senyawa dengan cara sederhana menggunakan spektrofotometer ultraviolet dilakukan pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Radiasi senyawa pada panjang gelombang 254 nm menunjukkan radiasi gelombang pendek, sedangkan pada panjang gelombang 366 nm menunjukkan radiasi panjang gelombang. Bila senyawa menyerap sinar UV, maka akan tampak sebagai bercak gelap pada latar belakang yang berfluoresensi (Stahl, 1985).

Sinar radiasi UV-Vis adalah panjang gelombang antara 180 – 380 nm untuk UV dan panjang gelombang 380 – 780 nm untuk visible. Cahaya yang dapat dilihat oleh manusia disebut cahaya tampak/visibel. Biasanya cahaya terlihat merupakan campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang gelombang dari 400 nm hingga 750 nm.

Tabel 4. Spektrum cahaya tampak dan warna-warna komplementer
(Underwood, 2001; 396).

Panjang gelombang (nm)	Warna	Warna komplementer
400-435	Violet	Kuning-hijau
435-480	Biru	Kuning
480-490	Hijau-biru	Orange
490-500	Biru-hijau	Merah
500-560	Hijau	Ungu
560-580	Kuning-hijau	Violet
580-595	Kuning	Biru
595-610	Orange	Hijau-biru
610-750	Merah	Biru-hijau

Suatu spektrofotometer UV-Vis dapat mengukur dan merekam spektrum senyawa tumbuhan dalam bentuk larutan. Spektrum tampak terentang panjang dari 400 nm (ungu) sampai 750 nm (merah), sedangkan spektrum ultraviolet terentang dari 100 nm sampai 400 nm (Fessenden, 1994).

Instrumen yang digunakan untuk mempelajari serapan atau emisi radiasi elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang gelombang disebut spektrometer atau spektrofotometer. Pada umumnya konfigurasi dasar dari spektrofotometer UV-Vis berupa susunan peralatan adalah sebagai berikut:

1. Sumber radiasi

Beberapa sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu deuterium, lampu tungsten, dan lampu merkuri. Sumber-sumber radiasi ultra lembayung yang kebanyakan dipakai adalah lampu hidrogen dan lampu deuterium (D2). Disamping itu sebagai sumber radiasi ultra lembayung yang lain adalah lampu xenon. Kejelekannya lampu xenon tidak memberikan radiasi yang stabil seperti lampu deuterium. Lampu deuterium dapat dipakai pada panjang gelombang 180 nm sampai 370 nm (daerah ultra lembayung dekat) (Mulja, 1995).

Lampu tungsten merupakan campuran dari filament tungsten gas iodine (halogen), oleh sebab itu sebagai lampu tungstein-iodin pada panjang spektrofotometer sebagai sumber radiasi pada daerah pengukuran sinar tampak dengan rentangan panjang gelombang 380-900 nm (Mulja, 1995).

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultra lembayung khususnya daerah disekitar panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator.

2. Monokromator

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit) masuk-filterprisma-kisi(grating)-celah keluar.

a. Celah (slit)

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu sistem optik monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi panjang gelombang.

b. Filter optik

Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran cahaya dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai. Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya hampir monokromatis sehingga akan mengikuti hukum Lambert-Beer pada analisis kuantitatif.

c. Prisma dan Kisi (grating)

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

3. Kuvet

Kuvet atau sel merupakan wadah sampel yang dianalisis. Kuvet ini bentuk biasanya terbuat dari quartz atau leburan silika dan ada yang dari gelas dengan bentuk tabung empat persegi panjang 1x1 cm, dengan tinggi kurang lebih 5 cm. Pada pengukuran di daerah ultra lembayung dipakai quartz atau leburan silika, sedang kuvet dari gelas tidak dipakai, sebab gelas mengabsorpsi sinar ultra lembayung.

4. Detektor

Detektor merupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting oleh sebab itu detektor akan menentukan kualitas dari spektrofotometer adalah merubah signal elektronik.

5. Amplifier

Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik yang dilahirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu alat pengukur (Mulja, 1995).

Prinsip penentuan spektrofotometer UV-Vis merupakan aplikasi dari Hukum Lambert Bert. Hukum ini menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi kuvet (Rohman, 2007).

F. Metode Ekstraksi Bahan Alam

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Ekstraksi adalah proses penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan atau biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat didalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dan pemilihan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya (Dirjen POM, 1995).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, biota laut, dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara didalam dan diluar sel mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Harbone, 1987).

Umumnya, zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasiantara larutan zat aktif didalam sel dan pelarut organik diluar sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan berdifusi keluar sel, dan proses ini berulang terus

sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi zat aktif didalam dan diluar sel (Depkes RI, 2000).

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa tersebut dapat dipisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan dalam hal ekstrak total, maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung (Septiningsih, 2008).

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara panas dan secara kering. Ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi dingin yaitu dengan maserasi, perkolasi dan soxhletasi (Dirjen POM, 1995).

Adapun metode yang dapat digunakan dalam ekstraksi sampel yaitu :

1. Maserasi

Maserasi adalah cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif didalam sel dengan yang diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan (Dirjen POM, 1986).

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirok dan lain-lain. Pada penyarian dengan cara maserasi, perlu dilakukan pengadukan. Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia,

sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Hasil penyarian dengan cara meserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu. Waktu tersebut diperlukan untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi ikut terlarut dalam cairan penyari seperti malam dan lain-lain (Dirjen POM, 1986).

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, atau pelarut lain. Bila cairan penyari digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang, dapat ditambahkan bahan pengawet, yang diberikan pada awal penyarian.

Keuntungan metode maserasi adalah peralatan yang digunakan sederhana. Sedangkan kekurangan metode maserasi adalah waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama, cairan penyari yang digunakan lebih banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks dan lilin (Rohman, 2007).

2. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur pada titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga proses ekstraksi sempurna (Depkes RI, 2000).

Prinsip refluks adalah penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan, uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat, akan menyari kembali sampel yang berada pada labu alas bulat, demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna, penggantian

pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan.

3. Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi yaitu kecuaali dinyatakan lain, perkolasi dilakukan sebagai berikut : 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok dibasahi dengan 2,5 bagian sampai 5 bagian cairan penyari, lalu dimasukkan kedalam bejana tertutup sekurangkurangnya selama 3 jam. Massa dipindahkan sedikit demi sedikit kedalam perkolator sambil tiap kali ditekan hati-hati, dituangi dengan cairan penyari secukupnya sambil cairan mulai menetes dan diatas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari. Lalu perkolator ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah itu kran perkolator dibiarkan menetes dengan kecepatan 1 ml permenit (lambat) (Depkes RI, 2000).

Tujuan dari perkolasi adalah upaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan.

4. Soxhletasi

Soxhletasi adalah ekstraksi yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes RI, 2000).

Prinsip soxhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya sehingga terjadi ekstraksi kontiyu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik.

5. Destilasi Uap-air

Destilasi uap-air adalah ekstraksi senyawa dengan kandungan yang mudah menguap (minyak atsiri) dari bahan (segar atau simplisia) dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial. Digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200°C atau lebih. Dapat menguapkan senyawasenyawa ini dengan suhu mendekati 100°C dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air disemua temperature. Tapi dapat didestilasi dengan air. Campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran dan mungkin ditambah juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik ke atas menuju ke kondensor dan akhirnya masuk ke labu distilat. Prinsip destilasi uap-air adalah penyarian minyak menguap dengan cara simplisia dan air ditempatkan dalam labu berbeda. Air dipanaskan dan akan menguap, uap air akan masuk ke dalam labu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang terdapat dalam simplisia, uap air dan minyak menguap yang telah terekstraksi menuju kondensor dan akan terkondensasi, lalu akan melewati pipa alonga, campuran air dan minyak menguap akan masuk kedalam corong pisah, dan akan memisah antara air dan minyak atsiri.

G. Tinjauan Islami Tentang Manfaat Langit dan Bumi Beserta Isinya

Allah SWT. Berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Baqarah (2): 29) (Kementerian Agama, 2014).

Mengenai firman Allah SWT. *“dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Termasuk segala tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt di muka bumi ini mempunyai manfaat (Ghoffar, 2008).*

Dalam Islam, kesehatan termasuk hal utama. Hal ini di dukung dengan kenyataan bahwa banyak ayat Al-qur’an dan hadits yang berkaitan dengan kesehatan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat An-Naba’ (78) ayat 13-15:

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

“Dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari), dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan” (Q.S. An- Naba’(78): 13-15) (Kementerian Agama, 2014).

Ayat-ayat diatas menguraikan tentang langit serta manfaat yang diperoleh manusia dari penciptaannya. Allah SWT. Berfirman: *Dan*, di samping yang tersebut diatas, *Kami juga telah bangun di atas kamu tujuh lapis langit yang kukuh* dan dapat bertahan selama mungkin sampai kami menetapkan kerapuhannya, *dan Kami telah menjadikan pelita*, yakni matahari, *yang sangat terang* lagi menghasilkan panas sampai batas waktu yang kami kehendaki *dan Kami telah menurunkan dari awan yang telah terkumpul padanya uap-uap dari laut air yang tercurah deras supaya Kami mengeluarkan*, yakni tumbuhkan, *dengannya*, yakni dengan air itu, *biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat*, antara lain untuk menjadi bahan pangan manusia dan hewan.

Berkaitan dengan matahari, penemuan ilmiah telah membuktikan bahwa panas permukaan matahari mencapai enam ribu derajat. Sedangkan, panas matahari mencapai tiga puluh juta derajat disebabkan oleh materi-materi bertekanan tinggi yang ada pada matahari. Sinar matahari menghasilkan energi berupa ultraviolet 9%, cahaya 46%, dan inframerah 45%. Karena itulah ayat suci diatas dinamai matahari sebagai (سِرَاجًا) *sirajān/ pelita* karena mengandung cahaya dan panas secara bersamaan. (Tafsir al-Muntakhab). Kata (وَهَاجًا) *wahhājan* terambil dari kata *wahaja* yang berarti bercahaya atau berkerlap kelip atau menyala (Shihab,2007).

Dalam pandangan islam dijelaskan bahwa segala yang diciptakan Allah SWT. di bumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan ada manfaatnya. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Asy-syu'araa'(26) ayat 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik (Q.S. Asy-syu'araa'(26): 7)”(Kementerian Agama, 2014).

Pada firman-Nya pada ayat ini *أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ* *awalam yarâ ilâ ardh/apakah mereka tidak melihat ke bumi* merupakan kata yang mengandung makna *batas akhir*. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir. Dengan demikian, ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2002).

Dapat dipahami bahwa sebagai manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, khususnya tumbuh-tumbuhan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan, maka dapat dipahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian harus disadari bahwa tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga selain mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan terhadap pengamatan-pengamatan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Salah satunya dengan meneliti kandungan dari tumbuh-tumbuhan dan manfaatnya dalam meningkatkan kesehatan manusia, sehingga hal itu

menimbulkan rasa syukur dan semakin yakin akan tanda-tanda kekuasaan Allah (Shihab, 2002)

Kata (زَوْجٍ) *zauj* berarti *pasangan*. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan karena tumbuhan muncul dicelah-celah tanah yang terhampar dibumi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu, ayat di atas memulai dengan pertanyaan *apakah mereka tidak melihat*, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu (Shihab, 2002).

Kata (كَرِيمٍ) *karim* antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik adalah paling tidak yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2002).

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa rasulullah bersabda :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً . [سواء البخاري]

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra, dari nabi saw, bersabda ; “Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya”. (H.R. Al-Bukhari)

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari penyakit. Penyakit yang dialami manusia terdiri dari penyakit rohani dan

penyakit jasmani (Faiz. 1991). Penyakit jasmani sering muncul karena dipengaruhi oleh faktor penyakit rohani seperti berlebih-lebihan dalam makanan atau malas mengkonsumsi zat-zat yang gizi seperti vitamin dan sebagainya (Faiz. 1991).

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui, penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya, bukan berarti tumbuhan yang menyembuhkan tetapi atas seizin Allah. Dalam pandangan islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui potensi tabir surya pada ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis).

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Lokasi Pengambilan Sampel

Sampel pada penelitian ini diambil dari Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan eksperimental laboratorium. Penelitian dengan pendekatan eksperimental adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah semua tanaman binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) yang ada di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

2. Sampel Penelitian

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)

E. Metode Pengumpulan Data

1. Pengolahan Sampel

Sampel daun binahong yang telah diambil dicuci bersih menggunakan air mengalir kemudian dipotong-potong kecil dan dikeringkan dengan menggunakan lemari pengering sehingga diperoleh simplisia daun binahong.

2. Ekstraksi Sampel

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Diambil simplisia lalu ditimbang sebanyak 130 gr kemudian dimasukkan dalam wadah maserasi. Kemudian dituangi pelarut etanol 96% sebanyak 3 liter, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari terlindung dari cahaya, sambil sesekali diaduk. Setelah 3 hari kemudian disaring dan diambil sarinya dan ampas ditambah cairan penyari, diaduk dan disimpan lagi selama 3 hari terlindung dari cahaya hingga diperoleh seluruh sari. Sari kemudian dipekatkan dan diuapkan dengan *rotary evaporator* dengan suhu 60°C selama 4 jam sampai diperoleh ekstrak kental. Dilakukan remaserasi, ditambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 2 liter hingga simplisia terendam seluruhnya kemudian diaduk. Wadah maserasi ditutup dan didiamkan. Proses ekstraksi terus berlanjut hingga diperoleh filtrat yang jernih, kemudian dipekatkan hingga didapatkan ekstrak yang kental.

F. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah wadah maserasi, cawan porselin, gelas ukur, kuvet, labu tentukur, mikro pipet, neraca analitik, pipet tetes, spektrofotometer UV-Vis, dan deksikator vakum.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air suling, daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis), pelarut etanol 96%, etanol pro analisis.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapat dari absorbansi yang diukur untuk penentuan potensi tabir surya. Pada penelitian ini potensi tabir surya ekstrak daun binahong ditentukan berdasarkan nilai SPF, persen transmisi eritema dan transmisi pigmentasi.

Ditimbang dengan seksama 25,0 mg ekstrak daun binahong kemudian dilarutkan dengan 25,0 ml etanol p.a dan dimasukkan ke dalam labu tentukur hingga diperoleh suatu konsentrasi 1000 ppm (Larutan stok), kemudian larutan stok diencerkan hingga diperoleh 4 konsentrasi, yaitu 300 ppm, 350 ppm, 400 ppm, 450 ppm. Diamati nilai transmisi pada panjang gelombang 292,5-372,5 nm dan absorbansi pada panjang gelombang 290-400 nm dengan interval 5,0 nm.

2. Analisis Data

a. Nilai *Sun Protecting Factor* (SPF) dihitung terlebih dahulu luas area dibawah kurva serapan (AUC) dari nilai serapan pada panjang gelombang 290-400 nm dengan interval 5 nm, Nilai AUC dihitung menggunakan rumus berikut

$$\{AUC\} = \frac{Aa+Ab}{2} \times dPa - b$$

dimana

Aa = absorbansi pada panjang gelombang a nm

Ab = absorbansi pada panjang gelombang b nm

dPa-b = selisih panjang gelombang a dan b

Nilai total AUC dihitung dengan menjumlahkan nilai AUC pada tiap segmen panjang gelombang. Nilai SPF masing-masing konsentrasi ditentukan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Log SPF} = AUC / \lambda_n - \lambda_1$$

λ_n = panjang gelombang terbesar (dengan $A > 0,05$ untuk ekstrak dengan $A > 0,01$ untuk sediaan)

λ_1 = panjang gelombang terkecil (290 nm)

Untuk memperoleh nilai SPF pada rentang panjang gelombang UV A dan UV B, terlebih dahulu ditentukan rata-rata nilai A pada interval aktivitas eritemogeniknya adalah interval panjang gelombang yang dapat diserap oleh bahan tabir surya yang dapat menyebabkan eritema yang dapat ditunjukkan dengan absorbansi sebesar 0,05 pada sampel tanpa pengenceran.

b. Nilai Persen Eritema

Dari data pengamatan nilai transmittan pada berbagai panjang gelombang dapat dihitung persen transmisi eritema dengan cara sebagai berikut :

1. Nilai transmisi eritema adalah $T.Fe$. Perhitungan nilai transmisi eritema tiap panjang gelombang (panjang gelombang 292,5 – 372,5 nm).
2. Banyaknya fluks eritema yang diteruskan oleh bahan tabir matahari (E_e) dihitung dengan rumus : $E_e = \Sigma T.Fe$
3. Kemudian % transmisi eritema dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ transmisi eritema} = \frac{E_e}{\Sigma E_e}$$

Dimana :

T = Nilai transmisi

Fe = Fluks eritema

$E_e = \Sigma T.Fe$ = banyaknya fluks eritema yang diteruskan oleh ekstrak panjang gelombang 292,5 – 317,5 nm

c. Persen Transmisi Pigmentasi

Nilai persen transmisi pigmentasi dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Nilai transmisi pigmentasi adalah $T.Fp$. Perhitungan nilai transmisi pigmentasi tiap panjang gelombang (panjang gelombang 322,5 – 372,5 nm).
2. Banyaknya fluks pigmentasi yang diteruskan oleh bahan tabir surya (E_p) dihitung dengan rumus $E_p = \Sigma T.Fp$
3. Kemudian % transmisi pigmentasi dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ transmisi pigmentasi} = \frac{E_p}{\Sigma E_p}$$

Dimana :

T = nilai transmisi

Fp = fluks pigmentasi

$E_p = \Sigma T \cdot F_p$ = banyaknya fluks pigmentasi yang diteruskan oleh ekstrak
pada panjang gelombang 322,5 – 372,5 nm

ΣF_p = Jumlah total energi sinar UV yang menyebabkan pigmentasi



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil ekstraksi daun Binahong

Penelitian dilakukan dengan menggunakan simplisia daun binahong sebanyak 130 gram kemudian diekstraksi dengan cara dimaserasi dengan pelarut etanol 96% selama 3x24 jam. Dari hasil ekstraksi diperoleh ekstrak sebanyak 14 gram.

Tabel 5. Hasil ekstraksi daun Binahong (*Anredera cordifolia* Ten. Steenis)

Berat Simplisia	Berat ekstrak	Jenis ekstrak	% rendamen
130 gram	14 gram	Ekstrak kental	10.77 %

2. Nilai Potensi Tabir Surya Ekstrak daun Binahong

a. Nilai *Sun Protected Factor* (SPF)

Tabel 6. Nilai rata-rata SPF

Replikasi	Nilai SPF ekstrak			
	300 ppm	350 ppm	400 ppm	450 ppm
I	4.34	5.92	7.01	9.97
II	4.36	5.99	7.55	11.04
III	4.40	5.56	7.78	10.35
Nilai Rata-rata SPF ekstrak	4.36	5.82	7.44	10.45

b. Transimisi Eritema dan Pigmentasi

1) Persen Transmisi Eritema

Tabel 7. Nilai Persen Transmisi Eritema Daun Binahong

Replikasi	Persen Transmisi Eritema			
	300 ppm	350 ppm	400 ppm	450 ppm
I	31.74 %	24.82 %	22.30 %	15.74 %
II	31.27 %	23.49 %	19.68 %	14.06 %
III	31.56 %	23.41 %	18.83 %	14.34 %

%Te Rata-rata	31.52 %	23.90 %	20.27 %	14.71%
---------------	---------	---------	---------	--------

2) Persen Transmisi Pigmentasi

Tabel 8. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Daun Binahong

Replikasi	Persen Transmisi Pigmentasi			
	300 ppm	350 ppm	400 ppm	450 ppm
I	21.35 %	16.55 %	12.45 %	8.67 %
II	20.67 %	15.59 %	11.92 %	8.10 %
III	20.82 %	15.58 %	11.59 %	8.02 %
%Tp Rata-rata	20.95 %	15.90 %	11.98 %	8.26%

B. Pembahasan

Sinar UV dibedakan menjadi 3, yaitu sinar ultraviolet A (UV-A), UV-B, dan UV-C, yang ketiganya mempunyai panjang gelombang dan efek radiasi yang berbeda. Sinar UV-A dengan panjang gelombang 320–400 nm mempunyai efek radiasi, berupa pigmentasi yang menyebabkan kulit berwarna coklat dan kemerahan. Sinar UV-B dengan panjang gelombang 290-320 nm memiliki efek radiasi, yang menyebabkan eritema (kemerahan) hingga dapat menyebabkan kanker kulit bila terlalu lama terkena radiasi ini. Sedangkan sinar UV C dengan panjang gelombang 200-290 nm tertahan pada lapisan atmosfer paling atas dari bumi dan tidak sempat masuk ke bumi karena adanya lapisan ozon (Tranggono dkk, 2007). Sehingga dalam penelitian ini, potensi tabir surya diukur dari panjang gelombang 290-400 (UVA dan UV B).

Secara alamiah, manusia memiliki perlindungan terhadap sinar UV dengan cara pengeluaran keringat, penebalan stratum korneum dan pembentukan melanin pada epidermis. Namun pada kontak yang berlebihan paparan sinar UV yang terlalu lama menjadikan sistem alamiah tersebut tidak berfungsi dengan baik sehingga

menyebabkan efek yang merugikan bagi kulit. Oleh karena itu, diperlukan senyawa tabir surya untuk melindungi kulit dari radiasi UV secara langsung (Cumpelick, 1972).

Penelitian ini menggunakan daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis). Pemilihan daun binahong pada penelitian kali ini karena berdasarkan penelitian sebelumnya daun ini memiliki aktivitas antioksidan yang kuat serta memiliki kandungan senyawa flavonoid yang diduga dapat berpotensi sebagai tabir surya.

Metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode maserasi. Metode ini digunakan karena didalam daun binahong terdapat senyawa flavonoid dan antioksidan yang tidak tahan terhadap pemanasan, sehingga metode ini dipilih untuk mencegah rusaknya senyawa yang terdapat didalam sampel akibat pengaruh suhu. Selain itu metode ini dipilih karena selain murah dan mudah dilakukan, akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat tekanan didalam dan diluar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma terdesak keluar dan akan terlarut dalam pelarut (Lenny, 2006 dalam Fanna, 2017). Pelarut etanol digunakan karena merupakan pelarut pengestraksi yang mempunyai *extractive power* yang terbaik untuk hampir semua jenis senyawa yang mempunyai berat molekul rendah seperti flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa yang bersifat polar sehingga akan terikat dalam pelarut etanol (Afrianti, 2014 dalam Fanna, 2017). Dari hasil ekstraksi dengan berat simplisia 130 gram didapatkan ekstrak kental sebanyak 14 gram dengan persen rendamen 10.77%.

Ekstrak kental yang telah didapatkan kemudian dibuat larutan stok dengan konsentrasi 1000 ppm. Setelah itu dibuat berbagai variasi konsentrasi yaitu 300 ppm,

350 ppm, 400 ppm, dan 450 ppm. Pelarut yang digunakan yaitu etanol p.a karena menurut Cristian (1980) etanol p.a memiliki kemurnian yang sangat tinggi (>99,5%) dan biasanya digunakan untuk keperluan laboratorium.

Penentuan potensi tabir surya dari ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) dilakukan secara *in vitro* dengan metode spektrofotometer pada rentang panjang gelombang ultraviolet. Penentuan efektivitas tabir surya didasarkan pada nilai persen transmisi eritema (%Te) dan transmisi pigmentasi (%Tp) serta dengan menghitung nilai SPF (*Sun Protecting Factor*).

Suatu sediaan tabir surya dikatakan memiliki efektivitas yang baik apabila memiliki nilai SPF yang tinggi, serta memiliki persen transmisi eritema dan persen transmisi pigmentasi yang rendah (Agustin,2013).

Dari hasil pengukuran didapatkan rata-rata nilai SPF menunjukkan bahwa ekstrak dengan konsentrasi 300 ppm dan 350 ppm termasuk kategori proteksi sedang karena berada pada range 4-6, pada konsentrasi ekstrak 400 ppm menunjukkan bahwa ekstrak termasuk kategori proteksi ekstra karena berada pada range 6-8, sedangkan pada konsentrasi ekstrak 450 ppm menunjukkan bahwa ekstrak termasuk kategori proteksi maksimal karena berada pada range 8-15. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak yang terbaik adalah 450 ppm karena memiliki daya proteksi maksimal dengan nilai SPF 10,45 artinya dapat melindungi kulit lebih lama dibawah sinar matahari.

Berdasarkan nilai transmisi eritema dan pigmentasi yang didapatkan dari hasil pengukuran dapat dinyatakan bahwa konsentrasi ekstrak 450 ppm termasuk kategori *fast tanning* untuk eritema didasarkan pada nilai %Te sebesar 14,71% karena berada pada range 10-18%, ini artinya ekstrak pada konsentrasi tersebut dapat melindungi

atau mencegah kulit dari terjadinya kemerahan atau eritema. Sedangkan untuk ketiga konsentrasi 300 ppm, 350 ppm dan 400 ppm belum mencapai nilai minimum untuk penggolongan proteksi eritema, yang artinya belum bisa melindungi atau mencegah kulit dari eritema/ kemerahan pada kulit, namun jika dilihat dari nilai SPF yang didapatkan yaitu termasuk proteksi sedang hingga proteksi ekstra yang artinya ekstrak pada konsentrasi tersebut masih dapat memperpanjang kontak kulit dibawah sinar matahari sehingga masih dapat memperpanjang waktu terjadinya eritema pada kulit. Sedangkan untuk hasil yang didapatkan dari nilai rata-rata persen pigmentasi dapat dinyatakan bahwa konsentrasi ekstrak 300 ppm, 350 ppm, 400 ppm, dan 450 ppm termasuk kategori *total block* untuk penggolongan proteksi pigmentasi karena berada pada range 3-40%, yang artinya ekstrak dapat melindungi atau mencegah terjadinya pigmentasi pada kulit. Ini karena ekstrak daun binahong memiliki penyerapan UV-A yang cukup baik jika dilihat dari persen rata-rata pigmentasi yang menunjukkan proteksi *totalblock* dan diketahui spektrum sinar UV-A dapat menyebabkan warna gelap pada kulit (pigmentasi) dengan panjang gelombang 320-400 nm (Soerarti, 2004).

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi penentuan nilai SPF yaitu perbedaan konsentrasi dari tabir surya. Faktor ini dapat menambah atau mengurangi sinar UV pada setiap tabir surya (More, et.al, 2013).

Berdasarkan hal diatas menunjukkan bahwa seiring bertambahnya konsentrasi, maka daya proteksi tabir surya juga bertambah. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai SPF yang didapatkan pada ekstrak daun binahong menunjukkan seiring bertambahnya konsentrasi maka nilai SPF ekstrak juga semakin besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nilai SPF (*Sun Protecting Factor*) dari Ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) pada konsentrasi 300 ppm dan 350 ppm sebesar 4,36 dan 5,82 (proteksi sedang), konsentrasi 400 ppm sebesar 7,44 (proteksi ekstra), sedangkan pada konsentrasi 450 ppm sebesar 10,45 (proteksi maksimal).
2. Ekstrak daun binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) berpotensi sebagai tabir surya pada konsentrasi 450 ppm termasuk *fast tanning* untuk eritema dan *totalblock* untuk pigmentasi, serta SPF dengan proteksi maksimal.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat formulasi ekstrak daun binahong dalam bentuk sediaan.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan fraksi atau isolasi terhadap senyawa aktif yang berpotensi sebagai tabir surya.

KEPUSTAKAAN

- Agustin, Rini., Oktadefitri, Yulida., dan Lucida, Henny. *Formulasi Krim Tabir Surya Dari Kombinasi Etil P-Metoksisinamat Dengan Katekin*. Padang: Universitas Andalas. 2013.
- Astuti, S. M., Sakinah, M., Andayani, R. & Risch, A. *Determination of saponin compound from *Anredera cordifolia* (Ten.) steenis (binahong) to potential treatment for several deseases*. *Journal of Agricultural Science*. 2011.
- Al.Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadist 2; Shahih Al.Bukhari 2*. Jakarta: Almahira. Terj. Cet.1. 2012
- Balsam, M.S., Edward Sagarin. *Cosmetics: Science and Technology*. Canada: John Wiley & Sons, Inc. 1972.
- Barel, Andre. *Handbook of Cosmetic Science and technology third edition*. New York: Informa Healthcare. 2009.
- Cefali, L.C. Ataide, J.A. Moriel , P. Foglio, M.A; Mazzola, P.G. *Plant-based active photoprotectants for sunscreens*. *Int. J. Cosmet. Sci*, V.38, p,346-353.2016.
- Cumpelick, B.M. *Analitical Prosedures And Evaluation Of Sunscreen*, *J.Soc. Cosmet*, Vol.2. 1972.
- Chairns. *Essential of Pharmaceutical Chemistry. Third edition*. London: Pharmaceutical Press. 2008
- Departemen Kesehatan RI. *Formularium Kosmetika Indonesia (Cetakan I)*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1985.
- Dirjen POM. *Sediaan Galenik*. Edisi 2. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1986.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia*, Edisi IV, Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1995.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2000.

- Dutra, EA Olivera D.A, *Determination of Sun Protecting Factor (SPF) of Sunscreen by Ultraviolet Spectrophotometry. Brazilian Journal Of Pharmaceutical Sciences*. M.I, 2004.
- Fadlan. *Uji Potensi Tabir Surya Dan Nilai Sun Protecting Factor (Spf) Ekstrak Kulit Buah Delima Putih (Punica Granatum L.) secara In Vitro*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016
- Fanna,et al. *Isolasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Daun Binahong serta Aplikasinya sebagai Hand Sanitizer*.Semarang. Universitas Negeri Semarang. 2017.
- Faiz Muhammad Almath, Dr. *1100 hadits terpilih: Sinar ajaran Muhammad*, Gema Insani, Jakarta. 1991
- Fessenden, R. J., Fessenden, J. S. *Kimia Organik Jilid I Edisi Ketiga*.Terjemahan dari *Organic Chemistry oleh Hadyana Pudjaatmaka*. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Gordon, V. C., *„Evaluation du facteur de protetion solaire. Parfum.Cosmet. Arom., Paris, n, p. 1993.*
- Ghoffar Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2008
- Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Terbitan Kedua. Bandung: Penerbit ITB. 1987.
- Hassan, I., K. Dorjay, A. Sami, & P. Anwar. *Suncreens and Antioxidant as Photo-Protective Measures: An Update*. Our Dermatol Online. 4: 369-374. 2013
- Hogade, M.G., Basawaraj, S.P., & Dhumal, P. *Comparative Sun Protection Factor Determination of Fresh Fruits Extract of Cucumber VS Marketed Cosmetic Formulation. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*. .2010.
- Isriany. *Formulasi Kosmetik*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Isriany. *Desain Sediaan Tabir Surya*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.
- Juliandri. *Formulasi dan Penentuan Nilai SPF (Sun Protecting Factor) Sediaan Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Kemangi (Ocimum sacantum)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014
- Kusantati, Herni. *Tata Kecantikan Kulit*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

- Karina. *Penentuan Nilai Sun Protecting Factor (Spf) Ekstrak Dan Fraksi Rimpang Lengkuas (Alpinia Galanga) Sebagai Tabir Surya Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. Pontianak: Universitas Tanjungpura. 2015
- Kessel RG. *Basic Medical Histology. The Biology of Cells, Tissues, and Organs*. New York: Oxford University Press. 1998.
- Kurniasih, dkk. *Potensi Daun Sirsak (Annona murica Linn.), Daun Binahong (Anredera cordifolia Ten. Steenis) dan Daun Benalu Mangga (Dendrophthoe pentandra) sebagai antioksidan dan Pencegah Kanker*. Bandung: Farmasi Politeknik Kesehatan. 2015.
- Khopkar S. M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Terjemahan dari *Basic Concepts Of Analytical Chemistry* oleh Saptoraharjo. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Lavi, Novita. *Tabir Surya Bagi Pelaku Wisata*. Universitas Udayana : Denpasar. 2013.
- Lowe NJ, Shaath NA. *Sunscreen Development, Evaluation, and Regulatory Espect*. New York: Marcel Dekker. 2000.
- Miftahurrahmah. *Penentuan Potensi Tabir Surya Ekstrak Etanol Kulit buah Rambutan (Nephelium lappaceum)*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi, UIN Alauddin Makassar. 2015.
- Manoi, F. *Binahong (Anredera cordifolia (Ten) Steenis) sebagai obat*. *Jurnal Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri*. 2009.
- More BH, Sakharwade SN, Thembrune SV, Sakarkar DM. *Evaluation of Sunscreen Activity of Cream Containing Leaves Extract of Butea monosperma for Topical Application*. India: Sudhakar Rao Naik Institute of Pharmacy. 2013
- Mulja, M. dan Suharman. *Analisis Instrumental*. Surabaya: Airlangga University Press. 1995.
- Pandiangan, Dingse. *Produksi Katarantin melalui Kultur Jaringan*. Lubuk Agung. Bandung. 2011.
- Parwati, dkk. *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis) dengan 1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil (DPPH) menggunakan Spektrofotometer UV-Vis*. Palu: Universitas Tadulako. 2014

- Pathak, M.A, *Sunscreens : Topical and Systemic Approaching for Protection For Human Skin Against Harmful Effect Of Solar Radiation*. J Am Acad Dermatol. 1982.
- Prasiddha, I.J., Rosalina A.L., Teti E.dan Jaya M. *Potensi senyawa bioaktif rambut jagung (zea mays l.) untuk tabir surya alami: kajian pustaka. Jurnal Pangan Dan Agroindustri*. Vol. 4(1).2016
- Rohman, Abdul. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Sami, dkk. *Uji Aktivitas Tabir Surya Pada Beberapa Spesies Dari Family Zingiberaceae Dengan Metode Spektrofotometri*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi.2015.
- Saewan, N. dan Jimtaisong, A. *Photoprotection of Natural Flavonoid*. Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 3. 2013
- Soeratri, Widji, dkk. *Penentuan Stabilitas Sediaan Krim Tabir Surya Dari Bahan Ekstrak Rimpang Kencur (Kaempferia galanga L.)*. Jakarta: Fakultas Farmasi, Universitas Ailangga. Berkala penelitian Hayati 10. 2004.
- Setiawan, Tri. *Uji Stabilitas Fisik dan Penentuan Nilai SPF Krim Tabir Surya Yang Mengandung Ekstrak Daun The Hijau (Camelia sinensis L.), Oktimetoksisinamat dan Titanium Dioksida*. Depok: FMIPA UI. 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shovyana, Hana Hidayatu dan Zulkarnain, A. Karim, *Stabilitas Fisik dan Aktivitas Krim w/o Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria marocarpa .S) sebagai tabir surya*. yogyakarta : Faculty of Pharmacy. Universitas gadjah Mada. 2013.
- Sugihartini, Nining. *Optimasi Komposisi Tepung Beras dan Fraksi Etanol Daun Sendok (Plantago major L) Dalam Formulasi Tabir Surya Dengan metode Simplex Lattice Design*. Yogyakarta : Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. 2011
- Sastrohamidjojo, H. *Kimia Dasar*. Yogyakarta: UGM University Press. 2001.
- Septiningsih, Erna. *Efek Penyembuhan luka bakar ekstrak etanol 70% daun pepaya (Carica papaya) dalam sediaan gel pada kulit punggung kelinci (new zealand)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008.


- Stahl, Egon. *Analisis Obat Secara Kromatografi dan Mikroskopi*. Bandung: ITB Press. 1985.
- Stanfield and Joseph, W. *Sun Protectans: Enhancing Product Functionality with Sunscreen*, in Schueller, R Romanowski, P, Multifunctional Cosmetic, Marcell Dekker Inc, New York, USA. 2003.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: UGM Press. 2013.
- Titis Muhammad, dkk. *Isolasi, Identifikasi dan Uji Aktifitas Senyawa Alkaloid Daun Binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis)*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2013.
- Tranggono, Retno I dan Fatmas Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Umrah ,ST. *Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium Guajava L.) Berdaging Putih Secara In Vitro*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.
- Underwood, A.L. dan Day, R.A. *Analisis kimia kuantitatif*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Warnida. *Efektivitas Ekstrak Daun Kokang (Lepisanthes amoena) Sebagai Tabir Surya; Eksplorasi Kearifan Lokal Kalimantan Timur*. Samarinda: Akademi Farmasi Samarinda. 2017
- Wihelmina, Chyntya Esra. *Pembuatan dan Penentuan Nilai SPF Nanoemulsi Tabir Surya Menggunakan Minyak Kencur (Kaempferia galangal L.) Sebagai Fase Minyak*. Depok: UI Press. 2011.
- Wood, C. & Murphy, E., *Sunscreen Efficacy*. *Glob. Cosmet. Ind.*, Duluth, v. 2000.
- Wilkinson, J.B. & Moore, R.J., *Harry's Cosmeticology (7th edition)*, New York: Chemical Publishing Company, 1982.
- Yulianti Erlina, Adeltrudis Adelsa, dan Alifia Putri. *Jurnal: Penentuan nilai SPF (Sun Protection Factor) Ekstrak Etanol 70 % Temu Mangga (Curcuma mangga) dan Krim Ekstrak Etanol 70 % Temu Mangga (Curcuma mangga) secara In Vitro Menggunakan Metode Spektrofotometri*. *Majalah Kesehatan FKUB Volume 2, Nomor 1, Maret*. 2015

Yuliastuti, Ike. *Pemodelan dan Sintesis Senyawa Penyerap Sinar UV 3,4 Dimetoksi heksilsinamat Berdasarkan Pendekatan Kimia Komputasi*. Yogyakarta: FMIPA UGM. 2002.




Lampiran 1. Skema kerja

1. Penyiapan Sampel



2. Skema Analisis Data



Lampiran 2. Gambar Sampel



(Gambar 2 . Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis)

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Persen transmisi dan SPF

A. Pengukuran Persen Transmisi Eritema dan Pigmentasi

1. Pengukuran persen transmisi eritema dan pigmentsi konsentrasi 300 ppm

Tabel 9. Data transmisi replikasi I

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	41.0360	4.5345	
297.5	0.6720	35.0210	23.5341	
302.5	1.0000	30.9990	30.9990	
307.5	0.2008	28.2240	5.6674	
312.5	0.1364	25.6980	3.5052	
317.5	0.1125	23.2510	2.6158	
Jumlah	2.2322		70.8559	%Te =31.7426
322.5	0.1079	21.7430	2.3461	
327.5	0.1020	20.9480	2.1367	
332.5	0.0936	20.8930	1.9556	
337.5	0.0798	21.3340	1.7025	
342.5	0.0669	21.7000	1.4517	
347.5	0.0570	21.8590	1.2459	
352.5	0.0488	21.7410	1.0609	
357.5	0.0456	21.5090	0.9808	
362.5	0.0356	21.1160	0.7517	
367.5	0.0310	20.7200	0.6423	
372.5	0.0260	20.9520	0.5448	
Jumlah	0.6942		14.8190	%Tp 21.3468

Tabel 10. Data transmisi replikasi II

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	41.5200	4.5879	
297.5	0.6720	34.8860	23.4433	
302.5	1.0000	30.4190	30.4190	

307.5	0.2008	27.4750	5.5169	
312.5	0.1364	24.8920	3.3953	
317.5	0.1125	22.4790	2.5289	
Jumlah	2.2322		69.8194	%Te =31.2782
322.5	0.1079	20.9890	2.2648	
327.5	0.1020	20.2520	2.0657	
332.5	0.0936	20.2050	1.8912	
337.5	0.0798	20.6080	1.6445	
342.5	0.0669	21.0080	1.4054	
347.5	0.0570	21.1360	1.2048	
352.5	0.0488	21.0750	1.0284	
357.5	0.0456	20.8930	0.9527	
362.5	0.0356	20.5570	0.7318	
367.5	0.0310	20.2210	0.6268	
372.5	0.0260	20.4750	0.5324	
Jumlah	0.6942		14.3485	%Tp=20.6691

Tabel 11. Data transmisi replikasi III

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythema</i> Flux/ <i>Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	41.7960	4.6184	
297.5	0.6720	35.1050	23.5900	
302.5	1.0000	30.6910	30.6910	
307.5	0.2008	27.6920	5.5605	
312.5	0.1364	25.1110	3.4251	
317.5	0.1125	22.7280	2.5569	
Jumlah	2.2322		70.4426	%Te =31.5574
322.5	0.1079	21.1670	2.2839	
327.5	0.1020	20.4070	2.0815	
332.5	0.0936	20.3580	1.9055	
337.5	0.0798	20.7650	1.6570	
342.5	0.0669	21.1380	1.4141	
347.5	0.0570	21.3120	1.2147	
352.5	0.0488	21.2410	1.0365	
357.5	0.0456	21.0190	0.9585	
362.5	0.0356	20.6960	0.7368	
367.5	0.0310	20.3690	0.6314	
372.5	0.0260	20.6190	0.5361	

Jumlah	0.6942		14.4562	%Tp=20.8242
---------------	---------------	--	----------------	--------------------

2. Konsentrasi 350 ppm

Tabel 12. Data Transmisi replikasi I

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythema</i> Flux/ <i>Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	27.9160	3.0847	
297.5	0.6720	26.1090	17.5452	
302.5	1.0000	25.3630	25.3630	
307.5	0.2008	22.7520	4.5686	
312.5	0.1364	20.4420	2.7883	
317.5	0.1125	18.2160	2.0493	
Jumlah	2.2322		55.3991	%Te =24.8181
322.5	0.1079	16.8630	1.8195	
327.5	0.1020	16.1710	1.6494	
332.5	0.0936	16.1520	1.5118	
337.5	0.0798	16.5650	1.3219	
342.5	0.0669	16.8700	1.1286	
347.5	0.0570	17.0160	0.9699	
352.5	0.0488	16.9090	0.8252	
357.5	0.0456	16.6910	0.7611	
362.5	0.0356	16.3670	0.5827	
367.5	0.0310	16.0290	0.4969	
372.5	0.0260	16.2360	0.4221	
Jumlah	0.6942		11.4891	%Tp=16.5501

Tabel 13. Data Transmisi replikasi II

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythema</i> Flux/ <i>Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	28.2290	3.1193	
297.5	0.6720	25.8670	17.3826	
302.5	1.0000	23.1620	23.1620	
307.5	0.2008	21.0620	4.2292	
312.5	0.1364	19.0860	2.6033	

317.5	0.1125	17.1080	1.9247	
Jumlah	2.2322		52.4212	%Te =23.4841
322.5	0.1079	15.8760	1.7130	
327.5	0.1020	15.2410	1.5546	
332.5	0.0936	15.2070	1.4233	
337.5	0.0798	15.5830	1.2435	
342.5	0.0669	15.9210	1.0651	
347.5	0.0570	16.0150	0.9129	
352.5	0.0488	15.9130	0.7766	
357.5	0.0456	15.7130	0.7165	
362.5	0.0356	15.3940	0.5480	
367.5	0.0310	15.1100	0.4684	
372.5	0.0260	15.3200	0.3983	
Jumlah	0.6942		10.8203	%Tp=15.5867

Tabel 14. Data Transmisi replikasi III

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning Fe/Fp (E-vitons)</i>	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	27.9860	3.0925	
297.5	0.6720	25.7970	17.3355	
302.5	1.0000	23.0930	23.0930	
307.5	0.2008	21.0170	4.2202	
312.5	0.1364	19.0510	2.5986	
317.5	0.1125	17.0610	1.9194	
Jumlah	2.2322		52.2592	%Te =23.4115
322.5	0.1079	15.8600	1.7112	
327.5	0.1020	15.2200	1.5524	
332.5	0.0936	15.2160	1.4242	
337.5	0.0798	15.5830	1.2435	
342.5	0.0669	15.8880	1.0629	
347.5	0.0570	16.0120	0.9127	
352.5	0.0488	15.9140	0.7766	
357.5	0.0456	15.7300	0.7173	
362.5	0.0356	15.4120	0.5487	
367.5	0.0310	15.1120	0.4685	
372.5	0.0260	15.3240	0.3984	
Jumlah	0.6942		10.8165	%Tp=15.5812

3. Konsentrasi 400 ppm

Tabel 15. Data Transmisi replikasi I

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp	
292.5	0.1105	28.4950	3.1487		
297.5	0.6720	26.2690	17.6527		
302.5	1.0000	21.5440	21.5440		
307.5	0.2008	18.3650	3.6876		
312.5	0.1364	16.0020	2.1826		
317.5	0.1125	13.9770	1.5724		
Jumlah	2.2322		49.7882		%Te =22.3045
322.5	0.1079	12.7750	1.3784		
327.5	0.1020	12.1620	1.2405		
332.5	0.0936	12.1170	1.1342		
337.5	0.0798	12.4350	0.9923		
342.5	0.0669	12.7110	0.8504		
347.5	0.0570	12.7960	0.7294		
352.5	0.0488	12.7060	0.6200		
357.5	0.0456	12.5310	0.5714		
362.5	0.0356	12.2700	0.4368		
367.5	0.0310	12.0320	0.3729		
372.5	0.0260	12.2500	0.3185		
Jumlah	0.6942		8.6449		%Tp=12.4530

Tabel 16. Data Transmisi replikasi II

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	27.0210	2.9858	
297.5	0.6720	22.1320	14.8727	
302.5	1.0000	19.1040	19.1040	
307.5	0.2008	17.0200	3.4176	
312.5	0.1364	15.1030	2.0600	
317.5	0.1125	13.2650	1.4923	
Jumlah	2.2322		43.9325	

322.5	0.1079	12.1150	1.3072	
327.5	0.1020	11.5590	1.1790	
332.5	0.0936	11.5570	1.0817	
337.5	0.0798	11.8770	0.9478	
342.5	0.0669	12.1620	0.8136	
347.5	0.0570	12.3080	0.7016	
352.5	0.0488	12.2350	0.5971	
357.5	0.0456	12.1230	0.5528	
362.5	0.0356	11.8940	0.4234	
367.5	0.0310	11.6600	0.3615	
372.5	0.0260	11.8820	0.3089	
Jumlah	0.6942		8.2746	%Tp=11.9196

Tabel 17. Data Transmisi replikasi III

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	25.0540	2.7685	
297.5	0.6720	21.0350	14.1356	
302.5	1.0000	18.3660	18.3660	
307.5	0.2008	16.4900	3.3112	
312.5	0.1364	14.7070	2.0060	
317.5	0.1125	12.9120	1.4526	
Jumlah	2.2322		42.0398	%Te =18.8333
322.5	0.1079	11.7920	1.2724	
327.5	0.1020	11.2280	1.1453	
332.5	0.0936	11.2260	1.0508	
337.5	0.0798	11.5660	0.9229	
342.5	0.0669	11.8320	0.7915	
347.5	0.0570	11.9630	0.6819	
352.5	0.0488	11.9090	0.5812	
357.5	0.0456	11.7920	0.5377	
362.5	0.0356	11.5680	0.4118	
367.5	0.0310	11.3670	0.3524	
372.5	0.0260	11.6000	0.3016	
Jumlah	0.6942		8.0494	%Tp=11.5952

4. Konsentrasi 450 ppm

Tabel 18. Data Transmisi replikasi I

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	20.1960	2.2317	
297.5	0.6720	18.4780	12.4172	
302.5	1.0000	15.0710	15.0710	
307.5	0.2008	13.5680	2.7245	
312.5	0.1364	11.6360	1.5872	
317.5	0.1125	9.9380	1.1180	
Jumlah	2.2322		35.1495	
322.5	0.1079	8.8920	0.9594	
327.5	0.1020	8.3880	0.8556	
332.5	0.0936	8.3460	0.7812	
337.5	0.0798	8.6080	0.6869	
342.5	0.0669	8.8430	0.5916	
347.5	0.0570	8.9520	0.5103	
352.5	0.0488	8.9240	0.4355	
357.5	0.0456	8.8190	0.4021	
362.5	0.0356	8.6300	0.3072	
367.5	0.0310	8.4750	0.2627	
372.5	0.0260	8.6930	0.2260	
Jumlah	0.6942		6.0186	

Tabel 19. Data Transmisi replikasi II

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	19.6570	2.1721	
297.5	0.6720	15.9110	10.6921	
302.5	1.0000	13.6400	13.6400	
307.5	0.2008	12.0700	2.4237	
312.5	0.1364	10.5680	1.4415	
317.5	0.1125	9.1060	1.0244	
Jumlah	2.2322		31.3938	%Te =14.0640

322.5	0.1079	8.1780	0.8824		
327.5	0.1020	7.7530	0.7908		
332.5	0.0936	7.7450	0.7249		
337.5	0.0798	7.9960	0.6381		
342.5	0.0669	8.2600	0.5526		
347.5	0.0570	8.3930	0.4784		
352.5	0.0488	8.4110	0.4105		
357.5	0.0456	8.3770	0.3819		
362.5	0.0356	8.2660	0.2943		
367.5	0.0310	8.1890	0.2539		
372.5	0.0260	8.4420	0.2194		
Jumlah	0.6942		5.6272		%Tp=8.1060

Tabel 20. Data Transmisi replikasi III

Panjang gelombang (nm)	<i>Erythemat Flux/ Tanning</i> Fe/Fp (E-vitons)	%T	Ee	%Te/%Tp	
292.5	0.1105	19.5660	2.1620		
297.5	0.6720	16.0760	10.8030		
302.5	1.0000	13.9860	13.9860		
307.5	0.2008	12.4710	2.5042		
312.5	0.1364	10.9800	1.4977		
317.5	0.1125	9.5010	1.0689		
Jumlah	2.2322		32.0218		%Te =14.3454
322.5	0.1079	8.5450	0.9220		
327.5	0.1020	8.0900	0.8252		
332.5	0.0936	8.0780	0.7561		
337.5	0.0798	8.3460	0.6660		
342.5	0.0669	8.5960	0.5750		
347.5	0.0570	8.7400	0.4981		
352.5	0.0488	8.7630	0.4276		
357.5	0.0456	8.7320	0.3982		
362.5	0.0356	8.6120	0.3066		
367.5	0.0310	8.5380	0.2647		
372.5	0.0260	8.7990	0.2288		
Jumlah	0.6942		5.5684		%Tp = 8.0213

B. Pengukuran Nilai SPF

Tabel 21. Pengukuran Nilai SPF Konsentrasi 300 ppm

Panjang Gelombang (λ) nm	Absorbansi	AUC
290	0.3410	1.9125
295	0.4240	2.2745
300	0.4840	2.5285
305	0.5300	2.7475
310	0.5690	2.9525
315	0.6120	3.2400
320	0.6840	3.3900
325	0.6720	3.3775
330	0.6790	3.3825
335	0.6740	3.3475
340	0.6650	3.3150
345	0.6610	3.3025
350	0.6600	3.3100
355	0.6640	3.3350
360	0.6700	3.3750
365	0.6800	3.4050
370	0.6820	3.3825
375	0.6710	3.3200
380	0.6570	3.3075
385	0.6660	3.4300
390	0.7060	3.6600
395	0.7580	3.8825
400	0.7950	
AUC		70.1780
Log SPF		0.6379
SPF		4.3441

Lampiran 4. Perhitungan Nilai Transmisi Eritema (%Te) dan Pigmentasi (%Tp), Serta SPF

1. Contoh perhitungan nilai transmisi (konsentrasi 300 ppm replikasi 1)

$$\text{Persen eritema (\%Te)} = \frac{\Sigma (TxFe)}{\Sigma Te}$$

$$\text{Persen pigmentasi (\%Tp)} = \frac{\Sigma (TxFe)}{\Sigma Tp}$$

Ket:

T x Fe : Perhitungan nilai transmisi eritema tiap panjang gelombang yaitu

panjang gelombang 292,5 - 317,5 nm

Fe : Fluks eritema

T x Fp : Perhitungan nilai transmisi eritema tiap panjang gelombang yaitu

panjang gelombang 322,5 - 372,5 nm

Fp : Fluks pigmentasi

$$\begin{aligned} \text{Persen eritema (\%Te)} &= \frac{\Sigma (TxFe)}{\Sigma Te} \\ &= \frac{70.8559}{2.2322} \\ &= 31.7426\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persen eritema (\%Tp)} &= \frac{\Sigma (TxFe)}{\Sigma Te} \\ &= \frac{14.8190}{0.6942} \\ &= 21.3469\% \end{aligned}$$

2. Contoh perhitungan nilai SPF (konsentrasi 300 ppm replikasi I)

$$\text{AUC} = \frac{Aa+Ab}{2} \times Dpb - a$$

$$\text{AUC} = L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+\dots+Ln$$

$$\text{Log SPF} = \frac{\text{AUC}}{\lambda_n - \lambda_1}$$

Ket:

Aa = Absorbansi pada panjang gelombang a nm

Ab = Absorbansi pada panjang gelombang b nm

dPb-a = Selisih panjang gelombang a dan b

λ_n = Panjang gelombang terbesar (dengan $A > 0,05$ untuk ekstrak, dengan $A > 0,01$ untuk sediaan)

λ_1 = Panjang gelombang terkecil (290 nm).

$$L1 = \frac{0,3410 + 0,4240}{2} \times (295 - 290) = 1.9125$$

$$L2 = \frac{0,4240 + 0,4840}{2} \times (300 - 295) = 2.2745$$

$$L3 = \frac{0,4840 + 0,5300}{2} \times (305 - 300) = 2.5285$$

$$L4 = \frac{0,5300 + 0,5690}{2} \times (310 - 305) = 2.7475$$

$$L5 = \frac{0,5690 + 0,6120}{2} \times (315 - 310) = 2.9525$$

$$L6 = \frac{0,6120 + 0,6840}{2} \times (320 - 315) = 3.2400$$

$$L7 = \frac{0,6840 + 0,6720}{2} \times (325 - 320) = 3.3900$$

$$L8 = \frac{0,6720 + 0,6790}{2} \times (330 - 325) = 3.3775$$

$$L9 = \frac{0,6790+0,6740}{2} \times (335-330) = 3.3825$$

$$L10 = \frac{0,6740+0,6650}{2} \times (340-335) = 3.3475$$

$$L11 = \frac{0,6550+0,6610}{2} \times (345-340) = 3.3150$$

$$L12 = \frac{0,6610+0,6600}{2} \times (350-345) = 3.3025$$

$$L13 = \frac{0,6600+0,6640}{2} \times (355-350) = 3.3100$$

$$L14 = \frac{0,6640+0,6700}{2} \times (360-355) = 3.3350$$

$$L15 = \frac{0,6700+0,6800}{2} \times (365-360) = 3.3750$$

$$L16 = \frac{0,6800+0,6820}{2} \times (370-365) = 3.4050$$

$$L17 = \frac{0,6820+0,6710}{2} \times (375-370) = 3.3825$$

$$L18 = \frac{0,6710+0,6570}{2} \times (380-375) = 3.3200$$

$$L19 = \frac{0,6570+0,6660}{2} \times (385-380) = 3.3075$$

$$L20 = \frac{0,6660+0,7060}{2} \times (390-385) = 3.4300$$

$$L21 = \frac{0,7060+0,7580}{2} \times (395-390) = 3.6600$$

$$L22 = \frac{0,7580+0,7950}{2} \times (400-395) = 3.8825$$

$$AUC = 70.1780$$

$$\begin{aligned} \text{Log SPF} &= \frac{AUC}{\lambda n - \lambda_1} \\ &= \frac{70.1780}{400-290} \\ &= 0.6379 \end{aligned}$$

$$SPF = 4.3441$$

3. Rata-rata nilai SPF

$$\begin{aligned} \text{a. 300 ppm} &= \frac{4.3441+4.3621+4.4025}{3} \\ &= 4.3695 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. 350 ppm} &= \frac{5,9200+5,9970+5,5600}{3} \\ &= 5.8250 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. 400 ppm} &= \frac{7,0140+7,5500+7,7800}{3} \\ &= 7.4480 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. 450 ppm} &= \frac{9,9700+11,0400+10,3500}{3} \\ &= 10.4500 \end{aligned}$$

Lampiran 5. Gambar Pengerjaan

(a) Penimbangan sampel ekstrak daun binahong



(b) Pembuatan larutan stok 1000 ppm



(c) Pembuatan pengenceran dengan konsentrasi 300 ppm, 350 ppm, 400 ppm, dan 450 ppm




(d) Hasil pengenceran dimasukkan kedalam kuvet




(e) Penyiapan sel untuk pengukuran nilai SPF, %Te dan %Tp



(f) Penyiapan sel untuk pengukuran nilai SPF, %Te dan %Tp



(g) Pengukuran Nilai SPF



(h) Pengukuran transmisi eritema dan pigmentasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurfajri Indriani lahir di Malino, 9 Juli 1996 Anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Abd. Rasyid dan Ibu Hadawiyah. Pernah menimba ilmu di SD Negeri Centre Malino dan lulus pada tahun 2008, kemudian masuk di SMP Negeri 1 Tinggimoncong dan lulus pada tahun 2011 dan kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Tinggimoncong lulus pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada jurusan Farmasi.

Memiliki harapan untuk bisa bisa lulus dari perguruan tinggi dengan nilai yang memuaskan, dan memiliki banyak teman. Moto hidup adalah “jangan berhenti berjuang karena tidak ada perjuangan yang sia-sia”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R