

**IDENTIFIKASI TELUR CACING PARASIT PADA FESES SAPI
(*Bos sp.*) YANG DIGEMBALAKAN DI SEKITAR TEMPAT
PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPAS)
TAMANGAPA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
FIRDAYANA
NIM. 60300112109

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdayana
NIM : 60300112109
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkep/ 7 Februari 1995
Jurusan/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Cakalang III No. 20A Makassar
Judul : Identifikasi Telur Cacing Parasit Pada Feses Sapi (*Bos sp.*)
Yang Digembalakan di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir
Sampah (TPAS) Tamangapa Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 NOVEMBER 2016

Penyusun,

Firdayana

NIM: 60300112109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Identifikasi Telur Cacing Parasit Pada Feses Sapi (*Bos sp.*) Yang Digembalakan di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Makassar", yang disusun oleh Firdayana, NIM: 60300112109, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 14 November 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Sekretaris	: Hafsan, S.Si., M.Pd.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes.	(.....)
Munaqisy II	: St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Rosmini, M.Th. L.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Isna Rasdianah Azis, S.Si., M.Sc.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Anifuddin Ahmad, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya. Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Identifikasi Telur Cacing Parasit Pada Feses Sapi (*Bos sp.*) Yang Digembalakan di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Makassar”**.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki skripsi ini.

Skripsi ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.

Sebuah persembahan dan terima kasih yang khusus penulis persembahkan kepada Ayahanda **H. Muh. Syukur** dan Ibunda **Hj. Hamsinah Ali** yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, berkorban, yang telah bekerja keras sepenuh

hati membesarkan dan membiayai penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada bangku kuliah hingga mendapatkan gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini. Olehnya secara mendalam saya sampaikan banyak terima kasih kepada semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya adalah:

1. Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan Universitas lainnya.
2. Prof. Dr. H.Arifuddin Ahmad,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes. selaku Ketua Jurusan Biologidan Ibunda Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes. selaku Ketua Jurusan Biologi sekaligus selaku penguji I, St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes. selaku penguji II, Dr.Rosmini, M.Th. L. selaku penguji III terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.

5. Dr. Cut Muthiadin, S.Si.,M.Si. selaku pembimbing I dan Isna Rasdianah Azis, S.Si., M.Sc. selaku pembimbing II terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya, saran, dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Staf pengajar terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan pegawai akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi.
7. Bapak dan Ibu dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik penulis dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi..
8. Saudara seperjuanganku Madinah, Hasnidar, Marwah, Tina, Azizah, Kiki, Kikio, Ima, Dewi, Unuy dan Yusuf serta teman-teman kelas C biologi yang senantiasa memberikan semangat, saran dan bantuannya, serta setia menemani penulis dalam suka maupun duka, menghadirkan cerita warna warni dalam bingkai persaudaraan.
9. Teman-teman “**RANVIER**” (Biologi Angkatan 2012) yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat serta menghadirkan cerita kurang lebih 4 tahun.
10. Adik-adik Mahasiswa jurusan Biologi 2013, 2014, dan 2015.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pada pembaca, sebagai bahan perbaikan kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang dilimpahkan rahmat dan ridho-Nya. Amin

Makassar, 14 November 2016




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ILUSTRASI	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-7
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	7
BABII TINJAUAN PUSTAKA.....	8-39
A. Ayat yang Relevan.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Sapi.....	10
C. Tinjauan Umum Tentang Parasitisme Gastrointestinal.....	13
D. Tinjauan Umum Tentang Kotoran (Feses) Sapi.....	32
E. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).....	35
F. Kondisi Makan Sapi.....	37
G. Kerangka Pikir	39
BAB III MOTODEOLOGI PENELITIAN.....	40-44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel	40
C. Variabel Penelitian.....	40
D. Defenisi Operasional Variabel.....	41
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	41
G. Prosedur Kerja	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45-52
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54-59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60
RIWAYAT HIDUP	67



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kandungan Nutrisi Kotoran Sapi, Kuda, Kambing dan Ayam	34
Tabel 4.1. Jenis telur cacing yang ditemukan dan hasil identifikasi pada feses sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar	45



DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1.	<i>Bos indicus</i>	13
Gambar 2.2.	Morfologi cacing trematoda <i>Fasciola hepatica</i>	17
Gambar 2.3.	Morfologi telur trematoda <i>Fasciola hepatica</i>	18
Gambar 2.4.	Morfologi cacing cestoda <i>Taenia solium</i>	25
Gambar 2.5.	Morfologi telur cestoda <i>Taenia</i> sp.	26
Gambar 2.6.	Morfologi cacing nematoda <i>Ascaris lumbricoides</i>	29
Gambar 2.7.	Morfologi telur nematoda <i>Ascaris lumbricoides</i>	29
Gambar 2.8.	Kondisi pengembalaan sapi di TPAS Tamangapa Makassar ...	38
Gambar 2.9.	Kondisi kandang sapi di TPAS Tamangapa Makassar	38



ABSTRAK

Nama : Firdayana
NIM : 60300112109
Judul Skripsi : Identifikasi Telur Cacing Parasit Pada Feses Sapi (*Bos sp.*) Yang Digembalakan di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Makassar.

Pengembalaan sapi tidak hanya dilapangan rumput, namun saat ini juga terdapat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis telur cacing parasit pada feses sapi dan untuk mengetahui prevalensi telur cacing pada feses sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar. Identifikasi secara kuantitatif dengan menggunakan metode apung (*Flotation methode*). Sedangkan secara kualitatif menggunakan metode *Mc. Master*. Data identifikasi yang diperoleh dari 25 sampel feses sapi terdapat 3 sampel yang positif mengandung jenis telur cacing *Oesophagostomum sp.* dan *Cooperia sp.* yang dihasilkan dari penelitian dengan menggunakan metode apung. Sedangkan dengan metode *Mc.Master* hasil penelitiannya tidak menemui hasil apapun.

Kata kunci : Feses, Sapi (*Bos sp.*), Telur cacing

ABSTRACT

Name : Firdayana

Student ID Number : 60300112109

Title : Identification of the parasite worm eggs in the feces of cattle (*Bos sp.*) Grazing in the place landfill Tamangapa Makassar

Grazing the cows not only on the grass, but today there are at landfill. This study aimed to determine the type of parasitic worms in cow feces and to determine the prevalence of worm eggs in the feces of cattle in pastored around the landfill Tamangapa Makassar. Identification qualitatively using flotation method, whereas quantitative using Mc. Master method. The identification results obtained from 25 samples of cow feces, there are 3 types of positive samples containing worm eggs *Oesophagostomum sp.* and *Cooperia sp.* resulting from the floating method. While using Mc. Master method showed nothing of the worm eggs.

Keywords: Cow (*Bos sp.*), Feces, Worm egg

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Identifikasi Telur Cacing Parasit Pada Feses Sapi (*Bos sp.*) Yang Digembalakan di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Makassar", yang disusun oleh Firdayana, NIM: 60300112109, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 14 November 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 November 2016 M

14 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Sekretaris	: Hafsan, S.Si., M.Pd.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes.	(.....)
Munaqisy II	: St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Rosmini, M.Th. L.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Isna Rasdianah Azis, S.Si., M.Sc.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk hidup dengan cara berjalan yang berbeda-beda serta memiliki potensi dan fungsi berbeda-beda. Seperti sapi yang berjalan dengan empat kaki dan berpotensi dijadikan sebagai hewan ternak dan cacing yang berjalan dengan perutnya.

Allah berfirman dalam QS An-Nur/24: 45

خَلَقَ كُلَّ لَئِيْنَةٍ مِّن مَّاءٍ ط فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بُرُوجِهِمْ مِّن يَمَشِي عَلَىٰ
لَيْثٍ وَ مِّنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ؕ يَذُرُّونَ إِذْ يُشَاءُ بِرَبِّهِمْ كَلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
٤٥

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Ayat di atas menegaskan bahwa: di samping bukti-bukti dan limpahan anugerah yang telah di kemukakan sebelumnya, Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air yang memancar sebagaimana Allah menciptakan tumbuhan dari air yang tercurah. Allah juga menjadikan hewan-hewan itu beraneka jenis berdasarkan potensi dan fungsi. Hewan yang diciptakannya ada yang berjalan di atas perutnya seperti buaya, cacing, ular dan hewan melata lainnya. Adapula yang berjalan dengan dua kaki seperti burung dan adapula yang berjalan dengan empat kaki seperti sapi, kambing kerbau dan lain-lain. Dan ada juga yang berjalan dengan menggunakan lebih dari empat kaki seperti laba-laba, kepiting dan kelabang. Sesungguhnya Allah maha kuasa lagi maha bijaksana, Oleh sebab itu Allah secara terus-menerus

menciptakan apa dan dengan cara serta bahan yang dikehendaknya (Shihab, 2002: 579).

Ruminansia merupakan ternak yang termasuk ke dalam kelompok hewan bertulang belakang, mempunyai rahang, memiliki kaki berkuku genap dan tanduk yang strukturnya berongga, menyusui anaknya dan mempunyai sistem pencernaan makanan yaitu memamah biak. Lambung ruminansia terdiri atas empat bagian yaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Contoh hewan yang termasuk ruminansia adalah sapi (Khasanah, 2009).

Sapi merupakan ternak ruminansia yang paling dikenal di daerah tropis. Secara tradisional pakan ternak ruminansia berasal dari limbah pertanian yang merupakan pakan berserat kasar tinggi. Sekitar 60% sampai 75% pakan ternak sapi dalam bentuk serat kasar terdiri atas karbohidrat seperti selulosa, hemiselulosa, pektin dan ligin (Jusmaldi, 2002).

Pada umumnya sapi yang tersebar di seluruh dunia berasal dari bangsa sapi primitif yang telah mengalami domestikasi (penjinakan). Secara umum, sapi primitif dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu *Bos taurus*, *Bos indicus* (Zebu atau sapi berponok) dan *Bos sondaicus* (sapi keturunan banteng). Kebanyakan sapi di Indonesia berasal dari persilangan antara *Bos indicus* Zebu atau sapi berponok dan *Bos sondaicus* (sapi keturunan banteng). Ternak sapi, merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sapi dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa daging, susu dan kotorannya dapat dijadikan pupuk kandang Sapi merupakan hewan pemakan rumput yang sangat berperan sebagai pengumpul bahan bergizi rendah yang diubah menjadi bahan bergizi tinggi (Arbi, 2009).

Usaha peternakan sapi tidak hanya menghasilkan daging atau susu, tetapi juga menghasilkan pupuk kandang dan sebagai lahan pembukaan lapangan kerja. Ternak sapi bermanfaat lebih luas dan bernilai ekonomis lebih besar dari pada ternak lain. Usaha ternak merupakan usaha yang lebih menarik sehingga mudah merangsang pertumbuhan usaha. Ternak sapi di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, ternak sapi perah dan ternak sapi pedaging (Setiawan, 2014).

Salah satu kunci keberhasilan dalam usaha peningkatan produktivitas ternak yaitu kesehatan ternak sapi. Arti sehat bagi ternak adalah kondisi dimana dalam tubuh ternak berlangsung proses-proses normal, baik proses fisik, kimiawi, dan fisiologis. Timbulnya penyakit pada ternak dapat menyebabkan penurunan laju produktivitas ternak sehingga menyebabkan kerugian ekonomi di bidang peternakan (Kertawirawan, 2012).

Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, satu sebagai parasit yang diuntungkan dan satu sebagai inang yang dirugikan. Salah satu penyakit pada ternak sapi adalah infeksi organisme parasit gastrointestinal. Parasit gastrointestinal merupakan organisme yang bersimbiosis parasitisme dengan inang dan menyerang pada organ pencernaan. Parasit gastrointestinal umumnya mengambil sebagian nutrisi inang, memakan jaringan inang atau menggunakan sel pada organ pencernaan untuk menyelesaikan fase hidupnya. Salah satu penyebab penyakit parasit gastrointestinal adalah cacing, namun penyakit ini masih kurang mendapat perhatian dari para peternak (Nugroho, 2015).

Penyakit parasit gastrointestinal akibat infeksi cacing merupakan penyakit dalam tubuh yang menginfeksi saluran pencernaan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, babi, dan mamalia lainnya. Penyakit parasit akibat infeksi cacing tidak langsung menyebabkan kematian hewan ternak, namun

menyebabkan kerugian dari segi ekonomi, diantaranya penurunan berat badan, penurunan kualitas daging, jeroan dan kulit, penurunan produktivitas ternak sebagai tenaga kerja pada ternak potong dan kerja, dan bahaya penularan pada manusia dapat terjadi (Rahayu, 2015).

Penggembalaan sapi saat ini tidak hanya di lapangan rumput, namun terdapat juga digembalakan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). Sapi yang digembalakan di TPAS mendapatkan asupan makanan dari sampah organik yang terfermentasi, tetapi ada efek samping yang kurang baik bagi kesehatan sapi terutama serangan parasit yang banyak hidup di tempat lembab tersebut. Salah satu TPAS di Makassar yang dimanfaatkan sebagai tempat penggembalaan sapi adalah TPAS Tamangapa dengan populasi sapi terbesar di Kota Makassar. Penggembalaan di tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) dapat menyebabkan sapi terkena penyakit akibat terjangkit oleh parasit terutama cacing. Salah satu cara mengetahui adanya cacing parasit dengan identifikasi telur cacing pada feses. Hal ini dilakukan untuk deteksi dini adanya infeksi cacing parasit terutama parasit pencernaan dengan cara yang cepat, mudah dan efektif. Pencegahan dapat dilakukan dengan memutus siklus hidup telur cacing yang berkembang biak di dalam tubuh hewan ternak sebelum berkembang menjadi cacing secara berkala (Nezar, 2014).

Program pencegahan dan pengendalian parasit gastrointestinal pada ternak perlu dilakukan demi meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, salah satu cara dengan pemberian obat cacing/antelmintika. Obat cacing digunakan untuk membasmi atau mengurangi cacing dalam rumen usus atau jaringan tubuh. Pemeriksaan feses secara rutin sangat diperlukan untuk mengidentifikasi adanya parasit gastrointestinal pada ternak, terutama jenis dan derajat infeksi. Dengan mengetahui jenis cacing yang menginfeksi maka segera dapat dilakukan pengobatan

dengan jenis antelmintika yang tepat, sehingga pengobatannya menjadi lebih efektif (Vivi, 2015).

Hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian dengan judul “Identifikasi Telur Cacing Parasit Pada Feses Sapi yang digembalakan di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Makassar” untuk mengetahui jenis cacing parasit apa saja yang terdapat pada feses sapi yang digembalakan di kawasan TPAS Tamangapa.

B. Rumusan Masalah

1. Jenis telur cacing apa yang terdapat pada feses sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar?
2. Bagaimana tingkat prevalensi telur cacing yang terdapat pada feses sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sampel berupa feses sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa baik di kandang dan tempat sapi digembalakan, kemudian sampel diteliti di laboratorium Parasitologi Balai Besar Veteriner (BBVET) Maros.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kartika Dewi dan R.T.P Nugraha pada tahun 2007 dengan judul Endoparasit Pada Feses Babi Kutil (*Sus verrucosus*) di Kebun

Binatang Surabaya menemukan telur endoparasit *Ascaris* sp., *Oesophagostomum* sp., *Eimiria* sp. dan *Balantidium coli*.

2. Penelitian lainnya dilakukan oleh Novese Tantri dkk pada tahun 2013 dengan judul Prevalensi dan Intensitas Telur Cacing Parasit pada Feses Sapi (*Bos* Sp.) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pontianak Kalimantan Barat menemukan pada Sampel feses sapi adalah 7 jenis telur cacing parasit dengan spesies yaitu *Paramphistomum* sp. dan *Fasciola hepatica* dari kelas *Trematoda*, *Strongyloid* sp., *Trichuris trichiura*, dan *Ascaris* sp. (infertil, fertil dan berembrio) dari kelas *Nematoda*, *Taenia saginata* dan *Moniezia* sp. dari kelas *Cestoda*.
3. Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Rofiq Nezar pada tahun 2014 dengan judul Jenis Cacing Pada Feses Sapi di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang menemukan bahwa jenis telur cacing yang ditemukan pada feses sapi di TPA Jatibarang Semarang lebih tinggi dan lebih banyak yaitu 9 spesies (*A. lumbricoides*, *B. phlebotomum*, *H. contortus*, *O. radiatum*, *O. ostertagi*, *Fasciola* sp., *Moniezia* sp. dan *S. bovis*) daripada feses sapi dari KTT Sidomulyo Nongkosawit sebanyak 7 spesies (*B. phlebotomum*, *H. contortus*, *O. ostertagi*, *Moniezia* sp., *P. cervi*, larva *T. axei* dan *S. papillosus*).
4. Penelitian lainnya dilakukan oleh Vivi Andrianty pada tahun 2015 dengan judul Kejadian *Nematodiasis Gastrointestinal* pada Pedet Sapi Bali di kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng yang bertujuan untuk mengetahui kejadian *nematodiasis gastrointestinal* di Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng, dan meneemukan jenis telur cacing nematoda gastrointestinal yang terdapat pada sampel pedet sapi bali di Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng adalah *Oesophagostomum* sp., *Bunostomum* sp., *Strongylus* sp., *Strongyloides* sp., *Cooperia* sp. dan *Tricuris* sp.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui jenis telur cacing parasit yang terdapat pada feses sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar.
2. Untuk mengetahui prevalensi telur cacing yang terdapat di tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi pada masyarakat tentang jenis cacing parasit yang terdapat pada feses sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa.
2. Sebagai informasi cara pencegahan dan penanggulangan infeksi cacing pada ternak sapi serta informasi mengenai kualitas ternak sapi tersebut berdasarkan tingkat infeksi cacing.
3. Sebagai sumber informasi dan bahan relevansi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Allah berfirman dalam QS An-Nahl/16: 66

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا
سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”

Sesungguhnya pada binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, kerbau dan binatang terbak lainnya benar-benar terdapat pelajaran. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang tersebut, kita dapat memperoleh bukti kekuasaan Allah dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Allah memberikan minum susu murni yang bergizi yang ada pada perut hewan tersebut. Selain susunya binatang-binatang ternak tersebut secara khusus terdapat manfaat yang banyak untuk kita. Seperti daging, kulit dan bulunya. Semua itu dapat kita manfaatkan untuk berbagai tujuan. Kita juga dapat memakan dagingnya yang lezat dan bergizi (Shihab, 2002: 177).

Pada ayat diatas menjelaskan kekuasaan Allah SWT dari hewan ternak seperti sapi, kerbau, unta dan kambing dapat menghasilkan suatu minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia yaitu susu dan daging yang dapat dikonsumsi. Salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari binatang ternak seperti sapi adalah endoparasit yang terdapat pada sapi dan menjadi tolak ukur apakah daging sapi tersebut aman untuk dikonsumsi.

B. Tinjauan Umum Tentang Sapi

Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang termasuk dalam kelompok hewan ruminansia. Ruminansia memiliki lambung yang terdiri atas empat bagian yaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Di dalam rumen terdapat bolus dan cairan rumen. Bolus yang terdapat di dalam rumen merupakan makanan padat yang belum sepenuhnya tercerna, sedangkan cairan rumen yang terdiri dari partikel halus dari makanan yang tercerna dan air yang porsinya bisa mencapai 830-900 gram/kg. Di dalam rumen juga terdapat mikroflora dan mikrofauna. Mikroflora yang terdapat dalam rumen berupa bakteri anaerob dan fungi, sedangkan mikrofaunanya adalah ciliata (Khasanah, 2009).

Sapi adalah ternak memamah biak yang mempunyai ukuran tubuh yang besar, mempunyai empat kaki, ada yang bertanduk ada pula yang tidak bertanduk, ada yang berponok dan ada pula yang tidak berponok (Jumriah, 2013).

Sapi (*Bos sp.*) sudah dikenal sejak 8.000 tahun SM diperkirakan berasal dari Asia Tengah kemudian menyebar ke Eropa, Afrika dan seluruh Asia termasuk Indonesia. Sapi yang sekarang tersebar di Indonesia merupakan hasil domestikasi (penjinakan) dari sapi jenis primitif. Secara umum, sapi primitif dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu *Bos indicus*, *Bos taurus* dan *Bos sondaicus*. Sapi di Indonesia kebanyakan berasal dari persilangan antara *B. indicus* dan *B. sondaicus* atau sapi keturunan banteng (Nezar, 2014).

Sapi sebagai salah satu hewan piaraan, disetiap daerah atau Negara berbeda sejarah penjinakkannya, di Mesir, India, Mesopotamia 8000 tahun SM telah mengenal sapi piaraan. Akan tetapi, di daratan Eropa dan Cina baru dikenal pada sekitar 6000 tahun SM. Hal ini disebabkan karena disetiap daerah atau Negara perkembangannya berbeda-beda. Pada umumnya bangsa sapi yang tersebar di

seluruh penjuru belahan dunia berasal dari bangsa sapi primitif yang telah mengalami domestikasi (penjinakkan) (Arbi, 2009).

Sistem pencernaan merupakan suatu sistem yang terdiri dari saluran pencernaan yang dilengkapi beberapa organ yang bertanggung jawab atas pengambilan, penerimaan, pencernaan dan absorpsi zat makanan mulai dari mulut sampai ke anus. Sistem pencernaan bertanggung jawab pula terhadap pengeluaran bahan-bahan pakan yang tidak dapat dicerna (Huda, 2008). Sapi merupakan hewan ruminansia, yang memiliki keunikan dalam sistem pencernaannya terutama lambung sehingga mereka dapat mensintesis asam amino. Sapi memiliki satu lambung dengan terbagi dalam empat bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Atas dasar karakteristik tersebut, mereka dapat dibedakan dari ternak lainnya. Diperkirakan terdapat 1,3 miliar ekor sapi tersebar di seluruh dunia (Rizqi, 2009).

Proses pencernaan sapi meliputi pencernaan mekanik, pencernaan hidrolitik dan pencernaan fermentatif. Pencernaan mekanik terjadi dalam mulut oleh gigi melalui proses mengunyah dengan tujuan untuk memperkecil ukuran, kemudian pakan masuk ke dalam perut dan usus melalui pencernaan hidrolitik, tempat zat makanan diuraikan menjadi molekul-molekul sederhana oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh hewan. Hasil pencernaan fermentatif berupa *Volatile Fatty Acid* (VFA), NH_3 dan air yang sebagian diserap dalam rumen dan sebagian lagi diserap dalam omasum. Selanjutnya pakan yang tidak dicerna disalurkan ke abomasum dan dicerna secara hidrolitik oleh enzim-enzim pencernaan, sama seperti yang terjadi pada monogastrik. Sistem pencernaan ruminansia sangat tergantung pada perkembangan populasi mikroba yang mendiami rumen dalam mengolah setiap bahan pakan yang dikonsumsi. Mikroba tersebut berperan sebagai pencerna serat dan sumber protein (Kurniawati, 2009).

Perbedaan anatomis antara kelompok ternak ruminansia dan non ruminansia ialah kelompok ternak ruminansia tidak mempunyai gigi geligi pada rahang bagian atas sebagaimana yang dimiliki oleh kelompok ternak non ruminansia. Pengunyahan makanan di bagian mulut berlangsung relatif singkat, bahkan tidak terjadi sama sekali. Sebagian besar makanan yang dikonsumsi langsung ditelan dan disimpan (untuk sementara waktu) di dalam bagian perut. Ternak ruminansia memiliki empat bagian perut, yaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum (Huda, 2008).

Pada hewan yang belum dewasa, rumen dan retikulum relatif belum berkembang sehingga susu yang dikonsumsi mencapai lambung melalui lipatan-lipatan jaringan yang menyerupai tabung yang disebut parit esophagus. Pada saat ternak mulai memakan makanan yang padat, retikulerumen membesar hingga memenuhi 85% kapasitas lambung dewasa. Struktur perut demikian menyebabkan sapi dapat menelan banyak pakan dalam waktu yang singkat (Khasanah, 2009). Menurut (Blakely, 1992) sapi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
 Filum : Chordata
 Classis : Mamalia
 Ordo : Artiodactile
 Familia : Bovidae
 Genus : Bos
 Spesies : *Bos taurus.*,
 Bos indicus.,
 Bos sondaicus



Gambar 2.1. Sapi (*Bos indicus*) (Dokumen pribadi, 2016)

C. Tinjauan Umum Tentang Parasitisme Gastrointestinal

Secara umum, parasit dapat didefinisikan sebagai organisme yang hidup pada organisme lain, yang disebut inang, dan mendapat keuntungan dari inang yang ditempatinya hidup, sedangkan inang menderita kerugian. Parasit memiliki habitat tertentu dalam tubuh inangnya (Eka, 2011). Parasit ini dapat menghambat kemajuan di bidang peternakan, terutama dalam hubungannya dengan peningkatan populasi dan produksi ternak (Sari, 2015).

Parasit merupakan salah satu jenis penyakit hewan maupun manusia yang sangat merugikan peternak. Kerugian tersebut terjadi akibat rusaknya organ dan sistem organ ternak sehingga sering terjadi kematian dan bagi peternak biaya yang harus ditanggung olehnya cukup besar. Kerugian yang diakibatkan oleh parasit berupa perkembangan tubuh ternak terhambat, sedangkan pada sapi dewasa kenaikan berat badannya tidak tercapai, organ tubuh rusak dan kualitas karkas jelek,

menurunnya fertilitas dan predisposisi penyakit metabolik hal ini disebabkan oleh menurunnya nafsu makan, perubahan distribusi air, elektrolit dan protein darah (Gusti, 2013).

Pada umumnya paratisme dapat terjadi karena terpenuhinya komponen-komponen seperti adanya parasit, adanya sumber parasit untuk hospes yang rentan (reservoir: hospes antara dan hospes definitif), proses pembebasan stadium parasit dan reservoir, proses penularan terhadap hospes yang rentan, cara parasit memasuki tubuh hospes yang rentan dan adanya hospes yang rentan (Subronto, 2007).

Perubahan atau kerusakan yang disebabkan oleh parasit dapat berupa kerusakan sel dan jaringan, perubahan fungsi fisiologi dari hospes, penurunan daya tahan terhadap agen penyebab penyakit lain, masuknya agen penyakit sekunder setelah terjadi kerusakan mekanik dan parasit mampu menyebarkan mikroorganisme patogen (Ida, 2004).

Kerusakan sel dan jaringan dapat berbentuk seperti pencucuran darah yang disebabkan oleh cacing *Ancylostoma* sp., *Ostertagia* sp., *Hemonchus* sp., *Bunostomum* sp. dan *Strongylus* sp. Artofi dan *Ascaris* sp. Invasi terhadap sel jaringan misalnya oleh *Coccidia*, dan radang lokal baik oleh larva maupun parasit dewasa seperti yang dilakukan oleh cacing dewasa *Ostertagia*, dan cacing muda *Paramphistomum*, larva *Oesophagostomum* sp., dan *Strongylus* sp. Kerusakan jaringan fungsi fisiologi akan mengalami penurunan dan berbentuk sebagai hilangnya nafsu makan, gangguan digesti, gangguan penyerapan, hilangnya cairan dan elektrolit, timbulnya kepekaan yang meningkat (*Hipersentivity*) secara lokal maupun sistematis dan penyerapan oleh jaringan usus terhadap hasil-hasil radang yang timbul maupun penyerapan eksret dari parasit (Subronto, 2007).

Parasitisme sering pula mengakibatkan penurunan komponen makanan yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan fungsi organ-organ tubuh. Akibat adanya cacing parasit seperti *Ostertagia* sp., *Trichostrongylus*, Fasciola dan cacing-cacing penghisap darah mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah protein di dalam tubuh yang tercermin dari adanya hipoproteinemia. Umumnya hipoproteinemia terjadi apabila protein yang dikonsumsi jumlahnya kurang atau oleh karena adanya perdarahan. Hipoproteinemia disebabkan oleh parasit yang mampu mengganggu aktivitas enzim pencernaan, terjadinya oedema usus hingga absorpsi sari makanan terganggu, mampu merusak dinding usus, mampu secara langsung memanfaatkan protein yang dikonsumsi oleh hospes dan mengkonsumsi darah untuk hidupnya (Ida, 2004).

Dalam kesehatan ternak upaya pencegahan infeksi penyakit akibat cacing harus dilakukan sebelum infeksi. Salah satu cara mengetahui adanya telur cacing dengan identifikasi telur cacing dalam feses. Hal ini dilakukan untuk deteksi dini adanya infeksi cacing parasit terutama parasit pencernaan dengan cara yang cepat, mudah dan efektif. Pencegahan dapat dilakukan dengan memutus siklus hidup telur cacing yang berkembang biak di dalam tubuh hewan ternak sebelum berkembang menjadi cacing secara berkala. Pemeriksaan telur cacing berdasarkan hasil yang akan didapat secara umum dibedakan menjadi pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Pemeriksaan kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya adalah metode natif (*direct slide*), apung (*Flotation methode*), sedimentasi (*Sedimentation methode*), modifikasi metode *Methiolat Iodine Formaldehyde* (MIF), metode selotip (*Cellotape methode*), teknik sediaan tebal (Teknik Kato) dan metode konsentrasi. Metode yang umum dipakai untuk pemeriksaan telur cacing pada feses hewan ternak adalah metode natif, apung dan sedimentasi. Metode tersebut menggunakan alat dan

bahan yang mudah digunakan serta langkah pemeriksaan yang cukup sederhana (Nezar, 2014).

Metode natif adalah metode pemeriksaan feses secara langsung dan tanpa pewarnaan. Metode ini cepat dan efektif untuk pemeriksaan pada infeksi berat. Pada metode natif, sampel feses hanya dilarutkan dengan aquades untuk melarutkan dan memisahkan partikel-partikel besar pada feses sehingga mudah diproses dan diamati. Setelah larutan dipipetkan pada gelas benda dan ditutup dengan gelas penutup larutan akan mudah diamati daripada feses tanpa pelarutan apapun. Metode endapan/sedimentasi adalah metode pemeriksaan feses dengan cara diendapkan terlebih dahulu sebelum diperiksa dan bisa diberikan pewarnaan atau tidak. Metode sedimentasi cukup baik untuk memeriksa sampel feses yang tidak bisa langsung diperiksa dan harus disimpan terlebih dahulu. Metode ini bisa memudahkan pengendapan secara manual selama 15-20 menit atau menggunakan sentrifuge selama 1-5 menit dengan putaran 1000-3000 rpm (Agoes, 2009).

Berdasarkan lingkungannya, parasit dibedakan menjadi dua yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit yaitu parasit yang hidup pada permukaan tubuh inang dan yang memperoleh makanan dengan mengirimkan haustorium masuk ke dalam sel-sel tubuh inang itu. Beberapa golongan parasit yang bersifat ektoparasit antara lain adalah ciliata, beberapa flagellata, monogenea, copepod, isopod, branchiuran dan lintah (Eka, 2011).

Endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam tubuh organisme, antara lain tubuh sapi dengan mengambil zat-zat makanan yang diperlukan bagi cacing. Cacing dalam jumlah banyak akan menyebabkan kerusakan usus dan mengakibatkan terjadinya berbagai reaksi tubuh cacing. Parasit-parasit tersebut tidak secara langsung menyebabkan kematian pada hewan, melainkan mengakibatkan terjadinya penurunan


berat badan pada hewan dewasa dan hewan- hewan muda (Sari, 2015). Golongan parasit yang masuk kelompok endoparasit antara lain adalah digenea, cestoda, nematoda, acantocephala, coccidia, microsporidia, amoeba dan cacing pada intestinum sapi (Eka, 2011).

1. Jenis Cacing Parasit pada Ruminansia

Berbagai jenis cacing parasitik yang dapat menginfeksi ruminansia tersebar secara kosmopolitan, kecuali jenis-jenis tertentu hanya ditemukan pada suatu wilayah geografis tertentu. Kejadian kecacingan pada sapi dengan kepentingannya secara ekonomis sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis dan iklim serta musim sepanjang tahun (Rizqi, 2009). Menurut morfologinya cacing parasitik pada sapi dibagi menjadi tiga kelas, yaitu trematoda (cacing hati), cestoda (cacing pita), dan nematoda (cacing gilig) yang perkembangan dan siklus hidupnya berbeda (Jumriah, 2011).

a. Kelas Trematoda


Kelas trematoda termasuk dalam filum plathyhelminthes dengan ciri-ciri tubuh tidak bersegmen, umumnya hermaprodit, reproduksi ovipar (berbiak dalam larva), infeksi terutama pada stadium larva yang masuk lewat mulut sampai usus. Semua organ dikelilingi oleh sel-sel parenkim, badan tak berongga dan mempunyai mulut penghisap atau *sucker* (Noble, 1989).



Keterangan:

- A. Batil hisap (*Oral sucker*)
- B. Acetabulum (*Ventral sucker*)

Gambar 2.2. Morfologi cacing trematoda *Fasciola hepatica* (Robert, 2011)



Keterangan:

A. Operkulum

B. Blastomer

Gambar 2.3. Telur trematoda *Fasciola hepatica* (Robert, 2011)

Cacing trematoda yang banyak ditemukan pada sapi adalah kingdom animalia, filum platyhelminthes, kelas trematoda, sub ordo prosostomata dan ordo digenea. Beberapa famili dari ordo digenea adalah famili dicrocoeliidae dengan genus eurytrema, famili fasciolidae dengan genus fasciola, famili paramphistomidae dengan genus paramphistomum, famili schistosomatidae dengan genus schistosoma. Semua spesies trematoda yang berparasit pada ternak ruminansia adalah ordo digenea. Bentuk tubuh trematoda pipih dorsoventral menyerupai bentuk daun dan tidak bersegmen. Dalam keadaan hidup cacing ini bertubuh relatif tebal. Bagian paling luar disebut tegumen, ujung anterior tubuh terdapat batil hisap (*oral sucker*) dan pada bagian ventralnya terdapat *acetabulum* (*ventral sucker*). *Acetabulum* terletak di sepertiga bagian anterior tubuh, namun posisi ini bervariasi menurut jenis trematoda. Terlihat pada gambar 2.2 (Kusumamihardja, 1995).

Spesies cacing dari kelas trematoda yang menyerang ternak adalah *Paramphistomum* sp. (cacing parang), *Schistosoma* sp. yang menyerang sistem peredaran darah, *Fasciola hepatica* (cacing hati), *Fasciola gigantica* yang berwarna merah muda kekuningkuningan sampai abu-abu kehijau-hijauan, (Nezar, 2014).

Paramphistomiasis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Paramphistomum* sp. yang merupakan salah satu cacing dalam kelas trematoda. *Paramphistomum* sp. hidup di dalam rumen, retikulum, usus, saluran empedu atau kandung kemih hewan yang diserangnya. Hal ini menyebabkan kerja rumen menjadi terganggu sehingga pakan tidak dapat dicerna dengan sempurna (Hamdan, 2014).

Paramphistomiasis pada sapi dapat disebabkan oleh satu atau lebih cacing dari genus *Paramphistomum*, misalnya *P. cervi*, *P. microbothrioides*, *P. liorchis*, *P. ichikawi*, *P. gotoi*, dan *Calicophoron* sp. atau *Ceylonocotyle* sp. maupun *Cotyledophoron* sp. Di Indonesia terdapat 2 spesies *Paramphistomum* sp., yaitu *P. cervi* dan *P. (Gygantocotyl) explanatum*. Salah satu jenis yang sering terdapat pada sapi adalah *Paramphistomum cervi* (Subronto, 2007).

Hewan yang diserang *Paramphistomum* sp. sebagai hospes definitif, yaitu hewan ternak (kerbau, sapi, domba, kambing) dan ruminansia lain. Cacing muda *Paramphistomum* sp. berpredeliksi di dalam usus halus dan akan bermigrasi ke dalam rumen dan retikulum setelah dewasa. Daerah penyebaran *Paramphistomum* sp. adalah daerah yang memiliki suhu udara 25-30°C dengan kelembaban kira-kira 85%. *Paramphistomum* sp. merupakan cacing trematoda yang tebal, berbentuk pipih, seperti *Fasciola* sp. dan *Eurythrema* sp. Cacing ini mempunyai batil isap di bagian perut (*ventral sucker*) yang disebut *asetabulum*, dan di bagian mulut ada batil isap mulut yang kecil (*oral sucker*). *Paramphistomum* sp. memiliki saluran pencernaan yang sederhana dan juga testis yang bergelambir, terletak sedikit di bagian *anterior ovarium*. Cacing dewasanya berukuran panjang sekitar 5-13 mm dan lebar 2-5 mm, sedangkan ukuran telur *Paramphistomum* sp. panjangnya 113-175 mikron dan lebar 73-100 mikron dan berwarna sedikit kuning muda transparan (Kamaruddin, 2005).

Paramphistomiasis tersebar di seluruh dunia dengan prevalensi tertinggi terjadi pada daerah beriklim tropis dan subtropis, seperti Asia, Afrika, Australia, Eropa timur dan Rusia. Kejadian paramphistomiasis banyak terjadi di bagian dunia dengan curah hujan yang tinggi dan di padang rumput yang basah, hal ini berkaitan dengan siklus hidup cacing tersebut. Infeksi *Paramphistomum* sp. pada ternak biasa terjadi pada akhir musim hujan dan awal musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan optimal telur menjadi mirasidium terjadi pada awal musim hujan dan perkembangan di dalam tubuh siput mencapai tahap yang lengkap pada akhir musim hujan. Pelepasan serkaria pada hospes antara dimulai awal musim kemarau dengan curah hujan yang masih cukup tinggi dan menurun seiring makin rendahnya curah hujan (Ida, 2004).

Kelangsungan hidup *Paramphistomum* sp. memerlukan siput sebagai hospes antara. Dua famili siput penting yang bertindak sebagai hospes antara cacing ini adalah *Planorbidae* dan *Lymnaeidae*. Infeksi pada hospes definitif terjadi pada saat ternak memakan rumput atau meminum air yang mengandung metaserkaria. Metaserkaria mampu bertahan hidup di rerumputan sampai 12 minggu tergantung dari kondisi lingkungan. Metaserkaria masuk ke dalam saluran pencernaan, eksistasi, dan keluar cacing muda. Cacing muda menembus mukosa usus, bermigrasi ke rumen dalam waktu 4-6 minggu setelah infeksi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa bertelur di dalam rumen dan retikulum. Telur *Paramphistomum* sp. keluar bersama feses dan terjatuh di tempat yang basah dan lembab. Telur *Paramphistomum* sp. memerlukan waktu minimal 4 minggu pada suhu 17 °C untuk berkembang menjadi mirasidium dan mencari siput yang cocok sebagai hospes antara (Suharmita, 2014).

Infeksi *Paramphistomum* sp. terdiri atas dua fase, yaitu fase intestinal dan fase ruminal. Pada fase intensital, cacing muda menyebabkan pendarahan, bengkak serta merah di dalam *duodenum* dan *abomasum*. Pada fase ruminal, cacing akan menyebabkan perubahan epitel dari rumen yang mengganggu kapasitas resorpsi. Cacing muda *Paramphistomum* sp. yang menembus masuk ke dalam submukosa akan menyebabkan peradangan usus, nekrosis sel dan erosi vili-vili mukosa (Kamaruddin, 2005).

Cacing muda dalam jumlah banyak yang berada di dalam usus halus dapat menyebabkan kematian pada sapi. Cacing dewasa yang berada di dalam rumen dan retikulum akan menghisap bagian permukaan mukosa sehingga menyebabkan kepuatan pada mukosa. Papilla rumen pada sapi yang terinfeksi *Paramphistomum* sp. akan mengalami degenerasi sehingga perubahan tersebut mengakibatkan gangguan kerja rumen dan makanan tidak dapat dicerna dengan sempurna (Ida, 2004).

Schistosomiasis adalah penyakit disebabkan oleh sejenis cacing yang tergolong dalam genus *Schistosoma*. Cacing ini hidup di dalam pembuluh darah vena binatang vertebrata, khususnya mamalia di beberapa daerah tropik dan subtropik. Schistosomeorniasis atau dikenal dengan bilhaziasis, istilah ini digunakan untuk menghorrnati seorang sarjana Jerman yang bernama Theodore Bilharz, orang pertama yang menemukan cacing *Schistosoma haematobiurn* pada tahun 1852 (Desi, 1994).

Schistosoma sp. dapat menyebabkan penyakit Schistosomiasis. Pada sapi dan ternak lain seperti kerbau, kambing, kuda dan babi biasanya diinfeksi oleh spesies *Schistosoma japonicum*. Spesifik untuk sapi biasanya diinfeksi oleh cacing *Schistosoma bovis*. Ukuran dewasa jantan bisa mencapai (0,9-2,2)x0,05 mm,

sedangkan ukuran betina lebih besar mencapai (1,2-2,6)x0,03 mm memiliki oral dan *ventral sucker*. Sistem digestinya meliputi mulut, esophagus pendek dan berlanjut kedua buah ceca yang bersatu menjadi satu saluran pada bagian posterior tubuhnya. Cacing jantan pendek dan kekar, sedangkan betinanya lebih ramping dan panjang. Pada bagian ventral tubuh jantan terdapat gynecophoral canal (lipatan yang membentuk celah) dan memiliki 7 buah testis yang berderet dalam satu kolom. Betinanya memiliki ovarium memanjang terletak di tengah tubuh dan dapat bertelur hingga 1500 butir/hari. Telur *Schistosoma* sp. memiliki tonjolan di sebelah lateral, berwarna coklat dan berbentuk bulat berukuran 89 x 67 μ m (Sandjaja, 2007).

Trematoda genus *Fasciola*, *Fascioloides* dan *Dicrocoelium* dapat menyebabkan penyakit seperti fascioliasis (hepatik) atau penyakit cacing hati (PCH). Pada umumnya istilah fascioliasis digunakan untuk menggambarkan atau menentukan diagnosis penyakit cacingan yang menyerang ternak memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan spesies lainnya, yang disebabkan oleh cacing trematoda genus *fasciola*. Selain di jaringan hati, cacing dapat juga bertumbuh dan berkembang di jaringan lain, misalnya otak, limpa dan paru-paru (Subronto, 2007).

Cacing *Fasciola* sp. diklasifikasikan ke dalam filum platyhelminthes, kelas trematoda, ordo digenea, family fasciolidae, genus *fasciola*, spesies *Fasciola hepatica* dan *Fasciola gigantica*. *Fasciola gigantica* berukuran 25-27 x 3-12 mm, mempunyai pundak sempit, ujung posterior tumpul, ovarium lebih panjang dengan banyak cabang, sedangkan *Fasciola hepatica* berukuran 35 x 10 mm, mempunyai pundak lebar dan ujung posterior lancip. Telur *Fasciola gigantica* memiliki operkulum, berwarna emas dan berukuran 190 x 100 μ , sedangkan telur *Fasciola*

hepatica juga memiliki operkulum, berwarna kuning emas dan berukuran 150 x 90 μ (Baker, 2007).

Di daerah tropik seperti Indonesia fascioliasis paling sering disebabkan oleh spesies *Fasciola gigantica*, yang menyerang sapi, kambing, kerbau, kambing dan domba (Ida, 2004). Fasciolosis yang disebabkan oleh *Fasciola hepatica* dan *Fasciola gigantica* dianggap sebagai salah satu penyakit parasit yang paling penting di dunia. Fasciolosis terdistribusi di seluruh dunia dan prevalensi pada ruminansia diperkirakan berkisar hingga 90% di beberapa negara, misalnya Kamboja mencapai 85.2%, Wales 86%, Indonesia 80-90%, Tunisia 68.4%, dan Vietnam 30-90% (Nguyen, 2012).

Di Indonesia, fasciolosis merupakan salah satu penyakit ternak yang telah lama dikenal dan tersebar secara luas. Keadaan alam Indonesia dengan curah hujan dan kelembaban yang tinggi memungkinkan parasit seperti cacing berkembang dengan baik. Sifat hermiprodit *Fasciola* sp. juga akan mempercepat perkembangbiakan cacing hati tersebut. Cacing ini banyak menyerang ruminansia yang biasanya memakan rumput yang tercemar metaserkaria, tetapi dapat juga menyerang manusia. *Fasciolosis* sp. di Indonesia merupakan penyakit yang penting dengan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. *Fasciola gigantica* dan *Fasciola hepatica* tersebar di seluruh dunia dan penyebaran *Fasciola hepatica* lebih luas dibandingkan dengan *Fasciola gigantica* (Ditjennak, 2012).


Siklus hidup berbagai spesies *Fasciola* sp. umumnya memiliki pola yang sama, dengan variasi pada ukuran telur, jenis siput sebagai hospes perantaranya dan panjang waktu yang diperlukan untuk berkembang di dalam hospes tersebut, maupun pertumbuhannya dalam hospes definitif (Subronto, 2007).

Di dalam tubuh hospes yaitu ternak, ikan, dan manusia, cacing dewasa hidup di dalam hati dan bertelur di usus, kemudian telur keluar bersama dengan feses. Telur menetas menjadi larva dengan cilia (rambut getar) di seluruh permukaan tubuhnya yang disebut mirasidium. Larva mirasidium kemudian berenang mencari siput *Lymnea*. Mirasidium akan mati bila tidak masuk ke dalam siput air tawar (*Lymnea rubiginosa*). Setelah berada dalam tubuh siput selama 2 minggu, mirasidium akan berubah menjadi *sporosis*. Larva tersebut mempunyai kemampuan reproduksi secara aseksual dengan cara paedogenesis di dalam tubuh siput, sehingga terbentuk larva yang banyak. Selanjutnya *sporosis* melakukan paedogenesis menjadi beberapa redia, kemudian redia melakukan paedogenesis menjadi serkaria. Larva serkaria kemudian berekor menjadi metaserkaria, dan segera keluar dari siput dan berenang mencari tanaman yang ada di pinggir perairan misalnya rumput, tanaman padi atau tumbuhan air lainnya. Setelah menempel, metaserkaria akan membungkus diri dan menjadi kista yang dapat bertahan lama pada rumput, tanaman padi, atau tumbuhan air. Apabila tumbuhan tersebut termakan oleh hewan ruminansia maka kista tersebut dapat menembus dinding usus, kemudian masuk ke dalam hati, lalu ke saluran empedu dan menjadi dewasa selama beberapa bulan sampai bertelur dan siklus ini terulang kembali (Ditjennak, 2012).


b. Kelas Cestoda

Sapi dapat bertindak sebagai inang antara maupun inang definitif cestoda. Taksonomi dan klasifikasi cacing cestoda yang banyak ditemukan pada sapi adalah Kingdom Animalia, Filum Platyhelminthes, Kelas Eucestoda, dan Ordo Anoplocephalidea dengan Famili Anoplocephalidae, Genus *Moniezia*, dan spesies *Moniezia expansa* serta *Moniezia benedeni*. Selain itu terdapat juga Ordo Taeniidea dengan Famili Taeniidae dan genus *Taenia*. Cestoda pada ruminansia

diklasifikasikan menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok ruminansia sebagai inang definitif yang mengandung cacing dewasa dalam saluran pencernaannya (*Moniezia*) dan inang antara (*Cysticercus*, *Coenurus*, dan *Hydatid*) dalam jaringannya. Cestoda memiliki tubuh panjang, pipih dorsoventral, bersegmen, tanpa rongga badan maupun saluran pencernaan. Panjang tubuhnya beberapa milimeter hingga beberapa meter menurut jenisnya (Kusumamihardja, 1995).



Gambar 2.4. Morfologi cacing cestoda *Taenia solium* (CDC, 2013).



Keterangan:

A. Operkulum

B. Blastomer

Gambar 2.5. Morfologi telur cestoda *Taenia* sp. (CDC, 2013).

Tubuh pada cacing dewasa terdiri dari kepala (*skoleks*), leher, dan rantai segmen (*strobila*). Skoleks berbentuk globular, dilengkapi dengan empat buah batil hisap (*sucker*) atau *rostellum* yang kadang-kadang dilengkapi dengan baris kait, terlihat pada gambar 2.4. (CDC, 2013). Bagian organ inilah yang berguna untuk menempel pada permukaan mukosa usus inang. *Strobila* biasanya terdiri dari segmen muda yang terletak dekat dengan leher, segmen dewasa di pertengahan *strobila*, dan segmen *gravid* pada bagian posterior *strobila*. Segmen dewasa ditandai dengan adanya perkembangan organ reproduksi jantan maupun betina secara lengkap, sedangkan segmen *gravid* ditandai dengan degenerasi organ reproduksi yang kemudian diganti dengan kantung-kantung yang penuh berisi telur. Telur cestoda memiliki ciri adanya embrio yang memiliki enam buah kait yang disebut *Oncosphere*. Seluruh permukaan tubuhnya berupa tegumen yang antara lain berguna untuk menyerap nutrisi yang berasal dari nutrisi inang. Sistem ekskretori pada cestoda mirip pada trematoda yang dilengkapi dengan dua saluran ekskretori di bagian lateral tubuh yang memiliki cabang pada setiap segmennya (Kusumamihardja, 1995).

Cacing cestoda *Moniezia* sp. dan *Taenia* sp. merupakan cacing cestoda yang hidup dalam usus kecil sapi dan kerbau. *Taenia saginata* adalah cestoda yang menginfeksi ruminansia. Cacing ini disebut juga cacing tanpa senjata karena scolexnya tidak mempunyai kait. Ukurannya lebih panjang daripada *Taenia solium*, biasanya sekitar 5-10 m dan hidup di usus halus. Untuk perkembangan yang ekstrim bisa mencapai panjang 25 m hampir tiga kali panjang usus manusia. Telur cacing bisa dibawa oleh lalat baik secara internal ataupun eksternal menempel di tubuh lalat. Lalat rumah seperti *Musca domestica* hanya menelan telur yang kecil. Organisme lain seperti kumbang dan cacing tanah juga kemungkinan bisa membawa telur cacing ini (Sandjaja, 2007).

Hampir semua cestoda dalam siklus hidupnya memerlukan inang antara. Cacing dewasa dalam usus inang akan melepaskan segmen gravid yang kemudian keluar secara pasif bersama dengan tinja. Segmen gravid dalam tinja akan tersebar dan mengkontaminasi lapangan penggembalaan. Jika di area ini terdapat inang antara yang cocok, yaitu jenis tungau tanah (*Oribatidae*) dan kemudian memakan segmen gravid yang mengandung telur cestoda maka akan berkembang menjadi stadium larva (*Cysticercoid*) dalam rongga tubuhnya. Inang definitif akan terinfeksi jika memakan rumput yang terkontaminasi oleh stadium *cysticercoid* (Kusumamihardja, 1995).

c. Kelas Nematoda

Nematodiasis adalah penyakit akibat infeksi cacing nematoda dalam tubuh. Cacing nematoda atau disebut juga cacing gilig termasuk kelompok cacing yang hidup di dalam saluran pencernaan yang akan mengisap sari makanan, darah, cairan tubuh atau memakan jaringan tubuh. Dalam jumlah banyak dapat menyebabkan sumbatan usus atau menyebabkan terjadinya berbagai macam reaksi tubuh akibat

dari toksin yang dihasilkan oleh cacing ini. Infeksi dari cacing ini menyebabkan penurunan produksi ternak berupa turunnya bobot badan, terhambatnya pertumbuhan, turunnya produksi susu pada ternak yang menyusui dan turunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Tanda klinis hewan yang terinfeksi cacing adalah kurus, bulu kusam, tidak nafsu makan, diare terutama pada musim hujan serta kematian yang akut pada hewan-hewan muda (Beriajaya, 2004).

Nematoda adalah jenis cacing yang banyak menginfeksi ruminansia karena memiliki siklus hidup langsung. Jenis-jenis tersebut adalah kelompok *strongylid*, *ascarid*, *trichurid*, dan *capilarid* (Rizqi, 2009). Cacing nematoda merupakan anggota dari filum nemathelminthes. Terdapat sekitar 10.000 jenis nematoda yang hidup di dalam segala jenis habitat mulai dari tanah, air tawar, air asin, tanaman, hewan dan manusia (Vivi, 2015).

Secara umum nematoda berbentuk panjang, silindris, dan kedua bagian ujungnya meruncing. Tubuhnya tidak bersegmen dan diselaputi oleh kutikula yang biasanya relatif tebal. Lapisan kutikula ini juga terdapat pada rongga mulut, esofagus, rektum, dan bagian distal saluran genital. Beberapa spesies memiliki perluasan kutikular tipis khususnya pada bagian servikal yang disebut alae (*ascarid*). Sebagian besar nematoda jantan memiliki perluasan kutikular pada bagian ekstremitas posterior. Nematoda memiliki mulut di bagian anterior, kadang-kadang sub dorsal atau sub ventral dikelilingi oleh bibir. Pada kelompok yang tidak mempunyai bibir berkembang struktur sekunder yaitu yang disebut daun mahkota yang halus mengelilingi bagian mulut. Pada bagian mulut yang disebut *buccal capsule* diselaputi dinding kutikular tebal, beberapa spesies memiliki gigi atau menyerupainya. Dari mulut menuju ke faring, esofagus yang mengandung tiga buah kelenjar esofagial

yang mensekresi enzim cerna. Pada beberapa spesies antara esofagus dan intestin dilengkapi dengan katup (Rizqi, 2009).




Keterangan:

A. Mulut

B. Ekor

Gambar 2.6. Morfologi cacing nematoda *Ascaris lumbricoides* (Rizqi, 2009).



Keterangan:

A. Operkulum

B. Blastomer

Gambar 2.7. Morfologi telur nematoda *Ascaris lumbricoides* (Rizqi, 2009).

Telur nematoda memiliki kulit yang tersusun dari kapsul kitin yang homogen dan transparan. Bagian luar telur terdapat permukaan eksternal yang mempunyai sejumlah lapisan protein yang halus, kasar atau seragam dengan membentuk pola. Bagian dalam telur terdapat lapisan lipid internal (*membrane vitelline*) yang tipis dan

terdapat cairan yang mengisi ruang yang memisahkan kapsul dan embrio di dalam telur (Georgi, 1969).

Ascaris lumbricoides dewasa betina berukuran 20-50 cm dengan diameter $\pm 3-6$ mm, jantan berukuran 15-30 cm x 2,4 mm. Ekor cacing jantan melingkari bagian bawah dan mempunyai dua *papila ventrolateral* yang membujur dan memanjang di sebelah anterior hingga bagian ekor di luar pembukaan kloaka (Nezar, 2014). Telur berdinding tebal, berbintik-bintik dan agak bulat berukuran 68-101 x 60-86 mikron (Rahayu, 2015).

Cacing bungkul (*Oesophagostomum* sp.), cacing terdapat dalam kolon sapi, domba, kambing dan babi, larva membentuk bungkul. Ukuran rata-rata cacing dewasa, pada betina 13,8 – 19,8 mm dan jantan 11,2 – 14,5 mm, memiliki kapsula bukalis kecil dan korona radiata jelas. Telur elips, blastomer memenuhi telur, cangkang luar tipis dan berukuran 70-76 x 36-40 mikron (Rahayu, 2015). Infeksi oleh cacing *Oesophagostomum* sp. ditandai dengan adanya nodule atau bintil-bintil. Cacing *Oesophagostomum* sp. yang dapat menginfeksi sapi adalah *O. radiatum* (Subronto, 2007).

Cacing kait (*Bunostomum* sp.) Terdapat dalam usus halus. Cacing jantan memiliki panjang 18 mm dan betina 28 mm. Kapsula bukalis tumbuh baik, korona radiata tidak ada tetapi terdapat alat penggigit berupa gigi yang terdapat di dasar kapsula bukalis bagian ventral. Ujung anterior (kepala) membengkok ke dorsal sehingga cacing ini bentuknya seperti kait. *Bunostomum* sp. mempunyai saluran kerongkongan yang sempit. Telur berbentuk elips berukuran 79-117 x 47-70 mikron (Rahayu, 2015). Cacing *Bunostomum* sp. yang dapat menginfeksi sapi adalah *B. phlebotomum* atau *B. radiatum* (Ida, 2004).

Haemonchus placei merupakan cacing lambung yang besar pada sapi. Cacing dewasa berukuran panjang jantan 10-20 mm dan diameter 400 mikron. Ukuran panjang cacing betina adalah 18-30 mm dan diameter 500 mikron dengan telur berukuran 62-90 x 39-50 mikron. Cacing lambung ini sangat berbahaya, karena selain menghisap darah, daya perkembangbiakannya sangat tinggi. Hewan dapat mengalami anemia akibat perdarahan akut dimana cacing menghisap darah 0,05 ml perhari hingga kematian. Karakteristik telur dengan bentuk oval dan memiliki banyak blastomer (Junquera, 2007).

Cacing rambut (*Trichostrongylus* sp., *Cooperia* sp., *Ostertagia* sp., *Nematodirus* sp.). Kelompok cacing ini sangat kecil dan terdapat di usus halus. Tebalnya sama dengan rambut sedangkan panjangnya tidak lebih dari 10 mm, cacing rambut termasuk satu famili dengan cacing lambung yang tidak mempunyai *korona radiata*, kapsula bukalis dan gigi. Pada cacing jantan *Trichostrongylus* sp. panjangnya 2-6 mm, berdiameter 50-60 mikron. Panjang cacing betina 3-8 mm dan diameter 55-70 mikron. Telur berbentuk elips, berselubung tipis bersegmen dan cangkang tipis, dengan ukuran 71-107 × 41- 54 mikron (Rahayu, 2015). Cacing ini sering disebut cacing rambut, cacing perusak atau cacing diare hitam. *Trichostrongylus axei* terdapat pada abomasum dan kadang-kadang pada usus halus sapi, ruminansia lain, babi, kuda dan mamalia lain di seluruh dunia (Junquera, 2007).

Habitat nematoda dewasa di dalam saluran gastrointestinal inang definitif. Telur yang diproduksi oleh cacing betina dewasa keluar bersama tinja. Telur berembrio akan menetas di luar tubuh inang menjadi stadium larva 1 (L1) yang berkembang dan ekdisis menjadi larva 2 (L2). Selanjutnya L2 mengalami ekdisis menjadi larva 3 (L3) namun kutikulanya tidak dilepas setelah ekdisis sebelumnya sehingga L3 memiliki kutikula rangkap. Selanjutnya L3 disebut sebagai stadium

larva infeksi. Waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan telur menjadi larva infeksi tergantung kondisi lingkungan. Dalam kondisi yang optimal (kelembaban tinggi dan temperatur hangat) perkembangannya membutuhkan sekitar tujuh sampai sepuluh hari. Jika temperatur lebih rendah proses perkembangan tersebut memerlukan waktu yang lebih lama. Ruminansia terinfeksi nematoda setelah menelan L3. Sejumlah L3 tertelan ketika inang merumput, selanjutnya mengalami pelepasan kutikula di dalam abomasum atau usus halus. Kelompok trichostrongylid melakukan penetrasi ke dalam membran mukosa abomasum (*Haemonchus* dan *Trichostrongylus*) atau masuk ke dalam kelenjar lambung (*Ostertagia*) dan ekdisis menjadi L4 selama sepuluh hingga empat belas hari. Selanjutnya L4 ekdisis menjadi L5 sebagai cacing muda. Sebagian besar trichostrongylid mulai memproduksi telur sekitar tiga minggu setelah infeksi (Rizqi, 2009).

D. Tinjauan Umum Tentang Kotoran (Feses) Sapi

Limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu aktivitas manusia atau proses alam yang tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi, tetapi memiliki dampak negatif. (Djaja, 2008). Limbah organik merupakan sisa hasil aktivitas kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan yang terbuang dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebelum diolah. Limbah peternakan adalah semua buangan dari usaha peternakan yang bersifat padat, cair maupun gas. Limbah padat adalah semua limbah yang berbentuk padatan atau berada dalam fase padat. Dalam usaha peternakan limbah padat berasal dari feses ternak, rumput sisa pakan ternak, ternak yang mati, isi rumen dan isi usus hasil pemotongan. Keberadaan limbah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sebagai penyebab polusi dan sumber penyakit (Mashur, 2001).

Limbah peternakan sebagian besar bahan organik (Hifizah, 2012). Bahan organik adalah bahan-bahan yang berasal dari organisme hidup baik tumbuhan maupun hewan yang mengandung senyawa karbon. Bahan organik diuraikan menjadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, asam nukleat dan asam organik. Bahan organik dapat didekomposisi dengan mudah oleh mikroorganisme seperti bakteri, fungi dan aktinomisetes yang terdapat pada feses sapi (Mashur, 2001).

Kotoran ternak banyak mengandung mikroba penghancur bahan organik. Mikroba ini dibagi menjadi dua golongan yaitu *Mesofilia* dan *Thermofilia*. Dari kedua golongan tersebut adalah bakteri dalam jumlah terbanyak. Bakteri dengan memanfaatkan O_2 dan H_2O merombak bahan organik material pada fermentasi primer. Perombakan menghasilkan ammonia, panas, H_2O , dan CO_2 . Temperatur timbunan terus meningkat sampai mencapai puncaknya. Pada saat ini O_2 berkurang banyak sehingga aktivitas mikroba menurun. Periode fermentasi sekunder menghasilkan asam, CO_2 , H_2O , dan pengikatan N, P, dan K oleh mikroba. Setelah temperatur stabil maka proses pengomposan dianggap selesai (Salman, 2003).

Kotoran ternak merupakan hasil buangan metabolisme (tinja ternak yang bercampur dengan urin), apabila tidak dikelola secara benar dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Kotoran ternak adalah sumber protein dan mineral yang dapat digunakan sebagai media cacing tanah (Permata, 2006). Nutrisi kotoran sapi, kuda, kambing dan ayam dapat dilihat pada tabel 2.1. (Mashur, 2001).

Tabel 2.1. Kandungan Nutrisi Kotoran Sapi, Kuda, Kambing dan Ayam (Mashur, 2001).

Jenis ternak	Kadar air	Bahan Organik	Protein kasar	Lemak	Serat kasar	N	P	K	C/N
	-----%-----								
Sapi	15,37	45,89	10,62	0,54	16,21	1,70	0,49	1,11	15,69
Kuda	17,74	65,55	13,20	0,14	25,73	2,11	0,74	1,03	18,06
Kambing	19,69	73,35	17,84	0,92	32,90	2,85	0,41	1,39	15,37
Ayam	23,87	72,29	24,93	1,25	16,53	3,99	1,13	1,50	10,53

Setiap hari seekor sapi makan sejumlah ransum. Ransum dicerna dalam saluran pencernaan dan sebagian zat gizi ransum diserap tubuh ternak. Ransum yang tidak dicerna dikeluarkan tubuh dalam bentuk feses. Keluaran ini disebut kotoran ternak. Kotoran ternak mengandung sejumlah zat gizi yang tidak diserap oleh tubuh ternak (Salman, 2003).

Isi rumen seekor sapi berkisar antara 10-20% dari bobot badannya. Isi rumen sapi mengandung protein kasar 9,63%, lemak kasar 1,81%, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 38,40%, serat kasar 24,60%, abu 16,76%, Ca 1,22%, P 0,29%, vitamin B dan K serta memiliki pH 6,5-7,0. Seekor sapi menghasilkan feses 36-45 kg/hari dengan total bahan padat 18-30%, pH 6,6-8,6 dan nisbah C/N 18. Feses sapi mengandung sekitar 15% protein kasar (Sihombing, 1972 dalam Mashur, 2001).

Agar kotoran sapi tidak terbuang dengan sia-sia, maka kotoran ini dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang baik untuk tanaman. Di beberapa tempat kotoran ternak seperti feses sapi perah sering dipakai memupuk tanaman dan dibuat kompos. Pembuatan pupuk organik tidak terlepas dari proses pengomposan yang diakibatkan oleh mikroba yang berperan sebagai pengurai atau dekomposisi sebagai limbah organik yang dijadikan bahan pembuat kompos (Isroi, 2008).

Kompos banyak diperlukan untuk pemupukan tanaman di kebun bunga, rumah kaca, dan di tempat lain. Pengomposan adalah proses biologis dalam yang mana mikroorganisme mengubah material organik seperti kotoran sapi menjadi materi mirip tanah yang disebut kompos. Kompos sangat berbeda dari material awalnya (Salman, 2003).

Memanfaatkan limbah sapi yang berupa kotoran atau feses diolah menjadi kompos atau pupuk organik sangat berguna bagi tanaman dan sangat membantu menanggulangi pencemaran lingkungan hasil limbah kotoran sapi tersebut. Pengkomposan adalah proses penguraian limbah padat organik menjadi materi yang stabil oleh mikroorganisme dalam kondisi terkendali. Proses penguraian tersebut dilakukan oleh mikroorganisme yang memerlukan udara atau oksigen sehingga tidak timbul bau yang menyengat. Untuk mengoptimalakan kerja mikroorganisme tersebut diperlukan beberapa pengendalian antara lain pengendalian terhadap kelembaban, aerasi, dan temperatur untuk menghindari terjadinya proses yang dapat menyebabkan bau busuk (Hifizah, 2012).

E. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)

Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai dan dianggap tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan (Nandi, 2005). Sampah organik merupakan limbah yang juga dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, jika tidak dimanfaatkan secara baik. Sampah salah satu masalah penyebab tidak seimbangnya lingkungan hidup yang umumnya terdiri dari komposisi sisa makanan, daun-daun dan lain-lain. Sampah organik ini juga dapat dimanfaatkan sebagai biogas, karena sampah organik ini dapat menghasilkan gas

yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dan sebagai pupuk organik yang baik (Winarto, 2010).

Didalam Standar Nasional Indonesia atau SNI 03-3241-1994, pada pengertian, yang dimaksudkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah yang berupa tempat untuk menyingkirkan atau mengkarantinakan sampah kota. Kriteria lokasi TPAS harus memenuhi persyaratan/ketentuan hukum, pengelolaan lingkungan hidup dengan analisis mengenai dampak lingkungan, serta tata ruang yang ada (Retta, 2014). Berdasarkan data dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun 2014, diketahui bahwa komposisi sampah kota Makassar adalah 70,43% sampah organik dan 29,57% merupakan sampah anorganik.

Secara geografis kota Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat $119^{\circ}18'27,97''$ $119^{\circ}32'31,03''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}00'30,18''$ - $5^{\circ}14'6,49''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km^2 dengan batas utara Kabupaten Pangkajene Kepulauan, batas selatan kabupaten Gowa, batas timur, kabupaten Maros dan batas barat selat Makasar. Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT, ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20°C sampai dengan 32°C . Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Dengan jumlah penduduk lokal mencapai sekitar 1,3 juta jiwa, kota Makassar menghasilkan sekitar 3800 m^3 sampah perkotaan setiap harinya. Padahal kapasitas maksimum dari TPAS Tamangapa hanya sekitar $2,800 \text{ m}^3$ sampah perkotaan setiap harinya. Sebagian besar sampah berasal dari aktivitas

penduduk seperti di pasar, pusat perdagangan, rumah makan, dan hotel (Irwan, 2013).

TPAS Tamangapa Makassar terletak di Kecamatan Manggala, Kelurahan Tamangapa pada koordinat 5,1752°LS 119,4935°BT, ± 15 km dari pusat kota Makassar. TPAS Tamangapa dibuka pada tahun 1993 dan diharapkan akan tetap menjadi satu-satunya lokasi pembuangan sampah padat perkotaan (*Municipal Solid Waste*) hingga tahun 2016. Lahan TPAS dibangun pada tahun 1993 dan terletak pada kemiringan lereng dan bukit. Lahan TPAS ini telah mengalokasikan sekitar 14,3 Ha Lahan dari tahun 1993-2014. Namun karena semakin meningkatnya volume sampah di kota Makassar maka ada penambahan lahan untuk beberapa zona sehingga ditahun 2015 lahan TPAS Tamangapa berlokasi sekitar 16,8 Ha (Sigit, 2015).

F. Kondisi Makan Sapi

Sampah organik dapat dimanfaatkan secara langsung, tanpa melalui proses tertentu, misalnya untuk pakan ternak, khususnya sapi. Sampah organik juga dapat diproses untuk berbagai keperluan diantaranya adalah pakan ternak dan kompos (Haeruddin, 2012).

Banyaknya sampah organik membuat tingginya minat peternak untuk menggembalakan ternak sapi di TPAS. Sapi-sapi ini dapat membantu mereduksi timbunan sampah yang ada di TPAS. Sampah organik yang terfermentasi adalah makanan sapi-sapi tersebut. Adanya sapi yang digembalakan di TPAS memberikan nilai positif untuk mereduksi timbunan sampah di TPAS tersebut. Sapi di TPAS memakan sampah organik yang tertimbun bersama sampah lainnya. Sampah di TPAS mengalami fermentasi oleh bakteri menjadi silase yang cocok bagi perkembangan bobot badan sapi. Sapi di TPAS dipelihara secara semiintensif,

meskipun dipelihara secara semiintensif, sapi TPAS digembalakan di tempat sampah bukan padang rumput (Nezar, 2014).




Gambar 2.8. Kondisi penggembalaan sapi di TPAS Tamangapa Makassar (Dokumen pribadi, 2016).



Gambar 2.9. (a) Kondisi kandang sapi dewasa dan (b) Kondisi kandang sapi khusus untuk menyusui di TPAS Tamangapa Makassar (Dokumen pribadi, 2016).

G. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan model eksploratif untuk menentukan genus cacing parasit pada feses sapi yang berada di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekitar lingkungan tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa yang terletak di Jalan Tamangapa Jalur Antang Raya Kota Makassar dan laboratorium Parasitologi Balai Besar Veteriner (BBVET) Maros.

B. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan feses sapi yang berada di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah feses sapi yang berada di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki variabel tunggal yaitu jenis cacing parasit pada feses sapi.

D. Defenisi Operasional Variabel

1. Feses sapi merupakan hasil buangan sisa hasil pencernaan sapi berupa kotoran.
2. Identifikasi telur cacing pada feses merupakan salah satu cara mengetahui adanya telur cacing pada sapi.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode secara sengaja atau *Purposive Sampling*.

F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop trinokuler, tabung reaksi, kantong plastik, botol pot plastik, pipet pasteur (pipet tetes), sentrifuge, sendok, tabung sentrifuge, neraca analitik, rak tabung, gelas ukur, timer, gelas kimia, mortar, timbangan, saringan, freezer, *hand scon*, kaca preparat (*object glass*), kaca penutup (*deck glass*) label dan alat tulis.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel berupa feses sapi, aquades, garam (NaCl) jenuh, kapas dan formalin 10%.

G. Prosedur Kerja

1. Pengambilan Sampel Feses

Feses sapi diambil masing-masing secukupnya menggunakan kantong plastik di TPAS baik di kandang atau tempat sapi digembalakan, segera setelah sapi

defekasi, memasukkan kapas yang telah diberi formalin 10% kedalam kantong plastik yang berisi sampel untuk mencegah menetasnya telur selama pengangkutan dan penyimpanan. Memberikan setiap sampel tanda atau label, kemudian sampel dimasukkan dalam freezer hingga dilakukan identifikasi (Nezar, 2014).

2. Identifikasi Telur Cacing

Identifikasi dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Identifikasi secara kualitatif dengan menggunakan metode apung (*Flotation methode*) (Vivi, 2015). Sedangkan secara kuantitatif menggunakan metode *Mc. Master* (Nezar, 2014).

a. Uji Kualitatif

Metode apung (*Flotation methode*) digunakan untuk jenis telur cacing parasit yang dapat mengapung dengan menggunakan larutan garam jenuh (Tantri, 2013). Mengambil sampel feses sebanyak 2 gram, meletakkan dalam botol pot plastik dan menambahkan garam jenuh sebanyak 30 ml, mengaduk feses dan larutan pengapung sampai homogen dengan menggunakan mortar. Setelah campuran homogen, menyaringnya menggunakan saringan dan memasukkan hasil saringan ke dalam tabung sentrifuge sampai volume 15 ml, kemudian sentrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Menambahkan lagi sedikit garam jenuh sampai permukaan cairan tepat di atas permukaan tabung. meletakkan kaca penutup (*deck glass*) di atas tabung, membiarkan selama 5 menit. Setelah itu, mengambil kaca penutup (*deck glass*) letakkan ke dalam kaca preparat (*object glass*) dan periksa di bawah mikroskop untuk melihat morfologi telur lebih jelas (Vivi, 2015). Jenis cacing diidentifikasi dengan manual book dan buku identifikasi (Zajac dan Conboy, 2012).

b. Uji Kuantitatif

Cara perhitungan kuantitas telur cacing dilakukan dengan menggunakan metode *Mc Master*. Metode *Mc Master* dapat menentukan tingkat keparahan infeksi telur cacing parasit dari hasil perhitungan telur per gram feses (EPG) dengan menggunakan kamar hitung *Mc Master* (Mukti, 2006). Menimbang Feses sapi sebanyak 2 gram dan masukkan ke dalam botol pot plastik, menambahkan aquadest sebanyak 28 ml, mengaduk feses, aquadest sampai homogen dengan menggunakan mortar. Jika feses keras dan kering, membiarkan dalam beberapa menit sebelum dilakukan pengadukan. Kemudian mengambil tabung sentrifuge dan mengisinya dengan 1 ml larutan NaCl dengan menggunakan pipet pasteur (pipet tetes) kemudian menambahkan 1 ml campuran feses yang telah dilutkan dan menghomogenkannya, setelah itu memipet ke dalam kamar *Mc. Master* dan didiamkan selama 20 menit supaya telur dan kista mengapung ke permukaan. Memeriksa kamar *Mc. Master* dengan menggunakan mikroskop dan menfokuskan pada tiap-tiap kolom dimana dalam 1 kamar *Mc. Master* berisi 6 kolom. menghitung jumlah telur yang terlihat pada tiap-tiap kolom. EPG dihitung dengan rumus:

$$EPG = 2n \times 50$$

Keterangan : n : Jumlah telur cacing yang terhitung dalam kamar hitung

EPG : Egg per gram (telur cacing per gram) feses (Nezar, 2014).


3. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif. Prevalensi dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini (Budiharta, 2002):

$$\text{Prevalensi} = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan: F: Jumlah sampel yang positif.

N: Jumlah dari seluruh sampel yang diperiksa.



BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

1. Identifikasi Jenis Telur dan Larva Cacing pada Feses Sapi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Makassar

Sampel berupa feses sapi yang diambil langsung dari kandang yang berada disekitar TPAS yaitu di Lingkungan Kassi Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala. Jenis ternak sapi yang dipelihara oleh masyarakat daerah tersebut adalah sapi Ongole, pengambilan sampel dilakukan sebanyak 2x dan sampel yang diperoleh adalah sebanyak 25 sampel. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi pada 25 sampel feses sapi, sampel yang positif terdapat telur cacing sebanyak 3 sampel dan ditemukan 2 jenis telur cacing, tertera pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Jenis telur cacing yang ditemukan dan hasil identifikasi pada feses sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar.

No.	Gambar	Keterangan
1.		Telur <i>Oesophagostomum</i> sp. Perbesaran 100x/1,25 a. Blastomer b. Operkulum



2. Prevalensi

Menurut (Budiharta, 2002) Prevalensi infeksi dihitung dengan menggunakan rumus (Lampiran 6.), prevalensi infeksi sebesar 12 %. Identifikasi telur cacing dilakukan dengan menggunakan metode apung (*Flotation methode*), dengan cara mengambil sampel feses sebanyak 2 gram, meletakkan dalam botol pot plastik dan menambahkan garam jenuh sebanyak 30 ml, mengaduk feses dan larutan pengapung sampai homogen dengan menggunakan mortar. Setelah campuran homogen, menyaringnya menggunakan saringan dan memasukkan hasil saringan ke dalam tabung sentrifuge sampai volume 15 ml, kemudian sentrifuge dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Menambahkan lagi sedikit garam jenuh sampai permukaan cairan tepat di atas permukaan tabung. meletakkan kaca penutup (*cover glass*) di atas tabung, biarkan selama 5 menit. Setelah itu, ambil kaca penutup (*cover glass*) letakkan ke dalam kaca preparat (*object glass*) dan periksa di bawah mikroskop (Vivi, 2015).

B. Pembahasan

Pengambilan feses secara langsung dari rectum sapi atau diambil sebelum feses jatuh ke tanah akan sangat beresiko. Jadi, pengambilan sampel feses yang paling aman adalah mengambil yang sudah jatuh ke tanah kurang dari 3 jam setelah sapi mengalami defekasi. Struktur feses sapi di TPAS agak lembek dan warnanya gelap. Jika dilihat fisik feses terlihat tidak ada rerumputan yang terkandung dalam feses, kadar seratnya sedikit namun aromanya tidak terlalu menyengat.

Identifikasi sampel berupa feses sapi pada penelitian ini menggunakan metode apung (*Flotation methode*) dimana sampel feses diapungkan menggunakan larutan garam jenuh. Prinsip kerjanya berdasarkan perbandingan berat jenis telur cacing dan larutan. Jika berat jenis telur cacing lebih ringan daripada berat jenis larutan maka telur cacing akan mengapung pada permukaan larutan. Telur cacing terindikasi mengapung ini yang bisa diamati pada metode flotasi (Nezar, 2014). Pada metode flotasi menggunakan larutan garam jenuh. Garam jenuh berfungsi mengapungkan telur cacing dengan berat jenis lebih ringan daripada berat jenis larutan. Selain itu, garam jenuh berfungsi memisahkan partikel besar pada feses sehingga memudahkan untuk diamati. Setelah sampel feses sapi positif terdapat telur cacing, sampel kemudian ditentukan jumlah telur cacing per gram (EPG) feses sapi menggunakan metode *Mc Master*.

Dalam penelitian ini dalam melakukan pengambilan sampel menggunakan kantong plastik dan sebagai tempat sampel feses sementara dan diawetkan dengan menggunakan formalin 10 %. Untuk mengamati telur cacing pada preparat yang telah terapung menggunakan mikroskop trinokuler, sampel dihomogenkan di dalam tabung reaksi sedangkan untuk memisahkan antara supernatant dan endapan yang diamati menggunakan sentrifuge sedangkan kaca preparat (*object glass*) dan kaca

penutup (*deck glass*) berfungsi untuk meletakkan sampel yang sudah menjadi preparat yang siap diamati.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan identifikasi sampel sebanyak 25 feses sapi, terdapat 3 sampel yang positif ditemukan 2 jenis telur cacing yaitu *Oesophagostomum* sp. dan *Cooperia* sp. sedangkan penentuan jumlah telur cacing per gram (EPG) hasilnya tak ada satupun telur yang di peroleh atau negatif dikarenakan sapi tersebut hanya mengalami infeksi rendah, dengan angka prevalensinya sebesar 12%. Berdasarkan keterangan standar infeksi, infeksi dapat dibedakan yaitu infeksi ringan jika jumlah telur 1-499 butir tiap gram, infeksi sedang ditunjukkan jika jumlah telur 500-5000 butir tiap gram dan infeksi berat ditunjukkan jika telur yang dihasilkan >5000 butir tiap gram feses ternak (Vivi, 2015).

Prevalensi infeksi cacing pada sapi disetiap wilayah berbeda-beda. Perbedaan tingkat prevalensi dapat disebabkan oleh perbedaan geografis yang mempengaruhi keberadaan siput sebagai hospes antara (Mage, 2002). Selain geografis, prevalensi infeksi cacing pada ternak juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain manajemen pemeliharaan ternak, umur ternak, penggunaan anthelmintik, pendidikan dan status ekonomi peternak (Raza, 2009). Selain itu menurut (Levine, 1990) prevalensi parasit pada ternak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain letak geografis, kondisi lingkungan, kualitas kandang, sanitasi dan higiene, kepadatan kandang, temperatur, humiditas, dan vegetasi.

Sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar dipelihara secara semiintensif, dimana sapi digembalakan di TPAS pada pagi hingga sore hari kemudian dikandangkan pada malam harinya, sehingga lebih rentan terinfeksi cacing parasit. Dari segi pakan, sapi di TPAS Tamangapa memakan sampah organik sebagai asupannya. Hal tersebut adalah salah

satu faktor utama jalur penularan infeksi cacing. Sapi-sapi yang digembalakan di TPAS Tamangapa hanya dipotong saat pasokan dari daerah kurang.

Pada waktu pengambilan sampel di kandang yang berada di sekitar TPAS yaitu di Lingkungan Kassi Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala, pengambilan sampel dilakukan sebanyak 2 kali pengambilan, pengambilan pertama dilakukan pada tanggal 22 Maret 2016 sedangkan pengambilan sampel ke dua dilakukan pada tanggal 12 April 2016. Indonesia beriklim tropis dan memiliki dua tipe musim, yaitu kemarau dan hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei-November dan musim hujan terjadi pada bulan Desember-April. Musim kemarau sangat berhubungan dengan tingkat kejadian cacingan yang cukup rendah karena pada musim kemarau dapat mengganggu perjalanan siklus hidup cacing, kondisi tanah yang kering dan atmosfer yang cukup panas menyebabkan feses cepat mengering sehingga telur cacing menjadi rusak dan mati. Berbeda dengan yang terjadi pada musim hujan atau kondisi lingkungan lembab dan basah karena manajemen pemeliharaan yang kurang baik. Kondisi tersebut menjadi media yang cocok untuk perkembangan telur cacing menjadi bentuk yang siap masuk ke dalam tubuh sapi sehingga terjadi tingkat cacingan yang cukup tinggi pada musim hujan. Suhu tinggi dan kekeringan di musim panas dapat secara efektif membunuh telur dan larva di lingkungan, ini sering mengakibatkan berkurangnya transmisi parasit selama periode ini. Selain itu, pergantian musim antara panas dan basah akan lebih buruk terhadap nematoda yang hidup bebas di lingkungan daripada saat musim dingin (Sayuti, 2007).

Rendanya prevalensi cacing yang ditemukan pada sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) tamangapa makassar, disebabkan karena jumlah sampel yang di gunakan sedikit yaitu 25 sampel. Novese Tantri pada

tahun 2013 menggunakan 80 sampel feses sapi untuk mengetahui Prevalensi dan Intensitas Telur Cacing Parasit pada Feses Sapi (*Bos sp.*) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pontianak Kalimantan Barat sedangkan Muhammad Rofiq Nezar di tahun 2014 menggunakan 64 sampel untuk mengetahui jenis cacing pada feses sapi di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang.

Berdasarkan hasil prevalansi cacing yang sedikit belum dapat dipastikan bahwa infeksi cacing pada sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) tamangapa makassar, infeksiunya rendah, karena sapi yang diambil fesesnya sebagai sampel memiliki umur yang berkisar 2 sampai 5 tahun. Menurut penelitian (Darmono, 1983) menunjukkan ternak ruminansia yang sudah dewasa atau pernah mengalami infeksi cacing dewasa di dalam rumennya akan kebal terhadap infeksi baru (reinfeksi). Menurut (Taylor, 2015) klasifikasi *Oesophagostomum sp.* adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Nematoda
Classis	: Secernentea
Ordo	: Strongylida
Familia	: Strongyloidae
Genus	: <i>Oesophagostomum</i>
Spesies	: <i>Oesophagostomum dentatum</i>
	: <i>Oesophagostomum quadrispinulatum</i>
	: <i>Oesophagostomum brevicaudum</i>
	: <i>Oesophagostomum longicaudatum</i>
	: <i>Oesophagostomum georgianum</i>
	: <i>Oesophagostomum granatensis</i>

Cacing *Oesophagostomum* sp. (cacing bungkul) berparasit di dalam usus besar. Dinamakan cacing bungkul karena bentuk larva dari cacing ini membentuk bungkul dan gejala yang timbul dengan adanya bungkul-bungkul di dalam *colon* (usus besar) (Rahayu, 2015). Larvanya tinggal dalam dinding usus sedangkan cacing dewasa berparasit pada *colon* (usus besar) dan kadang-kadang pada *sekum* (usus buntu) (Levine, 1990). Siklus hidup cacing ini berawal dari keluarnya telur bersama tinja yang biasanya menetas dalam waktu 20 jam, dan larva menjadi larva infeksiif dicapai dalam waktu 5-6 hari kemudian. Infeksi terjadi melalui oral yaitu pada saat makan, minum atau saat menjilati bulunya yang tercemar larva infeksiif. Larva yang tertelan ini akan mengalami ekdisis di usus halus selanjutnya menjadi dewasa pada kolon (Kertawirawan, 2012). Gejala klinis akibat infeksi cacing ini tidak begitu jelas, namun hewan menjadi kurus, kotoran berwarna hitam, lunak bercampur lendir dan kadang-kadang terdapat darah segar. Dalam keadaan kronis sapi memperlihatkan diare dengan feses berwarna kehitaman, nafsu makan menurun, kurus, anemia, hipoalbuminemia dan hipoproteinemia (Noble, 1989).

Menurut (Anderson, 2000) klasifikasi *Cooperia* sp. adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Nematoda
Classis	: Secernentea
Ordo	: Strongylida
Familia	: Trichostrongylidae
Genus	: Cooperia
Species	: <i>Cooperia oncophora</i> (<i>Cooperia surnabada</i>) <i>Cooperia curtecei</i>

Cacing *Cooperia* sp. merupakan cacing gilig atau nematoda bentuknya kecil dengan warna kemerah-merahan, ditemukan di dalam usus halus berbagai ruminansia, terutama sapi. Cacing ini juga digolongkan sebagai cacing rambut, karena ukurannya yang kecil. Pada cacing dewasa jantan memiliki panjang 4-9 mm dan cacing betina 5-9 mm. Karakteristik telur lonjong, blastomer tidak jelas, berbentuk oval dan cangkang tipis, dengan ukuran $71-83 \times 28-35$ mikron. Infeksi terjadi secara per oral, siklus hidup dari nematoda ini adalah telur dikeluarkan bersama feses induk semang kemudian berkembang menjadi larva stadium 1 dan akan menjadi larva infeksi.

Gejala infeksi pada ternak sapi antara lain diare, lemah, anemia, dan ternak menjadi kurus (Noble, 1989). *Cooperia* sp., terdiri dari empat spesies yaitu *C. punctata*, *C. pectinata*, *C. dan oncophora*, *C. curticei* (Junquera, 2007).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis telur cacing parasit yang terdapat pada feses sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar adalah *Oesophagostomum* sp. dan *Cooperia* sp.
2. Prevalensi telur cacing yang terdapat di tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar, teridentifikasi memiliki prevalensi yang rendah sebesar 12%.

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah dalam melakukan identifikasi telur cacing menggunakan metode lain dan mengambil sampel feses sapi yang umurnya berkisar 3 - 24 bulan dan melakukan penelitian pada awal atau pertengahan musim hujan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KEPUSTAKAAN

- Agoes Ridad. Natadisastra Djaenudin. *Parasitologi Kedokteran: Ditinjau dari Organ Tubuh yang Diserang*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Anna Anggriana. "Prevalensi Infeksi Cacing Hati (*Fasciola* sp.) pada Sapi Bali di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Anderson Roy Clayton. "Nematoda Parasites of Vertebrates: Their Development and Transmission, 2nd Edition", in Christian Wilhelm Sauermaun, *Some Aspects of The Population Dynamics of Cooperia oncophora*. Thesis. Palmerston North: Massey Universtity, Palmerston North, New Zealand, 2014.
- Anon. "Beberapa Penyakit Penting Pada ternak. Seri Peternakan. Proyek Pengembangan Penyuluhan Pertanian Pusat/NAEP. Daerah Istimewa Aceh: Balai Informasi Pertanian Departemen Pertanian, 1990.
- Arbi Purnomo. "Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong". *Skripsi*. Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Baker David G. *Flynn's Parasites of Laboratory Animals Second edition*. American College of Laboratory Animal Medicine. USA: Blackwell Publishing, 2007.
- Berijaya. Priyanto Dwi. "Efektifitas Serbuk Daun Nanas Sebagai Antelmintika Pada Sapi Yang Terinfeksi Cacing Nematoda Saluran Pencernaan". Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner hlm 162-169, 2007.
- Budiharta Setyawan. "*Kapita Selekta Epidemiologi Veteriner*". Yogyakarta: Bagian Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Cdc. "*Taeniasis*". USA: Laboratory Identification of Parasitic Diseases of Public Health Concern, 2013.
- Darmono. Parasit Cacing Paramphistomum sp. Pada Ternak Ruminansia dan Akibat Infestasinya. Bogor: Balai Penelitian Penyakit Hewan. Wartazoa. 1: (2), 1983.
- Desi Atry. "Aspek Klinik *Schistosomiasis japonicum*". *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas Padang, 1994.
- Djaja Willyan. *Langkah Jitu Membuat Kompos dari Kotoran Ternak dan Sampah*. Jakarta: Agro Media Pustaka, 2008.

- DITJENNAK (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan). *Manual Penyakit Hewan Mamalia*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta: Subdit Pengamatan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, 2012.
- Eka Yuliartati. "Tingkat Serangan Ektoparasit pada Ikan Patin (*Pangasius djambal*) pada Beberapa Pembudidaya Ikan di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Georgi JR. *Parasitology for Veterinarians*. Philadelphia US: W.B. Saunders Company, 1969.
- Gusti I Ngurah Putu Widnyana. "Prevalensi Infeksi Parasit Cacing pada Saluran Pencernaan Sapi Bali dan Sapi Rambon di Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali". *Jurnal AgroPet* no 2 (Desember 2013): 39-46.
- Hamdan A. *Paramphistomiasis pada ternak ruminansia*. Bogor: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014.
- Handayani Putri. Santoso Purnama Edy. Siswanto. "Tingkat Infestasi Cacing Saluran Pencernaan Pada Sapi Bali Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung". *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu* no 3 (Agustus 2015): 127-133.
- Huda Rofiqoh Nurul. "Pengaruh Penggunaan Ampas Tempe dalam Ransum Terhadap Performan Domba Lokal Jantan". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.
- Ida Tjahjati. Subronto. *Ilmu Penyakit Ternak II*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Irwan Ridwan Rahim. Zubair Achmad. "Studi Keinginan Membayar Oleh Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah TPA Tamangapa Kota Makassar (151L)". Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 24-26 Oktober 2013.
- Junquera Pablo. *Parasites of Dogs, Cats and Livestock Biology and Control*. Parasitipedia.net, 2007.
- Jumriah Syam. *Ilmu Penyakit dan Kesehatan Ternak*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- , 2013. *Ilmu Dasar Ternak Potong*. Makassar: Alauddin Press.

- Jusmaldi. “Keragaman Protozoa Symbion Dalam Rumen Sapi dan Kerbau Lumpur di Sumatera Barat”. *Tesis*. Bogor: Program Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor, 2002.
- Kertawirawan I Putu Agus. Yasa I Made Rai Yasa. Adijaya I Nuoman Adijaya. “Efektivitas Penggunaan Ivermectin Untuk Pengendalian Parasit Cacing pada Usaha Tani Penggemukan Sapi Bali”. Proseding Seminar Nasional Teknologi Peternakan. Mataram, 11 Desember 2012.
- Khasanah Usmaul. “Identifikasi Ciliata di Dalam Rumen Sapi Brahaman Cross, Peranakan Ongole, Sumba Ongole dan Frisien Holstein dari Daerah Lampung”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Kurniawati Arisma. “Evaluasi Suplementasi Ekstrak Lerak (*Sapindus Rarak*) Terhadap Populasi Protozoa, Bakteri dan Karakteristik Fermentasi Rumen Sapi Peranakan Ongole Secara In Vitro”. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Peternakan Insitut Pertanian Bogor, 2009.
- Kusumamihardja S. *Parasit dan Parasitosis pada Hewan ternak dan Hewan Piaraan di Indonesia*. Bogor: Pusat Antar Universitas Bioteknologi IPB, 1995.
- Kosasih Z. “Metode Larval Culture Sebagai Teknik Untuk Mengidentifikasi Jenis Cacing Nematoda Saluran Pencernaan Padaruminansia kecil”. Prosiding Temu Teknis Fungsional Non Peneliti, 2003.
- Levine Norman D. *Textbook of Veterinary Parasitology*. Terj. Gatot Ashadi. Ed. Wardiarto. *Buku Pelajaran Parasitologi Veteriner*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Mage Christian. Bourgne Henri. Toullieu Jean Marc. Roundelaud Daniel. Dreyfuss Gilles. “*Fasciola hepatica* and *Paramphistomum daubneyi*: Changes in Prevalences of Natural Infections In Cattle and in *Lymnaea truncatula* from Central France Over The Past 12 Years”. *J Vet. Res* no 33 (2002): 439-447.
- Mashur. “Kajian Perbaikan Teknologi Budidaya Cacing Tanah *Elsenia foetida* Savigny Untuk Meningkatkan Produksi Biomassa dan Kualitas Eksmecat dengan Memanfaatkan Limbah Organik Sebagai Media”. *Desertasi*. Bogor: Program Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor, 2001.
- Musdalifah. “Prevalensi Paramphistomiasis Pada Sapi Bali Di Kabupaten Maros”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

- Nandi. "Kajian Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah dalam Konteks Tata Ruang". *Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi* no. 9 (April 2005).
- Nezar Muhammad Rofiq. "Jenis Cacing Pada Feses Sapi di TPA Jatibarang dan KTT Sidomulyo Desa Nongkosawit Semarang". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Nguyen Thi Giang Thanh. "Zoonotic Fasciolosis in Vietnam: Molecular Identification and Geographical Distribution". *Skripsi*. Salisburylan: Universiteit Gent Salisburylan, 2012.
- Nugraha RTP. Dewi Kartika. "Endoparasit pada Feses Babi Kutil (*Sus verrucosus*) di Kebun Binatang Surabaya". *Jurnal Fauna Tropika Zoo Indonesia* no.1 (Juni 2007): 13-20.
- Nugroho Herjuno Ari. Purwaningsih Endang. "Nematoda parasit gastrointestinal pada satwa mamalia di penangkaran Pusat Penelitian Biologi LIPI Cibinong, Jawa Barat". *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon* no 8 (Desember 2015): 1785-1789.
- Noble Elmer Ray. Noble Athur Glenn. Schad Gerhard A. Austin JJ. *Parasitology: The Biology of Animal Parasites*. Philadelphia: Lea and Febiger, 1989.
- Permata Dian. "Reproduksi Cacing Tanah (*Eisenia Foetida*) dengan Memanfaatkan Daun dan Pelepah Kimpul (*Xanthosoma Sagittifolium*) pada Media Kotoran Sapi Perah". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Peternakan Insitut Pertanian Bogor, 2006.
- Pfukenyi DM. Mukaratirwa S. Willingham AL. Monrad J. "Epidemiological Studies Of Parasitic Gastrointestinal Nematodes, Cestodes And Coccidia Infections In Cattle In The Highveld And Lowveld Communal Grazing Areas Of Zimbabwe". *Journal of Veterinary Research* no 74 (2007): 129-142.
- Rahayu Sri. "Prevalensi Nematodiasis Saluran Pencernaan Pada Sapi Bali (*Bos sondaicus*) di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang". *Skripsi*: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Raza MA. Murtaza S. Bachaya HA. Hussain A. "Prevalence of Paramphistomum cervi in ruminants slaughtered in district Muzaffar Garh". *Pakistan Vet J*. 29 (4) (2009): 214-215.

- Retta Ida Lumongga. "Tinjauan Kebijakan Lingkungan Hidup Terhadap Standar Baku Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah". *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum* no.2 (Juli 2014): 78-139.
- Rizqi Putratama. "Hubungan Kecacingan Pada Ternak Sapi di Sekitar Taman Nasional Way Kambas dengan Kemungkinan Kejadian Kecacingan Pada Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) di Suaka Rhino Sumatera". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan Insitut Pertanian Bogor, 2009.
- Robert W. Tolan, Jr MD. "Fascioliasis Due to *Fasciola hepatica* and *Fasciola gigantica* Infection: An Update on This 'Neglected' Neglected Tropical Disease". *Lab Med.* no. 2 (2011): 107-116.
- Sandjaja Bernardus. Herri Pedo. *Parasitologi Kedokteran: Helmintologi Kedokteran*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Salman Lia Budimuljati. Suwardi Nur Kasim. Djaja Willyan. "Pengaruh Imbangan Kotoran Sapi Perah Dan Serbuk Gergaji Terhadap Kualitas Kompos". *Laporan Penelitian*. Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, 2003.
- Setiawan Deni. "Studi Kelayakan Usaha Peternakan Sapi Pedaging di Kalangan Petani di Dusun Getasan, Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang". *Skripsi*. Saligata: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unversitas Kristen Satya Wacana Saligata, 2014.
- Sayuti Linda. "Kejadian Infeksi Cacing Hati (*Fasciola* spp) Pada Sapi Bali di Kabupaten Karangasem, Bali". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan Insitut Pertanian Bogor, 2007.
- Sigit Adipura. "Pengaruh TPA Tamangapa Terhadap Kualitas Air Baku di Wilayah Pemukiman Sekitarnya (Besi dan Mangan)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Sihombing Emeritus DTH. Simamora S. "Penelitian Isi Rumen Sapi dan Kerbau untuk Makanan Ternak Babi", dalam Mashur. "*Kajian Perbaikan Teknologi Budidaya Cacing Tanah *Elsenia foetida* Savigny Untuk Meningkatkan Produksi Biomassa dan Kualitas Eksmecat dengan Memanfaatkan Limbah Organik Sebagai Media*". *Desertasi*. Bogor: Program Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor, 2001.
- Subronto. *Ilmu Penyakit Ternak II (Mammlia)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.


- Suharmita Darmin. "Prevalensi Paramphistomiasis Pada Sapi Bali di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Sularno. "Daya Reduksi Kapang Nematofagus *Arthrobotrys oligospora* (Fresenius, 1852) Isolat Lokal Terhadap Larva Infektif (L3) Trichostrongylidae Pada Pupukan Tinja Domba". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan Insitut Pertanian Bogor, 2001.
- Soulsb E.J.L. "Helminth, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals". dalam Sri Rahayu. "*Prevalensi Nematodiasis Saluran Pencernaan Pada Sapi Bali (Bos sondaicus) di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*". Skripsi: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Tantri Novese. Setyawati Tri Rima. Khotimah Siti. "Prevalensi dan Intensitas Telur Cacing Parasit pada Feses Sapi (*Bos Sp.*) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pontianak Kalimantan Barat. *Jurnal Protobiont* no.2 (2013): 102-106.
- Taylor M.A. Coop R.L. Wall R.L. "*Veterinary Parasitology, 4th Edition*". <https://books.google.co.id/books?id=jelbCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. (30 September 2015).
- Vivi Andrianty. "Kejadian Nematodiasis Gastrointestinal pada Pedet Sapi Bali di Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Winarto Ferry. "Penambahan Tepung Darah Dalam Pembuatan Pupuk Organik Padat Limbah Biogas dari Feses Sapi dan Sampah Organik Terhadap Kandungan N, P Dan K". *Skripsi*. Padang: Fakultas Peternakan Universitas Andalas, 2010.
- Zajac Anne M. Conboy Gary A. *Veterinary Clinical Parasitology 8th ed.* USA: Auspices of the American Association of Veterinary Parasitologists, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Alat-alat yang digunakan.



Kantong Plastik



Spidol



Botol semprot



Botol pot plastik



Sendok



Kaca penutup (*deck glass*)



Sentrifuge



Neraca analitik



Timbangan



Tabung sentrifuge



Timer



Saringan

Lampiran 2. Proses pengambilan sampel feses sapi di kandang sapi sekitar Lingkungan Kassi Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala pukul 5.30 WITA.



Lampiran 3. Proses pemeriksaan identifikasi telur dan larva cacing metode metode apung (*Flotation methode*).



Proses penimbangan sampel feses sapi



Proses penambahan larutan garam jenuh



Proses sentrifuge sampel



Penambahan larutan garam jenuh dan peletakan *deck glass* di atas permukaan tabung



Proses pengambilan *deck glass* untuk diperiksa di mikroskop trinokuler

Lampiran 4. Proses pemeriksaan identifikasi telur dan larva cacing metode metode Mc Master.



Lampiran 5. Jenis telur cacing yang ditemukan dan hasil identifikasi pada feses sapi yang digembalakan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Tamangapa Makassar dengan menggunakan metode apung (*Flotation methode*) dan *Mc Master*.

Sampel ke-	Jenis telur cacing	Metode	
		Apung	<i>Mc Master</i>
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	<i>Oesophagostomum</i> sp.	+	-
5.	-	-	-
6.	<i>Oesophagostomum</i> sp.	+	-
7.	<i>Cooperia</i> sp.	+	-
8.	-	-	-
9.	-	-	-
10-25	-	-	-

Lampiran 6. Perhitungan prevalensi infeksi telur cacing

$$\text{Prevalensi} = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan: F : Jumlah sampel yang positif.

N : Jumlah dari seluruh sampel yang diperiksa.

$$\begin{aligned} \text{Prevalensi} &= \frac{3}{25} \times 100\% \\ &= 12\% \end{aligned}$$

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Firdayana, lahir di Pangkep pada tanggal 7 Februari 1995 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak H. Muh. Syukur dan Hj. Hamsinah Ali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 8 Timporongan kec. Segeri Kab. Pangkep dan lulus pada tahun 2006, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS DDI-AD SEGERI lulus pada tahun 2009 dan SMK KEPERAWATAN YAPI MAKASSAR lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2012. Pada semester akhir tahun 2016 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Identifikasi Telur Cacing Parasit Pada Feses Sapi (*Bos sp.*) Yang Digembalakan di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Makassar” dan mendapat gelar S1 pada tahun 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R