

**PENGARUH PEMBERIAN DAUN KELOR (*Moringa Oleifera*)
TERHADAP PERTAMBAHAN BERAT BADAN SAPI BALI**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN
Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh

ALAUDDIN
M A K A S S A R

MUHAMMAD NUR

Nim: 60700112008

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur
NIM : 60700112008
Tempat/Tgl. Lahir : Landokadawang, 26 Juni 1994
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Vetran Bakung, Samata-Gowa
Judul : Pengaruh Pemberian Daun Kelor (*Moringa Oleifera*)
Terhadap Pertambahan Berat Badan Sapi Bali

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Februari 2017

Penyusun,

Muhammad Nur
NIM: 60700112008

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi saudara **MUHAMMAD NUR**, NIM: 60700112008 mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“PENGARUH PEMBERIAN DAUN KELOR (*Moringa Oleifera*) TERHADAP PERTAMBAHAN BERAT BADAN SAPI BALI”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Januari 2017


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ir. H. Abd. Latief Toleng, M.Sc.
NIP. 19540602 197802 1 001


Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.
NIP. 19720727 200003 2 008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.
NIP. 19390712 1986 031 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, “**Pengaruh Pemberian Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Terhadap Pertambahan Berat Badan Sapi Bali**” yang disusun oleh **MUHAMMAD NUR, NIM: 60700112008**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu 8 Februari 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan dalam Ilmu Produksi Ternak, Jurusan Ilmu Peternakan.


Gowa, 8 Februari 2017
12 Jumadil Awwal 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si** 


Sekretaris : **Rusny, S.Pt., M.T** 

Munaqisyi I : **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P** 

Munaqisyi II : **Ir. Junaedi, M.Si** 

Munaqisyi III : **Dr. Muh. Tahir Malloko, M.HI** 

Pembimbing I : **Prof. Dr. Ir. Abd. Latief Toleng, M.Sc** 

Pembimbing II : **Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si** 



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H/ Arifuddin, M.Ag
NIP. 196912051993031002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemberian Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Terhadap Pertambahan Berat Badan Sapi Bali”** yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. yang merupakan rahmat bagi semesta alam dan menjadi sosok suri teladan bagi kita, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, perjalanan dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat doa yang begitu besar dari manusia yang begitu berharga dan merupakan penynemangat hidup. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda **Alm. Idrus Jamaluddin** dan ibunda tercinta **Marwah Onggi** serta seluruh keluarga yang tampah pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Musyafir Pabbabari, M. Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Bapak Dr. Ir. Muh Basir S. Paly, M.Si.** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. **Bapak Prof. Dr. Ir. Abd. Latief Toleng, M.Sc** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan **Ibu Hj. Jumriah Syam, S.Pt.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. **Ibu Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P,** **Bapak Ir. Junaedi, M.P** dan **Bapak Dr. Muh. Tahir Malloko, M.HI** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. **Bapak Ir. Andi Nursyam AS M.P, Muhammad Arsan Jamili, S.Pt, Dzulyadaeni S.Pt, Umar S.Pt, Ilyas S.Pt, Sampeang S.Pt, Nurwahida J S.Pt,** yang telah memberikan bantuan serta bimbingan yang begitu banyak sehingga selesainya skripsi ini.
8. **Hasrin, Asrul, Nurfatima Jamrah S.Pt, Muhammad Surwanto Uddin, Muhammad Imran Yambas, Chaedar Ali, Rustam, Muh Mansyur, dan teman teman kelas A angkatan 2012,** serta rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan bantuan yang begitu berharga dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini

Penulis berharap adanya masukan dan saran yang positif demi perbaiki skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan khususnya masalah Produktivitas Sapi Potong. Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah swt. Amin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Samata, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Hipotesis.....	4
F. Kajian Terdahulu.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengaruh Pakan terhadap Pertambahan Berat Badan Sapi Potong.....	8
B. Tanaman Kelor (Moringa oleifera) dan Manfaatnya terhadap Ternak ...	11
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Pakan	17
D. Manajemen Pemberian Pakan pada Sapi Potong	20
E. Pertambahan Berat Badan (PBB) Sapi Potong	27
F. Tinjauan Islam terhadap Pemanfaatan Tanaman sebagai Sumber Pakan Ternak	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
B. Materi Penelitian	36
1. Alat dan Bahan.....	36
2. Pakan.....	36

C. Prosedur Penelitian.....	38
1. Persiapan	38
2. Pembuatan Pakan Konsentrat.....	39
3. Pemberian Pakan dan Air Minum	39
4. Penimbangan	40
5. Parameter yang diukur	40
D. Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengaruh Konsumsi Pakan terhadap Pertambahan Berat Badan	41
B. Pertambahan Berat Badan Harian (PBBH) Sapi Bali	44
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Implikasi Penelitian.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kandungan Zat Nutrisi Daun Kelor	15
2. Komposisi Pakan Konsentrat yang Diberikan	37
3. Hasil Analisis Proximat Kandungan Nutrisi Pakan Konsentrat.....	37
4. Hasil Analisis Proximat Kandungan Nutrisi Daun Kelor	38
5. Percobaan Rancangan Acak Lengkap.....	39
6. Rata-Rata Konsumsi Pakan pada Sapi Bali	41
7. Rata-Rata Pertambahan Berat Badan Sapi Bali	44



ABSTRAK

Nama : MUHAMMAD NUR
NIM : 60700112008
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Pengaruh Pemberian Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Terhadap Pertambahan Berat Badan Sapi Bali.

Sapi potong di wilayah tropis memiliki pertambahan bobot badan yang masih rendah hal ini diduga karena terbatasnya pakan hijauan yang tidak kontinyu sepanjang tahun. Daun kelor (*Moringa Oleifera*) adalah salah satu hijauan tropis yang mengandung nutrisi lengkap yang berpotensi sebagai pakan hijauan berkualitas tinggi untuk memaksimalkan produktivitas sapi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian daun kelor terhadap pertambahan berat badan sapi Bali. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 perlakuan yaitu perlakuan 1 (konsentrat + hijauan) dan perlakuan 2 (konsentrat+ hijauan+ 250 gram daun kelor) dengan masing-masing 5 ulangan. Materi penelitian adalah 10 ekor sapi Bali jantan yang berumur 1-2 tahun dengan berat badan rata-rata 150 kg. Pakan yang digunakan adalah hijauan, daun kelor, dan konsentrat yang terdiri dari ampas tahu 46%, dedak padi 46%, molasses 4%, garam 2%, mineral 1% dan urea 1%. Data konsumsi pakan dan pertambahan berat badan harian dianalisis dengan *uji t-2 sampel bebas*. Hasil penelitian adalah pemberian daun kelor 250 gram/ekor/hari pada sapi Bali berpengaruh cenderung signifikan terhadap pertambahan berat badan.

Kata kunci: *Daun Kelor, Pertambahan Berat Badan, Pakan Konsentrat, Sapi Bali.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : MUHAMMAD NUR
NIM : 60700112008
Department : Animal Science
Title : **Effect of Leaf Moringa (*Moringa oleifera*) Against Weight Gain Bali cattle.**

Beef cattle in tropical regions have a body weight that is low it is suspected because of the limited forage is not continuous throughout the year. Moringa leaves (*Moringa oleifera*) is one of the tropical forage containing complete nutritional potential as a high-quality forage for cattle Bali maximize productivity. This study aims to determine how the effect of Moringa leaves against weight gain Bali cattle. This study uses a completely randomized design (CRD) with two treatments, one treatment (concentrates + forage) and treatment 2 (concentrates + forage + 250 grams of Moringa leaves) with each 5 replicates. The research material was 10 cows Bali males who are 1-2 years old with an average body weight of 150 kg. Feed use is forage, Moringa leaves, and concentrate comprising pulp 46%, 46% rice bran, molasses 4%, salt 2%, 1% minerals and urea 1%. Data feed intake and daily weight gain were analyzed by independent samples t-2. The results showed that administration of Moringa leaves 250 grams / head / day in Bali cattle potentially significant effect on weight gain.

Keywords: *Moringa Leaves, Weight Gain, Feed Concentrates, Bali Cattle.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produktivitas ternak sapi di daerah tropis termasuk Indonesia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah yang beriklim sedang. Pertambahan berat badan sapi di daerah tropis masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh ternak yang bersangkutan. Salah satu penyebab masalah ini adalah terbatasnya pakan, termasuk hijauan yang tersedia di daerah ini. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi sangat tergantung dari tiga faktor yaitu pakan, pemuliaan dan pemeliharaan. Pakan bagi ternak ruminansia tergantung dari penyediaan hijauan dengan jumlah cukup, berkualitas tinggi dan berkesinambungan sepanjang tahun. Rendahnya nilai gizi dan fluktuasi produksi hijauan pakan sepanjang tahun merupakan masalah penyediaan pakan di Indonesia sampai saat ini (Sutrisno, 2009).

Hijauan merupakan pakan utama pada ternak ruminansia. Namun, ketersediaan hijauan segar sepanjang tahun mengalami kendala, karena dipengaruhi oleh musim. Artinya, dimusim hujan ketersediaan hijauan sangat berlimpah, namun dimusim kemarau sulit didapatkan. Pada musim penghujan ketersediaan hijauan sering melimpah, sedangkan pada musim kemarau menjadi kurang. Pada kondisi iklim yang normal, ritme ketersediaan pakan cenderung berimbang antara kebutuhan dan ketersediaannya di alam. Namun kecenderungan kebutuhan ternak jumlahnya terus meningkat, sedangkan pada sisi lain terjadi

pergeseran pola iklim atau anomali cuaca yang mempengaruhi pola kehidupan tumbuhan sumber hijauan (Ukanwoko *et al*, 2012). Pemanfaatan hijauan tropis yang banyak tumbuh subur dan bernutrisi tinggi, seperti tanaman kelor dan murbei dapat menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Tanaman kelor mampu hidup diberbagai jenis tanah, tidak memerlukan perawatan yang intensif, tahan terhadap musim kemarau, dan mudah dikembangbiakkan (Simbolan *et al*, 2007).

Kualitas pakan ternak berdampak pada *performance* dan produktivitas ternak. Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu usaha penggemukan sapi potong (Heriyanto *et al*, 2016). Menurut Suhartanto *et al* (2003) bahwa perbaikan kualitas pakan akan meningkatkan kecepatan pertumbuhan ternak, sehingga sapi yang dipotong ukurannya lebih besar (berat potong lebih tinggi), persentase karkas lebih tinggi dan kualitas daging lebih baik, sehingga penyediaan daging menjadi lebih tinggi. Olehnya itu, pakan yang mengandung nutrisi tinggi, mudah didapatkan serta biaya murah sangat dibutuhkan oleh peternak. Menurut Makkar dan Bekker (1996), bahwa daun kelor kandungan proteinnya mencapai 26-43% dari bahan kering, daun kelor merupakan sumber protein murah yang dapat menekan biaya pakan ternak.

Dampak pemberian daun kelor terhadap ternak ruminansia dilaporkan oleh beberapa peneliti yaitu Soetanto dan Firsoni (2008), bahwa pemberian suplemen tepung daun kelor didalam molases blok, meningkatkan produksi susu sapi perah hingga 15%, Sarwatt, *et al* (2004) bahwa penambahan tepung daun kelor pada pemberian pakan hay *Chloris gayana*, secara nyata ($P < 0.05$) dapat meningkatkan pencernaan bahan kering dan serat kasar. Hasil lain yang

ditunjukkan adalah, kelor bisa menggantikan pemakaian tepung biji bunga matahari pada tingkat 50%, yaitu setiap pemberian 5 kg daun kelor segar/ekor/hari akan mampu meningkatkan produksi susu sapi perah 2-3 kg/ekor/hari. Selanjutnya pada ternak kambing perah, pemberian daun kelor segar 0,5-1,5 kg ekor/hari, mampu memacu pertumbuhan antara 60-87 gr/ekor/hari dan produksi susu 0,5 lt/ekor/hari (Soetanto, 2000). Penambahan daun kelor baik secara tunggal maupun dicampur dengan molases ke dalam ransum ternak ruminansia terbukti memberikan manfaat secara nyata untuk meningkatkan pertambahan bobot badan maupun produksi susu (Soetanto *et al*, 2011). Bagi ternak ruminansia daun kelor memiliki palatabilitas yang baik dan memiliki kandungan protein yang tinggi. Daun dan biji kelor kaya akan karoten dan asam askorbat. Kelor merupakan sumber provitamin A, vitamin B dan C, mineral terutama zat besi (Kakengi *et al*, 2005).

Berdasarkan uraian sebelumnya, menunjukkan bahwa pemberian kelor sebagai pakan suplemen pada sapi potong, berpotensi untuk meningkatkan pertambahan bobot badan, namun penggunaan tanaman kelor (*moringa oleifera*) di beberapa daerah di Indonesia baru sebatas sebagai sayuran dan belum banyak masyarakat yang mengetahui penggunaan kelor sebagai pakan ternak (Panjaitan, 2010). Olehnya itu, penelitian tentang bagaimana pengaruh pemberian daun kelor terhadap pertambahan berat badan pada sapi potong perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian pakan daun kelor terhadap penambahan berat badan sapi Bali.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian daun kelor terhadap penambahan berat badan sapi Bali.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswa serta peternak, tentang strategi pemberian pakan dan keunggulan kelor sebagai salah satu bahan pakan untuk sapi Bali agar lebih meningkatkan produktivitas.

E. Hipotesis

1. H_0 = Pemberian daun kelor sebagai pakan hijauan suplemen berpengaruh terhadap penambahan berat badan sapi Bali.
2. H_i = Pemberian daun kelor sebagai pakan hijauan suplemen tidak berpengaruh terhadap penambahan berat badan sapi Bali.

F. Kajian Terdahulu

*Sánchez, N.R., Spöndly, E., Ledin, I (2005). Pengaruh Pemberian Berbagai Level Daun Kelor untuk Sapi Perah Creole pada Konsumsi, Kecernaan, Produksi Susu dan Komposisinya. Penelitian dilakukan di Nikaragua untuk mengetahui pengaruh dari pemberian berbagai tingkat daun dari *Moringa oleifera* Lam (sinonim: *Moringa pterygosperma* Gaertner) untuk sapi perah pada*

konsumsi, pencernaan, produksi susu dan komposisi susu. Perlakuan penelitian ini adalah: pemberian hay *Brachiaria brizantha* secara *ad libitum*, baik yang tidak ditambahkan atau ditambahkan dengan 2 kg atau 3 kg kelor atas dasar bahan kering. Enam sapi *Bos indicus* dari jenis Creole Reyna, dengan berat badan rata-rata 394 ± 24 kg, dengan menggunakan replikasi 3 X 3 rancangan bujur sangkar latin. Penambahan dengan daun kelor meningkatkan ($P < 0.05$) konsumsi bahan kering dari 8,5 menjadi 10,2 dan 11,0 kg bahan kering perhari dan produksi susu dari 3,1 menjadi 4,9 dan 5,1 kg perhari untuk hay *B. brizantha* saja dan penambahan masing-masing dengan 2 kg dan 3 kg bahan kering kelor. Lemak susu, total padatan, protein kasar dan karakteristik organoleptik, bau, rasa dan warna, tidak berbeda secara signifikan antara pakan. koefisien cerna tampak dari bahan kering, bahan organik, protein kasar, NDF dan ADF meningkat ($P < 0.05$) dalam pakan yang dilengkapi dengan kelor dibandingkan dengan hay *B. brizantha* saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya kelor sebagai suplemen protein untuk pakan kualitas rendah meningkatkan konsumsi bahan kering dan pencernaan pakan juga peningkatan produksi susu tetapi tidak mempengaruhi komposisi susu.

Soetanto, H., Marhaenyanto, E., Chuzaemi, S (2011). Penerapan Teknologi Suplementasi Berbasis Daun Kelor dan Molases pada Peternakan Kambing Rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengevaluasi keragaman hijauan yang biasa diberikan pada kambing di desa Pasrujambe; 2) mengenalkan daun kelor sebagai sumber protein untuk pertumbuhan kambing sistem tradisional. Sembilan puluh orang peternak kambing yang disurvei

mengenai profil para peternak kambing dan keragaman jenis hijauan yang mereka berikan pada kambing selama musim kemarau. Untuk mengevaluasi hasil suplementasi daun kelor, pada 26 ekor kambing muda (kurang dari satu tahun), kemudian dibagi menjadi dua kelompok yang tidak seimbang. Yaitu kelompok kontrol (tujuh ekor) dan kelompok perlakuan (sembilan belas ekor) selama empat bulan dengan mengamati konsumsi pakan, konversi pakan, penambahan berat badan harian yang diperoleh. Hasil menunjukkan 73,3% peternak, telah beternak kambing lebih dari 25 tahun, 26,7% peternak, beternak kambing kurang dari 5 tahun. Rasio jenis kelamin dari kambing yang dipelihara oleh peternak 67,4% betina: 32,6% jantan. Hijauan yang diberikan kepada kambing di Pasrujambe dikelompokkan kedalam 5 jenis rumput, 3 spesies legum pohon, 29 jenis daun pohon dan 12 spesies herba. Penambahan daun kelor menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam konsumsi pakan ($P < 0,05$) dan peningkatan pendapatan peternak ($P < 0,01$). Pemberian pakan suplemen berbasis daun kelor dan molases dapat meningkatkan penambahan bobot badan kambing sebesar 100 gr/ekor/hari dan memberikan tambahan keuntungan/ekor selama 4 bulan sebesar Rp. 125.000.

Marhaeniyanto, E dan Susanti, S (2014). Produk Fermentasi dan Produksi Gas Secara Invitro dari Ransum yang Mengandung Daun Kelor (Moringa oleifera, Lamm). Penelitian ini bertujuan untuk:1) mengetahui komposisi terbaik antara daun kelor dan materi penyusun konsentrat lainnya sebagai pemasok protein by-pass dan yang mengandung senyawa sekunder tanin. Empat jenis konsentrat terdiri dari berbagai level daun kelor, daun trambesi, bungkil kelapa dan onggok, Konsentrat ini akan dikombinasikan dengan tiga

pakan hijauan proporsi misalnya jerami jagung. Pakan yang dicerna dalam kondisi in vitro dan produksi gas diinkubasi selama 48 jam menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan ($P < 0,01$) antara setiap perlakuan, yang nilai tertinggi adalah dengan penambahan daun kelor dan daun trambesi. Meningkatnya level dari daun kelor adalah pencernaan yang lebih rendah. Tingkat N-NH₃ dalam cairan rumen untuk 4, 12 dan 24 jam menurun dengan semakin tingginya tingkat penggunaan daun kelor. Ada respon positif dari suplemen pakan yang berbasis daun kelor karena pasokan nutrisi yang cukup bagi mikroba rumen. Berdasarkan kandungan protein kasar 36,55% dari kelor dapat dikembangkan sebagai suplemen pakan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pakan konsentrat (daun kelor 30%: daun trambesi 10%: bungkil kelapa 45%: onggok 15%) dengan proporsi 50% hijauan: konsentrat dari 50%, berpotensi sebagai alternatif sumber suplemen untuk ternak ruminansia di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaruh Pakan terhadap Pertambahan Berat Badan Sapi Potong

Pakan ternak merupakan salah satu faktor penting dalam berhasilnya usaha pengembangan peternakan. Tanpa memperhatikan faktor tersebut setiap usaha pengembangan peternakan tidak akan berhasil seperti apa yang kita harapkan. Dalam usaha peningkatan produksi peternakan khususnya ternak ruminansia perlu disertai dengan peningkatan produksi hijauan makanan ternak baik kualitas maupun kuantitasnya. Ternak membutuhkan hijauan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, produksi dan reproduksi (Putra *et al*, 2014).

Pakan yang dapat diberikan untuk sapi potong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hijauan pakan ternak dan pakan konsentrat. Hijauan pakan yang dapat diberikan diantaranya rumput gajah, rumput benggala, setaria, lamtoro, dan kaliandra (Erlangga, 2013). Pakan konsentrat meliputi jagung giling, menir, dedak, bekatul, bungkil kelapa, ampas tahu, berbagai umbi, yang berfungsi meningkatkan dan memperkaya nilai gizi pada pakan yang nilai gizinya rendah (Sudarmono dan Sugeng, 2008).

Pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam usaha penggemukan sapi potong. Pakan memegang peranan sekitar 75 % dari total biaya operasional, tergantung tahap produksi dan performa yang diinginkan. Aspek nutrisi pakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi performa ternak (Azevedo, *et al.*,

2010). Pakan yang seimbang adalah pakan dengan kandungan nutrisi dalam jumlah dan proporsi yang memenuhi kebutuhan fisiologis, reproduksi dan produksi. Pemberian pakan yang sesuai kebutuhan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pakan yang seimbang tanpa menyebabkan gangguan pada ternak dengan biaya yang lebih efisien. Hal penting selain pemenuhan kebutuhan pakan yaitu penyiapan pakan, yang meliputi bahan baku pakan, formulasi ransum, proses pembuatan pakan dan penyimpanan sampai pemberian pakan (Agus, 2007).

Ampas tahu merupakan hasil ikutan proses pembuatan tahu yang berasal dari kacang kedelai, dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak ruminansia dan unggas. Bahan pakan ini mudah didapat dan memiliki nilai gizi cukup baik dengan kandungan protein kasar 21%. Sebagai pakan tambahan, ampas tahu dapat berfungsi melengkapi protein dari hijauan. Pemanfaatan ampas tahu sangat efektif, pada sapi potong pertambahan berat badan akan lebih cepat. Selain pertumbuhan lebih cepat karkasnya dapat mencapai 60% dari berat sapi hidup (Novieta, 2012)

Ampas tahu merupakan limbah industri pembuatan tahu yang memiliki kandungan protein cukup tinggi, yaitu 23,7% (Siregar, 2008). Surtleff dan Aoyagi (1979) melaporkan bahwa penggunaan ampas tahu sangat baik digunakan sebagai ransum ternak sapi perah. Di Jawa Barat ampas tahu telah banyak dan sudah biasa digunakan oleh peternak sebagai makanan ternak sapi potong untuk proses penggemukan. Di Taiwan ampas tahu digunakan sebagai pakan sapi perah mencapai 2-5 kg per ekor per hari (Heng-Chu, 2004), sedangkan di Jepang

penggunaan ampas tahu untuk pakan ternak terutama sapi dan babi dapat mencapai 70% (Amaha, *et al.*, 1996).

Knipscheer *et al.* (1983) menyatakan, bahwa pemberian ampas tahu dapat memberikan keuntungan dalam usaha peternakan kambing atau domba yang dipelihara secara intensif.

Pemberian dedak sebagai suplemen untuk menggantikan 30% (BK) dari rumput memberikan pertumbuhan yang lebih baik pada sapi Bali (Nitis dan Lana, 1983).

Dedak dengan kadar lemak tinggi terbaik digunakan kurang dari 0,5 persen berat badan, serat cerna lemak dedak sedang dan kandungan protein yang cukup tinggi, pakan ini dapat mengganti hijauan yang baik ketika pesediaan hijauan terbatas (Gadberry, 2015).

Adiwinarti, *et al.*, (2011) melaporkan, bahwa pemberian konsentrat berbahan baku dedak padi 10 % dan onggok 17 % dengan kandungan protein 11,03 % berpengaruh terhadap pertumbuhan sapi Jawa, yaitu dapat menambah lingkar dada 0,19 cm, panjang badan 0,09 cm, tinggi pundak 0,08 cm dan bobot badan harian sebesar 0,72 kg/hari/ekor.

Kenaikan bobot hidup yang lebih baik diperoleh pada ternak yang mendapatkan pemberian pakan awet (*cubes*) bahan tepung daun Lamtoro (0,23 kg/ekor/hari) dibandingkan dengan bahan tepung daun Gamal (0,09 kg/ekor/hari). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan pakan awet (*cubes*) dapat merupakan salah satu alternatif pakan untuk mencegah terjadinya penurunan bobot hidup pada ternak sapi Bali di NTT, yang biasanya mengalami kehilangan

bobot hidup sebesar 0,4–0,5 kg/ekor/hari selama kemarau atau dapat dimanfaatkan untuk menghindari kehilangan bobot hidup ternak sapi selama transport laut dari NTT ke Pulau Jawa dan selama penampungan di karantina ternak Tenau Kupang (Nulik dan Hau, 2004).

Pemberian pakan daun murbei pada ternak sapi PO dengan perlakuan P2 = Pakan hijauan berupa rumput lapang dan pakan konsentrat berupa murbei dan konsentrat jagung. P3= Pakan hijauan berupa rumput lapang dan pakan konsentrat berupa murbei dan konsentrat dedak padi. P4= Pakan hijauan berupa rumput lapang dan pakan konsentrat berupa murbei dan konsentrat onggok. Menghasilkan pertambahan berat badan harian P2 (1 kg/ekor/hari). P3 (0,73 kg/ekor/hari). P4 (0,90 kg/ekor/hari) (Setiawan D dan Nuraini H, 2016). Penelitian menggunakan hijauan daun murbei oleh Syahrir (2009) melaporkan dalam penelitiannya bahwa hasil pertambahan bobot badan harian sapi peranakan ongole (PO) jantan yang lebih tinggi masing-masing sebesar 0,91: 0,96 dan 0,79 kg/hari dengan pemberian pakan jerami padi, konsentrat dan murbei yang memiliki imbang 50:50:0, 50:25:25 dan 50:0:50. Serta Sanchez (2002) hasil penelitiannya, pertambahan bobot badan harian domba yang diberikan daun murbei dengan level 0; 0,5; 1; 1,5 % dari BB berturut turut adalah 60, 75, 85, 101 gram/ekor

B. Tanaman Kelor (*Moringa oleifera*) dan Manfaatnya terhadap Ternak

Kelor dibudidayakan dan telah beradaptasi dengan baik di luar jangkauan daerah asalnya, termasuk seluruh Asia Selatan, dan di banyak negara Asia Tenggara, Semenanjung Arab, tropis Afrika, Amerika Tengah, Karibia dan tropis

Amerika Selatan. Kelor menyebar dan telah menjadi naturalisasi di bagian lain Pakistan, India, dan Nepal, serta di Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Asia Tenggara, Asia Barat, Jazirah Arab, Timur dan Afrika Barat, sepanjang Hindia Barat dan selatan Florida, di Tengah dan Selatan Amerika dari Meksiko ke Peru, serta di Brazil dan Paraguay (Jama *et al*, 1989).

Kelor merupakan tanaman perdu yang toleran kekeringan dan terhadap intensitas curah hujan tahunan 250 – 3.000 mm. Tinggi tanaman dapat mencapai 10 meter, berbatang lunak dan rapuh, daun kecil berbentuk bulat telur dan tersusun majemuk. Berbunga sepanjang tahun berwarna putih, buah bersisi segitiga dengan panjang sekitar 30 cm dan dapat tumbuh mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 700 m di atas permukaan laut (Fuglie *et al*, 2005). Kelor mempunyai kemampuan produksi biomassa yang tinggi mencapai 4,2 – 8,3 ton bahan kering/ha pada interval pemotongan 40 hari. Kandungan protein daun berkisar 19,3 – 26,4% (Makkar *et al*, 1996). Fuglie (2001) melaporkan daun kelor selain mempunyai kandungan protein yang tinggi, juga memiliki asam amino esensial yang lengkap, vitamin seperti: A, C, B1 dan B kompleks dan mineral seperti: Fe, Ca, Mg, Se dan Zn.

Sánchez (2006) melaporkan, bahwa pemberian daun kelor sebagai pakan tambahan yang diberikan sebanyak 2 – 3 kg atas dasar bahan kering pada sapi perah yang diberi pakan dasar rumput *B. brizantha* dapat meningkatkan total konsumsi pakan sampai 2,5 kg dan produksi susu 2 kg lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang hanya diberi pakan rumput saja.

Di daerah tropis, daun kelor digunakan sebagai pakan ternak, dan di banyak negara, digunakan sebagai *mikronutrien* cair, obat cacing alami (membunuh parasit) dan *adjuvant* (membantu atau meningkatkan obat lain) yang digunakan sebagai *metabolisme kondisioner* untuk membantu melawan penyakit endemik di negara-negara berkembang (Foidl *et al*, 2001).

Kelor kaya dengan senyawa yang mengandung gula sederhana, *rhamnosa* dan kelompok yang cukup unik dari senyawa yang disebut *glucosinolates* dan *isothiocyanates* (Bennett *et al*, 2003). Kulit batang telah dilaporkan mengandung dua alkaloid, yaitu *moringine* dan *moringinine* (Kerharo, 1969). *Vanili*, β -sitosterol, β -sitostenone, 4-hydroxymellin dan Asam octacosanoic telah diisolasi dari batang tanaman Kelor (Faizi *et al*, 1994).

Getah Kelor diketahui mengandung *L-arabinosa*, *galaktosa*-, *asam glukoronat*, dan *L-rhamnosa*, *mannose* dan *xilosa*, polisakarida terdiri asam *L-galaktosa*, dan *L-glukuronat-mannose* (Bhattacharya *et al*, 1982).

Daun Kelor menjadi sumber antioksidan alami yang baik karena kandungan dari berbagai jenis senyawa antioksidan seperti asam askorbat, *flavonoid*, *phenolic* dan *karotenoid* (Anwar *et al*, 2005). Tingginya konsentrasi asam askorbat, zat estrogen dan β -sitosterol, besi, kalsium, fosfor, tembaga, vitamin A, B dan C, α -tokoferol, riboflavin, nikotik, asam folat, piridoksin, β -karoten, protein, dan khususnya asam amino esensial seperti *metionin*, *sistin*, *triptofan* dan *lisin* yang terdapat dalam daun dan polong, membuatnya menjadi suplemen makanan yang hampir ideal (Makkar dan Becker, 1996).

Komposisi sterol dari minyak biji Kelor terutama terdiri dari *campesterol*, *stigmasterol*, β -*sitosterol*, Δ 5-*avenasterol* dan *clerosterol* disertai sejumlah *24-methylenecholesterol*, Δ 7-*campestanol*, *stigmastanol* dan *28-isoavenasterol* (Anwar *et al*, 2005).

Telah dilaporkan, Kelor juga merupakan sumber yang baik dari berbagai *tokoferol* (α , γ dan δ) dengan konsentrasi masing-masing antara 98,82–134,42 mg/kg, 27,90–93,70 mg/kg dan 48.00–71.16 mg/kg (Tsaknis, *et al.*, 1999.). Antioksidan dapat digunakan sebagai upaya pencegahan terhadap *hepatotoksisitas* melalui mekanisme mencegah kenaikan MDA dan kenaikan GSH, serta mencegah peningkatan enzim faal hepar dan kerusakan hepar (Soetanto *et al*, 2011).

Sanchez *et al*, (2005) melakukan sebuah percobaan untuk melihat efek dari daun Kelor sebagai asupan pakan pada tingkat yang berbeda untuk sapi perah, dengan mengukur daya cerna, produksi susu dan komposisi susu. Bayangkan apa yang akan mungkin terjadi bila produksi susu di negara-negara berkembang dapat ditingkatkan dengan cara ini, tentu dapat membantu banyak orang yang mengalami defisiensi protein (Foidle *et al*, 2001)

Tabel 1. Kandungan Zat Nutrisi Daun Kelor

Zat nutrisi	Jumlah (%)
Bahan Kering (BK)	18,43
Bahan Organik (BO)	87,05
Protein Kasar (PK)	25,55
Serat Kasar (SK)	10,82
Lemak Kasar (LK)	5,79

Sumber: *Marhaenyanto et al, 2015*.

Daun kelor juga merupakan sumber protein yang baik yang merupakan pengganti yang baik beberapa jenis pakan (kedelai dan lobak) untuk ruminansia, dan mereka mampu meningkatkan sintesis protein mikroba dalam rumen (Soliva *et al*, 2005). Kelebihan penggunaan daun kelor juga ditambahkan oleh Subadra, *et al* (1997) yang melaporkan bahwa kelor kaya akan asam amino, vitamin dan mineral terutama zat besi. Daun kelor merupakan sumber protein murah yang potensial untuk pakan ternak. Keuntungan menggunakan kelor sebagai sumber protein yang banyak, dan termasuk fakta bahwa itu adalah tanaman tahunan yang dapat dipanen beberapa kali dalam satu musim tanam dan juga memiliki potensi untuk mengurangi biaya pakan (Sarwatt *et al*, 2004).

Kelor dapat menjadi suplemen yang berharga untuk ternak. Daun kelor, dan batang muda memiliki kandungan protein, kelor memiliki kualitas yang lebih baik untuk ruminansia (Becker, 1995). Kelor juga kaya karoten, asam askorbat, besi dan dua jenis asam amino yang umumnya kurang pada pakan lainnya, yaitu metionin dan sistin (Makkar dan Becker, 1996).

Daun kelor baik secara tunggal maupun dicampur dengan molases ke dalam ransum ternak ruminansia terbukti memberikan manfaat secara nyata untuk meningkatkan penambahan bobot badan maupun produksi susu (Soetanto, 2011).

Foidl, *et al* (2001) menyatakan bahwa pemberian daun kelor sebagai pakan suplemen pada ternak sapi meningkatkan total konsumsi pakan dan meningkatkan penambahan berat badan harian dibandingkan dengan sapi yang hanya mengkonsumsi rumput. Daun kelor mempunyai potensi untuk bisa dipakai sebagai bahan suplemen pakan pada ternak ruminansia (Sarwatt, *et. al*, 2004).

Pemberian daun kelor sebagai pakan suplemen pada ternak sapi meningkatkan total konsumsi pakan dan meningkatkan penambahan berat badan harian dibandingkan dengan sapi yang hanya mengkonsumsi rumput (Foidl *et al*, 2001). Produksi susu lebih tinggi pada sapi yang diberi suplemen daun kelor segar sebanyak 8 sampai 12 kg dari sapi yang hanya diberi rumput (Sanchez *et al*, 2005).

Sapi jantan yang diberi pakan jerami rumput bermuda (*Cynodon dactylon*) dan jerami yang ditambah dengan daun kelor pada 0,6% dari berat badan secara bahan kering, menemukan perbedaan yang signifikan dalam berat badan masing-masing 0,045 dibandingkan 0,380 kg/hari (Castellon dan Gonzalez, 1996).

Kambing, yang diberi 9%, 27% dan 36% dari daun kelor dalam ransum menghasilkan konsumsi bahan kering masing-masing 251, 335 dan 311 gram/hari. Namun, penggabungan berbagai tingkat pemberian daun kelor tidak mempengaruhi penambahan berat badan masing-masing 16,1, 15,0 dan 13,6

gram/hari (Sarwatt *et al*, 2002). Juga dilaporkan oleh Aregheore (2002) bahwa kambing yang diberi dengan 20% dan 50% dari daun kelor memiliki konsumsi bahan kering dari 50,9 dan 51 gram/hari, yang mirip dengan kambing yang tidak diberi daun kelor. Kambing yang diberi suplemen daun kelor memiliki pertambahan berat badan rata-rata 86 dan 78 gram/hari sedangkan kambing yang tidak diberi tambahan kelor hanya diperoleh 55 gram/hari.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Pakan

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dimakan ternak dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam satuan waktu per hari (Wariata, 2000). Jumlah konsumsi pakan merupakan faktor penentu yang paling penting yang menentukan jumlah nutrisi yang didapat oleh ternak dan selanjutnya mempengaruhi tingkat produksi (Wodzicka, 1993).

Sapi yang akan digemukkan dan memperoleh ransum yang terdiri dari hijauan dan konsentrat harus diatur pemberiannya agar tercapai hasil yang memuaskan. Pemberian hijauan pada sapi yang digemukkan sebaiknya dihindari pemberian yang sekaligus dan dalam jumlah yang banyak. Pemberian yang demikian akan berakibat pada banyaknya hijauan yang terbuang dan tidak dimakan sapi, sehingga tidak efisien. Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa frekuensi pemberian pakan lebih dari dua kali sehari hasilnya lebih baik dari pada yang dilakukan dua atau tiga kali sehari. Frekuensi pemberian pakan semakin sering maka semakin baik, namun dalam jumlah yang sama (Siregar, 2008).

Parakkasi (1999) menyatakan bahwa, palatabilitas pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah konsumsi pakan dan kemampuan ternak untuk mengonsumsi bahan kering yang terkandung dalam pakan berkaitan dengan kapasitas fisik lambung serta kondisi saluran pencernaan, sehingga tinggi rendahnya konsumsi pakan pada ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kondisi ternak serta faktor pakan. Menurut Imran, *et al* (2012) menyatakan bahwa palabilitas merupakan faktor yang penting dalam menentukan tingkat konsumsi ransum. Palabilitas ransum ditentukan oleh rasa, bau, dan warna dari pakan. Ternak dalam mengonsumsi ransum tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, produksi dan reproduksi. Konsumsi ransum dipengaruhi oleh iklim, suhu, imbalanced zat-zat makanan, kualitas ransum, bangsa ternak, kecepatan pertumbuhan, bobot badan, tingkat produksi, palatabilitas ransum dan tingkat energi ransum (Tillman dkk, 1991).

Yudith (2010) menambahkan bahwa salah satu faktor tingkat konsumsi pakan antara lain:

1. Faktor pakan dan palatabilitas, meliputi daya cerna pakan sangat menentukan pertumbuhan, bila kualitasnya baik dan diberikan dalam jumlah yang cukup, maka pertumbuhannya akan menjadi cepat, demikian pula sebaliknya
2. Faktor ternak yang meliputi bangsa, jenis kelamin, umur dan kondisi kesehatan ternak.

Konsumsi pakan antara lain dipengaruhi oleh bobot hidup ternak, semakin tinggi bobot hidup ternak, konsumsi bahan pakan semakin tinggi pula. Salah satu faktor penambahan berat badan dapat dipengaruhi oleh tingkat

konsumsi pakan, maka sapi yang mengalami kekurangan konsumsi pakan, penambahan berat badannya akan terhambat (Depison dan Sumarsono, (2001).

Palatabilitas pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah konsumsi pakan dan kemampuan ternak untuk mengkonsumsi bahan kering yang terkandung dalam pakan berkaitan dengan kapasitas fisik lambung serta kondisi saluran pencernaan, sehingga tinggi rendahnya konsumsi pakan pada ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kondisi ternak serta faktor pakan (Parakassi, 1999).

Menurut Campbell, *et al* (2006) menyatakan bahwa efisiensi penggunaan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kemampuan ternak dalam mencerna bahan pakan, kecukupan zat pakan untuk hidup pokok, pertumbuhan serta jenis pakan yang digunakan. Semakin baik kualitas pakan semakin baik pula efisiensi pembentukan energi dan produksi (Pond *et al*, 2005).

Menurut Oldman dan Smith (1982) menyatakan level protein akan meningkatkan konsumsi bahan kering. Pakan yang kurang kandungan nutrisinya seperti protein, juga dapat menurunkan konsumsi pakan. Produksi ternak hanya dapat terjadi apabila konsumsi energi pakan berada diatas kebutuhan hidup pokok (Sumadiyasa, 2013).

Peningkatan asupan nutrisi, bahan kering, bahan organik dan protein kasar, ketika daun kelor diberikan pada ternak, mungkin akibat dari protein kasar tinggi dan konsentrasi NDF rendah. Penambahan daun kelor memberikan efek pada konsumsi hay *B. brizantha* dan penelitian lain menunjukkan potensi hijauan

pohon untuk meningkatkan pemanfaatan pakan berserat berkualitas rendah (Sanchez, 2005).

Pengurangan ukuran partikel mampu mempercepat gerak laju pakan dalam rumen sehingga menaikkan konsumsi pakan serta menurunkan heat increment karena berkurangnya ruminasi (Utomo 2012).

Menurut Sagala (2011), bahwa efisiensi penggunaan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kemampuan ternak dalam mencerna bahan pakan, kecukupan zat pakan untuk hidup pokok, pertumbuhan dan fungsi tubuh serta jenis pakan yang digunakan.

D. Manajemen Pemberian Pakan pada Sapi Potong

Produktivitas ternak sapi potong sangat peka atau sensitif terhadap perubahan pemberian pakan, oleh karena itu pakan yang diberikan harus sesuai dengan ketersediaan, kesinambungan mutu maupun jumlahnya. Disamping itu perlu diketahui bahwa biaya pakan dalam usaha penggemukan memberikan kontribusi yang cukup besar. Oleh karena itu dalam usaha penggemukan, peternak harus dapat memberikan pakan yang murah namun bermanfaat bagi peningkatan produksi daging (Siregar, 2008).

Pada dasarnya, sumber pakan sapi dapat disediakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat, dan yang terpenting adalah pakan harus memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin serta mineral. Secara alamiah pakan utama ternak sapi baik potong maupun perah adalah hijauan, dapat berasal dari rumput alam atau lapang, rumput unggul, *leguminosa* dan limbah pertanian serta tanaman hijauan lainnya. Dalam pemberiannya harus diperhatikan hijauan

tersebut disukai ternak dan tidak mengandung racun atau *toxin* sehingga dapat membahayakan perkembangan ternak yang mengkonsumsi. Namun permasalahan yang ada bahwa hijauan di daerah tropis seperti di wilayah Indonesia mempunyai kualitas yang kurang baik sehingga untuk memenuhi kebutuhan gizi ternak tersebut, perlu ditambah dengan pemberian pakan konsentrat (Siregar, 2008).

Dalam pemberian pakan di kandang atau di palungan, yang perlu diperhatikan adalah mengetahui berapa jumlah pakan dan bagaimana ransum yang diberikan pada ternak sapi. Untuk itu, telah dibuat *feeding standard*. Akan tetapi, dalam pemberiannya ada yang dilakukan dengan cara *ad libitum*, yaitu diberikan dalam jumlah yang selalu tersedia. Ada juga yang diberikan dalam bentuk *restricted* atau dibatasi (Santosa, 2002).

Mutu, jumlah pakan dan cara cara pemberiannya sangat mempengaruhi kemampuan produksi sapi pedaging. Untuk mempercepat penggemukan, selain dari rumput, perlu juga diberi pakan penguat berupa konsentrat yang merupakan campuran berbagai bahan pakan umbi-umbian, sisa hasil pertanian, sisa hasil pabrik dan lain-lain yang mempunyai nilai nutrien cukup dan mudah dicerna (Setiadi, 2001).

Dalam menyusun ransum harus diusahakan agar kandungan nutrien di dalam ransum sesuai dengan nutrien yang dibutuhkan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan bereproduksi (Santoso, 2002).

Ransum adalah satu atau campuran beberapa jenis bahan pakan yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan ternak selama 24 jam. Ransum yang diberikan pada sapi yang digemukan tergantung pada sistem

penggemukan yang digunakan. Penggemukan sapi dengan sistem *pasture* hanya terdiri dari hijauan yang diperoleh dengan melepas sapi untuk merumput di padang penggembalaan. Demikian pula dengan sistem kereman yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, ada diantaranya yang hanya memberikan hijauan saja tanpa pakan tambahan berupa konsentrat (Siregar, 2008).

Pakan suplemen merupakan bahan yang mengandung jasad renik (mikroba) hidup yang sengaja ditambahkan dalam pakan sapi atau ruminansia lainnya. Dengan diberikan sedikit pakan tambahan, kebutuhan pakan persatuan ternak dapat dikurangi. Apabila setiap hari ternak membutuhkan 10-11 kg bahan kering (BK) untuk menaikkan 1 kg berat badan maka, penggunaan pakan tambahan mampu mengurangi jumlah pakan (Sarwono, 2002).

Pemberian pakan pada sapi potong dapat dilakukan secara *ad libitum* dan *restricted* (dibatasi). Pemberian secara *ad libitum* sering kali tidak efisien karena akan menyebabkan bahan pakan banyak terbuang dan pakan yang tersisa menjadi busuk sehingga ditumbuhi jamur dan sebagainya yang akan membahayakan ternak bila termakan (Santosa, 2002).

Tingkat konsumsi ternak ruminansia umumnya didasarkan pada konsumsi bahan kering pakan, baik dalam bentuk hijauan maupun konsentrat, persentase konsumsi bahan kering memiliki grafik meningkat sejalan dengan pertambahan berat badan sampai tingkat tertentu, kemudian mengalami penurunan. Rata-rata kemampuan konsumsi bahan kering bagi ruminansia adalah 2-3 % dari berat badan (Me Cullough, 1973). Atau 2,5 – 3,2 % menurut (Sugeng, 2002).

Ransum ternak ruminansia pada umumnya terdiri dari hijauan dan konsentrat. Pemberian ransum berupa kombinasi kedua bahan itu akan memberi peluang terpenuhinya nutrisi dan biayanya relatif murah. Namun bisa juga ransum terdiri dari hijauan ataupun konsentrat saja. Apabila ransum terdiri dari hijauan saja maka biayanya relatif murah dan lebih ekonomis, tetapi produksi yang tinggi sulit tercapai, sedangkan pemberian ransum hanya terdiri dari konsentrat saja akan memungkinkan tercapainya produksi yang tinggi, tetapi biaya ransumnya relatif mahal dan kemungkinan bisa terjadi gangguan pencernaan (Siregar, 2008).

Pada usaha penggemukan sapi, pemberian pakan konsentrat lebih banyak daripada hijauan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan badan yang cepat. Perbandingan jumlah konsentrat dan hijauan dalam ransum penggemukan sapi atas dasar bahan kering adalah 70 % dan 30 % (BPTP, 2001).

Pemberian konsentrat dapat dilakukan dua atau tiga kali dalam sehari semalam. Pemberian konsentrat dua kali dalam sehari semalam dapat dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 dan sekitar pukul 15.00. Lain lagi dengan pemberian yang dilakukan tiga kali dalam sehari semalam pada saat pukul 08.00, sekitar pukul 12.00, dan sekitar pukul 16.00. Sedangkan pemberian hijauan dilakukan sekitar 2 jam setelah pemberian konsentrat. Pemberian hijauan ini dilakukan secara bertahap dan minimal 4 kali dalam sehari semalam. Frekuensi pemberian hijauan yang lebih sering dilakukan dapat meningkatkan kemampuan sapi itu untuk mengonsumsi ransum dan juga meningkatkan pencernaan bahan kering hijauan. Teknik pemberian pakan yang baik untuk mencapai pertumbuhan

bobot badan yang lebih tinggi pada penggemukan sapi potong adalah dengan mengatur jarak waktu antara pemberian konsentrat dengan hijauan. Pemberian konsentrat dapat dilakukan dua atau tiga kali dalam sehari semalam. Hijauan diberikan sekitar dua jam setelah pemberian konsentrat pada pagi hari dan dilakukan secara bertahap minimal empat kali dalam sehari semalam (Siregar, 2008).

Dalam pemberian konsentrat sebaiknya dalam bentuk kering (tidak dicampur air), namun pemberian bentuk basah juga bisa dilakukan. Yang perlu diperhatikan bila pemberian bentuk basah adalah konsentrat tersebut harus habis dalam sekali pemberian sehingga tidak terbuang. Perubahan jenis pakan, yang secara mendadak dapat berakibat ternak stress, sehingga tidak mau makan. Oleh karena itu cara pemberiannya dilakukan sedikit demi sedikit agar ternak beradaptasi dahulu, selanjutnya pemberian ditambah sampai jumlah pakan yang sesuai kebutuhannya, sedangkan air minum diberikan secara *ad libitum* (Anonim, 2001).

Teknik pemberian pakan yang baik untuk mencapai pertambahan bobot badan yang lebih tinggi pada penggemukan sapi potong adalah dengan mengatur jarak waktu antara pemberian konsentrat dengan hijauan. Hijauan diberikan sekitar dua jam setelah pemberian konsentrat pada pagi hari dan dilakukan secara bertahap minimal empat kali dalam sehari semalam. Frekuensi pemberian hijauan yang lebih sering dilakukan dapat meningkatkan kemampuan sapi untuk mengkonsumsi ransum dan juga meningkatkan pencernaan bahan kering hijauan itu sendiri (Me Cullough, 1973).

Pemberian ransum hendaknya mencukupi kebutuhan zat gizi bagi ternak sapi dan lebih efisien agar tidak menimbulkan kerugian. Pemberian ransum tidak dimaksudkan kenyang, sehingga alat pencernaan terisi penuh, tetapi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan zat-zat ransum baik untuk hidup pokok maupun untuk produksi. Agar sapi dapat berproduksi dengan baik, maka frekuensi, dan waktu pemberian ransum harus tepat (Nuswantara, 2002). Pemberian ransum pada sapi potong dapat dilakukan secara tidak dibatasi dan dibatasi. Pemberian secara tidak dibatasi sering kali tidak efisien karena akan menyebabkan bahan ransum banyak terbuang dan ransum yang tersisa menjadi busuk sehingga ditumbuhi jamur yang akan membahayakan ternak bila termakan (Santosa, 2002). Sapi dengan pemberian ransum konsentrat yang dibatasi akan meningkatkan jumlah bakteri dan protozoa, terutama bakteri selulolitik di dalam rumen (Nuswantara, 2002). Blakely dan Bade (1992) menyatakan bahwa pemberian konsentrat dapat dicampur sekaligus dengan hijauan sebagai ransum lengkap.

Frekuensi pemberian ransum akan mempengaruhi tingkat konsumsi ransum dan kualitas ransum yang dikonsumsi ternak. Semakin sering frekuensi ransum akan semakin meningkatkan konsumsi ransum (Purbowati *et al*, 2003).

Dewell (2010) mengatakan bahwa puncak produksi panas dari konsumsi ransum adalah 4—6 jam setelah makan. Oleh karena itu panas produksi ternak makan di pagi hari akan mencapai puncaknya pada tengah hari ketika suhu lingkungan juga meningkat. Pengaruh langsung dari temperatur dan kelembaban terhadap produksi disebabkan meningkatnya kebutuhan sistem tubuh untuk menghilangkan kelebihan beban panas, pengurangan laju metabolik, dan

menyusutnya konsumsi ransum (Rumentor, 2003). Upaya pengurangan panas yang dapat dilakukan oleh sapi antara lain berteduh, mengurangi konsumsi ransum, memperbanyak minum, peningkatan frekuensi respirasi, meningkatkan produksi saliva dan keringat, serta mengeluarkan urin (Churng, 2002).

Pengaturan waktu pemberian ransum akan bermanfaat selama periode cuaca panas, guna menghindari stres panas pada ternak. Pengurangan kuantitas ransum di pagi dan siang hari dimana kondisi cuaca panas dan ternak cenderung mengurangi konsumsi ransum dan menambah kuantitas ransum yang diberikan di malam hari saat temperatur lingkungan turun dan ternak cenderung mengkonsumsi banyak ransum (Gaughan dan Mader, 1997). Sapi yang mengkonsumsi ransum lebih banyak di malam hari dan sedikit di siang hari dapat membantu mengurangi produksi panas metabolik pada suhu tinggi di siang hari (Lunn, 2010).

Proses pencernaan secara normal akan menghasilkan panas pada tubuh sapi. Manajemen pemberian ransum dengan jumlah sedikit di siang hari dan porsi yang lebih besar pada sore hingga malam hari dapat menghindari potensi stres panas pada sapi, selain itu proses fermentasi di dalam rumen berlangsung lebih baik selama suhu dingin di malam hari (Dahlen dan Stoltenow, 2012).

Malam hari saat suhu lingkungan rendah maka aktivitas dari kelenjar tiroid dapat menghasilkan tiroksin secara maksimal. Fungsi utama hormon tiroksin untuk meningkatkan metabolisme dan penyerapan zat-zat nutrisi yang akan meningkatkan absorpsi makanan, dengan demikian laju pertumbuhan akan meningkat. Pada siang hari suhu lingkungan tinggi, kelenjar tiroid tidak

menghasilkan tiroksin secara maksimal yang akan menurunkan laju pertumbuhan (Fradson, 1992).

E. *Pertambahan Berat Badan (PBB) Sapi Potong*

Pertambahan berat badan pada sapi potong sangat tergantung pada pakan serta kemampuan ternak itu sendiri dalam memanfaatkan pakan (Kostaman *dkk*, 2000).

Menurut Widada, *dkk* (2013) menyatakan bahwa iklim makro maupun iklim mikro pada suatu tempat dapat berpengaruh langsung terhadap penampilan produktivitas ternak. Pengaruh langsung misalnya terjadinya cekaman panas atau dingin, sehingga ternak menderita cekaman atau ternak merasa tidak nyaman yang berakibat terhadap penurunan konsumsi pakan, produksi (bobot badan) dan reproduksi ternak. Proses pertumbuhan pada semua jenis hewan terkadang berlansung cepat, lambat dan bahkan terhenti jauh sebelum hewan tersebut mencapai dalam ukuran besar tubuh karena dapat dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun lingkungan (Bambang, 2005).

Pertambahan bobot badan sapi ditentukan oleh berbagai faktor, terutama jenis sapi, jenis kelamin, umur, ransum atau pakan yang diberikan dan teknik pengolahannya. Diantara jenis sapi lokal, sapi ongole dan sapi Bali mempunyai pertambahan bobot badan yang tinggi (Siregar, 2008).

Pertambahan bobot hidup harian lebih dipengaruhi oleh protein yang dikonsumsi dibandingkan dengan mengkonsumsi energi. Makin tinggi taraf protein yang dikonsumsi oleh ternak maka makin besar pula responnya terhadap pertambahan bobot badan harian (Garantjang, 2004).

Bambang (2005) menjelaskan bahwa proses pertumbuhan pada semua jenis hewan terkadang berlansung cepat, lambat dan bahkan terhenti jauh sebelum hewan tersebut mencapai dalam ukuran besar tubuh karena dapat dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun lingkungan.

Oematan (2000) menyatakan bahwa sapi Bali (kisaran bobot badan awal 158-230 kg) mampu menghasilkan pertambahan bobot badan 0,7-0,9 kg/hari pada pemberian ransum dengan kandungan protein kasar 12,2-15,3%.

Amril (1990) menyatakan bahwa laju pertambahan bobot badan (Pbb) sapi Bali yang diberi rumput lapangan tanpa diberi pakan tambahan adalah 175,75 g/ekor/hari, namun pertambahan berat badan harian (Pbbh) meningkat jika diberi pakan tambahan konsentrat 1,8% hingga mencapai 313,88 g/ekor/hari juga hasil penelitian Bahar dan Rakhmat (2003) melaporkan bahwa pertambahan bobot badan harian (Pbbh) sapi bali yang digembalakan dengan pakan hijauan lokal pada musim kemarau berkisar antara 0,05-0,1 kg/ekor/hari, sedangkan pada musim hujan antara 0,2-0,4 kg/ekor/hari.

Susilawati, *et al* (2006), melaporkan rata-rata pertambahan berat badan sapi Bali Pandaan adalah $0,41 \pm 0,18$ kg/ekor/hari dan penelitian Pane (1991) juga melaporkan pertambahan bobot badan sapi Bali dengan pakan yang baik dapat mencapai 0,7 kg/hari (jantan dewasa) dan 0,6 kg/hari (betina dewasa). Kostaman *et al* (2000) menyatakan bahwa pertambahan berat badan sapi sangat tergantung pada pakan serta kemampuan ternak dalam memanfaatkan pakan.

F. Tinjauan Islam terhadap Pemanfaatan Tanaman sebagai Sumber Pakan Ternak

Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang dikaruniai curah hujan setiap tahunnya. Hujan adalah rahmat Allah swt. yang menjadi salah satu penyebab tanah menjadi subur yang merupakan media terbaik untuk perkembangan berbagai macam tumbuh-tumbuhan termasuk salah satunya aneka tumbuhan sumber pakan ternak ruminansia.

Salah satu tanaman yang memiliki berbagai macam manfaat baik untuk manusia maupun hewan ternak adalah tanaman kelor, mengingat kandungan berbagai zat nutrisi yang dibutuhkan banyak terkandung pada tanaman kelor, selain itu sifat kelor yang mudah tumbuh serta memiliki daya adaptasi yang baik pada kondisi cuaca yang ekstrim. Sehingga ada pepatah yang mengatakan dunia tidak selebar daun kelor tetapi pemanfaatan daun kelor secara maksimal untuk manusia dan ternak diharapkan akan menjadikan dunia terasa lebih sejahtera dan berkah. Sebagaimana diterangkan Iqbal (2014) menyatakan bahwa dalam pepatah “dunia tidak sesempit daun kelor” daun kelor diartikan sebagai sesuatu yang sempit atau kecil. Tidak banyak yang tahu bahwa arti (manfaat) harfiah daun kelor sesungguhnya sangat luas. Badan dunia WHO bahkan sudah 40 tahun terakhir menggunakan daun kelor ini untuk mengatasi malnutrisi pada anak-anak di negeri yang mengalami krisis pangan. Daun kelor Insya Allah bisa menjadi salah satu unggulan Indonesia di pasar MEA, bahkan pasar global nantinya. Meskipun seluruh pohon kelor mulai dari akar, pohon, daun dan buahnya bermanfaat, daun dan buahnya yang sangat berpotensi untuk digarap secara serius menjadi unggulan

komoditi Indonesia. Kelor memang bisa tumbuh di seluruh dunia, tetapi habitat terbaiknya adalah negeri panas tropis.

Allah swt. berfirman dalam QS An-Nahl/16:10 telah di sebutkan bagaimana hujan menjadi penyubur tanah yang menjadi tempat tumbuh berbagai tanaman untuk sumber makanan manusia atau sumber pakan hewan ternak:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ

Terjemahnya:

Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu (Kementrian Agama, RI; 2017)

Ayat tersebut menjelaskan betapa besar nikmat Allah berupa curah hujan yang menyuburkan tanah sebagai tempat yang sangat baik untuk tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pakan untuk ternak, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan tanah yang subur secara maksimal untuk menanam tumbuhan yang produktif dan kaya manfaat, banyak lahan yang belum ditanami tumbuhan yang produktif hanya dibiarkan kosong sehingga ditumbuhi oleh tumbuhan liar. Sehingga masalah kekurangan pangan pada manusia maupun pakan pada ternak kerap melanda misalnya ketika musim kemarau tiba.

Ketika Allah swt. telah menyebutkan apa yang telah Dia berikan nikmat kepada mereka, yaitu berupa binatang-binatang ternak, dan binatang-binatang melata, mulailah Dia menyebutkan nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka

yaitu berupa turunnya hujan dari langit yang didalam hujan itu ada air minum dan kenikmatan dunia untuk mereka dan binatang-binatang mereka. Maka Allah swt. berfirman “Dan untukmu sebagiannya menjadi minuman” Makasudnya Allah menjadikannya tawar lagi cair, yang mudah bagimu meminumnya dan Allah tidak menjadikannya asin lagi pahit. “Dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan yang (pada tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu “ Maksudnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari hujan itu untukmu, yang kamu semua menggembalakan ternak-ternakmu ditempat itu, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, Ikramah, adh-Dhahhak, Qatadah dan Ibnu Zaid dalam Firman Allah “Ditempat itu kamu menggembalakan ternakmu” *Tusiimun* yaitu menggembalakan dari lafazh itu pula disebut artinya, unta digembalakan. Akar kata dari kata tersebut artinya penggembalaan (Ghoffar, 2004).

Kata *syajara* bisa digunakan dalam arti pohon yang kokoh bukan yang merambat dan merupakan tempat menggembalakan ternak. Tumbuh-tumbuhan merupakan makanan dan perlindungan bagi hewan, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan, maka hiduplah binatang dan berbagai jenis hewan lainnya, dengan adanya tumbuhan dan binatang itu, maka hiduplah manusia seterusnya. Semua itu adalah berkat kebesaran dan kekuasaan Allah swt. (Shihab, 2003).

Salah satu jenis tanaman yang mempunyai manfaat yang sangat banyak baik untuk manusia maupun ternak adalah tanaman kelor yang saat ini jumlahnya belum bisa digunakan secara maksimal untuk pakan ternak karena kelor yang ada baru mencukupi untuk kebutuhan manusia seperti untuk bahan sayuran dan obat.

Masih banyak orang yang belum memaksimalkan lahan yang ada untuk menanam kelor dengan tujuan untuk pakan ternak padahal Allah swt. telah mengaruniakan wilayah Indonesia dengan tanah yang subur maka melalui potensi ini masyarakat didorong agar lebih giat lagi untuk mengolah lahan yang ada dengan menanamnya dengan tanaman-tanamn yang bermanfaat seperti kelor.

Tanaman kelor telah disebut didalam kitab *Ath_Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Dalam kitab ini yang disebut adalah minyak Baan atau minyak ben, digunakan bila minyak yang terbaik yaitu minyak zaitun tidak tersedia. Minyak ben (ben oil) dalam *Encyclopedia of Islamic Herbal Medicine* dihasilkan dari tanaman yang nama latinnya *Moringa oleifera* atau dalam bahasa orang Indonesia dikenal sebagai pohon kelor (Jawa, Sunda, Bali dan Lampung), kerol (Buru), Maronggih (Madura), *drumstick* , *miracle tree*, *magic tree*, *tree of life*, *the tree of paradise*, *mother best tree* (Inggris), kalor, marunggai dan sajian (Melayu). Sebagaimana Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut menyandingkan minyak terbaik yaitu minyak zaitun dengan minyak ben atau minyak kelor ini, maka kurang lebih seperti inipula masyarakat dapat menyandingkan produk unggulan zaitun dengan potensi unggulan lokal yaitu kelor (Iqbal, 2014).

Menanam tumbuhan merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah swt. yang bisa mendekatkan diri kita kepada-Nya dan bermanfaat untuk menjaga kualitas tanah serta menjadi sumber makanan untuk binatang-binatang atau tempat tinggal bagi mereka hasil dari tanaman ini utamanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Rasullah saw. telah memotivasi umat manusia

untuk giat menanam karena tidak ada kisiasaan didalamnya selama seseorang menanam pada lahan yang merupakan hak pribadinya sabda Rasulullah saw:

الشَّائِي عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا مَامِنُ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا لِمَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ
وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا كَلَّتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَزَعُوهُ أَي
يَنْقُصُهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ

Artinya:

Dari Jabir RA, secara *marfu'* :”Seorang muslim yang menanam suatu tanaman, nisyac^a apa yang termakan akan menjadi sedekah, apa yang tercuri akan menjadi sedekah, dan apapun yang diambil oleh seseorang dari tanaman itu akan menjadi sedekah bagi pemiliknya sampai hari kiamat datang.“ (HR. Muslim no. 2900)

Seorang muslim yang menanam tanaman tidak akan pernah rugi di sisi Allah swt. sebab tanaman tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh manusia dan hewan, bahkan bumi. Tanaman yang pernah ditanam oleh seorang muslim lalu diambil oleh siapa saja, baik dengan jalan yang halal, maupun jalan haram, maka sang penanam tetap mendapatkan pahala, sebab tanaman yang diambil tersebut berubah menjadi sedekah bagi diri yang menanam tanaman tadi. Pahala sedekah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hadis-hadis ini akan diraih oleh orang yang menanam, walaupun ia tidak meniatkan tanamannya yang diambil atau dirusak orang dan hewan sebagai sedekah (Fa'izah, 2010).

Jika demikian banyak manfaat dari reboisasi alias penghijauan, maka tak heran jika agama memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan tanah dan menanaminya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hadis-hadis lainnya, seperti beliau pernah bersabda,

عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل

Artinya:

Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi saw. bersabda, “Jika hari kiamat telah tegak, sedang di tangan seorang diantara kalian terdapat bibit pohon korma; jika ia mampu untuk tidak berdiri sampai ia menanamnya, maka lakukanlah”. [HR. Ahmad dalam Al-Musnad(3/183, 184, dan 191), Ath-Thoyalisiy dalam Al-Musnad (2068), dan Al-Bukhoriy dalam Al-Adab Al-Mufrod (479). Hadis ini di-shohih-kan oleh Syaikh Al-Albaniy dalam Ash-Shohihah (no. 9)]

Ahli hadis abad ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy rahimahullah berkata saat memetik faedah dari hadis-hadis di atas, "Tak ada sesuatu (yakni, dalil) yang paling kuat menunjukkan anjuran bercocok tanam sebagaimana dalam hadis-hadis yang mulia ini, terlebih lagi hadits yang terakhir diantaranya, karena di dalamnya terdapat targhib (dorongan) besar untuk menggunakan kesempatan terakhir dari kehidupan seseorang dalam rangka menanam sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia setelah ia (si penanam) meninggal dunia. Maka pahalanya terus mengalir, dan dituliskan sebagai pahala baginya sampai hari kiamat" (Fa'izah, 2010).

Seorang tabi'in yang bernama Umaroh bin Khuzaimah bin Tsabit Al-Anshoriy Al-Madaniy rahimahullah berkata,

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِأَبِي: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَغْرِسَ أَرْضَكَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ أَمُوتُ غَدًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعَزُّمُ عَلَيْكَ لَتَغْرِسَنَّهَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَغْرِسُهَا بِيَدِهِ مَعَ أَبِي

Artinya:

"Aku pernah mendengarkan Umar bin Khoththob berkata kepada bapakku, "Apa yang menghalangi dirimu untuk menanam tanahmu?" Bapakku berkata kepada beliau, "Aku adalah orang yang sudah tua, akan mati besok". Umar berkata kepadanya, "Aku mengharuskan engkau (menanamnya). Engkau harus menanamnya!" Sungguh aku melihat Umar bin Khoththob menanamnya dengan tangannya bersama

bapakku". [HR. Ibnu Jarir Ath-Thobariy sebagaimana dalam Ash-Shohihah (1/1/39)]

Begitu pula halnya ajaran Islam tentang memelihara hewan ternak harus dilakukan dengan ikhlas, professional dan penuh tanggung jawab dalam rangka beribadah kepada Allah swt. Jika ada seseorang yang menyayangi seekor binatang maka dengan amalnya itu bisa menjadi sebab Allah swt. merahmati orang itu lalu memasukkannya kedalam surga, dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَنَا رَجُلٌ إِلَى بَيْتْرِ فَنَزَلَ، فَشَرِبَ مِنْهَا، وَوَعَلَى الْبَيْتْرِ كَلْبٌ يَلْهَثُ، فَرَحِمَهُ، فَزَرَعَ أَحَدَ خُفَيْهِ فَسَقَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ (ابن حبان في صحيحه و رواه مالك و البخارى و مسلم و ابو داود اطول من هذا)

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ada seorang laki-laki mendekati sebuah sumur, lalu turun dan minum airnya, sedangkan di atas sumur ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Orang laki-laki tersebut merasa kasihan kepada anjing tersebut, maka dia melepas salah satu sepatunya untuk memberi minum anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepadanya (menerima amalnya) sehingga memasukkannya ke surga". [HR. Ibnu Hibban di dalam shahihnya, Bukhari no. 2363 dan Muslim no. 2244)]

Rasullah saw. mengancam orang yang tega menyiksa binatang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat bisa menjadi penyebab Allah swt. memurkainya melalui sebuah hadis:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَذِبتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ حَبَسْتَهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ أَغْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتَهَا وَلَا سَقَيْتَهَا حِينَ حَبَسْتَهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتَهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka". Nafi' berkata; Beliau berkata: "Sungguh Allah Maha Mengetahui bahwa kamu tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah".(HR. Bukahri no. 2192)

Islam menganjurkan pola makan yang sehat untuk seorang manusia yang baik yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air dan sisanya sepertiga untuk udara sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis:

عن المقدم بن معدي كرب أن رسول الله ﷺ قال: مَا مَلَأَ أَدَمِيَّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، بِحَسَبِ إِبْنِ آدَمَ لُقَيْمَةَ يُقْمَنَ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لِأَمْحَالَةَ فَأَعْلًا فَتَلْتُ لِطْعَامِهِ وَتَلْتُ شَرًّا بِهِ وَتَلْتُ لِنَفْسِهِ (رواه الترمذی وابن حبان)

Artinya:

Dari Miqdam bin ma'dikariba sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri, cukuplah bagi anak adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya, iikapun ingin berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk nafasnya. (HR. Tirmidzi no 2380 dan Ibnu Hibban)

Hadis tersebut jika dikaitkan dengan pola makan ternak khususnya ternak ruminansia seperti sapi kambing dan domba berbeda jika dibandingkan dengan manusia, karena ternak ruminansia dari segi anatomi alat pencernaanya pada ruminansia memiliki 4 buah lambung sementara pada manusia hanya 1 lambung, pada salah satu bagian lambung ruminansia yang bernama rumen memiliki fungsi sebagai tempat penampungan sementara makanan dalam jumlah banyak, kemudian difermentasi oleh bantuan mikroba seperti bakteri, protozoa

dan jamur untuk mengurai bahan makanan utamanya hijauan. Ternak ruminansia juga memiliki sifat memahbiak yaitu mengunyah bahan makanan sebanyak dua kali sehingga pola makan ternak secara alami adalah mengisi perutnya hingga kenyang baru kemudian mereka beristirahat untuk mengunyah makanan agar lebih halus sebelum masuk ke organ pencernaan selanjutnya. Jadi ternak ruminansia secara alami memiliki naluri untuk makan dan minum hingga komposisi makanan, air dan udara tercapai dalam ukuran yang pas dalam proses pencernaannya sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya .

Daun kelor adalah hijauan yang begitu bermanfaat bagi manusia dan ternak sehingga menjadi karunia yang begitu berharga yang patut kita syukuri. Allah menciptakan hijauan kelor selain untuk manusia juga sebagai bahan pakan untuk meningkatkan produktivitas ternak yang juga pada akhirnya untuk kesejahteraan manusia sehingga tidak ada keisiasiaan dalam segala penciptaan-Nya termasuk tanaman kelor ini. Maka upaya kita selaku khalifah di muka bumi ini adalah adalah banyak menanam dan melestarikan tanaman kelor sehingga mencukupi untuk kebutuhan ternak dan manusia karena jika jumlah tanaman kelor masih sedikit maka akan timbul persaingan antara manusia dan ternak untuk mengkonsumsi kelor. Tetapi manusia paling banyak memanfaatkan daun dan buahnya untuk bahan makanan dan menyisakan ranting daun maka ranting ini bisa diberikan pada ternak seperti sapi karena Allah swt. telah menciptakan alat pencernaan mereka dengan fungsi spesial yakni dapat mencerna hijauan yang manusia atau hewan lainnya tidak mampu mencernanya, dan akan lebih baik lagi jika jumlah tanaman kelor tersedia memadai untuk manusia dan ternak, karena

jika ternak sapi yang dipelihara tumbuh dan berkembang dengan baik dengan pemberian pakan hijauan berkualitas tinggi seperti hijauan kelor, maka ternak sapi yang dipelihara bisa menjadi salah satu bahan pangan sumber protein yang berkualitas tinggi utamanya daging dan susu. Allah swt. berfirman dalam QS. Ali Imran/3: 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka (Kementrian Agama, RI; 2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

MATERI DAN METODE

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – April 2016. Lokasi penelitian bertempat di Samata Integrated Farming System (SIFS), Jln. Veteran Bakung, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

B. Materi Penelitian

1. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa drum, ember, gerobak, timbangan analitik Iconix FX-1, 2 timbangan manual, mesin copper, parang, sekop, kandang jepit dan tali pengikat.

Bahan yang digunakan berupa 10 ekor ternak sapi Bali jantan, yang berumur 1-2 tahun dengan berat badan rata-rata 150 kg. pakan ternak berupa hijauan, daun kelor dan konsentrat

2. Pakan

Pakan yang diberikan dalam penelitian ini adalah pakan hijauan segar (rumput lapang, rumput benggala dan rumput gajah), daun kelor dan konsentrat. Daun kelor diberikan sebanyak 250 gram ekor/hari, hijauan diberikan secara *ad-libitum* Konsentrat dibuat dari bahan pakan lokal dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2. Komposisi Pakan Konsentrat yang Diberikan

Bahan	Jumlah (kg)
Ampas tahu	46
Dedak padi	46
Molases	4
Garam	2
Mineral	1
Urea	1
Jumlah	100

Tabel 3. Hasil Analisis Proximat Kandungan Nutrisi Pakan Konsentrat

Bahan dan Nutrisi	Komposisi (%)
Kadar air	42,41
Protein kasar	11,30
Lemak kasar	3,63
Serat kasar	41,49
BETN	19,05
Abu	24,54

Sumber: *Laboratorium Kimia Makanan Ternak Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.*

Keterangan: 1. *Kecauli air, semua fraksi dinyatakan dalam bentuk bahan kering*

2. *BETN: Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen*

3. *EM = 2169 Kkal/kg*

4. *TDN = 74,85*

Tabel 4. Hasil Analisis Proximat Kandungan Nutrisi Daun Kelor

Zat Nutrisi	Komposisi (%)
Kadar air	11,84
Protein kasar	25,70
Lemak	10,20
Serat kasar	9,84
BETN	41,56
Abu	13,06
Ca	3,34
P	0,39
Zn	12,56

Sumber: Laboratorium Kimia Makanan Ternak Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

C. Prosedur Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan pola 2 x 5, yaitu 2 perlakuan dengan masing-masing 5 ulangan. Perlakuan (P₁); pakan konsentrat dan hijauan segar lainnya dan perlakuan (P₂); penggunaan pakan konsentrat, hijauan segar lainnya + 250 gram daun kelor. Percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Percobaan Rancangan Acak Lengkap

Ulangan	Perlakuan	
	Perlakuan 1	Perlakuan 2
	- Konsentrat (6 kg/ekor/hari)	- Konsentrat 6 kg
	-	- Daun kelor 250 gr ekor/hari
	- Hijauan segar (adlibitum)	- Hijauan segar (adlibitum)
	- Air (adlibitum)	- Air (adlibitum)
1	A5	B5
2	A1	B4
3	A2	B3
4	A3	B1
5	A4	B2

2. Pembuatan Pakan Konsentrat

Pada pembuatan pakan konsentrat, bahan-bahan yang digunakan yaitu: dedak padi, ampas tahu, molasses, garam, urea, dan mineral dengan komposisi dapat dilihat pada Tabel 2.

3. Pemberian Pakan dan Air Minum

Pemberian pakan pada ternak dibagi menjadi dua kelompok dengan masing-masing 5 ulangan, dapat dilihat pada tabel 4. Pakan dan air minum diberikan 2 x/hari yaitu pada pagi hari dan sore hari. Pakan hijauan dan air minum diberikan secara *adlibitum*. Pakan konsentrat diberikan sebanyak 3 kg/ekor/hari di pagi hari dan 3 kg/ekor/hari di sore hari, sehingga total pakan yang diberikan 6 kg/ekor/hari.

4. Penimbangan

Pertambahan berat badan sapi, dapat dilihat dengan melakukan penimbangan pada saat:

- Awal penelitian (BB awal)
- Penelitian berlangsung selama 60 hari, sehingga penimbangan dilakukan sebanyak 7 x, dengan interval waktu setiap 10 hari.

5. Parameter yang diukur

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertambahan berat badan harian ternak sapi potong diukur menggunakan metode yang dikemukakan oleh Salim (2013).

$$PBBH = \frac{BB \text{ akhir pengamatan (kg)} - BB \text{ awal pengamatan (kg)}}{\text{Lama pengamatan (hari)}}$$

Berat badan awal : berat pada diawal percobaan/perlakuan (kg)

Berat badan akhir : berat pada diakhir penelitian (kg)

- b. Konsumsi pakan ternak sapi potong

$$\text{Konsumsi pakan (kg)} = \text{jumlah pakan diberi (kg)} - \text{jumlah pakan sisa (kg)}$$

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis statistik menggunakan *uji t-2 sampel bebas*. *Uji t-2 sampel bebas* bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan nilai 2 sampel yang diberi perlakuan yang berbeda (Yulius, 2010).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Konsumsi Pakan terhadap Pertambahan Berat Badan

Konsumsi pakan ternak sapi Bali perlakuan 1 (pakan konsentrat dan hijauan segar lainnya) dan sapi Bali perlakuan 2 (pakan konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-Rata Konsumsi Pakan pada Sapi Bali (Kg/Ekor/Hari) Selama Periode Penelitian (60 Hari) Pada Kedua Perlakuan.

No Sapi	Pakan Konsentrat dan Hijauan Segar Lainnya	Pakan Konsentrat, Hijauan Segar Lainnya + Daun Kelor
1	12.51	12.89
2	11.77	12.81
3	12.93	12.90
4	12.85	12.89
5	12.16	13.00
Rata-Rata	12.44	12.90

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi pakan pada sapi perlakuan 2 (pakan konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor) lebih tinggi 0,46 kg/ekor/hari dari pada sapi perlakuan 1 (pakan konsentrat dan hijauan segar lainnya). Data pada Tabel 6 selanjutnya dianalisis menggunakan *Uji t-2 Sampel Bebas (independent sample T-Test)*. Hasil analisis menunjukkan, bahwa rata-rata konsumsi pakan pada ternak sapi perlakuan 1 (pakan konsentrat dan hijauan segar lainnya) dan ternak sapi perlakuan 2 (pakan konsentrat, hijauan

segar lainnya + daun kelor) adalah tidak berbeda nyata, dengan nilai ($P > 0,05$). Hal ini dapat diartikan, pemberian pakan perlakuan 1 (pakan konsentrat dan hijauan segar lainnya) dan perlakuan 2 (pakan konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor) tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah konsumsi pakan pada ternak sapi. Meskipun secara analisis tidak berbeda nyata, tetapi secara statistik biasa menunjukkan perbedaan jumlah konsumsi pakan antara perlakuan 1 (pakan konsentrat + hijauan segar lainnya) dan perlakuan 2 (pakan konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor). Perbedaan jumlah konsumsi pakan ini, diduga dipengaruhi palatabilitas dari pakan yang diberikan. Parakkasi (1999) menyatakan bahwa, palatabilitas pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah konsumsi pakan dan kemampuan ternak untuk mengkonsumsi bahan kering yang terkandung dalam pakan berkaitan dengan kapasitas fisik lambung serta kondisi saluran pencernaan, sehingga tinggi rendahnya konsumsi pakan pada ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kondisi ternak serta faktor pakan. Menurut Imran, *dkk* (2012), yang menyatakan bahwa palatabilitas merupakan faktor yang penting dalam menentukan tingkat konsumsi ransum. Palatabilitas ransum ditentukan oleh rasa, bau, dan warna dari pakan. Ternak dalam mengkonsumsi ransum tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, produksi dan reproduksi. Konsumsi ransum dipengaruhi oleh iklim, suhu, imbang zat-zat makanan, kualitas ransum, bangsa ternak, kecepatan pertumbuhan, bobot badan, tingkat produksi, palatabilitas ransum dan tingkat energi ransum (Tillman *dkk*, 1991).

Konsumsi rata-rata bahan kering pakan pada perlakuan 1 adalah 4,73 kg dan perlakuan 2 konsumsi rata-rata bahan kering pakan adalah 4,83 kg, jadi konsumsi pakan pada perlakuan 2 adalah sebanyak 3,22% dari berat badan awal rata-rata ternak yaitu 150 kg. Hal ini sesuai dengan pendapat Tillman dkk, (1991) yang menyatakan bahwa sapi potong mampu mengkonsumsi ransum berupa bahan kering sebanyak 3-4% dari bobot badannya.

Faktor konsumsi pakan berkaitan dengan pertambahan berat badan ternak, hal ini ditunjukkan pada Tabel 7 (rata-rata pertambahan berat badan harian) dan Tabel 6 (rata-rata konsumsi pakan harian). Jika diamati secara seksama, maka rata-rata pertambahan berat badan harian sapi perlakuan 1 (pakan konsentrat + hijauan segar lainnya) dan sapi yang pakan 2 (pakan konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor) jumlah konsumsi pakan yaitu rata-rata 12,44 kg/ek/hr berbanding 12,90 kg/ek/hr pada masing-masing perlakuan, namun Pbbh sapi perlakuan 2 (pakan konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor) rata-rata lebih tinggi 0,07 kg/ek/hr jika dibandingkan dengan sapi perlakuan 1 (pakan konsentrat + hijauan segar lainnya), hal ini berarti bahwa suplementasi daun kelor dalam ransum bisa memperbaiki atau mempertahankan pertambahan berat badan pada sapi juga dapat meningkatkan jumlah konsumsi pakan lebih baik jika dibanding sapi yang tidak diberi tambahan daun kelor dalam ransum yang diberikan. Hal sesuai dengan pendapat Foidl *et al*, (2001) yang menyatakan bahwa pemberian daun kelor sebagai pakan suplemen pada ternak sapi meningkatkan total konsumsi pakan dan meningkatkan pertambahan berat badan harian dibandingkan dengan sapi yang hanya mengkonsumsi rumput. Juga

ditambahkan Sarwatt, *et. al.* (2004) melaporkan bahwa daun kelor mempunyai potensi untuk bisa dipakai sebagai bahan suplemen pakan pada ternak ruminansia.

B. Pertambahan Berat Badan Harian (PBBH) Sapi Bali


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh rata-rata pertambahan berat badan harian sapi yang beragam pada kedua perlakuan rata-rata pertambahan berat badan harian (PBBH) pada kedua perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rata-Rata Pertambahan Berat Badan Sapi Bali (Kg/Ekor/Hari) Selama Periode Penelitian (60 Hari) Pada Kedua Perlakuan.

No	Perlakuan 1 (Pakan Konsentrat + Hijauan Segar Lainnya)	Perlakuan 2 (Pakan Konsentrat + Hijauan Segar Lainnya+ Daun kelor)
1	0,24	0,26
2	0,23	0,38
3	0,34	0,43
4	0,24	0,31
5	0,31	0,33
Rata-Rata ekor/hari	0,27	0,34

Pada Tabel 7 menunjukkan, bahwa rata-rata pertambahan berat badan harian (PBBH) kg/ekor/hari pada kedua perlakuan menunjukkan perbedaan yang cenderung signifikan ($P < 0,1$), dimana pada perlakuan 2 (konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor) pertambahan berat badan harian (PBBH) kg/ekor/hari1 lebih

tinggi 0,07 kg/ekor/hari dari pada perlakuan 1 (pemberian pakan konsentrat dan hijauan segar lainnya). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pakan yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula. Ternak pada perlakuan 2 (konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor) yaitu adanya penambahan daun kelor memberikan rata-rata pertambahan berat badan yang lebih baik. Diduga kandungan zat nutrisi dari pakan daun kelor (*Moringa oleifera*) memberikan efek pada laju kecepatan pertambahan berat badan. Kandungan nutrisi pakan yang diberikan pada perlakuan 2 (konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor) yang bersumber dari daun kelor (*Moringa oleifera*) berdasarkan analisis proximat memiliki kandungan: protein kasar 25,70%, lemak kasar 10,20 %, dan serat kasar 9,84%, sehingga kandungan nutrisi pakan yang dikonsumsi ternak pada perlakuan 2 (konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor) lebih baik dari pada ternak pada perlakuan 1 (pemberian pakan konsentrat dan hijauan segar lainnya). Rata-rata berat badan pada kedua perlakuan dapat diilustrasikan pada grafik 1.



Grafik 1. Rata-Rata Berat Badan Sapi Bali (Kg/Ekor). Setiap 10 Hari pada Kedua Perlakuan.

Pemberian daun kelor pada penelitian ini menghasilkan rata-rata pertambahan berat badan harian (Pbbh) sapi Bali 0,34 kg/ekor/hari, dengan rata-rata berat badan awal 150 kg. Rata-rata pertambahan berat badan harian (Pbbh) ini ternyata lebih rendah dibandingkan yang dilaporkan Oematan (2000), bahwa sapi Bali (kisaran bobot badan awal 158-230 kg) mampu menghasilkan pertambahan bobot badan 0,7-0,9 kg/hari pada pemberian ransum dengan kandungan protein kasar 12,2-15,3%. Perbedaan ini diduga, disebabkan oleh berbagai faktor seperti pakan dan kondisi lingkungan, pemberian daun kelor juga mempunyai beberapa macam respon pada ternak yang diberi daun kelor dan ternyata tidak semuanya dapat memacu pertambahan berat badan secara maksimal seperti halnya yang kita dapati dalam penelitian ini. Misalnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwatt *et al.*, (2002) melaporkan bahwa pada kasus dengan kambing, dimasukkannya 9%, 27% dan 36% dari daun kelor dalam ransum menghasilkan konsumsi bahan

kering masing-masing 251, 335 dan 311 gram/hari. Namun, penggabungan berbagai tingkat pemberian daun kelor tidak mempengaruhi penambahan berat badan masing-masing 16,1, 15,0 dan 13,6 gram/hari. Juga dilaporkan oleh Aregheore (2002) bahwa kambing yang diberi dengan 20% dan 50% dari daun kelor memiliki konsumsi bahan kering dari 50,9 dan 51 gram/hari, yang mirip dengan kambing yang tidak diberi daun kelor. Kambing yang diberi suplemen daun kelor memiliki penambahan berat badan rata-rata 86 dan 78 gram/hari sedangkan kambing yang tidak diberi tambahan kelor hanya diperoleh 55 gram/hari. Sedangkan untuk sapi dilaporkan oleh Castellon dan Gonzalez (1996) bahwa ketika sapi jantan yang lambat makan dengan jerami rumput-rumput bermuda (*Cynodon dactylon*) atau jerami yang ditambah dengan daun kelor pada 0,6% dari berat badan secara bahan kering, menemukan perbedaan yang signifikan dalam berat badan masing-masing 0,045 dibandingkan 0,380 kg / hari.

Hijauan kelor yang diberikan pada ternak perlakuan 2 merupakan pakan suplemen yang menjadi salah satu penyedia protein, vitamin dan mineral, Begitupun juga dengan kandungan jenis asam amino lainnya yaitu metionin dan sistin kolaborasi semua zat nutrisi inilah yang sangat dibutuhkan untuk proses metabolisme agar produktivitas ternak khususnya penambahan berat badan bisa tercapai dengan maksimal. Sebagaimana pendapat Makkar dan Becker, (1996) yaitu kelor juga kaya karoten, asam askorbat, besi dan dua jenis asam amino yang umumnya kurang pada pakan lainnya, yaitu metionin dan sistin.

Daun kelor bisa meningkatkan proses penyerapan protein dalam rumen oleh mikroba hal ini sesuai dengan pendapat Soliva *et al* (2005) yang menyatakan

bahwa daun kelor juga merupakan sumber protein untuk ruminansia, dan mampu meningkatkan sintesis protein mikroba dalam rumen. Protein, vitamin dan mineral dalam tubuh ternak selanjutnya diabsorpsi didalam usus halus, usus besar dan cecum lalu masuk kedalam pembuluh darah untuk selanjutnya menjadi bahan baku proses metabolisme untuk mencukupi kebutuhan hidup ternak jika sudah terpenuhi maka kelebihan hasil metabolisme digunakan untuk pembentukan sel lalu jaringan dan produknya pada ternak sapi adalah berupa pertumbuhan dan penambahan bobot badan hal ini sesuai dengan proses yang dijelaskan oleh McDonald *et al*,(2002) menyatakan bahwa nutrisi adalah semua unsur atau senyawa kimia dalam pakan yang menunjang kebutuhan pokok, pertumbuhan, laktasi dan reproduksi. Hewan mendapatkan pakan dengan tujuan nutrisi yang berbentuk molekul besar akan dicerna atau dihidrolisis lebih dulu menjadi komponen zat makanan utama yang siap diserap sebagai asam amino dari protein. Pemecahan nutrisi terjadi di dalam saluran pencernaan melalui gerakan mekanik dan aktivitas enzim. Komponen nutrisi diserap dinding sel saluran pencernaan yang selanjutnya memasuki dan diangkut melalui sistem peredaran darah menuju berbagai organ tubuh. Di dalam organ, nutrisi dimetabolisme khususnya dalam jaringan dan sel. Hasil metabolisme tersebut digunakan untuk hidup pokok, pembentukan daging, susu, telur dan wol, tenaga dan reproduksi. Oleh sebab itu, ternak memerlukan nutrisi untuk menghasilkan performa produksi yang tertinggi.

Kelor juga memiliki keunggulan lainnya yaitu kandungan protein *bypass* yang tinggi sehingga protein bisa lebih cepat diabsorpsi oleh ternak didalam usus halus, sehingga tidak perlu proses fermentasi lagi di rumen untuk mensintesis

protein dari daun kelor sehingga ternak tidak mengeluarkan energi yang terlalu besar untuk memperoleh protein, hal ini sesuai dengan pendapat Becker, (1996) yang menyatakan protein kasar kelor adalah kualitas yang lebih baik untuk ruminansia dari protein kasar daun gamal atau lamtoro karena karena kandungan tinggi protein *bypass*, 47% berbanding masing-masing 30% dan 41%.

Data pada Tabel 7, selanjutnya dianalisis menggunakan *Uji t-2 Sampel Bebas (independent sample T-Test)*. Hasil analisis menunjukkan, bahwa rata-rata pertambahan berat badan harian (Pbbh) pada ternak sapi Bali yang diberikan pakan konsentrat dan hijauan segar lainnya dan yang diberi pakan konsentrat, hijauan segar + daun kelor adalah cenderung berbeda, dengan nilai ($P < 0,1$). Hal ini dapat diartikan, pemberian daun kelor pada konsentrat dapat memacu peningkatan pertambahan badan harian (Pbbh) pada ternak sapi perlakuan 2 dibandingkan ternak sapi perlakuan 1 sehingga penambahan daun kelor sebanyak 250 gram sebagai suplemen pada pakan dalam konsentrat ada kemungkinan mampu meningkatkan pertambahan berat badan pada ternak. Karena kandungan nutrisi dalam daun kelor lebih lengkap maka hal ini yang bisa mempertahankan kondisi tubuh ternak yang prima sehingga tetap menghasilkan pertambahan berat badan harian pada sapi, meskipun pertambahan berat badan harian yang dihasilkan berfluktuasi selama periode penelitian kadang meningkat dan kadang menurun tetapi jika dirata-ratakan pertambahan berat badan harian sapi perlakuan 2 lebih baik daripada pertambahan berat badan harian sapi perlakuan 1, hal ini didukung oleh Subadra *et al* (1997) yang melaporkan bahwa kelor kaya akan asam amino, vitamin dan mineral terutama zat besi. Sarwatt *et al* (2004)

melaporkan bahwa daun kelor merupakan sumber protein murah yang potensial untuk pakan ternak. Keuntungan menggunakan kelor sebagai sumber protein yang banyak, dan termasuk fakta bahwa itu adalah tanaman tahunan yang dapat dipanen beberapa kali dalam satu musim tanam dan juga memiliki potensi untuk mengurangi biaya pakan.

Rata-rata penambahan berat badan yang diperoleh pada perlakuan 2 (konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor). Lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh Nulik dan Hau (2004) yang menggunakan hijauan lamtoro dan gamal pada ternak sapi Bali, yang menghasilkan rata-rata penambahan berat badan 0,09 kg/ekor dan 0,23 kg/ekor/hari. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian pakan daun kelor (*moringa oleifera*) lebih baik dalam memacu pertumbuhan berat badan harian pada sapi Bali dibandingkan dengan pakan daun hijauan lainnya seperti gamal dan lamtoro. Namun, pengguna hijauan lainnya berupa daun murbei memberikan hasil pertumbuhan berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pakan hijauan daun kelor ((konsentrat, hijauan segar lainnya + daun kelor)), hal ini dilaporkan oleh Syahrir (2009) bahwa pertumbuhan bobot badan harian sapi peranakan ongole (PO) jantan menggunakan pakan jerami padi + hijauan murbei diperoleh pertumbuhan berat badan harian (PBBH) sebesar 0,79 kg/hari dengan pemberian pakan jerami padi, konsentrat dan murbei yang memiliki imbang 50:50:0, 50:25:25 dan 50:0:50.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini pemberian daun kelor (*Moringa oelifera*) sebanyak 250 gram/ekor/hari pada sapi Bali menunjukkan pengaruh yang cenderung signifikan dalam memacu peningkatan pertumbuhan berat badan sapi Bali.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi penggunaan pakan hijauan daun kelor (*Moringa oelifera*) dalam ransum dalam kadar yang lebih tinggi dari pemberian 250 gram/ekor/hari pada sapi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinarti, R., Fariha, U.R. dan Lestari C.M.S, 2011. *Pertumbuhan Sapi Jawa yang Diberi Pakan Jerami Padi dan Konsentrat Dengan Level Proteinj yang Berbeda*. JITV. Puslitnak. Badan Litbang Pertanian Volume 16 Nomor 4 Hlm 260 – 265.
- Agus A. 2007. *Membuat Pakan Ternak Secara Mandiri*. (ID): PT. Citra Adi Parama. Yogyakarta.
- Amaha, K., Sasahi, Y, dan Segawa T, 1996. *Utilization of Tofu (Soybean Curd) By-Product as Feed for Cattle*. [http// www.agnet.org](http://www.agnet.org). Diakses pada tanggal 20 Februari 2016.
- Amril, M. A, S. Rasjid dan S. Hasan. 1990. *Rumput Lapangan dan Jerami Padi Amoniasi Urea Sebagai Sumber Hijauan dalam Penggemukan Sapi Bali Jantan dengan Makanan Penguat*. Pros. Seminar Nasional Sapi Bali. 20-22 September 1990. Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Denpasar.
- BPTP, 2001. *Sapi Potong*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah. Semarang.
- Anwar F., Ashraf M, dan Bhangar MI. 2005. *Interprovenance Variation in The Composition of Moringa Oleifera Oilseeds From Pakistan*. J Am Oil Chem Soc 82: 45–51.
- Anwar F. Bhangar MI. 2003. *Analytical Characterization of Moringa Oleifera Seed Oil Grown in Temperate Regions of Pakistan*. J Agric Food Chem 51: 6558–6563.
- Aregheore, E.M., 2002. *Intake and Digestibility of Moringa Oleifera–Batiki Grass Mixtures by Growing Goats*. Small Rumin. Res. 46, 23– 28
- Azevêdo JAG, Sebastio de Campos VF, Douglas dos SP, Rilene Ferreira DV, Edenio D. 2010. *Prediction of Dry Matter Intake by Cattle in Feedlot*. www.BRCorteBrazil.co.id. Diakses pada tanggal 6 Februari 2016.
- Bahar, S. dan Rakhmat. 2003. *Kajian Pertumbuhan Sapi Bali yang Digembalakan dengan Pakan Hijauan Lokal*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, 28-29 September 2003. Bogor.
- Bambang S. Y. 2005. *Sapi Potong*. Penebar Swadaya. Jakarta.

- Becker, K., 1995. *Studies on Utilization of Moringa Oleifera Leaves As Animal Feed*. Institute for Animal Production in the Tropics and Subtropics, vol. 480. University of Hohenheim, Stuttgart.
- Bennett R, Mellon F, Pratt J, Dupont M, Pernins L, Kroon P. 2003. *Profiling Glucosinolates and Phenolics in Vegetative and Reproductive Tissues Of Multi-Purpose Trees Moringa Oleifera L. (Horseradish Tree) and Moringa Stenopetal L.* J. Agric. Food Chem, 51: 3546-5553.
- Bhattacharya SB. Das AK. Banerji N. 1982. *Chemical Investigations on The Gum Exudates from Sonja (Moringa Oleifera)*. Carbohydr Res 102: 253–262.
- Blakely. J. dan D.H. Bade. 1992. *Ilmu Peternakan*. Edisi IV. Penerjemah B. Srigandono. Penyunting Sudarsono. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Campbell, J. R., M. D. Kenealy & K.L. Campbell 2006. *Animal Sciences*. 4th Edition. McGraw-Hill, New York.
- Castello´n, C.V., Gonza´lez, C.J.R., 1996. *Utilizacio´N Del Marango (Moringa Oleifera) En La Alimentacio´N De Novillos En Crecimiento Bajo Re´Gimen De Estabulacio´N*. Thesis Lic. Zootecnia. Managua, Nicaragua, UCA. p. 44.
- Churng, F.L. 2002. *Feeding Management and Strategies for Lactating Dairy Cows Under Heat Stress*. International Training on Strategies for Reducing Heat Stress in Dairy Cattle. Taiwan Livestock Research. Hsinchu. Taiwan.
- Dahlen. C.R. dan C.L. Stoltenow. 2012. *Dealing with Heat Stress in Beef Cattle Operation*. North Dakota State University Fargo. North Dakota.
- Davies HL. 1982. *Principle on Growth of Animal*. In H. L. Davies, Nutrition on Growth Manual. Canberra.
- Depison dan Sumarsono, T., 2001. *Evaluasi Hasil Perkawinan Induk Sapi Bali dengan Beberapa Bangsa Pejantan di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Bunga Tebo*. Jurnal ilmiah ilmu-ilmu peternakan. 4 (1): 29-35.
- Dewell. G. 2010. *Heat Stress in Beef Cattle*.
<http://vetmed.iastate.edu/vdpam/extension/beef/current-events/heat-stressbeef-cattle>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2016.
- Erlangga, E. 2013. *Meningkatkan Bobot Sapi Potong dengan Pakan Racikan Sendiri*. Pustaka Argo Mandiri. Pamulang.

- Fa'izah Abu. 2010. *Go Green Sebuah Amal Jariah*. Buletin Jum'at At-Tauhid edisi 121 Tahun II, Pustaka Ibnu Abbas.Sulawesi Selatan, Gowa.
- Faizi S. Siddiqui B. Saleem R. Saddiqui S. Aftab K. 1994. *Isolation and Structure Elucidation Of New Nitrile and Mustard Oil Glycosides From Moringa Oleifera and Their Effect On Blood Pressure*. J Nat Prod 57: 1256–1261.
- Foidl. N. Makkar H. Becker K. 2001. *In The Miracle Tree: The Multiple Uses of Moringa(Ed, J, F)*. Wageningen, Netherlands. pp. 45-76.
- Franson. R.D. 1992. *Anatomi dan Fisiologi Ternak*. Diterjemahkan oleh: Srigandono, B., dan K. Praseno. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Fuglie. L. J. 2001. *The Miracle Tree: The Multiple Attributes of Moringa*. Cta-CWS. Dakar-Senegal.
- Gadberry Shane. 2015. *Alternative Feeds for Beef Cattle*. Agriculture and Natural Resources, Research & Extension University of Arkansas System. <http://www.uaex.edu/publications/pdf/fsa-3047.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2016.
- Garantjang, S. 2004. *Pertumbuhan Anak Kambing Kacang pada Berbagai Umur Induk yang Dipelihara Secara Tradisional*. [www.pascaunhas.net/.../05-Sjamsuddin%20FORMTA%20KOLO M%20ok%20prin](http://www.pascaunhas.net/.../05-Sjamsuddin%20FORMTA%20KOLO%20M%20ok%20prin). diakses pada tanggal 13 Oktober 2014.
- Gaughan. J.B. dan T.L. Mader. 1997. *Managing Heat Stress on Feedlot Cattle Through Nutrition*. Armidale NSW. Australia.
- Ghoffar Abdul E M. Abdurrahim Mu'thi. Abu Ihsan Al- Atsari dan M. Yusuf Harun. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Bogor.
- Heng-Chu, A. 2004. *Utilization of Agricultural By-Products in Taiwan*. <http://www.agnet.org>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2016.
- Heryanto K., Maaruf, S.S., Malalantang., Waani M.R. 2016. *Pengaruh Pemberian Rumput Raja (Pennisetum Purpupoides) dan Tebon Jagung terhadap Performans Sapi Peranakan Ongole (Po) Betina*. Jurnal Zootek Vol. 36 No.1:123-130. Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Imran Budhi, S.P.S., Ngadiyono, N., Dahlanuddin. 2012. *Pertumbuhan Pedet Sapi Bali Lepas Sapih yang Diberi Rumput Lapang dan Disuplementasi Daun Turi (Sesbania Grandiflora)*. Agrinimal J Ilmu Ternak dan Tanaman. 2:55-60.

- Iqbal Muhammad. 2014. *Dunia Luas dengan Daun Kelor*. Artikel enterpreunership pada gerai dinar. <http://geraidinar.com/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/81-gd-articles/entrepreneurship/1508-dunia-luas-dengan-daun-kelor>. diakses pada tanggal 1 oktober 2016.
- Jama, B., Nair, P.K.R. and Kurira, P.W. 1989. *Comparative Growth Performance Of Some Multipurpose Trees and Shrubs Grown At Machakos*, Kenya. *Agroforestry Systems* 9, 17-27.
- Kakengi, A. M. V., M. N. Shem, S. V. Sarwatt & T. Fujihara. 2005. *Can Moringa Oleifera Be Used As A Protein Supplement For Ruminants?*. *J. Anim. Sci.* 18(1):42-47.
- Knipscheer, H.C., T.D. Soedjana and A. Prabowo. 1983. *Survey of Six Specialized Small Ruminant Farms in West Java*. BPT/SR-CRSP Working paper No. 9.
- Kostaman T., E. Handwirawan, B. Haryanto dan K. Dwiyanto. 2000. *Respons Bangsa Sapi Potong Terhadap Pemberian Jerami Padi*. Pros. Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Bogor 18–19 Oktober 1999.
- Lunn, D. 2010. *Managing Heat Stress in Beeff Cattle*. Journal. Nutreco Canada Inc. www.nutrecocanada.com/docs/shur-gain-beef/managing-heat-stress-in-beefcattle.pdf. Diakses pada tanggal 9 Januari 2016.
- Makkar. H. P. S. and Bekker. K. 1996. *Nutritional Value And Antinutritional Components of Whole and Ethanol Extracted Moringa Oleifera Leaves*. *Anim. Feed Sci. and Tech.* 63 : 211-228.
- Manurung L. 2008. *Analisi Ekonomi Uji Ransum Berbasis Pelepa Daun Sawit, Lumpur Sawit dan Jerami Padi Fermentasi dengan Phanerochate Chysosporium pada Sapi Peranakan Ongole*. Departemen Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara Medan.
- Marhaeniyanto E. S. Rusmiwari dan S. Susanti. 2015 *Pemanfaatan Daun Kelor untuk Meningkatkan Produksi Ternak Kelinci New Zealand White*. *Buana Sains* Vol 15 No 2: 119-126, 2015. PS. Peternakan, Fak. Pertanian. Universitas Tribhuwana Tungadewi. Malang.
- Marhaeniyanto E. dan Susanti S. 2014. *Produk Fermentasi dan Produksi Gas Secara Invitro dari Ransum yang Mengandung Daun Kelor (Moringa Oleifera, Lamm)*. *Buana Sains* Vol. 14 No. 2: 19-28, 2014. Fakultas Peternakan, Universitas Tribhuwana Tungadewi. Malang.
- McDonald, P., Edwards, R. A. & Greenhalgh, J. F. D. 2002. *Animal Nutrition*. 6th edition. Longman Scientific and Technical, New York.

- Me Cullough, M. E. 1973. *Optimum Feeding of Dairy Animal for Meat and Milk*. Athens: The University of Georgia Press.
- Nitis, I.M. dan K. Lana. 1983. *Pengaruh Suplementasi Beberapa Limbah Industri Pertanian Terhadap Pertumbuhan Sapi Bali*. Pros. Seminar Pemanfaatan Limbah Pangan dan Limbah Pertanian untuk Makanan Ternak. LKN-LIPI, Bandung. Hal. 157-162.
- Novieta, I.D. 2012. *Pemanfaatan Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak: Sulawesi Selatan*. <http://pemanfaatan-ampas-tahu-untuk-pakan.html>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2016.
- Nulik J dan Hau D.K. 2005. *Pembuatan dan Pemanfaatan Pakan Awet pada Ternak Sapi Bali Timor*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur. Kupang.
- Nuswantara, L.K. 2002. *Ilmu Makanan Ternak Ruminansia. Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak*. Fakultas Peternakan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Oematan JS. 2000. *Pertumbuhan Kompensasi Sapi Bali Jantan pada Beberapa Imbangan Energi: Protein Ransum dan Efeknya Terhadap Sifat-sifat Karkas*. Thesis.Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Oldman, J.D. dan T. Smith. 1982. *Protein Energy Interrelation For Growing and for Lactation Cattle*. In E.L. Miller, I.H. Piuke and A.J.H. Van es (Ed). Protein Contribution of Feedstuff of Ruminant.Application to Feed Fornulation.Butterworth Scientific. London. Pp 103-130.
- Panjaitan. T. 2010. *Inovasi Pengembangan Kelor (*Moringa oleifera*) sebagai Pakan Ternak Mendukung Swasembada Daging Sapi*. <http://ntb.litbang.deptan.go.id/> Diakses pada tanggal 10 Januari 2016.
- Parakkasi, A. 1999. *Ilmu Makanan dan Ternak Ruminansia*. UI Press, Jakarta. Hal 371-374.
- Pond, W. G., D. C. Church, K. R. Pond dan P.A. Schoknet. 2005. *Basic Animal Nutrition and Feeding*. 5th Revised Edition.John Willey and Sons Inc.New York.
- Purbowati E. R.T. Mulatsih. dan Surahmanto. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Petani dengan Penerapan Teknologi Penggemukan Berbasis Pakan*

Lokal di Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Putra Wibawa, A. A. P., Adi Parwata, I G. B., Wirawan I W., Sumardani, N. L. G., dan Suberata, I W. 2014. *Respons Rumput Gajah (Pennisetum Purpureum Schumach) terhadap Aplikasi Pupuk Urea, Kotoran Ayam, dan Kotoran Sapi sebagai Sumber Nitrogen (N)*. Majalah Ilmiah Peternakan • Volume 17 Nomor 2 Tahun 201 Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Denpasar.
- Rumentor. S.D. 2003. *Stres Panas Pada Sapi Perah Laktasi*. Makalah Falsafah Sains. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sagala W. 2011. *Analisis Biaya Pakan dan Performa Sapi Potong Lokal Pada Ransum Hijauan Tinggi yang Disuplementasi Ekstrak Lerak (Sapindus Rarak)*. [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Salim, E. 2013. *Sukses Bisnis dan Beternak Sapi Potong*. Lily Publisher. Yogyakarta.
- Sanchez. M. D. 2002. *Mulberry an Exceptional Forage Available Almost Worldwide Animal Production and Health Division*. Publishing and Multimedia Service. FAO, Roma.
- Sanchez, N. R., E. Sporndly, I. Ledin 2005. *Article In Press Livestock Science*. www.elsevier.com/locate/livesci. Diakses pada tanggal 10 Januari 2016.
- Sanchez, N. R., E. Sporndly, I. Ledin 2005. *Effect Of Feeding Different Levels Of Foliage Of Moringa Oleifera To Creole Dairy Cows On Intake, Digestibility, Milk Production and Composition*. Article In Press Livestock Science. Faculty of Animal Science, Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua and Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
- Sánchez, N.R. 2006. *Moringa oleifera and Cratylia argentea: Potential Fodder Species for Ruminants in Nicaragua*. PhD Thesis. Swedish University of Agricultural Science.
- Santosa. U. 2002. *Tata Laksana Pemeliharaan Ternak Sapi*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sarwatt, S.V., Kapange, S.S., Kakengi, A.M.V., 2002. *Substituting Sunflower Seed Cake with Moringa Oleifera Leaves As A Supplemental Goat Feed in Tanzania*. Agrofor. Syst. 56, 241– 247.

- Sarwatt, S. V. Milang'ha, M. S. Lekule, F. P. and Madalla. N. 2004. *Moringa Oleifera and Cottonseed Cake As Supplements For Smalholder Dairy Cows Fed Napier Grass*. Livestock Research for Rural Development Vol 16 (6).
- Setiadi, B. 2001. *Beternak Sapi Pedaging dan Masalahnya*. Aneka Ilmu. Semarang.
- Setiawan D dan Nuraini H. 2016. *Penampilan Produksi Sapi Peranakan Ongole yang Diberi Pakan Konsentrat yang Mengandung Tepung Daun Murbei*. Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Pontianak dan Bogor.
- Shihab Quraish M. 2003. *Mukjizat Al-qur'an*. Mizan. Bandung.
- Shurtleff, W. and A. Aoyagi. 1979. *The Book of Tofu, Food for Mankind*. Ten Speed Press, California, USA.
- Simbolan. JM. M. Simbolan. N. Katharina. 2007. *Cegah Malnutrisi dengan Kelor*. Kanisius, Yogyakarta.
- Siregar, S.B. 2008. *Penggemukan Sapi*. Penebar Suadaya. Jakarta.
- Soetanto, H. 2000. *The Use of Medicated Block as Feed Supplement and 34 Control og Gastro Intestinal Parasites in Heifer and Lactating Dairy Cows*. A Project Report submitted to IAEA/FAO. Vienna
- Soetanto, H. and Firsoni. 2008. *Effect Of Supplementation With Molasses Block Containing Gliricidia Or Moringa Leaves On In Vitro Gas Production And Microbial Protein Synthesis*. Word Conference on Animal Production. South Africa. Cape Town.
- Soetanto. H. E. Marhaeniyanto dan S. Chuzaemi. 2011. *Penerapan Teknologi Suplementasi Berbasis Daun Kelor dan Molases pada Peternakan Kambing Rakyat*. Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, PS. Produksi Ternak, Fakultas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tungadewi. Malang.
- Soliva C, Kreuzer M, Foidl N, Foidl G, Machmüller A and Hess H (2005). *Feeding Value Of Whole And Extracted Moringa Oleifera Leaves for Ruminants and Their Effects on Ruminal Fermentation In Vitro*. Animal Feed Science and Technology, 118: 47-62.

- Subadra S. 1997. *Retention and Storage Stability of Beta-Carotene in Dehydrated M. Oleifera*. Inter J Food Science and Nutri, 48: 373–379
- Sudarmono, A.S dan Y.B. Sugeng. 2008. *Sapi Potong*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sugeng, Y. B. 2002. *Sapi Potong*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Suhartanto, B., B.P. Widyobroto, dan R. Utomo. 2003. *Produksi Ransum Lengkap (Complete Feed) dan Suplementasi Undegraded Protein untuk Meningkatkan Produksi dan Kualitas Daging Sapi Potong*. Laporan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan (Hibah Bersaing X/3). Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Susilawati, T., S.Ifar., Aulanium dan Kuswati., 2006. *Potensi Produksi Plasma Nutfah Sapi Jawa, Bali-Pandaan dan Sapi Madura*. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur dan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang.
- Sutrisno, C.I. 2009. *Pemanfaatan Sumber daya pakan lokal terbaru. Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan*. Program Magister Ilmu Ternak Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sumadiyasa, I.W. 2013. *Pengaruh Pemberian Pakan Hijauan Dan Pakan Tambahan Terhadap Penampilan Sapi Bali (Bos Sondaicus)*. SKRIPSI. Universitas Palangka Raya. Palangka Raya.
- Syahrir, S., 2009. *Potensi Daun Murbei dalam Meningkatkan Nilai Guna Jerami Padi sebagai Pakan Sapi Potong*. Disertasi Doktor, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tillman, A.D., Hartadi, H. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo, S. dan Lebdoesoekojo, S. 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Tsaknis J. Lallas S. Gergis V. Dourtoglou V. Spiliotis V. 1999. *Characterization of Moringa Oleifera Variety Mbololo Seed Oil Of Kenya*. J Agric Food Chem 47: 4495–4499.
- Ukanwoko, A. I. and N. C. Igwe. 2012. *Proximate Composition of Some Grass and Legume Silages Prepared in A Humid Tropical Environment*. International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science 2: 068-071.
- Utomo R. 2012. *Evaluasi Pakan dengan Metode Noninvasif*. PT Citra Aji Purnama. Yogyakarta.

- Wariata,W., 2000, *Peluang Penerapan Iptek dalam Pengembangan Ternak Domba Ditinjau dari Segi Anatomi dan Fisiologi Reproduksi*. Oryza (Majalah Ilmiah Universitas Mataram) . 5 (20) : 16. Mataram University Press. Mataram.
- Widada A.S., W. Busono, dan H. Nugroho. 2013. *Pengaruh Ketinggian Tempat terhadap Nilai HTC (Heat Tolerance Coefficient) pada Sapi Peranakan Limousin (Limpo) Betina Dara Sebelum dan Sesudah Diberi Konsentrat*. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang.
- Wodzicka. M, Tomaszewska, I.M., Mastika, A. Djajanegara, S. Gardiner, dan T.R. Wiradarya., 1993. *Produksi Kambing dan Domba di Indonesia*. UNS Press. Surakarta.
- Yudith Taringan A. 2010. *Pemamfaatan Pelepah sawit dan Hasil Ikutan Industri Kelapa Sawit Terhadap Pertumbuhan Sapi Peranakan Simental Fase Pertumbuhan*. Departemen Pendidikan. Sumatera Utara, Medan.
- Yulius, O. 2010. *Kompas IT Kreatif SPSS 18*. Panser Pustaka. Yogyakarta.

LAMPIRAN

A. *Rata-Rata Pertambahan Berat Badan Sapi Potong (Kg/Ekor/Hari) Selama Periode Penelitian (60 hari).*

$$\text{PBBH} = \frac{\text{BB akhir pengamatan (kg)} - \text{BB awal pengamatan (kg)}}{\text{Lama pengamatan (hari)}}$$

1. Perlakuan Pakan Konsentrat

a. Sapi Nomor 1

$$\begin{aligned}\text{PBBH} &= \frac{135,5 \text{ kg} - 121 \text{ kg}}{60 \text{ hari}} \\ &= 0,24 \text{ Kg/hari}\end{aligned}$$

b. Sapi Nomor 2

$$\begin{aligned}\text{PBBH} &= \frac{170 \text{ kg} - 156 \text{ kg}}{60 \text{ hari}} \\ &= 0,23 \text{ Kg/hari}\end{aligned}$$

c. Sapi Nomor 3

$$\begin{aligned}\text{PBBH} &= \frac{202 \text{ kg} - 181,5 \text{ kg}}{60 \text{ hari}} \\ &= 0,34 \text{ Kg/hari}\end{aligned}$$

d. Sapi Nomor 4

$$\begin{aligned}\text{PBBH} &= \frac{193 \text{ kg} - 178,5 \text{ kg}}{60 \text{ hari}} \\ &= 0,24 \text{ Kg/hari}\end{aligned}$$

e. Sapi Nomor 5

$$\begin{aligned} \text{PBBH} &= \frac{164 \text{ kg} - 148,5 \text{ kg}}{50 \text{ hari}} \\ &= 0,31 \text{ Kg/hari} \end{aligned}$$

2. Perlakuan Pakan Konsentrat + 250 gram daun kelor

a. Sapi Nomor 1

$$\begin{aligned} \text{PBBH} &= \frac{150 \text{ kg} - 134,5 \text{ kg}}{60 \text{ hari}} \\ &= 0,26 \text{ Kg/hari} \end{aligned}$$

b. Sapi Nomor 2

$$\begin{aligned} \text{PBBH} &= \frac{192,5 \text{ kg} - 170 \text{ kg}}{60 \text{ hari}} \\ &= 0,38 \text{ Kg/hari} \end{aligned}$$

c. Sapi Nomor 3

$$\begin{aligned} \text{PBBH} &= \frac{205 \text{ kg} - 179,5 \text{ kg}}{60 \text{ hari}} \\ &= 0,43 \text{ Kg/hari} \end{aligned}$$

d. Sapi Nomor 4

$$\begin{aligned} \text{PBBH} &= \frac{184,5 \text{ kg} - 166 \text{ kg}}{60 \text{ hari}} \\ &= 0,31 \text{ Kg/hari} \end{aligned}$$

e. Sapi Nomor 5

$$\begin{aligned} \text{PBBH} &= \frac{152 \text{ kg} - 136 \text{ kg}}{50 \text{ hari}} \\ &= 0,33 \text{ Kg/hari} \end{aligned}$$

B. Rata-Rata Pertambahan Berat Badan Harian (PBBH) Sapi Potong

kg/ekor/hari selama Periode Penelitian (60) hari.

t-Test: Two-sample Assuming Equal Variances

Group Statistics

Perlakuan		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
pertambahan berat badan dalam satuan kg	tanpa daun kelor	5	.2720	.04970	.02223
	dengan daun kelor	5	.3420	.06535	.02922

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
pertambahan berat badan dalam satuan kg	Equal variances assumed	.243	.635	-1.907	8	.093	-.07000	.03672	-.15467	.01467
	Equal variances not assumed			-1.907	7.467	.096	-.07000	.03672	-.15573	.01573

C. Rata-Rata Jumlah Konsumsi Pakan pada Ternak Sapi Potong kg/ekor/hari selama Periode Penelitian (60) hari.

t-Test: Two-sample Assuming Equal Variances


Group Statistics

perlakuan	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
konsumsi tanpa daun kelor	5	12.41	.513	.229
dengan daun kelor	5	12.90	.068	.030


Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means								
		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
konsumsi Equal variances assumed	16.735	.003	2.101	8	.069	-.486	.231	-1.019	.047	
Equal variances not assumed			2.101	4.139	.101	-.486	.231	-1.120	.148	

D. Foto Kegiatan Penelitian



Gambar 1. Pakan yang diberikan selama penelitian.



Gambar 2. Proses penimbangan bahan konsentrat dengan menggunakan timbangan iconix FX-1.



Gambar 3. Proses Penimbangan Bahan Konsentrat dengan menggunakan timbangan iconix FX-1.



Gambar 4. Proses pencampuran bahan konsentrat dengan 100 % dedak padi.



Gambar 5. Proses penambahan mineral dalam campuran konsentrat.



Gambar 6. Proses penimbangan pada sapi potong.



Gambar 7. Pengambilan Daun Kelor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Nur (60700112008), Lahir di Landokadawang pada tanggal 26 Juni 1994 anak pertama dari 3 bersaudara pasangan dari Alm. Idrus Jamaluddin dan Marwah Onggi. Penulis memulai jenjang pendidikan pada tahun 2000 di sekolah dasar di SDK Galitin Kabupaten Enrekang dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan pada sekolah madrasah tsanawiyah di MTs Baburrahmah Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan selesai pada tahun 2009 dan melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas di SMA PM Darul Falah Enrekang Kabupaten Enrekang dan selesai pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan disalah satu perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2012 melalui jalur SNMPTN dan diterima di Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Ilmu Peternakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R