


**ANALISIS INTERVENSI FUNGSI *STEP* UNTUK PERAMALAN NILAI
KURS RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Matematika pada Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Oleh

NURALAINA
60600112088

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Intervensi Fungsi Step untuk Peramalan Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika", yang disusun oleh Saudari **Nuralaina**, Nim: **60600112068** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **29 November 2016 M**, bertepatan dengan **29 Shafar 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 29 November 2016 M
29 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si
Sekretaris : Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.
Munaqisy I : Ermawati, S.Pd., M.Si.
Munaqisy II : Fauziah Nurfahirah, S.Pd., M.Si.
Munaqisy III : Dr. Rahmi Damis, M. Ag.
Pembimbing I : Irwan, S.Si., M.Si.
Pembimbing II : Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

HALAMAN MOTTO

Kita harus tahu bahwa pertolongan Allah itu tidak pernah terlambat dan Juga tidak pernah terlalu cepat melainkan selalu tepat waktu. Semua akan Indah pada waktu Nya.

Tuhan tidak meminta kita untuk sukses; Dia hanya meminta kita Untuk mencoba.

Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan Bertekunlah dalam do'a

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini aku persembahkan untuk:

kedua orang tuaku yang tercinta, Alm.Syamsuddin dan Nurhayati
Terimakasih untuk do'a dan keringat kalian, terima kasih untuk kasih sayang dan perjuangan mu sampai aku bisa sampai ke bangku perkuliahan.

kakakku Nursyamsi S.Kep.,Ners, Sanipah dan Riffat Naufal Fadhilah
Terima kasih untuk do'a kalian

my ARD

Terima kasih karena telah menjadi calon pendamping hidup yang selalu setia memberi dukungan dan motivasi dalam bentuk apapun.

Sahabatku anak "EIGHTKONT" dan anak ONGOL
Kalian sahabat terbaik yang pernah kumiliki, kalian telah mengajarkan betapa berharganya sebuah persahabatan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang hanya kepada-Nyalah, kita harus menghambakan diri. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW., keluarga serta para sahabatnya dan akhirnya kepada kita sebagai umat yang tunduk terhadap ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana Sains (Matematika). Skripsi ini berisi tentang Analisis Intervensi fungsi *step* untuk peramalan nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika . Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sendiri, melainkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
2. Ayahanda yang tercinta Almarhum Syamsuddin, Ibundaku yang aku sayangi Nurhayati, ibunda Sanipah, Kakakku Nursyamsi S.Kep.,Ners dan anakku Riffat Naufal Fadhilah yang telah memberikan do'a dan dorongan moral dan material serta perhatian dan kasih sayang.
3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si Rektor UIN Alauddin Makassar,

4. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad ,M.Ag. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
5. Bapak Irwan,S.Si.,M.Si., Ketua Jurusan Sains Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk membimbing,
6. Ibu Wahida Alwi, S.Si., M.Si., Sekretaris Jurusan Sains Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
7. Bapak / Ibu Staf dan Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan do'a dan dorongan moral serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
8. Try Azisah Nurman, S.Pd.,M.Pd pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,
9. Ibu Ermawati, S.Si., M.Si., penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
10. Ibu Fauziah NurFahirah S.pd.,M.Si.,penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,

11. Ibu Dr.Rahmi Damis M.Ag., penguji III yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
12. Kepada guruku tercinta St.MusyawahS.Pd dan Ni'matul hasanah yang tak hentinya memberi pertolongan dalam bentuk moril.
13. Teman – teman seperjuangan angkatan 2012 “ KURVA” yang selalu member semangat bersaing sehat dan inspirasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini,
14. Kepada sahabat-sahabat terbaikkku”ONGOL” (ikki, icha, dian, rika, emmi, indah) dan anak “EIGHTKONT” (nayla, dista, izmi, vivi, dewi, intan, nanna) yang selalu setia memberi semangat dan dorongan.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan sangat dibutuhkan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Makassar, November 2016

Penulis

Nuralaina

NIM. 60600112088

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv-vi |
| DAFTAR ISI..... | vii - viii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR SIMBOL..... | xi |
| ABSTRAK..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Masalah..... | 9 |
| E. Batasan Masalah..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 10-11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Deret Waktu (<i>Time Series</i>)..... | 13 |
| B. Stokastik dan Stasioner | 15 |
| C. Rata-rata, Autokovariansi dan Autokorelasi..... | 22 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| D. <i>ACF dan PACF</i> | 23 |
| E. <i>White noise process</i> | 27 |
| F. Uji Asumsi Distribusi Normal..... | 28 |
| G. ARIMA..... | 29 |
| H. Model Intervensi..... | 37 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 40 |
| B. Waktu Penelitian..... | 40 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 40 |
| D. Definisi Operasional Variabel..... | 40 |
| E. Prosedur Penelitian..... | 41 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--------------------|-------|
| A. Hasil..... | 44-78 |
| B. Pembahasan..... | 78-83 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran..... | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------|---|----|
| Tabel | | |
| 2.1 | nilai λ dan transformasinya..... | 18 |
| 2.2 | Tabel identifikasi plot ACF dan PACF..... | 32 |
| 4.1 | Data perubahan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar..... | 42 |
| 4.2 | ACF data preintervensi..... | 47 |
| 4.3 | PACF data preintervensi..... | 47 |
| 4.4 | ACF data preintervensi <i>differencing</i> 1..... | 49 |
| 4.5 | PACF data preintervensi <i>differencing</i> 1..... | 50 |
| 4.6 | Ringkasan uji Ljung-Box Pierce ARIMA(1,1,0)..... | 52 |
| 4.7 | Ringkasan uji Ljung-Box Pierce ARIMA(0,1,1)..... | 56 |
| 4.8 | Ringkasan uji Ljung-Box Pierce ARIMA(1,1,1)..... | 58 |
| 4.9 | Ringkasan uji Ljung-Box Pierce ARIMA(2,1,2)..... | 61 |
| 4.10 | Ringkasan uji Ljung-Box Pierce ARIMA(1,1,2)..... | 64 |
| 4.11 | Ringkasan uji Ljung-Box Pierce ARIMA(2,1,1)..... | 66 |
| 4.12 | Peramalan dengan menggunakan <i>minitab</i> | 68 |
| 4.13 | Peramalan dengan menggunakan <i>SAS</i> | 69 |
| 4.14 | Output program <i>SAS</i> intervensi..... | 71 |
| 4.15 | Hasil pengujian independensi residual dengan program <i>SAS</i> | 73 |

| | | |
|------|-----------------------------------|----|
| 4.16 | Test normalitas intervensi..... | 74 |
| 4.17 | Peramalan dengan program SAS..... | 76 |

DAFTAR GAMBAR

| | | Gambar |
|-----|--|--------|
| 2.1 | Diagram deret waktu nonstasioner dalam rata-rata..... | 19 |
| 2.2 | Diagram deret waktu nonstasioner dalam variansi..... | 19 |
| 2.3 | Diagram deret waktu nonstasioner dalam rata-rata dan variansi..... | 20 |
| 2.4 | ACF deret waktu stasioner..... | 20 |
| 2.5 | PACF deret waktu non stasioner..... | 21 |
| 2.6 | Grafik data berdistribusi normal..... | 27 |
| 4.1 | Plot time series data keseluruhan..... | 44 |
| 4.2 | Box-Cox data pre intervensi sebelum transformasi..... | 45 |
| 4.3 | Box-Cox data preintervensi setelah transformasi..... | 46 |
| 4.4 | (a) ACF data preintervensi sebelum differencing..... | 46 |
| | (b) PACF data preintervensi sebelum differencing..... | 46 |
| 4.5 | Trend analysis data preintervensi setelah differencing..... | 48 |
| 4.6 | (a) ACF setelah differencing 1..... | 49 |
| | (b) PACF setelah differencing 1..... | 49 |
| 4.7 | Kolmogorov Smirnov nilai residual ARIMA(1,1,0)..... | 53 |
| 4.8 | Diagram residual respon intervensi..... | 70 |

4.9 probability plot residual intervensi.....75

DAFTAR SIMBOL

| | |
|-------------|--|
| Z_t | : proses stokastik pada waktu t |
| t | : indeks berurutan waktu |
| β | : ruang sampel |
| μ | : mean proses |
| ρ | : fungsi autokorelasi |
| ϕ_{kk} | : fungsi autokorelasi parsial pada lag k |
| γ_k | : autokovariansi pada lag k |
| B | : operator Backshift |
| $E(Z_t)$ | : ekspektasi dari variabel random Z_t |
| θ | : parameter <i>Moving Average</i> (MA) |
| ϕ | : parameter <i>Autoregressive</i> |
| α_t | : residual model ARIMA pada waktu t |
| I_t | : variabel intervensi pada waktu t |
| N_t | : error model intervensi pada waktu t |
| B^b | : ($b = \text{kostantadelay}$) |

ω_s : operator dari s

δ_r : operator dari r

ANALISIS INTERVENSI FUNGSI *STEP* UNTUK PERAMALAN NILAI KURS RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA

Oleh :

Nuralaina
60600112088

ABSTRAK

Analisis intervensi merupakan salah satu analisis deret waktu *time series* untuk memodelkan data *time series* yang dipengaruhi oleh adanya suatu kejadian luar atau adanya intervensi. Secara umum, ada dua macam fungsi intervensi yaitu fungsi *step* dan *pulse*. Analisis intervensi fungsi *step* digunakan pada intervensi yang bersifat jangka panjang seperti kebijakan pemerintah. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui cara menentukan model intervensi fungsi *step* pada peramalan nilai kurs Rupiah terhadap dollar Amerika. Kenaikan nilai kurs Dollar Amerika terkadang membuat nilai rupiah anjlok dan ini biasanya disebabkan tingginya harga inflasi dan tingkat suku bunga di Indonesia. Ini menyebabkan rupiah mengalami penurunan harga pada bulan oktober 2015 dan merupakan suatu intervensi fungsistep ($S_t^{(T)}$) karena intervensi tersebut bersifat jangka panjang.

Langkah-langkah dalam menentukan model intervensi diawali dengan membagi data menjadi dua bagian yaitu data preintervensi dan data intervensi. Selanjutnya data preintervensi tersebut dimodelkan dengan *ARIMA* dengan mencari model yang sesuai dengan criteria pengujian. Setelah didapatkan model *ARIMA* data preintervensi, dapat dilakukan identifikasi respon intervensi dengan mengamati plot residual antara nilai aktual dan nilai peramalan dan menentukan orde intervensi, s dan r . Langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi parameter untuk model intervensi dengan pengujian asumsi *white noise* dan residual *independent* serta distribusi normal.

Hasil analisis intervensi fungsi *step* pada data nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika periode 1 Agustus 2015 – 31 Desember 2015 diperoleh model *ARIMA* preintervensi yaitu $Z_t = [(1 + (-0,6628)Z_{t-1} + (0,6628)Z_{t-2} + \alpha_t]$ sedangkan

model intervensi yaitu intervensi $Z_t = Z_t \frac{(\omega_0 S_{t-1}^{(67)} - \omega_0 S_{t-2}^{(67)} - \omega_0 \emptyset S_{t-2}^{(67)} + \omega_0 \emptyset S_{t-3}^{(67)}) + e_t}{1}$ Hasil peramalan nilai kurs Rupiah pada periode Januari 2016 diperkirakan sebesar Rp.18.110.

Kata kunci : analisis intervensi, fungsi *step*, ARIMA, Kurs Rupiah, Dollar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya akan membuat tingkat peradaban manusia pun semakin meningkat. Peradaban inilah yang membuat mereka cenderung bersaing untuk meraih cita-cita dan harapan yang mereka inginkan. Jika manusia selalu menginginkan hasil terbaik dari usaha yang dilakukannya, tentunya mesti melakukan beberapa perencanaan yang baik serta strategi yang tepat. Meskipun pasti ada resiko yang dihadapi, akan tetapi sebisa mungkin untuk diminimalisir.

Peramalan merupakan gambaran situasi ataupun kondisi di masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lalu. Peramalan sangat berperan penting dalam proses pembuatan rencana serta pengambilan keputusan yang baik dan tepat. Peramalan merupakan tahap awal dalam merencanakan sesuatu. Baik perseorangan, kelompok, organisasi maupun sebuah negara membutuhkan peramalan yang strategis dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya dalam bidang kesehatan, pemerintah perlu peramalan dalam merencanakan strategi serta inisiatif bagaimana cara menjamin kesehatan rakyat dengan program yang telah dibuat demi mendapatkan fasilitas kesehatan yang merata. Peramalan juga berguna dalam bidang perusahaan khususnya dalam mengendalikan sistem kendali informasi pemasaran dan produksi perusahaan. Begitupun dalam bidang

perekonomian khususnya keuangan. Uang merupakan alat tukar menukar yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga ada yang cenderung melakukan apa saja demi untuk mendapatkan uang. Hal tersebut digambarkan dalam al Qur'an sebagai golongan yang lebih mencintai harta dalam QS. al Fajr/89 : 20 yang berbunyi :

﴿جَمَّاحِبًا الْمَالِ وَتُحِبُّونَ﴾

Terjemahnya :

*“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”.*¹

Sehubungan dengan ayat tersebut di jelaskan bahwa dalam kehidupan nyata seperti sekarang ini, sebagian besar manusia yang hidup di muka bumi ini terlalu mencintai uang dengan cara yang berlebihan. Mereka bahkan rela melakukan apa saja tanpa memperhatikan baik buruk ataupun halal haramnya suatu pekerjaan demi untuk mendapatkan uang.

Karena uang membawa pengaruh yang sangat besar, sehingga berbagai cara bisa saja dilakukan untuk memperbanyak uang yang dimiliki tanpa mau bekerja dan berusaha. Di zaman sekarang, praktik tersebut telah banyak dilakukan oleh masyarakat seperti korupsi, suap, pencucian uang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia segeralah bertaubat dan meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah swt sebelum azab-Nya mendatangi kita.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: CV Penerbit J-ART, 1971), h. 88

Krisis moneter yang pernah melanda negara-negara ASEAN tahun 1997-1998 sampai mundurnya presiden Indonesia Soeharto sebagai kepala Negara saat itu telah memporak-porandakan struktur perekonomian negara. Bahkan bagi Indonesia, akibat dari terjadinya krisis moneter yang kemudian berlanjut pada krisis ekonomi dan politik ini, telah menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan terhadap sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis moneter yang melanda Indonesia diawali dengan terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (terutama dolar Amerika), akibat adanya *domino effect* dari terdepresiasinya mata uang Thailand (bath), salah satunya telah mengakibatkan terjadinya lonjakan harga barang-barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri. Lonjakan harga barang-barang impor ini, menyebabkan harga hampir semua barang yang dijual di dalam negeri meningkat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terutama pada barang yang memiliki kandungan barang impor yang tinggi.²

Kurs merupakan salah satu harga yang lebih penting dalam perekonomian terbuka, karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, mengingat pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel-variabel makro ekonomi lainnya. Kurs dapat dijadikan alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik atau stabil. Ketidakstabilan nilai tukar ini mempengaruhi

²Adwin, "Inflasi di Indonesia (Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya)". *Jurnal akuntansi dan keuangan*, vol.1,no.1(Mei 1999), h.55

arus modal atau investasi dan perdagangan Internasional. Indonesia sebagai negara yang banyak mengimpor bahan baku industri mengalami dampak dan ketidakstabilan kurs ini, yang dapat dilihat dari rnelonjaknya biaya produksi sehingga menyebabkan harga barang-barang milik Indonesia mengalami peningkatan. Dengan melemahnya rupiah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan dilanda krisis ekonomi dan kepercayaan terhadap mata uang dalam negeri.³

Keadaan tersebut merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah swt bagi kita umat manusia untuk menguji seberapa besar kesabaran hamba-Nya ketika diberikan cobaan tersebut. Allah memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan manusia digambarkan dalam firman Allah QS. al-Baqarah/ 3: 75:

مَا أَخْطَاْنَا أَوْ تَسِينَا إِن تُوَاخِذْنَا لَا رِبْنَا أَكْتَسَبْتَمَا وَعَلَيْهَا كَسَبْتَمَا لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلَا

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.⁴

Dari ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah didalam memberi cobaan, musibah ataupun bencana kepada umat manusia tidak akan melebihi dari batas kemampuannya, karena Allah telah mengetahui segala macam bentuk resiko yang akan terjadi kedepan sebelum ia menurunkan cobaan tersebut kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk keluar dari segala permasalahan yang

³Triyono, “Analisis perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika”.*Jurnal ekonomi pembangunan*, vol.9,no.2(Desember 2008), h.156

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: CV Penerbit J-ART, 1971), h. 658

dihadapi. Allah swt juga menganjurkan kita untuk berusaha sesuai kemampuan jangan berbuat sesuatu yang di luar batas kemampuan kita agar apa yang kita hasilkan nanti dapat bermanfaat terutama untuk orang lain terlebih diri sendiri. Sungguh Allah maha adil dan maha mengetahui apa yang ia ciptakan di muka bumi ini. Ayat ini sangat erat hubungannya dengan pernyataan krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia beberapa tahun silam. Allah swt memberikan cobaan kepada negara kita Indonesia berupa krisis dalam bidang ekonomi, politik dsb agar supaya kita sebagai warga negara Indonesia lebih sadar akan perbuatan-perbuatan salah yang telah mereka lakukan selama ini, utamanya dalam hal keuangan. Diperlukan beberapa strategi yang tepat kedepannya untuk menghadapi perubahan nilai kurs mata uang Dollar yang dapat merugikan keuangan di negara kita.

Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang, tentunya perlu untuk lebih meningkatkan sistem ketatanegaraan agar bisa mencapai suatu target menjadi negara yang maju baik dari segi sektor kesehatan, pendidikan maupun dalam hal ekonomi khususnya keuangan. Keuangan dalam suatu negara sangat menunjang stabilitas perekonomian yang menjadi tolak ukur utama di negara tersebut. Mata uang yang digunakan sebagai alat tukar menukar harus selalu dikontrol kenaikan atau perubahannya sesuai dengan harga Dollar Amerika yang telah ditetapkan sebelumnya. Mata uang dapat dijadikan alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara.

Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik atau stabil. Perubahan nilai kurs rupiah

terhadap Dollar Amerika merupakan data deret waktu (time series) yang bersifat intervensi (dapat berubah secara tiba-tiba) yang dihitung untuk dapat mengantisipasi lonjakan kenaikan harga dollar Amerika terhadap rupiah. Data deret waktu merupakan data yang diambil dan dikumpulkan untuk diamati berdasarkan indeks waktu secara berurutan demi mendapatkan peramalan dalam menghadapi situasi atau kondisi kedepannya.

Disini penulis memilih untuk meneliti tentang kurs Rupiah karena bagi mereka para pelaku-pelaku ekonomi dalam membeli dan menjual saham, melakukan investasi dan seluruh kegiatan perekonomian nasional di Indonesia harus didasari dengan adanya standar nilai kurs mata uang rupiah tersebut. Mereka harus selalu mengawasi tingkat perubahan kurs Rupiah setiap saat agar tidak salah dalam mengambil keputusan dalam berbisnis. Sebagai penyokong utama dalam transaksi perekonomian, nilai kurs Rupiah tergantung pada nilai Dollar Amerika sebagai mata uang Internasional yang telah disepakati seluruh dunia. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa tingkat stabilitas mata uang rupiah merupakan variabel yang paling sensitif terhadap akar permasalahan utama yang menghadang gerak perekonomian Indonesia. Maka disini diputuskan untuk meneliti perubahan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika tersebut. Sedangkan untuk metode yang digunakan dilihat berdasar pada data perubahan nilai kurs rupiah yang membentuk data time series dan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian eksternal di luar dugaan yang merupakan suatu kejadian yang akan membawa dampak dalam waktu yang panjang

di dalam masyarakat. Faktor ini sesuai dengan karakteristik dan cocok dengan variabel data intervensi *fungsi step*.

Alasan penulis memilih judul penelitian ini karena berdasar pada hasil penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian yang juga meneliti tentang kurs rupiah terhadap dollar Amerika seperti Ahmad Amiruddin Anwary 2011 tentang “Prediksi Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika menggunakan metode *Fuzzy Time Series*” yang menghasilkan data kurs untuk satu hari kedepan dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi yakni mendekati 0%, Cindy Wahyu Elvitra tentang “Metode Peramalan dengan menggunakan Model Volatilitas Asymmetric Power ARCH (APARCH) yang menghasilkan model APARCH yang sebelumnya tidak bisa dimodelkan dengan ARMA dan model ARCH, maka penulis ingin mencoba menerapkan metode peramalan dengan menggunakan intervensi *fungsi step* dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah melakukan suatu penelitian tentang peramalan dengan judul “**Analisis Model Intervensi Fungsi Step untuk Peramalan Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana model intervensi fungsi step terbaik yang digunakan untuk meramalkan nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika?

2. Bagaimana prediksi nilai kurs rupiah terhadap Dollar Amerika dalam 30 hari kedepan?

C. Tujuan

Berdasar dari rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui model intervensi fungsi step terbaik yang digunakan untuk meramalkan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika.
2. Untuk mengetahui prediksi nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dalam 30 hari kedepan

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan serta menambah wawasan penulis tentang analisis model intervensi untuk fungsi step.

2. Bagi pembaca

Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

3. Bagi pustaka

Hasil penelitian ini dapat digunakan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperdalam wawasan keilmuan khususnya pada jurusan matematika mengenai masalah tentang model intervensi fungsi *step*.

E. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasannya hanya dibatasi pada:

1. Data yang digunakan adalah data harian dari tanggal 1 Agustus 2015 – 31 Desember 2015
2. Peramalan yang dilakukan adalah untuk 30 hari kedepan
3. Variabel intervensi yaitu inflasi dan tingkat suku bunga

F. Sistematika Penulisan

a. BAB I Pendahuluan

Membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, dimana latar belakang masalah ini dikemukakan dengan alasan penulis mengangkat topik ini, rumusan masalah, batasan masalah sebagai fokus pembahasan penelitian, tujuan penulisan proposal yang berisi tentang tujuan penulis membahas topik ini, manfaat penulisan ini, kajian yang digunakan penulis serta sistematika pembahasan.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini dikemukakan hal-hal yang mendasari dalam teori yang dikaji, yaitu deret waktu, stokastik dan stasioner, rata-rata, autokovariansi dan autokorelasi, ACF

dan PACF, *White Noise*, uji normalitas residu, ARIMA, intervensi dan preintervensi , pemilihan model terbaik, dan peramalan.

c. BAB III Metode Penelitian

Membahastentang langkah-langkah menemukan solusi umum dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah meliputi jenis penelitian yang digunakan, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, serta prosedur penelitian.

d. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

e. BAB V Penutup

Bab ini dikemukakan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

f. Bagian akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan data, penyajian data, pengolahan data, penarikan kesimpulan serta bagaimana cara penarikan kesimpulan berdasarkan masalah tertentu. Statistika juga merupakan sekumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel, gambar, diagram atau ukuran-ukuran tertentu. Sedangkan data itu sendiri adalah serangkaian atau kumpulan informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan atau dalam bentuk sifat yang ketika diolah dengan menggunakan metode statistik akan menghasilkan kesimpulan tentang sesuatu.⁵

Adapun jenis-jenis data berdasarkan waktu pengumpulan dibedakan atas dua:

1. *Cross Section*

Merupakan Jenis data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu tertentu yang dapat menggambarkan keadaan pada waktu tersebut atau suatu data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang sama. Misalnya, terdiri dari dua variabel yaitu pendapatan (X) dan pengeluaran (Y). Total pendapatan dan pengeluaran dalam 5 perusahaan dikumpulkan dalam satu waktu yang sama yaitu pada tahun 2013.

⁵Ir.Syofian Siregar,M.M, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*.(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2010),h. 1

2. Deret Waktu (*Time Series*)

Jenis data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan dalam suatu rentang waktu tertentu atau serangkaian pengamatan dari suatu variabel yang dikumpulkan dalam waktu yang berbeda-beda. Misalnya, data penjualan PT. SEMEN TONASA 2010 sampai 2013.

3. Data panel

Jenis data yang merupakan gabungan antara cross section dan time series. Misalnya, data penjualan yang diperoleh dari 5 perusahaan periode 2010 s/d 2013.⁶

A. Deret Waktu (*Time Series*)

Analisis deret waktu diperkenalkan pada tahun 1970 oleh George E.P.Box dan Gwilyrn M.Jenkins melalui bukunya yang berjudul *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Sejak saat itu, deret waktu mulai banyak dikembangkan. Deret waktu (*time series*) merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap. Analisis deret waktu adalah salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik keadaan yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan.

Suatu urutan pengamatan memiliki model deret waktu jika memiliki dua hal yaitu:

1. interval waktu antara indeks waktu t dapat dinyatakan dalam satuan waktu yang sama (identik),

⁶Dedi Rosadi, *Diktat: Pengantar Analisa Runtun Waktu* (Yogyakarta: UGM, 2006), h.6

2. adanya ketergantungan antara pengamatan Z_t dengan Z_{t+k} yang dipisahkan oleh jarak waktu berupa kelipatan Δt sebanyak k kali (dinyatakan sebagai *lag k*).

Sedangkan, tujuan analisis deret waktu antara lain untuk:

1. meramalkan kondisi dimasa yang akan datang (*forecasting*),
2. mengetahui hubungan atau model antar peubah, kepentingan kontrol (untuk mengetahui apakah proses terkendali atau tidak).⁷

Di dalam meramalkan nilai suatu variabel di waktu yang akan datang harus diperhatikan dan dipelajari terlebih dahulu sifat dan perkembangan variabel itu di waktu yang lalu. Nilai dari suatu variabel dapat diramal jika sifat dari variabel tersebut diketahui di waktu sekarang dan di waktu yang lalu, untuk mempelajari bagaimana perkembangan historis dari suatu variabel, biasanya urutan nilai-nilai variabel itu diamati menurut waktu. Urutan waktu seperti ini dinamakan runtun waktu dengan kata lain runtun waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan-urutan waktu terjadinya dan kemudian disusun sebagai data yang mungkin berupa data mingguan, bulanan atau tahunan.⁸

Langkah penting dalam memilih suatu metode deret waktu yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data, sehingga metode yang paling tepat

⁷Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu : Teori dan Aplikasi*, ed. Arif Tiro. (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 5

⁸Dewi Nur Samsiah, "Analisis Data Runtun Waktu Menggunakan Model ARIMA (p,d,q)". *Skripsi* (2008): h. 11-12

dengan pola data tersebut dapat diuji. Pola tersebut dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1. Pola horizontal, terjadi bilamana nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang tetap.
2. Pola musiman, terjadi bilamana suatu runtun waktu dipengaruhi oleh faktor musiman.
3. Pola siklis, terjadi bilamana datanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi jangka panjang seperti halnya siklus bisnis.
4. Pola trend, terjadi bilamana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data.

B. Stokastik dan Stasioner

Jika dari pengalaman yang lalu masa depan suatu deret waktu dapat diramalkan secara pasti maka deret waktu itu dinamakan deterministik. Sebaliknya jika pengalaman yang lalu hanya dapat menunjukkan struktur probabilistik keadaan masa yang akan datang suatu runtun waktu, maka runtun waktu semacam ini dinamakan stokastik. Suatu runtun waktu statistik dapat dipandang sebagai suatu realisasi dari suatu proses stokastik. Biasanya kita tidak mungkin memperoleh realisasi yang lain suatu proses stokastik, yaitu kita tidak dapat mengulang kembali keadaan untuk memperoleh himpunan observasi serupa seperti yang telah kita kumpulkan.⁹

⁹Soejoeti,Zanzawi, Ph.D, *Buku Materi Pokok Analisis Runtun Waktu : Modul 1-9*, STAT4532.(Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka, 1987), h. 2.4

Dalam analisis deret waktu disyaratkan data yang sering disimbol Z_t mengikuti proses stokastik. Suatu urutan pengamatan dari peubah acak $Z(\omega, t)$ dengan ruang sampel ω dan satuan waktu t dinyatakan sebagai proses stokastik.¹⁰

Berdasarkan ada atau tidaknya kejadian di waktu yang akan datang, maka Time Series dibagi atas dua macam yaitu:

1. Jika nilai suatu masa depan (*future value*) dari suatu deret waktu dapat dengan tepat dapat ditentukan oleh suatu fungsi matematika, misalnya:

$$Z_t = \cos(2\pi ft)$$

Maka deret waktu dikatakan sebagai deterministik.

2. Jika nilai suatu masa depan (*future value*) hanya dapat digambarkan dalam suatu distribusi probabilitas, maka deret waktu dikatakan sebagai stokastik.¹¹

Ciri-ciri dalam pembentukan model analisis deret waktu adalah dengan mengasumsikan bahwa data dalam keadaan stasioner. Deret waktu dikatakan stasioner jika tidak ada perubahan kecenderungan dalam rata-rata dan perubahan variansi. Dengan kata lain, deret waktu yang stasioner adalah relative tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan nilai secara tajam pada data. Dimana kondisi stasioner terdiri atas dua hal, yaitu stasioner dalam rata-rata dan stasioner dalam variansi.¹²

Proses runtun waktu $\{Z_t, t \in T\}$ dengan $T = Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ disebut proses stasioner jika:

¹⁰Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu : Teori dan Aplikasi*, ed. Arif Tiro. (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 7

¹¹Siana Halim, *Diktat: Time Series Analysis* (Surabaya, 2006), h.2

¹²Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu : Teori dan Aplikasi*, ed. Arif Tiro. (Makassar: Andira Publisher, 2006), h. 7

$$E[Z_t]^2 < \infty, \forall t \in Z$$

$$E[Z_t] = \text{konstanta, independen dengan } t, \forall t \in Z$$

$$\gamma_z(t, s) = \gamma_z(t + k, s + k), \forall t, s, k \in Z. \text{ }^{13}$$

Box dan Jenkins(1976) menjelaskan bahwa pada deret waktu yang bersifat kuat, waktu pengamatan tidak berpengaruh terhadap rata-rata μ , variansi σ^2 dan kovariansi γ_k . Ini berarti bahwa deret Z_t akan berfluktuasi disekitar rata-rata dan variansi yang tetap, dan dapat dikatakan bahwa deret Z_t stasioner dalam rata-rata dan variansi(Wei 1994).

Untuk memeriksa kestasioneran ini dapat digunakan diagram deret waktu (*time series plot*) yaitu diagram pencar antar nilai peubah Z_t dengan waktu t . Jika diagram deret waktu berfluktuasi di sekitar garis yang sejajar sumbu waktu (t) maka dikatakan deret (*series*) stasioner dalam rata-rata. Bila kondisi stasioner dalam rata-rata tidak terpenuhi diperlukan proses pembedaan (*differencing*).

Notasi yang sangat bermanfaat adalah operator shift mundur (*backward shift*) B, yang penggunaannya sebagai berikut:

$$BX_t = X_{t-1} \quad (1) \text{ dimana : B = pembeda}$$

$$X_t = \text{nilai } X \text{ pada orde ke } t$$

$$X_{t-1} = \text{nilai } X \text{ pada orde ke } t-1$$

Notasi B yang dipasang pada X_t akan menggeser data sebesar 1 periode ke belakang atau dapat dituliskan sebagai berikut :

¹³Dedi Rosadi, *Diktat: Pengantar Analisa Runtun Waktu* (Yogyakarta: UGM, 2006), h.6

$$B(BX_t) = B^2X_t = X_{t-2} \quad (2)$$

dengan X_{t-2} = nilai X pada orde ke $t-2$.¹⁴

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menstasionerkan data yang tidak stasioner dalam rata-rata yaitu dengan menggunakan metode *differencing* (pembedaan). Pada dasarnya metode *differencing* adalah membentuk sesuatu data baru yang diperoleh dengan cara mengurangi nilai pengamatan pada waktu t dengan nilai pengamatan pada waktu sebelumnya. Jika hasil *differencing* tersebut disimbolkan dengan X'_t maka secara umum *differencing* orde 1 dapat dituliskan sebagai berikut :

$$X'_t = X_t - X_{t-1} \quad (3)$$

Sedangkan untuk *differencing* orde ke 2:

$$X'_t = X_t - X_{t-1} = (1 - B)^2X_t \quad (4)$$

Secara umum, proses *differencing* orde d yaitu :

$$X_t^d = (1 - B)^dX_t. \quad (5)$$

Sedangkan untuk keperluan menstabilkan variansi dari data deret waktu, sering digunakan transformasi Box-Cox. Transformasi Box Cox adalah transformasi pangkat pada variabel respon. Box Cox mempertimbangkan kelas transformasi berparameter tunggal yaitu λ yang dipangkatkan pada variabel respon Z_t , sehingga transformasinya menjadi

¹⁴Dewi Nur Samsiah, "Analisis Data Runtun Waktu Menggunakan Model ARIMA (p,d,q)". *Skripsi* (2008): h. 14-15

¹⁵Reta Ekayanti,dkk."Analisis Model Intervensi Fungsi Step untuk Peramalan Kebaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Terhadap Besarnya Pemakaian Listrik". Vol 03, no.3(2014): h.176-177

$$y = Z_t^\lambda \tag{6}$$

dimana λ dinamakan parameter transformasi. Di bawah ini adalah nilai λ dan transformasinya:

Tabel 2.1. Nilai-nilai λ dengan transformasinya


| Nilai λ (lambda) | Transformasi |
|--------------------------|------------------------|
| -1 | $\frac{1}{Z_t}$ |
| -0.5 | $\frac{1}{\sqrt{Z_t}}$ |
| 0 | $\text{Ln } Z_t$ |
| 0.5 | $\sqrt{Z_t}$ |
| 1 | Z_t |

Ada beberapa ketentuan untuk menstabilkan variansi:

1. Transformasi boleh dilakukan hanya untuk deret Z_t yang positif
2. Transformasi dilakukan sebelum melakukan diferensiasi dan pemodelan deret waktu
3. Nilai λ dipilih berdasarkan *Sum of Square Error* (SSE) dari deret hasil transformasi. Nilai SSE terkecil memberikan hasil variansi paling konstan


$$SSE = \sum_{t=1}^n (Z_t(\lambda) - \hat{\mu})^2$$

Transformasi tidak hanya menstabilkan variansi, tetapi juga dapat menormalkan distribusi.¹⁶



Gambar 2.1 : Diagram deret waktu non stasioner dalam rata-rata


Jika hal yang terjadi adalah seperti Gambar 2.1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak stasioner dalam rata-rata karena terjadi perubahan rata-rata dari waktu ke waktu. Jika demikian, data tidak dapat langsung digunakan untuk mendapatkan model ARIMA terbaik, tetapi terlebih dahulu data tersebut di stasionerkan.



Gambar 2.2 : Diagram data deret waktu non stasioner dalam variansi


¹⁶Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu : Teori dan Aplikasi*, ed. Arif Tiro. (Makassar: Andira Publisher, 2006), h.91-92

Berdasar pada gambar 2.2 di atas, dimana plot menunjukkan bahwa data belum stasioner dalam rata-rata maupun variansinya. Untuk mengatasi hal ini, maka dilakukan transformasi terlebih dahulu. Dan jika masih belum stasioner, maka dilanjutkan dengan proses differencing dari hasil transformasi yang telah diperoleh sebelumnya.




Gambar 2.3 : Diagram data deret waktu stasioner dalam rata-rata dan variasi

Jika plot data menunjukkan seperti Gambar 2.3 di atas, maka data dianggap aman dan serta dapat dilakukan proses peramalan untuk langkah selanjutnya. Selain dari plot deret waktu, stasioner dapat dilihat dari plot *Autocorrelation Function* (ACF) data tersebut.



Gambar 2.4 : Diagram ACF data deret waktu stasioner



Gambar 2.5 : Diagram ACF data deret waktu non stasioner.¹⁷

C. Rata-rata, Autokovariansi dan Autokorelasi

Suatu proses yang stasioner Z_t mempunyai rata-rata dan variansi yang konstan yakni rata-rata atau ekspektasi $E(Z_t) = \mu$ dan variansi $var(Z_t) = E(Z_t - \mu)^2 = \sigma^2$ serta kovariansi $cov(Z_t, Z_s) = \gamma_{t,s}$ adalah fungsi dari perbedaan waktu $|t - s|$. Kovariansi antara Z_t dan Z_{t+k} adalah :

$$\gamma_k = cov(Z_t, Z_{t+k}) = [(Z_t - \mu)(Z_{t+k} - \mu)] \quad (7)$$

Korelasi antara Z_t dan Z_{t+k} adalah

$$\rho_k = \frac{cov(Z_t, Z_{t+k})}{\sqrt{var(Z_t)}\sqrt{var(Z_{t+k})}} = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} \quad (8)$$

Dengan catatan bahwa $var(Z_t) = var(Z_{t+k}) = \gamma_0$.

Adapun γ_k dinamakan fungsi autokovariansi dan ρ_k dinamakan fungsi autokorelasi pada analisis deret waktu, karena masing-masing menyatakan kovariansi dan korelasi antara Z_t dan Z_{t+k} dari proses yang sama, hanya dipisahkan oleh jarak waktu k (*lag k*).

¹⁷Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu : Teori dan Aplikasi*, ed. Arif Tiro. (Makassar: Andira Publisher, 2006), h.93-95

Untuk proses stasioner, fungsi autokovariansi γ_k dan autokorelasi ρ_k mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

$$\gamma_0 = \text{var}(Z_t) \quad ; \quad \rho_0 = 1$$

$$|\gamma_k| \leq \gamma_0 \quad ; \quad |\rho_k| \leq 1$$

$$\gamma_k = \gamma_{-k} \text{ dan } \rho_k = \rho_{-k} \text{ untuk semua } k.^{18}$$

D. ACF dan PACF

Fungsi Autokorelasi ditulis dengan *Autocorrelation Function* (ACF) atau fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi parsial atau *Partial Autocorrelation Function* (PACF). Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan antar data pengamatan suatu data deret waktu.

1. Autocorrelation Function (ACF)

Statistik kunci dalam analisis deret waktu adalah koefisien autokorelasi (korelasi deret waktu dengan deret waktu itu sendiri dengan selisih waktu (*lag*) 0,1,2 periode, atau lebih). Koefisien korelasi adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi (hubungan linear) antara pengamatan pada waktu ke t (dinotasikan dengan Z_t) dengan pengamatan pada waktu-waktu sebelumnya ($Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k}$). Untuk suatu data deret waktu Z_1, Z_2, \dots, Z_n , maka nilai fungsi autokorelasi *lag* k sampel adalah sebagai berikut :

$$r_k = \text{corr}(Z_t, Z_{t-k})$$

¹⁸Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu : Teori dan Aplikasi*, ed. Arif Tiro. (Makassar: Andira Publisher, 2006), h.9-10

$$r_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (Z_t - \bar{Z})(Z_{t-k} - \bar{Z})}{\sum_{t=1}^n (Z_t - \bar{Z})^2} \quad (9)$$

Taksiran kesalahan baku (*standard error*) dari r_k adalah

$$S_{r_k} = \sqrt{\frac{1}{n}(1+2 \sum_{j=1}^{k-1} r_j^2)} \quad (10)$$

Sedangkan untuk pengujian $r_k = 0$ atau $r_k \neq 0$ menggunakan statistik uji t yaitu:

$$t_{r_k} = \frac{r_k}{S_{r_k}} \quad (11)$$

Diagram ACF dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi kestasioneran data. Jika diagram ACF cenderung turun lambat atau turun secara linear, maka dapat disimpulkan data belum stasioner dalam rata-rata.

2. Partial Autocorrelation Function (PACF)

Ukuran korelasi yang lain pada analisis deret waktu adalah autokorelasi parsial. Autokorelasi parsial digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara Z_t dan Z_{t-k} , apabila pengaruh dari lag waktu 1, 2, ..., $k-1$ dianggap terpisah. Fungsi autokorelasi parsial adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi antara pengamatan ke t yaitu Z_t dengan pengamatan waktu-waktu sebelumnya yaitu $Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k}$. Rumus autokorelasi parsial adalah:

$$\phi_{kk} = \text{corr}(Z_t, Z_{t-k} | Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k+1}) \quad (12)$$

Harga ϕ_{kk} dapat ditentukan melalui persamaan Yule-Walker sebagai berikut:

$$\rho_j = \phi_{k1}\rho_{j-1} + \phi_{k2}\rho_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_{j-k} \quad (13)$$

Diberikan model regresi dengan peubah tak bebas Z_{t+k} dari proses stasioner dengan mean nol diregresikan terhadap peubah tak bebas $Z_{t+k-1}, Z_{t+k-2}, \dots, Z_t$:

$$Z_{t+k} = \phi_{k1}Z_{t+k-1} + \phi_{k2}Z_{t+k-2} + \dots + \phi_{kk}Z_t + a_{t+k} \quad (14)$$

Dimana ϕ_{ki} adalah parameter regresi ke- i dan a_{t+k} adalah bentuk sisa yang tidak berkorelasi dengan Z_{t+k-j} untuk $j = 1, 2, \dots, k$. Dengan mengalikan kedua ruas persamaan (14) dengan Z_{t+k-j} dan menghitung nilai harapan (ekspektasi) nya :

$$Z_{t+k-j} \cdot Z_{t+k} = \phi_{k1}Z_{t+k-j} \cdot Z_{t+k-1} + \phi_{k2}Z_{t+k-j} \cdot Z_{t+k-2} + \dots + \phi_{kk}Z_{t+k-j}Z_t + Z_{t+k-j}a_{t+k} \quad (15)$$

Ekspektasikan :

$$E(Z_{t+k-j} \cdot Z_{t+k}) = \phi_{k1}E(Z_{t+k-j} \cdot Z_{t+k-1}) + \phi_{k2}E(Z_{t+k-j} \cdot Z_{t+k-2}) + \dots + \phi_{kk}E(Z_{t+k-j}Z_t) + E(Z_{t+k-j}a_{t+k}) \quad (16)$$

$$\gamma_j = \phi_{k1}\gamma_{j-1} + \phi_{k2}\gamma_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\gamma_{j-k} \quad (17)$$

$$\frac{\gamma_j}{\gamma_0} = \rho_j$$

$$\rho_j = \phi_{k1}\rho_{j-1} + \phi_{k2}\rho_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_{j-k} \quad (18)$$

Untuk $j=1, 2, \dots, k$, berlaku persamaan sebagai berikut:

$$\rho_1 = \phi_{k1}\rho_0 + \phi_{k2}\rho_0 + \dots + \phi_{kk}\rho_{k-1}$$

$$\rho_2 = \phi_{k1}\rho_1 + \phi_{k2}\rho_0 + \dots + \phi_{kk}\rho_{k-2}$$

⋮

$$\rho_k = \phi_{k1}\rho_{k-1} + \phi_{k2}\rho_{k-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_0$$

Sistem persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk matriks dengan aturan cramer

dengan aturan cramer :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \dots & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \rho_{k-4} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{k1} \\ \phi_{k2} \\ \vdots \\ \phi_{kk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \rho_k \end{bmatrix} \quad (19)$$

Dengan menggunakan metode cramer, untuk $k = 1, 2, \dots$, diperoleh:

$$\phi_{11} = \rho_1$$

$$\phi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}}$$

$$\phi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 \end{vmatrix}}$$

$$\phi_{kk} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \dots & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \rho_{k-4} & \dots & \rho_k \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \dots & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \rho_{k-4} & \dots & 1 \end{vmatrix}}$$

Pada tahun 1960 Durbin telah memperkenalkan metode yang lebih efisien untuk menyelesaikan persamaan Yule-Walker yaitu:

$$\phi_{kk} = \frac{\rho_k - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-1,j} \rho_{k-j}}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-1,j} \rho_j} \quad (20)$$

E. *White Noise Process*

Suatu proses $\{a_t\}$ dinamakan *white noise process* (proses yang bebas dan identik) jika bentuk peubah acak yang berurutan tidak saling berkorelasi dan mengikuti distribusi tertentu. Rata-rata $E(a_t) = \mu_a$ dari proses ini diasumsikan bernilai nol dan mempunyai variansi yang konstan yaitu $var(a_t) = \sigma_a^2$ dan nilai kovariansi untuk proses ini $\gamma_k = cov(a_t, a_{t+k}) = 0$ untuk $k \neq 0$.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu *white noise process* $\{a_t\}$ adalah stasioner dengan beberapa sifat berikut.

Fungsi Autokovariansi:

$$\gamma_k = \begin{cases} \sigma_a^2, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases} \quad (21)$$

Fungsi autokorelasi:

$$\rho_k = \begin{cases} 1, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases} \quad (22)$$

Fungsi autokorelasi parsial:


$$\phi_{kk} = \begin{cases} 1, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases} \quad (23)$$

Dengan demikian, suatu deret waktu disebut *white noise* jika rata-rata dan variansinya konstan dan saling bebas.¹⁹

F. Uji Asumsi Distribusi Normal

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi kenormalan atau belum. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval ataupun rasio. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melakukan uji asumsi kenormalan ini adalah uji Kolmogorof Smirnov dengan melihat nilai p-value pada probability plot menggunakan pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $p < 0,05$, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai $p > 0,05$, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.²⁰



Gambar 2.6 : grafik data berdistribusi normal

¹⁹Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*, ed. Muhammad Arif Tiro. (Makassar: Andira Publisher, 2006) h. 19-20

²⁰Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*, ed. Muhammad Arif Tiro. (Makassar: Andira Publisher, 2006) h. 126

Namun apabila dengan mengamati dsitribusi normal dengan p-value dan tidak berdistribusi normal, maka dapat digunakan Q-Q plot untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Apabila pada Q-Q plot semua titik-titik mengarah kepada garis kenormalan maka dapat diasumsikan bahwa data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk peramalan.

G. Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

1. Model Autoregressive (AR)

Model AR (p) adalah model persamaan regresi yang menggabungkan nilai-nilai sebelumnya dari suatu variabel tak bebas dengan variabel itu sendiri.

Rumus umum dari model AR adalah:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t \quad (24)$$

$$Z_t - \phi_1 Z_{t-1} - \dots - \phi_p Z_{t-p} = a_t$$

Maka persamaan (24) dapat ditulis dalam bentuk

$$(1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p) Z_t = a_t$$

dimana $BZ_t = Z_{t-1}$

dengan,

Z_t = variabel dependent pada waktu t

$Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-p}$ = variabel independent yang merupakan lag dari Z_t

$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$ = parameter model *Autoregresif (AR)*

a_t = nilai residual pada waktu ke- t

p = orde AR

Persamaan (24) dapat ditulis dengan operator B menjadi:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t \quad (25)$$

2. Model Moving Average (MA)

Model MA (q) adalah model untuk memprediksi Z_t sebagai fungsi dari kesalahan prediksi dimasa lalu (*past forecast error*) dalam memprediksi Z_t . Secara umum model MA (q) adalah sebagai berikut:

$$Z_t = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q} \quad (26)$$

Persamaan (26) dapat ditulis dalam bentuk:

$$Z_t = (1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q) a_t$$

dengan,

Z_t = variabel dependent pada waktu t

$\theta_{t-1}, \theta_{t-2}, \dots, \theta_{t-p}$ = variabel independent yang merupakan lag dari Z_t

$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$ = parameter model *Autoregresif* (AR)

a_t = nilai residual pada waktu ke- t

$a_{t-1}, a_{t-2}, \dots, a_{t-q}$ = nilai residual pada periode sebelumnya

q = orde MA

Persamaan (26) dapat ditulis dengan operator B menjadi:

$$Z_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q) a_t \quad (27)$$

3. Model ARMA

Model ARMA(p, q) merupakan kombinasi dari model AR(p) dan MA(q), yaitu:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q} \quad (28)$$

$$Z_t - \phi_1 Z_{t-1} - \dots - \phi_p Z_{t-p} = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}$$

Persamaan (28) dapat ditulis dalam bentuk

$$(1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p) Z_t = (1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q) a_t$$

Apabila kedua ruas pada persamaan (28) dikalikan dengan Z_{t-k} hasilnya

$$\begin{aligned} Z_t Z_{t-k} &= \phi_1 Z_{t-1} Z_{t-k} + \dots + \phi_p Z_{t-p} Z_{t-k} + a_t Z_{t-k} - \theta_1 a_{t-1} Z_{t-k} - \dots + \\ &\quad - \theta_q a_{t-q} Z_{t-k} \end{aligned} \quad (29)$$

Jika persamaan (29) diekspektasikan maka

$$\begin{aligned} \gamma_k &= \phi_1 \gamma_{k-1} + \dots + \phi_p \gamma_{k-p} + E[a_t Z_{t-k}] - \theta_1 E[a_{t-1} Z_{t-k}] - \dots \\ &\quad - \theta_q E[a_{t-q} Z_{t-k}] \end{aligned} \quad (30)$$

4. Model ARIMA

Model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) yang dikembangkan oleh George Box dan Gwilyn Jenkins pada tahun 1976 merupakan model yang tidak mengasumsikan pola tertentu pada data historis yang diramalkan dan model yang secara penuh mengabaikan variabel bebas dalam membuat peramalan karena model ini menggunakan nilai sekarang dan nilai-nilai lampau dari variabel terikat untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA yang juga sering disebut metode deret waktu Box-Jenkins sebenarnya adalah teknik untuk mencari pola yang paling cocok dari sekelompok data (*curve fitting*), dengan demikian ARIMA memanfaatkan sepenuhnya data masa lalu dan sekarang dengan

²¹Siana Halim, *Diktat: Time Series Analysis* (Surabaya, 2006), h.5-7

variabel dependen untuk melakukan peramalan jangka pendek yang akurat sedangkan untuk peramalan jangka panjang ketepatan peramalannya kurang baik. Model ARIMA merupakan model gabungan antara *Autoregressive* (AR) dan *Moving Average* (MA) dimana model ini mampu mewakili deret waktu yang stasioner dan non-stasioner.²²

Dalam ARIMA dikenal adanya konstanta p, d dan q. dimana p dikenal dengan konstanta untuk *Autoregressive*, d dikenal dengan konstanta untuk diferensiasi membuat data menjadi stasioner, sedangkan q adalah konstanta untuk tingkat *Moving Average*. Nilai konstanta p dan q biasanya didapatkan dari estimasi gambar ACF dan PACF. Sedangkan untuk nilai d umumnya dilakukan dengan trial error terhadap nilai p dan q yang sudah didapatkan. Secara umum model ARIMA dirumuskan dengan notasi berikut:

$$ARIMA(p, d, q)$$

Model ARIMA dinotasikan sebagai ARIMA (p,d,q) dimana apabila d=0 dan q=0, maka model *Autoregressive* dinotasikan sebagai AR (p). Apabila p=0 dan d=0, maka model *Moving Average* dinotasikan sebagai MA (q).²³

Model ARIMA dilakukan pada data stasioner atau data yang tidak stasioner. Data deret waktu lebih banyak bersifat tidak stasioner sehingga harus melalui proses

²² Melly Sari Br Meliala, “Sistem Aplikasi *Forecasting* Penjualan Elektronik pada Toko Nasiaoanal Elektronik Kabanjahe dengan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA)”. *Pelita Informatika Budi Darma*4, no. 1 (2014): h. 169

²³ Yudi Wibowo, *Ánalisis data Runtun Waktu Menggunakan Metode Wafalet Theresolding*”. *Gaussian1*, no.1(2012), h.250

differencing sebanyak d kali agar menjadi stasioner. Rumus umum dari model ARIMA (p,d,q) adalah sebagai berikut:

$$\phi_p(B)(1 - B)^d Z_t = \theta_q(B)a_t \quad (31)$$

dengan:

$$\phi_p(B) = (1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p), AR(p)$$

$$\theta_q(B) = (1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q), MA(q)$$

$(1 - B)^d$: *differencing* orde d

a_t : nilai residual pada saat t

Berdasarkan pendekatan Box-Jenkins dalam melakukan analisis deret waktu terdapat empat tahapan, yaitu:

1. Pengidentifikasian model

Dalam melakukan identifikasi model ARIMA yang mungkin terbentuk, dilakukan identifikasi plot ACF dan PACF. Berikut adalah tabel ACF dan PACF untuk pengidentifikasian model :

Tabel 2.2 ACF dan PACF dari model ARIMA (p,0,q)

| Model ARIMA | ACF | PACF |
|-------------|---|---|
| AR(p) | Turun secara eksponensial (sinusoida) menuju 0 dengan bertambahnya k (<i>dies down</i>) | Terpotong secara <i>lag p</i> (<i>lag 1,2,3,...,p</i> yang signifikan berbeda dengan 0) (<i>cut off after lag p</i>) |
| MA(q) | <i>cut off after lag p</i> | <i>dies down</i> |
| ARMA(p,q) | <i>dies down</i> | <i>dies down</i> |

Model ARIMA diidentifikasi berdasarkan pergerakan *lag* dari ACF dan PACF dari data yang diteliti. Misalkan pada *lag* ACF mengalami *dies down* dan *lag* PACF mengalami *cuts off* maka modelnya yaitu AR(1).

2. Pendugaan parameter model

Untuk mendapatkan besaran koefisien model, maka dilakukan penaksiran. Penaksiran ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah metode Least Square. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari nilai parameter yang meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan (selisih antara nilai aktual dan ramalan) yang dinyatakan dalam bentuk persamaan :

$$S(\phi, \mu) = T \sum_{t=2}^n a_t^2 = \sum_{t=2}^n [(Z_t - \mu) - \phi(Z_{t-1})]^2$$

Sebagai contoh adalah penaksiran parameter untuk model AR(1) . Dengan demikian diperoleh nilai taksiran parameter untuk μ yaitu :

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{t=2}^n Z_t - \phi \sum_{t=2}^n Z_{t-1}}{(n-1)(1-\phi)} \quad (32)$$

Untuk $n > 1$ yang besar dapat ditulis :

$$\sum_{t=2}^n \frac{Z_t}{n-1} \approx \sum_{t=2}^n \frac{Z_{t-1}}{n-1} \approx \bar{Z} \quad (33)$$

Persamaan (33) dapat disederhanakan menjadi :

$$\hat{\mu} \approx \frac{\bar{Z} - \phi \bar{Z}}{1-\phi} = \bar{Z} \quad (34)$$

Dengan cara yang sama, operasi turunan terhadap ϕ yaitu :

$$[(Z_t - \mu) - \phi(Z_{t-1})]^2 = 2 [(Z_t - \mu) - \phi(Z_{t-1})] [-Z_{t-1}] = 0$$

jika diturunkan terhadap S maka :

$$2 [(Z_t - \bar{Z}) - \phi (Z_{t-1} - \bar{Z})] [-Z_{t-1}] = 2 [(Z_t - \mu) - \phi (Z_{t-1} - \mu)] [-Z_{t-1}] \quad (35)$$

Didapatkan nilai taksiran ϕ sebagai berikut :

$$\hat{\phi} = \frac{\sum_{t=2}^n (Z_t - \bar{Z}) - \phi (Z_{t-1} - \bar{Z})}{\sum_{t=2}^n (Z_{t-1} - \bar{Z})^2} \quad (36)$$

3. Pemeriksaan diagnostik

a. Uji Kesignifikanan Parameter

Model ARIMA yang baik dapat menggambarkan suatu kejadian adalah model yang salah satunya menunjukkan bahwa penaksiran parameternya signifikan berbeda dengan nol. Secara umum, misalkan θ adalah suatu parameter pada model ARIMA dan $\hat{\theta}$ adalah nilai taksiran parameter tersebut, serta $SE(\hat{\theta})$ adalah *standard error* dari nilai taksiran, maka uji signifikan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Hipotesis : $H_0 : \hat{\theta} = 0$

$H_1 : \hat{\theta} \neq 0$

Statistik Uji : $t = \frac{\hat{\theta}}{SE(\hat{\theta})}$

Daerah penolakan : tolak H_0 jika $|t| > t_{\alpha/2}$; $df = n - n_p =$ banyaknya parameter atau dengan menggunakan nilai-p (*p-value*), yakni tolak H_0 jika nilai-p $< \alpha$.

b. Uji Kesesuaian Model

- Uji Sisa *White Noise*

Uji sisa *white noise* dapat dituliskan sebagai berikut:

Hipotesis H_0 : model sudah memenuhi syarat cukup (sisa memenuhi syarat *white noise*)
 H_1 : model belum memenuhi syarat cukup (sisa tidak *white noise*)

Statistik uji $Q^* = n(n+2) \sum_{k=1}^K \frac{\hat{\rho}_k^2}{(n-k)}$

Dimana $\hat{\rho}_k^2 = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (\hat{a}_t - \bar{a})(\hat{a}_{t+k} - \bar{a})}{\sum_{t=1}^n (\hat{a}_t - \bar{a})^2}$

Daerah Penolakan tolak H_0 jika $Q^* > \chi_{a;df=K-m}^2$. K berarti pada *lag* K dan m adalah jumlah parameter yang ditaksir dalam model atau dengan menggunakan nilai-p (*p-value*), yakni tolak H_0 jika nilai-p $< a$.

- Uji Asumsi Distribusi Normal

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi kenormalan atau belum. Uji Kolmogorof Smirnov dapat digunakan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

Hipotesis H_0 : Residual model berdistribusi normal
 H_1 : Residual model tidak berdistribusi normal

Kriteria penolakan H_0 : *p-value* $<$ dengan menggunakan taraf signifikansi () = 0.05.

4. Peramalan

Model peramalan yang diterima digunakan untuk menghasilkan ramalan nilai mendatang.²⁴

H. Model Intervensi

Suatu data time series dapat dipengaruhi oleh kejadian luar yang dapat menyebabkan perubahan pola data *time series*. Kejadian luar misalnya bencana alam, kebijakan pemerintah, promosi, perang, hari libur, dan sebagainya. Guna memodelkan data *time series* dan mendeskripsikan pola respon dari intervensi yang ada, diperlukan suatu metode yaitu analisis intervensi. Analisis intervensi ini merupakan pengembangan dari ARIMA. Analisis intervensi digunakan untuk mengetahui analisis data *time series* apabila waktu intervensi telah diketahui. Namun apabila suatu kejadian luar tidak diketahui waktunya, maka digunakan deteksi outlier yaitu suatu metode analisis *time series* yang khusus digunakan untuk kejadian yang tidak diketahui waktu dan penyebabnya.²⁵

Model intervensi adalah suatu model analisis data time series yang pada awalnya banyak digunakan untuk mengeksplorasi dampak dari kejadian-kejadian eksternal yang diluar dugaan terhadap variabel yang menjadi objek pengamatan. Secara umum ada dua jenis model intervensi yaitu *fungsi step* dan *pulse*. Secara umum model umum intervensi yaitu :

$$Z_t = f(X_t) + N_t \quad (37)$$

²⁴Mendenhal dan Reinmuth, *Statistik untuk Manajemen dan Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga,1982), h. 234

²⁵Reta Ekayanti,dkk.“Analisis Model Intervensi Fungsi Step untuk Peramalan Kebaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Terhadap Besarnya Pemakaian Listrik”. Vol 03, no.3(2014): hal 177-178

Dengan:

Z_t = variabel respon pada waktu t

$f(X_t)$ = variabel intervensi

N_t = data preintervensi yang mengikiti proses ARIMA

Dengan,

$$f(X_t) = \frac{\omega_s(B)B^b}{\delta_r(B)} I_t \quad (38)$$

Dengan,

Z_t^* = respon model intervensi

$\omega_s(B)$ = operator dari s

$\delta_r(B)$ = operator dari r

$f(X_t)$ = variabel intervensi

b, s, r = suatu konstanta

$$I_t^{(r)} = S_t^r = \begin{cases} 0, & t < T \\ 1, & t \geq T \end{cases}, \text{ dengan } T \text{ adalah waktu intervensi} \quad (39)$$

Orde b, s, r merupakan orde penting pada model intervensi yang dapat diketahui dari grafik residual ARIMA data sebelum intervensi dengan batas 3 kali akar MSE ($RMSE$) dari data preintervensi. Orde b merupakan waktu mulai dampak dari intervensi. Apabila dampak intervensi langsung terasa satu hari setelah terjadi intervensi maka $b = 1$. Orde s diperoleh dapat diperoleh dengan melihat grafik residual agar data kembali stabil dihitung dari waktu terjadinya intervensi. Orde r merupakan *time lag* (setelah b dan s) saat data membentuk pola yang jelas. Jadi, model intervensi fungsi *step* yaitu :

$$Z_t = f(X_t) + N_t = \frac{\omega_s(B)B^b}{\delta_r(B)} S_t^{(T)} + N_t. \quad (40)$$

Adapun beberapa pola respon yang dapat terjadi pada suatu data runtun waktu setelah terjadinya intervensi yaitu :

1. Abrupt Permanent

Pola respon *Abrupt Permanent* menunjukkan perubahan setelah intervensi terjadi secara kasar (*abrupt*) dan perubahan itu tetap ada (*permanent*) setelah terjadinya intervensi dengan fungsi :

$$f(\beta, I_t) = \omega_0 S_t^T \quad (41)$$

2. Gradual Permanent

Pola *Gradual Permanent* menunjukkan intervensi menyebabkan perubahan secara perlahan atau berangsur-angsur (*gradual*) kemudian perubahan tersebut tetap permanendalam suatu runtun waktu dengan fungsi :

$$f(\beta, I_t) = \frac{\omega_0}{1 - \delta_1 B} S_t^T. \quad (42)$$



²⁶William W.S. Wei, *Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods*. (New York : PEARSON, 2006),h.212

²⁷Kasmiantini dan Dhoriva Urwatul Wutsqa, “Dampak Penurunan Harga BBM Jenis Premium Terhadap Angka Inflasi di Kota Yogyakarta”. Vol 03, no.3(2014): h.5-7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan data dan hasil yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini yaitu aplikasi atau terapan. Penelitian terapan adalah suatu jenis penelitian yang hasilnya dapat secara langsung diterapkan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada 1 Agustus 2015 – 31 Desember 2015

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa data harian perubahan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dari tanggal 1 Agustus 2015 sampai 31 Desember 2015 yang berjumlah 153 data.

D. Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini variabel yang didefinisikan adalah nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika sebagai (Z_t) yang diasumsikan dipengaruhi oleh variabel intervensi yaitu inflasi dan tingkat suku bunga ($f(X_t)$).

E. Prosedur Penelitian

Secara umum langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui analisis model intervensi fungsi step terbaik yang digunakan untuk meramalkan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika, adapun langkah-langkahnya yaitu :
 - a. Mengumpulkan data sekunder yang bisa diperoleh dari salah satu situs resmi tentang data perubahan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dari tanggal 1 Agustus 2015 – 31 Desember 2015.
 - b. Membuat plot data time series menggunakan software Minitab 16 untuk melihat perubahan pola data dimana letak intervensi terjadi.
 - c. Membagi data menjadi dua bagian yaitu data preintervensi (sebelum intervensi) dan data saat terjadi intervensi sampai data akhir.
 - d. Membentuk model ARIMA dari data preintervensi menggunakan metode Box-Jenkins yang didahului dengan pemeriksaan stasioneritas dalam rata-rata dan varians untuk data awal berdasarkan plot data yang telah dibuat sebelumnya.
 - e. Jika data tersebut belum stasioner dalam rata-rata dapat dilakukan differencing (pembedaan) dan melakukan transformasi Box-Cox jika data tidak memenuhi stasioner dalam varians sebelum terjadi intervensi.
 - f. Membuat plot ACF dan PACF untuk mengidentifikasi model yang mungkin dihasilkan dari data preintervensi (pendugaan model sementara).

- g. Melakukan estimasi parameter menggunakan metode *Least Square* (kuadrat terkecil) .
 - h. Dilakukan pemeriksaan diagnosis untuk data preintervensi yang meliputi uji signifikansi parameter dan uji kesesuaian model. Dimana uji kesesuaian model ini terdiri atas uji independensi residual dan uji normalitas residu.
 - i. Melakukan identifikasi respon intervensi dengan mengamati plot respon intervensi apakah termasuk *abrupt permanent*, atau *gradual permanent*
 - j. Menentukan nilai orde intervensi yang terdiri dari nilai (b,s,r) berdasarkan plot residual respon intervensi dengan batas 3 kali RMSE model ARIMA preintervensi.
 - k. Setelah orde intervensi didapatkan, dilakukan pengestimasian parameter dengan menggunakan program *SAS (Statistical Analysis System)*
 - l. Melakukan estimasi parameter intervensi dengan cara yang sama dengan model ARIMA preintervensi sebelumnya yaitu uji signifikansi parameter dan uji independensi residual. .
 - m. Setelah model intervensi memenuhi kriteria pengujian maka dibentuk model intervensi fungsi *step* untuk peramalan.
2. Untuk mengetahui prediksi nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dalam 30 hari kedepan maka digunakan rumus intervensi fungsi *step* yang telah dibentuk sebelumnya dengan memasukkan $t=30$.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam menganalisis data runtun waktu semakin banyak data yang digunakan maka hasil yang akan didapatkan akan mendekati keakuratan. Di dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data harian yang berjumlah 153 data runtun waktu dari tanggal 1 Agustus 2015–31 Desember 2015 yang diperoleh dari <http://www.currency-converter.org.uk/currency-rates/historical/table/USD-IDR.html>. Situs ini adalah salah satu situs resmi yang memuat nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dan dapat diakses kapan saja. Dari data tersebut diasumsikan bahwa variabel intervensi yang mempengaruhi penurunan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika adalah inflasi dan tingkat suku bunga. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari www.bi.go.id bahwa inflasi meningkat dari 4, 89% menjadi 6,25 % dan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,50 % pada bulan oktober 2015. Berikut adalah data perubahan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika :


Tabel 4.1 Data perubahan nilai kurs Rupiah dari 1 Agustus 2015 – 31 Desember 2015

| Tanggal | Nilai Kurs | Tanggal | Nilai Kurs | Tanggal | Nilai Kurs |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1-Aug-15 | 13509.2497 | 21-Sep-15 | 14451.0237 | 11-Nov-15 | 13592.1209 |
| 2-Aug-15 | 13524.37 | 22-Sep-15 | 14537.7096 | 12-Nov-15 | 13580.1209 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3-Aug-15 | 13506.4376 | 23-Sep-15 | 14605.8643 | 13-Nov-15 | 13635.1147 |
| 4-Aug-15 | 13493.3061 | 24-Sep-15 | 14687.5029 | 14-Nov-15 | 13654.9453 |
| 5-Aug-15 | 13510.1156 | 25-Sep-15 | 14671.4613 | 15-Nov-15 | 13698.0368 |
| 6-Aug-15 | 13522.0352 | 26-Sep-15 | 14660.6789 | 16-Nov-15 | 13695.0084 |
| 7-Aug-15 | 13530.954 | 27-Sep-15 | 14659.4837 | 17-Nov-15 | 13747.9593 |
| 8-Aug-15 | 13534.0208 | 28-Sep-15 | 14643.2851 | 18-Nov-15 | 13793.4206 |
| 9-Aug-15 | 13529.4097 | 29-Sep-15 | 14672.5025 | 19-Nov-15 | 13773.2685 |
| 8-Oct-15 | 13529.1881 | 30-Sep-15 | 14671.8693 | 20-Nov-15 | 13689.7962 |
| 11-Aug-15 | 13620.527 | 1-Oct-15 | 14685.2154 | 21-Nov-15 | 13646.081 |
| 12-Aug-15 | 13743.145 | 2-Oct-15 | 14681.6422 | 22-Nov-15 | 13657.3395 |
| 13-Aug-15 | 13723.2088 | 3-Oct-15 | 14678.1097 | 23-Nov-15 | 13691.3867 |
| 14-Aug-15 | 13809.9978 | 4-Oct-15 | 14700.6054 | 24-Nov-15 | 13715.4129 |
| 15-Aug-15 | 13809.9978 | 5-Oct-15 | 14621.0959 | 25-Nov-15 | 13679.2689 |
| 16-Aug-15 | 13828.1956 | 6-Oct-15 | 14378.7454 | 26-Nov-15 | 13726.6734 |
| 17-Aug-15 | 13828.0459 | 7-Oct-15 | 14056.6942 | 27-Nov-15 | 13745.313 |
| 18-Aug-15 | 13838.5168 | 8-Oct-15 | 13948.1152 | 28-Nov-15 | 13773.4318 |
| 19-Aug-15 | 13805.5693 | 9-Oct-15 | 13599.344 | 29-Nov-15 | 13780.3917 |
| 20-Aug-15 | 13838.1692 | 10-Oct-15 | 13539.7809 | 30-Nov-15 | 13821.8322 |
| 21-Aug-15 | 13866.427 | 11-Oct-15 | 13441.053 | 1-Dec-15 | 13777.4827 |
| 22-Aug-15 | 13908.1494 | 12-Oct-15 | 13437.8594 | 2-Dec-15 | 13787.0494 |
| 23-Aug-15 | 13906.824 | 13-Oct-15 | 13557.9308 | 3-Dec-15 | 13770.036 |
| 24-Aug-15 | 13974.1106 | 14-Oct-15 | 13539.6406 | 4-Dec-15 | 13830.8143 |
| 25-Aug-15 | 13979.8243 | 15-Oct-15 | 13480.027 | 5-Dec-15 | 13833.9811 |
| 26-Aug-15 | 14140.9885 | 16-Oct-15 | 13508.3333 | 6-Dec-15 | 13826.5227 |
| 27-Aug-15 | 14046.3439 | 17-Oct-15 | 13508.45 | 7-Dec-15 | 13825.5294 |
| 28-Aug-15 | 14088.4492 | 18-Oct-15 | 13504.9387 | 8-Dec-15 | 13930.0389 |
| 29-Aug-15 | 14045.4106 | 19-Oct-15 | 13508.5808 | 9-Dec-15 | 13952.2431 |
| 30-Aug-15 | 14067.3004 | 20-Oct-15 | 13578.1482 | 10-Dec-15 | 13957.9762 |
| 31-Aug-15 | 14074.4417 | 21-Oct-15 | 13738.4038 | 11-Dec-15 | 13953.3591 |
| 1-Sep-15 | 14069.7781 | 22-Oct-15 | 13696.4464 | 12-Dec-15 | 13875.1528 |
| 2-Sep-15 | 14126.8358 | 23-Oct-15 | 13610.8673 | 13-Dec-15 | 13945.6165 |
| 3-Sep-15 | 14192.2343 | 24-Oct-15 | 13601.6514 | 14-Dec-15 | 14042.6494 |
| 4-Sep-15 | 14170.1694 | 25-Oct-15 | 13619.173 | 15-Dec-15 | 14057.5278 |
| 5-Sep-15 | 14173.7358 | 26-Oct-15 | 13614.3658 | 16-Dec-15 | 14026.5755 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 6-Sep-15 | 14156.4521 | 27-Oct-15 | 13635.5306 | 17-Dec-15 | 13984.9776 |
| 7-Sep-15 | 14238.6153 | 28-Oct-15 | 13605.7389 | 18-Dec-15 | 13949.6576 |
| 8-Sep-15 | 14244.385 | 29-Oct-15 | 13604.824 | 19-Dec-15 | 13923.3573 |
| 9-Sep-15 | 14245.8565 | 30-Oct-15 | 13714.2482 | 20-Dec-15 | 13908.9608 |
| 10-Sep-15 | 14307.7685 | 31-Oct-15 | 13714.2482 | 21-Dec-15 | 13799.7306 |
| 11-Sep-15 | 14287.159 | 1-Nov-15 | 13731.8016 | 22-Dec-15 | 13693.3269 |
| 12-Sep-15 | 14290.6593 | 2-Nov-15 | 13695.708 | 23-Dec-15 | 13654.6406 |
| 13-Sep-15 | 14305.5018 | 3-Nov-15 | 13622.0637 | 24-Dec-15 | 13635.5274 |
| 14-Sep-15 | 14292.2757 | 4-Nov-15 | 13559.7636 | 25-Dec-15 | 13583.8208 |
| 15-Sep-15 | 14381.8274 | 5-Nov-15 | 13546.4115 | 26-Dec-15 | 13574.5833 |
| 16-Sep-15 | 14426.4856 | 6-Nov-15 | 13583.5404 | 27-Dec-15 | 13635.1934 |
| 17-Sep-15 | 14439.5891 | 7-Nov-15 | 13582.0436 | 28-Dec-15 | 13630.3344 |
| 18-Sep-15 | 14421.25 | 8-Nov-15 | 13691.7189 | 29-Dec-15 | 13675.8402 |
| 19-Sep-15 | 14390.5967 | 9-Nov-15 | 13731.2193 | 30-Dec-15 | 13776.0987 |
| 20-Sep-15 | 14411.1391 | 10-Nov-15 | 13633.6748 | 31-Dec-15 | 13799.267 |

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu melihat plot data time series untuk melihat perbedaan antara data preintervensi dan data intervensi. Berikut adalah plot data secara keseluruhan dari nilai Kurs :




Gambar 4.1 Plot data keseluruhan

I. Data preintervensi (sebelum intervensi)


Berdasarkan plot data tersebut terlihat bahwa intervensi terjadi pada series ke-66, oleh karena itu data preintervensi terdiri dari data 1 sampai 66 dan data intervensi yaitu data 67 sampai data akhir.

1. Identifikasi model preintervensi

Gambar dibawah ini merupakan diagram deret waktu (plot data asli) dari nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika yang berjumlah 153 data. Dari plot di atas, terlihat bahwa data mengalami penurunan secara drastis dimulai pada series ke 67. Intervensi itu menyebabkan penurunan harga drastis dalam beberapa hari berturut-turut sebesar Rp.242,341, Rp.322,051, Rp.348,771. Dalam hal ini, data tidak dapat dimodelkan karena data belum stasioner, oleh karena itu dilakukan pemeriksaan kestasioneran dalam hal varian dan mean. Untuk melihat variansinya stasioner atau tidak, maka dilakukan transformasi Box Cox (lamda optimum) .




Gambar 4.2 Box Cox plot dari preintervensi sebelum transformasi



Gambar 4.3 Box Cox plot dari preintervensi setelah transformasi

Dari Gambar 4.2 di atas, Grafik Transformasi Box Cox, nilai lamda pada (Gambar 4.2) belum memenuhi syarat stasioner yaitu 1,00 sehingga perlu ditransformasikan dengan Z_t^λ . Setelah ditransformasikan seperti pada (Gambar 4.3) menghasilkan nilai lamda 1,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah stasioner dalam varian. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam mean dengan melihat plot ACF dan PACF berikut :



(a)

(b)

Gambar 4.4(a) Plot Box Cox sebelum differencing

(b) Plot Box Cox setelah differencing

Tabel 4.2 Autokorelasi data preintervensi perubahan kurs


| Lag | ACF | | ACF |
|-----|----------|----|----------|
| 1 | 0.961124 | 11 | 0.526461 |
| 2 | 0.919014 | 12 | 0.473655 |
| 3 | 0.872432 | 13 | 0.429564 |
| 4 | 0.825327 | 14 | 0.384333 |
| 5 | 0.778058 | 15 | 0.347198 |
| 6 | 0.73116 | 16 | 0.310555 |
| 7 | 0.682872 | 17 | 0.275741 |
| 8 | 0.634721 | 18 | 0.241013 |
| 9 | 0.581001 | | |

Tabel 4.3 Autokorelasi Parsial data preintervensi perubahan kurs

| Lag | PACF | | PACF |
|-----|-----------|----|-----------|
| 1 | 0.961124 | 11 | -0.040534 |
| 2 | -0.062247 | 12 | -0.004624 |
| 3 | -0.079136 | 13 | 0.080737 |
| 4 | -0.027451 | 14 | -0.056618 |
| 5 | -0.024506 | 15 | 0.064695 |
| 6 | -0.021176 | 16 | -0.026114 |
| 7 | -0.045878 | 17 | -0.013898 |
| 8 | -0.026175 | 18 | -0.025512 |
| 9 | -0.101832 | | |


Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 18 *lag* karena secara otomatis yang muncul akan menampilkan *lag* sebanyak $n/4$, untuk prngamatan sejumlah 66 sehingga ada $66/4 = 17,5$ (18) *lag* yang muncul. Nilai ACF pada lag 1,2, dan lag 3

mengalami penurunan secara lambat dan berada di sekitar angka 1. Sedangkan Tabel 4.2, nilai PACF pada lag 1 mendekati 1, dan pada lag-lag selanjutnya nilai PACF semakin kecil. Berdasarkan pola ACF dan PACF dia atas dapat ditarik kesimpulan bahwa data belum stasioner dalam mean. Oleh karena itu perlu dilakukan differencing orde 1. Setelah dilakukan differencing orde 1, data tersebut telah stasioner dalam mean ditandai dengan tidak adanya lag yang keluar dari batas signifikansi. Hasil differencing data kurs tersebut dapat dilihat dalam lampiran 2. Setelah data tersebut telah differencing orde 1, pola Trend time series berbentuk seperti berikut :



Gambar 4.5 Plot Analisis Trend data preintervensi perubahan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika setelah transformasi dan differencing orde 1

Adapun plot ACF dan PACF setelah differencing orde 1 yaitu :



(a)

(b)

Gambar 4.6 (a) Plot ACF setelah differencing 1
 (b) Plot PACF setelah differencing 1

Tabel 4.4 Autokorelasi data preintervensi perubahan kurs setelah d=1

| Lag | ACF | Lag | ACF |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 1 | -0.150459 | 9 | -0.11894 |
| 2 | 0.19186 | 10 | 0.105829 |
| 3 | -0.210614 | 11 | -0.306606 |
| 4 | -0.089931 | 12 | 0.168708 |
| 5 | -0.088071 | 13 | -0.072365 |
| 6 | -0.019232 | 14 | 0.186956 |
| 7 | -0.049094 | 15 | -0.011863 |
| 8 | 0.182591 | 16 | -0.041319 |

Tabel 4.5 Autokorelasi Parsial data preintervensi perubahan kurs setelah d=1

| Lag | PACF | Lag | PACF |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 1 | -0.150459 | 9 | -0.099667 |
| 2 | 0.173142 | 10 | -0.014434 |
| 3 | -0.169498 | 11 | -0.253825 |
| 4 | -0.178783 | 12 | 0.105761 |
| 5 | -0.059136 | 13 | 0.045488 |
| 6 | -0.029603 | 14 | 0.076588 |

| | | | |
|---|-----------|----|-----------|
| 7 | -0.094877 | 15 | -0.007145 |
| 8 | 0.144695 | 16 | -0.128909 |

Dari Gambar 4.4 di atas dapat dilihat bahwa pada plot Analisis Trend data perubahan kurs tersebut telah sejajar dengan sumbu horizontal. Semua titik pada plot tersebut cenderung menuju ke titik 0. Sedangkan plot Autokorelasi dan Autokorelasi Parsial hasil differencing orde 1 pada (Gambar 4.6(a) dan (b)) telah menunjukkan stasioner dalam mean, sehingga data telah memenuhi syarat kestasioneran dalam varian dan mean. Oleh karena itu bisa langsung digunakan untuk mendapatkan model ARIMA terbaik untuk model preintervensi. Pada diagram ACF (Gambar 4.5(a)) terlihat diagram berbentuk pola *dies down* pada lag 2 dan juga pada diagram PACF (Gambar 4.5(b)) mengalami *dies down* pada lag 2. Hal ini menunjukkan bahwa dugaan model ARIMA untuk sementara yaitu ARIMA(1,1,0), ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,1), ARIMA(2,1,1), ARIMA(1,1,2), ARIMA(2,1,2).

2. Pemeriksaan Diagnosis model ARIMA

Untuk tahap pemeriksaan diagnosis masing-masing model ARIMA terdiri dari uji signifikansi parameter dan uji kesesuaian model (uji white noise dan distribusi normal). Berikut adalah pemeriksaan diagnosis untuk setiap model ARIMA :

a. Model ARIMA (1,1,0)

Untuk melakukan estimasi parameter model ARIMA(1,1,0) digunakan Software Minitab 16, dengan menggunakan analisis time series metode ARIMA, adapun estimasi parameter dengan menggunakan ARIMA yaitu :

Final Estimates of Parameters

| Type | Coef | SE Coef | T | P |
|----------|---------|---------|-------|-------|
| AR 1 | -0.6628 | 0.0983 | -6.74 | 0.000 |
| Constant | -1.073 | 6.312 | -0.17 | 0.866 |

Differencing: 1 regular difference

Number of observations: Original series 65, after differencing 64

Residuals: SS = 158032 (backforecasts excluded)

MS = 2549 DF = 62

1) Uji statistik parameter model

Uji statistik parameter model digunakan untuk melihat signifikansi parameter model dari data runtun waktu perubahan nilai kurs Rupiah yaitu model ARIMA (1,1,0).

Hipotesis:

$H_0 : \theta = 0$ (parameter ARIMA tidak cukup signifikan dalam model)

$H_0 : \theta \neq 0$ (parameter ARIMA cukup signifikan dalam model)

Kriteria penolakan H_0 yaitu jika $P\text{-Value} < \alpha$, dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, maka berdasarkan estimasi parameter hasil pengolahan data yang ditunjukkan nilai $P\text{-Value}$ parameter ARIMA (1,1,0) adalah $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa dalam model ARIMA (1,1,0) parameter θ cukup signifikan jadi persamaan modelnya adalah :

$$Z_t = (1 + \phi_1)Z_{t-1} + \phi_1 Z_{t-2} + \alpha_t$$

$$Z_t = (1 + (-0,6628))Z_{t-1} + 0,6628 Z_{t-2} + \alpha_t$$

Tabel taksiran parameter model menunjukkan besarnya *Mean Square Error* (MSE) model sebesar 2549 dan derajat kebebasan (df) model sebesar 62. Dengan

melihat nilai MSE dapat diketahui model mana yang terbaik, karena semakin kecil nilai MSE maka model semakin baik.

2) Diagnosis model

Untuk mendeteksi adanya proses white noise, maka perlu dilakukan beberapa uji. Uji pertama adalah uji korelasi yang berguna untuk mendeteksi independensi residual dan uji kedua adalah uji kenormalan residual model. Berikut adalah olahan data model ARIMA (1,1,0) yaitu :

| | Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|
| Lag | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Chi-Square | 15.7 | 23.6 | 36.3 | 46.5 |
| DF | 10 | 22 | 34 | 46 |
| P-Value | 0.110 | 0.370 | 0.363 | 0.453 |

Uji independensi residual untuk mendeteksi independensi *residual* antar lag. Dua *lag* dikatakan tidak berkorelasi apabila antar *lag* tidak ada korelasi yang berarti. Dalam penelitian ini, uji dilakukan dengan menggunakan statistik *Ljung-Box*.

Hipotesis

H_0 : $\rho_{at,at+k} = 0$ (ada korelasi antar lag)


H_1 : minimal ada 1 lag yang $\rho_{at,at+k} \neq 0$

Tabel 4.6 Ringkasan hasil uji Ljung Box Pearce ARIMA (1,1,0)

| Lag (K) | Df(K-m) | Ljung-Box(Q*) | $X_{\alpha}^2; df$ | p-value |
|---------|-----------|---------------|--------------------|---------|
| 12 | 12-1 = 11 | 15,7 | 19,675 | 0,110 |
| 24 | 24-1 = 23 | 23,6 | 35,172 | 0,370 |
| 36 | 36-1 = 35 | 36,3 | 49,801 | 0,363 |
| 48 | 48-1 = 47 | 46,5 | 64,00 | 0,453 |

Ringkasan hasil pada table menunjukkan bahwa sampai pada lag 48 bisa diambil kesimpulan bahwa ada korelasi antar residual pada lag t dengan residual pada lag 12, karena nilai $\chi^2_{Ljung-Box}$ pada lag 12 (15,7) $< \chi^2_{(0,05,11)}(19,675)$. Pada lag 24, $\chi^2_{(Ljung-Box)}(23,6) < \chi^2_{(0,05,23)}(35,17)$. Pada lag 36, $\chi^2_{(Ljung-Box)}(36,3) < \chi^2_{(0,05,35)}(49,8)$. Pada lag 48 $\chi^2_{(Ljung-Box)}(46,5) < \chi^2_{(0,05,47)}(64,0)$. Maka antar residual pada lag t dengan residual sampai pada lag 12 saling berkorelasi, lag 24, 36 dan 48 tidak saling berkorelasi maka berdasarkan hipotesis awal maka H_0 ditolak. Jadi diperoleh kesimpulan residual model memenuhi asumsi independensi.

Uji kenormalan residual model digunakan untuk mendeteksi kenormalan residual model ARIMA (1,1,0). Salah satu cara yang ditempuh untuk melakukan uji kolmogorov smirnov pada minitab 16 :



Gambar 4.7 Kolmogorov Smirnov nilai residual ARIMA(1,1,0)

Uji distribusi normal digunakan uji Kolmogorov Smirnov P-value > 0,05. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa P-value > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data telah berdistribusi normal.

b. Model ARIMA (0,1,1)

Untuk melakukan estimasi parameter model ARIMA(0,1,1) digunakan Software Minitab 16, dengan menggunakan analisis time series metode ARIMA, adapun estimasi parameter dengan menggunakan ARIMA yaitu :

```
Final Estimates of Parameters

Type      Coef  SE Coef    T      P
MA 1      0.9916  0.0770  12.88  0.000
Constant -0.0268  0.4801  -0.06  0.956

Differencing: 1 regular difference
Number of observations: Original series 65, after differencing 64
Residuals:    SS = 124402 (backforecasts excluded)
              MS = 2006  DF = 62
```

1) Uji statistik parameter model

Uji statistic parameter model digunakan untuk melihat signifikansi parameter model dari data runtun waktu perubahan nilai kurs Rupiah yaitu model ARIMA (0,1,1)

Hipotesis:

$H_0 : \theta = 0$ (parameter ARIMA tidak cukup signifikan dalam model)

$H_0 : \theta \neq 0$ (parameter ARIMA cukup signifikan dalam model)

Kriteria penolakan H_0 yaitu jika $P\text{-Value} < \alpha$, dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, maka berdasarkan estimasi parameter hasil pengolahan data yang ditunjukkan nilai $P\text{-Value}$ parameter ARIMA (0,1,1) adalah $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa dalam model ARIMA (0,1,1) parameter θ cukup signifikan. Tabel taksiran parameter model menunjukkan besarnya *Mean Square Error* (MSE) model sebesar 2006 dan derajat kebebasan (df) model sebesar 62. Dengan melihat nilai MSE dapat diketahui model mana yang terbaik, karena semakin kecil nilai MSE maka model semakin baik.

2) Diagnosis model

Untuk mendeteksi adanya proses white noise, maka perlu dilakukan beberapa uji. Uji pertama adalah uji korelasi yang berguna untuk mendeteksi independensi residual dan uji kedua adalah uji kenormalan residual model. Berikut adalah olahan data model ARIMA (0,1,1) yaitu :

| | Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|
| Lag | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Chi-Square | 23.0 | 30.5 | 41.1 | 51.2 |
| DF | 10 | 22 | 34 | 46 |
| P-Value | 0.011 | 0.108 | 0.187 | 0.277 |

Uji independensi residual untuk mendeteksi independensi *residual* antar lag. Dua lag dikatakan tidak berkorelasi apabila antar lag tidak ada korelasi yang berarti. Dalam penelitian ini, uji dilakukan dengan menggunakan statistik *Ljung-Box*.

Hipotesis

H_0 : $\rho_{at,at+k} = 0$ (ada korelasi antar lag)

H_1 : minimal ada 1 lag yang $\rho_{at,at+k} \neq 0$

Tabel 4.7 Ringkasan hasil uji Ljung Box Pearce ARIMA (0,1,1)

| Lag (K) | Df(K-m) | Ljung-Box(Q*) | $\chi^2; df$ | p-value |
|---------|-----------|---------------|--------------|---------|
| 12 | 12-1 = 11 | 23,0 | 19,675 | 0,011 |
| 24 | 24-1 = 23 | 30,5 | 35,172 | 0,108 |
| 36 | 36-1= 35 | 41,1 | 49,801 | 0,187 |
| 48 | 48-1= 47 | 51,2 | 64,00 | 0,277 |

Ringkasan hasil pada table menunjukkan bahwa sampai pada lag 12, bisa diambil kesimpulan bahwa ada korelasi antar residual pada lag t dengan residual pada lag 12, karena nilai $\chi^2_{Ljung-Box}$ pada lag 12 (23,0) > $\chi^2_{(0,05,11)}$ (19,675). Pada lag 24, $\chi^2_{(Ljung-Box)}(30,5) > \chi^2_{(0,05,23)}$ (35,1). Pada lag 36, $\chi^2_{(Ljung-Box)}(41,1) < \chi^2_{(0,05,35)}$ (49,8). Pada lag 48 $\chi^2_{(Ljung-Box)}(51,2) < \chi^2_{(0,05,47)}$ (64,0). Maka antar residual pada lag t dengan residual sampai pada lag 12 saling berkorelasi, lag 24, 36 dan 48 tidak saling berkorelasi maka berdasarkan hipotesis awal maka H_0 diterima. Jadi diperoleh kesimpulan residual model tidak memenuhi asumsi independensi.

c. Model ARIMA (1,1,1)

1). Uji statistik parameter model

Uji statistik parameter model digunakan untuk melihat signifikansi parameter model dari data runtun waktu perubahan nilai kurs Rupiah yaitu model ARIMA (1,1,1) :

Final Estimates of Parameters

| Type | | Coef | SE Coef | T | P |
|----------|---|---------|---------|--------|-------|
| AR | 1 | -0.0961 | 0.1318 | -0.73 | 0.469 |
| MA | 1 | 1.0333 | 0.0096 | 108.12 | 0.000 |
| Constant | | -0.1755 | 0.1522 | -1.15 | 0.253 |

Differencing: 1 regular difference

Number of observations: Original series 65, after differencing 64

Residuals: SS = 115537 (backforecasts excluded)

MS = 1894 DF = 61

Hipotesis:

$H_0: \theta = 0$ (parameter ARIMA tidak cukup signifikan dalam model)

$H_0: \theta \neq 0$ (parameter ARIMA cukup signifikan dalam model)

Kriteria penolakan H_0 yaitu jika $P\text{-Value} < \alpha$, dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, maka berdasarkan estimasi parameter hasil pengolahan data yang ditunjukkan nilai $P\text{-Value}$ ARIMA (1,1,1) dengan parameter θ_1 yaitu $0,469 > 0,05$ dan parameter θ_2 yaitu $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa dalam model ARIMA (2,1,2) parameter θ_1 tidak signifikan dan parameter θ_2 cukup signifikan.

Table taksiran parameter model menunjukkan besarnya *Mean Square Error* (MSE) model sebesar 1894 dan derajat kebebasan (df) model sebesar 61. Dengan melihat nilai MSE dapat diketahui model mana yang terbaik, karena semakin kecil nilai MSE maka model semakin baik.

1) Diagnosis model

Untuk mendeteksi adanya proses white noise , maka perlu dilakukan beberapa uji. Uji pertama adalah uji korelasi yang berguna untuk mendeteksi independensi

residual dan uji kedua adalah uji kenormalan residual model. Berikut adalah olahan data model ARIMA (1,1,1) yaitu :

| Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Lag | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Chi-Square | 18.9 | 27.3 | 36.7 | 47.0 |
| DF | 9 | 21 | 33 | 45 |
| P-Value | 0.026 | 0.161 | 0.300 | 0.391 |

Uji independensi residual untuk mendeteksi independensi *residual* antar lag. Dua *lag* dikatakan tidak berkorelasi apabila antar *lag* tidak ada korelasi yang berarti. Dalam penelitian ini, uji dilakukan dengan menggunakan statistik *Ljung-Box*.

Hipotesis

$H_0 : \rho_{at,at+k} = 0$ (ada korelasi antar lag)

H_1 : minimal ada 1 lag yang $\rho_{at,at+k} \neq 0$

Tabel 4.8 Ringkasan hasil uji Ljung Box Pearce ARIMA (1,1,1)

| Lag (K) | Df(K-m) | Ljung-Box(Q*) | $\chi^2_{\alpha}; df$ | p-value |
|---------|-----------|---------------|-----------------------|---------|
| 12 | 12-2 = 10 | 18,9 | 18,3070 | 0,006 |
| 24 | 24-2 = 22 | 27,3 | 33,9245 | 0,044 |
| 36 | 36-2 = 34 | 36,7 | 48,6024 | 0,108 |
| 48 | 48-2 = 46 | 47,0 | 62,8296 | 0,203 |

Ringkasan hasil pada table menunjukkan bahwa sampai pada lag 12, bisa diambil kesimpulan bahwa ada korelasi antar residual pada lag t dengan residual pada lag 12, karena nilai $\chi^2_{Ljung-Box}$ pada lag 12 (18,9) $> \chi^2_{(0,05,10)}$ (18,3070). Pada lag 24, $\chi^2_{Ljung-Box}(27,3) < \chi^2_{(0,05,22)}$ (33,9). Pada lag 36, $\chi^2_{Ljung-Box}(36,7) < \chi^2_{(0,05,22)}$ (48,6024). Pada lag 48 $\chi^2_{Ljung-Box}(47,0) < \chi^2_{(0,05,22)}$ (62,8296). Maka antar

residual pada lag t dengan residual sampai pada lag 12 saling berkorelasi, lag 24, 36 dan 48 tidak saling berkorelasi, maka berdasarkan hipotesis awal maka H_0 diterima. Jadi diperoleh kesimpulan residual model tidak memenuhi asumsi independensi. Karena tidak memenuhi asumsi independensi maka tidak perlu lagi dilakukan uji distribusi normal.

c. Model ARIMA (2,1,2)

Untuk melakukan estimasi parameter model ARIMA(2,1,2) digunakan Software Minitab 16, dengan menggunakan analisis time series metode ARIMA, adapun estimasi parameter dengan menggunakan ARIMA yaitu :

Final Estimates of Parameters

| Type | Coef | SE Coef | T | P |
|----------|---------|---------|--------|-------|
| AR 1 | -0.1237 | 0.1392 | -0.89 | 0.378 |
| AR 2 | 0.1932 | 0.1436 | 1.35 | 0.183 |
| MA 1 | 1.0046 | 0.0080 | 126.08 | 0.000 |
| MA 2 | 0.0456 | 0.1195 | 0.38 | 0.704 |
| Constant | -0.0921 | 0.1990 | -0.46 | 0.645 |

Differencing: 1 regular difference

Number of observations: Original series 65, after differencing 64

Residuals: SS = 109452 (backforecasts excluded)

MS = 1855 DF = 59

1). Uji statistik parameter model

Uji statistik parameter model digunakan untuk melihat signifikansi parameter model dari data runtun waktu perubahan nilai kurs Rupiah yaitu model ARIMA (2,1,2) :

Hipotesis:

$H_0 : \theta = 0$ (parameter ARIMA tidak cukup signifikan dalam model)

$H_0 : \theta \neq 0$ (parameter ARIMA cukup signifikan dalam model)

Kriteria penolakan H_0 yaitu jika $P\text{-Value} < \alpha$, dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, maka berdasarkan estimasi parameter hasil pengolahan data yang ditunjukkan nilai $P\text{-Value}$ pada ARIMA (2,1,2) untuk parameter θ_1 yaitu $0,378 > 0,05$, parameter θ_2 yaitu $0,183 > 0,05$, parameter θ_3 yaitu $0,000 < 0,05$, parameter θ_4 yaitu $0,704 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa parameter $\theta_1, \theta_2, \theta_4$ tidak signifikan dalam model dan parameter θ_3 signifikan.

Table taksiran parameter model menunjukkan besarnya *Mean Square Error* (MSE) model sebesar 1855 dan derajat kebebasan (df) model sebesar 59. Dengan melihat nilai MSE dapat diketahui model mana yang terbaik, karena semakin kecil nilai MSE maka model semakin baik.

2) Diagnosis model

Untuk mendeteksi adanya proses white noise , maka perlu dilakukan beberapa uji. Uji pertama adalah uji korelasi yang berguna untuk mendeteksi independensi residual dan uji kedua adalah uji kenormalan residual model. Berikut adalah olahan data model ARIMA (2,1,2) yaitu :

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

| | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Lag | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Chi-Square | 13.7 | 21.8 | 32.1 | 41.8 |
| DF | 7 | 19 | 31 | 43 |
| P-Value | 0.057 | 0.294 | 0.413 | 0.522 |

Uji independensi residual untuk mendeteksi independensi *residual* antar lag. Dua lag dikatakan tidak berkorelasi apabila antar lag tidak ada korelasi yang berarti. Dalam penelitian ini, uji dilakukan dengan menggunakan statistik *Ljung-Box*.

Hipotesis

H_0 : $\rho_{at,at+k} = 0$ (ada korelasi antar lag)

H_1 : minimal ada 1 lag yang $\rho_{at,at+k} \neq 0$

Tabel 4.9 Ringkasan hasil uji Ljung Box Pearce ARIMA (2,1,2)

| Lag (K) | Df(K-m) | Ljung-Box(Q*) | $\chi^2; df$ | p-value |
|---------|-----------|---------------|--------------|---------|
| 12 | 12-4 = 8 | 13,7 | 15,5073 | 0,057 |
| 24 | 24-4 = 20 | 21,8 | 31,4104 | 0,294 |
| 36 | 36-4 = 32 | 32,1 | 46,1942 | 0,413 |
| 48 | 48-4 = 44 | 41,8 | 60,4809 | 0,522 |

Ringkasan hasil pada table bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada korelasi antar residual pada lag t dengan residual pada , karena nilai $\chi^2_{Ljung-Box}$ pada lag 12 (13,7) $< \chi^2_{(0,05,8)}(15,5073)$. Pada lag 24, $\chi^2_{Ljung-Box}(21,8) < \chi^2_{(0,05,20)}(31,4)$. Pada lag 36, $\chi^2_{Ljung-Box}(32,1) < \chi^2_{(0,05,32)}(46,1)$. Selanjutnya pada lag 48 $\chi^2_{Ljung-Box}(41,8) < \chi^2_{(0,05,44)}(60,4)$. Maka antar residual pada lag 12 sampai lag 48 tidak saling berkorelasi maka berdasarkan hipotesis awal maka H_0 ditolak. Jadi diperoleh kesimpulan residual tidak memenuhi asumsi independensi.\

d. Model ARIMA (1,1,2)

Untuk melakukan estimasi parameter model ARIMA(1,1,2) digunakan Software Minitab 16, dengan menggunakan analisis time series metode ARIMA, adapun estimasi parameter dengan menggunakan ARIMA yaitu :

Final Estimates of Parameters

| Type | | Coef | SE Coef | T | P |
|----------|---|---------|---------|-------|-------|
| AR | 1 | -0.1910 | 0.2723 | -0.70 | 0.486 |
| MA | 1 | 0.9639 | 0.2274 | 4.24 | 0.000 |
| MA | 2 | 0.0222 | 0.2771 | 0.08 | 0.936 |
| Constant | | -0.2693 | 0.3543 | -0.76 | 0.450 |

Differencing: 1 regular difference

Number of observations: Original series 65, after differencing 64

Residuals: SS = 121243 (backforecasts excluded)

MS = 2021 DF = 60

1). Uji statistik parameter model

Uji statistik parameter model digunakan untuk melihat signifikansi parameter model dari data runtun waktu perubahan nilai kurs Rupiah yaitu model ARIMA (1,1,2) :

Hipotesis:

$H_0 : \theta = 0$ (parameter ARIMA tidak cukup signifikan dalam model)

$H_0 : \theta \neq 0$ (parameter ARIMA cukup signifikan dalam model)

Kriteria penolakan H_0 yaitu jika $P\text{-Value} < \alpha$, dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, maka berdasarkan estimasi parameter hasil pengolahan data yang ditunjukkan nilai $P\text{-Value}$ pada ARIMA (1,1,2) untuk parameter θ_1 yaitu $0,486 > 0,05$, parameter θ_2 yaitu

$0,000 < 0,05$, parameter θ_3 yaitu $0,936 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa parameter θ_1 dan θ_3 tidak signifikan dan parameter θ_2 signifikan dalam model.

Table taksiran parameter model menunjukkan besarnya *Mean Square Error* (MSE) model sebesar 2021 dan derajat kebebasan (df) model sebesar 60. Dengan melihat nilai MSE dapat diketahui model mana yang terbaik, karena semakin kecil nilai MSE maka model semakin baik.

3) Diagnosis model

Untuk mendeteksi adanya proses white noise, maka perlu dilakukan beberapa uji. Uji pertama adalah uji korelasi yang berguna untuk mendeteksi independensi residual dan uji kedua adalah uji kenormalan residual model. Berikut adalah olahan data model ARIMA (1,1,2) yaitu :

| | Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|
| Lag | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Chi-Square | 17.1 | 26.8 | 35.5 | 46.2 |
| DF | 8 | 20 | 32 | 44 |
| P-Value | 0.029 | 0.142 | 0.305 | 0.382 |

Uji independensi residual untuk mendeteksi independensi *residual* antar lag. Dua lag dikatakan tidak berkorelasi apabila antar lag tidak ada korelasi yang berarti. Dalam penelitian ini, uji dilakukan dengan menggunakan statistik *Ljung-Box*.

Hipotesis

$$H_0 : \rho_{at,at+k} = 0 \text{ (ada korelasi antar lag)}$$

$$H_1 : \text{minimal ada 1 lag yang } \rho_{at,at+k} \neq 0$$

Tabel 4.10 Ringkasan hasil uji Ljung Box Pearce ARIMA (1,1,2)

| <i>Lag (K)</i> | <i>Df(K-m)</i> | <i>Ljung-Box(Q*)</i> | $\chi_a^2; df$ | <i>p-value</i> |
|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 12 | 12-3 = 9 | 17,1 | 16,9190 | 0,029 |
| 24 | 24-3 = 21 | 26,8 | 32,6706 | 0,142 |
| 36 | 36-3 = 33 | 35,5 | 47,3999 | 0,305 |
| 48 | 48-3 = 45 | 46,2 | 61,6562 | 0,382 |

Ringkasan hasil pada table menunjukkan bahwa bisa diambil kesimpulan bahwa ada korelasi antar residual pada lag t dengan residual pada lag 12, karena nilai $\chi_{Ljung-Box}^2$ pada lag 12 (17,1) $> \chi_{(0,05,9)}^2(16,9190)$. Pada lag 24, $\chi_{Ljung-Box}^2(26,8) < \chi_{(0,05,22)}^2(32,6)$. Pada lag 36, $\chi_{Ljung-Box}^2(35,5) < \chi_{(0,05,33)}^2(47,3)$. Pada lag 48 $\chi_{Ljung-Box}^2(46,2) < \chi_{(0,05,45)}^2(61,6)$. Maka antar residual pada lag t dengan residual sampai pada lag 12 saling berkorelasi, lag 24, 36 dan 48 tidak saling berkorelasi, maka berdasarkan hipotesis awal maka H_0 diterima. Jadi diperoleh kesimpulan residual model tidak memenuhi asumsi independensi.

e. Model ARIMA (2,1,1)

Untuk melakukan estimasi parameter model ARIMA(2,1,1) digunakan Software Minitab 16, dengan menggunakan analisis time series metode ARIMA, adapun estimasi parameter dengan menggunakan ARIMA yaitu :

Final Estimates of Parameters

| Type | | Coef | SE Coef | T | P |
|----------|---|---------|---------|-------|-------|
| AR | 1 | -1.5429 | 1.0210 | -1.51 | 0.136 |
| AR | 2 | -0.5604 | 0.6951 | -0.81 | 0.423 |
| MA | 1 | -0.9228 | 0.9856 | -0.94 | 0.353 |
| Constant | | -2.07 | 12.31 | -0.17 | 0.867 |

Differencing: 1 regular difference

Number of observations: Original series 65, after differencing 64

Residuals: SS = 157350 (backforecasts excluded)

MS = 2622 DF = 60

1). Uji statistik parameter model

Uji statistik parameter model digunakan untuk melihat signifikansi parameter model dari data runtun waktu perubahan nilai kurs Rupiah yaitu model ARIMA (1,1,2) :

Hipotesis:

$H_0 : \theta = 0$ (parameter ARIMA tidak cukup signifikan dalam model)

$H_0 : \theta \neq 0$ (parameter ARIMA cukup signifikan dalam model)

Kriteria penolakan H_0 yaitu jika $P\text{-Value} < \alpha$, dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, maka berdasarkan estimasi parameter hasil pengolahan data yang ditunjukkan nilai $P\text{-Value}$ ARIMA (2,1,1) dengan parameter θ_1 yaitu $0,136 > 0,05$, parameter θ_2 yaitu $0,423 > 0,05$ dan parameter θ_3 yaitu $0,353 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua parameter dalam model ARIMA (2,1,1) tidak signifikan dalam model.

Table taksiran parameter model menunjukkan besarnya *Mean Square Error* (MSE) model sebesar 2622 dan derajat kebebasan (df) model sebesar 60. Dengan

melihat nilai MSE dapat diketahui model mana yang terbaik, karena semakin kecil nilai MSE maka model semakin baik.

4) Diagnosis model

Untuk mendeteksi adanya proses white noise, maka perlu dilakukan beberapa uji. Uji pertama adalah uji korelasi yang berguna untuk mendeteksi independensi residual dan uji kedua adalah uji kenormalan residual model. Berikut adalah olahan data model ARIMA (2,1,1) yaitu :

| | Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic | | | |
|------------|--|-------|-------|-------|
| Lag | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Chi-Square | 15.6 | 23.1 | 37.2 | 47.6 |
| DF | 8 | 20 | 32 | 44 |
| P-Value | 0.049 | 0.285 | 0.243 | 0.327 |

Uji independensi residual untuk mendeteksi independensi *residual* antar lag. Dua lag dikatakan tidak berkorelasi apabila antar lag tidak ada korelasi yang berarti. Dalam penelitian ini, uji dilakukan dengan menggunakan statistik *Ljung-Box*.

Hipotesis

H_0 : $\rho_{at,at+k} = 0$ (ada korelasi antar lag)

H_1 : minimal ada 1 lag yang $\rho_{at,at+k} \neq 0$

Tabel 4.11 Ringkasan hasil uji Ljung Box Pearce ARIMA (2,1,1)

| Lag (K) | Df(K-m) | Ljung-Box(Q^*) | $X_a^2; df$ | p-value |
|---------|-----------|--------------------|-------------|---------|
| 12 | 12-3 = 9 | 17,1 | 16,9190 | 0,029 |
| 24 | 24-3 = 21 | 26,8 | 32,6706 | 0,142 |
| 36 | 36-3 = 33 | 35,5 | 47,3999 | 0,305 |
| 48 | 48-3 = 45 | 46,2 | 61,6562 | 0,382 |

Ringkasan hasil pada tabel menunjukkan bahwa sampai pada lag 12, bisa diambil kesimpulan bahwa ada korelasi antar residual pada lag t dengan residual pada lag 12, karena nilai $\chi^2_{Ljung-Box}$ pada lag 12 (17,1) $> \chi^2_{(0,05,9)}$ (16,9190). Pada lag 24, $\chi^2_{(Ljung-Box)}$ (26,8) $< \chi^2_{(0,05,21)}$ (32,6). Selanjutnya pada lag 36, $\chi^2_{(Ljung-Box)}$ (35,5) $< \chi^2_{(0,05,33)}$ (47,3). Pada lag 48 $\chi^2_{(Ljung-Box)}$ (46,2) $< \chi^2_{(0,05,45)}$ (61,6). Maka antar residual pada lag t dengan residual sampai pada lag 12 saling berkorelasi, lag 24, 36 dan 48 tidak saling berkorelasi, maka berdasarkan hipotesis awal maka H_0 diterima. Jadi diperoleh kesimpulan residual model tidak memenuhi asumsi independensi.

3. Pemilihan model ARIMA preintervensi

Setelah dilakukan pengujian dengan syarat-syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dugaan model ARIMA yang sesuai (memenuhi syarat) untuk peramalan adalah ARIMA (1,1,0) dengan nilai MSE yaitu 2549. Dalam hal ini, tidak dilakukan pemilihan nilai MSE terkecil karena hanya model ARIMA (1,1,0) yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemodelan. Oleh karena itu, model ARIMA terbaik yang akan digunakan untuk meramalkan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika adalah model ARIMA (1,1,0) dengan persamaan

$$Z_t = (1 + \phi_1)Z_{t-1} + \phi_1 Z_{t-2} + a_t$$

Berikut adalah peramalan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika untuk data preintervensi dalam 30 hari ke depan :

Tabel 4.12 Peramalan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dalam 30 hari

ke depan data preintervensi dengan program *Minitab*

| Periode | Peramalan |
|---------|-----------|
| 67 | 14654.2 |
| 68 | 14668.9 |
| 69 | 14686.7 |
| 70 | 14703.9 |
| 71 | 14721.3 |
| 72 | 14738.6 |
| 73 | 14755.9 |
| 74 | 14773.2 |
| 75 | 14790.5 |
| 76 | 14807.9 |
| 77 | 14825.2 |
| 78 | 14842.5 |
| 79 | 14859.8 |
| 80 | 14877.1 |
| 81 | 14894.5 |
| 82 | 14911.8 |
| 83 | 14929.1 |
| 84 | 14946.4 |
| 85 | 14963.7 |
| 86 | 14981 |
| 87 | 14998.4 |
| 88 | 15015.7 |
| 89 | 15033 |
| 90 | 15050.3 |
| 91 | 15067.6 |
| 92 | 15085 |
| 93 | 15102.3 |
| 94 | 15119.6 |
| 95 | 15136.9 |
| 96 | 15154.2 |

Tabel 4.13 Peramalan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dalam 30 hari kedepan


data preintervensi dengan program SAS

| | |
|----|------------|
| 67 | 14654.2004 |
| 68 | 14668.9449 |
| 69 | 14686.6827 |
| 70 | 14703.9325 |
| 71 | 14721.2619 |
| 72 | 14738.5783 |
| 73 | 14755.8968 |
| 74 | 14773.215 |
| 75 | 14790.5332 |
| 76 | 14807.8514 |
| 77 | 14825.1697 |
| 78 | 14842.4897 |
| 79 | 14859.8061 |
| 80 | 14877.1243 |
| 81 | 14894.4426 |
| 82 | 14911.7608 |
| 83 | 14929.079 |
| 84 | 14946.3972 |
| 85 | 14963.7154 |
| 86 | 14981.0337 |
| 87 | 14998.3519 |
| 88 | 15015.6701 |
| 89 | 15032.9883 |
| 90 | 15050.3066 |
| 91 | 15067.6248 |
| 92 | 15084.943 |
| 93 | 15102.2612 |
| 94 | 15119.5794 |
| 95 | 15136.8977 |
| 96 | 15154.2159 |

II. Identifikasi Model Intervensi

1. Identifikasi respon intervensi

Identifikasi respon intervensi dilakukan dengan mengamati pola respon saat intervensi dan setelah terjadinya intervensi dengan diagram residual respon intervensi. Diagram residual respon intervensi ini diperoleh dari selisih nilai aktual dengan nilai peramalan dengan batas 3 RMSE ARIMA preintervensi. Pengamatan dilakukan pada gambar 4.1, dari gambar tersebut dapat dilihat pada saat terjadinya intervensi yaitu pada series ke-67 terdapat penurunan nilai kurs Rupiah yang mengindikasikan bahwa pola respon yang terjadi adalah *abrupt* (kasar) dan *permanent* (tetap ada) setelah terjadinya intervensi. Fungsi intervensi sesuai pola respon tersebut adalah $f(\beta, I_t) = \omega_0 BS_t^{(T)}$.



Gambar 4.8 diagram residual respon intervensi

Gambar diagram residual intervensi pada gambar 4.8 menunjukkan bahwa dampak intervensi mulai dirasakan sehari setelah terjadinya intervensi yang ditandai

dengan semua lag yang keluar dari batas signifikansi. Berdasarkan cirri-ciri yang digambarkan oleh diagram residual tersebut maka bisa dilakukan identifikasi nilai b,s,r. Nilai dugaan untuk masing-masing b,s,r yaitu b=1,s=1,r=0, dan b=1,s=0,r=0.

2. Estimasi parameter intervensi

Estimasi parameter intervensi dilakukan dengan metode *least square*, dengan *software SAS* maka diperoleh nilai parameter untuk intervensi (dapat dilihat pada lampiran 7). Berikut adalah tabel output program *SAS* untuk estimasi parameter intervensi yaitu:

Tabel 4.14 output program SAS intervensi

| Conditional Least Square Estimation | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------|-------------|-----|----------|-------|
| Parameter | Estimate | Standar Error | t Value | Approx Pr>t | Lag | Variabel | Shift |
| AR 1,1 | 0,32360 | 0,08173 | 3,96 | 0,0001 | 1 | y1 | 0 |
| NUM1 | -219,26755 | 5,814,704 | -377 | 0,0002 | 0 | S | 1 |

Berdasarkan output pada tabel 4.14 diperoleh parameter untuk $\theta_1 = 0,32360$, $\omega_0 = -219,26755$ dengan semua *p-value* $< 0,05$ sehingga parameter signifikan dan dapat digunakan dalam model intervensi. Oleh karena itu model intervensi dapat dibangun dengan menambahkan antara model intervensi dan model preintervensi ARIMA (1,1,0) yaitu :

$$\text{Model intervensi: } f(X_t) = \frac{\omega_s(B)B^b}{\delta_r(B)} I_t^{(T)} S_t^T$$

$$= \frac{\omega_1 B}{\delta_0} BS_t^{(67)} \text{ (intervensi terjadi pada series ke-67)}$$

$$= \omega_0 BS_t^{(67)} \text{ (abrupt permanent)}$$

Model printervensi ARIMA(1,1,0): $(1 - \phi_1 B)(1 - B)Z_t = (1 - \theta_1)a_t$

$$(1 - \phi_1 B)(1 - B)Z_t = a_t$$

$$Z_t = \frac{1}{(1 - B)(1 - \phi_1)} a_t$$

Sehingga, model intervensi yang diperoleh yaitu :

$$Z_t = f(X_t) + N_t$$

$$Z_t = \frac{\omega_1 B}{\delta_0} BS_t^{(67)} + \frac{1}{(1 - B)(1 - \phi_1 B)} a_t$$

$$Z_t = \omega_0 BS_t^{(67)} + \frac{1}{(1 - B)(1 - \phi_1 B)} a_t$$

$$Z_t = \frac{(1 - \phi_1 B)(1 - B)(\omega_0 BS_t^{(67)}) + a_t}{(1 - \phi_1 B)(1 - B)}$$

$$Z_t = \frac{(1 - B - \phi_1 B + \phi_1 B^2)(\omega_0 BS_t^{(67)}) + a_t}{(1 - \phi_1 B)(1 - B)}$$

$$Z_t = \frac{(\omega_0 BS_t^{(67)} - \omega_0 B^2 S_t^{(67)} - \omega_0 \phi_1 B^2 S_t^{(67)} + \omega_0 \phi_1 B^3 S_t^{(67)}) + a_t}{(1 - \phi_1 B)(1 - B)}$$

$$Z_t = \frac{(\omega_0 S_{t-1}^{(67)} - \omega_0 S_{t-2}^{(67)} - \omega_0 \phi_1 S_{t-2}^{(67)} + \omega_0 \phi_1 S_{t-3}^{(67)}) + a_t}{(1 - \phi_1 B)(1 - B)}$$

3. Pemeriksaan Diagnosis

Seperti pada model ARIMA pemeriksaan diagnosis model intervensi dilakukan uji independensi residual dan uji normalitas residual.

a. Uji independensi residual

Hipotesis H_0 : $\rho_{at,at+k} = 0$ (ada korelasi antar lag)

H_1 : minimal ada 1 lag yang $\rho_{at,at+k} \neq 0$

Taraf signifikansi : $\alpha = 0,05$

Statistik uji : $Q^* = n(n + 2) \sum_{k=1}^K \frac{\hat{\rho}_k^2}{(n-k)}$

$$\text{Dimana } \hat{\rho}_k^2 = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (\hat{a}_t - \bar{a})(\hat{a}_{t+k} - \bar{a})}{\sum_{t=1}^n (\hat{a}_t - \bar{a})^2}$$

Daerah Penolakan : tolak H_0 jika $Q^* > \chi_{\alpha; df=K-m}^2$. K berarti pada lag K dan m adalah jumlah parameter yang ditaksir dalam model atau dengan menggunakan nilai-p (*p-value*), yakni tolak H_0 jika nilai-p $< \alpha$.

Tabel 4.15 hasil pengujian independensi residual dengan program SAS

| Lag (K) | Df | Ljung-Box(Q^*) | $\chi_{\alpha}^2; df$ | p-value |
|---------|----|--------------------|-----------------------|---------|
| 6 | 5 | 5,29 | 18,3070 | 0,38 |
| 12 | 11 | 9,43 | 33,9245 | 0,58 |
| 18 | 17 | 13,43 | 48,6024 | 0,70 |
| 24 | 23 | 19,07 | 62,8296 | 0,69 |

Berdasarkan hasil pengujian independensi residual pada tabel 4.14 diperoleh nilai Q_{hitung} pada lag 6,12,18,24 tidak satupun yang melebihi nilai dalam tabel chi-


kuadrat(t_{α}^2). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan H_0 diterima jadi $\{e_t\}$ merupakan barisan yang independent.

b. Uji normalitas residual

Menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov, hasil perhitungan ditampilkan oleh tabel 4.16 dari output :

| Test for Normality | | | | |
|--------------------|-----------|----------|---------|--------|
| TEST | Statistic | | p Value | |
| Shapiro-Wilk | W | 0,964749 | Pr<W | 0,0487 |
| Kolmogorov Smirnov | D | 0,099429 | Pr<D | 0,0894 |
| Cramer-von Mises | W-Sq | 0,077479 | Pr<w-Sq | 0,2262 |
| Anderson Darling | A-Sq | 0,569105 | Pr<A-Sq | 0,1396 |

Berdasarkan gambar 4.16 dapat diketahui bahwa $p\text{-value} = 0,0894$, karena nilai $p\text{-value} > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Selain dengan uji Kolmogorov Smirnov kenormalan juga dapat dilihat dengan plot probability residual.



Gambar 4.9 Probability Plot

Berdasarkan diagnosis yang diperoleh sebelumnya yaitu model dengan uji independensi residual dan uji normalitas residual maka model intervensi nya yaitu

$$Z_t = \frac{(\omega_0 S_{t-1}^{(67)} - \omega_0 S_{t-2}^{(67)} - \omega_0 \theta_1 S_{t-2}^{(67)} + \omega_0 \theta_1 S_{t-3}^{(67)}) + a_t}{(1-\theta B)(1-B)}$$

memenuhi asumsi *white noise* sehingga layak untuk dijadikan model intervensi dan digunakan untuk peramalan.

III. Peramalan dengan model intervensi

Peramalan intervensi dilakukan dengan bantuan software SAS dengan memperkirakan nilai kurs Rupiah terhadap dollar Amerika pada 30 hari ke depan di Indonesia. Adapun tabel hasil peramalannya yaitu :

Tabel 4.17 peramalan kurs Rupiah untuk 30 hari kedepan data intervensi dengan program SAS

| Periode | Peramalan |
|---------|------------|
| 1 | 13806.7642 |
| 2 | 13809.1903 |
| 3 | 13809.9754 |
| 4 | 13810.2294 |
| 5 | 13810.3116 |
| 6 | 13810.3382 |
| 7 | 13810.3469 |
| 8 | 13810.3496 |
| 9 | 13810.3505 |
| 10 | 13810.3508 |
| 11 | 13810.3509 |
| 12 | 13810.351 |
| 13 | 13810.351 |
| 14 | 13810.351 |
| 15 | 13810.351 |
| 16 | 13810.351 |
| 17 | 13810.351 |
| 18 | 13810.351 |
| 19 | 13810.351 |
| 20 | 13810.351 |
| 21 | 13810.351 |
| 22 | 13810.351 |
| 23 | 13810.351 |
| 24 | 13810.351 |
| 25 | 13810.351 |

| | |
|----|-----------|
| 26 | 13810.351 |
| 27 | 13810.351 |
| 28 | 13810.351 |
| 29 | 13810.351 |
| 30 | 13810.351 |

B. Pembahasan

Pada peramalan ini, data yang digunakan adalah data perubahan nilai kurs rupiah terhadap Dollar Amerika dalam 153 hari dari bulan agustus 2015 hingga desember 2016, dimana peramalan tersebut menggunakan metode intervensi fungsi *step* dengan data dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu data preintervensi (sebelum intervensi) dan data setelah intervensi. Data preintervensi tersebut dapat dilihat pada plot time series pada gambar 4.1. Dari plot tersebut, terlihat bahwa data mengalami penurunan secara drastis terus menerus dimulai pada series ke 67, oleh karena itu data preintervensi dimulai dari data 1 – 66 dan data intervensi data ke-67 sampai akhir. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah modelkan data preintervensi tersebut dengan model ARIMA. Berdasarkan plot ACF dan PACF data preintervensi belum stasioner dalam mean dan varian, ini dapat dilihat pada Data yang tidak stasioner dalam varian dapat dilakukan transformasi Box-Cox hingga nilai $(\lambda) = 1$. Gambar transformasi Box-Cox yang telah stasioner dalam varian dapat dilihat pada gambar 4.3. Sedangkan untuk data yang belum stasioner dalam mean dapat dilihat dengan nilai ACF dari setiap lag yang mengalami penurunan secara lambat dan berada di sekitar 1, sedangkan untuk nilai PACF nya semakin kecil.

Untuk mengatasi data yang belum stasioner tersebut dilakukan *differencing* orde 1. Hasil *differencing* tersebut dapat dilihat pada gambar (4.6 (a dan b)). Nilai lag ACF dan PACF setelah di *differencing* tingkat 1 cenderung menuju ke titik 0, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa data telah stasioner dalam mean. Setelah data telah stasioner dalam mean dan varian maka kembali dilakukan identifikasi plot ACF dan PACF untuk memperoleh model time series yang sesuai. Berdasarkan plot ACF dan PACF yang diperoleh, pada plot ACF dan PACF *dies down* pada lag 1 dan 2. Oleh karena itu diperkirakan untuk model ARIMA dengan *differencing* tingkat 1 yang mungkin untuk model tersebut adalah ARIMA (1,1,0), ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,2), ARIMA(2,1,1), ARIMA(2,1,2).

Model ARIMA yang diperoleh masing-masing dilakukan selanjutnya dilakukan beberapa uji yang meliputi uji signifikansi parameter dan uji kesesuaian model untuk memilih model yang akan digunakan dalam peramalan. Model yang pertama adalah model ARIMA(1,1,0). Pengujian kesignifikansian parameter pada model ARIMA(0,1,1) dilihat berdasarkan tabel hasil taksiran parameter dengan menggunakan program minitab 14. Tabel hasil taksiran parameter dengan level toleransi () yang digunakan adalah 5%. Kesignifikansian parameter dilihat berdasarkan nilai $p\text{-value} < 0,05$. Sedangkan pada model tersebut nilai $p\text{-value}$ menunjukkan 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter signifikan karena $p\text{-value} < .$ Tabel hasil taksiran parameter model menunjukkan besarnya MSE (Mean Square Error) sebesar 2549 dengan derajat kebebasan (df) = 62. Selanjutnya

dilakukan *diagnostic checking* (pemeriksaan diagnosis) untuk mendeteksi adanya proses *white noise*. Uji ini dilakukan dengan melihat tabel Ljung-Box pada setiap lag.

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

| | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Lag | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Chi-Square | 15.7 | 23.6 | 36.3 | 46.5 |
| DF | 10 | 22 | 34 | 46 |
| P-Value | 0.110 | 0.370 | 0.363 | 0.453 |

Tabel tersebut menunjukkan nilai statistik Ljung-Box pada lag 12, 24, 36, dan 48. Nilai statistik pada lag 12 menunjukkan nilai statistic antara lag t dengan lag 12, begitupun untuk lag yang selanjutnya. Ringkasan hasil pada tabel menunjukkan bahwa sampai pada lag 48 tidak ada korelasi antar residual pada lag t dengan residual pada lag 12, karena nilai $\chi^2_{Ljung-Box}$ pada lag 12 (15,7) $< \chi^2_{(0,05,11)}(19,675)$. Pada lag 24, $\chi^2_{(Ljung-Box)}(23,6) < \chi^2_{(0,05,23)}(35,17)$. Pada lag 36, $\chi^2_{(Ljung-Box)}(36,3) < \chi^2_{(0,05,35)}(49,8)$. Pada lag 48 $\chi^2_{(Ljung-Box)}(46,5) < \chi^2_{(0,05,47)}(64,0)$. Maka antar residual pada lag t dengan residual sampai pada lag 48 tidak saling berkorelasi oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa residual model telah memenuhi syarat *white noise*.

Selain itu, mendeteksi adanya *white noise* dapat dilihat dengan menggunakan nilai *p-value* tabel Ljung-Box tanpa harus melihat nilai χ^2 . Semua lag dikatakan memenuhi asumsi *white noise* jika *p-value* $> 0,05$ yakni pada lag 12 ($0,110 > 0,05$), lag 24 ($0,370 > 0,05$), lag 36 ($0,363 > 0,05$) dan lag 48 ($0,453 > 0,05$). Ini berarti bahwa model tersebut telah memenuhi asumsi *white noise*. Uji selanjutnya adalah uji distribusi normal dengan menggunakan nilai residual pada model ARIMA.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada *probability plot* pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa sisa memenuhi asumsi distribusi normal dengan melihat nilai *p-value* > 0,05 (0,15>0,05).

Untuk memperoleh nilai estimasi parameter model ARIMA untuk ARIMA (0,1,1), ARIMA(1,1,1), ARIMA(2,1,1), ARIMA(1,1,2), ARIMA(2,1,2) dapat menggunakan metode seperti yang digunakan pada model ARIMA(1,1,0) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk pemilihan model terbaik dilakukan dengan pemilihan model MSE terkecil pada beberapa model ARIMA yang telah memenuhi asumsi *white noise* dan distribusi normal. Setelah menguji beberapa model ARIMA di atas, ternyata yang memenuhi criteria untuk dijadikan peramalan hanya ARIMA (1,1,0). Oleh karena itu peramalan nilai kurs Rupiah preintervensi dalam 30 hari kedepan menggunakan model ARIMA(1,1,0).

Setelah melakukan peramalan dengan ARIMA preintervensi, maka langkah selanjutnya adalah mencari orde intervensi (b,s,r) melalui digram residual respon intervensi (diagram tersebut dapat dilihat pada gambar 4.8). Diagram tersebut diperoleh dari selisih antara nilai aktual dan nilai peramalan dengan batas signifikansi 3 RMSE (Root Mean Square Error) model ARIMA preintervensi. Untuk pola respon intervensi dilakukan pengamatan pada plot keseluruhan pada gambar 4.1, dimana plot menyatakan bahwa penurunan nilai kurs Rupiah mengikuti pola *abrupt permanent* dengan fungsi $f(\beta, I_t) = \omega_0 BS_t^{(T)}$. Adapun orde intervensi dari diagram residual yaitu b=1 karena nilai residual keluar dari batas signifikansi dimulai dari

series 1, sedangkan untuk nilai s digunakan $s = 0$ karena semua respon keluar dari batas signifikansi dan $r = 0$ karena data telah membentuk pola yang jelas setelah s. setelah orde intervensi didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan program SAS (*Statistical Analysis System*). Output dari program SAS tersebut dapat dilihat pada gambar 4.9.

Parameter yang diperoleh kemudian dilakukan uji signifikansi parameter dan uji kesesuaian model seperti yang dilakukan pada model ARIMA preintervensi sebelumnya. Output dari program SAS diperoleh $\theta_1 = 0,32360$, $\omega_0 = -219,26755$. uji signifikansi parameter dilakukan dengan melihat *p-value* ($0,0001 < 0,05$) oleh karena itu parameter dikatakan signifikan. Selanjutnya untuk uji asumsi *white noise* dilakukan dengan melihat ringkasan hasil pada tabel Ljung-Box (Q*) pada tabel 4.10. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sampai pada lag 24 tidak ada korelasi antar residual pada lag t. Karena nilai $\chi^2_{Ljung-Box}$ pada lag 6 (5,29) $< \chi^2_{(0,05,11)}(18,3070)$, sedangkan untuk lag 12 $\chi^2_{(Ljung-Box)}(9,43) < \chi^2_{(0,05,23)}(33,9245)$, sedangkan untuk lag 18, $\chi^2_{(Ljung-Box)}(13,43) < \chi^2_{(0,05,35)}(48,6024)$, selanjutnya pada lag 24 $\chi^2_{(Ljung-Box)}(19,07) < \chi^2_{(0,05,47)}(62,8296)$. Karena residual pada lag t dengan residual sampai pada lag 24 tidak saling berkorelasi maka bisa ditarik kesimpulan bahwa residual model telah memenuhi syarat *white noise*. Selanjutnya untuk uji kenormalan dengan distribusi normal, dilihat nilai *p-value* dari grafik residual dengan menggunakan QQ plot yaitu 0,15. Sehingga model tersebut disimpulkan telah memenuhi asumsi distribusi normal dan dapat digunakan dalam peramalan. Nilai

hasil peramalan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika sesuai dengan tabel 4.16 untuk hari pertama yaitu Rp. 13806,742, sedangkan untuk hari kedua Rp.13809,1903, hari ketiga Rp. 13809,975 dan seterusnya. Dari peramalan ini dapat disimpulkan bahwa nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dalam 30 hari kedepan yaitu konstan berada pada kisaran Rp.13810,3510 .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis intervensi fungsi *step* untuk peramalan nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model intervensi fungsi *step* terbaik yang diperoleh melalui penggabungan antara model ARIMA preintervensi dan model intervensi. Dimana model preintervensi yang diperoleh yaitu ARIMA(1,1,0) dengan persamaan $Z_t = [(1 + (-0,6628)Z_{t-1} + (0,6628)Z_{t-2} + \alpha_t]$ sedangkan model intervensi dengan persamaan $\frac{\omega_1 B}{\delta_0} BS_t^{(67)}$ setelah digabungkan akan diperoleh model yaitu:

$$Z_t = \frac{(\omega_0 S_{t-1}^{(67)} - \omega_0 S_{t-2}^{(67)} - \omega_0 \emptyset S_{t-2}^{(67)} + \omega_0 \emptyset S_{t-3}^{(67)}) + e_t}{1}$$

2. Berdasarkan hasil peramalan dengan menggunakan *Software SAS* diperoleh nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika untuk 30 hari ke depan berada pada nilai konstan Rp.13.810,351. Berikut adalah tabel peramalan nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika:

| Periode | Peramalan |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

| | |
|----|------------|
| 1 | 13806.7642 |
| 2 | 13809.1903 |
| 3 | 13809.9754 |
| 4 | 13810.2294 |
| 5 | 13810.3116 |
| 6 | 13810.3382 |
| 7 | 13810.3469 |
| 8 | 13810.3496 |
| 9 | 13810.3505 |
| 10 | 13810.3508 |
| 11 | 13810.3509 |
| 12 | 13810.351 |
| 13 | 13810.351 |
| 14 | 13810.351 |
| 15 | 13810.351 |
| 16 | 13810.351 |
| 17 | 13810.351 |
| 18 | 13810.351 |
| 19 | 13810.351 |
| 20 | 13810.351 |
| 21 | 13810.351 |
| 22 | 13810.351 |
| 23 | 13810.351 |
| 24 | 13810.351 |
| 25 | 13810.351 |
| 26 | 13810.351 |
| 27 | 13810.351 |
| 28 | 13810.351 |
| 29 | 13810.351 |
| 30 | 13810.351 |

B. Saran

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini hanya menggunakan model fungsi *step* pada peramalan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika, oleh karena itu penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode intervensi sebaiknya menggunakan model intervensi fungsi *pulse* agar dapat membedakan lebih jelas bagaimana penggunaan intervensi *step* dan *pulse* dalam menganalisis pengaruh-pengaruh intervensi yang terjadi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Adwin. "Inflasi di Indonesia (Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya)". Vol 01, no.1(Mei 1999): h.55
- Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*, ed. Muhammad Arif Tiro. Makassar: Andira Publisher, 2006
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005
- Halim, Siana. *Diktat: Time Series Analysis*. Surabaya, 2006
- Kasmiantini dan Dhoriva Urwatul Wutsqa, "Dampak Penurunan Harga BBM Jenis Premium Terhadap Angka Inflasi di Kota Yogyakarta". Vol 03, no.3(2014): h.5-7
- Meliala, Melly Sari Br, "Sistem Aplikasi *Forecasting* Penjualan Elektronik pada Toko Nasiaoanal Elektronik Kabanjahe dengan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)". *Pelita Informatika Budi Darma*4, no. 1 (2014): h. 168-258
- Mendenhal, William dan James E. Reinmuth, *Statistik untuk Manajemen dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1982
- Reta Ekayanti, dkk. "Analisis Model Intervensi Fungsi Step untuk Peramalan Kebaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Terhadap Besarnya Pemakaian Listrik". Vol 03, no.3(2014): h.176-177
- Rosadi, Dedi. *Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan Dengan R: Aplikasi Untuk Bidang Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan*. Yogyakarta: 2006
- Rosadi, Dedi. *Diktat: Pengantar Analisis Runtun Waktu*. Yogyakarta: Andi, 2011
- Samsiah, Dewi. "Analisis Data Runtun Waktu Menggunakan Model ARIMA (p,d,q)". *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*: h. 1-80

Soejoeti,Zanzawi, Ph.D, *Buku Materi Pokok Analisis Runtun Waktu : Modul 1-9*, STAT4532.(Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka, 1987), h. 2.4

Syofian Siregar,M.M, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*.(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2010),h. 1

Triyono, “Analisis perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika”.*Jurnal ekonomi pembangunan*, vol.9,no.2(Desember 2008), h.156

Wibowo, Yudi, dkk., ”Analisi Data Runtun Waktu Menggunakan Metode Wafalet Theresholding”. *Gaussian1*, no. 1 (2012): h. 249-258

William W.S. Wei, *Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods*. (New York : PEARSON, 2006),h.212

Yulita Milla Pakereng, “Pergerakan Nilai Mata Uang Rupiah Terhadap Dollar Amerika dan Dollar Australia Pasca Tragedi Ledakan Hotel JW Marriot dan Ritz Calton”. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, vol.XV,no.2(September 2009), h.151





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

Data Perubahan Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dimulai dari 1 Agustus 2015 – 31 Desember 2015.


| Tanggal | Nilai Kurs | Tanggal | Nilai Kurs | Tanggal | Nilai Kurs |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1-Aug-15 | 13509.2497 | 21-Sep-15 | 14451.0237 | 11-Nov-15 | 13592.1209 |
| 2-Aug-15 | 13524.37 | 22-Sep-15 | 14537.7096 | 12-Nov-15 | 13580.1209 |
| 3-Aug-15 | 13506.4376 | 23-Sep-15 | 14605.8643 | 13-Nov-15 | 13635.1147 |
| 4-Aug-15 | 13493.3061 | 24-Sep-15 | 14687.5029 | 14-Nov-15 | 13654.9453 |
| 5-Aug-15 | 13510.1156 | 25-Sep-15 | 14671.4613 | 15-Nov-15 | 13698.0368 |
| 6-Aug-15 | 13522.0352 | 26-Sep-15 | 14660.6789 | 16-Nov-15 | 13695.0084 |
| 7-Aug-15 | 13530.954 | 27-Sep-15 | 14659.4837 | 17-Nov-15 | 13747.9593 |
| 8-Aug-15 | 13534.0208 | 28-Sep-15 | 14643.2851 | 18-Nov-15 | 13793.4206 |
| 9-Aug-15 | 13529.4097 | 29-Sep-15 | 14672.5025 | 19-Nov-15 | 13773.2685 |
| 8-Oct-15 | 13529.1881 | 30-Sep-15 | 14671.8693 | 20-Nov-15 | 13689.7962 |
| 11-Aug-15 | 13620.527 | 1-Oct-15 | 14685.2154 | 21-Nov-15 | 13646.081 |
| 12-Aug-15 | 13743.145 | 2-Oct-15 | 14681.6422 | 22-Nov-15 | 13657.3395 |
| 13-Aug-15 | 13723.2088 | 3-Oct-15 | 14678.1097 | 23-Nov-15 | 13691.3867 |
| 14-Aug-15 | 13809.9978 | 4-Oct-15 | 14700.6054 | 24-Nov-15 | 13715.4129 |
| 15-Aug-15 | 13809.9978 | 5-Oct-15 | 14621.0959 | 25-Nov-15 | 13679.2689 |
| 16-Aug-15 | 13828.1956 | 6-Oct-15 | 14378.7454 | 26-Nov-15 | 13726.6734 |
| 17-Aug-15 | 13828.0459 | 7-Oct-15 | 14056.6942 | 27-Nov-15 | 13745.313 |
| 18-Aug-15 | 13838.5168 | 8-Oct-15 | 13948.1152 | 28-Nov-15 | 13773.4318 |
| 19-Aug-15 | 13805.5693 | 9-Oct-15 | 13599.344 | 29-Nov-15 | 13780.3917 |
| 20-Aug-15 | 13838.1692 | 10-Oct-15 | 13539.7809 | 30-Nov-15 | 13821.8322 |
| 21-Aug-15 | 13866.427 | 11-Oct-15 | 13441.053 | 1-Dec-15 | 13777.4827 |
| 22-Aug-15 | 13908.1494 | 12-Oct-15 | 13437.8594 | 2-Dec-15 | 13787.0494 |
| 23-Aug-15 | 13906.824 | 13-Oct-15 | 13557.9308 | 3-Dec-15 | 13770.036 |
| 24-Aug-15 | 13974.1106 | 14-Oct-15 | 13539.6406 | 4-Dec-15 | 13830.8143 |
| 25-Aug-15 | 13979.8243 | 15-Oct-15 | 13480.027 | 5-Dec-15 | 13833.9811 |
| 26-Aug-15 | 14140.9885 | 16-Oct-15 | 13508.3333 | 6-Dec-15 | 13826.5227 |
| 27-Aug-15 | 14046.3439 | 17-Oct-15 | 13508.45 | 7-Dec-15 | 13825.5294 |
| 28-Aug-15 | 14088.4492 | 18-Oct-15 | 13504.9387 | 8-Dec-15 | 13930.0389 |
| 29-Aug-15 | 14045.4106 | 19-Oct-15 | 13508.5808 | 9-Dec-15 | 13952.2431 |
| 30-Aug-15 | 14067.3004 | 20-Oct-15 | 13578.1482 | 10-Dec-15 | 13957.9762 |
| 31-Aug-15 | 14074.4417 | 21-Oct-15 | 13738.4038 | 11-Dec-15 | 13953.3591 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1-Sep-15 | 14069.7781 | 22-Oct-15 | 13696.4464 | 12-Dec-15 | 13875.1528 |
| 2-Sep-15 | 14126.8358 | 23-Oct-15 | 13610.8673 | 13-Dec-15 | 13945.6165 |
| 3-Sep-15 | 14192.2343 | 24-Oct-15 | 13601.6514 | 14-Dec-15 | 14042.6494 |
| 4-Sep-15 | 14170.1694 | 25-Oct-15 | 13619.173 | 15-Dec-15 | 14057.5278 |
| 5-Sep-15 | 14173.7358 | 26-Oct-15 | 13614.3658 | 16-Dec-15 | 14026.5755 |
| 6-Sep-15 | 14156.4521 | 27-Oct-15 | 13635.5306 | 17-Dec-15 | 13984.9776 |
| 7-Sep-15 | 14238.6153 | 28-Oct-15 | 13605.7389 | 18-Dec-15 | 13949.6576 |
| 8-Sep-15 | 14244.385 | 29-Oct-15 | 13604.824 | 19-Dec-15 | 13923.3573 |
| 9-Sep-15 | 14245.8565 | 30-Oct-15 | 13714.2482 | 20-Dec-15 | 13908.9608 |
| 10-Sep-15 | 14307.7685 | 31-Oct-15 | 13714.2482 | 21-Dec-15 | 13799.7306 |
| 11-Sep-15 | 14287.159 | 1-Nov-15 | 13731.8016 | 22-Dec-15 | 13693.3269 |
| 12-Sep-15 | 14290.6593 | 2-Nov-15 | 13695.708 | 23-Dec-15 | 13654.6406 |
| 13-Sep-15 | 14305.5018 | 3-Nov-15 | 13622.0637 | 24-Dec-15 | 13635.5274 |
| 14-Sep-15 | 14292.2757 | 4-Nov-15 | 13559.7636 | 25-Dec-15 | 13583.8208 |
| 15-Sep-15 | 14381.8274 | 5-Nov-15 | 13546.4115 | 26-Dec-15 | 13574.5833 |
| 16-Sep-15 | 14426.4856 | 6-Nov-15 | 13583.5404 | 27-Dec-15 | 13635.1934 |
| 17-Sep-15 | 14439.5891 | 7-Nov-15 | 13582.0436 | 28-Dec-15 | 13630.3344 |
| 18-Sep-15 | 14421.25 | 8-Nov-15 | 13691.7189 | 29-Dec-15 | 13675.8402 |
| 19-Sep-15 | 14390.5967 | 9-Nov-15 | 13731.2193 | 30-Dec-15 | 13776.0987 |
| 20-Sep-15 | 14411.1391 | 10-Nov-15 | 13633.6748 | 31-Dec-15 | 13799.267 |


Sumber : <http://www.currency-converter.org.uk/currency-rates/historical/table/USD-IDR.html>.


Lampiran 2 (program minitab)

Plot time series data nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika



Transformasi Box-Cox data preintervensi





(c) (b)

Gambar 4.4(a) Plot Box Cox sebelum differencing


(b) Plot Box Cox setelah differencing

Tabel 4.1 Autokorelasi data preintervensi perubahan kurs

| Lag | ACF | | ACF |
|-----|----------|----|----------|
| 1 | 0.961124 | 11 | 0.526461 |
| 2 | 0.919014 | 12 | 0.473655 |
| 3 | 0.872432 | 13 | 0.429564 |
| 4 | 0.825327 | 14 | 0.384333 |
| 5 | 0.778058 | 15 | 0.347198 |
| 6 | 0.73116 | 16 | 0.310555 |
| 7 | 0.682872 | 17 | 0.275741 |
| 8 | 0.634721 | 18 | 0.241013 |
| 9 | 0.581001 | | |

Tabel 4.2 Autokorelasi Parsial data preintervensi perubahan kurs

| Lag | PACF | | PACF |
|-----|-----------|----|-----------|
| 1 | 0.961124 | 11 | -0.040534 |
| 2 | -0.062247 | 12 | -0.004624 |
| 3 | -0.079136 | 13 | 0.080737 |
| 4 | -0.027451 | 14 | -0.056618 |
| 5 | -0.024506 | 15 | 0.064695 |
| 6 | -0.021176 | 16 | -0.026114 |
| 7 | -0.045878 | 17 | -0.013898 |
| 8 | -0.026175 | 18 | -0.025512 |
| 9 | -0.101832 | | |



(c)

(b)

Gambar 4.6(a)

Plot ACF setelah differencing 1

(d)

Plot PACF setelah differencing 1


Tabel 4.3 Autokorelasi data preintervensi perubahan kurs setelah d=1

| Lag | ACF | Lag | ACF |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 1 | -0.150459 | 9 | -0.11894 |
| 2 | 0.19186 | 10 | 0.105829 |
| 3 | -0.210614 | 11 | -0.306606 |
| 4 | -0.089931 | 12 | 0.168708 |
| 5 | -0.088071 | 13 | -0.072365 |
| 6 | -0.019232 | 14 | 0.186956 |
| 7 | -0.049094 | 15 | -0.011863 |
| 8 | 0.182591 | 16 | -0.041319 |

Tabel 4.4 Autokorelasi Parsial data preintervensi perubahan kurs setelah $d=1$

| Lag | PACF | Lag | PACF |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 1 | -0.150459 | 9 | -0.099667 |
| 2 | 0.173142 | 10 | -0.014434 |
| 3 | -0.169498 | 11 | -0.253825 |
| 4 | -0.178783 | 12 | 0.105761 |
| 5 | -0.059136 | 13 | 0.045488 |
| 6 | -0.029603 | 14 | 0.076588 |
| 7 | -0.094877 | 15 | -0.007145 |

| | | | |
|---|----------|----|-----------|
| 8 | 0.144695 | 16 | -0.128909 |
|---|----------|----|-----------|



Gambar 4.7 Kolmogorov Smirnov nilai residual ARIMA(1,1,0)

Lampiran 3 (hasil peramalan)

Tabel peramalan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dalam 30 hari kedepan dengan MINITAB .

Forecasts from period 66

| Period | Forecast | 95% Limits | | Actual |
|--------|----------|------------|---------|--------|
| | | Lower | Upper | |
| 67 | 14654.2 | 14568.7 | 14739.7 | |
| 68 | 14668.9 | 14557.4 | 14780.5 | |
| 69 | 14686.7 | 14552.9 | 14820.5 | |
| 70 | 14703.9 | 14551.3 | 14856.6 | |
| 71 | 14721.3 | 14551.8 | 14890.7 | |
| 72 | 14738.6 | 14553.9 | 14923.3 | |
| 73 | 14755.9 | 14557.1 | 14954.7 | |
| 74 | 14773.2 | 14561.2 | 14985.2 | |
| 75 | 14790.5 | 14566.2 | 15014.9 | |
| 76 | 14807.9 | 14571.7 | 15044.0 | |
| 77 | 14825.2 | 14577.9 | 15072.5 | |
| 78 | 14842.5 | 14584.5 | 15100.5 | |
| 79 | 14859.8 | 14591.5 | 15128.1 | |
| 80 | 14877.1 | 14599.0 | 15155.3 | |
| 81 | 14894.5 | 14606.7 | 15182.2 | |
| 82 | 14911.8 | 14614.8 | 15208.8 | |
| 83 | 14929.1 | 14623.1 | 15235.1 | |
| 84 | 14946.4 | 14631.7 | 15261.1 | |
| 85 | 14963.7 | 14640.6 | 15286.9 | |
| 86 | 14981.0 | 14649.6 | 15312.5 | |
| 87 | 14998.4 | 14658.9 | 15337.8 | |
| 88 | 15015.7 | 14668.3 | 15363.0 | |
| 89 | 15033.0 | 14677.9 | 15388.1 | |
| 90 | 15050.3 | 14687.7 | 15412.9 | |
| 91 | 15067.6 | 14697.7 | 15437.6 | |
| 92 | 15085.0 | 14707.7 | 15462.2 | |
| 93 | 15102.3 | 14718.0 | 15486.6 | |
| 94 | 15119.6 | 14728.3 | 15510.9 | |
| 95 | 15136.9 | 14738.8 | 15535.1 | |

LAMPIRAN 4(Peramalan dengan program SAS)

Tabel peramalan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dalam 30 hari kedepan
dengan program SAS

| Forecasts for variable y1 | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| Obs | Forecast | Std Error | 95% Confidence Limits | |
| 67 | 14654.2004 | 43.6315 | 14568.6843 | 14739.7165 |
| 68 | 14668.9449 | 56.8970 | 14557.4288 | 14780.4610 |
| 69 | 14686.6827 | 68.2414 | 14552.9320 | 14820.4334 |
| 70 | 14703.9325 | 77.8607 | 14551.3283 | 14856.5367 |
| 71 | 14721.2619 | 86.4292 | 14551.8638 | 14890.6600 |
| 72 | 14738.5783 | 94.2196 | 14553.9112 | 14923.2454 |
| 73 | 14755.8968 | 101.4137 | 14557.1296 | 14954.6640 |
| 74 | 14773.2150 | 108.1302 | 14561.2838 | 14985.1462 |
| 75 | 14790.5332 | 114.4531 | 14566.2092 | 15014.8573 |
| 76 | 14807.8514 | 120.4446 | 14571.7843 | 15043.9186 |
| 77 | 14825.1697 | 126.1519 | 14577.9165 | 15072.4228 |
| 78 | 14842.4879 | 131.6119 | 14584.5333 | 15100.4425 |
| 79 | 14859.8061 | 136.8542 | 14591.5767 | 15128.0355 |
| 80 | 14877.1243 | 141.9030 | 14598.9995 | 15155.2492 |
| 81 | 14894.4426 | 146.7783 | 14606.7624 | 15182.1227 |
| 82 | 14911.7608 | 151.4967 | 14614.8327 | 15208.6889 |
| 83 | 14929.0790 | 156.0726 | 14623.1824 | 15234.9756 |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

| | | | | |
|----|------------|----------|------------|------------|
| 84 | 14946.3972 | 160.5180 | 14631.7877 | 15261.0068 |
| 85 | 14963.7154 | 164.8436 | 14640.6279 | 15286.8030 |
| 86 | 14981.0337 | 169.0586 | 14649.6849 | 15312.3825 |
| 87 | 14998.3519 | 173.1710 | 14658.9429 | 15337.7609 |
| 88 | 15015.6701 | 177.1880 | 14668.3880 | 15362.9523 |
| 89 | 15032.9883 | 181.1159 | 14678.0076 | 15387.9691 |
| 90 | 15050.3066 | 184.9605 | 14687.7907 | 15412.8224 |
| 91 | 15067.6248 | 188.7267 | 14697.7272 | 15437.5223 |
| 92 | 15084.9430 | 192.4192 | 14707.8083 | 15462.0778 |
| 93 | 15102.2612 | 196.0422 | 14718.0256 | 15486.4969 |
| 94 | 15119.5794 | 199.5994 | 14728.3717 | 15510.7872 |
| 95 | 15136.8977 | 203.0944 | 14738.8400 | 15534.9554 |
| 96 | 15154.2159 | 206.5302 | 14749.4242 | 15559.0076 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 5 chart residual respon intervensi



Gambar 4.8 diagram residual respon intervensi

LAMPIRAN 6 (syntax dengan program SAS)

```
data kurs;  
input s y1;  
datalines;  
0 1234937  
0 1407408  
0 1265048  
0 1427088  
0 1409877  
0 1500517  
0 1429083  
0 1413291  
0 1449402  
0 1597633  
0 1561297  
0 1647265  
0 2049670  
0 1559804  
0 1379114  
0 1570504  
0 1526845  
0 1494553
```



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

0 1505450
0 1467666
0 1525269
0 1522306
0 1619950
0 1724163
0 1713183
0 1700890
0 1582360
0 1679959
0 1683061
0 1764965
0 1683882
0 1733827
0 1658378
0 1677034
0 1650422
0 1791953
0 1724900
0 1792731
0 1718586
0 1718958



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

0 1745289
0 1794028
0 1731134
0 1708242
0 1749099
0 1934534
0 1741722
0 1810282
0 1883630
0 1932005
0 1694099
0 1952770
0 1929690
0 2002157
0 2108189
0 1851636
0 1939979
0 1873134
0 2102208
0 1961920
0 2187761
0 2108339



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


```

;
proc arima data=kurs out=out1;
identify var=y1 crosscorr=( s(1) ) noprint;
estimate p=(1) input=( 1 $ (0) s )
noconstant method=cls;
forecast lead=12 out=y1;
run;
proc arima data=y1;
identify var=residual;
run;
proc univariate data=y1t normal plot;
var residual;
run;

```



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 7 (output analisis intervensi fungsi *step* dengan *Software SAS*)

The ARIMA Procedure

| Conditional Least Squares Estimation | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------|----------------|-----|----------|-------|
| Parameter | Estimate | Standard Error | t Value | Approx Pr > t | Lag | Variable | Shift |
| AR1,1 | 0.32360 | 0.08173 | 3.96 | 0.0001 | 1 | y1 | 0 |
| NUM1 | -219.26755 | 58.14704 | -3.77 | 0.0002 | 0 | s | 1 |


| | |
|---------------------|----------|
| Variance Estimate | 3470.231 |
| Std Error Estimate | 58.90867 |
| AIC | 1639.475 |
| SBC | 1645.483 |
| Number of Residuals | 149 |


* AIC and SBC do not include log determinant.

| Correlations of Parameter Estimates | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Variable | | y1 | s |
| Parameter | | AR1,1 | NUM1 |
| y1 | AR1,1 | 1.000 | 0.266 |
| s | NUM1 | 0.266 | 1.000 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

| Autocorrelation Check of Residuals | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|----|------------|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| To Lag | Chi-Square | DF | Pr > ChiSq | Autocorrelations | | | | | | |
| 6 | 5.29 | 5 | 0.3811 | -0.047 | 0.112 | 0.082 | 0.063 | 0.007 | 0.110 | |
| 12 | 9.43 | 11 | 0.5826 | -0.093 | 0.015 | 0.050 | 0.072 | -0.089 | -0.072 | |
| 18 | 13.43 | 17 | 0.7069 | -0.069 | 0.036 | -0.152 | -0.003 | 0.020 | -0.021 | |
| 24 | 19.07 | 23 | 0.6973 | 0.014 | 0.037 | -0.123 | 0.086 | -0.059 | -0.134 | |
| 30 | 22.86 | 29 | 0.7830 | 0.037 | 0.009 | 0.166 | 0.008 | 0.010 | -0.045 | |





| | |
|------------------------------|---|
| Model for variable y1 | |
| Period(s) of Differencing | 1 |

No mean term in this model.

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Autoregressive Factors | |
| Factor 1: | $1 - 0.3236 B^{**}(1)$ |


| | |
|---------------------------|----------|
| Input Number 1 | |
| Input Variable | s |
| Shift | 1 |
| Period(s) of Differencing | 1 |
| Overall Regression Factor | -219.268 |


The ARIMA Procedure

| Name of Variable = RESIDUAL | |
|---|----------|
| Mean of Working Series | 2.621709 |
| Standard Deviation | 59.68954 |
| Number of Observations | 151 |
| Embedded missing values in working series | 1 |

| Autocorrelation Check for White Noise | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----|------------|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| To Lag | Chi-Square | DF | Pr > ChiSq | Autocorrelations | | | | | |
| 6 | 4.24 | 6 | 0.6442 | -0.051 | 0.064 | 0.106 | -0.042 | -0.020 | 0.096 |
| 12 | 8.78 | 12 | 0.7217 | -0.137 | 0.029 | 0.025 | 0.043 | -0.083 | -0.058 |
| 18 | 14.08 | 18 | 0.7240 | -0.074 | 0.051 | -0.163 | -0.002 | 0.052 | -0.048 |
| 24 | 18.90 | 24 | 0.7575 | 0.038 | 0.033 | -0.114 | 0.078 | -0.044 | -0.120 |

Trend and Correlation Analysis for RESIDUAL





The UNIVARIATE Procedure
Variable: RESIDUAL (Residual: Actual-Forecast)


| Moments | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| N | 150 | Sum Weights | 150 |
| Mean | 2.62170888 | Sum Observations | 393.256332 |
| Std Deviation | 59.8895076 | Variance | 3586.75313 |
| Skewness | -1.0209016 | Kurtosis | 5.72926407 |
| Uncorrected SS | 535457.219 | Corrected SS | 534426.216 |
| Coeff Variation | 2284.36911 | Std Error Mean | 4.88995782 |

| Basic Statistical Measures | | | |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------|
| Location | | Variability | |
| Mean | 2.62171 | Std Deviation | 59.88951 |
| Median | -0.16888 | Variance | 3587 |
| Mode | . | Range | 472.95050 |
| | | Interquartile Range | 54.05527 |

| Quantiles (Definition 5) | |
|--------------------------|-------------|
| Level | Quantile |
| 100% Max | 159.315257 |
| 99% | 159.164327 |
| 95% | 93.831641 |
| 90% | 73.255716 |
| 75% Q3 | 33.237118 |
| 50% Median | -0.168881 |
| 25% Q1 | -20.818156 |
| 10% | -58.687360 |
| 5% | -79.453393 |
| 1% | -216.621376 |
| 0% Min | -313.635241 |

| Extreme Observations | | | |
|----------------------|-----|---------|-----|
| Lowest | | Highest | |
| Value | Obs | Value | Obs |
| -313.635 | 70 | 109.720 | 91 |
| -216.621 | 67 | 110.160 | 100 |
| -146.797 | 27 | 137.744 | 82 |
| -110.327 | 102 | 159.164 | 74 |
| -104.572 | 143 | 159.315 | 26 |

| Missing Values | | | |
|----------------|-------|------------|-------------|
| Missing Value | Count | Percent Of | |
| | | All Obs | Missing Obs |
| . | 33 | 18.03 | 100.00 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 8 (hasil peramalan dengan program SAS)

| Forecasts for variable y1 | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| Obs | Forecast | Std Error | 95% Confidence Limits | |
| 154 | 13806.7642 | 58.9087 | 13691.3054 | 13922.2231 |
| 155 | 13809.1903 | 97.7229 | 13617.6569 | 14000.7237 |
| 156 | 13809.9754 | 128.9547 | 13557.2288 | 14062.7220 |
| 157 | 13810.2294 | 155.0767 | 13506.2848 | 14114.1741 |
| 158 | 13810.3116 | 177.7074 | 13462.0115 | 14158.6117 |
| 159 | 13810.3382 | 197.8570 | 13422.5457 | 14198.1308 |
| 160 | 13810.3469 | 216.1634 | 13386.6743 | 14234.0194 |
| 161 | 13810.3496 | 233.0444 | 13353.5910 | 14267.1083 |
| 162 | 13810.3505 | 248.7850 | 13322.7409 | 14297.9602 |
| 163 | 13810.3508 | 263.5881 | 13293.7277 | 14326.9740 |
| 164 | 13810.3509 | 277.6031 | 13266.2588 | 14354.4430 |
| 165 | 13810.3510 | 290.9439 | 13240.1114 | 14380.5905 |
| 166 | 13810.3510 | 303.6992 | 13215.1114 | 14405.5905 |
| 167 | 13810.3510 | 315.9400 | 13191.1199 | 14429.5820 |
| 168 | 13810.3510 | 327.7239 | 13168.0238 | 14452.6781 |
| 169 | 13810.3510 | 339.0986 | 13145.7299 | 14474.9720 |
| 170 | 13810.3510 | 350.1039 | 13124.1599 | 14496.5420 |
| 171 | 13810.3510 | 360.7736 | 13103.2476 | 14517.4543 |
| 172 | 13810.3510 | 371.1368 | 13082.9363 | 14537.7657 |
| 173 | 13810.3510 | 381.2183 | 13063.1769 | 14557.5251 |
| 174 | 13810.3510 | 391.0400 | 13043.9267 | 14576.7752 |
| 175 | 13810.3510 | 400.6210 | 13025.1483 | 14595.5536 |
| 176 | 13810.3510 | 409.9781 | 13006.8087 | 14613.8932 |
| 177 | 13810.3510 | 419.1264 | 12988.8784 | 14631.8235 |
| 178 | 13810.3510 | 428.0792 | 12971.3312 | 14649.3708 |
| 179 | 13810.3510 | 436.8486 | 12954.1435 | 14666.5584 |
| 180 | 13810.3510 | 445.4453 | 12937.2942 | 14683.4078 |
| 181 | 13810.3510 | 453.8793 | 12920.7639 | 14699.9381 |
| 182 | 13810.3510 | 462.1594 | 12904.5352 | 14716.1667 |
| 183 | 13810.3510 | 470.2937 | 12888.5922 | 14732.1097 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R