

PERTUMBUHAN TANAMAN KRISAN (*Chrysanthemum morifolium*) PADA BERBAGAI KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR DARI LIMBAH SAYURAN



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:
SITI FATIMA
NIM. 60300112035

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERTUMBUHAN TANAMAN KRISAN (*Chrysanthemum morifolium*) PADA BERBAGAI KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR DARI LIMBAH SAYURAN



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
SITI FATIMA
NIM. 60300112035
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatima
NIM : 60300112035
Tempat/Tgl. Lahir : Palanro/13 Juni 1993
Jur/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. Shasan Bin Tahir No.63 Palanro, Barru
Judul : Pertumbuhan Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*)
Pada berbagai Konsentrasi Pupuk Organik Cair Dari Limbah Sayuran

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2016
Penyusun



Siti Fatima
NIM: 60300112035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pertumbuhan Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) pada Berbagai Konsentrasi Pupuk Organik Cair Dari Limbah Sayuran", yang disusun oleh Siti Fatima, NIM: 60300112035, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016, bertepatan dengan 26 Dzulqaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Makassar, 29 Agustus 2016 M
26 Dzuqaidah 1437 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI. (.....)
Sekretaris	: Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd. (.....)
Munaqisy I	: Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. (.....)
Munaqisy II	: Isna Rasdianah Aziz, S.Si., M.Sc. (.....)
Munaqisy III	: Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag, M.Hum. (.....)
Pembimbing I	: Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si. (.....)
Pembimbing II	: Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P. (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Siti Fatima**, NIM: 60300112035, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul “Pertumbuhan Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) Pada berbagai Konsentrasi Pupuk Organik Cair Dari Limbah Sayuran”, memandang bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Agustus 2016

Pembimbing I



Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si
NIP. 19750222 20912 2 002

Pembimbing II



Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P
NIP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Segala puji atas kebesaran Sang Khalik yang telah menciptakan alam semesta dalam suatu keteraturan hingga dari lisan terpercik berjuta rasa syukur kehadiran Allah swt karena atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nyalah sehingga saya diberikan kekuatan, kesempatan dan kemudahan kepada hamba-Nya untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini yang berjudul **“Pertumbuhan Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) Pada Berbagai Konsentrasi Pupuk Organik Cair dari Limbah Sayuran”** dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada umatnya hingga akhir zaman ini yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menuntun manusia dari lembah kebiadaban menjadi kebaikan seperti sekarang ini yang menjadi suri tauladan/uswatun hasanah bagi kita semua.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Dg Pataweng dan Ibunda Nur Hasanah, saudara-saudariku tercinta (Moh Suryawan, St. Khadijayanti dan St. Rahma) beserta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, semangat, motivasi, dan nasehat-nasehat dengan penuh keikhlasan, kesabaran serta kasih sayang yang tiada tara. Kalian merupakan pahlawan yang sangat berjasa, semoga jasa-jasamu dapat terbalaskan, aamiin..

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Namun berkat kerja keras dan motivasi dari pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan


skripsi ini. Olehnya itu, secara mendalam saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sejarannya.
2. Prof. Dr. A.Qadir Gassing HT.,MS., selaku Rektor periode 2011-2015 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sejarannya.
4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
6. Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing I dan Nurlailah Mappanganro S.P, M.P. selaku Dosen Pembimbing II yang sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan telah meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si., Isna Rasdiana Aziz, S.Si., M.Sc dan Nurkhalis A. Ghaffar, S.A.g, M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian dan penulisan skripsi penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah selama kuliah di kampus ini serta seluruh Staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
9. Kepada seluruh Laboran Laboratorium Jurusan Biologi FST UIN Alauddin Makassar yang memberikan ilmu, arahan, dan membantu selama penelitian ini.
10. Kepala perpustakaan beserta jajarannya, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Sahabat-sahabatku dan Teman-temanku yang selama ini suka dan duka hidup sebagai mahasiswa kita rasakan bersama dan selalu setia menemaniku terima kasih atas do'a dan dukungannya.

12. Spesial untuk teman-teman angkatan 2012 “RANVIER 2012” dan “CREW BANTA’S” yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta banyak kenangan yang tak terlupakan selama ini.
13. Adik-adik angkatan 2013, 2014 dan 2015 terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
14. Terimakasih juga kepada kakak Zulkarnain S.Si., M.Kes. (BIO 07) yang selama ini menjadi kakak panutan yang selama ini selalu memberi arahan dan bimbingannya.
15. Terimakasih kepada ibu Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si, telah bersedia memberikan tempat penelitian (Panorama indah) berupa lahan, penulis mendapat tempat peneliatian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, atas bantuannya penulis mengucapkan banyak terimah kasih.
16. Serta seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dukungan, saran dan pemikiran yang perlu diberikan kepada penulis.

Dengan rendah hati penulis berharap semoga Allah swt memberikan balasan atas bantuan dan pemikirannya. Sebagai akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi peneliti lain serta menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Makassar, Agustus 2016
Penulis



Siti Fatima
NIM: 60300112035

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v-vii
DAFTAR ISI	vi-vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11-42
A. Ayat dan Hadis yang Relevan.....	11
B. Tanaman Krisan	16
C. Limbah Sayuran	27
D. Pupuk Organik Cair	28
E. Fermentasi	32
F. Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman	33
G. Unsur Hara Esensial Tumbuhan.....	37

	H. Hipotesis.....	41
	I. Kerangka Pikir	42
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	43-48
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	43
	B. Pendekatan Penelitian	43
	C. Variabel Penelitian.....	44
	D. Definisi Operasional Variabel.....	44
	E. Metode Pengumpulan Data.....	45
	F. Alat dan Bahan	45
	G. Prosedur Kerja.....	46
	H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	51-65
	A. Hasil Penelitian	51
	B. Pembahasan	55
BAB V	PENUTUP	66-67
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran (Implikasi Penelitian).....	66
KEPUSTAKAAN		68
LAMPIRAN-LAMPIRAN		75-87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Ulangan Hasil Pengacakan Perlakuan	46
Tabel 4.1. Rata-rata Pertambahan Tinggi Tanaman Krisan (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)	49
Tabel 4.2. Rata-rata Pertambahan Jumlah Daun Tanaman Krisan (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)	50
Tabel 4.3 Rata-rata Pertambahan Panjang Daun Tanaman Krisan (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Akar Krisan (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)	16
Gambar 2.1. Batang Krisan (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)	17
Gambar 2.2. Daun Krisan (<i>Chrysanthemum morifolium</i>).....	17
Gambar 2.3. Bunga Krisan (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)	18
Gambar 2.4. Tanaman Krisan (<i>Chrysanthemum morifolium</i>).....	19
Gambar 4.1. Rata-rata Pertambahan Tinggi (cm) Tanaman Krisan	50
Gambar 4.2. Rata-rata Pertambahan Pertambahan Jumlah Helai Daun Tanaman Krisan	51
Gambar 4.3. Rata-rata Pertambahan Pertambahan Jumlah Helai Daun Tanaman Krisan	52

ABSTRAK

Nama : Siti Fatima
NIM : 60300112035
Judul Skripsi : **Pertumbuhan Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) Pada Berbagai Konsentrasi Pupuk Organik Cair Dari Limbah Sayuran**

Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) merupakan tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pupuk organik cair merupakan pupuk yang berasal dari limbah organik berbentuk cair mengandung unsur hara yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi pupuk organik cair dari limbah sayuran terhadap pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) dan untuk mengetahui konsentrasi pupuk organik cair dari limbah sayuran yang dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*). Desain yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pada perlakuan pupuk cair 0 ml (K0), 5 ml (K1), 10 ml (K2), 15 ml (K3), 20 ml (K4) dan 25 ml (K5), 5 kali ulangan, dianalisis dengan uji *One-way ANOVA* dengan taraf signifikansi 5% dan 1%. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pupuk organik cair dengan berbagai konsentrasi perlakuan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*). Konsentrasi 15 ml/l (K3) menghasilkan tanaman tertinggi dan konsentrasi 5 ml/l (K1) menghasilkan jumlah daun terbanyak. Perlakuan pupuk organik cair pada konsentrasi 15 ml/l (K3) memberikan pengaruh terbaik pada pertambahan tinggi tanaman krisan. Pada konsentrasi 5 ml/l (K1) memberikan pengaruh terbaik pada pertambahan jumlah helai daun tanaman krisan. Pada konsentrasi 15 ml/l (K3) memberikan pengaruh terbaik pada pertambahan panjang daun tanaman krisan. Pada konsentrasi 10 ml/l (K2) dan konsentrasi 25ml/l (K5) memberikan pengaruh terbaik pada pertambahan diameter batang tanaman krisan.

Kata kunci: Pupuk Organik Cair, Limbah Sayuran, Pertumbuhan Tanaman, Krisan (*Chrysanthemum morifolium*).

ABSTRACT

Name : Siti Fatima
SIN : 60300112035
Minithesis Title : **The growth of Chrysanthemum (*Chrysanthemum morifolium*)
At Various Concentrations of Liquid Organic Fertilizer
From Waste Vegetables**

Chrysanthemum (*Chrysanthemum morifolium*) is an ornamental plant that has high economic value. Liquid organic fertilizer is a fertilizer derived from organic waste liquid contains nutrients that can enhance plant growth. This study was conducted to determine the effect of various concentrations of liquid organic fertilizer from vegetable waste on the growth of chrysanthemum (*Chrysanthemum morifolium*) and to determine the concentration of liquid organic fertilizer from vegetable waste that can give the best effect on the growth of chrysanthemum (*Chrysanthemum morifolium*). The design used is Complete Random Rancangan (RAL) in the treatment of liquid organic fertilizer 0 ml (K0), 5ml (K1), 10 ml (K2), 15 ml (K3), 20 ml (K4) and 25 ml (K5), 5 replications, were analyzed by One-way ANOVA with a significance level of 5% and 1%. The results of this study can be concluded that the liquid organic fertilizer with various concentrations of treatment berpengaruh to the growth of chrysanthemum (*Chrysanthemum morifolim*). Concentration of Concentration of 15 ml/l (K3) produced the highest plant and the concentration of 5 ml/l (K1) to produce the highest number of leaves. The treatment of liquid organic fertilizer at a concentration of 15 ml/l (K3) gives the best effect on height increment chrysanthemum. At a concentration of 5 ml/l (K1) gives the best effect on the increase of chrysanthemum leaves. At a concentration of 15 ml/l (K3) gives the best effect on the length of the chrysanthemum plant leaves. At a concentration of 10 ml/l (K2) and the concentration of 25 ml/l (K5) gives the best effect on the increase in diameter trunk chrysanthemum.

Keywords : Liquid Organic Fertilizer, Waste Vegetable, Plant Growth,
Chrysanthemum (*Chrysanthemum*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menciptakan tanaman di bumi ini, sebagian tanaman bisa dijadikan obat dan sebagai tanaman hias, salah satunya adalah tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) yang merupakan ciptaan Allah swt yang dapat dimanfaatkan. Begitu pun dengan limbah sayuran dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna, yaitu sebagai pupuk oranik cair yang bermanfaat bagi tanaman. Salah satu surah yang mengajak untuk memanfaatkan tanaman yaitu surah Az Zumar/39 : 21 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ مَخْرَجُ
بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَذِكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

“Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu Dia megalirkannya menjadi air-mata di bumi, kemudian Dia mengeluarkan dengannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian Dia menjadikannya hancur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi Ulil Albab.” (Kementerian Agama RI, 2010).

Menurut Shihab (2002), kata kemudian, (ثُمَّ) *tsumma/* kemudian sebelum firman-Nyayukhriju *bihi zar'an/* Dia mengeluarkan dengannya tanam-tanaman, berfungsi : (تَخْرِجُ بِهِ زَرْعًا) menggambarkan betapa jauh dan hebatnya penciptaan Allah yang kuasa menumbuhkan tumbuhan dari air serta betapa ia memberi kesan yang dalam dibanding dengan yang disebut sebelumnya yaitu mengalirkan air menjadi mata air. Apalagi proses penumbuhan itu terlihat dengan mata kepala dari saat ke saat ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, yaitu kemudian dengan air yang turun dari langit dan yang muncul dari bumi itu, Dia tumbuhkan tanam-tanaman yang bermacam-macam yaitu warna, bentuk, rasa bau dan manfaatnya.

Dari penafsiran ayat ini memberikan pengilhaman untuk mengetahui lebih lanjut aneka tanaman seperti yang telah disebutkan. Tanaman-tanaman ini bisa berupa tanaman pertanian dan tanaman hias yang bisa dimanfaatkan dengan tumbuhan. Salah satu yang menarik perhatian adalah tanaman krisan.

Tanaman hias merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak diminati masyarakat, karena memiliki warna dan bentuk yang beragam, selain itu tanaman hias bermanfaat untuk memperindah lingkungan. Tanaman hias juga bermanfaat sebagai pemuas kebutuhan rohani dan memperindah ruangan sehingga banyak masyarakat yang membudidayakannya. Tanaman hias meliputi tanaman hias daun dan tanaman hias bunga. Salah satu jenis tanaman hias bunga adalah tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*). Daya tarik yang dimiliki tanaman krisan antara

lain warna, tipe dan bentuknya yang beragam. Krisan juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan yaitu dikonsumsi sebagai teh herbal atau teh obat (Rahayu, 2013).

Krisan memiliki banyak manfaat selain dapat digunakan sebagai tanaman hias, juga dapat dijadikan sebagai tanaman obat. Saat ini krisan termasuk bunga yang paling populer di Indonesia karena memiliki keunggulan yaitu bunganya kaya warna dan tahan lama, bunga krisan pot bahkan dapat tetap segar selama 10 hari. Peluang untuk mengembangkan budidaya tanaman bunga krisan, guna memenuhi kebutuhan baik dalam maupun luar negeri tetap terbuka (Lukito, 2008).

Produksi tanaman krisan di Indonesia mulai meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan produksi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi usaha untuk tanaman krisan. Usaha bunga krisan di Indonesia memiliki peluang ekspor yang cukup besar seiring dengan peningkatan bunga krisan, jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup masyarakat. Ekspor krisan dilakukan ke beberapa negara diantaranya Jepang, Arab Saudi, Kuwait, Pakistan dan Uni Emirat Arab (Rahayu, 2013).

Secara umum produktivitas krisan di Indonesia cukup fluktuatif namun cenderung meningkat selama periode 2000-2013, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,35% per tahun. Pada tahun 2007 terjadi penurunan produktivitas krisan di Indonesia hingga 52,37%. Penurunan produktivitas tersebut disebabkan terjadinya peningkatan luas panen krisan di Indonesia yang sangat tinggi pada tahun 2007 dari 1.939.039 m² menjadi 4.279.390 m², dengan pertumbuhan

120,70%, sementara produksi hanya tumbuh meningkat sebesar 5,12%. Ini menandakan produktivitas yang sangat rendah dari tanaman krisan tersebut, yang dapat disebabkan karena rendahnya mutu benih krisan yang digunakan. Karena menurut Soedarjo (2010), salah satu permasalahan dalam industri dan agribisnis krisan di Indonesia adalah faktor benih. Ketergantungan terhadap benih impor dan ketidaksediaan benih yang dibutuhkan tepat waktu, jumlah dan jenis sering kali menjadi kendala peningkatan produktivitas pertanian pada skala petani tradisional (Kementerian Pertanian, 2014).

Permasalahan yang sekarang dihadapi Indonesia dalam budidaya tanaman krisan adalah masih mengimpor bibit dari luar negeri seperti Belanda, Jerman, Amerika Serikat dan Jepang. Bibit krisan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, sehingga dengan mengimpor bibit biaya produksi semakin mahal dan ketersediaan bunga krisan secara kontinuitas juga diperlukan untuk memenuhi permintaan konsumen (Istianigrum, 2013).

Teknologi tepat guna yang diciptakan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas bunga krisan sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani, devisa negara, dan kenyamanan lingkungan hidup. Kualitas bunga dipengaruhi juga oleh macam stek, panjang stek, umur anakan, defoliiasi dan media tumbuh pada dua varietas bunga krisan (Aini, 2008).

Tindakan mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah dengan penambahan dan pengembalian zat-zat hara secara buatan diperlukan agar produksi

tanaman tetap normal atau meningkat. Tujuan penambahan zat-zat hara tersebut memungkinkan tercapainya keseimbangan antara unsur-unsur hara yang hilang baik yang terangkut oleh panen, erosi, dan pencucian lainnya. Tindakan pengembalian/penambahan zat-zat hara ke dalam tanah ini disebut pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan harus sesuai kebutuhan, sehingga diperlukan metode diagnosis yang benar agar unsur hara yang ditambahkan hanya yang dibutuhkan oleh tanaman dan yang kurang di dalam tanah (Leiwakabessy dan Sutandi, 2004).

Penggunaan pupuk organik mampu menjadi solusi dalam mengurangi pemakaian pupuk anorganik yang berlebihan. Pupuk organik dapat berbentuk padat maupun cair. Kelebihan pupuk organik cair adalah unsur hara yang dikandungnya lebih cepat tersedia dan mudah diserap akar tanaman (Pardosi, 2014).

Pupuk organik cair selain dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, membantu meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan kualitas produk tanaman, mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan sebagai alternatif pengganti pupuk kandang (Indrakusuma, 2000).

Salah satu pupuk organik dalam bentuk cair adalah pupuk organik cair dari limbah sayuran. Limbah organik (termasuk limbah sayuran dari hasil kegiatan pasar) apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik merupakan limbah yang paling besar mencemari lingkungan. Dengan berkembangnya model pertanian *zero waste*, tidak akan membiarkan hasil ikutan menjadi limbah atau tidak bermanfaat. Oleh karena itu, maka peningkatan produksi limbah sebenarnya tidak terlampaui

bermasalah lagi karena dapat diproses menjadi pupuk organik padat dan pupuk organik cair seperti hasil fermentasi limbah sayuran. Untuk meningkatkan kualitas hasil pembuatan pupuk organik padat maupun pupuk organik cair dapat ditambahkan molase dan mikroorganisme seperti EM4 (Pardosi, 2014).

Bahan baku pupuk cair yang sangat bagus dari sampah organik yaitu bahan organik basah seperti sisa buah dan sayuran. Selain mudah terdekomposisi, bahan ini juga kaya akan hara yang dibutuhkan tanaman. Semakin tinggi kandungan selulosa dari bahan organik, maka proses penguraian akan semakin lama (Purwendro dan Nurhidayat, 2006).

Pemberian pupuk organik cair harus memperhatikan konsentrasi atau dosis yang diaplikasikan terhadap tanaman. Konsentrasi, waktu, dan cara pemberian harus tepat agar tidak merugikan dan tidak merusak lingkungan akibat kelebihan konsentrasi serta waktu dan cara aplikasinya (Rahmi dan Jumiati, 2007).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dilakukan penelitian terhadap pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) pada berbagai konsentrasi pupuk organik cair dari limbah sayuran.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh berbagai konsentrasi pupuk organik cair dari limbah sayuran terhadap pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ?
2. Pada konsentrasi berapa dari pemberian pupuk organik cair dari limbah sayuran yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) diperoleh dari pembibitan hasil kultur jaringan krisan, kemudian tanaman dibudidayakan di dalam *polybag* dan diberikan perlakuan berbagai konsentrasi pupuk organik cair. Parameter pengamatan terdiri dari pertambahan tinggi tanaman (cm), pertambahan jumlah daun (helai), pertambahan panjang daun (cm) dan pertambahan diameter batang (cm).

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Rahmah dkk. (2014), tentang Pengaruh Pupuk Organik Cair Berbahan Dasar Limbah Sawi Putih (*Brassica chinensis* L.) terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis (*Zea mays* L. var *saccharata*) menyimpulkan pupuk organik cair dengan berbagai konsentrasi perlakuan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis. Konsentrasi 3 ml/l (P3) menghasilkan tanaman tertinggi, konsentrasi 1 ml/l (P10 dan 4 ml/l (P4) menghasilkan jumlah daun terbanyak serta konsentrasi 1 ml/l (P1) menghasilkan berat basah dan berat kering tanaman terbanyak.

Parman (2007), tentang Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kentang (*Solanum tuberosum* L.) menyimpulkan penggunaan pupuk organik cair dengan berbagai konsentrasi perlakuan yaitu 0 ml/l, 1 ml/l, 2 ml/l, 3ml/l dan 4 ml/l yang diaplikasikan terhadap tanaman kentang memberikan hasil yang berbeda tidak nyata terhadap parameter tinggi tanaman, berat kering tanaman, jumlah umbi dan berat kering umbi kentang tetapi pada konsentrasi 4 ml/l memberikan hasil yang signifikan terhadap jumlah daun, diameter umbi, berat basah tanaman dan berat basah umbi kentang.

Wijaya (2010), tentang Pengaruh Konsentrasi dan Frekuensi Pemberian Pupuk Organik Cair Hasil Perombakan Anaerob Limbah Makanan Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi (*Brassica juncea* L.), menyimpulkan bahwa pemberian pupuk organik cair hasil perombakan anaerob limbah makanan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman sawi, meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, dan berat basah. Kombinasi pemberian pupuk organik cair hasil perombakan anaerob limbah makanan untuk mendukung pertumbuhan tanaman sawi adalah konsentrasi 1% dengan frekuensi 10 kali.

Pardosi dkk (2014), tentang Respons Tanaman Sawi terhadap Pupuk Organik Cair Limbah Sayuran pada Lahan Kering Ultisol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk organik cair limbah sayuran dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Pupuk organik cair limbah sayuran dengan dosis 500 ml per tanaman menghasilkan jumlah daun, luas daun, bobot segar, dan bobot kering tanaman sawi tertinggi.

Putra dan Histifarina (2010), tentang Respon beberapa Varietas Krisan Terhadap Penggunaan Pupuk Organik. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan pupuk organik memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan bunga Krisan. Penggunaan pupuk bokasi memperlihatkan hasil yang lebih baik terhadap panjang tangkai bunga, jumlah kuntum bunga, tinggi tanaman, diameter batang, jumlah ruas batang, panjang daun, lebar daun, dan panjang tangkai daun, tetapi tidak berpengaruh terhadap diameter bunga.

Handajarningsih dan Wibisono (2009), tentang Pertumbuhan dan Pembungaan Krisan dengan Pemberian Abu Janjang Kelapa Sawit Sebagai Sumber Kalium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian AJKS pada bunga oranye meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah bunga per tanaman, mempercepat umur keluar kuncup pertama dan umur mekar bunga namun juga memperpendek umur ketahanan bunga. Bunga warna ungu kurang responsif terhadap pemberian dosis AJKS, hanya pada jumlah bunga pertanaman yang meningkat pada pemberian dosis 0,6 g dan 0,9 g serta diameter bunga yang bertambah 1 mm dengan pemberian AJKS dibandingkan diameter bunga tanpa AJKS. Peningkatan dosis AJKS dari 0 sampai 0,9 g tanaman-1 menambah jumlah cabang sebanyak 1,7; jumlah daun 12,1; dan jumlah bunga sebanyak 16,3 kuntum.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi pupuk organik cair dari limbah sayuran terhadap pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*).
2. Untuk mengetahui konsentrasi pupuk organik cair dari limbah sayuran yang dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*).

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain :

1. Bagi UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu Fisiologi Tumbuhan dan Nutrisi Tumbuhan .
2. Bagi petani krisan (*Chrysanthemum morifolium*) diharapkan dapat memberikan informasi dalam hal teknik budidaya tanaman krisan dengan menggunakan pupuk organik cair dari limbah sayuran yang baik digunakan terhadap usaha tani mereka.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan keuntungan dari segi ekologis dan solusi dari permasalahan limbah sayuran yang ada di pasar maupun yang ada di lahan pertanian.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Ayat Al-Qur'an yang Relevan

1. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dalam Al-Qur'an Surah al-An'am:

95

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ ۗ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?” (Kementerian Agama RI, 2010).

Bukti kekuasaan Allah tentang hari kiamat, keberhakan-Nya untuk disembah dan kebangkitan kembali manusia dari dalam kuburnya, sungguh bermacam-macam. Allah, misalnya, membelah berbagai biji sumber bibit untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan baru. Dia juga membelah tunas untuk menumbuhkan pohon-pohon baru. Dia mengeluarkan benda hidup dari benda mati seperti manusia dari tanah dan mengeluarkan benda mati dari benda hidup seperti susu yang keluar dari tubuh hewan. Zat Yang Maha Kuasa dan Maha Agung itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Tak ada yang menolehkan kalian dari penyembahan-Nya, selain Dia. Ayat ini

menunjukkan salah satu bukti kekuasaan Allah swt, yaitu penciptaan biji dan embrio tanaman di setiap tempat yang sempit. Sedangkan bagian lain biji itu, terdiri atas zat-zat tidak hidup terakumulasi. Ketika embrio itu mulai bernyawa dan tumbuh, zat-zat yang terakumulasi itu berubah menjadi zat yang dapat memberi makan embrio. Ketika mulai pertumbuhan, dan sel-sel hidup mulai terbentuk, biji kedua berubah pula dari fase biji/bibit ke fase tunas. Saat itu tumbuhan mulai dapat memenuhi kebutuhan makanannya sendiri, dari zat garam yang larut dalam air di dalam tanah dan diserap oleh akar serabut, dan terbentuknya zat hijau daun dari karbohidrat, seperti gula dengan bantuan cahaya matahari. Ketika siklus itu sampai pada titik akhirnya, buah-buahan kembali mengandung biji-bijian yang merupakan bahan kehidupan baru lagi. Dan begitu seterusnya (Shihab, 2002).

Makna yang dapat diperoleh penulis yaitu bahwa, tumbuhan mengalami proses pertumbuhan yang sangat rumit. Mulai dari berkecambah dengan melakukan penyerapan air dari dalam tanah tumbuhan pun memulai perkembangannya. Biji yang tadinya tumbuh menjadi kecambah kulitnya pun mulai robek karena perkembangannya. Selanjutnya tumbuhan mulai mengeluarkan akar dan menembus kedalam tanah untuk mencari makanan dan masih panjang lagi perjalanan tumbuhan menjalani proses pertumbuhannya. Tiada sekalipun penciptaan Tuhan yang sia-sia dimuka bumi ini. Tumbuh-tumbuhan yang ada diciptakan untuk kemaslahatan dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk Tuhan dibumi. Salah satu penciptaan Tuhan yaitu, diciptakannya tumbuh-tumbuhan, salah satunya yaitu tanaman hias krisan, krisan

dengan bermacam-macam bentuk, warna, dan manfaat yang dimiliki. Krisan jenis *Chrysanthemum morifolium*, yang berwarna putih atau kuning bisa dijadikan teh krisan atau *Chrysanthemum Tea*. Khasiatnya untuk menyembuhkan influenza, dan mengobati panas dalam dan sakit tenggorokan. Manfaat tersebut didapatkan karena krisan mengandung vitamin C, beta karotene, kalsium, serat, zat besi, kalium, dan magnesium.

Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah yang memiliki banyak sekali manfaat. Tumbuh-tumbuhan dapat memunculkan beberapa zat untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, misalnya mulai beberapa vitamin-vitamin, minyak dan masih banyak lainnya. Dengan berbagai manfaat yang dimiliki tanaman krisan yang tercipta, memungkinkan tanaman ini dapat ditumbuhkan dan diambil manfaatnya. Terciptanya varietas yang diinginkan tentunya tidak terlepas dari mereka yang selalu mau berfikir dan bersyukur (peneliti).

2. Proses pertumbuhan tanaman (Al-Qur'an Surah Al-Waqiah ayat 63-66)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كَحَرْتُمْ ۗ ۝۱۳ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ الزَّرْعُونَ ۝۱۴
لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَبًا فَأَنْظَرْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۝۱۵ إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ۝۱۶

Termahnya:

“Maka apakah kamu melihat yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atautkah Kami Para Penumbuhnya? Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami menjadikannya hancur; maka kamu menjadi heran tercengang: “Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. (Kementerian Agama RI, 2010).

Allah berfirman: Maka apakah kamu melihat dengan mata kepala atau hatimu, keadaan yang sungguh menakjubkan, terangkanlah kepada-Ku tahapan-tahapan dari benih yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya setelah benih itu kamu tanam, sehingga dia pada akhirnya berbuah atukah Kami para penumbuhnya? Kalau kami kehendaki maka benar-benar Kami menjadikannya yakni tanaman itu kering tidak berbuah dan hancur berkeping-keping sebelum kamu petik, akibat terkena sengatan panas atau dimakan hama (Shihab, 2002).

Dalam proses penciptaan makhluk hidup di bumi hanya Allah yang sanggup melakukan semua itu. Kita menanam tumbuhan pada tanah (media) yang mengandung air dan unsur hara, saat tanam itu tumbuh dengan subur ada campur tangan Allah swt. Siapakah yang mampu menumbuhkan tanaman tersebut selain Allah swt, karena atas Kekuasaan-Nya segala yang terjadi dan tercipta di bumi (Shihab, 2002).

3. Air dalam Al-Qur'an Surah Ar-rum: 24

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوَافًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepada kamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air dari langit lalu menghidupkan bumi dengannya sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berakal.” (Kementerian Agama RI, 2010).

Ayat yang diakhiri dengan menyebut pendengaran. Di samping pendengaran, manusia memiliki penglihatan. Dari sini, ayat di atas berbicara tentang sebagian dari apa yang dapat dilihat di angkasa. Yakni potensi listrik dan awan. Allah berfirman : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, adalah Dia memperlihatkan kepada kamu untuk menimbulkan harapan bagi turunnya hujan dan menurunkan air dari langit yakni awan, lalu menghidupkan bumi yakni tanah dengannya dengan air itu sesudah matinya yakni sesudah kegersangan dan ketandusan tanah di bumi itu. Sesungguhnya pada yang demikian hebat dan menakjubkan itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah antara lain menghidupkan kembali yang telah mati. Tanda-tanda itu diperoleh dan bermanfaat bagi kaum yang berakal yakni yang memikirkan dan merenungkannya (Shihab, 2002).

Makna yang dapat diperoleh penulis yaitu bahwa air merupakan komponen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan sel. Adapun peran air terhadap pertumbuhan tanaman sebagai pelarut dan sebagai medium transport senyawa. Fungsi air sebagai pelarut adalah memudahkan unsur hara dan mineral yang masuk ke dalam tumbuhan. Kemudian fungsi air sebagai medium transport senyawa ialah menghantarkan garam-garam mineral dan unsur hara yang diserap oleh tanaman ke seluruh bagian tanaman.

Air sangat bermanfaat untuk semua makhluk hidup yang ada didunia, begitu juga untuk tumbuhan. Manfaat air bagi tumbuhan adalah untuk membantu proses fotosintesis yang terjadi didalam daun, air merupakan komponen yang paling utama

pada proses fotosintesis tersebut. Pada proses fotosintesis air dibawa oleh akar untuk menuju ke pada batang agar disampaikan pada daun. Oleh sebab itu, air dikatakan sebagai sumber kehidupan. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah SWT, karena Dia sudah menurunkan air dengan ukuran yang cukup. Air ini ditetapkan di bumi bukan karena tanpa alasan, yaitu untuk membantu menumbuhkan tanaman di bumi dan sebagai sumber kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Terciptanya air dengan segala manfaatnya tentunya tidak terlepas dari mereka yang selalu mau berfikir dan bersyukur (peneliti).

B. *Tanaman Krisan*

1. Karakteristik Tanaman Krisan

Perakaran tanaman krisan dapat menyebar kesemua arah pada kedalaman 30 cm – 40 cm. akarnya mudah mengalami kerusakan akibat pengaruh lingkungan yang kurang baik, hal tersebut dikarenakan akar tanaman krisan berjenis serabut (Hasim dan Reza, 1995)



Gambar 2.1 : Akar krisan (*Chrysanthemum morifolium*) (dokumentasi pribadi 2016)

Batang tanaman krisan tumbuh tegak, berstruktur lunak dan berwarna hijau. Bila dibiarkan tumbuh terus, batang menjadi keras (berkayu) dan berwarna hijau kecoklat-coklatan. Penampilan visual sosok tanaman krisan mirip dengan aster. Ciri khas tanaman krisan dapat diamati pada bentuk daun, yaitu bagian tepi bercelah atau bergerigi, tersusun secara berselang-seling pada cabang atau batang (Rukmana dan Mulyana,1997).




Gambar 2.2 : Batang krisan (*Chrysanthemum morifolium*) (dokumentasi pribadi 2016)

Bentuk daun krisan khusus pada bagian tepi tampak bercelah dan bergerigi. Daun tersebut tersusun berselang-seling pada cabang atau batang. Sedangkan batangnya tumbuh tegak, berstruktur lunak, dan berwarna hijau. Namun demikian, bila batang dibiarkan terus tumbuh, maka batang pun akan menjadi keras berkayu dan warnanya menjadi hijau kecoklat-coklatan (Reginawati, 1999).



Gambar 2.3 : Daun krisan (*Chrysanthemum morifolium*) (dokumentasi pribadi 2016)

Bunga krisan tumbuh tegak pada ujung tanaman dan tersusun dalam tangkai (tandan) berukuran pendek sampai panjang. Bentuk bunga beraneka macam, tetapi organisasi pencinta krisan, *National Chrysanthemum Society* (NCS) mengklasifikasikannya ke dalam 13 kategori berdasarkan susunan dan jumlah mahkota bunga. Perakaran tanaman krisan menyebar ke semua arah pada kedalaman 30 cm – 40 cm. Akarnya mudah mengalami kerusakan akibat pengaruh lingkungan yang kurang baik, misalnya keadaan drainase yang jelek, kandungan unsur Al dan Mn dalam tanah yang tinggi, serta tanah yang terlalu masam (pH rendah) (Rukmana dan Mulyana, 1997).



Gambar 2.3: Bunga krisan (*Chrysanthemum morifolium*) (Wijayakusuma, 2000)

Bunga krisan merupakan bunga majemuk di dalam satu bonggol bunga terdapat bunga cakram yang berbentuk tabung dan bunga tepi yang berbentuk pita. Bunga tabung dapat berkembang dengan warna yang sama atau berbeda dengan bunga pita. Dengan bentuk dan warna bunga krisan yang beranekaragam memungkinkan banyak pilihan bagi konsumen (Sanjaya, 1996).

Menurut Crater (1980), tanaman krisan merupakan tanaman perdu dengan sifat tumbuh semusim (*annual*), mempunyai ciri morfologis batang tegak kokoh, bulat, berwarna hijau, sisi bawah berwarna hijau muda dengan rambut putih yang rapat, bentuk bervariasi dari bulat telur (*ovatus*) sampai lanset (*lanseolatus*) dasar bunga segitiga (*kuneatus*) tepian rata (*entire*) dengan kapitulium yang tersusun dari bunga tabung, mahkota tabung berwarna kuning, sedangkan mahkota bunga tepi bervariasi, berwarna putih, pink, kuning, atau nila



Gambar 2.5 : Tanaman krisan *Chrysanthemum morifolium* (dokumentasi pribadi 2016)

Kedudukan tanaman krisan atau seruni dalam sistematik (taksonomi) tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut:

Regnum	: Plantae (tumbuh-tumbuhan)
Divisio	: Spermatophyta (tumbuhan berbiji)
Sub-divisi	: Angiospermae (berbiji tertutup)
Classis	: Dycotiedonae (biji berkeping dua)
Ordo	: Asterales (Compositae)
Familia	: Asteraceae
Genus	: <i>Chrysanthemum</i>
Species	: <i>Chrysanthemum morifolium</i> (Tjitrosoepomo, 2013).

Krisan mempunyai banyak spesies diantaranya adalah *C maximum*, *C daisy*, *C indicum*, dan *C parthenium*. Sosok tanaman krisan tumbuh menyemak setinggi 30 cm – 200 cm. Daur (siklus) hidup tanaman krisan dapat bersifat sebagai tanaman semusim (*annual*) dan tanaman (*perenial*). Disebut krisan *annual* bila siklus hidupnya berulang-ulang, artinya setelah bunga dipanen (dipangkas) tumbuh tunas-tunas baru dan menghasilkan bunga secara periodik (Rukmana dan Mulyana, 1997).

Diketahui tanaman krisan dengan nama internasional *Chrysanthemum* atau disebut *mum*, terdiri dari banyak spesies. Dari banyaknya spesies inilah kemudian mulai dikembangkan/ disilangkan oleh para pemulia, sehingga menghasilkan banyak kultivar yang baru dan hibrida. Dalam penggunaannya krisan dikategorikan dalam

tiga jenis, yaitu: *cut mum* (krisan potong), *pot mum* (krisan pot), dan *garden mum* (krisan kebun) (Taulu, 2007).

Adapun jenis-jenis dan keluarga tanaman krisan relatif banyak, seperti yang asli di Sulawesi Utara yang dikenal Seruni Welanda (*Chrysanthemum indicum*) ada yang Seruni Welanda Beureum (merah), Seruni Welanda Bodas (putih), Seruni Walanda Tambaga (coklat) dan Seruni Walanda (kuning). Setiap anggota keluarga memiliki kelebihan. Jenis-jenis tanaman krisan selain yang digunakan sebagai bunga potong, juga ada yang dapat digunakan sebagai bumbu, lalapan dan sebagai penangkal nyamuk (Taulu, 2007).

Menurut Kurniawati (2007) bunga krisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Bunga Krisan Potong

Krisan sebagai bunga potong digunakan untuk bahan dekorasi ruangan, jambangan (vas) bunga, dan sebagainya. Bunga potong ditandai dengan sosok bunga yang berukuran pendek sampai tinggi, mempunyai tangkai bunga panjang, dan ukuran bervariasi (kecil, menengah, dan besar). Pada umumnya ditanam di lapangan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bunga potong.

2. Bunga Krisan Pot

Krisan sebagai bunga pot dikenal pada tahun 1988. Menurut produsen bunga pot, pemilihan krisan sebagai tanaman dalam pot merupakan diversifikasi dari pemanfaatan bunga potong. Bunga krisan pot berbeda dalam hal perlakuannya dengan bunga krisan potong. Krisan pot ditandai dengan sosok tanaman yang kecil,

tingginya 20-40 cm, berbunga lebat, dan cocok ditanam di pot, *polybag*, serta digunakan untuk penghias meja ruangan.

2. Syarat Tumbuh Tanaman Krisan

Menurut Rukmana dan Mulyana (1997) faktor iklim yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembungaan (produksi bunga) krisan diantaranya adalah:

a. Cahaya

Umumnya varietas-varietas krisan komersial asal luar negeri (indroduksi) termasuk tanaman hari pendek (*short day plant*), sehingga untuk merangsang pertumbuhan vegetatif perlu dipelihara dalam kondisi hari panjang. Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa (ekuator) mempunyai panjang hari 12 jam cocok untuk pertumbuhan tanaman krisan, tetapi kurang produktif bagi pembungaan.

Untuk mendapatkan bunga yang berkualitas baik, tanaman krisan membutuhkan cahaya yang lebih lama daripada panjang hari normal. Penambahan panjang hari dapat dilakukan dengan penyinaran buatan setelah matahari terbenam atau selama periode gelap. Penambahan cahaya dapat meningkatkan hasil fotosintesis. Oleh karena itu penambahan fotoperiode dan meningkatkan laju fotosintesis. Peningkatan hasil fotosintesis berpengaruh terhadap laju pertumbuhan generatif, yaitu pembentukan primordia atau pembungaan.

Sumber cahaya buatan yang umum digunakan adalah lampu pijar dan TL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lampu TL (*Fluorescent*) lebih mempercepat

pertumbuhan generatif tanaman krisan pada lampu pijar. Penambahan penyinaran yang terbaik adalah pada tengah malam (*nite break*) antara pukul 22.30-01.00 dengan lampu 150 Watt untuk area seluas 9 m² dan lampu dipasang setinggi 1,5 m dari permukaan tanah. Periode pemasangan lampu dilakukan sampai batas tertentu fase vegetatif (2-8 minggu) untuk mendorong pembentukan bunga.

b. Suhu Udara (Temperatur)

Di daerah tropis, seperti Indonesia, suhu udara yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman krisan adalah antara 20°C-26°C (siang hari). Toleransi tanaman krisan terhadap faktor suhu udara untuk tetap tumbuh baik adalah antara 17°C-30°C. Suhu udara berpengaruh langsung terhadap pembungaan krisan. Suhu udara yang ideal untuk pembungaan adalah antara 16°C – 18°C. Pada suhu tinggi (lebih dari 18°C) bunga krisan cenderung berwarna kusam, sedangkan suhu rendah (kurang dari 16°C) berpengaruh baik terhadap warna bunga karena cenderung lebih cerah.

c. Kelembapan Udara

Tanaman krisan umumnya membutuhkan kondisi kelembapan udara (rH) tinggi. Pada fase pertumbuhan awal, seperti perkecambahan benih atau pembentukan akar bibit setek, diperlukan kelembapan udara antara 90% - 95%. Tanaman muda sampai dewasa tumbuh dengan baik (prima) pada kondisi kelembapan udara (rH) antara 70%- 80%. Kelembapan udara yang tinggi perlu diimbangi dengan sirkulasi udara yang memadai (lancar) di sekitar kebun. Bila kelembapan udara tinggi,

sementara sirkulasi udara jelek dapat menyebabkan mudah berkembang organisme penyebab penyakit, terutama cendawan (jamur).

d. Curah Hujan

Air hujan merupakan salah satu sumber air yang dibutuhkan tanaman krisan agar tumbuh prima. Hujan deras atau keadaan curah hujan tinggi yang langsung menerpa tanaman krisan menyebabkan tanaman mudah roboh, rusak, dan kualitas bunganya rendah. Tanaman krisan membutuhkan air dalam jumlah memadai, tetapi tidak tahan terhadap terpaan hujan deras. Oleh karena itu pembudidayaan krisan di daerah bercurah hujan tinggi dapat dilakukan di dalam bangunan rumah plastik (*sere*) dan *greenhouse*.

e. Karbondioksida (CO₂)

Kondisi alami di habitat terbuka, kandungan (kadar) CO₂ sekitar 300 ppm. Karbondioksida berperan penting dalam proses metabolisme tanaman khususnya proses fotosintesis. Bila kadar CO₂ ditingkatkan, dapat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan proses fotosintesis tanaman. Kadar CO₂ yang ideal dan dianjurkan untuk memacu kemampuan fotosintesis tanaman krisan adalah antara 600 ppm – 900 ppm. Oleh karena itu, pada pembudidayaan tanaman krisan dalam bangunan tertutup, seperti rumah plastik dan *greenhouse*, dapat ditambahkan CO₂ hingga mencapai kadar yang dianjurkan.

f. Ketinggian Tempat

Di Indonesia keadaan suhu udara ditentukan oleh ketinggian tempat dari atas permukaan laut (dpl). Daerah yang berketinggian antara 1.250 m – 3.000 m dpl bersuhu antara 10°C – 18°C, sedangkan daerah berketinggian antara 700 m – 1.500 m dpl suhu udaranya antara 18°C – 22°C. Setiap ketinggian tempat naik 100 m, suhu udaranya turun 1°C.

Tanah yang ideal untuk budidaya krisan yaitu tekstur liat berpasir, subur, gembur, drainase baik, pH 5,5-6,5 (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2006).

Tanah yang ideal untuk tanaman krisan adalah bertekstur liat berpasir, subur, gembur dan drainasenya baik. Air tanah dalam keadaan kapasitas lapang (lembab tetapi tidak becek) sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman bunga. Masa kritis tanaman ini adalah saat pertumbuhan vegetatif cepat, penanaman, penumbuhan dan pembentukan bunga. Kelembaban tanah yang ideal untuk pembentukan akar bibit, setek 90-95% dan tanaman muda dewasa dalam pertumbuhan dan hasil tanaman bunga berkisar antara 70-80 %. Hal ini dilihat dari perkembangan jumlah daun, kuncup bunga dan jumlah bunga. Jumlah kebutuhan air pertanaman selama fase pertumbuhan akar adalah 200 ml tiap 2 hari dan meningkat menjadi 400 ml tiap 2 hari pada fase vegetatif. Upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, penerapan sistem irigasi tetes untuk lahan kering tampaknya akan lebih efisien, baik ditinjau dari segi penggunaan air maupun respon tanaman terhadap pemberian air pengairan (Sumarni, 2003).

3. Manfaat Tanaman Krisan

Kegunaan tanaman krisan yang utama adalah sebagai bunga hias. Manfaat lain adalah sebagai tumbuhan obat tradisional dan penghasil racun serangga. Sebagai bunga hias, krisan di Indonesia digunakan sebagai:

- a. Bunga pot dengan sosok tanaman kecil, tingginya 20-40 cm, berbunga lebat dan cocok ditanam di pot, polibag atau wadah lainnya. Contoh krisan mini.
- b. Bunga potong dengan sosok bunga berukuran pendek sampai tinggi, mempunyai tangkai bunga panjang, ukuran bervariasi (kecil, menengah dan besar), umumnya ditanam di lapangan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bunga potong (Rukmana dan Mulyana 1997).
- c. Bunga krisan juga bermanfaat bagi kesehatan. Bunga krisan yang telah dikeringkan, berkhasiat menyembuhkan panas dalam dan menyerap racun dalam tubuh. Selain itu juga tersedia obat-obatan berbahan baku bunga krisan. Beragam kemasan dan merek ditawarkan pada konsumen yang membutuhkan, salah satunya teh *Chrysanthemum* seharga Rp. 7500 per pak isi 10 saset. Ada juga teh krisan yang telah diracik dengan madu, dan buah *Louhanguo*. Sementara bunga krisan yang telah dikeringkan dan siap seduh dijual seharga Rp. 5000 per 40 gram. Manfaat yang terkandung dalam teh kemasan seduh itu efektif dan sesuai untuk anak muda dan orang tua dalam segala kondisi, teh menyegarkan tenggorokan, memperindah bentuk tubuh, memulihkan kesehatan, dan baik untuk menjaga kesehatan mata. Ahli tanaman obat Prof. dr. Azwar Agoes

mengatakan, untuk tumbuhan sejenis bunga krisan biasanya mengandung zat antioksidan yang mampu menyerap racun dalam tubuh. Meskipun belum populer penggunaannya sebsagai obat-obatan, bunga krisan juga dapat melancarkan peredaran darah.

- d. Jus yang terbuat dari krisan bisa dijadikan obat untuk demam. Anda juga dapat menggunakannya untuk mengurangi pembengkakkan dan kemerahan pada mata akibat polusi.
- e. Minuman yang terbuat dari bunga krisan dapat membantu mengobati flu, demam, sakit kepala, dan hipertensi.
- f. Kemudian dalam manfaat bunga krisan dalam dunia ekonomi adalah banyak dijual sebagai bunga potong (Rukmana dan Mulyana1997).

C. *Limbah Sayuran*

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan, telah diambil bagian utamanya, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya lagi dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam (Amurwaraharja, 2009).

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Istilah sampah organik basah dimasukkan sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya kulit buah dan sisa sayuran.

Sedangkan bahan yang termasuk sampah organik kering adalah sampah yang memiliki kandungan air yang rendah. Contoh sampah organik kering adalah kayu atau ranting kering, dan dedaunan kering (Purwendro dan Nurhidayat, 2007).

Bahan baku pupuk organik yang sangat bagus dari sampah organik yaitu bahan organik atau bahan organik yang mempunyai kandungan air tinggi seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran. Selain mudah terkomposisi, bahan ini juga kaya akan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Semakin besar kandungan selulosa dari bahan organik (C/N rasio) maka proses penguraian oleh bakteri akan semakin lama (Purwendro dan Nurhidayat, 2006).

D. Pupuk Organik Cair

Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik atau makhluk hidup yang telah mati. Bahan organik ini akan mengalami pembusukan oleh mikroorganisme sehingga sifat fisiknya akan berbeda dari semula. Pupuk organik termasuk pupuk majemuk lengkap karena unsur haranya lebih dari satu unsur yang mengandung dan mengandung unsur mikro (Hadisuwito, 2007).

Berdasarkan cara pembuatannya, pupuk organik terbagi menjadi dua bagian kelompok, yaitu: Pupuk organik alami dan pupuk organik buatan. Jenis pupuk yang tergolong dalam pupuk organik alami yang benar-benar langsung diambil dari alam seperti, dari sisa-sisa hewan, tumbuhan, tanah baik dengan atau tanpa sentuhan teknologi yang berarti. Pupuk yang termasuk ke dalam ini antara lain: pupuk

kandang, kompos, pupuk hijau, humus dan pupuk burung. Pupuk organik buatan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pupuk tanaman yang bersifat alami atau non kimia, berkualitas baik dengan bentuk ukuran, dan kemasan yang praktis, mudah didapat, didistribusikan, dan diaplikasikan, serta dengan kandungan unsur hara yang lengkap dan terukur. Berdasarkan bentuknya ada dua jenis pupuk organik buatan yaitu, padat dan cair (Marsono dan Paulus, 2001).

Jenis sampah organik yang bisa diolah menjadi pupuk organik adalah:

- a. Sampah sayur baru
- b. Sisa sayur basi, tetapi harus dicuci dulu, peras, lalu dibuang airnya
- c. Sisa nasi
- d. Sisa ikan, ayam, kulit telur
- e. Sampah buah (anggur, kulit jeruk, apel, dll). Tetapi tidak termasuk kulit buah yang keras seperti salak.

Sampah organik yang tidak bisa diolah:

- a. Protein seperti daging, ikan, udang, juga lemak, santan, susu karena mengandung lalat sehingga tumbuh belatung.
- b. Biji-biji yang utuh atau keras seperti biji salak, asam, lengkeng, alpukat dan sejenisnya. Buah utuh yang tidak dimakan karena busuk dan berair seperti pepaya, melon, jeruk anggur.
- c. Sisa sayur yang berkuah harus dibuang airnya, kalau bersantan harus dibilas air dan ditiriskan (Litauditomo, 2007).

Menurut Simamora, dkk (2005) pupuk cair organik adalah pupuk yang bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mengalami fermentasi dan bentuk produknya berupa cairan. Kandungan bahan kimia didalamnya maksimum 5%. Penggunaan pupuk cair organik memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Pengaplikasiannya lebih mudah jika dibandingkan dengan pupuk organik padat.
2. Unsur hara yang terdapat di dalam pupuk cair mudah diserap tanaman.
3. Mengandung mikroorganisme yang jarang terdapat pada pupuk organik padat
4. Pencampuran pupuk cair organik dengan pupuk padat organik mengaktifkan unsur hara yang ada dalam pupuk organik padat tersebut.

Sedangkan menurut Hadisuwito (2007). Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan manusia, yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik ini adalah dapat secara cepat mengatasi defisiensi hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara, dan mampu menyediakan hara secara cepat. Dibandingkan dengan pupuk anorganik, pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walaupun digunakan sesering mungkin. Selain itu, pupuk ini juga memiliki bahan pengikat, sehingga larutan pupuk yang diberikan ke permukaan tanah bisa langsung digunakan oleh tanaman (Hadisuwito, 2007).

Tindakan pengembalian/penambahan zat-zat hara ke dalam tanah ini disebut pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan harus sesuai kebutuhan, sehingga diperlukan metode diagnosis yang benar agar unsur hara yang ditambahkan hanya

yang dibutuhkan oleh tanaman dan yang kurang di dalam tanah. Konsentrasi, waktu, dan cara pemberian harus tepat agar tidak merugikan dan tidak merusak lingkungan akibat kelebihan konsentrasi serta waktu dan cara aplikasinya. Pupuk digolongkan menjadi dua yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk dapat berbeda pengertiannya sesuai dengan cakupan luasannya. Menurut jumlah unsur haranya pupuk dibedakan menjadi pupuk tunggal dan majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang digunakan untuk menyuplai satu jenis hara, sekalipun di dalamnya terdapat beberapa hara lainnya sebagai ikatan, sedangkan pupuk majemuk merupakan kombinasi campuran secara fisik atau formulasi pupuk (dua atau lebih pupuk tunggal) untuk memasok dua atau lebih unsur hara sekaligus (Amilia, 2011).

Pupuk organik cair adalah jenis pupuk berbentuk cair tidak padat mudah sekali larut pada tanah dan membawa unsur-unsur penting untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk organik cair mempunyai banyak kelebihan diantaranya, pupuk tersebut mengandung zat tertentu seperti mikroorganisme jarang terdapat dalam pupuk organik padat dalam bentuk kering. Pupuk organik cair apabila dicampur dengan pupuk organik padat, dapat mengaktifkan unsur hara dalam pupuk organik padat (Syefani, 2003).

Ketersediaan hara dalam tanah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pemberian konsentrasi pupuk tepat akan mempengaruhi hasil tanam suatu tanaman. Upaya-upaya untuk menjaga ketersediaan hara dalam tanah selain

pemberian konsentrasi pupuk, dapat juga melalui frekuensi pemberian pupuk, cara pemberian dan bentuk pupuk digunakan secara tepat (Bastari, 1996).

Pupuk organik cair kebanyakan diaplikasikan melalui daun atau disebut sebagai pupuk cair foliar mengandung hara makro dan mikro esensial (N, P, K, S, Ca, Mg, B, Mo, Cu, Fe, Mn, dan bahan organik). Pupuk organik cair mempunyai beberapa manfaat diantaranya dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara, dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, cekaman cuaca dan serangan patogen penyebab penyakit, merangsang pertumbuhan cabang produksi, meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah, mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah (Susanto, 2002).

E. Fermentasi

Fardiaz (1992) menyatakan bahwa fermentasi sebagai proses pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anaerobik, yaitu tanpa memerlukan oksigen. Senyawa yang dapat dipecah dalam proses fermentasi terutama karbohidrat, sedangkan asam amino hanya dapat difermentasi oleh beberapa jenis bakteri tertentu.

Tetes tebu merupakan sumber karbon dan nitrogen bagi ragi. Prosesnya merupakan proses fermentasi. Prinsip fermentasi adalah proses pemecahan senyawa

organik menjadi senyawa sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Mikroorganisme ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan karbon (C) dan Nitrogen (N) yang merupakan faktor penentu keberhasilan dalam proses fermentasi. Tetes tebu berfungsi untuk fermentasi dan menyuburkan mikroba yang ada di dalam tanah, karena dalam tetes tebu (molasses) terdapat nutrisi bagi bakteri *Sacharomyces cereviceae*. *Sacharomyces cereviceae* bertugas untuk menghancurkan material organik dan tentunya mereka juga membutuhkan nitrogen (N) dalam jumlah yang tidak sedikit untuk nutrisi mereka. Nitrogen (N) akan bersatu dengan mikroba selama penghancuran material organik. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan material tetes tebu yang mengandung komponen nitrogen sangat diperlukan untuk menambah kandungan unsur hara agar proses fermentasi berlangsung dengan sempurna. Selain itu, berdasarkan kenyataan bahwa tetes tebu tersebut mengandung karbohidrat dalam bentuk gula yang tinggi (64%) disertai berbagai nutrisi yang diperlukan jasad renik juga dapat meningkatkan kecepatan proses menjadi pupuk dalam waktu yang relatif singkat (Martinsari, 2010).

F. *Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman*

Pertumbuhan merupakan suatu proses dalam kehidupan tanaman, dari proses tersebut akan terjadi perubahan ukuran yaitu tanaman akan tumbuh semakin besar dan akan berkolerasi positif dalam menentukan hasil tanaman. Pertambahan ukuran

tersebut secara keseluruhan dikendalikan oleh sifat genetik disamping faktor-faktor lainnya seperti lingkungan (Trenggono, 2011).

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan proses yang penting dalam kehidupan dan perkembangbiakan suatu spesies. Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara terus-menerus sepanjang daur hidup, bergantung pada tersedianya meristem, hasil asimilasi, hormon dan substansi pertumbuhan lainnya, serta lingkungan yang mendukung (Gardner, 2008).

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu koordinasi yang baik dari banyak peristiwa pada tahap yang berbeda, yaitu tahap biofisika dan biokimia ke tahap organisme dan menghasilkan suatu organisme yang utuh dan lengkap (Nasaruddin, 2010).

Pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan ukuran tanaman sebagai akibat adanya pembelahan dan pembesaran sel, termasuk sintesis berbagai bahan seluler dan organisasi organel-organel subseluler. Pertumbuhan merupakan suatu proses yang tidak dapat balik (*irreversible*), dan laju pertumbuhan dapat diukur dengan menghitung peningkatan berat segar, berat kering, volume, panjang, tinggi atau luas area. Oleh karena ukurannya bertambah, maka bentuk tanaman pun berubah-ubah sebagaimana ditentukan oleh faktor-faktor genetiknya (Zulkarnain, 2009).

Perkembangan dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan yang teratur dan berkembang menuju suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur, atau lebih

kompleks. Perkembangan menyangkut suatu seri perubahan pada organisme yang terjadi sepanjang daur kehidupan tumbuhan yang meliputi pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan dapat terjadi tanpa pertumbuhan dan sebaliknya pertumbuhan dapat terjadi tanpa perkembangan, tetapi kedua proses ini saling berhubungan dan terkait dalam suatu proses (Nasaruddin, 2010).

Istilah perkembangan, mengarah pada total pertumbuhan yang bertahap dan progresif baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang meliputi transformasi dari satu zigot menjadi tanaman dewasa yang reproduktif. Fenomena ini dicirikan oleh perubahan ukuran dan berat, munculnya struktur dan fungsi baru serta hilangnya struktur dan fungsi yang lama. Perkembangan dapat dipandang sebagai suatu fenomena yang terdiri atas tiga proses, yang biasanya terjadi secara bersamaan, yakni pertumbuhan, diferensiasi seluler dan morfogenesis (Zulkarnain, 2009).

Perkembangan pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal (dalam) dan faktor luar (lingkungan). Faktor internal yaitu faktor yang melibatkan hormon yang akan mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor luar yang erat hubungannya dengan proses perkembangan. termasuk ke dalam faktor ini adalah panjang pendeknya hari, suhu, nutrisi, dan lain-lain (Nasaruddin, 2010).

Menurut Soemarno (2011), menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal) yaitu:

1. Faktor Dalam (Internal)

Faktor internal disebut juga sebagai faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena faktor yang mempengaruhi tersebut berasal dari dalam tanaman itu sendiri yang meliputi:

- a. Gen, ternyata dapat mengatur pola pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup tidak terkecuali tumbuhan melalui sifat yang diturunkan dari induknya.
- b. Hormon:
 - 1) Auksin, berfungsi dalam pembentangan dan proses pembelahan sel serta merangsang pembentukan bunga dan buah.
 - 2) Giberelin, dan membantu menyebabkan tanaman berbunga sebelum waktunya dan memacu aktifitas kambium, menyebabkan tanaman tumbuh tinggi, menghasilkan buah tanpa biji, dan membantu perkecambahan biji.
 - 3) Gas etilen, berfungsi mempercepat pemasakan buah, mempertebal pertumbuhan batang, dan menyebabkan pengguguran bunga.
 - 4) Sitokinin, berfungsi merangsang pertumbuhan akar, mempercepat pelebaran daun, merangsang pertumbuhan tanaman ke arah samping dan pucuk, merangsang aktivitas pembelahan sel, serta membantu perkecambahan biji.
 - 5) Asam Absisat, berfungsi mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel, membantu pengguguran bunga, serta menyebabkan dormansi (Soemarno, 2011).

2. Faktor Luar (Eksternal)

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman juga sangat di pengaruhi oleh kondisi eksternal lingkungan yang meliputi suhu, kelembaban udara, cahaya, air, dan mineral-mineral, serta ketersediaan oksigen yang mencukupi (Puspita, 2011).

a. Suhu

Tanaman membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh. Suhu paling rendah yang masih memungkinkan suatu tumbuhan untuk tumbuh disebut suhu minimum, suhu tertinggi yang masih memungkinkan suatu tanaman untuk tumbuh disebut suhu maksimum. Suhu dimana tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan maksimal disebut suhu optimum.

b. Kelembaban

Baik tanah maupun udara yang lembab berpengaruh baik bagi pertumbuhan tanaman.

c. Air

Air berfungsi dalam fotosintesis yang mengaktifkan reaksi enzimatik, menjaga kelembaban, dan membantu perkecambahan pada biji.

d. Cahaya

Cahaya menghambat pertumbuhan tinggi tanaman karena dapat menguraikan auksin. Tetapi, cahaya juga merangsang pembungaan tumbuhan tertentu. Adapun tumbuhan yang dapat berbunga pada hari pendek dan adapula pada hari panjang. Hal

itu dapat terjadi karena pada tumbuhan terdapat hormon fitokrom yang mengatur pengaruh cahaya ini dalam pertumbuhan dan perkembangan pembungaan tanaman.

G. Unsur Hara Esensial Tumbuhan

Beraneka ragam unsur dapat ditemukan di dalam tubuh tumbuhan, tetapi tidak berarti bahwa seluruh unsur-unsur tersebut dibutuhkan tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Beberapa unsur yang ditemukan di dalam tubuh tumbuhan malah dapat mengganggu metabolisme atau meracuni tumbuhan, sebagai contoh adalah beberapa jenis logam berat seperti Al, Cd, Ag, dan Pb. Suatu unsur dikatakan esensial bagi tumbuhan adalah jika tumbuhan tidak dapat melengkapi daur hidupnya (sampai menghasilkan biji yang dapat tumbuh) apabila unsur tersebut tidak tersedia. Unsur tersebut merupakan penyusun suatu molekul atau bagian tumbuhan yang esensial bagi kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Misalnya N sebagai penyusun protein dan Mg sebagai penyusun klorofil (Lakitan, 2011).

Nutrisi yang diberikan pada tanaman harus mampu memenuhi semua unsur hara yang dibutuhkan tanaman, yang meliputi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro meliputi Karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Belerang (S), Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg). Unsur hara mikro meliputi Boron (B), Klor (Cl), Tembaga (Cu), Besi (Fe), Mangan (Mn), Molibdenum (Mo) dan Seng (Zn). Tanaman membutuhkan unsur hara esensial karena bila salah satu saja diantaranya tidak tersedia maka tanamannya akan mati

atau minimal tanaman tidak mampu menyelesaikan siklus hidupnya (Sukawati, 2010).

Dalam jaringan tumbuhan nitrogen merupakan komponen penyusun dari banyak senyawa esensial bagi tumbuhan, misalnya asam-asam amino. Karena setiap molekul protein tersusun dari asam-asam amino dan setiap enzim adalah protein dan enzim. Selain itu nitrogen juga merupakan unsur penyusun protein dan enzim. Selain itu nitrogen juga terkandung dalam klorofil, hormon sitokinin, dan auksin (Lakitan, 2011).

Fosfor umumnya ada dalam konsentrasi yang sangat rendah dalam larutan tanah. P merupakan komponen penting penyusun senyawa untuk transfer energi (ATP dan *nucleoprotein* lain), untuk sistem informasi genetik (DNA dan RNA), untuk membran sel (fosfolipid), dan fosfoprotein. Fosfor itu bergerak dan diretribusi dari jaringan tua ke jaringan muda, sehingga gejala defisiensi pertama kali ditunjukkan oleh daun-daun tua (Gardner, 2008).

Tanaman menyerap P dalam bentuk ortofosfat primer (H_2PO_4) dan sebagian kecil dalam bentuk ortofosfat sekunder (HPO_4) (Barker and Pilbeam, 2007). Bentuk P dalam tanah dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu organik dan anorganik. Proporsi kedua bentuk P tersebut sangat bervariasi. Nilai P-organik dilaporkan antara 5-80% (Richardson *et al*, 2005; Hao *et al*, 2008).

Nitrogen (N) dan Fosfor (P) merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Nitrogen merupakan unsur penting dalam

pembentukan klorofil, protoplasma, protein, dan asam-asam nukleat. Unsur ini mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan semua jaringan hidup (Brady and Weil, 2002). Fosfor merupakan komponen penting penyusun senyawa untuk transfer energi (ATP dan nukleoprotein lain), untuk sistem informasi genetik (DNA dan RNA), untuk membran sel (fosfolipid), dan fosfoprotein (Gardner *et al.*, 1991; Lambers *etal*, 2008).

Nitrogen pada umumnya diserap tanaman dalam bentuk NH_4^+ atau NO_3^- , yang dipengaruhi oleh sifat tanah, jenis tanaman dan tahapan dalam pertumbuhan tanaman. Pada tanah dengan pengastusan yang baik N diserap tanaman dalam bentuk ion nitrat, karena sudah terjadi perubahan bentuk NH_4^+ menjadi NO_3^- , sebaliknya pada tanah tergenang tanaman cenderung menyerap NH_4^+ (Havlin *et al.*, 2005). N adalah unsur yang mobil, mudah sekali terlindi dan mudah menguap, sehingga tanaman seringkali mengalami defisiensi.

Kalium berasal dari mineral-mineral primer dan mineral sekunder seperti misalnya tanah liat. Kalium berfungsi membantu memelihara potensial osmosis dan pengambilan air. Tanaman yang cukup kalium hanya kehilangan sedikit air karena K meningkatkan potensial osmotik dan mempunyai pengaruh positif juga terhadap penutupan stomata. Kalium dapat juga berfungsi untuk menyeimbangkan muatan-muatan anion dan mempengaruhi pengambilan dan transport anion tersebut kalium juga dapat mengurangi berjangkitnya penyakit-penyakit tertentu. Kalium berperan

penting dalam fotosintesis karena secara langsung meningkatkan pertumbuhan dan indeks luas daun (Lakitan, 2011).

Menurut Wang *et al.* (2007) dan Homer (2008) bahwa kondisi pertumbuhan tanaman yang baik akibat tercukupinya hara N akan menyebabkan tanaman mampu menyerap P lebih efektif.

Sebagian besar belerang dalam tumbuhan terdapat sebagai penyusun asam amino sistein (*cysteine*) dan methionin (*methionine*). Senyawa lain yang mengandung belerang adalah vitamin thiamin (*thiamine*) dan biotin. Belerang juga terkandung dalam koenzim A, yakni suatu senyawa esensial untuk respirasi dan sintesis serta penguraian asam-asam lemak (*fatty acid*) (Lakitan, 2011).

Magnesium merupakan bagian dari molekul klorofil suatu aktivator enzim-enzim fotosintesis serta respirasi dan diperlukan untuk sintesis protein. Magnesium dapat didistribusikan kembali dalam tanaman, sehingga gejala defisiensi pertama kali tampak pada daun-daun tua sebagai klorosis antar urat daun (Gardner, 2008).

Magnesium diserap oleh tanaman dalam bentuk Mg^{2+} dan berfungsi dalam pembentukan klorofil dan sistem enzim. Tanaman yang kekurangan magnesium, daunnya akan menguning karena pembentukan klorofil terganggu. Dibandingkan dengan hara lain, magnesium mempunyai peranan terbanyak sebagai aktivator maupun kofaktor enzim terutama yang terlibat dalam reaksi dengan substrat yang mengandung fosfor. Kekurangan magnesium menyebabkan terjadinya klorosis, diikuti dengan merosotnya laju fotosintesis dan asimilasi (Hardjowigeno, 1987).

Ketersediaan dan penyerapan magnesium oleh tanaman akan menurun pada kondisi tanah yang masam karena pengaruh pH. Peningkatan pH tanah akan meningkatkan penyerapan magnesium oleh tanaman (Mortvedt dan Cox, 1985). Magnesium hilang dari tanah melalui tiga cara yaitu erosi, diangkut tanaman dan melalui pencucian (Soepardi, 1983).


Perang penting unsur kalsium adalah sebagai pengikat antara molekul-molekul fosfolipida atau antara fosfolipida dengan protein penyusun membran, hal ini menyebabkan membran dapat berfungsi secara normal pada semua sel. Kalsium juga dapat memacu aktivitas beberapa enzim, sekaligus dapat menghambat aktivitas enzim (Lakitan, 2011).

H. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh berbagai konsentrasi pupuk organik cair dari limbah sayuran terhadap pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*).
2. Terdapat konsentrasi pupuk organik cair dari limbah sayuran yang memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*).

I. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Samata, Kabupaten Gowa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif eksperimental yang menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen.

Metode ini bersifat *validation* atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas (*independent variables*) dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat (*dependent variables*). Metode ini bersifat *validation* atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas (*Independent variables*) dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat (*Dependent variables*). Penelitian ini merupakan eksperimen murni.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah pupuk organik cair dari limbah sayuran dan variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*).

D. Defenisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Pupuk organik cair merupakan pupuk organik yang berbentuk cair yang dibuat dari bahan dasar limbah sayuran mengandung unsur hara yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yang diberikan pada tanaman krisan dengan berbagai konsentrasi. Adapun konsentrasi yang digunakan yaitu konsentrasi 0 ml/l air (K0), 5 ml/l air (K1), 10 ml/l air (K2), 15 ml/l air (K3), 20 ml/l air (K4) dan 25 ml/l air (K5).
2. Pertumbuhan tanaman krisan didefinisikan sebagai bertambahnya jumlah ukuran sel yang diukur dengan pertambahan tinggi tanaman (cm), pertambahan jumlah daun (helai), pertambahan panjang daun (cm) dan pertambahan diameter batang (cm).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pengamatan dan pengukuran langsung, dan pencatatan hasil dilakukan dengan bantuan kamera foto.

Parameter pengamatan pada penelitian ini yaitu:

a. **Pertambahan Tinggi Tanaman (cm)**

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan cara menggunakan mistar dengan pengamatan pertama 2 minggu setelah tanam (MST) dan dilanjutkan seminggu sekali 7 kali pengamatan. Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang (permukaan media) hingga bagian bagian titik tumbuh atau ujung batang.

b. **Pertambahan Jumlah Daun (helai)**

Menghitung jumlah daun dengan cara menghitung daun yang sudah membuka sempurna.

c. **Pertambahan Panjang Daun (cm)**

Pengukuran panjang daun dilakukan dengan cara mengukur panjang helaian daun dimulai dari pangkal helaian daun hingga ujung daun.

d. **Pertambahan Diameter Batang (cm)**

Pengamatan dilakukan dengan mengukur diameter utama batang tanaman.

F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah kantong kain berlubang-lubang, tali, pisau, talenan, timbangan, gelas ukur, pengaduk, saringan, corong, jerigen, ember, gayung, kamera, naungan plastik transparan, saringan, pengaduk, bambu dan alat tulis menulis.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi limbah sayuran, daun pandan, nenas, bioaktivator (EM4), molase (tetes tebu), air bersih, air cucian beras (cucian pertama), air kelapa yang sudah tua, sabun krim, sekam padi, pupuk kandang, tanah, *polybag*, pembibitan hasil kultur jaringan krisan dan label.

G. Prosedur Kerja

Rancangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor dengan 6 perlakuan dan 4 kali ulangan dan terdapat 2 unit ulangan, sehingga terdapat 24 unit dalam ulangan percobaan.

Perlakuan terdiri dari :

K0 = Konsentrasi pupuk organik cair 0 ml (Perlakuan Kontrol).

K1 = Konsentrasi pupuk organik cair 5 ml/l air

K2 = Konsentrasi pupuk organik cair 10 ml/l air

K3 = Konsentrasi pupuk organik cair 15 ml/l air

K4 = Konsentrasi pupuk organik cair 20 ml/l air

K5 = Konsentrasi pupuk organik cair 25 ml/l air

1. Pembuatan Pupuk Organik Cair

Limbah sayuran ditimbang sebanyak 10 kg kemudian dicacah dengan menggunakan pisau dan alas talenan, bahan dicacah agar proses penguraian dapat berlangsung lebih cepat. Limbah sayuran dimasukkan ke dalam kantong berlubang-lubang dan ditekan sampai padat. Kantong diikat dengan menggunakan tali. Kemudian membuat larutan dengan mencampurkan air bersih sebanyak 7 liter, air cucian beras (cucian pertama) 1 liter, air kelapa yang sudah tua 1 liter, molase 500 ml dan cairan mikroorganisme EM4 (bioaktivator) 500 ml ke dalam ember. Kemudian memasukkan kantong yang berisi bahan ke dalam ember yang telah berisi larutan hingga kantong terendam seluruhnya. Untuk mengurangi bau khas, larutan ditambahkan dengan daun pandan dan nenas. Mengoles permukaan mulut ember dengan sabun krim untuk mencegah lalat tidak masuk dan bertelur. Menutup ember dengan rapat sehingga udara tidak masuk. Menyimpan ember di tempat teduh, terhindar dari sinar matahari selama 14 hari dan dilakukan pengadukan 3 hari sekali, proses fermentasi yang berhasil ditandai dengan adanya bercak-bercak putih pada permukaan cairan. Setelah nantinya proses fermentasi berhasil kemudian cairan diambil dengan cara menyaring larutan. Cairan merupakan pupuk organik cair yang telah jadi.

2. Media Tanam

Media tanam untuk penanaman terdiri dari media tanah, sekam padi, dan pupuk kandang. Kemudian mencampur semua media tanam dengan perbandingan 2:1:2 dan memasukkan ke dalam polybag ukuran 15 x 30 cm.

3. Penanaman

Penanaman dilakukan dengan terlebih dahulu membuat lubang tanam, kemudian bibit dipindahkan dengan memilih bibit yang sehat dan telah berdaun rata-rata 2 helai.

4. Pemeliharaan

Penyiraman dilakukan secara rutin setiap hari dengan melihat kondisi media. Penyiraman dilakukan secara manual menggunakan gayung. Pemberian pupuk organik cair dilakukan seminggu sekali dan diberikan pada tanaman dengan cara dicampurkan pupuk organik cair dengan air sesuai dengan perlakuan lalu disiram pada media. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara mekanik yaitu jika terlihat ada gejala penyakit maka segera membuang bagian tanaman, dan jika ada hama dengan cara membuang hama tersebut.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis sidik ragam dan bila hasil sidik ragam berbeda nyata ($F_{hitung} > F_{tabel 5\%}$) atau berbeda sangat nyata ($F_{hitung} > F_{tabel}$)

1%) maka untuk membandingkan dua rata-rata perlakuan dilakukan uji lanjutan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tinggi Tanaman

Rata-rata pertambahan tinggi tanaman (cm) krisan (*Chrysanthemum morifolium*) (9 MST-8MST) serta sidik ragamnya disajikan pada Tabel Lampiran 1a dan 1b. Sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik cair berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman ke VI ((MST-8 MST).


Tabel 4.1. Hasil uji BNT pertambahan tinggi tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST)

Perlakuan	Ulangan				Rata-rata	NP BNT 0,05
	I	II	III	IV		
K0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00 ^b	2,131
K1	0.50	2.00	1.00	2.00	1.38 ^{ab}	
K2	0.00	0.80	0.50	2.00	0.83 ^b	
K3	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00 ^a	
K4	1.00	0.50	0.30	2.00	0.95 ^b	
K5	1.00	2.50	0.30	0.50	1.08 ^b	

keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata. Dan apabila angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf uji BNT $\alpha=0,05$ dan 0,01

Hasil uji BNT $\alpha(0.05)$ pada Tabel 4.1 menunjukan bahwa pada pertambahan ke VI (minggu IX-VIII), perlakuan 15 ml/l air (K3) menghasilkan pertambahan tinggi tanaman tertinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Perlakuan kontrol (K0), perlakuan 5 ml/l air (K1), 10 ml/l air (K2), 20 ml/l air (K4) dan perlakuan 25 ml/l air (K5) tidak berbeda nyata.

Perbandingan rata-rata pertambahan tinggi tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST)

2. Jumlah Daun

Rata-rata pertambahan jumlah daun (helai) tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST) serta sidik ragamnya disajikan pada Tabel Lampiran 2a dan 2b. Sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik cair berpengaruh nyata terhadap pertambahan jumlah daun (helai) tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST).


Tabel 4.2. Hasil uji BNT penambahan jumlah daun tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-MST)

Perlakuan	Ulangan				Rata-rata	NP BNT 0,05
	I	II	III	IV		
K0	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00 ^b	2,131
K1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00 ^a	
K2	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00 ^b	
K3	2.00	1.00	0.00	2.00	1.25 ^{ab}	
K4	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50 ^b	
K5	1.00	0.00	0.00	2.00	0.75 ^b	

keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata. Dan apabila angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf uji BNT $\alpha=0,05$ dan $0,01$

Hasil uji BNT $\alpha(0.05)$ pada Tabel 4.2 menunjukan bahwa pada penambahan ke VI (9 MST-8MST), perlakuan 5 ml/l air (K1) menghasilkan pertambahan jumlah daun lebih banyak dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, perlakuan kontrol (K0), perlakuan 10 ml/l air (K2), 15 ml/l air (K3), 20 ml/l air (K4) dan perlakuan 25 ml/l air (K5) berbeda tidak nyata.

Perbandingan rata-rata jumlah daun (helai) tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 4.2. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST)

3. Panjang Daun

Rata-rata Pertambahan panjang daun (cm) tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST) serta sidik ragamnya disajikan pada Tabel Lampiran 3a dan 3b. Sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik cair berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan panjang daun tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST).

Perbandingan rata-rata pertambahan panjang daun (cm) tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST)

Perlakuan 15 ml/l air (K3) menghasilkan pertambahan panjang daun yang lebih panjang dibandingkan dengan perlakuan lain dan berbeda tidak nyata terhadap perlakuan lainnya.

B. Pembahasan

Pertumbuhan merupakan suatu proses dalam kehidupan tanaman, dari proses tersebut akan terjadi perubahan ukuran yaitu tanaman akan tumbuh semakin besar dan akan berkolerasi positif dalam menentukan hasil tanaman. Pertambahan ukuran tersebut secara keseluruhan dikendalikan oleh sifat genetik disamping faktor-faktor lainnya seperti lingkungan (Trenggono, 2011).

Pertumbuhan tanaman krisan merupakan bertambahnya ukuran tanaman krisan ditandai dengan terbentuknya suatu organ pada tanaman yang mengalami perubahan antara lain terbentuknya daun dan perpanjangan batang yang diukur dengan pertambahan tinggi tanaman (cm), pertambahan jumlah daun (helai), pertambahan panjang daun (cm) dan pertambahan diameter batang (cm). Setiap parameter diukur setiap minggu hingga umur 9 minggu setelah tanam. Pada penelitian ini menggunakan pertambahan karena, pada tanaman krisan ditanam di media tanam memiliki ukuran tinggi yang berbeda, jumlah daun yang berbeda, pertambahan panjang daun yang berbeda dan diameter batang yang berbeda.

Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan pada pupuk organik cair terdapat *Saccharomyces cerevisiae*. *Saccharomyces cerevisiae* merupakan spesies yang termasuk dalam khamir berbentuk oval. *Saccharomyces cerevisiae* bersifat fermentatif, yaitu mampu melakukan fermentasi, yang memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Namun, dengan adanya oksigen, *S. cerevisiae* juga dapat melakukan respirasi yaitu mengoksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air.

Kalium digunakan oleh mikroorganisme dalam bahan substrak sebagai katalisator, dengan kehadiran bakteri dan aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kandungan kalium. Kalium diikat dan disimpan dalam sel oleh bakteri dan jamur.

Fermentasi adalah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme baik aerob dan anaerob yang bertujuan untuk mengubah senyawa kimia ke substrat organik. Fermentasi dapat terjadi karena aktivitas mikroorganisme penyebab fermentasi pada bahan organik yang sesuai, proses ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan tersebut. Menurut hasil penelitian Azizah (2012), semakin lama waktu yang digunakan untuk fermentasi, maka semakin banyak gas yang CO₂ yang dihasilkan. Fermentasi selama 60 jam pada bioetanol dengan substitusi kulit nanas dengan penambahan *Saccharomyces cerevisiae* berpengaruh terhadap penurunan ph, tetapi tidak dapat menurunkan kadar alkohol dan produksi gas.

Air kelapa merupakan salah satu limbah produk kelapa, limbah ini biasanya hanya di manfaatkan sebagai minuman ataupun dibuat sebagai nata de coco, namun limbah ini lebih banyak dibuang dan tidak dimanfaatkan. Air kelapa memiliki kandungan Kalium yang cukup tinggi yaitu mineral dan vitamin. Air kelapa mengandung hormon sitokinin dan auksin yang dibutuhkan oleh tanaman. Menurut penelitian Budiono (2005), bahwa pemberian air kelapa sampai 20% mampu meningkatkan pertumbuhan jumlah tunas dan jumlah daun bawang merah dari *in vitro*. Penggunaan air kelapa mampu meningkatkan hasil kacang tanah sebesar 15%,

kedelai 45%, dan sayuran hingga 20-30%. Menurut Setyawati (2010), tentang pemberian pupuk daun dan air kelapa sebagai medium alternatif untuk induksi tunas angek Dendrodium pada kombinasi perlakuan konsentrasi pupuk daun 1.5 g/l + air kelapa 200 ml/l merupakan kombinasi terbaik pada induksi tunas. Pemberian pupuk cair kepada tanaman harus memperhatikan konsentrasi atau dosis serta interval waktu pemberian pupuk.

Pupuk organik cair merupakan pupuk yang berasal dari alam dan berperan meningkatkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah karena mengandung unsur hara yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pupuk organik merupakan pupuk yang berperan meningkatkan aktifitas biologi, kimia, dan fisik tanah sehingga tanah menjadi subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman (Indriani, 2004). Pemberian pupuk organik cair juga harus memperhatikan dosis yang diaplikasikan terhadap tanaman (Rahmi dan Jumiati, 2007).

Hasil analisis unsur N, P, K yang dilakukan menunjukkan bahwa pada pupuk organik cair dari limbah sayuran mengandung N-total sebanyak 1,12 %, Fosfor dalam bentuk P_2O_5 sebanyak 0,06 % dan Kalium dalam bentuk K_2O sebanyak 0,46 %. Unsur N,P,K ini tidak terlalu tinggi jika disesuaikan dengan standar mutu pupuk komersil oleh Permentan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 menyebutkan bahwa standar mutu pupuk organik cair adalah sebesar 3 - 6 % (Perundangan Pertanian, 2009).

Selain unsur hara makro yaitu N, P, K ada juga unsur hara lain yang berperan dalam pertumbuhan tanaman, menurut Agustina (2004), kegunaan masing-masing unsur hara bagi tanaman yaitu, fosfor (P) berperan penting dalam transfer energi di dalam sel tanaman, misalnya: ADP, ATP. Berperan dalam pembentukan membran sel, misalnya: lemak fosfat. Berpengaruh terhadap struktur K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} dan Mn^{2+} , terutama terhadap fungsi unsur-unsur tersebut yang mempunyai kontribusi terhadap stabilitas struktur dan konformasi makro molekul, misalnya: gula fosfat, nukleotida, dan koenzim dan meningkatkan efisiensi fungsi dan penggunaan N. Kalium (K) fungsi utamanya mengaktifkan kerja beberapa enzim, asetik thiokinase, aldolase, piruvat kinase, glutamilsistein sintetase, formil tetradrofolat sintase, suksinil- Co A sintetase, induksi nitrat reduktase, sintesis tepung, ATP ase. Memacu translokasi karbohidrat dari daun ke organ tanaman yang lain, terutama organ tanaman penyimpan karbohidrat. Merupakan komponen penting di dalam mekanisme pengaturan osmotik di dalam sel dan berpengaruh langsung terhadap tingkat semipermeabilitas membran dan fosforilasi di dalam kloroplas. Magnesium (Mg) berfungsi sebagai penyusun klorofil. Pembawa fosfat terutama dalam pembentukan biji berkadar minyak tinggi yang mengandung lesitin. Mangan (Mn) berperan dalam transport elektron pada fotosistem II. Elemen struktural membran kloroplas dan ikut berperan dalam beberapa fungsi enzim, misalnya enzim yang berperan mengatalisir pemecahan air, respirasi dan metabolisme N. Besi (Fe) berperan dalam proses oksidasi reduksi di dalam fotosintesis dan respirasi. Seng (Zn), unsur seng dibutuhkan dalam

penbentukan triptopan sebagai prekursor IAA, metabolisme triptamin. Dan unsur tembaga (Cu) berperan dalam transport elektron pada fotosintesis dan berperan di dalam pembentukan nodul akar.

Pupuk organik cair merupakan pupuk organik yang berbentuk cair yang dibuat dari bahan dasar limbah sayuran mengandung unsur hara yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yang diberikan pada tanaman krisan dengan berbagai konsentrasi. Konsentrasi yang digunakan yaitu 0 ml/l air (K1), 5 ml/l air (K1), 10 ml/l air (K2), 15 ml/l air (K3), 20 ml/l air (K4) dan 25 ml/l air (K5).

1. Tinggi Tanaman

Hasil pengamatan terhadap tinggi tanaman krisan setelah dilakukan uji lanjut yaitu uji BNT menunjukkan bahwa konsentrasi pupuk organik cair berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Rata-rata hasil pengamatan tinggi tanaman krisan dapat dilihat pada Tabel 4.1. Dimana konsentrasi 5 ml/l air (K1), 25 ml/l air (K5), 0 ml/l air (K0), 20 ml/l air dan konsentrasi 10 ml/l air tidak berbeda nyata. Sedangkan pada pemberian pupuk organik cair 15 ml/l air (K3) berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman krisan. Pemberian pupuk organik cair 15 ml/l air (K3) menghasilkan pertambahan tanaman tertinggi yaitu 2 cm. Hal ini menunjukkan bahwa media tanam pencampuran tanah, pupuk kandang dan sekam mempunyai kemampuan yang baik untuk menahan dan mengikat air dan larutan hara, menciptakan aerasi dan drainase yang baik, sehingga unsur hara dapat diserap oleh

akara tanaman dan dimanfaatkan untuk metabolismenya. Pemberian pupuk organik cair 15 ml/l air (K3) memberikan unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan, karena pupuk organik cair mengandung unsur hara makro dan mikro serta ketersediaan air yang cukup, maka pertumbuhan tanaman akan semakin baik bagi tanaman. Lingga (2003) menyatakan bahwa hara yang diserap tanaman akan dimanfaatkan dalam metabolisme, sehingga pertumbuhan menjadi lebih baik.

Prasetya, Kurniawan dan Febrianingsih (2009) menjelaskan bahwa unsur nitrogen bermanfaat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu pembentukan sel-sel baru seperti daun, cabang, dan mengganti sel-sel yang rusak. Setyamidjaja (1986) mengemukakan bahwa apabila tanaman kekurangan unsur N tanaman akan memperlihatkan pertumbuhan yang kerdil. Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa ternyata tinggi tanaman yang paling rendah adalah pada pemberian konsentrasi 10 ml/l air (K2) pupuk organik cair per tanaman dan yang tertinggi pada pemberian konsentrasi 15 ml/l air (K3) pupuk organik cair per tanaman. Selain faktor di atas adanya interaksi berbagai faktor internal pertumbuhan (yaitu atas kendali genetik) dan unsur-unsur iklim, tanah dan biologis juga berpengaruh terhadap tidak terdapatnya pertambahan tinggi tanaman. Hal ini disebabkan bahwa tinggi tanaman krisan juga dipengaruhi oleh lingkungan meliputi: cahaya, suhu udara, kelembapan udara, curah hujan dan ketinggian tempat. Sesuai dengan pendapat Gardner, Piarre dan Mitchell (1991) menyatakan bahwa tinggi tanaman lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, iklim dan CO₂.

Pada pengamatan terlihat proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman krisan, hal ini sesuai menurut Hill (1982) menyatakan morfogenesis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan bentuk, diferensiasi suatu organisme. Embrio yang terbentuk di dalam biji memiliki kotiledon dan akar serta tunas rudimeter. Sesudah berkecambah, akar dan tunas rudimeter tersebut akan berkembang membentuk sistem akar dan tunas tumbuhan. Proses ini yang dinamakan morfogenesis.

Pertumbuhan pertambahan tinggi yang baik bagi tanaman krisan pada umur 9MST adalah konsentrasi 15ml/l air (K3), hal ini karena terdapat unsur hara makro pada pupuk organik cair yang mendukung pertumbuhan tinggi tanaman. Sesuai dengan pendapat Campbell, (2012) menyatakan pertumbuhan tinggi tanaman dapat didukung pula oleh ketersediaan makronutrien lainnya, seperti karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan sulfur yang dibutuhkan untuk siklus hidup tanaman dan menghasilkan generasi yang lain.

2. Jumlah Daun

Hasil pengamatan terhadap jumlah daun tanaman krisan setelah dilakukan uji lanjut yaitu uji BNT menunjukkan bahwa konsentrasi pupuk organik cair berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah daun. Rata-rata pengamatan jumlah daun disajikan dalam Tabel 4.2. Berdasarkan Tabel 4.2. terlihat bahwa pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi 0 ml/l air (K0), 10 ml/l air (K2), 20 ml/l air (K4) dan 25 ml/l air (K5) per tanaman memiliki rata-rata jumlah helaian daun yang lebih

rendah dibandingkan pada tanaman yang diberikan pupuk dengan konsentrasi 15 ml/l air (K3) dan 5 ml/l air.

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah rata-rata helaian daun pemberian konsentrasi tinggi yaitu 20 dan 25ml/l air menunjukkan rata-rata jumlah daun yang paling rendah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa jumlah daun akan lebih banyak terbentuk pada pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi 5 dan 15 ml/l air dibandingkan dengan pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi tinggi yaitu 20 ml/l air dan 25 ml/l air. Didukung oleh pendapat Soewito (1991) bahwa N terkandung dalam protein dan berguna untuk pertumbuhan pucuk daun, selain itu juga untuk menyuburkan bagian-bagian batang daun. Pupuk yang mengandung unsur N, P, K yang cukup memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Kandungan unsur N yang cukup tinggi yaitu 1,12% dalam pupuk organik cair ini mampu menutupi kekurangan yang tersedia dalam tanah. Didukung oleh pendapat Setyamidjaja (1986) bahwa fungsi N adalah untuk memacu pertumbuhan vegetatif tanaman. Bila kekurangan N tanaman akan memperlihatkan pertumbuhan yang kerdil. Unsur hara N juga berguna untuk pembentukan klorofil dan kloplas pada daun yang nantinya berguna untuk proses fotosintesis. Gardner *et al* (1991) mengemukakan bahwa daun dibutuhkan untuk penyerapan dan pengubahan energi cahaya matahari menjadi pertumbuhan dan menghasilkan panen melalui fotosintesis.

Pertambahan jumlah helai daun terjadi karena terdapat unsur hara seperti N, P, K yang terdapat pada pupuk organik cair. Hal ini didukung oleh pendapat Soewito (1991) bahwa N terkandung dalam protein dan berguna untuk pertumbuhan pucuk daun, selain itu juga untuk menyuburkan bagian-bagian batang daun. Pupuk yang mengandung unsur N, P, K yang cukup memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan.

Selain itu peningkatan pertambahan jumlah helai daun tanaman krisan disebabkan oleh penyerapan unsur nitrogen oleh akar tanaman krisan. Menurut Anas (2009) menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan jumlah daun yang tinggi diakibatkan oleh penyerapan unsur nitrogen yang lebih tinggi. Nitrogen merupakan nutrisi vital terpenting bagi tanaman. Senyawa nitrogen digunakan oleh tanaman untuk membentuk asam amino yang akan diubah menjadi protein. Nitrogen juga dibutuhkan untuk membentuk senyawa penting seperti klorofil, asam nukleat, dan enzim. Nitrogen dibutuhkan dalam jumlah relatif besar pada setiap tahap pertumbuhan tanaman, khususnya pada tahap pertumbuhan vegetatif, seperti pembentukan tunas, perkembangan batang dan daun. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Foth, (1994) menyatakan bahwa pertambahan jumlah daun dikarenakan adanya nitrogen yang dapat mempercepat proses fotosintesis sehingga pembentukan organ daun menjadi lebih cepat. Kelimpahan nitrogen juga mendorong pertumbuhan

yang cepat termasuk perkembangan daun, batang lebih besar dan berwarna hijau tua serta mendorong pertumbuhan vegetatif di atas tanah.

3. Panjang Daun

Hasil analisis sidik ragam terhadap penambahan panjang daun tanaman krisan berpengaruh tidak nyata terhadap penambahan panjang daun. Dari Tabel 4 terlihat bahwa penambahan panjang daun yang terpanjang yaitu pada pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi 15 ml/l air (K3). Sedangkan yang terpendek yaitu pada pemberian pupuk dengan konsentrasi 25 ml/l air (K5). Data yang disajikan pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa cara aplikasi pupuk memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap pertumbuhan panjang daun yang berkisar antara 0,18-0,40 mm. Nutrisi yang diserap tanaman dari pemberian pupuk organik cair tampaknya sama, sehingga pertumbuhan sel-sel dalam jaringan tanaman untuk memperpanjang daun tidak berkembang lebih lanjut. Takaran pupuk memberikan pengaruh tidak nyata terhadap panjang daun. Panjang daun tertinggi pada perlakuan K3 yaitu 15 ml/l air. Menurut informasi dari Balithi (2008) pertumbuhan dan kualitas tanaman krisan sangat dipengaruhi oleh kadar nutrisi yang tersedia dalam media tanam dan dapat diserap oleh tanaman. Kekurangan nitrogen dalam daun muda yang tumbuh kecil-kecil, berwarna pucat, dan pertumbuhan terhambat.

Selain adanya unsur hara yang terdapat pada pupuk organik cair, ada juga hormon auksin dan sitokinin yang terdapat pada bahan campuran pupuk organik cair

yaitu air kelapa hal ini sesuai menurut Wahyuni (2010) menyatakan bahwa selain ketersediaan unsur hara, terdapat bahan campuran dalam pupuk cair yang diberlakukan yaitu air kelapa. Air kelapa mengandung hormon alami bagi pertumbuhan tanaman yaitu air kelapa. Air kelapa mengandung 2 hormon alami bagi pertumbuhan tanaman yaitu auksin dan sitokinin sebagai pendukung pembelahan sel tanaman. Sitokinin dalam hal ini berfungsi menyebabkan pembesaran daun muda. Auksin berperan dalam pemanjangan sel tumbuhan sehingga penting bagi pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Kerja auksin sendiri sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya cahaya matahari. Cahaya matahari dapat mengganggu auksin sehingga proses pemanjangan sel menjadi terhambat. Ujung batang tanaman akan selalu tumbuh menuju arah datangnya cahaya matahari. Bagian batang yang tidak terkena cahaya matahari (membelakangi matahari) akan mengalami pemanjangan, sedangkan bagian batang yang terkena cahaya matahari (menghadap matahari) tidak mengalami pemanjangan. Sel-sel batang yang membelakangi cahaya akan memanjang, padahal bagian yang menghadap matahari tidak bertambah panjang, akibatnya batang jadi membengkok dan mengarah ke arah datangnya cahaya matahari. Auksin sendiri sesungguhnya tidak langsung terganggu oleh adanya cahaya matahari, yang terjadi adalah auksin terganggu karena pengaruh molekul xanthin yang timbul karena penyinaran karotenoid. Terganggunya auksin menyebabkan sel-sel pada daerah yang terkena cahaya tidak bertambah panjang sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pupuk organik cair dengan berbagai konsentrasi perlakuan berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman (cm) dan pertambahan jumlah daun dan berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan panjang daun (cm) tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*).
2. Perlakuan pupuk organik cair pada konsentrasi 15 ml/l (K3) memberikan pengaruh terbaik pada pertambahan tinggi tanaman (cm). Sedangkan konsentrasi 5 ml/l (K1) memberikan pengaruh terbaik pada pertambahan jumlah helai daun (helai), dan konsentrasi 15 ml/l (K3) memberikan pengaruh terbaik pada pertambahan panjang daun (cm) tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*).

B. Implikasi Penelitian (Saran)

Adapun saran yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Limbah sayuran dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pupuk organik cair.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang variasi kadar konsentrasi limbah sayuran agar dapat diketahui konsentrasi yang optimal dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman krisan.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi pupuk pada pertumbuhan generatif sampai masa panen sehingga data yang dibutuhkan untuk membuktikan adanya pengaruh perlakuan semakin valid.
4. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tanaman krisan dengan memenuhi faktor-faktor yang diperlukan bagi pertumbuhan yang optimal tanaman krisan.

KEPUSTAKAAN

- Agustina, L. *Dasar Nutrisi Tanaman*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Aini N. “*Rekayasa Paket Teknologi budidaya dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas Bunga Krisan (C. morifolium R.)*. (Maret 2008). <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mud=browse&0p=read&id=oqi:www.digilib.br awijaya.ac.id:JIUBRA29800219&h+kualita%20bunga%20krisan> (Diakses 11 Februari 2016).
- Amilia, Y. *Penggunaan pupuk organik cair untuk mengurangi dosis penggunaan pupuk anorganik pada padi sawah (Oryza sativa L.)*. (2011). Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Amurwaraharja IP. *Analisis Teknologi Pengolahan Sampah Dengan Proses Hirarki Analitik dan Metode Valuasi kontingensi Studi Kasus Di Jakarta Timur, Makalah Falsafah Sains*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Ilmu Pengolahan Sumber Dayan Alam dan Lingkungan Program Pascasarjana, 2006.
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Pusat Pelatihan Pertanian. *Pembuatan Pupuk Organik*. 2015
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. *Budidaya Tanaman Krisan*. Yogyakarta, 2006.
- Bastari, T. 1996. *Penerapan Anjuran Teknologi Untuk Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Pupuk*. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Badan Litbang Pertanian Deptan. hal. 7 - 36.
- Barker AV and DJ Pilbeam. *Hand Book of Plant Nutrition*. CRC Press. New York, 2007.
- Brady NC and RR Weil. *The Nature and Properties of Soils*. 13th Edition. Upper Saddle River, New Jersey. USA, 2002.
- Campbell. *Buku Ajar Biologi*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012.
- Crater, L. D. *Pot Mums*. Newyork: Academic Press Inc, 1990.
- Ermanita. *Pertumbuhan Vegetatif Dua Varietas Jagung pada Tanah Gambut yang Diberi Limbah Pulp dan Paper*. Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Riau. *Jurnal Biogenesis* 1(1): 1-8, (2004).

- Fardiaz, S. *Polusi Air and Udara. Edisi ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Fitriyatno. *Uji Pupuk Organik Cair dari Limbah Pasar Terhadap Pertumbuhan Tanaman Selada (Lactuca sativa L) dengan Media Hidroponik*. 2012. <https://eprints.uns.ac.id/13856/1/1188-2689-1-SM.pdf> (Diakses 20 Februari 2016).
- Foth. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Terjemahan Soenartono Adisumarto*. Jakarta: Erlangga. Jakarta, 1994.
- Gardner FP, RB Pearce and RL Mitchell. *Fisiologi Tanaman Budidaya - (Physiology of Crop Plants)*. Jakarta: UI-Press, 1991.
- Gundoyo W. *Pembuatan Pupuk Cair Organik*. 2010. <http://www.warsitotti.files.wordpress.com>.
- Hadisuwito. *Membuat Kompos Cair*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2007.
- Hasim, I. dan M. Reza. *Krisan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 1995.
- Havlin JL, JD Beaton, SL Tisdale and WL Nelson. *Soil Fertility and Fertilizers. An introduction to nutrient management. Seventh Edition*. Pearson Education Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 2005.
- Hakim, Anas Mahirul, *Asupan Nitrogen Dan Pupuk Organik Cair Terhadap Hasil Dan Kadar Vitamin C Kelopak Bunga Rosela (Hisbiscus Sabdariffa L.)*, *Skripsi*: Universitas Sebelas Maret Fakultas Pertanian, 2009.
- Handajarningsih dan Wibisono. *Pertumbuhan dan Pembungaan Krisan dengan Pemberian Abu Janjang Kelapa Sawit Sebagai Sumber Kalium*. (Juni 2009). http://repository.unib.ac.id/215/1/merak_akta_Vol12%20No.1.pdf. (Diakses 18 Februari 2016).
- Hao X, F Godlinski and C Chang. *Distribution of phosphorus forms in soil following long-term continuous and discontinuous cattle manure applications*. *Soil Science Society of America Journal* 72, 90-97, 2008.
- Homer ER. *The effect of nitrogen application timing on plant available phosphorus*. *Thesis*. Graduate School of The Ohio State University. USA, 2008).

- Indrakusuma. *Proposal Pupuk Organik Cair Supra Alam Lestari*. Yogyakarta: PT Surya Pratama Alam, 2000.
- Indriani. *Membuat Kompos Secara Kilat*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Istianigrum, Putri. Damanhuri. Swoetopo, Lita. "Pengaruh Generasi Benih Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Krisan (*Chrysanthemum*) Varietas Rhino. Jurnal Produksi Tanaman Vol. 1.No.3, Juli 2013.
- Kementerian pertanian. *Ourlook Komoditi Krisan*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jederal-Kementerian Pertanian, 2014. <http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/krisan2014.pdf> (Diakses 10 Februari 2016).
- Kurniawati, I. *Budi Daya Tanaman Krisan*. Jakarta: Sinar Cemerlang Abadi, 2007.
- Lakitan B. *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*. Jakarta: PT raja grafindo persada, 2011.
- Lakitan. *Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1993.
- Leiwakabessy FM, Sutandy A. *Pupuk dan Pemupukan*. Bogor: Depertemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian IPB, 2004.
- Litauditomo. *Megolah sampah Rumah Tangga*. <http://www.litauditomo.multiply.com/> (Diakses !6 Februari 2016)
- Lukito AM. *Rekayasa Pembungaan Krisan dan Bunga Lain. (Kasinius Yogyakarta, 2008). Secara In Vitro Pada Tanaman Anggrek Cymbidium Varietas Lovely Angel (in Vitro Flower Induction Of Orchid Cymbidium Var Lovely Angel). Makalah seminar Program Study Hortikultura. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.*
- Mangel K and EA Kirby. *Principles of Plant Nutrition*.4th Edition. International Potash Institute.Worblaufen-Bern, Switzerland, 1987.
- Marschner H. *Mineral Nutrition of Higher Plants*. Institute of Plant Nutrition Univ. Hohenheim. Fed. Rep. of Jerman. 1986.

- Marsono dan Paulus. *Pupuk Akar Jenis dan Aplikasi*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2001.
- Martinsari, T., Y. Wijayanti., E. Purwanti. *Optimalisasi Fermentasi Urine Sapi Dengan Aditif Tetes Tebu (Molasses) Untuk Menghasilkan Pupuk Organik Cair Yang Berkualitas Tinggi*. Universitas Negeri Malang. Malang. (2010).
- Murbandono. *Membuat Kompos*. Jakarta: Penebar Swadaya, 1990.
- Nasaruddin. *Dasar-dasar fisiologi tumbuhan*. Makassar: Yayasan forest Indonesia dan Fakultas Pertanian UNHAS, 2010.
- Novizan. *Petunjuk Pemupukan Yang Efektif, Cetakan Pertama*. Jakarta: AgroMedia Pustaka. Jakarta, 2005.
- Pardosi AH, Irianto, dan Mustakim. *Respons Tanaman Sawi terhadap Pupuk Organik Cair Limbah Sayuran pada Lahan Kering Ultisol*. (September 2014) [http://www.pur-plso-unsri.org/dokumen/9_irianto%26andri%20pardosi revisi1.pdf](http://www.pur-plso-unsri.org/dokumen/9_irianto%26andri%20pardosi%20revisi1.pdf). (Diakses 15 Februari. 2016).
- Parman, S. “*Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kentang (Solanum tuberosumL.)*”. Buletin Anatomi dan Fisiologi Vol. XV, No. 2 (Oktober 2007): 30.
- Perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan-70-11.pdf, diakses tanggal 21 Agustus 2016.
- Prasetya, B., S, Kurniawan, dan Febrianingsih. *Pengaruh Dosis dan Frekuensi Pupuk Cair Terhadap Serapan dan Pertumbuhan Sawi (Brassica juncea L.) Pada Entisol*. Univ. Brawijaya. Malang. 2009.
- Purwendro dan Nurhidayat. *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.
- Puspita D. *Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan* (Jakarta: Journal online, 2011).
- Putra dan Histifarina. *Pertumbuhan dan Pembungaan Krisan dengan Pemberian Abu Janjang Kelapa Sawit Sebagai Sumber Kalium*. (2009). <http://lampung.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/publikasi/prosiding2012/prosiding2011/12makalahkrisan.pdf> .(Diakses 18 Februari 2016).

- Rahayu, S M dan Hasrat E P. "Penambahan Bahan Organik Pada media Pertumbuhan Krisan (*Dendrathera grandiflora* Travelve) Secara In Vitro". Bul. Agrohorti 1 (4): 94-100 (2013).
- Rahma A. Izzati M dan Parman S. *Pengaruh Pupuk Organik Cair Berbahan Dasar Limbah Sawi Putih (*Brassica chinensis* L.)*. (Maret 2014). http://eprints.undip.ac.id/44491/1/7._atika.pdf. (Diakses 15 Februari 2016).
- Rahmi, A. dan Jumiati. *Pengaruh Konsentrasi dan Waktu Penyemprotan Pupuk Organik Cair Sper ACI terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jagung Manis*. J. Agritrop. 26(3), 105-109 (2007).
- Reginawanti. 1999. *Krisan (*C. Morifolium* Ramat, *C. Indicum*, *C. daisy*)*. [http://www.Kpel.or.id/TTGP/Komoditi/Krisan I. htm](http://www.Kpel.or.id/TTGP/Komoditi/KrisanI.htm).
- Rohmah, Atikah, dkk. *Pengaruh Pupuk Organik Cair Berbahan Dasar Limbah Sawi Putih (*Brassica Chinensis* L.) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis (*Zea Mays* L. Var. *Saccharata*)*. Buletin Anatomi dan Fisiologi Volume XXII, Nomor 1, Maret 2014.
- Rukmana R dan Mulyana AE. *Krisan*. Yogyakarta: Kasinius, 1997.
- Sanjaya, L. 1996. *Krisan, Bunga Potong dan Tanaman Pot Pertanian*. No 3 (15): 55 - 60.
- Setyamidjaya. *Pupuk dan Pemupukan*. Jakarta: Simplex, 1986.
- Shihab M Q. *Tafsir al Mishbah : pesan, kesan dan keserasial Al-Qur'an/ M. Quraish Shihab*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simamora S, dkk. *Membuat Biogas Pengganti Bahan Bakar Minyak dan Gas dari Kotoran Ternak*. Bogor: Agromedia Pustaka, 2005.
- Soemarno, *Penyerapan Unsur Hara Oleh Akar Tumbuhan Program Pascasarjana*, Universitas Brawijaya Malang (2011).
- Soewito, M. *Memfaatkan Lahan-Bercocoktanam Wortel*. CV. Titik Terang. Jakarta. 1991.


- Sumarni, N. *Budidaya Tanaman*. (2003).<http://www.balitsa.or.id/budidaya.pdf#search;suhu%20tanah%20pada%20tanah>.
- Sukawati I. *Pengaruh kepekaan larutan nutrisi terhadap pertumbuhan dan hasil baby kalian (Bassica oleranceae.VAR-alba-glabra) pada berbagai komposisi media tanaman dengan system hidroponik*. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.
- Sulistiyorini, Endah, dkk. *Penggunaan Air Kelapa dan Beberapa Auksin untuk Induksi Multiplikasi Tunas dan Perakaran Lada Secara In Vitro*. *Bulletin Ristri, Vol:3 No:3, November 2012*.
- Susanto R. *Penerapan Pertanian Organik*. Yogyakarta: Kasinius, 2002.
- Syefani dan Lilia A. *Pelatihan Pertanian Organik*. Malang: Fakultas Pertanian Unibraw, 2003.
- Taulu, L A. “*Krisan (Chrysanthemum morifolium)*”. Tomohon : Departemen Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara, 2007.
- Tips UKM Online. *Budidaya Bunga Krisan : Teknik Pembibitan Dan Penyemaian*. (2015). <http://tips-ukm.com/budidaya-bunga-krisan-teknik-pembibitan-dan-penyemaian/>. (Diakses 21 Februari 2016).
- Tjitrosoepomo G. *Taksonomi (Spermatophyta)*. Gajah Mada University. Press:Yogyakarta, 2013.
- Trenggono A Dan Ni Made A Wi. 2011. *Induksi Pembungaan Secara In Viro Pada Tanaman Anggrek Cymbidium Varietas Lovely Angel (In Vitro Flower Induction Of Orchid Cymbidium Var. Lovely Angel)*. Makalah Seminar Program Studi Hortikultura. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Wahyuni, Sri, *Manfaat Air Kelapa*, Tangerang: PT. Namira Citra Alifiani, 2010.
- Wang YP, BZ Houlton and CB Field. *A model of biogeochemical cycles of carbon, nitrogen, and phosphorus including symbiotic nitrogen fixation and phosphatase production*. *Global Biogeochemical Cycles* 21, 1018-1029, 2007.
- Wijaya K. *Pengaruh Konsentrasi dan Frekuensi Pemberian Pupuk Organik Cair HasilPerombakan Anaerob Limbah Makanan Terhadap Pertumbuhan*

Tanaman Sawi (Brassica juncea L.)”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, 2010.

Wijayakusuma H. *Ensiklopedia Milenium tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia Jilid 1*. Jakarta: PT. Prestasi Insan Indonesia (Prestasi), 2000.

Zubachtirodin, M. S. P. dan Subandi. 2007. *Wilayah Produksi dan Potensi Pengembangan Jagung. Dalam Sumarno, et.al. (Editor). Jagung: Teknik Produksi dan Pengembangan: 464-473. Puslitbang Tanaman Pangan. Badan Litbang Pertanian. Bogor*

Zulkarnain. *Dasar-dasar Holtikultura*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel

Tabel Lampiran 1a. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST)

Perlakuan	Ulangan				Total	Rata-rata
	I	II	III	IV		
K0	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00
K1	0.50	2.00	1.00	2.00	5.50	1.38
K2	0.00	0.80	0.50	2.00	3.30	0.83
K3	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00
K4	1.00	0.50	0.30	2.00	3.80	0.95
K5	1.00	2.50	0.30	0.50	4.30	1.08
Total	5.50	8.80	5.10	9.50	28.90	7.23

Tabel Lampiran 1b. Sidik ragam pertambahan tinggi tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*)

Sumber Keragaman (Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	5	4.565	0.913	2.359*	0.01
Ulangan	3	2.935	0.978		
Galat	15	5.805	0.387		
Total	23	13.305			

Ketengan: * = Nyata

Tabel Lampiran 2a. Rata-rata pertambahan jumlah daun tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST)

Perlakuan	Ulangan				Total	Rata-rata
	I	II	III	IV		
K0	2.00	1.00	0.00	1.00	4.00	1.00
K1	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	1.00
K2	1.00	0.00	1.00	2.00	4.00	1.00
K3	2.00	1.00	0.00	2.00	5.00	1.25
K4	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.50
K5	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.75
Total	5.00	2.00	3.00	12.00	26.00	6.50

Tabel Lampiran 2b. Sidik ragam pertambahan jumlah daun tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST)

Sumber Keragaman (Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	5	16.00	3.20	3.42*	0.05
Ulangan	3	8.50	2.83		
Galat	15	14.00	0.94		
Total	23	38.50			

Keterangan * = Nyata


Tabel Lampiran 3a. Rata-rata pertambahan panjang daun tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST)

Perlakuan	Ulangan				Total	Rata-rata
	I	II	III	IV		
K0	0.20	0.30	0.10	0.10	0.70	0.18
K1	0.10	0.10	0.20	0.70	1.10	0.28
K2	0.10	0.60	0.40	0.10	1.20	0.30
K3	0.40	0.50	0.40	0.30	1.60	0.40
K4	0.20	0.20	0.10	0.50	1.00	0.25
K5	0.10	0.10	0.20	0.30	0.70	0.18
Total	1.10	1.80	1.40	2.00	6.30	1.58

Tabel Lampiran 3b. Sidik ragam pertambahan panjang daun tanaman krisan (*Chrysanthemum morifolium*) ke VI (9 MST-8 MST)

Sumber Keragaman (Sk)	Derajat bebas (db)	Jumlah kuadrat (JK)	Kuadrat tengah (KT)	F	Sig.
Perlakuan	5	0.057	0.011	0.30 ^{tn}	0.90
Ulangan	3	0.128	0.043		
Galat	15	0.57	0.038		
Total	23	0.750			

Keterangan tn= Tidak Nyata

Lampiran 2. Skema Penelitian

Lampiran 3. Alat dan Bahan

a. Alat


 <p>Pisau dan Talenan</p>	 <p>Kantong kain berlubang-lubang</p>	 <p>Tali</p>
 <p>Kamera</p>	 <p>Timbangan</p>	 <p>Gelas Ukur Plastik</p>
 <p>Gelas Ukur</p>	 <p>Jerigen</p>	 <p>Ember dan Gayung</p>
 <p>Naungan plastik transparan</p>	 <p>Alat Tulis menulis</p>	 <p>Mistar</p>

b. Bahan

 <p>Limbah sayuran</p>	 <p>Daun pandan</p>	 <p>EM4</p>
 <p>Molase (Sari tetes tebu)</p>	 <p>Air bersih</p>	 <p>Air cucian beras</p>
 <p>Air Kelapa</p>	 <p>Sabun krim</p>	 <p>Sekam Padi</p>
 <p>Pupuk kandang</p>	 <p>Tanah</p>	 <p>Label</p>
 <p>Polybag</p>	 <p>Nanas</p>	 <p>Bibit Krisan</p>

Lampiran 4. Alur singkat penelitian

1. Pembuatan Pupuk Organik Cair



Keterangan :

a = Sayuran dicacah dengan menggunakan pisau

b = Menimbang sayuran

c = Memasukkan ke dalam kantong berlubang-lubang

d = Hasil fermentasi pupuk organik cair

e = Cairan pupuk organik cair

2. Pembuatan Media Tanam	3. Penanaman
 <p data-bbox="386 835 407 863">a</p> <p data-bbox="721 835 742 863">b</p>	 <p data-bbox="1127 827 1148 854">c</p>

Keterangan :

a = Pencampuran media tanam


b = Menimbang media tanam

c = Penanam bibit krisan (*Chrysanthemum morifolium*)


4. Pemeliharaan	5. Pengamatan dan Pengukuran
	

Lampiran 5. Tanaman Setelah 9 Minggu Setelah Tanam





Gambar 3.1. Tata letak acakan tananan krisan (*Chrysanthemum morifolium*.)



Lampiran 5. Hasil Analisis Pupuk Organik Cair

Lab. BPTP Lab. BPTP



MINISTRY OF AGRICULTURE
AGENCY FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
LABORATORY OF ASSESMENT INSTITUTE
FOR AGRICULTURE TECHNOLOGY SOUTH SULAWESI
Jl. Dr. Ratulangi, Maros 90514
Phone : +62-411-371572 Facs : +62-411-371572
E-mail : lab_bptpmrs@piasa.com



LAPORAN ANALISIS PUPUK
REPORT OF FERTILIZER ANALYSIS

Nomor Lab. : SP 143 P/L-BPTP/IV/2016 Halaman 1 dari 1
Lab. Number Page 1 of 1

IDENTIFIKASI BAHAN UJI
SUBJECT IDENTIFICATION

Nama Bahan Uji : Pupuk Organik Cair Merek Sampel :
Subject Sample Mark

Keterangan Contoh : Packing Botol Plastik Produksi :
Sample Description Production

IDENTIFIKASI PELANGGAN
CUSTOMER IDENTIFICATION

Pelanggan : St. Fatimah
Customer

Alamat : Jl. Samata - Gowa
Address

Telepon : +62-855-27927097
Phone

Tanggal Penerimaan : 12 April 2016
Date of Registration

No. Urut Number	Parameter Parameter	Hasil Result	Metode Pengujian Analysis Method
1	N-total, %	1,12	IK PO 4/L-BPTP/10 (Kjeldahl)
2	P ₂ O ₅ , %	0,08	IK PO 5/L-BPTP/10 (Spektrofotometri)
3	K ₂ O, %	0,46	IK PO 6/L-BPTP/10 (AAS)
4	pH	4,73	IK PO 2/L-BPTP/10 (Elektrometri)
5	C-organik, %	1,64	IK PO 3/L-BPTP/10 (Chumies)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diterbitkan tanggal, 25 April 2016
Date of issue

Lab. BPTP, P1604143-1-IBN-310


Muhammad Asri, S.Si, M.Si
Technical Manager

1. Result of analysis relating with sample tested only.
2. Result of analysis can not be copied without legal permission from BPTP Laboratory.
3. Copyright kind protected after three months.

F.DP.5.10.7

Lab. BPTP Lab. BPTP



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11 Tamalanrea Makassar 90245



LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

No : 16106720 / LHU / BBLK-MKS / IV / 2016

Nama Customer : SITI FATIMA
 Customer Name :
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin 2 No. 63, Makassar
 Address :
 Jenis Sampel : Pupuk Organik Cair
 Type of Sample (S) :
 No. Sampel : 16106720
 No. Sample :
 Tanggal Penerimaan : 24 April 2016
 Received Date : April 24, 2016

HASIL PEMERIKSAAN

No	Parameters	Units	Test Result	Method Specification
1	Besi / Iron (Fe)	mg/l	17.59	IKM/5.4.13/BBLK-MKS (AAS) *
2	Mangan / Manganese (Mn)	mg/l	13.81	Atomisasi
3	Magnesium (Mg)	mg/l	39.52	Atomisasi
4	Seng / Zink (Zn)	mg/l	0.5	Atomisasi
5	Tembaga / Copper (Cu)	mg/l	0.04	Atomisasi

Catatan : 1 Hasil uji ini berlaku untuk sampel yang diuji
Note : The analytical result are only valid for the tested sample
 2 Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 halaman
 The report of analysis consists of 1 page
 3 Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan kecuali secara lengkap dan seizin tertulis Laboratorium Pengujian Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
 This report of analysis shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the testing Laboratory Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.



DP/5.10.3/KL/BBLK - Mks; Rev 1; 15 Oktober 2012

Telp. 0411 586458-586457-586270 Fax 0411 586270
 Surat Elektronik : bblk_makassar@yahoo.com bblk.mksr@gmail.com





KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11 Tamalanrea Makassar 90245



LAPORAN HASIL UJI
NO. 16111742/LHU/BBLK-MKS/VII/2016

Nama Costumer	: Siti Fatima
Tanggal Sampling	: -
Tanggal Penerimaan	: 28 Juli 2016
Alamat	: Samata, Gowa
Pemeriksaan	: Kultur <i>Bacillus sp.</i> , <i>Sacharomyces</i>
Jenis Sampel	: Pupuk

HASIL UJI MIKROBIOLOGI

No. Lab	Jenis Sampel	Kultur <i>E. coli</i>	Kultur <i>Sacharomyces</i>
16111742	Pupuk Cair	Negatif	Positif

- Catatan :
1. Hasil uji hanya berlaku untuk sampel yang di uji
 2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 halaman
 3. Laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan
- Kecuali secara lengkap dan seizin tertulis laboratorium penguji
 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
- Parameter yang terakreditasi

Makassar, 10 Agustus 2016
 Manager Teknik



dr. Aswan Usman, M.Kes
 NIP. 197104042002121001

DP/5.10.3/BBLK-MKS;Rev 1;15 Oktober 2012

Telp. 0411 586458-586457-586270 Fax 0411 586270
 Surat Elektronik : bblk_makassar@yahoo.com bblk.mksr@gmail.com



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siti Fatima, lahir di Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada tanggal 13 Juni 1993. Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara (Moh. Suryawan, St. Khadijayanti dan St. Rahma) dari pasangan Dg. Pataweng dan Nurhasanah.

Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut

1. Sekolah Dasar Inpres (SDI) Negeri Siaratan pada tahun 2000-2006.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) DDI Cileleng pada tahun 2006-2009
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri 1 Mallusetasi pada tahun 2009-2012.
4. Pada tahun 2012, penulis diterima di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur SPMB-*PTAIN* pada Program Strata 1 (S1) jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

Selama masa kuliah penulis aktif menjadi asisten praktikum pada berbagai mata kuliah seperti Biokimia dan Botani Lanjut. Kemudian penulis PKL di BNNP Sul-Sel. Terakhir penulis membuat skripsi dengan judul “Pertumbuhan Tanaman Krisan (*Chrysanthemum morifolium*) Pada Berbagai Konsentrasi Pupuk Organik Cair Dari Limbah Sayuran”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R