


**PERTUMBUHAN *Salmonella* sp. DENGAN VARIASI  
KONSENTRASI BAWANG PUTIH (*Allium sativum*)  
PADA TELUR ASIN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh:

**ARDIANSYAH**  
**NIM. 60700112049**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2016

Penyusun,

**ARDIANSYAH**  
NIM: 60700112049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara **ARDIANSYAH**, NIM: 60700112049 mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “**Pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan Variasi Konsentrasi Bawang Putih (*Allium sativum*) Pada Telur Asin**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P**  
NIP. 19730828 200604 2 001

**Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P**  
NIP. 19750909 200912 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

**Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.**  
NIP. 19590712 198603 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan Variasi Konsentrasi Bawang Putih (*Allium sativum*) Pada Telur Asin**” yang disusun oleh **ARDIANSYAH**, NIM: 60700112049, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, 25 Agustus 2016  
22 Syawal 1437 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr.H. Arifuddin Ahmad., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Irmawati, S.Pt., M.P. (.....)

Munaqisy I : Prof.Dr.Ir. Efendi Abustam., M.Sc (.....)

Munaqisy II : Abbas, S.Pt., M.Sc (.....)

Munaqisy III : Dr. M.Tahir Maloko., M.Hi (.....)

Pembimbing I : Khaerani Kiramang., S.Pt., M.P (.....)

Pembimbing II : Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr.H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini dirancang sebagai tahap penyelesaian studi S1 dengan melakukan kegiatan penelitian sebagai tugas akhir.

Penyusunan skripsi ini di buat berdasarkan hasil dari pelaksanaan Penelitian dengan judul **“Pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan Variasi Konsentrasi Bawang Putih (*Allium sativum*) Pada Telur Asin”** dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Selama penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada alm. Ayahanda Arifuddin dan Ibunda Sanawiah yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga saat ini.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Ir. Muh. Basir S. Paly, M.Si sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan ibu Astati, S.Pt, M.Si selaku sekretaris Jurusan Ilmu Peternakan.
4. Ibu Khaerani Kiramang, S.Pt, M.P selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muh. Nur Hidayat, S.Pt, M.P selaku pembimbing II atas bimbingan dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari pemilihan judul sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Efendi Abustam, M.Sc., Bapak Abbas, S.Pt., M.Sc. dan Bapak Dr. M.Tahir Maloko, M.Hi selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada pihak Kampus UIN Alauddin yang telah memberikan kesempatan sebagai peserta penerima program beasiswa Bidik Misi oleh Kemendikbud/Kemenristek RI dibawah naungan Kemenag RI.

8. Ibu Drh. Mamansari selaku staf Kesmavet dan Toksikologi beserta Drh. Taman Firdaus staf Virulogi Balai Besar Veteriner Maros yang telah membantu untuk proses dan fasilitas selama penelitian.
9. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si, M.Si selaku kepala Laboratorium Biologi dan kak Kurniati, S.Si selaku laboran Biologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah mengizinkan untuk melakukan dan membantu selama penelitian pada Laboratorium Mikrobiologi, Biologi.
10. Terima kasih pula yang tak terhingga kepada Kak Andi Afriana, SE selaku staf operator jurusan yang telah membantu pengurusan berkas hingga tahap akhir. Tak lupa juga kepada ibu Drh. Aminah Hajah Thaha selaku kepala Laboratorium Peternakan dan kak Hikmawati, S.Pt dan Muh. Arsan Jamili, S.Pt yang membantu fasilitas penelitian, serta ibu Rusny, S.Pt, M.Si yang selalu memberikan support hingga ke tahap akhir.
11. Terima kasih juga kepada teman Partner penelitian Yulianti dan Suci Indah Sari atas kerjasamanya sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik. Dan terima kasih pula kerjasamanya kepada rekan Mikrobiologi, Biologi, yang telah bersama-sama dan saling membantu selama penelitian di Laboratorium Mikrobiologi, Biologi.
12. Teman Kelas, IP-B, Syafruddin, Marnila L, Irma Rukmana Kadir, Akkuruddin, Asrul, Andi Nurrika Haslinda, Resti Nanda Saputri, Salahuddin, Syamsuri, Astri Wahyuni, Rifaid, Sarialang, Suparman, Saenal Salju, Sutarmin, Fadhillah M, Sudrianto, Asdar dan M.Mansur Rasyid dan Teman-

teman seperjuangan Angkatan 2012 Akbar, Nurfahmi Sukiman, Nurfatimah Jamrah, M.Yusuf, Nur Radia Lestari, Abd. Rahim, Aswar Anas, Hasriani Budi, M.Ridwan dan Hasnih saling memotivasi satu sama lain dan berjuang bersama-sama menyelesaikan studi SI.

13. Kepada Sahabat Haerul Imam, Suhaemi dan Syamsul Has yang selalu menyemangati dan selalu ada untuk membantu hingga penulis menyelesaikan pendidikan strata satu (SI).
14. Kepada Keluarga Besar Bidik Misi (Himabim), Kepmi Bone dan Teman Hipma Koltim yang telah memberikan ruang dan menjadi bagian dari mereka dan memberikan support dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada Teman Posko KKN 51 Polut saling menyemangati sama lain hingga penyelesaian penyusunan skripsi.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Agustus 2016


Penulis

ARDIANSYAH  
NIM. 60700112049

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Kajian Pustaka .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Deskripsi Telur.....	7
B. Telur Asin .....	12
C. Bawang Putih ( <i>Allium sativum</i> ) .....	17
D. Bakteri <i>Salmonella</i> sp. ....	25
E. Perhitungan Koloni Bakteri dengan Metode Hitung Cawan .....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37
B. Alat dan Bahan .....	37

C. Metode Penelitian .....	37
D. Prosedur Kerja .....	38
E. Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan .....	42
BAB V PENUTUP .....	52
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	53
LAMPIRAN .....	59
RIWAYAT HIDUP .....	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Komposisi Telur Ayam dan Itik.....	7
Tabel 2. Komposisi Zat Gizi Telur .....	8
Tabel 3. Kandungan Kimia Bawang Putih.....	22
Tabel 4. Pertumbuhan <i>Salmonella</i> sp. dengan Variasi Konsentrasi Bawang Putih ( <i>Allium sativum</i> ) pada Telur Asin .....	44
Tabel 5. Lampiran 1 Tabel Hasil Penelitian.....	59

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Halaman</b>
Grafik 1. Jumlah Koloni Bakteri pada Pengasinan 7 hari.....	47
Grafik 2. Jumlah Koloni Bakteri pada Pengasinan 10 hari.....	50
Grafik 3. Jumlah Koloni Bakteri pada Pengasinan 15 hari.....	52

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Telur .....	9
Gambar 2. Telur Asin .....	13
Gambar 3. Bawang Putih .....	19
Gambar 4. <i>Salmonella</i> sp .....	27
Gambar 5. Hasil Pengamatan <i>Koloni Salmonella</i> sp. pada pengasinan 7 hari... 46	
Gambar 6. Hasil Pengamatan <i>Koloni Salmonella</i> sp. pada pengasinan 10 hari.. 49	
Gambar 7. Hasil Pengamatan <i>Koloni Salmonella</i> sp. pada pengasinan 15 hari.. 51	
Gambar 8. Lampiran 3 Pembuatan Telur Asin.....	61
Gambar 6. Lampiran 4 Pengerjaan dalam Laboratorium.....	62

## ABSTRAK

**Nama** : Ardiansyah  
**Nim** : 60700112049  
**Jurusan** : Ilmu Peternakan  
**Judul** : Pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan Konsentrasi Bawang Putih (*Allium sativum*) Pada Telur Asin

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan pemberian konsentrasi (*Allium sativum*) bawang putih yang berbeda pada telur asin dan bagaimana pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan lama pengasinan telur pada konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*) yang berbeda. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif untuk mengetahui pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan variasi konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*) pada telur asin dengan metode hitung cawan dengan pengasinan 7, 10 dan 15 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengasinan 7 hari dengan konsentrasi 0% (0 cfu/g), 50% ( $49 \times 10^4$  cfu/g), 60% ( $44 \times 10^3$  cfu/g) dan 70% ( $44 \times 10^3$  cfu/g). Pengasinan 10 hari dengan konsentrasi 0% ( $58 \times 10^1$  cfu/g), 50% (0 cfu/g), 60% ( $129 \times 10^2$  cfu/g) dan 70% ( $113 \times 10^2$  cfu/g). Pengasinan 15 hari menunjukkan 0% ( $32 \times 10^4$  cfu/g), 50% ( $44 \times 10^3$  cfu/g), 60% ( $54 \times 10^1$  cfu/g) serta 70% TBUD ( $410 \times 10^4$  cfu/g).

*Kata kunci* : Pengasinan, bawang putih, *Salmonella* sp., hitung cawan dan koloni Bakteri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

**Name** : Ardiansyah  
**Nim** : 60700112049  
**Subject** : Animal Science  
**Title** : Growth of *Salmonella* sp. with concentration Onions White (*Allium sativum*) On Salted Eggs

---

This study aims to determine how the growth of *Salmonella* sp. with the provision of a concentration (*Allium sativum*) Garlic different on salted eggs and how the growth of *Salmonella* sp. with long marinating eggs at concentrations of garlic (*Allium sativum*) is different. This research method is descriptive quantitative to determine the growth of *Salmonella* sp. with variations in the concentration of garlic (*Allium sativum*) on salted eggs by salting plate count method 7, 10 and 15 days. The results showed that salting 7 days with concentrations of 0% (0 cfu / g), 50% (49x10<sup>4</sup> cfu / g), 60% (44x10<sup>3</sup> cfu / g) and 70% (44x10<sup>3</sup> cfu / g). Salting 10 days with concentrations of 0% (58x10<sup>1</sup> cfu / g), 50% (0 cfu / g), 60% (129x10<sup>2</sup> cfu / g) and 70% (113x10<sup>2</sup> cfu / g). Salting 15 days showed 0% (32x10<sup>4</sup> cfu / g), 50% (44x10<sup>3</sup> cfu / g), 60% (54x10<sup>1</sup> cfu / g) and 70% TBUD (410x10<sup>4</sup> cfu / g).

Keywords: Salting, garlic, *Salmonella* sp., Count cup and colonies bacterium

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang berasa lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Di samping mudah diperoleh, harga telur relatif terjangkau. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat, pengencer ramuan obat (Astawan, 2006).

Ketersediaan telur tidak mengenal musim, telur memiliki beberapa kelemahan antara lain kulit telur mudah pecah atau retak dan tidak dapat menahan tekanan mekanis yang besar, sehingga telur tidak dapat diperlakukan secara kasar pada suatu wadah, kelembaban relatif udara dan suhu ruang penyimpanan dapat mempengaruhi mutu telur dan dapat menyebabkan perubahan secara kimia dan mikrobiologis. Oleh sebab itu, usaha pengawetan sangat penting untuk mempertahankan kualitas telur. Jenis pangan penyebab atau diduga menjadi penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan pada tahun 2001-2002 yang tertinggi adalah pangan jasa boga. Pada tahun 2003-2009 trend jenis pangan penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan tertinggi beralih pada masakan rumah tangga, yaitu makanan yang disiapkan oleh ibu rumah tangga di rumah atau di suatu tempat lingkungan pedagang pangan yang memiliki dapur umum untuk memproduksi hasil pangan (BPOM, 2010).

Data Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan oleh BPOM tahun 2011 menunjukkan bahwa telah terjadi 128 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di Indonesia, 38 kasus (29,69%) KLB keracunan pangan tersebut diakibatkan oleh cemaran mikroba, 19 kasus (14,84%) akibat keracunan cemaran kimia, dan 71 kasus (55,47%) tidak diketahui penyebabnya (BPOM, 2011).

Jenis mikroba yang mengontaminasi telur biasanya adalah bakteri *Salmonella*, selain bakteri lain seperti *Escheria coli* (*E. coli*), yang lazim tumbuh dimana-mana dan berasal dari tempat peternakan unggas. Masuknya mikroba tersebut terjadi bila terdapat keretakan pada kulit telur, atau tidak ada lagi lapisan tipis yang melindungi pori-pori kulit telur (Muslim, 1992).

Salah satu cara pengawetan telur adalah dengan mengolahnya menjadi telur asin dengan menggunakan garam dan merebusnya sampai mendidih selama beberapa waktu. Metode pengasinan pada telur dilakukan agar dapat memperlambat reaksi metabolisme, selain dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme penyebab kerusakan atau kebusukan (Winarno dan Koswara, 2002).

Telur asin merupakan salah satu produk pengawetan telur dari kerusakan telur selama penyimpanan. Di samping menghasilkan rasa asin yang khas pada telur, penambahan garam dapur (NaCl) juga bersifat bakteriostatik dan bakterisidal. Ini disebabkan natrium dari garam dapat menaikkan tekanan osmotik yang menyebabkan plasmolisa pada sel mikroba, mengurangi kelarutan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba, serta menghambat aktivitas enzim proteolitik yang berperan pada proses penguraian protein (Dwidjoseputro, 2005).

Selain itu, akan lebih baik jika diberikan pula bawang putih (*Allium sativum*) untuk menambah cita rasa dan aroma yang khas dari rempah-rempah yang berfungsi sebagai antioksidan atau antibakteri terhadap pangan sehingga tidak mudah mengalami pembusukan.

Pada penelitian ini akan ditekankan untuk mengetahui potensi antioksidan yang terdapat dalam bawang putih (*Allium sativum*) yang diduga mempunyai kemampuan sebagai antibakteri. Pemberian bawang putih pada telur asin dari berbagai variasi konsentrasi bawang putih guna mengetahui ada tidaknya bakteri Gram negatif dan seberapa besar kemampuan hambatan pertumbuhan bakteri yang dipicu pada telur asin tersebut. Dalam penelitian ini digunakan variasi konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*). Pemilihan metode aktivitas antioksidan penghambat bakteri yang dicampur pada adonan pembaluran dengan berbagai variasi konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*) yang berbeda dengan kadar garam yang ditentukan yang selanjutnya diamati aktivitas antibakterinya terhadap *Salmonella* sp.

Sehingga hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini guna untuk mengetahui hambatan pertumbuhan bakteri dengan pemberian bawang putih pada telur asin.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan pemberian konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*) yang berbeda pada telur asin?
2. Bagaimana pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan lama pengasinan telur pada konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*) yang berbeda ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan pemberian konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*) yang berbeda pada telur asin.
2. Mengetahui pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan lama pengasinan telur pada konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*) yang berbeda.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keamanan pangan produk peternakan ditinjau dari segi mikrobiologi pangan khususnya pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan variasi konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*) pada telur asin dan dapat pula menambah aroma dan cita rasa dari bawang putih.

### ***E. Defenisi Operasional***

1. Pertumbuhan *Samonella* sp. adalah perbanyakkan sel dan peningkatan ukuran populasi bakteri. *Salmonella* sp. merupakan bakteri Gram negatif berbentuk basil, tidak berspora, panjangnya bervariasi dan kebanyakan spesies bergerak dengan flagel peritrik.
2. Bawang Putih adalah bumbu penyedap makanan yang memiliki rasa harum yang khas. Tanaman rempah ini berkhasiat obat dan berperan sebagai aktivitas antimikroba dalam melawan bakteri Gram negatif dan Gram positif.
3. Telur asin merupakan telur yang diawetkan dengan cara penggaraman yang berperan sebagai pengawet yang dapat mempertahankan serta memperpanjang daya simpan sekaligus meningkatkan cita rasa telur itu sendiri.

### ***F. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)***

Harlina, dkk (2011), dengan judul penelitian “ Pengaruh Suplementasi Minyak Bawang Putih Sebagai Aktivitas Antibakteri dan Waktu Pengasinan Pada Karakteristik Telur Asin “. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak bawang putih memiliki aktivitas antibakteri pada tiga bakteri yang digunakan dalam penelitian ini. Minimum penghambatan konsentrasi atau minimum inhibitory concentration (MIC) dari minyak bawang putih digunakan sebagai penentuan konsentrasi pada telur asin. Kehadiran minyak bawang putih dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*, *Salmonella enteritidis* dan *Staphylococcus aureus*. Putih telur dan kuning telur bebek dengan waktu penggaraman yang berbeda dan konsentrasi minyak bawang putih menunjukkan sedikit perbedaan dalam komposisi kimia dan sifat tekstur seperti waktu pengasinan. Keduanya

dapat menginduksi pematangan kuning disertai eksudasi minyak dan pengembangan berpasir tekstur.

Masniari (2007), dengan judul penelitian “ Uji Daya Hambat Perasan Umbi Bawang Putih (*Alium Sativum Linn*) Terhadap Bakteri Yang Diisolasi Dari Telur Ayam Kampung “. Hasil uji invitro menunjukkan bahwa perasan umbi bawang putih mempunyai efektivitas sebagai antibakteri terhadap *Salmonella* sp. diameter daerah hambat (DDH) 12 .67 mm pada konsentrasi 50% dengan nilai konsentrasi hambat minimal (KHM) 3,125% serta memiliki daya antibakteri terhadap *Escherichia coli* 15 .67 mm pada konsentrasi 50% dengan nilai KHM 3,125%. Semakin besar konsentrasi perasan bawang putih yang digunakan, maka semakin besar zona hambat yang terbentuk .

Darti (2013), dengan judul penelitian “Penambahan Jahe, Bawang Putih Dan Serai Pada Media Pembuatan Telur Asin Terhadap Total Populasi Bakteri Dan Preferensi Konsumen”. Hasil uji organoleptik menyatakan bahwa penambahan jahe, bawang putih dan serai berpengaruh nyata ( $P < 0,05$ ) pada warna hari ke-6, rasa hari ke-6 dan bau hari ke-3 dan ke-6. Panelis lebih menyukai variabel rasa dan bau pada lama penyimpanan hari ke-0 dan variabel warna dan tekstur pada lama penyimpanan hari ke-6. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang perbandingan penambahan jahe, bawang putih dan serai yang tidak dipanaskan.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### *A. Deskripsi Telur*

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang paling lengkap gizinya. Selain itu, bahan pangan ini juga bersifat serba guna karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Telur adalah substansi yang dihasilkan oleh ternak itu sendiri di dalam tubuhnya, substansi tersebut membentuk organisme baru atau kehidupan baru. Selain dibungkus dengan kulit yang keras sebagai pelindung, telur juga dilengkapi dengan bahan makanan yang lengkap (Haryoto, 1993 dan Sudaryani, 2003).

Telur secara umum mengandung utama yang terdiri air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Perbedaan komposisi kimia antar spesies terutama terletak pada jumlah dan proporsi zat-zat yang dikandungnya yang dipengaruhi oleh keturunan, makanan dan lingkungan. Komposisi telur ayam dan itik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Telur Ayam dan Itik

Komposisi	Telur Ayam			Telur Itik		
	Putih Telur	Kuning Telur	Telur Utuh	Putih Telur	Kuning Telur	Telur Utuh
Air (%)	88,57	48,50	73,70	88,00	47,00	70,60
Protein (%)	10,30	16,15	13,00	11,00	17,00	13,10
Lemak (%)	0,03	34,65	11,59	0,00	35,00	14,30
Karbohidrat	0,65	0,60	0,65	0,80	0,80	0,80
Abu (%)	0,55	1,10	0,90	0,8	1,2	1,0

*Sumber : Winarno dan Koswara, 2002*

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat dan bergizi tinggi. Selain itu telur mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat, dan lain sebagainya. Nilai tertinggi telur terdapat pada bagian kuningnya. Kuning telur mengandung asam amino esensial serta mineral seperti besi, fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Sebagian protein (50%) dan semua lemak terdapat pada kuning telur. Adapun putih telur yang jumlahnya sekitar 60% dari seluruh bulatan telur mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat. Untuk mengetahui kandungan gizi dari berbagai macam telur dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Zat Gizi Telur


Zat Gizi	Telur Ayam	Telur Bebek	Telur Bebek Asin	Telur
Kalori (kal)	162	189	195	144
Protein (g)	12,8	13,1	13,6	12,0
Lemak (g)	11,5	14,3	13,6	10,2
Karbohidrat (g)	0,7	0,8	1,4	0
Kalsium (mg)	54	56	120	84
Fosfor (mg)	180	175	157	193
Besi (mg)	2,7	2,8	1,8	1,3
Vitamin A (SI)	900	1230	841	600
Vitamin B <sub>1</sub> (mg)	0,10	0,18	0,28	0,11
Air (g)	74,0	70,8	66,5	76,6

Sumber : Poedjiadi, 1994

Telur merupakan media yang sangat mudah terkontaminasi oleh *Salmonella* sp. dan *Escherichia coli*. Kulit telur kemungkinan mengandung *Salmonella* dan *Escherichia coli* yang berasal dari kotoran ayam dan mungkin mengkontaminasi isi telur pada waktu telur dipecahkan (Masniari, 2007).

## 1. Struktur Telur

Secara umum, telur terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu kulit telur (+ 11% dari berat total telur), putih telur (+ 57% dari berat total telur), dan kuning telur (+ 32 % dari berat total telur) (Powrie, 1996 dan Suprapti, 2002).



Gambar 1. Struktur Telur ( Powrie, 1996 dan Suprapti, 2002)

Nama lain dari putih telur adalah *albumen* telur. Putih telur terdiri sepenuhnya oleh protein dan air. Dibandingkan dengan telur kuning, telur putih memiliki rasa (*flavor*) dan warna yang sangat rendah (Animous, 2007).

Putih telur mempunyai empat bagian utama yaitu lapisan putih telur yang encer bagian luar, lapisan putih telur yang kental, lapisan putih telur encer bagian dalam dan lapisan kalaza. Bagian putih telur diikat dengan bagian kuning telur oleh kalaza, yaitu serabut-serabut protein berbentuk spiral yang disebut *mucin*. Struktur putih telur dibentuk oleh serabut-serabut protein yang terjalin membentuk jala yang disebut *ovomucin*, sedangkan bagian cair diikat kuat di dalamnya menjadi bagian kental (Romanoff AL, 1963).

Telur kuning sekitar setengahnya mengandung uap basah (*moisture*) dan setengahnya adalah kuning padat (*yolk solid*). Semakin bertambah umurnya telur, kuning telur akan mengambil uap basah dari putih telur yang mengakibatkan kuning telur semakin menipis dan menjadi rata ketika telur dipecahkan ke permukaan yang rata (berpengaruh kepada grade dari telur itu sendiri). Selengkapnya akan dibahas di bagian grade telur (Animous, 2007).

Kuning telur terletak di tengah-tengah bila telur dalam keadaan normal atau masih segar. Posisi kuning telur akan bergeser bila telur mengalami penurunan selama penyimpanan telur. Penurunan tersebut terjadi karena elastisitas membran vitellin menurun, akibat adanya penguapan air yang berpengaruh terhadap perubahan tekanan osmotik kuning telur (Sirait, 1986).

Kulit telur memiliki berat sekitar 11% dari jumlah total berat telur. Meskipun terlihat keras dan benar-benar menutupi isi telur, kulit telur itu sebenarnya berpori (*porous*). Dengan kata lain, bau dapat menembus kulit telur dan uap basah (*moisture*) dan gas (terutama karbon dioksida) dapat keluar (Animous, 2007).

Warna kulit telur terdiri dari warna coklat atau putih, tergantung dari perkembangbiakan dari ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping putih menghasilkan telur dengan kulit putih, tetapi ayam dengan bulu berwarna merah dan cuping merah menghasilkan telur dengan kulit coklat. Warna dari kulit telur tidak memiliki pengaruh kepada rasa, nutrisi dan kegunaan dari telur tersebut (Animous, 2007).

Telur memiliki dua selaput pelindung diantara kulit telur dan putih telur. Sesudah telur diletakkan, rongga udara terbentuk diantara selaput telur. Semakin telur bertambah tua, kehilangan uap basah (*moisture*) dan menyusut maka rongga udara akan semakin membesar yang mengakibatkan telur yang sudah lama akan melayang apabila diletakkan ke dalam air (Animous, 2007).

Kalaza adalah tali dari putih telur yang mempertahankan kuning telur agar tetap ditengah – tengah telur (Animous, 2007).

## **2. Komposisi Telur**

Komposisi telur terdiri dari protein dan lemak 13 dan 12 persen serta vitamin dan mineral. Nilai gizi tertinggi telur terdapat pada bagian kuningnya. Kuning telur mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan serta mineral, seperti zat besi, fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Sebagian protein (50%) dan semua lemak terdapat pada kuning telur. Adapun putih telur, yang jumlahnya sekitar 60 persen dari seluruh bulatan telur, mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat (Animous, 2007).

Sumber protein bisa berasal dari protein nabati dan protein hewani. Salah satu sumber protein hewani yang penting bagi manusia disamping daging dan ikan adalah telur. Telur banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum karena mudah didapat dan harganya terjangkau dibandingkan daging dan ikan (Sarwono, 1985).

## **3. Kualitas Telur**

Kualitas telur adalah sekumpulan sifat-sifat telur yang berpengaruh terhadap penilaian atau pemilihan konsumen. Kualitas telur dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu kualitas telur bagian luar dan kualitas telur bagian

dalam. Kualitas telur bagian luar meliputi bentuk, warna, tekstur, keutuhan, dan kebersihan kulit telur. Sedangkan kualitas telur bagian dalam ditentukan antara lain oleh kantong udara (*air cell*), keadaan kuning telur dan yang terpenting keadaan albumen (Sarwono, 1985).

Sudaryani (2000), Pembagian kualitas telur berdasarkan ukuran kedalaman ruang udaranya:


- a. Kualitas AA memiliki kedalaman ruang udara 0,3 cm
- b. Kualitas A memiliki kedalaman ruang udara 0,5 cm
- c. Kualitas B memiliki kedalaman ruang udara lebih dari 0,5 cm

### ***B. Telur Asin***

Bentuk olahan telur itik yang sampai sekarang paling dikenal dan paling digemari oleh masyarakat Indonesia adalah telur asin. Telur asin merupakan telur yang diawetkan dengan cara penggaraman. Tujuan utama dari proses pengasinan telur ini selain membuang rasa amis dan menciptakan rasa yang khas adalah untuk memperpanjang masa simpan telur (Srigandono, 1986).

Pengawetan telur dengan pengasinan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kualitas telur. Hal ini disebabkan oleh garam yang digunakan pada pengasinan berperan sebagai pengawet yang dapat mempertahankan serta memperpanjang daya simpan telur sekaligus dapat meningkatkan cita rasa telur itu sendiri. Telur asin dengan proses pembaluran menggunakan bubuk batu bata dan garam hanya tahan selama 7 hari (Novia, 2011).

Telur asin yang berkualitas baik, memiliki ciri-ciri sebagai berikut dimana memiliki rasa asin yang cukup (pemeraman selama 7-10 hari) dan memiliki kuning telur yang berwarna kemerah-merahan dan terkesan berpasir (masir). Telur asin dengan kondisi yang demikian tersebut, dapat diupayakan dengan pemakaian bahan tertentu berikut proses pembuatan yang tertentu pula (Suprapti, 2002).



*Gambar 2. Telur Asin (Anonim, 2016)*

Pembuatan telur asin yang baik dengan menggunakan perbandingan 4:2 dengan abu gosok/bata merah 400 gram dengan garam 200 gram bisa menampung 10 butir telur (Yuniati, 2011).

Pada pembuatan telur asin, telur direndam dalam larutan garam jenuh atau dilumuri dengan suatu adonan garam, yang terdiri dari garam, abu gosok atau serbuk bata merah. Garam akan masuk ke dalam telur melalui pori-pori kulitnya. Selain garam mikroba yang ada dalam adonan garam juga bisa masuk ke dalam telur melalui pori-pori kulitnya. Media yang lazim digunakan dalam pembuatan

telur asin adalah abu gosok karena mudah didapat dan murah harganya daripada serbuk bata merah (Muslim, 1992).

Menurut Suprapti (2002) untuk membuat produk awetan telur berupa telur asin, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Cara perendaman

Pembuatan telur asin dengan cara perendaman ini merupakan cara yang sederhana, yaitu hanya menyangkut kegiatan perendaman telur di dalam larutan garam jenuh. Larutan garam jenuh dapat tercapai, bila tiap liter air mampu melarutkan 650 gram garam (dengan bantuan pemanasan). Perendaman telur dalam larutan garam jenuh dilakukan setelah larutan garam jenuh dingin. Perendaman dilakukan selama 7–10 hari, sehingga didapat telur asin mentah. Selain berfungsi untuk memberikan rasa asin pada telur, garam juga berfungsi sebagai bahan pengawet.

2) Cara pemeraman

Pembuatan telur asin cara pemeraman, dilakukan dengan membungkus telur menggunakan adonan dan kemudian memeramnya selama 7-10 hari. Setelah proses pemeraman dianggap cukup, adonan pembungkus harus segera dilepas dari kulit telur tersebut, sehingga rasa asin tidak menjadi berlebihan. Adonan pembalut dapat dipakai ulang pada periode pemeraman berikutnya.

Agar adonan pembalut yang mengandung garam dapat menempel kuat pada kulit telur, maka diperlukan bahan yang dapat melekat namun tidak bereaksi. Adapun adonan yang biasa digunakan untuk memeram telur tersebut

ada tiga macam yaitu tanah liat, abu dapur, dan serbuk batu bata. Sebagaimana halnya garam, bau dan warna adonan pembalut akan meresap ke dalam telur dan akan mempengaruhi warna kuning telurnya, sehingga mempengaruhi kualitas produk telur asin. Untuk cara pemeraman terdapat tiga jenis adonan yang masing-masing terdiri atas bahan yang berlainan. Ketiga bahan adonan tersebut adalah :

a) Adonan I

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat adonan I adalah : telur itik 30 butir, tanah liat 20 genggam, sekam padi 0,5 gram, garam halus 1 kg, dan air bersih secukupnya.

b) Adonan II

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat adonan II adalah : telur itik 30 butir, abu dapur 60 genggam, garam halus 1 kg, dan air bersih secukupnya

c) Adonan III

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat adonan I adalah : telur itik 30 butir, serbuk batu bata 60 genggam, garam halus 1 kg, salpeter/sendawa 50 g, air bersih secukupnya, dan sabun cuci secukupnya.

Garam yang ditambahkan pada proses pembuatan telur asin juga berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen *Salmonella* sp. Adanya garam yang terlarut dalam telur asin menyebabkan tekanan osmotiknya lebih tinggi dari pada tekanan osmotik di dalam sel bakteri. Perbedaan tekanan osmotik ini dapat menyebabkan terjadinya plasmolisis pada sel-sel bakteri tersebut. Adanya penambahan garam yang bersifat higroskopis, menurut Hudaya

dan Daradjat juga dapat menyerap air dan mengurangi kelarutan oksigen pada bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Dari hal ini menunjukkan bahwa semakin lama telur asin disimpan, maka bakteri *Salmonella* sp. dapat mengkontaminasi telur asin (Putriana, 2014).

Salah satu pengolahan telur itik yang paling sederhana yaitu dengan pengasinan. Dimana pengasinan merupakan salah satu upaya untuk mengawetkan telur, mengurangi bau amis dan menciptakan rasa khas. Proses pengasinan dilakukan dengan menggunakan garam sebagai bahan pengawetnya (Novia, 2011).

Pengasinan merupakan proses penetrasi garam ke dalam bahan yang diasin dengan cara difusi setelah garam mengion menjadi  $\text{Na}^+$  dan  $\text{Cl}^-$ . Penambahan garam dalam jumlah tertentu pada suatu bahan pangan dapat mengawetkan bahan pangan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tekanan osmotik yang menyebabkan plasmolisis sel mikroba yaitu sel mengalami dehidrasi atau keluarnya cairan dari sel dan plasmolisis sel terhadap  $\text{CO}_2$ . Penambahan garam juga akan mengurangi oksigen terlarut, menghambat kerja enzim dan menurunkan aktivitas air. Proses pengasinan yang berhasil dengan baik ditentukan oleh karakteristik telur asin yang dihasilkan. Telur asin tersebut bersifat stabil, aroma dan rasa telurnya terasa nyata, penampakan putih dan kuning telurnya baik (Winarno dan Koswara, 2002).

Telur asin sangat bermanfaat untuk dikonsumsi, selain berkalsium tinggi, juga mengandung hampir semua unsur gizi dan mineral dan protein maka telur asin baik dikonsumsi oleh anak-anak hingga lansia. Sarwono (1985), zat-zat gizi

yang ada pada telur sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Itulah sebabnya, maka telur sangat dianjurkan untuk dikonsumsi anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang, ibu hamil dan menyusui, orang yang sedang sakit atau dalam proses penyembuhan, serta usia lanjut (Kadir, 2013).

Kandungan mikroba pada telur asin yang dibuat dengan adonan media abu gosok akan lebih rendah dari yang terkandung dalam telur asin yang dibuat dengan media serbuk bata merah (Yuniati, 2011).

Total bakteri pada penggaraman 5 hari dari abu gosok lebih besar jumlahnya dibandingkan pada hari ke-10 justru mengalami penurunan tajam. Pada hari berikutnya kandungan menaik, dikarenakan ada jenis bakteri yang tahan terhadap garam (Yuniati, 2011).

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) bahwa batas maksimum cemaran mikroba dan batas maksimum residu dalam bahan makanan asal hewani khususnya telur yang ditetapkan SNI No.01-6366-2000 yaitu  $1 \times 10^5$  koloni/gram (DSN, 2000).

### ***C. Bawang Putih (Allium sativum)***

Bawang putih merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat obat. Bawang putih berbentuk menyerupai gasing, baunya menyengat, berwarna putih, berasal dari familia *Alliaceae* dengan nama latin *Allium sativum* Linn. Bawang putih mengandung minyak atsiri, *dialil sulfida*, *alilin*, *alisin*, enzim *alinase*, *saponin*, *flavonoid*, *polifenol*, vitamin A, B, dan C (Departemen Kesehatan RI, 1995).

Adapun Klasifikasi Ilmiah dari bawang putih yaitu:

Kerajaan	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Liliopsida
Ordo	: Asparagales
Famili	: Alliaceae
Upafamili	: Allioideae
Bangsa	: Allieae
Genus	: Allium
Spesies	: <i>A. Sativum</i>

Tanaman dengan nama latin "*Allium sativum*" ini termasuk bumbu dapur yang sangat populer di Asia. Ia memberikan rasa harum yang khas pada masakan, sekaligus menurunkan kadar kolesterol yang terkandung dalam bahan makanan yang mengandung lemak. Maka jangan heran jika pada masakan Cina, Korea dan Jepang banyak menggunakan bawang sebagai bumbu utamanya (Tim Redaksi, 2007).



Gambar 3. Bawang Putih (Anonim, 2016)

## 1. Sejarah Bawang Putih

Bawang putih sudah lama digunakan sebagai penyedap rasa dan mempunyai keuntungan dalam mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Sanskrit melaporkan bahwa penggunaan bawang putih untuk kepentingan medis sejak 5.000 tahun yang lalu, dan digunakan dalam pengobatan Cina sejak 3.000 tahun yang lalu. Peradaban Mesir, Babilonia, Yunani, dan Romawi menggunakan bawang putih untuk pengobatan. Pada tahun 1958 untuk menjaga dan meningkatkan stamina mereka sehingga dapat bekerja lebih keras dan produktif. Selain itu, didapatkan beberapa siung bawang putih ditemukan di makam Raja Tutankhamen (Rivlin, 2001)

Para ahli tidak tahu persis kapan bawang putih pertama kali digunakan dalam makanan. Namun bukti historis lain menyatakan bahwa bangsa Sumeria telah menggunakan bawang putih sebagai obat sejak lebih 2600 tahun SM. Sekumpulan manuskrip tua menegaskan bahwa bangsa Mesir kuno sangat mengandalkan bawang putih dalam dunia pengobatan (Thayyarah, 2014).

Pada abad pertengahan, bawang putih disebarluaskan ke daratan Eropa dan mulai digunakan untuk mengobati penyakit pes (sampar) dan penyakit jantung. Selama beberapa abad, bawang putih digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati sejumlah penyakit infeksi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir bawang putih semakin dikenal luas karena kemampuannya mengobati penyakit kanker dan jantung (Thayyarah, 2014).

## 2. Kandungan Bawang Putih

Kandungan zat dalam bawang putih adalah protein 49%, minyak yang mengandung karbohidrat 25%, lemak 22%, garam 47%, dan air 6% (Ismail, 2002).

Menurut Syamsudin (1994) selain *Allicin*, umbi bawang putih mengandung bahan sebagai berikut:

- a. *Alliin*: Asam amino yang membentuk *Allicin*
- b. Sugar Regulation Faktor: Sejenis bahan yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan diabetes.
- c. *Antiarthritis* Faktor: Zat atau faktor anti rematik
- d. Sinar gorwitch (*gorwitch rays*): sejenis sinar radiasi yang dapat merangsang pertumbuhan sel tubuh dan memiliki daya peremajaan.
- e. *Antihaemolitic* Faktor: Factor anti lesu darah atau anti kurang sel darah merah.
- f. *Selenium*: Yaitu sejenis antioksidasi atau anti kerusakan sel tubuh, atau sejenis mikromineral yang sifatnya dapat menghindari penggumpalan darah.
- g. *Allithiamine*: Merupakan sumber ikatan biologis yang aktif dan vitamin B1
- h. Antitoksin: Anti racun atau zat pembersih darah. Memiliki khasiat memperkuat daya tahan tubuh penderita asma.
- i. *Scordinin*: Zat yang dapat mempercepat perkembangan tubuh, berat badan, peningkatan energi dan pengobatan penyakit kardiovaskular.
- j. *Methylallyl trisulfide*: Yaitu pencegah terjadinya penggumpalan darah dan keampuhannya serba guna.

Kandungan khas bawang putih, yaitu sejenis minyak atsiri yang disebut *allicin*, yang merupakan gugusan kimiawi terdiri atas beberapa jenis *Sulfida* dan paling banyak adalah *allil sulfida*. Sulfida ini kaya akan unsur belerang yang sangat mempengaruhi aroma bawang putih (Suririnah, 2005).

Tabel 3 Kandungan kimia lain yang ada dalam bawang putih per 100 g

Kandungan	Jumlah
Air	66,2-71,0 %
Kalori	95,0-122 kal
Protein	4,5-7 %
Lemak	0,2-0,3 g
Karbohidrat	23,1-24,6 g
Serat	0,7 %
Tiamin (Vit B1)	Sedikit
Riboflavin (Vit B2)	Sedikit
Asam askorbat (Vit C)	Sedikit
Kalsium	26,00-42 mg
Kalium	346-377,00 mg
Natrium	16,00 mg
Zat besi	1,40-1,50 mg

Sumber : Syamsiah, 2003

Bawang putih mengandung lebih dari 100 unsur kimiawi dan kandungannya yang terpenting adalah zat alisin yaitu satu jenis asam amino yang mengandung sulfur namun zat ini tidak terdapat pada bawang putih yang masih segar tapi baru terbentuk secara bertahap bersama unsur lainnya ketika dirajang atau dicambuk. Bawang putih yang banyak digunakan sebagai unsur obat diolah menjadi tablet dan beberapa unsur lainnya menggunakan olahan berbentuk ekstrak minyak bawang putih. Bawang putih olahan pada tablet umumnya mengandung kadar zat alisin yang terbatas. Riset-riset laboratorium selama ini diarahkan untuk meneliti bawang putih yang sudah diolah dalam bentuk serbuk, karena serbuk itulah yang dianggap paling efektif sebagai unsur obat (Thayyarah, 2014).

### 3. Manfaat Bawang Putih

Dalam dunia kesehatan bawang putih sering digunakan sebagai obat yaitu diantaranya untuk mengobati penyakit hipertensi, asma, batuk, sakit kepala, sakit kuning, sesak nafas, busung air, ambeien, sembelit, luka memar, abses, luka benda tajam, digigit serangga, cacangan, sulit tidur (insomnia) (Jamilah, 2015).

Tanaman bawang putih merupakan salah satu dari jenis tanaman obat yang banyak memberikan manfaat bagi kesehatan manusia yang menunjukkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah swt. sebagaimana firman Allah dalam QS. As-Syu'araa/26:7-8 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya :

*Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. dan kebanyakan mereka tidak beriman* (Kementrian Agama RI, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan tentang keanekaragaman tumbuhan ciptaan Allah swt. salah satu jenis tanaman obat ialah tanaman bawang putih yang memiliki kandungan alisin yang merupakan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan manusia antara lain dapat menghentikan diare yang disebabkan oleh mikroba (Naurillah, 2000).

Selain Alquran yang menjelaskan seperti diatas dengan keberadaan peran penggunaan bawang putih, tetapi ada ayat lain juga yang menjelaskan mengenai bawang putih. Allah berfirman dalam QS.al-Baqarah/2:61 yang berbunyi:

.... تَخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ... ﴿٦١﴾

Terjemahnya :

Agar Dia mengeluarkan untuk kita dari apa yang ditumbuhkan bumi berupa sayur-mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang (Kementrian Agama RI, 2002).

Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat makanan yang baunya sangat menyengat dan sangat berbau pada mulut jika dikonsumsi tetapi khasiatnya luar biasa bagi manusia.

Hadis dari HR. Ad Dailami dari Ali menyebutkan makanlah bawang putih dan gunakanlah ia sebagai obat karena ia mampu mengobati 70 macam penyakit. Kalaulah malaikat tidak datang (dan berbicara) denganku pastilah aku pun memakannya (Thayyarah, 2014).

Ibnu Manzur menyatakan *adas* adalah sejenis bijian. Perkataan *adas* telah dinyatakan dalam al-Qur'an bersama-sama perkataan *fum*, *basal* dan *qiththa*. *Basal* adalah bawang merah seperti yang dikenali hari ini, kata tunggal bagi basal ialah *basalah* (Manzur, h.1870).

Manakala mengenai maksud lafaz *fum*, ulama mempunyai dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama daripada Ibnu Abbas yang berpendapat maksud *fum* ialah gandum atau roti. Namun begitu, pendapat kedua daripada Ibnu Mas'ud mengatakan jika maksud *fum* ialah gandum mengapa Allah swt. mendatangkan ayat yang bermaksud “*adakah kamu mau menukar sesuatu yang*

*kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik?”* sedangkan gandum merupakan makanan yang baik. Beliau berpendapat perkataan *fum* ialah *thum* yang bersesuaian dengan kacang dal dan bawang merah berbanding gandum (Al-Razi, 1981).

Begitu juga dengan pandangan Imam Kis'aiy yang mengatakan, *fum* ialah *thum* (bawang putih). Pendapat ini adalah bersesuaian dengan perkataan *al-adas* (kacang dal) dan *al-basal* (bawang merah) yang turut disebut di dalam ayat ini (Al-Maraghi, 2001).

Riwayat daripada Juwaibir daripada al-Dahhak mengatakan huruf *tha* ditukarkan kepada huruf *fa* yaitu *thum* ditukarkan kepada *fa* seperti juga perkataan *maghafir* ditukarkan kepada *maghathir*. Mengenai perkataan *fum* ini adalah perkataan *thum* dapat dikuatkan lagi dengan memetik penjelasan al-Qurtubi (M. 671H) yang menyatakan Ibnu Mas'ud membacanya dengan *thumiha* (Al-Qurtubi, 2006).

#### **4. Aktivitas Antimikroba Bawang Putih**

Beberapa studi menunjukkan bahwa bawang putih mempunyai efek antimikroba dalam melawan bakteri Gram positif dan Gram negatif, virus, fungi, dan parasit. Penggunaan bawang putih secara tradisional sudah lama digunakan untuk infeksi digestif, respiratori dan dermatologi (Tattelman, 2005).

Kemampuan bawang putih sebagai antibakteri dalam menghambat pertumbuhan jumlah bakteri didukung oleh penelitian Lingga dan Rustama (2005) yang menyatakan bahwa ekstrak bawang putih yang dilarutkan dalam air bersifat antibakteri terhadap bakteri Gram positif dan Gram negatif, serta Wiryawan, dkk

(2005) menyatakan bawang putih dapat menghambat pertumbuhan koloni bakteri patogen *Salmonella typhimurium* (Lingga dan Wiryawan, 2005).

#### **D. Bakteri *Salmonella* sp.**


Syarat penting kualitas produk asal hewan (termasuk telur) adalah bebas patogen mikrobiologi termasuk *Salmonella* dan *Shigella*. *Salmonella* sp. merupakan bakteri Gram negatif berbentuk basil, tidak berspora, panjangnya bervariasi, dan kebanyakan spesies bergerak dengan flagel peritrik. *Shigella* juga merupakan bakteri Gram negatif yang berbentuk kokobasil, bersifat fakultatif anaerob tetapi paling baik tumbuh secara aerob. Koloninya konveks, bulat, transparan dengan pinggir utuh, mencapai kira-kira 2 mm dalam waktu 24 jam (Jawet, 1996).

Berikut adalah klasifikasi dari Bakteri *Salmonella* sp. :

Kingdom : *Bacteria*  
 Filum : *Proteobacteria*  
 Kelas : *Gamma proteobacteria*  
 Ordo : *Enterobacteriales*  
 Famili : *Enterobacteriaceae*  
 Genus : *Salmonella*

*Salmonella* sp. termasuk dalam kelompok bakteri enteropatogenik yaitu kelompok bakteri penyebab infeksi gastrointestinal. Bakteri enteropatogenik pada umumnya terdapat dalam jumlah kecil di dalam makanan, meskipun demikian jumlah tersebut sudah dapat menimbulkan penyakit. *Salmonella* sp. merupakan bakteri yang sangat infeksiif yaitu hanya dengan jumlah kurang dari 100 sel cukup

untuk menimbulkan penyakit. Bahkan pada keju *cheddar*, kontaminasi dalam jumlah 1-10 sel *S. typhimurium* sudah dapat mengakibatkan keracunan makanan (Humphrey, 2000).



Gambar 4. *Salmonella* sp. (Anonim, 2016)

*Salmonella* sp. pertama kali diidentifikasi pada tahun 1885 oleh dua ilmuwan yang bernama Daniel Elmer Salmon dan Theobald Smith. Penemuan pertama *Salmonella* sp. dilakukan pada babi yang menderita penyakit *hog cholera*. Pada saat itu, penemu menamakan organisme penyebab penyakit *hog cholera* pada babi tersebut dengan nama *Hog-cholerabacillus*. Nama *Salmonella* diberikan pada tahun 1900 oleh seorang ilmuwan Perancis bernama Joseph Leon Lignieres yang mengusulkan penamaan bakteri *Salmonella* sp sebagai sebuah penghargaan bagi salah satu penemu bakteri tersebut. *Salmonella* sp. sering disebut sebagai TPE atau *Thypoid Parathypus Enteritis*. Bakteriologis berkebangsaan Jerman Yang bernama Karl Joseph Eberth menyebut *Salmonella* sp. sebagai *Eberthella thypi* (Brands, 2006).

Sejak ditemukan pada tahun 1885 dan dinamakan pada tahun 1900, telah banyak jenis bakteri yang dimasukkan ke dalam kelompok *Salmonella*. Lebih dari 2500 serovar *Salmonella* telah diketahui menginfeksi hewan dan manusia dan masing-masing *Salmonella* menyebabkan enteritis akut (Kraus, 2003).

*Salmonella* sp. sering bersifat patogen untuk manusia atau hewan bila masuk melalui mulut. Bakteri ini ditularkan dari hewan atau produk hewan kepada manusia, dan menyebabkan enteritis, infeksi sistemik, dan demam enterik. *Salmonella* sp. diklasifikasikan dalam 3 spesies yaitu *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella thypi*, *Salmonella enteritidis*, dan bakteri dengan tipe antigenik yang lain dimasukkan ke dalam serotype dari *Salmonella parathypi enteritidis* bukan sebagai spesies baru. *Salmonella* sp. berbentuk batang, tidak berspora, pada pewarnaan Gram bersifat negatif Gram, ukuran  $1-3,5 \mu\text{m} \times 0,5-0,8 \mu\text{m}$ , besar koloni rata-rata 2-4 mm, memiliki flagel peritrikih kecuali *Salmonella pullorum* dan *Salmonella gallinarum*. *Salmonella* sp. mudah tumbuh pada pembenihan biasa. Bakteri ini dapat hidup dalam air beku untuk jangka waktu yang cukup lama. *Salmonella* sp. resisten terhadap zat-zat kimia tertentu (misalnya hijau brilian, natrium tetrasetat, dan natrium deoksikolat) yang menghambat bakteri lainnya, karena itu senyawa ini bermanfaat untuk dimasukkan dalam pembenihan yang dipakai untuk mengisolasi *Salmonella* sp. dari tinja (Syahrurachman, 1994).

Jumlah mikroba pada kulit telur sekitar 10<sup>2</sup>-10<sup>7</sup> koloni/gram. Beberapa bakteri patogen yang mungkin terdapat pada telur adalah *Salmonella*, *Campylobacter*, dan *Listeria*. Dari berbagai jenis patogen tersebut, *Salmonella*

bisa ditemukan dalam saluran pencernaan hewan (termasuk unggas). Konsumsi pangan yang mengandung sel variabel *Salmonella* dalam jumlah besar (10<sup>5</sup> sel) dapat menyebabkan infeksi *Salmonellosis* dengan gejala pusing, sakit perut bagian bawah dan diare yang kadang didahului oleh sakit kepala dan menggigil. Beberapa *Salmonella* dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius dimana *Salmonella paratyphi* menyebabkan paratifus dan *Salmonella thypi* menyebabkan tifus (Syamsir, 2016).

Telur dikeluarkan dari tubuh induk ayam melalui saluran yang juga digunakan untuk mengeluarkan feses. Hal inilah yang menyebabkan kulit telur bisa menjadi sumber patogen yang berasal dari feses ayam. Selain dari feses ayam, kulit telur juga bisa terkontaminasi karena kontak dengan lingkungan, udara, pakan dan peralatan yang kotor. Patogen yang menempel di kulit telur ini bisa masuk ke dalam isi telur melalui pori-pori kulit terutama jika kulit dalam kondisi lembab (basah). Selain terkontaminasi karena masuknya patogen dari kulit telur, patogen di dalam isi telur juga bisa berasal dari induk ayam yang terinfeksi (Syamsir, 2016).

Menurut Saksono (1986) dalam Anonim (2016) *Salmonella* sp. dapat masuk dalam telur melalui dua cara yaitu :

- a. Secara Langsung (vertikal), melalui kuning telur dan *albumen* (putih telur) dan ovarium induk ayam yang terinfeksi oleh *Salmonella* sp. dalam hal ini biasanya terjadi apabila induk ayam terkena penyakit yang di sebabkan oleh bakteri *Salmonella* sp. dan menghasilkan telur ayam yang terinfeksi ringan dan menghasilkan anak ayam yang terinfeksi dan bertahan hidup serta tumbuh

menjadi besar dan mungkin terus menerus mengekresikan *Salmonella* sp. yang kemudian menghasilkan telur yang mengandung *Salmonella* sp.

- b. Secara Horizontal, dimana *Salmonella* sp. masuk melalui pori-pori kulit (cangkang), hal ini biasanya karena kotoran yang menempel pada kulit telur.

#### ***E. Perhitungan Koloni Bakteri dengan Metode Hitung Cawan (Pour Plate)***

Koloni adalah kumpulan dari mikroba yang memiliki kesamaan sifat-sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Sifat-sifat yang perlu diperhatikan pada koloni yang tumbuh di permukaan medium adalah:

1. Besar kecilnya koloni. Ada koloni yang hanya serupa suatu titik, namun ada pula yang melebar sampai menutup permukaan medium.
2. Bentuk. Ada koloni yang bulat, ada yang memanjang. Ada yang tepinya rata, ada yang tidak rata.
3. Kenaikan permukaan. Ada koloni yang rata saja dengan permukaan medium, ada pula yang timbul yaitu menjulang tebal di atas permukaan medium.
4. Halus kasarnya permukaan. Ada koloni yang permukaannya halus, ada yang permukaannya kasar dan tidak rata.
5. Wajah permukaan. Ada koloni yang permukaannya mengkilat, ada yang permukaannya suram.
6. Warna. Kebanyakan koloni bakteri berwarna keputihan atau kekuningan.
7. Kepekatan. Ada koloni yang lunak seperti lendir, ada yang keras dan kering (Dwidjoseputro, 1978).

Perhitungan jumlah koloni dilakukan dengan hitungan cawan (*Total Plate Counts*) berdasarkan pertumbuhan dapat dilihat langsung tanpa mikroskop. Metode hitungan cawan cukup sensitif untuk menentukan jumlah mikroorganisme yang masih hidup dengan menghitung beberapa jenis mikroorganisme sekaligus mengisolasi dan mengidentifikasi yang berasal dari suatu mikroorganisme yang mempunyai penampakan pertumbuhan spesifik. Dengan metode *Total Plate Counts* jumlah koloni dalam contoh dihitung sebagai berikut : Koloni per ml atau per gram = jumlah koloni per cawan x 1/FP (faktor pengenceran) Selanjutnya cawan petri yang dipilih dan dihitung mengandung jumlah koloni antara 30-300 (Permana dan Kusmiati, 2007).

Kuantifikasi populasi mikroorganisme sering dilakukan untuk mendapatkan jumlah kuantitatif mikroorganisme target. Kuantifikasi tersebut dapat berupa penentuan jumlah sel dan penentuan massa sel. Penentuan jumlah sel dapat dilakukan pada mikroorganisme bersel tunggal. Penentuan massa sel dilakukan bagi mikroorganisme bersel tunggal dan mikroorganisme berfilamen. Penghitungan jumlah sel dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya metode hitungan cawan (*Total Plate Count*), hitungan mikroskopis langsung (*Direct Count*) dan penghitung *Coulter*. Cara lain penentuan jumlah sel adalah dengan menyaring sampel dengan saringan membran kemudian daringan tersebut diinkubasi pada permukaan media yang sesuai. Koloni-koloni yang terbentuk berasal dari satu sel tunggal yang dapat hidup (Microbiology, 2012).

Perhitungan koloni bakteri dapat dilakukan dengan menggunakan *Colony counter*. Koloni bakteri yang tumbuh dapat menggambarkan laju pertumbuhan bakteri pada medium tertentu. Faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan bakteri diantaranya medium tumbuh, pH, suhu, Oksigen, dan salinitas (Lisa, 2016).

Dalam metode perhitungan cawan, bahan yang diperkirakan mengandung lebih dari 300 sel mikroba per ml atau per gram atau per cm. Perlakuan pengenceran sebelumnya ditumbuhkan pada medium agar di dalam cawan petri. Setelah inkubasi, akan terbentuk koloni pada cawan petri tersebut dalam jumlah yang dapat dihitung, dimana jumlah yang terbaik antara 30-300 koloni. Pengenceran biasanya dilakukan secara desimal yaitu 1 : 10, 1 : 100, 1 : 1000 dan seterusnya (Waluyo, 2007).

Pengukuran pertumbuhan mikroorganisme dilakukan dengan metode cawan. Prinsip dari metode ini adalah sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium sedemikian sehingga mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung tanpa menggunakan mikroskop. Jumlah koloni mikroorganisme dihitung berdasarkan *Standard Plate Count* (SPC). Metode ini cukup sensitif karena hanya sel mikroorganisme yang hidup yang dapat dihitung. Selain itu beberapa sel yang berdekatan dapat dihitung sekaligus sebagai suatu koloni (Hanafi, et al., 2006).

Metode hitungan cawan menggunakan anggapan bahwa setiap sel akan hidup berkembang menjadi satu koloni. Jumlah koloni yang muncul menjadi indeks bagi jumlah organisme yang terkandung di dalam sampel. Teknik

penghitungan ini membutuhkan kemampuan melakukan pengenceran dan mencawakan hasil pengenceran. Cawan-cawan tersebut kemudian diinkubasi dan kemudian dihitung jumlah koloni yang terbentuk. Cawan yang dipilih untuk penghitungan koloni, sesuai dengan kaidah statistik adalah cawan yang berisi 30-300 koloni. Jumlah organisme yang terdapat dalam sampel asal dihitung dengan cara mengalikan jumlah koloni yang terbentuk dengan faktor pengenceran pada cawan bersangkutan (Microbiology, 2012).

Untuk melaporkan suatu analisis mikrobiologi digunakan suatu standar yang disebut "*Standard Plate Count*" yang menjelaskan cara menghitung koloni pada cawan serta cara memilih data yang ada untuk menghitung jumlah koloni dalam suatu contoh. Cara menghitung koloni pada cawan adalah sebagai berikut :

1. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30 sampai 300.
2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan suatu kumpulan koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan, dapat dihitung sebagai satu koloni.
3. Suatu deretan koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung sebagai satu koloni (Dwidjoseputro, 1978).

Secara kuantitatif koloni bakteri dapat dihitung dengan cara menghitung populasinya secara umum atau dengan kata lain menghitung seluruh sel bakteri yang ada dalam media termasuk sel yang mati, dan menghitung sel bakteri hidup dengan menggunakan teori pendekatan. Teknik perhitungan cara pertama relatif mudah dilakukan, karena pada cara yang kedua jumlah koloni yang dapat dihitung

sangat tergantung dari aktivitas bakteri dalam media pertumbuhannya. Walaupun demikian kedua cara perhitungan ini sering dipakai sesuai dengan tujuan percobaannya (Oktavia, 2008).

Pengenceran dilakukan dengan menambahkan larutan, sesuatu yang berbentuk cair ke dalam medium yang akan dibiakan. Di dalam cara perhitungan ini, kerapatan pertumbuhan koloni harus dipertimbangkan. Jika pertumbuhan terlalu rapat, hasilnya akan sulit dipertanggungjawabkan. Demikian juga untuk pertumbuhan yang terlalu jarang sehingga diperlukan pemilihan cawan petri yang pertumbuhan koloni kumannya paling layak untuk dihitung, yang biasanya diambil dari cawan petri yang pertumbuhan koloninya berkisar 30-300 koloni per cawan petri (Setiyono, 2013).

Tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Perbandingan 1 : 9 digunakan untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya, sehingga pengenceran berikutnya mengandung  $1/10$  sel mikroorganisme dari pengenceran sebelumnya (Pelczar, 2006).

Metode penghitungan cawan menggunakan media agar karena apabila koloni tumbuh pada media agar akan lebih mudah mengamatinya. Berbeda apabila menggunakan media *broth*. Pada media *broth* akan lebih sulit dalam menghitung koloni karena bentuknya adalah cair. Apabila bentuknya padat seperti agar, maka akan lebih mudah menghitungnya (Hadiutomo, 1990).

Metode untuk perhitungan ini menggunakan pengenceran berseri atau pengenceran serial dari sampel yang mengandung mikroorganisme. Koloni bakteri yang muncul akibat pertumbuhan mikroorganisme, diasumsikan berasal dari satu sel bakteri. Oleh karena itu, jumlah bakteri pada sampel asal dapat ditentukan dengan menghitung jumlah koloni dan memperhitungkan faktor pengenceran (Hadiutomo, 1990).

Pada hitungan cawan kita hanya menghitung sel bakteri yang hidup saja yang membentuk koloni pada media karena apabila menggunakan satuan jumlah sel/ml, itu berarti harus menghitung seluruh sel yang ada dalam cawan. Tidak hanya yang hidup saja, yang matipun juga ikut terhitung. Selain itu, dalam hitungan cawan, tujuannya adalah menghitung koloni. Sedangkan apabila menggunakan satuan sel/ml, maka tidak akan mengetahui secara pasti berapa jumlah sel dalam setiap koloni yang terbentuk. Dengan demikian tidak bisa menggunakan satuan sel/mL. Itulah tujuannya menggunakan CFU/mL, karena untuk menghitung sel yang membentuk koloni yang tampak saja (Irianto, 2006).

Pada tiap perhitungan bakteri ketepatan berkurang dengan meningkatnya konsentrasi sel-sel. Begitu halnya bila jumlah yang dihitung terlalu kecil. Bahan yang mengandung sejumlah bakteri (kira-kira lebih dari  $10^4$ /ml) biasanya diencerkan dari 1:10<sup>5</sup> atau lebih tergantung pada bahan pemeriksaan atau metode hitung, sehingga hasil hitungan yang diperoleh dapat diandalkan dan memudahkan perhitungan. Perhitungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perhitungan secara langsung dan perhitungan secara tidak langsung (Rizki, 2013).

Menurut Hadiutomo (1990) menyatakan bahwa perhitungan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penentuan volume total

Cara ini adalah semacam modifikasi penentuan hematokrit pada pengukuran volume total butir-butir darah, misalnya 10 ml biakan dimasukkan ke dalam tabung reaksi khusus (tabung hopklins) yang bagian bawahnya berupa silinder dan bergaris ukuran.

2. Metode turbidometri

Teknik ini sudah dipakai sebagai cara mengukur kekeruhan suspensi atas dasar penyerapan dan pemencaran cahaya yang dilintaskan, sehingga yang mengandung lebih dari  $10^7$ - $10^8$  sel/ml, tampak lebih keruh oleh mata telanjang. Suatu volume biakan yang telah ditakar ditempatkan dalam tabung khusus yang jernih dengan diameter tertentu.

Menurut Yulneriwanti (2013), menyatakan bahwa perhitungan langsung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perhitungan sel langsung

Cara ini menggunakan bilik hitung (*hemocytometer*) yang menghasilkan hitungan total, karena semua sel terhitung, baik sel yang hidup maupun sel yang mati. Karena bakteri itu kecil, maka perhitungan yang dilakukan secara statistik dapat diterima, namun harus dibuat suspensi sekurang-kurangnya  $10^7$  / ml.

## 2. Menghitung dengan alat penghitung elektronik

Dengan alat ini dapat dihitung beribu-ribu bakteri dalam beberapa detik. Penggunaan alat ini banyak didasarkan atas kerja dengan lobang pengintai elektronik (dapat disamakan dengan mata elektronik) kerjanya tergantung pada interupsi dari berkas cahaya elektronik yang melintasi suatu ruang antara dua ruang elektron yang berdekatan letaknya. Tiap partikel yang karena perbedaan konduktivitas sel dan cairan. Interupsi ini dicetak oleh suatu alat secara elektris.

## 3. Menghitung dengan filter membran

Contoh cairan yang disaring dan ditakar dengan filter steril yang terbuat dari membran berpori. Bakteri yang tertahan oleh filter itu kemudian dihitung langsung. Dalam hal ini banyak bakteri dalam cairan tersebut tidak boleh terlalu banyak dan tersebar rata.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Waktu dan Tempat Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan pada 03 Juni - 14 Juli 2016. Bertempat di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

##### ***B. Alat dan bahan***

###### **1. Alat**

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu *autoclav*, baskom, bunsen, botol selai, blender, cawan petri, erlenmeyer, vorteks, hot plate, *incubator*, *colony counter*, timbangan, tabung reaksi, gelas ukur, gelas kimia, kaki tiga dan kasa asbes, *laminar air flow*, mikropipet, neraca analitik, oven, pisau, rak tabung.

###### **2. Bahan**

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu, abu gosok, garam, bawang putih, telur itik, media *Bismuth Sulfitate Agar (BSA)*.

##### ***C. Metode Penelitian***

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif untuk mengetahui pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan variasi konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*) pada telur asin dengan metode hitung cawan.

#### ***D. Prosedur kerja***

##### **1. Pembuatan Telur Asin**

- a. Menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan.
- b. Membersihkan kerabang telur itik menggunakan amplas.
- c. Mengupas bawang putih dan menimbang dengan membuat konsentrasi 50%, 60% dan 70%, cara membuat konsentrasi yaitu:
  - $50\% = \frac{50}{100} \times 400 = 200$  gram bawang putih
  - $60\% = \frac{60}{100} \times 400 = 240$  gram bawang putih
  - $70\% = \frac{70}{100} \times 400 = 280$  gram bawang putih
- d. Mencuci lalu menghaluskannya menggunakan blender.
- e. Menuangkan bawang putih yang telah halus kedalam baskom.
- f. Menimbang dan mencampur bahan-bahan seperti garam 200 gram dan abu gosok 400 gram dan menambahkan air.
- g. Mengaduk bahan yang sudah dicampur sampai merata dan berbentuk adonan.
- h. Adonan tersebut dibalut pada telur hingga merata dengan cara menimbang.
- i. Pengasinan telur tersebut selama 7, 10 dan 15 hari.

## 2. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang terbuat dari kaca seperti cawan petri, erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, disterilisasi dalam oven pada suhu 180°C selama 2 jam.

Untuk proses sterilisasi media yang telah dibuat, cawan petri sebagai tempat media padat dan tabung reaksi yang akan digunakan untuk tempat media cair disterilkan pada autoclav dengan menyalakan api pada kompor. Media tersebut harus dibungkus *aluminium foil* beserta *plastick silk* terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam *autoclav* selama 45 menit pada suhu 121°C ditandai dengan adanya suara letupan pada *autoclav*. Tahap selanjutnya menunggu selama 15 menit.

## 3. Pembuatan Media *Bismuth Sulfitate Agar (BSA)*

*Bismuth Sulfitate Agar (BSA)* merupakan jenis media agar digunakan untuk mengisolasi *Salmonella* sp. Media ditimbang sebanyak 10,4 g dan aquadest 300 ml yang telah disaring dan di *autoclav*. Media dan aquadest tersebut dicampur kemudian dihomogenkan dengan *stirrer* pada *hot plate*. Setelah media telah homogen/larut. Selanjutnya menyiapkan kaki tiga, kasa asbes dan menyalakan api bunsen. Memanaskan media tersebut sambil menggoyang-goyangkan agar homogen sekitar 30 menit hingga mendidih. Biarkan media mendidih selama 1 menit kemudian matikan api bunsen.

## 4. Penyiapan *Laminar Air Flow (LAF)*

*Laminar Air Flow (LAF)* adalah tempat yang digunakan untuk melakukan suatu proses yang membutuhkan kondisi steril seperti penanaman bakteri. Proses pengerjaan harus dilakukan dalam keadaan steril dengan

menyemprotkan alkohol 70% sebagai desinfektan baik pada *handgloves* maupun meja pengerjaan untuk menjaga sterilitas selama pengujian. Setelah *Laminar Air Flow* sudah didesinfektan dengan alkohol 70%, tahap selanjutnya dengan melakukan *Blower* untuk membasmi/kuman selama 5 menit. Kemudian menekan tombol UV untuk membunuh bakteri secara menyeluruh pada *Laminar Air Flow* selama 30 menit sampai 1 jam yang ditandai dengan nyala lampu sudah mati.

**5. Aplikasi *Salmonella sp* pada Telur Asin Konsentrasi Bawang Putih (*Allium sativum*) (Susanti, 2013)**

- a. Menyiapkan alat dan bahan yang sudah steril ke dalam *laminar air flow*
- b. Mengambil telur asin yang telah diasinkan dengan pengasinan selama 7, 10 dan 15 hari dengan konsentrasi bawang putih 0%, 50%, 60% dan 70%.
- c. Dibersihkan kulit telur lalu didesinfeksi dengan alkohol 70% di bagian runcing telur.
- d. Dibuka kulit bagian runcing telur dan dituangkan isi telur ke dalam botol selai steril.
- e. Dihomogenkan isi telur tersebut (ekstrak telur) dengan batang pengaduk.
- f. Mengambil masing-masing tabung reaksi yang berisi aquadest steril 9 ml.
- g. Membuat pengenceran  $10^{-1}$  sampai dengan  $10^{-4}$ . Kemudian memipet masing-masing 1 ml ke dalam cawan petri steril.

- h. Menuangkan media *Bismuth Sulfite Agar* 15-20 ml (suhu 40°C sampai 50°C) ke dalam masing-masing cawan petri tersebut kemudian digoyangkan secara hati-hati seperti angka delapan dan dibiarkan memadat.
- i. Setelah agar memadat, dimasukkan cawan petri tersebut ke dalam *incubator* bersuhu 37°C 24 jam dalam keadaan cawan terbalik.
- j. Menghitung jumlah sel sampel yang mengandung 30-300 koloni atau sel dengan menggunakan *colony counter*.

#### ***E. Analisis Data***

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan cara menghitung jumlah koloni dari hasil pengenceran bertingkat dari berbagai konsentrasi bawang putih yang berbeda dengan pengasinan 7, 10 dan 15 hari pada telur asin.

Rumus Menghitung Jumlah Koloni: (Helmiyati dan Nurrahman, 2010).

$$N = n \times \frac{1}{FP} \quad \text{dimana : } N = \text{Jumlah sel/ml atau/gram sampel}$$

$n = \text{Jumlah koloni pada cawan}$   
 $FP = \text{Faktor pengenceran}$

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan variasi konsentrasi bawang putih (*Allium sativum*) pada telur asin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan Variasi Konsentrasi Bawang Putih (*Allium sativum*) pada Telur Asin

Lama pengasinan (hari)	Konsentrasi (%)	Total koloni bakteri (cfu/g)
7	0	0
	50	$49 \times 10^4$
	60	$66 \times 10^3$
	70	$44 \times 10^3$
10	0	$58 \times 10$
	50	0
	60	$129 \times 10^2$
	70	$113 \times 10^2$
15	0	$32 \times 10^4$
	50	$44 \times 10^3$
	60	$54 \times 10$
	70	TBUD ( $410 \times 10^4$ )


Sumber : Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

#### B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1 menunjukkan konsentrasi bawang putih dengan lama pengasinan terdapat jumlah koloni *Salmonella* sp. yang berbeda pada telur asin. Lama pengasinan 7, 10 dan 15 hari untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan *Salmonella* sp. pada bawang putih pada telur asin.

Pada pengasinan 7 hari diketahui jumlah koloni *Salmonella* sp. nilainya bervariasi dilihat dari beberapa konsentrasi yang berbeda. Pada konsentrasi 0% hanya terdapat 1 sel saja yang ada. Konsentrasi 50% ( $49 \times 10^4$  cfu/g), konsentrasi 60% ( $66 \times 10^3$  cfu/g) dan 70% ( $44 \times 10^3$  cfu/g).

Keberadaan *Salmonella* sp. pada telur asin dapat dilihat pada cawan petri dengan menggunakan media *Bismuth Sulfitate Agar* dinyatakan positif tercemar *Salmonella* sp. jika koloni berwarna abu-abu, kecoklatan hingga dengan adanya bintik-bintik hitam. Hal ini dapat dilihat pada Gambar berdasarkan hasil penelitian dengan pengasinan telur 7 hari sebagai berikut.




C  
Gambar 5. A (Konsentrasi 0%)  
C (Konsentrasi 60%)

D  
B (Konsentrasi 50%)  
D (Konsentrasi 70%)

Ciri-ciri ini sesuai dengan Bacteriological Analytical Manual (2007) yang menyatakan bahwa selain coklat, koloni dari *Salmonella* sp. dapat berwarna abu-abu atau hitam. Di sekitar media pada permulaan biasanya berwarna coklat, tetapi seiring dengan berjalannya inkubasi, warna dapat berubah menjadi hitam.

Konsentrasi 0% yang hanya memiliki 1 sel dan tidak tergolong dalam perhitungan koloni karena tidak memenuhi syarat *Standar Plate Count* (SPC). Syarat khusus untuk menghitung jumlah koloni bakteri sesuai standar (*Standar Plate Count*) yaitu yang mengandung 30-300 koloni bakteri. Hal ini sesuai menurut Hadioetomo (1993) bahwa jumlah koloni yang muncul pada cawan petri merupakan suatu indeks bagi jumlah organisme yang dapat hidup dalam sampel. Untuk memenuhi persyaratan statistik, cawan yang dipilih untuk perhitungan koloni adalah yang mengandung antara 30-300 koloni. Karena jumlah mikroorganisme dalam sampel tidak diketahui sebelumnya, maka untuk memperoleh sekurang-kurangnya satu cawan yang mengandung koloni dalam jumlah yang memenuhi syarat tersebut harus dilakukan sederetan pengenceran dan pencawanan.

Jumlah koloni *Salmonella* sp. dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 4.1 Jumlah Koloni Bakteri dari konsentrasi Bawang Putih pada Pengasinan 7 hari

Pada grafik diatas menunjukkan konsentrasi 0% tidak adanya koloni yang bisa dihitung berdasarkan *Standar Plate Count*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan koloni tidak tumbuh dalam jumlah banyak dan bahkan tidak ada yang tumbuh pada saat pengujian ruang isolasi kurang steril, penggunaan alat dan bahan yang kurang steril yang ditandai dengan keluar masuknya alat dan bahan pada *laminar air flow* sehingga menimbulkan kontaminasi. Faktor lain yaitu pada media *Bismuth Sulfitate Agar* yang masih dalam keadaan panas pada saat penuangan dan penghomogenan media pada cawan petri yang menimbulkan *bakteri tersebut mati*. Hal ini sesuai pendapat Megamii (2009) bahwa banyaknya kontaminan dan tidak tumbuhnya bakteri dimungkinkan terjadi karena batang penyebar yang kurang steril, kemudian pada saat penuangan atau saat mengambil sampel yang kurang steril sehingga kontaminan dapat tumbuh.


Konsentrasi 50% , 60% dan 70% pada pengasinan 7 hari menunjukkan adanya penurunan jumlah koloni *Salmonella sp*. Ini menunjukkan bawang putih menghambat pertumbuhan *Salmonella sp*. ditandai dengan berkurangnya jumlah koloni. Pendapat Ankri (1997) bahwa senyawa antimikroba pada bawang putih yang diduga sebagai antibakteri yaitu minyak atsiri dan alisin. Dugaan terhadap cara kerja alisin dalam menghambat pertumbuhan bakteri menurut peneliti di *Weizmann Instintute of Science* adalah dengan menghambat dua jenis enzim. Enzim yang dihambat adalah sistem *proitenase* dan alkohol *dehidrogenease*. Sistem *proitenase* adalah enzim yang memberikan kemampuan terhadap bakteri untuk merusak sel tubuh dan jaringan, sedangkan alkohol *dehidrogenease* adalah

enzim utama metabolisme dan daya tahan bakteri. *Alisin* menghambat metabolisme dari bakteri.

Telur asin pada pengasinan 7 hari tercium aromanya dengan aroma khas bawang putih yang masih pekat. Baunya cocok pada indera penciuman yang aromanya masih dengan bau khas.


Telur asin dengan hari ke-10 dengan konsentrasi 0% ( $58 \times 10^1$  cfu/g), 50% tidak terdapat koloni, 60% ( $129 \times 10^2$  cfu/g) dan pada 70% ( $113 \times 10^2$  cfu/g). Lama pengasinan 10 hari cenderung menghambat koloni dimana pada konsentrasi 0% ( $58 \times 10^1$  cfu/g) menghambat pada konsentarsi 50% ditandai tidak adanya koloni, tetapi 60% jumlah koloni bertambah ( $129 \times 10^2$  cfu/g) jika dibandingkan dengan 0% ( $58 \times 10^1$  cfu/g). Pada konsentarsi 70% jumlah koloni semakin berkurang ( $113 \times 10^2$  cfu/g) dari konsentarsi 60% ( $129 \times 10^2$  cfu/g). Tampak dilihat pada Gambar dibawah ini.





Gambar 6. A (Konsentrasi 0%)  
 C (Konsentrasi 60%)  
 B (Konsentrasi 50%)  
 D (Konsentrasi 70%)

Jumlah koloni pada Grafik dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut.



Gambar 4.2 Jumlah Koloni Bakteri dari konsentrasi Bawang Putih pada Pengasinan 10 hari

Dari Grafik diatas, lama pengasinan 10 hari cenderung menghambat koloni dimana pada konsentrasi 0% ( $58 \times 10^1$  cfu/g) menghambat pada konsentrasi 50% ditandai tidak adanya koloni, tetapi 60% jumlah koloni bertambah jika dibandingkan dengan 0%. Pada konsentarsi 70% jumlah koloni semakin berkurang dari konsentrasi 60%. Jumlah koloni pada konsentrasi 0% sangat sedikit nilainya (580 cfu/g) dibanding dari konsentrasi 60% dan 70%. Konsentrasi 50% tidak adanya tumbuh koloni bakteri. Tidak konsistennya data

yang diperoleh disebabkan penggunaan ruang isolasi, alat dan bahan yang digunakan kurang steril serta penuangan media pada cawan petri. Selain itu, cara merekat plastik silk pada cawan petri sangat mempengaruhi terjadinya kontaminasi. Hal ini sesuai pendapat Megamii (2009) bahwa banyaknya kontaminan dan tidak tumbuhnya bakteri dimungkinkan terjadi karena batang penyebar yang kurang steril, kemudian pada saat penuangan atau saat mengambil sampel yang kurang steril sehingga kontaminan dapat tumbuh.

Telur asin yang ke-10 hari aroma khas bawang putih sudah berkurang, aromanya tidak pekat lagi. Aroma khas bawang putih berkurang karena seiring berjalan waktu penyimpanan pada adonan. Semakin lama bawang putih pada adonan maka semakin berkurang aroma khasnya.

Pada hari ke-15 jumlah koloni pada 0% ( $32 \times 10^4$  cfu/g), 50% ( $44 \times 10^3$  cfu/g), 60% ( $54 \times 10^1$  cfu/g) dan 70% ( $410 \times 10^4$  cfu/g/TBUD). Perlakuan dengan pengasinan ke-15 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



A


B



Gambar 7. A (Konsentrasi 0%)      B (Konsentrasi 50%)  
 C (Konsentrasi 60%)      D (Konsentrasi 70%)

Pengasarian 15 hari dapat menghambat pada konsentrasi 0%, 50 % dan 60% kecuali 70 % yang justru mengalami kenaikan jumlah koloni yang nilainya TBUD ( $410 \times 10^4$  cfu/g). Nilai koloni dari 70% dikategorikan terlalu banyak untuk dihitung (TBUD) yang melebihi syarat *Standar Plate Count* koloni yang mengandung 30-300. TBUD terjadi karena pengenceran masih rendah sehingga jumlah koloni bakteri  $> 300$  pada cawan petri. Hal ini sesuai pendapat Fardiaz (2005), yang menyatakan bahwa TBUD terjadi karena pengenceran yang terlalu rendah, kondisi pH dan suhu yang tidak sesuai dan adanya kontaminasi. Kontaminasi bisa disebabkan karena alat yang digunakan, lingkungan dan diri yang tidak aseptis.

Jumlah koloni *Salmonella* sp. yang tumbuh pada telur asin dengan variasi konsentrasi bawang putih yang digunakan dari cawan petri dengan metode hitung cawan (*pour plate*) dengan lama pengasarian 15 hari dapat dilihat pada Grafik dibawah ini sebagai berikut.



Gambar 4.3 Jumlah Koloni Bakteri dari konsentrasi Bawang Putih pada Pengasinan 15 hari

Keberadaan *Salmonella* sp. pada telur asin dengan melibatkan penggunaan bawang putih dapat menghambat pertumbuhan bakteri dimana dari 0%, 50% dan 60% jumlah koloni mengalami penurunan yang cukup baik. Pada konsentrasi 70% pertumbuhan koloni justru mengalami peningkatan pertumbuhan jika dilihat dari konsentrasi 0%, 50% dan 60%.

Konsentrasi 70% ini terjadi karena semakin lama penyimpanan telur asin maka semakin banyak jumlah koloni bakteri yang tumbuh. Dari hal ini pendapat Putriana (2014) menunjukkan bahwa semakin lama telur asin disimpan, maka bakteri *Salmonella* sp. dapat mengkontaminasi telur asin.

Selain itu, peran bawang putih sudah tidak aktif dalam menghambat bakteri sehingga mengalami pertumbuhan bakteri yang cukup tajam. Ini terjadi karena adanya bakteri yang bisa bertahan dan berkembang biak sehingga menimbulkan dalam keadaan banyak. Berdasarkan pendapat Yuniati (2011) total bakteri pada pengasinan 5 hari dari abu gosok lebih besar jumlahnya dibandingkan pada hari ke-10 justru mengalami penurunan tajam. Pada hari

berikutnya kandungan menaik, dikarenakan ada jenis bakteri yang tahan terhadap garam.

Pengasinan telur dengan 15 hari aroma bawang putih sudah tidak tercium dengan bau yang khas melainkan baunya tercium aroma lain, hal ini bisa jadi karena semakin lamanya pengasinan dengan penambahan bawang putih segar dalam adonan pada telur yang menyebabkan mengalami pembusukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian tentang pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan variasi konsentrasi bawang putih pada telur asin adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi bawang putih yang cenderung berkurang pertumbuhan koloni *Salmonella* sp. pada 70%
2. Pengasinan yang terlihat pertumbuhan koloni *Salmonella* sp. menurun ialah hari ke-15.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penggunaan konsentrasi bawang putih 70% dengan lama pengasinan 15 hari dalam pembuatan telur asin namun perlu penelitian lebih lanjut untuk menindaklanjuti konsentrasi bawang putih terhadap pertumbuhan *Salmonella* sp.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2011. [http:// repository. usu.ac.id/bitstream/123456789/29772/4/Chapter% 20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29772/4/Chapter%20II.pdf).(3 Januari 2016).
- Animous.2007. *Penuntun Kesehatan Masyarakat Veteriner* (susu, daging dan telur). Banda Aceh: Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Syiah Kuala.
- Al-Razi (1981), *Tafsir Fakh al-Razi.*, j.3, h. 107. Rujuk juga Ibn Manzur (t.t), *Lisan al Arab*, h. 2836.
- Al-Maraghi .2001. *Tafsir Maraghi.*, j.1, h. 141.
- Al-Qurtubi .2006. *Tafsir Qurtubi*, j.2, h. 146-147. Rujuk juga al-Maraghi, *Tafsir Maraghi*.
- Ankri, S, dkk. 1997. *Alicin from garlic strongly inhibits cysteine proitenance and cytopathic effects of entamoeba histolytica*. Antimicrobial agents chemother.41 (10):2286-2288.
- Astawan, M. 2006. *Telur Asin, Aman dan Penuh Gizi*. [http://www.Departemen Kesehatan Indonesia. Htm](http://www.DepartemenKesehatanIndonesia.Htm).07.35 pm.31/10/2006.
- Bacteriological Analytical Manual (BAM). 2007. *Salmonella*.[http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalM anualBAM/ucm070149.htm](http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManualBAM/ucm070149.htm) (06/06/2010).
- BPOM. 2010. *Data KLB Keracunan Pangan Tahun 2009 di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Data KLB Keracunan Pangan Tahun 2011 di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Brands, D. 2006. *Deadly Disease and Epidemics Salmonella*. Philadelphia : Chealsea House Publishers.
- Darti, D. 2013. *Penambahan Jahe, Bawang Putih Dan Serai Pada Media Pembuatan Telur Asin Terhadap Total Populasi Bakteri dan Preferensi Konsumen*. Bengkulu : UNIB.
- Dewan Standarisasi Nasional. 2000. *Standar Nasional Indonesia No. 6366-2000 : Batas maksimum cemaran mikroba dan batas maksimum residu dalam bahan makanan asal hewan*. Jakarta : Departemen Pertanian.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. *Materi Media Indonesia . Jilid IV*. Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. Jakarta.
- Dwidjoseputro, D. 2005. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Dwidjoseputro. 1998. *Dasar-dasar Mikrobiologi*. Jakarta : Djambatan.
- Fardiaz, S. 2005. *Analisis Mikrobiologi Pangan*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Haediotomo, RS. 1993. *Mikrobiologi Pangan*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Harlina, P.W, M.M, Hu, A.M, Legowo dan Y.B, Pramon . 2011. *The Effect Of Supplementation Garlic Oil As An Antibacterial Activity And Salting Time On The Characteristics Of Salted Egg*. Cina: Huazhong Agricultural University.
- Hadiutomo. 1990. *Mikrobiologi Dasar Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Hanafi, A., Amrinsyah N., I. Imran dan S. Soegiri. 2006. *Degradasi Kekuatan Beton Akibat Intrusi Mikroorganism*. Jurnal Teknik Sipil.
- Haryoto. 1993. *Pengawetan Telur Segar*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Helmiyati, A.F dan Nurrahman. 2010. *Penuntun Praktikum Rancangan Percobaan dengan spss*. Universitas Udayana.
- Humphrey, T. 2000. " *Public Health Aspect of Salmonella Infection* ". In :*Salmonella In Domestic Animal* (Eds. C. Wrey and A. Wrey). CAB International. UK.
- Irianto,Koes .2006 .*Mikrobiologi*. Bandung : Yrama Widya.
- Ismail, A.Muthalib. 2002. *Bawang Dalam Pengobatan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibn Manzur (t.t), (1870).Lisan al-.,Arab. Abdullah Ali al-Kabir (ed) j.6. Kaherah: Daral-Ma"arif.
- Jamilah. 2012. *Daya Hambat Antibakteri Kombinasi Kunyit, Bawang Putih, Zink Terhadap Staphylococcus Aureus dan E. coli dengan Metode Difusi Disk*. (2012) [http://meewait.blogspot.co.id/2012/12/daya-hambat-antibakteri-kombinasi\\_31.html](http://meewait.blogspot.co.id/2012/12/daya-hambat-antibakteri-kombinasi_31.html). (3 Desember 2015).

- Jawet, M dan Adelberg`s. 1996. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta : Salemba Medica.
- Kadir, I. 2013. *Pengaruh kombinasi konsentrasi daun teh (Camellia sinensis) dengan asap cair (Liquid smoke) dan lama pengasinan terhadap kualitas telur asin* [Skripsi]. Fakultas Sains dan Teknolgi, Ilmu Peternakan : UIN Alauddin Makassar.
- Kementrian Agama RI.2002. Alquran dan Terjemahannya :Juz 1-Juz 30. Surabaya : Lintas Media.
- Kraus, H. 2003. *Zoonoses : Infectious Disease Transmissible from Animals to Humans*. Washington DC : ASM Pr.
- Leitasari, F.Y. 2012. *Pengaruh penambahan ekstrak jahe (Zingiber officinale Rosc) varietas empirit terhadap aktivitas antioksidan dan aktivitas antibakteri pada telur asin selama penyimpanan dengan metode penggaraman basah*. Skripsi Universitas sebelas maret, Surakarta.
- Lingga dan M.M, Rustama. 2005. *Uji Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak Air dan Etanol Bawang Putih (Allium sativum L.) terhadap Bakteri Gram Negatif dan Gram Positif yang Diisolasi dari Udang Dogol (Metapenaeus monoceros), Udang Lobster (Panulirus sp), dan Udang Rebon (Mysis dan Acetes)*. *Jurnal Biotika* 5 (2).
- Lisa. 2012. *Morfologi dan perhitungan koloni*. <https://chamaiaariani.wordpress.com/mikrobiologi/morfologi-koloni-dan-perhitungan-koloni-bakteri/>. ( 25 Juli 2016).
- Masniari, P. 2007. *Uji Daya Hambat Perasan Umbi Bawang Putih (Allium Sativum Linn.) Terhadap Bakteri Yang Diisolasi Dari Telur Ayam Kampung*. Bogor : Balai Besar Penelitian Veteriner.
- Muslim, D.A. 1992. *Budidaya Mina Itik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Megamii. 2009. *Pemeriksaan Bakteri Secara Makroskopis*. (<http://megamii.wordpress.com>). (19 Juli 2016).
- Microbiology. 2012. *Perhitungan Koloni*. [https://marinemicrobiologyfpikunpad.files.wordpress.com/2012/04/4\\_mikrolaut\\_modul\\_4\\_ta2012.pdf](https://marinemicrobiologyfpikunpad.files.wordpress.com/2012/04/4_mikrolaut_modul_4_ta2012.pdf). (25 Juli 2016).
- Naurillah, S.C. 2000. *Efek Antimikroba Fraksi Larut Bawang Putih terhadap (Salmonella thyposa)* [Skripsi]. Fakultas Kedokteran Malang : Universitas Brawijaya.

- Nindhia, T.S. 2013. *Penuntun Praktikum Rancangan Percobaan dengan SPSS. Universitas Udayana.*
- Novia, D, I. Juliyarsih dan P. Andalusia. 2011. *Evaluasi Total Koloni Bakteri dan Cita Rasa Telur Asin dengan Perlakuan Perendaman Ekstrak Kulit Bawang (*Allium ascalonicum*)*. Padang : Universitas Andalas.
- Putriana, A.E, S. Sirajuddin dan U. Najamuddin. 2014. *Pengaruh Konsentrasi Garam Dan Lama Penyimpanan Terhadap Kandungan Mikroba Telur Asin [Jurnal]*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Oktavia, H ., et al. 2008. *Pemeriksaan Bakteriologis Air Minum Isi Ulang*. Tersedia di [journal.ui.ac.id/index.php/mik/article/download/1202/1107](http://journal.ui.ac.id/index.php/mik/article/download/1202/1107) (25 Juli 2016).
- Permana D.R., dan Kusmiati. 2007. *Isolasi Kapang Patogen Dari Bahan Kitosan Sebagai Pengawet Makanan Snack Ubi Jalar (*Ipomea Batatas, L.*)*. LIPI. Bogor.
- Pleczar, M.J.2006. *Dasar Dasar Mikrobiologi*. Jakarta : UI-Press.
- Poedjiadi, Anna. 1994. *Dasar-dasar Biokimia*. Jakarta: UI-Press.
- Powrie WD, H. Little and N. A. Lopez,. 1996. *Gelation of Egg Yolk*. Food Science. h:38.
- Rizki. 2013. "*Mikroba,*" *Blog Rizki*. <http://mikroba-Rizki.blogspot.com>. (25 Juli 2016).
- Rivlin, R.S. 2001. *Historical Perspective on the Use of Garlic*. *J Nutr*.131(3Suppl): 951-4.
- Romanoff AL, and A. J. Romanoff. 1963. *The Avian Egg*. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Sarwono, B. Murtidjo dan Daryanto, A. 1985. *Telur Pengawetan dan Manfaatnya*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Setiyono, M.R. 2013. *Sterilisasi, Pembuatan Medium, Metode Perhitungan cawan, dan Pewarnaan Gram*. Available at <http://www.scribd.com/doc/198994628/Laporan-Resmi-Praktikum-Mikrobiologi> (25 Juni 2016).
- Sirait CH. 1986. *Telur dan Pengolahannya*. Bogor: Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan.

- Srigandono, B. 1986. *Ilmu Unggas Air*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sudaryani. 2003. *Kualitas Telur*. Jakarta : Penerbit Swadaya.
- Suririnah. 2005. *Bawang Putih Si Kecil Yang Ampuh*. Tersedia: Dr. Suririnah–myonlinerecipe.com.
- Suprapti ML. 2002. *Pengawetan Telur*. Yogyakarta: Kanisius.
- Susanti, I. 2013. *Cara Mengisolasi Mikroba Pada Telur Asin*. Garut : Sabda Mojang.
- Syamsiah, T. 2003. *Khasiat & manfaat bawang putih raja antibiotik alam*. Agromedia Pustaka.
- Syamsir, E. 2016. *Departemen Ilmu dan dan Teknologi Pangan IPB*.<http://www.sinarharapan.com/sehat/read/19646/waspadakontaminasi-bakteri-pada-telur>.(3 Januari 2016).
- Syaruracman, A. (Eds).1994. *Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Syamsudin, U. 1994. *Budidaya Bawang*. Bandung: Percetakan Binacipta.
- Tattelman, E. 2005. *Health Effects of Garlic*. *Am Fam Physician*. 72(1):103-6.
- Thayyarah, Nadiyah. 2014. *Buku Pintar Sains dalam Alquran : Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah*. Jakarta : Penerbit Zaman.
- Tim Redaksi, 2007. *Manfaat bawang putih umbi seribu khasiat*. *Majalah Nikah* Vol 5 No 17: 15-16.
- Winarno, F.G. dan S. Koswara. 2002. *Telur: Komposisi Penanganan dan Pengolahannya*. Bogor: M-Brio Press.
- Waluyo, Saraswati, dkk. 2007. *Metode Analisis Biologi Tanah*. Bogor : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Lahan Pertanian.
- Wiryanan, K.G, S. Suharti & M Bintang. 2005. *Kajian Antibakteri Temulawak, Jahe dan Bawang Putih terhadap Salmonella typhimurium serta Pengaruh Bawang Putih terhadap Performans dan Respons Imun Ayam Pedaging*. *Media Peternakan* 28 (2):52-62.
- Yulneriwanti.2013. "*Pertumbuhan Mikroba*" *Blog Yulneriwanti*.<http://pertumbuhanMikroba-yulneriwanti.blog.com>.(25 Juli 2016).

Yuniati, Heru.2011.*Efek penggunaan abu gosok dan serbuk bata merah pada pembuatan telur asin terhadap kandungan mikroba*. Bogor : PGM.



## LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Hasil Penelitian Pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan Konsentrasi Bawang Putih (*Allium sativum*) Pada Telur Asin

No	Lama Pengasinan (Hari)	Konsentrasi Bawang Putih (%)	Faktor Pengenceran				Σ Jumlah Koloni (cfu/g)
			10 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup>	10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	
1	7	0	-	-	-	1	0
		50	66	60	58	49	49X10 <sup>4</sup>
		60	52	60	66	79	66X10 <sup>3</sup>
		70	TBUD	114	44	9	44X10 <sup>3</sup>
2	10	0	58	-	-	-	58X10 <sup>1</sup>
		50	-	-	-	-	0
		60	TBUD	129	17	80	129X10 <sup>2</sup>
		70	283	113	3	-	113X10 <sup>2</sup>
3	15	0	-	13	19	32	32X10 <sup>4</sup>
		50	110	77	44	39	44X10 <sup>3</sup>
		60	54	-	12	13	54X10 <sup>1</sup>
		70	TBUD	TBUD	TBUD	410	410X10 <sup>4</sup>

$$N = n \times 1/FP$$

Keterangan : N = Jumlah Sel/ml atau gram sampel

n = Jumlah koloni pada cawan

FP = Faktor pengenceran

## LAMPIRAN

Lampiran 2. Data Hasil Penelitian Pertumbuhan *Salmonella* sp. dengan Konsentrasi Bawang Putih (*Allium sativum*) Pada Telur Asin

7 Hari

$$0\% : N = 0$$

$$50\% : N = 49 \times \frac{1}{10^{-4}}$$

$$= 49 \times 10^4$$

$$60\% : N = 66 \times \frac{1}{10^{-3}}$$

$$= 66 \times 10^3$$

$$70\% : N = 44 \times \frac{1}{10^{-3}}$$

$$= 44 \times 10^3$$

10 Hari

$$0\% : N = 58 \times \frac{1}{10^{-1}}$$

$$= 58 \times 10^1$$

$$50\% : N = 0$$

$$60\% : N = 129 \times \frac{1}{10^{-2}}$$

$$= 129 \times 10^2$$

$$70\% : N = 113 \times \frac{1}{10^{-2}}$$

$$= 113 \times 10^2$$

15 Hari

$$0\% : N = 32 \times \frac{1}{10^{-4}}$$

$$= 32 \times 10^4$$

$$60\% : N = 54 \times \frac{1}{10^{-1}}$$

$$= 45 \times 10^1$$

$$50\% : N = 44 \times \frac{1}{10^{-3}}$$

$$= 44 \times 10^3$$

$$70\% : N = 10 \times \frac{1}{10^{-4}}$$

$$= 410 \times 10^4$$

LAMPIRAN

Lampiran 3. Pembuatan Telur Asin aroma Bawang Putih (*Allium sativum*)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



## LAMPIRAN

### Lampiran 4. Pengerjaan dalam Laboratorium Mikrobiologi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





## RIWAYAT HIDUP



**Ardiansyah**, dilahirkan pada tanggal 29 November 1994 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Anak dari pasangan Ayahanda Arifuddin (alm) dan ibunda Sanawiah. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 1 Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Sultra diselesaikan pada tahun 2006. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Negeri 1 Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Sultra diselesaikan pada tahun 2009 dan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di SMA Negeri 1 Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Sulsel. Setelah tamat SMA penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ke jenjang S1 melalui Jalur SPMB dan lolos diterima sebagai peserta penerima beasiswa Bidik Misi sampai semester VIII pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi. Selama kuliah pernah bergabung dan pengurus Organisasi HMJ Ilmu Peternakan Periode 2013/2014. Selain itu, aktif pada Organisasi Himpunan Mahasiswa Bidik Misi (Himabim) dan salah satu kader Organda Kepmi Bone dan Hipma Koltim.