

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY”M”
DENGAN PERSALINAN KETUBAN PECAH DINI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 18 JULI 2018**



**Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

OLEH:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WIWI AGUSTINA

70400115016

ALAUDDIN

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIWI AGUSTINA
Nim : 70400115016
Tempat/tanggal lahir : Lembang, 14 Agustus 1997
Jurusan/Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN. Paccinongang Harapan PA 10/21
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny.
“M” dengan Persalinan Ketuban Pecah Dini (KPD) di
RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 18 Juli
2018.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau sepenuhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Gowa, 10 Agustus 2018

Penyusun

WIWI AGUSTINA
Nim: 70400115016

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Wiwi Agustina
Nim : 70400115016
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Pada Ny M Dengan
Persalinan Ketuban Pecah Dini (KPD) Di RSUD Syekh Yusuf Gowa
Tanggal 18 Juli Tahun 2018

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar hasil Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing I



Anisa Mamthiah Al Rautsar, S.siT.,M.Keb

Pembimbing II



dr. Rini Fitriani, M.Kes

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "M" Dengan Persalinan Ketuban Pecah Dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 18 Juli 2018", yang disusun oleh Wiwi Agustina NIM: 70400115016 Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari senin 14 Agustus 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 16 Agustus 2018 M

4 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc.** (.....)

Sekretaris : **Firdayanti, S.SiT, M.Keb.** (.....)

Pembimbing I : **Anieq Muntiah Alkautsar, S.SiT, M.Keb.** (.....)

Pembimbing II : **dr. Rini Fitriani, M.Kes.** (.....)

Penguji I : **dr. Darmuwansyih, M.Kes.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Supardin, M. Hi.** (.....)


Dekan
Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat berniat ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menggelarkan permadani keislaman bagi umat manusia di muka bumi terutama bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi pada Ny “M” dengan Persalinan Ketuban Pecah Dini di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2018”**. Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Kasih sayang dan penghormatan yang tak terkira kepada kedua orang tua saya ibunda Nurhidaya dan ayahanda Muh.Saleh yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, bimbingan dan pelajaran hidup yang begitu besar untuk saya. Dan juga kepada kakak tercinta Azhari yang telah memberikan dukungan moril dan material selama masa studi.

Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pabbari, M.Si.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc. beserta seluruh staf administrasi
3. Ibu Dr. H. Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M. Keb. selaku ketua Prodi Kebidanan yang telah meluangkan waktu demi membimbing saya selama menjalani studi di prodi kebidanan Uin Alauddin Makassar.
4. Ibu Anieq Mumthiah Al-kautsar S.ST, M.keb. selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu demi membantu, membimbing, serta memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
5. Ibu dr. Rini Fitriani, M. Kes. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu demi membantu, membimbing, serta memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
6. Ibu dr. Darmawansyih, M.Kes. selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
7. Ibu dr. Nadyah, M.kes. yang sempat menjadi penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna membangun karya tulis ilmiah ini.

8. Bapak Dr. H. Supardin, M.Hi. selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
 9. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah meberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi
 10. Direktur dan petugas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
 11. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya angkatan 2015 serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik di sisi Allah swt.
- Akhir kata penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata-Gowa, 10 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penulis
ALAUDDIN
M A K A S S A R

WIWI AGUSTINA
Nim : 70400115016


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penulisan.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Persalinan.....	10
1. Pengertian Persalinan.....	10
2. Jenis-Jenis Persalinan.....	11
3. Sebab-Sebab Persalinan.....	12
4. Tanda-Tanda Dalam Persalinan.....	13
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan.....	14
6. Tahap-Tahap Persalinan.....	16

B. Tinjauan Khusus Tentang Ketuban Pecah Dini (KPD).....	18
1. Fisiologi Air Ketuban.....	18
2. Pengertian KPD.....	19
3. Klasifikasi KPD.....	20
4. Etiologi KPD.....	20
5. Mekanisme Pecahnya Selaput Ketuban.....	22
6. Tanda Dan Gejala KPD.....	23
7. Diagnosis KPD.....	23
8. Pemeriksaan Penunjang KPD.....	26
9. Prognosis/Komplikasi KPD.....	27
10. Penatalaksanaan KPD.....	30
C. Paritas	34
D. Hubungan KPD Dengan Paritas.....	35
E. Tinjauan Umum Persalinan Menurut Pandangan Islam.....	37
F. Teori Manajemen Kebidanan.....	39
G. Asuhan Kebidanan Dalam Bentuk Soap.....	45
BAB III STUDI KASUS.....	48
ASKEB INC.....	48
A. Kala I.....	48
B. Kala II.....	71

C. Kala III.....	84
D. Kala IV.....	93
SOAP INC.....	100
A. Kala I.....	100
B. Kala II.....	114
C. Kala III.....	120
D. Kala IV.....	125
SOAP BAYI.....	129
SOAP PNC.....	137
BAB IV PEMBAHASAN.....	143
Langkah I Identifikasi Data Dasar.....	143
Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.....	146
Langkah III Identifikasi Diagnose/ Masalah Potensial.....	147
Langkah IV Tindakan Segera/Kolaborasi.....	148
Langkah V Rencana Tindakan.....	149
Langkah VI Tindakan Asuhan Kebidanan.....	150
Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	150

BAB V PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran-saran	153
DAFTAR PUSTAKA.....	155



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Partograf
Lampiran IV	: Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Balitbanda Sulawesi Selatan)
Lampiran V	: Surat Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
Lampiran VI	: Surat Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Bupati Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur Rsud Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
Lampiran VII	: Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari RSUD Syekh Yusuf
Lampiran VII	: Daftar Riwayat Hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2018

WIWI AGUSTINA, 70400115016

Pembimbing I : Anieq Mumthi'ah Alkautsar

Pembimbing II : Rini Fitriani

**Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Pada Ny "M" dengan Persalinan Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Gowa
Tanggal 18 Juli 2018**

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu apabila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi pada Ny. "M" dengan Persalinan ketuban pecah dini(KPD) di RSUD. Syekh Yusuf tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP. Yaitu langkah I pengkajian data dasar, langkah II diagnosa masalah aktual, langkah III diagnosa masalah potensial, langkah IV tindakan segera/kolaborasi, langkah V menyusun rencana asuhan yang menyeluruh, langkah VI implementasi, langkah VII evaluasi.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny" M" dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) yakni tidak ditemukannya kendala dalam menangani masalah dengan Ketuban Pecah Dini (KPD). Dalam penatalaksanaan masalah ketuban pecah dini pada Ny" M" di lakukan pemasangan infus Ringer Laktat per IV 28 tetes per menit untuk mengganti cairan yang hilang selama persalinan, pemasangan cytotec pervaginam 1/8 tablet untuk membantu kematangan serviks dan pemberian injeksi cefotaxime 1 gram untuk mencegah terjadinya infeksi, serta dilakukannya pemantauan dan asuhan dari kala I sampai kala IV

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada Ny. "M" dengan persalinan Ketuban Pecah Dini di RSUD. Syekh Yusuf Gowa 2018 dan telah dilakukan pengkajian pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny. "M" dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan teori dan kasus.

Kata kunci: Ketuban Pecah Dini (KPD), 7 langkah varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2018

WIWI AGUSTINA, 70400115016

Supervisor I : Anieq Mumthi'ah Alkautsar

Supervisor II : Rini Fitriani

Title : The Intranatal Patology Obstetric Care Management on Mrs. "M" with Delivery of Early Rupture of Membranes at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018

Early rupture of membranes is rupture of membranes before *nyoroti*, that is when the opening of cervix on the primipara is less than 3 cm and less than 5 cm in multipara.

This study is aimed at implementing the Intranatal Pathology Obstetric Care Management on Mrs. "M" with delivery of early rupture of membranes at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 based on the 7 steps of Varney and SOAP, that is step I of assessing the basic data, step II of diagnosing the actual problems, step III of diagnosing the potential problems, step IV of immediate actions/collaborative, step V of compiling a comprehensive care plan, step VI of implementation, step VII of evaluation.

The results of the case study conducted on Mrs. "M" with early rupture of membranes are not found obstacles in dealing with problems with Early Rupture of Membranes. In the management of the early rupture of membranes problem on Mrs. "M", it is performed IV Ringer infusion per IV 28 drops per minute to replace the lost fluid during the labor, installing the *cytotec pervaginam* 1/8 tablet to help ripening the cervix and administering cefotaxime 1 gram injection to prevent the occurrence of infection, as well as monitoring and caring from the time I to IV.

The conclusion of the case study is that 7 steps of Varney and SOAP implemented for the obstetric problem solving process have been carried out in the study and analysis of the data on Mrs. "M" with the delivery of early rupture of membranes at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018, and a review of all the findings and actions carried out on Mrs. "M" with the results of no gap between the theory and the case.

Keywords : Early Rupture of Membranes, 7 Steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan/ sebelum inpartu , pada pembukaan <3 cm pada primipara dan <5cm pada multipara. Hal ini terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan(Nugroho, 2013: 113).

KPD biasanya terjadi pada usia kehamilan yang sangat awal yaitu usia kehamilan sebelum 28 minggu atau pada trimester ketiga (Antara 28 minggu hingga 34 minggu), hal ini biasanya di sebabkan apabila leher rahim tertutup atau melebar. Kemungkinan yang menjadi faktor predisposisi pada KPD adalah paritas, kelainan selaput ketuban, usia ibu, serviks yang pendek, indeksi, serviks yang inkompeten, trauma, gemeli, hidromnion, kelainan letak, alkohol, dan merokok (Nugrahini, et al:2017).

Komplikasi yang bisa di sebabkan KPD pada ibu yaitu infeksi masa nifas, meningkatkan operatf *obstetric* (khususnya SC), morbiditas, mortalitas maternal. Sedangkan pada janin KPD dapat menyebabkan *prematunitas* (*sindrom distress* pernafasan, *hipotermia*, masalah pemberian makan pada *neonatal*, perdarahan *intraventikuler*, gangguan otak, dan resiko *cerebral palsy*, *anemia*, skor APGAR rendah, *ensefelopati*, *cerebral palsy*, perdarahan *intracranial*, gagal ginjal, *distress* pernafasan). Dan *oligohidromnion* (*sindrom defornits* janin, hipolapsia paru, *deformitas ekstrimitas* dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal(Marni dkk,2016:105-106).

Penyebab Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi menurut dinas kesehatan RI tahun 2013 yaitu perdarahan, infeksi, dan abortus. Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum inpartu atau persalinan, yaitu apabila pembukaan pada primi kurang dari 3 cm dan pada multi kurang dari 5 cm. dalam keadaan normal ketuban pecah pada saat persalinan. Bila periode laten panjang dan ketuban sudah pecah, maka akan menyebabkan infeksi yang bisa menyebabkan kematian ibu (Sofian,2013).

Penyebab kematian langsung ibu akibat dari penyakit penyulit kehamilan, persalinan, dan nifas. misalnya infeksi, eklamsia, perdarahan, emboli air ketuban, trauma anestesi, trauma operasi, dan lain-lain. Infeksi yang banyak dialami oleh ibu sebagian besar merupakan akibat dari adanya komplikasi/penyulit kehamilan, seperti febris, korioamnionitis, infeksi saluran kemih, dan sebanyak 65% adalah KPD karena KPD yang banyak menimbulkan infeksi pada ibu dan bayi.

KPD disebabkan karena berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauterin atau oleh kedua faktor tersebut. Berkurangnya kekuatan membran disebabkan oleh adanya infeksi yang dapat berasal dari vagina dan serviks. KPD merupakan suatu kejadian obstetrik yang banyak ditemukan, dengan insiden sekitar 10,7% dari seluruh persalinan, dimana 94% diantaranya terjadi pada kehamilan cukup bulan. Ini terjadi pada sekitar 6-20% kehamilan

Pada tahun 2012 kementerian kesehatan meluncurkan program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS), dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25% Program ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan

provinsi tersebut disebabkan 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara signifikan(Dekpes,2016:104).

Angka insidensi ketuban pecah dini pada tahun 2010 berkisar antara 6-10 % dari semua kelahiran. Angka kejadian KPD yang paling banyak terjadi ada kehamilan cukup bulan yaitu 95 %, sedangkan pada kehamilan *prematuur* terjadi sedikit 34 %. (Depkes, 2010). Sedangkan AKI akibat infeksi terjadi sebanyak 7,3% selama tahun 2013.

Program EMAS berupaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal dengan cara yaitu pertama, meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 Rumah Sakit PONED dan 300 Puskesmas/Balkesmas mampu PONED . Pemerintah juga telah meluncurkan program Jampersal sejak tahun 2012, yang telah di lanjutkan ke era JKN saat ini dengan tujuan utama mendekatkan akses layanan untuk seluruh ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas. Diharapkan upaya ini dapat menekan kematian ibu dan bayi baru lahir(Depkes Kota Makassar, 2016: 37).

Kesakitan dan angka kematian ibu masih merupakan masalah serius di Negara berkembang. Menurut *World Health Organization* (WHO) menegaskan setiap tahun sejumlah 358.000 ibu meninggal saat bersalin di mana 355.000(99%) dari Negara berkembang. Angka Kematian Ibu(AKI) di Negara berkembang merupakan peringkat tertinggi dengan 290 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup jika di bandingkan dengan AKI di Negara maju yaitu 14 kematian per 100.000 kelahiran

hidup. AKI tahun 2015 di dunia yaitu 303.000 menurun sekitar 44% di bandingkan dengan tahun 1990(WHO 2015).

Presentase komplikasi pada persalinan dengan KPD yaitu infeksi sebanyak 28,3%, premature 19,1%, partus lama sebanyak 13,4%, perdarahan 7,3%, sindrom gawat napas 33%, dan kompresi tali pusat yaitu 32% (Prediatri, 2013:318).

AKI dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator untuk mencerminkan derajat kesehatan ibu dan anak, selain sekaligus menjadi cerminan dari status kesehatan suatu Negara. Hasil survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015, AKI yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup yang mengalami penurunan dari 2012 yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB menurut Survey Penduduk Atau Sensus (SUPAS) pada tahun 2015 yaitu 22 per 100.000 kelahiran hidup.

Di Sulawesi Selatan jumlah AKI yang di laporkan oleh dinas kesehatan kabupaten/ kota mengalami peningkatan dan penurunan, yaitu pada tahun 2012 berjumlah 160 orang atau 110,26 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2013 menurun menjadi 115 orang atau 78,38 per 100.000 kelahiran hidup, dan kembali meningkat pada tahun 2014 yaitu 138 orang atau 93,20 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2011 sebanyak 868 bayi atau 5.90 per 100.000 kelahiran hidup, 2014 meningkat sebanyak 1.056 bayi atau 7.23 per 100.000 kelahiran hidup, dengan penyebab utama kematian adalah perdarahan, infeksi, hipertensi, preeklampsia-eklamsia, abortus, dan partus lama(Profil Kesehatan SulSel , 2014 19-27).

Berdasarkan data yang di peroleh dari dinas kesehatan Gowa, AKI dan AKB mengalami penurunan yaitu AKI pada tahun 2012 sebanyak 12 orang atau 106,53 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 10 orang

atau 80 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3 orang atau 24 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB 2012 sebanyak 57 bayi atau 4,5 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 17 bayi atau 1 per 1000 kelahiran hidup, (Dinkes, kab Gowa 2014: 25-29).

Sedangkan untuk data KPD pada tahun 2017 yaitu pada bulan 7 sebanyak 0 kasus, bulan 8 sebanyak 7 kasus, bulan 9 sebanyak 7 kasus, bulan 10 sebanyak 6 kasus, bulan 11 sebanyak 9 kasus dan bulan 12 sebanyak 3 kasus (Dinkes, Kab Gowa 2017).

Berdasarkan data Rekam medik RSUD Syekh Yusuf Gowa, pada tahun 2015 angka kejadian KPD di ruangan bersalin sebanyak 27 kasus dari 1804 (1.50%) ibu yang melahirkan, pada tahun 2016 sebanyak 16 kasus dari 1578 (1.02%) ibu bersalin, dan pada tahun 2017 sebanyak 11 kasus dari 2624 (0.42%) ibu bersalin.

Berdasarkan kemenkes 900 tahun 2002 tentang registrasi dan praktik bidan dan memperhatikan draf ke VI kompetensi inti bidan yang disusun oleh *International Confederation of Midwife* (ICM) Februari 1999, kompetensi bidan yang mencakup dan berhubungan dengan judul diatas dalam pemberian asuhan yakni :

1. Bidan memiliki persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etik yang membentuk dasar asuhan yang bermutu yang tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya.
2. Bidan memberikan asuhan bermutu tinggi serta tanggap terhadap budaya setempat selama persalinan, memimpin persalinan yang bersih, aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayi baru

lahir. Berdasarkan uraian masalah tersebut penulis tertarik mengambil study kasus dengan judul “Ketuban Pecah Dini (KPD)”.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan adalah pendekatan manajemen asuhan kebidanan intranatal care dengan kasus Ketuban Pecah Dini (KPD).

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan KPD sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

- a. Dilakukan pengumpulan data terhadap ibu bersalin
- b. Dilakukan interpretasi dari data yang di dapatkan dari ibu bersalin
- c. Diidentifikasi diagnosis potensial pada ibu bersalin Melakukan antisipasi penanganan segera pada ibu bersalin
- d. Disusun rencanatindakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin
- e. Dilaksanakan asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan pada ibu bersalin
- f. Dievaluasi asuhan kebidanan yang telah di berikan pada ibu bersalin
- g. Dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah di berikan pada ibu bersalin
- h. Didiskusikan kesenjangan antara teori dengan kasus di lahan
- i. Diintegrasikan nilai-nilai keislaman kepada ibu bersalin

D. Manfaat Penulisan

1. Instansi

Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan kepada instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Institusi

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber pengetahuan untuk penulis selanjutnya dan juga sebagai sumber informasi bagi rekan-rekan Mahasiswa Kebidanan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam penerapan Asuhan Kebidanan Persalinan dengan KPD.

3. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang kasus KPD, dan merupakan pengalaman yang dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan dalam penerapan manajemen asuhan persalinan dengan KPD.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode pustaka

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan Intranatal Care khususnya pada Asuhan persalinan dengan KPD

2. Studi kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Verney, dengan 7 langkah yang meliputi identifikasi data dasar, identifikasi Diagnosa/masalah actual, identifikasi diagnose/masalah potensial, segera/ kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Penulis menggunakan teknik Tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan keluarga dan bidan yang memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi, adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk
- 4) Auskultasi, merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah sedangkan lenek digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial dilakukan meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas, kesehatan dan lingkungan.

3. Studi dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan bidan, perawat, peugas laboratorium, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dan penyelesaian proposal ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan Tanya jawab dengan klien keluarga klien, dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu : pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Pada bab II terdiri dari tinjauan teori, akan menguraikan tinjauan umum tentang asuhan kebidanan dan persalinan, tinjauan khusus tentang KPD, tinjauan umum KPD menurut islam, proses manajemen asuhan kebidanan, serta pendokumentasian asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP.

Pada bab III yaitu pada kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah vaney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnose atau masalah actual, identifikasi diagnose atau masala potensial, tindakan segera atau kolaborasi, rencana tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan atau intervensi , implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang di laksanakan di

RSUD syekh yusuf dalam memberikan asuhan kebidanan intranatal dengan KPD. Pada bab V yaitu penutup akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah di lakukan, semua temuan seta pengetahuan yang di dapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagan ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah di jadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Persalinan

1. Pengertian persalinan

Definisi persalinan normal menurut *WHO* adalah persalinan yang di mulai secara spontan, beresiko rendah pada awal persalinan dan tetap demikian selama persalinan. Bayi di lahirkan spontan dalam presentase belakang kepala pada usia kehamilan antara 37 minggu hingga 42 minggu lengkap. Setelah persalinan ibu maupun bayi berada dalam kondisi sehat.

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Proses ini di mulai dengan adanya kontraksi persalinan sejati, yang di tandai dengan perubahan serviks secara progresif dan di akhiri dengan kelahiran plasenta (eka dan kurnia, 2014:2).

Menurut Varney (2007), Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar dengan berbagai rangkaian yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati, dan diakhiri dengan kelahiran plasenta (Elisabet siwi walyani, 2015).

a. Tujuan asuhan persalinan

Salah satu hal penting daalam proses persalinan adalah asuhan intrapartum, yang bertujuan untuk meningkatkan jalan lahir yang aman bagi

ibu dan bayi, meminimalkan resiko pada ibu dan bayi, dan meningkatkan hasil kesehatan yang baik dan pengalaman yang positif.

Tujuan dari asuhan persalinan normal adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perilaku coping ibu
- 2) Memberikan lingkungan yang aman bagi ibu dan janin
- 3) Mendukung ibu dan keluarganya melewati pengalaman persalinan dan melahirkan
- 4) Memenuhi keinginan dan pilihan ibu selama persalinan, ketika memungkinkan
- 5) Memberikan tindakan rasa nyaman dan meredakan nyeri jika perlu
- 6) Memberikan ketenangan dan informasi, yang disertai dengan perhatian terhadap kebutuhan budaya ibu dan keluarga
- 7) Untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya (Eka Puspita 2014).

2. Jenis-Jenis Persalinan

a. Persalinan Spontan

Yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir.

b. Persalinan Spontan

Yaitu persalinan yang berlangsung dengan presentase belakang kepala dengan bantuan tenaga ibu sendiri, tanpa adanya bantuan dari luar misalnya ekstraksi dari forceps/vakum atau sectio caesarea

c. Persalinan Anjuran

Yaitu persalinan yang berlangsung bila kekuatan yang di perlukan untuk persalinan di timbulkan dari luar dengan jalan rangsangan misalnya pemberian Pitocin, prostaglandin (Damayanti, dkk, 2014:oktarna, 2016;prawirohardjo,2014).

3. Sebab-sebab Terjadinya Persalinan

a. Teori Penurunan Hormon

Satu sampai dua terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron. Penurunan progesteron mempengaruhi relaksasi otot-otot Rahim, Sedangkan penurunan estrogen mempengaruhi kerentanan otot-otot Rahim. Pada saat kehamilan terjadi keseimbangan antara kedua hormon tersebut dan pada akhir kehamilan terjadi penurunan hormon.

b. Teori Distensi Rahim

Rahim yang membesar dan meregang akan menyebabkan iskemik otot rahim sehingga timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya.

c. Teori Iritasi Mekanik

Di belakang servik terdapat ganglion servikalis, ketika ganglion tersebut mengalami penekanan pada kepala janin dan mengakibatkan kontraksi pada Rahim.

d. Teori Plasenta Menjadi Tua

Akibat tuanya placenta mengakibatkan turunnya kadar progesteron yang mengakibatkan ketegangan pada pembuluh darah dan menyebabkan kontraksi pada Rahim.

e. Teori Prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua menjadi sebab permulaan persalinan karena menyebabkan kontraksi pada myometrium pada setiap umur kehamilan.

f. Teori oxytosin

Pada akhir kehamilan kadar oxytosin bertambah, oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot Rahim(kuswanti dan melina, 2014:3-4).

4. Tanda-tanda persalinan

Pada fase ini memasuki tanda-tanda inpartu:

a. Terjadinya his persalinan

His adalah kontraksi Rahim yang dapat diraba menimbulkan rasa nyeri pada perut serta dapat menimbulkan pembukaan serviks kontraksi Rahim. His menimbulkan pembukaan serviks dengan kecepatan tertentu disebut his efektif. His efektif mempunyai sifat adanya dominan kontraksi uterus pada fundus uteri (*fundal dominance*), kondisi berlangsung secara sinkron dan harmonis, adanya intensitas kontraksi yang maksimal diantara dua kontraksi, irama teratur dan frekuensi yang kian sering. Lama his berkisar 45-60 detik.

Pengaruh his dapat menimbulkan desakan daerah uterus, terjadi penurunan janin, terjadi penebalan pada dinding korpus uteri, terjadi peregangan dan penipisan pada istmus uteri, serta terjadinya pembukaan pada kanalis servikalis.

His persalinan memiliki sifat yaitu:

- 1) Pinggang terasa sakit dan mulai menjalar kedepan
- 2) Teratur dan interval yang makin pendek dan kekuatannya makin besar.
- 3) Mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks
- 4) Penabahan aktivitas (seperti berjalan) maka his tersebut semakin meningkat.

b. Dilatasi dan *effacement*

Dilatasi adalah terbukanya kanalis servikalis secara berangsur-angsur akibat pengaruh his. Effacement adalah pendataran atau pemendekan kanalis servikalis yang semula panjang 1-2 cm menjadi hilang sama sekali, sehingga tinggal ostium yang tipis yang seperti kertas.

c. Keluarnya lendir bercampur darah (*show*)

Lendir ini berasal dari pembukaan kanalis servikalis. Sedangkan pengeluaran darah di sebabkan oleh robeknya pembuluh darah waktu serviks membuka.

5. Faktor-faktor terjadinya persalinan

Ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya persalinan yaitu :

a. *Power*

Power adalah tenaga atau kekuatan yang membantu atau mendorong penurunan dan keluarnya janin. Kekuatan tersebut terdiri dari his, kontraksi otot Rahim, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligament dengan kerja sama yang baik dan sempurna.

1) His

His adalah kontraksi uterus karena otot-otot polos Rahim bekerja. Sifat his yang baik yaitu kontraksi simetris, fndus dominan, terkoordinasi dan relaksasi.

2) Tenaga ibu

b. *Passenger* (faktor janin)

Passenger ini meliputi letak janin, sikap janin, presentasi, bagian bawah, dan posisi janin.

c. *Passage* (jalan lahir)

Jalan lahir terdiri dari tulang panggul (rangka panggul) dan bagian-bagian lunak dari panggul (otot-otot, Jaringan-jaringan, dan ligament-ligamen)

d. Psikologi ibu

Keadaan psikologi ibu memberi pengaruh pada persalinan ibu, ibu yang bersalin di damping suami atau keluarga atau orang-orang yang di percayai ibu cenderung mengalami proses persalinan yang lancar karena adanya kepercayaan dan rasa nyaman yang dirasakan ibu. Di bandig dengan ibu bersalin yang tanpa pendampingan.

e. Faktor penolong

Kompetensi yang di miliki penolong sangat bermanfaat untuk memperlancar persalinan dengan mencegah kemaian dan neonatal (asrinah dkk,2010:9-21).

f. Faktor posisi ibu

Posisi ibu dapat mempengaruhi adaptasi anatomi ibu dan fisiologi persalinan. Perubahan posisi yang di berikan pada ibu bertujuan untuk

menghilangkan rasa letih, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi (sondakh, 2013).

6. Tahap-tahap persalinan

Tahap persalinan terbagi menjadi atas 4 tahapan yaitu :

a. Kala I (fase pembukaan)

Kala I di sebut sebagai kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 hingga pembukaan 10 cm (lengkap). Proses pembukaan serviks sebagai akibat his di bagi menjadi 2 fase, yaitu:

1) Fase laten

Berlangsung selama 8 jam, terjadi sangat lambat hingga mencapai 3 cm

2) Fase aktif

di bagi menjadi 3 fase yaitu:

- a) Fase akselerasi, dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm tadi menjadi 4 cm
- b) Fase dilatasi maksimal, dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.
- c) Fase deselerasi, pembukaan menjadi lambat sekali. Dalam waktu 2 jam pembukaan 9 cm menjadi lengkap.

Kala I pada primigravida dan multigravida berbeda. Untuk primigravida berlangsung 12 jam, sedangkan multigravida berlangsung 8 jam. Berdasarkan hitungan *friedman*, pembukaan 1cm/jam dan pembukaan multigravida 2cm/jam. Dengan perhitungan tersebut maka waktu pembukaan lengkap dapat di perkirakan (eka dan kurnia, 2014:14).

b. Kala II

Kala II di sebut juga kala pengeluaran. Kala ini di mulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai lahirnya bayi. Proses ini berlangsung selama 1 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida(sumrah,2009).

Tanda dan gejala kala II

Pada pengeluaran janin his terkoordinir,kuat,cepat dan lama kira-kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekaan otot dasar panggul yang secara *reflektoris* menimbulkan mencedan. Karena tekanan pada rectum ibu merasa seperti ingin buang air besar dengan tanda anus terbuka pada waktu his, kepala janin mulai terlihat. Vulva membuka dan perineum menegang.

c. Kala III (kala pengeluaran uri)

Batasan kala III yaitu masa setelah lahirnya bayi dan berlangsungnya proses peneluaran placenta.

Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dan bundar dengan tinggi fundus setinggi pusat dan beberapa kemudian uterus kembali berkontraksi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya, biasanya placenta terlepas dari dindingnya 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan.

d. Kala IV(kala pengawasan)

Di mulainya dari lahirnya sampai dengan 2 jam pertama post partum. kala IV di maksudkan untuk mengobservasi karena perdarahan di 2 jam pertama post partum.

Observasi yang di lakukan adalah:

- 1) Memeriksa tingkat kesadaran pasien
- 2) Memeriksa tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan)
- 3) Kontraksi uterus
- 4) Jumlah perdarahan.

B. Tinjauan Khusus tentang KPD

1. Fisiologi Air Ketuban

Air ketuban adalah cairan jernih agak kekuningan yang menyelimuti janin di dalam Rahim selama kehamilan yang memiliki berbagai fungsi yaitu melindungi pertumbuhan janin, menjadi bantalan untuk melindungi janin terhadap trauma dari luar, menstabilkan dari perubahan suhu, pertukaran cairan, sarana yang memungkinkan janin bergerak bebas, sampai mengatur tekanan dalam Rahim. Selain itu ketuban juga berfungsi melindungi janin dari infeksi, dan pada saat persalinan, ketuban yang mendorong servik untuk membuka, juga meratakan tekanan intra-uterin dan membersihkan jalan lahir bila ketuban pecah (Mika, 2016:22-23).

Air ketuban berkembang dan mengisi kantong ketuban mulai 2 minggu sesudah pembuahan. Kantong ketuban terbentuk saat usia kehamilan 12 hari setelah pembuahan, dan segera terisi oleh air ketuban. Setelah 10 minggu, kemudian air ketuban mengandung protein, karbohidrat, lemak, *fosfolipid*, urea, dan elektrolit untuk membantu pertumbuhan janin. Pada saat akhir kehamilan sebagian besar air ketuban dari urin janin.

Saat minggu-minggu awal ketuban berisi terutama air yang berasal dari ibu, setelah 20 minggu urin janin membentuk sebagian air ketuban yang mengandung *nutrient*, hormon, dan anti bodi yang melindungi janin dari penyakit.

Air Ketuban terus menerus di telan/dihirup dan di ganti lewat proses eksresi seperti juga di keluarkan lewat urin. Hal demikian merupakan hal yang penting bahwa air ketuban di hirup dalam paru janin untuk membantu janin mengembang sempurna. Air ketuban yang tertelan membantu pembentukan mekonium saat ketuban pecah. Apabila ketuban pecah terjadi selama proses persalinan di sebut dengan ketuban pecah spontan, apabila terjadi sebelum persalinan disebut dengan KPD. Sebagian besar air ketuban akan berada dalam Rahim sampai neonatus lahir (kosim, 2010: 1-2).

2. Pengertian Ketuban Pecah Dini(KPD)

KPD adalah bocornya selaput air ketuban (*liquor amnii*) secara spontan dari rongga *amnion* di mana janin di tampung. Cairan keluar dari selaput ketuban yang mengalami kerobekan, muncul setelah usia kehamilan 28 minggu dan setidaknya sebelum 1 jam sebelum waktu kelahiran yang sebenarnya(Gehwagi et al, 2015).

Dalam keadaan normal ketuban pecah dalam proses persalinan. Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi pada kehamilan di bawah 37 minggu disebut ketuban pecah dini premature. Dalam keadaan normal 8-10% perempuan hamil aterm mengalami ketuban pecah dini. (Prawirahardjo, 2014: 677).

Ada macam-macam batasan tentang KPD atau *premature rupture of membrane (PROM)* yakni:

- a. Ada teori yang menghitung berapa jam sebelum inpartu, misalnya 2 atau 4 atau 6 jam sebelum inpartu.

- b. Ada juga yang mengatakan dalam ukuran pembukaan serviks atau leher Rahim pada kala I, misalnya ketuban pecah sebelum pembukaan serviks 3 cm Pada primipara atau 5 cm pada multipara.
- c. Prinsipnya adalah ketuban pecah sebelum waktunya (Norma Dan Dwi, 2013: 247).

3. Klasifikasi

Menurut Pogi tahun 2014, KPD diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu KPD preterm dan KPD aterm.

a. KPD preterm

Ketuban pecah dini preterm adalah pecahnya ketuban yang terbukti dengan *vaginal pooling*, tes nitrazin, dan tes *fern* pada usia kehamilan <37 minggu sebelum onset persalinan. KPD psangat preterm adalah pecahnya ketuban saat umur kehamilan ibu di antara 24 minggu sampai kurang dari 34 minggu, sedangkan KPD preterm saat usia kehamilan ibu antara 34 minggu sampai kurang dari 37 minggu .

b. KPD aterm

Ketuban pecah dini aterm adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya yang terbukti dengan *vaginal pooling*, tes nitrazin dan tes *fern* pada usia kehamilan ≥ 37 minggu.

4. Etiologi

Belum pasti penyebab terjadinya ketuban pecah dini, namun faktor-faktor yang lebih sulit di ketahui. Kemungkinan yang menjadi faktor predisposisi adalah:

a. Infeksi

Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban yang berasal dari vagina atau infeksi cairan ketuban yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini.

b. Jumlah paritas

Wanita yang telah melahirkan beberapa kali maka akan lebih beresiko tinggi mengalami KPD pada kehamilan berikutnya. Kehamilan yang terlalu sering dapat mempengaruhi *embryogenesis*, selaput ketuban lebih tipis sehingga mudah pecah sebelum waktunya dan semakin banyak paritas semakin mudah terjadi infeksi amnion karena rusaknya struktur serviks pada persalinan sebelumnya.

Wanita dengan paritas kedua dan ketiga pada usia reproduktif biasanya relatif memiliki keadaan yang lebih aman untuk hamil dan melahirkan karena pada keadaan tersebut dinding uterus lebih kuat karena belum banyak mengalami perubahan, dan *serviks* belum terlalu sering mengalami pembukaan sehingga dapat menyanggah selaput ketuban dengan baik. Wanita yang telah melahirkan beberapa kali akan lebih beresiko pada mengalami KPD, karena jaringan ikat selaput ketuban mudah rapuh yang diakibatkan oleh vaskularisasi pada uterus mengalami gangguan yang mengakibatkan akhirnya selaput ketuban mengalami pecah spontan.

c. Serviks yang inkompeten, kanalis servikalis yang selalu terbuka yang disebabkan karena kelainan pada serviks uteri (akibat persalinan, *curatage*).

d. Tekanan pada intera uterin yang meninggi atau meningkat secara berlebihan (*overdistensi uterus*), misalnya trauma, *hidramnion*, *gemelli*.

- e. Trauma yang di dapat misalnya hubungan seksual, pemeriksaan dalam, maupun amnosintesis menyebabkan terjadinya KPD karena biasanya di sertai infeksi.
- f. Kelainan letak, misalnya sungsang, sehingga tidak ada bagian terendah yang menutupi pintu atas panggul (PAP) yang dapat menghalangi tekanan terhadap membran bagian bawah.

Kelainan letak pada janin dapat meningkatkan kejadian KPD karena kelainan letak dapat memungkinkan ketegangan otot rahim meningkat sehingga dapat menyebabkan KPD. Besar kecinya janin dan posisi janin yang dikandung tidak menyebabkan peregangan pada selaput ketuban seperti pada keadaan normal, sungsang ataupun melintang, karena sebenarnya yang dapat mempengaruhi KPD adalah kuat lemahnya selaput ketuban menahan janin (Budi, Ayu Novita, 2017).

5. Mekanisme terjadinya ketuban pecah dini

Ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan kontraksi uterus dan peregangan berulang. Pada kondisi yang normal kolagen terdapat pada lapisan *kompakta amnion*, *fibrolast*, jaringan *retikuler korion* dan *trofoblas*, sintesis maupun degradasi *jaringan kolagen* dikontrol oleh sistem aktifitas dan inhibisi *interleukin -1 (iL-1)* dan *prostaglandin*, *prostaglandin* berfungsi untuk membantu *oksitosin* dan *estrogen* dalam merangsang aktivitas otot polos, hormon ini dihasilkan oleh uterus dan produksi hormon ini meningkat pada akhir kehamilan saja, akan tetapi karena ada infeksi dan inflamasi, terjadi peningkatan aktifitas *iL-1* dan *prostaglandin*, menghasilkan *kolagenase jaringan*, sehingga

terjadi *depolimerasi kolagen* pada selaput *korion/amnion*, menyebabkan ketuban tipis, lemah dan mudah pecah spontan sehingga terjadi ketuban pecah dini.

Selaput ketuban sangat kuat pada kehamilan muda. Pada trimester ketiga selaput ketuban akan mudah pecah. Melemahnya kekuatan selaput ketuban ada hubungannya dengan pembesaran uterus, kontraksi Rahim, dan gerakan janin. Pada trimester terakhir terjadi perubahan biokimia pada selaput ketuban. Pecahnya ketuban pada kehamilan aterm merupakan hal yang fisiologis. KPD pada kehamilan *prematum* disebabkan oleh adanya faktor-faktor eksternal, misalnya infeksi yang menjalar dari vagina. Ketuban Pecah Dini prematur sering terjadi pada *polihidromnion*, inkompeten serviks, solusio plasenta (Prawirohardjo,2014:678).

6. Tanda dan gejala

Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes, dengan ciri pucat dan bergaris warna darah. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus di produksi sampai kelahiran(Norma dan Dwi, 2013:248-249).

Adapun tanda dan gejala:

- a. Keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina.
- b. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes dengan ciri pucat dan bergaris warna darah.

- c. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran.
- d. Demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi.

7. Diagnosis

Menegakkan diagnosa KPD sangat penting. Karena diagnosa yang positif palsu berarti melakukan intervensi seperti melahirkan bayi terlalu awal atau melakukan seksio yang sebetulnya tidak ada indikasinya. Sebaliknya diagnosa yang negatif palsu berarti akan membiarkan ibu dan janin mempunyai resiko infeksi yang akan mengancam kehidupan janin, ibu dan keduanya. Oleh karena itu di perlukan diagnosa yang cepat dan tepat.

Diagnosa KPD di tegakkan dengan cara:

a. Anamnesa

Penderita merasa basah pada vagina, atau mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba dari jalan lahir. Cairan berbau khas, dan perlu juga di perhatikan warna, keluarnya cairan tersebut his belum teratur atau belum ada, dan belum ada pengeluaran lender dan darah.

b. Inspeksi

Pengamatan dengan mata biasa akan tampak keluarnya cairan dari vagina, bila ketuban baru pecah dan jumlah air ketuban masih banyak, pemeriksaan ini akan lebih jelas.

c. Tes *Valsava*

Dilakukan dengan cara melakukan ekspirasi paksa dengan menutup mulut dan hidung yang akan menambah tekanan pada telinga dan tekanan pada bagian fundus, sehingga jika terjadi KPD, maka air ketuban akan keluar (Fadlun, 2011 : 114)

d. Pemeriksaan dengan Spekulum

Pemeriksaan dengan spekulum pada KPD akan tampak keluar cairan dari *orifisium uteri eksternum*(OUE), kalau belum juga tampak keluar, fundus uteri di tekan, penderita di minta batuk, mengejan atau mengadakan *manuvover valsava*, atau bagian terendah di goyangkan, akan tampak keluar cairan dari ostium uteri dan terkumpul pada fornix anterior.

e. Pemeriksaan Dalam

Pemeriksaan dalam didapat cairan di dalam vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada lagi. Mengenai pemeriksaan dalam vagina dengan *toucher* perlu di pertimbangkan, pada kehamilan yang kurang bulan yang belum dalam persalinan tidak perlu di adakan pemeriksaan dalam. Karena pada waktu pemeriksaan dalam, jari pemeriksa akan mengakumulasi segmen bawah Rahim dengan flora vagina yang normal. *Mikroorganisme* tersebut bisa dengan cepat menjadi *patogen*. Pemeriksaan dalam vagina di lakukan bila dalam persalinan atau yang di lakukan induksi persalinan dan di batasi sedikit mungkin.(Norma dan Dwi, 2013:249-250).

Selain itu menentukan diagnosa dengan Tentukan pecahnya selaput ketuban, dengan adanya cairan ketuban di vagina. Jika tidak ada dapat di coba dengan menggerakkan sedikit bagian terbawah janin atau meminta pasien batuk atau mengedan. Penentuan cairan ketuban dapat di lakukan dengan tes lakmus (*nitrazin test*) merah menjadi biru. Tentukan usia kehamilan, bila perlu dengan pemeriksaan USG. Tentukan tidak ada infeksi Tanda-tanda infeksi adalah bila suhu ibu lebih dari $37,5^{\circ}\text{C}$ serta air ketuban keruh dan berbau. Janin yang mengalami *takikardia*, mungkin mengalami infeksi *intrauterin*. Tentukan tanda-tanda persalinan dan *skoring pelvik*. Tentukan adanya kontraksi yang teratur. Periksa dalam dilakukan bila akan di lakukan penanganan aktif (terminasi kehamilan)(prawirahardjo, 2014:680).

8. Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan Laboratorium

Cairan vagina yang keluar dari vagina harus di periksa : warna, konsentrasi, bau dan pHnya

1. Tes Lakmus (tes *nitrazin*)

Jika kertas lakmus berubah merah berubah menjadi biru menunjukkan adanya air ketuban (alkalis).

2. *Mikroskopik* (Tes Pakis)

Dengan meneteskan air ketuban pada gelas objek dan di biarkan kering. Pemeriksaan mikroskopik menunjukkan gambaran daun pakis.

b. Pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG)

Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat jumlah cairan ketuban dalam kavum uteri

9. Komplikasi

a. Pada Ibu

Komplikasi yang bisa disebabkan KPD pada ibu yaitu *intrapartal* dalam persalinan, infeksi puerparalis/masa nifas, partus lama, pendarahan post partum, meningkatkan tindakan operatif obstetric (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal.

b. Pada Janin

1) Prematuritas

Kemungkinan masalah yang dapat terjadi pada bayi dengan lahir prematur yakni sebagai berikut :

a) *Respiratory Distress Syndrome* (RDS)

Respiratory Distress Syndrome (RDS) disebut juga dengan sindrom gangguan pernapasan. Hal ini terjadi karena paru-paru bayi belum matang sehingga tidak bisa menghasilkan zat surfaktan dalam jumlah memadai. Surfaktan memungkinkan permukaan paru-paru mengembang dengan baik ketika bayi keluar dari dalam rahim untuk menghirup udara sesuai kebutuhan bayi. Akan tetapi, jika bayi lahir sebelum paru-parunya berfungsi dengan sepenuhnya, kemungkinan akan mengalami masalah pernapasan. Tanpa adanya

asupan oksigen yang memadai, organ-organ yang lain juga bisa terpengaruh.

b) *Hipotermia*

Kondisi bayi yang prematur biasanya akan menurunkan suhu dengan sangat cepat. Hal ini disebabkan karena bayi prematur biasanya tidak memiliki cadangan lemak yang cukup untuk melindungi proses penurunan suhu. *Hipotermia* pada bayi yang lahir prematur juga bisa menyebabkan kondisi lain seperti gangguan pernapasan dan kadar gula yang sangat rendah.

c) *Hiperbilirubinemia*

Hiperbilirubinemia terjadi karena bilirubin terlalu tinggi, ditandai oleh perubahan warna kulit dan sklera mata menjadi kuning (bayi kuning). *Bilirubin* adalah pigmen kuning yang memang ada pada sel darah. *Hiperbilirubinemia* lebih umum terjadi pada bayi premature dibandingkan pada bayi lahir cukup bulan.

d) *Anemia*

Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya konsentrasi sel darah merah. Sel darah merah sangat penting karena mengandung *hemoglobin*, zat yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sebagian besar bayi baru lahir memiliki level sel darah merah lebih

dari 15gram. Namun bayi premature beresiko tinggi memiliki level rendah sel darah merah.

e) *Sepsis*

Sepsis adalah kondisi dimana bakteri masuk ke dalam aliran darah. Sepsis sering menyebabkan infeksi terbawa ke paru-paru dan bisa mengakibatkan pneumonia.

f) *Retinopathy Of Prematurity (ROP)*

Retinopathy Of Prematurity (ROP) adalah pertumbuhan abnormal pembuluh darah di mata yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Hal ini terjadi terutama pada bayi yang lahir sebelum 32 minggu kehamilan.

g) *Intraventricular Hemorrhage (IVH)*

Intraventricular Hemorrhage (IVH) disebut juga Perdarahan *Intraventrikular*. Perdarahan di otak terjadi pada beberapa bayi premature, terutama yang lahir sebelum usia kehamilan 32 minggu. Perdarahan yang lebih parah dapat menyebabkan struktur ventrikel otak berkembang pesat terisi cairan, menyebabkan otak tertekan dan dapat menyebabkan kerusakan otak seperti *cerebral palsy*, gangguan belajar dan masalah perilaku.

h) *Necrotizing Enterocolitis* (NEC)

Necrotizing Enterocolitis (NEC) terjadi ketika sebagian usus bayi memiliki aliran darah yang buruk, yang dapat menyebabkan infeksi di dinding usus.

i) *Prolaps funiculli* (penurunan tali pusat).

j) *Hipoksia* dan *asfiksia sekunder* (kekurangan oksigen pada bayi).

k) Mengakibatkan kompresi tali pusat, *prolaps uteri*, partus lama, skor apgar rendah, *ensefalopati*, *cerebral palsy*, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distress pernapasan.

l) Sindrom deformitas janin

m) Morbiditas dan mortalitas perinatal (Budi Rahayu, 2017).

10. Penatalaksanaan.

Kasus KPD yang kurang bulan kalau menempuh cara-cara aktif harus di pastikan bahwa tidak akan terjadi Respirator Distress Syndrom (RDS) dan kalau menempuh dengan cara konservatif dengan maksud untuk memberi waktu pematangan paru, harus bisa memantau keadaan janin dan infeksi yang akan memperjelek prognosis janin. Penatalaksanaan KPD tergantung pada umur kehamilan dan letak janin. Resiko yang lebih sering pada KPD dengan janin kurang bulan adalah RDS dibandingkan dengan sepsis. Oleh karena itu kehamilan kurang bulan perlu evaluasi hati-hati untuk menentukan waktu yang optimal untuk persalinan. Pada umur kehamilan 34 minggu atau lebih biasanya paru-paru

sudah matang, *chorioamniotitis* yang diikuti dengan sepsi pada janin merupakan sebab utama meningkatnya morbiditas dan mortalitas janin. Pada kehamilan cukup bulan, infeksi janin langsung berhubungan dengan lama pecahnya selaput ketuban atau lamanya periode laten.

Adapun penatalaksanaan ketuban pecah dini, diantaranya :

a) Tatalaksana Umum

- 1) Berikan *eritmisin* 4x500 mg selama 10 hari.
- 2) Rujuk ke fasilitas yang memadai.

b) Tatalaksana khusus

- 1) Di Rumah Sakit rujukan, tatalaksana sesuai dengan usia kehamilan

a) ≥ 34 minggu.

Lakukan induksi persalinan dengan *oksitosin* bila tidak ada kontraindikasi.

b) 24-34 minggu

1. Bila terdapat *amnionitis*, *abrupsi plasenta*, dan kematian janin, lakukan persalinan segera.

2. Berikan *deksametason* 6 mg IM tiap 12 jam selama 48 jam atau *betametason* 12 mg IM tiap 24 jam selama 48 jam.

3. Lakukan pemeriksaan serial untuk menilai kondisi ibu dan janin. Bayi dilahirkan di usia kehamilan 34 minggu, atau di usia kehamilan 32-33 minggu, bila dapat dilakukan pemeriksaan

kematangan paru dan hasil menunjukkan bahwa paru sudah matang (komunikasikan dan sesuaikan dengan fasilitas perawatan bayi preterm).

c) <24 minggu

1. Pertimbangan dilakukan dengan melihat resiko ibu dan janin.
2. Lakukan konseling pada pasien. Terminasi kehamilan mungkin menjadi pilihan.
3. Jika terjadi infeksi (korioamnionitis), lakukan tatalaksana korioamnionitis.

Berikut ini penatalaksanaan korioamnionitis, yaitu :

a. Tatalaksana Umum

- 1) Rujuk pasien ke rumah sakit.
- 2) Beri antibiotika kombinasi : *ampisilin* 2 g IV tiap 6 jam ditambah *gentamisin* 5 mg/kgBB IV setiap 24 jam

3) Terminasi kehamilan. Nilai serviks untuk menentukan cara persalinan :

Jika serviks matang : lakukan induksi persalinan dengan oksitosin dan Jika seerviks belum matang : matangkan dengan prostaglandin dan infus oksitosin atau lakukan seksio caesarea.

4) Jika persalinan dilakukan pervaginam, hentikan antibiotika setelah persalinan. Jika persalinan dilakukan dengan seksio caesarea, lanjutkan antibiotika dan tambahkan *metronidazole* 500 mg IV tiap 8 jam sampai bebas demam selama 48 jam.

b. Tatalaksana Khusus

- 1) Jika terdapat metritis (demam, cairan vagina berbau, berikan antibiotika.
- 2) Jika bayi mengalami sepsis, lakukan pemeriksaan kultur darah dan beri antibiotika yang sesuai selama 7-10 hari.

Adapun penanganan yang dapat dilakukan adalah :

a. *Konservatif*

- 1) Rawat di rumah sakit, berikan antibiotic (*ampisilin* 4x500 mg atau *eritromisin* bila tidak tahan ampisilin dan *metronidazole* 2x500 mg selama 7 hari).
- 2) Jika umur kehamilan <32-34 minggu, dirawat selama air ketuban masih keluar, atau sampai air ketuban tidak lagi keluar.
- 3) Jika usia kehamilan 32–37 minggu, belum inpartu, tidak ada infeksi, tes busa negatif berikan *deksametason*,
- 4) Observasi tanda-tanda infeksi dan kesejahteraan janin.

- 5) Jika usia kehamilan 32–37 minggu, sudah inpartu, tidak ada infeksi, berikan *tokolitik (salbutamol)*, *deksametason*, dan induksi sesudah 24 jam.
- 6) Jika usia kehamilan 32–37 minggu, ada infeksi, beri antibiotik dan lakukan induksi, niali tanda-tanda infeksi (suhu, leokosit, tanda-tanda infeksi intrauterine).
- 7) Pada usia kehamilan 32–37 minggu, berikan steroid untuk memacu kematangan paru janin, dan bila memungkinkan periksa kadar *lesitin* dan *spingomielin* tiap minggu. Dosis betametason 12 mg sehari dosis tunggal selama 2 hari, *deksametason* I.M 5 mg setiap 6 jam sebanyak 4 kali.

b. Aktif

Kehamilan >37 minggu, induksi dengan oksitosin. Bila gagal seksio sesarea. Dapat pula diberikan *misoprostol* 25 ug–50 ug intravaginal tiap 6 jam maksimal 4 kali. Apabila ada tanda-tanda infeksi berikan antibiotik dosis tinggi dan persalinan diakhiri. Bila skor pelvik <5, lakukan pematangan serviks, kemudian induksi. Jika tidak berhasil, akhiri persalinan dengan *seksio caesarea*. Apabila skor pelvik >5, induksi persalinan.

C. *Paritas*

Paritas menurut varney adalah jumlah kehamilan yang dialami oleh seorang wanita yang berakhir dengan kelahiran bayi atau bayi yang mampu bertahan hidup dengan minimal 20 minggu atau berat janin 500 gram (Elisabet siwi walyani,2015).

D. Hubungan KPD dengan Paritas

Kelahiran pertama dan jumlah paritas yang tinggi (lebih dari 3) mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi. Lebih tinggi paritas, lebih tinggi kematian maternal. Pada ibu multipara dan grandemultipara sering terjadi komplikasi karena berkaitan dengan fungsi organ reproduksi yang sudah menurun sehingga mengakibatkan kelainan atau bahkan komplikasi dalam persalinan.

Wanita yang telah melahirkan beberapa kali maka akan lebih beresiko tinggi mengalami KPD pada kehamilan berikutnya. Kehamilan yang terlalu sering dapat mempengaruhi *embryogenesis*, selaput ketuban lebih tipis sehingga mudah pecah sebelum waktunya dan semakin banyak paritas semakin mudah terjadi infeksi amnion karena rusaknya struktur serviks pada persalinan sebelumnya.

Wanita dengan paritas kedua dan ketiga pada usia reproduktif biasanya relatif memiliki keadaan yang lebih aman untuk hamil dan melahirkan karena pada keadaan tersebut dinding uterus lebih kuat karena belum banyak mengalami perubahan, dan *serviks* belum terlalu sering mengalami pembukaan sehingga dapat menyanggah selaput ketuban dengan baik. Wanita yang telah melahirkan beberapa kali akan lebih beresiko pada mengalami KPD, karena jaringan ikat selaput ketuban mudah rapuh yang diakibatkan oleh vaskularisasi pada uterus mengalami gangguan yang mengakibatkan akhirnya selaput ketuban mengalami pecah spontan (Budi, Ayu Novita, 2017).

Pada paritas, resiko KPD banyak terjadi pada multipara dan grandemultipara disebabkan motilitas uterus berlebih, kelenturan leher Rahim yang berkurang sehingga dapat terjadi pembukaan dini pada serviks. Sedangkan pada usia, bertambahnya usia wanita berhubungan dengan menurunnya fungsi dan kemampuan organ tubuh sehingga meningkatkan resiko timbulnya kelainan-kelainan (Maharani Dkk, 2017:103).

Pada multipara, karena adanya riwayat persalinan lalu maka keadaan jaringan ikatnya lebih longgar dari pada nullipara. Pada multipara jaringan ikat yang menyangga membran ketuban makin berkurang sehingga multipara lebih beresiko terjadi KPD dibandingkan nulipara.

Menurut Prawirahardjo (2010) KPD lebih sering ditemukan pada wanita multipara dibandingkan wanita nulipara. Hal ini disebabkan karena endometrium wanita yang sudah pernah melahirkan akan lebih bermasalah daripada wanita yang baru satu kali atau bahkan belum pernah melahirkan. Ketika seorang wanita sudah pernah mengalami kehamilan/persalinan lebih dari satu kali, berarti mengalami peletakan plasenta yang berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan plasenta pada kehamilan-kehamilan seterusnya rentan terjadi KPD.

E. Tinjauan Umum Persalinan Menurut Pandangan Islam

Hakikat penciptaan manusia dilihat dari sumbernya. Yang pertama adalah asal atau sumber yang jauh yakni menyangkut proses penciptaan manusia dari tanah dan disempurnakannya manusia dari tanah tersebut dengan ditiupkannya ruh. Asal yang kedua adalah penciptaan

manusia dari sumber yang dekat yakni penciptaan manusia dari nutfah yakni sel telur dan sel sperma.

Di dalam Alqur'an disebutkan tentang asal penciptaan manusia, diantaranya sebagai berikut, firman Allah SWT Q.S Al-mu'minun/23:12-15

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا
الْنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ۱۴ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۚ ۱۵

Terjemahnya :

dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang (berasal) dari tanah. kemudian kami menjadikannya air mani(yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (Rahim). kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, pencipta yang paling baik. (Kementrian Agama RI,2014: 342)

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh -Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; kamu sedikit sekali bersyukur. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd/13:8

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Terjemahnya:

Allah mengetahui apa yang di kandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam Rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-nya (Kementrian Agama RI,2014: 250).

Setelah ayat-ayat yang lalu menegaskan kekuasaan Allah SWT, kini diuraikan ilmunya yang sangat luas lagi mencakup segala yang kecil dan besar. Tuhan yang maha megetahuilah yang menentukan juga jenis ayat atau mukjizat yang di turunkan oleh setiap rasul.

Salah satu objek pengetahuannya adalah tentang kandungan. Allah sejak dahulu, sekarang dan terus menerus mengetahui keadaan janin sejak masih berbentuk sperma. Calon bapak lah membuahi ovum yang berada dalam diri seorang calon ibu. Allah juga mengetahui apa yang di kandung oleh setiap perempuan atau betina setelah pertemuan sperma dan ovum yang kemudian menempel di dinding Rahim. Allah mengetahui, bukan saja jenis kelaminnya, tetapi berat badan dan bentuknya, keindahan dan keburukannya, usia dan rezekynya, masa kini dan masa depannya, dan lain-lain. Dan Allah SWT mengetahui juga apa sperma serta ovum yang berkurang di dalam Rahim yang dapat mengakibatkan janin lahir cacat atau keguguran dan Allah SWT mengetahui juga yang bertambah, yakni tumbuh atau dalam keadaan kembar. Dan segala sesuatu baik menyangkut kehidupan kandungan maupun selain kandungan, pada sisi-nya ada ukuran-ukurannya yang sangat teliti, baik dalam kualitas, kuantitas maupun kadar, waktu dan tempatnya. Jangan heran menyangkut pengetahuan itu karena Allah SWT adalah yang mengetahui semua yang ghaib, dan yang Nampak; yang maha besar dan maha tinggi, sehingga pada akhirnya tidak ada satupun yang ghaib baginya (Shihab:2002,562-563).

F. Teori manajemen kebidanan berdasarkan kasus persalinan dengan KPD

1. Pengertian manajemen kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang di gunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Yulifah,2014 : 125).

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang di gunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Heryani,2011: 111).

a. Tujuh Langkah Manajemen Kebidanan Menurut Helen Varney

Varney (2002) menjelaskan proses manajemen manajemen merupakan proses pemecahan masalah yang di temukan oleh perawat dan bidan pada awal tahun 1970an

1) Langkah I (Pengumpulan Data Dasar)

Pada langkah ini, di lakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang di perlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Pada kasus KPD, data yang di perlukan untuk di kumpulkan yaitu, data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk Rumah sakit,riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu,

riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial dan ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Selain itu, data objektif pun termasuk ke dalam asuhan kebidanan pada ibu dengan KPD yang terdiri pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan inspekulo. Terakhir yaitu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu dalam menegakkan diagnosis yang pemeriksaan laboratorium uji kertas nitrazin atau kertas lakms yang akan berubah warna menjadi biru gelap jika pelepasan yang keluar adalah cairan amnion, kemudian pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) untuk melihat jumlah cairan amnion yang ada di dalam kavum uteri dan pemeriksaan darah untuk melihat tanda-tanda infeksi yang terjadi pada ibu.

2) Langkah II (interpretasi data)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah di kumpulkan. Data dasar yang telah di kumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penananan yang di tuangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahannya.

3) Langkah III (identifikasi diagnosis atau masalah potensial)

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan dapat diharapkan bersiap-siap bila diagnosis/ masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman (Yulifah, 2014:133).

Tujuan dari langkah ketiga ini adalah untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat muncul. Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial berdasarkan diagnosis dan masalah aktual.

Diagnosis potensial yang mungkin terjadi pada ibu yaitu infeksi *intrapartal* dalam persalinan, infeksi *puerpalis* atau masa nifas, *dry labour* atau partus lama, perdarahan post partum, meningkatkannya tindakan operatif *obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan masalah potensial yang terjadi pada janin yaitu *prematunitas* (*respiratory distress syndrom, hypotermia, neonatal feeding problem, retinopathy of prematurit, intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, brain disorder (and risk of serebral palsy, hipoksia, hiperbilirubinia, anemia, sepsis)*), prolaps funiculi atau penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder (kompresi tali pusat, prolaps uteri, *dry labour* atau partus lama, APGAR score rendah, *ensefalopathy, cerebral palsy*, perdarahan *intracranial, renal failure*,

respiratory distress), dan *oligohidromnion* (*sindrom deformitas janin*, hipolapsia paru, *deformitas* ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk,2016 : 105-106).

Pada langkah ketiga ini, bidan diuntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosis potensial tidak terjadi. Dengan demikian, langkah ini benar merupakan langkah yang bersifat antisipasi yang rasional atau logis. Kaji ulang diagnosis atau masalah potensial yang diidentifikasi sudah tepat.

4) Langkah IV (Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera)

Tindakan segera merupakan tindakan yang di lakukan dengan cara menetapkan kebutuhan tentang perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter untuk konsultasikan atau di tangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Pada kasus ini persalinan dengan KPD, tindakan antisipasi atau tindakan segera yang harus di lakukan yaitu memberikan infus cairan larutan garam fisiologis, larutan glukosa 5-10%, induksi uterotonika dan pemberian antibiotik.

5) Langkah V (perencanaan)

Perencanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh yang di tentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini

merupakan kelanjutan manajemen untuk masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi data tidak lengkap. Rencana asuhan kebidanan di buat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi.

Setiap rencana asuhan haruslah di setujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat di laksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang meliputi pengetahuan, teori yang terbaru, *evidence based care*, serta divalidasi dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan dan apa perencanaan sebaiknya pasien dilibatkan, karena pada akhirnya pengambilan keputusan untuk suatu rencana asuhan harus disetujui oleh pasien.

6) Langkah VI (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh dan di lakukan dengan efisien dan aman. Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah sebelumnya dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi ketika bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan menghambat waktu

dan menghemat biaya serta meningkatkan mutu asuhan klien. Pelaksanaan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD sesuai dengan perencanaan yang telah di buat.

7) Langkah VII (evaluasi)

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan kita berikan kepada pasien. Kita mengacu kepada beberapa pertimbangan yaitu tujuan asuhan kebidananm efektivitas tindakan untuk mengatasi masalah, dan hasil asuhan. Hasil yang di harapkan dari manajemen kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD adalah dapat di lakukan partus secara spontan, komplikasi akibat tindakan medik dapat di atasi serta ibu dan janin dalam keadaan baik dan sehat. Evaluasi di lakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang di berikan. (Varney dkk,2002:31)

G. Asuhan Kebidanan Dalam Bentuk SOAP

1. S : subjektif

Data dari pasien di dapat dari anamnesa yang merupakan langkah I varney

a. Anamnesa :

Ibu menatakan adanya pengeluaran air pervaginam, air yang keluar sedikit demi sedikit hingga sarung basah. Ibu belum merasa adanya sakit perut tembus belakang dan belum merasa mules

b. Riwayat menstruasi

c. Riwayat kehamilan sekarang

2. O : objektif

Hasil pemeriksaan diagnostik dan pendukung lain untuk mendukung asuhan

a. Keadaan umum ibu

b. Kesadaran ibu

c. Pemeriksaan *head to toe*

d. Pemeriksaan dalam

e. Pemeriksaan penunjang, di lakukan pemeriksaan kertas lakmus yang akan berubah menjadi biru.

3. A : *Assesment*

Kesimpulan apa yang d buat dari data subjektif dan objektif tersebut merupakan lanjah II,III,IV varney

4. *Planning* atau penatalaksanaan

Menggambarkan pelaksanaa dari tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment langkah V, IV, VII varney

BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PADA NY”M”
GESTASI DENGAN KETUBAN PECAH DINI (KPD)
DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 18 JULI 2018**

KALA I

Nomor register : 505xxx
Tanggal masuk rumah sakit : 18 juli 2018 jam : 10.10 wita
Tanggal pengkajian : 18 juli 2018 jam : 10.10 wita
Tanggal partus : 18 juli 2018 jam : 16.55 wita
Nama pengkaji : Wiwi Agustina

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas isteri/suami

Nama : Ny M / Tn s
Umur : 35 Th / 38 Th
Nikah / Lamanya : 1 Kali/ ±18 Tahun
Suku : Makassar/ Makassar
Agama : Islam
Pendidikan : Smp/ Smp
Pekerjaan : Irt/ Swasta
Alamat : Panyeroang, Kec. Parangloe, Kab Gowa

2. Anamnesa (data subjektif)

a. Alasan utama ibu masuk

Ibu masuk dengan keluhan terdapat pengeluaran air pervaginam.

b. Riwayat keluhan utama

Air yang keluar sedikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga sarung basah, berwarna jernih dan tidak berbau. Ibu adalah rujukan dari puskesmas parangloe dengan keluhan ada keluar cairan berwarna jernih pada tanggal 18 juli 2018 (\pm 3jam sebelum sampai ke rumah sakit) satu sarung basah akibat cairan yang keluar, ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang. Riwayat pemeriksaan di puskesmas yaitu his /kontraksi tidak ada, pembukaan 1 cm, dan riwayat pemeriksaan kertas lakmus di puskesmas positif yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan air ketuban.

c. Riwayat menstruasi

1. Menarche : 14 tahun
2. Siklus : 28-30 hari
3. Lamanya : 5-7 hari
4. Banyaknya : 2-3 kali ganti pembalut setiap hari
5. Teratur/tidak teratur : Teratur
6. Sifat darah : Encer
7. Disminore : Tidak ada

d. Riwayat Perkawinan

Ibu menikah 1 kali dengan Tn "S" pada tahun 2000, saat Ny "M" berusia 17 tahun dan tuan Tn "R" berusia 20 tahun.

e. Riwayat Kehamilan dan Persalinan yang lalu

No	tahun	Jenis partus	Jenis kelamin	BBL gr	PBL cm	Penolong	Tempat partus	keadaan
1	2001	Spontan	Laki-laki	3000 gr	48 cm	Dukun	Dukun	hidup
2	2004	Spontan	Perempuan	3500 gr	48 cm	Dukun	Dukun	hidup
3	2010	Abortus						
4	2013	Spontan	Perempuan	3500 gr	49 cm	Bidan	Rumah sakit	hidup

Sumber Data : Primer

f. Riwayat Nifas yang lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresi setelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas seperti cairan yang keluar berbau busuk, pengeluaran air Asi lancar, ibu menyusui anaknya hingga usia 6 bulan dan memberikan makanan pendamping Asi sejak usia diatas 6 bulan.

g. Riwayat Kehamilan sekarang

- 1) Hari pertama haid terakhir tanggal 6 oktober 2018
- 2) Hari tafsiran persalinan tanggal 13 juli 2018
- 3) Umur kehamilan 40 minggu 5 hari
- 4) Menurut ibu kehamilannya 9 bulan
- 5) Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat di rasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang.
- 6) Ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 7 kali di puskesmas
 - Trimester I : 2 kali

Trimester II : 2 kali

Trimester III : 3 kali

7) Ibu mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 1 februari 2018.

8) Keluhan – keluhan

Trimester I : tidak ada keluhan

Trimester II : tidak ada keluhan

Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah

9) Penyuluhan

Ibu tidak pernah mendapat penyuluhan apapun

h. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu

1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes mellitus, asma, dan hipertensi.

2) Tidak ada riwayat penyakit menular: tuberculosis, malaria, hipertensi, dan penyakit menular seksual.

3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan.

4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di rumah sakit maupun di puskesmas.

i. Riwayat penyakit keluarga

Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes militus, asma, dan penyakit keturunan lainnya.

j. Riwayat sosial ekonomi, psikososial dan spiritual

1) Yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami

- 2) Hubungan ibu dan suami, keluarga maupun tetangga baik.
- 3) Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.
- 4) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.

k. Riwayat kb

Ibu sebelumnya adalah akseptor KB 3 bulan,

l. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1) Riwayat nutrisi

Kebiasaan:

- a) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- b) Frekuensi : 3 kali sehari
- c) Kebutuhan minum : 6-8 gelas per hari

Selama inpartu:

- a) Ibu makan, tetap hanya sedikit dan lebih banyak minum

2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

- a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau omniak.
- b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu :

- a) BAK : ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok.
- b) BAB : ibu belum BAB (ibu terakhir BAB jam 06.00 WITA).

3) Personal Hygiene

Kebiasaan :

- a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b) Sikat gigi : 2 kali sehari (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi.
- c) Keramas : 3 kali seminggu menggunakan shampoo
- d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu :

- a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan:

- a) Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu:

- a) Ibu tidak pernah tidur

3. Pemeriksaan Fisik (Data Objektif)

a. Pemeriksaan Umum

- 1) Keadaan umum ibu baik
- 2) Kesadaran *Composmentis*
- 3) Hari tafsiran persalinan tanggal 13 juli 2018
- 4) Usia gestasi 40 minggu 5 hari
- 5) Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmHg suhu :36,8°C

Nadi : 83x/i pernapasan : 24x/i

- 6) Tinggi badan : 154 cm
 - 7) Berat badan sebelum hamil : 45 kg
 - 8) Berat badan sekarang : 56 kg
 - 9) Lingkar lengan atas (lila) : 28 cm
- b. Pemeriksaan Fisik (*Headto Toe*)
- 1) Kepala
Inspeksi : kepala bersih, tidak ada ketombe, rambut hitam dan lurus
Palpasi : tidak ada massa, tidak mudah rontok, dan tidak ada nyeri tekan
 - 2) Wajah
Inspeksi : tidak pucat, tidak ada *oedema* pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak.
 - 3) Mata
Inspeksi : simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sklera putih (tidak ikterus)
 - 4) Hidung
Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran secret.
Palpasi : tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak tampak adanya polip

5) Mulut dan gigi

Inspeksi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada gigi yang tanggal, tidak ada stomatitis dan gusi tidak berdarah.

6) Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan peradangan.

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.

7) Leher

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.

8) Payudara

Inspeksi : payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hyperpigmentasi areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat di pencet, tidak ada nyeri tekan.

9) Abdomen

Inspeksi : Nampak pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, Nampak striae alba dan linea nigra, tidak ada bekas luka operasi.

Palpasi :

Leopold I : 2 rbpx, 30cm, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP 5/5

Lingkar perut : 101 cm

Tafsiran berat janin : $101 \times 30 = 3232$ gram

Denyut jantung janin : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan Bawah perut ibu dengan frekuensi 132 Kali per menit.

His : 1x10 menit durasi 5-10 detik

10) Genetalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varices, Nampak pelepasan lendir bercampur dengan air ketuban.

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada oedema, dan tidak ada nyeri tekan.

11) Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

12) Ekstrimitas atas dan bawah

Inspeksi : pergerakan aktif, tidak ada varices

Palpasi : tidak ada oedema

c. Pemeriksaan Dalam

Vaginal toucher (VT) tanggal: jam: 10.10 WITA

1) Vulva Dan Vagina : Normal

2) Portio : Tebal

3) Pembukaan : 1 Cm

- 4) Air Ketuban` : Jernih
 - 5) Presentase : Ubun-Ubun Kecil Lintang
 - 6) Penurunan : Hodge I
 - 7) Penumbungan : Tdak Ada
 - 8) Molase : Tidak Ada
 - 9) Kesan Panggul : Normal
 - 10) Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban
- d. Pemeriksaan *valsava*
Tanggal : 18 juli 2018 jam: 10.15 WITA
Hasil pemeriksaan terdapat pengeluaran air ketuban dengan merembes.
- e. Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)
- a) WBC : $9.4 \times 10^3/\mu\text{L}$
 - b) RBC : $4.43 \times 10^6/\mu\text{L}$
 - c) HGB : 11.09 g/dl
 - d) HCT : 34,7%
 - e) MCV : 78.3fL
 - f) MCH : 24.8 pg
 - g) MCHC : 31.7g/dl
 - h) Hbsag : Negartif

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

GVPIIIAI, gestasi 40 minggu 5 hari, intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase laten dengan KPD

1. GPA

Dasar

Data subjektif : Ibu mengatakan ini adalah kehamilan yang kelima sebelumnya pernah keguguran dan di kuret di RS Syekh Yusuf Gowa pada kehamilan ketiga pada tahun 2010, ibu merasakan adanya pergerakan janin.

Data objektif : Nampak linea nigra, striae alba dan otot perut sudah kendor, terdapat denyut jantung janin, dan pada saat palpasi teraba bagian-bagian janin

Analisa dan interpretasi data:

Pada pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot sudah kendor, terdapat denyut jantung janin dan teraba bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu tanda pasti kehamilan (prawirohardjo, 2014: 179).

2. Gestasi 40 minggu 5 hari

Dasar

Data subjektif : hari pertama haid terakhir tanggal 6 oktober 2017

Data objektif : pemeriksaan leopold 1, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah *processus xiphoideus*, Dan hari tafsiran persalinan tanggal : 13 juli 2018 berdasarkan rumus Neegle.

Analisa dan interpretasi data:

Dari hasil pemeriksaan dilihat dengan menggunakan rumus Neegle, mulai dari haripertama haid terakhir tanggal 6 oktober 2018 sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan ..minggu,,hari (prawirohardjo, 2014: 279).

3. Intrauterine

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan janinnya bergerak dengan kuat dan ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya.

Data objektif : ibu tidak merasakan nyeri ketika di palpasi, TFU sesuai umur kehamilan, pada palpasi leopold teraba bagian-bagian kecil pada janin.

Analisis dan interpretasi data

Pembesaran perut sesuai usia kehamilan, janin dapat diraba saat palpasi serta tidak ada nyeri perut yang hebat dan tidak ada nyeri tekan, hal ini menandakan kehamilan ibu interauterin (prawirohardjo,2010).

4. Tunggal

Dasar

Data subjektif : ibu mengatakan pergerakan janin lebih sering di seblah kiri perut ibu

Data objektif : palpasi abdomen:

Leopold I : 2 Jrbpx, 32 Cm, Bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP 5/5

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran bawah
bawah perut ibu dengan frekuensi 132 kali permenit

Analisis interpretasi data

Pembesaran perut sesuai usia kehamilan dan pergerakan janin hanya pada satu tempat dan auskultasi DJJ terdengar pada kuadran kanan bawah perut ibu. Ini menandakan kehamilan tunggal (Manuaba,2008).

5. Hidup

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan pergerakan janinnya..kali dalam sehari

Data subjektif : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan
Bawah perut ibu dengan frekuensi 132 kali permenit

Analisis dan interpretasi data :

Adanya gerakan janin dan DJJ, merupakan tanda bahwa janin hidup, janin dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (prawirohardjo, 2014: 285).

6. Keadaan ibu dan janin baik

Dasar

Data subjektif : Tidak ada keluhan-keluhan lain dan kecemasan yang dirasakan ibu selama kehamilan, ibu merasakan pergerakan janin kuat dan biasanya bergerak 12 kali dalam sehari.

Data objektif : Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuaran kanan perut bawah ibu dengan frekuensi 132 kali per menit dan pemeriksaan *head to toe* kongjungtiva merah muda, wajah dan tungkai tidak oedema, hemoglobin 11,2 gr/dl menandakan ibu tidak anemi.

Analisis dan interpretasi data

Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal dan DJJ yang teratur dan berada dalam batas normal yang menandakan keadaan ibu dan janin baik, kongjungtiva merah muda hemoglobin normal.(Pantiawati dan Saryono, 2010:122).

7. Inpartu kala I fase laten dengan KPD

Dasar

Data subjektif : Ibu mengatakan adanya pengeluaran air hingga satu sarung basah.

Data objektif : Pengeluaran air pervaginam yang berwarna jernih, ada *verniks caseosa* dan berbau amis, belum ada kontraksi.
Selain itu, adapun hasil pemeriksaan lainnya, antara lan:

a. Hasil pemeriksaan dalam jam: 10.10 wita

- 1) Vulva Dan Vagina : Normal
- 2) Portio : Tebal
- 3) Pembukaan : 1 Cm
- 4) Ketuban : Jernih
- 5) Presentasi : -
- 6) Penurunan : Hodge 1
- 7) Molase : Tidak Ada
- 8) Penumbungan : Tidak Ada
- 9) Kesan Panggul : Normal
- 10) Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air
Ketuban

b. Hasil pemeriksaan *tes valsava* yaitu terdapat pengeluaran air ketuban dengan merembes.

Analisa dan interpretasi data:

- a. Adanya pengeluaran air pervaginam, jernih, dan terdapat *vernix caseosa* dengan bau amis yang menandakan telah terjadi pelepasan air ketuban (Fadhlun,2011:114).
- b. Pemeriksaan tes *valsava* membuktikan bahwa terdapat pengeluaran air ketuban (Fadhlun, 2011: 114).
- c. KPD adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya, dimana pada primipara pembukaan serviks kurang 3 cm, dan pada multipara kurang dari 5 cm (Sepduwiana,2011:144)

- d. Dilatasi servik 1-3 cm merupakan fase laten (Aisyah dan Oktarina, 2012:2).

C. LANGKAH : III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial yang akan terjadi yaitu:

1. Pada ibu, yaitu komplikasi yang bisa disebabkan KPD pada ibu yaitu *intrapartal* dalam persalinan, infeksi puerparalis/masa nifas, partus lama, pendarahan post partum, meningkatkan tindakan operatif obstetric (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal.
2. Pada janin, yaitu *prematunitas* (*sindrom distress* pernafasan, *hipotermia*, masalah pemberian makan pada *neonatal*, perdarahan *intraventikuler*, gangguan otak, dan resiko *cerebral palsy*, *anemia*, skor APGAR rendah, *ensefelopati*, *cerebral palsy*, perdarahan *intracranial*, gagal ginjal, *distress* pernafasan). Dan *oligohidromnion* (*sindrom defornits* janin, hipolapsia paru, *deformitas ekstrimitas* dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal.

Data subjektif : ibu mengatakan terdapat pengeluaran air pervaginam hingga satu sarung basah.

Data objektif : tampak pengeluaran air dari pervaginam, warna jernih, ada *vernix caseosa* dan bau amis

Analisa dan interpretasi data :

- a. KPD menyebabkan hubungan langsung antara luar dan ruang Rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi pada jalan lahir (Nugroho,2011:2).

- b. KPD memberi pengaruh/ komplikasi kepada ibu dan janin yaitu pada ibu potensial terjadinya infeksi *intraparta*/dalam persalinan, infeksi *puerpalis*/masa nifas, *dry labour*/partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric*(khususnya SC), morbiditas dan mortalitas (Marni dkk, 2016:105-106).

Masalah potensial yang akan terjadi pada janin yaitu *prematunitas* (*sindrom distress* pernafasan, *hipotermia*, masalah pemberian makan pada *neonatal*, perdarahan *intraventikuler*, gangguan otak, dan resiko *cerebral palsy*, *anemia*, skor APGAR rendah, *ensefelopati*, *cerebral palsy*, perdarahan *intracranial*, gagal ginjal, *distress* pernafasan). Dan *oligohidromnion* (*sindrom defornits* janin, hipolapsia paru, *deformitas ekstrimitas* dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marni dkk,2016:105-106).

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

KOLABORASI

Kolaborasi dengan dokter:

1. Pemasangan infus RL 28 tetes per menit

Rasional : membantu mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan

2. Pemasangan Mioprostol 1/8 tab pervaginam

Rasional : untuk pematangan serviks dan membantu kontraksi uterus

3. Injeksi Cefotaxime 1 gr/IV

Rasional : mencegah resiko terjadinya infeksi

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Masalah aktual : KPD
2. Masalah potensial :Potensial terjadi kepada ibu yaitu potensial terjadinya infeksi *intraparta*/dalam persalinan, infeksi *puerpalis*/masa nifas, *dry labour*/partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric*(khususnya SC), morbiditas dan mortalitas. Masalah potensial terjadi pada janin yaitu *prematunitas* (*sindrom distress* pernafasan, *hipotermia*, masalah pemberian makan pada *neonatal*, perdarahan *intraventikuler*, gangguan otak, dan resiko *cerebral palsy*, *anemia*, skor APGAR rendah, *ensefelopati*,*cerebral palsy*, perdarahan *intracranial*,gagal ginjal, *distress* pernafasan). Dan *oligohidromnion* (*sindrom defornits* janin, hipolapsia paru, *deformitas ekstrimitas* dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal.
3. Tujuan :
 - a. Persalinan dapat berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik.
 - b. Mencegah terjadinya masalah potensial.
4. Kriteria
 - a. Kala I multipara tidak lebih dari 7 jam dan pada primipara tidak lebih dari 13 jam.
 - b. DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit).

c. Tanda-tanda vital dalam batas normal

1) Tekanan darah

a) Systole 100-120 mmHg

b) Diastole 60-90 mmHg

2) Suhu normal 36,5°C-37,5°C

3) Nadi normal 60-100x/menit

d. Keadaan ibu dan janin baik.

5. Rencana tindakan

a. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Rasional : agar ibu dan keluarga memahami tentang keadaan ibu memberi dukungan yang dapat mengurangi kecemasan dan siap menghadapi persalinan.

b. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam(kecuali nadi setiap 30 menit)

Rasional : observasi tanda-tanda vital memantau keadaan ibu seperti memantau terjadinya demam yang merupakan tanda-tanda terjadinya infeksi pada ibu sehingga mempermudah melakukan tindakan.

c. Observasi DJJ setiap 30 menit

Rasional : Saat ada kontraksi , DJJ bisa berubah sesaat hingga apabila ada perubahan dapat diketahui dengan cepat dan dapat bertindak secara cepat dan tepat.

d. Observasi *vaginal toucher* (VT) kontrol tiap 2jam/4jam, atau jika ada indikasi

Rasional : Untuk memantau kemajuan persalinan

e. Observasi His setiap 30 menit

Rasional : Karena kekuatan kontraksi uterus dapat berubah setiap saat sehingga mempengaruhi penurunan kepala.

f. Ajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, menganjurkan ibu menarik napas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut seperti sedang meniup-niup selama timbul kontraksi.

Rasional : Untuk mengurangi rasa sakit akibat kontraksi.

g. Anjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin

Rasional :

- 1) Kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhi kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar.
- 2) Menghalangi penurunan kepala bayi dan memberi perasaan tidak nyaman pada ibu.

h. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatakasanaan pemberian infus RL 28 tetes per menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotik cefotaxime 1 gram/IV sesuai intruksi dokter.

Rasional : pemberian infus membantu untuk mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan, pemasangan Misoprostol dapat membantu pematangan serviks/ dilatasi seviks serta pemberian antibiotic dapat mencegah terjadinya infeksi.

- i. Memberi intake minum dan makan pada ibu

Rasional : Agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran.

- j. Menganurka ibu untuk selalu berdoa untuk kelancaran persalinan dan juga untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan janin.

Rasional : Agar ibu senantiasa berserah diri dan bertawakkal kepada sang pencipta.

- k. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

Rasional : Merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan memudahkan pengambilan keputusan klinik.

F. LANGKAH VI : PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal: 18 juli 2018,jam: 10.10 WITA

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), DJJ dan His tiap 1 jam pada kala 1 fase laten dan tiap 30 menit pada kala 1 fase aktif, kecuali jika ada indikasi dilakukan tiap 30 menit.

waktu	nadi	Suhu	tekanan darah	DJJ	HIS
11.10	84x/i			132x/i	1x10 menit durasi 10-15 detik
12.10	82x/i			138x/i	2x10 menit durasi 15-20 detik
13.10	78x/i	36,7°C	110/80 mmHg	140x/i	2x10 menit durasi 20-25 detik

Sumber Data : sekunder

3. Mengobservasi *vaginal toucher* (VT) tanggal, 18 juli 2018, jam 13.10 WITA
 - a. Vulva Dan Vagina : Normal

- b. Portio : Tipis
- c. Pembukaan : 5 Cm
- d. Ketuban : Jernih (Merembes)
- e. Presentasi : Uzun-Uzun Kecil Kanan Lintang
- f. Penurunan : Hodge II
- g. Molase : Tidak Ada
- h. Penumbungan : Tidak Ada
- i. Kesan Panggul : Normal
- j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban
4. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital setiap 4 jam(kecuali ada nadi setiap 30 menit), DJJ dan His

Waktu	nadi	Suhu	Tekanan darah	DJJ	His
13.40	80x/i	36,7°C	110/80 mmHg	130x/i	3x10 menit durasi 20-25 detik
14.10	80x/i			130x/i	4x10 menit durasi 25-30 detik
14.40	78x/i			132x/i	4x10 menit durasi 30-35 detik
15.10	80x/i			138x/i	4x10 menit durasi 30-35 detik
15.40	82x/i			138x/i	4x10 menit durasi 35-40 detik
16.10	84x/i			140x/i	5x10 menit durasi 40-45 detik
16.40	80x/i	36,7°C	110/80 mmHg	140x/i	5x10 menit durasi 50-55 detik

Sumber Data : Sekunder

5. Mengobservasi *vaginal toucher* (VT) kontrol tanggal 18 juli 2018, jam 16.40

WITA

- a. Vulva Dan Vagina : Normal
 - b. Portio : Melesap
 - c. Pembukaan : 10 Cm(Lengkap)
 - d. Ketuban : Jernih (Merembes)
 - e. Presentasi : Uzun-Uzun Depan
 - f. Penurunan : Hodge IV
 - g. Molase : Tidak Ada
 - h. Penumbungan : Tidak Ada
 - i. Kesan Panggul : Normal
 - j. Pelepasan : Lendir,Darah Dan Air Ketuban
6. Mengajarkan kepada ibu teknik relaksasi yaitu menarik napas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut seperti sedang meniup-niup.
7. Mengajarkan kepada ibu ntuk mengosongkn kandung kemih sesering mungkin
8. Berkolaborasi dengan dokter Obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infuse RL 28 tetes per menit, Misoprostol 1/8 tab pervaginam, dan antibiotik cefatoxime 1 gram/IV sesuai intruksi dokter.
9. Memberi makan dan minum jika tidak ada his
10. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga untuk berdoa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan untuk ibu dan bayinya
11. Mencatat dalam partograf.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 18 juli 2018 jam: 16.40 WITA

1. Keadaan ibu dan janin baik yang di tandai dengan:
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - 1) Tekanan darah : 110/80 mmHg
 - 2) Suhu : 36,7°C (axilla)
 - 3) Nadi : 84 kali per menit
 - 4) Pernapasan : 24 kali per menit
 - b. DJJ 132kali per menit terdengar jelas, kuat dan teratur
2. Kala 1 fase aktif berlangsung ditandai dengan:
 - a. His yang adekuat 5x10 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik
 - b. Pembukaan lengkap (10 cm) \pm 6 jam setelah *vaginal toucher* (VT) pertama dan penurunan kepala hodge IV
 - c. Tidak ada tanda-tanda infeksi
 - d. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan

KALA II

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : Sakitnya bertambah kuat dan tembus belakang, bu merasa ingin BAB, adanya dorongan kuat ntuk meeran serta adanya tekanan pada anus.

Data objektif : Perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksi uterus baik 5 kali dalam 10 menit durasi 50-55 detik, penurunan kepala 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap),

penurunan hodge IV dan pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Hasil pemeriksaan dalam, jam 16.40 WITA

1. Vulva Dan Vagina : Normal
2. Portio : Melesap
3. Pembukaan : 10 Cm(Lengkap)
4. Ketuban : Jernih (Merembes)
5. Presentasi : Uzun-Uzun Depan
6. Penurunan : Hodge IV
7. Molase : Tidak Ada
8. Penumbungan : Tdak Ada
9. Kesan Panggul : Normal
10. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Perlangsungan kala II

Masalah aktual : Nyeri akibat kontraksi

Data subjektif : Ada penekanan pada anus, ada dorongan kuat untuk meneran, sakitnya sering dan bertambah sakit.

Data objektif : Perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik, penurunan kepala hodge 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap), penurunan hodge IV dan pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Analisa dan intepretasi data :

Nyeri merupakan hal yang fisiologis yang di rasakan ibu akibat adanya kontraksi yang justru akan mempercepat prosespersalinan, tekana hebat pada dasar panggul dan bagian terendah janin, akan mempermudah penurunan kepala, kontraksi yang timbul disertai ibu mendedan yang berlangsung secara refleksi (kuswanti dan melina, 20rosespersalinan, tekana hebat pada dasar panggul dan bagian terendah janin, akan mempermudah penurunan kepala, kontraksi yang timbul disertai ibu mendedan yang berlangsung secara refleksi (kuswanti dan melina, 2014:13).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang.

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : Perlangsungan Kala II

Masalah Aktual : Tidak Ada Indiksi

Masalah Potensial : Tidak Ada Data Penunjang

Tujuan :

1. Kala II berlangsung normal
2. Bayi lahir normal tanpa ada penyulit

Kriteria :

1. Kala II berlangsung ± 15 menit tanpa ada penyulit

2. Bayi lahir spontan, segera menangis, bernafas tanpa ada kesulitan dan bergerak dengan aktif

Rencana tindakan

Tanggal 18 Juli 2018, jam: 16.40 WITA

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala II (dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).
Rasional : untuk mengetahui apakah sudah dapat dilakukan pimpinan meneran
2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukkan spuit ke dalam bak partus
Rasional : mempersiapkan diri sebelumnya dan mencegah diri dari infeksi nosocomial
3. Memakai celemek
Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang
4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
Rasional : mencegah dari infeksi
5. Menggunakan handscoon steril pada satu tangan untuk melakukan pemeriksaan dalam
Rasional : mencegah terjadinya infeksi
6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang menggunakan sarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan ke dalam bak partus set
Rasional : mempersiapkan alat dalam keadaan siap pakai

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah di basahi oleh air disinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum
Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang
8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah lengkap
Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan
9. Mencecupkan tangan kanan yang bersarung tangan dalam larutan klorin 0,5% dan membuka secara terbalik dan merendam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%
Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang
10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 per menit).
Rasional : untuk mengetahui keadaan janin.
11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.
Rasional : agar ibu tidak khawatir dengan keadaan bayinya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman.
Rasional : dapat membantu memperlancar proses persalinan

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Rasional : memperlancar proses berlangsungnya persalinan

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

Rasional : untuk mempercepat penurunan kepala

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Rasional : untuk mengeringkan tubuh bayi

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.

Rasional : sebagai alas untuk menyokong perineum

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

Rasional : mempersiapkan alat dalam keadaan siap pakai

18. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada kedua tangan.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Setelah

itu kita melakukan perasat stenan (perasat untuk melindungi perineum dengan satu tangan, di bawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang agar posisi tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan bagina).

Rasional : dengan menyokong yang baik, akan mengurangi trauma dan mecegah terjadinya rupture perineum.

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Rasional : membersihkan jalan nafas dari air ketuban dan lilitan tali pusat

21. dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Rasional : menghilangkan torsi pada leher akibat putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal dan menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Rasional : membantu mengeluarkan bayi agar tidak terjadi robekan perineum

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Rasional : membantu mengeluarkan bayi secara keseluruhan dan mencegah agar bayi tidak jatuh.

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Rasional : membantu mengeluarkan bayi secara keseluruhan dan mencegah agar bayi tidak jatuh

25. Melakukan penilaian selintas :

a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

b. Apakah bayi bergerak aktif ?

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering. Membiarkan bayi di atas perut ibu.

Rasional : mencegah agar bayi tidak mengalami hipotermi

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 17 juli 2018, jam 16.40 WITA

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorongan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).
2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set.

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu:

a. Partus set

Partus set terdiri atas 2 klem kocher, ½ kocher, 1½ handscoon steril, kateter nelaton, penjepit tali pusat, kasaa steril, spoit 3 cc dan gunting tali pusat.

b. Hecting set

Hecting set terdiri atas nelvuder, catgut, jarum, pinset anatomi, pinset sirurgi, dan gunting benang

c. Obat dan bahan

Obat dan bahan terdiri atas cairan infus, oksitosin, lidokain, salep mata, vitamin K, hepatitis B dan betadin.

d. Diluar partus set

Adapun yang harus disiapkan diluar partus set yaitu air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi, larutan klorin 0,5%, tempat sampah, delee, lenek, perlak, handuk kering, tensimeter, stetoskop dan termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, kaca mata, celemek, handscoon, alas kaki tertutup/ sepatu boot

3. Memakai celemek plastik.
4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.
6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.
7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum.
8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.
 - a. Vulva Dan Vagina : Normal
 - b. Portio : Melesap

- c. Pembukaan : 10 Cm(Lengkap)
 - d. Ketuban : Jernih (Merembes)
 - e. Presentasi : Ubus-Ubus Depan
 - f. Penurunan : Hodge Iv
 - g. Molase : Tidak Ada
 - h. Penumbungan : Tidak Ada
 - i. Kesan Panggul : Normal
 - j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban
9. Menceleupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.
 10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 x/menit).
 11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.
 12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).
 13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.
15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.
16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.
17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan
18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.
19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenan (perasat untuk melindungi perineum dengan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).
20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.
22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.
23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.
24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)
25. Melakukan penilaian selintas :
 - a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?
 - b. Apakah bayi bergerak aktif ?
26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu.

G. LANGKAH VII : EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 18 juli 2018. Jam: 16.55 WITA

1. Kala II berlangsung normal tanpa ada penyulit
2. Bayi lahir spontan tanggal 18 juli 2018, jam 16.55 WITA, menangis kuat dan bernapas tanpa ada bantuan, bayi bergerak aktif, dan APGAR *score* 8/10.
3. Perdarahan \pm 300cc
4. Terjadi ruptur tingkat II

KALA III

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : Ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri perut bagian bawah.

Data objektif : Bayi lahir spontan pada tanggal 18 juli 2018, jam: 16.55 WITA. kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar),tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat Nampak di depan vulva.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala III

Data subjektif : Ibu nyeri perut bagian bawah, ibu senang dengan kelahiran bayinya.

Data objektif : Bayi lahir spontan tanggal: 18 juli 2018, jam: 16.55 WITA, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), tinggi fundus

uteri setinggi pusat, dan tali pusat masih tampak di depan vulva.

Analisa dan interpretasi data:

Setelah bayi lahir uterus berkontraksi yang menyebabkan penciutan permukaan kavum uteri dan tampak placenta, akibatnya plasenta akan terlepas dari tempat tertanamnya.

pada waktu kala III, volume uterus berkurang, dapat teraba tinggi fundus uteri setinggi pusat, pada saat kontraksi maka akan memperkecil permukaan uteri sehingga akan terasa sakit dan teraba keras dan bundar (kuswanti dan melina, 2014: 7).

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA /MASALAH *POTENSIAL*

Tidak ada data penunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : Kala III berlangsung normal, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, kontraksi uterus baik (teraba keas dan bundar), keadaan ibu dan janin baik.

2. Kriteria : Lamanya kala III tidak lebih dari 30 menit, plasenta (selaput dan kotiledon) lahir lengkap, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar). Serta keadaan ibu dan janin baik.

Rencana tindakan

Tanggal 18 juli 2018, jam 16.55 WITA

- 1) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi dalam uterus
Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda
- 2) Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi
Rasional : mempercepat lahirnya plasenta
- 3) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit secara intramuskuler (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).
Rasional : penyuntikan oksitosin membantu kontraksi uterus yang membantu keluarnya plasenta
- 4) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.
Rasional : untuk memudahkan memotong tali pusat
- 5) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan penggungtingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Rasional : agar bayi dapat dipisahkan dari plasenta

- 6) Menjepit tali pusat menggunakan penepit tali pusat.

Rasional : agar darah tidak keluar dari pusat bayi

- 7) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Rasional : agar ibu dan bayi tidak hipotermi dan bisa melakukan kontak kulit

- 8) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Rasional : agar dapat memudahkan proses peregangan tali pusat terkendali

- 9) Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi dan tangan lain meregangkan tali pusat.

Rasional : memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

- 10) Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Rasional : dorso kranial memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

11) Melakukan peregangan dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Rasional : memudahkan plasenta keluar sesuai dengan kurva jalan lahir sehingga tampak pada vulva

12) Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Rasional : mencegah robekan dan mencegah tertinggalnya selaput ketuban yang dapat menyebabkan perdarahan

13) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Rasional : agar kontraksi baik dan mencegah perdarahan

14) Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukkan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Rasional : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dapat menyebabkan perdarahan

- 15) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Rasional : penjahitan laserasi dapat mencegah terjadinya perdarahan

- 16) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Rasional : kontraksi uterus yang baik dapat mencegah perdarahan akibat atonia uteri

- 17) Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Rasional : untuk menjalin ikatan batin antara ibu dan bayi

- 18) Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri salep mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral.

Rasional : agar bayi mendapat perlindungan dini terhadap komplikasi yang akan terjadi

- 19) Setelah satu jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

Rasional : mengurangi resiko bayi terkena penyakit hepatitis

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 18 juli 2018, jam: 16.55 WITA

1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus
2. Memberitahu ibu bahwa akan disuntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi baik
3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 lateral paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).
4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat 2 cm distal dari klem pertama.
5. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.
6. Mengikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.
7. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi pada kepala bayi.
8. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

9. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.
10. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorso kranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangn tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.
11. Melakukan peregangn dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).
12. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.
13. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)
14. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

15. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.
16. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.
17. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.
18. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri salep mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.
19. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis di paha kanan anterolateral

G. LANGKAH VII : EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Evaluasi tanggal 18 juli 2018 jam 17.00 WITA

1. Kala III berlangsung ± 5 menit
2. Kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 18 juli 2018, jam : 17.00 WITA
3. Tinggi undus uteri setinggi pusat
4. Perdarahan kala III ± 200 cc
5. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
6. Keadaan ibu dan janin baik

KALA IV

A. LANGKAH I IDENTIFIKAS DATA DASAR

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah.

Data objektif : kala III berlangsung ± 5 menit, plasenta lahir lengkap tanggal 18 juli 2018, jam 17.00 WITA, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan ± 200 cc dan kandung kemih kosong.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala IV

Data subjektif : ibu merasa lelah dengan persalinannya.

Data objektif : kala III berlangsung ± 5 menit, plasenta lahir lengkap tanggal 27 juli 2018, jam 17.00 WITA, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik, (teraba keras dan bundar), perdarahan ± 200 cc dan kadung kemih kosong.

Anlisa interpretasi data :

Setelah plasenta lahir lengkap, maka menunjukkan telah masuk ke kala pengawasan/ kala observasi post partum, kelelahan disebabkan oleh penggunaan energy dan cairan yang banyak saat persalinan (Kuswanti dan Melina 2014:8).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data yang menunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tidak ada data yang menunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : kala IV berlangsung dengan tidak terjadi perdarahan yang berlebihan, kesadaran composmentis, dan tanda-tanda vital dalam batas normal
2. Kriteria : tidak terjadi perdarahan, kontraksi uterus baik(teraba keras dan bundar), kandung kemih kosong, dan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Rencana tindakan

Tanggal 18 juli 2018, jam 17.00 WITA

1. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.

Rasional : mencegah terjadinya perdarah pervaginam

2. Mengajarkan kepada ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi

Rasional : agar kontrksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

3. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan

Rasional : mengetahui jumlah darah yang keluar

4. Memeriksa tanda-tanda vital ibu, tinggi fundus uteri kontraksi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.

Rasional : tanda-tanda vital yang normal dan kandung kemih yang kosong menandakan kala IV berlangsung normal

5. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bayi bernapas dengan baik

Rasional : agar bayi dalam keadaan nyaman dan baik

6. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

Rasional : larutan klorin 0,5% dapat membunuh bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi

7. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi dalam tempat sampah yang sesuai

Rasional : mencegah terjadinya infeksi

8. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi (DTT), membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

Rasional : agar ibu terhindar dari kuman

9. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin makan dan minum

Rasional : dengan makan dan minum akan memberikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinannya

10. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

Rasional : untuk membunuh kuman

11. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%

Rasional : mencegah infeksi silang dan sebagai tindakan desinfeksi infeksi

12. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Rasional : dekontaminasi agar tidak terkontaminasi dengan bakteri

13. Melengkapi partograf

Rasional : sebagai catatan pemantauan persalinan

F. LANGKAH VII PELAKSANAAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 18 juli 2018, jam 17.00 WITA

1. Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan mencegah perdarahan pervaginam
2. Mengajarkan ibu dan keluarga cara masase uterus dan menilai kontraksi.

3. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan 30 menit pada jam kedua pasca persalinan.

Waktu (Wita)	Jumlah perdarahan
17.15	50 cc
17.30	40 cc
17.45	30 cc
18.00	30 cc
18.30	30 cc
19.00	20 cc
Total	200 cc

Sumber data : sekunder

4. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua pasca persalinan.

jam	Waktu (Wita)	TD (mmHg)	Nadi (x/i)	Suhu (axilla)	TFU	kontraksi	Kandung kemih
I	17.15	110/80	83	36,8°C	Setinggi pusat	Baik	Kosong
	17.30	110/80	83		Setinggi pusat	Baik	Kosong
	17.45	110/80	84		Setinggi pusat	Baik	Kosong
II	18.00	110/80	80		Setinggi pusat	Baik	Kosong
	18.30	110/80	80	36,8°C	Setinggi pusat	Baik	Kosong
	19.00	110/80	80		Setinggi pusat	Baik	Kosong

Sumber data : sekunder

5. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

6. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (selama 10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.
7. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.
8. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.
9. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.
10. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.
11. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5 %
12. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
13. Melengkapi partograf (Saifuddin, 2014 : 341-347).

G. LANGLAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 18 juli 2018, jam 19.10 WITA

1. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
2. Jumlah perdarahan \pm 200 cc
3. Kandung kemih kosong
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal


Tekanan darah :110/80mmHg

suhu :36,8°C

Nadi : 84x/menit

pernapasan :.24x/menit

5. Ibu telah makan dan minum
6. Keadaan ibu dan janin baik



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
PADA NY”M”GESTASI 40 MINGGU 5 HARI DENGAN KETUBAN PECAH
DINI (KPD) DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 18 JULI 2018**

No register : 505xxx

Tanggal masuk : 18 juli 2018 jam : 10.10 WITA

Tanggal pengkajian : 18 juli 2018 jam : 10.10 WITA

Tanggal pertus : 18 juli 2018 jam : 16.55 WITA

Nama pengkaji : Wiwi Agustina

Identitas isteri/suami

Nama : Ny “M”/ Tn “S”

Umur : 35 Th/ 38 Th

Nikah/Lamanya : 1x/±18 Tahun

Suku : Makassar

Agama : Islam

Pendidikan : SMP/SMP

Pekerjaan : Irt/Wiraswasta

Alamat : Panyeroang, Kec Palangga, Kab Gowa

KALA I

Anamnesa (DATA SUBJEKTIF)

a. Alasan Ibu Masuk

Ibu masuk dengan keluhan adanya pengeluaran air pervaginam

b. Riwayat Keluhan Utama

Air yang keluar sedikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga sarung basah, berwarna jernih dan tidak berbau. Ibu adalah rujukan dari puskesmas parangloe dengan keluhan ada keluar cairan berwarna jernih pada tanggal 18 juli 2018 (± 3 jam sebelum sampai ke rumah sakit) satu sarung basah akibat cairan yang keluar, ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang. Riwayat pemeriksaan di puskesmas yaitu his /kontraksi tidak ada, pembukaan 1 cm, dan riwayat pemeriksaan kertas lakmus di puskesmas positif yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan air ketuban.

c. Riwayat Menstruasi

1. Menarche : 14 tahun
2. Siklus : 28-30 hari
3. Lamanya : 5-7 hari
4. Banyaknya : 2-3 kali ganti pembalut setiap hari
5. Teratur/tidak : teratur
6. Sifat darah : encer
7. Disminore : tidak ada

d. Riwayat Perkawinan

Ibu menikah 1x secara sah dengan Tn S pada tahun 2000 saat Ny M berusia 17 tahun dan Tn S berusia 20 tahun.

e. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu

N o	Tahun lahir	Jenis partus	Jenis kelamin	BBL g	PBL cm	Penolong	Tempat partus	Keadaan
1	2001	Spontan	Laki-laki	3000 g	49 cm	Dukun	Rumah	Hidup
2	2004	Spontan	Perempuan	3500 g	48 cm	Dukun	Rumah	Hidup
3	2010	Abortus						
4	2013	Spontan	perempuan	3500 g	49 cm	Dukun	RS	Hidup

Sumber Data : Primer

f. Riwayat nifas yang lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresi setelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas, seperti keluar cairan yang berbau busuk, pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui anak pertama, kedua dan ketiganya secara eksklusif selama 6 bulan dan di tambah makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan ke atas.

g. Riwayat kehamilan yang sekarang

- 1) Hari pertama haid terakhir tanggal 6 oktober 2017
- 2) Hari tafsiran persalinan tanggal 13 juli 2018
- 3) Umur kehamila 40 minggu 5 hari
- 4) Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan
- 5) Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kiri dan dirasakan sampai sekarang.

6) Ibu memeriksakan kehamilannya 7 kali di puskesmas

Trimester I : 2 kali

Trimester II : 2 kali

Trimester III : 3 kali

7) Ibu telah mendapatkan suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 1 kali pada tanggal 1 februari 2018

8) Keluhan-keluhan

Trimester I : mual dan muntah berlebihan

Trimester II : tidak ada keluhan

Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah

9) Penyuluhan

Ibu tidak pernah mendapat penyuluhan apapun

h. Riwayat keluhan sekarang dan yang lalu

1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes mellitus, asma dan hipertensi

2) Tidak ada riwayat penyakit menular, tuberculosis, malaria, dan penyakit menular seksual

3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan

4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah diopname di rumah sakit dan di puskesmas.

i. Riwayat Penyakit Keluarga

Didalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, asma dan penyakit serius lainnya.

j. Riwayat Sosial, Ekonomi, Psikososial Dan Spiritual

- 1) Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah suami
- 2) Hubungan ibu dengan suami, keluarga maupun tetangga baik
- 3) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami
- 4) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya

k. Riwayat KB

Sejak kelahiran anak pertama yaitu tahun 2010 ibu mulai menjadi akseptor KB 3 bulan dan berhenti pada bulan agustus 2017 dengan alasan ingin hamil lagi.

l. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi

1) Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan

- a) Pola makan : Nasi, sayur dan lauk
- b) Rekuensi : 3 kali sehari
- c) Kebutuhan nutrisi : 6-8 gelas per hari

Selama inpartu :

Ibu makan, tetapi hanya sedikit demi sedikit dan lebih banyak minum.

2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

- a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amniak.
- b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu :

- a) BAK : ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok
- b) BAB : ibu belum BAB

3) Personal hygiene

Kebiasaan :

- a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b) Sikat gigi : 2 kali sehari (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi.
- c) Keramas : 3 kali seminggu menggunakan shampoo
- d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu :

- a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan:

- a) Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu:

- a) Ibu tidak pernah tidur

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Hari tafsiran persalinan tanggal 13 juli 2018
4. Usia gestasi kehamilan 40 minggu 5 hari
5. Tanda-tanda vital

Tekanan darah	: 110/80mmHg	suhu	:36,8°C
Nadi	: 83 x/I	pernapasan	: 24x/i
6. Tinggi badan : 154 cm
7. Berat badan sebelum hamil : 45 kg
8. Berat badan sekarang : 56 kg
9. Lingkar lengan atas (LILA): 28 cm
10. Pemeriksaan fisik (*head to toe*)
 - a. Kepala : bersih, tidak ada ketombe, tidak rontok, rambut hitam dan lurus, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

- b. Wajah : tidak pucat, tidak ada *chloasma gravidarum*, tidak *oedema*, tidak ada nyeri tekan
- c. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih, kelopak mata tidak bengkak
- d. Hidung : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak pengeluaran secret, tidak *oedema*, tidak ada nyeri tekan, tidak ada polip
- e. Mulut dan gigi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada stomatitis, gusi tidak berdarah, dan tidak ada gigi yang tanggal
- f. Telinga : simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran serumen, tidak ada peradangan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
- g. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis
- h. Payudara : payudara simetris kiri dan kanan, puting susu bersih dan menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, terdapat pengeluaran kolostrum jika puting susu dipencet
- i. Abdomen :
- Leopold I : 2 jrbpx, 32 cm, bokong
- Leopold II : PUKA
- Leopold III : kepala
- Leopold IV : BDP 5/5

LP : 101 cm
 TBJ : $32 \times 101 = 3232$ gram
 DJJ : 130x/i
 His : 1x10 menit durasi 5-10 detik

- j. Ekstremitas atas : jari lengkap, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
- k. Ekstremitas bawah : tidak ada varises, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak oedema
- l. Genitalia dan anus : tidak ada varises, nampak pengeluaran lendir dan air ketuban, tidak ada oedema, tidak ada hemorrhoid

11. Pemeriksaan dalam

Vaginal toucher (VT) tanggal 18 juli 2018, jam: 10.10 WITA

- a. Vulva Dan Vagina : Normal
- b. Portio : Tebal
- c. Pembukaan : 1 Cm
- d. Ketuban : Jernih (Merembes)
- e. Presentase : -
- f. Penurunan : Hodge I
- g. Molase : Tidak Ada
- h. Penumbungan : Tidak Ada
- i. Kesan Panggul : Normal

j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

12. Pemeriksaan tes *valsava*

Tanggal 2018, jam: 10.15 WITA

Hasil pemeriksaan tes *valsava* yaitu terdapat pengeluaran air ketuban merembes

13. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

- 1) WBC : $9.4 \times 10^3 / \mu\text{L}$
- 2) RBC : $4.43 \times 10^6 / \mu\text{L}$
- 3) HGB : 11.02g/dl
- 4) HCT : 34,7%
- 5) MCV : 7.83fL
- 6) MCH : 32.7pg
- 7) MCHC : 31.7 g/dl
- 8) HbsAG : negatif

ASSESMENT

Diagnosa : GVPIIA0 gestasi 40 minggu 5 hari, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase laten dengan KPD

Masalah aktual : KPD

Masalah potensial : Potensial terjadi kepada ibu yaitu potensial terjadinya infeksi *intraparta*/dalam persalinan, infeksi *puerpalis*/masa nifas, *dry labour*/partus lama, perdarahan post partum,

meningkatnya tindakan *operatif obstetric*(khususnya SC), morbiditas dan mortalitas. Masalah potensial terjadi pada janin yaitu *prematunitas* (*sindrom distress* pernafasan, *hipotermia*, masalah pemberian makan pada *neonatal*, perdarahan *intraventikuler*, gangguan otak, dan resiko *cerebral palsy*, *anemia*, skor APGAR rendah, *ensefelopati*, *cerebral palsy*, perdarahan *intracranial*, gagal ginjal, *distress* pernafasan). Dan *oligohidromnion* (*sindrom defornits* janin, *hipolapsia* paru, *deformitas ekstrimitas* dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal.

PLANNING

Tanggal 18 juli 2018, jam 10.20 WITA

1. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Hasil : ibu telah mengetahui kedaannya sekarang.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his tiap 1 jam pada kala I fase laten dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan 30 menit.

waktu	Nadi	Suhu	Tekanan darah	DJJ	HIS
11.10	84x/i			132x/i	1x10 menit durasi 10-15 detik
12.10	82x/i			138x/i	2x10 menit durasi 15-20 detik
13.10	78x/i	36,7°C	110/80mmHg	140x/i	2x10 menit durasi 20-25 detik

Sumber Data : Sekunder

3. Melakukan *vaginal toucher* (VT) kontrol jam: 13.10 WITA

Hasil:

- a. Vulva Dan Vagina : Normal
- b. Portio : Tipis
- c. Pembukaan : 5 Cm
- d. Ketuban : Jernih(Merembes)
- e. Presentase : Ubun-Ubun Kecil Kanan Lintang
- f. Penurunan : Hodge II
- g. Molase : Tidak Ada
- h. Penumbungan : Tidak Ada
- i. Kesan Panggul : Normal
- j. Pelepasan : Lendir,Darah Dan Air Ketuban

4. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital setiap 4 jam (keuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin(djj) dan his.

Waktu	Nadi	Suhu	Tekanan Darah	Djj	His
13.40	80x/i	36,7°C	110/80 mmHg	130x/i	3x10 menit durasi 20-25 detik
14.10	80x/i			130x/i	4x10 menit durasi 25-30 detik
14.40	78x/i			132x/i	4x10 menit durasi 30-35 detik
15.10	80x/i			138x/i	4x10 menit durasi 30-35 detik
15.40	82x/i			138x/i	4x10 menit durasi 35-40 detik
16.10	84x/i			140x/i	5x10 menit durasi 40-45 detik
16.40	80x/i	36,7°C	110/80 mmHg	140x/i	5x10 menit durasi 50-55 detik

Sumber Data : Sekunder

5. Mengobservasi *vaginal toucher* (VT) kontrol, jam 16.40 WITA
- Vulva Dan Vagina : Normal
 - Portio : Melesap
 - Pembukaan : 10 Cm(Lengkap)
 - Ketuban : Jernih (Merembes)
 - Presentase : Ubun-Ubun Depan
 - Penurunan : Hodge IV
 - Molase : Tidak Ada
 - Penumbungan : Tidak Ada
 - Kesan Panggul : Normal

j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

6. Mengajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, ibu menarik napas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi

Hasil : ibu telah melakukannya

7. menganjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin

Hasil : kandung kemih telah kosong

8. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infuse RL 28 tetes per menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotic cefotaxime 1gr/ IV sesuai intruksi dokter

Hasil : infuse RL telah dipasang pada jam 10.25 WITA, misoprostol 1/8 tab telah berada didalam vagina ibu pada jam 10.30 WITA, dan injeksi cefotaxime telah diberikan pada jam 10.35 WITA

9. Memberi makan dan minum jika tidak ada his

Hasil : ibu telah diberi makan dan minum disela-sela his

10. Menganjurkan kepada ibu untuk senangtiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti

Hasil : ibu selalu beristighfar saat ibu mrasakan sakit akibat kontraksi

11. Mencatat dalam partograf

Hasil : partograf telah dilengkapi

KALA II**DATA SUBJEKTIF**

1. Sakitnya bertambah kuat dan tembus belakang
2. Ibu merasa ingin buang air besar
3. Adanya dorongan kuat untuk meneran
4. Adanya tekanan pada anus

DATA OBJEKTIF

1. Perineum menonjol
2. Vulva dan vagina membuka
3. His 5x dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik
4. Pembukaan 10cm (lengkap)
5. Penurunan kepala hodge IV (0/5)
6. Pelepasan lendir, darah dan air ketuban

ASSESSMENT

Perlangsungan kala II

PLANNING

Tanggal 18 juli 2018, jam: 16.40 WITA

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorongan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

Hasil : tanda dan gejala kala II telah dirasakan

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu:

a. Partus set

Partus set terdiri atas 2 klem kocher, $\frac{1}{2}$ kocher, $1\frac{1}{2}$ handscoon steril, kateter nelaton, penjepit tali pusat, kasaa steril, spoit 3 cc dan gunting tali pusat.

b. Hecting set

Hecting set terdiri atas nelvuder, catgut, jarum, pinset anatomi, pinset sirurgi, dan gunting benang

c. Obat dan bahan

Obat dan bahan terdiri atas cairan infus, oksitosin, lidokain, salep mata, vitamin k hepatitis B dan betadin.

d. Diluar partus set

Adapun yang harus disiapkan diluar partus set yaitu air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi, larutan klorin 0,5%, tempat sampah, delee, lenek, perlak, handuk kering, tensimeter, stetoskop dan termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, kacamata, celemek, handscoon, alas kaki tertutup/ sepatu boot

3. Memakai celemek plastik

Hasil : celemek telah dipakai

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Hasil : perhiasan telah disimpan dan tangan telah bersih

5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Hasil : sarung tangan telah dipakai pada tangan kanan

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.

Hasil : oksitosin 1 ampul telah berada didalam wadah partus set

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi, dengan gerakan vulva ke perineum.

Hasil : vulva dan perineum telah bersih

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Pemeriksaan dalam jam : 16.40 WITA

- a. Vulva Dan Vagina : Normal
- b. Portio : Melesap
- c. Pembukaan : 10 Cm(Lengkap)
- d. Ketuban : Jernih(Merembes)

- e. Presentasi : Ubun-Ubun Kecil Depan
 - f. Penurunan : Hodge IV
 - g. Molase : Tidak Ada
 - h. Penumbungan : Tidak Ada
 - i. Kesan Panggul : Normal
 - j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban
9. Mencilupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.
- Hasil : sarung tangan telah direndam dalam larutan klorin 0,5 % secara terbalik
10. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin dalam batas normal (120 – 160 kali per menit).
- Hasil : denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132 kali per menit.
11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.
- Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).
- Hasil : ibu dalam posisi setengah duduk

13. Melakukan pempinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Hasil : telah dilakukan pempinan meneran

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Hasil : ibu tetap dalam posisi setengah duduk karena sakitnya yang bertambah sering

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Hasil : handuk bersih telah diletakkan diatas perut ibu

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.

Hasil : *underpad* telah terpasang dibawah bokong ibu

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

Hasil : alat telah lengkap

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.

Hasil : sarung tangan telah dipakai pada kedua tangan

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenan (perasat untuk melindungi perineum dengan satu

tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).

Hasil : kepala telah lahir

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Hasil : tidak terjadi lilitan tali pusat

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala kearah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Hasil : kedua bahu telah lahir

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Hasil : lengan dan badan telah lahir

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Hasil : seluruh badan telah lahir

25. Melakukan penilaian selintas :

a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?

b. Apakah bayi bergerak aktif ?

Hasil : bayi lahir spontan tanggal 18 juli 2018, jam : 16.55 WITA, dengan segera menangis dan bernapas tanpa bantuan, bergerak dengan aktif dan APGAR *score* 8/10.

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu. Hasil : ibu telah diselimuti dengan handuk brsih dan kering, serta telah berada diatas perut ibu

KALA III

DATA SUBJEKTIF

- a. Ibu lelah setelah melahirkan
- b. Ibu merasakan nyeri perut bagian bawah

DATA OBJEKTIF

- a. Bayi lahir spontan tanggal 18 juli 2018, jam: 16.55 WITA
- b. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
- c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
- d. Perdarahan $300 \pm cc$
- e. Kala II berlangsung selama ± 15 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih Nampak di vulva.

ASSESSMENT

Perlangsungan kala III

PLANNING

Tanggal 18 juli 2018, jam: 17.00 WITA

27. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Hasil : bayi tunggal

28. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Hasil : ibu bersedia untuk disuntik

29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Hasil : oksitosin telah disuntikkan di 1/3 paha atas bagian distal lateral

30. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Hasil : tali pusat telah dijepit

31. Memotong dan mengikat tali pusat (dengan satu tangan mengangkat tali pusat yang telah dijepit, kemudian melakukan pengguntingan tali pusat sambil melindungi perut bayi diantara 2 klem

Hasil : tali pusat telah dipotong

32. Mengikat tali pusat dengan benang desinfeksi tingkat tinggi atau steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya atau menjepit tali pusat dengan penjepit tali pusat

Hasil : tali pusat telah dijepit

33. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Hasil : bayi telah diselimuti dengan kain hangat dan topi telah terpasang di kepala

34. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Hasil : klem telah dipindahkan

35. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

Hasil : satu tangan telah berada diatas perut ibu dan tangan lainnya meregangkan tali pusat

36. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorso kranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregang tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Hasil : dorso kranial telah dilakukan

37. Melakukan peregang dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Hasil : plasenta telah terlepas dari tempat implantasinya

38. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Hasil : plasenta dan selaput ketuban telah lahir

39. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Hasil : kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar

40. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Hasil : Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 18 Juli 2018, jam 17.00 WITA

41. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Hasil : terjadi ruptur tingkat II dan telah dijahit luar dan dalam sebanyak 6 jahitan secara jelujur

42. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Hasil : uterus berkontraksi baik (teraba keras dan bundar)

43. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Hasil : IMD telah dilakukan

44. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.

Hasil : Berat bayi lahir 3400 gram, panjang bayi lahir 49 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 34 cm, lingkar perut 32 cm, APGAR *score* 8/10, dan telah disuntik vitamin K1 (IM) dipaha kiri anterolateral

45. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

Hasil : hepatitis B telah disuntikkan dipaha kanan anterolateral

KALA IV**DATA SUBJEKTIF**

- a. Ibu lelah setelah selesai persalinannya
- b. Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah

DATA OBJEKTIF

- a. Ibu tampak lelah setelah menjalani persalinannya
- b. Plasenta lahir lengkap pada tanggal 18 juli 2018, jam: 17.00 WITA
- c. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
- d. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
- e. perdarahan \pm 200cc
- f. kandung kemih kosong

ASSESSMENT

Perlangsungan kala IV dengan keadaan ibu kelelahan

PLANNING

Tanggal 18 juli 2018, jam:17.10 WITA

46. melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah terjadinya perdarahan pervaginam
hasil : kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
47. Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

Hasil : ibu telah melakukannya

48. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam ke 2 pasca persalinan

Hasil:

Waktu	Perdarahan
17.15	±50 cc
17.30	±40 cc
17.45	±30 cc
18.00	±30 cc
18.30	±30 cc
19.00	±20 cc
Total	±200 cc

Sumber Data : sekunder

49. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan 30 menit pada 2 jam pasca persalinan

Hasil :

Jam	Waktu (Wita)	TD (mmHg)	N (x/i)	S (°C)	TFU	Kontraksi	Kandung kemih
I	17.15	110/80	83	36,8°C	STP	Baik	Kosong
	17.30	110/80	83		STP	Baik	Kosong
	17.45	110/80	84		STP	Baik	Kosong
	18.00	110/80	80		STP	Baik	Kosong
II	18.30	110/80	80	36,8°C	STP	Baik	Kosong
	19.00	110/80	80		1 jrbpst	Baik	Kosong

Sumber Data : Sekunder

50. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

Hasil : bayi bernapas dengan normal yaitu 50 kali per menit

51. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

Hasil : alat sudah dilarutkan dalam larutan klorin 0,5 %, telah dicuci dan telah bersih

52. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

Hasil : Sampah yang terkontaminasi telah dibuang ketempat sapah.

53. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi.

Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai memakai pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu telah dalam keadaan bersih

54. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.

Hasil : ibu telah nyaman dan telah makan dan minum

55. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

Hasil : tempat bersalin telah di dekontaminasikan

56. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.


Hasil : sarung tangan telah dicelupkan di didalam larutan klorin 0,5 % dalam keadaan terbalik

57. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Hasil : kedua tangan telah bersih

58. Melengkapi partograf

Hasil : partograf telah diisi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU
LAHIR PADA NY”M” DENGAN BCB/PBK/SMK DI RSUD SYEKH
YUSUF GOWA
TANGGAL 18 JULI 2018**

No. register : 505xxx
 Tanggal lahir : 18 juli 2018 jam: 16.55 WITA
 Tanggal pengkajian : 18 juli 2018 jam: 17.00 WITA
 Nama pengkaji : wiwi agustina

IDENTITAS BAYI

Nama : Bayi Ny “M”
 Tempat, Tanggal Lair : RSUD Syekh Yusuf Gowa, 18 Juli 2018
 Umur : 0 Hari
 Anak Ke : 4
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

IDENTITAS ORANG TUA

Nama : Ny’ m”/Tn”S”
 Umur : 35 Tahun/38 Tahun
 Nikah/ Lamanya : 1x/±18 Tahun
 Suku : Makassar
 Agama` : Islam
 Pendidikan : Smp/Smp
 Pekerjaan : Irt/Wiraswasta

Alamat : Panyeroang, Kec.Parangloe. Kab Gowa

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf pada tanggal 18 juli 2018, jam: 16.55

WITA

2. Hari pertama haid terakhir ibu tanggal 6 oktober 2017
3. Usia kehamilan pada saat melahirkan 9 bulan
4. Ibu pertama kali menyusui bayinya sejak dilahirkan yaitu IMD yang di bantu oleh Bidan
5. Persalinan spontan/tanpa alat dan tidak ada penyulit
6. Ini merupakan anak ke empat

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum bayi baik
2. Gestasi kehamilan pada saat melahirkan yaitu 40 minggu 5 hari
3. Penilaian sepintas segera menangis, bernafas dengan baik, kulit kemerahan segera setelah lahir

4. Penilaian Apgar Score

Penilaian	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 5
<i>Apperence</i> (warna kulit)	Pucat	Badan merah, ekstremitas biru	Seluruh badan kemerahan	2	2
<i>Pulse</i> (denyut jantung)	Tidak ada	<100	>100	2	2
<i>Grimace</i> (refleks)	Tidak ada	Sedikit gerakan	Batuk dan bersin		2
<i>Activity</i> (tonus otot)	Tidak ada	Ekstremitas dalam sedikit fleks	Gerakan aktif	1	2
<i>Respiration</i> (pernapasan)	Tidak ada	Lemah teratur	tidak Menangis kuat	2	2
Nilai				8	10

Sumber Data : Sekunder

5. Pemeriksaan Antropometri

Berat badan : 3400 gram

Panjang badan : 49 cm

Ligkar kepala : 33 cm

Lingkar dada : 34 cm

Lingkar perut : 32 cm

Lila : 11.5 cm

6. Pemeriksaan tanda-tanda vital

HR : 140x/i

Pernapasan : 44x/i

Suhu : 36,9°C

7. Pemeriksaan fisik

- a. Kulit : warna kulit kemerahan dan tidak ikterus
- b. Kepala : distribusi rambut di puncak kepala, tidak ada massa
- c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung di garis telinga, mulut garis tengah wajah dan simetris.
- d. Telinga : posisi telinga berada di garis lurus dengan mata, kulit tidak kendur, pembentukan tulang rawan terbentuk dengan baik dan kokoh.
- e. Hidung : posisi di garis telinga, bernafas melalui hidung,
- f. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah di garis tengah, refleks menghisap serta refleks *roothing* ada
- g. Leher : simetris, tyroid di garis tengah, tidak ada pembesaran pada vena jugularis
- h. Dada : gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 43x/I, suara nafas jernih, frekuensi jantung 142x/i
- i. Payudara : jarak antara puting pada garis sejajar tanpa ada puting tambahan
- j. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat yang dijepit dengan penjepit tali pusat, abdomen lunak, tidak ada massa dan bising usus ada.

- k. Genetalia : testis sudah turun, testis terbungkus scrotum, terdapat 1 peis dan terdapat lubang penis
- l. Anus : tampak lubang anus
- m. Ekstrimitas : simetris, jari kaki dan jari tangan lengkap.

8. Pemeriksaan usia gestasi dengan skala *Ballard*

a. Maturnitas fisik

- 1) Kulit : 3
- 2) Lanugo : 4
- 3) Garis telapak kaki : 5
- 4) Payudara : 3
- 5) Mata/kaki : 4
- 6) Genetalia : 3

b. Maturnitas neura muscular

- 1) Postur : 4
- 2) Jendela pergelangan tangan : 3
- 3) Gerakan tangan membalik : 3
- 4) Sudut puplitea : 4
- 5) Tumit ke telinga : 4

Total score : Maturnitas fisik + Neuro Muskuler

: 22+18 = 40

Usia Maturnitas : 40 minggu

9. Pemeriksaan refleks

- a. Refleks *Morro* (+) : ada respon saat di kejutkan
- b. Refleks *Roothing* (+) : ada respon mencari puting
- c. Refleks *Suching* (+) : ada respon ingin menghisap
- d. Refleks *Grafs/Plantar* : ada respon ingin menggenggam
- e. Refleks *Plantar* (+) : ada respon ketika bagian bawah disentuh
- f. Refleks *Babinsky* (+) : ada respon ketika disentuh, menarik
kedalam

10. Eliminasi

BAB : mekonium

BAK : positif

ASSESSMENT

Bayi Ny M dengan BCB/SMK/SPT, segera menangis

PLANNING

Tanggal 18 juli 2018 jam :17.00 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu bahwa keadaan bayi dalam keadaan baik
Hasil : ibu mengerti
2. Mengeringkan bayi dan mengganti sarung basah dengan sarung yang kering
Hasil : tindakan telah dilakukan
3. Membedong bayi dengan kain bersih dan kering agar bayi tidak kedinginan
Hasil : bayi telah dibedong

4. Mengajukan ibu untuk memberikan Asi eksklusif pada bayinya selama 6 bulan dan tidak memberikan makanan tambahan selain Asi.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

5. Menjelaskan tentang manfaat Asi yaitu
 - a. Asi kaya akan zat penting yang dibutuhkan oleh bayi seperti DHA,AA,omega 6, laktosa, protein, laktobasilus, vitamin A, colostrum, lemak yang semuanya dalam takaran dan komposisi yang pas untuk bayi
 - b. Asi memberikan kekebalan tubuh yang optimal pada bayi
 - c. Asi tidak basi, dan selalu higienis serta segar
 - d. Sebagai saran mendekatkan ibu dan bayi

Hasil : ibu mengerti

6. Mengajukan kepada ibu cara perawatan tali pusat
 - a. Membersihkan dengan kasa steril yang dibasahi air matang dimulai dari pangkal tali pusat sampai ujung, setelah itu keringkan tali pusat dan biarkan terbuka, dan tidak boleh diberi salep, bedak, minyak dan betadin
 - b. Usahakan popok atau celana bayi tidak mengenai tali pusat agar tali pusat cepat kering dan tidak iritasi ibu mengerti

Hasil :

7. Menjelaskan kepada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya bayi baru lahir
 - a. Pernapasan $<30x/i$ atau $>60x/i$
 - b. Suhu tubuh bayi $<36,5^{\circ}C$ atau $>37,5^{\circ}C$

- c. Bayi biru, pucat, dan memar
- d. Rewel dan muntah
- e. Tali pusat merah, bengkak, serta keluar cairan busuk bernanah
- f. Tidak BAB selama 3 hari, tinja merah
- g. Tidak BAK dalam 24 jam
- h. Kejang dan menigil

Hasil : ibu dan keluarga mengerti

8. Meminta izin kepada ibu untuk memberikan salep mata, vit K di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM(90°)

Hasil : ibu memberi izin dan bayi telah diberikan salep mata dan vit K

9. Setelah 1 jam pemerian vit K beritahu ibu bahwa bayinya akan di imunisasi Hbo di 1/3 lateral paha kanan bayi secara IM(90°)

Hasil : ibu bersedia dan bayi telah mendapat imunisasi Hbo

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL
CARE HARI PERTAMA PADA NY”M” DENGAN NYERI ABDOMEN DI
RSUD SYEKH YUSUF
TANGGAL 18 JULI 2018**

No register : 505xxx
 Tanggal masuk : 18 juli 2018 jam : 16.55 WITA
 Tanggal partus : 18 juli 2018 jam : 19.00 WITA
 Tanggal pengkajian : 18 juli 2018 jam : 19.00 WITA
 Nama pengkaji : Wiwi Agustina

IDENTITAS ISTERI/SUAMI

Nama : Ny”M”/ Tn”S”
 Umur : 35 tahun/ 38tahun
 Nikah/lamanya : 1x/±8 tahun
 Suku : makassar
 Agama : islam
 Pendidikan : SMP/SMP
 Pekerjaan : Irt/Wiraswasta
 Alamat : Panyeroang, kec parangloe, kab Gowa

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengeluh nyeri Abdomen setelah melahirkan sejak 3 jam yang lalu
2. Ibu melahirkan di RSUD Syekh yusuf tanggal 18 juli 2018 jam: 16.55 WITA
3. Hari pertama haid terakhir tanggal 6 oktober 2017

4. Ibu mengatakan ini kehamilan yang ke lima dan pernah keguguran 1 kali
5. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang di bantu oleh Bidan
6. Ibu belum BAB dan sudah BAK
7. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, DM, jantung dan penyakit serius lainnya.
8. Riwayat persalinan dan nifas yang lalu

No	Tahun lahir	Jenis partus	Jenis kelamin	BBL g	PBL cm	penolong	Tempat partus	ASI	keadaan
1	2001	Spontan	Laki-laki	3000 g	48 cm	Dukun	Rumah	eksklusif	Hidup
2	2004	Spontan	Perempuan	3500 g	49 cm	Dukun	Rumah	Eksklusif	Hidup
3	2010					Abortus			
4	2013	Spontan	perempuan	3500 g	49 cm	Bidan	RS	eksklusif	Hidup

Sumber Data : Primer

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan TTV

Tekanan darah	: 110/90 mmHg	suhu	: 36,7°C
Nadi	: 84x/I	pernapasan	: 23x/i
4. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah : tidak pucat, tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, sclera putih dan kongjungtiva merah muda

- c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tyroid dan limfe
- d. Payudara : simetris, putting susu menonjol, hyperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, ada pengeluaran asi saat putting di pencet.
- e. Abdomen : tidak ada bekas operasi, tinggi fundus uteri 1 jari d bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, kandung kemih ibu kosong
- f. Genetalia : tampak jahitan perineum, tampak pengeluaran darah ± 100 cc, ibu masih memakai popok, tidak ada oedema, tidak ada varisces, tidak ada tanda-tanda infeksi
- g. Anus : tidak ada hemoroid
- h. Ekstrimitas : terpasang infus di tangan sebelah kiri ibu, tidak ada oedema, tidak ada varices, tidak ada nyeri tekan.

ASSESSMENT

Ny M PIVAI postpartum hari pertama dengan nyeri abdomen

PLANNING

Tanggal : 18 juli 2018, jam : 19.10 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri abdomen, yaitu pada saat hamil Rahim membesar sesuai ukuran janin yang dikandung, saat bayi lahir maka perlahan-lahan Rahim akan menyusut dan mengecil hingga sebesar buah pir kecil. Proses

kembalinya kebentuk semula dari Rahim ini, maka disertai dengan rasa kram di perut yang di sebut dengan kontraksi, uterus segera mengecil dan pembuluh darah yang terbuka saat placenta terlepas akan segera menutup kembali sehingga tidak terjadi perdarahan. Nyeri perut seperti ini akan semakin terasa saat menyusui, ibu tidak perlu cemas karena adanya rangsangan hisapan bayi maka keluarlah hormone oksitosin yang membantu kontraksi uterus, menggunakan gurita yang nyaman, lakukan relaksasi napas bila nyeri atau kram muncul

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh bidan

2. Menganjurkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus yaitu dengan meletakkan satu tangan diatas perut ibu, lalu tekan dan putar secara terus menerus searah jarum jam sampai perut ibu teraba keras dan bundar

Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi dini agar memperlancar pengeluaran lochia, mengurangi infeksi, mempercepat involusi uteri serta memperlancar peredaran darah

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

4. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin agar produksi asi lancar dan bayi mendapatkan asupan nutrisi, maka bayi harus disuse selama 6 bulan tanpa makanan tambahan.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

5. Memberikan konseling tentang

a. Nutrisi

Gizi yang dibutuhkan ibu yaitu makanan sehat dan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, kalsium seperti yang terkandung dalam nasi, daging, ikan, telur, tempe, tahu, buah-buahan, kacang-kacangan dan banyak mengkonsumsi air putih untuk memperbanyak produksi ASI

b. Personal hygiene

Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi minimal 2 kali sehari, mengganti celana dalam tiap kali lembab atau basah dan rajin mengganti pembalut

c. Istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat cukup yaitu tidur siang 2 jam, dan malam 6-8 jam

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menjelaskan kepada ibu tentang kontrasepsi

- a. Kondom merupakan selubung tipis dari karet yang berguna sebagai sarung penis yang sedang ereksi selama berhubungan dan menghalangi sperma masuk ke vagina yang membantu mencegah kehamilan, adapun kekurangannya yaitu dapat bocor yang dapat menyebabkan fungsi tidak efektif

- b. Implant yaitu alat kontrasepsi berbentuk batil batang kecil yang dipasang dilengan atas yang berfungsi untuk menvegah kehamilan dan aman bagi ibu yang menyusui, adapun kekurangannya menstruasi tidak teratur, tidak dapat digunakan bagi penderita DM, dan osteoporosis, dapat memicu iritasi,serta rasa tidak nyaman di area lengan yang dipasang
 - c. IUD/alat kontrasepsi dalam Rahim adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam Rahim untuk menunda kehamilan dan menjaga jarak kehamilan dan menjamin perlindungan jangka panjang serta aman bagi ibu yang menyusui, adapun kekurangannya yaitu aliran menstruasi, bercak berulang, kemungkinan mengalami sakit punggung.
 - d. Suntik 3 bulan merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan menyuntikkan hrmon progesterone pada bokong ibu atau pada lengan atas ibu setiap 3 bulan sekali, adapun kekurangannya penggunaan jangka panjang menurunkan kepadatan tulang.
 - e. Pil KB merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan megkonsumsi rutin pil Kb, adapun kekurangannya dapat menyebabkan bercak diantara menstruasi, mual,muntah, sakit kepala dan tidak cocok bagi wanita yang pelupa
- Hasil : ibu mengerti dan belum menentukan kontrasepsi yang diinginkan dan ingin berdiskusi terlebih dahulu bersama suaminya.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesenjangan yang terjadi antara tinjauan pustaka dan studi kasus dalam penerapan proses asuhan kebidanan intranatal pada Ny M dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan paritas di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 18 Jul 2018. Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dari asuhan yang nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari tujuh langkah.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan tujuh langkah Varney yakni, pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I Identifikasi Data Dasar

Dalam pengkajian yang dimulai dari pengumpulan data berupa anamnesa serta data-data yang dapat ditemukan saat melakukan anamnesa yang dapat mendukung terjadinya kasus tersebut. Setelah dilakukan anamnesa, dilakukan pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Selain pemeriksaan fisik, juga dilakukan pemeriksaan dalam untuk memantau kemajuan persalinan, khususnya untuk memastikan pecahnya selaput ketuban dan juga dengan pemeriksaan tes *valsava*.

Tes *valsava* dilakukan dengan cara melakukan ekspirasi paksa dengan menutup mulut dan hidung yang akan menambah tekanan pada telinga dan tekanan pada bagian fundus, sehingga jika terjadi KPD, maka air ketuban akan keluar (Fadlun, 2011 : 114).Kemudian pemeriksaan laboratorium.

Dalam tahapan pengkajian, penulis tidak mendapat hambatan. Hal ini karena respon kooperatif ibu yang dapat menerima kehadiran penulis saat pengumpulan data sampai tindakan yang diberikan. Ibu menunjukkan sikap terbuka dan menerima anjuran serta saran yang diberikan oleh penulis maupun tenaga medis lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan.

Pada kasus Ny M didapatkan riwayat keluhan masuk rumah sakit ibu dirujuk oleh bidan dari Puskesmas berupa terdapat pengeluaran air ketuban dari jalan lahir pada tanggal 18 juli 2018, pukul 10.10 wita, dengan kontraksi 1x10 menit durasi 5-10 detik. Ibu. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 1 cm, air ketuban merembes dan berwarna jernih. Selain itu, data yang didapatkan dari seorang bidan yang merujuk yaitu riwayat pemeriksaan tes lakmus di Puskesmas yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru, yang menandakan pelepasan air yang keluar yaitu air ketuban ibu mengatakan ini kehamilannya yang ke 5 dan pernah mengalami kegugran 1 kali pada tahun 2010 ibu mengatakan hari pertama haid terakhir ibu 9 oktober 2017 dan usia kehamilan sekarang yaitu 9 bulan, ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 7 kali di Puskesmas Parangloe dan telah mendapat suntikan TT 1 kali pada tanggal 1

februari 2018. Ibu tidak pernah menderita penyakit asma, DM, jantung, hipertensi dan jantung. Serta ibu tidak memiliki penyakit menular dan menurun.

Tindakan yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf yakni pengumpulan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk Rumah sakit, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tes *valsava*. Terakhir yaitu pemeriksaan penunjang pemeriksaan laboratorium (sampel darah).

Meskipun terdapat perbedaan antara riwayat tindakan yang dilakukan di puskesmas dengan tindakan yang dilakukan di rumah sakit, yaitu pemeriksaan tes lakmus yang dilakukan di Puskesmas dan pada umumnya pemeriksaan kertas lakmus di Rumah sakit tidak dilakukan pada kasus KPD. Meskipun demikian, riwayat tindakan yang telah dilakukan di Puskesmas yang berbeda dengan tindakan yang dilakukan di Rumah sakit, hal tersebut dapat saling membantu untuk pengumpulan data dalam menegakkan diagnosis.

KPD merupakan pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm (Sepduwiana, 2011 : 144). Pada paritas, resiko KPD banyak terjadi pada multipara

dan grandemultipara disebabkan motilitas uterus berlebih, kelenturan leher Rahim yang berkurang sehingga dapat terjadi pembukaan dini pada serviks. Sedangkan pada usia, bertambahnya usia wanita berhubungan dengan menurunnya fungsi dan kemampuan organ tubuh sehingga meningkatkan resiko timbulnya kelainan-kelainan (Maharani Dkk, 2017:103). Pada langkah pertama, penulis tidak mendapatkan kesenjangan antara teori dan kasus yang terjadi dilapangan.

B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Dalam menegakkan suatu diagnosa kebidanan, didukung dan ditunjang oleh beberapa data, dan dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahan.

Pada kasus Ny M, telah dilakukan pengumpulan data subjektif yaitu Ny M mengatakan adanya pengeluaran air dari jalan lahir sedikit demi sedikit hingga sarung basah., data objektif di dapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, dari hasil pemeriksaan dalam jam 10.10 WITA di dapatkan vlva dan vagina normal, portio tebal, pembukaan 1 cm, ketuban pecah, presentasi uuk kanan lintang,

penurunan hodge 1 molase tidak ada, penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir, darah dan air ketuban. , maupun data penunjang yaitu pemeriksaan tes lakmus. sehingga berdasarkan data yang didapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa diagnosa atau masalah aktual yang dirumuskan yaitu KPD. Oleh karena itu tidak terdapat kesenjangan antara teori dan data yang diperoleh.

C. Langkah III Antisipasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Pada perumusan diagnosa/ masalah potensial akan dibahas tentang kemungkinan terjadi hal yang lebih fatal apabila apa yang menjadi masalah aktual tidak segera ditangani. Pada tinjauan pustaka, masalah potensial yang dapat terjadi yaitu infeksi *intrapartal/* dalam persalinan, infeksi *puerperalis/* masa nifas, *dry labour/* partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome, hypothermia, neonatal feeding problem, retinopathy of premturit, intraventricular hemorrhage, necroticing enterecolitis, brain disorder (and risk of cerebral palsy, hyperbilirubinemia, anemia, sepsis), prolaps funiculli/* penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder (kompresi tali pusat, *prolaps uteri, dry labour/partus lama, APGAR score rendah, ensefalopaty, cerebral palsy, perdarahan intracranial, renal failure, respiratory distress*), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

Pada kasus ini, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau komplikasi yang mungkin akan terjadi pada ibu maupun janin karena penanganan ibu bersalin atas indikasi KPD dengan tindakan pemasangan infus, pemberian obat uterotonika dan pemberian obat antibiotic telah sesuai dengan teori, sehingga tidak ada diagnosa potensial terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

D. Langkah IV Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/ Kolaborasi

Beberapa data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera yang harus dilakukan guna untuk menyelamatkan klien. Tindakan tersebut berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih professional (dokter obgyn). Pada tinjauan pustaka, tindakan segera/kolaborasi pada KPD adalah mengkolaborasikan dengan dokter untuk pemasangan infus, pemberian uterotonika dan pemberian antibiotik.

Pada studi Ny "M" tindakan segera yang dilakukan adalah kolaborasi dengan dokter dalam menangani persalinan dengan KPD yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit pada jam 10.20 WITA, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam pada jam 10.25 WITA, pemberian antibiotic cefotaxime 1 gr/IV pada jam 10.30 WITA, dilakukan pemeriksaan dalam jam 10.10 WITA yang di dapatkan pembukaan 1 cm, ketuban pecah, presentase uuk kanan lintang penurunan hodge I pelepasan lendir, darah dan air ketuban. Dilanjutkan pemantauan DJJ,nadi his tiap 1 jam pada jam 10.10 WITA hingga 13.10 WITA. Dilanjutkan VT II pada jam 13.10 WITA di dapatkan pembukaan 5 cm ketuban pecah presentase uuk kanan lintang penrunan

hodge II pelepasan lendir, darah dan air ketuban. Pemantauan DJJ, nadi, his tiap 30 menit pada 13.10 WITA hingga 16.40 WITA. Dilakukan VT III pada jam 16.40 WITA di dapatkan pembukaan 10 cm (lengkap), ketuban pecah, presentase uuk depan, penurunan hodge IV, pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

persalinan berlangsung normal. Dalam kasus ini tidak ada perbedaan yang ditemukan antara teori dan tindakan yang diberikan pada Ny “M” yang tetap mengacu pada tindakan sesuai kebutuhan klien.

E. Langkah V Rencana Tindakan

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut, menganjurkan ibu untuk berdoa dan berdzikir untuk kelancaran persalinannya dengan membaca firman Allah swt QS surah An-Nahl/16:78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur (Kementrian Agama RI,2014:275).

Pada studi kasus Ny “M”, penulis merencanakan tindakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial yang akan terjadi, rencana tersebut yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit, pemasangan

misoprostol 1/8 tab pervaginam, pemberian antibiotik cefotaxime 1 gr/ IV dan memantau keadaan ibu dan janin sampai persalinan berlangsung normal. Dalam rencana tindakan asuhan kebidanan pada kasus Ny “M”, tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada dilapangan.

F. Langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan

Semua rencana telah dilaksanakan seluruhnya dengan menyesuaikan kondisi, keadaan dan kebutuhan ibu, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 di RSUD Syekh Yusuf Gowa yaitu Pada studi Ny “M” kolaborasi dengan dokter dalam menangani persalinan dengan KPD yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit pada jam 10.20 WITA, pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam pada jam 10.25 WITA, pemberian antibiotic cefotaxime 1 gr/IV pada jam 10. 30 WITA. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, penulis tidak menemukan hambatan, karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek.

G. Langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan

Adapun evaluasi yang dimaksudkan untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang dilakukan berdasarkan tujuan kriteria yang diberikan kepada Ny “M” di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 18 juli 2018 yaitu pada kala 1 berlangsung tidak lebih dari 6 jam, keadaan ibu dan janin baik, dan tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi.

Selanjutnya yaitu kala II juga berlangsung normal tanpa ada penyulit, bayi

lahir spontan tanggal 18 juli 2018, jam / 16.55 wita, menangis kuat, bernapas tanpa bantuan serta bergerak aktif. Pada kala III, tidak ada penyulit dan berlangsung normal, berlangsung ± 5 menit, kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 18 juli 2018 jam 17.00 wita, TFU setinggi pusat, perdarahan ± 200 cc, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), serta keadaan ibu dan bayi baik. Terakhir yaitu kala IV atau kala pengawasan, pada kala IV kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), jumlah perdarahan ± 200 cc, kandung kemih kosong dan keadaan ibu dan bayi baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari kala I sampai dengan kala IV, semuanya berlangsung normal, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny “M” dengan ketuban pecah dini (KPD) di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 18 juli 2018, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa pengertian tentang KPD, jika dilihat dari pembukaan serviks, maka KPD diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm (Sepduwiana, 2011 : 144). Sedangkan jika dilihat dari kapan pecahnya ketuban, maka KPD dapat diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan dan ditunggu satu jam belum dimulainya tanda persalinan (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 1).
2. Setelah dilakukan pengkajian pada tanggal 07 Juli 2017, maka ditemukan bahwa tidak ada penyulit bagi ibu maupun janin dan keadaan ibu dan janin baik yang dilihat bahwa tanda-tanda vital dalam batas normal, tekanan darah: 110/80 mmHg, nadi: 83x/ menit, pernapasan: 24x/ menit, S: 36,7°C, denyut jantung janin dengan frekuensi 132x/ menit. Ibu melahirkan pada tanggal 18 juli 2018 pukul 16.55 wita dengan berat bayi lahir 3400 gram, panjang bayi lahir 49 cm, lingkaran kepala 33 cm, lingkaran dada 34 cm, lingkaran perut 32 cm.

3. Pada pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny “M” mulai dari pengkajian sampai tahap akhir tidak ditemukan adanya hambatan karena adanya kerjasama antara klien dan petugas kesehatan sehingga semua tindakan dapat terlaksana dengan baik.
4. Pendokumentasian sangat penting dilaksanakan pada setiap tahap dari proses manajemen kebidanan.

B. SARAN

1. Bagi klien
 - a. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi dan seimbang.
 - b. Menganjurkan ibu untuk banyak istirahat
 - c. Menganjurkan agar ibu menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan genitalia
 - d. Menganjurkan ibu untuk memberikan Asi kepada bayinya sesering mungkin
2. Bagi bidan
Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memeberikan pelayanan yang sesuai sehingga dapat membantu menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)

3. Bagi institusi

Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang professional untuk menunjang pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan keterampilan bidan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti Dan Oktarina Aini.”Perbedaan Kejadian Ketuban Pecah Dini Antara Primipara Dan Multipara”*jurnal midpro*.Edisi 1 (2012), <http://journal.unisla.ac.id/pdf/19412012/1.%20kejadian%20ketuban%20pecah.pdf> (diakses tanggal 1 juli 2018)
- Budi Rahayu Dan Ayu Novita Sari “*Study Deskriptif Penyebab Kejadian Ketuban Pecah Dini (Kpd) Pada Ibu Bersalin*. Vol V, No 2 (2017). <Http://Ejournal.Almaata.Ac.Id/Index.Php/Jnki/Article/View/450/420> (Di Akses Tanggal 15 Maret 2018)
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, *Profil Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar : Sik, 2016
- Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, *Profil Kesehatan Kabupaten Gowa*, 2014. <Http://Pusdatin.Kemkes.Go.Id/Resource/Download/Profil/Profil Kab Kota 2014/7306>. Sulsel Kab Gowa 2014 (Di Akses Tanggal 10 Maret 2018).
- Fadlun.*AsuhanKebidananPatologis* . Jakarta : SalembaMedika, 2011
- Heryani, Reni.*Buku Ajar Konsep Kebidanan*.DKI Jakarta : CV Trans Info , Medis, 2011
- Kementrian Agama Ri, *Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid*. Bandung: Jawa Barat, 2014
- Kementrian Kesehatan Ri: *Profil Kesehatan Indonesia*,2016
- Kosim, M Saleh. “*Pemeriksaan Kekeruhan Air Ketuban*” *Jurnal Sari Pediatric*. Vol 11, No.5 (Februari 2010). <Http://Saripediatri.Idai.Or.Idpdfile11-5-12.Pdf>
- Kuswanti, Ina Dan Melina,Fitria.*Askeb Ii Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Marni,Dkk,*Asuhan Kebidanan Patologi*.Yogyakart: Pustaka Belajar,2016

Maharani, DKK “*hubungan usia, paritas dengan ketuban pecah dini di puskesmas jagir Surabaya*”. Volume VIII nomor 2, April 2017

[Http://forikes-ejournal.com/index.php/SF](http://forikes-ejournal.com/index.php/SF) (Di Akses Tanggal 05 juni 2018)

Norma, Nita Dan Mustika Dwi. *Asuhan Kebidanan Patologi Teori Dan Tindakan Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Nugroho, Taufan. *Obsgyn: Obstetri Dan Genekologi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011

Oktarina, Mika. *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: Depublish, 2016.

Sari, Eka Puspita Dan Kurnia Dwi Rimandini. *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jakarta: Trans Info Media, 2014.

Sarwono, Prawirohardjo. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2014

Sepduwiana, henny”Faktor Terjadinya KPD Pada Ibu Bersalin Di RSUD Rokan Hulu.”*jurnal maternity and neonatal*.”vol.1 no.3 (2011).
<http://ejournal.uppa.ac.id/index.php/akb/article/download/1103/804> (Diakses tanggal 6 juli 2018)


Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 6* .Jakarta: Lentera Hati. 2002

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbahpesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 12*. Jakarta: Lentera Hati.2002

Sukarni, Icesmi Dan Margareth. *Kehamilan, Persalinan Dan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Media, 2013.

Varney, Helen dkk, *buku saku bidan*, 2001. Varney’s pocket midwife, ed. AlfrinaHany. Jakarta: EGC,2002.

Yulifah, Rita Dan Surachmindari. *Konsep Kebidanan*. Jakarta Selatan: Salemba Medika:
2014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal: 10 April 2018
2. Nama bidan:
3. Tempat persalinan: RSJ
 Rumah Ibu Puskesmas
 Poliklinik Rumah Sakti
 Klinik Swasta Lainnya:
4. Alamat tempat persalinan:
5. Catatan: Rajuk, kala: I/II/III/IV
6. Alasan masuk:
7. Tempat rujukan:
8. Pendamping pada saat masuk:
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Perogram melewati garis waspadanya: Ya
10. Masalah lain, sebutkan:
11. Penatalaksanaan masalah tersebut:
12. Hasilnya:

KALA II

13. Epistolomi:
 Ya, Indikasi
 Tidak
14. Pendamping pada saat persalinan:
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun
15. Gejal Jantam:
 Ya, Indikasi yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
16. Dialisis bayi:
 Ya, Indikasi yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak
17. Masalah lain, sebutkan:
18. Penatalaksanaan masalah tersebut:
19. Hasilnya:

KALA III

20. Lama kala III: 30 menit
21. Pemberian Oksitosin 10 U/ml?
 Ya, waktu: menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan:
22. Pemberian ulang Oksitosin (2x)?
 Ya, alasan:
23. Pelepasan tali pusat terencana?
 Ya
 Tidak, alasan:

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam:ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Suhu	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	12-15	110/80 mmHg	80x11	36.8°C	SD	Baik	Empang	± 10 cc
	12-30	110/80 mmHg	80x11		SD	Baik	Empang	± 10 cc
	13-15	110/80 mmHg	80x11		SD	Baik	Empang	± 10 cc
2	18-30	110/80 mmHg	80x11	36.8°C	SD	Baik	Empang	± 20 cc
	19-00	110/80 mmHg	80x11		1/2FBPST	Baik	Empang	± 20 cc

Masalah kala IV:

Penatalaksanaan masalah tersebut:

Hasilnya:

24. Masalah endokteri?
 Ya
 Tidak, alasan:
25. Plasenta lahir lengkap (intact) Ya / Tidak
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan:
 a.
 b.
26. Plasenta tidak lahir > 30 menit: Ya / Tidak
 Ya, tindakan:
 a.
 b.
 c.
27. Legamasi:
 Ya, dimana: perineal
 Tidak
28. Jika lesamasi perineum, derajat: 1/2/3/4
 Tindakan:
 Perawatan, dengan: lavage anastesi
 Tidak dijahit, alasan:
29. Atoni uteri:
 Ya, tindakan:
 a.
 b.
 c.
 Tidak
30. Jumlah perdarahan: ± 200 ml
31. Masalah lain, sebutkan:
32. Penatalaksanaan masalah tersebut:
33. Hasilnya:

BAYI BARU LAHIR

34. Berat badan: 3800 gram
35. Panjang: 50 cm
36. Jenis kelamin: P
37. Penilaian bayi baru lahir: baik ada pnyull
38. Bayi lahir:
 Normal, tindakan:
 mengeringkan
 menghangatkan
 mengang tali
 Bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspilekse ringan/pucuk/biru/lemasi, tindakan:
 mengeringkan bebaakan jalan napas
 mengang tali menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain - lain sebutkan:
39. Cacat bawaan, sebutkan:
 Hipotermi, tindakan:
 a.
 b.
 c.
39. Pemberian ASI
 Ya, waktu: jam setelah bayi lahir
 Tidak, alasan:
40. Masalah lain, sebutkan:
- Hasilnya:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 1, Jl. R.M. Tahir Ujung No. 36 Samar-Gowa Telp. (0411)841877 Fax. (0411) 8221430

Nomor : B-711 /FKIK/PP.00.9/06/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 14 Juni 2018

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMO Prov. Sul-Sel.
Jl. Bouengerwila No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wa w b

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Wivi Aguilina
NIM : 70400115016
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranal Patologi Pada Klien Dengan Perilaku Keluhan Fecah Dini Dengan partus di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018.
Tempat Penelitian : RSUD Syekh Yusuf Gowa
Dosen Pembimbing : 1. Anieg Mumthi'ah Akautar, S.ST., M.Keb.
2. dr. Rini Fitriani, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kejasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
at.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Nur Hidayah, S. Kep. Ns. M.Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

Terselamatkan
1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Mahasiswa Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Masjid Raya No. 30, Telepon. 884637, Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 12 Juli 2018

Kepada

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Di-
LEMPA

Nomor : 070/428 /BKBP/2018
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor 2326/S.01/PTSP/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **WIWI AGUSTINA**
Tempat/Tanggal Lahir : Lembang, 14 Agustus 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : BTN Paccalangan Bontone

Direkomendasikan akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI PADA KLIEN DENGAN PERSALINAN KETUBAN PECAH DINI DENGAN PARITAS DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2018**"

Selama : 10 Juli s/d 11 September 2018
Pangikat : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menanti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan saat istiadat setempat;
4. Menyediakan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Derralat disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan direkomendasikan diharapkan bantuan seperlunya.

As-BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,

DRS. BAHARUDDIN.T
Pangikat: Pembina Utama Muda
N.I.D. : 19600124 197911 1 001

Terdistribusi:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Ekstranjal.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN STUDY KASUS

Nomor : 176/Diklat.RSUD-SY/VIII /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menearangkan bahwa :

N a m a : Weni Agustina
N i m : 70400115016
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Study Kasus di Ruang Kamar Bersalin (INC) dan IGD Maternal RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Pada Ny " M " Dengan Kebun Pecah Dini Disertai Paritas Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa* pada Tanggal 08 Juli 2018 S/D 08 Juli 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 07 Agustus 2018

An. Kepala Diklat
Kebidanan Penelitian

Dra. Hj. Ramliyah Sauf, Dec. MMRS
No. 196703 2 019

IDENTITAS PENULIS



A. Identitas Peneliti

Nama : Wiwi Agustina
Nim : 70400115016
Tempat, Tanggal Lahir : 14 Agustus 1997
Suku : Bugis
Asal Daerah : Pangkep
Agama : Islam
Alamat : Desa Gentung, Kec. Labakkang, Kab. Pangkep

B. Riwayat Peneliti

TK Gentung : 2001-2003
SDN 11/22 Gentung : 2003-2009
SMPN 7 Mimika : 2009-2012
SMAN 1 Mimika : 2012-2015
UIN Alauddin Makassar : 2015-2018