

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN *POST NATAL CARE*

PADA NY “R” DENGAN *POST PARTUM BLUES*

02-29 JULI 2018 DI RSUD SYEKH YUSUF

TAHUN 2018



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**Oleh
SALMAH
NIM : 70400114056**

**JURUSAN KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Saimah

NIM : 70400115056

Judul : *Manajemen Asuhan Kebidanan Postnatal Pada Ny "R" dengan post partum blues di RSUD Syekh Yusuf pada Tanggal 02-29 Juli Tahun 2018.*

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 06 Agustus 2018

Pembimbing I



Anieq Mumthiah Alkauthzar, S.Si.T., M. Keb

Pembimbing II



dr. Nadyah Haruna, M.Kes

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 25 Mei 2018
Penyusun,

Salmah

70400115056



HALAMAN PENGESAHAN KTI

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya tulis ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan *Post Natal Care* pada "Ny. R" dengan *Post Partum Blues* Tanggal 02-29 Juli 2018 di RSUD Syekh Yusuf Gowa" yang di susun oleh Salmah Nim: 70400115056 Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah dipaparkan dan dipertahankan dalam karya tulis ilmiah yang di selenggarakan pada hari senin, tanggal 06 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan dengan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan)

Sartala, 06 Agustus 2018 M
24 Dzulkaidah 1439 H

DEWAN PENGLIJI

Ketua	Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	dr. Nadiyah, M.Keb	(.....)
Penguji I	Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Penguji II	Nurcholis A. Gaffar, S.Ag., M.Hum	(.....)

Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assaalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang sederhana ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan *post natal care* pada Ny “R” dengan *post partum blues* di RSUD Syekh Yusuf”.

Terselesainya Tulisan Karya Ilmiah (KTI) ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tulisan Karya Ilmiah (KTI) ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan

4. Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb selaku pembimbing I yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan penuh keikhlasan
5. Ibu dr. Nadyah., M.Kes selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberi saran-saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu dr. Nurhira Abdul Kadir., MPH yang sempat menjadi pembimbing II saya yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberi saran-saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga beliau lancar dalam melanjutkan *studynya*.
7. Ibu Firdayanti., S.SiT., M.Keb selaku sekretaris Jurusan Kebidanan yang banyak membantu dalam pengurusan persuratan dan juga selaku penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Ibu Nurmiati., S.SiT., M.Keb yang sempat menjadi penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Bapak Dr. Nurcholis Gaffar., M.Hum selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan KTI ini.
10. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar

11. Direktur Puskesmas Somba Opu Gowa dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
12. Ibu Mardawati., S.ST., M.Kes selaku kepala ruangan nifas di RSUD Syekh Yusuf yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan KTI ini.
13. Orang tuaku tercinta yang tidak henti-hentinya selalu memberi do'a, materi, kasih sayang dan dukungan kepada saya. Tak lupa kepada saudaraku semua yang telah memberikan dukungan kepada saya.
14. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2015.

Meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin..Amin..Amin Yarobbal Alamin


Samata, Mei 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN KTI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang lingkup	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Perubahan Fisiologis dan Psikologis Masa Nifas	12
B. Tinjauan Khusus <i>Post Partum Blues</i>	22
C. <i>Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)</i>	37
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	42

BAB III STUDI KASUS.....	54
Langkah I. Identifikasi Dasar	62
Langkah II. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual	65
Langkah III. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial	67
Langkah IV. Tindakan Segera/ Kolaborasi	67
Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan	61
Langkah VI. Tindakan Asuhan Kebidanan.....	75
Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	79
Pendokumentasian.....	80
BAB IV PEMBAHASAN.....	107
Pembahasan.....	107
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	126
Daftar Pustaka	129
Lampiran	132



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran II : Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa
- Lampiran III : Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
- Lampiran IV : Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
- Lampiran V : Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Lampiran VI : Daftar riwayat hidup

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, JULI 2018

70400115056

Pembimbing I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar

Pembimbing II : Nadyah

“Manajemen Asuhan Kebidanan *Post Natal Care* pada Ny “R” dengan *Post Partum Blues* di RSUD Syech Yusuf Gowa Tahun 2018”

Post partum blues merupakan kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan, biasanya hanya muncul sementara waktu, yakni sekitar dua hari hingga dua minggu sejak kelahiran bayi. Peningkatan dukungan mental atau dukungan keluarga sangat diperlukan dalam mengatasi gangguan psikologis yang berhubungan dengan masa nifas.

Penelitian ini bertujuan agar para ibu dan suami lebih mempersiapkan kehamilannya baik dari segi materi dan psikis, serta mencegah masalah potensial yang bisa muncul akibat dari *post partum blues* baik pada ibu maupun bayinya.

Studi kasus yang dilakukan pada Ny “R” dengan *post partum blues* yaitu dengan melakukan komunikasi terapeutik, adaptasi menjadi ibu, mengajarkan ibu teknik relaksasi, mobilisasi dini, personal *hygiene*, makanan bergizi, mencari posisi yang nyaman, melakukan *bounding attachment*, dan mendengarkan Al-Qur’an agar hati tenang.

Dari hasil asuhan sebanyak 6 kali didapatkan bahwa Ny.”R” pada hari pertama dan kedua ibu mengalami *post partum blues*. Hari ketiga ibu mulai beradaptasi dan hari selanjutnya ibu sudah beradaptasi menjadi seorang ibu. Studi kasus dapat disimpulkan tidak didapatkan kesenjangan antara teori dengan yang didapatkan di lapangan.

Daftar Pustaka: 30 (2002-2017)

Kata Kunci: Masa Nifas, *Post Partum Blues*, 7 Langkah Varney

ABSTRACT
MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC WRITING, JULY 2018

Salmah, 70400115056

Supervisor I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar

Supervisor II : Nadyah Haruna

“Postpartum Obstetric Care Management on Mrs. “R” with Postpartum Blues from July 02-29, 2018 at Syech Yusuf Gowa Regional Public Hospital”

Postpartum blues is the sadness or moodiness after childbirth, mostly appears only temporarily about two days to two weeks after the birth of the baby. The family mental support is required in dealing with the psychological disorders associated with the childbirth.

The objectives of the study are to make the mother and husband preparing for her pregnancy both materially and psychologically, and to prevent the potential problems that can arise as a result of postpartum blues in both the mother and her baby.

The case study conducted on Mrs. "R" with postpartum blues is by conducting the therapeutic communication, mother's adaptation, teaching the mother relaxation techniques, early mobilization, personal hygiene, nutritious food, finding a comfortable position, doing a bounding attachment, and listening to the Qur'an so that the heart will be peaceful.

From the results of care for six times, it was identified that Mrs. "R" at the first and second day experienced the postpartum blues. The third day the mother began to adapt and the next day she had adapted to become a mother. The case study concluded that there was no gap between the theories and those gained in the field.

References : 30 (2002-2017)

Keywords : Postpartum Period, Postpartum Blues, 7 Steps of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Persalinan yang berlangsung lancar sangat membahagiakan bagi setiap ibu. Persalinan merupakan salah satu anugerah terindah dari Allah SWT yang diberikan kepada kaum wanita. Setelah menjalani masa kehamilan selama 9 bulan, bukan waktu yang singkat, tentunya banyak hal-hal yang dialami oleh seorang ibu baik itu perubahan fisik maupun perubahan psikologis sehingga membutuhkan adaptasi.

Perubahan *mood* seperti sering menangis, lekas marah, dan sering sedih atau cepat berubah menjadi senang, merasa khawatir akan kondisi kehamilannya kelak, dimulai dari takut keguguran, takut melahirkan, khawatir akan masa depan anaknya kelak, dan banyak hal lainnya (Walyani, 2015 : 8). Dari setiap 1000 wanita hamil, sekitar 17% wanita akan mengunjungi unit kejiwaan. Lima persen akan mengalami gangguan mood depresi yang ringan pada minggu pertama setelah melahirkan yaitu (*post partum blues*) dan 2 % akan berkembang menjadi psikosis pada masa nifas. Antara 10 sampai 15% akan berkembang menjadi depresi setelah melahirkan. *Post partum blues* terjadi pada sekitar 50% wanita dalam waktu 4-5 hari setelah melahirkan Hanretty (2014) dalam Nurafifah (2015).

Menurut WHO (2014) dalam Desfanita (2015) angka kejadian *post partum blues* di seluruh dunia cukup tinggi yakni 26-85%. Data tersebut menunjukkan 81 % angka kematian ibu (AKI) akibat komplikasi selama hamil dan bersalin, dan 25%

kasus *post partum blues*. Angka kejadian *post partum blues* di Indonesia berkisar antara 50-70% pada ibu *post partum* (Desfanita, 2015). *Post partum blues* dialami oleh ibu *post partum* yang bersifat sementara dan terjadi pada minggu pertama setelah kelahiran. *Post partum depression* dialami oleh 34% ibu *postpartum* dan 1% yang mengalami *postpartum* psikosis (Yodatama, 2015).

Salah satu penyebab terjadinya *post partum blues* yaitu pengalaman dalam persalinan. Pengalaman persalinan yang kurang menyenangkan dapat mempengaruhi perubahan psikologi setelah melahirkan. Data ibu nifas di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebanyak 614 orang dengan riwayat persalinan spontan yaitu bersalin normal spontan sebanyak 530 orang, bersalin dengan tindakan (vacuum, forcep, induksi) sebanyak 44 orang, bersalin secara SC (*Sectio Caesar*) sebanyak 40 orang. Meskipun persalinan sangat tinggi namun tidak menutup kemungkinan dari wanita pasca persalinan mengalami *post partum blues*. Pada tahun 2013 pada bulan Januari-Mei terdapat 1 kasus nifas dengan *post partum blues*. Beberapa faktor penyebab *post partum blues* diantaranya yaitu umur, paritas dan pengalaman persalinan (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2016).

Masa nifas mempengaruhi sukses dan lancarnya masa transisi menjadi orang tua. Sebagian wanita berhasil menyesuaikan diri dengan baik dan bersemangat mengasuh bayinya, tetapi sebagian lagi tidak mampu menyesuaikan diri dan mengalami gangguan psikologis. Gangguan psikologis yang dialami berupa sering marah, lelah, sedih, dan putus asa (Arfian, 2012 : 2). Hubungan ibu dan bayinya harus dibina segera setelah lahir. Kontak dini antara ibu, ayah dan bayinya disebut

bounding attachment melalui sentuhan, kontak mata dan aroma. *Bounding attachment* berfungsi membuat bayi dan orang tua saling mencintai dan memberikan keduanya pemenuhan emosional dan saling membutuhkan. *Bounding attachment* dapat dilakukan dengan pemberian ASI eksklusif, rawat gabung, kontak mata (*eye to eye contact*), suara (*voice*), aroma (*odor*), gaya bahasa (*entrainment*) dan sentuhan (*touch*). Ibu yang mengalami *post partum blues* tentunya tidak memiliki *bounding attachment* yang baik dengan bayinya (Nurjanah, 2013 : 41-42).

Ibu yang menderita *post partum blues* akan memiliki dampak pada bayinya, seperti berat badan bayi turun karena tidak diberi ASI pada sang ibu. Anak merupakan titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Sebagai orang tua hendaknya menjaga, memberi nutrisi yang baik pada sang anak serta mendidiknya dengan baik. Gangguan *mood postpartum* bukan persoalan sepele. Dampaknya bisa memporandakan kehidupan ibu, keluarganya, bayi dan anak-anak lainnya. Ibu akan mengalami kesulitan dalam mengasuh serta menjalin ikatan emosional yang memadai terhadap bayi maupun anaknya yang lain. Dampaknya, anak-anak mereka bisa mengalami gangguan emosional dan perilaku, keterlambatan berbahasa dan gangguan kognitif. Bagi ibu sendiri, dalam kondisi berat bisa memunculkan keinginan untuk mengakhiri penderitaan lewat jalan yang membahayakan diri maupun anaknya.

Perhatian terhadap masalah *post partum blues* di Indonesia masih kurang. Tidak sedikit orang menganggap bahwa *post partum blues* syndrome hanya dialami oleh wanita-wanita di luar Indonesia. Wanita Indonesia dianggap tidak mungkin

mengalami *post partum blues* syndrome karena masih tingginya sikap kekeluargaan untuk membantu kerabat yang baru melahirkan. Padahal hasil penelitian yang dilakukan di Jakarta oleh dr. Irawati Sp.Kj menunjukkan 25% dari 580 ibu yang menjadi respondennya mengalami *post partum blues* Rein (2012) dalam Pulungan (2017).

Uraian di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian studi kasus dengan judul manajemen asuhan kebidanan pada Ny."R" dengan *post partum blues* di RSUD Syekh Yusuf.

B. Ruang lingkup pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam karya tulis ini adalah dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan dapat memperoleh informasi dan pelayanan nyata tentang proses asuhan kebidanan pada klien yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Ny."R" dengan *post partum blues*.

C. Tujuan penulisan

1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakan manajemen asuhan kebidanan *postnatal care* pada Ny."R" dengan *post partum blues*.

2. Tujuan khusus

Melaksanakan pengkajian dan analisis data *post partum blues* pada Ny."R" di RSUD Syekh Yusuf.

- a. Dilakukannya pengkajian untuk menegakkan diagnosa dan masalah aktual pada kasus *post partum blues* pada Ny."R" di RSUD Labuang

- Baji.
- b. Dilakukannya pengkajian untuk menegakkan diagnosa dan masalah potensial pada kasus *post partum blues* pada Ny."R" di RSUD Syekh Yusuf.
 - c. Dilakukannya tindakan segera pada kasus *post partum blues* pada Ny."R" di RSUD Syekh Yusuf.
 - d. Direncanakannya tindakan asuhan kebidanan pada kasus *post partum blues* pada Ny."R" di RSUD Syekh Yusuf.
 - e. Dilaksanakannya tindakan asuhan Kebidanan pada kasus *postpartum blues* pada Ny."R" di RSUD Syekh Yusuf.
 - f. Dilakukannya evaluasi hasil tindakan asuhan kebidanan pada *post partum blues* pada Ny."R" di RSUD Labuang Baji.
 - g. Dilakukannya pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada kasus *post partum blues* pada Ny."R" di RSUD Syekh Yusuf.
 - h. Dilakukannya penelusuran mendalam terhadap literatur untuk mencari dan mendiskusikan kesenjangan antara teori dan fakta kasus di lapangan.
 - i. Didiskusikannya penerapan nilai-nilai ke-Islaman dalam manajemen asuhan kebidanan *post partum blues* pada Ny."R" di Rumah Sakit Syekh Yusuf

D. Manfaat penulisan

1. Manfaat Bagi Rumah Sakit

Dapat menjadi sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pengelolah program kesehatan di Rumah Sakit Syekh Yusuf dalam mencegah dan penanganan *post partum blues*.

2. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan

- a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan acuan bagi penulisan karya tulis ilmiah berikutnya.
- b. Pelaksanaan asuhan kebidanan ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang *post partum blues*.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang *post partum blues*.

4. Manfaat Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan *post partum blues*.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca tentang *post partum blues*.

E. Metode penulisan

Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu peneliti mempelajari berbagai literatur literatur yang relevan dengan *post partum blues* termasuk karya tulis yang ada, buku, *e-book*, dan jurnal yang ada.

2. Studi Kasus

Studi kasus yaitu peneliti melaksanakan metode pendekatan pemecahan masalah dalam kebidanan antara lain pengkajian, merumuskan diagnosa/masalah aktual dan potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan dan mengevaluasi asuhan kebidanan serta mendokumentasikan dengan *post partum blues*. Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan tehnik:

a. Anamnesa

Peneliti mengadakan tanya jawab dengan klien yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Peneliti akan bertanya tentang riwayat terkait pengalaman persalinan yang dialami atau pertanyaan lainnya yang relevan yang dapat memberikan informasi faktor apa yang menyebabkan ibu terkena *post partum blues*.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis yaitu inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Pemeriksaan dignostik lainnya juga dilakukan dengan menggunakan format pengkajian. Pemeriksaan *post partum blues* peneliti melihat dan mendeteksi apakah ada masalah pada fisik klien yang membuat sang ibu merasa kesakitan dan akhirnya trauma yang menyebabkan terjadinya *post partum blues*.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan, pengetahuan tentang kesehatan dan interaksi ibu dengan bayinya, apakah ibu ingin menyusui bayinya atau tidak.

Pengkajian kondisi emosional ibu juga akan dilakukan dengan menggunakan metode *Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)*. EPDS berupa kuisioner yang terdiri dari 10 pertanyaan mengenai bagaimana perasaan pasien dalam satu minggu terakhir. EPDS akan digunakan 2 minggu pasca melahirkan jika memang ibu masih memperlihatkan gejala *post partum blues* dan akan berlanjut menjadi depresi *postpartum*.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil

pemeriksaan penunjang lainnya. Studi dokumentasi tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Peneliti mengadakan tanya jawab dengan tenaga kesehatan yaitu bidan di RSUD Syekh Yusuf yang menangani langsung klien Ny."R" tersebut serta berdiskusi dengan dosen pembimbing karya tulis ilmiah.

F. Sistematika penelitian

Penelitian ini disusun dalam bentuk laporan sistematis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini akan dijelaskan dalam uraian berikut.

BAB I berisi tentang pendahuluan. BAB ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan. Dalam BAB ini, dirumuskan mengapa penting untuk mengkaji kasus *post partum blues* pada Ny."R" di RSUD Syekh Yusuf.

BAB II tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perubahan fisiologis dan psikologis ibu masa nifas, tinjauan khusus tentang *post partum blues*, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

BAB III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah Varney (2003) terhadap klien Ny."R" dengan masalah *post partum blues*. Ketujuh langkah Varney tersebut terdiri dari identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah

aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

BAB IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori mengenai *post partum blues* dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan pada Ny."R" di Rumah Sakit Syekh Yusuf dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu tersebut saat dalam masa nifas dengan *post partum blues*.

Pada BAB V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan terhadap Ny."R". Semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum perubahan fisiologis dan psikologis ibu masa nifas

1. Perubahan fisiologis

Perubahan fisik pada ibu pada saat menjalani masa nifas merupakan salah satu faktor yang membuat ibu cemas dan menyebabkan terjadinya *post partum blues*. Perubahan fisik yang dialami ibu yaitu rasa kram dan mules dibagian bawah perut akibat penciutan rahim (*involusio*), keluarnya sisa-sisa darah dari vagina (*lochea*), kelelahan karena proses melahirkan, pembentukan ASI sehingga payudara membesar dan perlukaan jalan lahir (Walyani, 2015: 3).

Setelah menjalani masa kehamilan dan persalinan yang membuat tubuh sang ibu akan kembali seperti pada saat sebelum hamil, ibu akan mengalami perubahan fisiologis. Perubahan- perubahan yang terjadi yaitu :

a. Sistem kardiovaskuler

Curah jantung, volume dan denyut jantung meningkat segera setelah melahirkan karena terhentinya aliran darah ke plasenta yang mengakibatkan beban jantung meningkat yang dapat diatasi dengan haemokonsentrasi sampai volume darah kembali normal, dan pembuluh darah kembali keukuran semula (Maritalia, 2012 : 26).

b. Sistem reproduksi

Perubahan fisiologi sistem reproduksi pada ibu masa nifas ada 5 yaitu :

1) Uterus

Uterus secara berangsur-angsur menjadi kecil (invulasi) sehingga akhirnya kembali seperti sebelum hamil. Perubahan uterus 1 minggu pada ibu pasca melahirkan tinggi fundus uterus ibu teraba pertengahan pusat simpisis dengan berat uterus 500 gram. Dua minggu *post partum* tinggi fundus uteri tidak teraba diatas simpisis dengan berat uterus 350 gram. Enam minggu *post partum* fundus uteri bertambah kecil dengan berat uterus 50 gram (Martalia, 2014 : 17).

2) *Lochea*

Cairan sekret yang berasal dari cavum uteri dan vagina pada masa nifas disebut *lochea*. Beberapa macam-macam *lochea* yaitu *Lochea rubra*. *Lochea* ini terjadi pada hari ke 1-3 setelah persalinaan, warna merah terangsampai dengan merah tua yang mengandung desidua. Cairan *rubra* ini berupa cairan yang bercampur darah dan sisa-sisa selaput ketuban, berbau amis.

Lochea sanguinolental, *Lochea* ini berwarna merah kuning berisi darah dan lendir karena pengaruh plasma darah, pengeluarannya pada hari ke 3-5 hari *post partum*. *Lochea serosaya* yaitu pengeluaran sekret berwarna merah muda sampai kecoklatan terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-9 pasca persalinaan, yang mengandung cairan serosa, jaringan

desidua, leukosit, dan eritrosit. *Lochea alba* muncul lebih dari hari ke-10 *post partum*. Warnanya lebih pucat, putih kekuningan, serta lebih banyak mengandung leukosit, selaput lendir serviks dan serabut jaringan mati. *Lochiotosis* adalah *lochea* yang sudah tidak lancar keluarannya. *Lochea* yang tetap berwarna merah setelah 2 minggu ada kemungkinan tertinggalnya sisa plasenta atau karena involusi kurang baik (Marmi, 2012 : 89).

3) Serviks

Uterus dan serviks mengalami involusi bersama-sama. Setelah persalinan, ostium eksterna dapat dimasuki oleh 2 hingga 3 jari tangan, setelah 6 minggu persalinan serviks menutup (Rukiyah, 2014 : 60).

4) Vulva dan vagina

Vulva dan vagina mengalami peregangan serta penekanan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali sementara labia menjadi lebih menonjol (Martalia, 2014 : 19).

5) Perineum

Setelah melahirkan, perineum menjadi kendur akibat tekanan kepala bayi yang bergerak maju. Pada hari kelima pasca melahirkan perineum sudah mendapatkan kembali sebagian besar tonusnya sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum melahirkan Walyani (2015 : 66).

c. Payudara

Kadar prolaktin yang disekresi oleh hipofisis anterior meningkat secara stabil selama kehamilan, namun hormone plasenta menghambat produksi ASI. Setelah kelahiran plasenta, konsentrasi estrogen dan progesterone menurun, prolaktin dilepaskan dan produksi ASI dimulai. Pelepasan oksitosin dari kelenjar hipofisis posterior distimulasi oleh hisapan bayi. ASI yang pertama keluar pada awal nifas disebut kolostrum. Payudara ibu menjadi besar dan keras sebagai tanda mulainya laktasi Walyani (2015 : 69).

d. Sistem perkemihan

Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama. Ibu masa nifas terkadang takut untuk buang air kecil karena takut luka bekas jahitannya terlepas. Urine dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan (Rukiyah, 2014 : 65).

e. Sistem gastrointestinal

Faak usus dibutuhkan 3-4 hari untuk kembali normal. Walaupun kadar progesteron menurun setelah melahirkan, namun asupan makanan juga mengalami penurunan selama dua hari, gerak tubuh berkurang dan usus bagian bawah jika sebelum melahirkan diberikan edema. Rasa sakit di daerah perineum dapat menghalangi keinginan ke belakang (Rukiyah, 2014 : 63).

f. Sistem integumen

Kloasma yang biasa muncul pada masa hamil biasanya menghilang pada saat kehamilan berakhir. *Linea nigra* dan hiperpigmentasi di *aerola mammae* tidak menghilang seluruhnya setelah bayi lahir. Pigmentasi di daerah tersebut mungkin menetap pada beberapa ibu (Roito, 2013 : 73).

2. Adaptasi psikologis ibu masa nifas

Wanita masa nifas akan mengalami perubahan psikologis yang nyata sehingga memerlukan adaptasi. Sering menangis, lekas marah, dan sering sedih merupakan manifestasi dari emosi yang labil. Proses adaptasi psikologis sudah terjadi selama kehamilan, menjelang proses kelahiran maupun setelah persalinan. Masa nifas merupakan masa yang sangat rentan terjadinya perubahan psikologis pada ibu dimana seorang ibu memerlukan adaptasi. Dorongan dan perhatian dari keluarga dan suami merupakan dukungan positif untuk ibu. Negara maju maupun negara berkembang yang menjadi perhatian khusus bayi para ibu dan keluarga hanyalah tertuju pada

masa kehamilan dan persalinan, sementara keadaan yang sebenarnya merupakan kebalikannya, sehingga resiko kematian dan kematian ibu dan bayi lebih sering terjadi pada masa pasca persalinan (Prawirohardjo, 2014 :84). Fase-fase yang akan dialami ibu pada masa nifas yaitu fase *taking in*, fase *taking hold*, dan fase *letting go* (Rubin dalam Nugroho, 2014 :115).

a. *Fase taking In*

Fase ini merupakan periode ketergantungan, yang berlangsung dari hari pertama sampai hari ke dua setelah melahirkan. Pada fase ini ibu lebih cenderung memperhatikan dirinya dan pasif terhadap lingkungannya. Hal tersebut dikarenakan ketidaknyamanan yang dirasakan ibu seperti luka jahitan, kelelahan, kurang tidur dan rasa mules. Hal yang perlu diperhatikan pada fase ini yaitu banyak istirahat, asupan nutrisi yang cukup dan komunikasi yang baik (Nugroho, 2014 : 116). Gangguan psikologis yang mungkin dirasakan oleh ibu pada fase *taking in* menurut Walyani (2015 : 79-80) ada 4 yaitu :

- 1) Kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan tentang bayinya misal jenis kelamin tertentu, warna kulit, jenis kulit, jenis rambut dan lainnya.
- 2) Rasa bersalah karena belum menyusui bayinya
- 3) Ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan fisik yang dialami ibu misal rasa mules karena rahim berkontraksi untuk kembali pada keadaan semula, payudara bengkak, dan nyeri luka jahitan.

- 4) Suami atau keluarga yang mengkritik ibu tentang cara merawat bayi dan cenderung melihat saja tanpa membantu. Ibu akan merasa tidak nyaman karena hal tersebut bukan hanya tanggung jawab ibu semata.

b. Fase taking hold

Fase ini terjadi 3-10 hari pasca melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir tidak dapat merawat bayinya, ibu berupaya menguasai keterampilan perawatan bayinya. Perasaan ibu yang sensitif sehingga mudah merasa tersinggung. Ibu memerlukan dukungan dari keluarga maupun suami pada fase ini, karena pada fase ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya sehingga tumbuh rasa percaya diri (Nurjanah, 2013 : 76).

c. Fase letting go

Masa ini terjadi apabila ibu telah pulang ke rumah dan fase ini melibatkan orang tua. Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu mengambil langsung tanggung jawab dalam merawat bayinya, dia harus menyesuaikan diri dengan tuntutan ketergantungan bayinya dan interaksi sosial. Keinginan untuk merawat diri dan bayinya meningkat pada fase ini. Secara psikologis, seorang wanita yang baru saja melahirkan akan mengalami tekanan psikis (Martalia, 2014 : 32).

Banyak wanita yang sepiantas merasa bahagia dengan kelahiran bayinya, namun sejalan dengan itu, akan muncul gangguan suasana hati,

perasaan sedih dan tekanan yang dialami oleh seorang wanita setelah melahirkan yang berlangsung pada minggu pertama, terutama pada hari ketiga hingga kelima. Gangguan psikologis tersebut disebut dengan *post partum blues* (Hasni, 2012 dalam Fitriana 2016).

3. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas

Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas sangatlah berpengaruh pada kondisi psikologi dan fisiologi ibu pada masa nifas. Beberapa peran dan tanggungjawab bidan dalam masa nifas yaitu memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas, bidan sebagai promotor hubungan ibu dan bayi serta keluarga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya sampai usia 6 bulan secara *on-demand*, mendeteksi komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dan apakah hal tersebut butuh penanganan segera atau rujuk, membuat kebijakan, perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan administrasi (Rini, 2016 : 4-6).

Bidan dalam masa nifas juga mempunyai fungsi memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan gizi yang aman, melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah

komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas dan memberikan asuhan secara professional.

4. Program Nasional dan kebijakan teknis pada masa nifas

Kunjungan dalam masa nifas bertujuan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir dan untuk mencegah, mendeteksi serta menangani masalah. Kunjungan pada masa nifas memiliki keuntungan yang sangat jelas karena membuat bidan dapat melihat dan berinteraksi dengan anggota keluarga klien. Bidan mampu mengkaji kecukupan sumber yang ada di rumah. Semakin meningkatnya angka kematian ibu di Indonesia pada saat masa nifas (sekitar 60%) mencetuskan pembuatan program dan kebijakan teknis yang lebih baru mengenai jadwal kunjungan pada masa nifas, dilakukan untuk menilai keadaan ibu dan bayi baru lahir untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi. Frekuensi kunjungan pada masa nifas menurut (Walyani 2015 : 129-131) adalah :

a. Kunjungan I (6-8 jam setelah persalinan)

Tujuan pada kunjungan pertama pada masa nifas ini adalah untuk mencegah masa nifas karena atonia uteri, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga, bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. Pada kunjungan ini juga bidan mendukung ASI eksklusif, membina hubungan antara ibu dan bayi dengan

dilakukannya rawat gabung, menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah terjadinya hipotermi.

b. Kunjungan II (6 hari setelah persalinan)

Kunjungan kedua pada masa nifas bertujuan untuk memastikan involusio uterus berjalan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tidak ada perdarahan abnormal atau tidak ada bau. Kunjungan 6 hari setelah persalinan ini juga bidan perlu menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal serta memastikan ibu menyusui bayinya dengan benar, memastikan ibu mendapatkan makanan, cairan dan istirahat yang cukup serta memberi konseling cara merawat bayi dan tali pusat.

c. Kunjungan III (2 minggu setelah persalinan)

Kunjungan 2 minggu setelah persalinan sama dengan kunjungan 6 hari setelah persalinan, bidan tetap memperhatikan involusi uterus, cara ibu menyusui, nutrisi dan istirahat ibu cukup dan juga memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi agar tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari seperti mengganti popok bayi ketika basah, dan mengganti pakaian bayi ketika lembab.

d. Kunjungan IV (6 minggu setelah persalinan)

Kunjungan keempat pada masa nifas bertujuan untuk menanyakan pada ibu penyulit yang ia dan bayinya alami sertamemberikan konseling tentang keluarga berencana (KB). Jenis alat kontrasepsi apa yang ibu ingin gunakan apakah hormonal atau nonhormonal. Kontrasepsi berasal dari dua kata yaitu kontra mencegah/melawan dan konsepsi yaitu pertemuan antara

sel telur matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. jadi, yang dimaksud dengan kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen (Firdayanti, 2012).

Tabel 2.1 Kunjungan masa nifas

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6-8 jam setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah pendarahan karena atonia uteri b. Mendeteksi dan merawat penyebab lain pendarahan, rujuk bila pendarahan berlanjut. c. Memberikan konseling pada ibu dan salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah pendarahan masa nifas karena atonia uteri. d. Pemberian ASI awal. e. Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. f. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. g. Jika petugas kesehatan yang menolong persalinan ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama setelah kelahiran sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil.
2	6 hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilicus, tidak ada pendarahan abnormal, tidak ada bau. b. Menilai adanya tanda-tanda infeksi, demam, infeksi dan perdarahan abnormal. c. Memastikan ibu mendapatkan cukup makan, cairan dan istirahat. d. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi dan cara merawat tali pusat, serta menjaga
3	2 minggu setelah persalinan	Sama dengan atas (6 hari setelah persalinan).
4	6 minggu setelah persalinan	Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau bayi alami dan memberikan konseling KB secara dini.

Sumber : Pitriani, 2014 : 12-13

B. Tinjauan khusus *post partum blues*

1. Definisi

Post partum blues adalah suatu sindroma gangguan afek ringan yang sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan dan memuncak pada hari ke tiga sampai kelima dan menyerang dalam rentang waktu 14 hari terhitung setelah persalinan (Rini, 2016 : 92). Sedangkan menurut (Irawati, 2014) *Post partum blues* ialah keadaan transien dari peningkatan reaktifitas emosional yang dialami oleh separuh dari wanita dalam jangka waktu satu minggu pasca persalinan. Gejala klinis jelas terlihat dari hari ke 3 hingga hari ke 5, kemudian menghilang dalam beberapa jam hingga beberapa hari kemudian. *Post partum blues* umumnya terjadi 50% pada ibu baru (Rahayu, 2017). Periode *post partum* menyebabkan *stress* emosional terhadap ibu baru, bahkan lebih menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang hebat. Angka kejadian *post partum blues* di Asia cukup tinggi dan bervariasi antara 26-85%, sedangkan di Indonesia angka kejadian *post partum blues* antara 50-70% dari wanita pasca persalinan (Susanti, 2017).

Menurut Bobak (dalam Fitriana 2015) di Indonesia kejadian *post partum blues* yaitu 50 – 70 % dan hal ini dapat berlanjut menjadi depresi postpartum dengan jumlah bervariasi dari 5% hingga lebih dari 25% setelah ibu melahirkan. Data dari BKKBN Provinsi Aceh (2012) dalam Fitriana (2015) menunjukkan bahwa 7 dari 10 ibu yang melahirkan di Provinsi tersebut mengalami depresi berat setelah melahirkan. Gejala depresi yang ditunjukkan

seperti susah tidur dan tidak nafsu makan merupakan keluhan yang paling sering dirasakan para ibu pasca melahirkan.

2. Faktor penyebab *post partum blues*

Faktor penyebab *post partum blues* dapat dilihat dari beberapa faktor, baik karena pengalaman persalinan, dukungan suami sampai dengan usia ibu saat melahirkan. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya *post partum blues*, yaitu :

a. Faktor hormonal

Faktor hormonal berupa perubahan kadar estrogen, progesterone, proklatine, serta estriol terlalu rendah. Kadar estrogen turun secara tajam setelah melahirkan dan ternyata estrogen memiliki efek supresi aktivitas non adrenalin maupun serotonin yang *berperan* dalam suasana hati dan kejadian depresi (Arfian, 2012 : 3)

b. Ketidaknyamanan fisik

Ketidaknyamanan fisik yang dialami sehingga menimbulkan perasaan emosi pada wanita pasca melahirkan, seperti rasa sakit akibat luka jahit, pengalaman persalinan yang kurang menyenangkan, atau bengkak pada payudara. Ibu dengan riwayat operasi *caesar* juga memiliki resiko terkena *post partum blues* karena proses penyembuhannya lebih lama sehingga membuat ibu tidak nyaman (Irawati, 2014). Data yang diperoleh dari Azizah (2016) pada tanggal 1sampai 28 Februari 2013 didapatkan hasil dari 39 ibu bersalin post SC, didapatkan 55% ibu mengalami *post partum*

blues. *Post partum blues* seharusnya segera ditangani karena akan berujung pada gangguan mental yang memotivasi sang ibu untuk menyakiti dirinya sendiri jika tidak segera ditangani.

Menurut penelitian Rahayuningsih (2013) akibat dari laserasi perineum yang terjadi pada ibu post partum adalah adanya nyeri perineum sebanyak 70,9%. Dampak nyeri perineum tersebut adalah stress, traumatik, takut terluka, tidak nafsu makan, sulit tidur dan depresi, Sehingga ibu post partum mengalami keterlambatan mobilisasi, gangguan rasa nyaman pada saat duduk, berdiri, berjalan dan bergerak, sehingga berdampak pada gangguan istirahat ibu *post partum* dan keterlambatan kontak awal antara ibu dan bayinya (Utami, 2015: 31). Salah satu masalah yang terjadi pada ibu yang membuat ibu trauma untuk hamil lagi yaitu rest plasenta. Rest plasenta yaitu suatu bagian dari plasenta, satu atau lebih lobus tertinggal dalam uterus (Nadyah, 2013).

c. Melahirkan dengan usia terlalu muda dan terlalu tua

Usia terlalu muda dan terlalu tua berarti ibu yang melahirkan dengan usia <20 tahun dan >35 tahun. Penelitian ini dilakukan oleh Yuliani (2013) menyatakan bahwa kejadian *post partum blues* lebih banyak dialami oleh wanita yang berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun (81,8%). Kehamilan dan persalinan pada remaja menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya *post partum blues*. Indonesia termasuk Negara dengan prosentase pernikahan usia muda tertinggi di dunia (ranking 37) dan tertinggi kedua di

ASEAN setelah Kamboja. Penyebab lain *post partum blues* selain usia persalinan dibawah usia 20 tahun adalah kesiapan remaja dalam perubahan perannya sebagai ibu, antara lain: kesiapan fisik, mental, finansial dan sosial (Chasanah, 2016).

d. Dukungan suami dan keluarga

Dukungan suami dan keluarga sangatlah penting bagi sang ibu apalagi pada saat proses persalinan. Dampingan yang dilakukan oleh suami dan keluarga pada saat ibu melahirkan merupakan hal yang penting karena ibu merasa aman dan juga merupakan salah satu aspek sayang ibu. Survey awal pada bulan Desember 2013 (Hidayah, 2017) di BPM Yayuk Kalbariyanto di Desa Mlati Lor peneliti terhadap 10 ibu postpartum yang terdiri dari 7 multipara dan 3 primipara didapatkan hasil 6 orang di tunggu suami dan keluarga saat proses persalinan, sedangkan 4 diantaranya hanya ditunggu keluarga tanpa suami dengan alasan suaminya tidak ada di rumah (kerja). Ibu yang ditunggu suami terlihat bahagia setelah melahirkan, sedangkan ibu yang melahirkan tanpa suaminya (2 orang) tetap terlihat bahagia sedangkan dua orang lagi terlihat kurang bahagia karena tidak ada suami disampingnya (Hidayah, 2016).

Dukungan suami adalah faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya *post partum blues*. Dukungan suami sangat diperlukan, karena ibu tidak akan merasa beban dengan apa yang terjadi pada dirinya, baik dukungan saat hamil, saat bersalin maupun masa nifas.

Perhatian suami, komunikasi yang dijalin, sikap dan perilaku suami dalam membantu ibu baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas akan mempengaruhi kondisi ibu (Desfanita, 2015).

Pada minggu-minggu awal setelah persalinan kurang lebih 1 tahun ibu *post partum* cenderung akan mengalami perasaan-perasaan yang tidak pada umumnya seperti merasa sedih, tidak mampu mengasuh dirinya sendiri dan bayinya. hal tersebut terjadi karena kekecewaan emosional yang mengikuti kegiatan bercampur rasa takut yang dialami kebanyakan wanita selama hamil dan melahirkan, rasa nyeri pada awal masa nifas, kelelahan akibat kurang tidur selama persalinan dan telah melahirkan kebanyakan di rumah sakit, kecemasan akan kemampuannya untuk merawat bayinya setelah meninggalkan rumah sakit, ketakutan akan tidak menjadi menarik lagi (Nugroho,2014).

e. Persiapan kehamilan dan menjadi ibu

Persiapan kehamilan dan menjadi ibu merupakan salah satu penyebab terjadinya *post partum blues*. Kehamilan yang tidak diharapkan seperti hamil diluar nikah, kehamilan akibat perkosaan, kehamilan yang tidak direncanakan sehingga wanita tersebut belum siap menjadi ibu. Beberapa ibu mampu beradaptasi setelah melahirkan, tetapi banyak ibu ibu yang tidak mampu beradaptasi sehingga muncul perasaan sedih, tidak ingin mengurus bayinya. Sebagian wanita lain menerima kehamilan sebagai kehendak alam dan bahkan pada beberapa wanita termasuk remaja, kehamilan merupakan

akibat percobaan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi. Awalnya mereka terkejut ketika tahu dirinya hamil, namun seiring waktu mereka akan menerima kehadiran seorang anak (Rahayu,2017).

f. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh pada ibu yang terkena *post partum blues*. Ekonomi yang kurang menyebabkan ibu merasa khawatir tentang masa depan anaknya sehingga ibu mengalami tekanan yang mengakibatkan terjadinya *post partum blues*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti(2016) Dari 34 responden yang mengalami baby blues syndrome sebanyak 5 responden (14,71 %) mempunyai pendapatan Rp 500.000–Rp 1.000.000 perbulan, sebanyak 15 responden (44,12%) mempunyai pendapatan Rp1.000.000 – Rp 2.000.000 perbulan sedangkan sebanyak 14 responden (41,17 %) mempunyai pendapatan >Rp 2.000.000 perbulan.

g. Keadaan bayi saat lahir

Keadaan bayi saat lahir juga berpengaruh pada ibu yang terkena *post partum blues*.Keadaan bayi yang cacat atau jenis kelamin yang tidak diinginkan membuat ibu sulit menerima keadaan bayinya.Menurut penelitian Susanti (2017) dari 31 ibu yang melahirkan dan memenuhi kriteria, terdapat 17 ibu (54,48%) mengalami *post partum blues* yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, pengalaman kehamilan dan persalinan sebesar 38,71%, dukungan sosial 19,53%, keadaan bayi saat lahir 16,13%.

Islam juga menganjurkan kita untuk bersabar atas ujian diberikan kepada kita salah satunya yaitu anak. Anak yang Allah berikan kepada kita adalah titipan yang harus dijaga, dididik, dan dijaga agar tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Ibu hendaknya bersabar dan menerima apapun kondisi dan bayinya. Allah SWT telah menyebutkan bahwa anak merupakan cobaan bagi orang tuanya hal tersebut disebutkan dalam Q.S At-Taaghabun: 15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) di sisi Allah-lah pahala yang besar (Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 2013 : 557).

Ayat 15 di atas tidak lagi menyebutkan pasangan sebagai ujian, tetapi menyebut harta dan anak-anak. Karena ayat di atas mencukupkan penyebutan salah satu dari yang telah disebut pada ayat yang lalu untuk mewakili yang lain. Anak terpilih untuk mewakili pasangan karena ujian melalui anak-anak lebih besar dari daripada ujian melalui pasangan. Karena anak-anak lebih berani menuntut dan lebih kuat merayu daripada pasangan. Bisa juga dikatakan bahwa ujian melalui anak lebih besar dibandingkan pasangan (Shihab, 2002 : 119).

Kata fitnah diterjemahkan dengan ujian. Thahit Ibn Asyur dalam arti keguncangan hati serta kebingungannya akibat adanya situasi tidak sejalan dengan siapa menghadapi situasi ini. Karena itu, ulama ini menambahkan makna sabab (penyebab) sebelum kata fitnah, yakni harta dan anak-anak, dapat mengguncangkan hati seseorang. Anak-anak merupakan cobaan bagi orang tuanya hendaknya orang tua sabar dalam merawat bayinya. Anak-anak merupakan ujian bagi orang tuanya. Ibu dilatih untuk bersabar merawat bayinya (Shihab, 2002 : 119). Sangat penting bagi orang tua untuk kembali menyadari hakikat anak sebagai amanah yang menjadi tanggung jawabnya serta tidak lupa untuk selalu memohon kepada Allah agar dianugerahi keturunan yang baik.

h. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kecerdasan emosional, ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan memiliki cara berfikir yang lebih rasional, dan semakin mudah untuk menerima informasi. Ibu yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kehamilan dan persalinan umumnya akan sulit dalam menyesuaikan diri terhadap peran dan aktivitas barunya sehingga memungkinkan terjadinya gangguan psikologis seperti *post partum blues*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2013) dalam Desfanita (2013) menyatakan bahwa pendidikan terbanyak yang mengalami *post partum blues* adalah SD-SMP yaitu 12 responden (54,5%) dari 15 responden (Desfanita, 2015).

3. Tanda dan gejala *post partum blues*

Post partum blues memiliki tanda gejala seperti sedih berlebihan, menangis tiba-tiba, mudah tersinggung, sulit tidur, nyeri kepala, dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Persiapan kehamilan, persalinan sampai dengan masa nifas yang baik, serta dukungan suami yang tinggi memiliki kecenderungan untuk tidak terjadi *post partum blues* (Desfanita, 2015). *Post partum blues* biasanya terjadi pada kehamilan yang tidak diinginkan. Beberapa literatur dan penelitian menunjukkan bahwa depresi saat kehamilan dapat berkembang menjadi depresi pasca persalinan. Wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan akan mengalami peningkatan depresi dan *stress* yang akan berlanjut pada saat setelah melahirkan (Susanti, 2013 : 26).

Selain dari gejala yang telah diuraikan Pitriani juga mengatakan bahwa gejala *post partum blues* terbagi atas 2, yaitu gejala umum dan gejala medis.

a. Gejala umum

Gejala umum pada ibu *post partum blues* menurut Fitriani (2014) terbagi atas 6, yaitu :

- 1) Perasaan negatif terhadap bayi yang dilahirkannya (termasuk adanya keinginan untuk membunuh bayi tersebut)
- 2) Perubahan drastis berat badan

- 3) Adanya perasaan untuk membenci diri sendiri, perasaan bersalah dan merasa dirinya tidak berguna bagi orang lain
- 4) Sama sekali tidak bias berkonsentrasi walaupun dengan masalah kecil
- 5) Mudah marah, mudah terhasut, kegelisahan secara mendalam dan kehilangan harapan
- 6) Merencanakan dan percobaan bunuh diri
- 7) Sering terganggu dalam waktu istirahat dan insomnia berat
- 8) Muncul perasaan malas untuk mengurus bayinya (Pitriani, 2014 : 82).

b. Gejala medis

Gejala *post partum blues* sampai saat ini belum ada tes khusus yang dapat mengdiagnosis gejala langsung *post partum blues*. Secara medis dokter menyimpulkan beberapa sistem yang dapat yang tampak dapat disimpulkan sebagai depresi *post partum blues* bila memenuhi gejala yang ada. Kekurangan hormon tiroid pada individu yang mengalami kelelahan yang luar biasa (*fatigue*) ditemukan juga pada ibu yang mengalami *post partum blues* jumlah kadar tiroid yang sangat rendah (Pitriani, 2014 : 93).

4. Penanganan *post partum blues*

a. Pendekatan spiritual

Islam memandang anak adalah titipan yang harus dijaga oleh orang tua sebaik mungkin. Terkadang ada orang tua yang enggan mengurus anaknya bahkan tidak memberikan nafkah. *Post partum blues* merupakan salah satu masalah yang berdampak buruk bagi bayi, sehingga ibu

memerlukan dukungan psikologis dan meningkatkan jiwa spiritual terhadap Allah SWT.

Berdasarkan hasil penelitian Azizah (2016), terdapat perbedaan antara kelompok ibu yang diberikan terapi Al-Quran dengan kelompok yang tidak diberikan terapi Al-Quran. Kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan terapi mendengar Al-Qur'an hasil yang didapat 1 orang (6,7%) tidak mengalami *post partum blues*, 9 orang (60%) mengalami *post partum blues* ringan, 4 orang (26,7%) mengalami *post partum blues* sedang, dan 1 orang lainnya (6,7%) dari *post partum blues* berat.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa terapi mendengarkan Al-Qur'an sangat membantu ibu nifas dalam mencegah konstruksi *post partum blues*. Salah satu diantara sekian banyak mukjizat Al-Qur'an yang sudah terbukti sejak diturunkannya hingga saat ini adalah bisa menjadi penyembuh, termasuk penyembuh hati. Kemukjizatan Al-Qur'an ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Isra': 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Dan Kami turunkan dari Al-Qur`an suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian (Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 2013: 315).

Obat yang dimaksud dalam ayat ini meliputi obat atas segala penyakit, baik ruhani maupun jasmani dengan spesifikasi tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah di dalam ayat ini dipahami sebagai bantuan dari Allah, sehingga ketidakberdayaan dalam bentuk apa pun tertanggulangi. Rahmat Allah yang dilimpahkan kepada umat Islam adalah kebahagiaan hidup sebagai akibat dari ridha-Nya, termasuk di dalamnya kehidupan di akherat kelak. Karena itu jika Al-Quran dipahami sebagai rahmat bagi umat Islam, maka maknanya adalah limpahan karunia berupa kebajikan dan keberkatan yang disediakan oleh Allah bagi mereka (umat Islam) yang memhami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Allah dalam al-Quran (Shihab, 2002 : 110).

Berdasarkan dari penelitian diatas dan ayat Al-Qur`an yang menunjukkan bahwa Al-Qur`an adalah obat dari penyakit hati, maka salah

satu penanganan *post partum blues* yaitu menganjurkan ibu untuk membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an agar suasana hati ibu menjadi tenang. Ada beberapa ayat yang dapat didengar oleh ibu yang membuat hati tenang yaitu surah Qs al-Zalzalah: 7-8, Qs. Hud: 119, Qs. Al-Fajr:14, Qs. Al-A'la:17, dan Qs. Al-Baqarah: 261 dan195. Qori yang disarankan pada ibu yaitu Syaikh Mansur Al- Salmi.

Selain mendengarkan ayat suci Al-Qur'an agar hati ibu menjadi tenang pada kasus *post partum blues* ibu juga di anjurkan untuk selalu bermunajah kepada Allah SWT dimana terdapat dalam Qs. Surah Al-Ra'ad:28 yang artinya (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.

b. Pendekatan medis

Menurut Marni (2014) dalam Pratama (2016) terdapat 3 penanganan *post partum blues* yaitu :

1. Komunikasi terapeutik

komunikasi terapeutik bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara bidan dengan pasien dalam rangka dalam rangka kesembuhan klien dengan cara mendorong pasien mampu meredakan segala ketegangan emosinya dan dapat memahami dirinya sendiri.

2. Peningkatan *support* mental

Peningkatan suport mental dapat dilakukan oleh keluarga pasiendiantaranya:

- a) Meminta suami untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu mengurus bayinya dan menyiapkan susu
 - b) Memanggil nenek atau keluarga bayi agar bisa menemani ibu dalam menghadapi kesibukan merawat bayi
 - c) Suami lebih perhatian terhadap istri dan permasalahan yang dihadapi istrinya
 - d) Menyiapkan mental dalam menghadapi kelahiran anaknya
 - e) Suami menggantikan peran istri ketika istri kelelahan dan memperbanyak dukungan dan menemani istri dalam mengurus anaknya
 - f) Ibu dianjurkan sering berkumpul dengan teman-teman terdekat atau keluarga
3. Dilakukan pada diri klien sendiri

Penanganan *post partum blues* juga dapat dilakukan pada diri klien itu sendiri yaitu dengan cara anjurkan ibu belajar tenang dengan menarik nafas panjang, tidur ketika bayi tidur, berolahraga ringan, ikhlas dan tulus dengan peran baru sebagai ibu. Bicarakan rasa cemas dan komunikasikan masalah yang ada, bersifat fleksibel dan bergabung dengan kelompok-kelompok ibu baru. Pitriani (2014: 83-84) mengatakan bahwa terdapat 7 cara menangani *post partum blues* yaitu :

- a) Komunikasikan segala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan
- b) Bicarakan rasa cemas yang dialami dan belajar tenang dengan menarik nafas dan meditasi
- c) Bersikap tulus dan ikhlas dalam menerima aktivitas dan tugas baru pasca melahirkan
- d) Bersifat fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi atau rumah tangga
- e) Dukungan tenaga kesehatan, dukungan suami, keluarga, teman, dan sesama ibu.
- f) Memberikan motivasi pada ibu.

Terdapat 2 cara memberi motivasi, yang pertama yaitu motivasi langsung (*direct motivation*) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu yang sifatnya khusus seperti pujian. Motivasi yang kedua yaitu motivasi tidak langsung (*indirect motivation*) yaitu motivasi yang diberikan hanya fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah sang ibu dalam merawat sang bayi, seperti ruangan yang bersih (Donsu, 2017: 57).

C. *Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)*

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) adalah alat yang dirancang khusus untuk menyaring penyimpangan suasana hati ibu (Intan, 2017). *EPDS* dikembangkan pada tahun 1987. *EPDS* terdiri dari 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh ibu sendiri yang dapat diselesaikan kurang dari 5 menit. *EPDS* berupa kuesioner baku untuk mengukur seorang ibu nifas mengalami depresi *post partum* atau tidak. *EPDS* dapat digunakan pada 2 minggu pasca melahirkan, namun bila hasilnya meragukan dapat dilakukan pengisiannya 2 minggu kedepan (Susanti, 2017). *EPDS* yang dilakukan pada minggu pertama pada wanita yang tidak menunjukkan gejala depresi dapat memprediksi kemungkinan terjadinya depresi pasca persalinan pada minggu ke 4 dan 8. Menurut Susanti (2017) jika *post partum blues* tidak segera ditangani dengan baik akan mengakibatkan keadaan gangguan mental yang lebih parah lagi atau biasa disebut depresi *post partum* yang salah satu tanda gejalanya adalah keinginan untuk menyakiti bayi atau dirinya sendiri.

Saat ini di Indonesia, wanita dengan depresi *post partum* belum dilaporkan secara pasti insidensinya. Biasanya penderita baru akan dikenali bila kondisinya sudah mengalami depresi berat (*post partum psychosis*). Pentingnya petugas kesehatan untuk mengkaji kondisi psikologis ibu masa nifas dan menangani kasus *post partum blues* agar tidak berlanjut kepada depresi *post partum*. Berikut 10 pertanyaan yang akan ditanyakan pada ibu melalui *Edinburgh*

Postnatal Care (EPDS) Cox dkk (1987) terjemahan oleh Pusat Bahasa UIN Alauddin Makassar (2018).

**THE EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE
(INDONESIAN –TRANSLATION)**


Tanggal Pemeriksaan :
 Nama :
 Umur :
 No. RM :
 Status Perkawinan :
 Jumlah anak :
 Pekerjaan :
 Penghasilan :
 Pendidikan terakhir :

Instruksi :

Setelah anda melahirkan bayi, kami ingin mengetahui bagaimana perasaan anda selama 7 hari ini. Di bawah ini ada sebuah contoh pertanyaan yang dilengkapi dengan jawabannya. Saya merasa bahagia :

- a. Ya, hampir setiap waktu
- b. Ya, kadang-kadang
- c. Tidak terlalu sering
- d. Tidak, tidak sama sekali

Jika ibu menjawab *point b*, jawaban ini berarti : Saya kadang-kadang merasa bahagia. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah dengan cara yang sama. Selama 7 hari belakangan ini :

1. Saya dapat tertawa dan melihat sisi yang menyenangkan dari suatu hal :
 - a. Sebanyak-banyaknya
 - b. Sekarang ini tidak terlalu banyak
 - c. Sedikit
 - d. Tidak sama sekali
 2. Saya gembira menghadapi segala sesuatu
 - a. Sebanyak-banyaknya
 - b. Berkurang sedikit dari biasanya
 - c. Sangat kurang dari biasanya
 - d. Hampir tidak pernah
 3. Saya menyalahkan diri sendiri secara tidak semestinya bila keadaan menjadi buruk *:
 - a. Ya, hampir selalu
 - b. Ya, kadang-kadang
 - c. Tidak terlalu sering
 - d. Tidak ,tidak pernah
- 

4. Saya merasa khawatir atau cemas tanpa alasan yang jelas.
- Tidak, tidak sama sekali
 - Hampir tidak pernah
 - Ya, kadang-kadang
 - Ya, sangat sering
5. Saya merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas* :
- Ya, cukup sering
 - Ya, kadang-kadang
 - Tidak, tidak banyak
 - Tidak sama sekali
6. Segala sesuatu terasa membebani saya* :
- Ya, hampir selalu saya tidak bisa mengatasinya
 - Ya, kadang-kadang saya tidak bisa mengatasinya sebaik biasanya
 - Tidak, hampir selalu saya bisa mengatasinya dengan baik
 - Tidak, saya bisa mengatasinya dengan baik seperti biasa
7. Saya merasa tidak bahagia hingga saya merasa sulit untuk tidur * :
- Ya, hampir setiap waktu
 - Ya, kadang-kadang
 - Tidak terlalu sering
 - Tidak sama sekali

8. Saya merasa sedih dan jengkel tidak menentu * :

- a. Ya, hampir setiap waktu
- b. Ya, kadang-kadang
- c. Tidak, tidak banyak
- d. Tidak sama sekali

9. Saya merasa sangat tidak bahagia hingga saya menangis * :

- a. Ya, hampir setiap waktu
- b. Ya, cukup sering
- c. Tidak begitu sering
- d. Tidak sama sekali

10. Pikiran untuk melukai diri sendiri telah terjadi pada saya * :

- a. Ya, hampir setiap waktu
- b. Ya, cukup sering
- c. Hanya sesekali
- d. Tidak pernah

Jumlah skor :

Cara penilaian skor :

1. Setiap pertanyaan bernilai 4 poin skala (dari 0-3), dengan total skor berkisar antara 0-30.
2. Pertanyaan no 1,2 dan 4 (tanpa tanda *), dinilai 0,1,2,3 mulai dari jawaban teratas nilai skornya 0 dan jawaban terbawah nilai skornya.

3. Pertanyaan no 3, 5-10 (dengan tanda *), dinilai 3,2,1,0 mulai dari jawaban teratas nilai skornya 3 dan jawaban terbawah nilai skornya 0.
4. Nilai *cut-off* 10, artinya: skor > 10 berarti cenderung untuk mengalami depresi *post partum* skor < 10 berarti tidak cenderung untuk mengalami depresi *post partum*.

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat padamasa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. Seperti yang di jelaskan di dalam QS. Al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hariesok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini,serta prediksi masa datang. Karena perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan.

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses manajemen ini terdiri dari 7 langkah berurutan dimana di setiap langkah disempurnakan secara periodik, proses ini dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Proses manajemen asuhan kebidanan ini maka mudah kita dapat mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan suatu asuhan yang aman dan efektif.

2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan

Manajemen kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bisa dipecah-pecah ke dalam tugas-tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi klien. Berikut langkah-langkah dalam proses penatalaksanaan menurut Varnay(2003). Adapun tahapan manajemen asuhan kebidanan menurut langkah Varney adalah sebagai berikut:

a. Langkah I (Pengumpulan data dasar)

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Langkah ini terdiri dari data *subjektif* dan data *objektif*. Data *subjektif* adalah yang

menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Data *subjektif* antara lain biodata, riwayat kesehatan pada riwayat kesehatan ditanyakan apakah ibu memiliki penyakit keturunan atau menular. Riwayat kehamilan, pada riwayat kehamilan ditanyakan pada ibu apakah kehamilannya direncanakan atau tidak direncanakan sehingga kelahiran bayi tidak diinginkan, kemungkinan ibu menjawab bahwa kehamilannya tidak diinginkan karena ibu sudah memiliki banyak anak. Riwayat persalinan, pada riwayat persalinan ditanyakan pada ibu apakah ada penyulit yang dialami ibu pada saat bersalin seperti distosia bahu, persalinan lama, tindakan operasi *caesar* atau masalah lainnya sehingga menyebabkan ketidaknyamanan fisik pada ibu seperti luka jahitan, yang membuat ibu lelah dan tidak ingin mengurus bayinya pertanyaan terakhir yang dapat ditanyakan pada ibu yaitu kondisi psikologi ibu, dimana pada kasus *post partum blues* kemungkinan ibu mengatakan sulit tidur, mudah marah, cemas, tidak nafsu makan dan tidak ingin mengurus bayinya. .

Data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien, hasil laboratorium dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus. Data objektif terdiri dari pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi), pemeriksaan penunjang (laboratorium, catatan baru dan sebelumnya). Data objektif menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik pasien.

Pada kasus *post partum blues* pemeriksaan pada ibu yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital kemungkinan pada tekanan darah tidak normal. Tekanan darah ibu bisa meningkat karena suasana hati ibu tidak stabil. Tekanan darah yang rendah bisa terjadi karena ibu kurang tidur. Mata mungkin terlihat sembab karena sering menangis dan kongjungtiva pucat akibat kurang tidur. Payudara ibu kemungkinan mengalami bendungan ASI karena ibu tidak menyusui bayinya. Pemeriksaan fisik yang mungkin didapatkan pada bayi ibu yang mengalami *post partum blues* yaitu dehidrasi, gizi buruk (berat badan bayi turun), dan rentan terhadap infeksi.

b. Langkah II (Merumuskan diagnosa aktual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Pada kasus *post partum blues* dilakukan identifikasi diagnosa kebidanan yaitu pada data subjektif ibu mengeluh sulit tidur, tidak nafsu makan, mudah marah, tidak ingin mengurus bayinya dan merasa cemas. Pada data objektif ditemukan tanda vital tidak normal, tidak ingin menyusui bayinya sehingga kemungkinan terjadi bendungan ASI.

c. Langkah III (merumuskan diagnosa/masalah potensial yang membutuhkan antisipasi masalah potensial)

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap diagnosa atau masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada *kasus post partum blues* masalah yang biasa timbul bisa saja terjadi tanda bahaya pada ibu seperti gizi buruk, tekanan darah rendah, bendungan ASI yang akan berlanjut terjadinya abses payudara dan mastitis. Selain itu, juga masalah yang bisa timbul jika ibu tidak segera ditangani maka akan terjadi depresi *post partum* dimana ibu memperlihatkan tanda ingin membunuh bayinya maupun dirinya sendiri.

Saat dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan masalah potensial yang bersifat emergency seperti keinginan membunuh dirinya atau bendungan payudara hingga berlanjut pada mastitis dan abses payudara tentunya bidan sudah harus menetapkan penanganan yang tepat yang akan dilakukan pada asuhan langkah 4 yaitu menindak lanjuti tindakan emergency.

- d. Langkah IV (Identifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera).

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau ada hal yang perlu dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai kondisi ibu. Pada

kasus *post partum blues* diperlukan adanya tindakan segera dan atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain jika ibu menunjukkan tanda bunuh diri atau ingin membunuh bayinya atau terjadi masalah lainnya seperti bendungan ASI, mastitis dan abses payudara.

Apabila tanda tersebut tidak ditunjukkan ibu maka ibu cukup diberi dukungan baik dari bidan, keluarga dan suami. Dukungan suami dan keluarga tidak cukup dalam penanganan *post partum blues* ibu juga dianjurkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

e. Langkah V (Merencanakan asuhan yang menyeluruh)

Merencanakan asuhan menyeluruh yang rasional sesuai dengan temuan pada langkah sebelumnya. Adapun penatalaksanaan *post partum blues* adalah dengan pendekatan spiritual dan pendekatan secara medis. Pendekatan secara spiritual yaitu dengan menganjurkan ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara sholat, membaca Al-Qur'an dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pendekatan secara medis dapat dilakukan dengan komunikasi terapeutik, peningkatan *support* mental yaitu dengan cara meminta suami membantu pekerjaan ibu, memanggil nenek atau keluarga untuk menemani ibu, dan ibu dianjurkan untuk sering berkumpul dengan teman-teman terdekat atau keluarga.

Selain itu juga dapat dilakukan dengan diri klien sendiri yaitu memberikan dukungan pada ibu yang dilakukan oleh suami atau keluarga, komunikasikan segala permasalahan yang ada, bicarakan rasa cemas yang dialami, belajar tenang dengan menarik nafas, bersikap tulus, ikhlas dalam menerima aktiviras baru, dan tidak bersifat fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi atau keluarga.

f. Langkah VI (Melaksanakan perencanaan)

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini biasa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien, atau anggota tim kesehatan yang lain. *Post partum blues* dalam penanganannya dibutuhkan kerja sama yang baik antara bidan, klien, dan keluarga/ suami pasien dalam memotivasi ibu untuk mengurus bayinya.

g. Langkah VII (Evaluasi)

Mengevaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan hingga terjadi perubahan perilaku dari ibu yang mengalami *post partum blues*, mengulangi kembali proses manajemen dengan benar terhadap setiap aspek asuhan yang sudah dilaksanakan tetapi belum efektif. Melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu seperti kondisi psikis ibu seperti sudah ingin mengurus dan memberikan ASI pada bayinya. Evaluasi kondisi fisik ibu, dimana tekanan darah ibu sudah normal dan kondisi gizi ibu sudah

baik. Kondisi spiritual ibu juga dievaluasi ibu dianjurkan membaca Al-Qur'an agar hati ibu menjadi tenang.

3. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP)

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu:

a. *Subjektif (S)*

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui anamnese dengan klien. Analisis data subjektif yang didapatkan pada klien *post partum blues* didapatkan klien merasa mudah marah, tekanan darah naik, jantung berdebar-debar, tidak ingin menyusui bayinya dan sulit tidur.

b. *Objective (O)*

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh melalui beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada ibu, melihat kondisi ibu sesuai dengan tanda dan gejala *post partum blues* serta melakukan pemeriksaan fisik inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi apakah ada luka pada jalan lahir atau trauma yang dialami ibu sehingga merasa lelah dan enggan mengurus bayinya. Data objektif yang mungkin didapatkan pada ibu yaitu tekanan darah yang tidak

normal, gizi yang buruk, bendungan payudara akibat tidak menyusui bayinya yang mungkin akan berlanjut menjadi mastitis hingga abses payudara. Data objektif pada bayi mungkin akan didapatkan bayi mengalami dehidrasi dan gizi buruk.

c. *Assesment (A)*

Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien, apakah ibu betul terkena *post partum blues*.

d. *Planning (P)*

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan di mana planning ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien SOAP ini dilakukan pada asuhan terhadap ibu dengan *post partum blues* pada tahap berikutnya.

Pada tahap terakhir ini melakukan kunjungan ulang dan mengkaji serta menanyakan keadaan umum dan TTV, memastikan sang ibu menyusui bayinya dengan memberikan ASI eksklusif, mengurus bayinya, serta ibu juga menjaga personal hygiene bayi maupun dirinya. Hari pertama sampai dengan hari ke-10 pada ibu yang mengalami *post partum*

blues akan diberikan motivasi, dorongan dan dukungan baik dari keluarga, bidan dan suami.

Hari ke-10, dukungan psikologis tetap diberikan kepada ibu. Selain dukungan ibu juga diajari cara menyusui bayinya, merawat bayi dan menganjurkan ibu makan bergizi dan istirahat yang cukup. Minggu ke-2 akan dilakukan kunjungan lagi untuk memastikan kondisi psikologi ibu baik, involusio uterus berjalan normal, memastikan ibu menyusui dengan baik dan memberikan konseling cara merawat bayi dan tali pusat bayi. Minggu ke-6 memberikan konseling KB kepada ibu dan menanyakan penyulit apa saja yang dialami oleh ibu dan bayinya.

Tabel 2.2 Standar Operasional Prosedur Perwatan Ibu Postpartum di Ruang Nifas Di RSUD Syekh Yusuf

Pengertian	Melakukan observasi pasien setelah melahirkan dilakukan 2 jam <i>post partum</i> atau setiap hari selama post partum
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mencegah segala resiko atau komplikasi <i>post partum</i>. 2. Memberikan kenyamanan kepada ibu.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan direktur RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa, No : 465.a/RSUD – SY/ IV/2015 tentang kebijakan pelayanan kesehatan matenal dan neonatal 2. Keputusann Direktur RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa No : 468.a/RSUD – SY/IV/2015 tentang panduan pelayanan kesehatan dan neonatal
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Persiapan Persiapan Pasien : <ul style="list-style-type: none"> • Pasien diberitahu maksud dan tujuan serta tindakan yang akan dilakukan • Pasien posisi tidur santai. Persiapan Alat <ol style="list-style-type: none"> a. Tensi Meter b. Termometer c. Bengkok d. Air DTT e. Pembalut f. Hanschoen

Prosedur	<p>2. Pelaksanaan Prosedur</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ucapan selamatb. Lakukan identifikasic. Lakukan cuci tangand. Pakai hanschoene. Siapkan peralatan yang diperlukanf. Periksa vital signg. Lakukan pemeriksaan meliputi fundus uteri, kontraksi uterus, miksi, defikasi dan odem kakih. Desinfeksi daerah vulva, periksa lochea, pendarahan, jahitan perineumi. Anjurkan pasien untuk mobilisasi secepatnya.J. Ajukan pasien untuk lektasi sedini mungkin.k. Motivasi KB dan penyuluhan lainya antara lain : gizi ibu menyusui, perawatan payudara,cara memandikan bayi, perawatan tali pusat, cara menyusui yang benar, imunisasi, perawatan bayi dirumah, jadwal controll. Bereskan peralatanm.Lepas hanschoenn. Lakukan cuci tangano. Catat dalam merekam medis pasien.
----------	--

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN *POST PARTUM*
PADA NY”R” DENGAN *POST PARTUM BLUES*
DI RUMAH SAKIT SYEKH YUSUF
TANGGAL 02-29 JULI 2018

No Register : 44xxx
Tanggal Partus : 02 Juli 2018 Jam 09.10 WITA
Tanggal Masuk Ruang Nifas : 02 Juli 2018 Jam 11.40 WITA
Tanggal Pengkajian : 02 Juli 2018 Jam 14.00 WITA
Pengkaji : Salmah

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “R” / Tn “S”
Umur : 25 tahun / 35 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / 1 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SD
Alamat : Pakkalompo

B. Data subjektif

1. Keluhan Utama

Ibu merasa terganggu karena bayinya rewel dan tidak nafsu makan

2. Riwayat Keluhan Utama

Setelah melahirkan ibu tidak nyaman dengan status barunya yaitu seorang ibu

3. Riwayat kesehatan ibu

Ibu tidak memiliki riwayat menderita penyakit jantung, Diabetes Melitus (DM), hepatitis, tumor, hipertensi, Penyakit Menular Seksual (PMS), dan tuberkulosis (TBC). Tidak ada riwayat penyakit yang menyertai kehamilan seperti sakit kepala yang hebat, nyeri perut yang hebat, dan kejang.

4. Riwayat kesehatan keluarga

Tidak ada riwayat ketergantungan obat dan alkoholdan keluarga tidak memiliki penyakit menular dan penyakit keturunan lainnya.

5. Riwayat Reproduksi

- a. Menarche : 13 tahun
- b. Siklus Haid : Tidak teratur
- c. Lamanya Haid : 03-05 hari
- d. Keluhan Haid : Tidak Ada

6. Riwayat Kehamilan

- a. Ibu mengatakan ini adalah anak yang pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya
- b. Ibu mengatakan awalnya belum bersedia untuk hamil karena masih tinggal bersama orang tua, ibu ingin mempunyai rumah terlebih dahulu atau ibu tinggal bersama kedua orang tuanya.
- c. Hari pertama haid terakhir tanggal 01-10-2017
- d. Usia kehamilan saat melahirkan yaitu 39 minggu 1 hari
- e. Ibu telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali di Puskesmas Parigi dan telah mendapat imunisasi sebanyak 2 kali yaitu TT 1 pada tanggal 05-03-2018 dan TT II tanggal 08-05-2018. Berikut tanggal kunjungan ibu beserta dampungan selama memeriksakan kehamilannya

Tabel 3.1 pemeriksaan kehamilan

No.	Tanggal	Usia kehamilan	Keluhan	Pendamping	Tempat
1	17/11/17	6 minggu 3 hari	Lemas	Mertua	PKM Parigi
2	08/01/18	12 minggu 4 hari	Lemas, muntah	Sendiri	PKM Parigi
3	05/03/18	22 minggu 1 hari	Tidak ada keluhan	Sendiri	PKM Parigi
4	08/05/18	31 minggu 2 hari	Nyeri ulu hati	Sendiri	PKM Parigi

Sumber : Data primer

7. Riwayat Persalinan /Kelahiran sekarang

Tabel 3.2 riwayat persalinan yang terakhir

No.	Kala	Lama	KET
1	Kala I	8 jam	Normal
2	Kala II	20 menit	Ibu melahirkan secara normal dan terdapat ruptur perineum tingkat II
3	Kala III	15 menit	Plasenta dan selaput lahir lengkap, dilakukan penjahitan laserasi derajat 2 teknik jelujur secara mediolateral dengan benang cutgut.
4	Kala IV	2 jam	Normal, perdarahan 330 cc
Jumlah		10 jam 20 menit	

Sumber : Data primer

8. Data Bayi

- a. BBL : 3.000 gr
- b. PBL : 50 cm
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Apgar Score : 8/10
- e. Kulit kemerahan
- f. Konjungtiva merah muda
- g. Sklera tidak ikterus
- h. Tali pusat masih basah dan terjepit dengan penjepit tali pusat, tidak ada tanda-tanda infeksi.
- i. BAK: 1 kali, BAB: 1 kali (sejak kelahiran)
- j. Bayi kuat menetek, reflex menghisap kurang baik

k. Bayi terlihat tidur nyenyak

l. Tanda-tanda vital

- 1) Suhu : 36,8 °C
- 2) Pernapasan : 40 kali/menit
- 3) DJB : 130 kali/menit

9. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB jenis apapun

10. Data psikososial

- a) Hubungan dengan suami baik, namun pada usia kehamilan 5 bulan sempat cekcok dan sekarang telah baik
- b) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah dengan menggunakan sistem musyawarah
- c) Ibu belum siap untuk hamil karena belum memiliki tempat tinggal bersama suami dan harus tinggal bersama mertua dan kedua ipar laki-lakinya
- d) Ibu mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan membereskan rumah. Ibu juga pergi ke kebun membantu suami bertani
- e) Hubungan ibu dengan kedua tetangganya baik-baik saja
- f) Hubungan ibu dengan mertua dan adik iparnya baik-baik saja

11. Data ekonomi

- a) Pendapatan suami terkadang cukup dan terkadang tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga.

- b) Ibu menggunakan HP android yang digunakan ber 2 dengan suaminya
- c) Suami ibu bekerja sebagai petani dan juga teradang menjadi kuli bangunan
- d) Rumah ibu terletak di pegunungan dan jalanannya rusak

12. Data spiritual

- a) Ibu jarang solat, di rumah dan jika bepergian ibu tidak menggunakan kerudung
- b) Suami ibu menjalankan solat jika hari jumat saja
- c) Lokasi masjid dari rumah ibu ke masjid yaitu \pm 2 km

13. Status perkawinan

Ibu menikah di usia 24 tahun dengan suaminya dan menikah sudah hampir 2 tahun secara sah

14. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Nutrisi

Sebelum melahirkan pola makan ibu teratur dengan frekuensi 3 kali sehari dengan jenis makanan nasi, sayur dan lauk pauk. Ibu minum 7-8 gelas/hari.

Setelah melahirkan dari jam 09.10 Wita hingga tanggal pengkajian pukul 14.00 ibu belum makan hanya minum air putih.

b. Eliminasi

Ibu BAK sebanyak 3-4 kali/hari, berwarna kuning muda dengan bau khas amoniak. BAB sebanyak 1-2 kali/hari

c. Istirahat

Ibu tidur siang kurang lebih 1 jam/ hari jika tidak pergi ke kebun membantu suami dan tidur malam 7-8 jam / hari

d. Personal Hygiene

Ibu mandi 2 kali sehari memakai sabun, keramas tiap rambut kotor dengan menggunakan shampoo, sikat gigi 1 kali dalam sehari.

C. Data Objektif

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran : apatis
3. Ekspresi ibu meringis saat bergerak
4. Ibu terlihat acuh tak acuh saat ditanya dan terlihat tidak senang dan menyuruh ibunya untuk menjawab setiap pertanyaan
5. Pemeriksaan fisik terfokus
 - a. Mata

Inspeksi : Konjungtiva pucat, sclera putih dan tidak ikterus
 - b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema
 - c. Payudara

Inspeksi : Puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI

d. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada luka bekas operasi

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU setinggi pusat, kandung kemih kosong.

e. Genetalia

Inspeksi : Tidak ada varices, tampak pengeluaran lochia rubra, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah, tidak merah dan tidak ada tanda-tanda infeksi

Palpasi : Tidak ada oedema, ada nyeri tekan pada perineum

f. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varices, jari-jari ekstremitas atas dan bawah lengkap

Palpasi : Tidak ada oedema

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH AKTUAL

Diagnosa : P1 A0, *post partum* hari pertama periode *taking in*, dengan gejala *post partum blues*

P1 A0 *post partum* hari pertama dengan gejala *post partum blues*

Data subjektif (S)

- a. Ibu mengatakan ini anak yang pertama dan ibu tidak pernah keguguran
- b. Ibu merasa lelah dan sedih
- c. Ibu merasa terganggu karena bayinya rewel dan tidak nafsu makan. Setelah melahirkan dari jam 09.10 Wita hingga tanggal ppengkajian pukul 14.00 ibu belum makan hanya minum air putih.

- d. Pertama kali melihat bayinya dan mengetahui jenis kelaminnya ibu merasa kurang bahagia dan terlihat acuh tak acuh dengan bayinya
- e. Ibu menyusui bayinya ketika menangis dan hanya sebentar. Ibu meminta suami untuk membelikan susu formula untuk anaknya karena ibu lelah dan mengatakan ASI nya tidak lancar keluar

Data *objektif* (O)

- a. Tidak ada luka bekas operasi
- b. Ibu melahirkan secara normal (pervaginam) tanggal 02 Juli 2018 jam 09.10 wita.
- c. Kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU setinggi pusat, kandung kemih kosong
- d. Ibu terlihat murung dan menyusui bayinya hanya sebentar
- e. Ibu terlihat lelah dan lebih terlihat fokus ke dirinya sendiri ketimbang bayinya
- f. Ibu acuh tak acuh saat ditanya dan menyuruh suaminya untuk menjawab setiap pertanyaan dan sangat cuek
- g. Ibu tampak meringis karena terdapat luka jahitan
- h. Pengeluaran ASI masih sedikit
- i. Terdapat pengeluaran *lochea rubra*

Analisa dan Interpretasi data :

- 1) *Post partum blues* ialah keadaan transien dari peningkatan reaktifitas emosional yang dialami oleh separuh dari wanita dalam jangka waktu satu minggu pasca persalinan. Gejala klinis jelas terlihat dari pasca melahirkan hingga hari ke 5, kemudian menghilang dalam beberapa jam hingga beberapa hari kemudian. *Post partum blues* umumnya terjadi 50% pada ibu baru. Periode *post partum* menyebabkan *stress* emosional terhadap ibu baru, bahkan lebih menyulitkan bila terjadi perubahan fisik yang hebat (Susanti, 2017).
- 2) Ibu primipira biasanya akan mengalami banyak kesulitan dalam proses adaptasi peran menjadi orang tua (*bonding parenting*). Sebenarnya terdapat beberapa fase adaptasi peran *parenting*. Hari pertama sampai hari ke dua setelah melahirkan merupakan fase ketergantungan. Fase ini ibu lebih cenderung memperhatikan dirinya dan pasif terhadap lingkungannya. Hal ini terjadi karena ketidaknyamanan yang dirasakan ibu seperti luka jahitan, kelelahan, kurang tidur dan rasa mules. Hal yang perlu diperhatikan pada fase ini yaitu banyak istirahat, asupan nutrisi yang cukup dan komunikasi yang baik (Nugroho, 2014 : 116). Gangguan psikologis yang mungkin dirasakan oleh ibu pada fase *taking in* menurut Walyani (2015 : 79-80) ada 4 yaitu :

- 1) Kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan tentang bayinya misal jenis kelamin tertentu, warna kulit, jenis kulit, jenis rambut dan lainnya.
 - 2) Rasa bersalah karena belum menyusui bayinya
 - 3) Ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan fisik yang dialami ibu misal rasa mules karena Rahim berkontraksi untuk kembali pada keadaan semula, payudara bengkak, dan nyeri luka jahitan.
 - 4) Suami atau keluarga yang mengkritik ibu tentang cara merawat bayi dan cenderung melihat saja tanpa membantu. Ibu akan merasa tidak nyaman karena hal tersebut bukan hanya tanggung jawab ibu semata
- Fase yang kedua yaitu fase ketidaktergantungan (*taking hold*), fase ini terjadi hari ketiga dan berakhir sampai minggu ke-empat atau kelima. Selama fase ini sistem pendukung (*support*) menjadi sangat bernilai bagi ibu primipara yang membutuhkan sumber informasi dan pemulihan fisik (involusi) sehingga ia dapat beristirahat dengan baik
- 3) Involusio uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil. Ukuran uterus pada masa nifas akan mengecil seperti sebelum hamil. TFU akan turun 1 cm tiap hari (Marmi, 2012: 140).
 - 4) *lochea* adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa *post partum*, biasanya berlangsung 40 hari. Tahapan-tahapan masa nifas ini, vagina akan terus-menerus mengeluarkan darah. Biasanya darah

tersebut mengandung trombosit, sel-sel tua, sel-sel mati (nekrosis), serta sel-sel dinding rahim (endometrium), yang disebut lokia (Marmi, 2012: 140).

- 5) Involusio uterus atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil. Ukuran uterus pada masa nifas akan mengecil seperti sebelum hamil. TFU akan turun 1 cm tiap hari (Marmi, 2012: 140).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH POTENSIAL

1. Potensial terjadi depresi *post partum blues*, penurunan berat badan, tekanan darah rendah, bayi kurang gizi dan bendungan payudara

Data *Subjektif (S)*

- a. Ibu melahirkan tanggal 02 Juli 2018, pukul 09.10 Wita dan mendapat jahitan pada perineum
- b. Ibu merasa terganggu dengan bayinya dan bersifat biasa-biasa saja terhadap bayinya
- c. Ibu mengatakan ini bukan kehamilan yang direncanakan

Data *Objektif (O)*

- a. Ibu tampak lelah dan merasa nyeri pada luka bekas jahitan
- b. Ibu cuek saat ditanya dan tidak terlalu memperhatikan bayinya, saat bayi menangis ibu tidan menenangkan bayi
- c. Ibu terlihat sedih dan tampak lelah

Analisa Dan Interpretasi Data :

1. Perubahan fisik pada ibu pada saat menjalani masa nifas merupakan salah satu faktor yang membuat ibu cemas dan menyebabkan terjadinya *post partum blues*. Perubahan fisik yang dialami ibu yaitu rasa kram dan mules dibagian bawah perut akibat penciutan rahim(involusio), keluarnya sisa-sisa darah dari vagina(*lochea*), kelelahan karena proses melahirkan, pembentukan ASI sehingga payudara membesar dan perlukaan jalan lahir (Walyani, 2015: 3).
2. Menurut penelitian Rahayuningsih (2013) akibat dari laserasi perineum yang terjadi pada ibu post partum adalah adanya nyeri perineum sebanyak 70,9%. Dampak nyeri perineum tersebut adalah stress, traumatik, takut terluka, tidak nafsu makan, sulit tidur dan depresi, Sehingga ibu post partum mengalami keterlambatan mobilisasi, gangguan rasa nyaman pada saat duduk, berdiri, berjalan dan bergerak, sehingga berdampak pada gangguan istirahat ibu *post partum* dan keterlambatan kontak awal antara ibu dan bayinya (Utami, 2015: 31).
3. Dukungan suami adalah faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya *post partum blues*. Dukungan suami sangat diperlukan, karena ibu tidak akan merasa beban dengan apa yang terjadi pada dirinya, baik dukungan saat hamil, saat bersalin maupun masa nifas. Perhatian suami, komunikasi yang dijalin, sikap dan perilaku suami dalam membantu ibu baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas akan mempengaruhi kondisi ibu (Desfanita, 2015).
4. Kehamilan yang tidak diharapkan seperti hamil diluar nikah, kehamilan akibat perkosaan, kehamilan yang tidak direncanakan sehingga wanita tersebut belum siap

menjadi ibu. Beberapa ibu mampu beradaptasi setelah melahirkan, tetapi banyak ibu-ibu yang tidak mampu beradaptasi sehingga muncul perasaan sedih, tidak ingin mengurus bayinya. Sebagian wanita lain menerima kehamilan sebagai kehendak alam dan bahkan pada beberapa wanita termasuk remaja, kehamilan merupakan akibat percobaan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi. Awalnya mereka terkejut ketika tahu dirinya hamil, namun seiring waktu mereka akan menerima kehadiran seorang anak (Rahayu,2017).

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

Tindakan segera / kolaborasi tidak dilakukan pada Ny."R". Tindakan dilakukan dengan dokter spesialis kejiwaan atau psikiater jika ibu memang menunjukkan tanda-tanda ingin membunuh bayinya atau membunuh dirinya sendiri.

LANGKAH V : RENCANA/INTERVENSI

1. Ibu sulit beradaptasi dengan peran barunya sebagai seorang ibu
2. Luka bekas jahitan tidak merah dan infeksi pada luka jahitan perineum
3. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Kriteria

1. Ibu sulit beradaptasi dengan peran barunya sebagai seorang ibu

Wanita masa nifas akan mengalami perubahan psikologis yang nyata sehingga memerlukan adaptasi. Sering menangis, lekas marah, dan sering sedih merupakan manifestasi dari emosi yang labil. Proses adaptasi psikologis sudah terjadi selama kehamilan, menjelang proses kelahiran maupun setelah persalinan. Masa nifas merupakan masa yang sangat rentan terjadinya

perubahan psikologis pada ibu dimana seorang ibu memerlukan adaptasi. Dorongan dan perhatian dari keluarga dan suami merupakan dukungan positif untuk ibu (Walyani, 2015).

Hari pertama sampai hari ke dua setelah melahirkan merupakan fase ketergantungan. Fase ini ibu lebih cenderung memperhatikan dirinya dan pasif terhadap lingkungannya. Hal ini terjadi karena ketidaknyamanan yang dirasakan ibu seperti luka jahitan, kelelahan, kurang tidur dan rasa mules. Hal yang perlu diperhatikan pada fase ini yaitu banyak istirahat, asupan nutrisi yang cukup dan komunikasi yang baik (Nugroho, 2014 : 116).

2. Tidak infeksi pada luka jahitan

Tidak terdapat tanda-tanda infeksi: Seperti peningkatan suhu tubuh yang melebihi 37,5 C, luka jahitan perineum bengkak, berwarna merah, dan pengeluaran lochia yang berbau.

3. Tanda-tanda vital dalam batas normal

- a. Tekanan Darah : Sistol 110/130 mmHg, distol 70-90 mmHg
- b. Nadi : 60 – 90 kali/menit
- c. Suhu : 36,5-37,5 C
- d. Pernapasan : 16-24 kali/ menit
- e. Kontraksi uterus baik : Teraba keras dan bundar
- f. TFU turun 1 cm/ hari
- g. Pengeluaran lochia rubra dan berbau normal (amis)

Rencana Asuhan

1. Masa nifas hari pertama dengan gejala *post partum blues*

- a. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Rasional: Hal ini dapat mencegah terjadinya infeksi silang

- b. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Rasional: Dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, ibu dapat mengerti tentang keadaannya dan dapat mengurangi kecemasan ibu.

- c. Melakukan komunikasi terapeutik kepada ibu dan memberi dukungan kepada ibu bahwa yang dialaminya merupakan hal yang wajar bagi ibu yang baru belajar beradaptasi menjadi seorang ibu.

Rasional: Dengan memberikan dukungan dan melakukan pendekatan kepada ibu membuat ibu merasa bahwa dirinya tidak sendiri dan ibu merasa lebih nyaman karena ada yang memberi *support*.

- d. Memberitahu ibu untuk menceritakan segala kendala dan masalah yang ia rasakan selama ini jika memang ada masalah

Rasional : Dengan menceritakan masalah yang ibu hadapi membuat ibu sedikit lega dan bisa menyelesaikan masalahnya secara baik-baik.

- e. Mengajarkan ibu teknik relaksasi kepada ibu, yaitu menarik nafas melalui hidung dan menghembuskan secara perlahan lewat mulut

Rasional : Relaksasi membuat ibu menjadi lebih tenang

- f. Menganjurkan ibu untuk tidak *stress* karena akan berpengaruh pada produksi ASI

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

- g. Menganjurkan ibu untuk tidur ketika bayi tidur dan beristirahat yang cukup

Rasional : Agar ibu bisa istirahat yang cukup sehingga bisa berfikir jernih dan menjadi *fresh*. Kurang istirahat akan mengurangi produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri (Marmi, 2012:145).

- h. Memberitahu kepada suami dan keluarga untuk membantu istri merawat anaknya dan memberikan dukungan dan semangat kepada ibu

Rasional : Membantu ibu dapat membuat ibu merasa bebannya lebih berkurang dan bisa beristirahat cukup.

- i. Ajurkan kepada suami untuk lebih memberikan perhatian kepada istri seperti jika malam hari bayi menangis gantikan fungsi istri menenangkan bayi atau membantu istri dan memberikan dukungan penuh.

Rasional : Dengan perhatian yang lebih kepada istri dan membantu mengurus bayinya dapat membuat istri lebih ringan bebannya dan bisa mendapatkan istirahat yang cukup

j. Observasi tanda-tanda vital ibu

Rasional: Tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ibu

k. Observasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia setiap hari

Rasional:

- 1) TFU merupakan salah satu indikator untuk mengetahui bahwa proses involusio berlangsung normal, normalnya TFU mengalami penurunan 1 cm/ hari yang teraba keras dan bundar
- 2) Dengan mengobservasi kontraksi uterus dapat mengetahui apakah uterus berkontraksi dengan baik atau tidak, karena apabila uterus kurang berkontraksi akan menyebabkan perdarahan dan memperlambat proses involusio
- 3) Perubahan warna, bau, banyaknya, dan perpanjangan lochia merupakan terjadinya infeksi yang disebabkan oleh involusio yang kurang baik.

l. Anjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan shampoo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Rasional: dengan menjaga kebersihan diri ibu merasa nyaman, dan mencegah kemungkinan terjadinya infeksi pada luka yang terdapat pada diri ibu.

m. Anjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Rasional: Mobilisasi dini dapat memulihkan kondisi tubuh dengan cepat, sistem sirkulasi di dalam tubuh pun bisa berfungsi normal kembali. Bahkan dapat mencegah aliran darah terhambat. Hambatan aliran darah dapat menyebabkan terjadinya thrombosis vena dalam dan dapat menyebabkan infeksi (Marmi, 2012:137).

n. Ajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah.

Rasional: Dengan cara ini ibu dapat mengerti dan melakukan sendiri perawatan perineum yang baik dan benar. Dengan menjaga kebersihan vulva dengan teratur dapat mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh kuman-kuman patogen

o. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui dan jangan khawatir dengan ASI yang masih sedikit karena ASI yang keluar memang masih agak sedikit karena ibu baru saja melahirkan. Menganjurkan ibu untuk tidak *stress* karena dapat berpengaruh pada produksi ASI. Selain itu juga anjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand*.

Rasional: Dengan sesering mungkin menyusui akan memacu hormon prolaktin yang akan memperlancar produksi ASI. *Stress* juga mempengaruhi produksi ASI pada ibu.

- p. Ajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar serta cara perawatan payudara yang baik dan benar

Rasional: Posisi menyusui yang benar bayi dapat lebih baik dan mudah menghisap ASI dan agar payudara ibu tidak lecet, serta dengan perawatan payudara yang baik dan benar ibu dapat menjaga kebersihan daerah payudaranya dan mencegah terjadinya bendungan ASI

- q. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang

Rasional: Makanan yang bergizi mampu memulihkan tenaga dan pemenuhan nutrisi ibu selama proses pemulihan dengan luka persalinan dan tidak hanya itu pemenuhan gizi yang baik pada ibu akan berdampak positif terhadap produksi ASI ibu dan makanan yang mengandung serat dapat memperlancar BAB (Saleha, 2013:31-131).

2. Nyeri perineum

- a. Jelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karena adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Rasional: Dengan menyampaikan kepada ibu penyebab nyeri yang dialami ibu akan dapat mengetahui penyebab nyeri yang dialami.

- b. Ajarkan dan anjurkan ibu melakukan teknik relaksasi

Rasional: Teknik relaksasi dapat mengurangi ketegangan pada otot-otot dan meningkatkan suplai oksigen ke jaringan

- c. Bantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Rasional: Hal ini dapat mengurangi rasa nyeri dan memberikan rasa nyaman pada ibu sehingga suasana hati ibu menjadi lebih baik dan bisa beradaptasi dengan kondisinya yang sekarang

- d. Pemberian obat Analgetik, Antibiotik, dan vitamin C

Rasional: Antibiotik berfungsi mencegah terjadinya infeksi, analgetik untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan ibu, sedangkan vitamin C berfungsi untuk mempercepat penyembuhan jaringan atau sel-sel yang rusak

- 3. Potensial terjadinya depresi *post partum* dan infeksi pada luka jahitan perineum sehingga membuat kondisi psikologi ibu bertambah parah

- a. Ajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva

Rasional: Menjaga kebersihan vulva dengan teratur dapat mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh kuman-kuman patogen

- b. Observasi adanya tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum

Rasional: Tanda-tanda infeksi merupakan indikator untuk mengetahui keadaan ibu dan menentukan tindakan selanjutnya

LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

Tanggal 02 Juli 2018 jam 14.50 WITA

1. Masa nifas hari pertama dengan gejala *post partum blues*
 - a. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
Hasil : Tangan telah dicuci dan tangan dalam keadaan bersih
 - b. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya.
Hasil : Ibu memahami dan mengerti dengan keadaannya.
 - c. Menganjurkan ibu untuk menceritakan masalah yang ia miliki dengan teman atau kerabat terdekat agar bisa diselesaikan secara baik-baik
Hasil : Ibu mengerti
 - d. Melakukan pendekatan terapeutik kepada ibu, memberi dukungan kepada ibu, menganjurkan ibu untuk selalu berzikir, membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran agar ibu menjadi lebih tenang
Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan
 - e. Memberitahu suami untuk membantu ibu mengurus bayinya dan lebih memperhatikan ibu.
Hasil : Suami bersedia melakukannya
 - f. Menjelaskan pada ibu cara mengetahui baik tidaknya kontraksi uterus
Hasil : Ibu mengerti bahwa kontraksi baik apabila perut teraba keras dan bundar

g. Observasi tanda-tanda vital ibu

Hasil : 1) Tekanan Darah : 110/80 mmHg

2) Nadi : 80 kali/ menit

3) Suhu : 36,5 C

4) Pernafasan : 22 kali/ menit

h. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia setiap hari

Hasil: TFU setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), pengeluaran lochia rubra

i. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu: Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan shampoo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

j. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil: Ibu telah dapat miring kanan dan kiri serta mulai duduk secara perlahan- lahan

k. Mengajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

- l. Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar serta menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (*on demand*) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil: Ibu sedikit mengerti atas penjelasan yang diberikan dan masih terlihat enggan menyusui bayinya secara *on demand*

- m. Menganjurkan Menganjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, daging, ikan, telur), vitamin (buah dan sayur) dan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein untuk mempercepat penyembuhan luka episiotomi. Selain itu dengan pemenuhan nutrisi bergizi seimbang mampu menambah tenaga ibu serta pemenuhan nutrisi untuk produksi ASI, serta makanan yang berserat.

Hasil: Ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang diberikan

2. Nyeri perineum

- a. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karna adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- b. Mengajarkan dan anjurkan ibu melakukan teknik relaksasi

Hasil: Ibu mengerti dan langsung melakukan teknik relaksasi yang telah dianjurkan

- c. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Hasil: Ibu memilih posisi miring kekanan

- d. Memberikan obat Analgetik, Antibiotik, dan vitamin C

Hasil: Amoxicilin 3 x 1

Hermafort 1 x 1

Vitamin C 3 x 1

3. Potensial terjadi infeksi pada luka jahitan perineum yang membuat suasana hati ibu menjadi lebih buruk karena merasa tidak nyaman

- a. Mengajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

- b. Mengobservasi adanya tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum

Hasil: Tidak ada tanda-tanda infeksi yang ditemukan, suhu tubuh normal:

36,5 °C, luka jahitan tidak merah dan pengeluaran lochia tidak berbau

4. Memberi ibu dukungan dan edukasi untuk beradaptasi menjadi orang tua baru

- a. menganjurkan ibu untuk bersabar dan jangan terlalu cemas dengan keadaannya yang sekarang

Hasil : ibu terlihat tidak nyaman atas penjelasan yang diberikan dan terlihat ciek

- b. Melakukan pendekatan kepada ibu dan meminta ibu untuk menceritakan segala masalah yang dia alami

Hasil : ini merasa lelah dan merasa nyeri pada luka bekas jahitan, serta merasa terganggu karena bayinya rewel

- c. Memberitahu suami dan keluarga untuk memberi dukungan kepada ibu dan membantu ibu mengurus bayinya

Hasil : suami dan keluarga mendampingi ibu dan membantu ibu mengurus bayinya dan memberikan segala kebutuhan ibu.

- d. Menganjurkan ibu untuk mendekati diri kepada Allah SWT dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an agar hati ibu menjadi lebih tenang

Hasil : Ibu bersedia melakukannya dan ibu telah mendengar ayat suci Al-Qur'an di HP dengan Qori Syaikh Mansur Al- Salmi dengan surah Ar-Rahman.

- e. Menganjurkan bergabung dengan kelompok-kelompok ibu baru

Hasil : Ibu berjanji akan melakukannya

LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 02 Juli 2018 Jam 15. WITA

1. Masa nifas dengan *post partum blues*, ditandai dengan:

- a. Ibu merasa sedih dan mudah marah karena memang dari awal kehamilan belum direncanakan
- b. Ibu merasa terganggu dengan bayinya yang rewel
- c. Ibu terlihat menyusui anaknya namun saat bayi menangis ibu tidak menenangkan bayi, seperti ibu pada umumnya

- d. Ibu tidak nyaman dengan perubahan fisik yang dialami, ibu mendapat luka jahitan sebanyak 6 jahitan (ruptur perineum tingkat 2)
- e. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) dan TFU setinggi pusat
- f. *lochea rubra* tidak berbau busuk
- g. Tanda-tanda vital dalam batas normal
- 1) Tekanan Darah : 100/70 mmHg
 - 2) Nadi : 80 kali/ menit
 - 3) Suhu : 36,8 °C
 - 4) Pernafasan : 22 kali/ menit

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN *POST PARTUM*
PADA NY “R” HARI PERTAMA DENGAN *POST PARTUM BLUES*
DI RUMAH SAKIT SYEKH YUSUF
TANGGAL 02 JULI

No Register : 44xxx
Tanggal Partus : 02 Juli 2018 Jam 09.10 WITA
Tanggal Masuk Ruang Nifas : 02 Juli 2018 Jam 11.40 WITA
Tanggal Pengkajian : 02 Juli 2018 Jam 14.30 WITA
Pengkaji : Salmah
Identitas istri/suami
Nama : Ny “R” / Tn “S”
Umur : 25 tahun / 35 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / 1 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SD
Alamat : Pakkalompo

Data Subjektif (S)

1. Ibu melahirkan pada tanggal 02 Juli 2018 jam 09.10 wita dengan JK: Laki-laki,
BBL: 3.000 gr, PBL: 50 cm A/S: 8/10
2. Ibu merasa lelah setelah melahirkan dan merasa mudah marah

3. Ibu mengatakan sulit menyesuaikan diri dengan peran barunya dengan menjadi seorang ibu apalagi ketika bayi rewel dan menangis
4. Riwayat kelahiran sekarang

Tabel 3.3 Riwayat kelahiran sekarang

No.	Kala	Lama	KET
1	Kala I	8 jam	Normal
2	Kala II	20 menit	Ibu melahirkan secara normal dan terdapat ruptur perineum tingkat II
3	Kala III	15 menit	Plasenta dan selaput lahir lengkap, dilakukan penjahitan laserasi derajat 2 teknik jelujur secara mediolateral dengan benang cutgut.
4	Kala IV	2 jam	Normal, perdarahan 330 cc
	Jumlah	10 jam 20 menit	

Sumber : Data primer

5. Ibu mengeluh nyeri pada luka jahitannya dan takut melakukan pergerakan
6. Riwayat kehamilan
 - a. Saat hamil ibu merasa kurang diperhatikan dengan suaminya dan sempat cekcok diusia kehamilan ibu 5 bulan
 - b. Saat hamil ibu mendapatkan suntik TT sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 05-03-2017 dan TT II pada tanggal 08-05-2018
7. Ibu mengatakan ini bukan kehamilan yang direncanakan, ibu bersedia untuk hamil saat sudah memiliki tempat tinggal sendiri bersama suami
8. Ibu menyusui bayinya ketika menangis dan hanya sebentar dan ibu menyuruh ibunya untuk membelikan susu formula untuk bayinya

9. Hari pertama haid terakhir tanggal 01 Oktober 2017
10. Ibu tinggal bersama kedua orang tua suaminya beserta dua adik iparnya
11. ASI belum lancar
12. Ibu belum BAB dan BAK
13. Riwayat kesehatan ibu
Ibu tidak memiliki riwayat menderita penyakit jantung, DM, Hepatitis, tumor, hipertensi, PMS, dan TBC.
14. Riwayat kesehatan keluarga
Ibu tidak memiliki riwayat penyakit keturunan keluarga
15. Data psikososial
 - a. Hubungan dengan suami baik, namun pada usia kehamilan 5 bulan sempat cekcok dan sekarang telah baik
 - b. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah dengan menggunakan sistem musyawarah
 - c. Ibu belum siap untuk hamil karena belum memiliki tempat tinggal bersama suami dan harus tinggal bersama mertua dan kedua ipar laki-lakinya
 - d. Ibu mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan membereskan rumah. Ibu juga pergi ke kebun membantu suami bertani
 - e. Hubungan ibu dengan kedua tetangganya baik-baik saja
16. Data ekonomi
 - a. Pendapatan suami terkadang cukup dan terkadang tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga.

- b. Ibu mencuci pakaian suami, kedua mertuanya dan kedua adik iparnya menggunakan tangan
- c. Ibu menggunakan HP android yang digunakan ber 2 dengan suaminya

17. Data spiritual

- a. Ibu jarang solat dan jika keluar rumah ibu tidak menggunakan kerudung
- b. Suami ibu menjalankan solat jika hari jumat
- c. Lokasi masjid dari rumah ibu ke masjid \pm 2 km

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran : Apatis
3. Ekspresi ibu meringis saat bergerak
4. Ibu bersikap acuh tak acuh saat ditanya dan terlihat tidak senang dan menyuruh ibunya yang menjawab
5. TFU setinggi pusat, kontraksi uterus teraba keras dan bundar
6. Luka perineum masih basah
7. Kandung kemih kosong
8. Pengeluaran lochia rubra .
9. Tanda-tanda vital :
 - a) Tekanan Darah : 110/70 mmHg
 - b) Nadi : 80 kali/ menit
 - c) Suhu : 36,5 °C

d) Pernafasan : 22 kali/ menit

10. melakukan pemeriksaan fisik

- a. Mata : kongjungtiva pucat, sclera putih dan tidak icterus
- b. Wajah : tidak ada oedema, tidak ada cloasma gravidarum dan tidak ada nyeri tekan
- c. Leher : tidak ada pembesaraan kelenjar thyroïd, limfe dan vena jugularis
- d. Payudara : tampak pengeluaran ASI yang masih sedikit, tidak ada benjolan dan nyeri tekan serta puting susu menonjol
- e. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae lipid, setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
- f. Genetalia : Tidak ada varices, tampak pengeluaran lochia rubra, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah, tidak merah dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada oedema, ada nyeri tekan pada perineum
- g. Ekstremitas bawah : simetris kiri dan kanan, tidak ada varises, tidak ada oedema dan refleks kiri dan kanan positif

Assesment (A)

Pl A0, *post partum* hari kedua, dengan gejala *post partum blues*

Planning (P)

Tanggal 02 Juli 2018 pukul 14.30

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: Ibu memahami dan mengerti dengan keadaanya dan cuek

2. Memberitahu ibu dirinya adalah ibu yang baik

Hasil : ibu merasa tidak bisa menyusui bayinya dan masih terlihat bingung

3. Memberitahu suami dan keluarga untuk membantu ibu mengurus bayinya, mengerjakan pekerjaan rumah, memberikan dukungan kepada ibu dan menyiapkan keperluan ibu

Hasil : suami dan keluarga siap melakukannya

4. Menganjurkan suami untuk lebih perhatian kepada istri dan lebih sering bercerita kepada istrinya tentang masalah apa yang istri rasakan

Hasil : Suami bersedia melakukannya

5. Mengajarkan ibu teknik relaksasi agar ibu menjadi lebih tenang yaitu menarik nafas lewat hidung dan menghembuskan lewat mulut secara perlahan

Hasil : ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk tidur ketika bayi tidur

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan shampoo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil: Ibu miring kanan dan kiri di atas tempat tidurnya dan sudah bisa jalan ke kamar mandi untuk berkemih

9. Mengajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

10. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil : Ibu menyusui bayinya sesering mungkin dan segera setiap bayinya ingin

11. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karena adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

12. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Hasil : Ibu memilih posisi miring kekanan

13. Memberitahu ibu bahwa akan datang kembali lagi besok untuk memantau dan mendampingi ibu mengurus bayinya

Hasil : Ibu bersedia jika dikunjungi lagi

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN *POST PARTUM*
PADA NY “R” DENGAN *POST PARTUM BLUES* HARI KEDUA
TANGGAL 03 JULI 2018

No Register : 44xxx
Tanggal Partus : 02 Juli 2018 Jam 09.10 WITA
Tanggal Masuk Ruang Nifas : 02 Juli 2018 Jam 11.40 WITA
Tanggal Pengkajian : 03 Juli 2018 Jam 10.30 WITA
Pengkaji : Salmah

Data subjektif (s)

1. Ibu mengatakan masih terganggu dengan bayinya yang rewel dan membuat ibu sulit tidur
2. Nafsu makan ibu sudah mulai membaik, ibu telah makan 2 kali sejak ibu melahirkan namun tidak banyak
3. Ibu masih takut melakukan pergerakan karena luka bekas jahitan
4. Ibu mengatakan menyusui bayinya ketika menangis
5. Ibu telah BAB dan BAK

Data objektif (o)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran : Apatis
3. Ibu masih terlihat murung dan kelelahan

4. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 100/80 MmHg
- b. Nadi : 80x/i
- c. Suhu : 36,9 °C
- d. Pernafasan : 22x/i

5. Pemeriksaan fisik

- a. Mata : kongjungtiva sedikit pucat, sclera putih dan tidak icterus
- b. Wajah : Tidak ada oedema, tidak ada cloasma gravidarum dan tidak ada nyeri tekan
- c. Leher : Tidak ada pembesaraan kelenjar thyroid, limfe dan vena jugularis
- d. Payudara : tampak pengeluaran ASI yang masih sedikit, tidak ada benjolan dan nyeri tekan serta puting susu menonjol
- e. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae lipid, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
- f. Genetalia : Tidak ada varices, tampak pengeluaran lochia rubra, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah, tidak merah dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada oedema, ada nyeri tekan pada perineum
- g. Ekstremitas bawah: simetris kiri dan kanan, tidak ada varises, tidak ada oedema dan refleks kiri dan kanan positif

Assesment (A)

P1A0, *post partum hari kedua dengan post partum blues*

Planning (P)

1. Memberitahu ibu mengenai hasil pemeriksaan

Hasil : ibu mengerti

2. Memberitahu ibu bahwa dirinya adalah ibu yang baik, dimana seorang ibu yang baik akan memberikan kebutuhan anak yaitu menyusui, merawat bayi, menenangkan bayi ketika menangis dan menyayangi bayi

Hasil : Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan dan berjanji akan menyayangi bayinya

3. Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar serta menjelaskan kepada ibu maka akan membuat hubungan ibu dan anak akan terjalin.

Hasil : ibu telah diajarkan teknik menyusui

4. Melakukan *bounding attachment* antara ibu dengan bayinya yaitu dengan menganjurkan ibu untuk melakukan kontak fisik dengan bayinya, seperti pada saat menyusui bayinya anjurkan ibu untuk mengelus kepala bayinya, melihat bayinya (melakukan kontak mata dengan bayinya), sehingga ibu akan beradaptasi dan menyayangi bayinya.

Hasil : Telah dilakukan *bounding attachment* antara ibu dan bayi, yaitu ibu disuruh menggendong bayinya dan mengelus-ngelus kepala bayi

5. Menganjurkan ibu untuk menceritakan segala masalah yang ia miliki kepada kerabat terdekat

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

6. Memberitahu suami dan keluarga untuk membantu ibu mengurus bayinya dan jika telah pulang kerumah tetap membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah agar ibu bisa beristirahat dengan cukup

Hasil : keluarga dan suami mengerti dan bersedia melakukannya

7. Memberitahu ibu untuk selalu berzikir kepada Allah, membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an agar hati ibu menjadi lebih tenang

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

8. Mengajarkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan shampoo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

9. Mengajarkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil: Ibu miring kanan dan kiri di atas tempat tidurnya dan sudah bisa jalan ke kamar mandi untuk berkemih

10. Mengajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

11. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil : Ibu menyusui bayinya sesering mungkin dan segera setiap bayinya ingin

12. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karna adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

13. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Hasil : Ibu memilih posisi miring kekanan

14. Memberitahu ibu bahwa akan datang kembali lagi besok untuk memantau dan mendampingi ibu mengurus bayinya

Hasil : Ibu bersedia jika dikunjungi lagi

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN *POST PARTUM*
PADA NY “R” HARI KETIGA TANGGAL 03 JULI 2018

No Register : 44xxx
Tanggal Partus : 02 Juli 2018 Jam 09.10 WITA
Tanggal Masuk Ruang Nifas : 02 Juli 2018 Jam 11.40 WITA
Tanggal Pengkajian : 04 Juli 2018 Jam 10.30 WITA

Data subjektif (s)

1. Ibu mengatakan mulai bisa beradaptasi dengan bayinya yang rewel, ibu mulai bisa tidur
2. Nafsu makan ibu sudah mulai membaik, ibu telah makan sarapan yang diberikan oleh Rumah sakit.
3. Ibu masih takut melakukan pergerakan karena luka bekas jahitan
4. Ibu mengatakan menyusui bayinya namun ibu merasa air susunya tidak keluar dan tidak cukup untuk bayinya sehingga ibu berencana memberikan susu formula untuk bayi
5. Ibu mengatakan masih bingung untuk menyusui dan mengurus bayinya ketika di rumah
6. Ibu berencana pulang hari ini

Data objektif (o)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Ibu terlihat sedih, khawatir dan takut karena ingin pulang ke rumah
4. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/80 MmHg
 - b. Nadi : 81x/i
 - c. Suhu : 37,1 °C
 - d. Pernafasan : 22x/i
5. Pemeriksaan fisik
 - a. Mata : kongjungtiva sedikit pucat, sclera putih dan tidak icterus
 - b. Wajah : tidak ada oedema, tidak ada cloasma gravidarum dan tidak ada nyeri tekan
 - c. Payudara : tampak pengeluaran ASI yang masih sedikit, tidak ada benjolan dan nyeri tekan serta puting susu menonjol
 - d. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae lipid, TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
 - e. Genetalia : Tidak ada varices, tampak pengeluaran lochia rubra, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah, tidak merah dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada oedema, ada nyeri tekan pada perineum

Assesment (A)

P1A0, *post partum* hari kedua dengan *post partum blues*

Planning (P)

1. Memberitahu mengenai hasil pemeriksaan

Hasil : Ibu mengerti

2. Memberitahu ibu bahwa dirinya adalah ibu yang baik, dimana seorang ibu yang baik akan memberikan kebutuhan anak yaitu menyusui, merawat bayi, menenangkan bayi ketika menangis dan menyayangi bayi

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan dan berjanji akan menyayangi bayinya

3. Mengajarkan kembali kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar serta menjelaskan kepada ibu maka akan membuat hubungan ibu dan anak akan terjalin.

Hasil : ibu telah diajarkan teknik menyusui

4. Melakukan kembali *bounding attachment* antara ibu dengan bayinya yaitu dengan menganjurkan ibu untuk melakukan kontak fisik dengan bayinya, seperti pada saat menyusui bayinya anjurkan ibu untuk mengelus kepada bayinya, melihat bayinya (melakukan kontak mata dengan bayinya), sehingga ibu akan beradaptasi dan menyayangi bayinya.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

5. Memberitahu ibu dan suami untuk tidak memberikan susu formula kepada bayi dan menganjurkan ibu menyusui sampai usia 6 bulan

Hasil : ibu dan suami berjanji tidak akan memberikan susu formula pada bayi sampai usia 6 bulan

6. Mengajukan ibu untuk menceritakan segala masalah yang ia miliki kepada kerabat terdekat atau dengan suami di rumah jika memang ada masalah selama ini yang ibu miliki

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

7. Memberitahu ibu untuk selalu berzikir kepada Allah, membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an agar hati ibu menjadi lebih tenang

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

8. Mengajukan kepada suami untuk melaksanakan solat di masjid dan lebih memahami kebutuhan istri serta membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah sehingga ibu bisa mendapatkan istirahat cukup

Hasil : suami berjanji akan melakukannya

9. Mengajukan ibu untuk melakukan mobilisasi dini dan memberitahu ibu jangan takut untuk melakukan pergerakan karena dengan bergerak membuat proses penyembuhan lebih cepat

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

10. Mengajukan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan shampoo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

11. Mengajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

12. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil : Ibu menyusui bayinya sesering mungkin dan segera setiap bayinya ingin

13. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karna adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

14. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Hasil : Ibu memilih posisi miring kekanan

15. Mengajarkan ibu cara memandikan bayi

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

16. Mengajarkan ibu cara perawatan tali pusat bayi yaitu tali pusat jangan sampai ditutupi popok, jangan memberikan apapun pada tali pusat. Tali pusat dibiarkan terbuka agar cepat kering

Hasil : Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

17. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah untuk memantau perkembangan kesehatan ibu pada tanggal 07 Juli 2018 (6 hari setelah persalinan)

Hasil : Ibu awalnya untuk dilakukan kunjungan rumah, namun orang tua ibu membujuk dan ibu menjelaskan alamat rumahnya,memberikan nomer hpnya dan ibu bersedia dilakukannya kunjungan rumah



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
PADA NY “R” HARI KEENAM TANGGAL 07 JULI**

Hari/tanggal : Sabtu, 07 Juli Jam 15.30 WITA

Tempat : Rumah Ny “R”

Nama pengkaji : Salmah

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ASInya sudah lancar
2. Ibu mengatakan nyeri pada luka jahitannya masih terasa namun agak berkurang
3. Ibu mengatakan ibu mertuanya membantu ia mengurus bayinya jika rewel
4. Ibu mulai bisa beradaptasi dengan kondisinya sekarang dan mulai menikmati peran barunya menjadi seorang ibu
5. Ibu merasakan perih jika buang air kecil
6. Ada pengeluaran darah pada jalan lahir
7. Ibu mengatakan bayinya tidur dengan nyenyak dan aktif menyusui
8. Ibu sudah sering BAB

Data Objektif (O)

1. Ekspresi wajah ibu tampak bahagia
2. Keadaan umum baik
3. Keluar ASI saat puting susu dipencet
4. TFU pertengahan simpisis pusat, kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. Luka perineum masih basah
6. Kandung kemih kosong

7. Pengeluaran lochia sanguilenta

8. Tanda-tanda vital

a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg

b. Nadi : 82 kali/ menit

c. Suhu : 36,5 °C

d. Pernafasan : 20 kali/ menit

Assessment (A)

Pl A0, *post partum* hari keenam, dengan sedikit nyeri luka perineum, ibu mulai bisa beradaptasi dengan peran barunya

Planning (P)

Tanggal 07 Juli 2018 Jam 16.00 WITA

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan bayi dalam keadaan sehat

Hasil : Ibu mengerti dan merasa senang

2. Memberitahu ibu mertua ibu untuk tetap membantu ibu merawat bayinya

Hasil ; ibu mertua mengerti atas penjelasan yang diberikan

3. Menganjurkan ibu untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Allah SWT agar hatinya menjadi tenang, seperti solat 5 waktu, membaca Al-Quran dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk selalu memperhatikan kebersihan diri, dan genetaliaanya mengganti pembalut bila merasa lembab, dan senantiasa mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk ibu menyusui

Hasil : Ibu bersedia untuk melakukan anjuran yang diberikan

5. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand):
Ibu menyusui bayinya sesering mungkin dan segera setiap bayinya ingin

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumahnya terutama tempat tidur bayinya

Hasil : Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

7. Mengajarkan kembali teknik menyusui yang baik dan benar

Hasil : Ibu menyusui seperti yang diajarkan

8. Menjelaskan pada ibu tentang perawatan payudara yaitu membersihkan tiap kali mandi

Hasil : Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

9. Menganjurkan kembali pada ibu untuk melakukan teknik relaksasi apabila masih merasa nyeri pada luka jahitannya

Hasil : Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikandan

10. Mengajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

11. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah untuk memantau kesehatan ibu dan bayinya yaitu tanggal 15 Juli 2018

Hasil : Ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
PADA NY “R” HARI KE-14 TANGGAL 15 JULI 2018**

Hari/tanggal : Minggu 15 Juli 2018 Jam 14.00 WITA

Tempat : Rumah Ny “R”

Pengkaji : Salmah

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan keadaanya sudah agak membaik sudah menikmati perannya menjadi ibu
2. Nyeri yang dirasakan sudah berkurang dari sebelumnya
3. ASI sudah lancar dan banyak
4. Bayi sering menetek
5. Bayi tidak rewel dan tidur nyenyak
6. Ada pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna merah dan berlendir

Data *Objektif* (O)

1. Ekspresi ibu tampak ceria
2. Payudara banyak mengeluarkan ASI
3. TFU tidak teraba
4. Kandung kemih kosong
5. Luka perineum tampak lebih kering dari sebelumnya
6. Pengeluaran lochia serosa

7. Mengukur tanda-tanda vital

- a. Tekanan Darah : 120/90 mmHg
- b. Nadi : 82 kali/ menit
- c. Suhu : 36,5 °C
- d. Pernafasan : 20 kali/ menit

8. Bayi kuat menetek, refleks menghisap dan menelan pada bayi baik

Assessment (A)

Pll A0, post partum 2 minggu, dengan keadaan umum baik

Planning (P)

Tanggal 15 Juli Jam 15.00 WITA

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ibu dalam keadaan sehat

Hasil : Ibu mengerti dan merasa senang

2. Memotivasi ibu agar selalu memberikan ASI pada bayinya tanpa diselingi susu formula atau makanan tambahan lainnya

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukannya

3. Meminta ibu untuk mengisi lembar *Edinburgh post natal depression (EPDS)*

Hasil : ibu tidak memiliki tanda dan gejala depresi post partum dengan total nilai : 9 dimana hasil dari *EPDS* jika nilai >10 menunjukkan tidak ada gejala

depresi *post partum* dan jika nilai >10 maka menunjukkan ibu terkena depresi *post partum* (dapat dilihat pada lampiran).

4. Memberitahu ibu tentang keuntungan ASI eksklusif yaitu sebagai imunitas bayi, bayi tidak mudah sakit, meningkatkan kecerdasan, membentuk ikatan batin antara ibu dan anak, mudah didapat, kandungan gizinya tidak disamakan dengan susu formula lainnya, serta mempercepat pemulihan Rahim

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia memberikan ASI eksklusif pada bayinya

5. Menganjurkan kembali pada ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya dan bayinya serta lingkungan sekitarnya

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi jika bayi berusia 1 bulan

Hasil : ibu bersedia membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi

Memberitahu ibu untuk tidak melakukan hubungan suami istri sebelum masa nifas selesai yaitu 40 hari karena dapat membuat darah yang masih keluar masuk ke vagina ibu yang dapat menyebabkan penyakit

Hasil : Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

7. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah yang terakhir untuk mengetahui dan memantau kesehatan ibu pada tanggal 29 Juli 2018

Hasil : Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
PADA NY “R” HARI KE-28 TANGGAL 29 JULI**

Hari/tanggal : Minggu, 29 Juli Juni 2018 Jam 15.40 WITA

Tempat : Rumah Ny “R”

Pengkaji : Salmah

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dialami sekarang
2. Ada pengeluaran darah yang berwarna kuning dari jalan lahir
3. Ibu sudah aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah

Data Objektif (O)

2. Ekspresi ibu tampak ceria
3. Payudara banyak mengeluarkan ASI
4. TFU tidak teraba
5. Kandung kemih kosong
6. Luka perineum sudah kering
7. Pengeluaran lokhia alba
8. Mengukur tanda-tanda vital
 - a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg
 - b. Nadi : 82 kali/ menit
 - c. Suhu : 36,5 °C
 - d. Pernafasan : 20 kali/ menit

9. Bayi kuat menetek, refleks menghisap dan menelan pada bayi baik
10. Suami sekarang sudah sering membantu ibu mengurus bayi dan mengerjakan pekerjaan rumah jika tidak sibuk
11. Ibu segera menceritakan jika ada masalah yang ia miliki atau jika ada hal yang tidak ia sukai baik dari suami maupun dari ipar-iparnya serta orang lain.

Assessment (A)

Pll A0, *post partum* 6 minggu, dengan keadaan umum baik

Planning (P)

Tanggal 29 Juli 2018 Jam 16.10 WITA

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu, bahwa ibu dalam kondisi baik
 Hasil : Ibu merasa senang dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan
2. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya dan bayinya:
 Hasil : Ibu bersedia melakukannya
3. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan apapun, dan setelah bayi berusia 6 bulan menganjurkan ibu untuk memberikan makanan pendamping ASI, tetapi tetap memberikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun
 Hasil : Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan
4. Menganjurkan kepada ibu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT agar hatinya menjadi lebih tenang dan sabar menghadapi segala masalah yang dihadapinya
 Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Memberi tahu suami untuk selalu membantu ibu mengurus bayi dan jika ada waktu mengajak ibu beserta keluarga untuk liburan

Hasil : Suami ibu mengerti

6. Menjelaskan kepada ibu jenis kontrasepsi yang tidak mengganggu proses menyusui

Hasil : Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

7. Menganjurkan ibu untuk datang ke Puskesmas apabila usia bayinya genap 1 bulan yaitu tanggal 02 Agustus 2018

Hasil : Ibu bersedia untuk ke Puskesmas untuk imunisasi bayinya

8. Menganjurkan ibu untuk tidak menyimpan segala masalah yang ia alami, ceritakan kepada orang terdekat dan merasa tertekan dan selalu bersyukur

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

BAB IV

PEMBAHASAN

Studi kasus ini dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf selama 28 hari pada tanggal 02-29 Juli. Tiga kali asuhan selama di Rumah sakit dan 3 kali di rumah pasien. Berikut penulis akan membahas berdasarkan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 langkah Varney dengan uraian sebagai berikut :

1. Identifikasi Data Dasar

Langkah satu bertujuan untuk mengumpulkan data objektif dan data subjektif. Pada studi kasus Ny”R” hasil anamnesis pada hari pertama yaitu tanggal 02 Juli 2018 didapatkan bahwa ibu merasa terganggu dengan bayinya yang rewel sehingga ibu kurang nafsu makan dan susah tidur. Selain itu juga, didapatkan bahwa ibu memang dari awal tidak merencanakan kehamilannya karena kondisi tempat tinggal. Ibu tinggal di tengah pegunungan dimana ibu hanya mempunyai 2 orang tetangga. Menurut (Chasanah, 2016) penyebab lain *post partum blues* selain usia persalinan dibawah usia 20 tahun adalah kesiapan remaja dalam perubahan perannya sebagai ibu, antara lain: kesiapan fisik, mental, finansial dan social. Ibu menyusui bayinya, namun tidak memperdulikan jika bayinya menangis dan tidak seperti pada ibu pada umumnya yang menyayangi dan memperhatikan bayinya

Sehari-hari ibu mengatakan sering ke kebun membantu suami menanam sayur dan juga membereskan rumah serta mencuci pakaian. Ibu tinggal bersama kedua mertuanya dan dua orang ipar laki-lakinya. Pada saat pemeriksaan kehamilan ibu mengatakan lebih banyak melakukan pemeriksaan kehamilan

sendiri daripada ditemani suaminya. Bahkan, ibu mengatakan tidak pernah ditemani oleh suaminya dan hanya satu kali ditemani oleh mertuanya. Hal ini merupakan juga salah satu penyebab ibu mengalami *post partum blues* karena ibu cenderung dibiarkan melakukan hal apapun dengan sendirinya tanpa bantuan dari suaminya.

Tingkat pendidikan ibu juga dapat menyebabkan salah satu faktor ibu terkena *post partum blues*, dimana pada data subjektif didapatkan ibu memiliki pendidikan terakhir yaitu SMP dan suami SD. Hal ini bisa membuat ibu kekurangan informasi dan edukasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2014) bahwa hasil penelitian berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak yang mengalami postpartum blues adalah SD - SMP, yaitu 12 responden (54,5%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan yang tinggi.

Pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan kesiapan seorang ibu dalam menjalani kehamilan dan persalinan. Hal ini sejalan dengan Latipun (2008) yang mengatakan bahwa pendidikan seseorang akan mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang terhadap diri dan lingkungannya karena itu akan berbeda sikap responden yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dibandingkan yang berpendidikan rendah dalam menyikapi proses selama persalinan.

Hal ini sejalan dengan teori yang ada yang mengatakan bahwa dukungan suami adalah faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya *post*

partum blues. Dukungan suami sangat diperlukan, karena ibu tidak akan merasa beban dengan apa yang terjadi pada dirinya, baik dukungan saat hamil, saat bersalin maupun masa nifas. Perhatian suami, komunikasi yang dijalin, sikap dan perilaku suami dalam membantu ibu baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas akan mempengaruhi kondisi ibu (Desfanita, 2015).

Setelah anamnesa dilakukannya pemeriksaan fisik pada ibu, dimana didapatkan tekanan darah ibu turun, terdapat luka jahitan sebanyak 6 (rupture perineum tingkat 2), kontraksi uterus baik dan kongjungtiva pucat diakibatkan susah tidur. Ibu sangat cuek saat dilakukan anamnesa. Ibu cenderung menyuruh suaminya menjawab dan merasa terganggu. Ibu terlihat menyusui bayinya, namun ketika bayi menagis ibu tidak memperhatikan anaknya dan mertua yang membantu menenangkan bayi. Ibu terlihat sedih dan murung.

Ibu takut melakukan pergerakan karena takut luka jahitannya terlepas.

Menurut teori yang ada bahwa salah satu faktor yang membuat ibu cemas dan menyebabkan terjadinya *post partum blues*. Perubahan fisik yang dialami ibu yaitu rasa kram dan mules dibagian bawah perut akibat penciutan rahim (involutio), keluarnya sisa-sisa darah dari vagina (*lochea*), kelelahan karena proses melahirkan, pembentukan ASI sehingga payudara membesar dan perlukaan jalan lahir (Walyani, 2015: 3). *Post partum blues* yang disebabkan oleh faktor ketidaknyamanan fisik yang dialami sehingga menimbulkan perasaan emosi pada wanita pasca melahirkan, seperti rasa sakit akibat luka jahit, pengalaman persalinan yang kurang menyenangkan, atau bengkak pada payudara.

Selain itu penyebab *post partum blues* bisa disebabkan oleh faktor hormonal yaitu berupa perubahan kadar estrogen, progesterone, proklatine, serta estriol terlalu rendah. Kadar estrogen turun secara tajam setelah melahirkan dan ternyata estrogen memiliki efek supresi aktivitas non adrenalin maupun serotonin yang berperan dalam suasana hati dan kejadian depresi (Arfian, 2012 : 3). Hal ini, sejalan dengan teori yang ada bahwa ibu lelah setelah melahirkan dan terjadi penurunan hormon estrogen dan jahitan yang ibu dapatkan membuat ibu cemas dan takut melakukan pergerakan.

Pada hari kedua kunjungan pada ibu di RSUD Syekh Yusuf yaitu pada tanggal 03 Juli 2018 dari hasil anamnesa didapatkan bahwa ibu belum bisa beradaptasi dengan status barunya yaitu sebagai seorang ibu. Ibu masih terganggu dengan bayinya yang rewel. Namun ibu mengatakan tetap menyusui bayinya. Ibu masih takut melakukan pergerakan karena takut luka jahitan terlepas. Ibu sudah mulai bisa tidur dan nafsu makan ibu sudah mulai sedikit membaik.

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah ibu masih rendah yaitu 100/80 mmHg dan kontraksi uterus baik. Pada luka jahitan tidak merah dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Menurut teori yang ada pada hari pertama sampai kedua merupakan masa *taking in* dimana pada masa ini ibu cenderung memperhatikan dirinya sendiri dan pasif terhadap lingkungan. Fase ini merupakan periode ketergantungan, yang berlangsung dari hari pertama sampai hari ke dua setelah melahirkan. Pada fase ini ibu lebih cenderung memperhatikan dirinya dan

pasif terhadap lingkungannya. Hal tersebut dikarenakan ketidaknyamanan yang dirasakan ibu seperti luka jahitan, kelelahan, kurang tidur dan rasa mules.

Hal yang perlu diperhatikan pada fase ini yaitu banyak istirahat, asupan nutrisi yang cukup dan komunikasi yang baik (Nugroho, 2014 : 116). Gangguan psikologis yang mungkin dirasakan oleh ibu pada fase *taking in* menurut Walyani (2015 : 79-80) ada 4 yaitu kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan tentang bayinya misal jenis kelamin tertentu, warna kulit, jenis kulit, jenis rambut dan lainnya, rasa bersalah karena belum menyusui bayinya, ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan fisik yang dialami ibu misal rasa mules karena Rahim berkontraksi untuk kembali pada keadaan semula, payudara bengkak, dan nyeri luka jahitan dan suami atau keluarga yang mengkritik ibu tentang cara merawat bayi dan cenderung melihat saja tanpa membantu. Ibu akan merasa tidak nyaman karena hal tersebut bukan hanya tanggung jawab ibu semata.

Hari ketiga kunjungan di rumah sakit yaitu tanggal 04 Juli 2018 ibu mengatakan bahwa nafsu makan ibu mulai membaik, ibu mulai terbiasa dengan bayinya yang rewel. Ibu masih takut melakukan pergerakan. Ibu khawatir karena air susunya yang keluar sedikit. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tekanan darah ibu mulai membaik namun belum normal yaitu 110/80 mmHg (karena biasanya ibu mengatakan tekanan darahnya 120/90 mmHg), tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka jahitan dan payudara tidak terjadi bendungan ASI. Respon ibu saat ditanya sudah baik, ibu tidak cuek lagi saat ditanya.

Pada tinjauan pustaka juga dijelaskan bahwa hari 3-10 hari pasca melahirkan merupakan *taking hold*. Pada fase ini, ibu merasa khawatir tidak dapat merawat bayinya, ibu berupaya menguasai keterampilan perawatan bayinya. Perasaan ibu yang sensitif sehingga mudah merasa tersinggung. Ibu memerlukan dukungan dari keluarga maupun suami pada fase ini, karena pada fase ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya sehingga tumbuh rasa percaya diri (Nurjanah, 2013 : 76).

Pada kunjungan rumah di rumah pasien yaitu tanggal 07 Juli 2018 pada anamnesis ibu mengatakan bahwa mulai beradaptasi dengan bayinya, ibu mulai mengurus dan merawat bayinya. Ibu juga memberikan ASI kepada bayinya tanpa susu formula. Ibu mengatakan mulai menceritakan hal-hal yang menjadi kendala bagi dirinya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tekanan darah ibu mulai kembali normal yaitu 120/90 mmHg. Luka jahitan ibu tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi, tidak merah dan tidak berbau.

Pada kunjungan kedua dirumah ibu yaitu tanggal 15 Juli 2018, ibu mengatakan keadaannya sudah agak membaik dan telah menikmati perannya sebagai orang tua. Nyeri yang dirasakan ibu juga mulai berkurang. Bayi telah jarang menetek dan ASI ibu telah lancar. Dari hasil pemeriksaan tekanan darah ibu mulai normal yaitu 120/90 mmHg. Luka perineum sudah tampak lebih kering dari sebelumnya, tidak ada tanda-tanda infeksi, TFU tidak teraba dan terdapat

pengeluaran lochia serosa. Ekspresi ibu juga sudah tampak ceria dan menikmati perannya sebagai ibu.

Pada kunjungan terakhir pada tanggal 29 Juli 2018 Ibu mengatakan sudah tidak ada keluhan, ibu telah aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dan terdapat pengeluaran darah yang berwarna kuning dari jalan lahir. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah ibu normal yaitu 120/80 mmHg, luka perineum sudah kering, bayi kuat menetek, TFU sudah tidak teraba dan terdapat pengeluaran lochia alba. Suami sudah sering membantu ibu mengurus bayi dan mengerjakan pekerjaan rumah.

Adapun uraian *post partum blues* yang disebabkan oleh faktor keadaan bayi saat lahir yaitu keadaan bayi saat lahir juga berpengaruh pada ibu yang terkena *post partum blues*. Keadaan bayi yang cacat atau jenis kelamin yang tidak diinginkan membuat ibu sulit menerima keadaan bayinya. Menurut penelitian Susanti (2017) dari 31 ibu yang melahirkan dan memenuhi kriteria, terdapat 17 ibu (54,48%) mengalami *post partum blues* yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, pengalaman kehamilan dan persalinan sebesar 38,71%, dukungan sosial 19,53%, keadaan bayi saat lahir 16,13%.

Berdasarkan studi kasus pada Ny "R" dengan *post partum blues* ditemukan bahwa ibu terlihat kurang bahagia saat melahirkan, bersifat cuek pada bayinya pada minggu pertama pasca melahirkan hal tersebut dikarena ibu pada saat hamil tidak didampingi saat melakukan pemeriksaan kehamilan, selain itu juga ibu belum siap untuk memiliki anak karena kondisi ekonomi yaitu tempat

tinggal dan juga ibu sempat kecewa dengan jenis kelamin bayinya. Selain itu juga hal lain yang mendasari ibu terkena *post partum blues* yaitu ketidaknyamanan fisik yang ibu rasakan, adaptasi baru menjadi seorang ibu dan penurunan hormon. Hal ini sesuai dengan teori faktor *post partum blues* yaitu jenis kelamin bayi, perubahan hormone, ketidaknyamanan fisik, kondisi ekonomi dan persiapan kehamilan merupakan salah satu faktor terjadinya *post partum blues*. Sehingga apa yang dijelaskan pada tinjauan pustaka dengan studi tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

2. Identifikasi Diagnosa/Masalah aktual

Langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam menegakkan suatu diagnosa atau masalah klien, harus berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif dari hasil pengkajian. Dalam tinjauan pustaka dijelaskan bahwa. Dalam tinjauan pustaka dijelaskan bahwa terjadinya *post partum blues* karena ketidaknyaman fisik, kondisi bayi saat lahir, penurunan hormone, kondisi ekonomi, dan usia yang terlalu muda dan terlalu tua.

Pada *kasus post partum blues* masalah yang biasa timbul bisa saja terjadi tanda bahaya pada ibu seperti gizi buruk, tekanan darah rendah, bendungan ASI yang akan berlanjut terjadinya abses payudara dan mastitis. Selain itu, juga masalah yang bisa timbul jika ibu tidak segera ditangani maka akan terjadi depresi

post partum dimana ibu memperlihatkan tanda ingin membunuh bayinya maupun dirinya sendiri.

Sedangkan studi kasus Ny “R” terjadi penurunan tekanan darah pada ibu karena ibu sulit tidur dan tidak nafsu makan. Hal ini sejalan dengan teori yang ada sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

3. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa *post partum blues* kemungkinan dapat terjadi depresi *post partum* apabila tidak ditangani dengan baik. Pada bab III kasus Ny. “R” komplikasi yang disebutkan pada bab II tidak terjadi pada Ny.”R”. Pasien masih mengalami *post partum blues* dan belum mengalami bendungan payudara, mastitis hingga timbul perasaan ingin membunuh bayi ataupun mengakhiri hidupnya sendiri yang dimana pada tahap ini disebut dengan depresi *post partum*.

Asuhan yang diberikan pada Ny. “R” yaitu berupa dukungan psikologis yang dimana dilakukan oleh peneliti, suami dan keluarga. Selain itu, dilakukan perbaikan keadaan umum, cara mencegah infeksi pada luka jahitan, cara menyusui yang benar, dan adaptasi menjadi seorang ibu. Jika depresi *post partum* terjadi maka peneliti akan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kejiwaan. Jika bendungan payudara atau mastitis yang terjadi maka asuhan yang diberikan berupa asuhan pada kasus mastitis pada umumnya.

4. Tindakan Segera/Kolaborasi

Kasus *post partum blues* diperlukan adanya tindakan segera dan atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain jika ibu menunjukkan tanda bunuh diri atau ingin membunuh bayinya atau terjadi masalah lainnya seperti bendungan ASI, mastitis dan abses payudara. Namun pada kasus Ny."R" ibu tidak memperlihatkan tanda-tanda untuk membunuh bayinya atau mengakhiri hidupnya, sehingga tidak perlu dilakukannya tindakan segera. Ny."R" hanya diberikan dukungan psikologis berupa dukungan suami dan keluarga, perbaikan keadaan umum pasca melahirkan dan adaptasi menjadi ibu baru. suami dan keluarga tidak cukup dalam penanganan *post partum blues* ibu juga dianjurkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

5. Rencana Tindakan Asuhan

Pada kasus *post partum blues* asuhan yang dilakukan yaitu berupa pendekatan spiritual dan pendekatan medis. Berdasarkan hasil penelitian Azizah (2016), terdapat perbedaan antara kelompok ibu yang diberikan terapi Al-Quran dengan kelompok yang tidak diberikan terapi Al-Quran. Kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan terapi mendengar Al- Qur'an hasil yang didapat 1 orang (6,7%) tidak mengalami *post partum blues*, 9 orang (60%) mengalami *post partum blues* ringan, 4 orang (26,7%) mengalami *post partum blues* sedang, dan 1 orang lainnya (6,7%) dari *post partum blues* berat. Penelitian di atas menunjukkan bahwa terapi mendengarkan Al Qur'an sangat membantu ibu nifas dalam mencegah konstruksi *post partum blues*. Salah satu diantara sekian banyak

mukjizat Al-Qur'an yang sudah terbukti sejak diturunkannya hingga saat ini adalah bisa menjadi penyembuh, termasuk penyembuh hati.

Menurut Marni (2014) dalam Pratama (2016) terdapat 3 penanganan *post partum blues* yaitu komunikasi terapeutik yang bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara bidan dengan pasien dalam rangka dalam rangka kesembuhan klien dengan cara mendorong pasien mampu meredakan segala ketegangan emosinya dan dapat memahami dirinya sendiri. Yang kedua yaitu peningkatan *support* mental yang dapat dilakukan oleh keluarga pasien diantaranya yaitu meminta suami untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu mengurus bayinya dan menyiapkan susu, memanggil nenek atau keluarga bayi agar bisa menemani ibu dalam menghadapi kesibukan merawat bayi, suami lebih perhatian terhadap istri dan permasalahan yang dihadapi istrinya, menyiapkan mental dalam menghadapi kelahiran anaknya, suami menggantikan peran istri ketika istri kelelahan dan memperbanyak dukungan dan menemani istri dalam mengurus anaknya dan ibu dianjurkan sering berkumpul dengan teman-teman terdekat atau keluarga. Selanjutnya yaitu dilakukan pada diri klien sendiri yaitu dengan cara anjurkan ibu belajar tenang dengan menarik nafas panjang, tidur ketika bayi tidur, berolahraga ringan, ikhlas dan tulus dengan peran baru sebagai ibu. Bicarakan rasa cemas dan komunikasikan masalah yang ada, bersifat fleksibel dan bergabung dengan kelompok-kelompok ibu baru.

Studi kasus pada Ny'R' dengan *post partum blues*, penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan

masalah potensial yaitu observasi tanda-tanda vital, anjurkan ibu istirahat yang cukup, tidur ketika bayi tidur, anjurkan ibu makan-makanan yang bergizi, memberikan dukungan kepada ibu, menganjurkan kepada ibu untuk membaca Al-Quran agar hatinya menjadi lebih tenang.

Menganjurkan suami dan keluarga membantu ibu mengurus bayinya, mengajarkan ibu teknik relaksasi, anjurkan ibu untuk mobilisasi dini, berikan penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut dan pakaian bila basah/kotor, jelaskan penyebab nyeri, anjurkan ibu untuk sering menyusui bayinya, dan penatalaksanaan pemberian antibiotik, analgetik dan vitamin.

Dari rencana asuhan kebidanan yang telah diberikan, pada kasus ini ada kesesuaian antara teori dengan kasus yang ada pada Ny."R".

6. Implementasi Asuhan Kebidanan

Pada studi kasus Ny."R" dengan *post partum blues*, semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan diruang nifas di RSUD Syekh Yusuf terkhusus kepada kepala ruang nifas yang telah banyak membantu dan memberikan arahan.

Penjelasan telah disampaikan bahwa kondisi ibu saat ini baik, hasil didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, ibu sudah bisa beradaptasi dengan dengan peran barunya sebagai seorang ibu, ibu menyusui bayinya secara *on-demand*, kontraksi uterus ibu

baik teraba bundar dan keras, sehingga dapat mencegah terjadinya perdarahan *post partum* yang diakibatkan dari atonia uteri. Nafsu makan ibu yang berkurang dan sulit tidur pada hari pertama dan kedua pasca melahirkan merupakan proses adaptasi ibu menjadi seorang ibu, ketidaknyamanan ibu karena adanya luka jahitan yang membuat ibu takut melakukan pergerakan dan juga ada beberapa masalah internal ibu yang berkaitan dengan suami.

Sesuai kasus Ny."R" asuhan yang diberikan kepada ibu sesuai dengan uraian langkah kelima. Hari pertama pasca melahirkan ibu memang berada pada tahap *taking in* dimana menurut Reva Rubin, pada tahap ini ibu cenderung pasif terhadap lingkungannya dan fokus kepada dirinya sendiri. Apalagi, pada kasus ibu memang memiliki riwayat psikososial yang kurang baik dan persiapan kehamilan yang belum siap. Asuhan yang diberikan kepada ibu pada hari pertama yaitu berupa pendekatan terapeutik kepada ibu, menjelaskan kondisi fisik yang dialami ibu, melakukan kontak batin antara ibu dan bayinya dengan menyusui, menganjurkan ibu untuk sering mengelus dan memandang bayinya.

Asuhan lain yang diberikan kepada ibu yaitu pendekatan secara spiritual menganjurkan ibu untuk mendengarkan dan membaca ayat suci Al-Quran agar hati ibu menjadi lebih tenang. Selain dukungan psikologis pada asuhan ibu *post partum blues* juga dilakukan pendekatan spiritual. Ibu dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Qur'an agar hatinya menjadi lebih tenang.

Berdasarkan hasil penelitian Azizah (2016), terdapat perbedaan antara kelompok ibu yang diberikan terapi Al-Quran dengan kelompok yang tidak

diberikan terapi Al-Quran. Kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan terapi mendengar Al- Qur'an hasil yang didapat 1 orang (6,7%) tidak mengalami *post partum blues*, 9 orang (60%) mengalami *post partum blues*. Salah satu diantara sekian banyak mukjizat Al-Qur'an yang sudah terbukti sejak diturunkannya hingga saat ini adalah bisa menjadi penyembuh, termasuk penyembuh hati.

Hari pertama ibu masih memiliki nafsu makan dan sulit tidur, ibu juga masih masih enggan menenangkan bayinya ketika menangis, walaupun ibu tetap memberikan ASI kepada bayinya. Hari kedua ibu mulai memiliki nafsu makan dan masih cuek terhadap bayinya. Asuhan yang diberikan pada ibu yaitu berupa teknik menyusui yang baik dan benar, melakukan *bounding attachment* antara ibu dan bayi, menganjurkan ibu untuk menceritakan segala masalah yang ia miliki kepada kerabat terdekat atau kepada suami. Menganjurkan suami dan keluarga untuk membantu ibu mengurus bayinya, menganjurkan ibu untuk tidur ketika bayinya tidur dan menganjurkan ibu untuk senantiasa berzikir, mendengarkan dan membaca ayat suci Al-Qur'an agar hati ibu menjadi tenang.

Kondisi ibu pada hari ketiga *post partum* ibu mulai terbiasa dengan bayinya yang rewel, ibu juga mulai menenangkan bayi jika menangis. Tekanan darah ibu juga mulai membaik. Nafsu makan ibu mulai baik dan ibu juga mulai bisa tidur, jika bayinya tidur. Asuhan yang diberikan kepada ibu yaitu cara memandikan bayi ketika di rumah, menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya, khususnya kepada suami untuk lebih memberikan perhatian lebih kepada istri, membantu ibu

mengurus bayi dan pekerjaan rumah, ibu dianjurkan untuk tidak *stress* dan lebih terbuka kepada suami dengan masalah yang ia miliki. Mengajarkan ibu untuk sabar, berzikir, mendengarkan dan membaca ayat suci Al-Qur'an ibu merasa lebih tenang.

Hari keenam pasca melahirkan kondisi ibu sudah baik, ibu terlihat bahagia mengurus bayinya, tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka jahitan. Asuhan yang diberikan yaitu ibu dianjurkan menjaga kebersihan organ genitum makan bergizi, melihat cara ibu menyusui apakah sudah benar. Ibu juga tetap di ingatkan untuk tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan secara *on-demand* tanpa makanan pendamping lainnya. Mengajarkan ibu untuk mendekatkan diri dengan Allah jika ibu merasa lelah mengurus bayi dan pekerjaan rumah dengan membaca Al-Qur'an, solat, serta berzikir.

Kondisi ibu pada minggu kedua pasca melahirkan kondisi ibu dalam keadaan baik-baik saja tidak ada masalah yang ibu alami. Bayi dalam keadaan baik-baik saja. Kunjungan minggu kedua ibu diberikan pertanyaan untuk mendeteksi apakah ibu berpotensi terkena depresi *post partum*. Hasil *score* yang didapatkan tidak menunjukkan tanda depresi *post partum*. Pada minggu kedua ibu dianjurkan untuk tetap menyusui bayinya, untuk tidak tertekan mengurus bayinya, ibu dianjurkan tidur ketika bayi telah tidur dan anjurkan ibu untuk menceritakan masalah apapun yang ia alami kepada suami agar bisa diselesaikan dengan baik.

Kondisi psikologi ibu pada kunjungan terakhir, yaitu tanggal 29 Juli 2018 ibu dalam keadaan baik-baik saja dan hubungan ibu dengan suami dan keluarga

lainnya dalam keadaan baik-baik saja. Asuhan yang diberikan kepada ibu berupa imunisasi dasar pada bayi. Anjurkan ibu untuk membawa bayinya ke Puskesmas untuk diberikan imunisasi pada bayi. Ibu dianjurkan untuk tetap sabar dan bersyukur dengan segala yang ia miliki.

Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan telah mengarah pada kebutuhan pasien

7. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi : Ibu menyusui bayinya secara *on-demand*, mulai menyayangi bayinya, nafsu makan bertambah, tidak ada infeksi luka jahitan yang membuat kondisi psikologi ibu memburuk, ibu mulai terbuka kepada suami dan menceritakan segala permasalahan yang ada. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny”R” secara garis besar tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus. Kunjungan yang dilakukan pada Ny.”R” yaitu sebanyak 6 kali. kunjungan dilakukan sebanyak tiga kali selama di rumah sakit dan 3 kali kunjungan selama dirumah.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny”R” dengan *post partum blues* di RSUD Syekh Yusuf, maka bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Data subjektif didapatkan ibu sulit tidur, tidak nafsu makan, enggan menenangkan bayinya, enggan mengurus bayinya selama 3 hari. Ibu mengatakan bahwa kehamilannya memang bukan kehamilan yang direncanakan. Dimana pada data objektif didapatkan ibu terlihat cuek saat dilakukan anamnesa, tekanan darah ibu rendah dan juga ibu memang sering melakukan pemeriksaan kehamilan sendiri. Kunjungan ke tiga yang dilakukan di rumah ibu, ibu mengatakan sudah menikmati peran barunya menjadi seorang ibu dan dari hasil data objektif keadaan ibu baik, terlihat bahagia dan keadaan bayi baik-baik saja.
2. Diagnosa yang ditegakkan pada Ny.”R” berdasarkan dari data subjektif dan objektif yang didapatkan pada langkah 1. Data subjektif didapatkan ibu tidak nafsu makan, sulit tidur, enggan menenangkan bayinya sesuai dengan tanda dan gejala *post partum blues*. Data objektif juga didapatkan bahwa tekanan darah ibu turun akibat kurang tidur dan ibu terlihat cuek pada bayinya dan juga tidak senang dilakukannya pemeriksaan. Dari data subjktif dan objektif yang

didapatkan pada Ny. "R" maka dapat ditegakkan diagnosa bahwa ibu terkena *post partum blues*.

3. Perumusan masalah potensial pada Ny "R" dengan *post partum blues* di RSUD Syekh Yusuf, berpotensi terjadinya depresi *post partum*, bendungan payudara yang akan berlanjut kepada mastitis, anemia dan juga berdampak pada bayi yang akan kekurangan nutrisi dan kasih sayang seorang ibu. Namun masalah potensial itu tidak akan terjadi apabila penanganan lebih cepat. Kasus yang didapatkan pada Ny."R" tidak didapatkan tanda-tanda terjadinya masalah potensial.
4. Hasil identifikasi tidak didapatkan data perlunya tindakan segera/kolaborasi pada Ny "R" dengan *post partum blues* di RSUD Syekh Yusuf, dengan hasil bahwa kasus ini tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera. Tindakan segera/kolaborasi pada kasus Ny."R" dapat dilakukan jika ibu memperlihatkan tanda ingin membunuh bayinya atau dirinya sendiri.
5. Hasil rencana tindakan asuhan kebidanan telah disusun pada Ny "R" dengan *post partum blues* di RSUD Syekh Yusuf, dengan hasil susunan asuhan berdasarkan diagnosa aktual atau masalah potensial yang dapat terjadi. Rencana tindakan yang dilakukan berupa dukungan *support* mental, pendekatan secara spiritual agar ibu dan bayi dalam keadaan sehat dan tidak terjadi masalah potensial.
6. Asuhan telah diberikan pada Ny "R" dengan *post partum blues* di RSUD Syekh Yusuf, dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan ditandai dengan

hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan. Adapun asuhan yang diberikan pada Ny."R" yaitu melakukan komunikasi terapeutik,

7. Hasil valuasi tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny"R" dengan *post partum blues* di RSUD Syekh Yusuf, dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil dengan ditandai perubahan nafsu makan, yang semula kurang menjadi membaik, ibu terlihat ceria lagi, menyayangi bayinya, dan mulai bisa beradaptasi dengan peran barunya sebagai seorang ibu.

B. Saran

1. Bagi ibu (Klien)
 - a. Diharapkan pada setiap ibu dan calon ibu untuk senantiasa mempersiapkan kehamilannya baik secara materi, psikis, dan juga persiapan materi
 - b. Diharapkan kepada ibu untuk tidak menyembunyikan segala permasalahan yang ia miliki, hendaknya setiap masalah yang dimiliki diceritakan kepada suami atau kerabat terdekat.
 - c. Diharapkan ibu sering berkumpul dengan kelompok-kelompok ibu baru
2. Bagi suami dan keluarga ibu
 - a. Diharapkan suami menemani istri jika melakukan pemeriksaan kehamilan
 - b. Diharapkan suami lebih memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil, pasca melahirkan dan di kehidupan sehari-hari

- c. Diharapkan suami sering membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu ibu mengurus bayinya
 - d. Bagi keluarga diharapkan memberikan dukungan kepada ibu, jangan mengkritik dan menyudutkan ibu yang baru saja menjadi seorang ibu
3. Bagi bidan
- a. Petugas kesehatan dapat mengenali dan mendeteksi secara dini *post partum blues*
 - b. Petugas kesehatan khususnya bidan perlu menjelaskan keadaan ibu kepada keluarga ibu kondisi yang dialami oleh ibu serta diharapkan memberikan dorongan moral pada keluarga
 - c. Petugas kesehatan hendaknya juga memperhatikan kondisi psikis ibu yang baru melahirkan jangan hanya berfokus kepada kondisi fisik pasien
 - d. Tenaga kesehatan hendaknya lebih memberikan perhatian dan berlaku ramah kepada pasien agar pasien merasa lebih bahagia dan tidak segan menceritakan kendala dan masalah yang ibu alami.
4. Bagi institusi pendidikan
- a. Agar menerapkan asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat metode ini sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih profesional.
 - b. Perlu adanya persamaan persepsi antara pendidikan dan petugas kesehatan dilahan praktek tentang penerapan asuhan kebidanan

DAFTAR PUSTAKA

- Arfian, Sofiyan. *Baby Blues Mengenai Penyebab, Gejala, dan Mengantisipasinya*. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2012.
- Astuti, Sri. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jakarta : Erlangga. 2015.
- Azizah, Nur. 2016. *Terapi Mendengarkan Al-Qur'an Terhadap Pencegahan Blues Postpartum pada Ibu Nifas Di Rs Tk Iii 04.06.03 Dr. Soetarto Yogyakarta*. http://digilib.unisayogya.ac.id/2040/1/naskah publikasi_.pdf. (Diakses tanggal 28 Maret 2018 pukul 22.10 WITA).
- Chasanah, Nur. 2016. *Postpartum Blues pada Persalinan di Bawah Usia Dua Puluh Tahun*. Jurnal Akademi Kebidanan Yogyakarta Vol.14 No. 2. <http://jurnal.akper-notokusumo.ac.id/index.php/jkn/article/download/50/47> (Diakses tanggal 17 Maret 2018 pukul 14.00 WITA).
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2016*. Official Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_NSI_2015/27_Sulawesi_Selatan_2016.pdf (diakses 19 mei 2018 pukul 20:00 WITA)
- Desfanita dkk. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Postpartum Blues*. Jurnal Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau.
- Donsu, Tine. *Psikologi Keperawatan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Pres. 2017.
- Fitriana, Lisa dkk. 2015. *Gambaran Kejadian Postpartum Blues pada Ibu Nifas Berdasarkan Karakteristik di Rumah Sakit Umum Tingkat IV Sariningsih Kota Bandung*. Jurnal DIII Keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. <http://jurnal.akpernotokusumo.ac.id/index.php/jkn/article/download/50/47>.
- Fauziah, Siti. *Keperawatan Maternitas*. Jakarta : Kencana. 2015.
- Firdayanti. *Unmeet Need For Family Planning (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak terpenuhi)*. Makassar: Alauddin University Press.2012
- Hidayah, Noor dkk. 2016. *Support Sistem, Pengalaman Persalinan dengan Resiko Post Partum Blues di Bpm Yayuk Kalbariyanto Kudus Tahun 2016*.Jurnal Dosen Stikes Muhammadiyah Kudus Vol. 8 No.2.
- Intan. Laporan kemajuan risbinakes. 2017. (www.academia.edu.)
- Irawati, Dian dkk. *Pengaruh Faktor Psikososial dan Cara Persalinan Terhadap Terjadinya Postpartum Blues pada Ibu Nifas*. Jurnal Dosen Poltekkes

- Majapahit. 2014.
- Klein, Susan, dkk. *Buku Bidan, Asuhan pada Kehamilan, dan Kesehatan Wanita*. Jakarta : EGC. 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*. Penerbit Wali dan Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Mansur. *Psikologi ibu dan anak untuk kebidanan*. Jakarta : Selemba Medika. 2014.
- Marmi. *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas "Puerperium Care"*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2012.
- Martalia, Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nadyah. *Asuhan Neonatal, Anak dan Maternal, Makassar*: Alauddin University Press. 2013.
- Nugroho, Taufan. dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan 3 Nifas*. Yogyakarta : Nuha Medika. 2014.
- Nurafifah, Dian. *Ayah Asi (Breastfeeding Father) Terhadap Kejadian Postpartum Blues*. Jurnal Program Studi DIII Kebidanan STIKES Muhammadiyah Lamongan. <https://media.neliti.com/media/publications/176285-ID-ayah-asi-breastfeeding-father-terhadap-k.pdf> (Diakses 17 /03/18 pukul 13.00 WITA).
- Nurjanah, Nunung. *Asuhan Kebidanan Postpartum. Kuningan* : Refika ADITAMA 2013.
- Oktarina, Mika. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta : Deepublish. 2016.
- Pitriani, Risa dkk. *Panduan Lengkap Asuhan Kebidanan Ibu Nifas III*. Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Pratama, Kristin. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny. A umur 22 tahun P1A0 dengan Postpartum Blues di RSUD Surakarta*. 2015.
- Pulungan, Fitriyani. *Hubungan Pengetahuan Ibu Postpartum engan Sindrom Baby Blues Pada Hari 1-7 Postpartum di Klinik Romauli Kec. Medan Marelan Tahun 2015*. Jurnal Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan. 2017.
- Rahayu, Puspa. *Karya Tulis Ilmiah Pengalaman Baby Blues*. 2017.
- Rini, Susilo dkk. *Panduan Asuhan Nifas dan Evidence Based Practise*. Yogyakarta : Deepublish. 2016.

- Rukiyah, Aiyeyeh dkk. *Asuhan Kebidanan III*. Jakarta : Trans Info Media. 2014.
- Susanti, Wahyu dkk. 2017. *Analisis Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Baby Blues Syndrom Pada Ibu Nifas*. Jurnal Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta Vol. 7 No. 2. <http://www.apikescm.ac.id/ejurnalinfokes/index.php/index.php/infokes/article/view/178> (Diakses tanggal 18 Maret 2018 pukul 20.20 WITA)
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta : Katalog dalam Terbitan (KDT)
- Varney, Helen dkk. *Buku Saku Bidan. 2001. Varney's pocket midwife, ed*. Alfriana Hany. Jakarta : EGC, 2002.
- Varney, Helen dkk. *Varney's midwifery. America* : Jones and Barlet publisher. 2003.
- Walyani, Dewi dkk. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta PT Pustaka Baru. 2015.
- Waugh, Jason. *Patologi pada Kehamilan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC. 2013.
- Yodatama, Charla dkk. 2015. *Hubungan Bounding Attachment dengan Resiko Terjadinya Postpartum Blues pada Ibu Postpartum dengan Sectio Caesaria di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Srikandi IBI Kabupaten Jember*. Jurnal Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember Vol. 3 No.2.

Lembar follow up pada Ny. "R" dengan *post partum blues*

No	Tanggal	Keluhan	Intervensi	Hasil	Follow up
1.	02/07/18	<p>1.Nyeri luka perineum</p> <p>2.Sulit tidur dan tidak nafsu makan karena bayinya rewel</p> <p>3.Ibu takut melakukan pergerakan</p>	<p>1.menjelaskan pada ibu bahwa nyeri yang dirasakan karena luka bekas jahitan</p> <p>2.Memberitahu ibu bahwa dirinya adalah ibu yang baik, melakukan pendekatan terapeutik pada ibu memberikan semangat pada ibu agar bisa beradaptasi dengan peran barunya. Serta menyarankan ibu menceritakan kepada kerabat terdekat jika ada masalah. Suami dan keluarga dianjurkan membantu ibu mengurus bayinya</p> <p>3.Menyarankan ibu untuk tidak takut melakukan pergerakan yang ringan agar proses penyempuhan cepat</p>	<p>1.Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan</p> <p>2.Ibu masih terlihat cuek dan masih terlihat murung</p> <p>3.Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan</p>	<p>Follow up tanggal 03/07/18</p> <p>1.Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar</p> <p>2.memberikan ibu dukungan psikologi dan spiritual</p> <p>3.menjelaskan kepada ibu tentang tugas barunya menjadi seorang ibu</p>
2.	03/07/18	<p>1.ASI tidak lancar keluar</p> <p>2.Masih takut bergerak</p>	<p>1.Menganjurkan ibu untuk sering-sering menyusui bayinya dan memberitahu ibu untuk tidak <i>stress</i> karena dapat mempengaruhi produksi ASI</p> <p>2.Memberitahu ibu bahwa dengan bergerak tidak akan</p>	<p>1.Ibu berjanji akan menyusui bayinya sesering mungkin serta berjanji akan menceritakan segala</p>	<p>Follow up tanggal 04/07/18</p> <p>1.Memastikan ibu telah benar dalam teknik menyusui dan mengajarkan memandikan bayi</p>

			<p>membuat luka jahitan terbuka</p> <p>3.mengajarkan ibu cara menyusui</p> <p>4.Memberitahu ibu bahwa tugasnya sekarang bertambah ibu hendaknya bersabar, menerima pemberian Allah berupa anak dan senantiasa berzikir dan membaca ataupun mendengarkan ayat suci Al-Quran agar hati ibu menjadi tenang</p> <p>5.Memberikan dukungan kepada ibu bahwa dirinya adalah ibu yang baik dan juga tidak memendam masalah yang ia miliki</p>	<p>masalah jika memiliki masalah kepada kerabat terdekat</p> <p>2.Ibu berkata telah melakukan pergerakan dengan pergi ke kamar mandi untuk BAK</p> <p>3.ibu mengerti dan masih cuek</p>	<p>3.Memberitahu suami untuk lebih memperhatikan dan membantu ibu mengurus bayinya</p>
3.	04/07/18	1.Nyeri luka perineum	<p>1.Menjelaskan pada ibu nyerinya akan berkurang jika ibu melakukan saran yang diberikan dalam merawat luka jahitannya dan anjurkan ibu untuk bersabar</p> <p>2. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sampai 6 bulan dan mengajarkan ibu cara memandikan bayi</p> <p>4.Memberitahu</p>	<p>1.Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan</p> <p>2.Suami mengerti dan bersedia membantu ibu mengurus bayinya dan lebih mengerti kondisi istrinya</p> <p>3.Ibu</p>	<p>Follow up tanggal 07/07/18</p> <p>1.Memastikan ibu menyusui bayinya dengan benar dan memandikan bayi dengan benar</p> <p>2.memberitahu ibu bahwa dirinya adalah ibu yang baik</p> <p>3.memeriksa luka bekas jahitan apakah ada tanda infeksi</p> <p>4.memeriksa</p>

			<p>suami untuk memberikan perhatian lebih kepada istri dan membantu tugas istri dalam mengurus bayinya</p> <p>5.menganjurkan ibu untuk mendengarkan dan meBaca ayat suci Al-Quran dirumah, menyanyikan lagu-lagu solawat jika menidurkan bayi agar hati ibu menjadi lebih tenang</p> <p>6.Menganjurkan ibu untuk lebih sering melihat dan mengelus-ngelus kepala bayi agar terjalin ikatan emosional antara ibu dan bayinya</p>	<p>berusaha untuk senantiasa memeluk, menatap dan mengelus-ngelus bayinya</p>	<p>TTV dan kontraksi uterus</p> <p>5.Mengajarkan cara perawatan payudara dan perawatan tali pusat</p>
4.	07/07/18	<p>1.Ibu mengatakan lelah dan sakit kepala</p>	<p>1.Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan minum air putih 6-7 gelas/hari</p> <p>2.Melakukan pemeriksaan TTV. TD: 100/80 MmHg, N: 78x/I, S: 36,4 °C, P: 20x/i</p> <p>3.Memeriksa luka jahitan. Tidak ada tanda infeksi, tidak</p>	<p>1.Ibu bersedia istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi dan seimbang</p> <p>2.Ibu mengerti tentang cara perawatan tali pusat dan masih sedikit bingung tentang cara perawatan payudara</p>	<p>1.Mengajarkan kembali cara perawatan payudara</p> <p>2.Pemeriksaan TTV, Luka jahitan, TFU, dan proses involusi uteri</p> <p>3.Memastikan ibu tetap memberikan ASI</p>

			<p>merah.</p> <p>4. Mengajarkan ibu cara merawat tali pusat bayi dan perawatan payudara</p> <p>5. Menjaga bayi agar tetap sehat dan menghindari dari hipotermi</p>		
5.	15/07/18		<p>1. Mengajarkan cara perawatan payudara</p> <p>2. memeriksa TTV. TD: 120/80 MmHg, N: 78x/I, S: 36,4 °C, P: 20x/I, luka jahitan sudah mulai kering, tidak ada tanda infeksi. TFU tidak teraba</p> <p>3. Ibu memberikan ASI kepada bayinya tanpa susu formula</p>	<p>Tibu mengerti atas penjelasan yang diberikan dan ibu mulai terlihat menikmati perannya sebagai seorang ibu</p>	<p>Follow up tanggal 29 Juli 2018</p> <p>1. memberikan konseling KB</p> <p>2. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui selama 6 bulan secara <i>on demand</i></p>