

**PENURUNAN KADAR KOLESTEROL KARKAS BROILER
DENGAN SUPLEMENTASI BAKTERI ASAM LAKTAT
*Lactobacillus plantarum***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MURSALIM

NIM. 60300114131

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursalim
NIM : 603001140131
Tempat/ Tgl.Lahir : Pannujuang/ 04 November 1996
Jurusan/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Judul : Penurunan Kadar Kolesterol Karkas Broiler dengan
Suplementasi Bakteri Asam Laktat *Lactobacillus
plantarum*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar, adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa, ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 19 November 2018
Penyusun,

Mursalim
NIM: 60300114131

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penurunan Kadar Kolesterol Karkas Broiler dengan Suplementasi Bakteri Asam Laktat *Lactobacillus plantarum*”, yang disusun oleh Mursalim, NIM: 60300114131, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 19 November 2018 M.
11 Rabiul Awal 1440 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Wasilah, ST., M.T.
Sekretaris : Isna Rasdiana Azis, S.Si., M.Sc.
Munaqisy I : Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si
Munaqisy II : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi
Pembimbing I : Dr. Hafsan, S.Si., M.Si
Pembimbing II : St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H/ Arifuddin, M.Ag.
NTP. 1969/205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah swt. sebab berkat segala rahmat dan hidayah tanpa batas serta atas izin-Nyalah maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penurunan Kadar Kolesterol Karkas Broiler dengan Suplementasi Bakteri Asam Laktat *Lactobacillus plantarum*” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan tak lupa pula menghaturkan salam serta shalawat kepada Nabi Besar Muhammad saw, kepada keluarga, pada sahabat, dan seluruh umatnya.

Penyusun menyadari penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Abd. Latif, Ibu St. Ramlah, H. M. Yudu Erang dan Suaib yang menjadi motivasi penyusun untuk selalu maju, dukungan dalam bentuk do'a dan dalam kata yang terucap, bantuan moril dan materil, dan semua dukungan yang hanya didapatkan dalam keluarga. Penyusun juga menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya partisipasi atau bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan juga seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H.Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya.
3. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes dan Hasyimuddin, S.Si., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Dr. Hafsan, S.Si., M.Si dan St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes selaku Pembimbing, penyusun sangat berterima kasih atas segala bantuan, dukungan, dorongan, dan semua hal yang bahkan tidak dapat penyusun jabarkan satu persatu.
5. Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si dan Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi, selaku Penguji I dan II yang selama ini memberikan kritik dan saran yang sangat membantu penyusun dalam penyelesaian penulisan.
6. Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si, selaku Penasehat Akademik dan kepala Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, serta seluruh stafnya.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal baik mengenai ilmu pengetahuan maupun non-ilmu pengetahuan yang berlimpah kepada penyusun, serta kepada seluruh staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Kepala dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Teruntuk teman dalam penyelesaian tugas akhir TIM BAL (Rahmat Fajrin A., Nurman, Wahyuni Mentari, Mutmainnah, Fitri Aulia R., Sri Widiyanti, Siti Soraya Asti), terimakasih telah berjuang bersama dari awal hingga akhir kalian teman tim terbaik.
10. Teman-teman, sahabat sekaligus keluarga dari awal menapakkan kaki di Jurusan Biologi ini “LACTEAL 2014” terimakasih atas semua ukiran cerita selama empat tahun ini, penyusun mengukirnya dalam hati agar senantiasa teringat hingga akhir.
11. Teman-teman KKN angkatan 57 Posko 2 Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, terimakasih atas dukungannya.
12. Teman sekaligus sahabat Sri Wahyuni, terima kasih atas motivasi dan dukungan yang telah diberikan baik moril maupun materil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan doa, semangat, dukungan, saran dan pemikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan rendah hati penulis berharap semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt, Sebagai akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi peneliti lain serta menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Samata-Gowa, 19 November 2018 M.
11 Rabiul Awal 1440 H


Penyusun

Mursalim
NIM: 60300114131

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-7
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8-27
A. Ayat yang Relevan	8
B. Tinjauan Umum Kolesterol.....	11
C. Tinjauan Umum Broiler	14
D. Tinjauan Umum Bakteri Asam Laktat	20
E. Tinjauan Umum <i>Lactobacillus plantarum</i>	24
F. Hipotesis	27
G. Kerangka Pikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28-33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
C. Variabel Penelitian	28
D. Definisi Operasional Variabel	29
E. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan).....	29
F. Prosedur Kerja.....	30

	G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	34-39
	A. Hasil Penelitian	34
	B. Pembahasan.....	36
BAB V	PENUTUP.....	40-41
	A. Kesimpulan	40
	B. Saran.....	41
	KEPUSTAKAAN	42
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	47
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Klasifikasi LDL, HDL dan Kolesterol total.....	13
Tabel 4.1. Analisis Uji Kadar Kolesterol pada Kelompok Perlakuan.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1. Broiler.....	14
Gambar. 2.2. <i>Lactobacillus plantarum</i>	25
Gambar. 4.1. Penurunan Kadar Kolesterol Karkas Setiap Perlakuan	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Tabel Kurva Standar Kolesterol	47
Lampiran 2.	Kurva Standar Kolesterol	48
Lampiran 3.	Contoh Perhitungan Kadar Kolesterol.....	48
Lampiran 4.	Tabel Kadar Kolesterol Organ pada Setiap Perlakuan	50
Lampiran 5.	Hasil Uji Analisis <i>One Way Anova</i>	51
Lampiran 6.	Dokumentasi Penelitian.....	59
Lampiran 7.	Preparasi Sampel dan Uji Kolesterol.....	63
Lampiran 8.	Alat dan Bahan Penelitian	65
Lampiran 9.	Standar Mc Farland	67
Lampiran 10.	Hasil Uji Absorbansi Sampel pada Spektrofotometer	68



ABSTRAK

Nama : Mursalim
NIM : 60300114131
Judul : Penurunan Kadar Kolesterol Karkas Broiler dengan
Suplementasi Bakteri Asam Laktat *Lactobacillus plantarum*

Bakteri Asam Laktat (BAL) memiliki kemampuan dalam hal menurunkan kadar kolesterol. Kemampuan *Lactobacillus* dalam menurunkan kolesterol karena mampu mengasimilasi kolesterol dalam usus halus, memproduksi zat anti mikroba dan meningkatkan sistem kekebalan hewan dan mendekongugasi garam empedu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi BAL *Lactobacillus plantarum* untuk menurunkan kadar kolesterol karkas broiler. Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan yaitu P0 aquades sebanyak 2 ml (kontrol), P1 *Lactobacillus plantarum* (10^6 cfu/ml), P2 *Lactobacillus plantarum* (10^8 cfu/ml), dan *Lactobacillus plantarum* (10^{10} cfu/ml). Hasil sidik ragam menunjukkan pada perlakuan P0 (kontrol) memiliki kadar kolesterol yang tertinggi yaitu sebanyak 69 mg, perlakuan P1 (10^6 cfu/ml) nilai kolesterol sebanyak 68 mg, perlakuan P2 (10^8 cfu/ml) nilai kolesterol sebanyak 61 mg, dan pada perlakuan P3 (10^{10} cfu/ml) nilai kolesterol sebanyak 66 mg. Hasil uji menunjukkan terjadi penurunan yang paling tinggi yaitu pada perlakuan P2 yaitu pemberian *L. plantarum* dengan konsentrasi 10^8 cfu/ml. Hal ini mengindikasikan bahwa BAL *L. plantarum* memenuhi kriteria sebagai kandidat probiotik.

Kata kunci: Kolesterol, Broiler, Bakteri Asam Laktat, *Lactobacillus plantarum*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Mursalim
Student Id Number : 60300114131
Title : **Broiler Carcass Cholesterol Levels Reduction With Lactic Acid Bacteria *Lactobacillus plantarum* Supplementation**

Lactic acid bacteria (LAB) has ability to lower cholesterol levels. This study aims to know the effect of LAB *Lactobacillus plantarum* supplementation to lower broiler carcass cholesterol levels. *Lactobacillus* is able to reduce cholesterol because it can assimilate cholesterol in small intestine, produce anti microbe, increase animal system and conjugate bile salt. This study uses 4 treatments, they are P0 aquadest 2 ml (control), P1 *Lactobacillus plantarum* (10^6 cfu/ml), P2 *Lactobacillus plantarum* (10^8 cfu/ml), and P3 *Lactobacillus plantarum* (10^{10} cfu/ml). P0 (control) treatment has the highest cholesterol level, that is 69 mg, P1 *Lactobacillus plantarum* (10^6 cfu/ml) treatment cholesterol level 68 mg, P2 (10^8 cfu/ml) treatment cholesterol level 61 mg, P3 (10^{10} cfu/ml) treatment cholesterol level 66 mg. the result shows that P2 (10^8 cfu/ml) treatment is the most effective in reduction cholesterol levels.

Keywords : Cholesterol, Broiler, Lactic acid bacteria, *Lactobacillus plantarum*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era kemajuan ilmu pengetahuan, kehidupan manusia semakin sejahtera dengan kenikmatan duniawi yang tidak terbatas. Namun, terkadang tidak sesuai dengan harapan karena berbagai macam penyakit yang menjangkiti tubuh. Salah satunya dalam hal mengkonsumsi makanan yang kurang baik akan menimbulkan masalah tersendiri bagi kesehatan seperti, penyakit jantung (*Aterosklerosis*). Dalam QS Al-Qaaf: 50/ 16, Allah befirman yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝١٦

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya (Kementrian Agama RI, 2016).

Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia dan tidak ada sesuatu pun yang samar atau tersembunyi bagi-Nya. Dan sungguh, Allah dengan kuasa-Nya bersama ibu bapak yang dijadikannya sebagai perantara telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, baik kebaikan maupun kejahatan, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya. Yakni Allah Maha Mengetahui keadaan manusia walau yang paling tersembunyi sekali pun (Kementrian Agama RI, 2016).

Pada ayat diatas makna kalimat “lebih dekat pada urat leher” adalah pembuluh darah yaitu *vena jugularis*. *Vena jugularis* terletak di leher yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari kepala, otak, wajah dan leher menuju jantung. Dengan pola konsumsi makanan yang mengandung kolesterol yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah (*Aterosklerosis*). *Aterosklerosis* ini akan memicu timbulnya penyakit-penyakit *kardiovaskuler*, seperti stroke dan penyakit jantung koroner (Saidin, 2000).

Peningkatan kadar kolesterol khususnya *Low Density Lipoprotein* (LDL) yang biasa disebut sebagai *hiperkolesterolemia*. Pola konsumsi makanan yang kurang baik erat kaitannya dengan peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh (Asmarani, 2012).

Sektor perunggasan memegang peranan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya kebutuhan akan pangan hasil hewani. Salah satu bentuk hasil pangan asal unggas adalah karkas broiler. Daging ayam merupakan jenis daging yang dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat. Pemenuhan produksi ayam pedaging terus ditingkatkan dari aspek kuantitas maupun kualitasnya seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi akibat meningkatnya jumlah penduduk.

Pendekatan potensial dalam hal peningkatan kualitas produk perunggasan seperti karkas broiler salah satunya dengan aplikasi bakteri asam laktat (BAL) sebagai probiotik untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa mengkonsumsi produk-produk fermentasi yang mengandung BAL dapat menurunkan kadar kolesterol baik pada hewan maupun manusia.

Penelitian aplikasi bakteri asam laktat sebagai probiotik telah banyak digunakan dalam menurunkan kadar kolesterol. BAL telah digunakan secara luas dan diteliti sebagai probiotik untuk manusia dan hewan ternak. Hal ini berdasarkan bahwa BAL adalah penghuni alami saluran pencernaan manusia dengan kemampuan toleransi terhadap lingkungan asam dan empedu (*bile*) dari saluran pencernaan. BAL juga berfungsi mengubah laktosa menjadi asam asetat, sehingga menurunkan pH saluran pencernaan dan secara alami mencegah kolonisasi banyak bakteri (Watson, 2008).

BAL merupakan jenis bakteri yang mampu menghasilkan asam laktat, antimikroba dan hasil metabolisme lain yang memberikan pengaruh positif bagi biopreservatif pangan dan pencernaan tubuh. Asam laktat sebagai salah satu asam organik, dapat dihasilkan secara alami oleh tumbuhan maupun hewan. Genus *Lactobacillus* sering digunakan dalam produk makanan misalnya untuk produksi produk fermentasi susu, keju, roti dan beberapa spesies juga digunakan sebagai protektif dalam industri daging (Vermeiren *et al.*, 2004 dalam Yulinery dkk., 2015).

Hal yang mendasari penelitian ini untuk melakukan aplikasi bakteri asam laktat *Lactobacillus plantarum* asal dangke untuk menurunkan kadar kolesterol karkas broiler yaitu demi tercapainya ketahanan pangan nasional khususnya kebutuhan akan pangan hasil hewani dari broiler yang tentunya lebih berkualitas dan rendah kolesterol.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh suplementasi BAL *Lactobacillus plantarum* untuk menurunkan kadar kolesterol pada karkas broiler?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini BAL *Lactobacillus plantarum* diperoleh dari koleksi Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang merupakan hasil isolasi Dangke.
2. Kadar kolesterol karkas broiler diambil pada masa pemeliharaan 35 hari.
3. Karkas adalah ayam yang telah disembelih, dicabuti bulu, dihilangkan kepala dan leher serta jeroannya.
4. Pemeliharaan broiler dilakukan di Pannujuang Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dan pemeriksaan kadar kolesterol karkas broiler dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

D. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rusmana dkk, (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian minyak ikan lemuru dan vitamin E terhadap kadar lemak dan kolesterol daging ayam broiler. Hasil penelitian menunjukkan pada suplementasi vitamin E 6% tingkat 100 ppm dan pemberian minyak ikan lemuru pada tingkat 3% dapat mencegah terjadinya peningkatan kadar lemak daging ayam broiler. Sedangkan, pada suplementasi vitamin E 6% tingkat 200 ppm dan pemberian minyak ikan lemuru pada tingkat 3% dapat mencegah terjadinya peningkatan persentase kadar kolesterol daging ayam broiler.
2. Astuti, (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian *streptococcus thermophilus* terhadap kadar kolesterol darah ayam broiler. Hasil penelitian ini menunjukkan menurunnya kadar kolesterol darah broiler secara signifikan setelah perlakuan pemberian BAL *Streptococcus thermophilus*. Diduga mekanisme penyebab turunnya kadar kolesterol darah adalah secara tidak langsung dengan mekanisme dekonjugasi garam empedu.
3. Hasanuddin dkk, (2013) melakukan penelitian mengenai pemberian pakan *step down* protein air perasan jeruk nipis pada ayam broiler. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang nyata ($P < 0,05$) terhadap penurunan kolesterol daging (mg/g) dengan rata-rata (0,99, 0,89, 1,11, 1,02, 1,03 dan 0,81), tetapi

tidak berpengaruh ($P>0,05$) terhadap penurunan lemak daging (%) dengan rata-rata (5,53,6,30, 6,13, 6,15, 7,38 dan 4,8) pada ayam broiler.

4. Fadhilah dkk, (2015) melakukan penelitian mengenai Pemberian Bakteri Asam Laktat Asal Dangke Untuk Menurunkan Kadar Kolesterol Secara *In Vitro*. Hasil penelitian menunjukkan penambahan BAL perlakuan Ly1, Ly2 dan Ly3 yang diinokulasikan ke dalam media MRS dapat menurunkan kadar kolesterol secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa BAL asal dangke yaitu *L. fermentum* dan *L. acidophilus* memenuhi salah satu kriteria sebagai kandidat probiotik.
5. Nur (2015) melakukan penelitian tentang Isolasi dan Identifikasi Asam Laktat Dari Dangke yang Berpotensi Sebagai Probiotik, Makanan Tradisional dari Susu Kerbau Di Curio Kabupaten Enrekang. Isolasi BAL dilakukan dengan menggunakan medium selektif *de Man Ragosa Sharpe Agar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat BAL yang diperoleh terdiri dari dua spesies yaitu *Lactobacillus plantarum* dan *Lactobacillus fermentum*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh suplementasi BAL *Lactobacillus plantarum* untuk menurunkan kadar kolesterol karkas broiler.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengkaji secara mendalam mengenai kemampuan BAL *Lactobacillus plantarum* dalam menurunkan kadar kolesterol broiler.
2. Sebagai sumber informasi bagi ilmu mikrobiologi dan industri peternakan dalam memanfaatkan BAL *Lactobacillus plantarum* sebagai probiotik yang mampu menurunkan kadar kolesterol karkas broiler.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat dan Hadis yang Relevan

Mikroorganisme merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil yang memiliki bentuk, struktur, morfologi yang khas. Allah firman dalam QS. al-Baqarah/ 2: 26.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِينَ ۝٢٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, “Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan dengan itu banyak (pula) orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik, (Kementrian Agama RI, 2016).

Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur, dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba. Di sini dijelaskan sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk, kutu yang sangat kecil atau yang lebih kecil dari itu. Kendati kecil, belalainya dapat menembus kulit gajah, kerbau, dan unta, dan

menggigitnya, serta menyebabkan kematian. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mendengar perumpamaan itu mereka tahu maksud perumpamaan itu dan tahu bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan yang tidak diragukan lagi. Tetapi sebaliknya, mereka yang kafir menyikapi itu dengan sikap ingkar dan berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan yang remeh ini?" Allah menjawab bahwa perumpamaan itu dibuat untuk menguji siapa di antara mereka yang mukmin dan yang kafir. Oleh karenanya, dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, karena mereka tidak mencari dan menginginkan kebenaran, dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang yang diberi-Nya petunjuk karena mereka memang mencari dan menginginkannya. Tetapi Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya, sehingga tidak ada yang Dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan (Kementrian Agama RI, 2016).

Ayat diatas menjelaskan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Swt beraneka ragam dalam jenis, bentuk, dan manfaatnya dimuka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Hanya orang yang haus akan ilmu pengetahuan yang akan diberikan petunjuk dan sungguh dari penciptaan itu semua terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Termasuk mikroorganisme dalam hal ini BAL yang memiliki manfaat dalam menurunkan kadar kolesterol karkas broiler.

Mengonsumsi makanan yang berlebihan dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan. Berkaitan tentang pola konsumsi makanan dalam islam telah diatur

bagaimana adab yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Saw dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْحِمِصِيُّ وَحَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِبِيِّ عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكْلًا تَ يُكْمِنُ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلْتُ لِطَعَامٍ وَتُلْتُ لِشَرَابِهِ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ.

Artinya:

Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, Abdullah bin al Mubarak mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, Abu Salamah al Himshi dan Habib bi Shalih menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Jabir ath-Tha'i, dari Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Tidak ada sesuatu yang lebih buruk yang diisi oleh seorang manusia selain perutnya. Cukupilah anak Adam itu memakan makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak dapat melakukan yang demikian, hendaklah sepertiga perutnya untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk pernapasannya”. (Sahih: Ibnu Majah, 3349).

Dalam hadisnya nabi Muhammad mengajarkan untuk mengkonsumsi suatu makanan jangan berlebihan sesuai dengan kebutuhan tubuh, karena dapat merugikan tubuh. Nabi mengajarkan bahwa makanlah kamu sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Konsumsilah makanan untuk menegakkan tubuh jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Hadis diatas juga berlaku pada hewan seperti broiler dengan pemberian pakan yang tidak dibatasi, hal ini yang menyebabkan kandungan kolesterol ayam tinggi.

B. Tinjauan Umum Kolesterol

Kolesterol tubuh berasal dari dua sumber, yaitu dari makanan yang disebut kolesterol eksogen dan yang diproduksi oleh tubuh sendiri yang disebut kolesterol endogen. Kolesterol yang terdapat dalam makanan berasal dari hewan seperti kuning telur, daging, hati, dan otak (Muchtadi dkk., 1993). Jika jumlah kolesterol yang berasal dari makanan sedikit untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan organ lain maka sintesis kolesterol di dalam hati meningkat. Sebaliknya, jika jumlah kolesterol dalam makanan meningkat maka sintesis kolesterol dalam hati dan usus akan menurun (Ravnskov, 2005 dalam Rahmat dan Wiradimadja, 2011).

Kolesterol secara fisiologi penting bagi tubuh, karena merupakan hormon-hormon yang memiliki peranan vital khususnya kelompok hormon steroid dan bahan untuk membangun membran sel (Wulaniriky, 2011). Serabut-serabut sel saraf diselubungi oleh kolesterol yang bertujuan untuk membantu menghantarkan konduksi dan transmisi elektrik dan sebagai substrat untuk pembentukan asam empedu, vitamin D, dan hormon steroid (Hu *et al.*, 2001 dalam Widyaningsih dkk, 2010).

Secara fisiologi kolesterol penting bagi tubuh, namun kelebihan kolesterol dapat menyebabkan timbulnya berbagai gangguan kesehatan, salah satunya adalah *atherosclerosis* yaitu penimbunan kolesterol pada pembuluh darah khususnya pada arteri (Wulaniriky, 2011).

Kondisi dimana kolesterol dalam darah meningkat melebihi ambang normal yang ditandai dengan meningkatnya kadar *Low Density Lipoprotein* (LDL), trigliserida, dan kolesterol total disebut *hiperkolesterolemia*. Pada orang dewasa kadar

kolesterol total yang normal sebesar 120 sampai 200 mg/dl. Kolesterol merupakan prekursor senyawa steroid di dalam tubuh seperti *kortikosteroid*, hormon seks, asam empedu, dan vitamin D. Kolesterol LDL berfungsi untuk mengangkut kolesterol ke sel perifer di seluruh tubuh. Kolesterol *High Density Lipoprotein* (HDL) berfungsi mengangkut timbunan kolesterol dari jaringan kembali ke hati untuk didaur ulang (Setyaji, 2011).

Pada tahun 2001, berdasarkan hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah sebesar 26,3% sedangkan pada tahun 2005 sebesar 16,7%.³ (Setyaji, 2011).

Wahyuningsih (2015) menyatakan bahwa 80% kolesterol diproduksi oleh tubuh sendiri dan 20% berasal dari makanan. Jadi, setiap orang memiliki kolesterol di dalam darahnya. Kolesterol yang diproduksi terdiri atas 2 jenis yaitu:

1. Kolesterol LDL adalah kolesterol jahat. Penyumbatan pembuluh darah di akibatkan karena jumlah LDL dalam darah berlebihan sehingga akan terjadi endapan pada dinding pembuluh darah dan membentuk bekuan.
2. Kolesterol HDL adalah kolesterol baik. Kolesterol LDL yang berlebihan dalam pembuluh darah akan dibersihkan oleh kolesterol HDL. Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan suatu tanda yang baik sepanjang kolesterol LDL kurang dari 150 mg/dl.

Atherosklerosis adalah suatu proses dimana kolesterol LDL yang berakumulasi di dinding *arteri* sehingga membentuk semacam plak yang menyebabkan dinding *arteri* menjadi kaku dan rongga pembuluh darah menyempit. Kolesterol HDL

sebaliknya mencegah terjadinya *atherosklerosis* dengan cara mengeluarkan kolesterol jahat dari dinding *arteri* dan mengirimkannya ke hati (Wahyuningsih, 2015).

LDL (Kolesterol Jahat)	
<100 mg	Optimal
101 mg -129 mg	Mendekati optimal
130 mg -159 mg	Batas normal tertinggi
160 mg -189 mg	Tinggi
>190 mg	Sangat tinggi
HDL (Kolesterol Baik)	
<40 mg	Rendah
>60 mg	Tinggi
Total Kolesterol	
<200 mg	Yang diperlukan
201 mg -239 mg	Batas normal tertinggi
>240 mg	Tinggi

Tabel 2.1 Klasifikasi LDL, HDL dan Total Kolesterol (Kartika, 2009).

Kolesterol sangat penting bagi tubuh untuk membuat hormon seks, fungsi organ seksual dan sangat penting bagi perkembangan. Membuat hormon kortoks adrenal untuk metabolisme dan keseimbangan garam didalam tubuh (Wahyuningsih, 2015).

LDL merupakan komponen lipoprotein yang terbesar membawa kolesterol ke jaringan tubuh, yang digunakan untuk pembentukan membran atau dimetabolisme menjadi hormon steroid. HDL memiliki peran, yaitu mengangkut kolesterol dan lipoprotein lainnya yang sudah terakumulasi dari sel dan mengembalikan kolesterol ke hati untuk selanjutnya diekskresikan dalam empedu (Baigent and Clarke, 2008).

Mekanisme penurunan kolesterol oleh aktivitas BAL disebabkan oleh enzim *Bile Salt Hydrolase* (BSH) yang mendekongugasi garam empedu, dimana glisin atau

taurin dipisahkan dari steroid, sehingga menghasilkan garam empedu bebas atau terdekonjugasi dalam bentuk asam kolat bebas yang diserap oleh usus halus. Dengan demikian garam empedu yang kembali ke hati selama sirkulasi *enterohepatik* menjadi berkurang, sehingga total kolesterol dalam tubuh menjadi berkurang. Beberapa jenis BAL memiliki dinding sel yang mampu mengikat kolesterol dalam usus halus sebelum kolesterol diserap oleh tubuh (Ooi and Liong, 2010).

C. Tinjauan Umum Broiler

Strain broiler berasal dari persilangan antara *White Plymouth Rock* dan *White Cornish* (Poultry Indonesia, 2002)". Kata broiler berasal dari kata kerja "*to broil*" (*sate*) yang sering disama artikan dengan makna bahasa Inggris Amerika yaitu "*to grill*" (memanggang). Broiler mempunyai suhu tubuh yang relatif konstan walaupun suhu lingkungan berubah-ubah (*homeothermis*).



Gambar. 2.1. Broiler

Klasifikasi ayam menurut Sarwono (2003) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Galliformes
Family : Phasianidae
Genus : *Gallus*
Spesies : *Gallus gallus domestic* sp.

Suhu pemeliharaan broiler berkisar 20°C – 24°C. Kandungan gizi yang lumayan tinggi pada karkas broiler merupakan salah satu sumber protein dan vitamin bagi tubuh. Karena memiliki nilai gizi, nilai kesehatan dan nilai ekonomi yang tinggi, maka ayam broiler sangat layak untuk di budidayakan (Kusnadi, 2008).

Broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu pertumbuhan yang cepat, konversi pakan yang baik dan dapat dipotong pada usia 8 minggu yang relatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan efisien serta menghasilkan daging yang berkualitas baik (Murtidjo, 2003).

Broiler adalah strain ayam hibrida modern yang berjenis kelamin jantan dan betina yang dikembangkan oleh perusahaan pembibitan khusus, dapat dipanen pada umur 4-5 minggu karena pertumbuhannya yang sangat cepat (Gordon and Charles, 2002). Bell and Weaver (2002) menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat

dan siap dipotong pada umur yang relatif muda merupakan karakteristik khas dari broiler.

Menurut Badan Standardisasi Nasional (2005), persyaratan mutu bibit broiler atau *day old chick* (DOC) yaitu berat DOC per ekor minimal 37 g dengan kondisi fisik sehat, kaki normal, dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ditemukan kelainan bentuk dan cacat fisik, dubur kering dan warna bulu seragam.

Broiler merupakan jenis ayam ras yang dimuliakan dan dibibitkan serta dikembangkan untuk menghasilkan daging dengan cepat dan masa panen broiler singkat (Haris, 1997). Pemberian pakan yang baik, pemeliharaan dan pencegahan penyakit yang baik akan mempercepat pertumbuhan broiler. Segala kebutuhan broiler yang terkurung sepanjang hidupnya dipenuhi oleh manusia (Rasyaf, 1985).

Strain *Cobb, Hubbard, Ross, Lohman, Avian, Arbor Acres, Hi-bro dan ISA Vedette* merupakan strain broiler yang banyak dijual dan dipelihara di Indonesia. Jenis strain broiler yang memiliki pertumbuhan lebih cepat, daging dada lebih banyak dan konversi ransum paling rendah yaitu strain *Cobb*. Strain *Cobb* paling banyak dikembangkan di dunia karena galur ini memiliki keunggulan khusus dibanding galur lainnya (Hadi, 2002).

Strain *Cobb* merupakan salah satu strain pembibit broiler yang ada di Indonesia yang memiliki keunggulan tingkat pertumbuhan yang cepat, konversi ransum yang baik, mempunyai struktur tulang dan otot yang lebih baik, *breast formation* yang baik, dan mempunyai kualitas daging yang baik (Prambudi, 2007). Menurut Mulyantono (2003), keunggulan yang dimiliki strain *cobb* yaitu, daya hidupnya mencapai 98 %,

bobot badan mencapai 1,7 kg dalam waktu 35 hari dan konversi pakan mencapai 1,8 kg.

Perkembangan broiler di mulai dari *Great grand parent stock* adalah jenis ayam yang berasal dari persilangan dan seleksi dari berbagai kelas, bangsa, atau varietas yang dilakukan oleh pembibit dan merupakan bagian untuk membentuk *grand parent stock* yang dihasilkan dari persilangan galur murni (*pure line*). *Grand parent stock* adalah jenis ayam yang khusus dipelihara untuk menghasilkan *parent stock* dan *parent stock* dipelihara untuk menghasilkan *final stock* yang saat ini dikenal dengan istilah *broiler* (Anggorodi, 1990).

Salah satu sumber protein hewani yang murah, dibanding dengan daging yang lain adalah broiler. Keunggulan broiler adalah pertumbuhannya yang sangat cepat, sangat efisien dalam merubah pakan menjadi daging. Faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pemeliharaan ayam, khususnya broiler adalah pemberian pakannya. Protein, energi (karbohidrat dan lemak), vitamin, mineral serta air merupakan kandungan gizi utama yang berperan penting bagi pertumbuhan ayam broiler (Situmorang, 2013).

Ditinjau dari segi mutu, broiler memiliki nilai gizi yang tinggi dibanding daging ternak lainnya. Dagingnya lembut, berwarna merah terang dan menarik, memiliki asam amino lengkap serta mudah diolah. Umur 7-8 minggu dapat mencapai bobot kurang lebih 2 kg (Aak, 1987).

Ditinjau dari genetik, broiler sengaja diciptakan agar dalam waktu singkat dapat segera dimanfaatkan hasilnya serta mampu menghasilkan kualitas daging yang bersih, berserat lunak dengan kandungan protein yang tinggi (Murtidjo, 2003).

Broiler sebagai bahan makanan saat ini merajai pasaran. Selain murah, dagingnya yang lebih empuk dibandingkan ayam kampung, menyebabkan masyarakat kita lebih cenderung memilih daging broiler. Namun demikian, ternyata broiler memiliki kadar kolesterol yang relatif tinggi dibandingkan ayam kampung. Menurut DepKes RI (1995) bagian luar ayam yang terbanyak mengandung kolesterol adalah bagian dada. Hal ini disebabkan dada merupakan tempat timbunan lipid, terutama pada bagian kulitnya yang berminyak.

Pengembangan usaha peternakan broiler di Indonesia umumnya memiliki beberapa hambatan yang dapat berpengaruh terhadap *performance* diantaranya suhu lingkungan dan kelembaban yang cukup tinggi dan ketersediaan pakan. Suhu dan kelembaban yang relatif tinggi menyebabkan broiler menjadi sangat rawan terhadap cekaman panas. Pada umumnya ayam akan berproduksi optimal pada zona nyamannya (*comfort zone*), apabila kondisi lingkungan berada di bawah atau di atas zona nyamannya, ayam akan mengalami stress (Kusnadi, 2008).

Broiler akan nyaman hidup dan berproduksi pada suhu lingkungan 18 - 21 °C. Namun kita ketahui bahwa suhu di Indonesia lebih panas sehingga memungkinkan ayam mengurangi konsumsi ransum dan lebih banyak minum. Dengan demikian, faktor ransum menyangkut kualitas dan kuantitasnya sangat menentukan terhadap produktivitas ternak. Pertumbuhan yang cepat didukung dengan ransum yang

mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang (asam amino, asam lemak, mineral dan vitamin) sesuai dengan kebutuhan ayam (Abun, 2006).

Keberhasilan peternakan broiler tergantung pada mutu genetik, lingkungan dan interaksi antara genetik dengan lingkungan. Manajemen merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya broiler, diantaranya manajemen perkandangan yang harus menjadi perhatian karena secara tidak langsung akan mempengaruhi produksi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti suhu dan cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan broiler.

Broiler memerlukan suhu lingkungan dan pencahayaan yang memadai sesuai umur untuk pertumbuhan yang optimal. Panas lingkungan pada masa pertumbuhan awal (*brooding*) broiler dapat diperoleh dari lampu pijar dengan kekuatan (daya) tertentu. Ketika suhu lingkungan rendah broiler akan menurunkan konsumsi air minum dan meningkatkan konsumsi pakan (Bell and Weaver, 2002).

Broiler umumnya dipanen pada umur 5-6 minggu dengan masa pemeliharaan 25-40 hari dengan bobot antara 1,2 – 1,9 kg/ekor (Suharti, 2008). Pertumbuhan yang paling cepat terjadi sejak menetas sampai umur 4-6 minggu, kemudian mengalami penurunan dan terhenti sampai mencapai dewasa (Kartasudjana et al., 2006). Pertumbuhan broiler di bagi menjadi 2 periode yaitu periode starter dan finisher. periode starter dimulai sejak umur 1 hari sampai umur 21 hari dan periode finisher dimulai sejak 21 hari sampai panen (Rasyaf,1996). Kandungan kadar kolesterol broiler bagian daging 110 mg, hati 592 mg, rempela 479 mg, jantung 171, kulit 165 mg, kuning telur 485 (Saidin, 2000).

D. Tinjauan Umum Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri yang mempunyai kemampuan untuk membentuk asam laktat dari metabolisme karbohidrat dan tumbuh pada pH lingkungan yang rendah. Bakteri asam laktat pada dasarnya mempunyai kesamaan sifat yaitu: berbentuk batang atau kokus, gram positif, tidak membentuk spora, tidak motil, tidak membentuk pigmen, tumbuh pada kisaran pH 3 – 8 (Mitsuoka, 1990). Bakteri asam laktat juga memproduksi asam volatil dan karbondioksida (CO₂). Disamping itu, BAL juga mempunyai sifat umumnya tidak bergerak, kebanyakan bersifat anaerob fakultatif (Fardiaz, 1992).

BAL berhubungan dengan fermentasi makanan dan pakan ternak, dan juga merupakan bakteri yang secara normal berhubungan dengan kesehatan permukaan mukosa manusia dan hewan (Salminen, *et al.*, 2004). Bakteri asam laktat berpotensi dalam memproduksi bakteriosin dan bersifat probiotik (Guessas and Kihal 2004).

BAL berperan pada proses produksi makanan fermentasi dan beberapa bakteri ini mampu menghambat pertumbuhan varietas bakteri pembusuk dan patogen. Kemampuan BAL untuk mengkonversikan gula menjadi asam organik (laktat dan asetat) sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pH dan mendegradasi karbohidrat untuk digunakan sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme pengganggu atau pembusuk (Rahayu dan Sudarmadji, 1989).

Dalam industri pangan BAL digunakan secara luas sebagai kultur *starter* dalam fermentasi untuk tujuan pengawetan. Prinsip pengawetan bahan pangan dengan metode fermentasi BAL adalah peningkatan konsentrasi asam laktat dan penurunan

pH melalui metabolisme gula (karbohidrat). Pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen akan terhambat apabila konsentrasi asam laktat yang relatif tinggi dan pH yang rendah, sehingga produk pangan terfermentasi yang dihasilkan akan dapat disimpan lebih lama dan aman bagi konsumen (Aryanta, 2007).

BAL dibagi atas dua kelompok berdasarkan tipe fermentasinya, yaitu bakteri yang bersifat *homofermentatif* yang hanya menghasilkan asam laktat sebagai hasil metabolisme gula, dan bakteri yang bersifat *heterofermentatif* yang menghasilkan asam laktat, sedikit asam asetat, etanol, keton dan CO₂ (Buckle *et al.*, 1987).

BAL tidak hanya dapat mengubah rasa makanan menjadi asam dalam waktu singkat, tetapi juga akan merubah flavor, tekstur, dan kandungan zat gizi makanan tersebut. Secara alami bakteri asam laktat ditemukan pada tanaman, daging, susu dan hasil olahannya, dan hasil fermentasi sereal, dan makanan hasil fermentasi (Holzapfel and Schillinger, 2002).

BAL termasuk golongan bakteri *mikroaerofilik*, yang memfermentasi heksosa menghasilkan asam laktat. Spesies *Lactococcus*, *Enterococcus*, *Oenococcus*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, dan *Lactobacillus* merupakan spesies BAL yang banyak digunakan dalam dunia industri (Holzapfel and Schillinger, 2002).

BAL adalah kelompok bakteri yang menghasilkan asam laktat sebagai hasil utama dalam metabolisme karbohidrat. Karbohidrat yang dapat difermentasi BAL dapat berupa monosakarida, disakarida maupun polisakarida (Ngatirah, 2000).

Beberapa spesies BAL menghasilkan senyawa anti bakteri seperti bakterosin, risin, dan renfisin. Contoh spesies *Lactobacillus* memproduksi H₂O₂ yang bersifat

membunuh mikroorganisme pembusuk dan memproduksi senyawa antibiotik. Asam organik yang dihasilkan secara fermentasi seperti asam propionate dan asam format mempunyai daya anti mikroba yang lebih kuat dibandingkan dengan asam laktat (Fardiaz, 1992).

Beberapa BAL yang merupakan kultur probiotik yang ada dalam suplemen nutrisi, produk farmasi dan pangan fungsional yang telah terbukti memiliki efek menguntungkan pada kesehatan manusia adalah dari genus *lactobacillus* dan *bifidobacterium*. Aktivitas probiotik terbagi atas tiga aspek, yaitu nutrisi, fisiologis, dan efek antimikroba. Aspek nutrisi berupa penyediaan enzim (*lactase*) untuk membantu metabolisme komponen makanan, sintesis beberapa jenis vitamin (K, folat, piridoksin, pantotenat, biotin, dan riboflavin) dan menghilangkan racun dari metabolit komponen makanan dalam usus. Aspek fisiologis meliputi kemampuan menjaga keseimbangan komposisi mikroflora usus dan menstimulasi sistem kekebalan usus. Aspek efek antimikroba meliputi kemampuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap pengaruh negatif mikroba patogen (Ngatirah, 2000).

Selama bertahun-tahun BAL telah dipakai dalam industri makanan, karena mampu mengubah gula (termasuk laktosa) dan karbohidrat lain menjadi asam laktat. Proses pengubahan menjadi asam inilah yang memunculkan rasa asam yang unik dari makanan olahan susu yang difermentasi. Manfaat lain dari asam laktat ini sebagai pembasmi kuman dan virus penyakit, karena turut mengurangi kadar asam pH (Sunarlim, 2006).

Keunggulan yang dimiliki BAL, yaitu: mampu menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat memberikan rasa dan aroma spesifik pada makanan fermentasi. BAL menghasilkan senyawa antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan pembusuk pada bahan makanan sehingga dapat memperpanjang masa simpan produk tersebut. Senyawa asam laktat, hidrogen peroksida, CO₂ merupakan senyawa-senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh BAL (Rahayu dkk., 1989).

BAL mempunyai sistem proteolitik yang kompleks yang dibutuhkan untuk pertumbuhan BAL itu sendiri dan juga memberi kontribusi yang nyata pada pembentukan flavour produk fermentasi. Mekanisme dan keberhasilan efek dari probiotik tergantung pada interaksi mikroflora, khususnya sel dari mukosa intestinal (Yusmarini, 2009).

Bakteri asam laktat memiliki peran dalam meningkatkan kadar keasaman dalam usus halus sehingga meningkatkan absorbs kalsium. Pada anak ayam kalsium digunakan untuk pembentukan tulang, sedangkan pada ayam dewasa digunakan untuk kulit telur (Anggorodi, 1990). Kekurangan kalsium pada ayam dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, nafsu makan, dan secara bertahap dapat menurunkan produksi ayam pedaging (Timan, dkk. 1991).

Pemberian probiotik pada ayam memberikan efek yang menguntungkan seperti pengurangan bakteri patogen didalam usus, mengurangi tekanan negative yang diakibatkan adanya hambatan pakan (anti nutrisi) pada pakan karena pemberian BAL

mampu menstimulasi peningkatan ketersediaan zat gizi bagi ayam (Sumarsih, dkk. 2012).

Mekanisme kerja probiotik yang pertama, BAL menempel dan berkolonisasi dalam saluran pencernaan. Kemampuan menempel BAL pada usus menyebabkan mikroba berkembang dengan baik dan mikroba patogen tereduksi seperti *Salmonella thyphimurium* dalam saluran pencernaan akan terhambat. Mekanisme kedua, berkompetisi terhadap makanan dan memproduksi zat anti mikroba. BAL menghambat organisme dengan berkompetisi untuk mendapatkan substrat bahan makanan untuk difermentasi. Mekanisme yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan hewan dengan mengeluarkan toksin yang menghambat perkembangan mikroba patogen dalam saluran pencernaan (Sumarsih, dkk. 2012).

E. Tinjauan Umum *Lactobacillus plantarum*

Lactobacillus adalah genus bakteri gram positif, anaerobik fakultatif atau mikroaerofilik, berbentuk batang. Genus bakteri ini termasuk kelompok bakteri asam laktat yang hidup sebagai mikro flora normal di dalam saluran pencernaan, saluran kemih, dan di dalam vagina serta peranannya dalam fermentasi pangan (Puspadewi dkk., 2011). *Lactobacillus plantarum* merupakan salah satu jenis BAL *homofermentatif* dengan temperatur optimal lebih rendah dari 37°C (Syachroni, 2014).

L. plantarum yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil isolasi dari dangke. Dangke sudah dikenal sejak tahun 1905, dalam masa penjajahan Belanda. Dangke diolah dari susu sapi atau susu kerbau yang dipanaskan dengan api kecil

sampai mendidih, kemudian ditambahkan koagulan berupa getah papaya yang berwarna kuning. Susu merupakan sumber protein hewani yang sangat penting bagi manusia. Proses pembuatan dangke menggunakan suhu pemanasan dan penggunaan papain yang mempengaruhi jenis dangke yang terbentuk (Nur, 2015).

L. plantarum berbentuk batang (0,5-1,5 hingga 1-10 μm) dan tidak bergerak (non motil). Bakteri ini memiliki katalase negatif, mampu mencairkan gelatin, cepat mencerna protein, tidak mereduksi nitrat, toleran terhadap asam, dan mampu memproduksi asam laktat. Dalam media agar, *L. plantarum* membentuk koloni berukuran 2-3 mm, berwarna putih dan dikenal sebagai bakteri pembentuk asam laktat (Puspadewi dkk., 2011).



Gambar 2.2 *Lactobacillus plantarum* (Anonim, 2012 dalam Syachroni, 2014).

Klasifikasi bakteri *Lactobacillus plantarum* digolongkan ke dalam kingdom Bacteria, filum Firmicutes, kelas Bacili, bangsa Lactobacillales, keluarga Lactobacillaceae, marga Lactobacillus, dan spesies *Lactobacillus plantarum* (Felis, 2008).

L. plantarum mampu merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan hasil akhirnya yaitu asam laktat. Asam laktat dapat menghasilkan pH yang rendah pada substrat sehingga menimbulkan suasana asam (Puspawati dkk., 2011). Dalam keadaan asam, *L. plantarum* memiliki kemampuan untuk menghambat bakteri patogen dan bakteri pembusuk (Delgado *et al.*, 2001).

L. plantarum dapat menghambat kontaminasi dari mikroorganisme patogen karena kemampuannya untuk menghasilkan asam laktat dan menurunkan pH substrat (Suriawiria, 1986). *L. plantarum* juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bakteriosin yang berfungsi sebagai zat antibiotik (Jenie dan Rini, 1995).

L. plantarum mampu menghambat bakteri-bakteri patogen seperti *Escherchia coli*, *Bacillus subtilis*, *Stapylococcus aureus*, bakteri-bakteri gram negatif dan beberapa bakteri lain sehubungan dengan kemampuannya memproduksi asam laktat, H₂O dan bakteriosin seperti *plantaricin*. Selain itu *L. plantarum* merupakan bakteri probiotik yang mampu bertahan sampai saluran pencernaan dan menciptakan keseimbangan mikroflora usus (Hidayati, 2006).

L. plantarum dapat meningkatkan keasaman sebesar 1,5 - 2 % pada substrat. Pertumbuhan *L. plantarum* dapat menghambat kontaminasi dari mikroorganisme patogen dan penghasil racun karena kemampuannya untuk menghasilkan asam laktat dan menurunkan pH substrat, selain itu dapat menghasilkan hidrogen peroksida yang dapat berfungsi sebagai antibakteri (Puspawati dkk., 2011).

Bakteri ini sering digunakan dalam fermentasi susu, sayuran dan daging (sosis). *L. plantarum* nampaknya paling banyak berperan dalam fermentasi, karena

suhu fermentasi yang digunakan lebih tinggi. Selain itu, fermentasi dari *L. plantarum* bersifat *homofermentatif* sehingga tidak menghasilkan gas (Buckle *et al.*, 1987).

F. Hipotesis

Hipotesis rencana penelitian ini ada pengaruh jenis BAL *Lactobacillus plantarum* terhadap kadar kolesterol karkas broiler.

G. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan menerapkan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 September – 31 Oktober 2018. Bertempat di Pannujuang Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dan penentuan kadar kolesterol karkas broiler di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki dua macam variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kadar kolesterol karkas sebagai variabel terikat dan konsentrasi suspensi *Lactobacillus plantarum* sebagai variabel bebas.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Kadar kolesterol karkas merupakan banyaknya kandungan kolesterol pada karkas broiler 5 minggu pemeliharaan yang disuplementasi *L. plantarum* dengan metode oral.
2. Konsentrasi BAL *L. plantarum* yang disuplementasi pada broiler sebanyak 10^{10} cfu/ml, 10^8 cfu/ml dan 10^6 cfu/ml.

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan pada rencana penelitian ini adalah kandang sistem panggung sebanyak 4 petak, tempat pakan dan minum, 4 buah lampu pijar 60 watt, inkubator, autoklaf, erlenmeyer, *hot plate and stirrer*, lampu spiritus, ose bulat, gelas ukur, tabung reaksi, pipet tetes, vortex, aluminium foil, spoit, termometer, *waterbath*, spektrofotometer, neraca analitik, *laminar air flow*, *mortal and pastle*, mikropipet, timbangan digital, erlenmeyer, botol you C, karet pentil, pisau dan tip.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada rencana penelitian ini adalah broiler strain SR 707 umur 1 hari atau *Day Old Chick* (DOC), ransum BP 11 dan PB II, sekam padi, kardus, karung, biakan murni *L. plantarum*, *Man Rogosa Sharpe Broth* (MRSB), vaksin ND B1, kapas, kertas saring, aquadest, asetil anhidrida, alkohol, heksan, bacto agar, bambu, terpal 5x7, kabel, vita stres, perkakas dan vitachick.

G. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Kandang

Kandang yang digunakan berupa kandang dengan sistem panggung dengan jarak dari tanah 40 cm beralaskan sekam padi berukuran 1 m x 1 m x 60 cm (panjang x lebar x tinggi) sebanyak 4 petak. Setiap petak kandang dilengkapi dengan tempat pakan kapasitas 3 kg dan tempat minum kapasitas 3 liter serta lampu pijar 60 watt, bagian sisi kandang dilapisi kardus.

Sekam ditaburkan dengan ketebalan 5 - 8 cm di lantai yang telah dipasang karung terlebih dahulu. Suhu kandang diatur 31 - 32°C dan dipertahankan untuk minggu pertama dengan menyalakan lampu selama 24 jam dan selanjutnya lampu hanya dinyalakan pada malam hari hingga akhir penelitian.

2. Preparasi Suspensi Bakteri Asam Laktat *Lactobacillus plantarum*

Biakan murni *L. plantarum* diremajakan di media MRSA dan diinkubasi selama 2 x 24 jam. Kemudian bakteri yang telah tumbuh kemudian dipindahkan kedalam media MRSB lalu di homogenkan dan di inkubasi selama 2 x 24 jam.

Pembuatan suspensi BAL menggunakan standar Mac Farland 8 dengan metode pengenceran (10^{10} , 10^9 , 10^8 , 10^7 , 10^6). Botol you C diisi dengan aquades steril sebanyak 27 ml. Isolat BAL *L. plantarum* di media MRSB dipipet kedalam botol you C 10^{10} , kemudian menghitung jumlah suspensi BAL sampai mencapai nilai 0.94 – 0.98 cfu/ml di spektrofotometer dengan absorbansi 625 nm. Kemudian dilakukan seri

pengenceran dari 10^{10} , 10^9 , 10^8 , 10^7 , 10^6 . Kemudian konsentrasi 10^{10} , 10^8 , 10^6 di pipet masing-masing ke dalam botol vial sebanyak 2 ml.

3. Pemeliharaan Broiler

Broiler dipelihara selama 5 minggu, sebanyak 24 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor setiap perlakuan. Sebelum pemberian perlakuan dilakukan adaptasi selama 1 minggu dengan tujuan agar broiler mampu saling beradaptasi dan tidak saling menyerang satu sama lain. Vaksin ND B1 (*New Castle Disease*) diberikan saat ayam berumur 4 hari melalui tetes mata. Pada minggu pertama dan kedua, tempat pakan dan air minum diletakkan di atas sekam, sedangkan untuk minggu ketiga sampai pemanenan tempat pakan dan air minum digantung sejajar dengan punggung ayam. Pakan dan air minum diberikan secara *ad libitum*.

4. Perlakuan Terhadap Hewan Percobaan

Broiler dibagi kedalam 4 kelompok perlakuan (Tabel 3.1). Semua kelompok broiler diberi pakan ransum standar.

Tabel 3.1. Jenis Perlakuan Hewan Uji

Kelompok Broiler	Perlakuan
P ₀	Broiler yang hanya diberi aquadest 2 mL
P ₁	Broiler yang diberi BAL dengan konsentrasi 10^6 cfu/mL
P ₂	Broiler yang diberi BAL dengan konsentrasi 10^8 cfu/mL
P ₃	Broiler yang diberi BAL dengan konsentrasi 10^{10} cfu/mL

Pemberian bakteri asam laktat *L. plantarum* ke broiler diberikan secara oral dengan menggunakan spuit. Pemberian BAL dilakukan setiap hari pada pagi hari sebelum pemberian pakan. BAL pertama kali diberikan setelah broiler beradaptasi

dikandang selama 1 minggu. Setiap hari dilakukan penimbangan untuk mengetahui perkembangan bobot broiler. Kemudian setelah pemberian BAL yang terakhir broiler di puasakn selama 2 jam (Astuti, 2009).

5. Preparasi Sampel Karkas Broiler

Broiler disembelih dan dibedah dengan pisau, kemudian dipisahkan daging dengan tulangnya (dada, paha dan sayap). Masing-masing karkas bagian dada, paha dan sayap ditimbang sebanyak 1 gram.

6. Analisis Kadar Kolesterol Karkas Broiler

Analisis kolesterol dengan metode *Lieberman Burchard*. Sebanyak 1 g sampel dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge kemudian ditambahkan campuran alkohol : heksan dengan perbandingan 3:1 sebanyak 8 ml, dan diaduk hingga bercampur dengan baik. Lalu disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Supernatan dipindahkan kedalam gelas baker 100 ml dan diuapkan pada *hot plate* sampai pelarut mengering. Residu ditambahkan kloroform sebanyak 5 ml, 2 ml acetic anhidrida dan H₂SO₄ pekat sebanyak 2 tetes. Selanjutnya divortex dan disimpan didalam ruang gelap selama 25 menit. Lalu dilakukan pembacaan absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang (λ) 680 nm dengan standar yang digunakan = 0.4 mg/ml (Wulaniriky, 2011). Nilai kolesterol diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = aX - b$$

Keterangan:

Y = nilai absorbansi sampel

X = nilai Variabel bebas

a = koefisien regresi

b = koefisien regresi

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan data yang telah diperoleh dari hasil pengukuran dianalisis dengan *One – Way* ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan's Multiple Range Test (DMRT) pada perlakuan pemberian BAL berpengaruh secara signifikan (Astuti dkk, 2009).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

Sebagai kandidat probiotik, bakteri asam laktat memiliki kemampuan dalam menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Pengukuran kadar kolesterol sampel diawali dengan menghitung absorbansi sampel pada spektrofotometer. Nilai absorbansi sampel dihitung dengan analisis regresi (Lampiran 4) menunjukkan bahwa $P < 0.05$ dengan koefisien regresi $a = 7,916$ dan $b = 0,294$. Besar pengaruh yang diberikan standar terhadap nilai absorbansi ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R^2), yaitu 0,927 artinya 99.2 % nilai absorbansi dipengaruhi oleh standar, 0,7%, selebihnya dipengaruhi faktor lain. Berdasarkan nilai ketetapan standar kolesterol, maka dilanjutkan dengan perhitungan kadar kolesterol sampel dengan persamaan $Y = aX - b$, dengan ketentuan Y merupakan nilai absorbansi sampel, a besarnya 7.916, b sebesar 0,294 dan X adalah nilai kolesterol sampel (Lampiran 2).

Hasil pengukuran kolesterol pada setiap perlakuan pemberian bakteri asam laktat *L. plantarum* terhadap karkas broiler diperoleh data (gambar 4.1) bahwa rata-rata kadar kolesterol organ ayam yang diberi perlakuan antara 61 mg sampai 69 mg. Rata-rata tertinggi 69 mg pada kelompok broiler yang tanpa pemberian BAL *L. plantarum* atau kontrol (P0), sedangkan rata-rata terendah 61 mg pada kelompok yang mendapat perlakuan pemberian BAL *L. plantarum* 10^8 cfu/ml (P2).



Gambar 4.1 Penurunan kadar kolesterol karkas setiap perlakuan.

Berdasarkan hasil sidik ragam data kadar kolesterol masing-masing perlakuan yang disajikan pada diagram 4.1, membuktikan bahwa kadar kolesterol berbeda secara signifikan dari efek perlakuan sehingga hipotesis diterima. Perlakuan P0 tanpa pemberian BAL *L. plantarum* berbeda nyata dengan ketiga perlakuan yaitu P1, P2, dan P3 yang diberi perlakuan bakteri asam laktat. Hasil uji menunjukkan terjadi penurunan yang paling tinggi yaitu pada perlakuan P2 yaitu pemberian *L. plantarum* dengan konsentrasi 10^8 cfu/ml.

Variabel Bebas:					
Keterangan	Jumlah Kuadrat	Derajat Bebas(db)	Rataan Kuadrat	F	Sig.
Perlakuan	0.000	3	7.546E-05	201.222	0.000
Kelompok	0.000	3	9.904E-05	264.111	0.000
Perlakuan * Kelompok	0.001	9	6.282E-05	167.519	0.000
Galat	6.000E-06	16	3.750E-07		
Total	0.156	32			

R Squared = .995 (Adjusted R Squared = .989)

Tabel 4.1 Analisis Uji Kadar Kolesterol pada Kelompok Perlakuan

Dari hasil analisis kadar kolesterol menunjukkan bahwa pada tiap bagian ayam memiliki kadar kolesterol yang berbeda-beda. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kadar kolesterol perlakuan berbeda nyata dengan kontrol.

B. Pembahasan

Penggunaan bakteri asam laktat sebagai probiotik merupakan salah satu pendekatan potensial untuk menurunkan kolesterol. Salah satu karakteristik BAL yaitu memiliki kemampuan dalam menurunkan kadar kolesterol. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa dengan mengkonsumsi produk yang mengandung bakteri asam laktat itu dapat menurunkan kadar kolesterol baik pada hewan maupun manusia (Akalin *et al.* 1997).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa pemberian *L. plantarum* dapat menurunkan kadar kolesterol. Gambar 4.1 menunjukkan rata-rata kadar kolesterol yang terdapat pada kelompok perlakuan kontrol (P0) yaitu kelompok perlakuan tanpa pemberian *L. plantarum* dengan kadar kolesterol 69 mg. Rata-rata kelompok perlakuan selanjutnya mengalami penurunan untuk kelompok P1 (68 mg), P2 (61 mg) dan P3 (66 mg). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saidin (2000). Kandungan kolesterol pada berbagai bahan makanan hewani seperti pada daging ayam berkisar 110 mg, hati sebanyak 592 mg, kulit sebanyak 165 mg dan kuning telur sebanyak 485 mg.

Menurut Tannock (1999) batas pemberian probiotik yaitu berkisar antara 10^6 cfu/ml sampai dengan 10^8 cfu/ml. Jadi, pemberian BAL yang paling baik menurunkan

kadar kolesterol yaitu pada konsentrasi 10^8 cfu/ml. Hal ini disebabkan karena jumlah sel yang diberikan pada perlakuan P2 itu lebih efektif menurunkan kadar kolesterol dibandingkan dengan P1 konsentrasi 10^6 cfu/ml dan P3 konsentrasi 10^{10} cfu/ml, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu Astuti, dkk. (2009) bahwa yang lebih efektif menurunkan kadar kolesterol yaitu pada konsentrasi 10^8 cfu/ml. Sedangkan pada P3 sudah tidak efektif karena pemberian konsentrasi BAL memiliki batas pemberian seperti yang di kemukakan Tannock (1999).

Penurunan kadar kolesterol oleh *Lactobacillus* dapat melalui beberapa mekanisme. Mekanisme pertama yaitu melalui feses, garam empedu yang terdekonjugasi tidak diserap oleh usus, dan lebih mudah terbuang dari saluran pencernaan dibandingkan dengan garam empedu terdekonjugasi (Fadhillah, dkk. 2015). Mekanisme kedua yaitu BAL dapat menghambat sintesis kolesterol sehingga menurunkan produksi kolesterol. Kemampuan ketiga adalah BAL mampu mengikat kolesterol sehingga mencegah penyerapan kolesterol kembali ke hati (Callado, *et al.* 2009).

BAL juga mampu menghasilkan enzim kolesterol reduktase yang dapat mengkonversi kolesterol menjadi koprostanol yaitu jenis sterol yang tidak dapat diserap oleh usus. Kolesterol didalam usus diubah menjadi koprostanol sehingga tidak dapat diserap oleh usus dan akan keluar bersama dengan feses. Koprostanol adalah steroid alami yang dapat dihasilkan oleh bakteri dalam usus manusia atau hewan. Produk makanan hewani yang diberi BAL yang menghasilkan enzim kolesterol reduktase untuk mengurangi jumlah kolesterol tidak akan menurunkan kualitas produk

yang dihasilkan, dan tidak menimbulkan efek samping yang berat, karena enzim dalam suhu yang tinggi akan terdenaturasi (Nuraida, dkk., 2011).

Kemampuan BAL dalam mengasimilasi kolesterol ini menyebabkan penurunan kadar kolesterol daging. Pada mekanisme asimilasi kolesterol, BAL akan mengabsorpsi kolesterol sehingga kolesterol menyatu dengan membran seluler bakteri, yang menyebabkan bakteri tahan terhadap lisis. Akibat penurunan absorbs kolesterol pada sistem pencernaan, maka kadar kolesterol pada daging juga mengalami penurunan (Yuniastuti, 2004 dalam Fadhillah, dkk. 2015).

Kemampuan *Lactobacillus* dalam menurunkan kolesterol diduga karena mampu mengasimilasi kolesterol dalam usus halus dan mendekongugasi garam empedu. Asam lemak rantai pendek yang diproduksi oleh *Lactobacillus* dapat menghambat distribusi kolesterol di dalam plasma dan hati serta menghambat sintesis kolesterol hepatis (Callado, *et al.* 2009).

Beberapa jenis BAL memiliki kemampuan dalam mengikat kolesterol dalam usus halus sebelum kolesterol diserap oleh tubuh disebabkan oleh enzim *Bile Salt Hydrolase* (BSH) yang mendekongugasi garam empedu, dimana glisin atau taurin dipisahkan dari steroid, sehingga menghasilkan garam empedu bebas atau terdekongugasi (Nuraida, dkk., 2011).

Pada lingkungan yang penuh persaingan dalam saluran pencernaan enzim BSH memberikan keuntungan khusus bagi strain bakteri probiotik dengan memberikan daya tahan yang lebih baik terhadap garam empedu serta membantu dalam menurunkan kadar kolesterol daging (Begley, 2006).

Kadar kolesterol yang normal pada orang dewasa sebesar 120 – 200 mg/dl (tabel 2.1). Jika kadar kolesterol > 240 mg/dl tergolong tinggi masuk kedalam kategori berbahaya yang bisa menyebabkan stroke. Jika orang sehat dapat mengkonsumsi produk hewani yang mengandung kolesterol perhari yang disarankan sebesar 300 mg, sedangkan yang mempunyai riwayat penyakit jantung dan diabetes harus membatasi asupan kolesterol < 200 mg/ hari. Pedoman gizi seimbang, untuk jumlah konsumsi daging ayam per hari sebanyak 2-4 potong ukuran sedang (Rianda, 2017).

Nabi Muhammad saw menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan makan sedikit memungkinkan tubuh kita untuk berkonsentrasi, proses pembuangan zat-zat toksin keluar tubuh dan regenerasi sel-sel tubuh yang rusak bisa berlangsung secara optimal. Sedangkan, apabila konsumsi makanan yang melebihi batasan, kondisi lambung yang penuh tubuh akan sibuk untuk menguraikan makanan. Inilah salah satu yang mengundang penyakit seperti, kolesterol, diabetes, dan darah tinggi. Mengkonsumsi makanan yang berlebihan membuat seseorang menjadi malas untuk beribadah, melemahkan semangat dan mudah mengantuk. Nabi sudah memperingatkan kepada umatnya bagaimana dampak negatif dari sumber makanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa BAL *L. plantarum* memiliki kemampuan menurunkan kadar kolesterol pada karkas broiler. Perlakuan P0 (kontrol) memiliki nilai kolesterol tertinggi yaitu sebanyak 69 mg, perlakuan P1 (10^6 cfu/ml) nilai kolesterol sebanyak 68 mg, perlakuan P2 (10^8 cfu/ml) nilai kolesterol sebanyak 61 mg, dan pada perlakuan P3 (10^{10} cfu/ml) nilai kolesterol sebanyak 66 mg. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa kadar kolesterol perlakuan berbeda nyata dengan kontrol. Perlakuan P0 tanpa pemberian BAL *L. plantarum* berbeda nyata dengan ketiga perlakuan yaitu P1, P2, dan P3 yang diberi perlakuan bakteri asam laktat *L. plantarum*. Hasil uji menunjukkan perlakuan P2 yaitu pemberian *L. plantarum* dengan konsentrasi 10^8 cfu/ml memiliki nilai terendah dibanding konsentrasi yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa BAL *L. plantarum* memenuhi kriteria sebagai kandidat probiotik.

B. Saran

Adapun saran yang berdasar dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lanjutan untuk mengetahui kemampuan BAL *L. plantarum* untuk menurunkan kolesterol karkas broiler.

2. Untuk kepentingan informasi bagi industri peternakan, perlu dilakukan pengembangan dalam hal pemberian BAL *L. plantarum* terhadap broiler.



KEPUSTAKAAN

- Aak. *Beternak Ayam Pedaging*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Abun. *Nutrisi Ternak Unggas dan Monogastrik*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2006.
- Anggorodi, H. R. *Ilmu Makanan Ternak Umum*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Akalin, A.S., S. Gone and S. Duzell. *Influence of Yogurt dan Acidophilus Yogurt On Serum Cholesterol Levels In Mice*. J. Dairy Sci. 1997.
- Aryanta, I W. R.. “Peranan Bakteri Asam Laktat Dalam Industri Pengolahan Bahan Pangan”. Prosiding Orasi Ilmiah Guru Besar Universitas Udayana tahun 1991 – 2005. Denpasar: Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana, 2007.
- Asmarani, G. W. *Pengaruh Pemberian Buah Papaya (Carica Papaya L). Terhadap Kadar Kolesterol LDL dan HDL Pada Tikus Sprague Dawley Dengan Hiperkolesterolemia*. Semarang: Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran, 2012.
- Astuti, Bachruddin, Z., Supadmo, Harmayani, E.” Penngaruh Pemberian Bakteri Asam Laktat *Streptococcus thermophilus* Terhadap Kadar Kolesterol Darah Ayam Broiler Strain Lohman”. Yogyakarta: Fakultas MIPA UGM, 2009.
- Baigent, C. and R. Clarke. *Cholesterol dan Lipids*. USA: International Encyclopedia of Public Health, Elsevier Inc, 2008.
- Bell, D. D and W. D. Weaver, Jr. *Commercial Chicken Meat dan Egg Production*. New York: Springer Science and business Media Inc., 2002.
- Buckle, K.A., Edwards, R.A., Fleet, G.H., dan Wootton, M. *Ilmu Pangan*. Jakarta: UI-Press. 1987.
- Collado, M. C., E. Isolauri, S. Salmien, And Y. Sanz. *The Impact Of Probiotic On Gut Health*. Curr Drug Metab. No. 10 ((2009) h: 68-78.
- Departemen Kesehatan RI. *Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia*. Jakarta: Depkes RI, 1995. Diyan Yunanto Setyaji . “Pengaruh Pemberian *Nata De Coco* Terhadap Kadar Kolesterol Ldl Dan Hdl Pada Tikus Hiperkolesterolemia”. Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2011.

- Delgado, A., D. Brito, P. Fevereiro, C. Peres, and J.F. Marques. "Antimicrobial Activity Of *L. Plantarum*, Isolated From A Traditional Lactic Acid Fermentation Of Table Olives". *INRA, EDP Science*. 81 no. 1 (2001): p 203-215.
- Fardiaz, S. *Petunjuk Laboratorium Mikrobiologi Pengolahan Pangan*. Bogor: Pusat Antar Universitas Institut Pertanian Bogor, 1992.
- Fadhilah, A. N. Hafsan, Nur, F." Penurunan Kadar Kolesterol Oleh Bakteri Asam Laktat Asal Dangke Secara *In Vitro*". Prosiding Seminar Biologi, 2015
- Felis, G. E. dan F. Dellaglio. "Taxonomy of lactobacilli and Bifidobacteria". *Current Issues in intestinal microbiology*, 8 (2008): h 44-61
- Gordon, S. H and D.R. Charles. *Niche and Organic Chicken Products Their Technology and Scientific Principles*. Nottingham University Press, Definitions: III-X, UK, 2002.
- Guessas, B. and Kihal, M. "Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from Algerian Arid Zone Raw Goats' Milk". 2004.
- Hadi, S. "Penampilan Ayam broiler Strain Cobb yang Mendapat Ransum dengan Imbangan energi-Protein Berbeda". *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2002.
- Haris,A. *Beternak Ayam Broiler*. Pekalongan: Gunung Mas, 1997.
- Hidayat, Masdiana N. Padaga D. dan Sukartini S. *Mikrobiologi industri*. Yogyakarta:CV andi affset, 2006.
- Hasanuddin, S., Yunianto, V. D. dan Tristiarti. Lemak dan Kolesterol Daging pada Ayam Broiler yang Diberi Pakan *Step Down* Protein dengan Penambahan air Perasan Jeruk Nipis Sebagai *Acidifier*. *Bulletin Nutrisi dan Makanan Ternak*, 9 No 1 (2013).
- Holzappel, W. H. and U. Schillinger. *Introduction to pre- dan probiotics*. Food Res. Int. 35 (2002): p. 109-116.
- Jenie, S.L., dan Shinta E. Rini. "Aktivitas Antimikroba dari Beberapa Spesies *Lactobacillus* terhadap Mikroba Patogen dan Perusak Makanan". *Buletin Teknologi dan Industri Pangan*, 7 no.2 (1995): h. 46-51.
- Kartasudjana, R., Suprijatna E. *Manajemen Ternak Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2006.

- Kartika, D. S. "Tanda Gejala dan Bahaya *Hiperkolesterolemia*". Surakarta: *Studi Ilmu Keperawatan*. 2009.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2016.
- Kusnadi, E. "Pengaruh Temperatur Kandang Terhadap Konsumsi Ransum Dan Komponen Darah Ayam Broiler". *Jurusan Produksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Andalas*, 2008.
- Majah, I. *Sahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.
- Mulyantono. *Sulitnya Mencari Bibit Favorit*. Majalah Poultry Indonesia, 2003.
- Murtidjo, B.A. *Pedoman Beternak Ayam Broiler*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Muchtadi, D., Sri Palupi N., Astawan M. *Metabolisme Zat Gizi, Sumber, Fungsi dan Kebutuhan Bagi Tubuh Manusia Jilid II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Mitsuoka, T. *A Profile of Intestinal Bacteria*. Japan: Yakult Honsha Co. Ltp, 1990.
- Ngatirah, A. "Seleksi Bakteri Asam Aktat sebagai Agen Probiotik Yang Berpotensi Menurunkan Kolesterol". *Tesis*. Pascasarjana. Yogyakarta: UGM, 2000.
- Nur, F. Hafsan dan W. Andi. "Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat Berpotensi Probiotik pada Dangke, Makanan Tradisional dari Susu Kerbau di Curio Kabupaten Enrekang". *BIOGENESIS. J. Ilmiah Biologi*. 3 No. 1 Juni (2015): h. 60-65.
- Nuraida, Lilis, Siti Winarti, Hana, Ending Praagmutri. "Evaluasi In Vitro Terhadap Kemampuan Isolat Bakteri Asam Laktat Asal Air Susu Ibu Untuk Mengasimilasi Kolesterol dan Mendekongasi Garam Empedu". *Teknologi Industri Pangan*, 2011.
- Ooi, L.G. and M. T. Liong. "Cholesterol-Lowering Effects of Probiotics and Prebiotics: A Review of in Vivo and in Vitro". *Int. J. Mol. Sci.* 11 No. 6 (2010): p. 2499–2522
- Prambudi. "Selayang Pandang Broiler Cobb 500". *Nutrisi ternak IPB. Media Informasi dan Komunikasi Seputar Dunia Peternakan*. <http://article-34.blogspot.com/2007/08/animalnutrition-v-Cobb-500.html>. (14 Februari 2012).

- Poultry Indonesia. Menelusuri Jejak Strain-strain Ayam Ras Terpilih. *Situs Poultry Indonesia*. <http://www.poultryindonesia.com/modules.php?name=News&file=article&sid=235> (15 Juli 2010).
- Puspadewi, R., Adirestuti, Putranti., dan Anggraeni, Gina. “Aktivitas Metabolit Bakteri *Lactobacillus plantarum* dan Perannya dalam Menjaga Kesehatan Saluran Pencernaan”. Cimahi: Universitas Jenderal Achmad Yani, 2011.
- Rahayu, K dan S. Sudarmadji. *Mikrobiologi Pangan*. Jogjakarta: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Rahmat, D. dan Wiradimadja, R. “Pendugaan Kadar Kolesterol Daging dan Telur Berdasarkan Kadar Kolesterol Darah Pada Puyuh Jepang”. *Jurnal Ilmu Ternak*. 11. no 1 (Juni 2011): h. 35-38.
- Ravnskov, U. The Cholesterol Myths. [http. //www. Ravnskov.nu/ cholesterol.htm](http://www.Ravnskov.nu/cholesterol.htm). [21 Desember 2005].
- Rasyaf, M. *Beternak Ayam Pedaging*. Jakarta: Penebar Swadaya, 1996.
- Rianda, D. *Beauty Undercover For Muslimah*. Elex Media Komputindo, 2017.
- Rusmana, D. Natawiharja, P. Happali. “Pengaruh Pemberian Ransum Mengandung Minyak Ikan Lemuru dan Vitamin E Terhadap Kadar Lemak Dan Kolesterol Daging Ayam Broiler”. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Saidin, M. Kandungan Kolesterol Dalam Berbagai Bahan Makanan Hewani. *Bul. Penelitian Kesehatan*, 2000.
- Salminen, S., Wright, A.V., and Ouwehand, A.. Lactic Acid Bacteria. *Microbiological dan Functional Aspects*. New York: Marcel Dekker, 2004.
- Sarwono, B. *Beternak Ayam*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2003.
- Setyaji, D. Y. “Pengaruh Pemberian *Nata De Coco* Terhadap Kadar Kolesterol LDL dan HDL Pada Tikus Hiperkolesterolemia”. Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2011.
- Sunarlim, R. “Potensi *Lactobacillus* sp. Asal dari dadih sebagai starter pada pembuatan susu fermentasi khas indonesia”. *Buletin teknologi pascapanen pertanian* 5 (2006): h. 69-79.
- Suharti, S. A. Banowati, W. Heriana, K. G. Wiryawan. “Komposisi Dan Kandungan Kolesterol Karkas Ayam Broiler Diare Yang Diberi Tepung Daun Salam

- (*Syzygium polyanthum wight*) Dalam Ransum”. *Med-Pet*, No. 31(2008): h 138-145.
- Suriawiria, Unus. *Mikrobiologi Masa Depan Penuh Kecerahan Di Dalam Pembangunan*. Bandung: ITB, 1986.
- Sumarsih, S., Sulistiyanto, B., Sutrisno, C. I dan Rahayu, E.S. “Peran Mikroba Bakteri Asam Laktat Terhadap Produktivitas Ungas”. Yogyakarta: *Jurnal Litban* 10 No. 1, (2012).
- Situmorang N. A., L.D. Mahfudz, dan U. Atmomarsono. “Pengaruh Pemberian Tepung Rumput Laut (*Gracilaria verrucosa*) Dalam Ransum Terhadap Efisiensi Penggunaan Protein Ayam Broiler” . *Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro* 2 No. 2 (2013): h. 49-56.
- Syahroni. Pengaruh Kombinasi Starter Kultur *Lactobacillus plantarum* Dan *Lactobacillus acidophilus* Terhadap Karakteristik Mikrobiologis Dan Kimiawi Pada Minuman Fermentasi. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Tannock, G. W. Probiotic A Critical Review. *Horizon Scientific Press*. Norfolk, England, 1999.
- Tilman, A. D., Hartadi, H., Reksohadiprojo, S., Prawirokusumo, S. dan Lebdoesoekojo, S. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Watson, A,K,H. Development of consumer probiotics for the US market. *Dairy and food culture technologies*. Littleton. USA, 2008.
- Wahyuningsih M. “Mengenal Cara Kerja Kolesterol dalam Tubuh”. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/gaya_hidup/20150113152832-255-24330/mengenal-cara-kerja-kolesterol-dalam-tubuh/(13 Januari 2015).
- Widyaningsih, W. Prabowo, A. Sumiasih. Pengaruh Ekstrak Etanol Daging Bekicot (*Achantina fulica*) Terhadap Kadar Kolesterol Total, HDL, dan LDL Serum Darah Tikus Jantan Galur Wistar. *Jurnal Sains Dan Teknologi Farmasi*, 15, No.1 (2010): h. 1-10.
- Wulaniriky. “Pengukuran Kadar Kolesterol (Metode Lieberman-Burchards)”. *Situs resmi Wulaniriky*. <https://wulaniriky.wordpress.com/pengukuran-kadar-kolesterol-metode-lieberman-burchards/> (21 Januari 2011).

- Yulinery, T., E. Yulianto dan N. Nurhidayat. “Uji Fisiologis Probiotik *Lactobacillus* sp Mar 8 yang telah Dienkapsulasi Dengan Menggunakan Spray Dryer Untuk Menurunkan Kolesterol”. *Biodiversitas* 7 No. 2 (2006): h. 118 – 122.
- Yuniastuti, A. “Efek Hipokolesterol *Lactobacillus Acidophilus* D2 Dari Susu Fermentasi Pada Tikus”. Jurusan Biologi Fakultas Matematika Dan Pengetahuan. 2004.
- Yuniar L. “Performa *Broiler* Pada Suhu Kandang Dan Warna Cahaya Yang Berbeda”. *Skripsi*. Departemen Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Yusmarini, Indrati R., Utami T., dan Marsono Y. “Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat Proteolitik dari Susu Kedelai yang Terfermentasi Spontan”. *Jurnal Natur Indonesia* 12 No. 1 (Oktober 2009): h. 28-33.






LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1. Tabel Kurva Standar Kolesterol

No.	Larutan(ml)	Kloroform (ml)	Konsentrasi(mg/ml)	Absorbansi 680
1	5	5	0.2	1.4
2	9	1	0.18	1.2
3	4	6	0.16	0.7
4	7	3	0.14	0.9
5	6	4	0.12	0.7
6	5	5	0.1	0.4
7	4	6	0.08	0.3
8	3	7	0.06	0.2
9	2	8	0.04	0.1

Lampiran 2. Kurva Standar Kolesterol

Lampiran 3. Contoh Perhitungan Kadar Kolesterol

Rumus:

$$Y = aX - b$$

Keterangan:

Y = nilai absorbansi sampel

X = nilai Variabel bebas

a = koefisien regresi

b = koefisien regresi

diketahui:

$$Y = 0,263$$

$$a = 7,916$$

$$b = 0,294$$

$$Y = aX - b$$

$$0,263 = 7,916X - 0,294$$

$$0,263 + 0,294 = 7,916X$$

$$0,557 = 7,916X$$

$$X = 0,070$$

Jadi, kadar kolesterol adalah 70 mg.

Lampiran 4. Tabel Kadar Kolesterol Organ pada Setiap Perlakuan

Sampel	Perlakuan (mg)											
	P0		Rerata	P1		Rerata	P2		Rerata	P3		Rerata
	1	2		1	2		1	2		1	2	
Paha	0,075	0,075	0,075	0,070	0,071	0,070	0,069	0,070	0,069	0,081	0,080	0,080
Dada	0,073	0,073	0,073	0,070	0,069	0,069	0,070	0,071	0,070	0,072	0,072	0,072
Sayap	0,079	0,079	0,079	0,071	0,071	0,071	0,057	0,057	0,057	0,062	0,063	0,062
Komposit	0,069	0,069	0,069	0,069	0,067	0,068	0,062	0,061	0,061	0,066	0,067	0,066



Lampiran 5. Hasil Uji Analisis *One Way Anova*

GET

FILE='E:\Lacteal\PROPOSAL\spss hasil.sav'.

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.

UNIANOVA Hasil BY Perlakuan Kelompok

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/POSTHOC=Perlakuan Kelompok(TUKEY)

/EMMEANS=TABLES(OVERALL)

/PRINT=DESCRIPTIVE HOMOGENEITY

/CRITERIA=ALPHA(.05)

/DESIGN=Perlakuan Kelompok Perlakuan*Kelompok.

Univariate Analysis of Variance

Notes		
Output Created		07-NOV-2018 01:15:53
Comments		
Input	Data	E:\Lacteal\PROPOSAL\spss hasil.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>

	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	32
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the model.
Syntax		UNIANOVA Hasil BY Perlakuan Kelompok /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /POSTHOC=Perlakuan Kelompok(TUKEY) /EMMEANS=TABLES(OVER ALL) /PRINT=DESCRIPTIVE HOMOGENEITY /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=Perlakuan Kelompok Perlakuan*Kelompok.
Resources	Processor Time	00:00:00.08
	Elapsed Time	00:00:00.39

Between-Subjects Factors			
		Value Label	N
Probiotik	1	P0	8
	2	P1	8
	3	P2	8
	4	P3	8
Organ	1	Paha	8
	2	Dada	8
	3	Sayap	8
	4	Komposit	8

Descriptive Statistics				
Dependent Variable: Kadar Kolesterol				
Probiotik	Organ	Mean	Std. Deviation	N
P0	Paha	.07500	.000000	2
	Dada	.07300	.000000	2
	Sayap	.07900	.000000	2
	Komposit	.06900	.000000	2
	Total	.07400	.003854	8
P1	Paha	.07050	.000707	2

	Dada	.06950	.000707	2
	Sayap	.07100	.000000	2
	Komposit	.06800	.001414	2
	Total	.06975	.001389	8
P2	Paha	.08050	.000707	2
	Dada	.07200	.000000	2
	Sayap	.05700	.000000	2
	Komposit	.06150	.000707	2
	Total	.06775	.009794	8
P3	Paha	.06950	.000707	2
	Dada	.07050	.000707	2
	Sayap	.06250	.000707	2
	Komposit	.06650	.000707	2
	Total	.06725	.003370	8
Total	Paha	.07388	.004673	8
	Dada	.07125	.001488	8
	Sayap	.06738	.008943	8
	Komposit	.06625	.003151	8
	Total	.06969	.005943	32

Levene's Test of Equality of Error Variances^a			
Dependent Variable: Kadar Kolesterol			
F	df1	df2	Sig.
.	15	16	.

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.^a

a. Design: Intercept + Perlakuan + Kelompok + Perlakuan * Kelompok

Estimated Marginal Means

Grand Mean			
Dependent Variable: Kadar Kolesterol			
Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
		Lower Bound	Upper Bound
.070	.000	.069	.070

Post Hoc Tests

Probiotik

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: Kadar Kolesterol						
Tukey HSD						
(I) Probiotik	(J) Probiotik	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
P0	P1	.00425*	.000306	.000	.00337	.00513
	P2	.00625*	.000306	.000	.00537	.00713
	P3	.00675*	.000306	.000	.00587	.00763
P1	P0	-.00425*	.000306	.000	-.00513	-.00337
	P2	.00200*	.000306	.000	.00112	.00288
	P3	.00250*	.000306	.000	.00162	.00338
P2	P0	-.00625*	.000306	.000	-.00713	-.00537
	P1	-.00200*	.000306	.000	-.00288	-.00112
	P3	.000050	.000306	.389	-.00038	.00138
P3	P0	-.00675*	.000306	.000	-.00763	-.00587
	P1	-.00250*	.000306	.000	-.00338	-.00162
	P2	-.000050	.000306	.389	-.00138	.00038

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3.750E-7.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Homogeneous Subsets

Kadar Kolesterol				
Tukey HSD ^{a,b}				
Probiotik	N	Subset		
		1	2	3
P3	8	.06725		
P2	8	.06775		
P1	8		.06975	
P0	8			.07400
Sig.		.389	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3.750E-7.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 8.000.

b. Alpha = .05.

Organ

Multiple Comparisons						
Dependent Variable: Kadar Kolesterol						
Tukey HSD						
(I) Organ	(J) Organ	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Paha	Dada	.00263*	.000306	.000	.00175	.00350
	Sayap	.00650*	.000306	.000	.00562	.00738
	Komposit	.00763*	.000306	.000	.00675	.00850
Dada	Paha	-.00263*	.000306	.000	-.00350	-.00175
	Sayap	.00388*	.000306	.000	.00300	.00475
	Komposit	.00500*	.000306	.000	.00412	.00588
Sayap	Paha	-.00650*	.000306	.000	-.00738	-.00562
	Dada	-.00388*	.000306	.000	-.00475	-.00300
	Komposit	.00113*	.000306	.010	.00025	.00200
Komposit	Paha	-.00763*	.000306	.000	-.00850	-.00675
	Dada	-.00500*	.000306	.000	-.00588	-.00412
	Sayap	-.00113*	.000306	.010	-.00200	-.00025

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3.750E-7.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Homogeneous Subsets

Kadar Kolesterol					
Tukey HSD ^{a,b}					
Organ	N	Subset			
		1	2	3	4
Komposit	8	.06625			
Sayap	8		.06738		
Dada	8			.07125	
Paha	8				.07388
Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3.750E-7.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 8.000.

b. Alpha = .05.

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian




a. Kondisi kandang tampak luar



b. Kondisi kandang siang hari



c. Kondisi kandang malam hari




a. Vaksin ND B1



b. Tempat air minum




c. Tempat pakan





d. Timbangan digital



e. Thermometer




a. Media MRSA


b. *L. plantarum* hasil inkubasi

c. Media MRSB

d. Biakan bakteri *L. plantarum*



a. Vaksinasi dengan ND B1



b. Pemberian BAL secara oral



c. Hasil pengenceran



d. Spoit

Lampiran 8. Preparasi Sampel dan Uji Kolesterol




a. Menghaluskan daging




b. Menimbang sampel



c. Memipet larutan pengestrak



d. Sampel yang sudah ditimbang




e. Sampel dimasukkan kedalam tabung



f. Penguapan larutan pengestrak



g. Proses sentrifuge sampel



h. Penyimpanan sampel diruang gelap



i. Pengukuran absorbansi sampel

Lampiran 9. Alat dan Bahan Penelitian

a. Autoklaf



b. Neraca Analitik



c. Spektrofotometer



d. Oven



e. Inkubator



f. vortex



a. kloroform




b. Asetil Anhidrida



c. Bacto Agar



d. MRSB



e. Alkohol

f. H₂SO₄ Pekat

Lampiran 10. Standar Mc Farland

FORMULA

Latex Standard	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8
Latex Particles									
Sodium Azide									
Approximate Cell Density $\times 10^8$ /ml	1.5	3	6	9	12	15	18	21	24
Absorbance Specification at 625nm (ABS)	0.08 to 0.10	0.14 to 0.17	0.27 to 0.31	0.38 to 0.42	0.51 to 0.55	0.67 to 0.70	0.74 to 0.77	0.83 to 0.88	0.94 to 0.98



Lampiran 11. Hasil Uji Absorbansi Sampel pada Spektrofotometer

Absorbance Ratio			
Test Name: SALIM			
IDR	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.034	-0.034	1.000
2	0.304	0.303	1.000
3	0.302	0.302	1.000
4	-0.034	-0.034	1.000
5	-0.034	-0.034	1.000

Page 1, Samples 1 - 5

Absorbance Ratio			
Test Name: SALIM			
IDR	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.034	-0.033	1.030
2	0.283	0.284	0.996
3	0.283	0.287	0.985
4	-0.034	-0.034	1.000
5	-0.033	-0.034	0.971

Page 1, Samples 1 - 5

d. Daging Paha (P0)

c. Daging Dada (P0)

Absorbance Ratio			
Test Name: SALIM			
IDR	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.033	-0.033	1.000
2	0.324	0.331	1.009
3	0.327	0.329	0.997
4	-0.033	-0.033	1.000
5	-0.034	-0.034	1.000

Page 1, Samples 1 - 5

Absorbance Ratio			
Test Name: SALIM			
IDR	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.034	-0.034	1.000
2	0.253	0.254	0.996
3	0.251	0.240	1.012
4	-0.034	-0.034	1.000
5	-0.034	-0.034	1.000

Page 1, Samples 1 - 5

b. Daging Sayap (P0)

a. Komposit (P0)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIH 12:41pm 1Jan00

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.034	-0.034	1.000
2	0.263	0.263	1.000
3	0.272	0.271	1.004
4	-0.034	-0.034	1.000
5	-0.034	-0.034	1.000

Page 1, Samples 1 - 5

Save Measure
Data Samples

d. Daging Paha (P1)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIH 12:54pm 1Jan00

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.033	-0.034	0.971
2	0.253	0.257	0.984
3	0.252	0.249	1.012
4	-0.033	-0.033	1.000
5	-0.034	-0.033	1.030

Page 1, Samples 1 - 5

Save Measure
Data Samples

a. Daging Dada (P1)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIH 12:48pm 1Jan00

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	0.269	0.269	1.000
2	-0.034	-0.034	1.000
3	0.269	0.269	1.000
4	0.267	0.268	0.996
5	-0.034	-0.034	1.000

Page 1, Samples 1 - 5

Save Measure
Data Samples

b. Daging Sayap (P1)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIH 12:21pm 1Jan00

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	0.243	0.245	0.992
2	-0.033	-0.033	1.000
3	0.239	0.236	1.013
4	0.243	0.244	0.996
5	-0.033	-0.033	1.000

Page 1, Samples 1 - 5

Save Measure
Data Samples

c. Komposit (P1)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIM
2:27pm 1Jan00
Cell B5

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.034	-0.033	1.030
2	0.252	0.252	1.000
3	0.260	0.260	1.000
4	-0.034	-0.033	1.030
5	-0.033	-0.033	1.000

Page 1, Samples 1 - 5
Save Data Measure Samples

a. Daging Paha (P2)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIM
2:19pm 1Jan00
Cell B5

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.036	-0.036	1.000
2	0.259	0.259	1.000
3	0.269	0.266	1.011
4	-0.036	-0.036	1.000
5	-0.036	-0.036	1.000

Page 1, Samples 1 - 5
Save Data Measure Samples

b. Daging Dada (P2)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIM
2:11pm 1Jan00
Cell B5

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.033	-0.033	1.000
2	0.154	0.154	1.000
3	0.155	0.156	0.994
4	-0.033	-0.033	1.000
5	-0.033	-0.033	1.000

Page 1, Samples 1 - 5
Save Data Measure Samples

c. Daging Sayap (P2)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIM
1:59pm 1Jan00
Cell B5

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.033	-0.033	1.000
2	0.194	0.194	1.000
3	0.191	0.190	1.005
4	-0.033	-0.033	1.000
5	-0.033	-0.033	1.000

Page 1, Samples 1 - 5
Save Data Measure Samples

d. Komposit (P2)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIM
2:01pm 1Jan00
Cell 1:5

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.034	-0.034	1.000
2	0.350	0.351	0.997
3	0.342	0.338	1.012
4	-0.034	-0.034	1.000
5	-0.034	-0.034	1.000

Page 1, Samples 1 - 5
Save Data Measure Samples
2018-10-31 20:02

a. Daging Paha (P3)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIM
2:04pm 1Jan00
Cell 1:5

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.034	-0.034	1.000
2	0.280	0.276	1.014
3	0.278	0.278	1.000
4	-0.034	-0.034	1.000
5	-0.033	-0.034	0.971

Page 1, Samples 1 - 5
Save Data Measure Samples
2018-10-31 20:05

b. Daging Dada (P3)

Test Name: SALIM
2:03pm 1Jan00
Cell 1:5

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.034	-0.033	1.030
2	0.203	0.198	1.025
3	0.204	0.203	1.005
4	-0.034	-0.033	1.030
5	-0.033	-0.034	0.971

Page 1, Samples 1 - 5
Save Data Measure Samples
2018-10-31 20:02

c. Daging Sayap (P3)

Absorbance Ratio
Test Name: SALIM
2:25pm 1Jan00
Cell 1:5

ID#	Abs 680.0	Abs 680.0	Result
1	-0.033	-0.033	1.000
2	0.226	0.229	0.987
3	0.211	0.214	0.986
4	-0.033	-0.033	1.000
5	-0.033	-0.033	1.000

Page 1, Samples 1 - 5
Save Data Measure Samples

d. Komposit (P3)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Mursalim, lahir di Pannujuang, 04 November 1996. Beralamat lengkap di Pannujuang Desa Kalemardalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Abd. Latif dan St. Ramlah.

Mengawali pendidikan di jenjang sekolah dasar pada tahun 2002-2008 yakni di SD Inpres Pannujuang, kemudian melanjutkannya ke jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2008-2011 yaitu di Mts. Muhammadiyah Mandalle, dan ke jenjang yang lebih tinggi lagi di tahun 2011-2014 yakni di SMA Negeri 1 Galesong Utara. Kemudian secara resmi di tahun 2014 lulus untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK), Jurusan Biologi.