

**ANALISIS PEDIGREE VITILIGO PADA KOMUNITAS TO BALO
KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI NABILA NURFITRAH
NIM. 60300114157

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nabila Nurfitriah
NIM : 60300114157
Tempat/Tgl.Lahir : Simpo/22 Februari 1996
Jurusan/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Judul : Analisis Pedigree Vitiligo Pada Komunitas To Balo di
Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar, adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa, ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 19 November 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Andi Nabila nurfitriah

NIM: 6030011157

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Pedigree Vitiligo Pada Komunitas To Balo di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru”, yang disusun oleh Andi Nabila Nurfitriah, NIM: 60300114033, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 19 November 2018 M.

11 Rabiul Awal 1440 H.


DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	: Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Burhanuddin, Lc., M.Thi.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Isna Rasdianah Azis, S.Si., M.Sc	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah Swt yang senantiasa memberikan karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pedigree Vitiligo Pada Komunitas To Balo di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad Saw tauladan umat seluruh alam.

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan di dalamnya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ayahanda A. Abd. Rahman dan Ibunda Rusnani atas doa, bimbingan, usaha, pengorbanan, dan dengan sepenuh hati telah memberikan segalanya tanpa memikirkan diri sendiri untuk anaknya. Penyusun juga menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya partisipasi atau bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan juga seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H.Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya.
3. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes dan Hasyimuddin, S.Si., M.Si selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si dan Isna Rasdianah Azis, S.Si., M.Sc selaku Pembimbing, terima kasih atas segala arahan, bimbingan, waktu serta kesabarannya selama ini menghadapi penyusun.
5. Dr. Muh. Khalifah Mustami,. M.Pd. dan Dr. Burhanuddin,. Lc., M.Thi, selaku Penguji I dan II yang selama ini banyak memberikan saran dan kritik yang baik bagi penyusun.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah kepada penyusun di kampus ini, serta kepada seluruh staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Kepala dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Pemerintah Kabupaten Barru dan masyarakat desa Bulo-bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten barru yang telah memberikan izin dan membantu selama di lokasi penelitian.
9. Terima kasih kepada Keluarga Bapak Desa Bulo-bulo yang senantiasa membimbing penulis selama melakukan penelitian di Desa Bulo-bulo
10. Tim “To Balo” yang telah membantu dan berjuang bersama dalam menjalani penelitian dari awal revisi proposal sampai akhir skripsi
11. Keluarga seangkatan di Biologi “LACTEAL” terima kasih atas bantuan teman-teman selama ini, saya tidak menyesal bisa mengenal dan berproses bersama serta belajar bersama kalian. Serta kakak dan adik yang bukan sedarah di biologi yang telah memberikan dukungan dan kenangan yang tak terlupakan selama ini.
12. Terima kasih kepada kedua orang tua Puja yang sudah saya anggap sebagai orang tua kedua saya selama melakukan penelitian di Barru.
13. Terima kasih kepada HMJ Biologi periode 2015-2016 dan 2016-2017 karena kepercayaan kepada penulis untuk membagi ilmu dan belajar.
14. Terima kasih kepada Kakak dan Adik di Jurusan Biologi FST UINAM
15. Terima kasih kepada teman-teman Gembel (Eka, Puja, Wiwi dan Pipit) atas suka dan dukanya selama kurang lebih 4 tahun ini.

16. Kakak-kakak, adik dan keluargaku tercinta yang selalu mendidik dan memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati dan telah memberikan doa restunya dalam segala kegiatan dan selalu memberikan semangat baik materi dan moril kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah swt selalu menaungi mereka dan kemudian kelak dikumpulkan di Jannah Nya.
17. Terima kasih kepada teman KKN Angkatan 57 Congko Squad atas dukungan dan semangat yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini
18. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan doa, semangat, dukungan, saran dan pemikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan rendah hati penulis berharap semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt, Sebagai akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi peneliti lain serta menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Makassar, 19 November 2018 M.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 11 Rabiul Awal 1440 H.

ALAUDDIN Penyusun
M A K A S S A R

Andi Nabila Nurfitriah

60300114157

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv-vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii-ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ILUSTRASI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-28
A. Ayat yang Relevan	9
B. Tinjauan Umum Pewarisan Sifat.....	9
C. Tinjauan Umum Analisis Pedigree.....	13
D. Tinjauan Umum Vitiligo.....	15
E. Tinjauan Umum Komunitas To balo.....	16
F. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	29-32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29

C. Populasi dan Sampel.....	29
D. Variabel Penelitian.....	29
E. Definisi Operasional Variabel	30
F. Metode Pengumpulan Data	30
G. Alat dan Bahan	30-31
1. Alat	31
2. Bahan.....	31
H. Prosedur Kerja	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34-38
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan	38
BAB V PENUTUP	46-47
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
KEPUSTAKAAN	48-50
Lampiran I.....	51-52
Lampiran II.	53-58
Lampiran III.	59-62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Lain dari Vitiligo didasarkan pada Distribusi dan Luas keterlibatan Lesi.....	22
Tabel 2.2 Diagnosis Banding Vitiligo.....	22
Tabel 2.3 Penyakit Kormobid yang dihubungkan dengan Vitiligo.....	25
Tabel 4.1 Perkawinan Orang Normal dan Vitiligo.....	45
Tabel 4.2 Perkawinan Orang Normal Carrier dan Vitiligo.....	45
Tabel 4.3 Eksplorasi Vitiligo.....	46



DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1.	Skema Penentuan Jenis Kelamin	10
Gambar 2.2.	Pewarisan Sifat Autosomal dan Resesif.....	12
Gambar 2.3.	Analisis Pedigree Tiga Generasi	15
Gambar 2.4.	Simbol Analisis Pedigree	15
Gambar 2.5.	Simbol Probandus (Manusia Coba)	16
Gambar 2.6.	Contoh Analisis Pedigree Autosomal Resesif.....	17
Gambar 2.7.	Prevalensi Vitiligo Populasi General, Anak-anak, dan Dewasa	19
Gambar 2.8.	Koebner's Phenomenom.....	20
Gambar 2.9.	Gambar Individu To Balo.....	26-27
Gambar 4.1.	Silsilah Keluarga A.....	33
Gambar 4.2.	Silsilah Keluarga B.....	34
Gambar 4.3.	Gabungan Silsilah Keluarga A dan B.....	35
Gambar 4.4.	Gambar Replika Individu To Balo.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Individu A, B dan C Komunitas To Balo.....	59
Lampiran 2 Komunitas To Balo.....	60
Lampiran 3 Kuesioner Vitiligo.....	61



ABSTRAK

Nama : Andi Nabila Nurfitriah
NIM : 60300114157
Judul Skripsi : “Analisis Pedigree Vitiligo pada Peduduk Komunitas To Balo di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru”

Beberapa pewarisan sifat yang ditentukan oleh sifat autosomal pada manusia, melalui sifat keturunan ditentukan oleh gen pada autosomal. Terbagi atas dua yaitu autosomal dominan dan autosomal resesif bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Didesa Bulu-bulu Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Pujananting yang terdapat suatu Komunitas penduduk yang dikenal dengan sebutan Komunitas To Balo yang memiliki ciri khas kulit belang atau bercak kulit putih di sekujur tubuhnya sejak lahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pewarisan autosomal dominan atau resesif serta untuk mengetahui karakteristik fenotip dari Komunitas To Balo, dengan melalui analisis *pedigree* untuk menentukan pola penurunan suatu sifat, dimana generasi-generasi sebelumnya merupakan bahan untuk mempelajari suatu sifat menurun pada Komunitas To Balo dengan metode Observasi dan wawancara

Dari pola pewarisan sifat vitiligo pada Komunitas To Balo, maka untuk karakter vitiligo yang paling sesuai dengan pola fenotip yang ada adalah resesif autosomal berdasarkan analisa yang dilakukan dan dapat dinyatakan bahwa jika perkawinan homozigot didapatkan bahwa semua anak seharusnya normal, namun pada kenyataannya yang didapatkan bahwa anak yang terlahir 50% vitiligo dan 50% normal. Jadi yang benar adalah perkawinan orang normal heterozigot (carrier). Dari hasil pengamatan fenotif pola bercak putih (vitiligo) di tubuh individu To Balo, ketiga individu memiliki pola bercak putih (Vitiligo) yang sama dari letak pola. Pada bagian kepala letak pola terdapat di ubun-ubun (*Parietal*), pada bagian tangan tepatnya lengan atas (*humerus*), pengumpul (*radius*), dan hasta (*Ulna*), pada bagian dada sampai perut (*Gastro*) dan terakhir pada bagian paha (*femur*), lutut (*Patella*), tulang kering (*tibia*) dan betis (*fibula*)

Kata Kunci : Autosomal Resesif, Komunitas to Balo, Analisis Pedigree, Vitiligo

ABSTRACT

Name : Andi Nabila Nurfitriah
SNN : 60300114157
Thesis Title : “Pedigree Analysis of Vitiligo at To Balo Community, Sub-Pujananting, Barru Regency”

Multiple inheritance are determined by an autosomal trait in humans, through the properties of the specified descendant by gene on autosomal. Divided into two autosomal recessive and autosomal dominant can occur in men and women. In the village of Bulo bulo-Barru Regency, South Sulawesi, in the subdistrict of Pujananting contained a community resident known as Community To Balo that possess a characteristic striped skin or white patches on the whole her body since was born. The research aims to know the pattern of inheritance of autosomal dominant or recessive phenotypes, as well as to know the characteristics of the Community To Balo, through pedigree analysis to determine the pattern of decline of a trait, where previous generations is to study the properties of a decline in Community To Balo with the method of observation and interview.

From the inheritance patterns of vitiligo on Community To Balo, then for the character of vitiligo that best fits the pattern of the existing phenotype is recessive autosomal based on analysis done and it can be stated that if the marriage is invalidated homozygous that all children should be normal, but in fact it brings that child who was born 50% normal and 50% vitiligo. So the truth is marriage a normal person heterozygous (*carrier*). From the results of observations of the fenotif pattern of white patches (vitiligo) in the body of the individual To Balo, the three individuals have white patches (Vitiligo) from the layout pattern. On the head there is a pattern in the layout of the Cantle (*Parietal*), at the hands of the tepatrnya the upper arm (humerus), anatomically (radius), and cubit (*Ulna*), on the part of the chest to the stomach (Gastro) and the last part of the thigh (*femur*), knee (*Panatella*), bone dry (*tibia*) and calves (*fibula*)

Keywords: Autosomal Recessive, Community To Balo, Pedigree Analysis, Vitiligo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Genetika merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada organisme (mahluk hidup) maupun suborganisme (virus), suatu proses di mana orang tua (induk) mewariskan gen tertentu kepada anaknya. Gen juga merupakan unit pewarisan sifat yang sangat mungkin mempengaruhi karakter, seperti kemampuan mental, bakat alami, bahkan kerentanan seseorang terserang penyakit tertentu. Gen juga dapat mewariskan sifat, misalnya tinggi badan, kulit, warna rambut, dan mata.

Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, yaitu faktor yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Di dalam genetika dipelajari struktur, proses pembentukan dan pewarisan gen serta mekanisme ekspresinya dalam pengendalian sifat organisme. Ilmu pengetahuan genetika modern berawal dari penemuan Gregor Mendel tentang ciri-ciri faktor keturunan yang ditentukan oleh unit dasar yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, yang disebut unit genetik atau gen

Jauh sebelum Mendel mengemukakan teorinya yang terkait dengan hukum pewarisan sifat, Allah swt. melalui firmanNya telah memberikan sejumlah isyarat yang semestinya menantang manusia untuk berpikir dalam mengungkapkan misteri hukum-hukum pewarisan sifat (Mustami, 2013).

Salah satu yang patut untuk dipikirkan adalah firman Allah swt. QS. Faatir (35:11) sebagai berikut :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah” (Kementerian Agama RI, 2012)

Manusia dan makhluk lain dialam semesta ini diciptakan Allah swt dengan tujuan tertentu dan bukanlah tanpa maksud. (Dan Allah menciptakan kalian dari tanah) yaitu menciptakan Adam dari tanah liat (kemudian dari air mani) lalu Dia bapak (Adam) kalian, diciptakan anak cucunya dari air mani (kemudian Dia menjadikan kalian berpasang-pasang) terdiri dari kaum pria dan wanita. (Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya) lafal *Bi'ilmih* berkedudukan menjadi Hal atau kata keterangan keadaan, yakni telah diketahui oleh-Nya. (Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang) tidak diperpanjang (dan tidak pula dikurangi umurnya) yakni orang yang diberi umur panjang itu (melainkan tercatat dalam Kitab) di *Lohmahfuz* (Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah) amat gampang dan remeh. (Jalalain, 2002).

Dalam hal ini sangat berhubungan, dimana kita akan percaya pada Allah untuk mengemukakan adanya campur tangan dari kemampuan-Nya untuk mencipta. Ilmu sendiri didapatkan untuk membuktikan batapa kekuasaan Allah itu nyata dan dapat kita lihat di sekeliling kita melalui apa saja termasuk alam ini. Termasuk dengan beberapa penyakit keturunan, khususnya penyakit yang menimpa kaum to Balo yang berada di desa Bulo-bulo, Kab. Barru. Hal ini bertujuan mengetahui kelainan genetika yang terjadi di Komunitas ini dimana dalam istilah kesehatan para individu to Balo menderita Vitiligo dan agar manusia mengerti bahwa banyak Al-Qur'an mendorong manusia agar mencari tanda-tanda kekuasaan Allah melalui perenungan maupun fenomena alam.

Dalam pewarisan genetika terdapat istilah pewarisan sifat autosomal, yaitu pewarisan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom, sehingga dapat dijumpai pada laki-laki maupun perempuan karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genotip tipe ini adalah bahwa satu individu mewariskan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersendiri (Ernawati, dkk, 2009).

Desa Bulo-bulo merupakan sebuah desa di pedalaman Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Pujananting yang terdapat suatu Komunitas penduduk yang dikenal dengan sebutan Suku To Balo. Dimana Komunitas to Balo memiliki ciri khas kulit belang atau bercak kulit putih di sekujur tubuhnya sejak lahir.

Tampakan Komunitas To Balo secara fisik sangat unik. Dimana mulai bagian kaki, tangan, wajah bahkan seluruh tubuh masyarakat Komunitas To Balo

memiliki bercak kulit putih seperti bekas luka bakar dan terjangkau penyakit kulit yang bisa dikatakan merupakan penyakit turunan. Bercak kulit putih yang dimiliki Komunitas To Balo hampir sama. Biasanya ada yang dominan pada daerah wajah misalnya terdapat bercak putih pada dahi. Kemudian ada di sekujur tubuh seperti perut, dada, dan punggung.

Komunitas To Balo juga terkenal dengan perkawinan sesamanya, dimana dalam hal mencari jodoh Komunitas To Balo hanya menikah sesama Komunitas To Balo sehingga gen bawaan bercak kulit putih tersebut masih dialami keturunannya. Hanya beberapa orang dari penduduk Komunitas To Balo yang mencoba keluar dari sukunya dan menikah dengan penduduk yang berkulit normal. Pernikahan penduduk Komunitas To Balo dengan penduduk berkulit normal terbukti mampu melahirkan penduduk berkulit normal.

Dalam dunia kesehatan, bercak kulit putih biasa juga disebut dengan Vitiligo. Secara umum vitiligo merupakan suatu kelainan yang mengenai kulit dan mukosa yang ditandai dengan makula depigmentasi berbatas tegas yang terjadi akibat adanya kerusakan selektif pada melanosit. Makula berwarna putih susu berbatas tegas dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kondisi ini menyebabkan hilangnya produksi pigmen pada kulit dan permukaan mukosa. Dapat terjadi pada semua umur dan jenis kelamin.

Melalui analisi *pedigree* untuk menentukan pola penurunan suatu sifat, generasi-generasi sebelumnya merupakan bahan untuk mempelajari suatu sifat menurun pada organisme, khususnya manusia. Dalam ilmu genetika melalui pewarisan autosomal penyakit bercak kulit putih yang terjadi pada Komunitas To

Balo yang secara turun menurun dapat dihindari dengan tidak menikah dengan sesama Komunitasnya. Komunitas To Balo harus menikah dengan manusia berkulit normal. Dari perkawinan tersebut akan melahirkan individu bergen kulit normal. Berdasarkan latarbelakang diatas, makanya dilakukannya penelitian pada Komunitas To Balo.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola pewarisan autosomal dominan/ resesif?
2. Bagaimana karakteristik fenotip vitiligo dari Komunitas To Balo?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Komunitas To Balo' Kab, Barru, kemudian menganalisis beberapa dari Komunitas To Balo'dengan menggunakan *analisis pedgree*.

D. Kajian Pustaka.

1. Fadjar (2012) "**Analisis *pedigree* gangguan pendengaran dan ketulian pada penduduk dusun Sepang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat** " data penelitian ini menunjukkan bahwa dengan uji statistik *Chi-square test goodness of fit* pola pewarisan gangguan pendengaran pada penduduk Dusun Sepang terjadi melalui transmisi autosomal resesif.
2. Yuyun (2013) "**Analisis *Pedigree* dan Fenotip Pasangan Kembar: Studi Kasus Pada Keluarga Kembar di Kecamatan Laweyan, Surakarta**" Pada

penelitian ini hanya dilakukan pada beberapa keluarga kembar yang menunjukkan perbedaan pola pewarisan. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian pada keluarga kembar yang lain untuk melihat pola pewarisan pada keluarga kembar. Apabila terdapat adanya penurunan, maka diramalkan kemunculan individu kembar pada generasi berikutnya

3. Andi Faridah (2012) “**Analisis Pedigree Cadel (Studi Kasus Beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan)**” Cadel dapat disebabkan oleh faktor Keturunan dan Pola pewarisan gen cadel adalah resesif autosomal

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pola pewarisan autosomal dominan/ resesif.
2. Untuk mengetahui karakteristik fenotip dari suku To Balo.

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai informasi pada masyarakat tentang sifat gen pada Komunitas To Balo' Kab. Barru
2. Sebagai informasi pada masyarakat bagaimana pola pewarisan sifat gen pada Komunitas To Balo' Kab. Barru.
3. Sebagai sumber informasi tentang Komunitas To Balo.
4. Sebagai bahan relevansi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Komunitas To Balo.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Kesempurnaan al-Qur'an ini dapat menjadi petunjuk bagi seluruh manusia yang hidup semenjak kelahirannya hingga hari akhir kelak. Salah satu surah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah QS An Nisa/04:56 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
 بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا



Terjemahan :

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana “(Kementrian Agama RI, 2002).

Menurut Tafsir Jalalain mengemukakan bahwa, (Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan ayat-ayat Kami akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka) mereka akan terbakar hangus (setiap matang) atau menjadi hangus (kulit mereka itu Kami ganti dengan kulit lainnya) yakni dengan mengembalikannya kepada keadaannya sebelum matang atau hangus itu (supaya mereka merasakan azab) dan menderita kepedihannya. (Sesungguhnya Allah Maha Perkasa) dalam segala penciptaan-Nya.


Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari bukti-bukti yang jelas dan mendustakan para nabi, kelak akan Kami masukkan ke dalam api neraka yang akan menghanguskan kulit mereka. Dan setiap kali rasa pedih akibat siksaan itu hilang, Allah menggantinya dengan kulit yang baru, agar rasa sakitnya berlanjut. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana. Dia akan memberikan siksaan bagi orang yang sampai saat kematiannya tetap mengingkari-Nya(1). (1) Ayat ini merupakan bukti betapa dahsyatnya siksaan yang diderita oleh penghuni neraka. Sebuah temuan ilmiah membuktikan bahwa urat saraf yang tersebar dalam lapisan kulit merupakan yang paling sensitif terhadap pengaruh panas dan dingin.

Keanekaragaman dapat dinyatakan sebagai dasar ciri-ciri dari makhluk hidup. Adanya keanekaragaman genetik adalah hasil dari suatu spesies terhadap lingkungannya. Makhluk hidup terkhusus manusia mampu memperlihatkan variasi pada beberapa ciri-ciri yang dapat dilihat dengan mudah melalui fenotip atau penampilannya. Contoh kasus yang terjadi pada Komunitas To Balo. Beberapa dari ciri-ciri yang nampak tersebut tidak mengalami seleksi alam, sehingga tetap ada sampai sekarang, dan dapat ditentukan oleh para ahli genetika melalui beberapa cara (Suryo, 2005).

B. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan Sifat

Kromosom tubuh (*Autosom*) berfungsi untuk mengatur sifat-sifat tubuh, terdapat 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Kromosom tubuh pada individu laki-laki maupun perempuan memiliki bentuk dan sifat yang sama. Kromosom seks (*Gonosom*) berfungsi untuk menentukan jenis kelamin, kromosom seks pada

manusia berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Kromosom seks pada individu laki-laki maupun perempuan memiliki sifat dan bentuk yang tidak sama. Simbol kromosom seks pada laki-laki yaitu XY, sedangkan pada perempuan adalah XX. Berdasarkan susunan tersebut, kromosom perempuan bersifat homogametic, sedangkan susunan kromosom seks laki-laki bersifat heterogametic. Bila terjadi pembelahan meiosis, maka seorang perempuan hanya akan menghasilkan satu macam sel gamet yaitu X, sedangkan laki-laki akan menghasilkan dua macam sel gamet yaitu X dan Y (Nuraini, 2013).



Gambar 2.1 Skema Penentuan Jenis Kelamin (Susanto, 2011)

Dari skema diatas nampak jelas bahwa yang menentukan jenis kelamin anak adalah ayah, karena kromosom seks ibu hanya dapat menghasilkan satu macam, sedangkan kromosom seks yang ayah hasilkan ada dua macam. Seorang perempuan (ibu) akan memberikan jenis kromosom seks yang sama baik kepada kepada kedua jenis kelamin yakni anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan laki-laki (ayah) akan memberikan kromosom X kepada anak perempuan dan kromosom Y kepada anak laki-laki (Nuraini,2013)

Penurunan sifat autosomal pada manusia, melalui sifat keturunan ditentukan oleh gen pada autosomal. Terbagi atas dua yaitu autosomal dominan dan autosomal resesif bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Pewarisan gen autosomal dominan hadirnya gen dominan dalam genotip menyebabkan penampakan sifat (Nuraini, 2013)


Tipe pewarisan Autosomal adalah tipe pewarisan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosomal, sehingga dapat dijumpai pada laki-laki maupun perempuan karena keduanya mempunyai autosomal yang sama. Tata cara pewarisan genotip tipe ini adalah bahwa satu individu mewariskan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersendiri. Jika induk yang satu memiliki 2 gen yang berbeda, maka keturunan akan menerima salah satu dari kedua gen itu dengan probabilitas yang sama. Macam keturunan yang dihasilkan pada suatu persilangan dapat dijelaskan menggunakan kuadrat *punnet*. (Ernawati, dkk, 2009)

Pewarisan sifat autosomal resesif ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom, Selain itu penyakit autosomal resesif terjadi pada seseorang yang kedua orang tuanya sehat namun membawa gen resesif . Pada orang-orang yang homozigot. Dapat mengenai kedua jenis kelamin. Biasanya orang yang heterozigot benar-benar normal. Anak-anak seorang penderita semua normal, kecuali orang tersebut menikah dengan orang yang heterozigot. Pada umumnya kedua orang tua dan anak-anak dari penderita homozigot untuk resesif adalah normal. Pada penyakit resesif, kedua orang tua individu yang sakit sering mempunyai hubungan keluarga. Orang tua biasanya tidak terkena. 25 % saudara

kandung penderita, akan menderita sakit. Sering terjadi pada perkawinan sedarah. Dua orang tua yang sakit tidak dapat punya anak normal (Pai, 2008)

Sifat keturunan yg ditentukan oleh gen autosomal yang bersifat dominan dan dapat diturunkan pada laki laki atau perempuan. Penyakit genetik dominan autosom disebabkan adanya satu atau sepasang gen mutan yang merugikan pada autosom (pada kromosom nomor 1 sampai nomor 22). Gen mutan tersebut bersifat dominan (menang) terhadap gen normalnya. Jadi gen normal bersifat resesif (Nurhadi, 1984).

Sifat autosomal dominan memiliki ciri sifat tersebut mungkin ada pada pria maupun wanitanya. Sifat itu juga terdapat pada salah satu orang tua pasangan. Sekitar 50% anak yang dilahirkan akan memiliki sifat ini meskipun salah satu pasangan tidak memiliki sifat ini. Pola pewarisan bersifat vertikal, artinya tiap generasi yang ada pasti ada yang memiliki sifat ini. Bila sifat yang diwariskan berupa penyakit keturunan, anak-anak yang tidak menderita penyakit ini bila menikah dengan pasangan yang normal, maka keturunan yang dihasilkan juga akan normal juga (Susanto, 2011).



Gambar 2.2 Autosomal Dominan dan Resesif

C. Tinjauan Umum Tentang Analisis Pedigree

Dalam ilmu biologi terkhusus ilmu genetika, Analisis pedigree adalah diagram pohon atau silsilah keluarga yang menunjukkan hubungan antara individu bersamaan dengan fakta tentang riwayat dan sejarah medis (Penyakit) mereka. Analisis pedigree merupakan salah satu cara untuk mencari data-data yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang transmisi gen maupun kelainan genetik dalam keluarga. Biasanya, setidaknya satu anggota keluarga memiliki riwayat penyakit genetik dengan memeriksa silsilah keluarga sebelumnya, kemudian mencari petunjuk tentang cara mewarisi gangguan tersebut dan potensi risiko terhadap anggota keluarga lainnya dapat diperoleh (Russel, 1986).


Analisis pedigree ternyata juga dapat memungkinkan estimasi penetrasi gen dan ekspresi gen pada keluarga. Penetran dapat dijadikan sebagai probabilitas bahwa satu penyakit pada individu yang membawa alel dengan menggunakan penyakit ini. Salah satu contohnya yaitu apabila satu setengah dari semua individu yang membawa alel dominan akhirnya mewujudkan penyakit terkait, alel memiliki penetrasi 50%. Ekspresivitas menggambarkan berbagai gejala penyakit dan tingkat keparahan yang terjadi terkait dengan penyakit yang berbeda. Salah satu cara yang dipakai untuk mempelajari karakter (sifat) menurun pada manusia adalah dengan membuat suatu daftar silsilah keluarga (*pedigree*) yang menyangkut sebanyak mungkin generasi dan memperlihatkan individu yang normal maupun yang menampakkan sifat yang hendak diteliti (Arsal, 1995)

Pada karakter pada manusia, kita tidak dapat membuat suatu uji perkawinan, kemudian dapat menghasilkan generasi f1, f2 dan seterusnya dari induk (orang tua) yang diketahui secara pasti bergenotip homozigot untuk mempelajari pola pewarisan karakter menurun (Russel,1986).

Dengan semakin banyaknya informasi yang diperoleh dan dengan melakukan lebih banyak pemeriksaan akan lebih memungkinkan untuk membuat kesimpulan tentang mekanisme pewarisan gen atau gen-gen yang sesuai dengan sifat yang sedang dipelajari. Kita dapat menggambarannya dalam suatu bagan atau silsilah keluarga. Bila kita tidak dapat menunggu untuk melihat generasi selanjutnya dengan jalan mengumpulkan informasi tentang seluruh anggota keluarga yang masih hidup dan mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang generasi terdahulu (Arsal, 1995)

Sebuah *pedigree* merupakan diagram yang mengandung semua hubungan kekerabatan yang diketahui, baik dari generasi sekarang maupun generasi terdahulu dan memuat data-data tentang sifat atau keadaan yang akan dipelajari. Individu yang ada kelainan herediter menjadi sumber informasi bagi penyusunan sebuah pedigree disebut probandus atau propositus. Prosedur umum yang dilakukan dalam menganalisa pedigree adalah meneliti setiap generasi dari keluarga yang sedang dipelajari. Mulai dari generasi tertua sampai generasi terakhir kemudian menguji pola transmisi herediter. Transmisi herediter mana yang cocok untuk sifat yang sedang diteliti tersebut. Bersifat dominankah atau resesif atau terkait sex atau lainnya (Astari, 2006).


Dengan analisis pedigree akan diperoleh dugaan yang baik dan pasti bahwa sifat tersebut adalah dipengaruhi oleh faktor keturunan, untuk itu dilakukanlah penelitian analisis pedigree atau silsilah keluarga sifat pada Komunitas To Balo' dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari keluarga yang memenuhi kriteria dan disusun dalam bentuk silsilah keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisa silsilah Komunitas To Balo' untuk menentukan sifat Komunitas To Balo' yang disebabkan oleh pengaruh herediter dan untuk menentukan pola pewarisan suku To Balo'



Gambar 2.3 Simbol Pedigree

1. Proband

Pertama terpengaruh keluarga anggota yang mencari perhatian medis untuk kelainan genetic




Gambar 2.4 Probandus (Manusia Coba)

2. Autosom Resesif

Pewarisan sifat autosomal resesif ditentukan oleh gen - gen yang terdapat di dalam DNA pada autosomal, Selain itu penyakit autosomal resesif terjadi pada seseorang yang kedua orang tuanya sehat namun membawa gen resesif . Sifat-sifat autosomal resesif biasanya terjadi pada orang-orang yang homozigot dan mengenai kedua jenis kelamin. Terpengaruh keturunan memiliki setidaknya satu orangtua yang terkena. Pada kenyataannya orang yang heterozigot benar-benar normal. Anak-anak seorang penderita semua normal, kecuali orang tersebut menikah dengan orang yang heterozigot (*Heterozygotes*). Pada umumnya kedua orang tua dan anak-anak dari penderita homozigot (*homozygous*) untuk genetik resesif adalah normal. Pada penyakit resesif, kedua orang tua individu yang sakit, sering mempunyai hubungan keluarga. Orang tua biasanya tidak terkena. 25 %

saudara kandung penderita, akan menderita sakit dan sering terjadi pada perkawinan sedarah. Diperkirakan orang tua yang sakit tidak dapat punya anak normal (Stansfield, 1991)



Gambar 2.5 Contoh Analisis pedigree Autosomal resesif

C. Tinjauan Umum Teoritis Tentang Vitiligo

Vitiligo merupakan kelainan pigmentasi yang sering dijumpai dan ditandai oleh makula depigmentasi berbatas tegas yang dapat terjadi pada setiap area tubuh. Kelainan ini juga dapat mengenai area rambut dan mukosa seperti bibir dan genitalia (Gawkrodger.et.all, 2010).

Vitiligo biasanya terjadi setelah lahir dan dikatakan sekitar 50 % onset vitiligo muncul sebelum usia 20 tahun dan 25% pada usia kurang dari 14 tahun (Kakourau, 2009).

Vitiligo dapat menyerang semua ras. Vitiligo memiliki sejarah yang panjang, pertama kali dideskripsikan sekitar 3000 tahun yang lalu dan telah tercatat pada kitab Hindu dan catatan kuno bangsa Egypt (Mahmoud dkk., 2008).

Kata vitiligo pertama kali digunakan oleh Celsus di buku kedokteran klasik berbahasa Latin *De re medicina* pada abad pertama sesudah Masehi. Beberapa ahli mengatakan berasal dari kata *vituli* yang berarti daging anak sapi yang putih berkilauan. Ahli lainnya berpendapat bahwa vitiligo berasal dari kata

Latin *vitellus* yang berarti anak sapi (*calves*) karena ada bagian putih pada bulu anak sapi. Di pertengahan abad ke-16, Hieronymus Mercurialis berpendapat bahwa istilah vitiligo berasal dari bahasa Latin *vitium* atau *vitellum* yang berarti cacat. Vitiligo secara umum adalah suatu kelainan didapat yang mengenai kulit dan mukosa yang ditandai dengan makula depigmentasi berbatas tegas yang terjadi akibat adanya kerusakan selektif pada melanosit (VETF, 2003).

Karakteristik lesi berupa makula ataupun bercak depigmentasi yang berbatas tegas dan biasanya asimtomatik. Kelainan ini cenderung progresif dan jarang mengalami regresi spontan. Vitiligo adalah kelainan depigmentasi yang paling umum ditemukan. Vitiligo dapat muncul pada usia berapapun, tersering pada usia 10 – 40 tahun, dengan rata – rata usia 24 tahun. Vitiligo adalah kelainan yang bersifat multifaktorial dan poligenik, dengan patogenesis kompleks penyebab hilangnya melanosit pada epidermis belum diketahui sepenuhnya (Gawkrodger, et.al, 2010)

Angka insiden vitiligo berkisar antara 0,1-2% pada populasi dunia. Prevalensi dilaporkan mencapai 4% pada populasi Asia selatan, Meksiko dan Amerika (Parsad dkk., 2003). Hasil meta-analisis dari 50 penelitian di berbagai belahan dunia yang mendapatkan prevalensi vitiligo berkisar antara 0,06% hingga 8%, dengan prevalensi pada anak-anak dan dewasa muda mencapai 2,16%. (Kruger dan Schallreuter, 2012)



Gambar 2.6 Prevalensi Vitiligo Populasi general, Anak-anak dan Dewasa muda (Kruger dkk, 2012)

Tidak ada perbedaan rasio jenis kelamin, namun pada beberapa studi dilaporkan dominasi penderita wanita, dikarenakan penderita wanita lebih banyak mencari pengobatan khususnya untuk alasan kosmetik (Halder dan Taliaferro, 2008).

Banyak penelitian mendapatkan 20% dari penderita vitiligo memiliki anggota keluarga yang menderita vitiligo, dengan risiko relatif kejadiannya mencapai 7-10 kali lipat pada keluarga generasi pertama (Yaghoobi dkk., 2011).

2. Manifestasi klinis

Vitiligo dikategorikan sebagai suatu kelainan pigmentasi akibat hilangnya melanosit yang aktif sehingga menyebabkan gambaran bercak putih pada kulit. Bercak putih yang timbul bervariasi dalam hal bentuk dan ukuran, serta seringkali simetris. Lesi vitiligo muncul sebagai satu atau lebih makula atau *patch* amelanotik, berwarna putih seperti kapur atau susu, dikelilingi oleh tepi normal

atau hiperpigmentasi. Adakalanya didapatkan tepi kemerahan akibat mengalami inflamasi (Yaghoobi.et.all., 2011).

Lesi vitiligo melebar secara sentrifugal dengan pola yang tidak dapat diprediksi dan mengenai setiap area tubuh. Lesi awal banyak dijumpai pada tangan, lengan, kaki dan wajah (Halder dan Taliaferro, 2008). Lokasi vitiligo tersering adalah wajah, dada atas, dorsal tangan, aksila dan lipatan paha. Terdapat kecenderungan keterlibatan kulit sekitar orifisium. Lesi juga dapat muncul pada area trauma (Yaghoobi dkk., 2011). Pada fenomena Koebner, lesi vitiligo berkembang di tempat terjadinya mikrotrauma sebagai suatu respon isomorfik terhadap gesekan atau tekanan yang dapat terjadi pada berbagai aktivitas (Anurogo dan Ikrar, 2014). Lesi vitiligo sejak awal dikatakan sensitif terhadap paparan sinar matahari (Lotti dkk., 2008).



Gambar 2.7 Koebner's Phenomenon (Anugoro dan Ikrar, 2014)

Secara umum diklasifikasikan menjadi dua pola, yaitu pola segmental dan non-segmental. Pola segmental lebih jarang dijumpai dan ditandai oleh lesi fokal yang terlokalisir pada area tertentu. Pola non-segmental lebih banyak dijumpai

dan berpotensi mengalami evolusi sepanjang kehidupan. Fenomena Koebner dan penyakit autoimun lebih sering dihubungkan dengan pola ini (Lotti.et.all, 2008; Yaghoobi dkk., 2011).

Adapun klasifikasi klinis vitiligo adalah sebagai berikut:

1. *Localized*, terbagi tiga:
 - a. *Fokal* (satu makula atau lebih dengan distribusi sederhana),
 - b. *Unilateral* (satu makula atau lebih di salah satu bagian tubuh, dengan distribusi dermatomal; ciri khasnya adalah lesi berhenti mendadak di garis tengah tubuh),
 - c. *Mukosal* (keterlibatan mukosa membran).
2. *Generalized*, terbagi tiga:
 - a. *Vulgaris* (bercak kulit putih tersebar atau berpencar),
 - b. *Acrofacialis* (bagian bercak kulit putih terlokalisasi atau terbatas pada ekstremitas distal dan wajah),
 - c. *Mixed* atau campuran (bentuk *vulgaris* dan *acrofacialis*).
3. *Universalis*, lesi atau bercak kulit putih sepenuhnya dan hampir di seluruh permukaan kulit. Perubahan warna kulit pertama kali dijumpai di daerah terbuka, seperti di wajah atau punggung tangan. Pada kasus tertentu, warna rambut di kulit kepala, bulu-alis mata, atau janggut memudar menjadi agak putih atau keabu-abuan; warna retina berubah atau hilang. Vitiligo juga dapat mengenai bagian tubuh yang menonjol dan terpajan sinar surya. Terkadang juga ditemukan di alat kelamin, puting susu, bibir, dan gusi.

Tabel 2.1 Klasifikasi lain dari vitiligo didasarkan pada distribusi dan luas keterlibatan lesi (Kakourou, 2009)

Lokalisata	
Fokal	Satu atau lebih makula dengan distribusi lokal yang tidak spesifik
Unilateral	Satu atau lebih makula terlokalisasi pada area unilateral tubuh dengan distribusi sesuai dermaton
Mukosal	Keterlibatan membran mukosa
Generalisata	
Vulgaris	Makula dipegmintasi tersebar secara luas
Akrofasialis	Makula terlokalisasi pada ekstremitas bagian distal dan wajah
Campuran	Dijumpai pola akrofarsial dan vulgaris secara bersamaan
Universalis	Lesi dipegmentasi hampir pada seluruh tubuh (>80% permukaan tubuh)

2. Diagnosis dan diagnosis banding

Diagnosis vitiligo didasarkan pada manifestasi. Diagnosis vitiligo dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan lampu Wood 365 nm, dengan penampakan lesi yang semakin jelas (Halder dan Taliaferro, 2008).

Tabel 2.2 Diagnosis banding vitiligo (Kakourou, 2009)

Kelainan yang didapat	Kelainan dan Sindrom Kongenital
Hipopigmentasi post inflamasi	Nevus depigmentosus
Leukoderma akibat paparan bahan kimia	Makula Hipomelanotik tuberos sklerosis
Tinea Versikolor	Piebaldisme
Pitiriasis alba	Albinisme
Liken Sklerosus at atropikus	Sindrom Vogt Kianagi
Morfea	Sindrom Waardenburg
Sarkoi dosis	Sindrom Zipkowski-Margolis
Lepra	
Pinta stadium III	

3. Etiologi dan patogenesis

Vitiligo merupakan kelainan multifaktorial yang dihubungkan dengan faktor genetik dan non-genetik. Berdasarkan pengamatan pada variasi klinis pasien, diperkirakan patogenesis yang terjadi dapat berbeda pada setiap pasien (Bagherani dkk., 2011). Berbagai teori tersebut mencakup antara lain gangguan pada adhesi melanosit, kerusakan neurogenik, kerusakan biokimia, dan autotoksitas (Birlea dkk., 2012)

Peranan faktor genetik cukup penting pada vitiligo, yang dihubungkan secara luas sebagai bagian dari diatesis tentang pewarisan genetik, autoimun dan autoinflamasi (Bagherani dkk., 2011; Spritz, 2008). Tipe *Human leukocyte antigen* 14 (HLA) terkait vitiligo meliputi A2, DR4, DR7 dan CW6 pada kelompok keluarga Kaukasia dengan vitiligo generalisata dan penyakit autoimun, disamping itu ditemukan pula *linkage signals* pada kromosom 1,7 dan 17 (Bagherani dkk., 2011; Jin dkk., 2010). Spritz (2008) pada penelitiannya menunjukkan bahwa HLA, PTPN22, NALP1 dan CTLA4 dihubungkan dengan suseptibilitas autoimun pada penderita vitiligo.

Peranan autoimun dibuktikan dengan adanya keterlibatan sistem imunitas humoral dengan ditemukannya antibodi antimelanosit dengan target berbagai antigen melanosit seperti tirosinase, *tyrosinase-related protein-1* dan *dopachrome tautomerase*, yang dapat menyebabkan kerusakan melanosit secara *in vitro* dan *in vivo*. Antibodi yang terbentuk diduga sebagai suatu respon humoral sekunder. Penemuan infiltrat inflamasi pada tepi lesi terutama terdiri atas limfosit T sitotoksik. Sel T tersebut menghasilkan profil sitokin tipe 1 dan terdapat secara

bersamaan dengan melanosit epidermal, sehingga terdapat hipotesis bahwa sel ini bersifat sitolitik aktif terhadap melanosit yang ada melalui *granzyme/perforin pathway* (Birlea, 2012).

Peranan proses biokimia pada vitiligo merupakan hal yang banyak diteliti saat ini. Vitiligo adalah penyakit yang terjadi di seluruh epidermis, dengan kemungkinan keterlibatan baik melanosit dan keratinosit. Kelainan morfologi dan fungsional yang terjadi pada melanosit dan keratinosit kemungkinan memiliki peranan faktor genetik. Abnormalitas ultrastruktural dari keratinosit pada bagian perilesional diduga berhubungan dengan gangguan aktivitas mitokondria yang diduga mempengaruhi 15 produksi faktor pertumbuhan dan sitokin spesifik dari melanosit yang mengatur *survival* melanosit. Temuan biokimia yang penting adalah terjadinya peningkatan hidrogen peroksida pada lesi yang kemungkinan disebabkan oleh menurunnya aktivitas antioksidan dari keratinosit dan melanosit. Gangguan sistem antioksidan menyebabkan melanosit lebih rentan baik terhadap sitotoksitas imunologis maupun toksitas yang diinduksi oleh ROS (Birlea, 2012).

4. Histopatologi

Secara umum, hasil histopatologi menunjukkan adanya kekosongan melanosit pada lapisan epidermis area lesi, dan ditemukan dominasi infiltrasi limfosit pada daerah perifolikuler, perivaskuler dan dermal dari tepi lesi vitiligo dini dan lesi aktif vitiligo. Hal tersebut sesuai dengan proses imun yang diperantarai sel dengan terjadinya penghancuran melanosit in situ (Birlea, 2012).

5. Hubungan vitiligo dengan beberapa penyakit komorbid

Vitiligo generalisata berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit tiroid autoimun, terutama tiroiditis Hashimoto, sehingga kadar tirotropin sebaiknya diukur setiap tahun, terutama pada penderita dengan antibodi terhadap *thyroid peroxidase* pada skrining awal. Tes fungsi tiroid, uji serum *antithyroglobulin* dan *antithyroid peroxidase antibodies* dapat dipertimbangkan (Hann dan Nordlund, 2000; Halder dan Chappell, 2009). *Antithyroid peroxidase antibodies* adalah marker yang sensitif dan spesifik pada gangguan tiroid autoimun (Halder dan Chappell, 2009).

Tabel 2.3 Penyakit komorbid yang dihubungkan dengan vitiligo (Alkhateeb,2003)

Penyakit Autoimun	Penyakit Lain
Penyakit tyroid autoimun	Melanoma Maligna
Anemia Pernisiosa	Asma
Lupus	
Liken Skrerosus	
Diabetes militus	
Penyakit Addison	
<i>Autoimmune polyglandular syndrome</i>	

D. Tinjauan Teoritis Tentang Suku To Balo'



Gambar 2.4 Individu Komunitas To Balo

Komunitas *Tobalo*, yang berdomisili di sebuah desa di kabupaten barru, tepatnya di desa bulo-bulo, kecamatan Pujananting. Populasi komunitas to balo sekarang ini sangat terbatas karena jumlahnya saat ini hanya mencapai 5 orang dan tidak pernah lebih dari 11 orang. Jumlah terbanyak sepanjang informasi yang kami dapatkan adalah 9 orang. Sebuah hukum alam yang berlaku pada komunitas ini dengan jumlah mereka yang sangat terbatas. Berdasarkan buku informasi wisata Kabupaten Barru berjudul "*Barru dalam Visualisasi*" yang diterbitkan Pemda Barru tahun 1997, selain keunikan tersebut komunitas *Tobalo* juga tidak mempan senjata tajam dan tidak mempan dibakar api.

Keunikan dari komunitas to Balo yaitu belang-belang (*Balo*) secara ilmiah dapat dikatakan bercak kulit putih yang dimiliki seperti bekas luka bakar pada sekujur tubuhnya namun dalam dunia kedokteran bercak kulit putih tersebut merupakan penyakit vitiligo. Adapun lokasi bercak kulit putih pada komunitas to balo yaitu ada pada dahi yang menyerupai avatar, di sekitar lipatan siku, kaki dan bagian perut yang tersebar. Tapi ini bukan akibat penyakit kelainan kulit, kata


Prof.Dr.H.Abu Hamid salah seorang budayawan Sulsel yang meneliti suku Tobalo. Ia menyebut bahwa gejala itu disebabkan oleh bawaan genetik (gen) dan menampik anggapan masyarakat bahwa hal itu disebabkan oleh adanya “kutukan” dari dewata yang ditimpakan pada nenek moyang mereka di masa lalu dan menurun hingga ke generasinya saat ini. Ceritanya konon ada satu keluarga yang menyaksikan sepasang kuda belang jantan dan betina yang hendak kawin. Bukan hanya menonton, keluarga itu juga menegur dan mengusik kelakuan kedua kuda itu. Maka marahlah dewa lantas mengutuk keluarga ini berkulit seperti kuda belang atau *balo*. Ada pula kisah lain yang mengatakan bahwa *Komunitas Tobalo* turun bersama kuda belang dari langit saat pertama bumi diciptakan. Karena itulah mereka juga berkulit belang.

Dalam berkomunikasi sehari-hari komunitas *Tobalo* tidak menggunakan bahasa Bugis ataupun Bahasa Makassar. Hal ini merupakan *fenomena lingual* yang langka, karena dengan populasi yang boleh dihitung jari, komunitas *Tobalo* ternyata mampu menggunakan bahasa Bugis, Bahasa Makassar, dan Bahasa Konjo untuk berkomunikasi. Karena memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa *Tobentong*. Bahasa *tobentong* sendiri merupakan bahasa di desa bulu-bulo, dimana para komunitas *to balo* tinggal.

Kaum *To Balo* bisa keluar dari masalah kulit ini jika mereka menikah dengan orang lain yang punya gen kulit normal. “Selama ini kebanyakan mereka kawin antarmereka saja. Padahal terbukti, jika ada kaum *To Balo* yang kawin dengan orang di luar kelompoknya, sang anak akan berkurang belangnya”. Kelihatannya, perlu ada penyuluh yang menyambangi mereka ke dusun terpencil

itu untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Agar mereka segera keluar dari keterkungkungan yang disebabkan perasaan berbeda dari manusia lain (*Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kab. Barru*)

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dimana format deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena, berbagai situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, kemudian menarik kesimpulan (Suyanto, 2011).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018. Penelitian berlokasi di Desa Bulo-Bulo terletak di wilayah Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi Komunitas To Balo' Kab, Barru, dengan sampel sebanyak 3 orang dari Komnitas To Balo' yang berdomisili di Desa Bulo-bulo.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini memiliki variabel tunggal yaitu analisis pedigree Vitiligo

E. Definisi Operasional Variabel

1. Analisis pedigree adalah diagram yang mengandung semua hubungan kekerabatan yang diketahui, baik dari generasi sekarang maupun generasi terdahulu dan memuat data-data tentang sifat atau keadaan yang akan dipelajari. Individu yang ada kelainan herediter menjadi sumber informasi bagi penyusunan sebuah pedigree disebut probandus atau propositus .
2. Komunitas To Balo memiliki ciri khas warna kulit tersendiri yang tidak sama dengan suku lain, yaitu belang-belang (*Balo*) disekujur tubuhnya.
3. Vitiligo merupakan kelainan pigmentasi yang sering dijumpai dan ditandai oleh makula depigmentasi berbatas tegas yang dapat terjadi pada setiap area tubuh. Kelainan ini juga dapat mengenai area rambut dan mukosa seperti bibir dan genitalia (Gawkrödger dkk., 2010).

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi (Pengamatan), wawancara dan dokumentasi

G. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan adalah kamera dan alat tulis menulis

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan adalah probandus (Komunitas To Balo)

H. *Prosedur Kerja*

1) Pendataan

Pendataan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Komunitas To Balo' Desa Bulo-Bulo Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, untuk mengetahui silsilah keluarga To Balo' yang diteliti. Data yang diperoleh digunakan untuk pembuatan diagram silsilah.

2) Dokumentasi

Pengambilan foto pada individu to balo dengan menggunakan kamera digital

3) Pengamatan fenotip.

Pengamatan secara langsung pada individu suku to balo untuk membandingkan fenotip diantara individu . Fenotip yang diamati adalah :


- a) Pengamatan jenis vitiligo
- b) Estimasi pola pewarisan
- c) Diagram silsilah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pedgree (Silsilah Keluarga)


1. Silsilah Keluarga A



Silsilah Keluarga A

Gambar 4.1 Silsilah Keluarga A

2. Silsilah Keluarga B




Angka Romawi menunjukkan generasi
 Angka Arab menunjukkan indikator

Silsilah Keluarga B

Gambar 4.2 Silsilah Keluarga B

3. Gabungan Silsilah Keluarga Sepupuan A dan B



Simbol



Angka Romawi menunjukkan generasi
Angka Arab menunjukkan indikator

Keterangan

Laki-laki tidak balo
Perempuan tidak balo
Laki-laki balo
Perempuan balo
Probandus

Gambar 4.3 Gabungan Silsilah Keluarga A dan B

Komunitas To Balo memiliki keunikan sendiri yang ada di Desa Bulobulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Berbeda lainnya komunitas ini ternyata memiliki batasan jumlah populasi tersendiri bagi mereka yang hidup di desa tersebut. Batasan jumlah tidak datangnya dari masyarakat desa Bulobulo atau aparat desa setempat, tapi diasumsikan sebagai menjadi sebuah hukum alam bagi Komunitas To Balo, karena jumlah populasi bagi Komunitas To Balo ini

tidak boleh lebih dari standar yang ditetapkan yakni 11 orang. Apabila mencapai jumlah maksimal, maka salah satu individu akan meninggal kemudian lahir lagi satu keturunan yang sama dari Komunitas tersebut. Jumlah angka tertinggi dalam bilangan satuan ini, yakni sembilan menjadi ukuran paling banyak dan paling maksimal dalam Komunitas To Balo, akan tetapi semakin bertambah tahun, kondisi tersebut semakin mengecil, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa individu yang meninggalkan kampung halaman untuk merantau dan untuk menempuh pendidikan di kota, sehingga total populasi saat ini hanya tersisa lima orang saja, berdasarkan hasil survei dan informasi dari Bapak desa Bulo-Bulo, Abd. Rahman, SE

Penyakit yang diderita masyarakat Komunitas to Balo merupakan salah satu penyakit kulit yang disebut dengan vitiligo yang bukan penyakit kulit umumnya seperti penyakit panu, tidak menular dan tidak menimbulkan gatal-gatal. Penyakit vitiligo dikategorikan sebagai penyakit autoimun, bukan penyakit kulit. Gejala yang terjadi pada penyakit vitiligo berupa masalah pada kulit, yaitu timbulnya bercak-bercak kulit putih yang sangat berbeda dengan penyakit panu yang disebabkan oleh bakteri.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat faktor genetik (keturunan) yang dapat menyebabkan vitiligo. Sekitar 1 dari 5 penderita vitiligo memiliki keluarga yang juga sama menderita penyakit vitiligo. Namun disamping itu, ada beberapa faktor yang juga diasumsikan menjadi pemicu dari terjadinya vitiligo.

Vitiligo terjadi karena kurangnya produksi melanin kulit. Melanin merupakan senyawa yang bertanggung jawab penuh dalam menentukan warna kulit serta melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Saat ini belum diketahui secara pasti penyebab terjadi kekurangan produksi melanin pada penderita vitiligo (Nordlud, 2006)

1. Digram Silsilah Keluarga A

Dari gambar 4.1 diatas terlihat bahwa ayah dari A memiliki riwayat kulit bercak putih (Balo) kemudian menikah dengan orang berkulit normal. Dari perkawinan tersebut menghasilkan lima anak yang terlahir memiliki bercak kulit putih (balo) dengan jenis kelamin 3 laki-laki dan 2 perempuan. Akan tetapi keempat saudara A sudah meninggal dan tersisa A sendiri.

A (56) terlahir menderita vitiligo (Balo), memiliki riwayat penyakit vitiligo yang diturunkan oleh ayahnya. Kemudian menikah bukan dengan sesama komunitasnya, melainkan pria dengan gen kulit normal. Sepanjang perkawinannya, A tidak memiliki anak (mandul). Terlihat dari ayah dan kelima saudara A memiliki pola corak bercak kulit putih (vitiligo) yang sama persis. Adapun keluhan yang dirasakan A sendiri, merasa kulit gatal dan kering disertai batuk dan sesak intensitas kecil.

Pola dan aktivitas vitiligo yang dimiliki keluarga A adalah Non-Segmental yang merupakan pola terbanyak dijumpai, hilangnya pigmen tersebar dan simetris. Karakterisasinya adalah bercak putih biasanya simetris. Umumnya terjadi di tempat yang sensitif terhadap tekanan-gesekan, dan cenderung mudah trauma, seperti di: jari-jari, persendian (siku, lutut), aksila, pergelangan tangan,

pusat, sekitar mata, hidung, telinga, mulut, lipat paha, genitalia, dan anus. Vitiligo dapat dimulai di masa anak, kemudian pola tersebut muncul, namun biasanya tenggelam dengan sendirinya. Seperti bercak kulit putih yang muncul lalu menghilang. Hal ini berhubungan dengan riwayat penyakit autoimunitas pada keluarga penderita atau secara personal. Pola tersebut (bercak kulit putih) kemudian dapat muncul kembali di tempat sama (*in situ*). Hilangnya fungsi epidermis secara substansial, menyebabkan terjadinya proses melanosit folikel rambut.

Tipe lokalisata yang diderita merupakan bentuk segmental, dimana satu atau lebih makula pada satu area, dengan distribusi, misalnya satu tungkai dan pada tipe generalisata memiliki bentuk makula tanpa pola tertentu di banyak tempat.

2. Digram Silsilah Keluarga B

Dari gambar 4.1 diatas terlihat bahwa ayah dari B memiliki riwayat kulit bercak putih (Balo) kemudian menikah dengan orang berkulit normal. Dari perkawinan tersebut menghasilkan 2 anak yang terlahir memiliki bercak kulit putih (balo) dengan jenis kelamin laki-laki. Namun adik B sudah meninggal dan B tersisa sendiri.

B (48) terlahir menderita vitiligo (Balo), memiliki riwayat penyakit vitiligo yang diturunkan oleh ayahnya. Kemudian menikah bukan dengan sesama komunitasnya, melainkan wanita dengan gen kulit normal. Sepanjang perkawinannya, B memiliki anak lima orang anak 3 diantaranya menderita balo (Vitiligo) dan 2 normal, dengan jenis kelamin 2 laki-laki dan 3 perempuan. Dilihat

dari ayah, B dan ketiga anaknya memiliki pola corak bercak kulit putih (vitiligo) yang sama persis. Adapun keluhan yang dirasakan B kadang-kadang pandangannya agak kabur

Pola dan aktivitas vitiligo yang dimiliki A adalah Non-Segmental dimana merupakan pola terbanyak dijumpai, hilangnya pigmen tersebar dan simetris. Karakterisasinya adalah bercak putih biasanya simetris. Umumnya terjadi di tempat yang sensitif terhadap tekanan-gesekan, dan cenderung mudah trauma, seperti pada jari-jari, persendian (siku, lutut), aksila, pergelangan tangan, pusat, sekitar mata, hidung, telinga, mulut, lipatan paha, genitalia, dan anus. Dapat dimulai di masa anak, namun biasanya terjadi kemudian. Hal berhubungan dengan riwayat autoimunitas pada keluarga atau personal. Vitiligo dapat dimulai di masa anak, kemudian pola tersebut muncul, namun biasanya tenggelam dengan sendirinya. Seperti bercak kulit putih yang muncul lalu menghilang. Hal ini berhubungan dengan riwayat penyakit autoimunitas pada keluarga penderita atau secara personal. Pola tersebut (bercak kulit putih) kemudian dapat muncul kembali di tempat sama (*in situ*). Hilangnya fungsi epidermis secara substansial, menyebabkan terjadinya proses melanosit folikel rambut

Tipe lokalisasi yang diderita adalah bentuk segmental, dimana merupakan satu atau lebih makula pada satu area, dengan distribusi, misalnya satu tungkai memiliki bentuk makula tanpa pola tertentu di banyak tempat

Dengan adanya diagram silsilah keluarga dari suatu individu yang mengalami vitiligo, sudah dapat dipastikan/diperkirakan bahwa vitiligo yang dialaminya disebabkan oleh faktor keturunan serta dapat membedakannya dari

vitiligo yang disebabkan oleh faktor lain. Diagram silsilah juga dapat dilihat bagaimana sejarah keluarganya mengenai sifat atau karakter. Lalu selanjutnya menentukan pola penurunannya dari silsilah-silsilah keluarga tersebut. Dalam menentukan pola yang digunakan untuk mewariskan atau meneruskan suatu karakter, dibuat suatu asumsi misalnya “karakter A diturunkan menurut pola B”. Kemudian melalui pola fenotip yang ada ditentukan apakah asumsi tersebut sesuai atau tidak. Beberapa pola pewarisan sifat yang ditentukan oleh gen dan umum ditemukan pada manusia adalah sebagai berikut (Arsal, 2012)

1. Pewarisan gen Y - *linkage*
2. X - *linkage* dominan
3. X - *linkage* resesif
4. Dominan autosomal
5. Resesif autosomal
6. Karakter yang ekspresinya terbatas pada jenis kelamin tertentu
7. Karakter yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin yang dapat dibagi menjadi :
 - a. Karakter yang bersifat dominan pada laki-laki dan resesif pada perempuan
 - b. Karakter yang bersifat dominan pada perempuan dan resesif pada laki-laki

Asumsi 1 : Gen Vitiligo Terletak pada kromosom Y

Kromosom Y merupakan kromosom yang memiliki ukuran lebih pendek apabila dibandingkan dengan kromosom X, yang menyebabkan sedikit

mengandung gen-gen. Kromosom Y tentunya hanya dimiliki oleh orang laki-laki saja, sehingga sifat keturunan hanya akan diwariskan kepada keturunan laki-laki saja. Jika gen vitiligo terletak pada kromosom Y dapat dipastikan bahwa pembawa sifat vitiligo ini hanya akan dimiliki oleh orang laki-laki saja. Tetapi berdasarkan data diperoleh bahwa sifat vitiligo dapat dimiliki oleh orang laki-laki dan perempuan sehingga menghapus dugaan tersebut.

Asumsi 2: Gen vitiligo adalah Gen X - *Linkage* Dominan

Adapun jika dugaan bahwa gen yang menentukan terjadinya vitiligo adalah gen yang terletak pada kromosom X dan bersifat dominan maka :

- a. Pada perkawinan antara laki-laki vitiligo dan wanita tidak vitiligo (bergenotip resesif homozigot) akan diperoleh semua anak perempuannya vitiligo dan semua anak laki-laknya tidak vitiligo. Tetapi pada gambar 4.3 dari perkawinan III1 x II2 diperoleh sebagian anak perempuan tidak vitiligo dan sebagian anak laki-laki vitiligo.
- b. Dari perkawinan laki-laki tidak vitiligo dan perempuan tidak vitiligo akan diperoleh semua anak tidak vitiligo. Berdasarkan uji-uji perkawinan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan pola fenotip yang ada sehingga dugaan bahwa gen yang menyebabkan vitiligo terletak pada kromosom X dan bersifat dominan dapat dibenarkan.

Asumsi 3 : Gen vitiligo adalah Gen X *Linkage* Resesif

Dugaan bahwa gen yang menyebabkan vitiligo terletak pada kromosom X yang bersifat resesif dapat dibenarkan jika tidak melihat Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa perkawinan antara laki-laki tidak vitiligo dan perempuan vitiligo

berdasarkan data tidak memiliki keturunan (Agak sulit untuk memiliki keturunan), namun apabila memiliki keturunan maka yang seharusnya apabila suatu karakter adalah *X linkage* resesif, dari perkawinan antara laki-laki tidak vitiligo dan perempuan vitiligo akan diperoleh semua anak laki-laki vitiligo. Jadi dugaan bahwa gen yang menyebabkan terjadinya vitiligo terletak pada kromosom X dan bersifat resesif juga tidak dapat dibenarkan.

Asumsi 4: Vitiligo adalah gen yang Ekspresinya dibatasi oleh Seks

Gen yang dibatasi oleh jenis kelamin adalah gen yang diturunkan dengan cara yang sama pada kedua jenis kelamin tetapi hanya menampakkan karakternya pada jenis kelamin tertentu saja. Contohnya yaitu warna kupu semanggi : kupu jantan selalu berwarna kuning, tetapi yang betina dapat kuning dan putih. Warna putih dominan, tetapi hanya memperlihatkan diri pada kupu betina (2). Apabila vitiligo dipengaruhi oleh gen yang ekspresinya dibatasi oleh seks, maka vitiligo hanya akan kita jumpai pada salah satu seks saja karena hanya memperlihatkan diri atau mengekspresikan diri pada salah satu seks saja. Tapi pada kenyataannya vitiligo terdapat pada orang laki-laki dan juga pada orang perempuan. Dengan demikian vitiligo adalah bukan gen yang ekspresinya dibatasi oleh seks.

Asumsi 5: Vitiligo adalah gen yang ekspresinya dipengaruhi oleh Jenis Kelamin

Gen yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin adalah sifat yang tampak pada kedua macam seks, tetapi pada salah satu seks ekspresinya lebih besar dari pada untuk seks lainnya atau dengan kata lainnya gen-gen tersebut dominansinya dari jenis kelamin individu. Contohnya pada kepala botak, jika B merupakan gen yang menentukan kepala botak dan alelnya b menentukan kepala

berambut normal, maka pengaruh jenis kelamin itu demikian rupa sehingga gen B itu dominan pada laki-laki, tetapi resesif pada perempuan. Jika vitiligo juga termasuk gen yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin yang dominan pada laki-laki dan resesif pada orang perempuan, maka perkawinan antara laki-laki tidak vitiligo dengan perempuan vitiligo akan memperoleh anak laki-laki yang semuanya vitiligo dan semua anak perempuannya tidak vitiligo. Tetapi pada Gambar 4.3 dari perkawinan laki-laki normal dan perempuan vitiligo agak susah memiliki keturunan. Perkawinan antara laki-laki tidak vitiligo dan perempuan tidak vitiligo (bergenotip heterozigot atau homozigot) mestinya akan memperoleh anak laki-laki vitiligo atau tidak vitiligo dan semua anak perempuannya tidak vitiligo, tetapi kenyataannya tidak demikian, adanya kenyataan bahwa agak sulit memiliki keturunan yang disebabkan keguguran yang dialami selama 4 kali. Jadi dugaan bahwa vitiligo adalah gen yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin, khususnya yang bersifat dominan pada laki-laki dan resesif pada perempuan tidak dapat dibenarkan. Demikian pula untuk karakter yang bersifat dominan pada perempuan dan resesif pada laki-laki juga tidak dapat dibenarkan. Karena perkawinan antara laki-laki vitiligo dan perempuan tidak vitiligo tentulah memperoleh anak perempuan yang semuanya vitiligo dan semua anak laki-lakinya tidak vitiligo. Tetapi pada Gambar 4.3 dapat dilihat adanya anak perempuan tidak vitiligo dari perkawinan antara laki-laki vitiligo dan perempuan tidak vitiligo

Asumsi 6: Gen vitiligo adalah Gen Dominan Autosom

Dugaan bahwa gen vitiligo adalah gen dominan autosom juga dapat dibenarkan, karena terlihat adanya ciri pola pewarisan sifat secara dominan autosom yaitu bahwa sifat keturunan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara vertikal atau tidak terjadinya pelompatan generasi dalam pemunculan sifat. Hal ini terjadi karena hadirnya sebuah gen dominan di dalam genotip seseorang sudah menyebabkan sifat itu tampak padanya, berarti orang tidak vitiligo bergenotip homozigot resesif. Selain itu pada perkawinan antara laki-laki tidak vitiligo dan perempuan tidak vitiligo tidak didapati adanya anak yang vitiligo yang seharusnya demikian jika gen vitiligo adalah gen dominan autosom.

Asumsi 7 : Gen vitiligo adalah Gen Resesif Autosom

Dari keseluruhan pola pewarisan karakter yang ada, maka pola pewarisan untuk karakter vitiligo yang paling sesuai dengan pola fenotip yang ada adalah resesif autosomal. Hal ini berdasarkan analisa :

- a. Tidak ada pelompatan generasi dalam munculnya suatu karakter, dikarenakan kerja gen resesif tidak ditutupi oleh pasangannya yang dominan.
- b. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak vitiligo didapati adanya anak mengalami vitiligo, hal ini diperkirakan apabila kedua orang tua tidak vitiligo tersebut memiliki genotip heterozigot (carrier) dan anaknya yang vitiligo menerima sepasang alel resesif yang berasal dari kedua orang tuanya.

Pada Tabel 4.1 kesimpulan dari tabel diatas, jika perkawinan homozigot didapatkan bahwa semua anak seharusnya normal, namun pada kenyataannya yang didapatkan bahwa anak yang terlahir 50% vitiligo dan 50% normal. Jadi yang benar adalah perkawinan orang normal heterozigot (carrier).

a. Pengamatan pola bercak putih (vitiligo) di tubuh individu To Balo

Tabel 4.8 Eksplorasi Vitligo

Lokasi vitiligo	A	B	C
Kepala tepatnya diubun-ubun (<i>Parietal</i>)			
Lengan atas (<i>humerus</i>), pengumpul (<i>radius</i>), dan hasta (<i>Ulna</i>)			
Perut (<i>Gastro</i>)			



Dari hasil pengamatan Pengamatan pola bercak putih (vitiligo) di tubuh individu To Balo, ketiga individu memiliki pola bercak putih (Vitiligo) yang sama dari letak pola. Pada bagian kepala letak pola terdapat di ubun-ubun (*Parietal*), pada bagian tangan tepatnya lengan atas (*humerus*), pengumpul (*radius*), dan hasta (*Ulna*), pada bagian dada sampai perut (*Gastro*) dan terakhir pada bagian paha (*femur*), lutut (*Patella*), tulang kering (*tibia*) dan betis (*fibula*)

Vitiligo merupakan bercak putih pucat, berbatas tegas, umumnya berdiameter 0,5-5 cm, dapat disertai gatal atau panas, namun keluhan terutama pada problem kosmetik.3,39-34 Distribusi vitiligo mengikuti tiga pola, yaitu: fokal, segmental, dan generalisata (*nonsegmental*). **Fokal**; vitiligo terbatas pada satu atau dua area tubuh. **Segmental**; hilangnya warna hanya pada satu sisi tubuh, bisa juga mengenai minimal satu segmen atau lebih. Bersifat stabil dan unilateral. Distribusinya sesuai dengan satu atau lebih dermatoma tubuh yang berdekatan atau vitiligo. Didapatkan hubungan langsung antara tekanan H₂O₂ dan kerusakan sel serta *onset* respons imun seluler adaptif (Anugoro, 2014).

Penyebab lain antara lain: gangguan homeostasis melanosit (lemahnya kalsium intraseluler dan ekstraseluler), rusaknya melanosit karena produk

metabolik sintesis melanin atau mediator neurokimiawi tertentu, akumulasi prekursor melanin yang toksik di melanosit. Stres oksidatif berperan penting pada proses degradasi melanosit, juga paparan bahan kimia, seperti: monobenzileterhidrokinon pada sarung-tangan atau detergen yang mengandung fenol (Anugoro, 2014)

Hipotesis biokimiawi menyatakan terjadi peningkatan sintesis *hydrobiopterin*, suatu kofaktor hidroksilase tirosin yang menghasilkan peningkatan katekolamin dan *reactive oxygen species* (ROS) toksik untuk melanosit. Penurunan kadar katalase dan peningkatan konsentrasi H₂O₂ pada kulit penderita vitiligo memperkuat hipotesis biokimiawi. Riset dasar biokimiawi menemukan bahwa pada penderita vitiligo terjadi akumulasi H₂O₂, kadar *catalase* di seluruh epidermis menurun, ekspresi *catalase* mRNA tetap tidak berubah. Uniknya, limfosit darah tepi pada penderita vitiligo juga memiliki kadar *catalase* yang rendah dan sel-sel ini rentan terhadap tekanan (*stress*) H₂O₂. H₂O₂ dapat memodulasi respons sel-sel Langerhans epidermis pada sesuai *Blaschko's lines*. Sering dimulai di masa anak-anak. *Onset* cepat. Sering terjadi pada wajah. Biasanya tidak disertai penyakit autoimun lainnya. Pada kasus *onset* dini, sulit dibedakan dengan *nevus depigmentosus*.

Pada vitiligo juga dijumpai beragam varian klinis. Vitiligo *trichrome* dengan karakteristik makula *depigmented* dan *hypopigmented* sebagai tambahan kulit berpigmen normal. Vitiligo *quadrichrome*, bercirikan hiperpigmentasi *marginal* atau *perifollicular*. Varian ini lebih sering pada tipe kulit yang lebih gelap, terutama di area repigmentasi. Vitiligo *pentachrome*, dengan makula

hiperpigmentasi biru abu-abu, mewakili area *melanin incontinence*. Adakalanya penderita vitiligo memiliki varian luar biasa yang dinamakan tipe *confetti*, ciri khasnya adalah memiliki beberapa makula hipomelanotik, *discrete*, dan amat kecil (*tiny*). Peradangan pada vitiligo secara klinis ditandai *erythema* di tepi makula vitiligo. Meluasnya bercak putih menyebabkan penderita vitiligo kurang percaya diri, cemas, stres, hingga depresi, ditambah beban psikologis akibat stigma negatif dari sebagian orang yang meyakini takhayul bahwa vitiligo ini akibat penderita memiliki pesugihan. Depigmentasi wajah atau tangan pada penderita vitiligo memiliki pengaruh (*impact*) signifikan terhadap kualitas kehidupan dan kepercayaan diri

Ketika di keluarga ada riwayat vitiligo, sebut saja nenek atau ibu juga mengalami vitiligo. Kelak, apakah si anak atau si cucu juga pasti bakal 'mewarisi' kondisi ini. Pada prinsipnya, ketika bayi dibentuk, ada pengaruh gen ayah dan ibu. Dengan kata lain, kromosom X dan Y memiliki persentase tertentu ketika bersatu dan saat itulah terjadi penyatuan gen sang ayah dan ibu (dr Suksmagita Pratidina SpKK)


Beberapa negara yang pernah melakukan penelitian tentang vitiligo, baik itu jenis dan pola maupun penyebab terjadinya penyakit vitiligo. Vitiligo ditemukan pada 0,1-2,9% populasi penduduk dunia, di usia berapapun, tersering pada usia 10-40 tahun, dengan dominasi pada perempuan. Di Amerika, sekitar 2 juta orang menderita vitiligo. Di Eropa Utara dialami 1 dari 200 orang. Di Eropa, sekitar 0,5% populasi menderita vitiligo. Di India, angkanya mencapai 4%. Prevalensi vitiligo di China sekitar 0,19%. Sebagian besar kasus terjadi sporadis,

sekitar 10-38% penderita memiliki riwayat keluarga dan pola pewarisannya konsisten dengan *trait* poligenik (Anugoro, 2014).

Berdasarkan data dari Departemen Dermatologi pada tahun 2005, dari 182 pasien, 87 (47,8%) adalah laki-laki dan 95 (52,2%) adalah perempuan. Usia rata-rata onset penyakit adalah $55 \pm 2,3$ tahun. Vitiligo vulgaris adalah yang paling umum (83,5%) diikuti oleh fokus (5,5%), segmental (4,4%), acrofacial (3,8%), mukosa (2,2%), dan universal (0,5%). Tempat onset yang paling umum adalah kepala dan leher (24,2%) diikuti oleh ekstremitas atas (23%), trunkus (22%), ekstremitas bawah (17,6%), mukosa oral / genital (7,1%), dan lentur (6%). Fenomena Koebner diamati pada 14,8% sementara leukotrichia dimana menunjukkan bahwa kondisi ini resisten terhadap perawatan medis dan membutuhkan pencangkokan epidermal 47,3% dari pasien. Nevi halal diamati pada 3,8% pasien, dan vitiligo stabil pada 64,8%. (15,9%) pasien memiliki riwayat keluarga vitiligo. Gangguan autoimun / endokrin yang terkait hadir pada 39 (21,4%) pasien.

Pada fenomena Koebner, bercak vitiligo berkembang sebagai suatu respons isomorfik terhadap gesekan atau tekanan sebagai hasil berbagai aktivitas seperti: menyikat rambut, mengeringkan kulit dengan handuk, memakai ikat pinggang atau arloji. Lesi vitiligo sering muncul di tempat terjadinya *microtraumas* (*Koebner phenomenon*). Oleh karena itu, perawatan kulit yang tepat dan menghindari *microtraumas* sangatlah penting (Anugoro, 2014).

Umumnya vitiligo muncul setelah kelahiran, dapat berkembang di masa anak-anak, *onset* usia rata-ratanya adalah 20 tahun. Sementara ahli berpendapat vitiligo dijumpai baik pada pria maupun wanita, tidak berbeda signifikan dalam hal tipe kulit atau ras tertentu.^{4,5} Pada 25% kasus, dimulai pada usia 14 tahun; sekitar separuh penderita vitiligo muncul sebelum berusia 20 tahun (Anugoro, 2014).



Gambar 4.4 Replika Individu To Balo

Lain halnya dengan yang di alami Komunitas To Balo, jenis, letak dan pola berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan fenotif pola bercak putih (vitiligo) di tubuh individu To Balo, ketiga individu memiliki pola dan letak bercak putih (Vitiligo) yang sama. Vitiligo muncul sejak lahir (semula jadi). Dengan pola

pewarisan autosomal resesif. Vitiligo adalah suatu kondisi bercak putih di kulit. Setiap area pada tubuh dapat dipengaruhi dan kebanyakan orang dengan vitiligo memiliki bercak putih di banyak area tubuh. Luas dan tingkat kehilangan warna dari vitiligo tidak dapat diprediksi pada komunitas to Balo. Hal ini juga dapat memengaruhi kulit di bagian tubuh Anda, juga bisa memengaruhi rambut dan bagian dalam mulut. Biasanya, warna rambut dan kulit ditentukan oleh melanin. Vitiligo terjadi ketika sel-sel yang memproduksi melanin mati atau berhenti berfungsi. Vitiligo memengaruhi orang-orang dari semua jenis kulit, tetapi mungkin lebih terlihat pada orang dengan kulit yang lebih gelap halnya ini sama dengan warna kulit gelap pada individu komunitas to balo. Kondisi ini tidak mengancam kehidupan atau menular. Namun dapat membuat stres atau membuat merasa buruk tentang dirinya sendiri.

Penyebab terjadinya vitiligo pada Komunitas To Balo seperti yang kita ketahui, Melanin adalah pigmen yang memberikan kulit warna khas. Vitiligo disebabkan oleh hilangnya pigmen di kulit, karena rusaknya sel-sel pigmen pembentuk yang dikenal sebagai melanosit. Penyebab pasti dari kerusakan sel-sel ini tidak diketahui. Satu penjelasan yang mungkin bahwa sistem kekebalan tubuh menghancurkan sel-sel, seperti dalam kondisi autoimun lainnya. Meskipun vitiligo memengaruhi semua ras dengan rasio yang sama, namun vitiligo lebih terlihat pada orang berkulit gelap.

Bagian-bagian kulit yang terkena menjadi lebih terang atau putih. bisa jadi akibat sel-sel gagal atau mati. Itu mungkin terkait dengan gangguan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan melanosit di kulit.

Riwayat keluarga (keturunan). Kejadian pemicu, seperti terbakar sinar matahari, stres atau paparan bahan kimia industri. Faktor risiko lain yang meningkatkan kemungkinan seseorang terkena vitiligo termasuk penyakit autoimun. Autoimun merupakan suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel tubuh yang sehat, salah satunya adalah melanosit di kulit

Namun pada pola bercak putih yang diderita pada komunitas to balo, agak sedikit berbeda, belum diketahui secara pasti, namun berdasarkan hasil wawancara para individu to balo jarang, bahkan belum pernah memeriksakan penyakit yang mereka derita.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Dari pola pewarisan sifat vitiligo pada Komunitas To Balo, maka untuk karakter vitiligo yang paling sesuai dengan pola fenotip yang ada adalah resesif autosomal berdasarkan analisa yang dilakukan dan dapat dinyatakan bahwa jika perkawinan homozigot didapatkan bahwa semua anak seharusnya normal, namun pada kenyataannya yang didapatkan bahwa anak yang terlahir 50% vitiligo dan 50% normal. Jadi yang benar adalah perkawinan orang normal heterozigot (carrier).
2. Dari hasil Pengamatan fenotif pola bercak putih (vitiligo) di tubuh individu To Balo, ketiga individu memiliki pola dan letak bercak putih (Vitiligo) yang sama. Pada bagian kepala letak pola terdapat diubun-ubun (*Parietal*), pada bagian tangan tepatnya lengan atas (*humerus*), pengumpil (*radius*), dan hasta (*Ulna*), pada bagian dada sampai perut (*Gastro*) dan terakhir pada bagian paha (*femur*), lutut (*Patella*), tulang kering (*tibia*) dan betis (*fibula*)

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian ini yaitu, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang molekuler polimorfism (SNP) pada Komunitas To Balo.

KEPUSTAKAAN

- Agus, Rosana dan Sjafaraenan. *Penuntun Praktikum Genetika*. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2013
- Anurogo D, Ikrar T. *Vitiligo*. CDK-200, 2014; 9: 666-75.
- Al- Mahali, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2002
- Alkhateeb A, Fain PR, Thody A, Bennett DC, Spritz RA. *Epidemiology of vitiligo and associated autoimmune diseases in Caucasian probands and their families*. *Pigment Cell Res* 2003;16(3):208-14.
- Arsal AF. *Analisis Pedigree Cadel laporan kuliah kerja lapang Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin*, Makassar. 1995
- Arsal AF. *Genetika: Bahan Ajar dalam lingkungan Jurusan Biologi FMIPA UNM*, Makassar. 2012.
- Arsal AF. *Analisis Pedigree Cadel (Study Kasus Beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan)*. *Jurnal Sainsmat*. Vol 1, No.2 (2012): h 156-166
- Astari, Restya Winda. *Applikasi Peluang Diskrit dan Pohon Keluarga dalam Analisis Pewarisan Gen Tunggal*. ITB. Bandung. 2006
- Birlea S, Birlea M, Cimponeriu D, et al. *Autoimmune diseases and vitamin D receptor Apa-I polymorphism are associated with vitiligo in a small inbred Romanian community*. *Acta Derm Venereol* 2006;86(3):209–14.
- Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kab. Barru* Departemen Sosial dan Budaya. 1995
- Budiyanto, A.K. *Hand Out-7 Genetika Mikroorganisme*. UMM Malang. 2010.
- Campbell N A, Reece J B, Urry L A, et all. *Biologi Jilid 1 Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga. Fried G. 2005
- Parsad D .Dogra S,. *Combination of narrowband UV-B and topical calcipotriene in vitiligo*. *Arch Dermatol* 2003;139(3):393.
- Ernawati dan Joko Purwadi. *Program Pendeteksian Distribusi Pewarisan Genotip Suatu Populasi untuk Tipe Pewarisan Autosomal dengan Metode QR*. *Jurnal Informatika*, Vol. 5, No. 1. 2009

- Gawkroder DJ, Ormerod AD, Shaw L, Mauri-Sole I, Whitton ME, Watts MJ, Anstey AV, Ingham J, Young K. *Vitiligo: concise evidence based guidelines on diagnosis and management*. Postgrad Med J 2010;86:466-71.
- Hann SK, Nordlund JJ, eds. *Vitiligo: Monograph on the Basic and Clinical Science*. Oxford, London: Blackwell Science, 2000:7–12
- Hann SK, Nordlund JJ. *Clinical features of generalized vitiligo*. In: Hann SK, Nordlund JJ (eds) *Vitiligo*. Blackwell, Oxford. 2000:35-48.
- Halder RM, Chappell JL. *Vitiligo Update*. Semin Cutan Med Surg 2008;28:86-92
- Jin Y, Mailloux CM, Gowan K, Riccardi SL, LaBerge G, Bennett DC, Fain PR, Spritz RA. *NALP1 in Vitiligo-Associated Multiple Autoimmune Disease*. N Eng J Med 2010;356(12):1216-25
- Kementrian Agama RI, *Al Quraan dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir alquran Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Muhsaf Al-Quran, 2011
- Kakourou T. *Vitiligo in children*. World J Pediatr 2009;5(4):265-8.
- Lotti T, Gori A, Zanieri F, Colucci R, Moretti S. *Vitiligo: new and emerging treatments*. Dermatol Ther 2008;21:110-7.
- Michael Cumming. Chapter 4. *Pedigree Analysis in Human Genetic*. Thomson Learning. 2006
- Machwiyah, Yuyun dan Nurhandayani, N.S. *Analisis Pedigree dan Fenotip Pasangan Kembar Study Kasus Pada Keluarga Kembar di Kecamatan Laweyan Surakarta*. Jurnal Biogenesis. Vol. 1 No. 1 (2013): h 18-27
- Munandar. *Anatomi Susunan Saraf Manusia: Prinsip-prinsip Dasar Neurobiologi*. CV EGC Penerbit buku kedokteran. Jakarta Utara. hal 254. 1986
- Mustami, Muh. Khalifah. *Genetika*. Makassar: Alauddin University Press. 2013
- Mahmoud El Ramly ,Maha El Goweini, Naglaa El Sayed. *Topical Pimecrolimus Versus Clobetasol in The Treatment of Vitiligo*. Egypt. J. Derm. & Androl. Vol. 27. No (3,4) June & September 2008:13-8
- Nurhadi, Bambang. *Genetika Dasar*. Bandung: CV Armico, 1984
- Nuraini, Tuti. *Penurunan Sifat Autosomal Pada Manusia*. FIK-UI. 2013

- Nordlund JJ, Boissy RE, Hearing VJ, King RA, Oetting WS, Ortonne JP, eds. *The Pigmentary System: and Pathophysiology, 2nd ed.* Oxford: Blackwell Scientific, 2000:591–8.
- Pai, Anna C. *Dasar-Dasar Genetika*. Jakarta: Erlangga. 2008
- Pai, Anna C. *Foundations of Genetics*. Terj. Dr. Muchidin Apandi, M.Sc.. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Perkasa, Muhammad Fajar,. Punagi, A.Q., Kaeruddin. *Analisis Pedigree Gangguan Pendengaran dan Ketulian Penduduk Dusun Sepang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. Laporan Penelitian. Vol. 42. No.1 (2012): h 1-5
- Rekam Medis RSU Pusat Moehammad Hoesin. Data Rekam Medis Devis Dermato-Kosmetologi Poliklinik Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUPMH. Fakultas Kedokteran. Universitas Sriwijaya. Palembang. 2011
- Russel. *Genetics, Little Brown and Company*. USA. Hal 204-205. 1986
- Sidabutar T. *Kesehatan: Menangani Anak Cadel*. Nova No. 339/VII-21 Agustus 1994. Jakarta. hal 25.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 9*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 11*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Suryo. *Genetika Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005
- Susanto, Agus Heri. *Genetika*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2011
- Stansfield, Ph.D., William D. *Theory and Problems of Genetics, Second Edition*. Terj. Dr. Machidin Apandi dan Dra. Lanny T. Hardy. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Stansfield W D, *Biologi*. Jakarta: Erlangga.1983.
- Spritz RA. *The genetics of generalized vitiligo and associated autoimmune diseases*. Pigment Cell Res 2008;20:271-8.
- Tarle RG, Nascimento LM, Mira MT, Silva de Castro CC. *Vitiligo-Part 1- review. An Bras* 2014;89(3):461-70
- Vitiligo European Task Force (VETF). 2003

LAMPIRAN



Gambar 1 Individu A, B dan C Komunitas To Balo
(Dokumentasi Pribadi, 2018)



Gambar 2 Komunitas To Balo
(Dokumentasi Pribadi, 2018)

KUESIONER RIWAYAT VITILIGO PADA PENDUDUK SUKU TO BALO

No.	
Data Responden	
Nama	A
Umur	56
Jenis kelamin	<input type="radio"/> Laki-laki <input checked="" type="radio"/> Perempuan
Pendidikan terakhir	<input checked="" type="radio"/> a. Tidak sekolah <input type="radio"/> b. D2
	<input type="radio"/> c. SD <input type="radio"/> d. D3
	<input type="radio"/> e. SMP <input type="radio"/> f. S1
	<input type="radio"/> g. SMA <input type="radio"/> h. S2
	<input type="radio"/> i. D1 <input type="radio"/> j. S3
Pekerjaan	<input type="radio"/> a. PNS <input type="radio"/> b. Buruh
	<input type="radio"/> c. Pegawai Swasta <input type="radio"/> d. Sopir
	<input type="radio"/> e. Wiraswata <input type="radio"/> f. Pedagang
	<input type="radio"/> g. Petani <input checked="" type="radio"/> h. dll
Keadaan Fisik	
Berat badan (BB)	45
Tinggi Badan (TB)	150
IMB	
Eksplorasi Vitiligo	
Apakah Anda atau keluarga Anda memiliki riwayat penyakit vitiligo?	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
Apakah anda menikah dengan sesama suku To Balo?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak
Berapa jumlah anak yang anda miliki?	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 7
	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8
	<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9
	<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10
	<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11
	<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> Lebih dari 11
	<input type="radio"/> 6
Apakah semua terlahir dengan kulit seperti anda?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak
Apakah pola serta corak belang anak	<input type="radio"/> a. Memiliki kesamaan dengan saya <input type="radio"/> b. Memiliki kesamaan dengan istri

anda memiliki kesamaan dengan anda atau istri ?	c. Tidak memiliki kesamaan sama sekali	
Apakah anda merasakan keluhan seperti ?	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang pendengaran b. Peradangan pada mata c. Rasa cemas/ emosional d. Kulit gatal / kering 	
Apakah pernah ada bercak putih yang muncul lalu menghilang?	• Ya	• Tidak
Sejak kapan bercak putih itu muncul?	<ul style="list-style-type: none"> a. Dari lahir c. Anak-anak e. Remaja 	<ul style="list-style-type: none"> b. Dewasa d. Lanjut usia
Siapa saja anggota keluarga anda yang menderita vitiligo	<ul style="list-style-type: none"> a. Ayah c. Ibu e. Kakak g. Adik h. Anak 	<ul style="list-style-type: none"> b. Kakek d. Nenek f. Lainnya
Pola vitiligo	a. Segmental	b. Non segmental
Aktivitas vitiligo	a. Aktif	b. Stabil
Tipe lokalisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk fokal b. Bentuk segmental c. Bentuk mukosal 	
Tipe generalisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk aksofasial b. Bentuk vulgaris c. Bentuk universalis 	

KUESIONER RIWAYAT VITILIGO PADA PENDUDUK SUKU TO BALO

No.	
Data Responden	
Nama	B
Umur	48
Jenis kelamin	<input checked="" type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
Pendidikan terakhir	<input checked="" type="radio"/> Tidak sekolah <input type="radio"/> D2
	<input type="radio"/> SD <input type="radio"/> D3
	<input type="radio"/> SMP <input type="radio"/> S1
	<input type="radio"/> SMA <input type="radio"/> S2
	<input type="radio"/> D1 <input type="radio"/> S3
Pekerjaan	<input type="radio"/> PNS <input type="radio"/> Buruh
	<input type="radio"/> Pegawai Swasta <input type="radio"/> Sopir
	<input type="radio"/> Wiraswata <input type="radio"/> Pedagang
	<input type="radio"/> Petani <input checked="" type="radio"/> dll
Keadaan Fisik	
Berat badan (BB)	55kg
Tinggi Badan (TB)	155 cm
IMB	
Eksplorasi Vitiligo	
Apakah Anda atau keluarga Anda memiliki riwayat penyakit vitiligo?	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
Apakah anda menikah dengan sesama suku To Balo?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak
Berapa jumlah anak yang anda miliki?	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 7
	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8
	<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9
	<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10
	<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11
	<input checked="" type="radio"/> 5 <input type="radio"/> Lebih dari 11
	<input type="radio"/> 6
Apakah semua terlahir dengan kulit seperti anda?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak
Apakah pola serta corak belang anak anda memiliki kesamaan dengan anda atau istri ?	<input checked="" type="radio"/> Memiliki kesamaan dengan saya
	<input type="radio"/> Memiliki kesamaan dengan istri
	<input type="radio"/> Tidak memiliki kesamaan sama sekali
Apakah anda merasakan keluhan	<input type="radio"/> Kurang pendengaran
	<input type="radio"/> Peradangan pada mata

seperti ?	g. Rasa cemas/ emosional	
	h. Kulit gatal / kering	
Apakah pernah ada bercak putih yang muncul lalu menghilang?	• Ya	• Tidak
Sejak kapan bercak putih itu muncul?	f. Dari lahir	g. Dewasa
	h. Anak-anak	i. Lanjut usia
	j. Remaja	
Siapa saja anggota keluarga anda yang menderita vitiligo	i. Ayah	j. Kakek
	k. Ibu	l. Nenek
	m. Kakak	n. Lainnya
	o. Adik	
	p. Anak	
Pola vitiligo	c. Segmental	d. Non segmental
Aktivitas vitiligo	c. Aktif	d. Stabil
Tipe lokalisata	d. Bentuk fokal	
	e. Bentuk segmental	
	f. Bentuk mukosal	
Tipe generalisata	i. Bentuk aksofasial	
	j. Bentuk vulgaris	
	k. Bentuk universalis	

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Andi Nabila Nurfitriah, biasa dipanggil Nabil. Lahir di Simpo, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 22 Februari 1996, dari pasangan Andi Abd. Rahman dan Rusnani. Merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara.

Memulai pendidikan di TK Dharma Wanita Simpo. Kemudian menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Passeno, kecamatan Baranti pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Baranti dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2011. Lalu pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pamca Rijang (SMA Negeri 1 Sidrap) pada tahun 2014. Lalu dinyatakan lulus jalur UMM UIN Alauddin Makassar pada pilihan ketiga yaitu Biologi Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2014 hingga selesai pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi di HMJ Biologi Saintek. Penulis sendiri pernah menjadi anggota Devisi Ilmu dan Penalaran (IP) periode 2015 dan Koordinator Devisi Minat dan Bakat (Mikat) periode 2016. Untuk mendapatkan gelar sarjana penulis tertarik dengan salah satu komunitas di Kabupaten Barru yaitu Komunitas To Balo dimana komunitas tersebut memiliki penyakit vitiligo (bercak kulit putih) yang terjadi secara turun-temurun. Akhirnya penulis menyusun skripsi dengan judul “ Analisis Pedigree Vitiligo pada Komunitas To Balo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru”.