

**IDENTIFIKASI SENYAWA TANAMAN TAMBALEPEN DAN
PENGARUH PENGHAMBATANNYA PADA BAKTERI**
Salmonella enterica serovar Thyphi



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

JUMANIA
60300114001

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jumania
NIM : 60300114001
Tempat/Tgl.Lahir : Batu Sura/26 Januari 1996
Jurusan/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Judul : Identifikasi Senyawa Kimia Tanaman Tambalepen dan Pengaruh Penghambatannya pada Bakteri *Salmonella enterica serovar Thypi*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar, adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa, ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 19 November 2018
Penyusun,

Jumania
NIM: 60300114001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Identifikasi Senyawa Tanaman Tambalepen dan Pengaruh Penghambatannya pada Bakteri *Salmonella enterica serovar Thyphi*”, yang disusun oleh Jumania, NIM: 60300114001, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 19 November 2018 M.
11 Rabiul Awal 1440 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko M.Hi.	(.....)
Sekretaris	: St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah swt. kepada seluruh makhluk-Nya terutama manusia yang bernaung di muka bumi ini. Kenikmatan yang berupa kesehatan, kesempatan merupakan suatu nikmat yang begitu besar yang patut untuk disyukuri. Begitu juga penulis mengucapkan rasa syukur karena masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Identifikasi Senyawa Tanaman Tambalepen dan Pengaruh Penghambatannya pada Bakteri *Salmonella enterica serovar Thyphi*”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. Nabi yang telah diberikan wahyu dan Mukjizat oleh Allah berupa al-Qur'an yang akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Dialah teladan bagi seluruh umatnya serta dialah pembawa risalah kebenaran dalam menuntun umatnya kejalan keselamatan.

Penulis sepenuhnya menyadari akan banyaknya pihak yang berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan motivasi sehingga hambatan-hambatan yang penulis temui dapat teratasi.

Pertama-tama penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam dan tulus kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda Yorong dan ibunda Bolong yang senantiasa merawat dan mendidik penulis dari kecil hingga sekarang. Untuk ayahanda dan ibunda tercinta, pengertian, motivasi dan doa yang selalu kalian panjatkan senantiasa penulis ingat dan berusaha agar pesan-pesan itu diterapkan dalam keseharian.

Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.beserta Wakil Dekan I, II dan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. selaku ketua jurusan Biologi serta penasehat akademik ibunda Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si serta sekretaris Jurusan Biologi bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si atas segala ilmu, petunjuk serta arahnya selama menyanggah gelar sebagai mahasiswa di UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si selaku pembimbing I, dalam penulisan skripsi yang senantiasa menyisihkan waktunya yang berharga untuk membimbing penulis. Saran-saran serta kritik-kritik yang sangat bermanfaat dalam merampungkan skripsi ini.

5. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi yang senantiasa menyisihkan waktunya yang berharga untuk membimbing penulis. Saran-saran serta kritik-kritik mereka sangat bermanfaat dalam merampungkan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes selaku pembahas I, dan Bapak Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag selaku pembahas II.
7. Bapak dan Ibu dosen jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar atas segala ilmunya dan didikannya selama berada di jurusan Biologi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
8. Kepala Laboratorium Ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si dan para Laboran Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang senantiasa membimbing selama penulis jadi praktikan maupun peneliti. Kakak sekaligus laboran kak Zulkarnain, S.Si, M.Kes yang selalu siap mendampingi setiap Praktikum Lapangan, yang selalu baik dan ramah, kak Kurni selaku laboran Mikrobiologi yang selalu mendampingi selama penelitian di Laboratorium, terima kasih atas segala bimbingannya kak. Kak Sidar laboran baik yang selalu siap kami reportkan setiap praktikum Biokimia.
9. Kepada Kak Ati Staf di Jurusan Biologi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir penulis. Senantiasa meluangkan waktunya, baik dalam hal peminjaman buku, mengurus persuratan dan sebagainya.

10. Kepada pak Usman, staf Laboratorium Forensik Cabang Makassar, atas kesabarannya dan kesediannya membantu dalam menyelesaikan penelitian penulis yang sempat diulang.
11. Kak Eni, Laboran Kimia Organik Fakultas Sains dan Teknologi. Yang telah membantu dalam penelitian penulis. Dan kepala laboratorium Kimia Organik Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan peneliti untuk menyelesaikan salah satu rangkaian penelitian penulis.
12. Kepada semua keluarga, Kakak yang selalu sabar dalam membimbing, Tante, Paman, sepupu yang senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
13. Teman-teman yang selalu ada disampingku saat susah maupun senang selama kuliah. Lisda, teman berjuang sejak SD hingga kuliah. Intan, adik sepupu yang bandel tapi baik. Eni, Cimma, Nana, Nuka, Adys dan Mida terima kasih untuk kebersamaannya dan kebaikan kalian selama ini. Kepada teman seperjuangan Saifullah Azman yang terlebih dahulu menyandang gelar S.Si, terima kasih teman atas segala bantuannya selama kuliah sama-sama, manusia paling sabar dan paling baik.
14. Kepada teman se-Angkatan (14CTEAL) yang senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
15. Adik-adik mahasiswa jurusan Biologi 2015, 2016, dan 2017 serta para senior di Biologi.

16. Teman-teman KKN-57 di Kabupaten Jeneponto Kecamatan Rumbia, khususnya di Desa Lebang Manai yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.

17. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta staf-stafnya sehubungan dengan pengumpulan bahan-bahan untuk membuat skripsi ini.

Pada kenyataannya, walaupun menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, pada dasarnya yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini adalah penulis sendiri. Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan memberikan saran, kritikan atau bahkan koreksi terhadap kekurangan dan kesalahan yang pasti masih terdapat dalam skripsi ini. Semoga dengan saran dan kritik tersebut, skripsi ini dapat diterima dikalangan pembaca yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Gowa, 19 November 2018 M.
11 Rabiul Awal 1440 H.

Penyusun

Jumania
60300114001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ILUSTRASI	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
BABII TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Ayat yang Relevan.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Tanaman Tambalepen	11
C. Tinjauan Umum Demam Tifoid	13
D. Tinjauan Umum <i>Salmonella thypi</i>	15
E. Tinjauan Umum Struktur Dinding Sel Bakteri.....	18
F. Senyawa Antibakteri dari Bahan Tanaman	19
G. Mekanisme Kerja Penghambatan Senyawa Antibaktei	23
H. Mekanisme Resistensi	25
I. Tinjauan Prinsip dan Metode Esktraksi.....	28
J. Tinjauan Umum KHM dan KBM.....	29
K. Tinjauan Umum GC-MS	30
L. Kerangka Pikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
C. Variabel Penelitian	37
D. Defenisi Operasional Variabel.....	37

E. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	38
F. Prosedur Kerja	38
G. Analisis GC-MS	41
H. Skrining Fitokimia.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Nilai KHM dan KBM.....	45
Tabel 4.2. Hasil Skrining Fitokimia.....	46
Tabel 4.3. Senyawa Asil Analisa GC-MS Sampel Akar.....	48
Tabel 4.4. Senyawa Hasil Analisa GC-MS Sampel Batang	49
Tabel 4.5. Senyawa Hasil Analisa GC-MS Sampel Daun	50
Tabel 4.6. Senyawa Hasil Analisa GC-MS dan Struktur Kimianya.....	63



DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1. Tanaman Tambalepen	12
Gambar 2.2. Morfologi <i>S.thypi</i>	16
Gambar 2.3. Struktur Dinding Sel Bakteri.....	19
Gambar 2.4. Contoh Senyawa Fenolik	20
Gambar 2.5. Contoh Senyawa Terpen	21
Gambar 2.6 Contoh Senyawa Alkaloid.....	22
Gambar 2.7 Mekanisme Penghambatan Bakteri.....	22
Gambar 2.8. Mekanisme Resistensi.....	27
Gambar 4.1. Hasil Analisa GC-MS pada Akar	47
Gambar 4.2. Hasil Analisa GC-MS pada Batang.....	49
Gambar 4.3. Hasil Analisa GC-MS pada Daun	50
Gambar 4.4. Reaksi Uji Mayer	55
Gambar 4.5. Reaksi Uji Wagner	55
Gambar 4.6. Reaksi Uji Dragendorf	56
Gambar 4.6. Struktur Kimia Hasil Analisis GC-MS.....	66

ABSTRAK

Nama : Jumania

NIM : 60300114001

Judul Skripsi: Identifikasi Senyawa Tanaman Tambalepen Dan Pengaruh Penghambatannya Pada Bakteri *Salmonella Enterica Serovar Thyphi*

Demam tifoid merupakan salah satu jenis penyakit yang sampai saat ini masih menjadi masalah dalam dunia kesehatan yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Salmonella thypi* melauli penyebaran *fecal-oral*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas tanaman Tambalepen dalam menghambat atau membunuh bakteri *S.thypi* dengan melihat KHM dan KBM. Serta melihat beberapa kandungan senyawa kimia dari tanaman Tambalepen yang berpotensi sebagai antimikroba. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018-November 2018 di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Metode yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri pada penelitian ini adalah metode dilusi cair, untuk deteksi golongan senyawa aktif menggunakan metode skrining fitokimia dan metode analisis GC-MS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya aktivitas penghambatan pada ekstrak tanaman Tambalepen terhadap pertumbuhan bakteri *S.thypi* dengan nilai KHM tertinggi yaitu 250 µg/mL pada ekstrak etanol daun dan nilai KBM dengan nilai tertnggi yaitu 500 µg/mL pada etanol daun tanaman Tambalepen, dengan beberapa kandungan senyawa yang tergolong sebagai antimikroba diantaranya alkaloid, flavonoid, tanin dan steroid, senyawa yang berhasil terdeteksi pada analisa GC-MS pada ekstrak etanol daun tanaman Tambalepen 9-asam oktadekanoat.

Kata kunci: *Salmonella thypi*, KHM, KBM dan GC-MS.

ABSTRACT

Name : Jumania

NIM : 60300114001

Thesis Title : The Identification Compounds Tambalepen Plant and the Influence Obstacle on the Bacteria *Salmonella enterica serovar Thyphi*.

Typoid fever is one type of disease that feill be a problem in the health of the world caused by bacterial infection *Salmonella thyphi* through the spread of *fecal-oral*. The aims of the research is to tested the effectiveness of Tambalepen plant in inhibiting or killing *S.thyphi* bacteria with see MIC and MBC. As well as see some contens chemical compound from Tambalepen plant potentially as antimicrobe. This research implemented in April until November 2018 in Microbiology Laboratory Alauddin Islamic State University. Methode used in the test of antibacteria activities is dilusi liquid method, to detection of the active compound used fitokimia screening and analysis GC-MS method. The result of this research indicates the presence of obstacle activity on the extract Tambalepen plant against thr growth of bacterial *S.thyphi* with the highest MIC value 250 µg/mL on the extract ethanol leaves and highest MBC values 500 µg/mL on the ethanol leaves Tambalepen plant, with some concent of compound that classified as antimicroba among them alkaloid, flavonoid, tanin and steroid. The compound successfully detected on the analysis GC-MS in ethanol extract Tambalepen leaves plant 9-acid octadecanoic.


Keyword: *Salmonella thyphi*, MIC, MBC and GC-MS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya atas izin Allah dan setiap suatu kejadian ada hikmah yang terkandung dibalik itu semua. Dengan penciptaan langit dan bumi serta segala isinya seharusnya menjadi pelajaran bagi manusia tentang ke-Esa-an Allag swt., termasuk penciptaan berbagai jenis tanaman yang ada dimuka bumi ini sebagaimana firman Allah dalam QS Shad /38:27 yang berbunyi:



Terjemahnya:

Dan Kami tidak Menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu katena mereka akan masuk neraka (27) (Departemen Agama RI, 2012).

Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa Kami tidak menciptakan langit dan bumi beserta semua yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Yang demikian adalah sangkaan orang-orang kafir sehingga mereka semena-mena memberikan keputusan sesuai hawa nafsunya. Dari hal itu, mereka akan memperoleh siksa yang amat pedih berupa api neraka (Shihab, 2015).

Dari penjelasan tafsir di atas, dikatakan bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, terkait dengan ini kita sebagai manusia dituntut untuk

tiada pemberi nikmat dan rizki kecuali Dia. Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku dari penyakit dan Yang memberi kesembuhan, bukan para dokter.

Salah satu penyakit yang masih menjadi masalah utama di dunia kesehatan yaitu demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri *S.typhi*. Penanganan demam tifoid sampai saat masih terus dilakukan untuk mendapat penanganan yang tepat. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Purba I.E dkk (2016), dikatakan bahwa di negara Eropa, tidak ditemukan informasi yang memadai tentang program demam tifoid.

Meskipun berbagai pemeriksaan penunjang baru berkembang, diagnosis tifoid di negara berkembang masih sering didasarkan atas kriteria klinis. Hal ini menjadi masalah, karena demam tifoid mirip dengan banyak penyakit demam lokal lainnya. Pada anak, stadium awal perjalanan penyakit demam enterik dapat menyerupai kondisi gastroenteritis akut lainnya. Pemeriksaan Widal satu kali pada serum akut tidak dianjurkan karena sering memberikan hasil positif palsu. Untuk itu, penegakan diagnosis demam tifoid memerlukan pemeriksaan penunjang yang tepat berupa *rapid diagnostic test* (RDT) yang hasilnya cepat disertai konfirmasi pemeriksaan biakan empedu yang tetap merupakan baku emas dengan tujuan memantau apakah penggunaan terapi antibiotik masih sensitif atau resisten (Indang, 2013).

Pemilihan obat antibiotik lini pertama pengobatan demam tifoid pada anak di negara berkembang didasarkan pada faktor efikasi, ketersediaan dan biaya. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, kloramfenikol masih menjadi obat pilihan

pertama pengobatan demam tifoid pada anak, terutama di negara berkembang. Hal ini berbeda dengan dewasa, dimana obat antibiotik lini pertamanya adalah golongan fluorokuinolon, seperti ofloksasin, siprofloksasin, levofloksasin atau gatifloksasin. Persoalan pengobatan demam tifoid saat ini adalah timbulnya resistensi terhadap beberapa obat antibiotik yang sering digunakan dalam pengobatan demam tifoid atau yang disebut dengan *Multi Drug Resistance* (MDR). *S.typhi* yang resisten terhadap kloramfenikol, yang pertama kali timbul pada tahun 1970. Resistensi ini berkembang menjadi resisten terhadap obat ampisilin, amoksisilin, trimetoprim-sulfametoksazol dan bahkan resisten terhadap fluorokuinolon (Prayitno, 2012).

Kasus resistensi memicu pencarian pengobatan alternatif atau pengobatan pendamping yang efektif dan efisien dengan harga terjangkau namun tetap berorientasi pada standar pelayanan kesehatan yang sudah ada sangat dibutuhkan, dalam hal ini dengan menggunakan obat-obat tradisional (Ardananuridin dkk, 2004).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji beberapa jenis tanaman yang dianggap memiliki kandungan senyawa kimia yang aktif sebagai antibakteri. Ibrahim (2012), telah melakukan penelitian untuk menguji kemampuan ekstrak daun sungkai (*Peronema canescens* Jack) sebagai alternatif antibiotik herbal terhadap beberapa jenis bakteri patogen, salah satunya bakteri *S.thypi*. Dalam hasil penelitian tersebut dilaporkan bahwa ekstrak daun Sungkai memiliki aktivitas penghambatan terhadap beberapa bakteri patogen tersebut termasuk terhadap

bakteri *S.thypi* dengan beberapa senyawa kimia diantaranya alkaloid, steroid, flavonoid dan tanin.

Penelitian lain telah dilakukan oleh Wahyuni (2016) untuk menguji kemampuan ekstrak etanol daun pakis sayur (*Diplazium esculentum* Swartz) dalam menghambat pertumbuhan bakteri *S.thypi* secara in vivo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa ekstrak etanol daun pakis sayur memiliki penghambatan terhadap bakteri *S.thypi* secara in vivo meskipun menunjukkan hasil yang tidak signifikan dari hari pertama sampai perlakuan hari ke-8.

Penduduk di dusun Batu Sura, desa Mesakada, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang telah lama menggunakan air rembesan batang tanaman Tambalepen sebagai obat tradisional untuk kasus demam yang diduga disebabkan oleh infeksi *S.thypi*, yaitu demam tifoid. Tanaman Tambalepen sendiri merupakan tanaman yang diduga endemik dari dusun Batu Sura yang tumbuh di pinggir aliran sungai.

Cara pemanfaatan tanaman ini biasanya dengan menggunakan air yang berasal dari batang tanaman kemudian diminum oleh penderita yang diduga mengalami gejala tifoid. Khasiat air batang tanaman tambalepen sebagai obat tradisional diduga berkaitan erat dengan kandungan senyawa aktif yang terkandung pada batang tanaman itu sendiri. Namun sampai sekarang ini, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa tanaman Tambalepen dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan penyakit termasuk pada kasus demam tifoid.

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui secara ilmiah apakah tanaman Tambalepen mempunyai senyawa yang

dapat menghambat pertumbuhan bakteri *S. typhi* dengan melihat kandungan senyawa aktif pada ekstrak tanaman Tambalepen dan air yang berasal dari batang sehingga tanaman ini bisa dijadikan obat alternatif menangani demam tifoid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu:

1. Bagaimana aktivitas antimikroba dari ekstrak tanaman Tambalepen terhadap bakteri *S. typhi*?
2. Golongan senyawa apa saja yang aktif pada tanaman Tambalepen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Pengambilan sampel tanaman Tambalepen dilakukan di dusun Batu Sura, kecamatan Lembang, desa Mesadaka, kabupaten Pinrang.
2. Isolat bakteri *S. typhi* diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi UINAM.
3. Senyawa aktif tanaman Tambalepen yang dideteksi yaitu flavonoid, alkaloid, steroid, tanin, dan saponin.

D. Kajian Pustaka

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Ardananurdin, 2004 dkk), mengtaakan bahwa dekok bunga Belimbing Wuluh memiliki data antimikroba terhadap bakteri *S. typhi* (Anova, $p = 0,000$; $R = -0,749$; $R^2 =$

0,982). Daya antimikroba bunga belimbing wuluh ini disebutkan oleh karena adanya bahan-bahan aktif yang terkandung di dalamnya seperti saponin, polifenol dan flavonoids yang berperan utama dalam menghambat pertumbuhan maupun membunuh bakteri *S. typhi*.

2. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Wulandari, 2014), menjelaskan bahwa golongan senyawa kimia yang terdapat pada ekstrak etanol daun bintaro mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *S.thypi*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak tanaman Tambalepen terhadap *S. typhi*?
2. Mengethui senyawa apa saja yang aktif pada tanaman Tambalepen?

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai dasar ilmiah pemanfaatan tanaman Tambalepen sebagai obat alternatif demam tifoid.
2. Memberikan informasi yang akurat pada masyarakat dusun Batu Sura mengenai potensi antimikroba dan kandungan tanaman Tambelepen.
3. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

tanaman yang indah (7), untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali (tunduk kepada Allah) (8), Dan dari langit Kami Turunkan air yang memberi berkah, lalu Kami Tumbuhkan dengan (air) itu dengan pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat di panen (9), dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempinyai mayang yang bersusun-susun (10), (sebagai) rezeki bagi hamba-hamba (Kami) dan Kami Hidupkan dengan (air) itu negeri yang mati (tandus), seperti itulah terjadinya kebangkitan (dari kubur) (11). (Departemen Agama RI, 2012).

Tafsir:

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah swt. berfirman seraya mengingatkan hamba-hamba-Nya tentang kekuasaan-Nya yang agung, lebih besar dari apa yang mereka herankan itu. Firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* “*wal ardha madadnha* artinya dan Kami hamparkan bumi itu” maksudnya, Kami luaskan dan bentangkan. “*walqayna fiha rawasiya* artinya Dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh.” Hal itu agar bumi beserta penduduknya tidak miring dan tidak terguncang. Gunung-gunung itu berdiri tegak di atas bumi dengan semua sisinya dikelilingi air. “*waanbatnaa fiihaa minkullii zaujinbahijj* artinya dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata” yakni, dari segala macam tanaman-tanaman, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kata “*Bahijun*” berarti pemandangan indah. “*tabshiratan wadzikralikulli 'abdin munib* artinya untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah)” maksudnya, dengan menyaksikan penciptaan langit dan bumi serta tanda-tanda kekuasaan-Nya yang sangat menakjubkan yang telah Dia ciptakan di antara keduanya, sebagai saksi, bukti dan peringatan bagi setiap orang yang tunduk, takut dan kembali kepada Allah swt. Dan firman Allah Ta'ala “*wanazzal*

minassama am mubaraka artinya dan Kami turunkan dari langit air yang banyak berkahnya” yakni manfaatnya, *“fanbatnaa bihi jannati* artinya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon” yakni kebun, taman dan lain sebagainya, *“wahabbalhashyydi* artinya dan biji-biji tanaman yang diketam” yaitu tanaman yang diambil bijinya untuk kemudian disimpan. *“wannakhla ba siqati* artinya dan pohon kurma yang tinggi-tinggi” yakni panjang lagi itnggi. *“lahaa thul’uunnadhyyun* artinya yang mempunyai mayang yang bersusun-susun” yakni sebagian di atas dan sebagian lainnya, *“rizqon lil’ibadi* artinya untuk menjadi rizki bagi hamba-hamba (Kami)” yakni, bagi semua makhluk-Nya. *“waahyayna bihi baldatan mmaytaa* artinya dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati” yaitu tanah yang kering kerontang lagi tandus. Dan ketika air turun membasahinya, maka tanah itu kembali hidup, subur dan tumbuhlan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah, setelah sebelumnya tanah itu tidak ditumbuhi pepohonan (tumbuhan), maka berubahlah menjadi hijau. Ini adalah suatu contoh bagi (perumpamaan) kebangkitan setelah kematian dan kehancuran (yang telah mereka ingkari dan mereka anggap mustahil itu). Demikian pula Allah swt. akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Pemandangan seperti itu merupakan kebesaran kekuasaan-Nya dalam kenyataan, yang mana hal itu lebih agung dari apa yang diingkari oleh orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan (Ibnu Katsir, 2004).


Dikatakan di sini bahwa bumi adalah hamparan, artinya disediakan dan dikembangkan laksana mengembangkan permadani, dengan serba-serbi keseluruhannya. Dan di atas kita terbentanglah langit lazuardi, laksana satu

bangunan besar. Di atas langit itu terdapat matahari, bulan dan bintang dan awan gumawan dan angin yang berhembus sejuk. Lalu diterangkan pula bahwa kesuburan bumi adalah karena turunnya hujan dari langit, artinya dari atas. Ayat ini menyuruh kita berpikir dan merenungkan, diikuti dengan merasakan. Bukanlah kemakmuran hidup kita sangat bergantung kepada pertalian langit dengan bumi lantaran hujan? Adanya gunung gunung dan kayu kayuan, menghambat air hujan itu jangan tumpah percuma saja ke laut, tetapi tertahan-tahan dan menimbulkan sungai-sungai. Setengahnya terpendam ke bawah bumi menjadi persediaan air. Pertalian langit dengan bumi, dengan adanya air hujan itu teratur dengan sangat rapinya, sehingga kehidupan kita di atas bumi menjadi terjamin. Ayat ini menyuruh renungkan kepada kita, bahwasanya semuanya itu pasti ada yang menciptakan; itulah Allah. Tak mungkin ada kekuasaan lain yang dapat membuat aturan setertib dan seteratur itu. Sebab itu maka datanglah ujung ayat mengatakan tidaklah patut kita menyembah kepada Tuhan yang lain, selain Allah.

B. Tinjauan Umum tentang Tanaman Tambalepen

Tambalepen adalah tanaman yang diduga tanaman endemik di dusun Batu Sura, desa Mesakada, kecamatan Lembang, kabupaten Pinrang. Tanaman ini pada umumnya tumbuh di sekitar pinggiran sungai, namun dapat juga ditemukan pada daerah lembab. Tanaman ini diduga memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi karena ketika musim hujan batangnya akan banyak mengeluarkan air dan ketika musim kemarau airnya akan berkurang. Selain itu, tanaman ini juga

memiliki banyak lentisel di permukaan batangnya dimana salah satu fungsi dari lentisel adalah untuk menyerap air.



Gambar 2.1: Tanaman Tambalepen, (A) Morfologi Tanaman Tambalepen. (B) Morfologi Bunga Tanaman Tambalepen. (C) Morfologi Daun Tanaman Tambalepen. (D) Batang Tanaman Tambalepen. (E) Batang Tanaman Tambalepen dengan Daun Penumpu. (F) Cara Memperoleh air dari Batang Tambalepen. Sumber: Data Primer

Tanaman Tambalepen memiliki ciri umum yaitu merupakan tanaman perdu dan menjalar atau memanjat di pohon ataupun batu. Batangnya berkayu namun bukan merupakan pohon. Memiliki daun tunggal dan daun penumpu dengan pertulangan daun menyirip. Ujung daunnya meruncing dengan pangkal daun membulat. Bunganya merupakan bunga majemuk dengan tipe bunga tandan dan memiliki daun pelindung dengan warna bunga yaitu ungu. Tangkai bunga keluar di dekat tangkai daun.

C. Tinjauan Umum tentang Demam Tifoid

Demam tifoid atau tifus abdominalis sampai saat ini masih menjadi masalah dan banyak ditemukan kasus dalam masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat diperkotaan. Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dalam waktu yang panjang sehingga menimbulkan banyaknya terjadi kasus penyakit menular, termasuk kasus demam tifoid itu sendiri. Kasus demam tifoid itu sendiri sangat berkaitan erat dengan sanitasi lingkungan seperti *higiene* perorangan dan *higiene* penjamah makan yang rendah, lingkungan yang kurang terawat atau lingkungan kumuh, kebersihan tempat-tempat umum seperti rumah makan atau restoran serta perilaku hidup sehat masyarakat yang kurang mendukung (MENKES, 2006).

Kasus tifoid ditemukan bukan hanya di Indonesia namun diseluruh dunia, terutama pada negara-negara yang masih berkembang di daerah tropis. Penyakit ini timbul sejak beberapa abad yang lalu, misalnya di Jamestown Virginia USA dilaporkan bahwa pada periode 1607-1624 dilaporkan bahwa terjadi lebih dari

6000 kematian akibat wabah tifoid. Contoh kasus lain yaitu kasus yang terjadi pada peperangan di Afrika Selatan pada akhir abad ke 19, dilaporkan bahwa pada saat itu pihak Inggris kehilangan serdadu sebanyak 13.000 akibat demam tifoid padahal kematian akibat peperangan hanya 8000 serdadu. Sampai saat ini pun kasus demam tifoid itu sendiri masih terus meningkat. Di Indonesia sendiri, kasus tifoid jarang dijumpai secara epidemik tapi bersifat endemis (MENKES, 2006).

Pemberian antibiotik pada penderita demam tifoid dapat menyebabkan perubahan gejala klinis sehingga gejala demam klasik meningkat secara perlahan seperti *step ladder* dan toksisitas jarang ditemukan. Namun kasus resistensi terhadap antimikroba sering menyebabkan gejala penyakit menjadi berat dan terjadi komplikasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi derajat beratnya penyakit dan gejala klinis infeksi, diantaranya umur pasien, lamanya penyakit sebelum diberikan antimikroba yang tepat serta pemilihan anti mikroba, riwayat imunisasi, tingkat virulensi *strain* bakteri dan jumlah kuantitas inokulum yang tertelur (Hardinegoro dkk, 2012).

Periode asimtomatik berlangsung pada hari ke-14 (kisaran 3-60) hari setelah terjadinya infeksi. Adapun gejala awal yang terjadi pada pasien tifoid adalah demam, gejala mirip influenza, nyeri kepala, anoreksia, mual, muntah, batuk kering dan mialgia. Gejala lain yang juga sering ditemukan yaitu lidah kotor, nyeri abdomen, diare, hepatomegali dan splenomegali. Bradikardia relatif dan konstipasi juga dapat ditemukan pada penderita tifoid namun gejala ini bukanlah gejala yang konsisten ditemukan di beberapa daerah geografis lainnya (Hardinegoro dkk, 2012).

Pada minggu ke 2 setelah infeksi, terjadi sekitar 10%-15% kasus komplikasi. Kasus komplikasi yang sering terjadi yaitu perforasi saluran cerna (10%) dan ensefalopati tifoid (10%-40%) (Hardinegoro dkk, 2012).

Patogenesis Demam Tifoid


Demam typhoid adalah demam akut yang disebabkan oleh bakteri *S. typhi* yang ditularkan melalui *fecal-oral*. Ketika bakteri ini masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan mengeliminasinya namun jika bakteri dapat bertahan dan jumlahnya yang masuk cukup banyak, maka bakteri akan berhasil dan mencapai usus halus (Darmawati, 2009).

Bakteri *S. typhi* akan menembus mukosa epitel usus, kemudian berkembangbiak di dalam lamina propria lalu masuk ke dalam kelenjar getah bening mesenterium. Setelah itu, bakteri masuk ke peredaran darah sehingga terjadi bakteremia pertama yang asimtomatis, lalu bakteri masuk ke organ-organ seperti hati (*hepar*) dan sumsum tulang belakang yang dilanjutkan dengan pelepasan bakteri dan endotoksin ke peredaran darah sehingga menyebabkan bakteremia kedua. Bakteri yang ada di hepar akan masuk kembali ke dalam usus kecil, sehingga terjadi infeksi seperti semula dan sebagian bakteri akan dikeluarkan bersama tinja (Parama, 2011).

D. Tinjauan Tentang *Salmonella typhi*

Morfologi dan Struktur Bakteri *S. Typhi*

S. typhi merupakan bakteri Gram negatif, yang tidak memiliki spora, bergerak dengan flagel peritrik, bersifat intraseluler fakultatif dan anaerob fakultatif. Ukurannya berkisar antara 0,7-1,5 X 2-5 μm , mempunyai komponen *outer layer* (lapisan luar) yang tersusun dari LPS (lipopolisakariada) dan dapat berfungsi sebagai endotoksin, memiliki antigen somatik (O), antigen flagel (H) dengan 2 fase dan antigen kapsul (Vi). Bakteri ini tahan terhadap selenit dan atrium deoksikolat yang dapat membunuh bakteri enterik lain, menghasilkan endotoksin, protein invasin dan MRHA (*Mannosa Resistant Haemagglutinin*). *S. typhi* mampu bertahan hidup selama beberapa bulan sampai setahun jika melekat dalam tinja, mentega, susu, keju dan air beku. *S. typhi* adalah parasit intraseluler fakultatif, yang dapat hidup dalam makrofag dan menyebabkan gejala-gejala gastrointestinal hanya pada akhir perjalanan penyakit, biasanya sesudah demam yang lama, bakteremia dan akhirnya lokalisasi infeksi dalam jaringan limfoid submukosa usus kecil (Parama, 2011).



Gambar 2.2: Morfologi *S. typhi* (Amiruddin, 2017)

Bakteri *S. typhi* juga memiliki pilli atau fimbriae yang berfungsi untuk adesi pada sel host yang terinfeksi. Pilli berbentuk batang lurus dengan ukuran lebih pendek dan lebih kaku dari flagella. Pilli tersusun atas unit protein yang disebut pillin, yang mempunyai struktur berbentuk pipa, mempunyai peran dalam

proses konjugasi, sebagai reseptor bagi bakteriofag dan berperan pula dalam proses perlekatan (adhesi) antara bakteri dengan permukaan sel inang. Oleh karena itu pilli mempunyai peran dalam proses patogenesis bakteri, selain itu pilli mampu menginduksi terbentuknya respon imun pada hewan yang terinfeksi (Darmawati, 2009).

OMP (*Outer Membrane Protein*) merupakan salah satu lapisan membran sel yang merupakan bagian dari antigen utama terkait dengan aktivitas endotoksin nonspesifik khususnya pada bakteri Gram negatif. OMP pada *S.typhi* adalah bagian dari membran sel yang terletak di luar membran sitoplasma dan lapisan peptidoglikan yang membatasi sel-sel dengan lingkungannya (Muthiadin, 2015).

Klasifikasi *Salmonella typhi* menurut Permanasari (2015):

Phylum	: <i>Eubacteria</i>
Class	: <i>Prateobacteria</i>
Ordo	: <i>Eubacteriales</i>
Family	: <i>Enterobacteriaceae</i>
Genus	: <i>Salmonella</i>
Species	: <i>Salmonella enterica</i>
Subspesies	: <i>enterica</i>
Serotipe	: <i>typhi</i>

Sifat Fisiologis *Salmonella typhi*

S. typhi bersifat fakultatif anaerob dengan suhu optimum 37 °C, dapat menfermentasikan D-glukosa menghasilkan asam tetapi tidak membentuk gas, oksidase negatif, katalase positif, tidak memproduksi indol karena tidak menghasilkan enzim tryptophanase yang dapat memecah tryptophan menjadi indol, *methyl red* (MR) positif, Voges-Proskauer (VP) negatif, citrat negatif,


menghasilkan H₂S pada medai TSIA (*Triple Sugar Iron Agar*), urease negatif, nitrat direduksi menjadi nitrit, lysin dan ornithin dekarboksilase positif, laktosa, sukrosa, salisin dan inositol tidak difermentasi. Uji ONPG (o-nitro-phenyl-β-D-galactopyranoside) negatif karena tidak menghasilkan enzim betha galaktosidase sehingga bakteri tidak dapat menfermentasikan laktosa (*non lactosa fermenter*), lipase dan deoksiribonuklease tidak diproduksi (Brenner, *et al.* 1984; Koneman, *et al.* 1992; Talaro *et al.* 2002 dalam Darmawati, 2009).

E. Struktur Dinding Sel Bakteri

Sel bakteri dilindungi oleh dinding yang terdiri dari peptidoglikan, ruang periplasma yang meruapakan tempat enzim ekstraseluler dan juga membran sitoplasma yang terlibat dalam proses respirasi. Peptidoglikan tersusun dari N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramat yang saling berikatan satu sama lain serta asam amino L-alanin, D-alanin, D-glutamat dan lisin (Fardiaz, 1992). Sintesis dinding sel melibatkan sejumlah enzim untuk menggabungkan fosfoenolpiruvat dengan N-asetilglukosamin. Pada bakteri gram positif memiliki 40 lapisan peptidoglikan, merupakan 50% dari bahan dinding sel, sedangkan pada gram negatif hanya ada 1-2 lapisan peptidoglikan dan merupakan 5-10% dari bahan dinding sel.

Struktur dinding sel bakteri gram positif berbeda dengan dinding sel bakteri gram negatif. Pada bakteri gram positif dinding sel mengandung 90% peptidoglikan serta lapisan tipis asam teikoat dan asam teikuronat yang bermuatan negatif. Pada bakteri gram negatif, lapisan luar dinding sel mengandung 5-10%

peptidoglikan, selebihnya terdiri dari protein, lipopolisakarida dan lipoprotein. Lipopolisakarida (LPS) merupakan lapisan lipid kedua dan tidak semata-mata tersusun oleh fosfolipid seperti pada sitoplasma tetapi juga mengandung polisakarida dan protein. Lipopolisakarida (LPS) sangat beracun yang disebut endotoksin yang terikat kuat pada permukaan sel bakteri gram negatif dan hanya dilepaskan bila sel mengalami lisis. Bila LPS dipecah menjadi lipid A dan polisakarida, semua sifat racun terdapat pada lipid A, sebaliknya polisakarida merupakan antigen permukaan utama sel dan disebut antigen O. LPS terdiri dari antigen O, inti bagian luar (N-asetilglukosamin, glukosa dan galaktosa) dan inti bagian dalam (heptosa dan ketodeoksioktonat). Bakteri gram negatif memiliki lapisan luar yang terdiri dari lapisan lipopolisakarida (LPS) yang terikat satu sama lain dengan kation divalent Ca^{++} dan Mg^{++} .



Gambar 2.3: Struktur Dinding Sel Bakteri Gram Positif dan Negatif (Moat *et al.* 2002)


F. Senyawa Antibakteri dari Bahan Tanaman

Pada beberapa jenis tanaman memiliki bagian yang mengandung senyawa yang bersifat antibakteri. Senyawa tersebut diproduksi secara biologis oleh tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri.

Beberapa golongan senyawa yang terbukti mampu menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri antara lain:

1. Golongan fenolik dan polifenol

Fenolik dan polifenol merupakan kelas molekul yang bersifat polar yang meliputi subkelas flavon, flavonoid, flavanol, quinon, tanin dan kumarin (Dianella, 2013).




Gambar 2.4: Contoh senyawa fenolik

Senyawa fenolik merupakan substansi yang mempunyai satu cincin aromatik dengan satu atau lebih substansi gugus hidroksi (-OH) yang termasuk turunan fungsional. Beberapa senyawa fenolik yang bersifat antibakteri, seperti senyawa fenol sederhana, gingerol dan turunannya dapat menghambat pertumbuhan *Mycobacterium avium* dan *Mycobacterium tuberculosis*. Golongan fenolik dari turunan hidrosimanat seperti kafein diketahui dapat menghambat pertumbuhan *Listeria monocytogenes* (Nychas, 1995).

2. Golongan terpen

Terpen secara umum merupakan senyawa nonpolar yang tersusun atas unit isoprene. Tanaman lada dan tanaman aromatik lainnya mengandung terpen yang tinggi khususnya monoterpen (mengandung 2 unit isopren) dan sesquiterpen (mengandung 3 unit isopren) yang disebut minyak esensial (Freeman dkk, 2008).



Gambar 2.5: Contoh Senyawa Terpen


Terpen diketahui mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Gram positif dan juga memungkinkan pada Gram negatif, meskipun mekanisme kerjanya belum diketahui dengan baik. Diduga cara kerjanya dengan mengganggu membran sel (Dianella, 2013).

3. Senyawa alkaloid

Senyawa alkaloid merupakan metabolit basa dan nitrogen. Senyawa alkaloid ini memiliki struktur kimia yang beragam. Sebagian besar alkaloid dibentuk dari asam amino seperti lisin, ornitin, fenilalanin, tirosin dan tiptofan.


Alkaloid biasanya diekstraksi dengan senyawa nonpolar. Alkaloid dapat terakumulasi di dalam sel melalui potensial membran dan

merupakan interkalator DNA yang target spesifiknya adalah RNA polimerase, girase dan asam nukleat (Dianella, 2013). Berdasarkan beberapa penelitian diketahui alkaloid hanya mampu menghambat bakteri Gram negatif (Cowan, 1999).



Gambar 2.6: Contoh senyawa alkaloid

Adapun mekanisme penghambatan bakteri oleh senyawa aktif dari tanaman di sajikan pada gambar 2.7 berikut:



Gambar 2.7: Mekanisme Penghambatan Bakteri oleh Beberapa Senyawa Antibakteri (Madigan *et al.* 2003)

G. Mekanisme Kerja Penghambatan Senyawa Antibakteri

Kebanyakan senyawa antimikroba yang digunakan dapat dikelompokkan berdasarkan mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja antimikroba yaitu interaksi membran sel dan dinding sel, interaksi dengan asam nukleat dan interaksi dengan enzim.

1. Antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel mikroba

Antimikroba ini adalah antimikroba yang merusak lapisan peptidoglikan yang menyusun dinding sel bakteri Gram positif maupun Gram negatif. Beberapa obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah penisilin, penisilin memiliki struktur yang mengandung inti berupa cincin laktam. Penisilin diproduksi secara alami ataupun semisintetik. Mekanisme kerja penisilin adalah dengan mencegah ikatan silang peptidoglikan pada tahap akhir sintesis dinding sel, yaitu dengan cara menghambat protein pengikat penisilin (*penicillin binding protein*). Protein ini merupakan enzim dalam membran plasma sel bakteri yang secara normal terlibat dalam penambahan asam amino yang berikatan silang dengan peptidoglikan dinding sel bakteri dan memblokir aktivitas enzim transpeptidase yang membungkus ikatan silang polimer-polimer gula panjang yang membentuk dinding sel bakteri sehingga dinding sel menjadi rapuh dan mudah lisis (Pratiwi, 2008).

2. Antimikroba yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba

Penghambatan pada sintesis asam nukleat berupa penghambatan terhadap transkripsi dan replikasi mikroorganisme. Adapun antimikroba yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah rifampisin dan golongan kuinolon, adapun yang lainnya walaupun bersifat antimikroba karena sitotoksitasnya namun pada umumnya hanya digunakan sebagai obat antikanker, tetapi beberapa obat dalam kelompok ini dapat digunakan sebagai antivirus. Rifampisin berikatan dengan enzim polimerase-RNA (pada sub unit) sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA girase pada bakteri yang fungsinya menata kromosom yang sangat panjang menjadi bentuk spiral sehingga bisa muat dalam sel bakteri yang kecil.

3. Antimikroba yang menghambat sintesis protein sel mikroba

Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan obat aminoglikosid, makrolid, linkomisin, tetrasiklin dan kloramfenikol. Sintesis protein berlangsung di dalam ribosom dengan bantuan mRNA dan tRNA. Pada bakteri, ribosom terdiri atas dua subunit yang berdasarkan konstanta sedimentasi dinyatakan sebagai ribosom 30S dan 50S, saat berfungsi akan bersatu pada pangkal rantai mRNA menjadi ribosom 70S.

Sterptomisin akan berikatan dengan komponen ribosom 30S sehingga menyebabkan kode pada mRNA salah baca oleh tRNA pada saat sintesis protein sehingga akan terbentuk protein yang abnormal dan nonfungsional bagi sel mikroba. Eritromisin akan berikatan dengan ribosom 50S dan menghambat translokasi kompleks tRNA-peptida dari lokasi asam amino ke lokasi peptida sehingga rantai polipeptida tidak

dapat diperpanjang karena lokasi asam amino tidak dapat menerima kompleks tRNA asam amino yang baru. Untuk linkomisin juga berikatan dengan ribosom 50S dan menghambat sintesis protein. Tetrasiklin berikatan dengan ribosom 30S dan menghalangi masuknya kompleks tRNA asam amino pada lokasi asam amino. Sedangkan kloramfenikol berikatan dengan 50S dan menghambat asam amino baru pada rantai polipeptida oleh enzim peptidil transferase.

4. Antimikroba yang mengganggu atau merusak membran plasma

Membran plasma bersifat semipermeabel dan mengendalikan transpor berbagai metabolit ke dalam dan ke luar sel. Adanya gangguan atau kerusakan struktur pada membran plasma dapat menghambat atau merusak kemampuan membran plasma sebagai penghalang (*barrier*) osmosis dan mengganggu sejumlah proses biosintesis yang diperlukan dalam membran. Adapun obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah polimiksin. Polimiksin merupakan suatu peptida yang di dalamnya terdapat satu ujung molekul larut lipid dan ujung molekul yang lain larut air. Masuknya polimiksin dalam membran plasma fungi akan menyebabkan gangguan antara lapisan-lapisan membran plasma. Ujung larut air polimiksin akan tertinggal di luar membran, sedangkan ujung larut lemak akan berada di dalam membran dan menyebabkan gangguan antara lapisan-lapisan membran yang memungkinkan lalu-lintas substansi bebas keluar masuk sel (Pratiwi, 2008).

5. Antimikroba yang menghambat metabolisme sel mikroba


Penghambatan terhadap sintesis metabolit esensial antara lain dengan adanya kompetitor berupa antimetabolit, yaitu substansi yang secara kompetitif menghambat metabolit mikroorganisme karena memiliki struktur yang mirip dengan substrat normal bagi enzim metabolisme (Pratiwi, 2008).

Obat anti mikroba yang termasuk dalam kelompok ini adalah sulfomid, trimetoprim, asam p-aminosalisilat (PAS) dan sulfon dengan mekanisme kerja ini diperoleh efek bakteristatik.

H. Mekanisme Resistensi

Bakteri yang resisten terhadap antibiotika, terdapat dua jenis, yaitu bakteri yang secara alamiah resisten terhadap antibiotika dan bakteri yang berubah sifatnya dari peka menjadi resisten. Perubahan sifat bakteri tersebut dapat terjadi karena mutasi kromosom dan atau perolehan materi genetik dari luar. Mekanisme resistensi yang khusus terjadi terhadap antibiotika lini pertama adalah sebagai berikut: Mekanisme resistensi terhadap ampisilin, dapat terjadi karena bakteri menghasilkan inaktivator berupa enzim laktamase, perubahan target antibiotika sehingga kekurangan *Penicillins Binding Protein* (PBP), kegagalan dalam mengaktifkan enzim autolisis dan bakteri tidak memiliki peptidoglikan. Resistensi terhadap kloramfenikol, dapat terjadi melalui perubahan target (ribosom) dari antibiotik, dihasilkannya inaktivator berupa enzim kloramfenikol asetil transferase dan mekanisme yang membatasi antibiotika masuk secara terus menerus melalui membran luar serta akan memompa keluar antibiotika dari sitoplasma.

Selanjutnya resistensi terhadap tetrasiklin dapat terjadi karena mekanisme yang membatasi antibiotika masuk ke dalam target, melalui perubahan permeabilitas terhadap tetrasiklin dan perubahan target (ribosom) antibiotika, dihasilkannya inaktivasi berupa enzim yang menghambat kerja antibiotika, pengaturan gen represor dan melalui aktif efluks. Mekanisme resistensi terhadap trimetoprim sulfametoksazol, dapat terjadi karena kuman mampu mengembangkan jalur metabolisme lama yang dihambat antibiotika dan peningkatan sintesis metabolit yang bersifat antagonis kompetitif, melalui peningkatan sintesis PABA (*para amino benzoic acid*) yang digunakan untuk melawan efek sulfonamida dan perubahan yang terjadi pada enzim reduktase asam dehidrofolat sehingga dapat menjalankan fungsi metabolismenya. (Parama, 2011)



Gambar 2.8: Mekanisme Molekuler Resistensi Antibiotik
Sumber: <http://textbookofbacteriology.net/HorizontalTransfer.gif>

Semua mekanisme resistensi yang telah diuraikan di atas dapat dikelompokkan menjadi: mekanisme yang diperantarai oleh plasmid berupa aktif

efluks, enzim inaktivator yang dihasilkan bakteri, pengaturan represor, dan mekanisme yang diperantarai oleh kromosom yaitu perubahan target antibiotik, peningkatan sintesis metabolit yang bersifat antagonis serta pengembangan jalur mekanisme lama yang dihambat antibiotika. Beberapa gen yang menyandikan sifat resistensi ekspresinya dikendalikan oleh sistem regulator yang spesifik, seperti represor dan aktivator transkripsi. Gen-gen resisten dapat dipindahkan melalui transformasi, transduksi atau konjugasi. Pada umumnya gen resisten dalam satu spesies atau antar spesies Gram negatif dipindahkan melalui konjugasi. Elemen konjugasi ada dua macam yaitu plasmid konjugatif dan transposon konjugatif (Parama, 2011).

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Juwita (2013) tentang uji sensitivitas beberapa antibiotik yaitu kloramfenikol, amoksisilin dan kontrimoksazol terhadap *S.thypi*, memberikan hasil bahwa pada ketiga antibiotik tersebut yang menunjukkan hasil paling resisten adalah amoksisilin, hal ini terjadi karena amoksisilin merupakan obat pasaran yang paling sering digunakan oleh masyarakat karena harganya yang relatif murah.

I. Tinjauan Prinsip dan Metode Ekstraksi

Ekstraksi adalah pemisahan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Cara ini digunakan untuk mengisolasi atau memisahkan senyawa yang terdapat di dalam campuran padatan dengan menggunakan pelarut yang cocok. Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut

seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Ekstraksi dapat dilakukan dengan pelarut organik terhadap bahan segar atau bahan yang telah dikeringkan. Prinsip dari ekstraksi adalah melarutkan komponen senyawa yang berada dalam campuran secara selektif dengan pelarut yang sesuai dengan hasil yang disebut dengan ekstrak. Secara garis besar, ekstraksi dapat dibedakan menjadi dua yaitu dengan cara dingin (maserasi dan perkolasi) dan dengan cara panas (refluks, soxletasi, digesti, infus dan dekok). Hal yang harus diperhatikan dalam proses ekstraksi adalah kestabilan dari senyawa yang diisolasi, untuk senyawa yang tidak tahan panas diekstraksi dengan cara dingin agar senyawa tersebut tidak rusak. Pemilihan pelarut organik yang akan digunakan saat melakukan ekstraksi komponen bioaktif pada tanaman merupakan faktor penting dan menentukan untuk mencapai tujuan dan sasaran ekstraksi komponen. Semakin tinggi nilai polaritas, konstanta dielektrik, titik didih dan kelarutan dalam air maka pelarut akan semakin polar (Nuraina, 2015).

Dalam penelitian ini digunakan ekstraksi dingin yaitu dengan cara maserasi. Maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia dengan menggunakan pelarut organik dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang terus menerus. Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserasi pertama dan seterusnya.

J. Tinjauan Umum tentang Konsentrasi Hambat Minimal dan Konsentrasi

Bunuh Minimal

1. Konsentrasi hambat minimal

Aktivitas antibakteri dapat ditentukan oleh spektrum kerja dan cara kerja serta konsentrasi hambat minimum (KHM). KHM itu sendiri merupakan konsentrasi minimum dari suatu zat yang dapat mempegaruhi atau memiliki efek daya hambat pada perumbuhan mikroorganisme dalam hal ini dapat ditandai dengan dengan adanya tingkat kekeruhan pada tabung setelah diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37 °C.

Penetapan KHM dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Cara cair

Cara cair ini menggunakan media cair yang telah ditambahkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan pengenceran tertentu lalu diinokulasikan biakan mikroba dalam jumlah yang sama. Untuk penentuan respon suatu zat antimikroba dapat ditandai oleh tingkat kekeruhan dan kejernihan pada tabung setelah diinkubasi.

b. Cara padat

Pada cara ini menggunakan media padat yang telah dicampur larutan zat uji dengan konsentrasi tertentu. Untuk cara ini, satu cawan petri dapat lebih dari satu jenis mikroba untuk memperoleh nilai KHM.

Aktivitas antimikroba dari ekstrak tanaman dapat diklasifikasi kuat jika nilai KHM $< 100 \mu\text{g/ml}$, sedang jika $100 > \text{KHM} \geq 625 \mu\text{g/ml}$ dan lemah jika nilai KHM $> 625 \mu\text{g/ml}$ (Kuete *et al.*, 2011).

2. Konsetrasi bunuh minimal

Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM) adalah kadar terendah efek antimikroba suatu zat yang dapat membuunuh bakteri, ini ditandai dengan tidak adanya mikroba yang tumbuh pada medium padat atau pertumbuhan koloninya kurang dari 0,1% dari jumlah koloni inokulum awal (*original inocuum/ IO*) yang dilihat pada medium padat yang telah dilakukan penggosokan sebanyak satu ose sebelumnya (Noorhamdani *et al.*, 2011)

K. Tinjauan Umum GC-MS (*Gas Chromatography Mass Spectrometry*)

GC-MS merupakan perpaduan dua instrumen analisis dengan teknik yang berbeda. Teknik terpadu ini pada prinsipnya merupakan penggabungan antara teknik pemisahan selektif (GC) dan teknik analisis spesifik (MS). GC (*Gas Chromatography*) berfungsi dalam pemisahan senyawa-senyawa organik maupun anorganik, sedangkan MS (*Mass Spectrometry*) memberikan data spesifik mengenai macam-macam senyawa yang telah dipisahkan oleh kromatografi. MS (*Mass Spectrometry*) berfungsi untuk menentukan berat molekul tiap komponen berdasarkan fragmentasi. Saat uap senyawa organik dilewatkan pada ruang ionisasi spektrometer massa, senyawa ini akan ditembak dengan elektron berenergi tinggi dan melemparkan elektron berenergi tinggi dan melemparkan

elektron dari senyawa tersebut, senyawa yang kehilangan elektronnya akan membentuk ion positif yang disebut ion molekul.

GC-MS mengkombinasikan kromatografi gas dan spektrofotometer massa untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda di dalam sampel tertentu. Perbedaan sifat kimia diantara molekul yang berbeda di dalam semua larutan akan memisahkan molekul, sampel akan berjalan sepanjang kolom. Molekul membutuhkan jumlah waktu yang berbeda untuk keluar dari kromatografi gas, ini disebut sebagai waktu retensi dan memungkinkan spektrometer massa menangkap, mengionisasi dan mendeteksi molekul yang terionisasi secara terpisah. Spektrometer massa melakukan ini dengan memecah setiap molekul menjadi fragmen terionisasi dan mendeteksi fragmen ini menggunakan massa sampai ke rasio muatan.

GC-MS (*Gas Chromatography-Mass Spectrometer*) digunakan untuk menganalisis senyawa yang mudah menguap atau senyawa yang mudah diuapkan. Senyawa yang mudah terdegradasi oleh panas tidak dapat dianalisis dengan metode ini.

Prinsip kerja GC-MS yaitu sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap selanjutnya dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga mengalami ionisasi. Fragmen-fragmen ion yang dihasilkan akan di tangkap oleh detektor dan dihasilkan spektrum massa.

Pada prinsipnya, GC-MS terdiri dari 4 komponen utama, yaitu:

a. *Gas Chromatography*

Mekanisme kromatografi gas adalah sampel diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan hingga diubah menjadi gas atau uap. Yang berbentuk gas selanjutnya dibawa oleh pembawa gas dengan laju alir yang konstan masuk ke dalam kolom pemisah. Komponen-komponen sampel akan terpisah saat melewati kolom karena adanya perbedaan daya adsorpsi fasa diam terhadap komponen-komponen sampel. Komponen yang sudah terpisah selanjutnya akan didorong oleh fasa gerak untuk bergerak di sepanjang kolom berupa pita-pita. Setelah komponen-komponen terpisah, selanjutnya akan keluar dari kolom bersama fasa gerak. Konsentrasi komponen tersebut dapat diukur dengan satuan detektor yang akan menghasilkan sinyal dan akan dikirim ke pencatat. Komponen-komponen dari sampel yang telah terpisah akan menghasilkan kurva-kurva karena masing-masing komponen ditahan pada kolom dalam waktu yang berbeda-beda. Lamanya waktu komponen ditahan oleh kolom adsorpsi merupakan ciri khas komponen yang disebut sebagai waktu retensi atau waktu lambat. Pada kromatografi gas, pada umumnya ada 5 komponen utama yaitu:

1. Gas pembawa

Fungsi utama gas pembawa adalah untuk memindahkan analit dari injektor menuju detektor. Syarat mutlak gas pembawa pada kromatografi gas adalah lembam dari segi kimia dan mempunyai kemurnian yang tinggi.

2. Gerbang suntik

Sampel yang dapat dianalisis dengan metode kromatografi gas pada umumnya berbentuk cairan namun sampel dalam bentuk gas dan padat juga dapat dianalisis dengan memakai sistem pemasuk sampel yang khusus. Volume sampel yang diinjeksikan bervariasi mulai dari 0,01-20 μL . Pengaturan temperatur pada gerbang suntik sangat penting dan harus di atas suhu titik didih komponen yang terkandung dalam cuplikan, biasanya diatur sampai 50 $^{\circ}\text{C}$ di atas titik didih komponen. Jika temperatur terlalu tinggi, maka komponen akan cepat menguap tetapi dapat mengakibatkan penguraian komponen dan jika temperatur di bawah titik didih komponen dalam cuplikan dapat menyebabkan pengendapan/ penumpukan pada gerbang suntik.

3. Termostat oven

Termostat oven berfungsi untuk mengatur temperatur kolom. Pengaturan kolom kromatografi gas sangat penting karena pemisahan komponen terjadi di dalam kolom yang sangat dipengaruhi oleh temperatur di dalam oven.

4. Kolom

Kolom merupakan bagian yang sangat penting dalam kromatografi gas karena pemisahan komponen terjadi di dalam kolom. Efisiensi kolom dalam kromatografi gas secara umum berkaitan dengan lamanya waktu komponen atau molekul yang dianalisis berada dalam kolom yang dikenal dengan waktu retensi.

5. Detektor

Ciri detektor yang dikehendaki adalah kepekaan yang tinggi, kelinearan tanggapannya lebar, tanggapan terhadap semua jenis senyawa kuat, tidak peka terhadap perubahan aliran, suhu dan harganya murah.

b. *Interface*

Interface adalah bagian yang menghubungkan antara kromatografi gas dengan spektrometer massa pada kondisi hampa udara yang tinggi. Tujuan utama dari *interface* adalah menghilangkan gas pembawa tanpa menghilangkan analit.


c. *Mass Spectrometer*

Prinsip kerja dari spektrometri massa adalah sampel diuapkan dalam keadaan vakum kemudian dialirkan menuju ruang pengion. Di ruang pengion sampel ditembak dengan arus partikel berenergi tinggi menghasilkan ion dengan kelebihan energi (radikal ion) yang bisa memecah dan tidak bisa memecah. Ion yang bisa memecah disebut ion induk (*parent ion*), ion induk akan memecah menjadi ion positif, negatif dan pecahan yang netral.

d. Sistem pengolahan data

Teknologi komputer sangat diperlukan untuk harmonisasi bekerjanya instrumen terpadu seperti GC-MS dalam pengolahan atau penyuguhan data analisis.

L. Kerangka Pikir



Skrining fitokimia

Analisis senyawa dengan GC-MS

Output ⇒ Air tanaman Tambalepen memiliki golongan senyawa aktif sebagai antibakteri (*Salmonella thypi*)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif eksploratif yang bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa yang aktif sebagai antimikroba dan melihat pengaruhnya terhadap dinding sel bakteri *S. thypi* yang merupakan penyebab typhoid.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018 sampai Oktober 2018, dengan lokasi penelitian yaitu di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Kimia Organik UIN Alauddin Makassar, Laboratorium Kimia Organik Universitas Hasanuddin Makassar, Laboratorium Botani LIPI Bogor dan Laboratorium Instrumen Forensik cabang Makassar.

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabelnya adalah air batang tanaman Tambalepen.

D. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah beberapa operasional variabel serta definisinya:

1. Skrining fitokimia merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui senyawa yang terkandung pada ekstrak batang, ekstrak daun dan ekstrak akar yang diperoleh dari ekstraksi menggunakan pelarut etanol dan *n*-heksan serta air tanaman Tambalepen.
2. Air batang tanaman Tambalepen merupakan air yang menetes dari potongan batang tanaman Tambalepen.

E. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu rotavapor, *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS), botol ekstrak, botol vial, pipet tetes, cawan petri, jarum ose, lampu spiritus, LAF (*Laminar Air Flow*), autoklaf, inkubator, oven universal.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu air batang tanaman Tambalepen, ekstrak batang dan akar tanaman Tambalepen, pelarut etanol dan *n*-heksan, DMSO (Dimetil Sulfoksida), metanol, akuades, media NA (*Natrium Agar*), NB (*Nutrient Broth*) biakan bakteri *S. thypi*.

F. Prosedur Kerja

1. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan di dusun Batu Sura, desa Mesakada, kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Sampel batang dan

akar tanaman diambil dengan memotong bagian batang dan akar tanaman Tambalepen lalu di potong-potong kecil kemudian dilakukan maserasi. Sedangkan sampel air batang tanaman Tambalepen diambil dengan memotong batang tua tanaman, air yang menetes dari potongan batang ditampung dengan menggunakan botol steril kemudian dimasukkan dalam *cool box* untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium.

2. Identifikasi Tanaman

Identifikasi tanaman dilakukan di Laboratorium Biologi Bidang Botani Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong-Jawa Barat. Dengan mengirim sampel tanaman yang telah dilakukan pengawetan kering sebelumnya lalu diidentifikasi.

3. Ekstraksi Batang dan Akar Tanaman Tambalepen

Pembuatan ekstrak (Amelia, 2011)

Batang dan akar tanaman Tambalepen diambil lalu dibersihkan dan dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam wadah untuk maserasi. Ekstraksi dibuat dengan maserasi bertingkat dengan menggunakan pelarut *n*-heksan (non-polar) dan etanol (polar). Setelah potongan sampel dimasukkan kedalam wadah, selanjutnya direndam dengan pelarut *n*-heksan sampai terendam semuanya, kemudian didiamkan selama 2-3 hari sambil sesekali dilakukan pengadukan. Setelah 2-3 hari maserat disaring menggunakan corong yang dilapisi dengan kapas dan kertas saring agar tersaring sempurna.

Maserat pertama yang didapatkan adalah maserat *n*-heksan, ampas dari maserat *n*-heksan kemudian diangin-anginkan agar bebas dari pelarut *n*-heksan lalu dimaserasi kembali menggunakan etanol. Setelah di dapatkan maserat etanol, masing-masing maserat diuapkan pelarutnya menggunakan *vacum rotary evaporator*. Ekstrak yang didapatkan jika tidak langsung digunakan, maka disimpan di dalam *refrigerator*.

4. Uji Daya Hambat Ekstrak Batang Tanaman Tambalepen dan Air Batang Tanaman Tambalepen Terhadap Bakteri *Salmonella thypi* dengan Metode Dilusi Cair.

Pembuatan suspensi inokulum (*S.thypi*)

S.thypi diinokulasikan ke dalam media NB (*Nutrient Broth*) steril, lalu di inkubasi pada inkubator *shacker* selama 24 jam pada suhu 37 °C. Setelah itu dilakukan pengenceran menggunakan larutan NaCl 0,9% steril, lalu suspensi tersebut diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nm sampai diperoleh absorbansi 0,1 (setara dengan $1,5 \times 10^6$ CFU/mL) (Kuate *et al.*, 2011).

Metode dilusi cair dilakukan dengan menyiapkan beberapa tabung reaksi yang sudah steril terlebih dahulu. Kemudian setiap tabung diisi dengan 0,5 ml medium NB, selanjutnya ditambahkan 0,5 ml larutan uji pada tabung reaksi kemudian di *vortex*. Dari tabung pertama diambil 0,5 ml lalu dipindahkan ke tabung kedua dan seterusnya sampai konsentrasi 125 µg/mL, lalu diambil 0,5 ml larutan pada tabung terakhir dan dibuang sehingga masing-masing tabung berisi 0,5 ml. Masing-masing tabung reaksi

ditambahkan 0,1 ml suspensi bakteri $1,5 \times 10^6$ dan 0,4 ml *Nutrient Broth* sehingga volume total pada masing-masing tabung adalah 1 ml kemudian di *vortex*, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C dalam waktu 24 jam, selanjutnya diamati kekeruhan dan dibandingkan dengan kontrol positif (kloramfenikol), kontrol negatif (DMSO) dan kontrol media. Konsentrasi yang paling rendah dengan tidak menunjukkan kejernihan adalah Konsentrasi Hambat Minimum (KHM).

Aktivitas antimikroba dinyatakan memiliki daya hambat yang kuat jika nilai $\text{KHM} < 100 \mu\text{g/ml}$, sedangkan jika $100 > \text{KHM} \leq 625 \mu\text{g/ml}$ dan lemah jika nilai $\text{KHM} > 625 \mu\text{g/ml}$ (Kuete *et al.*, 2011).

Untuk mengetahui Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dilakukan penggoresan dari larutan tabung larutan $1000 \mu\text{g/ml}$, $500 \mu\text{g/ml}$, $250 \mu\text{g/ml}$, $125 \mu\text{g/ml}$, $62,5 \mu\text{g/ml}$ dari KHM pada media padat lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam, setelah 24 jam, konsentrasi paling rendah yang tidak menunjukkan adanya pertumbuhan koloni bakteri pada media padat adalah KBM.

5. Analisis GC-MS

Ekstrak pekat yang diperoleh dari masing-masing pelarut kemudian dimasukkan dalam alat GC-MS untuk dianalisis lebih lanjut. Sampel yang berupa ekstrak pekat diinjeksi ke dalam inlet alat GC (Kromatografi Gas), kemudian hasil pemisahan GC akan diteruskan ke alat MS (Spektroskopi Massa). Detektor ionisasi nyala GC (FID) akan

menyuguhkan TRC (*Total Respond Chromatogram*), dan MS akan memberikan data hasil analisis spesifik pada setiap titik atau puncak TRC.

6. Skrining Fitokimia

Setelah dilakukan ekstraksi pada sampel, selanjutnya dilakukan skreening fitokimia:

a. Uji Alkaliod

Uji alkaloid dilakukan menurut Douglas *et al.* (Sangi *et al.*, 2008) ekstrak tanaman Tambalepen diambil sebanyak 4 gr kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi, selanjutnya masing-masing tabung tersebut ditambahkan beberapa tetes pereaksi Mayer, Wagner dan Dragendorff. Jika terbentuk endapan menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung alkaloid, dengan pereaksi Mayer memberikan endapan warna putih, dan pereaksi Wagner memberikan endapan berwarna coklat sedangkan pereaksi Dragendorff memberikan endapan berwarna jingga.

b. Uji Triperpenoid dan Steroid

Uji ini dilakukan dengan mengambil sampel ekstrak lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan pereaksi Libermann Burchard. Jika terbentuk warna merah menandakan positif untuk senyawa triperpenoid dan jika terbentuk warna biru atau ungu menandakan positif mengandung senyawa steroid.

c. Uji Tanin

Uji tanin dilakukan dengan cara larutan ekstrak ditambahkan dengan FeCl_3 10%. Jika terbentuk warna biru tua, biru kehitaman atau hitam kehijauan menunjukkan adanya tanin (Simaremare, 2014).

d. Uji Flavonoid

Uji flavonoid dilakukan menurut Cai (Sangi *et al.*, 2008), pertama menyiapkan 3 tabung reaksi lalu ekstrak tanaman Tambalepen dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian masing-masing tabung reaksi ditambahkan pereaksi FeCl_3 5%, NaOH 10% dan H_2SO_4 . Jika hasilnya positif ditunjukkan dengan timbulnya warna merah tua.

e. Uji Saponin

Uji saponin dilakukan menurut Simes *et al.* (Sangi *et al.*, 2008) ekstrak tanaman Tambalepen diambil sebanyak 2 gr kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan akuades sampai seluruh sampel terendam lalu didihkan selama 2-3 menit kemudian dinginkan, lalu kocok kuat-kuat. Jika hasilnya positif ditunjukkan dengan terbentuknya buih yang stabil.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Identifikasi

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan di Laboratorium Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi-LIPI Bogor adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jenis	Suku
1	Tambalepen	<i>Poikilospermum suaveolens</i> (Blume) Merr.	Urticaceae

2. Uji Penghambatan dengan Metode Dilusi Cair

Uji penghambatan ekstrak tanaman Tambalepen terhadap bakteri *S.thypi* dilakukan dengan metode dilusi cair. Bagian organ tanaman Tambalepen yaitu akar, batang dan daun di ekstrak terlebih dahulu kemudian diuji penghambatannya, adapun air tanaman Tambalepen yang diperoleh dari potongan batang tanaman Tambalepen diuji langsung tanpa diekstrak. Untuk ekstraksi digunakan metode maserasi bertingkat dengan pelarut etanol dan *n*-heksan.

Uji penghambatan dengan metode dilusi cair dilakukan dengan melihat konsentrasi penghambatan dan konsentrasi bunuh minimum terhadap bakteri *S.thypi* dengan variasi konsentrasi masing-masing sampel uji 1000 µg/mL, 500 µg/mL, 250 µg/mL, 125 µg/mL dan 62,5 µg/mL. Untuk penentuan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) menggunakan media *Nutrient Broth* (NB) dengan parameter yang digunakan adalah kekeruhan dan kejernihan setelah diinkubasi selama 24 jam. Penentuan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dilakukan dengan penggosoran larutan uji hasil nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) pada media *Nutrient Agar* (NA) dengan melihat koloni bakteri yang tumbuh setelah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 °C.

Tabel hasil pengamatan nilai Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan nilai Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) ekstrak etanol dan *n*-heksan tanaman Tambalepen terhadap bakteri *S.thipy* (Metode Dilusi) dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 hasil nilai KHM dan KBM

No	Ekstrak	KHM (µg/mL)	KBM (µg/mL)	Ket.
1	Batang etanol	500	1000	Bakterisidal
2	Batang <i>n</i> -heksan	500	1000	Bakterisidal
3	Daun etanol	250	500	Bakterisidal
4	Daun <i>n</i> -heksan	500	1000	Bakterisidal
5	Akar etanol	500	1000	Bakterisidal
6	Akar <i>n</i> -heksan	500	1000	Bakterisidal

7	Air batang Tambalepen	1000	1000	Tidak menghambat
---	--------------------------	------	------	---------------------

Hasil uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa ekstrak yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri *S.thypi* adalah pada ekstrak etanol daun dengan nilai KHM yaitu 250 µg/mL yang berarti pada ekstrak etanol daun tersebut dengan konsentrasi 1000 µg/mL dan 500 µg/mL belum terlihat adanya pertumbuhan bakteri *S.thypi*. dan nilai KBM pada ekstrak etanol daun yaitu 500 µg/mL yang berarti pada konsentrasi 1000 µg/mL dan 500 µg/mL belum terlihat adanya pertumbuhan bakteri pada media NA setelah diinkubasi selama 24 jam, sedangkan pada sampel air batang tanaman Tambalepen tidak terlihat adanya aktivitas penghambatan.

3. Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia dilakukan dengan tujuan untuk melihat golongan senyawa kimia yang terdapat pada masing-masing sampel ekstrak dengan melihat perubahan warna yang terjadi setelah diberikan/ditetesi pereaksi. Skrining fitokimia ini merupakan cara sederhana untuk mendeteksi keberadaan metabolit sekunder pada sampel tanaman.

Adapun hasil skrining fitokimia ekstrak etanol dan ekstrak *n*-heksan tanaman Tambalepen dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol dan *n*-heksan

		Hasil						
Uji	Pereaksi	Akar		Daun		Batang		Air
		Etanol	<i>n</i> -heksan	etanol	<i>n</i> -heksan	etanol	<i>n</i> -heksan	
Alkaloid	Dragendorf	-	-	+	+	+	-	+
	Mayer	+	-	+	-	-	-	-
	Wagner	-	+	+	-	-	+	-
Steroid	Libermann	-	-	+	-	-	-	-
	Berchard							
Tanin	FeCl ₃ 1%	+	-	+	+	+	-	-
Flavonoid	FeCl ₃ 5%	+	+	-	+	-	+	-
	NaOH 10%	-	-	+	-	+	-	-
	H ₂ SO ₄	+	-	+	-	+	-	-
Saponin	Dipanaskan	+	-	-	-	-	-	-

Ket:

(-): tidak terjadi perubahan warna (reaksi)


(+): terjadi perubahan warna (reaksi)

4. Hasil Analisis GC-MS

Uji kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa yang terkandung dalam tanaman dilakukan dengan analisa GC-MS (*Gas Chromatography-Mass Spektrometer*). Metode ini mengkombinasikan kromatografi gas dan spektrometer massa untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda di dalam semua larutan. Pada penelitian ini, sampel ekstrak yang dilanjutkan ke analisis GC-MC yaitu ekstrak etanol akar, ekstrak etanol batang dan ekstrak etanol daun.

a. Hasil analisa GC-MS sampel ekstrak etanol akar tanaman Tambalepen

Adapun hasil analisa GC-MS dari akar tanaman Tambalepen dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Hasil analisa pada akar tanaman Tambalepen

Gambar 4.1 dapat dilihat jumlah puncak-puncak (peak) yang muncul yang menandakan bahwa setiap peak tersebut merupakan senyawa yang berbeda dengan waktu retensi yang berbeda pula. Senyawa-senyawa yang berhasil terdeteksi pada sampel akar tanaman Tambalepen dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Senyawa hasil analisa GC-MS akar tanaman Tambalepen


No	Nama Senyawa	Rumus Molekul	Waktu retensi	% area	% kesamaan
1	Asam Heksadekanoat	$C_{16}H_{32}O_2$	20.299	7.95	99
2	9,12-asam oktadekadienoat	$C_{19}H_{36}O_2$	21.926	6.06	99
3	9-asam oktadekanoat	$C_{19}H_{36}O_2$	21.976	10.12	99
4	1,2-asam benzenadikarboksilat	$C_8H_6O_4$	25.716	10.24	89
5	Beta-sitosterol	$C_{29}H_{50}O$	35.875	31.41	99

6	Sitostenone	$C_{29}H_{48}O$	39.378	34.23	98
---	-------------	-----------------	--------	-------	----

Pada tabel 4.3 menunjukkan terdapat 6 senyawa berbeda yang berhasil teridentifikasi pada sampel ekstrak etanol akar tanaman Tambalepen yaitu asam heksadekanoat, 9,12-asam oktadekadienoat, 9-asam oktadekanoat, 1,2-asam benzenadikarboksilat, beta-sitosterol dan Sitostenone.

b. Hasil analisa GC-MS sampel ekstrak etanol batang tanaman Tambalepen

Adapun hasil analisa GC-MS dari sampel ekstrak etanol batang tanaman Tambalepen dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.2 Hasil analisa pada batang tanaman Tambalepen

Gambar 4.2 menunjukkan beberapa jumlah peak yang merupakan senyawa aktif yang terdapat pada sampel ekstrak. Setiap peak tersebut merupakan senyawa yang berbeda dengan waktu retensi yang berbeda pula. Senyawa-senyawa yang berhasil terdeteksi pada sampel akar tanaman Tambalepen dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Senyawa hasil analisa GC-MS pada batang tanaman Tambalepen

No	Nama Senyawa	Rumus Molekul	Waktu retensi	% area	% kesamaan
1	Asam Heksadekanoat	$C_{16}H_{32}O_2$	20.299	15.15	99
2	9,12-asam oktadekadienoat	$C_{19}H_{36}O_2$	21.926	16.96	99
3	11-asam oktadekanoat	$C_{18}H_{34}O_2$	21.976	18.67	99
4	Asam oktadekanoat	$C_{18}H_{36}O_2$	22.182	5.74	99
5	Gamma sitosterol	$C_{29}H_{50}O$	35.869	43.48	91

Pada tabel 4.4 menunjukkan terdapat 5 senyawa berbeda yang berhasil teridentifikasi pada sampel ekstrak etanol batang tanaman Tambalepen yaitu asam heksadekanoat, 9,12-asam oktadekadienoat, 11-asam oktadekanoat, asam oktadekanoat dan gamma sitosterol.

c. Hasil analisa GC-MS sampel ekstrak etanol daun tanaman Tambalepen

Adapun hasil analisa GC-MS dari sampel ekstrak daun tanaman Tambalepen dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.3 Hasil analisa pada daun tanaman Tambalepen

Gambar 4.3 menunjukkan hasil hanya satu peak terbaca yang berarti hanya ada satu senyawa yang teridentifikasi. Senyawa yang berhasil terdeteksi pada sampel daun tanaman Tambalepen dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Senyawa hasil analisa GC-MS pada daun tanaman Tambalepen

No	Naman Senyawa	Rumus Molekul	Waktu retensi	% area	% kesamaan
1	9-asam oktadekanoat	C ₁₉ H ₃₆ O ₂	21.969	100.00	99

Pada tabel 4.5 menunjukkan terdapat 1 senyawa yang berhasil teridentifikasi pada sampel ekstrak etanol daun tanaman Tambalepen yaitu 9-asam oktadekanoat.

B. Pembahasan

1. Hasil Identifikasi

Berdasarkan hasil identifikasi yang diperoleh di Laboratorium Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi-LIPI Bogor, diketahui bahwa tanaman Tambalepen merupakan tanaman dari suku *Urticaceae* dengan nama latin *Poikilospermum suaveolens* (Blume) Merr. Berdasarkan artikel ilmiah tentang tanaman ini, menyatakan bahwa jenis tanaman ini tersebar di beberapa negara diantaranya India, Cina Selatan, Mianmar Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Habitat asli tanaman *Poikilospermum suaveolens* yaitu hutan hujan primer, hutan hujan sekunder dan hutan air tawar, biasa tumbuh di sepanjang sungai, sungai dan di semak-semak, hutan terbuka hingga

ketinggian 1500 m. Pada artikel ilmiah dituliskan bahwa tanaman obat ini digunakan untuk mengobati demam dan penyakit ginjal dengan daunnya di tumbuk atau direbus. Selain daun, akarnya jga digunakan sebagai obat demam. Akarnya juga digunakan sebagai obat gatal-gatal.

Penelitian tentang Keanekaragaman Tanaman Obat di Kalimantan Barat Indonesia yang telah dilakukan oleh Sudarmono (2018) melaporkan bahwa *Poikilospermum suaveolens* digunakan sebagai obat bisul oleh masyarakat Kalimantan Barat tersebut. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa tanaman ini juga digenakan sebagai obat maag di Sambas dan Serawak sementara di Sabah digunakan atau diaplikasikan sebagai obat setelah melahirkan dan di Negeri Sembilan tanaman obat ini digunakan sebagai perawatan mata. Dalam jurnal peneitian yang lain tentang Pemanfaatan Tanaman Obat di Sabah Malaysia yang dilakukan oleh (Kulip, 2003) dijelaskan bahwa tanaman *Poikilospermum suaveolens* digunakan atau dimanfaatkan air rembesan dari batangnya untuk pengobatan paska melahirkan dengan memotong batangnya kemudian air rembesan dari batangnya diminum.

Adapun klasifikasi tanaman Tambalepen (*Poikilospermum suaveolens*) yang dikutip dari (www.theplantlist.org, 2019) adalah sebagai berikut:

Regnum	: Plantae
Divisio	: Angiospermae
Classis	: Dicotyledoneae
Ordo	: Rosales

Familia : Urticaceae
Genus : Poikilospermum
Species : *Poikilospermum suaveolens*

2. Uji Penghambatan dengan Metode Delusi Cair

Dari hasil uji penghambatan ekstrak Tanaman Tambalepen dengan metode dilusi cair terhadap bakteri *S.thypi* dapat diketahui bahwa Tanaman Tambalepen memiliki aktivitas menghambat atau bahkan membunuh terhadap bakteri *S.thypi* hal ini dibuktikan pada tabel Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) yaitu tabel 4.1. Berdasarkan pengamatan pada tabel 4.1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari ekstrak yang paling menghambat atau konsentrasi hambat minimumnya (KHM) adalah ekstrak etanol daun yaitu pada konsentrasi 250 µg/mL sementara untuk konsentrasi bunuh minimumnya (KBM) yaitu ekstrak etanol daun dengan konsentrasi 500 µg/mL. Sementara untuk ekstrak yang lain semua memiliki KHM di 500 µg/mL dan KBM 1000 µg/mL kecuali pada air tanaman Tambalepen (tanpa melalui ekstraksi) tidak menunjukkan adanya penghambatan. Ini diduga karena masih adanya kandungan air pada air tanaman Tambalepen. Pengujian aktivitas antimikroba air tanaman Tambalepen tanpa melalui ekstraksi, merujuk pada kebiasaan masyarakat Baru Sura setempat dalam penggunaan air tanaman Tambalepen secara langsung dalam mengobati penyakit demam yang diduga akibat infeksi bakteri *S.thypi*. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa ekstrak dari tanaman Tamabalepen lebih berpengaruh terhadap

pertumbuhan bakteri *S.thypi* dibandingkan dengan air rembesan dari batang tanaman Tambalepen yang digunakan secara langsung.

Berdasarkan klasifikasi kemampuan ekstrak tanaman dalam menghambat pertumbuhan bakteri yaitu dinilai kuat jika nilai KHM < 100 µg/mL, sedang jika $>100 \geq 625$ µg/mL dan lemah jika nilai KHM > 625 µg/mL, dalam hal ini ekstrak tanaman Tambalepen memiliki kemampuan aktivitas penghambatan atau membunuh terhadap bakteri *S.thypi* yang sedang.

Efektivitas suatu ekstrak tanaman dalam menghambat atau bahkan membunuh mikroorganaisme merupakan aktivitas dari senyawa metabolit sekunder yang ada pada tanaman tersebut. Antibakteri dikategorikan sebagai bakteriostatik (penghambat bakteri) apabila pada konsentrasi tertentu bakteri tidak mengalami kematian tetapi juga tidak mengalami pertumbuhan sedangkan dikategorikan sebagai bakterisidal (membunuh bakteri) jika pada konsentrasi tertentu bakteri mengalami kematian. Mekanisme kerja golongan bakteriostatik yaitu dengan menghambat sintesis protein melalui proses difusi pasif melalui kanal hidrofilik dan sistem transportasi aktif, setelah masuk ke dalam ribosom antibakteri akan berikatan dengan ribosom tersebut dan menghalangi masuknya tRNA-asam amino pada lokasi asam amino sehingga bakteri tidak dapat berkembang biak (Wiyanto, 2010).

Perbedaan aktivitas penghambatan mikroba oleh suatu ekstrak tanaman dapat dipengaruhi oleh jenis ekstrak. Etanol merupakan pelarut

universal, yaitu dapat melarutkan hampir semua jenis senyawa kimia yang terkandung pada tanaman, baik senyawa polar maupun senyawa non polar (Dewangga, 2013).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mawaddah (2008) tentang kajian hasil riset potensi antimikroba bahan alami, menunjukkan bahwa jenis ekstrak yang banyak digunakan pada pengujian daya aktivitas antimikroba adalah pelarut yang bersifat polar. Hal ini berkaitan dengan senyawa antimikroba alami pada tanaman yang umumnya mengandung senyawa fenolik yang bersifat polar.

Pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa dari sampel seperti minyak atsiri, lilin lemak dan terpenoid yang bersifat non polar (Mawaddah, 2008). Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti (2012), yang menjelaskan bahwa pelarut *n*-heksan merupakan pelarut yang mudah dalam mengangkat minyak yang terkandung dalam sampel tanaman. Saifuddin (2014) dalam bukunya menyatakan bahwa *n*-heksan digunakan dalam melarutkan atau mengekstraksi lemak.

3. Skrining Fitokimia

Berdasarkan hasil skrining fitokimia yang telah dilakukan pada ekstrak etanol batang tanaman Tambalepen menunjukkan hasil positif pada uji alkaloid, tanin dan flavonoid, sementara pada ekstrak daun Tambalepen menunjukkan positif mengandung alkaloid, flavonoid,


steroid dan tanin dan pada ekstrak akar positif mengandung alkaloid, flavonoid, tanin dan saponin, dapat dilihat pada tabel 4.2.

Pada hasil skiring fitokimia ekstrak *n*-heksan tanaman Tambalepen, pada ekstrak batang positif mengandung alkaloid, flavonoid dan saponin, sementara pada ekstrak daun menunjukkan hasil positif pada uji alkaloid, flavonoid, tanin dan saponin. Dan pada hasil skrining ekstrak akar positif mengandung alkaloid, flavonoid dan saponin, sementara pada hasil skrining air tanaman Tambalepen menunjukkan hasil yang positif hanya pada uji alkaloid. Pada uji skrining fitokimia terhadap air tanaman Tambalepen memperlihatkan hasil yang hanya positif pada uji alkaloid hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh kandungan airnya yang cukup banyak karena tanpa diekstrak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Marlinda (2012) tentang perbedaan antara sampel kering dan sampel segar untuk uji skrining fitokimia, dengan hasil yang menyatakan bahwa sampel kering memiliki hasil yang lebih positif alkaloid dibandingkan dengan sampel segar.

a. Golongan senyawa alkaloid


Pada uji alkaloid digunakan tiga jenis pereaksi yaitu Mayer, Wagner dan Dragendorf. Hasil positif pada uji Mayer ditandai dengan adanya endapan berwarna putih yang terbentuk setelah penambahan pereaksi Mayer. Marlina (2005) endapan tersebut tersebut diperkirakan adalah kompleks kalium-alkaloid. Saat pembuatan pereaksi Mayer larutan Merkuriem (II) klorida ditambah dengan kalium iodida akan bereaksi dan

membentuk endapan merah merkuri (II) iodida, ketika kalium iodida yang ditambahkan berlebih akan membentuk kalium tetraiodomerkurat (II). Senyawa alkaloid mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas sehingga dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinat dengan ion logam, pada uji ini diperkirakan nitrogen pada alkaloid akan bereaksi dengan ion logam K^+ dari kalium tetraiodomerkurat (II) yang membentuk kompleks kalium-alkaloid yang mengendap. Reaksi uji Mayer dapat dilihat pada gambar dibawah:




Gambar 4.4 Reaksi uji Mayer

Hasil positif uji Wagner ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna coklat muda sampai kuning, diperkirakan endapan tersebut adalah kalium-alkaloid. Pada pembuatan Wagner iodin bereaksi dengan ion I^- dari kalium iodida dan menghasilkan ion I_3^- yang berwarna coklat, pada uji ini ion logam K^+ akan membentuk ikatan kovalen koordinat dengan nitrogen yang ada pada alkaloid membentuk kompleks kalium-alkaloid yang mengendap. Reaksi uji Wagner ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 4.5 Reaksi uji Wagner

Hasil positif pada uji Dragendorf ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna jingga. Pada reaksi menggunakan Dragendorf, ion logam K^+ membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan alkaloid sehingga membentuk kompleks kalium-alkaloid yang mengendap (Risky, 2014). Reaksinya sebagai berikut:



Gambar 4.6 Reaksi uji Dragendorf

Daya antimikroba yang dimiliki oleh suatu tanaman merupakan hasil dari metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman tersebut dengan mekanisme kerja antimikroba yang berbeda-beda.

Senyawa alkaloid merupakan senyawa yang bersifat basa. Umumnya alkaloid berbentuk kristal padat dan sebagian kecil yang bersifat cair dan terasa pahit, mudah larut dalam pelarut organik dan sukar larut dalam air. Mekanisme kerja senyawa alkaloid sebagai antimikroba yaitu dengan merusak komponen penyusun membran sel yaitu

peptidoglikan sehingga dapat mengakibatkan kematian pada sel bakteri, selain itu komponen alkaloid juga diketahui mampu menghambat enzim topoisomerase sel bakteri dan sebagai interkalator DNA (Nuraina, 2015). Ambarsari, (2013) menjelaskan bahwa mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri yaitu dengan cara menghambat sintesis dinding sel dan mengganggu komponen penyusun dinding sel yaitu peptidoglikan sehingga dinding sel bakteri tidak terbentuk secara utuh.

b. Golongan senyawa flavonoid

Golongan senyawa flavonoid umumnya dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif maupun Gram negatif dengan mekanisme kerja yang dibagi menjadi tiga, diantaranya dapat menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel dan menghambat metabolisme energi dalam sel (Nuraina, 2015).

Mekanisme kerja flavonoid dalam menghambat sintesis asam nukleat terletak pada cincin B yang berperan penting dalam proses interkalasi atau ikatan hidrogen dengan menumpuk basa asam nukleat yang menghambat pembentukan DNA dan RNA. Mekanisme kerja flavonoid dalam menghambat fungsi membran sel adalah membentuk ikatan kompleks dengan dinding sel dan merusak membran. Flavonoid dapat menghambat metabolisme energi dengan cara menghambat sistem respirasi, karena dibutuhkan energi yang cukup untuk penyerapan aktif berbagai metabolit dan biosintesis makromolekul (Nuraina, 2015). Sementara menurut Yunus (2014), bahwa mekanisme kerja flavonoid

sebagai antibakteri yaitu dapat membentuk senyawa kompleks ekstraseluler yang dapat larut sehingga mampu merusak membran sel bakteri sehingga senyawa intraseluler keluar dari sel.

Para peneliti mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda terkait dengan mekanisme kerja senyawa flavonoid dalam menghambat pertumbuhan bakteri, diantaranya bahwa flavonoid menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas sel bakteri, mikrosom dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri. Mirzoeva *et al.* dalam penelitiannya menyatakan bahwa flavonoid mampu melepaskan energi transduksi terhadap membran sitoplasma bakteri selain itu juga dapat menghambat motilitas bakteri. Hal yang berbeda dikemukakan oleh Di Carlo *et al.* dan Estreal *et al.* yang menyatakan bahwa gugus hidroksil yang terdapat pada struktur senyawa flavonoid dapat menyebabkan perubahan komponen organik dan transpor nutrisi yang pada akhirnya akan mengakibatkan timbulnya efek toksik terhadap bakteri (Sabir, 2005).

c. Golongan senyawa steroid

Mekanisme kerja senyawa golongan steroid sebagai antimikroba yaitu berkaitan dengan kemampuan komponen-komponen steroid dalam menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan menghasilkan membran yang dapat mengakibatkan kebocoran pada liposom atau penyusutan dinding sel bakteri (Ambarsari, 2013).

d. Golongan senyawa tanin

Mekanisme kerja golongan senyawa tanin sebagai antibakteri yaitu dapat menginaktivasi enzim yang berfungsi pada pembentukan materi genetik, menghambat enzim reverse transkriptase sehingga sel bakteri tidak terbentuk (Nuraina, 2015).

e. Golongan senyawa saponin

Saponin adalah senyawa aktif yang sifatnya seperti sabun yaitu akan menimbulkan busa jika dikocok kuat. Umumnya saponin bersifat netral (larut di dalam air) juga ada yang bereaksi dengan asam (sukar larut dalam air) dan ada yang bereaksi dengan basa (Nuraini, 2015).

4. Hasil Analisis GC-MS (*Gas Chromatography Mass Spectrometry*)

GC-MS merupakan metode yang mengkombinasikan kromatografi gas dan spektrofotometer massa untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda di dalam sampel tertentu. Perbedaan sifat kimia diantara molekul yang berbeda di dalam semua larutan akan memisahkan molekul, sampel akan berjalan sepanjang kolom. Molekul membutuhkan jumlah waktu yang berbeda untuk keluar dari kromatografi gas, ini disebut sebagai waktu retensi dan memungkinkan spektrometer massa menangkap, mengionisasi dan mendeteksi molekul yang terionisasi secara terpisah. Spektrometer massa melakukan ini dengan memecah setiap molekul menjadi fragmen terionisasi dan mendeteksi fragmen ini menggunakan massa sampai ke rasio muatan.

GC-MS artinya menggabungkan kromatografi dengan spektrometri massa, kromatografi sebagai metode pemisahan dan spektrometri massa sebagai metode identifikasi. Pada penelitian ini, ekstrak yang dilanjutkan ke analisa GC-MS yaitu ekstrak batang, ekstrak daun dan ekstrak akar. Adapun beberapa senyawa yang terbaca berhasil terbaca pada analisa GC-MS, pada ekstrak akar yaitu asam heksadekanoat, 9,12-asam oktadekadienoat, 9-asam aktadekanoat, 1,2-asam benzenadekarboksilat, beta-sitosterol dan sitostenone. Sedangkan senyawa yang berhasil terdeteksi pada ekstrak batang yaitu asam heksadekanoat, 9,12-asam oktadekadienoat, 11-asam oktadekanoat, asam oktadekanoat dan gamma sitosterol. Adapun pada ekstrak daun, senyawa yang berhasil terbaca hanya 9-asam oktadekanoat.

a. Akar

Pada analisa GC-MS untuk sampel ekstrak akar, jumlah senyawa yang terdeteksi adalah 6 macam senyawa, diantaranya heksadekanoat, 9,12-asam oktadekadienoat, 9-asam aktadekanoat, 1,2-asam benzenadekarboksilat, beta-sitosterol dan sitostenone.

Asam heksadekanoat dan asam oktadekanoat dilaporkan memiliki daya antimikroba, antikanker dan antioksidan (Preethi, 2010). Asam heksadekanoat adalah asam lemak jenuh yang tersusun atas 16 atom karbon ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$). Ketika berada pada suhu ruang, asam heksadekanoat berwujud padat dan berwarna putih. Titik leburnya $63,1^\circ\text{C}$, asam heksadekanoat merupakan produk awal dalam proses biosintesis

asam lemak. Mekanisme kerja asam heksadekanoat dalam menghambat pertumbuhan bakteri yaitu asam heksadekanoat mampu menyerap nutrisi yang ada pada bakteri dan memiliki kapasitas untuk menghambat air dan menghalangi sistem enzim beberapa bakteri (Wiyanto, 2010).

9-asam oktadekanoat memiliki aktivitas antioksidan dan antikanker. Asam oktadekanoat memiliki aktivitas sebagai antifungi, antibakteri dan antitumor. 1,2-benzenadikarboksilat memiliki aktivitas antifungi, antitumor, antioksidan dan agen antimikroba (Akpuaka, 2013).

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sermakkani (2012), dilaporkan bahwa senyawa 9,12-asam oktadekanoat memiliki aktivitas antioksidan dan antikanker. Beta-sitosterol adalah lemak alami tanaman yang ditemukan dalam sel dan membran semua tanaman penghasil minyak, buah, sayuran, biji-bijian dan pepohonan. Beta-sitosterol merupakan salah satu nutrisi tanaman yang luar biasa dimana studi ilmiah membuktikan bahwa beta-sitosterol menjadi nutrisi utama, aman dan tidak beracun untuk pemeliharaan kesehatan dan untuk perlindungan terhadap banyak gangguan kesehatan yang serius dan penyakit (Bouic, 1996).

b. Batang

Pada analisis GC-MS untuk sampel ekstrak batang dideteksi senyawa yaitu asam heksadekanoat, 9,12-asam oktadekadienoat, 11-asam oktadekanoat, asam oktadekanoat dan gamma sitosterol.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya bahwa asam heksadekanoat dan asam oktadekanoat dilaporkan memiliki daya antimikroba, antikanker dan antioksidan (Preethi, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akpuaka (2013) dilaporkan bahwa senyawa Gamma sitosterol memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri.

c. Daun


Analisis GC-MS pada sampel ekstrak daun hanya mendeteksi senyawa 9-asam oktadekanoat. Golongan asam lemak memiliki aktivitas antibakteri, seperti yang dilaporkan oleh (Herrero, 2006) bahwa pelarut organik khususnya heksana dapat melarutkan asam lemak yang memiliki aktivitas antimikroba. Misalnya 9-asam oktadekanoat yang merupakan senyawa dari golongan asam lemak, dari penelitian tersebut dilaporkan bahwa senyawa tersebut memiliki aktivitas antibakteri.

Mekanisme kerja asam lemak tak jenuh sebagai antibakteri yaitu berkaitan dengan kemampuannya dalam menghambat sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak pada bakteri sangat penting karena untuk produksi sejumlah komponen yang mengandung lipid, termasuk membran sel (Zheng, 2005).

Konsep kelarutan "*like dissolves like*" atau senyawa polar hanya dapat larut pada pelarut yang bersifat polar dan sebaliknya tidaklah sepenuhnya benar, pada batasan tertentu, kelompok metabolit sekunder dapat mengalami polarisasi atau depolarisasi pada suatu kuantitas pelarut berlebih sehingga terjadi peristiwa "*like dissolves unlike*". Misalnya,

pelarut etanol dalam jumlah besar mampu melarutkan glikosida (polarisasi) dan heksana yang bersifat nonpolar dalam jumlah besar juga mampu menarik polifenol karena fenomena depolarisasi (Saifuddin, 2014).

Secara keseluruhan dari sampel yang dilanjutkan ke analisis GC-MS, yaitu sampel ekstrak etanol akar, ekstrak etanol batang dan ekstrak etanol daun, jumlah senyawa yang berhasil terdeteksi yaitu 9 senyawa, diantaranya: asam heksadekanoat, 9,12-asam oktadekadienoat, 9-asam oktadekanoat, 1,2-asam benzenadikarboksilat, beta sitosterol, sitostenone, 11-asam oktadekanoat, asam oktadekanoat dan gamma sitosterol. Dan masing-masing senyawa memiliki gambar struktur kimia sebagai berikut:




Asam heksadekanoat




9,12-asam oktadekadienoat




9-asam oktadekanoat




beta sitosterol





1,2-asam benzenadikarboksilat

sitostenone



11-asam oktadekanoat

gamma sitosterol



Asam oktadekanoat

Gambar 4.7. Contoh-contoh Senyawa yang Berhasil Teridentifikasi pada Analisis GC-MS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Ekstrak tanaman Tambalepen yang memiliki aktivitas penghambatan tertinggi terhadap bakteri *S.thypi* yaitu ekstrak etanol daun dengan nilai KHM yaitu 250 $\mu\text{g/mL}$ dan nilai KBM yaitu 500 $\mu\text{g/mL}$ dengan indikator penghambatan sedang.
2. Beberapa kandungan golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak tanaman Tambalepen diantaranya alkaloid, flavonoid, tanin dan steroid yang memiliki aktivitas penghambatan pada mikroorganisme.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait potensi yang dimiliki tanaman Tambalepen seperti potensi mikroba endofitnya agar informasi terkait tanaman Tambalepen lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shekh Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor; Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- Al-Shekh Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor; Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014.
- Ardananuridin. A., Winarsih. S., Widayat M. "Uji Efektifitas Dekok Bunga Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*) Sebagai Antimikroba Terhadap Bakteri *Salmonella thypi* Secara In Vitro". *Jurnal Kesehatan*. Vol.20 No.1, April 2004 (30-34).
- Akpuasa. A., Ekwenchi. M. M., Dashak. A. D., Dildar. A. "Biological Activities of Characterized Isolat of *n*-hexane Extract of *Azadirachta Indica* A. Juss (Neem) Leaves". *Nature and Science*. Vol. 11 No. 5, 2013.
- Ambarsari. M. A. "Aktivitas Antibakteri Fraksi *n*-Heksan Ekstrak Etanol Daging Buah Sirsak (*Annona muricata* L) Terhadap *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Shigella sonnei* dan Serta Bioautografinya" *Naskah Publikasi*. 2013.
- Amiruddin R. M., Darniati dan Ismail. "Isolasi dan Identifikasi *Salmonella* sp pada Ayam Bakar di Rumah Makan Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh". *JIMVET*. Vol. 01 No.3. 2017.
- Cowan, M.M. "Plant Product as Antimicrobial Agents". *J. Microbiology Reviews*. Vol.12 No.4, 1999 (564-582).
- Darmawati. "Keanekaragaman Genetik *Salmonella thypi*". *Jurnal Kesehatan*. Vol.2 No.1, Juni 2009 (27-33).
- Dianella, Savoia. "Plant-Derived Antimicrobial Compounds". *Medscape*. N.p., n.d. Web. 25 Dec. 2013.
- Freeman, Brain C., and Gwyn A. Beattie. "An Overview of Plan Defenses Against Pathogens and Herbivores". *APSnet*. N.p., 2008.
- Hardinegoro SR., Kadim M., Devaera Y., Idris NS., dan Ambarsari CG. "Update Managenent of Infectious Disease and Gastrointestinal Disorders". Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, 2012.

- Herrero. M., Ibanez. E., Cifuentes. A., Reglero. G., Santoyo. S. “*Dunaliella salina* Microalga Pressurized Liquid Extract as Potential Antimicrobials”. *Journal of Food Protection*. Vol. 69 No. 10, 2006 (2471-2477).
- Ibrahim. S., Kuncoro. H. “Identifikasi Metabolit Sekunder dan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Sungkai (*Peronema canescens* Jack) Terhadap Beberapa Bakteri Patogen”. Vol. 2 No. 1, 2012.
- Indang. N., Guli. M. M., Alwi. M. “Uji Resistensi dan Sensitivitas Bakteri *Salmonella thypi* pada Orang yang Sudah Pernah Menderita Demam Tifoid Terhadap Antibiotik”. *Jurnal Biocelebes*. Vol.7 No.1, Juni 2013 (27-34).
- Juwita. S., Hartoyo. E., Budiarti. L. Y. “Pola Sensitivitas In Vitro *Salmonella phypi* Terhadap Antibiotik Kloramfenikol, Amoksisilin dan Kotrimoksazol”. *Berkala Kedokteran*. Vol.9 No.1, April 2013 (25-34).
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Madina*. PT. Madina Raihan Makmur, Bandung, 2012.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Pedoman Pengendalian Demam Tifoid”. *Warta Perundang-undangan No.2591/Selasa, 15-08-2006*.
- Kuete., *et al.* “Antimicrobial Activities of the Methanol Extract and Compound from *Artocarpus communis* (Moraceae)”. *MBC Complementary and Alternative Medicine*. 2011. 11:12. <http://www.biomedcentral.com/1474-6882/11/42>.
- Kulip. J. “An Ethnobotanical Survey of Medicinal and Other Useful Plants of Muruts in Sabah, Malaysia”. *Telopea*. 10 (1), 2003.
- Mawaddah. R. “Kajian Hasil Riset Potensi Antimikroba Alami dan Aplikasinya dalam Bahan Pangan di Pusat Informasi Teknologi Pertanian Fateta IPB”. *SKRIPSI*. 2008.
- Marliana. S. D., Suryanti. V., Suyono. “Skrining Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis Tipis Komponen Kimia Buah Labu Siam (*Sechium edule* Kacq. Swartz) dalam Ekstrak Etanol”. *Biofarmasi*. Vol.3 No.1, Februari 2005 (26-31).

- Marlinda M, Sangi MS dan Wuntu AD. "Analisis Senyawa Metabolit Sekunder dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Biji Buah Alpukat (*Persea americana* Mill.)". *Jurnal MIPA Unsrat Online*. Vol.1 No.1, 2012 (24-28).
- Mulyani. Y., Bachtiar. E., Kurnia. M. U. "Peranan Senyawa Metabolit Sekuner Tumbuhan Mangrove Terhadap Infeksi Bakteri *Aeromonas hydrophila* pada Ikan Mas (*Cyprinus carpio* L.)". *Jurnal Akuatika*. Vol. IV No. 1. Maret 2013 (1-9).
- Muthiadin. C., Natsir. R., Agus. R., Nasrum. M., Dwiyanti. R., Sabir. M., Yasir. Y., Hatta. M. "Identification and Characterization of Antigenic 36 Kda Outer Membrane Protein (OMP) of *Salmonella enterica* serovar Thypi (*S.thypi*) from Makassar, South Sulawesi, Indonesia". *American Journal of Biomedical Researh*. Vol. 3 No. 1, 2015 (9-12).
- Nuraina. "Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Daun *Garcinia benthami* Pierre dengan Metode Dilusi". *Skripsi*. Juli, 2015.
- Nychas G.J.E, Tassou C.C and Drosinos E.H. "Effect of Essential Oil from Mint (*Mentha piperita*) *Salmonella entritiis* and *Listeria monocytogenes* in Model Food System at 4⁰ and 10⁰C". *Journal of Applied Bacteriology*. 1995 (593-600).
- Parama. Y. "Bakteri *Salmonella thypi* dan Demam Tifoid". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol.6 No.1, 2011 (42-26).
- Purba. I. E., Wandra. T., Nurgahini. N., Nawawi. S., Kandun. N. "Pengendalian Demam Tifoid di Indonesia: Tantangan dan Peluang". *Media Litbangkes*. Vol. 26 No.2 Juni 2016 (99-108).
- Preethi. R., Devanathan. V. V., dan Loganathan. M. "Antimicrobial and Antioxodant Efficacy of Some Medicina Plants Against Food Borne Pathogen". *Advances in Biological Reaserch*. Vol. 4, 2010 (122-125).
- Permanasari. D. A. "Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Cincau Hijau (*Cylea barbata* Miers) Sebagai Penghambat Pembentukan Biofilm Bakteri *Salmonella thypi*". *Skripsi*, 2015.
- Risky. T. A. dan Suyatno. "Aktivitas Antioksidan dan Antikanker Ekstrak Metanol Tumbuhan Paku (*Adiantum philippensis* L.)". *UNESA Journal of Chemistry*. Vol. 3 No.1. Januari 2014.


- Sabir. A. "Aktivitas Antibakteri Flavonoid Propolis *Trigona* sp Terhadap Bakteri *Streptococcus mutans* (In Vitro)". *Majalah Keokteran Gigi*. Vol. 38 No. 3.2005 (135-141).
- Saifuddin. A. "Senyawa Alam Metabolit Sekunder (Teori, Konsep dan Teknik Pemurnian)". *Katalog Dalam Terbitan (KTD)*. Deepublish. Yogyakarta, November 2014.
- Simaremare. E. S. "Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Gatal (*Laportea decumana* (Roxb.) Wedd)". *Pharmacy*. Vol.11 No.01. Juli 2014.
- Shihab. Q. "TafsirQ.com". <https://tafsirq.com/38-sad/ayat-27#tafsir-quraish-shihab>, 2015. Diakses pada November 2018.
- Sudarmono. "Biodiversity of Medicinal Plants at Sambas Botanical Garden, West Kalimantan, Indonesia". *The Journal of Tropical Life Science*. Vol. 8 No. 2, 2018.
- Susanti. A. D., Ardiana. D., Gumelar. G., Behing. Y. "Polaritas Pelarut Sebagai Pertimbangan dalam Pemilihan Pelarut Untuk Ekstraksi Minyak Bekatul dari Bekatul Varietas Ketan (*Oriza sativa glatinosa*)". *Simposium Nasional RAPI XI FT UMS*. 2012.
- Suhada, Adriyan. "Analisis Komposisi Senyawa Kimia yang Terdapat dalam Batang Tanaman Sogga (*Strychnos ligustrina*) dengan Metode GC-MS". *Tesis*. 2012.
- Wahyuni, Armandany. F. I., Widasri. M. "Uji Aktivitas Antibakteri Secara In Vivo Ekstrak Etanol Daun Pakis Sayur (*Diplazium esculentum* Swartz) pada Mencit Jantan Galur Balb/c yang Diinfeksi *Salmonella typhi* ATCC 14028". Vol. 4 No. 2, 2016.
- Wiyanto. D. B. "Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Rumput Laut *Kappaphycus alvarezii* dan *Euचेuma denticullatum* Terhadap Bakteri *Aeromonas hydrophila* dan *Vibrio harveyii*". *Jurnal Kelutan*. Vol.3 No.1. April 2010.
- Wulandari. M. A. "Potensi Antibakteri dan Bioautografi Ekstrak Etanol Daun Bintaro (*Carbera odollam* Gaertn) Terhadap *S.thypi* dan *S.aureus*" *Skripsi*. 2014.
- Yunus. R., Alimuddin. A. H., Ardiningsih P. "Uji Antivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Buah Tampo (*Baccaurea macrocarpa*) Terhadap Bakteri *Eschericia coli* dan *Staphylococcus aureus*". Vol.3 No.3. 2014 (19-24).


Zheng. C. J., Yoo. J. S., Lee. T. G., Cho. H. Y., Kim. Y. H., Kim. W. G. "Fatty Acid Synthesis is a Target for Antibacterial Activity of Unsaturated Fatty Acid". Vol. 579 No. 23, 2005.



LAMPIRAN

1. Alur Kerja






2. Proses Ekstraksi

No	Gambar	Keterangan
1		<p>Proses perendaman simplisia dengan pelarut etanol dan <i>n</i>-heksan dengan lama perendaman 2-3 hari.</p>
2		<p>Penyaringan filtrat</p>
3		<p>Evaporasi</p>


4		Ekstrak
---	---	---------

3. Alur Kerja Uji Penghambatan Metode Delusi

Skema Peremajaan




Isolat bakteri *S.thypi*




NB steril

Diinkubasi dlm inkubator shacker 24 jam, 37 °C

Pembuatan Suspensi Bakteri



Skema Uji Penghambatan



Masing-masing volume total tabung 1 mL




Di inkubasi 24 jam 37 °C



Diamatai kekeruhannya (KHM)

Lanjut..








Dilakukan penggoresan dari masing-masing tabung pada NA, lalu diinkubasi pada 37 °C, 24 jam






Diamati pertumbuhan bakteri (KBM)



4. Lampiran Hasil Uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM)

No	Ekstrak	Gambar
1	Batang etanol	
2	Batang <i>n</i> -heksan	
3	Daun etanol	
4	Daun <i>n</i> -heksan	



5	Akar etanol	
6	Akar <i>n</i> -heksan	
7	Air Tambalepen	
8	Kontrol	




5. Lampiran Hasil Uji Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM)






No	Ekstrak	Gambar
1	Batang etanol	
2	Batang <i>n</i> -heksan	
3	Daun etanol	
4	Daun <i>n</i> -heksan	
5	Akar etano	



6	Akar <i>n</i> -heksan	
7	Air Tambalepen	




6. Lampiran Hasil Skining Fitokimia Ekstrak Etanol




Gol.senyawa/ Sampel	Pereaksi	Gambar	Ket.
Alkaloid Batang	Mayer + jika endapan warna putih		+
	Wagner + jika endapan coklta		-

	<p>Dragendorf + endapan jingga</p>		+
<p>Alkaloid Daun</p>	<p>Mayer + jika endapan warna putih</p>		+
	<p>Wagner + jika endapan coklta</p>		+
	<p>Dragendorf + endapan jingga</p>		+
<p>Alkaloid Akar</p>	<p>Mayer + jika endapan warna putih</p>		+

	Wagner + jika endapan coklta		-
	Dragendorf + endapan jingga		-
Flavonoid Batang	FeCl ₃ 5% + jika hijau kekuningan		-
	NaOH 10% + jika kuning muda		+
	H ₂ SO ₄ PA + jika merah bata		+

<p>Flavonoid Daun</p>	<p>FeCl₃ 5% + jika hijau kekuningan</p>		<p>-</p>
	<p>NaOH 10% + jika kuning muda</p>		<p>+</p>
	<p>H₂SO₄ PA + jika merah bata</p>		<p>+</p>
<p>Flavonoid Akar</p>	<p>FeCl₃ 5% + jika hijau kekuningan</p>		<p>+</p>
	<p>NaOH 10% + jika kuning muda</p>		<p>-</p>


	H_2SO_4 PA + jika merah bata		+
Steroid Batang	Liebermann Berchard + jika biru atau hijau		-
Steroid Daun	Liebermann Berchard + jika biru atau hijau		+
Steroid Akar	Liebermann Berchard + jika biru atau hijau		-
Tanin Batang	$FeCl_3$ 1% + jika hitam kebiruan atau hijau		+



<p>Tanin Daun</p>	<p>FeCl₃ 1% + jika hitam kebiruan atau hijau</p>		<p>+</p>
<p>Tanin Akar</p>	<p>FeCl₃ 1% + jika hitam kebiruan atau hijau</p>		<p>+</p>
<p>Saponin Batang</p>	<p>Dipanaskan + jika ada busa</p>		<p>-</p>
<p>Saponin Daun</p>	<p>Dipanaskan + jika ada busa</p>		<p>-</p>
<p>Saponin Akar</p>	<p>Dipanaskan + jika ada busa</p>		<p>+</p>

7. Lampiran Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak *n*-heksan



Gol.senyawa/ Uji	Pereaksi	Gambar	Ket.
Alkaloid Batang	Mayer +jika endapan warna putih		-
	Wagner +jika endapan coklta		+
	Dragendorf + jika enapan jingga		-
Alkaloid Daun	Mayer +jika endapan warna putih		-
	Wagner +jika endapan coklta		-


	<p>Dragendorf + jika enapan jingga</p>		+
<p>Alkaloid Akar</p>	<p>Mayer +jika endapan warna putih</p>		-
	<p>Wagner +jika endapan coklta</p>		+
	<p>Dragendorf + jika enapan jingga</p>		-
<p>Alkaloid Air Tambalepen</p>	<p>Mayer +jika endapan warna putih</p>		-

	Wagner +jika endapan coklta		-
	Dragendorf + jika enapan jingga		+
Flavonoid Batang	FeCl ₃ 5% +jika hijau kekuningan		+
	NaOH 10% +jika kuning muda		-
	H ₂ SO ₄ PA +jika merah bata		-
Flavonoid Daun	FeCl ₃ 5% +jika hijau kekuningan		+

	NaOH 10% +jika kuning muda		-
	H ₂ SO ₄ PA +jika merah bata		-
Flavonoid Akar	FeCl ₃ 5% +jika hijau kekuningan		+
	NaOH 10% +jika kuning muda		-
	H ₂ SO ₄ PA +jika merah bata		-

Flavonoid Air Tambalepen	FeCl ₃ 5% +jika hijau kekuningan		-
	NaOH 10% +jika kuning muda		-
	H ₂ SO ₄ PA +jika merah bata		-
Steroid Batang	Liebermenn Burchard +jika warna biru atau hijau		-
Steroid Daun	Liebermenn Burchard +jika warna biru atau hijau		-
Steroid Akar	Liebermenn Burchard +jika warna biru atau hijau		-

Steroid Air Tambalepen	Liebermenn Burchard +jika warna biru atau hijau		-
Tanin Batang	FeCl ₃ 1% +jika hitam kebiruan atau hijau		-
Tanin Daun	FeCl ₃ 1% +jika hitam kebiruan atau hijau		+
Tanin Akar	FeCl ₃ 1% +jika hitam kebiruan atau hijau		-
Tanin Air Tambalepen	FeCl ₃ 1% +jika hitam kebiruan atau hijau		-
Saponin Batang	Dipanaskan +jika terbentuk busa		-

Saponin Daun	Dipanaskan +jika terbentuk busa		+
Saponin Akar	Dipanaskan +jika terbentuk busa		-
Saponin Air Tambalepen	Dipanaskan +jika terbentuk busa		-



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
PUSAT PENELITIAN BIOLOGI
(RESEARCH CENTER FOR BIOLOGY)

Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta - Bogor KM. 46 Cibinong 16911
Telp. (+62 21) 87907636 - 87907604, Fax. 87907612
Website : www.biologi.lipi.go.id



Cibinong, 22 November 2018

Nomor : 2574/IPH.1.01/If.07/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : Hasil identifikasi/determinasi Tumbuhan

Kepada Yth.
Bpk./Ibu/Sdr(i). **Jumania**
NIM : 60800114001
Mhs. Univ. Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Fak. Sains & Teknologi
Jl. Sultan Alauddin No.63

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil identifikasi/determinasi tumbuhan yang Saudara kirimkan ke "Herbarium Bogoriense", Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi-LIPI Bogor, adalah sebagai berikut :

No.	No. Kol.	Jenis	Suku
1	Tambulepen	<i>Poikilospermum suaveolens</i> (Blume) Merr.	Urticaceae

Demikian, semoga berguna bagi Saudara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Kepala Bidang Botani
Pusat Penelitian Biologi-LIPI,

Dr. Joeni Setijo Rahajoe
NIP. 196706241993032004



RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki Nama Lengkap **Jumania** yang akrab disapa Nia atau Jum, dilahirkan di dusun Batu Sura pada Tanggal 26 Januari 1996. Penulis dilahirkan dalam keluarga sederhana dari pasangan suami istri **Yorong** dan **Bolong**. Penulis berasal dari Dusun Batu Sura, Desa Mesakada, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak ke-9 dari 9 bersaudara. Riwayat pendidikan yaitu, Alumni SDN INPRES Batu Sura selesai Tahun 2008, lalu penulis melanjutkan SLTP di MTs DDI Pekkabata. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SLTA yaitu di MAN Pinrang. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Makassar yaitu **Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar** melalui jalur SNMPTN Tahun 2014, mengambil **Jurusan Biologi** pada **Fakultas Sains dan Teknologi**.