

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI
PADA NY “R” DENGAN PERSALINAN KALA II LAMA
DI RSKDIA PERTIWI MAKASSAR**

TANGGAL 26 MEI 2016

TAHUN 2016



PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Prodi Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh :

NUR HIKMA

NIM : 70400113002

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Hikma
Nim : 70400113002
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Dengan
Persalinan Kala II Lama Di Rskdia Pertiwi Makassar Tahun
2016.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 29 Agustus 2018

Pembimbing


Firdayanti, S.Si.T.M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 0001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia adalah duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa,

2016

Penulis

NUR HIKMA

UNIVERSITAS ISLAM TERPADU

NIM : 70400113002

ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Hikma
Nim : 70400113002
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Dengan
Persalinan Kala II Lama Di Rskdia Pertiwi Makassar Tahun
2016.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya
Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa,

2018

Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb

NIP : 19751113 200604 2 0001

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI DENGAN PERSALINAN KALA II LAMA DI RSKDIA PERTIWI MAKASSAR TAHUN 2016"**, yang disusun oleh **NUR HIKMA**, NIM: 70400113002, mahasiswa jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian karya tulis ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 19 Oktober 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, Agustus 2018

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris : **Dr. Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes** (.....)

Pembimbing I : **Firdayanti, S.SiT., M.Keb** (.....)

Penguji I : **Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb** (.....)

Penguji II : **Dr. Sohra, M.Ag** (.....)

ALAUDDIN
MAKASSAR
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550201 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil 'Alamin segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang Maha sempurna dengan limpahan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga penyusun Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul **“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI DENGAN PERSALINAN KALA II LAMA DI RSKDIA PERTIWI MAKASSAR TAHUN 2016”** dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Karya Tulis Ilmiah ini juga merupakan persembahan terakhir perjalanan studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang tercinta, mudah-mudahan penulis dapat mempertanggungjawabkan dihadapan tim penguji.

Salam dan shalawat kepada sang *Uswatun Hasanah*, baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga beliau dan para sahabat yang telah mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan dalam menuntut Ilmu pengetahuan, beliau memperlihatkan akhlak seorang Nabi yang berjuang dalam santun, sabar, dan ikhlas.

Niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dalam Q.S Al-Insyiah ayat 6 disebutkan “Innama'al “UsriYusraa” (sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan), kalimat itulah yang menjadi pedoman semangat penulis meskipun terdapat berbagai kesulitan yang dihadapi pada saat

penyelesaian Karya Tulis Ilmiah yang tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di dalam penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta almarhumah Ibu Hj. Halima dan Ayahanda H. Mustari atas segala perhatian, kasih sayang, do'a restu serta pengorbanannya yang tak terhingga begitupun saudaraku dan semua pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, do'a serta bantuan-batuannya dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

Samata-Gowa. 22 September 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Penulis

ALAUDDIN

M A K A S S A R

NUR HIKMA
NIM: 70400113002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang lingkup pembahasan	7
C. Tujuan penulisan	7
D. Manfaat penulisan	8
E. Metode penulisan	9
F. Sistematika penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan umum tentang persalinan normal.....	13
1. Pengertian persalinan	13
2. Sebab-sebab persalinan	14
3. Permulaan persalinan	19
4. Tahapan persalinan normal	22

5. Mekanisme persalinan normal	24
6. Faktor-faktor yang berperan dalam persalinan	26
B. Tinjauan umum tentang persalinan kala II lama	29
1. Pengertian persalinan kala II lama	29
2. Diagnosis persalinan kala II lama	29
3. Etiologi partus lama	29
4. Tanda dan gejala klinik persalinan kala II lama.....	31
5. Komplikasi pada Ibu dan Janin	32
C. Penanganan persalinan kala II lama	35
D. Proses manajemen asuhan kebidanan	37
E. Tinjauan islam tentang persalinan kala II lama.....	46
BAB III STUDI KASUS	52
A. Kala I.....	52
B. Kala II.....	81
C. Kala III	102
D. Kala IV	114
BAB IV PEMBAHASAN.....	120
BAB V PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan adalah suatu proses dimana fetus dan plasenta keluar dari uterus, ditandai dengan peningkatan aktifitas miometrium (frekuensi dan intensitas kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks serta keluarnya lendir darah (*bloody show*) dari vagina (Lestari, 2011). Persalinan adalah fungsi seorang wanita, dimana hasil konsepsi (janin, air ketuban, plasenta, dan selaput ketuban) dapat dilepas dan dikeluarkan dari uterus melalui vagina ke dunia luar (Oxorn, 2010).

Pentingnya peranan wanita dalam suatu generasi merupakan kedudukan yang istimewa untuk kaum wanita di mata islam. Wanita dikatakan penting karena banyak beban berat yang harus dihadapinya. Islam memperhatikan bahwa wanita mengemban amanah yang besar serta memberikan berbagai keistimewaan dan perlakuan khusus pada mereka. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita untuk berterima kasih kepada ibu, berbakti kepadanya, dan santun dalam bersikap kepadanya. Kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan daripada kedudukan ayah.

Sebagaimana disebutkan dalam Qs Al-Ahqaf: 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa seorang ibu telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah hingga menyapih. Oleh karena itu manusia diperintahkan agar mereka menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Sebab dengan perantara keduanya, manusia dilahirkan ke muka bumi.

Dalam Islam, diajarkan bahwa hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, bersyukur dan menjadi khalifah, tetapi semuanya tidak dapat dilaksanakan jika kita tidak lahir di dunia ini. Dalam ayat ini pula digambarkan bagaimana payahnya ibu mengandung, payah bertambah payah, payah sejak bulan pertama, dan semakin payah pula bertambahnya bulan sampai di puncak kepayahan pada saat anak dilahirkan.

Lalu mengasuh, menyusukan, menjaga, memeliharanya, dan hendaknya kita bersyukur kepada kedua orang tua karena ibu telah mengasuh, dan ayah telah berusaha mencari nafkah, membela dan

melindungi anak-anaknya. Dan akhirnya diperingatkanlah akhir perjalanan ini “kepada-Kulah tempat kembalimu” (Shihab, 2009). Jadi, pada hakikatnya Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi pada ibu hamil baik saat hamil maupun bersalin, apakah akan terjadi partus lama atau komplikasi lainnya.

Kematian ibu adalah kematian seorang wanita terjadi saat hamil, bersalin, atau 42 hari setelah persalinan dengan penyebab yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap persalinan. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan 800 perempuan meninggal setiap harinya akibat komplikasi kehamilan dan proses kelahiran. Sekitar 99% dari seluruh kematian ibu terjadi di negara berkembang. Sekitar 80% kematian maternal merupakan akibat meningkatnya komplikasi selama kehamilan, persalinan dan setelah persalinan (*International Classification of Diseases*, 2012).

Menurut laporan WHO tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia yaitu 289.000 jiwa. Amerika Serikat yaitu 9300 jiwa, Afrika Utara 179.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia 214 per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 170 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 60 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Angka kematian ibu di Indonesia masih jauh lebih tinggi daripada negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya kelompok kehamilan berisiko. Kelompok kehamilan risiko tinggi di Indonesia pada tahun 2007 sekitar 34%. Kategori dengan risiko tinggi tunggal mencapai 22,4%, dengan rincian umur ibu <18 tahun sebesar 4,1%, umur ibu >34 tahun sebesar 3,8%, jarak kelahiran <24 bulan sebesar 5,2%, dan jumlah anak yang terlalu banyak (>3 orang) sebesar 9,4% (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2008).

Kategori risiko tinggi ganda sebesar 11,6%, dengan rincian umur <18 tahun dan jarak kelahiran <24 bln sebesar 0,2%, umur >34 tahun dan jarak kelahiran <24 bulan sebesar 0,1%, umur >34 tahun dan jumlah anak terlalu banyak (>3 orang) sebesar 8,5%, umur >34 dan jarak kelahiran <24 bulan dan jumlah anak terlalu banyak (>3 orang) sebesar 1,1%, jarak kelahiran <24 bulan dan jumlah anak yang terlalu banyak (>3 orang) sebesar 1,8% (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2008).

Berdasarkan *Millennium Development Goals* (MDGs) 2015, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 sebanyak 68 AKB, tahun 2007 sebanyak 34 AKB dan 2015 diperkirakan menurun sebanyak 23 AKB.

Target selanjutnya yakni menurunkan angka kematian ibu (AKI) hingga tiga-perempat dalam kurun waktu 1990-2015. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 sebanyak 390 AKI, tahun 2007 sebanyak 228 AKI dan target tahun 2015 diperkirakan menurun sebanyak 102 AKI. Hasil penurunan AKI yang signifikan (dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2007) tetapi perlu upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011).

Jumlah kematian ibu yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2006 sebanyak 133 orang atau 101,56 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 143 kematian atau 92,89 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk tahun 2008 jumlah kematian ibu mengalami penurunan menjadi 121 orang atau 85,17 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 118 orang atau 78,84 per 100.000 KH. Kematian ibu tersebut terdiri dari kematian ibu hamil (19%), kematian ibu bersalin (46%), dan kematian ibu nifas (35%).

Salah satu usaha yang dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB adalah memberi pelayanan pada ibu hamil dan ibu bersalin secara cermat dan tepat. Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, pemerintah menerapkan strategi *Making Pregnancy Safer* (MPS) yang dimulai pada tahun 2000. MPS mempunyai visi agar kehamilan dan persalinan di

Indonesia berlangsung aman dan bayi dilahirkan hidup dan sehat (Prawirohardjo, 2009).

Kala II lama adalah persalinan yang sudah dipimpin mengejan pada primigravida dibatasi 2 jam dan diperpanjang 3 jam apabila digunakan analgesi regional, sedangkan pada multigravida dibatasi 1 jam dan diperpanjang sampai 2 jam apabila digunakan analgesi regional (Prawiroharjdo, 2010).

Komplikasi yang timbul karena perjalanan persalinan kala II lama adalah ibu mengalami kelelahan karena tanpa makan dan minum serta berpengaruh pada kondisi janin dalam rahim. Ibu mengalami dehidrasi, tampak sakit, pucat, mata cekung, dan berkeringat dingin, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah menurun, dan suhu tubuh meningkat. His mulai melemah dan perut tampak kembung. Pada pemeriksaan dalam, terdapat tanda infeksi intrauterin (lokia berbau, berwarna keruh, tampak bercampur mekonium, dan edema pada vulva), ada kaput sucsedaneum, terjadi edema porsio, dan bagian terendah janin sulit di dorong ke atas. Pada janin dapat mengalami asfiksia sampai terjadi kematian dalam rahim (Manuaba, 2008).

Data yang diperoleh dari medical record RSKDIA Pertiwi Makassar menunjukkan bahwa 6363 persalinan pada bulan januari sampai desember 2015 tercatat 38 kasus partus lama. Penanganan kejadian partus lama rata-rata dilakukan di Rumah Sakit rujukan seperti RSKDIA Pertiwi

Makassar. Di mana kasus yang tidak bisa ditangani di puskesmas dan unit pelayanan lainnya merujuk ke Rumah Sakit.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan metode studi kasus persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar melalui pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang telah ada.

B. Ruang lingkup pembahasan

Adapun ruang lingkup dalam pembahasan karya tulis ini. Penerapan manajemen asuhan kebidanan pada klien dengan kasus persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar.

C. Tujuan penulisan

Bagaimana cara mengatasi intranatal patologi pada klien dengan kasus persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar.

1. Tujuan umum

Melaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada klien dengan persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar.

2. Tujuan khusus

- a. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar, pengkajian, analisa, dan merumuskan diagnosa kebidanan pada klien dengan kasus persalian kala II lama.

- b. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar, kemungkinan timbulnya diagnosa/masalah potensial pada klien dengan kasus persalinan kala II lama.
- c. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar untuk melakukan tindakan segera dan kolaborasi pada klien dengan kasus persalinan kala II lama.
- d. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar untuk merumuskan rencana tindakan komprehensif pada klien dengan kasus persalinan kala II lama.
- e. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar untuk megevaluasi tentang efektifitas tindakan yang telah dilakukan pada klien dengan kasus persalinan kala II lama.
- f. Diperolehnya pengalaman nyata dalam pengumpulan data dasar untuk mendokumentasikan manajemen asuhan kebidanan dalam kasus persalinan kala II lama.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai salah satu pernyataan dalam menyelesaikan ujian akhir jenjang pendidikan Diploma III Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
 - b. Merupakan pengalaman yang sangat berharga dan dapat menambah pengetahuan dalam penerapan asuhan kebidanan

dengan kasus persalinan kala II lama serta mempraktekkan teori-teori yang telah dipelajari.

2. Bagi institusi

Diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui jenjang pendidikan dan merupakan bekal bagi mahasiswa agar berhasil dalam menerapkan asuhan kebidanan pada klien dengan kasus persalinan kala II lama.

3. Bagi instansi

Memberikan masukan bagi instansi kesehatan khususnya pihak RSKDIA Pertiwi Makassar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada klien dengan kasus persalinan kala II lama.

E. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca dan mempelajari buku-buku dari literatur lain (internet) yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sebagai dasar teoritis yang digunakan dalam pembahasan karya tulis ini.

2. Studi kasus

Studi kasus ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah asuhan kebidanan meliputi pengkajian dan analisa data, menentukan diagnosa/masalah aktual.

a. Wawancara

Wawancara langsung dengan klien, bidan dan dokter diruangan kebidanan yang berhubungan dengan masalah klien.

b. Observasi Selama perawatan

Observasi keadaan umum klien, kemajuan persalinan, tanda-tanda vital klien (TTV), denyut jantung janin (DJJ), dan pemenuhan kebutuhan klien.

c. Pemeriksaan fisik

Melakukan pemeriksaan fisik pada klien secara sistematis pada klien mulai dari inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang (*Ultrasonografi dan Rontgen*).

3. Studi dokumentasi

Membaca dan mempelajari status kesehatan yang berhubungan dengan keadaan klien, baik yang bersumber dari perawatan klien maupun dari sumber lain yang menunjang seperti status klien melalui rekam medik.

4. Diskusi

Diskusi dengan pembimbing karya tulis ini, dan bidan di lahan.

F. Sistematika penulisan

Dalam karya tulis ini dapat dilihat secara garis besar tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Ruang lingkup pembahasan
- C. Tujuan penulisan
 - 1. Tujuan umum
 - 2. Tujuan khusus
- D. Manfaat penulisan
- E. Metode penulisan
- F. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum tentang persalinan normal
 - 1. Pengertian
 - 2. Sebab-sebab persalinan
 - 3. Permulaan persalinan
 - 4. Tahapan persalinan normal
 - 5. Mekanisme persalinan normal
 - 6. Faktor-faktor yang berperan dalam persalinan
- B. Tinjauan umum tentang persalinan kala II lama
 - 1. Pengertian persalinan kala II lama
 - 2. Diagnosis persalinan kala II lama
 - 3. Etiologi partus lama

4. Tanda dan gejala klinik persalinan kala II lama
 5. Komplikasi pada Ibu dan Janin
 6. Penanganan persalinan kala II lama
- C. Proses manajemen asuhan kebidanan
- D. Tinjauan islam tentang terjadinya persalinan dengan persalinan kala II lama



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang persalinan normal

1. Pengertian

- a. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Wiknjosastro, 2005).
- b. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin turun ke dalam jalan lahir atau proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin (Saifuddin, 2006).
- c. Persalinan adalah proses multifaset, kompleks karena kejadian psikologis dan fisiologis saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Chapman, 2006).
- d. Persalinan adalah persalinan yang dimulai secara spontan (dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir), berisiko rendah pada awal persalinan dan presentasi belakang kepala pada usia kehamilan antara 37-42 minggu setelah persalinan ibu maupun bayi dalam kondisi baik (World Health Organization(WHO)).
- e. Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya penyulit (Damayanti, dkk, 2014).

- f. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar (Damayanti, dkk, 2014).
 - g. Persalinan normal menurut IBI adalah persalinan dengan presentasi janin janin belakang kepala yang berlangsung secara spontan dengan lama persalinan dalam batas normal, tanpa intervensi (pengguna narkotik, epidural, percepatan persalinan, memecah ketubah dan episiotomi), beresiko rendah sejak awal persalinan hingga partus dengan masa gestasi 37-42 minggu.
 - h. Partus normal/partus biasa adalah bayi baru lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala /ubun-ubun kecil, tanpa memakai alat/pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu maupun bayi (kecuali episiotomi), berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam.
 - i. Partus abnormal adalah bayi baru lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi/ekstraksi, cunam, vakum, dekapitasi, embriotomi, dan sebagainya, atau lahir perabdominam dengan seksio sesarea (Damayanti, dkk, 2014).
2. Sebab-sebab mulainya persalinan
- Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti sehingga menimbulkan beberapa teori.
1. Faktor-faktor hormonal yang menyebabkan persalinan :
 - a. Rasio estrogen terhadap progesteron

Progesteron menghambat kontraksi uterus selama kehamilan, sehingga ekspulsi fetus tidak terjadi. Sedangkan estrogen dapat meningkatkan jumlah taut celah (*gap junction*) antar sel-sel otot polos uterus yang berdekatan. Dalam kehamilan estrogen dan

progesteron di eksresikan dalam jumlah yang secara progresif terus meningkat dari bulan kebulan. Tetapi mulai bulan ke 7 dan seterusnya estrogen terus meningkat tetapi progesteron tetap konstan atau mungkin sedikit menurun. Oleh karena itu diduga bahwa rasio estrogen progesteron yang menyebabkan persalinan.

b. Pengaruh oksitosin pada uterus

Oksitosin merupakan suatu hormon yang dihasilkan oleh neuro hipofisis (hipofisis posterior) yang dapat menyebabkan kontraksi uterus. Yang dimana terjadi :

1. Otot-otot uterus meningkatkan reseptor-reseptor oksitosin dan meningkatkan responnya terhadap oksitosin.
2. Kecepatan sekresi oksitosin oleh neurohipofisis meningkat pada waktu persalinan.
3. Regangan serviks atau iritasi serviks pada waktu persalinan dapat menyebabkan *reflek neurogenic* yang mengakibatkan neurohipofisis meningkatkan sekresi oksitosinnya.
4. Pengaruh hormon fetus pada uterus

Kelenjar hipofisis pada fetus juga mensekresikan oksitosin yang jumlahnya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Kelenjar adrenal fetus menghasilkan kortisol yang mungkin merupakan stimulan uterus. Membran fetus menghasilkan prostaglandin yang tinggi pada waktu persalinan. Prostaglandin dapat meningkatkan intensitas kontraksi uterus (Damayanti, dkk, 2014).

2. Teori yang berkaitan dengan mulai terjadinya kekuatan HIS

Ada 2 hormon yang dominan saat hamil yaitu estrogen dan progesteron.

a. Estrogen

- 1) Meningkatkan sensitivitas otot rahim.
- 2) Memudahkan penerimaan rangsangan oksitosin, prostaglandin dan rangsangan mekanis.

b. Progesteron

- 1) Menurunkan sensitivitas otot rahim.
- 2) Menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, prostaglandin dan mekanis.
- 3) Menyebabkan otot rahim dan otot polos relaksasi.

Estrogen dan progesteron terdapat dalam keseimbangan sehingga kehamilan dapat dipertahankan. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron menyebabkan oksitosin yang dikeluarkan oleh hipofise pars posterior dapat menimbulkan kontraksi dalam bentuk Braxton Hicks. Kontraksi Braxton Hicks akan menjadi kekuatan dominan saat mulainya persalinan, oleh karena itu mungkin tua hamil frekuensi kontraksi makin sering.

Oksitosin diduga bekerja bersama atau melalui prostaglandin yang makin meningkat mulai dari umur kehamilan minggu ke-15. Disamping itu faktor gizi ibu hamil dan ketegangan otot rahim dapat memberikan pengaruh penting untuk dimulainya kontraksi rahim (Damayanti, dkk, 2014).

Beberapa teori yang menyatakan kemungkinan proses persalinan:

1. Teori keregangan

- 1) Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu.
- 2) Setelah melewati batas tersebut terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai.

Contoh : pada hamil ganda sering terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu, sehingga menimbulkan proses persalinan.

2. Teori penurunan estrogen

- 1) Proses penebaran plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu, dimana terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu.
- 2) Produksi progesteron mengalami penurunan, sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin.
- 3) Akibatnya otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron tertentu.

Dengan penurunan hormon progesteron menjelang persalinan dapat terjadi kontraksi. Kontraksi otot rahim menyebabkan :

- 1) Turunnya kepala, masuk pintu atas panggul, terutama pada primigravida minggu ke-36 dapat menimbulkan sesak dibagian bawah, diatas simfisis pubis dan sering ingin

kencing atau susah kencing karena kandung kemih tertekan kepala.

- 2) Perut lebih melebar karena fundus uteri turun.
 - 3) Terjadi perasaan sakit di daerah pinggang karena kontraksi ringan otot rahim dan tertekannya pleksus Frankenhauser yang terletak sekitar serviks.
 - 4) Terjadi pelunakan serviks Karena terdapat kontraksi otot rahim.
 - 5) Terjadi pengeluaran lendir, dimana lendir penutup serviks dilepaskan (Damayanti, dkk, 2014).
3. Teori oksitosin internal
- 1) Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis pars posterior.
 - 2) Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi Braxton Hicks.
 - 3) Menurunnya konsentrasi progesteron akibat tuanya kehamilan maka oksitosin dapat meningkatkan aktivitas, sehingga persalinan dapat dimulai.
4. Teori prostaglandin
- 1) Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu, yang dikeluarkan oleh desidua.
 - 2) Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dikeluarkan.

3) Prostaglandin dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan.

5. Teori hipotalamus-pituitari

1) Teori ini menunjukkan pada kehamilan dengan anensefalus sering terjadi keterlambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus.

2) Pemberian kortokosteroid yang dapat menyebabkan maturitas janin, induksi (mulainya) persalinan.

3) Dari hal diatas menunjukkan ada hubungan antara hipotalamus pituitari dengan persalinan (Damayanti, dkk, 2014).

3. Permulaan persalinan

Tanda persalinan sudah dekat

a. Lightening

Menjelang minggu ke-36 pada primigravida, terjadinya penurunan fundus uterus karena kepala bayi telah sudah masuk ke dalam panggul.

Penyebab dari proses ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kontraksi Braxton Hicks
- 2) Ketegangan dinding perut
- 3) Ketegangan ligamentum rotundum
- 4) Gaya berat janin, kepala kerah bawah uterus.

Masuknya kepala janin kedalam panggul dapat dirasakan oleh wanita hamil dngan tanda-tanda sebagai berikut :

- 1) Terasa ringan di bagian atas dan rasa sesak berkurang.

- 2) Dibagian bawah terasa penuh dan mengganjal.
- 3) Kesulitan saat berjalan.
- 4) Sering berkemih.

Gambaran lightening pada primigravida menunjukkan hubungan normal antara ketiga P, yaitu : power (his), passage (jalan lahir), passanger (bayi dan plasenta). Pada multipara gambarannya menjadi tidak sejelas pada primigravida , karena masuknya kepala janin ke dalam panggul terjadi bersamaan dengan proses persalinan.

b. Terjadinya HIS permulaan

Pada saat hamil muda sering terjadi kontraksi Braxton Hicks yang kadang dirasakan sebagai keluhan karena rasa sakit yang ditimbulkan. Biasanya pasien mengeluh adanya rasa sakit dipinggang dan terasa sangat mengganggu, terutama pada pasien dengan ambang rasa sakit yang rendah. Adanya perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron menyebabkan oksitosin semakin meningkat dan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif untuk menimbulkan kontraksi atau his permulaan. His permulaan ini sering diistilahkan sebagai his palsu dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Rasa nyeri ringan di bagian bawah
- 2) Datang tidak teratur
- 3) Tidak ada perubahan pada serviks atau tidak ada tanda-tanda kemajuan persalinan
- 4) Durasi pendek
- 5) Tidak bertambah bila beraktifitas.

c. Tanda masuk dalam persalinan

1) Terjadinya his persalinan

Karakter dari his persalinan, yaitu:

- a) Pinggang terasa sakit menjalar kedepan (nyeri sampai ke ari-ari atau perut).
- b) Sifat his teratur, interval makin pendek dan kekuatan biasanya terjadi pada 2 x dalam 10 menit selama 40-45 detik.
- c) Terjadi perubahan serviks.
- d) Jika pasien menambah aktivitasnya, misalnya dengan berjalan maka kekuatannya bertambah (Damayanti, dkk, 2014).

2) Pengeluaran lendir dan darah (penanda persalinan)

Dengan adanya his persalinan, terjadi perubahan pada serviks yang menimbulkan:

- a) Pendataran dan pembukaan.
- b) Pembukaan menyebabkan selaput lendir yang terdapat pada kanalis servikalis terlepas.
- c) Terjadi perdarahan karena kapiler pembuluh darah pecah.

3) Pengeluaran cairan

Sebagian pasien mengeluarkan air ketuban akibat pecahnya selaput ketuban. Jika ketuban sudah pecah, maka ditargetkan persalinan dapat berlangsung dalam 24 jam. Namun jika ternyata tidak tercapai, maka persalinan akhirnya diakhiri dengan tindakan tertentu, misalnya ekstraksi vakum atau seksio saesaria (Damayanti, dkk, 2014).

4. Tahapan persalinan kala I, II, III dan IV

a. Kala I (pembukaan)

Paisen dikatakan dalam tahap persalinan I:

- 1) Jika sudah terjadi pembukaan serviks dan kontraksi terjadi teratur minimal 2 x dalam 10 menit selama 40 detik.
- 2) Kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0-10 cm (pembukaan lengkap).
- 3) Proses pada kala I terbagi menjadi dua fase, yaitu:
 - a) Fase laten (8 jam) dari pembukaan 0 cm sampai pembukaan 3 cm.
 - b) Fase aktif (7 jam) dari pembukaan serviks 3 cm sampai pembukaan 10 cm, dibagi lagi menjadi 3 fase yaitu:
 - 1) Fase akselerasi (2 jam), dari pembukaan serviks 3 cm sampai 4 cm.
 - 2) Fase dilatasi maksimal (2 jam), dari pembukaan 4 cm sampai 9 cm.
 - 3) fase deselerasi (2 jam), dari pembukaan 9 cm sampai 10 cm.
- 4) lamanya untuk primigravida berlangsung 12-14 jam sedangkan pada multigravida sekitar 6-8 jam.
- 5) Berdasarkan kurve Friedman, diperhitungkan pembukaan primigravida 1 cm per jam dan pembukaan multigravida 2 cm per jam.

b. Kala II (pengeluaran bayi)

- 1) Kala II adalah kala pengeluaran bayi, dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir.
- 2) Uterus dengan kekuatan hisnya ditambah kekuatan meneran akan mendorong bayi hingga lahir.
- 3) Lamanya proses ini berlangsung selama $1\frac{1}{2}$ – 2 jam pada primigravida dan $\frac{1}{2}$ - 1 jam pada multigravida.
- 4) Diagnosis persalinan kala II ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm.
- 5) Tanda gejala kala II: dorongan meneran, tekanan anus, perineum menonjol, vulva membuka.

c. Kala III (pelepasan plasenta)

- 1) Kala III adalah waktu untuk pelepasan dan pengeluaran plasenta.
- 2) Berlangsung setelah kala II yang tidak lebih dari sekitar 30 menit, kontraksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit.
- 3) Dengan lahirnya bayi dan proses retraksi uterus, maka plasenta lepas dari dari lapisan Nitabusch.
- 4) Tanda-tanda lepasnya plasenta, sebagai berikut :
 - a) Uterus menjadi berbentuk bundar.
 - b) Uterus terdorong ke atas, karena plasenta terlepas ke segmen bawah rahim.
 - c) Tali pusat semakin panjang.
 - d) Terjadinya perdarahan.

5) Melahirkan pasenta dilakukan dengan dorongan Crede pada fundus uterus.

d. Kala IV (observasi)

Hal penting yang harus diperhatikan pada kala IV persalinan :

- 1) Kontraksi uterus baik.
- 2) Tidak ada perdarahan pervaginam atau dari alat genital lain.
- 3) Plasenta dan selaput ketuban harus sudah lahir lengkap.
- 4) Kandung kemih harus kosong.
- 5) Luka-luka di perineum harus dirawat dan tidak ada hematoma.
- 6) Resume keadaan umum ibu dan bayi (Damayanti, dkk, 2014).

5. Mekanisme persalinan normal

Mekanisme persalinan merujuk kepada bagaimana seorang janin mampu keluar dari panggul ibu dengan selamat tanpa terjadinya komplikasi, di sini janin harus mampu dan berusaha keluar dengan berbagai cara agar bisa lolos keluar. Mekanisme persalinan sebenarnya mengadu pada bagaimana janin menyesuaikan dan meloloskan diri dari panggul ibu. yang meliputi gerakan :

a. Turunnya kepala janin

Sebelum janin mengalami penurunan terus menerus dalam jalan lahir sejak kehamilan trimester III, antara lain masuknya bagian terbesar janin ke dalam pintu atas panggul (PAP) yang pada primigravida 38 minggu atau selambat-lambatnya awal kala II (Yulianti, dkk, 2009).

b. Fleksi

Pada permulaan persalinan kepala janin biasanya berada dalam sikap fleksi. Dengan adanya his dan tahan dari dasar panggul yang makin besar, maka kepala janin makin turun dan semakin fleksi sehingga dagu janin menekan pada dada dan belakang kepala (*Oksiput*) menjadi bagian bawah. Keadaan ini dinamakan fleksi maksimal. Dengan fleksi maksimal kepala janin dapat menyesuaikan diri dengan ukuran panggul ibu terutama bidang sempit panggul yang ukuran panggul melintang 10 cm. Untuk dapat melewatinya, maka kepala janin yang awalnya masuk dengan ukuran diameter *Oksipito frontalis* (11,5 cm) harus fleksi secara maksimal menjadi diameter *Oksipito Bregmatik* (9,5 cm) (Rukiah, dkk, 2009).

c. Rotasi dalam atau putaran paksi dalam

semakin menurunnya kepala janin dalam jalan lahir, kepala janin akan berputar sedemikian rupa sehingga diameter terpanjang rongga panggul atau diameter anterior posterior kepala janin akan bersesuaian dengan diameter terkecil antero posterior pintu bawah panggul (PBP). Hal ini mungkin karena kepala janin tergerak spiral atau seperti sekrup sewaktu turun dalam jalan lahir. Bahu tidak berputar bersama-sama dengan kepala akan membentuk sudut 45. Keadaan demikian disebut putaran paksi dalam dan ubun-ubun kecil berada dibawah simpisis (Rukiah, dkk, 2009).

d. Ekstensi

Setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada PBP mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya kalau tidak terjadi ekstensi maka kepala akan tertekan pada pertemuan dan menembusnya. Dengan ekstensi ini maka sub Oksiput bertindak sebagai hipomochlion (sumbu putar), dahi, hidung, mulut dan akhir dagu.

e. Rotasi luar atau putaran paksi luar

Setelah ekstensi kemudian diikuti dengan putaran paksi luar yang pada hakikatnya kepala janin menyesuaikan kembali dengan sumbu panjang bahu, sehingga sumbu panjang bahu dengan sumbu panjang janin berada pada suatu garis lurus.

6. Faktor-faktor yang berperan dalam persalinan

Pada setiap persalinan harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tiga faktor utama yang menentukan prognosis persalinan adalah jalan lahir (*passage*), janin (*passanger*), dan kekuatan (*power*).

a. *Passage* (jalan lahir)

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang padat, dasar panggul, dan introitus (lubang luar vagina). Meskipun jaringan lunak,

khususnya lapisan-lapisan otot dasar panggul ikut menunjang keluarnya bayi, tetapi panggul ibu jauh lebih berperan dalam proses persalinan, janin harus berhasil menyesuaikan dirinya terhadap jalan lahir yang relatif kaku. Oleh karena itu, ukuran dan bentuk panggul harus ditentukan sebelum persalinan.

b. *Passanger* (janin)

Passanger atau janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin. Karena plasenta juga harus melewati jalan lahir, maka ia dianggap juga sebagai bagian dari *passanger* yang menyertai janin. Namun plasenta jarang menghambat proses persalinan pada kehamilan normal.

c. *Power* (kekuatan)

Kekuatan terdiri dari kemampuan ibu melakukan kontraksi involunter dan volunteer secara bersamaan untuk mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus. Kontraksi involunter disebut juga kekuatan primer, memadai dimulainya persalinan. Apabila serviks berdilatasi, usaha volunteer dimulai untuk mendorong, yang disebut dengan kekuatan sekunder, dimana kekuatan ini memperbesar kekuatan kontraksi involunter.

7. Pemantauan partograf

Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama persalinan. Tujuan utama penggunaan partograf adalah untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dan mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal (Prawirohardjo, 2011).

Dengan demikian, juga dapat dilaksanakan deteksi secara dini, setiap kemungkinan terjadinya partus lama. Jika digunakan secara tepat dan konsisten, partograf akan membantu penolong persalinan untuk mencatat kemajuan persalinan, kondisi ibu dan janin, asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, serta menggunakan informasi yang tercatat, sehingga secara dini mengidentifikasi adanya penyulit persalinan, dan membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu (Prawirohardjo, 2011).

B. Tinjauan umum tentang persalinan kala II lama

1. Pengertian persalinan kala II lama

Kala II merupakan kala pengeluaran yang dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida. Kala II dikatakan memanjang jika pembukaan serviks lengkap, ibu ingin mendedan, tetapi tidak ada kemajuan persalinan (Oxorn, 2010).

2. Diagnosis persalinan kala II lama

Diagnosis kala II lama yaitu pembukaan serviks lengkap, dilatasi serviks dikanan garis waspada partograf, kondisi ibu ingin mendedan tetapi tidak ada kemajuan persalinan.

3. Etiologi partus lama

Menurut Nugraheny (2010), sebab-sebab terjadinya partus lama ini sangat kompleks dan tergantung pada pengawasan saat hamil, pertolongan persalinan yang baik dan penatalaksanaannya. Faktor-faktor penyebabnya adalah :

a. Kelainan letak

- b. Kelainan panggul
- c. Kelainan kekuatan his dan mendedan
- d. Ketidakseimbangan sefalopelvik
- e. Pimpinan persalinan yang salah
- f. Primi tua.

Menurut Prawirohardjo (2010), sebab-sebabnya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Kelainan tenaga (kelainan His)

His yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya menyebabkan kerintangan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap persalinan, tidak dapat diatasi sehingga persalinan mengalami hambatan atau kemacetan.

- b. Kelainan janin

Persalinan dapat mengalami gangguan atau kemacetan karena karena kelainan dalam letak atau dalam bentuk janin.

- c. Kelainan jalan lahir

Kelainan dalam ukuran bentuk jalan lahir bisa menghalangi kemajuan persalinan atau menyebabkan kemacetan.

Menurut Chapman (2006) dalam konteks kesejahteraan ibu dan janin, persalinan lama bisa dapat terjadi akibat berbagai alasan dan dapat bisa saja “normal” untuk seorang individu. Berbagai penyebab yang dapat dicegah, termasuk stres psikologi dan masalah fisik, dapat berakibat persalinan lama, kontraksi tidak adekuat. Beberapa penyebab adalah :

- 1) Respon stres.
- 2) Presentasi/posisi janin.

- 3) Disproporsi sefalopelvik.
 - 4) Pembatasan mobilitas dan postur setengah berbaring.
 - 5) Puasa ketat.
 - 6) Analgesia.
 - 7) Paling jarang penyebab fisik.
4. Tanda dan gejala klinik persalinan kala II lama

Menurut Oxorn (2010), gejala klinik pada partus lama, yaitu :

- a. Pembukaan serviks tidak melewati 3 cm sesudah 8 jam inpartu.
- b. Pembukaan serviks melewati garis waspada partograf.
- c. Frekuensi dan lamanya kontraksi kurang dari 3 kontraksi per 10 menit dengan durasi kurang dari 40 detik.
- d. Pembukaan serviks dan penurunan bagian terendah janin tidak maju sedangkan his baik.
- e. Pembukaan serviks dan penurunan bagian terendah janin tidak maju, disertai kaput, molage hebat, edema serviks, tanda ruptur imminens dan gawat janin.
- f. Pembukaan serviks lengkap, ibu ingin meneran, tetapi tidak ada kemajuan persalinan.

Menurut Purwaningsih dan Fatmawati (2010), gejala klinik pada partus lama yaitu:

- a. Pada ibu
 - 1) Gelisah, letih, suhu badan meningkat, berkeringat, nadi cepat, pernapasan cepat, dan meteorismus.
 - 2) Di daerah lokal sering dijumpai edema vulva, edema serviks, cairan ketuban berbau, terdapat mekonium.

b. Pada janin

- 1) Denyut jantung janin cepat/tidak teratur, air ketuban terdapat mekonium, kental kehijau-hijauan, berbau.
- 2) Kaput succedaneum yang membesar.
- 3) Moulage kepala yang hebat.
- 4) Kematian janin dalam kandungan.
- 5) Kematian janin intrapartum.

Menurut Manuaba (2010), gejala utama partus lama adalah :

- a. Dehidrasi.
- b. Tanda infeksi (suhu tinggi, nadi dan pernapasan cepat, abdomen meteorismus).
- c. Pada pemeriksaan abdomen terdapat meteorismus, lingkaran Bundle tinggi, nyeri segmen bawah rahim.
- d. Pada pemeriksaan lokal vulva vagina terdapat edema vulva, cairan ketuban berbau, cairan ketuban bercampur mekonium.
- e. Pada pemeriksaan dalam terdapat edema serviks, bagian terendah sulit didorong ke atas, terdapat kaput pada bagian terendah.
- f. Keadaan janin dalam rahim mengalami asfiksia sampai terjadi kematian.
- g. Akhir dari partus lama adalah ruptur uteri imminens sampai ruptur uteri atau kematian karena perdarahan atau infeksi.

5. Komplikasi

Komplikasi yang timbul karena perjalanan persalinan lama pada ibu yaitu sebagai berikut :

- a. mengalami kelelahan karena tanpa makan dan minum serta berpengaruh pada kondisi janin dalam rahim.
- b. Ibu mengalami dehidrasi, tampak sakit, pucat, mata cekung, dan berkeringat dingin.
- c. Frekuensi nadi meningkat, tekanan darah menurun, dan suhu tubuh meningkat.
- d. His mulai melemah dan perut tampak kembung.
- e. Pada pemeriksaan dalam, terdapat tanda infeksi intrauterin (lochia berbau, berwarna keruh, tampak bercampur mekonium, dan edema vulva), ada kaput succedaneum, terjadi edema porsio, dan bagian terendah janin sulit didorong ke atas.

Komplikasi yang timbul karena perjalanan persalinan lama pada janin yaitu, sebagai berikut :

- a. Pada janin dapat mengalami asfiksia
- b. Terjadi kematian dalam rahim (Manuaba, 2008).

Dampak persalinan lama dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi salah satu atau keduanya sekaligus. Dampak persalinan lama yang terjadi pada ibu antara lain :

- a. Infeksi Intrapartum

Infeksi merupakan bahaya serius yang mengancam ibu dan janinnya pada partus lama, terutama bila disertai pecahnya ketuban. Bakteri didalam cairan amnion menembus amnion dan desidua serta pembuluh korion sehingga terjadi bakteremia , sepsis dan pneumonia pada janin akibat aspirasi cairan amnion yang terinfeksi.

b. Ruptur uteri

Penipisan abnormal segmen bawah uterus menimbulkan bahaya serius selama partus lama, terutama pada wanita dengan paritas tinggi dan pada mereka yang dengan riwayat seksio sesarea. Apabila disproporsi antara kepala janin dan panggul sedemikian besar sehingga kepala tidak engaged dan tidak terjadi penurunan, sehingga segmen bawah uterus menjadi sangat teregang yang kemudian dapat menyebabkan ruptur.

c. Cincin retraksi patologis

Pada partus lama dapat timbul konstiksi atau cincin lokal uterus, tipe yang paling sering adalah cincin retraksi patologis *Bandl*. Cincin ini disertai peregangan dan penipisan berlebihan segmen bawah uterus, cincin ini sebagai suatu identasi abdomen dan menandakan ancaman akan rupturnya segmen bawah uterus.

d. Pembentukan fistula

Apabila bagian terbawah janin menekan kuat ke pintu atas panggul tetapi tidak maju untuk jangka waktu lama, maka bagian jalan lahir yang terletak diantaranya akan mengalami tekanan yang berlebihan. Karena gangguan sirkulasi sehingga dapat terjadi nekrosis yang akan jelas dalam beberapa hari setelah melahirkan dengan munculnya fistula.

e. Cedera otot dasar panggul

Cedera otot-otot dasar panggul, persarafan, atau fasia penghubungnya merupakan konsekuensi yang tidak terelakkan pada persalinan pervaginam terutama apabila persalinannya sulit.

f. Kaput suksedaneum

Apabila panggul sempit, sewaktu persalinan sering terjadi kaput suksedaneum yang besar di bagian terbawah kepala janin. Kaput ini berukuran cukup besar dan menyebabkan kesalahan diagnostik yang serius. Kaput dapat hampir mencapai dasar panggul sementara kepala sendiri belum cakap. Biasanya kaput suksedaneum, bahkan yang besar sekalipun, akan menghilang dalam beberapa hari.

g. Moulage kepala janin

Akibat tenaga his yang kuat, lempeng-lempeng tulang tengkorak saling bertumpang tindih salah satu sama lain di sutura-sutura besar, suatu proses yang disebut molase (*molding, moulage*). Biasanya batas tulang median tulang parietal yang berkontak dengan promontorium bertumpang tindih dengan tulang disebelanya; hal yang sama terjadi pada tulang-tulang frontal. Namun, tulang oksipital terdorong ke bawah tulang parietal.

Perubahan-perubahan ini sering terjadi tanpa menimbulkan kerugian yang nyata. Di lain pihak, apabila distorsi yang terjadi mencolok, molase dapat menyebabkan robekan tentorium, laserasi pembuluh darah janin, dan perdarahan intrakranial pada janin (Prawirohardjo, 2011).

6. Penanganan persalinan kala II lama

Menurut Saifuddin (2009), penanganan yang dapat dilakukan pada ibu bersalin dengan kala II lama antara lain:

a. Ibu dianjurkan mengejan secara spontan.

- b. Jika malpresentasi dan tanda-tanda obstruksi bisa disingkirkan berikan oksitosin drip mulai 8 tetes permenit, setiap 15 menit ditambah 4 tetes sampai his adekuat (maksimum 40 tetes per menit).
- c. Bila pemberian oksitosin drip tidak ada kemajuan dalam 1 jam, lahirkan dengan batuan vakum atau forceps bila persyaratan dipenuhi.
- d. Lahirkan dengan seksio caesarea bila persyaratan vakum dan forceps tidak dipenuhi.

Menurut Purwaningsih dan Fatmawati (2010), penanganan pada partus lama antara lain:

- a. Perawatan pendahuluan
 - 1) Suntikan kortone 100-200 mg intra muskuler.
 - 2) Penisilin kokain 1 juta IU intra muskuler.
 - 3) Infus carian larutan garam fisiologis, larutan glukosa 5-10% pada jam pertama : 1 liter/jam.
 - 4) Istirahat 1 jam untuk observasi, kecuali bila ada keadaan mengharuskan untuk segera bertindak.
- b. Pertolongan

Dapat dilakukan partus spontan, ekstraksi vakum, ekstraksi forceps, manual aid pada letak sungsang, embriotomi bila janin meninggal, seksio caesaria, dan lain-lain.

Menurut Oxorn dan Forte (2010), penatalaksanaan pada partus lama dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Disproporsi atau cincin konstriksi

Seksio caesarea merupakan indikasi.
- b. Tanpa disproporsi

- 1) Infus oxytosin memperbaiki uterus.
- 2) Pemecahan ketuban secara artifisial diperlukan jika kantong ketuban masih utuh.
- 3) Pasien harus ditempatkan pada meja bersalin dan dpimpin agar mau mengejan pada setiap kali his.
- 4) Digunakan forceps untuk menghasilkan peurunan dan rotasi kepala lebih lanjut.
- 5) Episiotomi akan mengatasi perineum yang ulet.

Kalau metode-metode ini gagal atau kalau kelahiran pervaginam dengan tindakan dianggap terlalu traumatik bagi kelahiran yang aman, maka seksio caesarea merupakan indikasi.

C. Proses manajemen asuhan kebidanan

1. Pengertian

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka berpikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Kepmenkes 369; 2007, 5).

Manajemen kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan dengan urutan logis dan perilaku yang diharapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan ilmiah, penemuan, dan keterampilan dalam tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Varney, 2007).

Manajemen kebidanan merupakan suatu metode atau bentuk pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam memberi asuhan kebidanan. Langkah-langkah dalam manajemen kebidanan menggambarkan alur pola berpikir dan bertindak bidan dalam pengambilan keputusan klinis untuk mengatasi masalah (Yulifah, 2014).

2. Langkah-langkah dalam manajemen kebidanan

Langkah-langkah dalam manajemen kebidanan menggambarkan alur pola pikir dan bertindak bidan dalam pengambilan keputusan klinis sangat erat kaitannya dengan proses manajemen kebidanan karena dalam proses manajemen kebidanan seorang bidan dituntut untuk mampu membuat keputusan yang segera secara tepat dan cepat agar masalah yang dihadapi klien teratasi (Yulifah, 2014).

Proses manajemen terdiri atas tujuh langkah yang berurutan di mana setiap langkah disempurnakan secara periodik. Proses dimulai dengan mengumpulkan data dasar yang berakhir dengan evaluasi. Ketujuh langkah tersebut membentuk suatu kerangka yang dapat diuraikan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih rinci dan langkah-langkah tersebut bisa berubah sesuai dengan kebutuhan klien (Yulifah, 2014).

a. Langkah 1: Pengkajian

Pada langkah pertama ini, dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Pada langkah pengkajian, bidan mengumpulkan semua informasi akurat dan lengkap dari beberapa sumber yang berkaitan dengan kondisi klien dengan cara wawancara

klien, suami, keluarga dan dari catatan/dokumentasi pasien untuk memperoleh data subjektif. Sementara itu, data objektif dilakukan dengan melakukan observasi dan pemeriksaan.

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamneses meliputi : melakukan tanya jawab untuk memperoleh biodata meliputi: riwayat kesehatan, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan, nifas, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial, ekonomi, dan psikologis, serta keadaan klien meliputi: HPHT, HTP, pergerakan janinnya, umur kehamilan, sakit perut tembus kebelakang sejak kapan, ada pelepasan lendir dan darah.

Pemeriksaan fisik meliputi: pemeriksaan tanda-tanda vital, keadaan umum klien, dan pemeriksaan fisik dilakukan secara: inspeksi, palpasi meliputi: leopard I (mengetahui TFU dan umur kehamilan), leopard II (mengetahui dimana letak punggung dan bagian terkecil dari janin apakah dikiri/dikanan perut ibu), leopard III (mengetahui bagian terendah janin), leopard IV (mengetahui sejauh mana bagian terendah janin masuk PAP). Auskultasi DJJ dengan menggunakan lenek untuk mendengar bunyi jantung janin.

Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium (Hb, Albumin, Reduksi), Ultrasonografi (USG), dan catatan terbaru sebelumnya.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan, oleh karena itu proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus

komprehensif meliputi data subjektif objektif, dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien sebenarnya.

b. Langkah 2: Identifikasi diagnosis dan masalah

Mengidentifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasi sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Rumusan diagnosis dan masalah keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis tetapi tetap membutuhkan penanganan. Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang dialami wanita yang didefinisikan oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian.

Jika didapatkan persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam pada primigravida dan 18 jam multigravida, maka dapat didiagnosis sebagai partus lama.

Jika didapatkan persalinan kala II yang berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida, maka dapat didiagnosis sebagai kala II lama.

c. Langkah 3: Identifikasi diagnosis dan masalah potensial

Pada langkah ini dilakukan identifikasi diagnosa atau masalah potensial yang berdasarkan hasil pengkajian dari data subjektif dan data objektif. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman. Sehubungan dengan teori kasus

persalinan kala II lama penderita tampak kelelahan, pucat, mata cekung, dan berkeringat dingin, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah menurun dan suhu tubuh meningkat, his mulai melemah. Sehingga keadaan ibu dapat mempengaruhi janin.

Pada persalinan kala II lama masalah-masalah yang mungkin terjadi pada ibu yaitu infeksi intra partum, ruptur uteri, cincin retraksi patologis, pembentukan fistula, cedera otot-otot dasar panggul.

Pada janin masalah-masalah yang mungkin terjadi yaitu : kaput sucsadeneum, molase kepala janin, kematian janin dalam kandungan, dan kematian janin intrapartum (Prawirohardjo, 2010).

d. Langkah 4: Identifikasi kebutuhan segera

Pada langkah ini bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan petugas lain berdasarkan kebutuhan klien. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses terus-menerus ini menghasilkan data baru yang segera dinilai, data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan darurat dimana bidan harus segera bertindak untuk menyelamatkan klien dengan melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemasangan infus dengan drips oksitosin.

Dalam persalinan kala II lama diperlukan kolaborasi dengan dokter kandungan untukantisipasi terjadinya komplikasi terhadap ibu yaitu dengan perawatan pendahuluan dengan pemberian suntikan kortone 100-200 mg intra muskuler, penisilin kokain 1 juta IU intra muskuler, dan infus cairan larutan garam fisiologis, larutan glukosa 5-10% pada jam pertama : 1 liter/jam.

Selain kolaborasi dengan dokter kandungan dalam persalinan kala II lama juga perlu dilakukan kolaborasi dengan dokter anak. Untuk memberikan pertolongan pertama pada bayi baru lahir dengan persalinan kala II lama. Penyediaan O₂, suction, infant warmer dan persiapan inkubator serta obat-obat.

e. Langkah 5: Menyusun rencana asuhan menyeluruh (intervensi)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, langkah ini merupakan kelanjutan dari masalah yang telah diidentifikasi. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan teori persalinan kala II lama harus ditolong di Rumah Sakit untuk perbaikan keadaan umum ibu, pemeriksaan lebih lanjut, pengkajian masalah persalinan kala II lama, pemasangan infus dengan drips oksitosin, pemantauan lebih lanjut, serta intervensi hal-hal dapat mempercepat proses persalinan.

Merencanakan pemantauan djj, nadi dan his tiap 30 menit. Dan memastikan djj dalam batas normal (120-160 kali per menit). Nadi (60-100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat.

Merencanakan kolaborasi dengan dokter kandungan untuk pemasangan infuse dengan drips oksitosin 5 IU intra muskuler.

Merencanakan asuhan persalinan sesuai dengan APN. Dan dilaksanakan secara hati-hati karena kondisi bayi yang sudah lama di jalan lahir.

Merencanakan penanganan bayi baru lahir. Bebaskan jalan napas, mengeringkan bayi, mencegah hipotermi, mencegah infeksi.

Merencanakan pertolongan pertama terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi pada bayi baru lahir dengan persalinan kala II lama. Penyediaan suction, O₂, infant warmer dan inkubator.

f. Langkah 6: Pelaksanaan rencana asuhan (implementasi)

Pada langkah ini pelaksanaan asuhan langsung secara efisien dan aman yang dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan dan sebagian oleh pasien. Meski telah berkolaborasi dengan dokter, bidan tetap bertanggung jawab dalam manajemen asuhan klien agar penanganan kasus pada persalinan kala II lama dapat teratasi.

Pada langkah ini direncanakan asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Realisasi dari perencanaan sebagian dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota keluarga yang lain. Jika bidan tidak melakukan asuhannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab atas terlaksananya seluruh perencanaan. Pada situasi dimana ia harus berkolaborasi dengan dokter, misalkan karena pasien mengalami komplikasi, bidan masih tetap bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu, biaya, dan meningkatkan mutu asuhan (Nugraheny, 2010). Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan kala II lama sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

g. Langkah 7: Evaluasi

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang telah diberikan. Hal ini yang dievaluasi meliputi apa ibu sudah mengerti penjelasan yang diberikan, apa ibu sudah melakukan apa yang telah dianjurkan dan telah diajarkan, bagaimana keadaan umum ibu, mengukur tanda-tanda vital untuk memantau keadaan ibu, apa kecemasan ibu teratasi, dan apakah persalinan kala II lama dapat teratasi.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan kepada pasien. Kita mengacu kepada beberapa pertimbangan yaitu tujuan asuhan kebidanan, efektifitas tindakan untuk mengatasi masalah, dan hasil asuhan (Nugraheny, 2010). Hasil yang diharapkan dari manajemen kebidanan pada ibu bersalin dengan kala II lama adalah dapat dilakukan partus secara spontan, komplikasi akibat tindakan medik dapat diatasi serta ibu dan janin dalam keadaan baik dan sehat (Purwaningsih dan Fatmawati, 2010).

h. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Asuhan yang telah dilakukan harus dicatat secara benar, jelas, singkat, logis dalam suatu metode pendokumentasian. Pendokumentasian yang benar adalah pendokumentasian yang dapat mengkomunikasikan kepada orang lain mengenai asuhan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan pada seseorang klien, yang didalamnya tersirat proses berpikir yang sistematis seorang bidan dalam menghadapi seorang kliensesuai langkah-langkah dalam proses manajemen kebidanan.

Menurut Helen Varney, alur berpikir bidan dalam menghadapi klien meliputi 7 langkah. Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berpikir sistematis, didokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu S (Subjektif), menggambarkan pendokumentasian pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah 1 Varney, O (Objektif), menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnostic lain yang dirumuskan dalam data focus untuk mendukung asuhan sebagai langkah 2 Varney, A (Assesment), menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi, diagnosis/masalah, antisipasi diagnosis/masalah potensial, perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan sebagai langkah 3, 4 dan 5 Varney. P (Plan), menggambarkan pendokumentasian dan tindakan (Implementasi) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan assesment sebagai langkah 6, dan 7 Varney (Salmah, 2006).

SOAP adalah catatan yang bersifat sederhana, jelas, logis dan tertulis. Seorang bidan hendaknya menggunakan SOAP setiap kali ia bertemu dengan pasiennya. Selama masa antepartum, seorang bidan dapat menuliskan satu catatan SOAP untuk setiap kali kunjungan; sementara dalam masa intrapartum, seorang bidan boleh menuliskan lebih dari satu catatan untuk satu pasien dalam satu hari. Selain itu juga, seorangbidan harus melihat catatan-catatan SOAP terdahulu

bilamana ia merawat seorang klien untuk mengevaluasi kondisinya sekarang (Yulifah, 2014).

D. Tinjauan islam tentang terjadinya persalinan dengan persalinan kala II lama

Proses persalinan merupakan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT, dimana proses ini dimulai dengan membukanya serviks uteri yang terjadi adanya penekanan janin yang mendorong keluar hingga janin lahir ke dunia.

Proses ini tidak hanya berlangsung begitu saja, akan tetapi memerlukan perjuangan yang besar dari seorang ibu untuk melahirkan bayinya dan proses ini menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat yang berasal dari penekanan janin akibat adanya proses pengeluaran janin itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS, Maryam (19): 23

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّوَسِيًّا ﴿٢٣﴾

Artinya :

“Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: “Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan.”

Kata (المخاض) al-makhadh terambil dari kata al-makhdh yaitu gerak yang sangat keras. Desakan janin untuk keluar melalui rahim mengakibatkan pergerakan anak dalam perut dan mengakibatkan kontraksi sehingga

menimbulkan rasa sakit. Dari sini, kata tersebut dipahami dalam arti *sakit yang mendahului kelahiran anak* (Shihab hal 430).

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa sakit akibat persalinan yang dirasakan oleh Maryam sangatlah luar biasa, ia lebih memilih mati daripada merasakan sakit akibat persalinan, dari hal itu dapat tergambarakan rasa sakit yang begitu besar ketika terjadinya proses persalinan. Pada persalinan yang dirasakan oleh ibunda Nabi Isa AS, merupakan proses persalinan yang berlangsung normal dimana persalinan pada kala II berlangsung 1-2 jam, sedangkan proses persalinan yang dirasakan oleh klien dengan persalinan kala II lama berlangsung lebih dari 2 jam, dari waktu tersebut dapat diketahui betaapa sakit yang dirasaka oleh klien dengan persalinan kala II lama dimana persalinannya berlangsung abnormal.

Orang yang sakit hendaknya menerima sakit yang diberikan oleh Allah dengan lapang dada. Disamping itu, ia juga harus berusaha bersabar dalam menerima segala ketentuan_Nya. Sabda Rasulullah yang artinya :”sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jika mereka mendapat kebaikan, maka mereka bersyukur, dan itu baik baginya. Seandainya mereka ditimpa keburukan (musibah), mereka akan bersabar, dan itu baik baginya” (HR. Muslim).

Oleh karena itu, dalam menghadapi persalinan dibutuhkan persiapan, baik itu berupa persiapan fisik, psikis dan sosial. Persiapan fisik berupa ibu untuk mengejan, sedangkan persiapan psikis berupa kesiapan ibu secara emosional dalam menghadapi persalinan dan adappun persiapan sosial yaitu

berupa kesiapan ibu untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik itu berupa interaksi dengan tenaga kesehatan yang menangani persalinan ibu maupun interaksi dengan keluarga ibu. Tetapi dalam Islam, persiapan tersebut dimaknakan sebagai kekuatan iman.

Pada saat persalinan ibu harus berjuang menahan rasa sakit yang amat sangat, dan alangkah sia-sianya apabila perjuangan itu berlalu begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Seorang ibu yang akan berjuang (melahirkan) tentunya harus mutlak bergantung kepada pertolongan Allah, sedangkan para bidan atau dokter hanya membantu saja. Disinilah nilai tambah dari persalinan islami, proses persalinan akan dialami dengan menggantungkan harapan pada Allah. Dzikir dan doa akan menguatkan jiwanya dan di sisi lain kebaikan serta pahala akan dia dapatkan. Adapun dzikir dan doa yang biasa dibacakan kepada wanita yang hendak melahirkan yaitu firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ۗ

Artinya :

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu yang bersalin bukanlah sesuatu hal yang menyusahkan, karena proses tersebut merupakan suatu proses fisiologis dalam melahirkan janin keluar. Selain itu, secara tidak langsung ayat diatas memerintahkan kita

untuk selalu *berkhusnusan* (berprasangka baik) kepada Allah SWT, karena sesungguhnya kesusahan yang terjadi merupakan proses awal dalam menyambut kebahagiaan dalam kelahiran seorang bayi yang sudah lama dinanti kelahirannya. Oleh karena itu, hendaknya seorang ibu yang sedang bersalin berdoa agar persalinannya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl (27): 62

أَمِّنْ مِّجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ...

Artinya:

”...atau siapakah yang memperkenalkan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya...”

Ayat diatas menghendaki kita untuk selalu berdoa disetiap segi kehidupan yang kita jalani, seperti dalam proses persalinan. Dalam berdoa kita harus yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa kita sebagaimana penjelasan dalam firmanNya diatas, namun kita seharusnya mengetahui bagaimana cara berdoa agar doa kita diterima Allah SWT, dalam berdoa kita hendaknya merendahkan diri dihadapan Allah, dengan penuh harap doa kita terkabulkan.

Allah Mahakuasa melakukan apa saja. Dia mampu menjadikan segala kemudahan menjadi sesuatu yang sulit, juga sesuatu yang sulit menjadi mudah. Tidak ada yang susah bagi-Nya, karena Dia Maha kuasa atas segala-galanya. Karenanya ketika menghadapi kesulitan dan berbagai cobaan hidup, orang yang beriman tidak pernah menjadi lemah semangat. Masih ada Allah yang bisa kita minta dan mohon pertolongan-Nya. Maka kita diperintahkan

untuk berdoa saat mengalami kesulitan dan berperilaku sesuai dengan ayat al-quran (Abdurrahman, dkk. 2007).

Makna dari doa diatas, bahwa Allah tidak menjadikan segala sesuatu mudah bagi manusia. Tidak ada kemudahan bagi mereka, kecuali apa yang Allah jadikan mudah. Dan sesungguhnya kemudahan adalah yang Allah jadikan mudah. Sebaliknya, kesulitan dan kesusahan jika Allah kehendaki bisa menjadi mudah dan ringan. Sebagaimana kemudahan dan perkara ringan bisa menjadi mudah dan ringan. Sebagaimana kemudahan dan perkara ringan bisa menjadi sulit dan berat, jika Allah menghendakinya. Karena semua perkara berada di tangan Allah *'Azza wa Jalla* (www.voa-islam.com).

Selain berdoa, ibu yang sedang bersalin hendaknya bersabar dalam menghadapi rasa sakit dalam persalinan dengan beradaptasi terhadap nyeri yang dirasakan dengan cara tidak berteriak-teriak saat his timbul. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 153

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Ayat diatas memerintahkan kita untuk selalu meminta pertolongan dengan sabar dan melakukan sholat, terutama bagi ibu yang sedang menjalani proses persalinan. Kita tidak boleh bersikap sombong dengan tidak berdoa disaat proses persalinan berlangsung, karena tidak semua proses persalinan berlangsung normal apalagi jika memang telah jelas bahwa persalinan

berlangsung abnormal seperti persalinan kala II lama, maka doa dan kepasrahan diri kepada Allah sebagai penolong yang Maha Kuasa sangat diperlukan. Agar hati selalu tenang dan persalinan dapat menjadi mudah, serta kesulitan yang terjadi dapat tertangani dengan baik tanpa menimbulkan komplikasi yang mengikutinya. Kita harus yakin bahwa pertolongan akan datang untuk hambanya yang meminta pertolongan_Nya.

Demikian proses persalinan berlangsung, merupakan suatu proses yang indah dan luar biasa karena didalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Proses persalinan memang menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat, akan tetapi Allah SWT sedang menyampaikan pesan bahwa kebahagiaan haruslah melalui hal tersebut, kebahagiaan dalam menyambut buah hati haruslah merasakan sakit karena persalinan. Olehnya itu, ibu yang sedang bersalin hendaknya menyerahkan semua hal yang terjadi kepada Allah SWT dengan sabar dan tawaqal, serta selalu mengingat Allah dalam dzikirnya dan menyadari bahwa hal yang sedang terjadi pada dirinya merupakan suatu proses dalam menyambut kebahagiaan.

Adapun sebagai seorang bidan perlu menyadari dan memahami posisi ibu, dan memberikan pelayanan yang seikhas dan semaksimal mungkin dalam proses persalinan ibu, agar rasa sakit untuk melahirkan dapat terasa berkurang, baik dari segi fisik maupu psikis/emosional. Memberikan pelayanan dari hati sesuai dengan sumpah/janji yang telah diucapkan dihadapan Allah SWT, yaitu memberikan pelayanan tanpa membedakan pangkat, kedudukan, golongan, dan agama. Akan tetapi, yang paling mendasar dan harus ditanamkan dalam diri seorang bidan yang muslimah dan professional yaitu melaksanakan tugas

dan tanggung jawab bukan karena harta/uang, ataupun karena faktor dari manusianya, akan tetapi semata-mata karena ibadah kepada Allah SWT karena menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, dan segala sesuatunya akan kembali kepada pemiliknya yaitu Dzat yang Maha Memiliki, *Allah Azza wa Jallah.*



BAB III

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI
PADANY “R” DENGAN PERSALINAN KALA II LAMA
DI RSKDIA PERTIWI MAKASSAR

TANGGAL 26 MEI 2016

No. Registrasi : 08 83 07
Tgl. MRS : 26 Mei 2016 jam 09.55 wita.
Tgl. Pengkajian : 26 Mei 2016 jam 09.55 wita.
Tgl. Partus : 26 Mei 2016 jam 22.30 wita.
Nama Mahasiswa : Nur Hikma

KALA I

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/Suami

Nama : Ny. “R” / Tn. “M”
Umur : 23 thn / 23 thn
Nikah / Lamanya : 1x / ± 1 thn
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : jl. Veteran selatan No. 12

B. Data Biologis

1. Keluhan utama : Ibu mengatakan sakit perut tembus ke belakang disertai pelepasan lendir dan darah.
2. Riwayat keluhan utama
 - a. Sakit dirasakan sejak tanggal 25 Mei 2016 jam 23.00 wita.
 - b. Lokasi mulai dari perut tembus ke belakang.
 - c. Sifat his hilang timbul.
 - d. Usaha ibu untuk mengatasi keluhannya yaitu dengan mengurut-urut punggungnya sambil berjalan-jalan.

C. Riwayat kesehatan yang lalu

1. Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi dan diabetes melitus.
2. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit menular.
3. Ibu mengatakan tidak pernah minum alkohol dan merokok.
4. Ibu mengatakan tidak pernah menjalani operasi.
5. Ibu mengatakan tidak pernah mengonsumsi obat-obatan dan jamu selama hamil.

D. Riwayat reproduksi

1. Menarche : umur 14 tahun
2. Siklus : 28-30 hari
3. Lama : 6-7 hari

4. Disminorhoe : tidak ada nyeri pada saat haid.

E. Riwayat kehamilan sekarang

1. Ibu mengatakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya.
2. Ibu mengatakan haid terakhir tanggal 27 Agustus 2015.
3. Ibu mengatakan bahwa kehamilannya sudah \pm 9 bulan.
4. Ibu mengatakan pergerakan janinnya mulai dirasakan sejak bulan January sampai sekarang.
5. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat terutama pada perut sebelah kiri.
6. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil.
7. Ibu mengatakan sudah mendapat imunisasi TT sebanyak 2 x, yaitu tanggal 14 Desember 2015 dan pada tanggal 8 February 2016 di RSKDIA Pertiwi.

F. Riwayat keluarga berencana

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB sebelumnya karena ingin punya anak.

G. Pemenuhan kebutuhan dasar

1. Pola Nutrisi
 - a. Saat hamil
 - a) Frekuensi 3 kali dengan porsi 1 piring.
 - b) Pola makanan nasi, sayur, buah-buahan dan kadang-kadang minum susu.
 - c) Nafsu makan baik.
 - d) Minum 6-8 gelas perhari.

- b. Selama inpartu
 - a) Pola makan tidak teratur.
 - b) Nafsu makan kurang.
 - c) Kebutuhan minum \pm 3 gelas.
2. Pola Eliminasi
 - a. Saat hamil
 - a) Buang Air Besar (BAB) 1 x sehari.
Warna kekuning-kuningan
Konsisten lunak
 - b) Buang Air Kecil (BAK) 4-5 x sehari.
Warna kuning muda berbau amonia
 - b. Selama inpartu
Ibu belum pernah BAB, BAK 5 kali
3. Istirahat
 - a. Saat hamil
 - a) Pola tidur 2 x sehari
Tidur siang (14.00-15.00 wita)
Tidur malam (21.00-05.00 wita)
 - b. Selama inpartu
Ibu berbaring ditempat tidur karena rasa nyeri yang dialami
4. Personal Hygiene
 - a. Saat hamil
 - a) Kebersihan rambut ; keramas 2 x seminggu.

- b) Kebersihan mulut ; sikat gigi sehabis makan, mandi dan sebelum tidur.
- c) Kebersihan badan ; mandi 2 x sehari menggunakan sabun mandi.
- d) Kebersihan genetalia ; ibu memebersihkan alat genetalia nya setiap mandi dan sehabis BAK dan BAB.

H. Pemeriksaan fisik

1. Keadaan umum

- a. Wajah Nampak meringis
- b. Ibu Nampak lemah
- c. Kesadaran komposmentis
- d. LILA : 26 cm
- e. TB : 158 cm
- f. Berat Badan :
 - 1. Berat badan sebelum hamil : 48 kg
 - 2. Berat badan selama hamil : 55 kg
- g. Tanda Tanda Vital
 - TD: 110/70 mmHg
 - N : 80 x/menit
 - S : 36,7°C
 - P : 20 x/menit

2. Muka

Inspeksi : ekspresi wajah napak meringis.

Palpasi : tidak ada oedema pada wajah.

3. Mata

Inspeksi : konjungtiva merah muda dan sclera tidak icterus.

4. Gigi dan mulut

Gigi dan mulut bersih, keadaan gigi lengkap dan tidak ada caries, gusi berwarna merah.

5. Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe, kelenjar tyroid dan vena jugularis.

6. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk, hiperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi : tidak ada benjolan dan tidak ada nyeri tekan.

7. Abdomen

Inspeksi : tampak adanya stria livide, tonus otot abdomen tegang, tidak ada luka bekas operasi.

Palpasi : Leopold I : TFU 2 jbpx, 30 cm teraba bokong di fundus

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

- Pengukuran lingkar perut : 104 cm

- Auskultasi

DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit.

Kontraksi uterus

Pukul 10.00 wita his 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 25-30 detik

8. Genetalia

Inspeksi : tampak adanya pengeluaran lendir dan darah, tidak tampak adanya oedema dan tidak ada varises.

Pemeriksaan dalam (VT)

Tanggal 26 Mei 2016, Jam 10.00 wita

1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan
2. Porsio : Lunak dan tebal
3. Pembukaan : 2 cm
4. Ketuban : Utuh
5. Presentasi : Kepala dengan UUK kanan belakang
6. Penurunan : Hodge I
7. Molase : Tidak ada
8. Penumbungan : Tidak ada
9. Kesan panggul : Normal
10. Pelepasan : Lendir

12. Ekstremitas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : tidak ada oedema.

I. Data Psikologis

1. Ibu berencana melahirkan di RSKDIA Pertiwi Makassar.

2. Ibu senang dengan kehamilannya dan berharap anaknya segera lahir.
3. Ibu ditemani keluarganya selama proses peralihan.

J. Data spiritual

Selama persalinan ibu berdoa kepada untuk keselamatan diri dan bayinya.

LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa/masalah aktual : GI P0 A0, umur kehamilan 38-40 minggu, Letak memanjang, Intra uterine, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik, Keadaan ibu baik, inpartu kala I fase laten

1. GI P0 A0

DS : - ibu mengatakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya

DO : - tampak stria livide

- Tonus otot abdomen tegang

leopold I : TFU 2 jbp^x, 30 cm teraba bokong di fundus

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

Auskultasi : DJJ terdengr jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit.

Analisa dan interpretasi data

- Pada primigravida tonus otot tegang karena belum pernah mengalami peregangan sebelumnya.
- Pada kehamilan, uterus membesar mengikuti pertumbuhan janin disebabkan hipertropi otot polos dan serabut-serabut kolagen menjadi higroskopik akibat meningkatnya hormon estrogen.
- Pada kulit terdapat pigmen dan hiperpigmentasi alat-alat tertentu yang melanopore stimulating hormone yang meningkat pada masa kehamilan dimana hormon ini dikeluarkan oleh lobus anterior hipofise.
- Dan yang teraba bagian-bagian besar janin, terdengar denyut jantung janin serta adanya gerakan janin pada saat palpasi menandakan ibu dalam keadaan hamil.

2. Gestasi 38-40 minggu

DS : - Ibu mengatakan haid terakhir tanggal 14 September 2015

- Ibu mengatakan umur kehamilannya sudah 9 bulan

DO : - tanggal pengkajian 26 Mei 2016

- Leopold I : TFU 2jbp, 30 cm

Analisa dan interpretasi data

- Berdasarkan rumus Naegele dari HPHT ibu tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal pengkajian 26 Mei 2016 maka gestasi 274 hari atau 39 minggu 1 hari.

3. Letak memanjang

DS : - Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan bawah perutnya.

DO : - Leopold I : TFU 2 j bpx, 30 cm teraba bokong

- Leopold II : punggung kanan

- Leopold III : kepala

Analisa dan interpretasi data

- Pada palpasi Leopold II disatu sisi teraba struktur dan resisten adalah punggung dan disisi lain terdapat bagian-bagian kecil dan janin. Bunyi jantung janin terdengar lebih baik dipunggung janin daripada persentasi verteks dan bokong, biasanya bunyi jantung janin dihantarkan melalui lambung janin (punggung) yang terletak paling dekat dengan uterus.
- Letak janin dalam kehamilan sesuai dengan sumbu ibu dimana letak sumbu janin terdapat sumbu yang memanjang.

4. Intra uteri

DS : - ibu mengatakan selama hamil tidak ada nyeri perut

DO : - pada saat palpasi ibu tidak merasa nyeri

- Pembesaran perut sesuai umur kehamilan

- Leopold I : TFU 2 j bpx, 30 cm teraba bokong di fundus

- Leopold II : punggung kanan

- Leopold III : kepala

- Leopold IV : BDP 4/5

- Auskultasi : DJJ terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit.

Analisa dan interpretasi data

- Bagian dari uterus yang merupakan tempat perkembangan janin adalah kavum uteri dimana pada bagian ini hasil konsepsi dapat tumbuh dan berkembang hingga aterm tanpa menyebabkan adanya rasa nyeri.
- Letak janin dalam kehamilan sesuai dengan sumbu ibu dimana letak sumbu janin terdapat sumbu yang memanjang.

5. Tunggal

DS : - ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan bawah perutnya.

DO : - Leopold I : TFU 2jbp, 30 cm teraba Bokong di fundus

- Leopold II : punggung kanan

- Leopold III : kepala

- Leopold IV : BDP, 4/5

- Djj terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit.

- Pembesaran perut sesuai umur kehamilan.

Analisa dan interpretasi data

- Pembesaran perut sesuai umur kehamilan, teraba 1 kepala dan bokong dan terdengar djj pada satu tempat yaitu kuadran kanan bawah serta pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu pada sebelah kanan perutnya.

Hal ini menandakan tunggal.

6. Hidup

DS : - ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan bawah perutnya

DO : - auskultasi djj terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit.

Analisa dan interpretasi data

- Adanya pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu saat pngkajian dan djj terdengar jelas menandakan jantung janin berfungsi dengan baik menandakan janin hidup.

7. Keadaan janin baik

DS : - ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan bawah perutnya.

DO : - djj terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit.

Analisa dan interpretasi data

Adanya pergerakan janin yang dirasakan ibu serta terdengarnya Djj 138 x/menit yang dalam batas normal, teratur menandakan janin hidup dan baik.

8. Keadaan ibu baik

DS : - ibu mengatakan tidak pernah mengalami penyulit yang serius

DO : - konjungtiva merah muda dan sclera tampak bersih

- Tidak ada oedema pada wajah dan tungkai

Tanda Tanda Vital :

TD : 110/70 mmhg

N : 80 x/menit

S : 36,7⁰C

P : 20 x/menit

Analisa dan interpretasi data

- Tekanan darah 110/70 mmHg dalam batas normal menandakan ibu dalam keadaan (tidak pre eklampsia/eklsampsia) dan tidak ada oedema pada wajah.
- Konjungtiva merah muda normal menandakan ibu tidak anemis dan sclera putih bersih menandakan ibu tidak icterus.

9. Inpartu kala I fase laten

DS : - Ibu mengatakan sakit perut tembus belakang

- Ibu mengatakan adanya pengeluaran darah dari jalan lahir

DO : - Genetalia luar Nampak ada pelepasan lendir dan darah

- Hasil pemeriksaan dalam jam 10.00 wita

1. Porsio : Lunak dan tebal
2. Pembukaan : 2 cm
3. Ketuban : Utuh
4. Presentasi : Kepala dengan UUK kanan belakang
5. Penurunan : Hodge I
6. Molase : Tidak ada

Analisa dan interpretasi data

- Pada saat 1-2 minggu sebelum persalinan kadar hormone progesterone dan estrogen mulai menurun sehingga fungsinya akan berkurang yang menyebabkan kekejangan pembuluh darah sehingga menimbulkan hisatau

kontraksi dari uterus. Pada waktu kontraksi uterus (His) otot-otot akan mengalami anoxia yang akan menyebabkan nyeri.

- Pada saat pae maker memulai kontraksi gelombang his akan bergerak ke dalam dan ke bawah yaitu fundus, korpus dan seluruh uterus dimana otot pada fundus semakin tebal dan otot-otot uterus mengadakan retraksi sehingga otot korpus uteri lebih pendek dan dengan sendirinya serviks yang kurang mengandung otot dan banyak mengandung kolagen akan mudah tertarik dan membuka.

LANGKAH III. ANTISIPASI MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data menunjang

LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY ATAU KOLABORASI

Tidak ada indikasi

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Diagnosa aktual : GI P0 A0, umur kehamilan 38-40 minggu, Letak memanjang, Intra uterine, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik, Keadaan ibu baik, inpartu kala I fase laten

Tujuan : - kala I dalam batas normal
- Kondisi ibu dan janin baik

Kriteria : - kala I tidak melebihi 13 jam

- Kontraksi adekuat 3-4 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik
- Djj teratur dan kuat dalam batas normal (120-160 x/menit)
- Tanda Tanda Vital dalam batas normal

TD : 100-130/70-90 mmHg

N : 60-80 x/menit

S : 36,5-37,5⁰C

P : 20-24 x/menit

Intervensi tanggal 26 Mei 2016

1. Anjurkan ibu untuk BAK dan cuci kaki

Rasional : kandung kemih yang kosong dapat memberi rasa nyaman pada ibu dan mempercepat proses turunnya bagian terendah janin, cuci kaki untuk mencegah terjadinya infeksi.

2. Observasi his dan Djj tiap 30 menit

Rasional : kontraksi uterus merupakan tanda inpartu dan adanya kemajuan persalinan serta untuk memantau keadaan janin.

3. Observasi Tanda Tanda Vital tiap 4 jam

Rasional : memantau keadaan umum ibu

4. Monitor kemajuan persalinan tiap 4 jam bila ada indikasi dengan pemeriksaan dalam

Rasional : untuk memantau majunya persalinan.

5. Atasi nyeri yang sangat berlebihan pada ibu

Rasional : nyeri yang berlebihan pada ibu dapat mengganggu proses persalinan.

6. Anjurkan ibu untuk bernafas panjang saat ada his

Rasional : suplai O₂ dalam jaringan dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan.

7. Dampingi ibu

Rasional : ibu merasa aman dan diperhatikan.

8. Beri support pada ibu dan keluarga

Rasional : agar ibu dan keluarga tetap bersemangat dan optimis dalam menghadapi persalinan dan kelahiran.

9. Pantau kemajuan dengan menggunakan partograf

Rasional : dengan partograf dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis dan rencana asuhan selanjutnya.

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI

Implementasi tanggal 26 Mei 2016 jam 10.00 – 20.00 wita

1. Mengobservasi his dan djj tiap 30 menit dan TTV tiap 4 jam serta kemajuan persalinan tiap 2-4 jam

Pukul 10.30 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 138 x/menit, N ; 80 x/menit

Pukul 11.00 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 136 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 11.30 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 138 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 12.00 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 140 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 12.30 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 138 x/menit, N : 82 x/menit

Pukul 13.00 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 138 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 13.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 140 x/menit, N ; 80 x/menit

Pukul 14.00 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 138 x/menit, TD : 110/70 mmHg, N : 80x/menit, S : 36,7⁰C, P : 22 x/menit

VT₂ oleh bidan Pur dan Nur Hikma

1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan
2. Porsio : Lunak dan tebal
3. Pembukaan : 4 cm
4. Ketuban : Utuh
5. Presentasi : Kepala dengan UUK kanan lintang
6. Penurunan : Hodge II
7. Molase : Tidak ada
8. Penumbungan : Tidak ada
9. Kesan panggul : Normal
10. Pelepasan : Lendir dan darah

Pukul 14.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 138 x/menit, N : 82 x/menit

Pukul 15.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 140 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 15.30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 142 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 16.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 140 x/menit, N : 82 x/menit

Pukul 16.30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 138 x/menit, N : 82 x/menit

Pukul 17.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit, N : 84 x/menit

Pukul 17.30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 18.00 wita his 4 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit, TD : 110/70 mmHg, N : 80x/menit, S : 36,7⁰C, P : 24 x/menit

VT₃ oleh bidan Maya

1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan
2. Porsio : Lunak dan tebal
3. Pembukaan : 8 cm
4. Ketuban : Utuh
5. Presentasi : Kepala dengan UUK kanan lintang
6. Penurunan : Hodge II-III
7. Molase : Tidak ada
8. Penumbungan : Tidak ada

9. Kesan panggul : Normal

10. Pelepasan : Lendir dan darah

Pukul 18.30 wita his 4 x 10 menit durasi 35-40 djj 134 x/menit, N : 82
x/menit

Pukul 19.00 wita his 3 x 10 menit durasi 40-45 djj 140 x/menit, N : 80
x/menit

Pukul 19.30 wita his 3 x 10 menit durasi 40-45 djj 142 x/menit, N : 82
x/menit

Pukul 20.00 wita his 3 x 10 menit durasi 40-45 djj 132 x/menit, N : 82
x/menit

VT₄ oleh bidan Maya dan Hikma

1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan

2. Porsio : melesap

3. Pembukaan : 10 cm

4. Ketuban : pecah jernih

5. Presentasi : kepala dengan UUK depan

6. Penurunan : Hodge III-IV

7. Molase : Tidak ada, terdapat caput

8. Penumbungan : Tidak ada

9. Kesan panggul : Normal

10. Pelepasan : air ketuban jernih

2. Mengatasi nyeri yang sangat pada ibu

3. Menganjurkan ibu untuk bernafas panjang pada saat ada his

4. Memberi minum pada ibu
5. Mendampingi ibu
6. Memberi support dan motivasi pada ibu
7. Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf

LANGKAH VII. EVALUASI

Tanggal 26 Mei 2016 jam 20.00 wita

1. Ibu mengatakan mempunyai dorongan untuk meneran
2. Ibu mengatakan terasa ingib BAB
3. His 3 x 10 menit durasi 40-45 detik
4. Djj 132 x/menit
5. Tanda Tanda Vital
 - TD : 110/70 mmHg
 - N : 82 x/menit
 - S : 36,7⁰C
 - P : 22 x/menit
6. Pemeriksaan dalam
 1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan
 2. Porsio : melelap
 3. Pembukaan : 10 cm
 4. Ketuban : pecah jernih
 5. Presentasi : Kepala dengan UUK depan
 6. Penurunan : Hodge III-IV

7. Molase : Tidak ada, terdapat caput
8. Penumbungan : Tidak ada
9. Kesan panggul : Normal
10. Pelepasan : air ketuban jernih
7. Keadaan ibu lelah



PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI**PADA NY "R" DENGAN PERSALINAN KALA I FASE LATEN****DI RSKDIA PERTIWI MAKASSAR****TANGGAL 26 MEI 2016**

No. Registrasi : 08 83 07

Tgl. MRS : 26 Mei 2016 jam 09.55 wita.

Tgl. Pengkajian : 26 Mei 2016 jam 09.55 wita.

Tgl. Partus : 26 Mei 2016 jam 22.30 wita.

Nama Mahasiswa : Nur Hikma

Identitas istri/Suami

Nama : Ny. "R" / Tn. "M"

Umur : 23 thn / 23 thn

Nikah / Lamanya : 1x / ± 1 thn

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : jl. Veteran selatan No. 12

KALA I

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan sakit perut tembus belakang tanpa pelepasan lendir dan darah
2. Sakit dirasakan sejak tanggal 25 Mei 2016 jam 23.00 wita
3. Usaha ibu untuk mengatasi keluhannya yaitu dengan mengurut-urut punggungnya sambil berjalan-jalan
4. Ibu tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, penyakit menular, tidak pernah menjalani operasi, tidak pernah mengonsumsi obat-obatan dan jamu selama hamil
5. Ibu mengatakan haid terakhir tanggal 27 Agustus 2015
6. Ibu mengatakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya
7. Ibu mengatakan bahwa kehamilannya sudah 9 bulan
8. Ibu merasakan pergerakan janinnya pada satu tempat yaitu sebelah kiri
9. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut hebat selama hamil
10. Ibu mengatakan sudah mendapat imunisasi TT sebanyak 2 x, yaitu tanggal 14 Desember 2015 dan pada tanggal 8 February 2016 di RSKDIA Pertiwi

Data Objektif (O)

1. GI P0 A0
2. HTP 3 Juni 2016
3. Wajah ibu Nampak meringis
4. Kesadaran komposmentis
5. Tanda Tanda vital

TD: 110/70 mmHg

N : 80 x/menit

S : 36,7°C

P : 20 x/menit

7. Ekspresi wajah nampak meringis
8. Tidak ada oedema pada wajah
9. Konjungtiva merah muda dan sclera tidak icterus
10. Tampak adanya striae livide, tonus otot abdomen tegang, tidak ada luka bekas operasi
11. Saat palpasi tidak terasa nyeri

leopold I : TFU 2jbp_x, 30 cm teraba Bokong di fundus

Leopold II : punggung kanan

Leopold III : kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

Auskultasi

Djj terdengar jelas dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit.

12. Kontraksi his 2 x 10 menit durasi 25-30 detik
13. Tampak pelepasan lendir
14. Tidak tampak adanya varices
15. Pemeriksaan dalam (VT) tanggal 26 Mei 2016 jam 10.00 wita

1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan

2. Porsio : Lunak dan tebal

3. Pembukaan : 2 cm
4. Ketuban : Utuh
5. Presentasi : Kepala dengan UUK kanan belakang
6. Penurunan : Hodge I
7. Molase : Tidak ada
8. Penumbungan : Tidak ada
9. Kesan panggul : Normal
10. Pelepasan : Lendir

Assessment (A)

GI P0 A0, umur kehamilan 38-40 minggu, Letak memanjang, Intra uterine, Tunggal, Hidup, Keadaan janin baik, Keadaan ibu baik, inpartu kala I fase laten.

Planning (P)

1. Mengobservasi his dan djj tiap 30 menit dan TTV tiap 4 jam serta kemajuan persalinan tiap 2-4 jam

Pukul 10.30 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 138 x/menit, N ; 80 x/menit

Pukul 11.00 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 136 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 11.30 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 138 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 12.00 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 140 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 12.30 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 138 x/menit, N : 82 x/menit

Pukul 13.00 wita his 2 x 10 menit durasi 25-30 djj 138 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 13.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 140 x/menit, N ; 80 x/menit

Pukul 14.00 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 138 x/menit, TD : 110/70 mmHg, N : 80x/menit, S : 36,7⁰C, P : 22 x/menit

VT₂ oleh bidan Pur dan Hikma

1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan
2. Porsio : Lunak dan tebal
3. Pembukaan : 4 cm
4. Ketuban : Utuh
5. Presentasi : Kepala dengan UUK kanan lintang
6. Penurunan : Hodge II
7. Molase : Tidak ada
8. Penumbungan : Tidak ada
9. Kesan panggul : Normal
10. Pelepasan : Lendir dan darah

Pukul 14.30 wita his 2 x 10 menit durasi 30-35 djj 138 x/menit, N : 82 x/menit

Pukul 15.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 140 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 15.30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 142 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 16.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 140 x/menit, N : 82 x/menit

Pukul 16.30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 138 x/menit, N : 82 x/menit

Pukul 17.00 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 132 x/menit, N : 84 x/menit

Pukul 17.30 wita his 3 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit, N : 80 x/menit

Pukul 18.00 wita his 4 x 10 menit durasi 30-35 djj 130 x/menit, TD : 110/70 mmHg, N : 80x/menit, S : 36,7⁰C, P : 24 x/menit

VT₃ oleh bidan Maya

1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan
2. Porsio : Lunak dan tebal
3. Pembukaan : 8 cm
4. Ketuban : Utuh
5. Presentasi : Kepala dengan UUK kanan lintang
6. Penurunan : Hodge II-III
7. Molase : Tidak ada
8. Penumbungan : Tidak ada

9. Kesan panggul : Normal

10. Pelepasan : Lendir dan darah

Pukul 18.30 wita his 4 x 10 menit durasi 35-40 djj 134 x/menit, N : 82
x/menit

Pukul 19.00 wita his 3 x 10 menit durasi 40-45 djj 140 x/menit, N : 80
x/menit

Pukul 19.30 wita his 3 x 10 menit durasi 40-45 djj 142 x/menit, N : 82
x/menit

Pukul 20.00 wita his 3 x 10 menit durasi 40-45 djj 132 x/menit, N : 82
x/menit

VT₄ oleh bidan Maya dan Hikma

1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan

2. Porsio : melesap

3. Pembukaan : 10 cm

4. Ketuban : pecah jernih

5. Presentasi : kepala dengan UUK depan

6. Penurunan : Hodge III-IV

7. Molase : Tidak ada, terdapat caput

8. Penumbungan : Tidak ada

9. Kesan panggul : Normal

10. Pelepasan : air ketuban jernih

4. Mengatasi nyeri yang sangat pada ibu

5. Menganjurkan ibu untuk bernafas panjang pada saat ada his

6. Memberi minum pada ibu
7. Mendampingi ibu
8. Memberi support dan motivasi pada ibu
9. Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf



KALA II

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

DS :

1. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk meneran
2. Ibu merasakan sakit pada perut tembus ke belakang
3. Ibu mengatakan ada pengeluaran lendir dan darah
4. Ibu merasa ingin BAB
5. Ibu merasa lelah

DO :

1. Kontraksi uterus 3 x 10 menit durasi 35-40 detik
2. Djj 138 x/menit
3. Nampak pelepasan lendir dan darah
4. Pemeriksaan dalam

Tanggal 26 Mei 2016, jam 20.00 wita

1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan
2. Porsio : melesap
3. Pembukaan : 10 cm
4. Ketuban : jernih
5. Presentasi : Kepala dengan UUK depan
6. Penurunan : Hodge III-IV
7. Molase : tidak ada, terdapat caput
8. Penumbungan : Tidak ada

9. Kesan panggul : Normal

10. Pelepasan : air ketuban jernih

5. Tanda Tanda Vital

TD: 110/70 mmHg

N : 80 x/menit

S : 36,7°C

P : 20 x/menit

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa Aktual : Perlangungan Kala II

DS :

1. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk meneran
2. Ibu merasakan sakit pada perut tembus ke belakang
3. Ibu mengatakan ada pengeluaran lendir dan darah
4. Ibu merasa ingin BAB

DO :

1. Kontraksi uterus 3 x 10 menit durasi 40-45 detik
2. Djj 138 x/menit
3. Perineum menonjol
4. Nampak pelepasan lendir dan darah
5. Anus membuka
6. Pemeriksaan dalam pada jam 20.00 wita

1. Porsio : melesap
2. Pembukaan : 10 cm
3. Ketuban : pecah jernih
4. Presentasi : Kepala dengan UUK depan
5. Penurunan : Hodge III-IV
6. Molase : tidak`ada, terdapat caput
7. Pelepasan : air ketuban jernih

Analisa dan interpretasi data

- Keinginan mendedan ini merupakan reflex yang ditimbulkan oleh penekanan kepala bayi pada dinding vagina, rectum.
- Serviks uteri berdilatasi sehingga membentuk suatu saluran yang akan dilewati bayi sampai mencapai dasar panggul (dilatasi sempurna). Hal ini mengakibatkan tekanan hebat pada otot dasar panggul dan bagian terendah janin menekan fleksus saraf (frankenhauser) yang mengakibatkan rasa nyeri yang bertambah.

LANGKAH III. ANTISIPASI DIGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Diagnosa potensial : partus lama, terjadinya gawat janin

DS : - terdapat pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 26 Mei 2016 jam 09.30 wita

- Terdapat caput pada kepala bayi

DO : - kontraksi uterus jam 20.00 wita his 3 x 10 menit durasi 40-45 detik, djj 132 x/menit

- Hasil pemeriksaan dalam tanggal 26 Mei 2016 jam 20.00 wita :

1. Pembukaan : 10 cm
2. Ketuban : pecah jernih
3. Presentase : kepala dengan UUK depan
4. Molase : tidak ada, terdapat kaput
5. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

Analisa dan interpretasi data

- Persalinan yang berlangsung lama dapat menyebabkan keseimbangan O₂ pada janin dapat menurun disebabkan keadaan janin yang lebih lama pada jalan lahir.
- Serta pecahnya ketuban yang menjadi pelindung bayi dapat menyebabkan cairan ketuban berkurang sedikit demi sedikit sehingga dapat menyebabkan gawat janin.

LANGKAH IV. TINDAKAN EMERGENCY

Tidak ada data yang menunjang

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN

Diagnosa aktual : perlangsungan kala II

Tujuan : Kala II berlangsung normal

Kriteria : 1. Kala II berlangsung tidak lebih dari 1-2 jam.

2. Bayi lahir dalam waktu 30,napas spontan dan segera menangis.

3. Keadaan umum ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal:

- a. TD : 100-130/70-90 mmHg
- b. N : 60-80 x/menit
- c. S : 36,5-37,5⁰C
- d. P : 20-24 x/menit

4. Jumlah darah tidak lebih dari 500 cc.

5. Ibu langsung menyusui bayinya.

1. Lakukan informed consent

Rasional : untuk memudahkan dalam melakukan tindakan dan sebagai perlindungan hukum

2. Lihat tanda dan gejala kala II (dor-ran, tek-nus, per-jol, vul-ka).

Rasional : dapat mengetahui apakah sudah dapat memimpin persalinan.

3. Siapkan peralatan pertolongan termasuk oksitosin dan spoit.

Rasional : untuk mempersiapkan peralatan siap pakai dan tidak kerepotan bila pembukaan sudah lengkap.

4. Pakai celemek.

Rasional : mempersiapkan diri sebelumnya dapat mencegah terjadinya infeksi silang dan tidak kerepotan bila pembukaan sudah lengkap.

5. Pastikan lengan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir.

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.

6. Pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi.

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.

7. Isi spoit dengan oksitosin 10 IU dengan satu tangan.

Rasional : menyiapkan peralatan dalam keadaan siap pakai.

8. Bersihkan vulva sampai ke perineum.

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.

9. Lakukan pemeriksaan dalam.

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan.

10. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5% kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit.

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.

11. Dengar denyut jantung janin setelah uterus tidak berkontraksi.

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin.

12. Beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik.

Rasional : agar ibu tidak khawatir dengan keadaan janinnya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan.

13. Minta bantuan keluarga untuk membantu ibu menyiapkan posisi ibu untuk meneran.

Rasional : dapat membantu proses persalinan.

14. Pimpinlah ibu meneran saat ada his.

Rasional : memperlancar berlangsungnya proses persalinan.

15. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman.

Rasional : dapat membantu dalam proses persalinan.

16. Pasang handuk yang bersih di atas perut ibu pada saat kepala janin terlihat di depan vulva dengan diameter 5-6 cm.

Rasional : untuk mengeringkan tubuh janin.

17. Letakkan duk 1/3 bagian di bawah bokong ibu.

Rasional : sebagai alat untuk menyokong bayi.

18. Buka bak partus.

Rasional : menyiapkan alat dalam keadaan siap pakai.

19. Pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi (DTT).

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi silang.

20. Pimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala.

Rasional : dengan menyokong perineum dapat mengurangi dan mencegah rupture perineum.

21. Periksa adanya lilitan tali pusat.

Rasional : lilitan tali pusat dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin.

22. Tunggu kepala melakukan putaran paksi luar.

Rasional : menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putaran paksi dalam.

23. Letakkan tangan secara biparetal tarik secara hati-hati ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu posterior.

Rasional : membantu pengeluaran bahu agar tidak terjadi robekan perineum.

24. Lahirkan badan bayi dengan sanggah susur.

Rasional : dengan sanggah susur dapat mencegah rupture perineum dan trauma pada bayi.

25. Telusuri punggung, bokong dan tungkai bayi.

Rasional : mengendalikan pengeluaran bayi.

26. Nilai bayi dan letakkan bayi diatas perut ibu dengan posisi kepala lebih rendah dari tubuhnya.

Rasional : dengan posisi tersebut memudahkan bayi untuk bernafas.

27. Keringkan badan bayi.

Rasional : mencegah bayi tidak hipotermi.

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI

Implementasi tanggal 26 Mei 2016, jam 20.00-22.30 wita

1. Melakukan informed consent
2. Melihat tanda dan gejala kala II (dor-ran, tek-nus, per-jol, vul-ka).
 - Adanya dorongan untuk meneran
 - Adanya tekanan pada anus
 - Perineum menonjol
 - Vulva dan anus membuka
3. menyiapkan peralatan pertolongan termasuk oksitosin dan spoit.
 - a. Bak partus yang berisi
 - 1) 1 ½ handscone
 - 2) 2 buah klem kocher
 - 3) ½ kocher
 - 4) 1 buah gunting tali pusat
 - 5) 1 buah penjepit tali pusat

- 6) Kateter
- 7) 1 buah gunting episiotomy
- 8) Kasa secukupnya

b. Bak heacting

- 1) Needle holder
- 2) Pinset anatomi
- 3) Jarum
- 4) Cutgat
- 5) Gunting benang
- 6) Kasa secukupnya

c. Obat / bahan

- 1) Cairan infuse
- 2) Oksitosin
- 3) Lidocain
- 4) Salep mata
- 5) Vitamin K
- 6) HB_o

d. Luar bak partus

- 1) Air DTT
- 2) Kapas DTT
- 3) Larutan klorin 0,5%
- 4) Tempat sampah
- 5) Tensi meter

- 6) Stetoskop
- 7) Thermometer
- 8) De lee
- 9) Lenek
- 10)Perlak

e. APD

- 1) Topi
 - 2) Masker
 - 3) Kacamata
 - 4) Celemek
4. Memakai celemek.
 5. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan,cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir.
 6. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi.
 7. Mengisi spoit dengan oksitosin 10 IU dengan satu tangan.
 8. Membersihkan vulva sampai ke perineum.
 9. Pembukaan telah lengkap dipastikan dengan pemeriksaan dalam pada jam 20.00 wita
 10. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5% kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit.
 11. Mendengar denyut jantung janin setelah uterus tidak berkontraksi.
 12. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik.

13. Meminta bantuan keluarga untuk membantu ibu menyiapkan posisi ibu untuk meneran.
14. Memimpin ibu meneran saat ada his.
15. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman.
16. Memasang handuk yang bersih di atas perut ibu pada saat kepala janin terlihat di depan vulva dengan diameter 5-6 cm.
17. Meletakkan duk 1/3 bagian di bawah bokong ibu.
18. Membuka bak partus.
19. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi (DTT).
20. Memimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala pada jam

20.00 wita

Data Subjektif

ibu mengatakan sudah dipimpin bersalin selama 2 kali dalam 30 menit tetapi bayinya belum lahir dan ibu sudah merasa lelah

Data Objektif

keadaan umum ibu : tampak lemah

Kesadaran komposmentis

TTV : TD : 110/70mmHg S : 36,8⁰C

N : 80 x/menit

P : 24 x/menit

Vulva dan vagina tampak normal, pembukaan lengkap dengan presentase

UUK depan

Assesment

Ny "R" umur 23 thn, GIP0A0, keadaan umum ibu lemah, persalinan kala II lama

Planning

1. Melakukan kolaborasi dengan dokter Obgyn dalam pemberian terapi infus RL 500 cc + drips oxytosin 5 IU dengan 12 tetesan permenit.

2. Memantau his, djj dan nadi ibu serta tetesan infus

Pukul 20.30 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 130 x/menit, N : 80x/menit, oxy 5 IU 12 tpm

Pukul 21.00 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 130 x/menit, N : 78 x/menit, oxy 5 IU 16 tpm

Pukul 21.30 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 132 x/menit, N : 78 x/menit, oxy 5 IU 20 tpm

Pukul 22.00 wita his 4 x 10 menit durasi 45-50 djj 130 x/menit, N : 78 x/menit, oxy 5 IU 20 tpm, TD : 110/70mmHg, S : 36,8⁰C.

3. dilakukan pimpinan persalinan selama dua jam sejak jam 20.00 wita sampai 22.00 wita sampai kepala bayi telah lahir

21. Memeriksa adanya lilitan tali pusat.

22. Menunggu kepala melakukan putaran paksi luar.

23. Meletakkan tangan secara biparetal tarik secara hati-hati ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu posterior.

24. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur.

25. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai di tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk dan jari tengah di antara 2 tungkai

Hasil : bayi lahir spontan tanggal 26 Mei 2016 pukul 22.30 wita. JK : laki-laki , BB : 3350 gram , PB : 49 cm , A/S : 7/8.

26. Menilai bayi dan letakkan bayi diatas perut ibu dengan posisi kepala lebih rendah dari tubuhnya.

27. Mengeringkan dan membungkus badan bayi.

LANGKAH VII. EVALUASI

Evaluasi tanggal 26 Mei 2016, jam 22.30 wita

1. Kala II berlangsung \pm 2 jam 30 menit
2. Bayi lahir spontan tanggal 26 Mei 2016 laki-laki A/S : 7/8
3. BBL/PBL : bayi 3350 gram/ 49 cm
4. Anus berlubang dan tidak ada cacat bawaan
5. Kontraksi uterus baik (teraba bundar dan keras)
6. TFU setinggi pusat
7. Darah yang keluar \pm 150 cc
8. Plasenta belum lahir

SOAP KALA II

DS :

1. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk meneran
2. Ibu merasakan sakit pada perut tembus ke belakang
3. Ibu mengatakan ada pengeluaran lendir dan darah
4. Ibu merasa ingin BAB
5. Ibu merasa lelah

DO :

1. Kontraksi uterus 3 x 10 menit durasi 40-45 detik
2. Djj 138 x/menit
3. Nampak pelepasan lendir dan darah
4. Pemeriksaan dalam

Tanggal 26 Mei 2016, jam 20.00 wita

1. Vulva dan vagina : Normal tidak ada kelainan
2. Porsio : melesap
3. Pembukaan : 10 cm
4. Ketuban : pecah jernih
5. Presentasi : Kepala dengan UUK depan
6. Penurunan : Hodge III-IV
7. Molase : tidak ada, terdapat caput
8. Penumbungan : Tidak ada
9. Kesan panggul : Normal

10. Pelepasan : air ketuban jernih

5. Tanda Tanda Vital

TD : 110/70 mmHg

N : 82 x/menit

S : 36,7°C

P : 20 x/menit

ASSESSMENT (A)

Persalinan Kala II Lama, Ibu Kelelahan, Antisipasi terjadi gawat janin

PLANNING (P)

1. Melakukan informed consent
2. Melihat tanda dan gejala kala II (dor-ran, tek-nus, per-jol, vul-ka).
 - Adanya dorongan untuk meneran
 - Adanya tekanan pada anus
 - Perineum menonjol
 - Vulva dan anus membuka
3. menyiapkan peralatan pertolongan termasuk oksitosin dan spoit.
 - a. Bak partus yang berisi
 - 1) 1 ½ handscone
 - 2) 2 buah klem kocher
 - 3) ½ kocher
 - 4) 1 buah gunting tali pusat
 - 5) 1 buah penjepit tali pusat

- 6) Kateter
- 7) 1 buah gunting episiotomy
- 8) Kasa secukupnya

b. Bak heacting

- 1) Needle holder
- 2) Pinset anatomi
- 3) Jarum
- 4) Cutgat
- 5) Gunting benang
- 6) Kasa secukupnya

c. Obat / bahan

- 1) Cairan infuse
- 2) Oksitosin
- 3) Lidocain
- 4) Salep mata
- 5) Vitamin K
- 6) HB_o

d. Luar bak partus

- 1) Air DTT
- 2) Kapas DTT
- 3) Larutan klorin 0,5%
- 4) Tempat sampah
- 5) Tensi meter

- 6) Stetoskop
- 7) Thermometer
- 8) De lee
- 9) Lenek
- 10)Perlak

e. APD

- 1) Topi
 - 2) Masker
 - 3) Kacamata
 - 4) Celemek
4. Memakai celemek.
 5. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan,cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir.
 6. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi.
 7. Mengisi spoit dengan oksitosin 10 IU dengan satu tangan.
 8. Membersihkan vulva sampai ke perineum.
 9. Pembukaan telah lengkap dipastikan dengan pemeriksaan dalam pada jam 20.00 wita
 10. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan clorin 0,5% kemudian rendam secara terbalik selama 10 menit.
 11. Mendengar denyut jantung janin setelah uterus tidak berkontraksi.
 12. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik.

13. Meminta bantuan keluarga untuk membantu ibu menyiapkan posisi ibu untuk meneran.
14. Memimpin ibu meneran saat ada his.
15. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman.
16. Memasang handuk yang bersih di atas perut ibu pada saat kepala janin terlihat di depan vulva dengan diameter 5-6 cm.
17. Meletakkan duk 1/3 bagian di bawah bokong ibu.
18. Membuka bak partus.
19. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi (DTT).
20. Memimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala.

Data Subjektif

ibu mengatakan sudah dipimpin bersalin selama 2 kali dalam 30 menit tetapi bayinya belum lahir dan ibu sudah merasa lelah

Data Objektif

keadaan umum ibu : tampak lemah

Kesadaran komposmentis

TTV : TD : 110/70mmHg S : 36,8⁰C

N : 80 x/menit P : 24 x/menit

Vulva dan vagina tampak normal, pembukaan lengkap dengan presentase

UUK depan

Assesment

Ny "R" umur 23 thn, GIP0A0, keadaan umum ibu lemah, persalinan kala II lama

Planning

1. Melakukan kolaborasi dengan dokter Obgyn dalam pemberian terapi infus RL 500 cc + drips oxytosin 5 IU dengan 12 tetesan permenit.

2. Memantau his, djj dan nadi ibu serta tetesan infus

Pukul 20.30 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 130 x/menit, N : 80x/menit, oxy 5 IU 12 tpm

Pukul 21.00 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 130 x/menit, N : 78 x/menit, oxy 5 IU 16 tpm

Pukul 21.30 wita his 4 x 10 menit durasi 40-45 djj 132 x/menit, N : 78 x/menit, oxy 5 IU 20 tpm

Pukul 22.00 wita his 4 x 10 menit durasi 45-50 djj 130 x/menit, N : 78 x/menit, oxy 5 IU 20 tpm, TD : 110/70mmHg, S : 36,8⁰C.

3. dilakukan pimpinan persalinan selama dua jam sejak jam 20.00 wita sampai 22.00 wita sampai kepala bayi telah lahir

21. Memeriksa adanya lilitan tali pusat.

22. Menunggu kepala melakukan putaran paksi luar.

23. Meletakkan tangan secara biparetal tarik secara hati-hati ke bawah untuk melahirkan bahu anterior dan ke atas untuk melahirkan bahu posterior.

24. Melahirkan badan bayi dengan sanggah susur.
25. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung kearah bokong sampai di tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk dan jari tengah di antara 2 tungkai
- Hasil : bayi lahir spontan tanggal 26 Mei 2016 pukul 22.30 wita. JK : laki-laki , BB : 3350 gram , PB : 49 cm , A/S : 7/8.
26. Menilai bayi dan letakkan bayi diatas perut ibu dengan posisi kepala lebih rendah dari tubuhnya.
27. Mengeringkan dan membungkus badan bayi.

KALA III**LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

DS : a. Ibu mengatakan nyeri perut.

b. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya.

DO :a. Bayi lahir spontan tanggal 26 Mei 2016, pukul 22.30 wita, JK: laki-laki,

BB : 3350 gram , PB : 49 cm , A/S : 7/8.

Kategori	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit pertama	Menit kelima
Appearance (warna kulit)	Seluruhnya biru atau pucat	Warna kulit tubuh normal merah muda, tetapi kepala dan ekstremitas kebiruan (akrosiasionis)	Warna kulit tubuh, tangan dan kaki normal merah muda, tidak ada sianosis	1	1
Pulse (denyut jantung)	Tidak teraba	<100 kali/menit	>100 kali/menit	2	2
Grimace (respons reflex)	Tidak ada respon terhadap stimulasi	Meringis/menangis lemah ketika di stimulasi	Meringis/bersin/batuk saat stimulasi saluran napas	1	1
Activity (tonus otot)	Lemah/tidak ada	Sedikit gerakan	Bergerak aktif	1	2
Respiration (pernapasan)	Tidak ada	Lemah, tidak teratur	Menangis kuat, pernapasan baik dan teratur	2	2
Jumlah				7	8

- b. Kontraksi uterus baik : teraba keras dan bundar.
- c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat.
- d. Perdarahan ± 150 cc.
- e. Placenta belum terlepas.

Analisa dan interpretasi data :

Setelah bayi lahir uterus akan berkontraksi untuk mengeluarkan placenta . hal inilah yang menyebabkan nyeri perut

LANGKAH II : MENETAPKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : perlangsungan kala III.

DS : ibu mengatakan nyeri perut.

DO : a. Bayi lahir spontan tanggal 26 Mei 2016,pukul 22.30 wita, JK: laki-laki, BB : 3350 gram , PB : 49 cm , A/S : 7/8.

- b. Kontraksi uterus baik : teraba keras dan bundar.
- c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat.
- d. Tampak tali pusat di depan vulva.

Analisa dan interpretasi data

Pada waktu kala III volume uterus sudah berkurang , tinggi fundus uteri teraba setinggi pusat pada saat itu uterus berkontraksi memperkecil cavum uteri sehingga tersa sakit dan teraba bundar dan keras.

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Tidak ada indikasi untuk ditegakkannya diagnose/masalah potensial.

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Tidak ada indikasi untuk di lakukannya tindakan segera/emergency.

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa actual : perlangsungan kala III.

Diagnosa potensial : -

Tujuan : kala III berlangsung normal.

Kriteria : a. Perdarahan tidak lebih dari 500 cc.
b. Lamanya kala III \leq 30 menit.
c. Placenta dan selaput lahir lengkap

Intervensi

Tanggal 26 Mei 2016

28. Periksa fundus uteri .

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda .

29. Memberitahu ibu akan di suntik .

Rasional : agar ibu mengetahui tindakan yang akan di lakukan.

30. Menyuntik oksitosin 10 IU.

Rasional : akan membantu kontraksi uterus.

31. Jepit tali pusat.

Rasional : untuk memastikan atau menentukan batas tali pusat yang akan di potong.

32. Potong tali pusat.

Rasional : dengan memotong tali pusat akan memutuskan hubungan bayi dan ibu dan membantu proses pernapasan dan system sirkulasi dan agar darah dari tali pusat tidak mengalir.

33. Letakkan bayi di atas dada ibu.

Rasional : untuk menjalin kasih sayang antara ibu dan bayi.

34. Bungkus dan selimuti bayi.

Rasional : mencegah terjadinya hipotermi.

35. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva , jika tali pusat bertambah panjang.

Rasional : proses peregang tali pusat terkendali.

36. Letakkan tangan kiri di atas simfisis untuk menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.

Rasional : proses peregang tali pusat terkendali.

37. Regangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial.

Rasional : dengan begitu akan memudahkan placenta terlepas dari tempat implantasinya.

38. Jika tali pusat bertambah panjang tali pusat diregangkan ke atas dan ke bawah.

Rasional : dengan meregangkan ke atas dan ke bawah memudahkan placenta keluar sesuai kurva jalan lahir hingga tampak di vulva.

39. Setelah placenta tampak di depan vulva jemput placenta dengan kedua tangan lalu putar dan lahirkan placenta searah jarum jam.

Rasional : agar placenta dan selaput lahir lengkap.

40. Lakukan masase pada fundus uteri.

Rasional : masase akan merangsang kontraksi uterus.

41. Periksa apakah placenta dan selaput ketuban lahir lengkap.

Rasional : adanya sisa placenta dan selaput ketuban akan menyebabkan perdarahan.

42. Periksa adanya robekan jalan lahir.

Rasional : robekan jalan lahir akan menyebabkan perdarahan aktif.

43. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik.

Rasional : uterus yang berkontraksi dengan baik menandakan kala III berlangsung normal.

44. Biarkan bayi berada di atas perut ibu selama 1 jam.

Rasional : menjalin kasih sayang ibu dan bayinya.

45. Setelah 1 jam lakukan penimbangan, pengukuran pemberian salep mata dan vitamin K.

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi lahir normal atau tidak. Pemberian vitamin K untuk mencegah terjadinya perdarahan. Dan pemberian salep mata untuk mencegah terjadinya infeksi.

46. Memberikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam pemberian vitamin K.

Rasional : memberikan hepatitis.

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 26 Mei 2016

29. Memeriksa fundus uteri .
30. Memberitahu ibu akan di suntik oksitosin .
31. Menyuntikan oksitosin 10 IU.
32. Menjepit tali pusat.
33. Memotong tali pusat.
34. Meletakkan bayi di atas dada ibu.
35. Membungkus dan selimuti bayi.
36. Memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva , jika tali pusat bertambah panjang.
37. Meletakkan tangan kiri di atas simfisis untuk menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.
38. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus kearah dorso cranial.
39. Jika tali pusat bertambah panjang tali pusat diregangkan ke atas dan ke bawah.
40. Setelah placenta tampak di depan vulva jemput placenta dengan kedua tangan lalu putar dan lahirkan placenta searah jarum jam.

Hasil : placenta lahir lengkap jam 22.45 wita
41. Melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok-gosok fundus secara sirkuler.
42. Memeriksa apakah placenta dan selaput ketuban lahir lengkap.

Hasil : placenta , selaput ketuban dan kotiledon lahir lengkap.

43. Memeriksa adanya robekan jalan lahir.

Hasil : terdapat robekan pada perinenum dengan ruptur tingkat II

44. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik.

Hasil : uterus berkontraksi dengan baik teraba keras dan bundar , tinggi fundus uteri teraba 1 jari di bawah pusat.

45. Membiarkan bayi berada di atas perut ibu selama 1 jam.

46. Melakukan penimbangan dan pengukuran bayi setelah 1 jam, memberikan vitamin K dan salep mata.

Hasil :

a. BBL : 3350 gram

b. PBL : 49 cm

c. LK : 33 cm

d. LD : 33 cm

e. LP : 30 cm

f. LILA : 12 cm

g. ANUS : (+)

47. Memberikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam pemberian vitamin K.

Hasil : injeksi hepatitis sudah di berikan.

LANGKAH VII : EVALUASI

Evaluasi tanggal 26 Mei 2016

1. Kala III berlangsung normal.

2. Perdarahan \pm 150 cc.
3. Placenta dan selaput lahir lengkap.
4. Kala III berlangsung \pm 10 menit.
5. Ibu mengatakan lelah setelah proses persalinan.
6. Kontraksi uterus baik , terasa keras dan bundar.
7. Tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat.
8. Tanda – tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 80 \times /menit.
 - c. Suhu : 36,7 $^{\circ}$ C.
 - d. Pernapasan : 20 \times /menit.

SOAP KALA III**DATA SUBJEKTIF (S)**

- a. Ibu mengatakan nyeri perut.
- b. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya.

DATA OBJEKTIF (O)

- a. Bayi lahir spontan tanggal 26 Mei 2016 pukul 22.30 wita, JK : laki – laki,
BB : 3350 gran, PB : 49 cm, A/S : 7/8.
- b. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
- c. Tinggi fundus uteri teraba 1 jari di bawah pusat.
- d. Perdarahan \pm 150 cc
- e. Placenta belum terlepas.
- f. Tampak tali pusat di depan vulva.

ASSESMENT (A)

Perlangsungan kala III.

PLANNING (P)


29. Memeriksa fundus uteri.
30. Memberitahu ibu akan di suntik.
31. Menyuntikkan oksitosin 10 IU.
32. Menjepit jail pusat.
33. Memotong tali pusat.

34. Menempatkan bayi di atas dada ibu.
35. Membungkus dan menyelimuti bayi.
36. Memindahkan klem hingga berjarak 5-6 cm dari depan vulva.
37. Meletakkan tangan kiri di tepi atas simfisis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.
38. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial.
39. Meregangkan tali pusat ke arah atas kemudian ke arah bawah.
40. Menjemput placenta dengan kedua tangan jika placenta sudah tampak di depan vulva, lahirkan placenta dengan memutar searah jarum jam
Hasil : placenta lahir jam 22.40 wita.
41. Melakukan masase dengan gosokan fundus secara sirkuler.
42. Memeriksa apakah placenta dan selaput ketuban lahir lengkap.
Hasil : placenta, selaput ketuban dan kotiledon lahir lengkap.
43. Memeriksa adanya robekan jalan lahir.
Hasil : terjadi robekan pada perineum dengan ruptur tingkat II
44. Memeriksa kontraksi uterus.
Hasil : kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
45. Membiarkan bayi di atas perut ibu selama 1 jam.
46. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir berikan salep mata dan vitamin K.
Hasil :
 - a. BBL : 3350 gram

- b. PBL : 49 cm
- c. LK : 33 cm
- d. LD : 33 cm
- e. LP : 30 cm
- f. LILA :12 cm
- g. JK : laki - laki
- h. A/S : 7/8

47. Memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah pemberian vitamin k.

Hasil : hepatitis B telah di berikan.



KALA IV**LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

DS : ibu mengatakan lelah setelah persalinan.

DO : a. Kala III berlangsung \pm 15 menit.

- b. Placenta lahir lengkap pukul 22.40 wita.
- c. Tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat.
- d. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
- e. Perdarahan \pm 150 cc.
- f. Tanda – tanda vital
 - 1) Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - 2) Nadi : 80 \times /menit
 - 3) Suhu : 36,8 $^{\circ}$ C
 - 4) Pernapasan : 20 \times /menit

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa actual : perlangsungan kala IV

Masalah actual : kelelahan

DS : ibu mengatakan lelah setelah persalinan.

DO : a. Kala III berlangsung \pm 15 menit.

b. Placenta lahir lengkap pukul 22.40 wita.

c. Tanda – tanda vital

- 1) Tekanan darah : 110/70 mmHg
- 2) Nadi : 80×/menit
- 3) Suhu : 36,7°C
- 4) Pernapasan : 20×/menit

Analisa dan interpretasi data :

Saat kala IV diperlukan tenaga untuk mengeluarkan bayi sehingga tekanan cardiac meningkat mengakibatkan tekanan darah sedikit meningkatkan begitu pula dengan nadi.

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data yang menunjang untuk terjadinya masalah potensial.

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Tidak ada indikasi untuk di lakukan tindakan segera.

LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa : perlangsungan kala IV

Masalah aktual : kelelahan.

Tujuan : kala IV berlangsung normal.

- Kriteria :
- a. Tidak terjadi perdarahan.
 - b. Kontraksi uterus baik,teraba keras dan bundar.
 - c. Tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat.

d. Tanda –tanda vital dalam batas normal

- 1) Tekanan darah : 90/60-130/90 mmHg
- 2) Nadi : 60-80×/menit
- 3) Suhu :36,5-37,5°C
- 4) Pernapasan :16-24×/menit

e. Pernapasan dan suhu bayi dalam batas normal.

- 1) Penapasan : 40-60×/menit.
- 2) Suhu : 36,5-37,5°C.

Intervensi tanggal 26 Mei 2016

48. Lakukan pemantauan kontraksi uterus 3-5 kali dalam 10 menit pertama kemudian setiap 15 menit 1 jam berikutnya dan 30 menit pada satu jam berikutnya.

Rasional : kontraksi uterus yang baik menandakan kala IV berlangsung normal.

49. Ajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana cara masase uterus dan menilai kontraksi.

Rasional : agar ibu dan keluarga mengetahui bagaimana kontraksi uterus yang baik dan dapat melakukannya sendiri.

50. Evaluasi jumlah perdarahan.

Rasional : untuk mengantisipasi jumlah perdarahan.

51. Periksa tanda – tanda vital ibu.

Rasional : untuk mengetahui keadaan umum ibu.

52. Nilai pernapasan dan suhu tubuh ibu.

Rasional : untuk menilai keadaan umum ibu.

53. Rendam alat dalam clorin 0,5% selama 10 menit.

Rasional : mencegah infeksi silang.

54. Buang bahan – bahan yang terkontaminasi.

Rasional : mencegah infeksi silang.

55. Bersihkan ibu dari sisa darah, lendir, dan ketuban dengan ait DTT.

Rasional : memberikan rasa nyaman pada ibu dan mencegah infeksi.

56. Pastikan ibu merasa nyaman, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum.

Rasional : dengan makan dan minum akan mengembalikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinan sehingga stamina ibu tetap terjaga.

57. Dekontaminasi tempat tidur dengan larutan desinfeksi tingkat tinggi.

Rasional : mencegah infeksi silang.

58. Bersihkan sarung tangan dan merendam dalam larutan clorin 0,5% secara terbalik.

Rasional : mencegah infeksi silang.

59. Cuci tangan dengan sabun di bawah air bersih yang mengalir.

Rasional : dengan mencuci tangan merupakan dekontaminasi agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri.

60. Melengkapi partograf.

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 26 Mei 2016

47. Lakukan pemantauan kontraksi uterus.

Hasil : kontraksi uterus baik terba keras dan bundar.

48. Mengajarkan pada ibu dan keluarga bagaimana cara masase uterus dan menilai kontraksi.

Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya sendiri.

49. Mengevaluasi jumlah perdarahan.

Hasil : perdarahan \pm 150 cc.

50. Memeriksa tanda – tanda vital ibu.

Hasil : 1) Tekanan darah : 110/70 mmHg

2) Nadi : 80×/menit

3) Suhu : 36,7°C

4) Pernapasan : 20×/menit

51. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi.

Hasil :

a. Pernapasan : 46×/menit.

b. Suhu : 36,8°C

52. merendam alat dalam clorin 0,5% selama 10 menit.

53. Membuang bahan – bahan yang terkontaminasi.

54. Membersihkan ibu dari sisa darah, lendir, dan ketuban dengan ait DTT.

55. Memastikan ibu merasa nyaman, beritahu keluarga untuk memberi ibu makan dan minum.

56. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan desinfeksi tingkat tinggi.
57. Membersihkan sarung tangan dan merendam dalam larutan clorin 0,5% secara terbalik.
58. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air bersih yang mengalir.
59. Melengkapi partograf.

LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 26 Mei 2016

1. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
2. Tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat.
3. Jumlah perdarahan \pm 150 cc.
4. Keadaan umum ibu baik ditandai dengan :
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 80×/menit
 - c. Suhu : 36,8°C
 - d. Pernapasan : 20×/menit
5. Ibu sudah merasa nyaman.
6. Kesadaran composmentis.

SOAP KALA IV**DATA SUBJEKTIF (S)**

Ibu mengatakan lelah setelah proses persalinan.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Kala berlangsung \pm 15 menit.
2. Plasenta lahir lengkap pukul 22.40 wita.
3. Tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat.
4. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
5. Perdarahan \pm 150 cc.
6. Ibu tampak kelelahan.
7. Tanda – tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 80×/menit
 - c. Suhu : 36,8°C
 - d. Pernapasan : 20×/ menit

ASSESMENT (A)

Perlangsungan kala IV, Ibu Kelelahan

PLANNING (P)

48. Melakukan pemantauan kontraksi uterus.

Hasil : kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.

49. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase dan menilai kontraksi.

Hasil : ibu dan keluarga mengeti cara melakukan masase dan dapat menilai kontraksi uterus.

50. Mengevaluasi jumlah perdarahan.

Hasil : perdarahan \pm 150 cc

51. Memeriksa tanda-tanda vital ibu.

Hasil :

- a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
- b. Nadi : 80×/menit
- c. Suhu : 36,8°C
- d. Pernapasan : 20×/menit

52. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi.

Hasil :

- a. Pernapasan : 46×/menit
- b. Suhu : 36,8°C

53. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5% selama 10 menit.

54. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi.

55. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir dan air ketuban dengan air DTT.

56. Memastikan ibu merasa nyaman, memberitahu keluarga untuk memberikan ibu makanan dan minuman.

57. Mendekontaminasikan tempat tidur dengan larutan desinfeksi tingkat tinggi.
58. Membersihkan sarung tangan dan merendamnya dalam larutan clorin 0,5% selama 10 menit.
59. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air bersih yang mengalir.
60. Melengkapi partograf.



BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan setiap kala dalam kasus persalinan kala II lama pada klien Ny “R” di ruang Intra Natal Care RSKDIA Pertiwi Makassar tanggal 26 Mei 2016. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi agar tindakan direncanakan berdasarkan rasional yang relevan yang dapat dianalisa secara teoritis yang dimulai dari kala I hingga kala IV yang akan diuraikan berdasarkan 7 langkah Varney.

A. Kala I

a. Langkah I

Pada pengumpulan data dasar merupakan dasar proses manajemen kebidanan yang kegiatannya ditujukan untuk pengumpulan informasi.

Pada kasus Ny “R” didapatkan keluhan sebagaimana ibu inpartu pada umumnya sebelum masuk ke Rumah Sakit : ibu masuk tanggal 26 Mei 2016 jam 09.55 wita mengatakan nyeri perut tembus ke belakang sejak tanggal 25 Mei 2016 jam 23.00 wita, serta pelepasan lendir dan darah pada tanggal 26 Mei 2016 jam 09.30 wita. Lokasi keluhan mulai dari perut tembus belakang, bersifat hilang timbul dan usaha ibu untuk mengatasi keluhannya yaitu dengan mengurut-urut punggungnya sambil berjalan-jalan.

Ibu mengatakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya, usia kehamilan ibu \pm 9 bulan, janinnya bergerak kuat terutama pada bagian kiri perutnya, ibu mengatakan selama hamil berat badan ibu bertambah, nafsu makan ibu meningkat, serta tambah sering BAK.

Pada awal kehamilan suplai darah ke kandung kemih meningkat, dan pembesaran uterus terus menekan kandung kemih. Faktor-faktor tersebut menyebabkan meningkatnya berkemih. Meendekati kelahiran janin turun lebih rendah ke pelvis, lebih menekan lagi kandung kemih dan semakin meningkatnya berkemih. Walaupun gejala ini sangat tidak menyenangkan, hal ini tidak menyebabkan masalah medis yang berarti (Hamilton, 1995)

Walaupun peningkatan berat badan lebih bersifat individual, peningkatan berat badan rata-rata yang terjadi selama masa kehamilan yaitu pada ibu uterus beratnya 900 gram, payudara 450 gram, darah 1350 gram, jaringan 1350 gram, lemak 4050 gram, jadi subtotalnya 8100 gram, sedangkan janin beratnya rata-rata 3150 gram, plasenta 675 gram, cairan amniotic 900 gram, subtotal janin 4725 gram. Total ibu dan janin yaitu 12825 gram. Ini diambil dari Guthrie, HA : introductory nutrition, ed 6. St Louis, 1986, The CV Mosby Co.

Berdasarkan teori ibu dengan usia kehamilan aterm (38-42 minggu) akan mulai timbul tanda persalinan : terjadinya his persalinan,

pengeluaran lendir dan darah, pengeluaran cairan, dan tahapan persalinan kala I, II, III, dan IV (Damayanti, dkk, 2014).

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, ibu tidak mengalami anemia. Hasil pemeriksaan abdomen didapatkan tidak adanya luka bekas operasi, terdapat linea nigra dan stria livide, hasil palpasi didapatkan TFU 2 jbp, 30cm teraba bokong, punggung kanan, kepala, BDP dengan perlimaan 4/5, keadaan janin baik dimana djj dalam batas normal (138 x/menit). Pemantauan his selama 10 menit didapatkan kontraksi his 2 kali dengan durasi 25 – 30 detik, dan hasil pemeriksaan dalam jam 10.00 wita tanggal 26 Mei 2016 oleh bidan Pur didapatkan pembukaan 2 cm, hodge I.

Kehamilan aterm menunjukkan bahwa janin telah siap untuk dilahirkan karena perkembangan janin dari sistem kardiovaskuler, sistem gastrointestinal, sistem respirasi, sistem ginjal dan syaraf telah terbentuk dengan baik walaupun belum sempurna secara keseluruhan dan fungsinya belum bekerja dengan baik, akan tetapi dinilai telah mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan ekstrauterine, selain itu plasenta sebagai salah satu organ yang mendukung perkembangan janin telah menua dan fungsinya mulai menurun sesuai dengan tuanya kehamilan dan hormon estrogen dan progesterone yang menekan hormone oksitosin mulai menurun sehingga hormon oksitosin sebagai hormon persalinan mulai dilepaskan (Sarwono, 2011).

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek yang dilakukan.

b. Langkah II

Dalam pengkajian data dapat ditemukan diagnosa dan masalah kebidanan berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang didukung oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah dilakukan.

Ny "R" didiagnosis inpartu kala I fase laten berdasarkan data bahwa ibu masuk Rumah Sakit dengan pembukaan 2 cm. Kemudian kontraksi his yang didapatkan selama 10 menit yaitu 2-3 kali dengan durasi 20-30 detik, serta denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur dengan frekuensi rata-rata 128-138 denyut per menit.

Adapun rata-rata kontraksi uterus selama perlangsungan kala I fase aktif yaitu 3 kali dalam 10 menit, dengan durasi 35-45 detik, sedangkan denyut jantung janin terdengar kuat, jelas dan teratur dengan frekuensi rata-rata 130 denyut jantung per menit.

Sesuai dengan teori bahwa penetapan diagnosa fase laten berdasarkan pembukaan dibawah 3 cm yang dimana fase laten dimulai dari pembukaan 0 cm sampai 3 cm (Damayanti, dkk, 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek yang dilakukan.

c. Langkah III

Dalam merumuskan diagnosa/masalah potensial dengan manajemen asuhan kebidanan adalah pengambilan keputusan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dan membahayakan klien.

Pada kasus Ny "R" tidak dirumuskan adanya diagnosa/masalah potensial. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan terkadang tidak ada progresif dari pembukaan serviks atau lambat dari yang seharusnya.

Berdasarkan teori pada kala I dengan fase laten tidak melebihi 8 jam yang pembukaannya dimulai dari 0 cm sampai pembukaan 3 cm. Pada primigravida, lama maksimal kala satu persalinan yang normal (fase laten dan aktif digabungkan) adalah 28,5 jam (rata-rata 13,3 jam). Pada multipara, angka-angka tersebut 20 jam (rata-rata 7,5 jam) untuk kala satu (Oxorn, 2010).

Hal ini sesuai dengan kasus Ny "R" bahwa fase laten tidak lebih dari 8 jam, yaitu pada jam 14.00 pembukaan sudah 4 cm dan ini menandakan bahwa Ny "R" sudah berada pada inpartu kala I fase aktif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek yang dilakukan.

d. Langkah IV

Tindakan ini dilakukan jika ditemukan adanya diagnosa potensial dengan tujuan agar dapat mengantisipasi masalah yang mungkin muncul sehubungan dengan keadaan yang dialaminya (Nugraheny, 2010).

Pada kasus Ny “R” tidak dilakukan karena berdasarkan kondisi klien tidak ada yang mengancam jiwa seperti kala I dengan fase laten memanjang dan syok.

Namun jika ditemukan adanya kondisi yang mengancam jiwa maka hal yang dilakukan yaitu baringkan ibu ke kiri, jika memungkinkan menaikkan kaki ibu untuk meningkatkan aliran darah ke jantung, kemudian memasang infus RL atau garam fisiologi (NS).

Hal ini sesuai dengan kasus Ny “R” bahwa tidak ada penyulit atau yang mengancam jiwa, maka tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

e. Langkah V

Rencana Tindakan dibuat berdasarkan asuhan yang menyeluruh dari langkah sebelumnya.

Intervensi pada kasus Ny “R” dengan inpartu kala I dengan fase laten sesuai dengan teori maka dilakukan pemantauan his dan djj setiap 30 menit, dan pemeriksaan dalam tiap 4 jam pada fase laten dan pada fase aktif pemeriksaan dalam dilakukan tiap 2-4 jam. Serta pemantauan tanda-tanda vital dan suhu ibu dilakukan setiap 4 jam.

Pemantauan kemajuan persalinan dilakukan sesuai dengan teori bahwa pemantauan dengan VT dilakukan setiap 4 jam pada fase laten dan 2-4 jam pada fase aktif. Djj dan kontraksi uterus setiap 30 menit, tanda-tanda vital dan suhu ibu dilakukan setiap jam (Saifuddin, 2010)

Pemantauan his, djj dan nadi ibu di mulai dari jam 10.30 wita sampai 4 jam kemudian yaitu pada jam 14.00 wita melakukan pemeriksaan dalam untuk memantau kemajuan persalinan, serta memeriksa tekanan darah dan suhu ibu, dan memastikan pembukaan sudah lebih dari 3 cm dan menandakan sudah masuk inpartu kala I fase aktif. Selanjutnya memantau kembali his, djj dan nadi ibu di mulai dari 14.30 wita sampai 4 jam selanjutnya yaitu pada jam 18.00 wita, melakukan pemeriksaan dalam dan memastikan pembukaan sudah lebih dari 4 cm, serta mengukur tekanan darah dan suhu ibu.

Selanjutnya memantau kembali his, djj, dan nadi ibu dimulai dari jam 18.30 wita sampai 2 atau 4 jam kemudian yaitu pada jam 20.00 wita melakukan pemeriksaan dalam dan memastikan pembukaan sudah lengkap dan ibu sudah siap untuk di pimpin bersalin.

Hal ini menandakan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

f. Langkah VI

Sesuai tinjauan manajemen kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman klien, implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun dengan tim kesehatana lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

Implementasi pada kasus Ny "R" di mulai dari jam 10.00 wita yang didapatkan pembukan 2 cm, ketuban utuh, hodge I dengan presentase

kepala UUK kanan belakang. Data yang didapatkan belum bisa dimasukkan ke dalam partograf.

Selanjutnya pemantauan dimulai dari jam 10.30 wita sampai 4 jam kemudian yaitu pada jam 14.00 dengan his rata-rata 2 kali dalam 10 menit dengan durasi rata-rata 25-35 detik, dengan djj rata-rata 136-140 x/menit, serta nadi ibu rata-rata 80-82 x/menit. Pada pemeriksaan dalam yang dilakukan pada jam 14.00 wita didapatkan pembukaan 4 cm, ketuban utuh, hodge II, dengan presentase kepala UUK kanan lintang. Data ini dimasukkan kedalam pemantauan partograf dan sudah menandakan ibu pada inpartu kala I fase aktif.

Selanjutnya pemantauan kembali dilakukan pada jam 14.30 sampai 4 jam kemudian yaitu pada jam 18.00 wita dengan his rata-rata 2-4 kali dalam 10 menit dengan durasi rata-rata 30-35 detik, dengan djj rata-rata 132-142 x/menit, serta nadi ibu 80-84 x/menit. Pada pemeriksaan dalam yang dilakukan pada jam 18.00 wita didapatkan pembukaan 8 cm, ketuban utuh, hodge II-III dengan presentase kepala UUK kanan lintang. Selanjutnya memasukkan data yang didapatkan kedalam pemantauan partograf.

Melanjutkan kembali pemantauan dimulai dari jam 18.00 wita sampai 2 jam kemudian yaitu pada jam 20.00 wita, didapatkan koontraksi his 3-4 kali dalam 10 menit dengan durasi rata-rata 35-45 detik, dengan djj rata-rata 132-142 x/menit, serta nadi ibu 80-82 x/menit. Pemeriksaan dalam dilakukan pada jam 20.00 wita didapatkan pembukaan lengkap (10

cm) ketuban pecah jernih, hodge III-IV, dengan presentase kepala UUK depan.

Dari data yang didapatkan bahwa pada jam 10.30 wita sampai 13.00 wita kontraksi his konstan dan mengalami kenaikan pada durasi jam 13.30 wita sampai 14.30 wita, dengan djj mengalami kenaikan dan penurunan, begitupun dengan nadi ibu. Kemudian pada jam 15.00 wita mengalami kenaikan kontraksi his yaitu 3 kali dalam 10 menit dengan durasi yang tetap sampai jam 17.30 wita, dengan djj mengalami kenaikan dan penurunan, begitupun nadi ibu. Dan pada jam 18.00 wita mengalami kenaikan kontraksi yaitu 4 kali dalam 10 menit dengan durasi sama, hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 8 cm, hal ini sesuai dengan teori bahwa pada primigravida pembukaan dilatasi serviks 1 cm tiap 1 jam.

Selanjutnya pada jam 18.30 wita mengalami kenaikan durasi his yaitu 35-40 detik, dan pada jam 19.00 sampai 20.00 wita kontraksi his menurun menjadi 3 kali dalam 10 menit namun durasi his yang naik yaitu 40-45 detik. Hasil pemeriksaan dalam pada jam 20.00 wita didapatkan pembukaan sudah lengkap dan ibu siap untuk di pimpin bersalin.

Hal ini menandakan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

g. Langkah VII

Evaluasi pada Ny "R" dengan inpartu kala I fase aktif dengan pembukaan 10 cm pada jam 20.00 wita, ibu mempunyai dorongan untuk meneran, terasa ingin BAB, dengan his 3-4 kali dalam 10 menit dengan

durasi 40-45 detik, djj 132 x/menit jelas, kuat dan teratur, serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

Hasil evaluasi kala satu didapatkan bahwa pembukaan lengkap terjadi pada jam 20.00 wita tanggal 26 Mei 2016, perlangsungan kala satu normal (tidak ada penyulit) serta tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

h. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari S (Subjektif), menggambarkan pendokumentasian pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I Varney, sesuai pada kasus NY "R" didapatkan bahwa ibu masuk tanggal 26 Mei 2016 jam 09.55 wita mengatakan nyeri perut tembus ke belakang sejak tanggal 25 Mei 2016 jam 23.00 wita, serta pelepasan lendir dan darah pada tanggal 26 Mei 2016 jam 09.30 wita. Lokasi keluhan mulai dari perut tembus belakang, bersifat hilang timbul dan usaha ibu untuk mengatasi keluhannya yaitu dengan mengurut-urut punggungnya sambil berjalan-jalan.

Ibu mengatakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran sebelumnya, usia kehamilan ibu \pm 9 bulan, janinnya bergerak kuat terutama pada bagian kiri perutnya, ibu mengatakan selama hamil berat badan ibu bertambah, nafsu makan ibu meningkat, serta tambah sering BAK.

O (Objektif), menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnostic lain yang

dirumuskan dalam data focus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney, berdasarkan pada kasus Ny “R” didapatkan keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, ibu tidak mengalami anemia. Hasil pemeriksaan abdomen didapatkan tidak adanya luka bekas operasi, terdapat linea nigra dan stria livide, hasil palpasi didapatkan TFU 2 jbpx, 30cm teraba bokong, punggung kanan, kepala, BDP dengan perlimaan 4/5, keadaan janin baik dimana djj dalam batas normal (138 x/menit). Pemantauan his selama 10 menit didapatkan kontraksi his 2 kali dengan durasi 25 – 30 detik, dan hasil pemeriksaan dalam jam 10.00 wita tanggal 26 Mei 2016 oleh bidan Pur didapatkan pembukaan 2 cm, hodge I.

A (Assesment), menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi, diagnosis/masalah, antisipasi diagnosis/masalah potensial, perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 Varney.

Berdasarkan pada kasus Ny “R” assessment yang ditegaskan yaitu G1P0A0, umur kehamilan 38-40 minggu, letak memanjang, intra uterine, tunggal, hidup, keadaan janin baik, inpartu kala I fase laten.

P (Plan), menggambarkan pendokumentasian dan tindakan (Implementasi) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan assessment sebagai langkah 5, 6, dan 7 Varney, berdasarkan pada kasus Ny “R” telah dilakukan implementasi sesuai dengan teori dengan hasil evaluasi dengan inpartu kala I fase aktif dengan pembukaan 10 cm pada jam 20.00 wita,

ibu mempunyai dorongan untuk meneran, terasa ingin BAB, dengan his 3-4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik, djj 132 x/menit jelas, kuat dan teratur, serta tanda-tanda vital dalam batas normal (Salmah, 2006).

B. Kala II

a. Langkah I

Pengkajian adalah mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Untuk memperoleh data, dilakukan melalui anamnesis (Nugraheny, 2010).

Pengkajian data yang dilakukan pada Ny "R" didapatkan bahwa ibu merasakan adanya dorongan untuk meneran, terasa sakit dan tembus belakang serta merasakan adanya tekanan pada rektumnya. Dari hasil pemeriksaan kontraksi uterus 3-4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik, djj 138 x/menit, tampak vulva membuka, perineum menonjol, pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan lengkap dengan pengeluaran lendir bercampur darah, dan tampak bagian kepala bayi pada introitus vagina.

b. Langkah II

Interpretasi data diambil dari hasil pengkajian yang sudah terkumpul yang akhirnya akan muncul data meliputi Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan dalam lingkup praktek kebidanan (varney, 2004).

Ny "R" didiagnosis persalinan kala II berdasarkan data bahwa ibu mempunyai dorongan untuk meneran, sakit pada perut tembus ke belakang, terdapat pengeluaran lendir dan darah, dan ibu ingin BAB, dengan kontraksi uterus 3-4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik, djj 138 x/menit jelas, kuat dan teratur, perineum ibu menonjol, dan anus membuka, serta hasil pemeriksaan dalam jam 20.00 wita pembukaan lengkap presentase kepala dengan UUK depan dengan caput, ketuban pecah jernih.

Sesuai dengan teori bahwa indikasi kala II ditegakkan jika didapatkan tanda dan gejala kala II yaitu ibu ingin meneran bersama dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rectum dan/atau vaginanya, perineum menonjol, vulva-vagina dan sifteri membuka, meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah, pembukaan serviks telah lengkap dan terlihatnya bagian kepala janin melalui introitus vagina (Cunningham, 2005).

c. Langkah III

Diagnosa Potensial adalah mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah yang ada, dalam hal ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan (Nugraheny, 2010).

Diagnosa potensial yang mungkin terjadi pada ibu bersalin dengan partus lama menurut Manuaba (2010), antara lain: pada ibu terjadi infeksi intrapartum dan ruptur uteri, sedangkan yang terjadi pada bayi antara lain

fetal distress atau gawat janin, caput succedaneum, dan asfiksia sampai terjadi kematian. Diagnosa potensial pada kasus ibu bersalin dengan kala II lama pada bayi terdapat caput succedaneum.

Pada kasus Ny "R" dirumuskan adanya diagnosa/masalah potensial yaitu persalinan lama dan antisipasi terjadinya gawat janin berdasarkan data yang mengatakan bahwa bayi Ny "R" mendapat caput succedaneum yang ditandai dengan adanya pembengkakan beberapa millimeter melewati garis sutura dan tidak ada perdarahan dibawah periosteum yang merupakan salah satu tanda sefalhematoma.

Sesuai dengan teori bahwa pembentukan beberapa millimeter caput bukanlah hal yang tidak wajar atau abnormal. Caput succedaneum yang kecil dapat menunjukkan bahwa telah terjadi persalinan yang agak lama akibat dorongan yang tidak adekuat di dalam uterus lantaran kontraksi yang muncul lemah. Pembentukan caput succedaneum yang luas yang membuat identifikasi sutura janin dan fontanel tidak memungkinkan, biasanya terjadi hanya jika tekanan sudah sangat besar dan persalinan berlangsung lama (Varney, 2008).

d. Langkah IV

Tindakan emergency yang dilakukan jika terdapat caput succedaneum yaitu dengan memperbaiki kontraksi uterus dan mengajarkan ibu cara mengedan yang baik agar dapat menghasilkan dorongan yang adekuat untuk mendorong janin keluar.

Tindakan ini dilakukan jika ditemukan adanya diagnosa potensial dengan tujuan agar dapat mengantisipasi masalah yang mungkin muncul sehubungan dengan keadaan yang dialaminya (Nugraheny, 2010)

Perbaikan kontraksi uterus dapat dilakukan dengan menstimulasinya dengan pemberian infus dengan drips oksitosin. Adapun cara mengedan yang baik yaitu dagu didekatkan ke dada, pandangan tertuju pada perut, sedangkan tangan memegang pangkal pagha dan mengedn pada puncak his (APN, 2007).

e. Langkah V

Pada persalinan normal rencana tindakan yang diberikan adalah tirah baring, pemantauan dengan partograf, observasi dan memberikan motivasi pada klien.

Pada kasus Ny "R" menganjurkan ibu untuk memilih posisi yang menguntungkan dengan berbaring tidur dalam posisi miring ke kiri, memantau persalinan dengan partograf dan memberikan motivasi kepada ibu dalam menghadapi proses persalinan.

Intervensi dilakukan pada jam 20.00 wita dengan mempersiapkan peralatan pertolongan persalinan termasuk oksitosin dan spoit, memakai celemek, sarung tangan DTT, serta memastikan pembukaan sudah lengkap, dan juga memastikan djj dalam batas normal, kemudian memberitahu ibu pembukaan telah lengkap dan ibu sudah siap di pimpin untuk meneran. Meletakkan handuk bersih di atas perut ibu dan meletakkan duk dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu.

Pimpin persalinan lindungi perineum dan tahan puncak kepala, setelah kepala bayi lahir periksa lilitan tali pusat, tunggu sampai kepala bayi melakukan putaran paksi luar kemudian lanjut melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah kedua bahu telah lahir, dilanjutkan dengan sangga susur untuk melahirkan badan bayi, menelusuri punggung, bokong, dan tungkai bayi. Setelah bayi lahir, letakkan bayi diatas perut ibu dan keringkan badan bayi.

Pada kasus Ny "R" intervensi yang dilakukan sesuai dengan teori, maka tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

f. Langkah VI

Implementasi yang dilakukan pada Ny "R" sesuai dengan teori berdasarkan data bahwa pada pukul 20.00 wita pembukaan sudah lengkap, ketuban pecah jernih, hodge III-IV, presentase Kepala dengan UUK depan terdapat caput pada kepala.

Semua alat dan obat-obatan essensial telah siap digunakan dan pada jam 20.00 witta pimpinan meneran dilakukan sampai 30 menit kedepan tepatnya 20.30 wita namun bayi belum lahir. Melakukan kolaborasi dengan dokter obgyn untuk memasang infus RL 500 cc drips oksitosin 5 IU dengan 12 tetes permenit.

Memantau his, djj, dan nadi ibu tiap 30 menit serta tetesan infus, untuk memastikan kontraksi his mengalami kenaikan. Tepatnya pada jam 21.00 wita kontraksi his 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik, djj 130 x/menit, nadi ibu 80 x/menit, serta tetesan infus 16 tpm,

selanjutnya pada jam 21.30 wita dengan kontraksi dan durasi yang sama, djj 132 x/menit, nadi ibu 78 x/menit dan tetesan infus dinaikkan menjadi 20 tetesan permenit. Kemudian pada pukul 22.00 wita dengan kontraksi his yang sama namun durasi naik menjadi 45-50 detik, dengan tetesan infus sama, ibu mengatakan inin meneran dan tampak kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm.

Pimpinan meneran dilakukan pada jam 20.00 wita sampai 30 menit kedepan dan bayi lahir spontan dan tidak segera menangis (tidak bernapas dengan spontan dimana warna tubuh kemerahan, kaki pucat, stimulasi kurang, sedangkan denyut jantung janin kurang dari 100), apgar score 7/8, dengan caput suksadeneum, jenis kelamin laki-laki, BBL : 3350 gram, PBL : 49 cm.

Sesuai tinjauan manajemen kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman klien, implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

g. Langkah VII

Pada kasus Ny "R" bayi lahir tidak segera menangis (tidak bernapas dengan spontan dimana warna tubuh kemerahan, kaki pucat, stimulasi kurang, sedangkan denyut jantung janin kurang dari 100), apgar score 7/8, dengan caput suksadeneum, jenis kelamin laki-laki, BBL : 3350 gram, PBL : 49 cm. kala II berlangsung \pm 2 jam 30 menit, kasus ini terjadi karena kekuatan power ibu yang tidak adekuat dalam mendorong janin

keluar, terutama kekuatan kontraksi uterus yang menurun setelah memasuki kala II ditambah dengan lemahnya dorongan ibu. Hal ini disebut sebagai persalinan kala II lama akibat inersia uteri hipotonik sekunder, serta tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

h. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari S (Subjektif), menggambarkan pendokumentasian pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I Varney, berdasarkan pada kasus Ny "R" didapatkan bahwa ibu merasakan adanya dorongan untuk meneran, terasa sakit dan tembus belakang serta merasakan adanya tekanan pada rektumnya.

O (Objektif), menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnostic lain yang dirumuskan dalam data focus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney, pada kasus Ny "R" didapatkan kontraksi uterus 3-4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik, djj 138 x/menit, tampak vulva membuka, perineum menonjol, pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan lengkap dengan pengeluaran lendir bercampur darah, dan tampak bagian kepala bayi pada introitus vagina.

A (Assesment), menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi, diagnosis/masalah, antisipasi diagnosis/masalah potensial, perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi dan atau

rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 Varney. Berdasarkan pada kasus Ny “R” didapatkan assessment dengan persalinan kala II lama, ibu kelelahan, dan antisipasi terjadinya gawat janin.

P (Plan), menggambarkan pendokumentasian dan tindakan (Implementasi) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan assessment sebagai langkah 5, 6, dan 7 Varney (Salmah, 2006).

Pada kasus Ny “R” implementasi dilakukan sesuai dengan teori dan mendapatkan hasil evaluasi bayi lahir tidak segera menangis (tidak bernapas dengan spontan dimana warna tubuh kemerahan, kaki pucat, stimulasi kurang, sedangkan denyut jantung janin kurang dari 100), apgar score 7/8, dengan caput suksadeneum, jenis kelamin laki-laki, BBL : 3350 gram, PBL : 49 cm. kala II berlangsung ± 2 jam 30 menit, kasus ini terjadi karena kekuatan power ibu yang tidak adekuat dalam mendorong janin keluar, terutama kekuatan kontraksi uterus yang menurun setelah memasuki kala II ditambah dengan lemahnya dorongan ibu. Hal ini disebut sebagai persalinan kala II lama akibat inersia uteri hipotonik sekunder,

C. Kala III

a. Langkah I

Pada studi kasus Ny “R” didapatkan data bahwa ibu merasakan nyeri perut bagian bawah, dari data objektif tampak semburan darah tiba-tiba, kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat bertambah panjang.

Ada tiga perasat yang dapat digunakan untuk memastikan pelepasan plasenta, yaitu 1. Perasat kustner, perasat ini mengatakan bahwa untuk memastikan plasenta telah terlepas maka dilakukan dengan meletakkan tangan disertai tekanan pada/di atas simfisis, tali pusat ditegakkan, maka bila tali pusat masuk menandakan bahwa plasenta belum terlepas, bila tali pusat diam atau maju menandakan bahwa plasenta telah terlepas 2. Perasat klien mengatakan bahwa sewaktu ada his, Rahim kita dorong sedikit, bila tali pusat diam atau turun menandakan bahwa plasenta telah terlepas dari tempat insersinya. Adapun perasat yang ke 3, yaitu perasat strassman, perasat ini mengatakan bahwa tegangkan tali pusat dan ketok pada fundus, bila tali pusat bergetar menandakan bahwa plasenta telah terlepas (Mochtar, 2011).

b. Langkah II

Ny "R" didiagnosis perlangsungan kala III berdasarkan data yang didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri perut bagian bawah, dari data objektif tampak semburan darah tiba-tiba, kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat bertambah panjang.

Sesuai dengan teori bahwa kala III merupakan kala pengeluaran uri dimana proses ini dimulai ketika kelahiran bayi selesai dan berakhir dengan lahirnya plasenta. Kala III persalinan berlangsung rata-rata antara 5 sampai 10 menit. Akan tetapi, kisaran normal kala III sampai 30 menit (Varney, 2008).

c. Langkah III

Pada kasus Ny “R” tidak ada indikasi untuk ditegakkannya diagnose/masalah potensial. Ditinjau dari teori berdasarkan data yang yang dikumpulkan menunjukkan bahwa proses pelepasan dan pengeluaran plasenta terjadi secara normal dan tidak ada penyulit.

d. Langkah IV

Pada kasus Ny “R” tidak ada indikasi untuk dilkawkannya tindakan segera/emergency. Ditinjau dari teori berdasarkan data yang yang dikumpulkan menunjukkan bahwa proses pelepasan dan pengeluaran plasenta terjadi secara normal dan tidak ada penyulit.

e. Langkah V

Pada kasus Ny “R” dilakukan intervensi sesuai dengan teori yaitu melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta, namun sebelum tindakan ini dilakukan, setelah bayi lahir, dipastikan bahwa bayi lahir tunggal dengan meraba fundus uteri kemudian dilakukan penyuntikan oksitosin 10 IU secara intramuscular.

Berdasarkan teori yang didapatkan mengatakan bahwa kala III persalinan terdiri atas dua fase berurutan yaitu 1. Pelepasan plasenta dan 2. Pengeluaran plasenta. Pelepasan dan pengeluaran plasenta terjadi karena kontraksi uterus terjadi setiap 4 sampai 5 menit setelah kala II sampai plasenta terlepas dan tetap berkontraksi jika tonus otot baik, hal inilah yang menyebabkan nyeri setelah persalinan (Varney, 2008).

f. Langkah VI

Pada Ny “R” dilakukan implementasi berdasarkan dengan teori yaitu melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta, memastikan bahwa bayi lahir tunggal dengan meraba fundus uteri kemudian melakukan penyuntikan oksitosin 10 IU secara intramuscular. selanjutnya proses pelepasan dan pengeluaran plasenta terjadi secara normal dan tidak ada penyulit dimana plasenta lahir 10 menit setelah janin lahir yaitu jam 22.40 wita, plasenta lahir lengkap dengan perdarahan kurang lebih 150 cc.

g. Langkah VII

Dari kasus Ny “R” didapatkan tanda-tanda vital ibu dalam keadaan normal, plasenta dan selaput ketubang lahir lengkap jam 22.40 wita, kontraksi uterus baik ditandai dengan uterus teraba keras dan bulat, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, dengan perdarahan ± 150 cc, sehingga dapat disimpulkan bahwa kala III ibu berlangsung normal, serta tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

h. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari S (Subjektif), menggambarkan pendokumentasian pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I Varney, pada kasus Ny “R” didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri perut bagian bawah.

O (Objektif), menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnostic lain yang

dirumuskan dalam data focus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney, pada kasus Ny “R” didapatkan hasil pemeriksaan tampak semburan darah tiba-tiba, kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat bertambah panjang.

A (Assesment), menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi, diagnosis/masalah, antisipasi diagnosis/masalah potensial, perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 Varney. Pada kasus Ny “R” menunjukkan bahwa Ny “R” berada pada pperlangsungan kala III.

P (Plan), menggambarkan pendokumentasian dan tindakan (Implementasi) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan assesment sebagai langkah 5, 6, dan 7 Varney (Salmah, 2006). Pada kasus Ny “R” telah dilakukan implementasi sesuai dengan teori dan hasil evaluasi didapatkan tanda-tanda vital ibu dalam keadaan normal, plasenta dan selaput ketubang lahir lengkap jam 22.40 wita, kontraksi uterus baik ditandai dengan uterus teraba keras dan bulat, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, dengan perdarahan ± 150 cc.

D. Kala IV

a. Langkah I

Pada kasus Ny “R” sesuai dengan teori didapatkan bahwa ibu merasa kelelahan setelah persalinan, dari data objektif didapatkan bahwa kala III berlangsung ± 10 menit, plasenta lahir lengkap jam 22.40 wita,

kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat dengan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

Berdasarkan teori ibu dengan pemantauan kala IV persalinan yang harus diperhatikan yaitu, kontraksi uterus baik, tidak ada perdarahan pervaginam atau dari alat genitalia lain, plasenta dan selaput ketuban harus sudah lahir lengkap, kandung kemih harus kosong, dan luka-luka diperineum harus dirawat dan tidak ada hematoma, serta melihat keadaan umum ibu dan bayi (Damayanti, dkk, 2014)

b. Langkah II

Pada kasus Ny "R" didiagnosis kala IV dalam persalinan, hal ini sesuai dengan teori bahwa kala III berlangsung ± 10 menit, plasenta lahir lengkap pukul 22.40 wita dengan tanda-tanda vital dalam batas normal.

c. Langkah III

Pada kasus Ny "R" tidak ada data yang menunjang untuk terjadinya masalah potensial. Namun, pada kala IV sangat rentan terjadi perdarahan post partum. Perdarahan yang biasa terjadi yaitu perdarahan akibat atonia uteri, dimana keadaan lemahnya tonus/kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat imolantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir, perdarahan akibat adanya sisa plasenta yang tertinggal dalam uterus sehingga uterus tidak bekerja secara maksimal dalam melakukan kontraksi, hal ini biasa disebut sebagai rest plasenta.

Selain itu, perdarahan juga terjadi akibat adanya robekan/ruptur jalan lahir yang tidak segera dilakukan penjahitan, dan perdarahan akibat tidak normalnya proses pembekuan darah, hal ini biasa terjadi pada penyakit hemophilia (Saleha, 2009).

d. Langkah IV

Pada kasus Ny "R" tidak ada indikasi untuk dilakukan tindakan segera, hal ini sesuai dengan teori berdasarkan data yang didapatkan bahwa kala III berlangsung normal, kontraksi uterus baik, serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

e. Langkah V

Pada kasus Ny "R" intervensi yang dilakukan pada kala ini yaitu memantau tanda-tanda vital ibu, pemantauan perdarahan, kontraksi uterus, kandung kemih dan tinggi fundus uteri. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama yaitu dimulai jam 22.55 wita sampai 4 kali 15 menit yaitu ada jam 23.40 wita dan setiap 30 menit pada jam kedua yaitu mulai jam 24.10 wita sampai 2 kali 30 menit yaitu jam 24.40 wit. Serta mengukur suhu ibu setiap jam pada setiap jam pasca persalinan. Setelah itu memindahkan ibu ke ruang nifas jika pemantauan kala IV berlangsung normal dan keadaan ibu baik.

Berdasarkan dengan teori yaitu tindakan yang dilakukan pada kala ini yaitu memantau tanda-tanda vital ibu, karena pada kala ini banyak kemungkinan hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, selain itu dilakukan

pula pemantauan perdarahan, kontraksi uterus, kandung kemih dan tinggi fundusuteri,. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua post partum.

Pada kala ini diperhatikan pula akan adanya tanda-tanda infeksi (merah, bengkak, panas, bau, dan adanya pus) dan pengeluaran lokia (Saleha, 2009).

f. Langkah VI

Pada kasus Ny "R" dilakukan implementasi sesuai dengan teori yaitu memantau tanda-tanda vital ibu selama 4 kali 15 meni yaitu mulai jam 22.55 wita sampai 23.40 wita didapatkan tekanan darah ibu dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba bundar dank keras, kandung kemih kosong, serta perdarahan $\pm 50-20$ cc. selanjutnya melakukan pemantauan 2 kali 30 menit yaitu pada jam 24.10 wita sampai 24.40 wita ddidapatkan tekanan darah dalam batas normal, kontraksi uterus baik, tinggi fundus 1 jari dibawah pusat, kandung kemih kosonng serta perdarahan ± 10 cc. Keadaan bayi baik dengan pernapasan serta suhu dalam batas normal, serta mendokumentasikan hasil pemantauan ke dalam partograf. Selanjutnya memindahkan ibu ke ruang nifas.

g. Langkah VII

Pada kasus Ny "R" didapatkan bahwa ibu merasa kelelahan setelah persalinan, kontraksi uterus baik (teraba bundar dan keras), tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih kosong, jumlah perdarahan ± 150 cc. pada jam 24.40 wita tanggal 26 Mei 2016, hasil evaluasi menunjukkan

bahwa tidak terjadi penyulit pada kala IV/kala IV berlangsung normal, serta tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

h. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari S (Subjektif), menggambarkan pendokumentasian pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I Varney, berdasarkan pada kasus Ny "R" didapatkan bahwa ibu merasa kelelahan setelah persalinan.

O (Objektif), menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnostic lain yang dirumuskan dalam data focus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney, didapatkan kala III berlangsung ± 10 menit, plasenta lahir lengkap jam 22.40 wita, kontraksi uterus baik teraba bundar dan keras, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat dengan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

A (Assesment), menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi, diagnosis/masalah, antisipasi diagnosis/masalah potensial, perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 Varney. Berdasarkan data pada kasus Ny "R" maka assesment yang ditegakkan yaitu perlangsungan kala IV.

P (Plan), menggambarkan pendokumentasian dan tindakan (Implementasi) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan assesment sebagai langkah 5, 6, dan 7 Varney (Salmah, 2006). Berdasarkan

implementasi yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi yaitu ibu merasa kelelahan setelah persalinan, kontraksi uterus baik (teraba bundar dan keras), tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih kosong, jumlah perdarahan ± 150 cc.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan studi kasus pada Ny “R” dengan persalinan kala II lama serta menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan intra natal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny “R” dengan persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar tahun 2016.
2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnose/masalah aktual pada Ny “R” dengan persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar tahun 2016.
3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnose/masalah potensial pada Ny “R” dengan persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar tahun 2016. Masalah potensial yaituantisipasi terjadinya gawat janin.
4. Telah dilakukan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “R” dengan persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar tahun 2016. Kolaborasi dilakukan dengan pemberian infus drips oksitosin untuk memperbaiki kontraksi ibu supaya janin lahir dengan segera.
5. Telah dilakukan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar tahun 2016. Intervensi dilakukan dengan pimpinan persalinan secara normal, kepala di hodge IV, hanya kekuatan meneran ibu yang kurang.

6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar tahun 2016. Bayi lahir setelah dipimpin $\pm 2 \times 60$ menit, bayi lahir dengan tidak segera menangis, A/S : 7/8.
7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan persalinan kala II lama di RSKDIA Pertiwi Makassar tahun 2016. Kondisi ibu baik, tidak terjadi perdarahan, bayi lahir dengan tidak segera menangis dengan apgar score 7/8. Kala II lama berlangsung 2 jam 30 menit.

B. Saran

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya persalinan kala II lama yang dapat berdampak buruk baik pada ibu maupun janinnya maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, adapun penulis sarankan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya persalinan kala II lama maka perlu peningkatan kualitas pelayanan ANC dan pertolongan persalinan yang cepat dan tepat, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat timbul.
2. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam melaksanakan asuhan diperlukan kerja sama yang baik dengan pasien, keluarga pasien, dokter serta bidan yang terlibat dalam penanganan kasus klien.

3. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-penyulit yang dapat terjadi pada persalinan serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dkk. *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*. Bandung: Sygma. 2007.
- Anonim. *Tinjauan Islam Tentang Persalinan Kala II Lama*. www.voa-islam.com. 2011.
- Anonim. *Doa dalam Menghadapi Kesulitan*. www.islam-qa.com. 2013.
- BkkbN. *Jarak Kelahiran dan Dampak Kehamilan tidak Direncanakan*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2008.
- Chapman, Vicky. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kelahiran*. Cetakan Pertama, penerbit : Buku Asuhan Kedokteran EGC, Jakarta. 2006.
- Cunningham FG, et all. *Obstetri Williams. Edisi 21*. Jakarta : EGC. 2005.
- Damayanti, Ika Putri, dkk. *Buku Ajar: Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Hamilton, persis mary. *Dasar-dasar keperawatan maternitas*. Jakarta : EGC. 1995. h. 68.
- International classificaton of Diseases (ICD)-10. *Application of ICD-10 to deaths during pregnancy, childbirth and the puerperium: ICD maternal mortality(ICD-MM)*. Geneva: World Health Organization. 2012.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Buku Saku Millennium Development Goals (MDG's) di Bidang Kesehatan Tahun 2011-2015*. Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2013*. Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013.
- Manuaba, I.B.G. *Gawat-Darurat Obstetri-Ginekologi & Obstetri Ginekologi sosial Profesi Bidan*. Jakarta : EGC. 2008.
- _____. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB*. Jakarta: EGC. 2010. h. 389
- Mochtar, Rustam. *Synopsis Obstetri*. Jakarta : EGC. 2011.
- M. Quraish, Shihab. 2009. *Tafsir Al-Misbah Dan Terjemahannya*

- Nugraheny, Esti. S.S.T. *Asuhan kebidanan Patologi*. Yogyakarta : Pustaka Rihama. 2010. h. 103-110.
- Oxorn Harry, William R. Forte. *Ilmu kebidanan : Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta : Penerbit Andi. 2010. h. 60-68, 103-124 dan 603-633.
- _____. *Ilmu kebidanan: Patologi dan Fisiologi*. Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica. 2010. h.603-613.
- Purwaningsih,W. Fatmawati,S. *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Yogyakarta : Numed. 2010.
- Prawirohardjo, S. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta :PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2009.
- _____. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: EGC. 2010. h. M-47.
- _____. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2011.
- Rukiyah, Ai. Y, et al. *Asuhan Kebidanan IV (Patologi)*. Jakarta : TIM. 2010.
- Saifuddin, A B. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2006. h. 100 dan 184-190.
- _____. *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo. 2009.
- _____. *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo. 2010.
- Salmah, dkk. *Asuhan kebidanan antenatal*. Jakarta : EGC. 2006.
- Saleha, Sitti. “*Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*”, Jakarta : Salemba Medika. 2009.
- Sulistyawati, A., Nugraheny, E. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin*. Jakarta : Salemba Medika. 2010.
- Thalbah, Hisham. *Ensiklopedia M ukjizat Al-Qur'an dan Hadist*. Cetakan Ketiga. Penerbit PT. Sapta Sentosa. Jakarta. 2009.
- Varney, Helen. Dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Jakarta: EGC. 2007.
- _____. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Jakarta: EGC. 2008.

_____. *Varney's Midwifery text Book Third Edition*. London : Jan M. Kriebs. Carolyn L. Geger. 2004.

Winkjosastro, Haniifa. *Ilmu Kebidanan*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketujuh. Penerbit Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta. 2005.

World Health Organization (WHO). WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank. *Trends in maternal mortality: 1990 to 2013*. Geneva: World Health Organization. 2014.

Yulifah, Rita. *Konsep Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika. 2014. h. 127-137.



BIODATA PENELITI

A. Identitas Peneliti

Nama lengkap : Nur Hikma
NIM : 70400113002
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/TglLahir : Takalar, 17 February 2017
Agama : Islam
Alamat : BTN. Putri Tunggal Regency Blok I No
10A, Gowa
No. Hp : 082291833032
Email : nurhikmaa17@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 : SDN 22 Cakura, Takalar, Sul-Sel.
2. Tahun 2007-2010 : SMPN 5 Takalar, Takalar, Sul-Sel.
3. Tahun 2010-2013 : SMAN 1 Takalar, Takalar, Sul-Sel
4. Tahun 2013-2016 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sul-Sel.