

**PERAMALAN TINGKAT PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN  
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA  
MENGUNAKAN METODE *EXPONENTIAL SMOOTHING*  
(PEMULUSAN EKSPONENSIAL)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Matematika  
Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

**Oleh**

**RISA WAHYUNI**  
**60600114054**

**PRODI MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Wahyuni  
Nim : 60600114054  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba / 19 Oktober 1996  
Jurusan/Prodi : Matematika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi/S1  
Alamat : Perumahan Samata Residence Blok F/33 Kelurahan Romang  
Lompoa  
Judul skripsi : Peramalan Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan  
Rakyat Kabupaten Bulukumba Menggunakan Metode  
Exponential Smoothing

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,  
Yang membuat pernyataan



Risa Wahyuni  
60600114054

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peramalan Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bulukumba Menggunakan Metode Exponential Smoothing (Pemulusan Eksponensial)”, yang disusun oleh Saudari **Risa Wahyuni**, Nim: **60600114054** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **21 November 2018 M**, bertepatan dengan **13 Rabiul Awal 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 21 November 2018 M  
13 Rabiul Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rahmi Damis, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag  
Nip. 19691205 199303 1 001

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*SIAPA PUN YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH,  
SESUNGGUHNYA KESUNGGUHANNYA ITU  
ADALAH UNTUK DIRINYA SENDIRI*

**Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada :**

Ayah (H. Fathuddin, S.Pd) dan Ibu (Hj. Ratsiah, S.Pd.i) tercinta atas doa, nasehat, kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang telah menjadi motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi ini.

Saudara saya, Dian Fahriani, S.St, beserta keluarga besarku yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena dengan rahmat Islam, iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Peramalan Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bulukumba Menggunakan Metode *Exponential Smoothing*”**. Sebagai salah satu tugas akhir dan merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh suatu sarjana Matematika di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat dan salam senangtiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, penutup para nabi dari nabi yang di utus sebagai rahmat seluruh alam, juga kepada keluarga, para sahabat dan ummatnya hingga akhir hari.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **H. Fathuddin S.Pd** dan Ibunda **Hj. Ratsiah S.Pd.i**, serta saudara perempuan saya **Dian Fahriani, S.St** atas segala do’a, restu, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemikiran, waktu dan finansial. Oleh karena itu sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.S., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.A., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S. Si., M.Si. Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Wahida Alwi, S.Si., M.Si., Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Try Azisah Nurman, S.Pd.,M.Pd., Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, memeberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si., Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pada Staf dan Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan doa dorongan moral serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ibu Dr. Rahmi Damis, M.Ag., Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
9. Samriati, S.Si., operator Jurusan Matematika yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu pengurusan berkas kelengkapan ujian.
10. Teman-teman mahasiswa/mahasiswi “MED14N” Matematika 2014 yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
11. Teman-teman KKN angk. 58 se-Kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai, spesial terkhusus posko **Desa Tellulimpoe**. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta banyak kenangan bersama kalian yang tak terlupakan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Somoga semua amal kebbaikannya mendapat pahala dari Allah swt, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik bentuk, isi maupun penyusunannya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah swt. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di jurusan Matematika.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Samata-Gowa, Januari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR SIMBOL</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Masalah .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tanaman Pangan.....	9
B. Tanaman Perkebunan .....	10
C. Peramalan .....	10


D. Analisis Deret Waktu.....	12
E. Analisis Regresi Time Series .....	17
F. Uji Hipotesis .....	18
G. Uji Asumsi Model Regresi .....	20
H. <i>Exponential smoothing</i> .....	22
I. Ketetapan Peramalan .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
C. Jenis dan Sumber Data .....	30
D. Variabel Penelitian .....	30
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	31
F. Teknik Analisis.....	31
G. Prosedur Penelitian .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	35
B. Pembahasan .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b>	: Data persentase tanaman pangan .....	35
<b>Tabel 4.2</b>	: Data persentase tanaman perkebunan .....	36
<b>Tabel 4.3</b>	: Statistika Produksi Tanaman Pangan .....	37
<b>Tabel 4.4</b>	: Statistika Produksi Tanaman Perkebunan.....	37
<b>Tabel 4.5</b>	: Regresi Time Series Tanaman Pangan.....	40
<b>Tabel 4.6</b>	: Tabel Anova Tanaman Pangan.....	41
<b>Tabel 4.7</b>	: Uji Normalitas Tanaman Pangan.....	42
<b>Tabel 4.8</b>	: Uji Linearitas Tanaman Pangan.....	43
<b>Tabel 4.9</b>	: Uji Homokedastisitas Tanaman Pangan.....	43
<b>Tabel 4.10</b>	: Uji autokorelasi Tanaman Pangan.....	44
<b>Tabel 4.11</b>	: Persamaan Regresi Produksi Perkebunan.....	45
<b>Tabel 4.12</b>	: Tabel anova Produksi Perkebunan .....	46
<b>Tabel 4.13</b>	: Uji Normalitas Tanaman Perkebunan.....	47
<b>Tabel 4.14</b>	: Uji Linearitas Tanaman Perkebunan.....	47
<b>Tabel 4.15</b>	: Uji Homokedastisitas Tanaman Perkebunan.....	48
<b>Tabel 4.16</b>	: Uji Autokorelasi Tanaman Perkebunan.....	48
<b>Tabel 4.17</b>	: Parameter Optimum Tanaman Pangan.....	50
<b>Tabel 4.18</b>	: Prediksi Tanaman Pangan .....	51
<b>Tabel 4.19</b>	: Akurasi Peramalan Tanaman Pangan .....	52
<b>Tabel 4.20</b>	: Parameter Optimum Tanaman Perkebuna.....	53
<b>Tabel 4.21</b>	: Prediksi Tanaman Perkebunan.....	54
<b>Tabel 4.22</b>	: Akurasi Peramalan Tanaman Perkebunan.....	55

## DAFTAR GAMBAR

<b>Plot 4.1</b> : Produksi Tanaman Pangan .....	38
<b>Plot 4.2</b> : Produksi Tanaman Perkebunan .....	39
<b>Plot 4.3</b> : Plot Diagram Batang Tanaman Pangan.....	40
<b>Plot 4.4</b> : Plot Diagram Batang Tanaman Perkebunan.....	44
<b>Plot 4.5</b> : <i>Fitting</i> Data Tanaman Pangan.....	51
<b>Plot 4.6</b> : <i>Fitting</i> Data Tanaman Perkebunan.....	54



## DAFTAR SIMBOL

$\hat{Y}_t$	= Respon
$X_t$	= variabel prediktor
$\beta_0$	= konstanta (intercept)
$\beta_1$	= konstanta (slope)
$\varepsilon$	= kesalahan parameter
$\alpha$	= Derajat kesalahan (0.05)
$H_0$	= Penolakan hipotesis
$H_1$	= Penerimaan hipotesis
$t$	= waktu
$Y_t$	= Ramalan exponential yang terakhir
$X_{t-n}$	= Observasi yang lalu
$Y_{t+1}$	= Ramalan untuk periode yang mendatang
$a$	= Konstanta pemulusan (smoothing)
$S_0$	= Penaksiran awal dari $a$
$a$	= permintaan rata-rata
$e_T$	= random error
$S_T$	= rata-rata tertimbang dari semua data lampau
$S_T'$	= adalah nilai pemulusan <i>eksponential smoothing</i> tunggal
$S_T''$	= nilai pemulusan <i>exponential</i> ganda.
$m$	= periode kedepan yang diramalkan
$S_T'$	= Nilai single exponential periode $t$
$Y_T$	= Data aktual periode $t$

$S_{T-1}$  = Nilai single exponential periode t-1

$S''_{T-1}$  = Nilai double exponential periode t-1

$a_t$  = Konstanta pemulusan

$S_T''$  = Nilai pemulusan pada periode t

$X_t$  = Data aktual time series periode t

$S_{t-1}$  = Nilai pemulusan pada t-1

$b_{t-1}$  = nilai trend periode t-1

$b_t$  = nilai trend periode t

$\gamma \cdot a$  = parameter pemulusan

$F_{t+m}$  = hasil peramalan untuk periode yang akan datang



## ABSTRAK

**Nama** : Risa Wahyuni  
**Nim** : 60600114054  
**Judul** : **Peramalan Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bulukumba Menggunakan Metode Exponential Smoothing**

---

Penelitian ini membahas tentang produksi pertanian. Dalam sektor pertanian terdapat jenis tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat. *Exponential smoothing* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meramalkan jumlah produksi yang akan datang, jenis *double exponential smoothing* dengan  $\alpha=1$  dan  $\beta= 0.036$  dapat diaplikasikan terhadap data produksi tanaman pangan, dan *single exponential smoothing dengan  $\alpha=0.75$*  dapat diaplikasikan terhadap data produksi perkebunan rakyat. Tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produksi tanaman pangan tahun 2020 dan produksi tanaman perkebunan rakyat tahun 2018 kabupaten Bulukumba. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa produksi tanaman pangan tahun 2020 sebesar 518.087,09 ton, dan produksi tanaman perkebunan tahun 2018 sebesar 43.814,05 ton.

**Kata Kunci** : *Tanaman Pangan Dan Perkebunan, Single Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing*

## ABSTRACT

**Name** : Risa Wahyuni  
**Nim** : 60600114054  
**Title** : **Peramalan Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan  
Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bulukumba  
Menggunakan Metode Exponential Smoothing**

---

*This study discusses agricultural production. In the sector of agriculture there are some kinds of food plantation and society plantation. Exponential smoothing is one of the method which can be used to predict the number of production which will come, the kinds of double exponential smoothing with  $\alpha=1$  and  $\beta=0.036$  can be applied to the production data of the society agriculture and single exponential smoothing with  $\alpha = 0.75$  can be applied to society plantation. The aim of the research is to know the production of the food plantation in 2020 and the the production of society plantation 2018 in Bulukumba regency. As a result of this research, it could be seen that the production of food plantation in 2020 the amount of 518.087,09 ton, and the production of plantation in 2018 in the amount of 43.814,05 ton.*

**keywords** : Agriculture And Plantation, Single Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Berbicara tentang pertanian tidak terlepas dari masyarakat. Pertanian sudah menjadi peranan penting bagi suatu masyarakat khususnya pada daerah lahan yang luas serta memiliki tanah yang subur. Selain itu, pertanian juga berperan penting dalam peningkatan suatu daerah serta perekonomian daerah itu sendiri dan sebagai sarana dalam berusaha memenuhi kebutuhan keluarga.

Pertanian lebih banyak dijumpai pada kawasan pedesaan dimana menempatkan pertanian sebagai pokok utama perekonomian masyarakatnya, daerah pedesaan juga mempunyai lahan yang luas, banyak masyarakat desa yang lebih memilih bertani sehingga basis ekonomi pedesaan menjadi faktor utama dalam mengembangkan pertanian. Pembangunan pertanian tidak hanya pada pedesaan tetapi juga pada daerah serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung struktur perekonomian suatu wilayah yang merupakan faktor dasar sehingga dapat membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

Kabupaten Bulukumba menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu potensi unggulan yang dapat memberikan peluang yang besar terhadap perekonomiannya. Hal ini didukung dengan sumber daya lahan yang luas, iklim yang sesuai dan keanekaragaman sumber hayati yang besar, kondisi ini dapat dilihat pada luas pertaniannya yaitu 104.321 Ha. Kabupaten Bulukumba salah satu daerah dengan tingkat penghasilan alamnya yang baik diantaranya pada bidang tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura. Dimana Kabupaten

Bulukumba berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang jaraknya 153 km dari ibukota Provinsi dengan wilayah kabupaten terdiri atas 10 kecamatan yang memiliki 27 kelurahan dan 99 desa. Berdasarkan hasil sensus penduduk, Kabupaten Bulukumba memiliki jumlah penduduk sebanyak 394,757 dengan jenis tanah berwarna coklat kelabu dan merah..

pangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena pangan merupakan bahan makanan paling utama yang di butuhkan oleh tubuh manusia itu sendiri, selain untuk dikonsumsi, hasil produksi dari pangan juga dapat dijadikan sebagai sumber usaha dalam perekonomian. Jenis produksi pangan pada Kabupaten Bulukumba yaitu padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.

Selain pangan, terdapat pula perkebunan dimana juga memiliki peranan yang besar untuk masyarakat, dimana hasil produksinya selain diolah sendiri juga dapat diolah di suatu perusahaan atau industri. Perkebunan sudah dijadikan salah satu mata pencaharian masyarakat dan dapat memiliki potensi yang besar dalam pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani itu sendiri. produksi perkebunan di Kabupaten Bulukumba termasuk potensi unggulan diantaranya kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, kelapa, karet, dan lainnya.

Untuk mengetahui jumlah produksi pada tanaman pangan dan perkebunan rakyat dapat dilakukan peramalan sebagai salah satu unsur yang paling penting dalam pengambilan keputusan agar hasil yang didapatkan akurat. Ramalan yang dilakukan umumnya berdasarkan pada data masa lampau yang akan di analisis dengan menggunakan suatu cara tertentu. Data masa lampau tersebut

dikumpulkan kemudian melakukan analisis dan dihubungkan dengan perjalanan waktu. Dengan adanya faktor pada waktu itu, sehingga hasil tersebut akan dikatakan sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang.

Ramalan tidak ada dijelaskan dalam al-Qur'an karena segala sesuatu ditentukan oleh Allah swt seperti dalam QS al-Luqman / 31:34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak satu jiwa pun yang dapat mengetahui apa yang akan di usahakannya besok, dan tidak satu jiwa dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.<sup>1</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa sesungguhnya Allah hanya pada sisi Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, tidak ada satu makhluk betapa pun tinggi kedudukannya yang dapat mengetahui masa datangnya. Dia jugalah yang menurunkan hujan dalam berbagai bentuknya, cair atau membeku, dan dilokasi manapun dia tetapkan dan dia pula yang terus menerus mengetahui apa yang di dalam rahim, bukan saja jenis kelaminnya, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan janin termasuk penentuan nasibnya, dan tidak satu jiwa pun pandai atau bodoh yang dapat dengan pasti mengetahui secara rinci apa yang akan di usahakannya besok, dan tidak satu jiwa juga yang dapat mengetahui secara pasti di bumi mana dan kapan ia akan mati.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Bandung:CV.Diponegoro,2008).

<sup>2</sup> M.Quraish Shihab." *Tafsir Al-Misbah*". ( Jakarta:2004). hal:163-167

Dalam menentukan apa yang akan terjadi, hanya Tuhanlah yang tahu. Manusia dapat memperkirakan berdasarkan fenomena atau gejala alam yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, meningkatnya produksi pangan dan perkebunan, manusia berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya, baik dari segi kualitas bibit tanaman ataupun kualitas tanahnya, akan tetapi penentuan akhir adalah Allah swt.

Pada masa sekarang, semakin banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan di suatu daerah diantaranya pada Kabupaten Bulukumba, dimana dengan pembangunan tersebut banyak dibangun bangunan dengan menggunakan lahan dari persawahan atau lahan perkebunan, dengan adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan maka nantinya lahan pertanian dan perkebunan akan terus berkurang. Olehnya itu dengan melihat hasil jumla produksi setiap tahun berbeda-beda maka dilakukan peramalan dengan menggunakan metode *exponential smoothing*.

Jumlah produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan di Kabupaten Bulukumba yang hasilnya berbeda-beda atau bersifat tidak tetap sehingga sangat sulit untuk mendapatkan suatu informasi dalam memenuhi permintaan pada waktu yang akan datang, dengan demikian digunakan metode *exponential smoothing* agar lebih mudah dalam peramalan pada masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode *exponential smoothing* ini maka dapat diketahui suatu model yang sesuai dalam melakukan peramalan agar hasil yang didapatkan nantinya akan lebih akurat. Pada data tingkat jumlah produksi tanaman pangan menunjukkan pola trend sehingga digunakan metode *double exponential*

*smoothing*, dan tanaman perkebunan rakyat menunjukkan pola konstan sehingga digunakan metode *single exponential smoothing*.

Penelitian tentang peramalan dengan menggunakan metode *exponential smoothing* sudah pernah dilakukan oleh para peneliti. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Affiati Oktaviarina (2017) yang meramalkan tentang peramalan jumlah penumpang kereta api di Indonesia menggunakan metode *exponential smoothing*. Berdasarkan hasil penelitiannya, jumlah penumpang kereta api bulan januari sampai dengan desember 2018 menunjukkan adanya pertumbuhan dari bulan ke bulan sepanjang tahun, dimana metode *double exponential smoothing* yang cocok digunakan pada penelitian tersebut.<sup>3</sup> Kemudian Faisol dan Sitti Aisah (2016) yang berjudul Penerapan metode *Exponential Smoothing* untuk peramalan jumlah klaim di BPJS kesehatan pamekasan. Hasil penelitian didapatkan adalah hasil peramalan metode *double exponential smoothing* digunakan untuk meramalkan data dengan pola trend, dan untuk bulan ke 25 sampai 30 menunjukkan jumlah klaim di BPJS kesehatan pamekasan menurun atau berkurang dengan nilai  $RMSE = 98.865$  dan  $MAPE = 7.002$ .<sup>4</sup>

Peramalan dengan metode *exponential smoothing* dapat dilakukan dengan cara mengulang secara terus menerus dengan menggunakan data yang baru. Metode *exponential smoothing* ini dapat digunakan untuk meramalkan data produksi jangka panjang dan jangka menengah dan suatu metode untuk data deret

---

<sup>3</sup> Affiati Oktaviarina. *Peramalan Jumlah Penumpang Kereta Api di Indonesia Menggunakan Metode Exponential Smoothing*. Jurnal Buana Matematika Vol 7, No 2. 2017

<sup>4</sup> Faisol dan Sitti Aisah. *Penerapan Metode Exponential Smoothing Untuk Peramalan Jumlah Klaim Di BPJS Kesehatan Pamekasan*. Jurnal Matematika vol 02. No 01. Oktober 2016.

waktu yang meramalkan persediaan atau produksi. Ada 3 macam metode pemulusan eksponensial yaitu *single exponential smoothing*, *double exponential smoothing*, dan *triple exponential smoothing*. *Single exponential smoothing* dapat digunakan untuk peramalan jangka pendek, *double exponential smoothing* digunakan ketika berbentuk data *trend*, dan *triple exponential smoothing* digunakan ketika data menunjukkan adanya *trend* dan perilaku musiman.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang akan diselesaikan adalah:

1. Berapa besar hasil peramalan tingkat produksi tanaman pangan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 menggunakan metode *double exponential smoothing*?
2. Berapa besar hasil peramalan tingkat produksi tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 menggunakan metode *single exponential smoothing*?

### **C. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hasil peramalan tingkat produksi tanaman pangan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 menggunakan metode *double exponential smoothing*.
2. Untuk mengetahui hasil peramalan tingkat produksi tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 menggunakan metode *single exponential smoothing*.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan kepada pembaca dan melatih kemampuan penulis dalam menganalisis masalah berdasarkan fakta dan data yang disesuaikan dengan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.
2. Bagi Pembaca, dijadikan sebagai acuan referensi atau bahan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah, dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan dalam meramalkan atau memprediksi produksi dapat menggunakan metode *exponential smoothing*.

#### ***E. Batasan Masalah***

Batasan masalah pada penelitian ini adalah data produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan pada tahun 1996 sampai 2017, metode yang digunakan pada peramalan ini adalah *double exponential smoothing* dan *single exponential smoothing*.

#### ***F. Sistematika Penulisan***

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini, maka penyusunannya didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Sistematika Penulisan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam menganalisis tingkat produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba.

## **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, variabel-variabel penelitian, dan teknik analisis data.

## **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, analisis penelitian dan pembahasan.

## **Bab V Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **Daftar Pustaka**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tanaman Pangan

Produksi pangan merupakan suatu jenis kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan manusia. Dengan Ketersediaan pangan dapat mempengaruhi stabilitas pangan. Beberapa komoditas tanaman pangan yang pokok diantaranya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.<sup>5</sup>

##### 1. Umbi-umbian

Tanaman umbi-umbian adalah tanaman yang dapat ditanam untuk dipanen umbinya karena didalam umbi mengandung karbohidrat untuk sumber nutrisi bagi tubuh. Adapun tanaman umbi-umbian yang biasa dimanfaatkan oleh manusia yaitu ubi kayu (singkong), ubi jalar, talas, wortel dan lainnya.<sup>6</sup>

##### 2. Serealia

*Serealia* adalah sekumpulan tanaman yang dapat dimanfaatkan bijinya atau sebagai sumber karbohidrat. *serealia* termasuk dalam kelompok suku padi-padian yang biasa disebut sebagai serealia sejati. Kelompok tanaman *serealia* yang banyak dikonsumsi manusia adalah gandum, padi, dan jagung.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rudy Ariyanto, dkk. *Penerapan Metode Double Exponential Smoothing Pada Peramalan Produksi Tanaman Pangan*. Jurnal Informatika Polinema. hal: 57.

<sup>6</sup> Andi, Arif Ramadhan. *Pengertian dan jenis-Jenis Tanaman Pangan dan Holtikultura*. (Jakarta: 2016)

<sup>7</sup> Tati, Nurmala. *Serealia*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1998). hal: 4

### 3. Biji-bijian

tanaman yang didalamnya mengandung protein dan karbohidrat dapat disebut juga sebagai Biji-bijian. Tanaman biji-bijian yang sering dikonsumsi manusia diantaranya kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai.

### **B. Tanaman Perkebunan**

usaha tanaman perkebunan yang dimiliki dan atau diselenggarakan atau dapat dikelola oleh perorangan dan tidak berbadan hukum, dengan memiliki jumlah tanaman yang dipelihara lebih dari batas minimum usaha (BMU) disebut tanaman perkebunan. Sedangkan Pengelola tanaman perkebunan adalah perkebunan rakyat yang dapat diselenggarakan secara komersial dan mempunyai jumlah pohon yang dipelihara lebih besar dari batas minimal usaha.<sup>8</sup>

### **C. Peramalan**

Peramalan merupakan cara memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa depan, berdasarkan pada data yang relevan pada masa lalu. Oleh karena itu metode peramalan didasarkan atas data yang relevan maka metode peramalan ini dipergunakan dalam peramalan yang objektif. Terdapat dua langkah dasar yang harus dilakukan dalam membuat atau menghasilkan suatu peramalan yang akurat dan berguna yaitu pertama adalah pengumpulan data yang relevan dengan tujuan peramalan dan menurut informasi-informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat, kemudian kedua memilih metode peramalan yang tepat yang akan digunakan dalam mengolah informasi yang terkandung dalam data yang telah dikumpulkan.

---

<sup>8</sup> Firdaus Hasan. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)*. (Makassar: 2009). hal:2

Peramalan dapat dibedakan dari beberapa segi tergantung dari cara melihatnya, yaitu dilihat dari jangka waktu ramalan dan dilihat dari sifat ramalan.<sup>9</sup>

Proses peramalan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan tujuan, menganalisis dan membicarakan dengan para pembuat keputusan dalam perusahaan untuk mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan mereka dalam menentukan:
  - i. Variabel-variabel apa yang di estimasi
  - ii. Siapa yang akan menggunakan hasil peramalan
  - iii. Untuk tujuan apa hasil peramalan akan digunakan
  - iv. Estimasi jangka panjang atau jangka pendek yang diinginkan
  - v. Derajat kecepatan estimasi yang diinginkan
  - vi. Jenis-jenis peramalan yang diinginkan, misalkan peramalan kelompok pembeli, produk, dan daerah geografis.
2. Pengembangan model

Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengembangkan model. Pengembangan model ini merupakan penyajian yang lebih sederhana sistem yang dipelajari. Model adalah suatu kerangka analitik yang apabila dimasukkan data masukan menghasilkan estimasi penjualan diwaktu mendatang.

3. Pengujian model

Sebelum diterapkan model biasanya diuji untuk menentukan tingkat akurasi, validitas, dan reliabilitas yang diharapkan.

---

<sup>9</sup> Mason. Teknik Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi. (Jakarta : Erlangga:1999)hal. 317: 319

#### 4. Penerapan model

Setelah pengujian model, maka model akan diterapkan dalam tahapan untuk menghasilkan suatu ramalan.

Adapun pengertian peramalan menurut para ahli yaitu:

1. Heizer dan Render: Peramalan (forecasting) adalah seni dan ilmu yang memprediksi peristiwa masa depan.<sup>10</sup>
2. Nasution : Peramalan memperkirakan beberapa kebutuhan dimasa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas (jumlah), kualitas mutu, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa.<sup>11</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peramalan adalah suatu cara untuk mengetahui jumlah produksi atau permintaan barang ke masa yang akan datang.

#### D. Analisis Deret Waktu

Deret waktu merupakan serangkaian nilai pengamatan yang diambil pada kurun waktu tertentu dalam interval-interval yang sama panjang. Adapun contoh deret waktu yaitu produksi total tahunan besi baja di Negara Amerika Serikat pada kurun waktu beberapa tahun lamanya, harga penutupan harian sebuah saham pasar modal pada kurun waktu satu bulan. Secara matematis, deret waktu dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai  $Y_1, Y_2, \dots$  dari suatu variabel  $Y$  (suhu udara, harga penutupan saham) pada titik-titik waktu  $t_1, t_2, \dots$ , dengan

---

<sup>10</sup> Jay, Heizer dan Barry Render. *Operations Management Edisi Ke Sembilan*. (Jakarta: Salemba.2011). hal:46

<sup>11</sup> Hakim Arman Nasution. *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. (Jakarta: Guna Wijaya.2003).hal: 25

demikian  $Y$  adalah suatu fungsi dari  $t$  dan dapat disimbolkan sebagai  $Y = F(t)$ .<sup>12</sup>

Peramalan (*forecast*) yaitu alat bantu paling penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien khususnya dalam perekonomian. Dalam organisasi modern dapat mengetahui keadaan yang akan datang, tidak saja penting untuk melihat yang baik atau buruk tetapi juga bertujuan untuk melakukan persiapan peramalan. Peramalan merupakan prediksi, proyeksi atau estimasi tingkat kejadian yang tidak pasti pada masa yang akan datang. Ketetapan secara mutlak dalam memprediksi peristiwa dan tingkat kegiatan yang akan datang adalah tidak mungkin dicapai, sehingga ketika perusahaan tidak dapat lagi melihat kejadian yang akan datang secara pasti maka diperlukan waktu dan tenaga yang besar agar dapat mempunyai kekuatan untuk menarik kesimpulan terhadap kejadian pada masa kedepan.<sup>13</sup>

Unsur penting yang harus diketahui apabila ingin melakukan peramalan menggunakan analisis statistik yaitu runtun waktu (*time series*). Analisis yang tepat akan menjadikan peramalan terhadap suatu keadaan pada masa mendatang lebih akurat. Deret berkala yaitu data statistik yang tersusun berdasarkan urutan waktu. Deret berkala itu sendiri akan di bedakan menjadi empat komponen variasi, diantaranya tren sekuler, variasi musiman, variasi siklis, dan variasi tak beraturan.

---

<sup>12</sup> Murray R. SPIEGEL dan Larry J. Stephens. *Statistik Edisi Ketiga*. hal: 352

<sup>13</sup> Afni, Sahara. *Sistem Peramalan Persediaan Unit Mobil Mitsubishi Pada PT. Sardana Indah Berlian Motor Dengan Menggunakan Metode Exponential Smoothing*. Jurnal Informasi dan Teknologi Ilmiah (INTI) Volume 1 No 1 Oktober 2013. hal:2

a. Tren sekuler (*Secular Tren*)

pergerakan naik dan turun pada suatu keadaan dalam jangka panjang disebut tren sekular. Secara grafis tren ini menggambarkan suatu gerakan atau cenderung lamban, panjang, dan menuju ke satu arah. Pergerakan dalam tren sekular dapat saja naik serta bisa pula menurun, bahkan konstan. Apabila pergerakan dalam tren sekular menggambarkan gejala kenaikan, maka ia disebut sebagai tren sekular positif, sedangkan jika ia menunjukkan gejala penurunan tren sekular di sebut tren sekular yang negatif. Jika tren sekular memperlihatkan gejala yang konstan, maka tren ini disebut sebagai tren sekular yang konstan. Adapun gambar yang menunjukkan tren sekuler adalah:




Gambar 2.1. Tren sekuler

b. Variasi musiman (*Seasonal variation*)

Variasi musiman adalah suatu pergerakan keadaan yang berlangsung secara periode dalam jangka waktu satu tahun, yang di sebut juga tren musiman dan akan berulang dalam setiap tahunnya, contohnya kecenderungan meningkatnya permintaan yang di ikuti oleh peningkatan harga beberapa komoditas tertentu misalnya telur, daging dan pakaian jadi. Adapun besarnya nilai variasi musiman ini dapat dinyatakan dalam bentuk persentase

yang disebut juga sebagai indeks musiman. Adapun gambar dibawah ini yang merupakan indeks musiman adalah:




**Gambar 2.2.** Variasi Musiman

c. Variasi siklis

Aktivitas pada bidang perdagangan industri, dan keuangan menunjukkan suatu pergerakan meningkat atau menurun secara siklis di sekitar tren statistika atau di dekat kondisi normal, dinamika ini dinamakan variasi siklis atau siklus usaha, ada yang menamakan variasi siklis sebagai konjungtur, variasi siklis itu sendiri merupakan pergerakan tren yang meningkat atau pun menurun dalam jangka waktu yang relatif panjang dari pada variasi musiman yang biasa saja terjadi dalam lima, sepuluh, dua puluh lima tahun atau bahkan lebih.

Timbulnya kecenderungan pergerakan yang bersifat siklis ini biasa diakibatkan oleh dinamika kegiatan yang sifatnya agregat misalnya suatu perkembangan pada tingkat harga barang secara keseluruhan, ada kalanya variasi siklis oleh beberapa faktor eksternal dan tidak bersifat ekonomis contohnya perubahan sosial. Pada kondisi normal variasi siklis terdiri atas tahap

pemulihan, kemakmuran, atau kemunduran. Adapun gambar dibawah ini yang menunjukkan variasi siklis :




**Gambar 2.3.** Variasi siklis

d. Variasi tak beraturan (*irregular variation*)

variasi tak beraturan disebut juga sebagai variasi acak atau kejadian yang tak terduga. Hanya saja pada fluktuasi yang terjadi bisa saja terasa dan sebaliknya mungkin juga tidak terdeksi. Variasi yang tak beraturan ini dapat disebabkan oleh hal-hal yang terjadi secara kebetulan, misalnya banjir, gempa bumi, kerusuhan besar dan lain sebagainya.

Perbedaan antara variasi tak beraturan dengan yang lainnya ada pada sistematika fluktuasi yang diciptakan. Tren sekular, variasi musiman, serta variasi siklis dapat menciptakan pengaruh yang sistematis dan tidak acak. Fluktuasi yang terjadi pada ketiganya berlangsung secara teratur dan sistematis, sementara pada variasi yang tak beraturan, fluktuasi yang terjadi merupakan

pancaran yang jarang bisa dipastikan kapan terulangnya lagi, gambar dibawah ini yang menunjukkan variasi tak beraturan yaitu:<sup>14</sup>



**Gambar 2.4.** Variasi tak beraturan

### E. Analisis Regresi *Time Series*

Analisis regresi adalah teknik statistik untuk pemodelan dan menyelidiki hubungan antara variabel hasil atau respon dan satu atau lebih prediktor. Hasil akhir dari studi analisis regresi sering menghasilkan model yang dapat digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai variabel respon dimasa yang akan datang. Adapun model regresinya yaitu:<sup>15</sup>

$$\hat{Y}_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon \quad (2.1)$$

Dimana

$\hat{Y}_t$  = Respon

$X_t$  = adalah variabel prediktor

$\beta_0$  = konstanta (intercept)

$\beta_1$  = konstanta (slope)

<sup>14</sup> Purbayu, Budi Santosa dan Muliawan Hamdani. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. (Jakarta : Erlangga.2006). hal. 192-197

<sup>15</sup> Ajoy K.Palit dan Dobrivoje Popovic. *Computational Intelligence in Time Series Forecasting*. (Jerman :Springer.2005)hal: 51.

$\varepsilon$  = kesalahan parameter

## F. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan tentang sifat populasi sedangkan uji hipotesis adalah suatu prosedur untuk pembuktian kebenaran sifat populasi berdasarkan data sampel.

Dalam statistika, hipotesis yang ingin di uji kebenarannya tersebut biasanya membandingkan dengan hipotesis yang salah yang nantinya akan ditolak. Hipotesis yang salah dinyatakan sebagai hipotesis nol disimbolkan dengan  $H_0$  dan hipotesis yang benar dinyatakan sebagai hipotesis alternatif dengan simbol  $H_1$ , dalam menguji kebenaran hipotesis dari data sampel, statistika telah mengembangkan uji F dan uji t.

### a. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna tetap terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  pada derajat kesalahan 5% dalam artinya ( $\alpha = 0.05$ ), apabila nilai  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , maka variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat sehingga dapat diterima.

### b. Uji t

Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol ( $H_0$ ), keputusan untuk menerima atau menolak  $H_0$  dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data. Dalam hipotesis penelitian yang menggunakan data sampel dengan

menggunakan uji t adalah masalah pemilihan apakah menggunakan dua sisi atau satu sisi. Uji hipotesis dua sisi dipilih jika tidak punya dugaan kuat atau dasar teori yang kuat dalam penelitian, dan sebaliknya memilih satu sisi jika peneliti mempunyai landasan teori atau dugaan yang kuat.

Adapun pengujian hipotesis dengan menggunakan uji satu sisi dan uji 2 sisi yaitu:

1. Uji hipotesis satu sisi

$$H_0 = \beta_1 \leq 0$$

$$H_1 = \beta_1 > 0$$

Keputusan menolak atau menerima  $H_0$  yaitu:

Jika nilai t hitung  $>$  nilai t kritis maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_1$

Jika nilai t hitung  $<$  nilai t kritis maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_1$

Jika menolak hipotesis  $H_0$  atau menerima  $H_1$  berarti secara statistik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen, dan sebaliknya jika  $H_0$  diterima atau menolak  $H_1$  maka secara statistik variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2. Uji hipotesis dua sisi

$$H_0 = \beta_1 = 0$$

$$H_1 = \beta_1 \neq 0$$

Dalam hipotesis  $\beta_1 \neq 0$  dinyatakan bahwa variabel independen mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen. Dan

hipotesis  $\beta_1 = 0$  dapat dinyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dapat digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan derajat kesalahan  $\alpha = 0.05$ , apabila nilai  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka variabel bebasnya memberikan pengaruh terhadap variabel terikat.<sup>16</sup>

### G. Uji Asumsi Model Regresi

Ada beberapa uji asumsi dalam analisis regresi yaitu:

#### 1. Uji normalitas

untuk melihat nilai galat yang berdistribusi normal atau sebaliknya tidak berdistribusi normal maka dapat digunakan uji normalitas, model regresi yang baik adalah memiliki nilai galat yang berdistribusi normal dan dapat dideteksi menggunakan uji *Jarque Bera*, jika galat berdistribusi normal maka nilai signifikan lebih besar dari alpha.

Hipotesis:

$H_0$  = Data berdistribusi normal

$H_1$  = Data tidak berdistribusi normal

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika P-Value  $< \alpha$ , dengan  $\alpha = 0.05$ .

Adapun ciri-ciri kurva normal yaitu:<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Agus Tri Basuki, Nano Prawoto."Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis". Jakarta.(Rajawali Pers:2016)h:57

<sup>17</sup> Pangestu Subagyo, *Statistika Induktif Edisi 5*. (Yogyakarta:BPFE. 2005)hal.67-68

- a. Kurvanya mempunyai bentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti peta.
  - b. Kedua ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya tetapi tidak memotong.
  - c. Jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan  $\sigma$ .
  - d. Luas daerah dibawah lengkungan kurva tersebut dari minus terhingga sampai terhingga sama dengan 1 atau 100%.
2. Uji linearitas

Uji linearitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan, uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear.

$H_0$  = Tidak ada hubungan linear

$H_1$  = Ada hubungan linear

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika  $P - Value > \alpha$ , dimana  $\alpha = 0.05$ .

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat digunakan untuk melihat ketidaksamaan *varians* dari galat satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah terdapat kesamaan *varians* atau dapat disebut dengan homokedastisitas. Apabila nilai *varians* semakin kecil atau semakin besar dengan meningkatkan nilai  $\hat{Y}$  dikatakan *heteroskedastisitas*. Adapun syarat pengujian yaitu:

$H_0$  = Tidak ada gejala heteroskedastisitas

$H_1$  = Ada gejala heteroskedastisitas

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika  $P - Value > \alpha$ , dimana  $\alpha = 0.05$ .<sup>18</sup>

#### 4. Uji Autokorelasi

Galat pada autokorelasi dapat mengidentifikasi salah satu atau beberapa variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi yang mempengaruhi variabel terikat. Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat terjadinya korelasi antara suatu periode  $t$  dengan periode sebelumnya ( $t-1$ ), analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara data observasi dengan data observasi sebelumnya. salah satu ukuran dalam menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin Watson adalah:<sup>19</sup>

- a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah antara -2 ( $DW < -2$ )
- b. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau  $-2 < DW < +2$
- c. Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW diatas +2 atau  $DW > +2$

#### H. *Exponential Smoothing* (Pemulusan Eksponensial)

*Exponential smoothing* merupakan salah satu teknik yang lain yang bisa digunakan untuk menghaluskan *time series*, cara itu bisa mendapatkan gambaran pada suatu pergerakan jangka panjang secara menyeluruh dalam data. *Exponential smoothing* digunakan untuk mendapatkan ramalan jangka panjang

<sup>18</sup> Muhammad Arif Tiro dan Baharuddin Ilyas. *Statistika Terapan untuk Ilmu Ekonomi dan Sosial Edisi Kedua*. (Makassar: Andhira Publisher. 2002) hal: 43.

<sup>19</sup> Danang Sunyanto. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. (Yogyakarta: Medpress. 2016). hal: 91-92.

(satu atau dua periode di masa depan) pada suatu *time series*. Dinamakan *exponential smoothing* karena metode ini dapat memberikan serangkaian rata-rata bergerak yang dibobot secara ekponensial sepanjang *time series*, yaitu sepanjang serial tersebut pada tiap perhitungan pemulusan atau peramalan di masa yang akan datang tergantung pada semua nilai observasi yang mendahuluinya.

Pada *exponential smoothing* bobot-bobot ditetapkan dengan nilai-nilai semakin kecil sepanjang waktu sehingga kalkulasi dibuat, nilai observasi yang terakhir menerima bobot yang paling besar, nilai observasi sebelumnya menerima bobot kedua terbesar dan seterusnya, dengan nilai observasi pertama mendapat bobot yang paling kecil.

Adapun jenis metode *exponential smoothing* yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. *Single exponential smoothing*

Metode *single exponential smoothing* merupakan perkembangan dari metode *moving average* sederhana, yang mula-mulanya menggunakan rumus:

$$Y_{t+1} = \frac{X_t + X_{t-1} + \dots + X_{t-n+1}}{n} \quad (2.1)$$

$$Y_t = \frac{X_{t-1} + X_{t-2} + \dots + X_{t-n}}{n} \quad (2.2)$$

Dengan melihat hubungan antara persamaan (2.1) dan (2.2) bila  $Y_t$  diketahui maka nilai  $Y_{t+1}$  dapat dicari berdasarkan  $Y_t$ .

$$Y_{t+1} = \frac{X_t}{n} + Y_t - \frac{X_{t-n}}{n} \quad (2.3)$$

---

<sup>20</sup> Makridakis. *Forecasting Method and Application*. (Jakarta : Binarupa Aksara.1999). hal:105-123

Bila  $X_{t-n}$  diganti dengan nilai peramalan pada t yaitu  $S_t$  maka persamaan

(2.3) dapat ditulis:

$$Y_{t+1} = \frac{X_t}{n} + Y_t - \frac{Y_t}{n}$$

Atau dapat ditulis:

$$Y_{t+1} = \frac{1}{n}X_t + \left(1 - \frac{1}{n}\right)Y_t \quad (2.4)$$

Bila  $\left(\frac{1}{n}\right) = a$ , maka diperoleh persamaan:

$$Y_{t+1} = aX_t + (1 - a)Y_t$$

Sehingga persamaan umum *exponential smoothing* adalah:

$$Y_{t+1} = aX_t + (1 - a)Y_t \quad (2.5)$$

Dimana  $X_t$  = Nilai aktual yang terbaru

$Y_t$  = Ramalan yang terakhir

$Y_{t+1}$  = Ramalan untuk periode yang mendatang

$a$  = Konstanta pemulusan (smoothing)

Apabila perubahan volume penjualan dari waktu ke waktu tidak berubah atau kecil saja. Proses tersebut dapat di modelkan:

$$Y_t = a + \varepsilon_t \quad (2.6)$$

$a$  = permintaan rata-rata

$\varepsilon_t$  = random error dengan  $E(\varepsilon_t) = 0$

Jika  $a$  adalah nilai kecil tertentu yang dimaksud maka taksiran permintaan yang baru adalah:

$$a(T) = a_{(T-1)} + a[Y_T - a_{(T-1)}] \quad (2.8)$$

Jika  $a(T) = S_T$  maka

$$S_T = S_{T-1} + a(Y_T - S_{T-1})$$

$$S_T = aY_T + (1 - a)S_{T-1} \quad (2.9)$$

Dengan  $S_T$  = rata-rata tertimbang dari semua data lampau, hal ini dapat ditunjukkan :

$$S_T = aY_T + (1 - a)\{aY_{T-1} + (1 - a)S_{T-2}\} \quad (2.10)$$

Jika substitusi  $S_{T-k}$  untuk  $k=2,3,\dots, T$  dilanjutkan maka akan diperoleh

$$S_T = a \sum_{k=0}^{T-1} (1 - a)^k Y_{T-k} + (1 - a)^T S_0 \quad (2.11)$$

Dimana  $S_0$  adalah penaksiran awal dari  $a$ , yang dipakai pada awal proses,  $S_T$  dipakai sebagai penaksir parameter  $a$  yang tidak diketahui pada waktu  $T$ .  $a(T) = S_T$ , sehingga nilai ramalan produksi untuk  $t$  waktu atau periode kedepan akan menjadi:

$$Y_{T+t} = S_T \quad (2.11)$$

a. Menentukan nilai  $a$

$a$  disebut pemulusan konstan. Dalam metode *Exponential smoothing*, nilai  $a$  bisa ditentukan secara bebas, artinya tidak ada suatu cara yang pasti untuk mendapatkan nilai  $a$  yang optimal, maka pemilihan nilai  $a$  dilakukan dengan cara *trial and error*. Besarnya  $a$  terletak antara 0 dan 1.

b. Menentukan nilai  $S_0$

Jika data historis tersedia, maka nilai awal  $S_0$  dianggap sama dengan nilai rata-rata hitung n data terbaru.

$$S_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=t-N+1}^t X_i$$

Jika nilai ramalan awal tidak diketahui, maka nilai ramalan awal dapat diganti dengan:<sup>21</sup>

- a. Nilai observasi pertama sebagai nilai awal ramalan
- b. Nilai rata-rata dari beberapa nilai observasi pertama

2. *Double exponential smoothing*

Metode *double exponential smoothing* digunakan ketika data menunjukkan adanya trend. *Exponential smoothing* dengan adanya trend seperti pemulusan sederhana kecuali bahwa dua komponen harus di perbarui setiap periode level dan trendnya. *Double exponential smoothing* dapat di misalkan proses permintaan terhadap waktu yang mengikuti model:

$$Y_t = ab^t$$

*Trend* merupakan estimasi yang dihaluskan dari pertumbuhan rata-rata pada akhir masing-masing periode. Rumus pemulusannya adalah:

$$S_T = aY_T + (1 - a)S_{T-1} \quad (2.12)$$

$$S_T'' = aS_T + (1 - a)S_{T-1}'' \quad (2.13)$$

Dimana  $S_T$  adalah nilai pemulusan *single exponential smoothing* dan  $S_T''$  adalah nilai pemulusan *exponential ganda*.

<sup>21</sup> Makridakis. *Metode dan Aplikasi Peramalan*. ( Interaksara:1999) Hal.101-103

Dalam *double exponential smoothing* terdapat dua jenis yaitu:

a. *Double exponential brown*

$$S_T' = aY_T + (1 - a)S_{T-1} \quad (2.14)$$

$$S_T'' = aS_T + (1 - a)S_{T-1}'' \quad (2.15)$$

Pemulusan *trend*:

$$a_t = S_T'' + (S_T - S_T'') = 2S_T - S_T'' \quad (2.16)$$

$$b_t = \frac{a}{1-a} (S_t' - S_t'') \quad (2.17)$$

Ramalan:

$$F_{t+m} = a_t + b_t(m) \quad (2.18)$$

Dengan :

$m$  = periode kedepan yang diramalkan

$S_T'$  = Nilai *single exponential* periode t

$Y_T$  = Data aktual periode t

$S_{T-1}$  = Nilai *single exponential* periode t-1

$S_T''$  = Nilai *double exponential* periode t

$a$  = parameter pemulusan

$S_{T-1}''$  = Nilai *double exponential* periode t-1

$a_t$  = Konstanta pemulusan

$b_t$  = Konstanta pemulusan

Hal ini dapat dilakukan dengan hanya menetapkan  $S_{T-1}$  dan  $S_{T-1}'' = Y_T$  atau dengan menggunakan suatu nilai rata-rata dari beberapa nilai pertama sebagai titik awal. Besarnya nilai ramalan untuk t periode ke depan adalah:

$$\begin{aligned} Y_{t+1}(T) &= a_t + b_t \cdot t \\ &= 2S_T - S_T'' + \left\{ \frac{a}{1-a} [(S_T - S_T'')t] \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2S_T - S_T'' + \left\{ \frac{at}{1-a} S_T - \frac{at}{1-a} S_T'' \cdot t \right\} \\
Y_{t+1}(T) &= \left( 2 + \frac{at}{1-a} \right) S_T - \left( 1 + \frac{at}{1-a} \right) S_T'' \quad (2.19)
\end{aligned}$$

b. *Double exponential holt*

Adapun rumus *double exponential holt* adalah:

Pemulusan:

$$S_T'' = aX_t + (1 - a)(S_{t-1} + b_{t-1}) \quad (2.20)$$

Pemulusan *trend*

$$b_t = \gamma + (Y_t - Y_{t-1}) + (1 - \gamma)b_{t-1} \quad (2.21)$$

Ramalan

$$F_{t+m} = S_T'' + b_t(m) \quad (2.22)$$

Dengan:

$S_T''$  = Nilai pemulusan pada periode t

$X_t$  = Data aktual *time series* periode t

$S_{t-1}$  = Nilai pemulusan pada t-1

$b_{t-1}$  = nilai *trend* periode t-1

$b_t$  = nilai *trend* periode t

$\gamma, a$  = parameter pemulusan

$F_{t+m}$  = hasil peramalan untuk periode yang akan datang

## I. **Ketetapan Peramalan**

Usaha untuk meramalkan keadaan dimasa mendatang melalui pengujian dimasa lalu disebut *Forecasting*. *Forecasting* digunakan untuk meminimumkan pengaruh ketidakpastian, dengan kata lain *forecasting* digunakan untuk

mendapatkan *forecast* yang dapat meminimumkan kesalahan peramalan (*forecast error*) yang biasa diukur dengan menggunakan *mean squared error* dan *mean absolute error*. Hasil proyeksi yang akurat adalah peramalan yang bisa meminimalkan kesalahan peramalan. Biasanya kesalahan peramalan (*forecast error*) dapat dihitung dengan cara mengurangi data yang sebenarnya pada besarnya ramalan.

Dalam menghitung *forecast error* digunakan:<sup>22</sup>

- a. *Mean Absolute Error* adalah rata-rata absolute dari kesalahan meramal tanpa menghiraukan tanda positif dan tanda negatif.

$$MAE = \sum_{t=1}^n \frac{(X_t - Y_t)}{n} \quad (2.23)$$

- b. *Mean square error*, merupakan suatu rata-rata kesalahan peramalan yang dikuadratkan. *Mean Squared Error* (MSE) merupakan suatu metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan, masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan jumlah observasi.

$$MSE = \sum_{t=1}^n \frac{(X_t - Y_t)^2}{n} \quad (2.24)$$

- c. *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \frac{|X_t - Y_t|}{X_t} \quad (2.25)$$

Dengan  $X_t$  = Data aktual pada periode t

$Y_t$  = Nilai peramalan pada periode t dan  $n$  = Jumlah data.

---

<sup>22</sup> Bruce L. Bowerman, dkk. *Business Statistic in Practice*. (. Jerman :McGraw-Hill.2007).hal.673-674

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian terapan.

#### **B. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini bertempat pada kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Bulukumba. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai November 2018.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil langsung pada suatu instansi yang bersangkutan yaitu pada kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Bulukumba.

#### **D. Variabel Penelitian**

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel yang menjadi kriteria dalam peramalan tingkat produksi tanaman pangan dan perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Tanaman pangan

$X_p$  = Tahun produksi tanaman pangan

$Y_p$  = Jumlah produksi tanaman pangan

2. Tanaman perkebunan

$X_k$  = Tahun produksi tanaman perkebunan

$Y_k$  = Jumlah produksi tanaman perkebunan

**E. Definisi Operasional Variabel**

Pendefinisian yang digunakan adalah data tingkat produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat setiap tahun dari periode 1996 sampai 2017.

1. Produksi tanaman pangan dengan jumlah produksi setiap tahun dengan periode 1996 sampai 2017 dengan satuan ton.
2. Produksi tanaman perkebunan rakyat dengan jumlah produksi setiap tahun dengan periode 1996 sampai 2017 dengan satuan ton.

**F. Teknik Analisis**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Exponential Smoothing* untuk peramalan produksi.

**G. Prosedur Penelitian**

Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:

1. Menentukan nilai produksi tanaman pangan dan perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba. Sebelum melakukan proses peramalan, maka datanya harus disusun terlebih dahulu setiap tahunnya mulai tahun 1996 sampai tahun 2017.
2. Menentukan statistik deskriptif tanaman pangan dan tanaman perkebunan Kabupaten Bulukumba.

3. Menggambarkan plot dari data produksi tanaman pangan dan perkebunan rakyat
4. Penerapan model regresi *time series* untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara kedua variabel.

$$\hat{Y}_t = \beta_0 + \beta_1 X$$

5. Melakukan prediksi produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan menggunakan metode *exponential smoothing*

Metode *exponential smoothing* dilakukan dengan mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. Sebelum melakukan peramalan, terlebih dahulu melakukan penentuan model eksponensial untuk prediksi produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat. Pada penelitian ini digunakan metode *single exponential smoothing* untuk peramalan produksi tanaman pangan dan *double exponential smoothing*, dimana pada metode ini digunakan untuk peramalan produksi tanaman perkebunan Kabupaten Bulukumba. Adapun tahapan yang dilakukan:

a. *Single Exponential smoothing*

- i. Menentukan alpha ( $\alpha$ ) optimum

Untuk memperkirakan parameter yang menghasilkan error yang minimum maka digunakan teknik optimasi untuk memberikan hasil prediksi yang paling dekat dengan data observasi.

- ii. Melakukan *Fitting* data (kecocokan model)
- iii. Menentukan besarnya *forecast*

$$Y_{T+t} = S_T$$

iv. Akurasi peramalan

Dalam menghitung kesalahan ramalan digunakan

a. *Mean Absolute Error*

$$MAE = \frac{\sum(X_t - Y_t)}{n}$$

b. *Mean square error*

$$MSE = \frac{\sum(X_t - Y_t)^2}{n}$$

c. *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*

$$MAPE = \frac{\sum \left| \left( \frac{X_t - Y_t}{X_t} \right) \right|}{n} \times 100$$

b. *Double Exponential Smoothing*

i. Menentukan alpha ( $\alpha$ ) optimum

Untuk memperkirakan parameter yang menghasilkan error yang minimum maka digunakan teknik optimasi untuk memberikan hasil prediksi yang paling dekat dengan data observasi.

ii. Melakukan *Fitting* data (kecocokan model)

iii. Menentukan besarnya *forecast*

$$F_{t+m} = a_t + b_t(m)$$

iv. Akurasi peramalan

Dalam menghitung kesalahan ramalan digunakan

a. *Mean Absolute Error*


$$MAE = \frac{\sum(X_t - Y_t)}{n}$$

b. *Mean square error*

$$MSE = \frac{\sum(X_t - Y_t)^2}{n}$$

c. *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*

$$MAPE = \frac{\sum \left| \left( \frac{X_t - Y_t}{X_t} \right) \right|}{n} \times 100$$



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pengambilan data dilakukan pada kantor tanaman pangan dan Holtikultura kabupaten Bulukumba, pada penelitian ini data yang telah diambil untuk dianalisis yaitu jumlah produksi tanaman pangan dan produksi tanaman perkebunan rakyat pada Tahun 1996 sampai 2017 (*lampiran* ).

##### 1. Data Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba

Pada penelitian ini data yang diambil untuk dianalisis adalah data tingkat produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan kabupaten Bulukumba pada Tahun 1996 sampai 2017.

###### a. Tanaman Pangan

Adapun persentase tingkat produksi tanaman pangan kabupaten Bulukumba Tahun 1996 sampai 2017 yaitu:

**Tabel 4.1.** Data persentase tanaman pangan

Tahun	Produksi (ton)	Persentase produksi (%)	Tahun	Produksi (ton)	Persentase produksi (%)
1996	250,006.00	3.30%	2003	316,866.11	4.18%
1997	254,347.00	3.36%	2004	311,623.00	4.11%
1998	265,721.00	3.51%	2005	323,269.74	4.27%
1999	257,888.11	3.40%	2006	320,968.00	4.24%
2000	264,684.19	3.49%	2007	360,142.00	4.76%
2001	259,821.00	3.43%	2008	397,956.00	5.26%
2002	285,174.32	3.77%	2009	400,134.00	5.28%

Tahun	Produksi (ton)	Persentase produksi (%)	Tahun	Produksi (ton)	Persentase produksi (%)
2010	397,481.00	5.25%	2014	420,081.85	5.55%
2011	399,935.00	5.28%	2015	382,152.70	5.05%
2012	382,628.00	5.05%	2016	415,332.83	5.49%
2013	406,145.52	5.36%	2017	491,635.24	6.49%

b. Tanaman Perkebunan

Adapun persentase tingkat produksi tanaman perkebunan kabupaten Bulukumba yaitu:

**Tabel 4.2.** Data persentase tanaman perkebunan

Tahun	Produksi (ton)	Persentase produksi (%)	Tahun	Produksi (ton)	Persentase produksi (%)
1996	28,470.00	4.41%	2007	32,007.12	4.96%
1997	29,570.20	4.58%	2008	27,467.00	4.25%
1998	29,121.40	4.51%	2009	19,372.85	3.00%
1999	29,898.28	4.63%	2010	17,164.25	2.66%
2000	30,021.13	4.65%	2011	21,577.73	3.34%
2001	31,020.30	4.81%	2012	13,852.40	2.14%
2002	32,132.42	4.98%	2013	34,610.50	5.36%
2003	30,932.20	4.79%	2014	32,924.79	5.10%
2004	23,683.12	3.67%	2015	34,275.53	5.31%
2005	31,663.06	4.90%	2016	35,741.71	5.54%
2006	32,807.82	5.08%	2017	46,575.79	7.22%

2. Statistika Deskriptif Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bulukumba

Dalam rangka memahami data analisis penelitian, berikut disajikan hasil analisis deskriptif tingkat produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba.

a. Tanaman Pangan

Adapun statistik deskriptif dari data tingkat produksi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3.** Statistika Deskriptif Produksi Pangan

<b>Minimum</b>	<b>Q1</b>	<b>Median</b>	<b>Mean</b>	<b>Q3</b>	<b>Maximum</b>
250.000	270.600	341.700	343.800	399.400	491.600

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat produksi tanaman pangan kabupaten Bulukumba pada Tahun 1996 sampai 2017 sebesar 343.800 ton dengan nilai minimum 250.000 ton, dan nilai maksimum sebesar 491.600 ton.

b. Tanaman Perkebunan

Adapun statistik deskriptif dari data tingkat produksi tanaman perkebunan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4.** Statistika Deskriptif Produksi Perkebunan

<b>Minimum</b>	<b>Q1</b>	<b>Median</b>	<b>Mean</b>	<b>Q2</b>	<b>Maximum</b>
13.880	27.720	30.480	29.250	32.470	46.640


Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat produksi tanaman perkebunan kabupaten Bulukumba pada Tahun 1996 sampai 2017 sebesar 29.250 ton dengan nilai minimum 13.880 ton, dan nilai maksimum sebesar 46.640 ton.

### 3. Plot Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan Rakyat Kabupaten Bulukumba

Dapat dilihat plot data sebenarnya pada tingkat produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba

#### a. Tanaman Pangan

Adapun plot produksi tanaman pangan yaitu:




**Gambar 4.1.** Produksi Tanaman Pangan

Berdasarkan gambar 4.1, tingkat produksi pangan di kabupaten Bulukumba pada Tahun 1996 – 2017 memiliki nilai minimum sebesar 250.006.00 ton pada tahun 1996 dan nilai maksimum sebesar 491.635.24 ton pada tahun 2017. Total produksi pangan di kabupaten Bulukumba pada Tahun 1996 – 2017 menunjukkan pola yang berfluktuatif seiring berjalannya waktu. Produksi pangan di kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 1996 sampai tahun 2017. Hal ini juga dapat dilihat dari mulai tahun 2015, produksi pangan di kabupaten Bulukumba sebesar 382.152.70 ton dan meningkat tajam sampai tahun 2017 menjadi 491.635.24 ton. Total produksi pangan di kabupaten Bulukumba

pada Tahun 1996 – 2017 menunjukkan pola trend naik disetiap tahunnya sehingga dapat digunakan metode *double exponential smoothing*.

b. Tanaman Perkebunan

Dapat dilihat plot produksi tanaman perkebunan di bawah:



**Gambar 4.2.** Produksi Tanaman Perkebunan


Berdasarkan gambar 4.2 di atas, tingkat produksi perkebunan di kabupaten Bulukumba pada Tahun 1996 – 2017 memiliki nilai minimum sebesar 13.852.40 ton pada tahun 2012 dan nilai maksimum sebesar 46.575.79 ton pada Tahun 2017. Produksi perkebunan di kabupaten Bulukumba pada Tahun 1996 sampai tahun 2017 berbeda-beda dan dapat dikatakan data tidak memiliki karakteristik trend maupun musiman, sehingga dapat dilakukan analisis menggunakan metode *single exponential smoothing*.

4. Penerapan Model Untuk Meramalkan Tingkat Produksi Tanaman Pangan Dan Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bulukumba

Dalam menentukan model maka dilakukan analisis regresi time series untuk tujuan peramalan dimana variabel dependen dan variabel independen merupakan deretan waktu.

a. Tanaman pangan

Dapat dilihat plot histogram tingkat produksi tanaman pangan dibawah ini:



**Gambar 4.3.** Plot Diagram Batang Tanaman Pangan

Pada gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat produksi yang paling tinggi adalah tahun 2017, dan paling rendah pada tahun 1996. Dapat dilihat bahwa produksi tanaman pangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau cenderung berpola *trend* maka dapat digunakan metode *double exponential smoothing* dalam meramalkan tingkat produksi yang akan datang.

1). Model regresi *time series*

Adapun model regresi produksi tanaman pangan yaitu:

**Tabel 4.5.** Regresi Time Series Tanaman Pangan

Coefficients	Parameter	Standard Error	T Stat	Pr(> t )
<b>Intercept</b>	-2.0092801	1.50E+06	-13.37	1.96E-11
<b><math>X_t</math></b>	1.10185	7.49E+02	13.6	1.44E-11

Dapat di lihat model regresi produksi tanaman pangan, yaitu :

$$\hat{Y}_t = -2.0092801 + 1.10185 X_t,$$

Dengan  $\hat{Y}_t$  menunjukkan jumlah ramalan tingkat produksi tanaman pangan,  $X_t$  menunjukkan waktu, dan  $\beta_0$  konstanta dan  $\beta_1$  koefisien yang menggambarkan posisi kemiringan garis pada grafik.

## 2). Uji serentak

Uji serentak atau uji kesesuaian model dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara waktu dengan produksi tanaman pangan.

Adapun hipotesisnya yaitu:

$$H_0 = \beta_1 = 0$$

$$H_1 = \beta_1 \neq 0$$

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika nilai  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka variabel bebas tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.6.** Tabel Anova Tanaman Pangan

Residual	$R^2$	F statistic	F tabel	P-value
22280	0.9024	185	4.38	1.44E-11

Pada tabel 4.6 dapat dilihat  $F_{statistik} = 185$  dan  $F_{tabel} = 4.38$  atau dapat dikatakan  $F_{statistik} > F_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan untuk menerima  $H_0$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa waktu memberikan pengaruh terhadap produksi tanaman pangan.

## 3). Uji Kecukupan Model

Untuk mengukur kecukupan model regresi dapat dilihat pada tabel 4.6 koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu 0.9024 dimana  $0 \leq 0.9024 \leq 1$ , maka dapat dilihat angkanya mendekati 1 atau dapat dikatakan garis regresi mampu

menjelaskan data aktualnya, artinya bahwa 90.24% produksi tanaman pangan ditentukan oleh waktu.

#### 4). Uji asumsi klasik

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji linearitas, uji homokedastisitas, dan uji autokorelasi.

##### a). Uji Normalitas

Hipotesis:

$H_0$  = Data berdistribusi normal

$H_1$  = Data tidak berdistribusi normal

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika P-Value < 0.05, artinya data tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4.7.** Uji Normalitas Tanaman Pangan

$\chi^2$	Df	P-Value
0.017229	2	0.9914

Berdasarkan uji Jarque Bera diperoleh  $0.9914 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan untuk menerima  $H_0$  atau dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

##### b). Uji linearitas

Adapun uji linearitas untuk data produksi tanaman pangan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan hipotesis:

$H_0$  = Tidak ada hubungan linear

$H_1$  = Ada hubungan linear

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika  $P - Value > 0.05$ , artinya ada hubungan linear antara variabel respon dan variabel prediktor.

**Tabel 4.8.** Uji linearitas Tanaman Pangan

<b>D</b>	<b><i>P-Value</i></b>
0.4545	1

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa  $1 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan untuk menolak  $H_0$  yaitu terdapat hubungan linear antara waktu dengan produksi tanaman pangan.

c). Uji homokedastisitas

Untuk mendeteksi apakah residual bersifat homoskedastisitas atau heteroskedastisitas maka dapat digunakan statistik uji *brouch pagan*, dengan hipotesis berikut:

$H_0$  = Tidak ada gejala homokedastisitas

$H_1$  = Ada gejala homokedastisitas

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika  $P - Value < 0.05$ , artinya ada gejala homokedastisitas.

**Tabel 4.9.** Uji homokedastisitas Tanaman Pangan

<b>BP</b>	<b>Df</b>	<b><i>P - Value</i></b>
4.6817	1	0.03048

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa  $0.03048 < 0.05$ , maka dapat disimpulkan menolak  $H_0$  yaitu terjadi homokedastisitas.

## d). Uji autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya autokorelasi dengan melakukan uji Durbin Watson dengan hipotesis sebagai berikut:


**Tabel 4.10.** Uji autokorelasi

Durbin Watson	$d_i$	$d_u$	$P - Value$
1.1824	1.2395	1.4289	0.01067

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat nilai Durbin Watson sebesar 1.1824, nilai  $d_i$  sebesar 1,2395, dan nilai  $d_u$  sebesar 1,4289 (dilihat pada tabel Durbin Watson) karena  $0 < Dw < d_i$ , maka dapat disimpulkan autokorelasi positif.

## b. Tanaman Perkebunan

Dapat dilihat plot histogram tingkat produksi tanaman perkebunan dibawah ini:



**Gambar 4.4.** Plot Diagram Batang Tanaman Perkebunan

Pada gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa tingkat produksi tanaman perkebunan yang paling tinggi adalah Tahun 2017, dan paling rendah pada Tahun 2012. Dapat pula dilihat bahwa produksi tanaman

perkebunan dari tahun ke tahun konstan atau tidak membentuk pola trend dan musiman sehingga digunakan metode *single exponential smoothing* untuk meramalkan tingkat produksi pada periode berikutnya.

1). Model regresi time series

Adapun model regresi pada produksi tanaman perkebunan yaitu:

**Tabel 4.11.** Persamaan Regresi Produksi Perkebunan

Coefficients	Parameter	Standard Error	T Stat	Pr(> t )
<b>Intercept</b>	-256564.1	476220.7	-0.539	0.596
$X_t$	142.4	237.3	0.6	0.555

Dapat dilihat model regresi tingkat produksi tanaman perkebunan yaitu:

$$\hat{Y}_t = -256564.1 + 142.4 X_t ,$$

Dengan  $\hat{Y}_t$  menunjukkan jumlah ramalan tingkat produksi tanaman perkebunan ,  $X_t$  menunjukkan waktu, dan  $\beta_0$  konstanta dan  $\beta_1$  koefisien yang menggambarkan posisi kemiringan garis pada grafik .

2). Uji serentak

Uji serentak atau uji kesesuaian model dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara waktu dengan produksi tanaman perkebunan.

Adapun hipotesisnya yaitu:

$$H_0 = \beta_1 = 0$$

$$H_1 = \beta_1 \neq 0$$

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika nilai  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka variabel bebas tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.12.** Tabel anova produksi perkebunan

<b>Residual</b>	<b>R<sup>2</sup></b>	<b>F<sub>statistik</sub></b>	<b>F<sub>table</sub></b>	<b>P-value</b>
7063	0.01769	0.3602	4.38	5.55E-01

Pada tabel 4.12 dapat dilihat  $F_{\text{statistik}} = 0.3602$  dan  $F_{\text{tabel}} = 4.38$  atau dapat dikatakan  $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ . Sehingga dapat disimpulkan untuk menolak  $H_0$  atau dapat dikatakan bahwa waktu tidak memberikan pengaruh terhadap produksi tanaman perkebunan.

### 3). Uji Kecukupan Model

Untuk mengukur kecukupan model regresi dapat dilihat pada tabel 4.12 koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu 0.01769 dimana  $0 \leq 0.01769 \leq 1$ , maka dapat dilihat angkanya mendekati 0 atau dapat dikatakan garis regresi kurang baik menjelaskan data aktualnya, artinya bahwa 1.76% produksi tanaman perkebunan ditentukan oleh waktu..

### 4). Uji Asumsi Klasik

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan yaitu:

#### a). Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat dengan hipotesis:

$$H_0 = \text{Data berdistribusi normal}$$

$$H_1 = \text{Data tidak berdistribusi normal}$$

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika  $P\text{-Value} < 0.05$ , artinya data tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4.13.** Uji Normalitas Tanama Pangan

<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Df</b>	<b>P-Value</b>
1.7296	2	0.4211

Berdasarkan uji *Jarque Bera* diperoleh  $0.4211 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan untuk menerima  $H_0$  atau dapat dikatakan bahwa data tanaman perkebunan berdistribusi normal.

b). Uji linearitas

Adapun uji linearitas untuk data tingkat produksi tanaman perkebunan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan hipotesis:

$H_0$  = Tidak ada hubungan linear

$H_1$  = Ada hubungan linear

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika  $P - Value > 0.05$ , artinya ada hubungan linear antara variabel respon dan variabel prediktor.

**Tabel 4.14.** Uji Linearitas Tanaman Perkebunan

<b>D</b>	<b>P - Value</b>
0.4545	1

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa  $1 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan untuk menolak  $H_0$  yaitu terdapat hubungan linier antara waktu dengan produksi tanaman perkebunan.

## c). Uji homokedastisitas

Untuk mendeteksi apakah residual termasuk pada homoskedastisitas maka dapat digunakan statistik uji brouch pagan, dengan hipotesis berikut:

$H_0$  = Tidak ada gejala homokedastisitas

$H_1$  = Ada gejala homokedastisitas

Kriteria keputusan, tolak  $H_0$  jika  $P - Value < 0.05$ , artinya ada gejala homokedastisitas.

**Tabel 4.15.** Uji Homokedastisitas Tanaman Perkebunan

<b>BP</b>	<b>Df</b>	<b><i>P - Value</i></b>
8.1086	1	0.0044

Dapat dilihat pada tabel 4.15 bahwa  $0.0044 < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak yaitu terjadi homokedastisitas.

## d). Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya autokorelasi pada model regresi dengan melakukan uji Durbin Watson, adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

**Tabel 4.16.** Uji Autokorelasi

<b>Durbin Watson</b>	<b><math>d_i</math></b>	<b><math>d_u</math></b>	<b><i>P - Value</i></b>
0.85191	1.2395	1.4289	0.000484

Berdasarkan tabel 4.16, dapat dilihat nilai Durbin Watson sebesar 0.85191, nilai  $d_i$  sebesar 1,2395, dan nilai  $d_u$  sebesar 1,4289 (dilihat pada

tabel Durbin Watson) karena  $0 < Dw < d_i$ , maka dapat disimpulkan autokorelasi positif.

#### 5. Prediksi Tingkat Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan Rakyat Kabupaten Bulukumba

Setelah melihat pola data pada tingkat produksi tanaman pangan dan perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba maka selanjutnya dilakukan peramalan. Pada tingkat produksi tanaman pangan dengan data yang cenderung meningkat maka dapat dilakukan suatu peramalan dengan menggunakan metode *double exponential smoothing*, dan pada tingkat produksi tanaman perkebunan dengan data konstan maka dapat dilakukan peramalan dengan menggunakan *single exponential smoothing*. Prediksi Tingkat Produksi Tanaman Pangan

Dengan melihat pola tingkat produksi tanaman pangan di Kabupaten Bulukumba maka dapat digunakan metode *double exponential smoothing* dengan model :

$$\begin{aligned}
 Y_t &= ab^t \\
 Y_t &= \log a + t(\log b) \\
 &= \log(491.635240) + \log(8.817557) t \\
 &= 2.6916430052 + 0.9453482758 (27) \\
 &= 491.635240008 + 3.34505641
 \end{aligned}$$

Dalam melakukan peramalan tingkat produksi tanaman pangan terlebih dahulu melakukan penentuan parameter optimum sebagai berikut:


**Tabel 4.17.** Parameter Optimum Tanaman Pangan

Parameter	Nilai
Alpha	1.0000
Beta	0.0363

Pada tabel 4.17 Terdapat 2 (dua) parameter dalam model *double exponential smoothing* yaitu alpha ( $\alpha$ ) dan beta ( $\beta$ ). Identifikasi parameter optimum dimaksudkan untuk mengetahui nilai alpha dan beta yang mampu meminimumkan nilai MAE, RMSE, dan MAPE. Identifikasi ini dilakukan menggunakan teknik optimasi dengan rentang atau interval batas nilai parameter diantara 0 sampai 1.

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai parameter optimum yang diperoleh untuk alpha sebesar  $\alpha = 1.0000$  dan beta sebesar  $\beta = 0.0363$ . Kemudian nilai parameter alpha dan beta inilah yang akan digunakan untuk melakukan pemulusan data sekaligus melakukan peramalan dengan metode *double exponential smoothing* pada data produksi pangan di kabupaten Bulukumba pada Tahun 1996 - 2017.

Setelah menentukan parameter optimum, maka dapat dilihat hasil pemulusan data produksi pangan di kabupaten Bulukumba pada Tahun 1996 – 2017 menggunakan model *double exponential smoothing* dapat dilihat melalui hasil *fitted* data yang dihasilkan. Adapun plot hasil *fitted* data dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 4.5.** *Fitting* Data Tanaman Pangan

dapat diketahui bahwa dengan menggunakan parameter alpha sebesar  $\alpha = 1$  dan beta sebesar  $\beta = 0.0363$  dapat dilihat hasil *fitted* data (warna merah) mengikuti pola data aktual produksi pangan di kabupaten Bulukumba pada tahun 1996 – 2017 (warna hitam). Hal ini dapat diartikan bahwa *fitted* data sudah baik dalam mengimbangi pola data aktual serta pemilihan parameter alpha dan beta dengan rentang atau interval batas nilai parameter diantara 0 sampai 1 yang bisa menghasilkan nilai MAE, MSE, dan MAPE yang paling minimum.

Setelah identifikasi *fitted* data, selanjutnya melakukan peramalan periode kedepan, adapun hasil peramalan sebagai berikut :

**Tabel 4.18.** Prediksi Tanaman Pangan

Series	Forecast
2018	500.452.8
2019	509.270.4
2020	518.087.9

Berdasarkan table 4.18 dapat diketahui peramalan tingkat produksi pangan di kabupaten Bulukumba pada tahun 2018–2020 mengalami

peningkatan sebesar 500.452.8, 509.270.4 dan 518.087.9 ton secara berturut-turut.

Untuk mengetahui keakuratan peramalan dalam prediksi tingkat produksi tanaman pangan dengan metode *double exponential smoothing* dapat dilihat pada akurasi peramalan berikut:

**Tabel 4.19.** Akurasi Peramalan Tanaman Pangan

Kriteria	MAE	RMSE	MAPE
Nilai Akurasi	19094.27	25127.49	5.165977

Akurasi hasil peramalan dimaksudkan untuk mengetahui akurasi peramalan yang dinyatakan dengan *Mean Absolute Error* (MAE), *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

Dari tabel 4.19 diperoleh nilai MAE sebesar 19094.27, nilai RMSE sebesar 25127.49 dan nilai MAPE sebesar 5.165977. Semakin kecil nilai MAE, RMSE dan MAPE maka semakin baik tingkat akurasi peramalan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi terbaik untuk meramalkan tingkat produksi tanaman pangan Kabupaten Bulukumba untuk tahun berikutnya dengan menggunakan  $\alpha = 1$ , dan  $\beta = 0.036$ .

a. Prediksi Tanaman Perkebunan Rakyat

Dengan melihat pola pada produksi tanaman perkebunan maka dapat digunakan metode *single exponential smoothing* dengan menggunakan model:

$$\begin{aligned}
 Y_t &= e^a \\
 &= e^{\ln(43.813.48)}
 \end{aligned}$$

$$= e^{3.779.415}$$

$$= 43.790.416$$


Untuk meramalkan tingkat produksi yang akan datang. Sebelum melakukan peramalan terlebih dahulu dilakukan penentuan parameter optimum.

**Tabel 4.20.** Parameter Optimum Tanaman Perkebunan

Parameter	Nilai
Alpha	0.7564

Identifikasi alpha optimum untuk mengetahui nilai alpha yang mampu meminimumkan nilai MAE, MSE, dan MAPE. Identifikasi ini dilakukan menggunakan teknik optimasi antara alpha 0 dan 1. Berdasarkan perhitungan statistik dapat diketahui bahwa nilai alpha optimum yang diperoleh adalah 0.7564. Kemudian nilai alpha inilah yang akan digunakan untuk melakukan pemulusan data sekaligus melakukan peramalan dengan metode *single exponential smoothing* pada data tingkat produksi tanaman perkebunan rakyat kabupaten bulukumba.

Setelah menentukan parameter optimum, maka dapat dilihat hasil pemulusan data produksi perkebunan di kabupaten Bulukumba pada tahun 1996-2017 dapat dilihat melalui hasil *fitted* data yang dihasilkan.



**Gambar 4.6.** *Fitting* Data Tanaman Perkebunan

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa dengan menggunakan  $\alpha$  0.7564 dapat dilihat hasil *fitted* data (warna merah) mengikuti pola data aktual (warna hitam) tingkat tanaman perkebunan rakyat kabupaten bulukumba. Hal ini dapat diartikan bahwa *fitted* data sudah cukup baik dalam mengimbangi pola data aktual serta pemilihan parameter  $\alpha$  yang bisa menghasikan nilai MAE, MSE, dan MAPE yang paling minimum.

Setelah identifikasi *fitted* data, selanjutnya melakukan peramalan 1 periode kedepan dengan menggunakan model *single exponential smoothing*, adapun hasil peramalan sebagai berikut :

**Tabel 4.21.** Prediksi Tanaman Perkebunan

Series	Forecast
2018	43814.5

Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui peramalan tingkat produksi tanaman perkebunan rakyat kabupaten Bulukumba mengalami penurunan yaitu pada periode sebelumnya Tahun 2017 sebesar 46.644.52 ton. Peramalan 1 periode kedepan (2018) tingkat tanaman perkebunan rakyat kabupaten Bulukumba sebesar 43.814.50 ton.

Untuk mengetahui keakuratan peramalan dalam prediksi tingkat produksi tanaman pangan dapat dilihat pada akurasi peramalan.

**Tabel 4.22.** Akurasi Peramalan Tanaman Perkebunan

<b>Kriteria</b>	<b>MAE</b>	<b>RMSE</b>	<b>MAPE</b>
Nilai Akurasi	4172.026	6208.085	15.787

Dari tabel 4.22 diperoleh nilai MAE sebesar 4172.026, nilai RMSE sebesar 6208.085 dan nilai MAPE sebesar 15.787. Semakin kecil nilai MAE, RMSE dan MAPE maka semakin tinggi tingkat akurasi peramalan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi terbaik untuk meramalkan produksi tanaman perkebunan rakyat kabupaten bulukumba untuk tahun berikutnya dengan menggunakan alpha 0.75.

## **B. Pembahasan**

Dengan menggunakan data jumlah tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba dalam peramalan metode *exponential smoothing*. Pada tanaman pangan rata-rata tingkat produksi pada tahun 1996 sampai 2017 sebesar 343.800.00 ton dengan nilai minimum 250.000.00 ton dan nilai maksimum sebesar 491.600.00 ton, pada tanaman perkebunan rakyat rata-rata tingkat produksinya sebesar 29.250.00 ton dengan nilai minimum 13.880.00 ton dan nilai maksimum sebesar 46.640.00 ton.

Dengan melihat gambar data produksi tanaman pangan terlihat berpola trend, artinya jumlah produksi tanaman pangan selalu mengalami peningkatan

setiap tahunnya atau perubahan yang besar, selain itu dapat dilihat juga pada model regresi bahwa berdasarkan persamaan regresi diperoleh :  $\hat{Y}_t = -2.0092801 + 1.0185 X_t$ , dan dapat dilihat pada diagram batang tampak bahwa data tersebut cenderung berpola trend sehingga peramalan dilakukan dengan menggunakan *double exponential smoothing*. Dengan menggunakan uji kesesuaian model dapat diketahui bahwa waktu dengan jumlah produksi tanaman pangan memiliki perbedaan secara signifikan dimana pada uji kecukupan model ada 90,24% produksi tanaman pangan dapat ditentukan oleh waktu dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain.

Sedangkan pada plot data tanaman perkebunan terlihat cenderung berpola konstan, artinya perubahan yang tidak terlalu besar atau perubahan produksi meningkat dan menurun, adapun model persamaan regresi tanaman perkebunan rakyat yang diperoleh yaitu  $\hat{Y}_t = -256564.1 + 142.4 X_t$ , dan dengan melihat diagram batang tampak bahwa data tersebut cenderung berpola konstan sehingga peramalan dilakukan dengan menggunakan *single exponential smoothing*. Pada uji kesesuaian model dapat diketahui bahwa waktu dengan jumlah produksi tanaman pangan tidak memiliki perbedaan secara signifikan dimana pada uji kecukupan model dapat diketahui ada 1,77% produksi tanaman perkebunan dapat ditentukan oleh waktu dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain.

Pada uji asumsi klasik regresi untuk produksi tanaman pangan menunjukkan bahwa ada hubungan linier, ada autokorelasi, dan tidak

homokedastisitas, sedangkan pada tanaman perkebunan menunjukkan ada hubungan linear, ada autokorelasi, dan terdapat homokedastisitas.

Selanjutnya dilakukan peramalan untuk produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba. Adapun model peramalan produksi tanaman pangan adalah  $Y_t = ab^t$ . Pada peramalan produksi tanaman pangan pada penentuan parameter dengan menggunakan teknik optimasi maka digunakan parameter  $a = 1$  dan  $\beta = 0.036$ , dengan nilai parameter tersebut akan digunakan untuk melakukan pemulusan data sekaligus melakukan peramalan dengan metode *double exponential smoothing* pada data tingkat produksi tanaman pangan Tahun 1996 sampai 2017. Setelah melakukan parameter optimum dapat dilihat hasil pemulusan data tingkat produksi tanaman pangan dimana data sebenarnya (warna hitam) dengan pola data pemulusan produksi tanaman pangan (warna merah) bahwa data sudah baik dalam mengimbangi pola data aktual serta pemilihan parameter alpha dan beta dengan rentang 0 sampai 1 yang bisa menghasilkan nilai MSE, MAE, dan MAPE yang paling minimum.

Adapun hasil peramalan yang dihasilkan bahwa prediksi tingkat produksi tanaman pangan kabupaten Bulukumba pada Tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2018 sebesar 500.452.00 ton, 2019 sebesar 509.270.04 ton, dan 2020 sebesar 518.087,09 ton. Adapun keakuratan model dalam meramalkan produksi tanaman pangan diperoleh nilai MAE sebesar 19094.27, nilai RMSE sebesar 25127.49 dan nilai MAPE sebesar 5.165977.

Selanjutnya dilakukan peramalan untuk produksi tanaman perkebunan perkebunan rakyat Kabupaten Bulukumba. Adapun model peramalan produksi tanaman perkebuna adalah  $Y_t = a^t$ . Pada peramalan produksi tanaman perkebunan dapat diketahui parameter yang digunakan dengan menggunakan teknik optimasi yaitu menggunakan parameter  $a = 0.75$ , dengan nilai parameter tersebut akan digunakan untuk melakukan pemulusan data sekaligus melakukan peramalan dengan metode single exponential smoothing pada data produksi tanaman perkebunan Tahun 1996 sampai 2017. Setelah melakukan parameter optimum dapat dilihat hasil pemulusan data produksi tanaman perkebunan, yaitu pola data sebenarnya (warna hitam) dengan pola data pemulusan produksi tanaman pangan (warna merah) bahwa data sudah baik dalam mengimbangi pola data aktual serta pemilihan parameter alpha dengan rentang 0 sampai 1 yang bisa menghasilkan nilai MSE, MAE, dan MAPE yang paling minimum.

Adapun hasil peramalan yang dihasilkan bahwa prediksi produksi tanaman perkebunan kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 sebesar 43.814.05 ton. Adapun keakuratan model dalam meramalkan tingkat produksi tanaman pangan dapat diperoleh nilai MAE sebesar 4172.026, nilai RMSE sebesar 6208.085 dan nilai MAPE sebesar 15.787.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Hasil peramalan pada tingkat produksi tanaman pangan pada Tahun 2020 dengan menggunakan metode *double exponential smoothing* sebesar 518.087,09 ton.
2. Hasil peramalan tingkat produksi tanaman perkebunan pada Tahun 2018 dengan menggunakan metode *single exponential smoothing* sebesar 43.814,05 ton.

#### **B. Saran**

Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya, jika ingin meramalkan jumlah produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan kabupaten Bulukumba agar kiranya menggunakan metode lain sehingga dapat dibandingkan metode yang lebih cocok digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisah Sitti, Faisol. *Penerapan metode exponential smoothing untuk peramalan jumlah klaim di BPJS kesehatan Pamekasan*. Jurnal Matematika vol 02. No 01. Oktober 2016.
- Andi, Arif Ramadhan. 2016. *Pengertian dan jenis-jenis Tanaman Pangan dan Holtikultura*. Jakarta: Kompas.
- Arif Tiro Muhammad dan Baharuddin Ilyas. 2002. *Statistika Terapan untuk Ilmu Ekonomi dan Sosial Edisi Kedua*. Makassar:Andhira Publisher.
- Bowerman Bruce L., dkk. 2007. *Business Statistic in Practice*. Jerman.: McGraw-Hill.
- Hasan, Firdaus. 2009. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)*. Makassar: CV Mediatama
- Jay, Heizer dan Barry Render. 2011. *Operations Management Edisi Ke Sembilan*. Jakarta :Salemba.
- K.Palit Ajoy dan Dobrivoje Popovic. 2005. *Computational Intelegence in Time Series Forecasting*. Jerman : Springer.
- Makridakis. 1999. *Forecasting Method and Aplication*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Makridakis. 1999. *Metode dan Aplikasi Peramalan*. Jakarta : Interaksara.
- Mason. 1999. *Teknik Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Nasution , Hakim Arman. 2003. *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. Jakarta: Guna Wijaya
- Nurmala, Tati. 1998. *Serealia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oktaviarina, Affiati. *Peramalan Jumlah Penumpang Kereta Api di Indonesia Dengan Menggunakan Metode Exponential Smoothing*. Jurnal Buana Matematika Vol 7, No 2. 2017.
- Pangestu Subagyo, 2005. *Statistika Induktif* .Yogyakarta:BPFE,
- Purbayu, Budi Santosa dan Muliawan Hamdani. 2006. *Statistika Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*.Jakarta : Erlangga.
- R. SPIEGEL Murray dan Larry J. Stephens. *Statistik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Rudy Ariyanto, dkk. *Penerapan Metode Double Exponential Smoothing Pada Peramalan Produksi Tanaman Pangan*. Jurnal Informatika Polinema. 2011

Sahara, Afni. *Sistem Peramalan Persediaan Unit Mobil Mitsubishi Pada PT. Sardana Indah Berlian Motor Dengan Menggunakan Metode Exponential Smoothing*. Jurnal Informasi dan Teknologi Ilmiah (INTI) Volume 1 No 1 Oktober 2013.

Sunyanto, Danang . *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta : Medpress

Tri Basuki Agus, dan Nano Prawoto. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers.



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains Dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No.36, Romang Polong, Gowa.Telp:(0411)8221400

### Program Dan Output

Analisis Regresi Time Series

Tanaman Pangan

```
x=c(1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017)
```

```
y=c(250006.00,254347.00,265721.00,257888.11,264684.19,259821.00,285174.32,316866.11,311623.00,323269.74,320968.00,360142.00,397956.00,400134.00,397481.00,399935.00,382628.00,406145.52,420081.85,382152.70,415332.83,491635.24)
```

```
> summary(y,x)
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
250000	270600	341700	343800	399400	491600

```
> nilai.fit<-lm(y~x)
```

```
> nilai.fit
```

```
Call:
lm(formula = y ~ x)
Coefficients:
(Intercept)      x
-20092801      10185
```

```
> summary(nilai.fit)
```

```
> summary(nilai.fit)

Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-48239 -12900 -2001  10995  40873

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -2.009e+07  1.503e+06  -13.37 1.96e-11 ***
x             1.019e+04  7.488e+02   13.60 1.44e-11 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 22280 on 20 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9024,    Adjusted R-squared:  0.8976
F-statistic:  185 on 1 and 20 DF,  p-value: 1.442e-11
```

```
> nilai.res<-residuals(nilai.fit)
```

```
> nilai.res
```

1	2	3	4	5	6
13132.8313	7288.6240	8477.4166	-9540.6807	-12929.8081	-27978.2054
7	8	9	10	11	12
-12810.0928	8696.4898	-6731.8275	-5270.2949	-17757.2422	11231.5504
13	14	15	16	17	18
38860.3431	30853.1357	18014.9283	10283.7210	-17208.4864	-3876.1737
19	20	21	22		
-125.0511	-48239.4084	-25244.4858	40872.7168		

### TANAMAN PERKEBUNAN

```
>x=c(1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,
2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,
2017)
```

```
>y=c(28470.00,29570.20,29121.40,29898.28,30021.13,31020.30,3
2132.42,30932.20,23683.12,31663.06,32807.82,32007.12,27467.0
0,19372.85,17164.25,21577.73,13882.40,34640.50,33061.29,3258
7.05,35834.30,46644.52)
```

```
> summary(y,x)
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
13880	27720	30480	29250	32470	46640

```
> nilai.fit<-lm(y~x)
```

```
> nilai.fit
```

```
Call:
lm(formula = y ~ x)

Coefficients:
(Intercept)          x
-256564.1          142.4
```

```
> summary(nilai.fit)
```

```
Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-16154  -1321   1919   2726  15896

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -256564.1   476220.7  -0.539   0.596
x              142.4       237.3    0.600   0.555

Residual standard error: 7063 on 20 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.01769,    Adjusted R-squared:  -0.03142
F-statistic: 0.3602 on 1 and 20 DF,  p-value: 0.5551
```


```
> nilai.res<-residuals(nilai.fit)
```

```
> nilai.res
```

## DIAGRAM BATANG

Tanaman Pangan

```
> barplot(y, main="BARPLOT TANAMAN
PANGAN", xlab="tahun", names.arg=c("1996", "1997", "1998",
"1999", "2000", "2001", "2002", "2003", "2004", "2005", "2006",
"2007", "2008", "2009", "2010", "2011", "2012", "2013", "2014",
"2015", "2016", "2017"), col="red")
```



### Uji Asumsi Klasik Tanaman pangan

```
>x=c(1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005
,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017)
```

```
>y=c(250006.00,254347.00,265721.00,257888.11,264684.19
,259821.00,285174.32,316866.11,
311623.00,323269.74,320968.00,360142.00,397956.00,4001
34.00,397481.00,399935.00,382628.00,406145.52,420081.8
5,382152.70,415332.83,491635.24)
```

#### a. normalitas

```
> library(tseries)
> jarque.bera.test(nilai.res)
```

```
Jarque Bera Test

data: residual1
X-squared = 0.017229, df = 2, p-value = 0.9914
```

#### b. Linearitas

```
> ks.test(y,ecdf(y))
```

```
One-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: y
D = 0.045455, p-value = 1
alternative hypothesis: two-sided
```

#### c. Homokestisitas

```
> library(tseries)
> library(lmtest)
> bptest(nilai.fit,studentize=F)
```

## Breusch-Pagan test

```
data: nilai.fit
BP = 4.6817, df = 1, p-value = 0.03048
```

## d. Autokorelasi


```
> library(lmtest)
> dwtest(nilai.fit)
```

## Durbin-Watson test

```
data: nilai.fit
DW = 1.1824, p-value = 0.01067
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

**DIAGRAM BATANG Tanaman Perkebunan**

```
>barplot(y,main="BARPLOT TANAMAN
PERKEBUNAN",xlab="tahun",names.arg=c("1996","1997","19
98","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","
2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013"
,"2014","2015","2016","2017"),col="red")
```



### Uji Asumsi Klasik Tanaman Perkebunan

```
>tahun=c(1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004
,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,20
15,2016,2017)
```

```
>kebun=c(28470.00,29570.20,29121.40,29898.28,30021.13
,31020.30,32132.42,30932.20,23683.12,31663.06,32807.8
2,32007.12,27467.00,19372.85,17164.25,21577.73,13882.
40,34640.50,33061.29,32587.05,35834.30,46644.52)
```

#### a. Normalitas

```
> library(tseries)
> jarque.bera.test(nilai.res)
```

```
Jarque Bera Test
data: residual
X-squared = 1.7296, df = 2, p-value = 0.4211
```

#### a. Linearitas

```
> ks.test(kebun,ecdf(kebun))
```

```
One-sample Kolmogorov-Smirnov test
data: kebun
D = 0.045455, p-value = 1
alternative hypothesis: two-sided
```

#### b. Homokedastisitas

```
> library(tseries)
> library(lmtest)
> bptest(nilai.fit,studentize=F)
```

Breusch-Pagan test

```
data: nilai.fit
BP = 8.1086, df = 1, p-value = 0.004405
```

c. Autokorelasi

```
> library(lmtest)
> dwtest(nilai.fit)
```

Durbin-Watson test

```
data: nilai.fit
DW = 0.85191, p-value = 0.000484
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

**PREDIKSI TINGKAT PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT**

PRODUKSI TANAMAN PANGAN

```
> Data2 <-
ts(c(250006.00,254347.00,265721.00,257888.11,264684.19,
259821.00,285174.32,316866.11,311623.00,323269.74,32096
8.00,360142.00,397956.00,400134.00,397481.00,399935.00,
382628.00,406145.52,420081.85,382152.70,415332.83,49163
5.24))
> pangan<-ts(Data2,start=c(1996))
> pangan
```

```
Time Series:
```

```
Start = 1996
```

```
End = 2017
```

```
Frequency = 1
```

```
[1] 250006.0 254347.0 265721.0 257888.1 264684.2  
259821.0 285174.3 316866.1
```

```
[9] 311623.0 323269.7 320968.0 360142.0 397956.0  
400134.0 397481.0 399935.0
```

```
[17] 382628.0 406145.5 420081.8 382152.7 415332.8  
491635.2
```

```
> plot(pangan, main = "Produksi Pangan Kabupaten  
Bulukumba", xlab = "Waktu", ylab = "Ton", type = "l",  
lwd = 2)
```



```
> HoltWinters(pangan, gamma = FALSE, optim.start =  
c(alpha = 0.3, beta = 0.1))
```

Holt-Winters exponential smoothing with trend and without seasonal component.

```

Call:
HoltWinters(x = pangan, gamma = FALSE, optim.start
= c(alpha = 0.3,      beta = 0.1))

Smoothing parameters:

alpha: 1

beta : 0.03628311

gamma: FALSE

Coefficients:

      [,1]
a 491635.240
b   8815.844

```

```
#estimasi
```

```
> model2<- HoltWinters(pangan, alpha = 1, beta =
0.0363, gamma = FALSE)
```

```
> model2
```

Holt-Winters exponential smoothing with trend and without seasonal component.

```

Call:HoltWinters(x = pangan, alpha = 1, beta =
0.0363, gamma = FALSE)

Smoothing parameters:

alpha: 1

beta : 0.0363

gamma: FALSE

```

```
Coefficients:
```

```
      [,1]
```

```
a 491635.240
```

```
b   8817.557
```

```
#fitting Data
```

```
> model2$fitted
```

```
Time Series:
```

```
Start = 1998
```

```
End = 2017
```

```
Frequency = 1
```

	xhat	level	trend
1998	258688.0	254347.0	4341.000
1999	270317.3	265721.0	4596.298
2000	262033.2	257888.1	4145.118
2001	268925.5	264684.2	4241.348
2002	263731.9	259821.0	3910.854
2003	289863.5	285174.3	4689.215
2004	322535.5	316866.1	5669.409
2005	316896.3	311623.0	5273.284
2006	328774.4	323269.7	5504.641
2007	326189.3	320968.0	5221.269
2008	366595.8	360142.0	6453.753
2009	405548.1	397956.0	7592.130

```


2010 407529.6 400134.0 7395.597
2011 404511.8 397481.0 7030.833
2012 406799.7 399935.0 6864.694
2013 388615.3 382628.0 5987.262
2014 412769.1 406145.5 6623.610
2015 426970.9 420081.8 6889.062
2016 387414.9 382152.7 5262.161
2017 421608.4 415332.8 6275.583

```

```

> plot(model2, xlab = "Waktu", ylab = "Ton", type =
"l")

```



```

> #Peramalan

```

```

> predict(model2,n.ahead = 3, prediction.interval =
TRUE)

```

```
Time Series:
```

```
Start = 2018
```

```
End = 2020
```

```
Frequency = 1
```

	fit	upr	lwr
2018	500452.8	549436.2	451469.4
2019	509270.4	579811.9	438728.8
2020	518087.9	606045.4	430130.4

Akurasi Peramalan

```
> library(forecast)
```

Warning message:

package 'forecast' was built under R version 3.3.3

```
> accuracy(model2$fitted,model2$x)
```

	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	ACF1	Theil's U
Test set	6166.056	25127.49	19094.27	1.433139	5.165977	0.03568437	0.9257592

TANAMAN PERKEBUNAN

```
> Data1 <-
```

```
ts(c(28470.00,29570.20,29121.40,29898.28,30021.13,31020
.30,32132.42,30932.20,23683.12,31663.06,32807.82,32007.
12,27467.00,19372.85,17164.25,21577.73,13882.40,34640.5
0,33061.29,32587.05,35834.30,46644.52))
```


```
> kebun<-ts(Data1,start=c(1996))
```

```
> kebun
```

```
> Data1 <- ts(c(28470.00,29570.20,29121.40,29898.28,30021.13,31020.30,32132.42,
> kebun<-ts(Data1,start=c(1996)
+ )
> kebun
Time Series:
Start = 1996
End = 2017
Frequency = 1
 [1] 28470.00 29570.20 29121.40 29898.28 30021.13 31020.30 32132.42 30932.20
 [9] 23683.12 31663.06 32807.82 32007.12 27467.00 19372.85 17164.25 21577.73
[17] 13882.40 34640.50 33061.29 32587.05 35834.30 46644.52
.
```

```
#plot
```

```
> plot(kebulan,main="Produksi Perkebunan Kabupaten
Bulukumba",xlab="Waktu",ylab="ton",type="l",lwd=2)
```



```
optimasi
```

```
> HoltWinters(kebulan,beta = FALSE,gamma = FALSE)
```

Holt-Winters exponential smoothing without trend and without seasonal component.

```

Call:
HoltWinters(x = kebun, beta = FALSE, gamma = FALSE)

Smoothing parameters:

alpha: 0.7563499

beta : FALSE

gamma: FALSE

Coefficients:

      [,1]
a 43813.88

```

Estimasi

```

> modell <- HoltWinters(kebulan, alpha = 0.7564, beta =
FALSE, gamma = FALSE, l.start =
(mean(kebulan[1:6]) + (kebulan[1] - mean(kebulan[1:6])) * 0.7564))

> modell

```

Holt-Winters exponential smoothing without trend and without seasonal component.

```

Call:
HoltWinters(x = kebun, alpha = 0.7564, beta = FALSE,
gamma = FALSE, l.start = (mean(kebulan[1:6]) +
(kebulan[1] - mean(kebulan[1:6])) * 0.7564))

Smoothing parameters:

alpha: 0.7564

beta : FALSE

gamma: FALSE

```

```
Coefficients:
```

```
[,1] a 43814.5
```

```
fitting Data
```

```
> modell$fitted
```

```
Time Series:
```

```
Start = 1997
```

```
End = 2017
```


```
Frequency = 1
```

	xhat	level
1997	28470.00	28470.00
1998	29302.19	29302.19
1999	29165.44	29165.44
2000	29719.76	29719.76
2001	29947.72	29947.72
2002	30759.02	30759.02
2003	31797.86	31797.86
2004	31143.07	31143.07
2005	25500.36	25500.36
2006	30161.83	30161.83
2007	32163.26	32163.26
2008	32045.15	32045.15
2009	28582.24	28582.24
2010	21616.26	21616.26

```
2011 18248.76 18248.76
2012 20766.79 20766.79
2013 15559.44 15559.44
2014 29992.35 29992.35
2015 32313.70 32313.70
2016 32520.46 32520.46
2017 35027.05 35027.05
```

```
#plot
```

```
> plot(modell1, xlab = "Waktu", ylab = "Ton", type = "l")
```



Peramalan

```
> predict(modell1,n.ahead = 3)
```

```
Time Series:

Start = 2018

End = 2020

Frequency = 1

      fit

[1,] 43814.5
[2,] 43814.5
[3,] 43814.5
```

Akurasi Peramalan

```
> library(forecast)
```

```
> accuracy(modell1$fitted,modell1$x)
```

```
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M. AR. AS. S. A. R.

- - -
> #Accuracy
> library(forecast)
Warning message:
package 'forecast' was built under R version 3.3.3
> accuracy(modell1$fitted,modell1$x)

      ME      RMSE      MAE      MPE      MAPE      ACF1 Theil's U
Test set 947.4001 6208.085 4172.026 -0.9162923 15.7873 -0.02225401 0.9356501
> |
```

## RIWAYAT HIDUP



Risa Wahyuni, lahir di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa Padang Kecamatan Gantarang pada tanggal 19 Oktober 1996. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari H.Fathuddin S.Pd dan Hj. Ratsiah S.Pd,i.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar tepatnya SDN 232 Dampang kecamatan gantarang kabupaten Bulukumba pada tahun 2008, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di MTs Negeri 01 Bulukumba Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan tamat pada tahun 2011, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Bulukumba dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Fakultas Sains dan Teknologi pada program studi Matematika.