

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR PADA BAYI
“R” DENGAN MASALAH BAYI BERAT LAHIR RENDAH
DISERTAI ASFIKZIA DI RSUD LABUANG BAJI
TANGGAL 23 JULI – 03 AGUSTUS
TAHUN 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Oleh

SALSA PUTRI AULIA

70400115080

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsa Putri Aulia
NIM : 70400115080
Tempat/Tgl.lahir : Bima, 18 September 1997
Jurusan/ Fakultas : DIII Kebidanan/ Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R
SALSA PUTRI AULIA
NIM: 70400115080

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Salsa Putri Aulia
NIM : 70400115080
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi "R"
Dengan Masalah Bayi Berat Lahir Rendah Disertai Asfiksia di RSUD
Labuang Baji Tanggal 23 Juli – 03 Agustus Tahun 2018

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samara-Gowa, Agustus 2018

Pembimbing I



Anisa Murnithiah Al-kautzar S.ST., M.Keb

Pembimbing II



dr. Nadiyah Haruna, M.Kes
Nip. 19790417 200801 2 018

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi "R" Dengan Masalah Bayi Berat Lahir Rendah Disertai Asfiksia di RSUD Labuang Baji Tanggal 23 Juli - 03 Agustus Tahun 2018", yang disusun oleh Salsu Putri Aulia, NIM: 70400115080, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa 7 Agustus 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 7 Agustus 2018 M

25 Drukkandah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	Dr. dr. H. Andi Armyu Nurdin, M.Sc	()
Sekretaris	Firdiyanti, S.SiT, M.Keb	()
Pembimbing I	Anieq Mumthiah Al-karizsar S.ST., M.Keb	()
Pembimbing II	UM Nedyah Hartana, M. Keb	()
Penguji I	Dr. H. Sitti Saleha, S.SiT., SKM, M.Keb	()
Penguji II	Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag, M.Hum	()

Dekan

Dr. H. Andi Armyu Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil a'lamin, segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang Maha Sempurna, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim. Sebagai penulis dalam menyusun karya tulis yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi “R” Dengan Masalah Bayi Berat Lahir Rendah Disertai Asfiksia di RSUD Labuang Baji Tanggal 23 Juli – 03 Agustus Tahun 2018”**.

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Kebidanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengawali ucapan terima kasih ini disampaikan penghargaan yang istimewa kepada **Ayahanda Adi Mulia** dan **Ibunda Hasrawati**, atas segala perhatian, kasih sayang, do'a restu, serta pengorbanannya yang tak terhingga. Begitupun kepada kakakku **Uyun Khatimah Mulia** serta pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, do'a, serta bantuan-bantuan dalam bentuk apapun.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M, Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa Pendidikan.
2. Bapak Dr. dr. H. Armyn Nurdin, M, Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa Pendidikan.
3. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S. Si T, SKM, M. Keb selaku Ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus penguji I karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah
4. Ibu Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S. ST, M. Keb selaku Pembimbing I karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah
5. dr. Nadyah Haruna, M. Kes selaku Pembimbing II karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah

6. Bapak Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag selaku Penguji II karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa Pendidikan.
8. Kepada pimpinan RSUD Labuang Baji dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
9. Kepada seluruh teman kebidanan angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KTI	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Lingkup Pembahasan.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
1. Tujuan Umum	6
2. Tujuan Khusus	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bayi baru lahir	11
1. Pengertian bayi baru lahir	11
2. Karakteristik bayi normal.....	11
3. Penanganan bayi baru lahir normal.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).....	16
1. Pengertian BBLR	16
2. Klasifikasi BBLR	17
3. Etiologi BBLR	18
4. Gambaran Klinik BBLR	19
5. Penyakit yang berhubungan dengan BBLR	20
6. Penanganan BBLR.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Asfiksia.....	25
1. Pengertian Asfiksia	25
2. Klasifikasi Asfiksia	26
3. Etiologi Asfiksia	27
4. Gambaran Asfiksia.....	28
5. Penatalaksanaan Asfiksia.....	29
D. Tinjauan tentang BBLR dengan Asfiksia	32
E. Bayi Baru Lahir dalam Pandangan Islam.....	34

F. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	40
1. Manajemen Asuhan Kebidanan	41
2. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	47

BAB III STUDI KASUS

A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.....	49
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 23 Juli 2018.....	65
C. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 24 Juli 2018.....	70
D. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 25 Juli 2018.....	74
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 29 Juli 2018.....	77
F. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 3 Agustus 2018.....	80


BAB IV PEMBAHASAN

A. Langkah I: Identifikasi data dasar	84
B. Langkah II: Identifikasi Diagnosis/Masalah Aktual	88
C. Langkah III: Identifikasi Diagnosi/Masalah Potensial	90
D. Langkah IV: Tindakan Segera/Kolaborasi.....	92
E. Langkah V: Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan	93
F. Langkah VI: Implementasi.....	96
G. Langkah VII: Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perawatan Metode Kanguru.....23

Gambar 2.2 Bagan alur dan manajemen bayi baru lahir dengan Asfiksia.....32



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penilaian Apgar Skor	13
Tabel 2.2 Penilaian Apgar Skor	26
Tabel 3.1 Penilaian Apgar Skor Bayi R.....	67
Tabel 3.2 Pemantauan TTV, Nutrisi dan kenaikan BB.....	83
Tabel 4.1 Catatan perkembangan dan pertumbuhan Bayi R.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran II : Surat izin penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran III : Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Labuang Baji
- Lampiran VI : Daftar riwayat hidup



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR KARYA TULIS ILMIAH
JULI 2018

SALSA PUTRI AULIA, 70400115080

Pembimbing I : Anieq Mumthiah Alkautsar

Pembimbing II: Nadyah Haruna

“Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi R Dengan Masalah Bayi Berat Lahir Rendah Disertai Asfiksia di RSUD Labuang Baji Tahun 2018”

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir <2500 gram tanpa memandang usia kehamilan. Asfiksia adalah kejadian dimana bayi tidak dapat bernapas spontan segera setelah bayi lahir. Dari seluruh kasus neonatus, BBLR dan Asfiksia merupakan penyebab kematian terbanyak. Oleh karena itu, pada kejadian BBLR disertai Asfiksia, pentingnya dilakukan tindakan segera.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi R Dengan Masalah Bayi Berat Lahir Rendah Disertai Asfiksia di RSUD Labuang Baji Tahun 2018 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP. Penatalaksanaan kasus BBLR disertai Asfiksia yang dilakukan dengan penatalaksanaan manajemen Asfiksia bayi baru lahir kemudian dilanjutkan dengan manajemen bayi baru lahir normal, dan mencegah komplikasi yang dapat terjadi pada BBL.

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemantauan dan analisa data By R dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia di RSUD Labuang Baji Tahun 2018, bayi lahir spontan, tidak segera menangis, jenis kelamin perempuan, dengan berat lahir 2300 gram dan telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada By R dengan hasil tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan kasus.

Kata Kunci: BBLR, Asfiksia, 7 langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, JULY 2018

SALSA PUTRI AULIA, 70400115080

Supervisor I : Anieq Mumthiah Alkautsar

Supervisor II : Nadyah Haruna

“The Newborn Obstetric Care Management on Baby R with Low Birth Weight Baby Problem accompanied by Asphyxia at Labuang Baji Regional Public Hospital in 2018”

Low Birth Weight Babies (LBWB) are babies born <2500 grams regardless of the gestational age. Asphyxia is a state where the babies cannot spontaneously breathe as soon as they were born. Of all cases of neonates, LBWB and asphyxia were the most common causes of death. Therefore, in the incidence of LBWB with Asphyxia, the immediate action is crucial to carry out.

The study was a case study research with the Obstetric Care Management approach for Newborn on Baby R with the Low Birth Weight Baby accompanied by Asphyxia at Labuang Baji Regional Public Hospital in 2018 in accordance with 7 steps of Varney and SOAP. The management of LBWB case with Asphyxia carried out by the newborn Asphyxia management was then followed by the normal newborns management, and preventing complications occurred in LBWB.

The conclusions of the case were 7 steps of Varney and SOAP applied on the obstetric problem solving process were carried out in the form of monitoring and analyzing the data of Baby R with low birth weight baby with asphyxia at Labuang Baji Regional Public Hospital in 2018, the baby was spontaneously born, did not immediately cry, female sex with a birth weight of 2300 grams and documentation of all the findings and actions was carried out on Baby R with the results of no gap between the theory and the case.

Keywords: LBWB, Asphyxia, 7 Steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kematian bayi di Indonesia masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO), menunjukkan bahwa pravelensi Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) terjadi sebanyak 17% dari 25 juta persalinan per tahun di dunia dan hampir semua terjadi di negara berkembang (WHO, dalam Hendrawati, s, et al, 2018). Angka kematian neonatus di Asia Tenggara adalah 39 per 1000 kelahiran hidup.

Berdasarkan data kematian perinatal di Indonesia, 29,9% dilaporkan terjadi pada hari pertama, dan 75,6% pada satu minggu setelah lahir (Fajrawati, N. dkk, 2015). Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini sama dengan AKN berdasarkan SDKI tahun 2007 dan hanya menurun 1 poin dibanding SDKI tahun 2002-2003 yaitu 20 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Indonesia, 2015).

Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, jika diamati dari bayi lahir, pravelensi bayi dengan berat badan lahir rendah menurun dari 11,1% tahun 2010 menjadi 10,2% di tahun 2013. Berat badan lahir merupakan salah satu indikator tumbuh kembang anak yang diperoleh janin selama dalam kandungan. BBLR adalah berat

lahir <2500 gram atau dibawah normal. BBLR merupakan masalah yang sangat kompleks dan memberikan kontribusi berbagai hasil kesehatan yang buruk karena tidak hanya menyebabkan tingginya angka morbiditas dan mortalitas tetapi juga dapat menyebabkan kecacatan, gangguan kognitif, atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif dan penyakit kronis di kemudian hari (Susilowati, Wilar. Salendu, 2016 dan UNICEF, dalam Hendrawati,S. et al, 2018).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Hal ini mendorong tenaga kesehatan masyarakat yang menunjukkan bahwa distribusi berat lahir dan proporsi bayi yang lahir dengan berat lahir rendah. BBLR dianggap sebagai indikator pembangunan sosial-ekonomi. BBLR menjadi salah satu penyebab utama kematian tinggi dan morbiditas tingkat 3 di seluruh dunia dari 139 juta kelahiran hidup sekitar 23 juta bayi berat bayi lahir rendah yaitu berat badan lahir kurang dari 2500 gram (Shriram, V. Gosavi dan R,Koparkar, 2014).

Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015, upaya pemeliharaan kesehatan anak antara lain diharapkan untuk dapat menurunkan angka kematian anak, salah satu indikator kematian yang berhubungan dengan anak ialah Angka Kematian Neonatal (AKN). Upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi (Profil Kesehatan Indonesia, 2015).

Pada Anamnesis akan didapatkan pula riwayat kehamilan yang berpengaruh terhadap berat badan janin seperti usia ibu waktu hamil kurang dari 20 tahun, atau lebih dari 35 tahun, gizi ibu yang kurang, kehamilan ganda (*gemelli*) dan perdarahan antepartum. Penyakit-penyakit yang diderita oleh ibu termasuk penyakit jantung, TBC, Hipertensi dan penyakit ginjal dapat pula berpengaruh terhadap berat badan janin.

BBLR juga bisa terjadi karena adanya riwayat ibu bekerja terlalu berat, kebiasaan keluarga di rumah seperti pekerjaan yang melelahkan dan merokok. Ibu hamil dengan asupan gizi yang baik mengurangi resiko melahirkan berat bayi lahir rendah (Adnyani, N,W,S dan Luh Putu Risma, 2016). Dengan demikian, berat bayi lahir rendah dapat dicegah secara dini melalui kecukupan zat gizi yang baik pada ibu hamil.

Berat badan lahir merupakan salah satu indikator kesehatan bayi baru lahir. Bayi berat lahir rendah dan berat lahir lebih dimasukkan kedalam kelompok resiko tinggi, karena menunjukkan angka kematian yang lebih tinggi dari pada berat bayi lahir cukup. BBLR mempunyai kecendrungan ke arah peningkatan terjadinya infeksi, asfiksia, ikterus, dan hipoglikemia (Fajarwati,N. dkk, 2016).

Berat badan lahir merupakan salah satu faktor resiko yang menjadi penyebab utama terjadinya asfiksia neonatorum. Menurut Fajarwati tahun 2016, Asfiksia Neonatorum ialah suatu keadaan dimana bayi tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir atau beberapa saat setelah lahir. Keadaan ini

disertai dengan hipoksia, hiperkapnia dan berakhir dengan asidosis. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan Evi Desfaufa dari Universitas Sumatera pada tahun 2007, menyatakan bahwa berat lahir merupakan salah satu faktor resiko yang berhubungan signifikan dan sangat dominan pada kejadian asfiksia neonatorum di RSUD FR. Pirnga di Medan.

Bayi yang lahir dengan berat badan kurang memiliki resiko terjadi asfiksia sebesar 79,5% sedangkan bayi dengan berat badan normal beresiko sebesar 20,5%. Penelitian yang dilakukan Fahrudin di kabupaten Purworejo pada tahun 2003 menyatakan bahwa dari 14 variabel yang diteliti, salah satu faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian asfiksia neonatorum di 4 rumah sakit yang diteliti di Purworejo adalah berat badan lahir rendah.

BBLR berpotensi besar untuk mengalami berbagai masalah sebagai akibat belum lengkap dan matangnya organ dan fungsi tubuh. Masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian dari tim pelayanan kesehatan pada saat merawat BBLR adalah masalah yang terjadi sebagai akibat belum sempurnanya pengaturan suhu tubuh, fungsi pernafasan, fungsi persyarafan, fungsi kardiovaskuler, sistem perdarahan, sistem pencernaan, sistem perkemihan dan sistem kekebalan tubuh (Maryunani, dalam Lidya, 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji pada tahun 2015 angka kejadian BBLR dari 1.538 jumlah persalinan terdapat 98 bayi yang mengalami BBLR dan diantaranya terdapat 46 bayi disertai Asfiksia. Pada tahun 2016, angka kejadian BBLR dari 1.508 jumlah

persalinan terdapat 72 bayi dan diantaranya terdapat 28 bayi disertai Asfiksia. Dan pada tahun 2017, angka kejadian BBLR dari 1.502 jumlah persalinan terdapat 47 bayi yang mengalami BBLR dan diantaranya terdapat 16 bayi disertai Asfiksia (Rekam Medik RSUD Labuang Baji, 2017).

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa angka kejadian BBLR dengan Asfiksia menurun dalam tiga tahun terakhir, berawal dari tahun 2015 yaitu sebanyak 46%, dan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 39% dan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 34%. Walaupun angka kejadian BBLR disertai Asfiksia menurun di RSUD Labuang Baji, namun ini tetap menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan, sebab BBLR sangat rentan terhadap berbagai penyakit dan Asfiksia merupakan penyumbang terbesar angka kematian neonatus.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus BBLR disertai Asfiksia. Sehingga, penulis menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir pada bayi Ny”X” dengan masalah Bayi Berat Lahir Rendah dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji Tanggal 23 Juli- 03 Agustus Tahun 2018.

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini meliputi Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir pada bayi Ny “X” dengan masalah Bayi Berat Lahir Rendah dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji Tanggal 23 Juli-03 Agustus Tahun 2018.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi dengan Bayi Berat Lahir Rendah dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji dengan menggunakan proses asuhan kebidanan yang sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

Melakukan pengkajian data terkait dengan masalah Bayi Berat lahir rendah dengan Asfiksia.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Institusi

Sebagai bahan bacaan dan acuan bagi peneliti berikutnya di bidang kesehatan, dalam proses peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus jurusan DIII kebidanan mengenai “Manajemen Asuhan Pada Bayi Baru Lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah dengan Asfiksia”.

2. Bagi Instansi Tempat Pengambilan Kasus

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan sehingga dapat melakukan upaya peningkatan terkait pelayanan kesehatan pada bayi dengan bayi berat lahir rendah dengan asfksia.

3. Bagi Penulis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program studi pendidikan DIII Kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b. Dapat meningkatkan dan menambah wawasan serta keterampilan dalam penerapan asuhan kebidanan pada bayi dengan berat badan lahir rendah dengan asfiksia.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur, jurnal dan media internet yang berhubungan dengan Bayi Berat Lahir Rendah dengan Asfiksia.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, Identifikasi diagnosa/masalah aktual, Identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan emergensi/kolaborasi,

rencana tindakan/intervensi, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara lain:

a. Anamnesa

Penulis menggunakan Tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara *Inspeksi, Palpasi, dan Auskultasi*.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi bayi terhadap keluarga, dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi yang mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dari dokter dan bidan.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan di gunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu pendahuluan, akan menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis akan menguraikan mengenai tinjauan umum bayi baru lahir, tinjauan khusus bayi berat lahir rendah, tinjauan khusus bayi asfiksia, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan dan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di

RSUD Labuang Baji dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi dengan berat badan lahir rendah dengan asfiksia.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat data literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan umum tentang bayi baru lahir (BBL)

1. Pengertian bayi baru lahir

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan persentase belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai dengan 42 minggu, dengan berat badan 2500-4000 gram, nilai apgar >7 dan tanpa cacat bawaan (Yeyeh Ai R, Lia Y, 2012: 2). Berdasarkan penjelasan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan aterm dengan berat badan 2500-4000 gram dan tanpa cacat bawaan.

2. Karakteristik bayi normal

Pada bayi baru lahir normal memiliki beberapa ciri-ciri yaitu posisi lengan dan tungkai fleksi, bayi bergerak aktif, wajah, bibir dan selaput lendir, dada berwarna merah muda, tanpa adanya kemerahan atau bisul. Frekuensi napas normal 40-60 kali per menit, tidak ada tarikan dinding dada yang kuat, frekuensi denyut jantung normal 120-160 kali per menit, suhu normal adalah $36,5-37,5^{\circ}\text{C}$. Bentuk kepala terkadang asimetris karena penyesuaian pada saat proses persalinan, umumnya hilang dalam 48 jam. Tidak ada kotoran atau secret pada mata, bibir, gusi langit-langit utuh dan tidak ada bagian yang

terbelah, kekuatan mengisap bayi kuat. Perut bayi datar, teraba lemas, tidak ada perdarahan, pembengkakan, nanah, bau atau kemerahan pada tali pusat. Pada bagian punggung tidak teraba lubang atau benjolan. Pada ekstrimitas jumlah jari lengkap, posisi nya tidak bengkok. Terdapat lubang anus, biasanya mekonium keluar dalam 24 jam. Bayi perempuan kadang terlihat cairan vagina berwarna putih atau kemerahan, bayi laki-laki terdapat lubang uretra pada ujung penis, pastikan bayi sudah buang air kecil dalam 24 jam setelah lahir. Berat lahir normal 2500-4000 gram, dalam minggu pertama berat bayi mungkin turun dahulu baru kemudian naik kembali dan pada usia 2 minggu umumnya telah mencapai berat lahirnya. Panjang lahir normal 48-52 cm, lingkar kepala normal 33-37 cm. Posisi bayi pada saat menyusu bibir bawah melengkung keluar sehingga sebagian besar areola berada di dalam mulut bayi, bayi kuat menyusu dan menghisap dalam dan pelan kadang disertai berhenti sesaat (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

3. Penanganan bayi baru lahir normal

Bayi baru lahir memiliki kebutuhan dan perawatan yang diberikan melalui pemberian asuhan, yaitu :

- a. Menjaga kehangatan bayi.
- b. Mengisap lendir dari mulut dan hidung (hanya jika perlu).
- c. Mengeringkan bayi.
- d. Memantau tanda bahaya pada bayi.

- e. Klem, potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun, kira-kira 2 menit setelah lahir.
- f. Lakukan Inisiasi Menyusu Dini.
- g. Beri salep mata antibiotika pada kedua mata.
- h. Pemeriksaan fisis.
- i. Beri imunisasi Hepatitis B 0,5 mL *intramuskular*, dipaha kanan *anterolateral*, kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1 (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

Tabel 2.1

Penilaian Apgar Score

Skor	0	1	2
<i>Appereance color</i> (warna kulit)	Pucat	Badan merah, Ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerah-merahan
<i>Pulse (Heart Rate)</i> Atau frekuensi jantung	Tidak ada	<100 x/menit	>100 x/ menit
<i>Grimace</i> (Reaksi Terhadap rangsangan)	Tidak ada	Sedikit gerakan mimic	Menangis, batuk , bersin
<i>Activity</i> (Tonus otot)	Lumpuh	Ekstremitas dalam fleksi sedikit	Gerakan aktif
<i>Respiration</i> (pernafasan)	Tidak ada	Lemah, tidak teratur	Menangis kuat

(Sumber : Saleha, 2013: 3).

4. Pencegahan kehilangan panas

a. Mekanisme kehilangan panas

Bayi dapat kehilangan panas tubuhnya melalui sebagai berikut :

- 1) Evaporasi, yaitu penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh bayi sendiri karena setelah lahir tidak segera di keringkan dan diselimuti.
- 2) Konduksi, yaitu melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin.
- 3) Konveksi, yaitu pada saat bayi terpapar udara yang lebih dingin (misalnya melalui kipas angin, hembusan udara, atau pendingin ruangan).
- 4) Radiasi, yaitu ketika bayi ditempatkan di dekat benda benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi (walaupun tidak bersentuhan secara langsung) (Yeyeh Ai R. dan Lia Y, 2012:9).

b. Mencegah kehilangan panas

- 1) Keringkan bayi segera setelah bayi lahir untuk mencegah terjadinya evaporasi dengan menggunakan handuk atau kain (menyeka tubuh bayi juga termasuk rangsangan taktil untuk membantu memulai pernapasan).
- 2) Selimuti tubuh bayi dengan kain bersih dan hangat segera setelah mengeringkan tubuh bayi dengan memotong tali pusat. Sebelumnya ganti handuk atau kain yang telah digunakan untuk mengeringkan

tubuh bayi. kain basah di dekat bayi dapat menyerap panas tubuh bayi melalui radiasi.

- 3) Selimuti bagian kepala karena merupakan permukaan tubuh yang relatif luas dan bayi akan dengan cepat kehilangan panas jika tidak ditutupi.
- 4) Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya. Sebaiknya pemberian ASI harus dalam waktu 1 jam pertama kelahiran.
- 5) Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat, yang paling ideal adalah bersama dengan ibunya agar menjaga kehangatan tubuh bayi, mendorong ibu agar segera menyusui bayinya dan mencegah paparan infeksi pada bayi.
- 6) Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. Sebelum melakukan penimbangan, terlebih dahulu selimuti bayi, dengan kain yang kering dan bersih. Berat badan bayi dapat dinilai dari selisih berat bayi dikurangi dengan kain selimut bayi yang digunakan. Bayi sebaiknya dimandikan sedikitnya 6 jam setelah lahir. Sebelum dimandikan periksa bahwa suhu tubuh bayi stabil (suhu aksila antara $36,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, jika suhu tubuh bayi masih dibawah batas normal maka selimuti bayi dengan longgar, tutupi bagian kepala, tempatkan bersama dengan ibunya (skin to skin), tunda memandikan bayi sampai suhu tubuhnya stabil dalam waktu 1 jam. Tunda juga untuk

memandikan bayi jika mengalami gangguan pernapasan. Ruangan untuk memandikan bayi harus hangat dan tidak ada tiupan angin. Mandikan bayi secara cepat dengan air bersih dan hangat. Setelah bayi dimandikan, segera keringkan dan selimuti kembali bayi, kemudian berikan ke ibunya untuk disusui dengan ASI (Yeyeh Ai R, Lia Y, 2012:10-11).

B. Tinjauan umum tentang Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

1. Pengertian bayi berat lahir rendah

- a. Berat badan lahir rendah adalah berat badan kurang dari 2500 gram, yaitu karena usia kehamilan kurang dari 37 minggu, berat badan rendah dari semestinya, sekalipun cukup bulan, atau karena kombinasi keduanya (Ayu, et al, 2014).
- b. Bayi berat lahir rendah ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2.500 gram (sampai dengan 2.499 gram) (Prawirohardjo, dalam Yeyeh, A, 2012:242).
- c. Bayi berat lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram tanpa memperhatikan usia gestasi (Saputra, 2014).

2. Klasifikasi bayi berat lahir rendah

Bayi yang beratnya lebih dari 2.500 gram dianggap lebih matang dari pada bayi dengan berat lahir rendah. Berat lahir rendah, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bayi berat lahir rendah ialah bayi dengan berat lahir 1.500 – 2.499 gram.
- b. Bayi Berat lahir Sangat Rendah (BBLSR) ialah bayi dengan berat lahir 1000– 1499 gram.
- c. Bayi Berat Lahir Ekstrem Rendah (BBLER) ialah bayi dengan berat lahir <1000 gram (Yeyeh, A, 2012).

Berdasarkan umur kehamilan atau masa gestasi, dibedakan menjadi :

- a. *Preterm*: usia kehamilan kurang dari 37 minggu (259 hari)
- b. *Aterm*: usia kehamilan antara 37 dan 42 minggu (259-293)
- c. *Post Term*: usia kehamilan lebih dari 42 minggu (294 hari) (Ida, A. et al, 2014).

Berdasarkan pengelompokan tersebut BBLR dapat dikelompokkan menjadi prematuritas murni dan dismaturitas :

- 1) Prematuritas murni adalah neonatus dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan mempunyai berat badan yang sesuai dengan masa kehamilan atau disebut juga neonatus preterm / BBLR/ SMK.

- 2) Dismatur adalah bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya untuk masa kehamilan dikarenakan mengalami gangguan pertumbuhan dalam kandungan (Maryunani, A. Eka puspita S, 2013).

3. Etiologi Bayi Berat Lahir Rendah

a. Faktor ibu

- 1) Gizi saat hamil yang kurang
- 2) Usia ibu <20 tahun atau >35 tahun
- 3) Jarak hamil dan bersalin dekat
- 4) Penyakit menahun : hipertensi, jantung, gangguan pembuluh darah dll.

b. Faktor kehamilan

- 1) Hamil dengan hidramnion
- 2) Hamil ganda
- 3) Perdarahan antepartum
- 4) Komplikasi kehamilan : preeklampsia/eklampsia, ketuban pecah dini

c. Faktor janin

- 1) Cacat bawaan
- 2) Infeksi dalam Rahim
- 3) Kehamilan ganda

d. Faktor lain

- 1) Pekerjaan yang melelahkan
- 2) Perokok

- 3) Keadaan social ekonomi yang rendah (Yeyeh, A et al, 2012. dan Maryunani, A. Eka P. S, 2013. dan Ida. Et al, 2014).

4. Gambaran klinik Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi dengan berat lahir rendah tentu berbeda dengan bayi yang lahir dengan berat lahir normal dan dengan usia kehamilan aterm. BBLR memiliki gambaran secara umum sebagai berikut :

- 1) Berat badan kurang dari 2500 gram
- 2) Panjang badan kurang dari 45 cm
- 3) Lingkar dada kurang dari 30 cm
- 4) Lingkar kepala kurang dari 33 cm
- 5) Usia kehamilan kurang dari 37 minggu
- 6) Kepala relatif besar
- 7) Kulit tipis transparan, rambut lanugo banyak, lemak kulit kurang
- 8) Otot hipotonik-lemah
- 9) Pernapasan tidak teratur dapat terjadi apnea (gagal napas)
- 10) Ekstremitas : paha abduksi, sendi lutut/ kaki fleksi-lurus
- 11) Kepala tidak mampu tegak
- 12) Pernapasan sekitar 45-50 denyut per menit
- 13) Frekuensi nadi 100 sampai 140 denyut per menit (Ida. et al, 2014).

5. Penyakit yang berhubungan dengan Bayi Berat Lahir Rendah

Bayi dengan berat lahir rendah, baik prematur maupun dismaturitas dapat memunculkan beberapa penyakit. Penyakit tersebut sebagai berikut:

- a. Asfiksia atau gangguan pernapasan.
- b. Hipotermi disebabkan kemampuan metabolisme panas masih rendah.
- c. Mudah terjadi infeksi.
- d. Ikterus (Ida et al, 2014).

6. Penatalaksanaan Bayi Berat Lahir Rendah


BBLR membutuhkan bantuan dan waktu untuk penyesuaian kehidupan di luar rahim, sehingga perlu adanya diberikan asuhan. Adapun asuhan pada BBLR sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan suhu tubuh dengan ketat. BBLR mudah mengalami *Hipotermi*, oleh sebab itu suhu tubuhnya harus dipertahankan dengan ketat.
- 2) Mencegah infeksi dengan ketat. BBLR sangat rentan dengan infeksi, perhatikan prinsip-prinsip pencegahan infeksi termasuk mencuci tangan sebelum memegang bayi.
- 3) Pengawasan nutrisi/Asi. Refleks menelan BBLR belum sempurna, oleh sebab itu pemberian nutrisi harus dilakukan dengan cermat.
- 4) Penimbangan ketat. Perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi/nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu penimbangan berat badan harus dilakukan dengan ketat.

- 5) Kain yang basah secepatnya diganti dengan kain yang kering dan bersih, pertahankan suhu tetap hangat.
- 6) Kepala bayi ditutup topi, beri oksigen bila perlu.
- 7) Tali pusat dalam keadaan bersih.
- 8) Perawatan Metode Kangguru (PMK). BBLR membutuhkan bantuan dan waktu untuk penyesuaian kehidupan di luar rahim. Mereka juga memerlukan bantuan untuk tetap hangat dan mendapatkan ASI yang cukup untuk tumbuh. Satu cara untuk mendorong bayi mendapatkan kebutuhan ini adalah menjaga bayi tetap kontak kulit dengan kulit ibunya. Perawatan Metode Kangguru adalah suatu cara agar BBLR terpenuhi kebutuhan khusus mereka terutama dalam mempertahankan kehangatan suhu tubuh. Syarat dilakukan PMK yaitu bayi tanpa masalah atau komplikasi yaitu bayi tidak mengalami kesulitan bernapas, tidak mengalami kesulitan minum, tidak kejang, tidak diare, serta ibu dan keluarga bersedia dan tidak sedang sakit. Perawatan ini dilakukan dengan mendekapkan bayi kepada ibunya melalui kontak fisik secara langsung, tubuh ibu mampu berfungsi sebagai *natural termostant* (penyesuaian suhu tubuh) sehingga jika bayi kehilangan panas bayi akan lebih hangat begitupun jika bayi dingin suhu tubuh bayi akan kembali normal. Selain itu, perawatan metode kangguru mendekatkan bayi dengan jantung ibu yang dapat menjalin ikatan batin antara bayi dengan ibu dan membuat pernapasan bayi lebih stabil, lebih mudah dalam pemberian ASI serta membuat bayi lebih merasa dicintai dan aman. Perawatan ini sama

halnya dengan Kangguru yang meletakkan bayinya di dalam kantung nya yang membuat bayi kangguru dapat menyusu dan tetap hangat, sehingga perawatan ini di kenal dengan perawatan metode kangguru. Pelaksanaan PMK memiliki 4 komponen, yaitu posisi, nutrisi, dukungan dan pemantauan BB. Posisi melakukan Perawatan Metode Kangguru (PMK), yaitu:

- a) Bayi telanjang dada (hanya memakai popok, topi, kaus tangan, kaus kaki), diletakkan telungkup di dada dengan posisi tegak atau diagonal. Tubuh bayi menempel/kontak langsung dengan ibu.
- b) Atur posisi kepala, leher, dan badan dengan baik untuk menghindari terhalangnya jalan napas. Kepala menoleh ke samping di bawah dagu ibu (ekstensi ringan).
- c) Tangan dan kaki bayi dalam keadaan fleksi seperti posisi “katak”(gambar a)
- d) Kemudian “fiksasi” dengan selendang (gambar b)
- e) Ibu mengenakan pakaian atau blus longgar sehingga bayi berada dalam 1 pakaian dengan ibu. Jika perlu, gunakan selimut (gambar c).
- f) Selain ibu, ayah dan anggota keluarga lain bisa melakukan metode kangguru (gambar d).

Gambar 2.1**Perawatan Metode Kanguru (PMK)**

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Selama pelaksanaan PMK, BBLR hanya dapat diberikan ASI. Melalui PMK ini akan mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif, karena ibu menjadi lebih cepat tanggap bila bayi ingin menyusui, bayi bisa menyusui lebih lama dan lebih sering. Bila bayi dibawa ke fasilitas kesehatan

dan bayi tidak mampu menelan ASI dapat dilakukan pemasangan *Oro Gastric Tube (OGT)* untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan dari keluarga diberikan ke ibu dan bayi nya dalam melakukan PMK, dan pelaksanaan PMK akan dibantu oleh petugas kesehatan.

BBLR yang dirawat di fasilitas kesehatan yang dapat dipulangkan lebih cepat (berat <2000 gram) harus dipantau untuk tumbuh kembangnya. Apabila didapatkan tanda bahaya harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kunjungan BBLR minimal dua kali dalam minggu pertama, dan selanjutnya sekali dalam setiap minggu sampai berat bayi 2500 gram. Hikmah dari pemberian ASI adalah meningkatkan kadar oksitosin yang dapat membantu pemulihan ibu dan prolaktin yang dapat mempengaruhi produksi ASI, refleks hisap pada bayi baik, terjadi pembentukan kekebalan aktif dini pada bayi, mempercepat ikatan antara orang tua dengan anak serta bayi merasa aman, disayangi, mulai menumbuhkan rasa sosial dan mengadakan eksplorasi.

- 9) Beri minum dengan sonde/ tetes dengan pemberian ASI. Pemberian ASI pada bayi prematur dan bayi kecil (BBLR) yaitu dengan cara:
- a) Berikan ASI sesering mungkin walaupun waktu menyusuinya pendek-pendek. BBLR minum setidaknya setiap 2 jam.
 - b) Jika belum bisa menyusu, ASI dikeluarkan dengan tangan atau pompa. Berikan ASI dengan sendok atau cangkir.

- c) Untuk merangsang menghisap, sentuh langit-langit bayi dengan ibu jari bersih.

Mengajari ibu cara meningkatkan produksi ASI yaitu dengan cara menyusui sesering mungkin menggunakan payudara kiri dan kanan secara bergantian, berikan ASI dari satu payudara sampai kosong sebelum pindah ke payudara lainnya dan jika bayi telah tidur lebih dari 2 jam, bangunkan dan langsung disusui agar kebutuhan bayi dapat terpenuhi.

- 10) Bila tidak mungkin infuse dekstrose 10% + *bicabornas natricus* 1,5% = 4 : 1, hari 1 = 60 cc/kg/hari (kolaborasi dengan dokter) dan berikan antibiotik (Yeyeh, 2012).

C. Tinjauan umum tentang Asfiksia

1. Pengertian Asfiksia

- a. Asfiksia neonatorum merupakan kegagalan bernafas secara spontan, tidak teratur dan tidak adekuat segera setelah lahir atau beberapa saat setelah lahir. Keadaan ini disertai hipoksia, hiperkapnia dan berakhir dengan Asidosis (Fajarwati, N, 2016).
- b. Asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi yang tidak dapat bernapas spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan O_2 dan makin meningkatnya CO_2 yang menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan lebih lanjut (Manuaba, 1998. dan Ida, et al, 2014).

- c. Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bernafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah saat lahir yang ditandai dengan hipoksia, hiperkapnia dan asidosis (IDAI dalam Maryunani, A, 2013).

2. Klasifikasi Asfiksia

Klasifikasi asfiksia berdasarkan nilai APGAR :

- 1) Asfiksia ringan dengan nilai Apgar 7-9.
- 2) Asfiksia sedang dengan nilai Apgar 4-6.
- 3) Asfiksia berat dengan skor apgar 0-3 (Fajarwati, dkk, 2016)

Penilaian Bayi Baru Lahir (BBL). Perhitungan nilai Apgar dilakukan pada 1 menit pertama dan 5 menit kedua.

Tabel 2.2
Penilaian Apgar Score

Skor	0	1	2
<i>Appereance color</i> (warna kulit)	Pucat	Badan merah, Ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerah-merahan
<i>Pulse (Heart Rate)</i> Atau frekuensi jantung	Tidak ada	<100 x/menit	>100 x/ menit
<i>Grimace</i> (Reaksi Terhadap rangsangan)	Tidak ada	Sedikit gerakan mimic	Menangis, batuk , bersin
<i>Activity</i> (Tonus otot)	Lumpuh	Ekstremitas dalam fleksi sedikit	Gerakan aktif
<i>Respiration</i> (pernafasan)	Tidak ada	Lemah, tidak teratur	Menangis kuat

(Sumber : Saleha, 2013: 3).

3. Etiologi Asfiksia

a. Faktor keadaan ibu

- 1) Penyakit kronis (*Tuberculosis*, jantung, kekurangan gizi, ginjal).
- 2) Penyakit selama kehamilan (preeklampsia dan eklampsia).
- 3) Penyakit Genetik
- 4) Persalinan patologis (persentasi bokong, letak lintang, partus lama atau partus macet, demam sebelum dan selama persalinan, vakum ekstraksi, forsep).
- 5) Infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV)
- 6) Kehamilan lebih bulan (lebih 42 minggu kehamilan)

b. Faktor keadaan tali pusat

- 1) *Inersio velamentosa*
- 2) *Prolapsus vuniculi* (prolapsus tali pusat)

c. Faktor plasenta

- 1) Infark plasenta
- 2) Solusio plasenta
- 3) Plasenta previa

d. Faktor janin

- 1) Kelainan genetik
- 2) Kelainan kromosom
- 3) Kelainan pertumbuhan
- 4) Malnutrisi janin (Nanny, V, L,D, 2014).

4. Gambaran Asfiksia

Gambaran janin bila sirkulasi tidak adekuat. Gawat janin dapat diketahui dengan tanda :

- 1) Frekuensi detak jantung kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali per menit
- 2) Berkurangnya gerakan janin (janin normal bergerak lebih dari 10 kali per 12 jam).
- 3) Adanya air ketuban bercampur mekonium, warna kehijauan (pada bayi dengan persentase kepala, *meconium stained*) (Nanny, V, L, D, 2014).

Pada umumnya, anak yang mengalami kekurangan O_2 menunjukkan pernapasan cepat dalam periode yang singkat apabila asfiksia berlanjut, gerakan pernapasan berhenti dan denyut jantung menurun. Sedangkan, *tonus neuronmuskular* berkurang secara berangsur-angsur dan memasuki periode *apnue* primer. Adapun gejala dan tanda asfiksia neonatorum yang khas antara lain pernapasan cepat, pernapasan megap-megap dalam, denyut jantung terus-menerus menurun, anak terlihat lemah (*flaccid*), menurunnya tekanan O_2 anaerob (PaO_2), meningkatnya tekanan CO_2 darah ($PaCO_2$), menurunnya pH (akibat asidosis respiratorik dan asidosis metabolik), yang digunakan sebagai sumber glikogen bagi tubuh anak dan metabolisme anaerob, serta terjadinya perubahan sistem kardiovaskuler.

Pada asfiksia tingkat selanjutnya, juga akan terjadi perubahan yang disebabkan oleh beberapa keadaan. Diantaranya adalah:

- a. Hilangnya sumber glikogen dalam jantung, sehingga mempengaruhi fungsi jantung
- b. Terjadinya asidosis metabolik yang mengakibatkan menurunnya sel jaringan sehingga menimbulkan kelemahan jantung, dan,
- c. Pengisian udara alveolus yang kurang adekuat yang menyebabkan tetap tingginya resistensi pembuluh darah paru-paru, sehingga sirkulasi darah mengalami gangguan (Fida dan Maya, 2012).

5. Penatalaksanaan Asfiksia

Sebelum melakukan manajemen bayi baru lahir dengan Asfiksia, terlebih dahulu melakukan penilaian: Sebelum bayi lahir, apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur meconium? Segera setelah bayi lahir, Apakah bayi menangis atau megap-megap? Apakah bayi bergerak aktif atau tidak?


1. Jika bayi tidak cukup bulan dan atau tidak bernapas atau megap-megap, potong tali pusat. Jika air ketuban bercampur meconium, buka mulut lebar dan isap lendir dari mulut lalu potong tali pusat.
2. Menjaga bayi agar tetap hangat dengan menyelimuti dan mengeringkan bayi, atur posisi bayi, isap lendir pada mulut dan hidung, keringkan dan rangsang taktil, dan reposisi. Jika bayi bernapas normal, lakukan asuhan

pasca resusitasi yaitu pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermi, pemberian vitamin K1, pemberian salep mata, pemeriksaan fisis, pencatatan dan pelaporan. Namun, jika bayi belum bernafas normal, tidak bernafas atau megap-megap, lakukan ventilasi.

3. Melakukan ventilasi, pasang sungkup dan perhatikan perlekatannya. Ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air, jika dada mengembang lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik.
4. Setelah itu nilai napas, jika bayi bernapas normal maka hentikan ventilasi dan lakukan asuhan pasca resusitasi. Namun, jika bayi tidak dapat bernapas atau bernapas megap-megap, ulangi ventilasi sebanyak 20 kali selama 30 detik. Hentikan ventilasi dan nilai kembali napas tiap 30 detik. Jika bayi tidak dapat bernapas spontan sesudah 2 menit resusitasi, siapkan rujukan dan nilai denyut jantung.
5. Jika bayi dirujuk, lakukan konseling pada ibu dan keluarga, lanjutkan resusitasi, pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pemberian vitamin k, pemberian salep mata, pencatatan dan pelaporan.
6. Jika tidak mau dirujuk dan tidak berhasil, sesudah 10 menit bayi tidak bernapas spontan dan tidak terdengar denyut jantung, pertimbangkan menghentikan resusitasi. Lakukan konseling pada ibu dan keluarga, lakukan pencatatan dan pelaporan (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

Gambar 2.2

Bagan alur dan manajemen bayi baru lahir dengan Asfiksia.



(Sumber : Buku saku pelayanan kesehatan Neonatal Esensial, 2010: 5).

D. Tinjauan tentang BBLR dengan Asfiksia

Neonatus ialah bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Ada empat aspek transisi pada bayi baru lahir yang paling cepat berlangsung ialah sistem pernapasan, sirkulasi dan kemampuan menghasilkan sumber glukosa (Yeyeh, 2012). Bayi berat lahir rendah dan berat lahir lebih dimasukkan kedalam kelompok resiko tinggi, karena menunjukkan angka kematian yang lebih tinggi dari pada berat bayi lahir cukup. Bayi berat lahir rendah berpotensi besar untuk mengalami berbagai masalah sebagai akibat belum lengkap dan matangnya organ dan fungsi tubuh. BBLR mempunyai kecenderungan ke arah peningkatan terjadinya infeksi, asfiksia, ikterus, dan hipoglikemia (Fajarwati, N. dkk, 2016).

Setelah bayi lahir, bayi akan bergantung kepada paru-paru sebagai sumber oksigen utama. Cairan yang mengisi alveoli atau yang dikenal surfaktan akan diserap masuk kedalam jaringan paru-paru, dan alveoli akan berisi udara. Pengisian alveoli oleh udara akan memungkinkan oksigen mengalir ke dalam pembuluh darah di sekitar alveoli. Arteri dan *vena umbilicalis* akan menutup sehingga menurunkan tahanan pada sirkulasi plasenta dan meningkatkan tekanan darah sistematik. Akibat tekanan udara dan peningkatan kadar oksigen dan alveoli, pembuluh darah paru akan mengalami relaksasi sehingga tahanan terhadap aliran darah berkurang.

Bayi dengan berat lahir rendah tentu saja akan berbeda dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. BBLR sangat sering terjadi pada yang lahir prematur atau kurang bulan. BBLR sangat rentan terhadap berbagai penyakit, dan yang paling sering ialah gangguan pernafasan atau Asfiksia. Bayi yang lahir prematur atau kurang bulan sangat menentukan keberhasilan sistem pernafasan dan sirkulasi bayi. Hal tersebut di karenakan, pada bayi prematur jumlah surfaktan atau cairan alveolus kurang atau tidak tercukupi.

Surfaktan merupakan senyawa yang terdiri dari *Fosfolipid* dan protein yang berfungsi untuk menahan tekanan paru agar tidak kolaps dan membantu alveolus agar mengembang terisi udara. Sehingga, jika kekurangan surfaktan maka akan berpengaruh pada kemampuan alveolus yang tidak dapat menyerap dan mengantarkan oksigen ke tiap jaringan dan organ serta tidak ada yang menahan tekanan paru-paru saat ekspirasi yang mengakibatkan paru-paru kolaps. BBLR memiliki otot pernafasan yang masih lemah dan tulang iga yang mudah melengkung atau *peliable thorax* (Winkjosastro dalam Marmi, 2015). Kegagalan pernafasan dapat menyebabkan hipoksia dan kerusakan organ dan jika tidak di tangani akan menyebabkan mortalitas neonatal.

E. Bayi Baru Lahir dalam Pandangan Islam

Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat telah diberikan penjelasan, ketetapan dan perumpamaan. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan berbagai manfaat yang begitu besar yang bahkan manusia belum mengetahui sebagian besar manfaat itu sendiri. Allah memerintahkan hambanya agar menikah dan memperoleh keturunan dengan cara yang benar. Berikut beberapa ayat yang menerangkan tentang bayi dalam pandangan Islam.

Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S An-Nahl/16: 78.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Terjemahan :

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur”(Kementerian Agama RI, 2013: 275).

Berdasarkan penjelasan di atas, ayat ini sebagai pemaparan contoh sederhana dalam kehidupan manusia yang tidak dapat terjangkau oleh manusia. Ayat ini menyatakan : Dan sebagaimana Allah mengeluarkan kamu berdasar kuasa dan ilmu-Nya dari perut ibu-ibu kamu sedang tadi nya kamu tidak wujud, maka demikian juga Dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika dia

mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu, kamu semua dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun yang ada di sekeliling kamu dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan-penglihatan dan aneka hati, sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya kepada kamu (Shihab, 2002).

Ayat ini secara jelas menerangkan adanya campur tangan Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Allah yang memulai penciptaan sejak awal pembentukan yang sebagaimana dikenal masa *organogenesis* yaitu terjadi pembentukan organ pada saat trimester 1 awal kehamilan lalu Allah pula menyempurnakannya dan mengeluarkannya. Manusia tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung bagaimana proses tersebut terjadi, oleh karenanya kita harus yakin bahwa seorang bayi tidaklah bisa lahir tanpa bantuan Allah SWT. Allah yang menciptakan sedemikian indahnya jalan lahir bayi sehingga, bayi dapat keluar dari rahim ibu dan Allah pula yang mengatur bagaimana bisa proses fungsi organ dan tubuh dapat bekerja secara cepat dan bersamaan di luar rahim ibu, itu terjadi diluar dari kemampuan manusia, sebagaimana hal tersebut dibuktikan dari penelitian. Allah yang menentukan hidup dan mati tiap makhlukNya dan membangkitkan makhlukNya kembali di kemudian hari. Oleh karena itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah SWT.

Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَلَدِكُمُ الْوَالِدَاتُ فَجُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ آتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahan :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Kementerian Agama RI, 2013: 37).

Berdasarkan penjelasan di atas, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Kata al-wâlidât dalam penggunaan Al-Qur'an berbeda dengan kata ummahât yang merupakan bentuk jamak dari kata umm. Kata ummahât digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata al-wâlidât

maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun.

Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari pada selainnya. Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ibu yang menyusui bayinya memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia.

Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraiannya atau masih berstatus istri walaupun telah ditalak, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri sehingga, bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar (Shihab, 2002).

Selain itu, ASI memberikan dampak positif dari segi ekonomi sehingga tidak memberatkan ibu dan keluarga dalam hal pemberian susu bagi bayi. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa ASI merupakan nutrisi yang sangat penting, di butuhkan dan sempurna bagi bayi serta Al-Qur'an merupakan kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.

Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd/13:28.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahan :

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” (Kementerian Agama RI, 2013: 252).

Berdasarkan ayat di atas, diterangkan bahwa Allah SWT, memberikan hati yang tenteram kepada setiap manusia yang senantiasa mengingat-Nya. Dengan cara berzikir, shalat, bersyukur, sedekah, mendengarkan murottal dan melakukan amalan ibadah lainnya yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan Habib Maulana Akbar di RSUD Abdul Wahab Sjahranie tahun 2017 yang menyatakan bahwa bayi yang bermasalah yang diperdengarkan murottal qur'an surah Ar-Rahman, frekuensi nadinya menjadi normal dan bayi merasa nyaman, ukuran dari kesehatan bayi ialah bayi merasa nyaman.

Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Insyiroh/94:5-8.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Terjemahan :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap”(Kementerian Agama RI, 2013: 596).

Berdasarkan ayat di atas, diterangkan bahwa Allah SWT, memberikan kesulitan bersama dengan kemudahan. Hal ini berarti dibalik kesulitan, terdapat kemudahan. Ayat ini di ulang selama 2 kali dalam Al-qur'an yang berarti Allah menginginkan hambanya agar senantiasa berpikiran positif, berusaha, bekerja keras, berdoa, dan bertawakkal kepada Allah SWT.

F. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Helen varney (1997), manajemen asuhan kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan dan urutan logis dan perilaku yang di harapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan ilmiah, penemuan dan

keterampilan dalam tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien.

1. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Helen varney, proses manajemen kebidanan terdiri dari 7 (tujuh) langkah yaitu sebagai berikut :

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama ini semua informasi akurat dan lengkap dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data di lakukan:

Anamnese meliputi: keluhan tentang bayinya, penyakit ibu yang mungkin berdampak pada bayi (TBC, demam saat persalinan, KPD >18 jam, hepatitis B atau C, siphilis, HIV/AIDS, penggunaan obat), warna air ketuban, waktu dan tempat bersalin, frekuensi bayi buang air kecil dan besar, frekuensi bayi menyusu dan kemampuan menghisap.

Pada Anamnese akan didapatkan kemungkinan bayi berat lahir rendah pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu, namun dapat juga terjadi pada kehamilan aterm atau pada usia kehamilan 42 minggu. Dan pada Anamnesis akan didapatkan pula riwayat kehamilan yang berpengaruh terhadap berat badan janin seperti usia ibu waktu hamil kurang dari 20 tahun, atau lebih dari 35 tahun, gizi ibu yang kurang, kehamilan ganda (*gemelli*) dan perdarahan

antepartum. Penyakit-penyakit yang diderita oleh ibu termasuk penyakit jantung, TBC, Hipertensi dan penyakit ginjal dapat pula berpengaruh terhadap berat badan janin. BBLR juga bisa terjadi karena adanya riwayat ibu bekerja terlalu berat, kebiasaan keluarga di rumah seperti pekerjaan yang melelahkan dan merokok.

Pada pemeriksaan fisik akan didapatkan berat badan kurang dari 2500 gram bayi bisa preterm atau aterm, jaringan lemak bawah kulit sedikit, tulang tengkorak pada bayi lunak mudah bergerak, kulit tipis, merah dan transparan, verniks kaseosanya sedikit/ tidak ada, menangis lemah, bayi berat lahir sangat rendah mempunyai tanda-tanda vital: pernapasan sekitar 45-50 denyut per menit (pernapasan tidak teratur dapat terjadi apnea atau gagal napas), frekuensi nadi 100 sampai dengan 140 denyut per menit dan suhu dibawah 36,5 °C. Ukuran antropometri : berat badan kurang dari 2500 gram, panjang kurang dari 45 cm, lingkaran dada kurang dari 30 cm, lingkaran kepala kurang dari 33 cm, dan LILA dibawah dari 9,5 cm. Kulit: tipis dan transparan, lanugo banyak, dan lemak kulit kurang. Genitalia, bayi perempuan : klitoris yang menonjol dengan labia mayora yang belum berkembang, bayi laki-laki: skrotum yang belum berkembang sempurna dengan ruga yang kecil, testis tidak turun kedalam skrotum, ekstremitas: paha abduksi, sendi lutut/ kaki fleksi-lurus dan kuku jari tangan dan kaki belum mencapai ujung jari. Refleks menelan dan menghisap lemah, menangis lemah dan otot hipotonik lemah.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif, dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah actual

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasi sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan masalah dan diagnosa keduanya digunakan karena masalah tidak dapat di definisikan seperti diagnosis tetapi membutuhkan penanganan.

Masalah BBLR ditegakkan berdasarkan interpretasi data dasar yang di kumpulkan bahwa BBLR akan menimbulkan masalah-masalah seperti suhu tubuh yang tidak stabil atau masalah dalam pengaturan temperatur pada bayi, terjadinya gangguan pernafasan pada bayi berat badan lahir rendah dan gangguan persyarafan.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan di harapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/ masalah potensial terjadi.

Pada bayi berat lahir rendah maka perlu di lakukan antisipasi terjadinya hipotermia, dimana hipotermi terjadi karena hanya sedikit lemak dan pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum matang. Sindrom gangguan pernapasan sering terjadi pada BBLSR kurang bulan yaitu pernapasan yang tidak teratur, merintih waktu ekspirasi, thoraks yang lunak dan otot respirasi yang lemah, resiko aspirasi akibat belum terkoordinasinya refleks menghisap dan refleks menelan.

Hipoglikemia adalah sedikitnya simpanan energi pada bayi sehingga BBLR membutuhkan ASI sesegera mungkin setelah lahir dan berikan ASI setiap 2 jam sekali pada minggu pertama. Hiperbilirubinemia terjadi karena fungsi hati belum matang.

d. Langkah IV : Melaksanakan Tindakan segera, kolaborasi, dan rujukan

Pada langkah ini, bidan atau dokter mengidentifikasi perlunya segera melakukan konsultasi atau melakukan kolaborasi bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kondisi BBLR, dengan usia kehamilan aterm, dan tidak mengalami gangguan nafas atau cacat

yang harus dilakukan tindakan segera, maka tidak diperlukan kolaborasi, namun jika terjadi gagal nafas, sianosis, hipotermi, kejang, gemetar atau tremor, pernapasan cepat, kulit dingin, refleks moro menurun atau tidak ada, kurang kuat menyusu, muntah yang kuat, tonus otot menurun atau tidak ada. Maka perlu dilakukan tindakan kolaborasi ataupun rujukan. Rujukan dilakukan jika, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga kesehatan yang terlatih dan alat yang kurang lengkap sehingga perlunya dilakukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap.

e. Langkah V : Menyusun Rencana Asuhan Menyeluruh

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh dan ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Adapun penatalaksanaan BBLR yaitu: mempertahankan suhu tubuh dengan ketat, karena bayi BBLR mudah mengalami hipotermi, maka suhu tubuhnya harus di pertahankan dengan ketat.

Mencegah infeksi dengan ketat pada BBLR sangat rentan akan infeksi, maka prinsip-prinsip pencegahan infeksi termasuk cuci tangan sebelum memegang bayi. pengawasan nutrisi reflek menelan bayi BBLR belum sempurna dan sangat lemah, sehingga pemberian nutrisi harus dilakukan dengan cermat. Penimbangan ketat perubahan berat badan mencerminkan

kondisi gizi/nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu penimbangan berat badan harus dilakukan dengan ketat.

Perawatan Metode Kangguru (*Kangaroo Mother Care*), Perawatan metode kangguru ini merupakan cara yang murah, aman dan mudah diterapkan yaitu dengan cara mempertahankan suhu tubuh bayi dengan cara kontak ke kulit seawal mungkin, mendukung ibu untuk memberikan ASI. Manfaat PMK yaitu dapat menjaga ikatan emosi ibu dan bayi, dapat melatih ibu cara menyusui yang baik dan benar, melatih bayi untuk menghisap dan menelan secara teratur dan terkoordinasi. Syarat dilakukan PMK ialah bayi yang tidak disertai penyakit atau komplikasi dan ibu atau keluarga dalam keadaan sehat.

f. Langkah VI : Pelaksanaan (Implementasi)

Rencana asuhan menyuluruh yang telah diuraikan pada langkah lima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dilakukan oleh seluruh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Pada kondisi dimana bayi berat lahir rendah dilakukan pengukuran antropometri, pengukuran tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, rawat gabung. Maka dapat dilakukan pelaksanaan secara umum. Kecuali apabila bayi mengalami tanda dan gejala seperti gagal napas, hipotermia, kejang, gemetar atau tremor, pucat dan sianosis dan lain-lain. Maka dapat dilakukan penatalaksanaan secara khusus.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang diberikan. Meliputi apakah pemenuhan kebutuhan telah terpenuhi sesuai diagnosa atau masalah.

2. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Pendokumentasian dalam asuhan kebidanan adalah suatu pencatatan lengkap dan akurat terhadap keadaan atau kejadian yang dilihat dalam pelaksanaan asuhan (proses asuhan kebidanan).

Pendokumentasian asuhan yang telah diberikan harus dicatat benar, jelas, singkat dan logis dalam suatu metode pendokumentasian dalam bentuk SOAP, yaitu :

a. *Subjektif (S)*

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis (Langkah 1 varney)

b. *Objektif (O)*

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium, dan uji diagnosis lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan (langkah 1 varney).

c. *Assesment (A)*

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi :

- 1) Diagnosis / masalah
- 2) Antisipasi diagnosis / masalah potensial
- 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/ konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan (langkah I,II,III, dan IV varney).

d. *Planning (P)*

Menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment (langkah V, VI dan VII varney). SOAP ini dilakukan pada asuhan tahap berikutnya dan atau pada evaluasi hari berikutnya/kunjungan berikutnya yang dilakukan dalam 0-28 hari selama 4 kali kunjungan untuk memantau perkembangan bayi.

Perawatan Metode Kanguru (*Kangaroo Mother Care*), merupakan cara yang murah, aman dan mudah diterapkan yaitu dengan cara mempertahankan suhu tubuh bayi dengan cara kontak ke kulit seawal mungkin, mendukung ibu untuk memberikan ASI. Mengajarkan dan mengarahkan ibu untuk selalu mengucapkan Basmalah saat hendak menggendong, memberikan ASI dan tindakan yang dilakukan lainnya yang berkaitan dalam hal mengurus bayi, dan membaca Hamdalah saat setelah bayi disusui. Menuntun ibu untuk selalu

mengucapkan sholawat, doa dan membacakan ayat suci al-qur'an pada bayinya.

Manfaat PMK yaitu dapat menjaga ikatan emosi ibu dan bayi, dapat melatih ibu cara menyusui yang baik dan benar, melatih bayi untuk menghisap dan menelan secara teratur dan terkoordinasi. Syarat dilakukan PMK ialah bayi yang tidak disertai penyakit atau komplikasi dan ibu atau keluarga dalam keadaan sehat. Kunjungan rumah pada neonatal dilakukan untuk asuhan yang lebih efektif.

Terdapat 4 kali kunjungan pada bayi baru lahir :

- 1) Setelah lahir saat stabil (sebelum 6 jam)
- 2) Pada usia 6-48 jam (kunjungan neonatal 1)
- 3) Pada usia 3-7 hari (kunjungan neonatal 2)
- 4) Pada usia 8-28 hari (kunjungan neonatal 3)

Pada kunjungan ulang, dilakukan pemeriksaan fisik, timbang berat bayi, periksa tanda-tanda vital bayi yaitu laju jantung, pernafasan dan suhu serta kebiasaan makan bayi (menyusu). Memeriksa tanda bahaya bayi baru lahir, memeriksa tanda infeksi pada bayi, memastikan ibu memberikan ASI Eksklusif, menjelaskan kepada ibu agar menjaga kebersihan bayi terutama dalam merawat tali pusat, menjelaskan agar waspada terhadap tanda bahaya pada bayinya dan mengingatkan serta memantau imunisasi pada waktunya (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR PADA BAYI
“R” DENGAN MASALAH BAYI BERAT LAHIR RENDAH
DISERTAI ASFIKZIA DI RSUD LABUANG BAJI
TANGGAL 23 JULI S/D 3 AGUSTUS 2018

No register : xx-xxx
Tanggal lahir : 23 Juli 2018, pukul 13:01 wita
Tanggal pengkajian : 23 Juli 2018, pukul 13:20 wita
Nama pengkaji : Salsa Putri Aulia

Langkah I : Identifikasi Data Dasar

A. Identifikasi Bayi dan Orang tua

1. Identitas Bayi

Nama : By “R”

Tanggal lahir : 23 Juli 2018

Anak ke : 1 (Pertama)

Jenis kelamin : Perempuan

2. Identitas Ibu/Ayah

Nama : Ny “R”/ Tn “M”

Umur : 29 tahun / 29 tahun

Nikah/lamanya : 1x / 1,5 tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SI/ SI

Pekerjaan : IRT/ Wiraswasta

Alamat : Sudiang

B. Data Biologis/Fisiologis

1. Keluhan utama

Keadaan bayi setelah lahir, bayi lahir secara spontan, tidak segera menangis, bernapas megap-megap, ekstremitas biru, tonus otot lemah, menangis dengan rangsangan taktil, berat bayi 2300 gram dan bayi diletakkan dalam inkubator.

2. Riwayat selama kehamilan

Anak pertama dan tidak pernah keguguran, Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) tanggal 8-12-2017, Tafsiran Persalinan (TP) tanggal 15-9-2018, usia gestasi 32 minggu, ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali kunjungan selama hamil, ibu telah mendapat suntikan Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 2 kali selama kehamilannya. Selama ibu hamil ibu mengonsumsi tablet Fe, kalsium dan susu ibu hamil.

3. Riwayat kesehatan

Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma dan diabetes mellitus, ada keluarga yang menderita hipertensi, tidak ada riwayat alergi dan

penyakit menular seksual seperti hiv/aids, ibu juga dulunya dalam keadaan prematur sewaktu dilahirkan.

4. Riwayat kelahiran

Umur kelahiran 32-34 minggu, tanggal lahir 23 Juli 2018, pukul 13:01 wita di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji, penolong persalinan adalah bidan, jenis persalinannya yaitu persentase belakang kepala (PBK), spontan, lahir kurang bulan, ketuban pecah dini (KPD), perlangsungan kala II-IV normal, segera menangis dan apgar skor 6/8, Berat Badan Lahir (BBL) 2300 gram, Panjang Badan Lahir (PBL) 46 cm, dan jenis kelamin perempuan.

5. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar bayi

a. Nutrisi/Cairan

Kebutuhan nutrisi/cairan bayi sementara diperoleh dari pemberian perahan Asi ibu, dengan cara menyendokkan Asi ke mulut bayi

b. Personal hygiene

Bayi belum dimandikan, pakaian bayi diganti jika basah atau usai BAK/BAB

c. Eliminasi

Bayi sudah BAK selama pengkajian, frekuensi BAK 1 kali selama pengkajian, warna kuning jernih dengan bau amoniak, dan bayi belum pernah BAB selama pengkajian

d. Istirahat

Bayi lebih banyak tidur, dan terbangun saat pakaiannya basah, atau jika lapar.

6. Pemeriksaan Fisik

Jenis kelamin perempuan, berat badan 2300 gram, panjang badan 46 cm, lingkar kepala 32 cm, lingkar dada 30 cm, lingkar perut 29 cm, lila 10 cm, pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu denyut jantung bayi : 128 x/i, pernapasan bayi : 48 x/i, suhu bayi: 36,9 °C, dan pemeriksaan yang dilakukan dengan inspeksi, palpasi dan auskultasi :

a. Kepala

Simetris kiri dan kanan, tidak ada caput succedaneum

b. Mata

Konjungtiva merah muda dan sclera tidak ikterus

c. Mulut

Tidak ada kelainan pada bagian mulut dan langit-langit, terdapat banyak lendir

d. Leher

Tidak ada pembesaran jaringan atau pembengkakan pada bagian leher

e. Dada dan perut

Tidak ada tarikan dada yang kuat, dan tali pusat tampak basah

f. Punggung dan bokong

Tidak ada kelainan pada punggung dan bokong

g. Genitalia dan anus

Tidak ada kelainan pada genitalia, dan terdapat lubang anus

h. Ekstremitas

Jumlah jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada kelainan, refleks moro, graps dan babinsky baik

7. Kulit

Integrasi kulit tampak tipis, lemak kulit kurang, tampak kemrahan dan terdapat lanugo

8. Karakteristik menurut Skor Ballard

a. Maturitas Neuromuskuler

1) Sikap	: 2	
2) Jendela pergelangan tangan	: 3	
3) Gerakan lengan membalik	: 2	
4) Sudut poplitea	: 2	
5) Tanda selempeng	: 2	
6) Lutut ke telinga	: 2	+
<hr/>		

Jumlah : 13

b. Maturitas fisik

1) Kulit	: 1
2) Lanugo	: 2
3) Garis telapak tangan	: 3
4) Payudara	: 2

5) Mata/ daun telinga	: 1
6) Genitalia	: 1
<hr/>	
Jumlah	: 10

Maturitas fisik+Maturitas Neuromuskular : $13+10=23$ (32-34 minggu).

9. Data Psikologis, spiritual dan ekonomi

- a. Orang tua sangat sangat senang dengan kelahiran bayinya dan khawatir dengan berat badan bayinya
- b. Ibu dapat secara langsung memberikan ASI kepada bayi dengan dipantau oleh bidan
- c. Hubungan ibu ke suami, keluarga dan lingkungan baik
- d. Orang tua selalu mendoakan bayi nya agar kondisi bayi segera membaik

Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa aktual : BKB/SMK/Spontan dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia

1. BKB

a. Data Subjektif

Ibu melahirkan kurang bulan (8 bulan), HPHT tanggal 8-12-2017 dan bayi lahir pada tanggal 23 Juli 2018 dengan berat badan lahir 2300 gram.

b. Data Objektif

Masa gestasi 32-34 minggu, 32 minggu 3 hari, dan tafsiran persalinan tanggal 15-9-2018.

c. Analisa dan Interpretasi Data

Dilihat dari hari tafsiran persalinan yaitu tanggal 15-9-2018, sedangkan bayi lahir tanggal 23 Juli 2018 yang berarti kurang bulan, dengan berat lahir 2300 gram, artinya bayi yang lahir tidak cukup bulan dan berat badan kurang dari 2500 gram disebut prematuritas murni (Maryunani, A, 2013).

2. SMK

a. Data Subjektif

Ibu melahirkan kurang bulan (8 bulan), HPHT tanggal 8-12-2017 dan bayi lahir pada tanggal 23 Juli 2018 dengan berat badan lahir 2300 gram.

b. Data Objektif

Masa gestasi 32-34 minggu, Ballard skor 23, pengukuran antropometri Panjang badan bayi: 46 cm, lingkaran kepala: 32 cm, lingkaran dada: 30 cm.

c. Analisa dan Interpretasi data

Dilihat dari usia gestasi dengan berat badan <2500 gram dan berdasarkan pengukuran antropometri, ini termasuk dalam gambaran klinik bayi beralahir rendah (Ida, et al, 2014).

3. Spontan

a. Data Subjektif

Ibu melahirkan saat setelah dipimpin bidan.

b. Data Objektif

Bayi lahir spontan, dengan persentase belakang kepala dengan berat lahir 2300 gram.

c. Analisa dan Interpretasi Data

Dilihat dari persentasi belakang kepala dengan berat lahir 2300 gram dan setelah dipimpin bidan, artinya termasuk persalinan spontan (Fajarwati, 2016).

4. Bayi dengan berat lahir rendah

a. Data Subjektif

Ibu melahirkan pada tanggal 23 Juli 2018 dengan berat bayi 2300 gram

b. Data Objektif

Berat badan lahir 2300 gram atau dibawah normal yaitu <2500 gram.

c. Analisa dan Intrepretasi Data

Dilihat dari beratnya yaitu 2300 gram, bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram tanpa memperhatikan usia gestasi disebut bayi berat lahir rendah (Saputra, 2014).

5. Disertai asfiksia

a. Data Subjektif

Bayi tidak langsung menangis setelah lahir

b. Data Objektif

Penilaian sepintas bayi lahir secara spontan, tidak segera menangis setelah lahir, megap-megap, ekstremitas kebiruan, tonus otot lemah, apgar skor 6/8.

c. Analisa dan Interpretasi Data

Dilihat bahwa bayi tidak segera menangis setelah lahir dan apgar skor 6/8, yang berarti termasuk klasifikasi Asfiksia (Kemenkes, 2013).

Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Diagnosa Potensial :

1. Potensi terjadinya hipotermi

a. Data subjektif

Tafsiran persalinan 15-9-2018, bayi kurang bulan dengan berat lahir 2300 gram

b. Data objektif

Berat badan bayi 2300 gram, bayi dibungkus dengan selimut dan diletakkan dalam inkubator.

c. Analisis dan interpretasi data

Bayi dengan berat lahir rendah dapat mengalami hipotermi disebabkan kemampuan metabolisme panas pada bayi masih rendah (Ida et al, 2014).

2. Potensi terjadinya hipoglikemia

a. Data subjektif

Bayi masih lemah dan banyak tidur

b. Data objektif

Berat badan 2300 gram dan refleks hisap masih lemah

c. Analisis dan interpretasi data

Sedikitnya simpanan energi pada bayi, dikarenakan bayi tidak lagi mendapat asupan nutrisi langsung dari ibu seperti dalam kandungan, dan bayi harus berusaha menyesuaikan serta memperoleh asupan nutrisi baik Asi maupun susu formula segera setelah lahir agar mencegah terjadinya hipoglikemia pada bayi (Fajarwati, 2016).

3. Potensi terjadinya ikterus/hiperbilirubinemia

a. Data subjektif

Bayi lahir kurang cukup bulan dengan berat 2300 gram

b. Data objektif

Bayi lahir kurang bulan dengan berat 2300 gram, usia gestasi 32-34 minggu

c. Analisis dan interpretasi data

Pada bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau kurang dari 2500 gram, fungsi organ dalam tubuhnya belum terlalu sempurna salah satunya yaitu hepar, sehingga dapat terjadi hiperbilirubinemia dimana hepar

belum mampu berfungsi dengan baik dan dampaknya bayi kuning (Maryunani, A, 2013).

4. Potensi terjadinya infeksi

a. Data subjektif

Bayi lahir kurang cukup bulan dengan berat 2300 gram

b. Data objektif

Bayi lahir kurang bulan dengan berat 2300 gram, usia gestasi 32-34 minggu, tali pusat tampak basah, bersih dan tidak ada tanda infeksi

c. Analisis dan interpretasi data

Infeksi rentan terjadi pada bayi baru lahir, terlebih jika bayi berat lahir rendah, dimana sistem kekebalan tubuhnya belum bekerja optimal, fungsi organnya belum matang dan dibutuhkan pencegahan infeksi terutama melalui cuci tangan (Fajarwati, 2016).

Langkah IV: Tindakan Segera/Kolaborasi

Dilakukan manajemen penanganan asfiksia pada bayi baru lahir yaitu saat setelah bayi lahir segera memotong tali pusat, menjaga kehangatan bayi, reposisi dan isap lendir.

Langkah V: Rencana Tindakan

A. Tujuan

Kebutuhan nutrisi terpenuhi/teratasi, tidak terjadi hipotermi, tidak terjadi hipoglikemia, tidak terjadi, ikterus, tidak terjadi infeksi, berat bayi bertambah, bayi semakin sehat, tanda-tanda vital dalam batas normal

B. Kriteria

Berat bayi bertambah, tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak ada tanda infeksi, bayi dapat menyusu dengan baik pada ibunya, bayi tidak dirawat dalam inkubator

C. Rencana asuhan

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Rasional : Tangan yang kotor dapat menjadi tempat berkembang

Biaknya mikroorganisme, dimana apabila menyentuh pasien dapat terkontaminasi

2. Observasi tanda-tanda vital

Rasional : Tanda-tanda vital memberikan gambaran dalam menentukan

Tindakan selanjutnya

3. Timbang BB bayi setiap hari

Rasional : Penimbangan yang ketat pada bayi berat lahir rendah sangat penting untuk selalu dipantau kemajuannya

4. Pertahankan suhu bayi agar tetap hangat

Rasional : Suhu bayi harus tetap dijaga agar bayi merasa aman,

nyaman dan terhindar dari komplikasi yang tidak diinginkan

5. Rawat tali pusat

Rasional : Tali pusat yang tidak terawat akan memudahkan berkembangbiakan mikroorganisme dan memudahkan timbulnya infeksi

6. Kaji tanda-tanda infeksi

Rasional : Bayi sangat rentan dengan infeksi, sehingga dengan merawat tali pusat dengan baik dan menjaga kebersihan terutama cuci tangan akan mencegah terjadinya infeksi pada bayi

7. Observasi eliminasi pasien

Rasional : untuk mengkaji dan mengetahui keseimbangan antara *intake* dan *output*

8. Mengganti popok bayi setiap kali basah

Rasional : Pakaian yang basah dapat mempengaruhi suhu bayi

9. Anjurkan kepada ibu agar sesering mungkin menyusui bayinya

Rasional : Dengan pemberian Asi yang sering akan mudah mempengaruhi kenaikan berat bayi, mempererat hubungan antara ibu dan bayi dan terjalin rasa percaya, aman dan nyaman

10. Anjurkan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang

Rasional : Kecukupan gizi ibu akan mempengaruhi dan berdampak

pada bayi, kecukupan gizi yang baik akan meningkatkan produksi asi dan mempercepat pemulihan ibu

11. Anjurkan ibu cara menyusui yang benar

Rasional : Agar ibu dapat menyusui dengan benar, tanpa rasa sakit, nyaman dan bayi pun menghisap dengan kuat dan bayi merasa tenang

12. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk melakukan Perawatan Metode

Kanguru (PMK) dan menjelaskan manfaat dari PMK

Rasional : PMK merupakan perawatan bagi bayi dengan berat lahir rendah yang bertujuan untuk menjaga kehangatan bayi, mempercepat kenaikan BB bayi, memfasilitasi ibu dalam pemberian Asi, mempererat hubungan emosional antara ibu dan bayi

13. Mendokumentasikan

Rasional : Pencatatan yang baik dapat menjadi pegangan ataupun bukti jika sesuatu terjadi pada pasien

Langkah VI : Implementasi

Tanggal 23 Juli 2018, pukul 13:01 wita

1. Menganjurkan ibu agar selalu mencuci tangan dan tetap menjaga kebersihan diri dan bayinya

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia

2. Observasi tanda-tanda vital telah dilakukan jam 13:01 wita

Hasil : HR : 128 x/i, P: 48 x/i, S: 36,9 °C

3. Penimbangan berat badan bayi telah dilakukan jam 13:01 wita

Hasil : 2300 gram

4. Merawat tali pusat

Hasil : Tali pusat belum kering dan tampak bersih

5. Menganjurkan ibu agar tetap menyusui bayinya secara on demand

Hasil : Ibu bersedia

6. Menganjurkan ibu agar tetap menjaga dan memperhatikan kehangatan bayinya

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia

7. Menganjurkan pada ibu agar mewaspadaai tanda dan bahaya bayi baru lahir

Hasil : Ibu mengerti

8. Menjelaskan kembali pada ibu tentang perawatan metode kangguru, dan menganjurkan kepada ibu agar menerapkannya kepada bayinya serta menjelaskan kembali manfaat perawatan metode kangguru

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 23 Juli 2018, pukul 13:20 wita

1. Kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi ditandai bayi kuat minum susu
2. Bayi tidak mengalami hipotermi ditandai dengan suhu bayi dalam batas normal

3. Tidak terjadi infeksi tali pusat, ditandai dengan tidak adanya tanda infeksi yaitu kemerahan, bengkak, nyeri dan tidak ada pengeluaran pus
4. Keadaan bayi baik, ditandai tanda-tanda vital dalam batas normal, yaitu:

HR	: 128 x/i	(N=120-160 x/i)
P	: 48 x/i	(N=40-60 x/i)
S	: 36,9 °C	(N=36,5 -37,5 °C)

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR**PADA BAYI “R” DENGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH****DISERTAI ASFIKSIA DI RSUD LABUANG BAJI****TANGGAL 23 JULI 2018**

No. register : xx-xxx
Tanggal lahir : 23 Juli 2018, pukul 13:01 wita
Tanggal pengkajian : 23 Juli 2018, pukul 13:01 wita
Nama pengkaji : Salsa Putri Aulia

IDENTIFIKASI DATA DASAR**1. Identitas Bayi**

Nama : By “R”
Tanggal lahir : 23 Juli 2018
Anak ke : 1
Jenis kelamin : Perempuan

2. Identitas Ibu/Ayah

Nama : Ny “R”/ Tn “M”
Umur : 29 tahun/ 29 tahun
Nikah/lamanya : 1x/ 1,5 tahun
Suku : Bugis/ Bugis

Agama : Islam/ Islam
Pendidikan : S1/ S1
Pekerjaan : IRT/ Wiraswasta
Alamat : Jln. Sudiang

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan melahirkan tidak cukup bulan
2. Ibu mengatakan haid terakhir tanggal 8-12-2017
3. Ibu mengatakan ini kelahiran anak pertama dan tidak pernah keguguran
4. Ibu telah mendapat suntikan TT sebanyak 2 kali selama kehamilannya
5. Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit Jantung, Asma, Diabetes mellitus dan Tuberculosis
6. Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit menular seksual seperti HIV/Aids

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan bayi lahir tidak segera menangis
2. Hari tafsiran persalinan ibu tanggal 15-9-2018
3. Umur kehamilan 32-34 minggu, 32 minggu 3 hari.
4. Berat badan lahir : 2300 gram, panjang badan lahir: 46 cm, lingkaran kepala: 32 cm, lingkaran dada : 30 cm, bayi lahir dengan persentase kepala
5. Pada mulut dan hidung bayi terdapat banyak lendir
6. Tali pusat masih basah

7. Otot hipotonik lemah

8. Melakukan pemeriksaan TTV

HR : 128 x/i (N=120-160 x/i)

P : 48 x/i (N=40-60 x/i)

S : 36,9 °C (N=36,5 -37,5 °C)

9. Penilaian Apgar score pada menit 1 dan menit ke-5 setelah bayi lahir

Tabel 3.1

Keterangan	0	1	2	Menit ke-1	Menit ke-5
Appereance (Warna Kulit)	Seluruh tubuh biru/pucat	Tubuh kemerahan, Ekstrimitas biru	Seluruh tubuh kemerahan	1	2
Pulse (Laju Jantung)	Tidak ada	<100 x/i	>100 x/i	2	2
Grimace (Refleks)	Tidak ada	Gerakan sedikit	Gerakan melawan	1	1
Activity (Tonus otot)	Tidak ada	Ekstremitas fleksi sedikit	Gerakan aktif	1	1
Respiration (Pernapasan)	Tidak ada	Lambat	Menangis kuat	1	2
Jumlah				6	8

Sumber: Data Primer, 2018.

10. Melakukan pemeriksaan fisik

d. Kepala : Simetris kiri dan kanan, tidak ada caput succedaneum

e. Mata : Konjungtiva merah muda dan tidak icterus

f. Mulut : Tidak ada kelainan pada bagian mulut dan langit-langit,

terdapat banyak lendir

- g. Leher : Tidak ada pembesaran jaringan atau pembengkakan pada bagian leher
- h. Dada dan perut: Tidak ada tarikan dada yang kuat, dan tali pusat tampak basah
- i. Punggung dan bokong : Tidak ada kelainan
- j. Genitalia dan anus : Tidak ada kelainan pada genitalia, dan terdapat lubang anus
- k. Ekstrimitas : Jumlah jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada kelainan

ASSESSMENT (A)

BKB/SMK/Bayi lahir normal dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia, tindakan segera dengan memotong tali pusat dan dilanjutkan dengan manajemen penanganan asfiksia dan kolaborasi dengan dokter spesialis anak

PLANNING (P)

Tanggal 23 Juli 2018, pukul 13:01 wita

1. Melakukan penilaian pada bayi baru lahir pasca asfiksia

Hasil: Bayi menangis kuat dan bernapas dengan baik

2. Melakukan pemantauan tanda bahaya pada bayi

Hasil : Tidak ada tanda bahaya pada bayi

3. Melakukan perawatan tali pusat

Hasil : Terlaksana

4. Memberikan injeksi profilaksis vitamin K1 2mg dengan dosis 0,5 ml pada anterolateral paha kiri bayi.

Hasil : Terlaksana

5. Memberikan salep mata pada bayi

Hasil : Terlaksana

6. Melakukan pemeriksaan fisik pada bayi

Hasil : Terlaksana

7. Melakukan pencegahan Hipotermi

Hasil : Bayi diletakkan dalam inkubator dengan suhu $37,3^{\circ}\text{C}$ dan dibungkus dengan selimut

8. Memberikan nutrisi pada bayi sesuai arahan dari dokter spesialis anak

Hasil : Bayi diberi minum dengan bantuan susu formula sebanyak 30 cc tiap 3 jam

9. Mendokumentasikan

Hasil : Terlaksana

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR**PADA BAYI “R” DENGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH****DISERTAI ASFIKSIA DI RSUD LABUANG BAJI****TANGGAL 24 JULI 2018**

No. register : xx-xxx
Tanggal lahir : 23 Juli 2018, pukul 13:01 wita
Tanggal pengkajian : 24 Juli 2018, pukul 15:30 wita
Nama pengkaji : Salsa Putri Aulia

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bayinya kuat menetek/menghisap
2. Ibu diperbolehkan untuk rawat gabung bersama bayinya
3. Ibu memberikan Asi secara teratur, minimal 2 jam sekali

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan bayi : Baik
2. Berat badan bayi : 2300 gram
3. Tanda-tanda vital bayi
HR : 128x/i (N=120-160 x/i)
P : 46 x/i (N=40-60 x/i)
S : 36,7⁰C (N= 36,5- 37,5 ⁰C)

4. Konjungtiva tampak merah muda
5. Kulit kemerahan dan tipis
6. Refleks menghisap dan menelan baik
7. Gerakan dada sesuai dengan pola napas bayi
8. Tali pusat dijepit, masih basah, tampak bersih dan tidak ada tanda infeksi
9. Bayi telah dirawat gabung bersama ibunya

ASSESSMENT (A)

BKB/SMK/PBK, bayi berat lahir rendah, potensi terjadinya hipotermi, hipoglikemia, hiperbilirubinemia, dan infeksi

PLANNING (P)

Tanggal 24 Juli 2018, pukul 15:30 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh atau melakukan kontak dengan bayi

Hasil : Terlaksana

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Terlaksana

HR: 128x/i (N=120-160 x/i)

P : 46 x/i (N=40-60 x/i)

S : 36,7⁰C (N= 36,5- 37,5 ⁰C)

3. Menimbang berat bayi

Hasil : Berat badan bayi 2300 gram

4. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya

Hasil : Ibu bersedia

5. Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir yang harus

diwaspadai

Hasil : Ibu mengerti

6. Mengajarkan ibu cara perawatan tali pusat yang baik

Hasil : Ibu mengerti

7. Menjelaskan pada ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil : Ibu mengerti

8. Menganjurkan pada ibu untuk menyusui bayinya secara on demand

Hasil : Ibu bersedia

9. Mengajarkan ibu cara perawatan payudara yang bertujuan agar meningkatkan

produksi ASI

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia

10. Menganjurkan pada ibu untuk menjaga kehangatan bayinya

Hasil : Ibu mengerti

11. Menjelaskan dan mengajarkan pada ibu tentang perawatan metode kangguru yang bertujuan agar bayi tetap hangat, lebih cepat menaikkan berat badan bayi, lebih memfasilitasi ibu dalam memberikan ASI, serta ibu dan bayi lebih dekat dan merasa aman dan nyaman.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia

12. Mendokumentasikan

Hasil: Terlaksana



PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR**PADA BAYI “R” DENGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH****DISERTAI ASFIKSIA DI RSUD LABUANG BAJI****TANGGAL 25 JULI 2018**

No register : xx-xxx
Tanggal lahir : 23 Juli 2018, pukul 13:01 wita
Tanggal pengkajian : 25 Juli 2018, pukul 09:00 wita
Nama pengkaji : Salsa Putri Aulia

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Keadaan bayi baik, sudah bisa menghisap dan menyusu dengan baik
2. Ibu dan bayi masih dirawat gabung
3. Bayi menyusu dengan teratur

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan bayi : Baik
2. Berat badan bayi : 2300 gram
3. Tanda-tanda vital
HR: 130x/i (N=120-160 x/i)
P : 42 x/i (N=40-60 x/i)
S : 37⁰C (N= 36,5- 37,5 ⁰C)

4. Konjungtiva tampak merah muda
5. Kulit tampak kemerahan dan tipis
6. Refleks menghisap dan menelan baik
7. Tarikan dada sesuai dengan pola napas bayi.
8. Tali pusat belum kering, tampak bersih dan tidak ada tanda infeksi
9. Bayi masih dirawat gabung.

ASSESSMENT (A)

Bayi R umur 3 hari, dengan berat badan 2300 gram

PLANNING (P)

Tanggal 25 Juli 2018, pukul 09:00 wita

1. Mengajarkan ibu agar selalu mencuci tangan dan tetap menjaga kebersihan diri dan bayinya
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia
2. Mengajarkan ibu agar tetap menyusui bayinya secara on demand
Hasil : Ibu bersedia
3. Mengajarkan ibu agar tetap menjaga dan memperhatikan kehangatan bayinya
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia
4. Mengajarkan pada ibu agar mewaspadaai tanda dan bahaya bayi baru lahir
Hasil : Ibu mengerti

5. Menjelaskan kembali pada ibu tentang perawatan metode kangguru, dan menganjurkan kepada ibu agar menerapkannya kepada bayinya serta menjelaskan kembali manfaat perawatan metode kangguru

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia



PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR**PADA BAYI “R” DENGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH****DISERTAI ASFIKZIA DI RUMAH****TANGGAL 29 JULI 2018**

Tanggal pengkajian : 29 Juli 2018, pukul 10:00 wita

Nama pengkaji : Salsa Putri Aulia

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Keadaan bayi tambah baik dan dan bayi menghisap dengan kuat
2. Bayi lebih banyak tidur
3. Ibu memberikan Asi Eksklusif pada bayinya
4. Ibu merawat sendiri bayinya

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi : Baik
2. Berat badan bayi bertambah menjadi : 2400 gram
3. Tanda-tanda vital bayi

HR : 128 x/i (N=120-160 x/i)

P : 40 x/i (N=40-60 x/i)

S : 36,5 °C (N= 36,5- 37,5 °C)

4. Konjungtiva tampak merah muda
5. Kulit tampak kemerahan dan tipis
6. Refleks menghisap dan menelan semakin baik
7. Tarikan dada sesuai dengan pola napas bayi.
8. Tali pusat sudah puput, dan tidak ada tanda infeksi
9. Bayi dirawat dirumah

ASSESSMENT (A)

Bayi R umur 7 hari, dengan berat badan 2400 gram

PLANNING (P)

Tanggal 29 Juli 2018

1. Menganjurkan ibu tetap memberikan Asi secara on demand
Hasil : Ibu bersedia
2. Menganjurkan ibu tetap menjaga kebersihan dirinya dan bayinya
Hasil : Ibu bersedia
3. Memantau perkembangan perawatan metode kangguru yang telah dilakukan ibu
Hasil : Ibu jarang melakukannya
4. Menganjurkan ibu agar sesering melakukan perawatan metode kangguru, menjelaskan manfaat serta menjelaskan siapa saja yang boleh melakukan perawatan menggunakan metode kangguru
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia
5. Menganjurkan ibu tetap menjaga nutrisi selama ibu menyusui

Hasil : Ibu bersedia

6. Menganjurkan pada ibu untuk mewaspadai tanda bahaya bayi baru lahir

Hasil : Ibu mengerti



PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR

PADA BAYI NY “R” DENGAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH

DISERTAI ASFIKSIA DI RUMAH

TANGGAL 3 AGUSTUS 2018

Tanggal pengkajian : 3 Agustus 2018, pukul 10:00 wita

Nama pengkaji : Salsa Putri Aulia

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Keadaan bayi semakin baik dan dan bayi menyusu dengan kuat dan sering
2. Bayi lebih banyak tidur
3. Ibu memberikan Asi Eksklusif pada bayinya
4. Ibu merawat sendiri bayinya
5. Berat bayi semakin bertambah

DATA OBJEKTIF (O)

6. Keadaan umum bayi : Baik
7. Berat badan bayi bertambah menjadi : 2500 gram
8. Tanda-tanda vital bayi

HR : 128 x/i (N=120-160 x/i)

P : 46 x/i (N=40-60 x/i)

S : 36,6 °C (N= 36,5- 37,5 °C)

9. Konjungtiva tampak merah muda
10. Kulit tampak kemerahan
11. Refleks menghisap dan menelan semakin baik
12. Tarikan dada sesuai dengan pola napas bayi.
13. Tali pusat sudah puput, dan tidak ada tanda infeksi
14. Bayi dirawat dirumah

ASSESSMENT (A)

Bayi R umur 12 hari, dengan berat badan 2500 gram

PLANNING (P)

Tanggal 3 Agustus 2018, pukul 10:00 wita

1. Menganjurkan ibu tetap memberikan Asi secara on demand dan Eksklusif
 Hasil : Ibu bersedia
2. Memberikan nasihat kepada ibu, jika ingin menyusui bayinya secara sempurna yaitu berdasarkan perintah Allah SWT. Yakni, menyusui bayi selama 2 tahun penuh selama ibu sanggup untuk memenuhinya
 Hasil : ibu mengerti dan bersedia
3. Menganjurkan ibu tetap menjaga kebersihan dirinya dan bayinya
 Hasil : Ibu bersedia
4. Menganjurkan ibu tetap menjaga nutrisi selama ibu menyusui

Hasil : Ibu bersedia

5. Menganjurkan pada ibu untuk mewaspadai tanda bahaya bayi baru lahir

Hasil : Ibu mengerti

6. Menganjurkan pada ibu agar membawa bayinya imunisasi sesuai jadwal yang ditentukan di fasilitas kesehatan terdekat

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia.



Tabel 3.2
Pemantauan TTV, Nutrisi dan kenaikan BB

Jadwal/kunjungan	Nutrisi	TTV	BB	LILA
23 Juli 2018	Susu formula, asi perah	HR : 128 x/i P : 48x/i S : 36,9 °C	2300 gram	10 cm
24 Juli 2018	<i>Asi on demand</i>	HR : 128x/i P : 46x/i S : 36,7 °C	2300 gram	10 cm
25 Juli 2018	<i>Asi on demand</i>	HR : 130x/i P : 42 x/i S : 37 °C	2300 gram	10 cm
29 Juli 2018	<i>Asi on demand</i>	HR : 128x/i P : 40x/i S : 36,5 °C	2400 gram	10 cm
3 Agustus 2018	<i>Asi on demand</i>	HR : 128x/i P : 46x/i S : 36,6 °C	2500 gram	10 cm

Sumber: Data Primer, 2018.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan di RSUD Labuang Baji selama 3 hari asuhan di ruangan inc/bayi dan dilanjutkan dengan kunjungan rumah selama 2 kali kunjungan di jalan Sudiang Makassar. Penulis akan menguraikan berdasarkan langkah varney dan soap. Pada bab ini, penulis akan membandingkan antara tinjauan kasus pada bayi “R” dengan Bayi Berat Lahir Rendah disertai Asfiksia di RSUD Labuang Baji dengan teori tentang penanganan Bayi Berat Lahir Rendah disertai Asfiksia. Pada pembahasan ini, penulis akan membahas berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah, yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, melaksanakan tindakan segera/kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melaksanakan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai ke kaki dan pemeriksaan penunjang (Wahyuni, 2014).

Tahap ini dilakukan identifikasi data dasar (pengkajian) yang merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien mengenai By "R", baik orang tua maupun bidan dan dokter yang ada diruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga memudahkan untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Data yang diambil dari studi kasus By "R" dengan Bayi Berat Lahir Rendah disertai Asfiksia, selama bayi dirawat di Rumah sakit sampai dilakukan kunjungan rumah klien meliputi:

HPHT tanggal 8-12-2017, taksiran persalinan tanggal 15-9-2018, anak pertama dan tidak pernah keguguran, selama hamil telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali kunjungan, telah mendapatkan imunisasi TT sebanyak 2 kali, ibu mengkonsumsi tablet Fe, tidak ada riwayat penyakit jantung, asma, diabetes mellitus dan tuberculosis, terdapat riwayat lahir prematur. Ibu mengalami KPD, umur kehamilan 32 minggu 3 hari, presentasi belakang kepala dengan berat badan 2300 gram, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 23 Juli 2018, pukul 13:01 wita. Berdasarkan data tersebut, kasus ini sejalan dengan teori, dimana ibu yang mengalami KPD dapat mempengaruhi BBLR disertai Asfiksia.

Umur 1 hari, bayi dirawat di inkubator. Keadaan umum bayi lemah, berat badan 2300 gram, panjang badan 46 cm, reflex menghisap dan menelan lemah dan bayi belum menghisap puting susu ibu, tanda-tanda vital: Denyut jantung 128x/i,

pernapasan bayi : 48 x/i, suhu bayi: 36,9⁰C, tarikan dada sesuai dengan pola nafas, keadaan tali pusat masih basah,tampak bersih dan tidak ada tanda infeksi, tidak ada kelainan pada genitalia, jumlah jari tangan dan kaki lengkap, gerakan tangan dan kaki baik. Integrasi kulit tampak tipis, lemak kulit kurang, tampak kemerahan, dan terdapat lanugo. Bayi diberi ASI yang diperah dengan memakai sendok. Berdasarkan data tersebut, kasus ini sejalan dengan teori, dimana sebagian besar bayi yang BBLR menghisap dan menelan dengan lemah disebabkan belum sempurnanya sistem saraf pada bayi berat lahir rendah.

Umur 2 hari sudah dirawat gabung diruangan pnc, keadaan umum bayi baik, berat badan 2300 gram, refleks menghisap baik, tanda-tanda vital: denyut jantung 128x/i, pernapasan 46x/i, Suhu 36,7⁰C, gerakan dada sesuai dengan pola nafas, integrasi kulit tampak tipis, lemak kulit kurang, tampak kemerahan, terdapat lanugo, tali pusat masih basah tampak bersih, tidak ada tanda infeksi, bayi diberi ASI eksklusif oleh ibunya dan reflex menghisap dan menelan baik.

Umur 3 hari masih dirawat gabung, keadaan umum bayi baik, bayi menyusui dengan teratur dan sudah bisa menghisap puting susu ibunya, berat badan 2300 gram, tanda-tanda vital: denyut jantung 130x/i, pernapasan 42x/i, suhu 37⁰C, integrasi kulit tampak tipis, tampak kemerahan, dan sedikit lemak, gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi, dan bayi di beri ASI eksklusif oleh ibunya.

Kunjungan pertama umur tujuh hari bayi sudah di rawat dirumah, keadaan umum bayi tambah baik, bayi menghisap dengan kuat dan menelan dengan baik, bayi banyak tidur, tanda-tanda vital: Denyut jantung 128x/i, pernapasan 40x/i,

suhu 36,5°C, berat badan 2400 gram panjang badan 46 cm, gerakan dada sesuai dengan pola nafas, tali pusat sudah puput, tampak bersih, tidak ada infeksi, refleks menghisap dan menelan baik.

Kunjungan kedua umur dua belas hari keadaan umum bayi baik, bayi menghisap dengan kuat dan menelan dengan baik, bayi banyak tidur, bayi selalu diberi ASI eksklusif oleh ibunya, berat badan 2500 gram, tanda-tanda vital: denyut jantung 128x/i, pernapasan 46x/i, suhu 36,6°C, reflex menghisap dan menelan semakin baik, kulit tampak kemerahan, gerakan dada sesuai pola napas, tali pusat sudah puput, tampak bersih, tidak ada tanda infeksi, bayi di beri ASI dengan ASI eksklusif oleh ibunya.

Berdasarkan tinjauan teoritis, etiologi yang mempengaruhi kejadian BBLR yaitu: Faktor ibu : Gizi saat hamil yang kurang, Usia ibu <20 tahun atau >35 tahun, jarak hamil dan bersalin dekat, penyakit menahun: hipertensi, jantung, gangguan pembuluh darah dll. Faktor kehamilan: hamil dengan hidramnion, hamil ganda, perdarahan antepartum, komplikasi kehamilan: preeklampsia/eklampsia, ketuban pecah dini. Faktor janin: cacat bawaan, infeksi dalam rahim, kehamilan ganda. Faktor lain: Pekerjaan yang melelahkan, perokok, keadaan sosial ekonomi yang rendah (Yeyeh, A et al, 2012. dan Maryunani, A. Eka P. S, 2013. dan Ida. Et al, 2014). Sedangkan, pada kasus ini peneliti mengidentifikasi faktor BBLR: umur ibu 29 tahun, dengan ketuban pecah dini, dan pekerjaan ibu yang membantu suami dalam berdagang sehingga menyebabkan ibu kelelahan.

Berat badan lahir rendah adalah berat badan kurang dari 2500 gram, yaitu karena usia kehamilan kurang dari 37 minggu, berat badan rendah dari semestinya, sekalipun cukup bulan, atau karena kombinasi keduanya (Ayu, et al, 2014). BBLR mempunyai kecenderungan ke arah peningkatan terjadinya infeksi, asfiksia, ikterus, dan hipoglikemia (Fajarwati, N. dkk, 2016).

Berdasarkan tinjauan teoritis dan studi kasus pada By “R” dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia ditemukan banyak persamaan dengan tinjauan teoritis dan studi kasus sehingga tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan By “R” dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia.

Pemberian dukungan maupun anjuran kepada keluarga untuk senantiasa selalu mengingat Allah swt, berdoa dan berdzikir untuk kesehatan dan keselamatan ibu maupun bayi serta senantiasa bertawakkal kepada Allah swt.

B. Langkah II Merumuskan diagnosa atau masalah aktual

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan (Nurhayati, dkk, 2013). Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan kebidanan.

Berdasarkan data yang diperoleh diagnosa atau masalah aktual pada By “R” adalah BKB/SMK/PBK, bayi berat lahir rendah disertai asfiksia. Bayi dengan berat badan 2300 dengan konsep teori bahwa bayi berat lahir rendah ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2.500 gram (sampai dengan 2.499 gram) (Prawirohardjo, dalam Yeyeh, A, 2012:242). Umur 1 hari berat badan 2300 gram, umur 2 hari berat badan 2300 gram, umur 3 hari berat badan 2300 gram, umur tujuh hari berat badan 2400 gram, umur dua belas hari berat badan 2500 gram.

Bayi lahir secara normal, presentasi belakang kepala, masa gestasi 32 minggu 3 hari yaitu BKB/SMK/PBK, dengan konsep teori bahwa neonatus kurang bulan adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan preterm yaitu <37 minggu dan sesuai masa kehamilan (SMK) adalah berat badan sesuai dengan berat badan untuk usia kehamilan, maka hal ini sesuai data yang ada yaitu dari tanggal HPHT tanggal 8-12-2017 sampai klien melahirkan yaitu pada tanggal 23-7-2018 masa gestasinya adalah 32 minggu 3 hari dimana berada antara 32 sampai 34 minggu dan di tunjang dengan pemeriksaan ballard skor yang menandakan bayi tersebut adalah neonatus cukup bulan dan sesuai masa kehamilan. Menurut teori bayi yang lahir dengan usia kehamilan baik aterm ataupun preterm dengan berat badan dibawah 2500 gram adalah bayi berat badan lahir rendah. Penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus By “R” secara garis besar tampak adanya persamaan (Maryunani, A, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini sesuai dalam jurnal

penelitian Fajarwati tahun 2015 yang dijelaskan didalamnya bahwa berat badan bayi dapat mempengaruhi terjadinya Asfiksia neonatorum.

Dalam hal ini, perlu dilakukan pendekatan yang baik pada keluarga untuk selalu meyakinkan bahwa disetiap kesulitan yang diberikan oleh Allah swt, pasti akan selalu ada kemudahan dan hikmah dibalik itu semua, mengurangi kegelisahan dengan selalu bersabar, bersyukur dan berdoa.

C. Langkah III Merumuskan diagnosa/masalah Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi, berdasarkan temuan tersebut, bidan harus siap apabila didiagnosa masalah tersebut benar-benar terjadi. Konsep dasar Berat Badan lahir Rendah yang dilakukan di RSUD Labuang Baji selama 3 hari kunjungan perlu diantisipasi terjadinya hipotermi, dimana hipotermi dapat terjadi karena hanya sedikit lemak tubuh dan pengaturan

suhu tubuh pada bayi baru lahir belum matang. Potensi terjadinya Hipoglekemia dimana hipoglekemia terjadi karena sedikitnya energi pada bayi sehingga BBLR membutuhkan ASI sesegera mungkin setelah lahir. Potensi terjadinya Hiperbilirubinemia dapat terjadi karena fungsi hati belum matang. potensi terjadinya infeksi diangkat menjadi masalah potensial karena adanya data

yang menunjang munculnya diagnosa tersebut yaitu dari bayi sendiri dimana permukaan kulit bayi masih tipis sehingga mudah kehilangan panas baik melalui konduksi, konveksi, evaporasi dan radiasi, serta ditunjang dengan fasilitas yang ada di ruangan bayi yang belum memadai (Maryunani, A, 2013)

Adapun masalah potensial yang harus diantisipasi pada saat kunjungan dirumah yaitu: potensi terjadinya hipotermi, dimana pada saat dirumah kita mengantisipasi terjadinya hipotermi, hipotermi ini dapat terjadi karena hanya sedikit lemak tubuh dan pengaturan suhu tubuh pada bayi belum matang serta kehilangan panas disebabkan oleh permukaan tubuh bayi yang kurang relatif lebih luas, potensi terjadinya hipoglekemia, hipoglekemia dapat terjadi karena sedikitnya simpanan energi pada bayi sehingga bayi harus diberikan ASI secara on demand dan membutuhkan ASI sesegera mungkin, potensial terjadinya infeksi, bayi rentan terkena infeksi baik di Rumah sakit maupun di rumah terutama pada bayi BBLR disertai asfiksia, oleh karena itu perlu diantisipasi terjadinya infeksi.

Bayi rentan terhadap berbagai penyakit infeksi yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti riwayat kehamilan ibu dengan komplikasi riwayat kelahiran (persalinan lama dan persalinan dengan tindakan) serta riwayat bayi baru lahir (trauma lahir dan prematur), penyakit infeksi terutama pada bayi dengan BBLR dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan angka kematian yang tinggi.

Dalam hal ini, melakukan pendekatan kepada ibu dan menasihati bahwa Allah swt, tidak akan memberikan cobaan atau kesulitan diluar dari batas kemampuan, dan senantiasa berprasangka baik, berdoa dan bertawakkal kepada Allah swt, agar bayi segera membaik, ibu dapat menggendong dan mengasuh bayinya.

D. Langkah IV Identifikasi perlunya Tindakan Segera dan Kolaborasi

Perlunya tindakan segera dan kolaborasi dilakukan jika klien mengalami penyakit atau keluhan yang mengancam maka dilakukan segera atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menangani kasus BBLR disertai Asfiksia. Tidak ada yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Menurut teori tindakan segera/kolaborasi, jika dalam keadaan tertentu terjadi kejadian hipotermi, hipoglikemia, hiperbilirubemia, maka perlu dilakukan tindakan tergantung keadaan bayi. Pada By "R" tidak dilakukan tindakan segera/kolaborasi karena kondisi bayi tidak memerlukan tindakan tersebut.

Pemantauan ini tidak dilakukan tindakan segera/kolaborasi karena kondisi bayi tidak memerlukan tindakan tersebut namun harus dilakukan pemantauan dirumah seperti mengobservasi tanda-tanda vital bayi, menimbang berat badan bayi dan menganjurkan ibu untuk menyusui secara on demand. Namun jika keadaan bayi terjadi seperti hipotermi, hipoglekimia, hiperbilirubemia, kejang maka perlu dilakukan tindakan segera/kolaborasi dengan dokter sehingga dapat

terlihat adanya kesesuaian antara pelaksanaan tindakan dengan yang seharusnya menurut teori yang ada.

Dalam hal ini, menganjurkan ibu dan keluarga agar senantiasa berdzikir, memohon kepada Allah agar diberi keselamatan baik pada ibu maupun bayi, karena hakikatnya kita sebagai manusia sudah sepatutnya selalu berdoa dan memohon ampunan kepada Allah swt.

E. Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya. Dalam membuat perencanaan ini ditemukan tujuan dan kriteria yang akan dicapai dalam menerapkan asuhan kebidanan pada bayi “R” dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia, kurang bulan/sesuai masa kehamilan, ini tidak berbeda dengan teori dimana rencana asuhan kebidanan dikembangkan berdasar pada intervensi dan rasional sesuai dengan masalah aktual dan potensial pada bayi dengan Berat Lahir Rendah disertai asfiksia, kurang bulan/sesuai masa kehamilan.

Pada kasus bayi “R” penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial yang dilakukan di Rumah Sakit yaitu sebagai berikut: cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi, observasi tanda-tanda vital, timbang berat badan bayi, rawat tali pusat bayi, kaji adanya

tanda-tanda infeksi, observasi eliminasi bayi, ganti popok bayi saat basah, anjurkan ibu pertahankan suhu badan bayi, berikan nutrisi pada bayi, anjurkan kepada ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan dan konsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk agar produksi asi lancar.

Mengajarkan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar, ajarkan ibu tentang perawatan metode kangguru, anjurkan kepada ibu untuk menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya, anjurkan ibu untuk selalu berwudhu yang dimana wudhu dapat memberikan ketenangan batin dan kebersihan pada ibu, beritahu kepada ibu tentang tanda tanda bahaya bagi bayi, anjurkan kepada ibu untuk menyusui bayinya secara on demand, anjurkan kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayinya, anjurkan dan ajarkan kepada ibu cara masase uterus.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan kepada bayi untuk memantau keadaannya setelah pulang kerumah apakah berat badannya terjadi peningkatan atau tidak. Rencana asuhan yang diberikan yaitu anjurkan ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya secara *on demand*, menganjurkan ibu untuk mempertahankan suhu tubuh bayinya dengan cara membedongnya, timbang berat badan bayi dan periksa TTV bayi, anjurkan ibu untuk selalu menjaga personal hygiene diri dan bayinya, anjurkan kepada ibu untuk selalu mencuci tangan apabila menyentuh bayinya, anjurkan ibu untuk mengganti pakaian dan popok jika telah BAB/BAK, menganjurkan kepada ibu agar tidak memberikan makanan tambahan pada bayinya selama 6 bulan.

Berdasarkan tinjauan teoritis asuhan yang diberikan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) adalah tindakan umum pada BBLR. Secara umum yaitu memepertahankan tubuh dengan ketat karena bayi mudah mengalami hipotermi, maka itu suhu tubuhnya harus dipertahankan dengan ketat, mencegah infeksi dengan ketat karena bayi BBLR sangat rentan akan infeksi. Adapun prinsip – prinsip pencegahan infeksi adalah termasuk cuci tangan sebelum memegang bayi, pengawasan nutrisi (ASI) refleks menelan bayi BBLR belum sempurna dan sangat lemah, sehingga pemberian nutrisi harus di lakukan dengan cermat, sebagai langkah awal jika bayi BBLR belum bisa menelan adalah dengan tetesi ASI dengan bantuan sendok (Kemenkes, 2012).

Penimbangan ketat, perubahan berat mencerminkan kondisi gizi/nutrisi bayi dan erat kaitannya dengan daya tahan tubuh, oleh sebab itu penimbangan berat badan harus dilakukan dengan ketat. Kebutuhan cairan untuk bayi baru lahir adalah 120-150ml/kg/hari atau 100-120ml/kg/hari. Pemberian dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan bayi untuk segera mungkin mencukupi kebutuhan cairan/kalori.

Selain itu kapasitas lambung bayi BBLR sangat kecil sehingga minum harus sering diberikan tiap jam. Perhatikan apakah selama pemberian minum bayi menjadi cepat lelah, menjadi biru atau perut membesar/kembung. Bayi yang diberikan ASI Eksklusif mempunyai pertumbuhan normal lebih banyak dari pada bayi yang diberi ASI non eksklusif. Rencana tindakan sudah disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada

kesenjangan antara tinjauan teori dengan tinjauan manajemen Asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

Dalam hal ini menjelaskan pada ibu dan keluarga, bahwa sebagai manusia kita hanya bisa berusaha selebihnya berdoa kepada Allah swt.

F. Langkah VI Implementasi Asuhan Kebidanan

Berdasarkan tinjauan manajemen Asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencanakan tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

Pada saat dilakukan tindakan pada bayi, yang pertama dilakukan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan untuk pencegahan terjadinya infeksi . Pada studi kasus By “R” dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia, semua tindakan yang telah direncanakan seperti mempertahankan suhu tubuh bayi dengan ketat, melakukan pengawasan nutrisi, mencegah infeksi dengan ketat, melakukan penimbangan serta pemantauan tanda-tanda vital dan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu dan keluarga selama berada di Rumah sakit dan dirumah, dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa ada hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan di ruang bayi di RSUD Labuang Baji Makassar. Pada bayi “R” lahir spontan dan megap-megap, dilakukan pemotongan tali pusat, dan dilanjutkan dengan manajemen asfiksia pada bayi baru

lahir. Setelah asfiksia pada bayi BBLR ditangani, segera menghangatkan bayi dengan meletakkan kedalam inkubator dengan tetap memantau pemberian nutrisi yang di intruksikan oleh dokter spesialis anak yaitu pemberian susu formula sebanyak 30 cc tiap 3 jam. Berdasarkan hasil tersebut, hal ini tidak sejalan dengan teori bahwa bayi diberi minum tiap 2 jam sekali (Kemenkes, 2012).

Pada kunjungan pertama, By "R" setelah dilakukan penimbangan berat badan, dan pemantauan tanda-tanda vital, Berat Badan bayi sudah bertambah yaitu dari 2300 gram bertambah menjadi 2400 gram, ibu tetap diberikan konseling dan bimbingan agar selalu mempertahankan suhu tubuh bayinya dengan cara membedong bayi agar suhu bayi tetap hangat, memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara *on demand* dan cara menyusui yang benar, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri dan bayinya, memberitahu ibu dan keluarga agar selalu mencuci tangan sebelum menyentuh bayi agar terhindar dari infeksi, anjurkan ibu untuk selalu berwudhu agar ibu merasa tenang dalam merawat bayi serta kebersihan diri terjaga, setelah dilakukan bimbingan pada ibu, ibu mengerti apa yang dijelaskan dan melakukan apa yang telah dianjurkan.

Pemantauan kedua, pada hari ke dua belas, By "R" berat badannya semakin bertambah menjadi 2500 gram. Pada pemantauan kali ini memberitahukan kembali kepada ibu agar selalu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, menganjurkan ibu untuk selalu mempertahankan suhu tubuh bayinya dengan selalu membedongnya, memberitahu pada ibu agar tidak memberikan makanan

tambahan pada bayinya sebelum berumur 6 bulan, menganjurkan kepada ibu untuk selalu menjaga nutrisi bayinya dengan cara memberikan ASI secara *on demand*, memberitahukan kepada ibu agar selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran atau daun katuk agar produksi ASI ibu tambah banyak.

Memberikan konseling dan bimbingan kepada ibu tentang pentingnya selalu memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, selalu menganjurkan ibu agar menjaga personal hygiene ibu dan bayinya, menganjurkan ibu untuk selalu mempertahankan suhu tubuh bayi dengan cara membedongnya, menganjurkan kepada ibu dan keluarga agar selalu mencuci tangan dan berwudhu sebelum menyentuh bayinya.

Dalam hal ini, memberikan ibu nasihat agar tetap berdoa, tawakkal dan selalu bersyukur kepada Allah swt, agar diberikan kesembuhan dan berdoa agar tindakan medis yang dilakukan kepada bayi dapat bermanfaat dan diberkahi Allah SWT.

G. Langkah VII Evaluasi Hasil Asuhan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen Asuhan kebidanan, keberhasilan dan ketepatan tindakan terdapat dalam tahap ini. Dalam tahap ini pula kita dapat melakukan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang belum berhasil/tidak tepat. Pada kasus ini setelah dilakukan perawatan dan tindakan yang intensif selama 3 hari Rumah sakit dan melakukan kunjungan ulang selama 2 kali kunjungan, berat badan Bayi “R” meningkat 200 gram dari berat

badan lahir. Potensi terjadinya hipotermi, hipoglikemia dan infeksi tidak terjadi karena perawatan bayi baik dan tepat.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses manajemen Asuhan kebidanan yang diterapkan pada bayi “R” dengan Bayi Berat Lahir Rendah disertai Asfiksia, kurang bulan/sesuai masa kehamilan cukup berhasil dan efektif.

Tabel 4.1


Catatan perkembangan dan pertumbuhan bayi “R” dengan BBLR disertai Asfiksia.

Tanggal	Umur	Berat badan (gram)	Intake ASI/Susu Formula	Refleks menghisap dan menelan	Tonus otot
23 Juli 2018	1 hari	2300	<i>On demand</i>	Lemah	Lemah
24 Juli 2018	2 hari	2300	<i>On demand</i>	Baik	Baik
25 Juli 2018	3 hari	2300	<i>On demand</i>	Baik	Baik
29 Juli 2018	7 hari	2400	<i>On demand</i>	Baik	Baik
3 Agustus 2018	12 hari	2500	<i>On demand</i>	Baik	Baik

Sumber : Data Primer, 2018.

Berdasarkan tinjauan teoritis, kenaikan Berat Badan (BB) pemberian minum setelah 7 hari meliputi bayi kehilangan BB 1-10 hari pertama, 10% untuk BBL >1500 gram, 15% untuk BBL <1500 gram, BB lahir tercapai kembali setelah 10 hari, dan kenaikan BB selama 3 bulan seharusnya : 150-200 gram seminggu untuk bayi <1500 gram dan 200-250 gram seminggu untuk bayi 1500-2500 gram (Sudarti & Afroh, F, dalam wahyuni, 2013).

Dengan mengharap ridho Allah swt, atas hal yang telah dilakukan, tetap menganjurkan kepada ibu dan keluarga untuk selalu bersabar, bersyukur, berdoa dan bertawakkal kepada Allah swt, mempercayai bahwa segala sesuatunya pasti ada hikmahnya, dan senantiasa berprasangka baik terhadap takdir yang Allah swt berikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis mempelajari teori tentang Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia serta pengalaman langsung di lahan praktek Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari data subjektif dan objektif yang didapatkan By “R” maka ditegakkan diagnosa/masalah aktual BKB/SMK/PBK dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia.
2. Pengkajian dan analisa data yang diberikan dengan asuhan kebidanan sangat penting dilakukan karena merupakan langkah awal yang kiranya perlu penanganan cermat sehingga masalah-masalah dapat terdeteksi secara dini dan tidak berlanjut ke masalah kematian.
3. Diagnosa/masalah potensial yang ditegakkan pada By “R” dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia yaitu rentan terjadi hipotermi, hipoglikemia, ikterus dan infeksi.
4. Tindakan segera/kolaborasi/rujukan pada By “R” , tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera, kolaborasi dan rujukan.
5. Rencana asuhan kebidanan pada By “R” dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia untuk menangani bayi dalam masalah tersebut, mengidentifikasi komplikasi yang akan terjadi, merencanakan penanganan

mengenai komplikasi yang kemungkinan akan terjadi dan merencanakan penanganan segera.

6. Penatalaksanaan tindakan asuhan kebidanan yang dilakukan pada kasus By “R” dengan bayi berat lahir rendah disertai asfiksia dengan umur kehamilan 32-34 minggu, dengan berat bayi 2300 gram, dimana bayi berat lahir rendah dengan prematuritas murni. Penanganan yang dilakukan yaitu merawat bayi didalam inkubator, pemberian minum teratur secara on demand, pencegahan infeksi dan Perawatan Metode Kangguru (PMK).
7. Tindakan evaluasi pada By “R” dengan Bayi berat lahir rendah disertai asfiksia telah diberikan semaksimal mungkin dan sesuai standar pelayanan/rencana asuhan kebidanan serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi.
8. Pendokumentasian dilakukan mulai tanggal 23 Juli 2018 s/d 3 Agustus 2018, pengkajian pertama sampai pengkajian ketiga tanggal 23 s/d 25 Juli 2018 dilakukan di RSUD Labuang Baji dan dilanjutkan kunjungan rumah sebanyak 2 kali, pengkajian pertama pada tanggal 29 Juli 2018 dan kedua pada tanggal 3 Agustus 2018.

B. Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan untuk mencapai asuhan kebidanan yang baik, diperlukan :

1. Pada tempat pelayanan kesehatan yang melakukan perawatan bayi diharapkan ruangnya cukup hangat, peralatan yang tetap steril, tersedianya tempat mencuci tangan dengan menggunakan kran air yang mengalir dan bila memungkinkan menyiapkan pakaian khusus dalam ruangan, baik bagi petugas maupun pengunjung bayi.
2. Diharapkan petugas kesehatan dapat melakukan pengawasan dan penanganan yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang berlaku pada ibu hamil yang lebih ketat, pemeriksaan yang akurat serta penanganan dan perawatan yang tepat pada bayi khususnya bayi berat lahir rendah disertai asfiksia.
3. Bagi masyarakat agar memeriksakan kehamilannya secara teratur, memberikan ASI kepada bayi minimal 2 jam sekali, teratur, atau tiap bayi lapar, merawat bayi dengan tetap menjaga kebersihan diri dan selalu cuci tangan serta menggunakan alat kelengkapan dan keperluan bayi yang bersih dan terjaga.
4. Bagi institusi, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, penerapan manajemen asuhan dalam pemecahan masalah harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam

membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, berpotensi dan profesional.



DAFTAR PUSTAKA

- Asri, D. Cristine, C. *Asuhan persalinan Nomal*. Prinsip asuhan bayi baru lahir normal. Muha medika Yogyakarta, 2012.
- Ayu, et al. *Ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan kb*. Buku kedokteran EGC, 2014.
- Fajarwati, N. dkk. *Hubungan antara berat badan lahir dan kejadian asfiksia neonatorum*. Berkala kedokteran, 2016.
- Fatkhayah, N. *Hubungan Antara Persalinan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di RSUD DR. Soeselo Kabupaten Tegal*, 2008.
- Fida dan maya. *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*. D-Medika, 2012.
- Hanafi, Y. *Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Asi Dalam Al-Qur'am*. Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, 2012.
- Hendrawati, S. et al. *kebutuhan orang tua dalam perawatan bayi sakit kritis di neonatal intensive care unit (NICU)*, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Syamil Quran Tajwid, 2013.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. 2013.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial*, 2010.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia*. kesehatan keluarga, 2015.
- Lidya. *Hubungan Dukungan Keluarga dan Sikap Ibu Dengan Pelaksanaan Perawatan Metode Kanguru Pada Bayi Berat Lahir Rendah di Ruang Perinatologi RSUD H. Abdul Manap*: Universitas Batanghari Jambi, 2018.

- Marmi. Kukul Rahardjo. Asuhan Neonatus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, 2015.
- Maryunani, A. Eka Puspita S. Asuhan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, 2013.
- Nadyah, *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal*. Alauddin University Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Berat Lahir Rendah, , p.44
- Naik, Zakir. *Miracle of AL-Qur'an & As-Sunnah*. Aqwam, 2016.
- Nanny, Vivian Lia Dewi. *Resusitasi Neonatus*. Salemba medika, 2014.
- Nasrawati, Elisa Elma Wati. *Hubungan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Rumah Sakit Umum Dewi Sartika Provinsi Sulawesi Tenggara*, 2016.
- Nugroho, P, M, C. et al. *Tingkat Keparahan Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)*. Jurnal Kedokteran Muhammadiyah, 2015.
- Passerini, L. et al. *Increased Birth Weight Associated with Regular Pre-Pregnancy Deworming and Weekly Iron-Folic Acid Supplementation for Vietnamese Women*, 2012.
- Rekam medik RSUD Labuang Baji. 2017
- Saleha, Sitti, *Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita*, Alauddin University press, 2012.
- Shihab, MQ. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an, vol.1*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, MQ. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an, vol.7*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shriram, V. Gosavi. R, Koparkar. *Predictors of low birth weight: a retrospective study from rural india*. International journal of contemporary pediatrics, 2014.

Silvia. et al. *Pengaruh perawatan metode kanguru terhadap perubahan berat badan bayi lahir rendah*. 2015.

Susilowati, Wilar, Salendu. *Faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian Berat badan lahir rendah pada neonatus yang dirawat di RSUP Prof. Dr. R. D Kamdou: Jurnal e-Clinik (eCI)*, 2015.

Yeyeh, A,R. Lia, Y. *Asuhan Neonatus Bayi dan Balita*. Trans Info Media, 2012.

Yongki. et al. *Asuhan pertumbuhan kehamilan, persalinan, neonatus, bayi dan balita*. Muha Medica, 2012.

Yuliantanti, T. *Keberhasilan Bounding Atteachment*. Jurnal Kebidanan, 2013.

DAFTAR HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Salsa Putri Aulia
NIM : 70400115080
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 18 September 1997
Suku : Makassar
Asal Daerah : Makassar
Agama : Islam
Alamat : Jln. Dg Tata
2. Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Adi Mulia M.Pd
Ibu : Hasrawati S.Pd

B. Riwayat Pendidikan

- Tamat SD : SDN 41 Bima tahun 2009
Tamat SMP : MtsN Model Makassar tahun 2012
Tamat SMA : Man 2 Model Makassar tahun 2015

Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jurusan Kebidanan.