

**PERTUMBUHAN JAMUR TIRAM COKELAT (*Pleurotus cystidiosus*)
PADA BERBAGAI KOMPOSISI MEDIA DENGAN PENAMBAHAN
AMPAS KELAPA DAN MOLASE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUSFIRAH

NIM. 60300113026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

**PERTUMBUHAN JAMUR TIRAM COKELAT (*Pleurotus cystidiosus*)
PADA BERBAGAI KOMPOSISI MEDIA DENGAN PENAMBAHAN
AMPAS KELAPA DAN MOLASE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUSFIRAH

NIM. 60300113026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musfirah
NIM : 60300113026
Tempat/Tgl. Lahir : Bajo/ 29 Agustus 1995
Jur/Prodi : Biologi/ S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. Manuruki II lorong 3A, No. 9/ Makassar
Judul : Pertumbuhan Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus cystidiosus*)
pada Berbagai Komposisi Media Tanam dengan Penambahan
Ampas Kelapa dan Molase

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 November 2018
Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R




Musfirah
NIM: 60300113026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pertumbuhan Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus ostreatus*) pada Berbagai Komposisi Media dengan Penambahan Ampas Kelapa dan Molase", yang disusun oleh Musfirah, NIM: 60300113026, mahasiswa Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 21 November 2018 M, bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 21 November 2018 M
13 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag.	()
Sekretaris	Dr. Cut Muthadin, S. Si., M. Si.	()
Munaqasy I	Dr. Fatmawati Nur, S. Si., M. Si.	()
Munaqasy II	Dr. Muhi. Thahir Maloko, M. Hi.	()
Pembimbing I	Hasyemuddin, S. Si., M. Si.	()
Pembimbing II	Nurfaizal Mappanganro, S. P., M. P.	()

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

()

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag.
NIP. 196912091993031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur segala puji hanya bagi Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas rahmat dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pertumbuhan Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus cystidiosus*) pada Berbagai Komposisi Media dengan Penambahan Ampas Kelapa dan Molase”. Shalawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, Nabi terakhir yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, semoga keselamatan selalu tercurah kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran yang dibawah oleh beliau.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, akan tetapi dengan pertolongan Allah *Subhanahu Wata'ala* dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga semuanya dapat teratasi.

Kehormatan terbesar dan rasa sayang yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Alimuddin Tase dan Ibunda Nikmah Nuspin, yang selalu mendoakan, memberi nasehat, motivasi dan dengan cinta dan kasih sayang beliau memelihara, membesarkan dan mendidik penulis. Semoga jerih payah beliau mendapat nilai ibadah yang berlipat ganda disisi Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku pembimbing I dan Ibu Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P., selaku pembimbing II, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan atas kritik, saran dan arahan serta bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi sehingga menghasilkan karya terbaik dan dapat bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat.
5. Bapak Dr Thahir Maloko, M.HI., selaku penguji I dan Ibu Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si., selaku penguji II yang senantiasa memberikan saran-saran dalam penyempurnaan skripsi penulis.
6. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Biologi yang telah mencurahkan waktu dan ilmunya dalam mendidik dan membimbing penulis.
8. Staf Akademik, staf jurusan Biologi dan laboran jurusan Biologi Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan urusan akademik selama menjadi mahasiswa.
9. Untuk Kepala Perpustakaan dan jajaran Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
10. Untuk saudara/i serta sepupu-sepupu penulis yang senantiasa memberikan dukungan motivasi dan setia mendengar keluh kesah penulis dalam masa kuliah hingga penyelesaian skripsi. Terima kasih atas masukan sehingga menguatkan penulis hingga akhir.
11. Teman-teman seperjuangan penulis terkhusus Haslita, S.Si., As Awaliah Amir, S.Si., Nur Aeni., S.Si, Ismawati, S.Si., Lilis Sunarti, Pirdawati, S.Si., Hasnawati., S.Si serta Sumarni Rauf., S.Si yang selalu menyemangati serta memberi masukan kepada penulis. Terima kasih banyak atas do'a serta dukungannya.
12. Teman-teman **BRACHIALIS** (2013) yang telah menghadirkan keceriaan dan berjuang bersama selama masa kuliah.
13. Untuk Kakak-kakak (Elma Rahmawati S.Si., Fatmawati., S.Si., dan Nurul Iqraini D, S.Si.) yang telah membantu serta memberi dukungan selama ini.

14. Keluarga Besar Jurusan Biologi (Kakak-kakak, adik-adik) Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Terima kasih atas segala motivasi dan kebersamaan selama ini.

15. Teman-teman KKN Ang.54 kabupaten Bulukumba terkhusus Kelurahan Laikang, terima kasih atas waktu kurang lebih 2 bulan memberikan canda tawa, serta pengalaman yang sangat berkesan selama kkn berlangsung.

Kepada semua pihak yang tidak mampu penulis sebutkan karena keterbatasan. Penulis ucapkan banyak terima kasih dan hanya mampu menghanturkan do'a kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. semoga limpahan berkah mengiringi langkah mereka.

Disadari bahwa penulisan karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat memberi nilai tambah bagi pembaca dan peneliti-peneliti selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 21November 2018

Penulis

Musfirah

NIM: 60300113026

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR ILUSTRASI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	11-32
A. Ayat yang Relevan	11
B. Fungsi.....	13
C. Jamur Tiram Cokelat.....	16
D. Media Jamur Tiram	24
E. Ampas Kelapa	27
F. Molase	29
G. Kerangka Fikir.....	31
H. Hipotesis	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33-41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	33
C. Variabel Penelitian	33
D. Defenisi Operasional Variabel	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Instrument Penelitian.....	37
G. Prosedur Kerja	38
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	42-56
	A. Hasil Penelitian.....	42
	B. Pembahasan.....	47
BAB V	PENUTUP	57-58
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran.....	58
	KEPUSTAKAAN	59-62
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63-75
	RIWAYAT HIDUP.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Parameter faktor lingkungan pertumbuhan jamur tiram.....	22
Tabel 2.2. Komposisi dan kandungan nutrisi jamur tiram pe 100 gram.....	23
Tabel 4.1. Hasil uji BNT waktu awal tumbuh miselium (HSI) jamur tiram coklat (<i>Pleurotus cystidiosus</i>)	44
Tabel 4.2. Hasil uji BNT waktu pemenuhan miselium (<i>full colony</i>) jamur tiram cokelat (<i>Pleurotus cystidiosus</i>).....	44



DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1. Morfologi Jamur	16
Gambar 2.2. Siklus hidup jamur tiram	16
Gambar 2.3. Jamur tiram coklat (<i>Pleurotus cystidiosus</i>)	18
Gambar 2.4. Gambaran dan alur skematis penelitian	31
Gambar 4.1 Grafik waktu awal tumbuh miselium (HSI) jamur tiram coklat (<i>Pleurotus cystidiosus</i>).....	43
Gambar 4.2. Grafik waktu pemenuhan miselium (<i>full colony</i>) jamur tiram coklat (<i>Pleurotus cystidiosus</i>).....	43
Gambar 4.3. Grafik lebar tudung (cm) jamur tiram coklat (<i>Pleurotus cystidiosus</i>).....	45
Gambar 4.4. Grafik panjang tangkai (cm) jamur tiram coklat (<i>Pleurotus cystidiosus</i>).....	46
Gambar 4.5. Grafik berat basah tubuh buah (gr) jamur tiram coklat (<i>Pleurotus cystidiosus</i>).....	47




ABSTRAK

NAMA : Musfirah
NIM : 60300113026
Judul Skripsi : **Pertumbuhan Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus cystidiosus*) pada Berbagai Komposisi Media Dengan Penambahan Ampas Kelapa dan Molase**

Pleurotus cystidiosus merupakan salah satu jamur pangan yang mudah dibudidayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi media tanam dengan penambahan limbah ampas kelapa dan molase untuk pertumbuhan jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*) dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga faktor serta 13 perlakuan dan 3 kali ulangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa media tanam dengan komposisi media $S_3A_3M_1$, $S_4A_4M_1$, $S_4A_4M_2$ memberikan pengaruh paling baik terhadap kecepatan tumbuh miselium (HSI) dan $S_3A_3M_0$, $S_4A_4M_1$, $S_4A_4M_2$ memberikan pengaruh paling baik pada pemenuhan miselium (*full colony*) HSI. Komposisi media $S_4A_4M_1$ memberikan pengaruh terbaik untuk lebar tudung serta panjang tangkai sedangkan komposisi media $S_2A_2M_1$ memberikan pengaruh terbaik pada berat buah (gr) *Pleurotus cystidiosus*.

Kata Kunci : *Pleurotus cystidiosus*, Limbah ,Ampas Kelapa, Molase.



ABSTRAC

Name : Musfirah
Studen ID Nummber : 60300113026
Title : **Growth of Brown Oyster Mushroom (*Pleurotus cystidiosus*) in Various Media Compositions with Addition of Coconut Dregs and Molasses**

Pleurotus cystidiosus is one of the mushroom that are easily cultivated. The research is to determine the effect of the composition of the planting medium with the addition of coconut dregs and waste molasses for the growth of the Brown oyster mushroom (*Pleurotus cystidiosus*) by using a completely randomized design with three factors and 13 treatment and three replication. The result showed that planting medium with composition of media S₃A₃M₁, S₄A₄M₁, S₄A₄M₂ providing the most influence to the speed of the mycelium growing (HSI) and S₃A₃M₀, S₄A₄M₁, S₄A₄M₂ gives good influence on fulfillment of mycelium. The composition of media S₄A₄M₁ gave the best influence to the weidth of the hood and the length of the stalk. While the composition of the media S₂A₂M₁ provies the best influence on the weight of the fruit *Pleurotus cystidiosus*


Key Word : *Pleurotus cystidiosus*, Waste, Coconut dregs, Molasses, growth.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia telah diberikan nikmat yang sangat banyak dari Allah swt. Manusia diberi ilmu untuk mengetahui segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Maka dari itu manusia harus menggunakan ilmu dan kelebihanannya untuk lebih bersyukur serta menyadari betapa besar kekuasaan-Nya, Allah swt. telah berfirman dalam QS Yunus/10: 24 yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, hanya seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur (karena air itu), diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya (memetik hasilnya), tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami pada waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanamannya) seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang yang berpikir (Kementerian Agama, 2012).

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi yang kalian dambakan wahai manusia yang lengah, perumpamaan dari segi keelokan dan kecepatan punahnya adalah seperti air hujan yang Kami turunkan dari langit, lalu bercampur olehnya, yakni air itu, dengan tanaman-tanaman bumi. Hasil bumi beraneka ragam diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dengan tumbuhannya aneka tumbuhan dan berhias pula ia dengan berbunga dan berbuahnya tanaman-tanaman itu sehingga bumi tampak semakin indah dan ketika hiasan itu sampai pada kesempurnaannya dan para pemiliknya menduga keras bahwa mereka pasti kuasa dengan kekuasaan yang mantap atasnya guna memetik dan mengambil manfaatnya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami berupa bencana alam, hama, atau bencana lainnya di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan ia, yakni tanaman-tanaman itu, laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, yakni dipanen karena semua telah tiada, bahkan seakan-akan di tempat itu belum pernah ada tumbuhan sama sekali kemarin. Demikianlah terus-menerus Kami menjelaskan dengan terperinci dan beraneka ragam ayat-ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan Kami, kepada orang-orang yang mau berpikir secara terus –menerus (Shihab, 2012).

Allah swt. telah memberikan kita banyak nikmat yang patut disyukuri, salah satu nikmat itu yakni adanya tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam sehingga kita dapat mengkonsumsinya sebagaimana yang telah tertulis “Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak”. Salah satu tanaman yang dapat dikonsumsi oleh manusia yakni

jamur, dan dengan adanya jamur pada suatu tempat akan menandakan adanya bentuk kehidupan. Jamur juga merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan, banyak masyarakat memperoleh sumber perekonomian dengan membudidayakannya.

Jamur tiram merupakan jamur pangan yang berasal dari kelompok *Basidiomycetes*, disebut jamur tiram karena tudungnya berbentuk lingkaran seperti cangkang tiram. Warna tudung beragam mulai dari putih, putih kekuningan, kuning, abu-abu, abu kecoklatan, coklat, bahkan ada yang berwarna merah dan biru. Kandungan nutrisi jamur tiram selain memiliki cita rasa yang menyedapkan, jamur tiram mempunyai kandungan nutrisi cukup baik. Komposisi kimia yang terkandung dalam jamur tiram tergantung jenis dan tempat tumbuhnya. Dari hasil penelitian, rata-rata jamur tiram mengandung 19-3 persen protein lebih tinggi dibanding dengan beras (7,38 persen) atau gandum (13,2 persen). Asam amino esensial yang terdapat pada jamur tiram ada sembilan jenis dari 20 jenis asam amino ini menyerupai derivat protein yang dihasilkan dari daging hewan (Meinanda, 2013).

Budidaya jamur tiram merupakan salah satu usaha agribisnis yang memiliki peluang bisnis yang cukup besar karena dalam 10 tahun terakhir nilai ekonomis jamur tiram terus meningkat (Setiagama, 2014).

Jamur tiram coklat merupakan salah satu jenis jamur yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jamur tiram coklat biasanya tumbuh liar di alam dan belum banyak dibudidayakan. Jamur tiram coklat memiliki kandungan vitamin B, C dan D yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur lainnya. Handayani (2011) menambahkan bahwa jamur tiram coklat memiliki beberapa kelebihan yaitu tudung

tubuh buah lebih tebal, dapat disimpan lebih lama, dan memiliki rasa yang lebih enak dibanding jamur tiram jenis lainnya (Seswati, dkk., 2013).

Susbrat atau media adalah faktor utama bagi kehidupan jamur. Jamur akan tumbuh subur pada bahan-bahan yang melapuk atau terdekomposisi. Bahan organik yang mengandung selulosa dan lignin akan mendukung pertumbuhan miselium dan perkembangan tubuh buah (Steviani, 2011).

Budidaya jamur tiram dapat menggunakan serbuk kayu (serbuk gergaji). Kelebihan penggunaan serbuk kayu sebagai media antara lain mudah diperoleh dalam bentuk limbah sehingga harganya relatif murah, mudah dicampur dengan bahan pelengkap (Maulana, 2011).

Serbuk gergaji kayu banyak digunakan sebagai media bibit jamur karena resiko kontaminasinya rendah. Namun, nutrisi yang terdapat pada serbuk gergaji lebih rendah daripada media jamur karena itu, serbuk gergaji kayu harus ditambahkan dengan konsentrat dan berbagai bahan lainnya agar nutrisi bisa mendekati kualitas media jagung (Suharjo 2015). Kayu atau serbuk kayu yang digunakan sebagai tempat tumbuh jamur mengandung karbohidrat, serat, lignin, selulosa dan hemiselulosa (Steviani, 2011).

Menurut Slamet (2005) media tanam serbuk gergaji harganya murah, mudah didapat, medianya kompak dan padat. Pada proses awal pembuatan media tanam jamur, bahan yang dibutuhkan terdiri dari serbuk gergaji kayu, dedak dan kapur ditambah dengan air, selain itu bisa juga ditambahkan pupuk hayati untuk mempercepat proses pengomposannya. Media tanam jamur tiram pada awal

pembuatan sudah memiliki kandungan nutrisi yang cukup, namun setelah proses inkubasi yaitu pada fase penumbuhan miselium, nutrisi yang ada pada media jamur sedikit berkurang, sehingga diperlukan kembali asupan nutrisi yang cukup untuk tahap pembentukan calon tubuh buah jamur. Setelah panen pertama media tanam juga memerlukan nutrisi sehingga diupayakan untuk menambahkan nutrisi kembali agar nutrisi selalu tersedia dalam media, dan setelah panen selanjutnya diperlakukan sama.

Ampas kelapa merupakan limbah hasil perasan santan kelapa yang menjadi limbah rumah tangga. Ampas kelapa biasanya digunakan masyarakat sebagai bahan pangan ternak. Menurut Sari (2015) ampas kelapa dapat digunakan sebagai pengganti dedak/ bekatul yang merupakan salah satu bahan utama pembuatan media tanam jamur karena ampas kelapa masih memiliki nutrisi yang dapat digunakan untuk menumbuhkan jamur tiram. Selain itu, ampas kelapa tidak di perjualbelikan sehingga mudah didapat.

Bekatul berfungsi sebagai nutrisi dan sumber karbohidrat, karbon dan nitrogen. Karbon digunakan sebagai energi utama sedangkan nitrogen untuk membangun miselium. Kapur berfungsi untuk menjaga keasaman media dan sumber mineral, selain menggunakan media tanam serbuk gergaji, bekatul dan kapur juga digunakan media tambahan tetes tebu atau molase sebagai penambah nutrisi jamur tiram putih (Puspaningrum, 2013).

Penambahan nutrisi di kalangan petani tradisional komposisinya beragam, adapun komposisi nutrisi yang biasa digunakan salah satunya dengan menggunakan

air leri. Sebenarnya banyak teori untuk membuat nutrisi tambahan untuk memacu pertumbuhan jamur tiram, selain memanfaatkan air leri (air cucian beras), penggunaan hasil fermentasi buah, ekstrak tauge, vitamin B kompleks, gula sampai beberapa ramuan yang bisa dibuat sendiri (Juhaeni, 2014).

Molase merupakan limbah dari pabrik gula yang tidak dapat dikristalkan lagi. Molase memiliki kandungan K, Ca, Cl yang berfungsi dalam pertumbuhan jamur tiram putih, selain itu molase juga memiliki kandungan gula yang merupakan sumber energi untuk metabolisme sel jamur tiram putih yang akan merangsang pertumbuhan miselium. Molase juga memiliki kandungan unsur nitrogen berkisar 2-6% yang berfungsi untuk membangun miselium. Pemilihan media tambahan molase pada dosis yang berbeda diharapkan dapat meningkatkan produktivitas jamur tiram putih (Puspaningrum, 2013).

Penambahan molase yang memiliki kandungan nutrisi cukup tinggi baik bagi pertumbuhan miselium jamur. Dengan meningkatnya produktivitas pembuatan gula, maka memungkinkan adanya juga penambahan jumlah limbah molase yang terbentuk. Saat ini molase pun dapat diperjualbelikan mengingat kandungannya yang cukup tinggi serta memiliki berbagai zat-zat yang baik bagi tanaman serta beberapa peneliti yang menggunakannya sebagai bahan penelitian.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian ini untuk melihat perbandingan komposisi media dengan penambahan ampas kelapa dan molase terhadap pertumbuhan jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penambahan ampas kelapa dan molase pada berbagai komposisi media terhadap pertumbuhan jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*)?
2. Pada komposisi media berapa yang memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Bibit F₂ jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*) diperoleh dari pembibitan jamur tiram di Desa Kartawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Ampas kelapa yang telah dikeringkan diperoleh dari limbah rumah tangga di Desa Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan serta Molase diperoleh dari limbah PTPN XIV (PERSERO) Pabrik Gula Takalar di Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, kemudian jamur tiram coklat ditanam dan dibudidayakan di dalam baglog. Pelaksanaan penelitian, dilakukan di kumbung jamur Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Samata.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Sari (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Media Dengan Penambahan Ampas Kelapa Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) dan Sumbangsihnya Terhadap Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X Semester I Materi Fungsi. Adapun jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen dan rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan dan 6 ulangan. Hasil penambahan ampas kelapa pada media tanam dapat berpengaruh sangat nyata terhadap semua parameter tanaman pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*).
2. Steviani (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penambahan Molase Dalam Berbagai Media Pada Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial terdiri atas 2 faktor perlakuan dengan 3 ulangan. Hasil pemberian molase dengan konsentrasi 15 ml/baglog mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) lebih baik.
3. Tjokrokusomo, Hendritomo dan Widyastuti (2004) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penambahan Dedak dan Molase Pada Substrat Pertumbuhan Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus cystidiosus*). Hasil pengukuran menyatakan bahwa dengan penambahan molases menunjukkan adanya kecenderungan

pertumbuhan yang baik, sedangkan penambahan dedak pada pertumbuhan panen ke-1 jumlah rata-rata 3-4 buah. Demikian juga terdapat peningkatan pada diameter tudung jamur tiram.

4. Puspaningrum dan Suparti (2013) meneliti tentang Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Media Tambahan Molase dengan Dosis yang Berbeda. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap satu faktorial yaitu pemberian molase dengan empat taraf konsentrasi 0 %, 7,5 %, 14,5 % dan 22%/baglog dan dilakukan 3 ulangan. Hasil penelitian pada pengamatan pemenuhan miselium diperoleh perlakuan yang memberikan pengaruh paling baik yaitu M1 (7,5% molase/baglog) dengan rata-rata pemenuhan miselium 16,3 hari dan perlakuan yang memberikan pengaruh kurang baik yaitu M0 atau kontrol dengan rata-rata 27,7 hari.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan ampas kelapa dan molase pada berbagai komposisi media terhadap pertumbuhan jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*).
2. Untuk mengetahui komposisi media yang memberikan hasil terbaik untuk pertumbuhan jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*).

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Memberi wawasan yang luas kepada masyarakat mengenai cara pembudidayaan jamur tiram dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan yang lebih produktif.
2. Memberikan informasi tentang pemanfaatan limbah pertanian.
3. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II
TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Allah telah menurunkan nikmat yang sangat banyak bagi manusia maka dari itu kita sebagai khalifah di bumi harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan.

Dalam QS al-Kahfi/18: 45 Allah berfirman:



Terjemahnya:

“Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia ada adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka bercampurlah dengannya tumbuh-tumbuhan lalu ia menjadi keriting kerontang yang diterbangkan oleh angin Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Kementerian Agama, 2012).

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad saw. dengan firman-Nya: “dan”di samping perumpamaan yang lalu, “berilah” juga “perumpamaan kepada mereka” yakni manusia seluruhnya, khususnya para penduhaka, tentang “kehidupan dunia”. Dia “adalah sebagai air”hujan ”yang Kami turunkan dari langit”, dan menyirami tumbuh-tumbuhan ”maka bercampurlah dengannya”, yakni bercampurlah air itu dengan tanah yang mengandung benih “tumbuh-tumbuhan” yang berada di bumi yakni dalam tanah sehingga benih itu tumbuh subur menghijau dan matang, lalu

dengan amat cepat “ia” yakni tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kerontang, yang di terbangkan oleh angin. Demikian Allah Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan, menyuburkan tumbuhan dan melayukannya, dan demikian juga sifat kesudahan kenikmatan hidup duniawi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Shihab, 2012).

Ayat tersebut mempersamakan kehadiran nikmat duniawi yang dinikmati pada masa muda, kemudian sedikit demi sedikit berkurang dan berkurang, hingga akhirnya punah dan hilang sama sekali, dengan kehadiran hujan yang menumbuhkan tumbuhan serta memekarkannya dengan sangat indah dan subur, kemudian layu dan mati sehingga diterbangkan angin (Shihab, 2012).

Ayat tersebut dengan sangat singkat menggambarkan singkat dan cepatnya berlalu kehidupan duniawi. Air yang turun dari langit, tidak lagi dilukiskan bahwa dia “mengalir di sungai kemudian mengairi tumbuhan”. Benih pun tidak digambarkan “ditanam”, tetapi air itu dikatakan sebagai “sudah bercampur dengan tanah”, tanaman yang tumbuh pun tidak lagi digambarkan bahwa “ ia tumbuh menghijau, atau buahnya matang”, tetapi langsung dilukiskan bahwa “ia layu dan hancur diterbangkan angin”. Demikian hidup ini berlalu, dilukiskan dengan tiga kalimat, masing-masing dengan empat kata: *mâ'in anzalnâhu min as-samâ'*/ air yang Kami turunkan dari langit, selanjutnya *fakhtalatha bihi nabât al-ardh*/ maka bercampurlah dengannya tumbuh-tumbuhan dan *ashbaha hasyiman adzruhu ar-riyah*/ menjadi kering kerontong yang diterbangkan angin. (Shihab, 2012).

B. Fungi

Jamur (fungi, cendawan, lapuk, supu) adalah jasad hidup yang tidak mempunyai warna hijau daun (klorofil), dan bersifat heterotrofik, artinya untuk keperluan hidupnya, jamur mempunyai ketergantungan terhadap sumber nutrisi (terutama karbohidrat) dari sumber lain di luar tubuhnya, misalnya kotoran/buangan, sisa tanaman ataupun hewan yang sudah mati dan sebagainya (Suriawiria, 2002).

Fungi merupakan organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya (sumber karbon dan energi). Bila sumber nutrisi tersebut diperoleh dari bahan organik mati, maka fungi bersifat saprofit. Fungi saprofit mendekomposisi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang kompleks dan menguraikannya menjadi zat yang lebih sederhana (Pratiwi, 2008).

Terdapat dua istilah pada fungi, yaitu kapang (*mold*) yang merupakan fungi yang berfilamen dan multiseluler dan khamir (*yeast*) yaitu bentuk fungi berupa sel tunggal dengan pembelahan sel melalui pertunasan. Khamir tidak berfilamen, berbentuk oval atau bulat, tidak berflagella, dan berukuran lebih besar dibanding sel bakteri. Tubuh kapang (*thallus*) dibedakan menjadi dua bagian yaitu miselium dan spora. Miselium merupakan kumpulan beberapa filamen yang disebut hifa. Bagian dari hifa yang berfungsi untuk mendapatkan nutrisi disebut hifa vegetatif, sedangkan bagian hifa yang berfungsi sebagai alat reproduksi disebut hifa reproduksi atau hifa

udara (*aerial hypha*), karena pemanjangannya mencapai bagian atas permukaan media tempat fungi ditumbuhkan (Pratiwi, 2008).

Menurut Pratiwi (2008) terdapat 3 macam morfologi hifa yaitu:

1. Aseptat (*coenocytic hypha*) yaitu hifa yang tidak memiliki dinding sekat (septa)
2. Septat hifa (hifa bersekat) dengan sel-sel uninukleat. Septa membagi hifa menjadi ruang-ruang yang berisi 1 inti, dan pada tiap sekat terdapat pori-pori yang memungkinkan perpindahan inti dan sitoplasma dari satu ruang ke ruang lainnya
3. Septa dengan ruang-ruang yang berisi lebih dari 1 inti (multi nukleat)

Menurut Cahayana, dkk., (1997) berdasarkan ciri hidup, jamur dibedakan menjadi jamur simbiosis, jamur parasit dan jamur saprofit:

1. Jamur simbiotik, yaitu hidup berdampingan dengan tanaman lain. Apabila hubungan itu saling menguntungkan maka disebut simbiotik mutualisme tetapi bila satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak dirugikan disebut simbiotik komensialisme. Contoh: *Amanita muscaria*, *Limacella guttata*, *Cystoderma amianthium*.
2. Jamur parasit, adalah jamur yang mengambil makanan dari tumbuhan lain yang masih hidup. Contoh jamur jenis ini antara lain: *Omphalotus olearius*, *Armillariella mellea*.

3. Jamur saprofit yaitu jamur yang hidup pada zat organik yang tidak diperlukan lagi (misalnya sampah). Contoh: *Pleurotus ostreatus*, *Rhodotus palartus*, *Macrolepiota procera*.


Menurut Alexopaulus dalam Maulana (2011) *thallophyta* tidak berklorofil dapat dibedakan dalam 3 keluarga besar dan memiliki 4 kerabat, yaitu:

1. *Phylum Schizomycophyta* (keluarga besar bakteri)
2. *Phylum Mycomichophyta* (kelurga besar jamur lendir)
3. *Phylum Eumichophyta* (keluarga besar jamur) yang terdiri atas:
 - a. Kelas *Phycomycetes* (keluarga jamur ganggang)
 - b. Kelas *Ascomycetes*
 - c. Kelas *Deutromycetes* (fungi imperfectif)
 - d. Kelas *Basidiomycetes* (keluarga jamur tingkat tinggi)

Berhubung jamur tidak berklorofil, maka hidupnya terpaksa mengisap mengambil zat-zat yang sudah jadi, yang dibuat oleh organisme lain. Oleh karena itu jamur bisa dikelompokkan sebagai *heterotrof*, artinya organisme yang hidupnya tergantung dari organisme lain. Jamur tiram termasuk dalam kelas *Basidiomycetes* dimana jamur dalam kelas ini memiliki susunan tubuh yang umumnya mudah diamati, karena selain sporanya bisa tumbuh menjadi miselium yang hifanya bersekat-sekat, jamur ini juga terdiri dari banyak sel (makroskopis) sehingga menyerupai tanaman, meskipun tidak berklorofil. Berdasarkan perkembangannya, miselium dibedakan menjadi *mycelium primair*, *mycelium sekunder* dan *mycelium tertier*. Miselium ini bisa berbentuk tubuh buah yang disebut *basidiocarp*, yang untuk

beberapa famili berbeda-beda, ada yang berbentuk payung, papan, lembaran berliku-liku, daun telinga dan sebagainya (Suhardiman, 1989).

Kelompok fungi *Basidiomycota* biasa disebut jamur bagi orang awam karena banyaknya jenis yang karpusnya (tudung buah) besar dapat dilihat dengan kasat mata. Fungi (*mushroom*) telah lama dimanfaatkan manusia misalnya *Agaricus biosporus*, *Pleurotus flabellatus*, dan *Flamulina velutipes*, akan tetapi banyak juga yang bersifat toksin bahkan dapat mematikan diantaranya *Amanita sp* dan *Coprinus cineris* (Gandjar, dkk., 2006).



Gambar 2.1. Morfologi Jamur (Agroflo, 2012)



Gambar 2.2. Siklus hidup jamur tiram (Ekowati, 2014)

C. Jamur Tiram Cokelat

Jamur tiram termasuk tumbuhan. Tubuh buah jamur tiram mempunyai tangkai yang tumbuh menyamping (bahasa Latin; *pleurotus*) dan bentuknya seperti tiram (*ostreatus*) sehingga jamur tiram mempunyai nama *Pleurotus ostreatus*. Bagian tudung jamur tersebut berubah warna dari hitam, abu-abu, coklat, hingga putih, dengan permukaan yang hampir licin, diameter 5-20 cm yang bertepi tudung mulus sedikit berlekuk. Selain itu, jamur tiram memiliki spora berbentuk elips berukuran 8-11x3-4 μm ($\mu\text{m}=0.001\text{mm}$) serta miselia berwarna putih yang bisa tumbuh dengan cepat (Wijoyo, 2011).

Jamur ini banyak tumbuh secara liar (walaupun berukuran kecil), di kawasan yang berdekatan dengan hutan, menempel pada kayu atau dahan kering. Jamur ini tumbuh terutama pada waktu musim hujan. Jika sudah terlalu tua, apalagi kering, jamur ini akan tetap alot atau liat walau terus menerus direbus, sehingga disebut supu liat. Jenis supu liat yang paling banyak dicari adalah supu liat yang tumbuh secara alami pada kayu lunak, misalnya karet, kapuk, dan kidamar. Daya tarik jamur tiram adalah pada warna tubuh buahnya yang bervariasi, mulai dari putih, kecoklatan, keabu-abuan, kekuning-kuningan, kemerah-merahan, dan lain-lain (Suriawiria, 2002).

Jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*) merupakan keluarga dari Tricholomataceae. Umumnya dikenal sebagai jamur *abalone* yang dapat dimakan. Makanan yang populer di masyarakat Sri Lanka. Jamur ini besar dan berdaging, tumbuh di batang pohon atau tunggul di lapisan seperti rak. *Pileus* berbentuk kerang.

Tudung muda dalam kecokelatan, permukaannya halus dan lembab dengan tepi menghadap ke bawah. *Stipe* berwarna coklat tua (Kudahewa, dkk., 2008).



Gambar 2.3. Jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*) (Dokumen pribadi, 2018)

Menurut Djarijah (2001) jamur tiram coklat termasuk dalam kelompok famili Agaricaceae atau Tricholomataceae dari kelas *Basidiomycetes*. Adapun klasifikasi jamur tiram coklat yakni sebagai berikut.

Regnum : Myceteae (Fungi)

Divisio : Amastigomycota

Subdivisio : Basidiomycotae

Classis : Basidiomycetes

Ordo : Agraicales

Familia : Agaricaceae

Genus : Pleurotus

Species : *Pleurotus cystidiosus* (Tjitrosoepomo, 2014)

Jamur tiram coklat mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat dikenali dengan mudah diantaranya bentuk tudung seperti tiram berdiameter 4-15 cm atau lebih. Permukaan tudung licin agak berminyak ketika lembab, warna tudung putih kecokelatan atau coklat tua kadang kekuningan pada saat jamur dewasa, tetapi tudung menggulung ke dalam dan sering bergelombang pada jamur muda (Mudakir, dkk., 2014). Sedangkan menurut Ahmad, dkk, (2011) tubuh buah tidak memiliki tangkai, tudung hanya membentuk setengah lingkaran, membentuk seperti tiram dengan bagian atas lebih lebar, bagian bawah agak runcing, bagian bawah tudung terbentuk lapisan seperti insang, disebut *gills*, berwarna keputih-putihan atau abu-abu.

Jamur tiram coklat memiliki *lamellae* agak tebal lebar, relatif padat, berujung ke bagian atas *stipe*, biasanya dengan anastomosis yang dekat dengan *stipe* dimana mereka membentuk jaring. Basidiospora memiliki panjang 11,0-18,0 x 3,2-5,7 μm (berarti: 14,8 \pm 1,7 x 4,3 \pm 0,7 μm), silindris hingga elips, berdinding tipis dengan *apiculus* kecil, *inamyloid*, *hyaline* (Zervakis, 1998).

Menurut Suriawiria dalam Wijoyo (2011), siklus hidup jamur tiram hampir sama dengan siklus hidup jamur dari keluarga besar *Agaricaceae* lainnya. Tahap-tahap pertumbuhan jamur tiram adalah sebagai berikut:

- a. Spora (*basidiospora*) yang sudah masak atau dewasa jika berada di tempat yang lembap akan tumbuh dan berkecambah membentuk serat-serat halus menyerupai serat kapas, yang disebut miselium atau miselia.

- b. Jika keadaan lingkungan tempat tumbuh miselia tersebut baik, dalam arti temperatur, kelembapan, kandungan C/N/P- Rasio substrat tempat tumbuh memungkinkan, maka kumpulan miselia tersebut akan membentuk primordia atau bakal tubuh buah jamur.
- c. Bakal tubuh buah jamur tersebut kemudian akan membesar, dan pada akhirnya membentuk tubuh buah atau bentuk jamur yang kemudian dipanen.
- d. Tubuh buah jamur dewasa akan membentuk spora, spora ini tumbuh di bagian ujung *basidium*, sehingga disebut *basidiospora*. Jika sudah matang atau dewasa, spora akan jatuh dari tubuh buah jamur.

Miselium primer bersifat homokarion selanjutnya berfusi dengan miselium kompatibel dan membentuk miselium sekunder dengan dua inti atau dikarion. Miselium sekunder mempertahankan sifat dikarion dengan membentuk struktur kait (*clamp connections*) pada bagian tepi (*mycelial tip*) yang memanjang. Miselium sekunder yang berada pada kondisi lingkungan optimal akan terhimpun menjadi jaringan teratur dan membentuk tubuh buah (*basidiokarpus*) yang menghasilkan basidiospora. Setiap basidium dalam basidiokarpus menghasilkan empat basidiospora melalui proses kariogami dan meiosis. Basidiospora yang telah matang kemudian jatuh dari tubuh buah jamur dan tumbuh menjadi hifa primer jika menemukan substrat yang sesuai (Alexopoulos dalam Pradipta, 2008).

Habitat merupakan tempat yang mempunyai sumber nutrisi (bahan makanan) untuk tempat pertumbuhan jamur yang sesuai. Sumber nutrisi dimaksud dapat berbentuk karbohidrat, lemak protein serta senyawa lainnya. Kehadiran jamur pada

substrat mungkin bersifat normal, yang artinya jamur tersebut selalu didapatkan. Tetapi mungkin bersifat *transpien* (sementara) yang disebabkan oleh pengaruh luar. Pengaruh luar yang dimaksud antara lain adanya penambahan bersama bahan lain, terbawa oleh hewan ataupun terbawa bersama peralatan dan benda-benda lainnya (Suriawiria,1993).

Di alam bebas, jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan yang berdaerah sejuk. Tubuh buah terlihat saling bertumpuk di permukaan batang pohon yang sudah melapuk atau batang pohon yang sudah ditebang. Jamur tiram dapat tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian sekitar 600 mdpl di lokasi yang memiliki kadar air sekitar 60% dan derajat keasaman atau pH 6-7. Jika tempat tumbuh terlalu kering atau kadar airnya kurang dari 60%, miselium jamur tidak bisa menyerap sari makanan dengan baik sehingga tumbuh kurus. Sebaliknya, jika kadar air di lokasi tumbuhnya terlalu tinggi, jamur akan terserang penyakit busuk akar (Achmad, dkk., 2013).

Secara alami, jamur tiram ditemukan di hutan di bawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman berkayu. Jamur tiram tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak, di tempat terlindung miselium jamur akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tempat yang terang dengan cahaya matahari yang melimpah (Wijoyo, 2011).

Agar jamur tiram dapat tumbuh dan menghasilkan dengan baik maka persyaratan pertumbuhannya harus diperhatikan. Syarat tumbuh jamur tiram meliputi

beberapa parameter, terutama temperatur, kelembapan relatif, waktu, kandungan, CO₂ dan cahaya.

a. Temperatur (Suhu)

Dalam melangsungkan kehidupannya, jamur memerlukan suhu-suhu tertentu untuk tumbuh secara optimal. Pada kisaran suhu optimal fase miselium jamur tiram antara 26-28°C dan fase tumbuh buah kisaran suhunya 24-26°C (Agus, 2006).

Wardi, dkk. (2006) menambahkan bahwa untuk pertumbuhan bakal buah membutuhkan suhu normal ruangan yang berkisar 25-28°C. Jika terlalu dingin tubuh buah akan banyak mengandung air yang berdampak pada kebusukan, sedangkan jika terlalu panas maka akan terhambat pertumbuhan bakal buahnya.

b. Kelembapan

Masa pertumbuhan miselium membutuhkan kelembapan udara antara 65-70% tetapi untuk merangsang pertumbuhan tunas dan tubuh buah jamur membutuhkan kelembapan udara sekitar 80-85%. Tunas dan tubuh buah jamur yang tumbuh pada lingkungan dengan kelembapan di bawah 80% akan mengalami gangguan absorpsi nutrisi sehingga menyebabkan kekeringan dan gangguan pertumbuhan ataupun kematian (Djarajah dan Djarajah, 2001).

c. Intensitas Cahaya

Cahaya sangat dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan primordia (bakal buah), bahkan jika kekurangan cahaya akan mengurangi besarnya buah dan akan menyebabkan warna tudung berubah menjadi pucat, bahkan miselium tumbuh baik pada kondisi gelap (Wardi, dkk., 2006).

Faktor-faktor lingkungan yang menentukan pertumbuhan jamur tiram ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1: Parameter faktor lingkungan pertumbuhan jamur tiram (Wijoyo, 2011)

Parameter - pertumbuhan	Pertumbuhan miselia pada substrat tanam	Pertumbuhan primordial	Pembentukan tubuh buah
Temperatur inkubasi	24°C-29°C	21°C-27°C	21°C-28°C
RH	90%-100%	90%-100%	90%-95%
Waktu tumbuh	10-14 hari	3- 5 hari	3-5 hari
Lanjutan tabel 2.1			
Parameter pertumbuhan	Pertumbuhan miselia pada substrat tanam	Pertumbuhan primordial	Pembentukan tubuh buah
Kandungan CO₂	5.000-20.000 ppm	<1.000ppm	<1.000ppm
Cahaya	500-1.000 lux	500-1.000 lux	500-1.000 lux
Sirkulasi Udara	1-2 jam	4-8 jam	-

Menurut Djarijah dan Djarijah (2001) jamur tiram mengandung 18 macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan tidak mengandung kolestrol. Macam asam amino yang terkandung dalam jamur tiram adalah isoleusin, lysin, methionin, cystein, penylalanin, tyrosin, treonin, tryptopan, valin, argin, histidin, alanin, asam aspartat, asam glutamat, glysin, prolin, dan serin.

Jamur tiram coklat dikenal juga dengan nama jamur abalon. Tiram coklat mempunyai rumpun yang sangat sedikit, tetapi tudungnya lebih tebal dan daya simpannya lebih lama. Kandungan energinya mencapai 100 kkal/100 g, sedangkan vitamin C yang dikandung sebesar 4 mg (Agriflo, 2012).

Jamur tiram coklat memiliki kandungan vitamin B,C, dan D yang lebih tinggi dibanding dengan jamur lain (Suriawiria, 2002).

Komposisi dan kandungan nutrisi setiap 100 gram jamur tiram dapat dilihat dibawah tabel berikut.

Tabel 2.2. Komposisi dan kandungan nutrisi jamur tiram per 100 gram (Djarajah dan Djarajah 2001)

Zat Gizi	Kandungan
Kalori (Energi)	367 kal.
Protein	10,5-30,4%
Karbohidrat	56,6%
Lemak	1,7-2,2 %
Thiamin	0,20 mg

Lanjutan Tabel 2.2

Zat Gizi	Kandungan
Riboflavin	4,7-4,9 mg
Niacin	77,2 mg
Ca (Kalsium)	314,0 mg
K(kalium)	3.792,0 mg
P (fosfor)	717,0 mg
Na (natrium)	837,0 mg
Fe (besi)	3,4-18,2 mg

Jamur tiram sendiri juga memiliki berbagai spesies yang mudah dibedakan berdasarkan warna tudung buahnya dan memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Misalnya saja jamur tiram merah muda (*Pleurotus flabellatus*) atau dikenal dengan nama *sakura shimeji* dalam 100 g, kandungan proteinnya mencapai 19,9 gram dan vitamin C 6,25 mg. Kemudian jamur tiram kuning (*Pleurotus citrinopileatus*) memiliki rumpun paling banyak dibanding dengan jamur tiram putih maupun coklat, tetapi cabangnya sedikit dan tubuh buah yang tipis, memiliki kandungan protein yang mencapai 42,3-47,9 g/100 g. Jamur tiram abu-abu (*Pleurotus cystidius*) atau biasa dikenal dengan nama *shimeji grey* karena tudungnya yang berwarna kelabu kecokelatan sampai kuning kehitaman memiliki kandungan energi mencapai 20 kkal dan vitamin A mencapai 30-114 mg/100 g (Agroflo, 2012).

Pada ayat 190, ayat ini mengundang manusia untuk berpikir, karena *sesungguhnya dalam penciptaan*, yakni benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di *langit* atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian *dan* perputaran *bumi* pada porosnya, yang melahirkan *silih bergantinya malam dan siang* perbedaannya, baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi *ulūl-albāb*, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni. Pada ayat 191 Ayat tersebut menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa yang dinamai *Ulūl-albāb*. Mereka adalah orang baik laki-laki atau perempuan yang terus-menerus mengingat Allah, dengan ucapan dan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi apapun. Obyek dzikir adalah Allah, sedangkan obyek akal pikiran adalah seluruh makhluk ciptaan-Nya. Akal diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena alam, dan terdapat keterbatasan dalam memikirkan dzat Allah (Shihab 2012).

Dalam budidaya jamur, media tumbuh jamur adalah salah satu faktor penentu terhadap pertumbuhan jamur. Oleh karena itu, jamur membutuhkan nutrisi tambahan untuk mendukung pertumbuhannya selain yang terdapat dalam serbuk gergaji. Salah satunya dengan penambahan mineral yang terkandung dalam kapur dan dolomit, unsur mineral tersebut yaitu berupa kalsium (Ca) dan magnesium (Mg). Unsur Ca dan Mg merupakan unsur mineral yang dibutuhkan oleh jamur. Selain itu, menurut Djarijah dan Djarijah (2001), unsur Ca berfungsi untuk menetralkan asam oksalat yang dikeluarkan oleh miselium jamur.

Kayu atau serbuk kayu yang digunakan sebagai tempat tumbuh jamur mengandung karbohidrat, serat, lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Zat yang terkandung dalam kayu tersebut ada yang berguna dan membantu pertumbuhan jamur, tetapi adapula yang menghambat. Kandungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram adalah karbohidrat, lignin dan serat, sedangkan faktor yang menghambat adalah getah dan zat ekstraktif (zat pengawet alami yang terdapat pada kayu). Oleh karena itu, pada budidaya jamur sebaiknya menggunakan serbuk gergaji yang berasal dari jenis kayu yang tidak banyak mengandung zat pengawet alami (Parlindungan, 2000 dalam Steviani, 2011).

Bahan baku untuk medium tempat bertanam jamur tidak harus selalu menggunakan serbuk kayu. Beberapa bahan untuk medium pertumbuhan jamur yakni merang (tangkai padi), sekam (kulit gabah), arang sekam, jerami, dan bahan lain seperti daun pisang, kertas bekas, kapas bekas, ampas tebu, ampas aren, ampas sagu dan sebagainya (Suriawiria, 1993).

Sustrat atau media adalah faktor utama bagi kehidupan jamur. Jamur akan tumbuh subur pada bahan-bahan yang melapuk atau terdekomposisi. Bahan organik yang mengandung selulosa dan lignin akan mendukung pertumbuhan miselium dan perkembangan tubuh buah (Steviani, 2011).

Bekatul berfungsi sebagai nutrisi dan sumber karbohidrat, karbon dan nitrogen. Karbon digunakan sebagai energi utama sedangkan nitrogen untuk membangun miselium. Kapur berfungsi untuk menjaga keasaman media dan sumber mineral, selain menggunakan media tanam serbuk gergaji, bekatul dan kapur juga digunakan

media tambahan tetes tebu atau molase sebagai penambah nutrisi jamur tiram putih (Puspaningrum, 2013).

E. Ampas Kelapa

Kelapa merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting bagi Indonesia di samping kakao, kopi, lada dan vanili. Selama ini hasil utama kelapa yang banyak dimanfaatkan manusia adalah buahnya untuk dijadikan minyak. Padahal selain dari buah kelapa tersebut juga dihasilkan bahan-bahan lain yang tersisa dan tidak dimanfaatkan yang sering disebut limbah. Ampas kelapa merupakan limbah dari proses pembuatan santan (Elyana,2011).

Ampas kelapa merupakan limbah industri atau limbah rumah tangga yang sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan pakan ayam pedaging, karena ampas kelapa masih mudah didapatkan dari sisa pembuatan minyak kelapa tradisional dan limbah pembuatan *virgin coconut oil* (VCO) (Yamin, 2008).

Selain itu, karena minyak kelapa menduduki tempat pertama dalam memenuhi kebutuhan manusia akan minyak goreng, maka ampas kelapa sangat mudah didapatkan dan mengandung zat-zat yang mudah dicerna. Kandungan ampas kelapa ini antara air 13,35%, protein 17,09%, lemak 9,44%, karbohidrat 23,77%, abu 5,92%, dan serat kasar 30,4%. Ampas kelapa atau bungkil kelapa biasanya adalah hasil sisa pembuatan dan ekstraksi minyak kelapa yang didapat dari daging kelapa yang telah dikeringkan terlebih dahulu (Elyana, 2011).

Menurut Balasubramanian (1976), melaporkan bahwa analisis ampas kelapa kering (bebas lemak) mengandung 93% karbohidrat yang terdiri atas: 61% galaktomanan, 26% manosa dan 13% selulosa.

Ampas industri pengolahan kelapa memiliki nilai gizi dan kandungan serat tinggi yang sangat baik bagi kesehatan, akan tetapi selama ini ampas kelapa hanya diolah menjadi pakan ternak dengan harga sangat rendah (Yamin, 2008).

F. Molase

Tebu, atau *Saccharum officinarum* termasuk keluarga rumput-rumputan. Mulai dari pangkal sampai ujung batangnya mengandung air gula dengan kadar mencapai 20% (Tim penulis, 1995).


Tetes tebu (molase) adalah salah satu hasil samping pabrik gula tebu yang masih mempunyai nilai ekonomi yang cukup disebabkan kandungan gulanya yang tinggi sekitar 52 persen, sehingga memungkinkan dijadikan bahan baku berbagai industri. Industri yang memanfaatkan tetes diantaranya adalah industri yang menghasilkan produk distilasi seperti alkohol; industri fermentasi seperti monosodium glutamat, lisin, asam sitrat, vinegar, protein sel tunggal asetonbutanol, gum xanthan dan sebagainya. Molase atau tetes tebu mengandung kurang lebih 60% selulosa dan 35,5% hemiselulosa. Kedua bahan polisakarida ini dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana yang selanjutnya dapat difermentasi menjadi etanol. Salah satu produk samping dari industri gula pasir dari tebu adalah molase (Juwita,2012).

Molase adalah sejenis sirup yang merupakan sisa dari proses pengkristalan gula pasir. Molase tidak dapat dikristalkan karena mengandung glukosa dan fruktosa. Molase atau *black strap* merupakan limbah cair yang berasal dari sisa-sisa pengolahan tebu menjadi gula. Molase memiliki kandungan zat yang berguna, zat-zat tersebut antara lain kalsium, magnesium potasium, dan besi. Molase memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi, karena terdiri dari glukosa dan fruktosa (Steviani, 2011).

Molase merupakan limbah dari pabrik gula yang tidak dapat dikristalkan lagi. Molase memiliki kandungan K, Ca, Cl (Prayitno, 2010), yang berfungsi dalam pertumbuhan jamur tiram putih, selain itu molase juga memiliki kandungan gula yang merupakan sumber energi untuk metabolisme sel jamur tiram putih yang akan merangsang pertumbuhan miselium. Molase juga memiliki kandungan unsur nitrogen berkisar 2-6% yang berfungsi untuk membangun miselium (Puspaningrum, 2013).

G. Kerangka Pikir

Gambaran dan alur skematis dari penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat pada gambar 2.4.



H. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penambahan ampas kelapa dan molase pada berbagai komposisi media memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*).
2. Terdapat komposisi media yang memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan menerapkan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen.

Metode ini bersifat validasi atau menguji, yakni menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat (*dependent variabel*). Penelitian ini merupakan eksperimen murni.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kumbung Jamur Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dilaksanakan pada bulan Maret 2018 hingga Mei 2018.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian terbagi atas dua yakni variabel terikat dan variabel bebas. Pada penelitian ini variabel bebasnya yakni penambahan ampas kelapa dan molase

yang digunakan sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu pertumbuhan jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*).

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*) merupakan proses bertambahnya jumlah ukuran sel yang diukur dengan waktu awal tumbuh miselium hari setelah inokulasi (HSI), waktu pemuhan miselium (*full colony*) (HSI), lebar tudung (cm), panjang tangkai (cm), dan berat basah tubuh buah (gr).
2. Ampas kelapa merupakan limbah industri kelapa yang berperan sebagai pengganti dedak yang merupakan bahan umum yang digunakan pada pencampuran bahan dasar media, mempunyai kandungan protein, karbohidrat, serat.
3. Molase merupakan limbah industri pabrik gula yang digunakan sebagai penambah nutrisi yang dibutuhkan jamur yang juga memiliki kandungan selulosa dan hemiselulosa, selain itu molase juga mengandung K, Ca, Cl serta nitrogen.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan hasil dilakukan dengan bantuan alat elektronik.

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

1. Waktu awal tumbuh miselium (HSI) dengan cara mengamati awal pertumbuhan miselium hari setelah inokulasi.
2. Waktu pemuhan miselium (*full colony*) (HSI), dengan cara mencatat pada hari ke berapa setelah inokulasi pertumbuhan miselium memenuhi media tanam untuk masing-masing *baglog*.
3. Lebar tudung (cm) yaitu dengan cara mengukur lebar tudung dari ujung ke ujung pada bagian yang terlebar tudung di atas kertas millimeter.
4. Panjang tangkai (cm) dengan mengukur panjang tangkai dari pangkal hingga dibawah tudung di atas kertas millimeter.
5. Berat basah tubuh buah (gr) yaitu dengan cara menimbang tubuh buah jamur yang sudah dipanen dengan menggunakan timbangan neraca analitik.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial terdiri dari tiga faktor perlakuan dengan 3 ulangan sebagai berikut:

- a. Faktor pertama yaitu serbuk kayu (S) dengan 4 macam taraf konsentrasi, yaitu:

S₁ : Serbuk kayu 80% + kapur

S₂ : Serbuk kayu 70% + kapur

S_3 : Serbuk kayu 60% + kapur

S_4 : Serbuk kayu 50% + kapur

b. Faktor kedua yaitu ampas kelapa (A) dengan 4 macam taraf konsentrasi, yaitu:

A_0 : Tanpa penambahan ampas kelapa

A_1 : Ampas kelapa 15%

A_2 : Ampas kelapa 25%

A_3 : Ampas kelapa 35%

A_4 : Ampas kelapa 45%

c. Faktor ketiga yaitu konsentrasi molase dengan 3 taraf konsentrasi, yaitu:

M_0 : Tanpa molase

M_1 : Pemberian molase 15 ml/*baglog*

M_2 : Pemberian molase 20 ml/*baglog*

Sehingga diperoleh 13 kombinasi perlakuan, yaitu:

$S_1A_0M_0$: Serbuk gergaji tanpa pemberian molase dan ampas kelapa
(kontrol)

$S_1A_1M_0$ = Ampas kelapa 15 % tanpa pemberian molase

$S_1A_1M_1$ = Ampas kelapa 15% + 15 ml molase/ *baglog*

$S_1A_1M_2$ = Ampas kelapa 15 % + 20 ml molase/ *baglog*

$S_2A_2M_0$ = Ampas kelapa 25% tanpa pemberian molase

$S_2A_2M_1$ = Ampas kelapa 25% + 15 ml molase/ *baglog*

$S_2A_2M_2$ = Ampas kelapa 25% + 20 ml molase/ *baglog*

$S_3A_3M_0$ = Ampas kelapa 35% tanpa penambahan molase

$S_3A_3M_1$ = Ampas kelapa 35% + 15 ml molase/ *baglog*

$S_3A_3M_2$ = Ampas kelapa 35% + 20 ml molase/ *baglog*

$S_4A_4M_0$ = Ampas kelapa 45% tanpa penambahan molase

$S_4A_4M_1$ = Ampas kelapa 45% + 15 ml molase/*baglog*

$S_4A_4M_2$ = Ampas kelapa 45% + 20 ml molase/*baglog*

dengan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 39 unit percobaan.

Untuk penentuan takaran ampas kelapa pada perlakuan berdasarkan kebutuhan media tumbuh jamur yaitu dengan kombinasi dari bahan dasar 80% (serbuk gergaji), dedak (15%) serta kapur ($CaCO_3$) 5%, dan air secukupnya (kandungan air 40-60%) kombinasi tersebut dibutuhkan pada 1000 gram/ *baglog* (Daryanti dalam Sari (2015)).

F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah LAF (*Laminar Air Flow*), *autoklaf*, neraca analitik, timbangan duduk berkapasitas 3 kg, wadah, terpal, *hand sprayer*, kompor, gas, lampu spiritus, gergaji besi, baki (tempat setelah jamur dipanen), thermometer, hydrometer, pinset, gelas ukur, gunting, spatula, aluminium foil, kertas millimeter, rak pemeliharaan, cincin pipa paralon, plastik putih ukuran 18 x 30 cm (sebagai *baglog*), kapas, tali rafia, karet gelang, pisau, dan alat tulis.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bibit F2 jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*), serbuk gergaji kayu, ampas kelapa, tetes tebu (molase), dedak, kapur/kalsium karbonat (CaCO_3), alkohol 96%, air, dan label.

G. Prosedur Kerja

1. Persiapan media dan Pemberian Molase

Semua bahan disiapkan terlebih dahulu seperti serbuk gergaji kayu, ampas kelapa yang telah dikeringkan, kapur (CaCO_3) serta molase, kemudian bahan ditimbang sesuai dengan formulasi bahan dasar untuk kontrol yaitu serbuk gergaji 80% + dedak 15% + kapur (CaCO_3) 5%, dan air secukupnya (kandungan air 40-60%), untuk 1 baglog dibutuhkan 1000 gram total bobot media tanam. Untuk media dengan komposisi yang berbeda formulasi yang digunakan juga tetap sama tetapi bahan dedak diubah menjadi ampas kepala dengan takaran 15%, 25%, 35%, dan 45% serta pemberian molase dengan takaran 15 ml, dan 20 ml, kemudian proses pengomposan media dilakukan dengan cara menutup media dengan menggunakan terpal secara rapat selama 3 hari.

2. Pengemasan/pembuatan Media

Bahan media yang telah tercampur rata dimasukkan ke dalam plastik *baglog* ukuran (18 x 30 cm) dengan takaran 1000 gram (1 kg) dan dipadatkan menggunakan kayu pematik/mesin pengepres. Memberi cincin paralon pada bagian atas plastik

kemudian ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet gelang (Puspaningrum, 2013).

3. Sterilisasi

Sterilisasi adalah proses pengukusan *baglog* yang bertujuan untuk mematikan mikroba-mikroba yang terdapat dalam bahan media tanam. Proses sterilisasi dilakukan dengan memasukkan media ke dalam drum, kemudian memanaskan media hingga suhunya mencapai 80-90°C selama 6-8 jam dengan tekanan 1,5 atm (Cahyana, 1997). Setelah disterilisasi media didinginkan selama 24 jam.

4. Inokulasi

Inokulasi merupakan proses penanaman bibit jamur pada log media steril, bibit yang digunakan yaitu bibit F2 yang berumur 15 hari. Kapas penutup log dibuka, kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tusukan yang telah dipersiapkan dengan pinset, kemudian lubang pipa disumbat dengan kapas dan dilanjutkan dengan penutupan dengan kertas koran dan diikat menggunakan karet gelang. Inokulasi dilakukan di ruang yang steril dengan menggunakan alkohol 96% (Tjokrokusumo, dkk, 2004).

5. Inkubasi

Setelah dilakukan inokulasi, tahapan selanjutnya yaitu inkubasi. Tahap inkubasi merupakan tahap penyimpanan *baglog* yang sudah diinokulasi ke dalam ruang inkubasi hingga seluruh *baglog* ditutupi miselium berwarna putih (*full colony*).

Media tersebut kemudian diinkubasi selama \pm 45 hari dengan suhu 24°-30°C (Tjokrokusumo, dkk., 2004).

6. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan dengan menjaga kondisi lingkungan yang optimum untuk pertumbuhan jamur tiram khususnya kelembapan dan (temperatur jika suhu melebihi 30°C dan kelembapan kurang dari 80%) dilakukan penyemprotan air menggunakan *sprayer*. Air yang disemprotkan diusahakan tidak mengenai bagian dalam *baglog* karena bisa menyebabkan kebusukan media. Kegiatan penyiraman rutin dilakukan pagi dan sore hari terhadap *baglog* untuk menjaga kebutuhan jamur terhadap sumber air (Steviani, 2011).

7. Pemanenan

Pemanenan dalam priode ini perlu diperhatikan kualitas dan ciri-ciri jamur yang sudah siap untuk dipanen. Panen dilakukan setelah jamur tiram mencapai pertumbuhan yang optimal (cukup besar tetapi belum mekar penuh dan tudung jamur masih agak menggulung ke bawah) setelah tiga hari tumbuhnya calon jamur (*Pin head*). Teknik pemanenan dilakukan dengan cara pemotongan dengan menggunakan pisau yang bersih dan pemotongan sampai sedekat-dekatnya dengan media tumbuh (Tjokrokusumo, dkk., 2004)

8. Pengukuran

Parameter pengukuran yang dilakukan yakni dengan mengukur pertumbuhan miselium (cm), lebar tudung (cm), panjang batang (cm) dan berat tubuh buah jamur tiram coklat (gr). Pertumbuhan miselium jamur tiram diukur menggunakan kertas

milimeter yang dipotong dengan lebar ± 1 cm dan ditempelkan secara vertikal pada setiap media tanam, dan ditempel pada 3 titik yang berbeda. Tudung jamur diukur dengan menggunakan mistar atau di atas kertas milimeter dimana pengukurannya dimulai dari ujung kanan tudung hingga ujung kiri bagian kiri untuk melihat lebar tudung, untuk batang jamur diukur dari bagian miselia hingga bagian bawah tudung untuk melihat panjang batangnya, sedangkan untuk berat tubuh jamur digunakan neraca analitik.

H. Teknik Pengolahan Dan Analisis data

Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis data menggunakan analisis sidik ragam dan jika hasil ragam berbeda nyata ($F_{hitung} > F_{tabel 5\%}$ tetapi lebih kecil dari F_{Tabel} pada taraf 1%) atau berbeda sangat nyata ($F_{hitung} > F_{Tabel 1\%}$), maka untuk membandingkan 2 rata-rata perlakuan dilakukan uji lanjutan dengan uji beda nyata terkecil (BNT), untuk pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS 24.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada penelitian ini dilihat dari parameter yang diukur. Adapun parameter pengukuran pada pertumbuhan jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*) yaitu:

1. Waktu Awal Tumbuh Miselium dan Waktu Pemenuhan Miselium (*Full Colony*)

Pertumbuhan miselium jamur merupakan tanda bahwa inokulasi yang dilakukan telah berhasil. Waktu awal tumbuh miselium (HSI) dan waktu pemenuhan miselium (*full colony*) (HSI) jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*) dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 serta sidik ragamnya pada tabel lampiran 1b dan 2b. Sidik ragam menunjukkan adanya pengaruh nyata pada komposisi media tanam serbuk gergaji kayu dengan ampas kelapa serta molase terhadap waktu awal tumbuh miselium (HSI) jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*) dan terhadap waktu pemenuhan miselium (*full colony*).

Adapun perbandingan waktu awal tumbuh miselium dengan waktu pemenuhan miselium dapat dilihat pada gambar 4.1. dan gambar 4.2.



Gambar 4.1. Waktu awal tumbuh miselium (HSI) jamur coklat (*Pleurotus cystidiosus*)



Gambar 4.2. Waktu pemenuhan miselium (*full colony*) (HSI) jamur coklat (*Pleurotus cystidiosus*)

Hasil uji BNT waktu awal tumbuh miselium (HSI) dan waktu pemenuhan miselium (*full colony*) jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*) dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2

Tabel 4.1. Hasil uji BNT waktu awal tumbuh miselium (HSI) jamur tiram coklat (*Pleurotus Cystidiosus*)

Perlakuan	Ulangan			Rata-rata
	I	II	III	
S ₁ A ₀ M ₀	5	5	5	5 ^{bcd}
S ₁ A ₁ M ₀	5	5	7	5,6 ^{cd}
S ₁ A ₁ M ₁	5	7	7	6,3 ^d
S ₁ A ₁ M ₂	5	5	5	5 ^{bcd}
S ₂ A ₂ M ₀	7	5	5	5,6 ^{cd}
S ₂ A ₂ M ₁	7	3	5	5 ^{bcd}
S ₂ A ₂ M ₂	7	7	5	6,3 ^d
S ₃ A ₃ M ₀	5	5	5	5 ^{bcd}
S ₃ A ₃ M ₁	3	3	3	3 ^a
S ₃ A ₃ M ₂	3	5	3	3,6 ^{ab}
S ₄ A ₄ M ₀	5	3	5	4,3 ^{abc}
S ₄ A ₄ M ₁	3	3	3	3 ^a
S ₄ A ₄ M ₂	3	3	3	3 ^a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata. Dan apabila angka-angka diikuti oleh huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf uji BNT $\alpha=0,05$ dan $0,01$


Tabel 4.2. Hasil uji BNT waktu pematangan miselium (*full colony*) (HSI) jamur tiram coklat (*Peurotus cystidiosus*)

Perlakuan	Ulangan			Rata-rata
	I	II	III	
S ₁ A ₀ M ₀	29	29	27	28,3 ^a
S ₁ A ₁ M ₀	48	48	48	48 ^c
S ₁ A ₁ M ₁	37	29	48	38 ^b
S ₁ A ₁ M ₂	27	27	29	27,6 ^a
S ₂ A ₂ M ₀	29	29	29	29 ^a
S ₂ A ₂ M ₁	24	27	29	26,6 ^a
S ₂ A ₂ M ₂	27	29	27	27,6 ^a
S ₃ A ₃ M ₀	24	24	27	25 ^a
S ₃ A ₃ M ₁	27	24	27	26 ^a
S ₃ A ₃ M ₂	27	27	24	26 ^a
S ₄ A ₄ M ₀	27	27	27	27 ^a
S ₄ A ₄ M ₁	27	24	24	25 ^a
S ₄ A ₄ M ₂	24	27	24	25 ^a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata. Dan apabila angka-angka diikuti oleh huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf uji BNT $\alpha=0,05$ dan $0,01$

2. Lebar Tudung

Lebar tudung jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*) Gambar 4.3 dan sidik ragam dapat dilihat pada tabel lampiran 3b, dari hasil sidik ragamnya dapat dilihat bahwa komposisi media serbuk gergaji dengan ampas kelapa serta molase penambahan ampas kelapa serta molase pada media tidak memberikan pengaruh nyata pada lebar tudung jamur tiram coklat.



Gambar 4.3. Rata-rata lebar tudung jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*)

3. Panjang Tangkai

Pengamatan panjang tangkai dari jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*) dapat dilihat pada Gambar 4.4 serta sidik ragamnya pada tabel lampiran 4b. Dari hasil sidik ragam, komposisi media serbuk gergaji dengan ampas kelapa serta molase tidak memberikan pengaruh nyata terhadap panjang tangkai jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*).



Gambar 4.4. Rata-rata panjang tangkai jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*)

4. Berat Basah Tubuh Buah Jamur

Berat basah tubuh buah jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*) dapat dilihat pada Gambar 4.5 serta sidik ragamnya pada tabel lampiran 5b. Hasil sidik ragam menjelaskan bahwa komposisi media serbuk gergaji dengan ampas kelapa serta molase tidak memberikan pengaruh nyata pada berat basah tubuh buah jamur tiram cokelat (*Pleurotus cytydiosus*)



Gambar 4.5. Rata-rata berat basah tubuh buah jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*)

B. Pembahasan

Jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*) merupakan jamur konsumsi yang memiliki banyak kandungan berupa vitamin, protein dan karbohidrat. Dalam pembudidayaan jamur, serbuk gergaji kayu merupakan bahan utama dalam pembuatan medainya, selain itu beberapa bahan tambahan yang menunjang nutrisi media jamur dapat digunakan seperti ampas kelapa dan molase. Penggunaan ampas kelapa serta molase dapat memberikan hasil yang lebih baik terhadap waktu awal

tumbuh miselium, waktu pemenuhan miselium (*full colony*), lebar tudung, panjang tangkai serta berat basah jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*) dibandingkan dengan kontrol yang tidak menggunakan kedua bahan tambahan tersebut.

1. Waktu Awal Tumbuh Miselium Dan Waktu Pemenuhan Miselium (*Full Colony*)

Penyebaran miselium diamati sejak munculnya miselium pada hari setelah inokulasi (HSI) hingga memenuhi permukaan *baglog*. Kecepatan tumbuh miselium ini merupakan salah satu indikator keberhasilan inokulasi. Apabila *baglog* tidak ditumbuhi miselium maka inokulasi yang telah dilakukan dinyatakan gagal.

Penyebaran miselium sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, kelembapan dan intensitas cahaya. Selain itu kandungan dalam media *baglog* dan kualitas bibit jamur yang digunakan juga mempengaruhi kecepatan penyebaran miselium. Menurut Agus (2006) suhu optimal fase miselium jamur tiram berkisar antara 26-28°C dan membutuhkan kelembapan udara antara 65-70% (Djarajah dan Djarajah, 2001)..

Pada gambar 4.1. dan gambar 4.2. menunjukkan bahwa dari beberapa perlakuan, kecepatan tumbuh miselium dapat dilihat dari perlakuan S₃A₃M₁ dengan komposisi media ampas kelapa 35% dengan penambahan molase 15 ml, S₄A₄M₁ dengan komposisi media ampas kelapa 45% dengan penambahan molase 15 ml dan S₄A₄M₂ dengan komposisi media ampas kelapa 45% dengan penambahan molase 20 ml dimana rata-rata kecepatan awal tumbuh miselium yaitu 3 hari. Sedangkan S₁A₁M₁ dan komposisi media ampas kelapa 15% dengan penambahan molase 15 ml

dan S₂A₂M₂ dengan komposisi media ampas kelapa 25% dan penambahan molase 20 ml merupakan perlakuan yang paling lambat dengan rata-rata 6,3 hari.

Untuk waktu pemenuhan miselium (*full colony*) (HSI), kecepatan miselium dalam memenuhi *baglog* terjadi pada perlakuan S₃A₃M₀ dengan komposisi media ampas kelapa 35% tanpa pemberian molase, S₄A₄M₁ dan S₄A₄M₂ dengan komposisi media ampas kelapa 45% dengan penambahan molase 15 ml dan 20 ml dengan rata-rata 25 hari. Sedangkan pada perlakuan S₁A₁M₀ dengan komposisi media ampas kelapa 15% dan tanpa pemberian molase merupakan perlakuan yang paling lama dengan rata-rata 48 HSI.

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa komposisi media serbuk gergaji kayu dengan ampas kelapa dan molase memberikan pengaruh sangat nyata terhadap waktu awal tumbuh miselium dan waktu pemenuhan miselium (*full colony*) (HSI), dimana F hitung > F tabel yakni 4,722 untuk awal tumbuh dan 14,556 untuk pemenuhan miselium (*full colony*) maka dilakukan uji BNT untuk melihat perbedaan dari perlakuan.

Kecepatan tumbuh miselium pada komposisi ampas kelapa 35% ,45% dengan molase 15 ml dan 20 ml menunjukkan hasil yang sangat baik terhadap awal tumbuh miselium dan waktu pemenuhan miselium. Hal ini menunjukkan bahwa ampas kelapa dan molase mampu memberikan nutrisi yang dibutuhkan miselium untuk tumbuh.

Dengan penambahan molase dapat meningkatkan kecepatan awal tumbuh miselium dibanding dengan yang tanpa pemberian molase. Hal ini dijelaskan oleh

peneliti sebelumnya bahwa molase dapat memberikan energi pada miselium dengan kandungan dalam molase yang mengandung sumber energi seperti C, Ca,Cl yang baik terhadap merangsang miselium dan nitrogen yang berkisar 2-6% yang berfungsi untuk membangun miselium. Selain itu menurut Stevia (2011) proses pertumbuhan miselium jamur membutuhkan gula, nitrogen, kalsium, kalium, fosfor dan vitamin B dalam jumlah yang cukup.

Kandungan dalam ampas kelapa yang mengandung karbohidrat, selulosa, lignin, serta protein yang juga dibutuhkan oleh miselium jamur dapat dimanfaatkan dengan baik, selulosa yang juga merupakan karbohidrat jenis polisakarida dapat dengan mudah diurai oleh enzim selulase sehingga mudah diserap oleh jamur sebagai energi dalam pembentukan miselium. Karena kandungan dalam serbuk gergaji kayu, ampas kelapa dan molase yang lebih kompleks serta lingkungan yang cukup sesuai sehingga miselium jamur dapat tumbuh dengan optimal.

Sebagai pengganti dedak padi, ampas kelapa yang masih mengandung serat yang dapat menyerap air dengan baik sehingga kelembapan *baglog* tetap terjaga. Kelembapan yang optimal dapat memberi pengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan miselium. Selain itu, beberapa unsur-unsur yang juga mempengaruhi pertumbuhan miselium jamur yaitu Ca (kalsium), Belerang (S), Mg (Magnesium), P (Fosfor) dan unsur mikro lainnya. Djarijah dan Djarijah (2001) mengemukakan bahwa kandungan kalium berperan dalam menetralkan asam oksalat yang dikeluarkan oleh miselium dan hanya sedikit berperan katalik, yakni sebagai aktivator beberapa enzim pada glikolisis. Belerang (S) diperlukan dalam sintesis protein serta berperan dalam

metabolisme karbohidrata, Mg (magnesium) merupakan unsur yang dibutuhkan oleh semua tumbuhan baik tumbuhan berklorofil maupun bukan. Fosfor (P) merupakan salah satu unsur hara esensial yang sangat diperlukan untuk menunjang perumbuhan jamur. Dalam pembuntukan karbohidrat dibutuhkan elemen Karbon (C), Hidrogen (H) dan Oksigen (O) begitupun Besi (Fe) yang secara tidak langsung berperan dalam metabolisme karbohidrat, dimana karborbohidrat tersebut akan digunakan untuk pertumbuhan jamur.

2. Lebar Tudung

Pengamatan lebar tudung dilakukan di atas kertas milimeter, dengan mengukur keseluruhan lebar jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*). Dari hasil analisis sidik ragam, perlakuan komposisi media ampas kelapa dan molase tidak memberikan pengaruh nyata terhadap lebar tudung jamur sehingga tidak diuji lanjut.

Beberapa perlakuan memberikan hasil yang berbeda-beda dari pengukurannya, perlakuan yang memberikan nilai tertinggi terdapat pada perlakuan S₄A₄M₁ dengan penambahan ampas kelapa 45% dan molase 15 ml dengan rata-rata sebesar 39,36 cm dan nilai yang paling rendah adalah perlakuan S₁A₁M₁ dengan penambahan ampas kelapa 15 % dan molase 15 ml dengan rata-rata sebesar 5,1 cm.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa perlakuan S₄A₄M₁ (Serbuk kayu 60% + Ampas kelapa 45% + molase 15%) memberikan pengaruh optimal terhadap lebar tudung jamur. Penambahan ampas kelapa dalam media dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap lebar tudung jamur. Hal ini dijelaskan oleh Hidayah (2013) bahwa ampas kelapa yang merupakan limbah mengandung selulosa dan

lignin dimana diketahui bahwa kedua kandungan tersebut mampu berperan penting dalam pertumbuhan lebar tudung jamur. Tetapi selulosa tidak dapat dicerna secara langsung oleh jamur melainkan memerlukan beberapa proses kimia lainnya.

Dengan penambahan ampas kelapa 45% dan molase 15 ml memberikan hasil yang baik terhadap diameter tudung, hal ini disebabkan karena adanya ketersediaan dan keseimbangan komposisi nutrisi dalam media tubuh jamur. Pembentukan tubuh jamur membutuhkan berbagai jenis nutrisi seperti gula, nitrogen, kalium, dan vitamin. Menurut Supati dan Marfuah (2015) vitamin mempengaruhi terbentuknya *pinhead* pada jamur tiram dan unsur kalsium mampu memberikan akar dan batang yang kokoh pada jamur tiram.

Pada komposisi media Ampas kelapa 15% dan molase 15 ml tidak memberikan penambahan terhadap lebar tudung jamur tiram coklat. Hal ini dikarenakan nutrisi yang terkandung masih kurang dan sulitnya jamur tiram untuk menyerap nutrisi. Menurut Puspaningrum (2013) adanya kekurangan nutrisi pada media menyebabkan jamur terganggu. Selain itu, menurut Riyati dan Sumarsih (2002) penambahan nutrisi dengan perbandingan tingkat tertentu mampu menyuplai nutrisi untuk pertumbuhan jamur, namun dengan penambahan yang terus meningkat akan mengurangi kandungan lignoselulosa yang dibutuhkan dalam pertumbuhan jamur yang akhirnya akan mempengaruhi banyak sedikitnya tudung jamur yang terbentuk.

Hal ini dijelaskan oleh Purnawanto (2012) bahwa jika jumlah badan buah yang tumbuh semakin sedikit maka diameter tudung jamur akan semakin besar/lebar

Laju pertumbuhan mikrobial juga dipengaruhi oleh konsentrasi komponen-komponen penyusun media pertumbuhan. Suplai sumber karbon merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan optimal, tetapi pada kenyataannya konsentrasi sumber karbon memiliki batas maksimum. Jika konsentrasi sumber karbon melampaui batas maka laju pertumbuhan akan terhambat (Judoamidjojo dalam Saputra, dkk., 2014).

Selain itu diameter tudung buah jamur juga dipengaruhi oleh kadar air, menurut Wiardani (2010) kadar air pada media jamur tiram yaitu sekitar 60%, jika kadar air media terlalu tinggi maka jamur tiram akan terserang penyakit busuk akar, sebaliknya jika kadar air kurang maka miselium jamur tidak bisa menyerap mineral dengan baik sehingga pertumbuhan jamur tidak maksimal.

3. Panjang Tangkai

Panjang tangkai jamur tiram diamati di atas kertas milimeter dan mengukur keseluruhan panjang tangkai dari jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*).

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tumbuh serbuk gergaji kayu dan ampas kelapa dengan molase memberikan pengaruh tidak nyata terhadap panjang tangkai jamur tiram cokelat, artinya tidak ada perlakuan yang berbeda nyata, sehingga tidak diperlukan uji lanjut.

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa nilai yang paling tertinggi untuk panjang tangkai yaitu pada perlakuan S₄A₄M₁ dengan penambahan ampas kelapa 45% dan molase 15 ml dengan rata-rata sebesar 59,3 cm. Hal ini disebabkan karena kandungan pada media masih mampu memenuhi nutrisi yang dibutuhkan jamur tiram, sehingga

menghasilkan panjang tangkai yang lebih panjang. Sedangkan nilai yang paling rendah terlihat pada perlakuan S₁A₁M₁ dengan penambahan 15% ampas kelapa dan molase 15 ml dengan rata-rata 5,46 cm.

Kandungan nutrisi dalam media sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan tubuh buah jamur tiram. Dalam pembentukan tubuh buah jamur diperlukan berbagai macam nutrisi seperti gula, nitrogen, kalium, dan vitamin.

Pelakuan S₄A₄M₁ dengan komposisi ampas kelapa 45% dan molase 15 ml mampu memberikan hasil yang baik pada panjang tangkai jamur tiram karena nutrisi yang terkandung dalam media. Molase yang mengandung kalium, vitamin, nitrogen dan unsur lain mampu diserap oleh jamur tiram. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ipunk dan Saprianto (2010) bahwa dalam merangsang pertumbuhan jamur membutuhkan nitrogen. Senyawa nitrogen dapat diperoleh dari molase yang mengandung 2-6% nitrogen.

Selain itu, nutrisi yang paling penting dalam pembentukan buah jamur adalah karbohidrat. Ampas kelapa yang mengandung karbohidrat seperti, selulosa dan lignin yang akan didegradasi menjadi glukosa dan senyawa-senyawa lain yang mampu memberikan hasil pada pertumbuhan jamur tiram. Menurut Hidayah (2013) jamur tiram mampu merombak selulosa, lignin dan polisakarida lainnya karena jamur tiram mempunyai enzim lignoselulase. Salah satu hasil perombakan tersebut adalah glukosa yang dapat digunakan jamur sebagai sumber karbon.

4. Berat Basah Tubuh Buah

Berat basah tubuh buah merupakan berat jamur yang diambil dalam bentuk jamur segar. Berat tubuh jamur dapat dipengaruhi oleh kelembapan dan suhu kumbung jamur. Jamur yang telah dipanen, dibersihkan dari sisa-sisa media tanam yang menempel kemudian ditimbang.

Dari hasil analisis sidik ragam, perlakuan komposisi serbuk gergaji kayu dengan ampas kelapa dan molase berpengaruh tidak nyata terhadap berat basah tubuh buah jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*) dimana tidak ada perbedaan nyata pada perlakuan sehingga tidak diuji lanjut.

Gambar 4.5. menunjukkan bahwa nilai tertinggi berat tubuh jamur tiram yakni pada perlakuan $S_2A_2M_1$ dengan penambahan 25% ampas kelapa dan 15 ml molase (34,5 gr) sedangkan nilai terendah yakni pada perlakuan $S_1A_1M_1$ dengan penambahan 15 % ampas kelapa dan 15 ml molase (2,12 gr).

Ampas kelapa yang mengandung karbohidrat dapat dimanfaatkan oleh jamur tiram dengan mengubah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Glukosa dan senyawa –senyawa tersebut digunakan sebagai nutrisi cadangan energi untuk menghasilkan berat yang optimal.

Perlakuan $S_2A_2M_1$ dengan komposisi ampas kelapa 25% dan molase 15 ml memberikan pengaruh terhadap berat jamur tiram. Hal ini dikarenakan kandungan karbon yang terdapat dalam ampas kelapa mampu dimanfaatkan oleh jamur tiram. Hal ini juga dijelaskan Susiana (2010) komponen karbohidrat mampu memberikan nutrisi bagi pertumbuhan jamur tiram. Unsur-unsur karbohidrat dapat dipecahkan

oleh enzim yang dikeluarkan miselium menjadi senyawa sederhana berupa glukosa yang menjadi energi untuk metabolisme sehingga jamur tumbuh baik dalam pertumbuhannya yang berpengaruh terhadap berat basah (gr) jamur tiram cokelat (*Pleurotus cyistidiosus*).

Kandungan protein pada ampas kelapa diduga berperan dalam pertumbuhan miselium yang lebih cepat sehingga mempengaruhi pertumbuhan primordia lebih cepat. Menurut Hidayah (2013) pati dan protein akan didegradasi menjadi senyawa yang lebih sederhana yang kemudian akan digunakan untuk pertumbuhan miselium dan membangun enzim yang akan disimpan didalam tubuhnya, karena jamur memanfaatkan nutrisi yang lebih mudah untuk didegradasi, seperti protein.

Selain itu, molase yang mempunyai kandungan fosfor serta nitrogen juga mampu memberikan nutrisi yang baik bagi primordia sehingga berat jamur bertambah.

Menurut Baharuddin, dkk, (2005), terbentuknya sel-sel tubuh buah tidak terlepas dari keberadaan kandungan senyawa yang dibutuhkan oleh jamur pada media tumbuh dalam jumlah yang cukup banyak. Nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium dan perkembangan tubuh buah jamur tiram adalah komponen utama dinding sel yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin serta protein. Setelah terdekomposisi senyawa ini akan menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur. Ini berarti bahwa media tumbuh berperan aktif untuk mensuplai bahan yang dibutuhkan, dimana enzim-enzim yang di keluarkan dapat melakukan metabolisme komponen dinding sel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komposisi media tanam serbuk gergaji kayu dengan penambahan ampas kelapa dan molase memberikan pengaruh sangat nyata terhadap waktu awal tumbuh dan waktu pemenuhan miselium (*full colony*) jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*), tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap lebar tudung, panjang tangkai serta berat basah tubuh buah
2. Komposisi media yang memberikan pengaruh terbaik pada waktu awal pertumbuhan miselium yakni pada perlakuan S₃A₃M₁, S₄A₄M₁ dan S₄A₄M₂ dimana rata-rata kecepataannya yaitu 3 HSI sedangkan hasil terendah yaitu pada perlakuan S₁A₁M₁ dan S₂A₂M₂ dengan rata-rata 6,3 HSI. Media yang terbaik terhadap waktu pemenuhan miselium (*full colony*) yakni pada perlakuan S₃A₃M₀, S₄A₄M₁ dan S₄A₄M₂ dengan rata-rata 25 HSI sedangkan hasil terendah yaitu pada perlakuan S₁A₁M₁ dengan rata-rata 48 HSI. Media tanam S₄A₄M₁ memberikan pengaruh terbaik pada lebar tudung jamur tiram yakni 39,36 cm dan panjang tangkai yakni 59,3 cm. Untuk berat tubuh S₂A₂M₁ memberikan hasil yang baik yakni 34,5 gr. Sedangkan perlakuan S₁A₁M₁ memberikan hasil terendah pada lebar tudung, panjang tangkai dan berat basah.

B. Implikasi Penelitian (Saran)

1. Serbuk gergaji kayu, ampas kelapa serta molase merupakan limbah yang dapat dimanfaatkan/ digunakan sebagai alternatif media tanam jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*).
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan media ampas kelapa dengan pencampuran media lainnya.



KEPUSTAKAAN

- Achmad, dkk. *Panduan Lengkap Jamur*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2013.
- Ahmad, E.N., Herliyana, I.Z., Siregar., Permana, O. Karakter Morfologi dan Genetik Jamur Tiram (*Pleurotus* spp.). *Jurnal Hort. Vol 21, No.3, 2011*.
- Agus, G.T.K. *Budidaya Jamur Shitake, Kuping, Tiram, Lingzhi dan Merang*. Jakarta: Agromedia Pustaka 2006.
- Baharuddin, M.T., Arfah, dan Syahidah., Pemanfaatan Serbuk Kayu Jati (*Tectona grandis* l.) yang Direndam dalam Air Dingin Sebagai Media Tumbuh Jamur Tiram (*Pleurotus comunicipae*). *Jurnal Perenial Vol 2, No 1, Hal 1-5. 2005*.
- Bala Subbramaniam, K. Polysaccharides of the Kernel of Maturing and Matured Coconuts. *J. of Food Sci.* 41:1370-1371, 1976.
- Cahayana., Muchrodji., dan Bakrun, M. *Jamur Tiram*. Jakarta: PT.Penerbit Swadaya, 1997.
- Chazali, Syammanhfuz dan Pratiwi, S Putri. *Usaha Jamur Tiram: Skala Rumah Tangga*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2009.
- Djarajah, NM dan Djarajah A.S. *Budaya Jamur Tiram*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Ekowati, Nuraeni. *Tinjauan Biologi Jamur Tiram (Pleurotus spp)*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2014.
- Elyana, Puri. Pengaruh Penambahan Ampas Kelapa Hasil Fermentasi *Aspergillus oryzae* dalam Pakan Komersial Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila (*Oreochromis niloticus* Linn). *Skripsi, Universitas Sebelas Maret*. Surakarta, 2011.
- Gandjar, Indrawati., Syamsuridzal W., Oetari A., *Mikrologi Dasar dan Terapan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Gunawan, A.W. *Usaha Pembibitan Jamur*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Hidayah, *Pengaruh Campuran Media Tanam Serbuk Sabuk Kelapa dan Ampas Tahu Terhadap Diameter Tudung dan Berat Basah Jamur Tiram (Pleurotus Ostreatus)*. Unpublished Paper. Program Sarjana IKIP PGRI Semarang, 2013.

- Ipunk Y. dan C. Saprianto.. *Usaha 6 Jenis Jamur Skala Rumah Tangga*. Jakarta; Penebar Swadaya. 2010
- Juhaeni, Ade H., Fitri,Kurniati., dan Undang. Pengaruh Penambahan Berbagai Komposisi Nutrien Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*), *Jurnal Agrophantha UNSIL, Vol 5(12)* 2014.
- Juwita, Ratna. Studi Produksi Alkohol dari Tetes Tebu (*Saccharum officinarum L*) selama Proses Fermentasi. *Skripsi, Universitas Hasanuddin*. Makassar, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah-Nya*. Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif Medina Munawwarah P.O. Box 6262 Kerajaan Arab Saudi, 2012.
- Kudahewa D.D., Abeytunga D.T.U., Ratnasooriya W.D., Antinociceptive Activity of *Pleurotus cystidiosus*, An Edible Mushroom In Rats. *Pharmacognosy Magazine, Vol 4 (13)* 2008.
- Maulana. *Panen Jamur Tiap Musim*. Lampung, Lily Publisher, 2011.
- Meinanda I. *Panen Cepat Budidaya Jamur*. Bandung: Padi, 2013.
- Mudakir, Imam,. Dkk. Pengaruh Limbah Kulit Kakao Sebagai Media Tanam Terhadap Produktivitas dan Kandungan Gizi Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus cystidiosus*). *Jurnal of Biology, Agriculture and Healthcare, Vol 4, No. 24*, 2014.
- Pratiwi, T Sylvia. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Penertbit Erlangga, 2008.
- Pradipta, N.A.D, Agnes. Pengaruh Ethyl Methan Sulfonate (EMS) Terhadap Produksi Ekspolisakarida (EPS) Pada Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus cystidiosus* O.K. Mill). Depok; *Skripsi, Universitas Indonesia*, 2008.
- Purnawanto, AM., Hajoeningtjas, OD,. Dan Utami, P., Pengaruh Takaran Bekatul dan Pupuk Organik terhadap Hasil Jamur Tiram Putih (*Pleurotus cystidiosus*). Purwokerto:*Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2012.
- Puspaningrum, Indah dan Suparti. Produksi Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) Pada Media Tambahan Molase Dengan Dosis yang Berbeda. Seminar nasional X, 2013.

- Riyati R. dan S. Sumarsih. Pengaruh perbandingan bagas dan blotong terhadap pertumbuhan dan produksi jamur tiramputih (*Pleurotus ostreatus*). *Jurnal Ilmiah Agrivet :Vol 1, No10*. 2002.
- Saputra, D.Y. Nurmiati, Periadnadi. Pengaruh Pengaturan Keasaman Limbah Industri Teh Terhadap Produksi Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus cystidiosus* O.K. Miller). *BioETI Vol 10, No 1, Hal: 25-34*, 2013
- Seswati, Dkk. Pengaruh Pengaturan Keasaman Media Serbuk Gergaji Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus cystidiosus* O.K.Miller.) *J.Bio.Universitas Andalas, Vol 2, No.1*, 2013.
- Setiagama, R. Pertumbuhan Dan Produktivitas Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*) Dengan Komposisi Media Tumbuh Serbuk Gergaji Kayu Sengon, Tandan Kosong Kelapa Sawit, Dan Ampas Tahu Yang Berbeda. Surakarta: *Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2014.
- Shihab, Q.M. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011.
- Slamet, K. Pengembangan usaha budidaya jamur tiram putih di jawa barat melalui pembangunan industri terpadu. Bandung: Proposal MAJI., 2005.
- Suhardiman, P. *Jamur Kayu*. Jakarta: Penebar Swadaya. 1989.
- Supati dan Marfuah. M., Produktivitas Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Pada Limbah Sekam Padi dan Daun Pisang Kering Sebagai Media Alternatif. *Jurnal Bioeksperimen, Vol.1 No.2*.2015
- Suriawiria, U. *Pengantar Untuk Mengenal dan Menanam Jamur*. Bandung: ITB press, 1993
- Suriawiria, U. *Budidaya Jamur Tiram*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Susiana, S. *Untung Besar Usaha Bibit Jamur Tiram*. Jakarta: Penebar Sawadaya, 2010.
- Steviani, S. Pengaruh Campuran Media Tanam Serbuk Sabut Kelapa dan Ampas Tahu Terhadap Diameter Tudung Dan Berat Basah Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*). *Skripsi. Fakultas Pertanian Sebelas Maret*. Surakarta. 2011.
- Tim Penulis Agriflo. *Jamur: Info Lengkap dan Kiat Sukses Agribisnis*. Jakarta: Agriflo, 2012.

- Tim Penulis PS. *Pembudidayaan Tebu di Lahan Sawah dan Tegalan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 1995.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan Rendah*. Yogyakarta: UGM Press, 2014.
- Tjokrokusumo. D, Hendritomo. H.I, Widyastuti. N. Pengaruh Penambahan Dedak dan Molase pada Substrat Pertumbuhan Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus cystidiosus*). *Jurnal Biotika*, Vol. 3 No.2. 2004.
- Wiardani, I. *Budi Daya Jamur Konsumsi Menangguk Untung dari Budi Daya Jamur Tiram dan Kuping*. Yogyakarta; Lili Publisher. 2010.
- Wardi, dkk. *Budidaya Jamur, Pembuatan Nata, Yoghurt, dan Budidaya Azolla*. Malang: Tim Biotek, 2006
- Wijoyo, P.M. *Cara Budi daya Jamur Tiram Yang Menguntungkan*. Jakarta: Pustaka Agro Indonesia, 2011.
- Yamin, M. Pemanfaatan Ampas Kelapa dan Ampas Kelapa Fermentasi dalam Ransum terhadap Efisiensi Ransum dan *Income Over Feed Cost* Ayam Pedaging. *Jurnal Agroland*, Vol. 15, 2008.
- Yuditian, R. *Budidaya Jamur Tiram Putih untuk Pemula*. Bandung: Pribumi Mekar, 2006.
- Zervakis I, Georgios. Mating Competence and Biological Species Within The Subgenus *Coremiopleurotus*. *Mycologia* Vol. 90, No.6. 1998.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel

Tabel lampiran 1a. Waktu awal tumbuh miselium jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*)

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata
	I	II	III		
S ₁ A ₀ M ₀	5	5	5	15	5
S ₁ A ₁ M ₀	5	5	7	17	5,6
S ₁ A ₁ M ₁	5	7	7	19	6,3
S ₁ A ₁ M ₂	5	5	5	15	5
S ₂ A ₂ M ₀	7	5	5	17	5,6
S ₂ A ₂ M ₁	7	3	5	15	5
S ₂ A ₂ M ₂	7	7	5	19	6,3
S ₃ A ₃ M ₀	5	5	5	15	5
S ₃ A ₃ M ₁	3	3	3	9	3
S ₃ A ₃ M ₂	3	5	3	11	3,6
S ₄ A ₄ M ₀	5	3	5	13	4,3
S ₄ A ₄ M ₁	3	3	3	9	3
S ₄ A ₄ M ₂	3	3	3	9	3
Total	63	59	61	183	60,7

Tabel lampiran 1b. Sidik ragam waktu awal tumbuh miselium jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*)

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Perlakuan	52,308	12	4,359	4,722**	,000
Galat	24,000	26	,923		
Total	76,308	38			

Keterangan: **= sangat nyata

Tabel lampiran 2a. Waktu pemenuhan miselium (*full colony*) jamur tiram coklat (*Pleurotus Cystidiosus*)

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata
	I	II	III		
S ₁ A ₀ M ₀	29	29	27	85	28,3
S ₁ A ₁ M ₀	48	48	48	144	48
S ₁ A ₁ M ₁	37	29	48	114	38
S ₁ A ₁ M ₂	27	27	29	83	27,6
S ₂ A ₂ M ₀	29	29	29	87	29
S ₂ A ₂ M ₁	24	27	29	80	26,6
S ₂ A ₂ M ₂	27	29	27	83	27,6
S ₃ A ₃ M ₀	24	24	27	75	25
S ₃ A ₃ M ₁	27	24	27	78	26
S ₃ A ₃ M ₂	27	27	24	78	26
S ₄ A ₄ M ₀	27	27	27	81	27
S ₄ A ₄ M ₁	27	24	24	75	25
S ₄ A ₄ M ₂	24	27	24	75	25
Total	377	371	390	1138	379,1

Tabel lampiran 2b. Sidik ragam waktu pemenuhan miselium (*full colony*) jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*)

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Perlakuan	1563,077	12	130,256	14,556**	,000
Galat	232,667	26	8,949		
Total	1795,744	38			

Keterangan: **= sangat nyata

Tabel lampiran 3a. Lebar tudung jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*)

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata
	I	II	III		
S ₁ A ₀ M ₀	49,1	32,6	0	81,7	27,56
S ₁ A ₁ M ₀	16,2	0	0	16,2	5,4
S ₁ A ₁ M ₁	0	0	15,3	15,3	5,1
S ₁ A ₁ M ₂	28,5	46,6	0	75,1	25,03
S ₂ A ₂ M ₀	38,11	0	0	38,11	12,7
S ₂ A ₂ M ₁	33,3	39,1	42,2	114,6	38,2
S ₂ A ₂ M ₂	20,91	28	0	48,91	16,3
S ₃ A ₃ M ₀	12,2	22,2	0	34,4	11,46
S ₃ A ₃ M ₁	23,8	0	40,2	64	21,33
S ₃ A ₃ M ₂	0	0	19,1	19,1	6,36
S ₄ A ₄ M ₀	41,3	4,5	0	45,8	15,26
S ₄ A ₄ M ₁	68,5	49,6	0	118,1	39,36
S ₄ A ₄ M ₂	68,4	0	20,3	88,7	29,56
Total	400,32	222,6	137,1	761,02	253,62

Tabel lampiran 3b. Sidik ragam lebar tudung jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*)

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Perlakuan	4986,850	12	415,571	,942 ^{tn}	,523
Galat	11466,333	26	441,013		
Total	16453,183	38			

Keterangan: tn= tidak nyata

Tabel lampiran 4a. Panjang tangkai (cm) jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*)

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata
	I	II	III		
S ₁ A ₀ M ₀	46,8	31	0	77,8	25,93
S ₁ A ₁ M ₀	29,4	0	0	29,4	9,8
S ₁ A ₁ M ₁	0	0	16,4	16,4	5,46
S ₁ A ₁ M ₂	45,4	46,2	0	91,6	30,53
S ₂ A ₂ M ₀	44,3	0	0	44,3	14,76
S ₂ A ₂ M ₁	46,7	41,9	30,6	119,2	39,73
S ₂ A ₂ M ₂	27,5	39,1	0	66,6	22,2
S ₃ A ₃ M ₀	12,1	38,7	0	50,8	16,93
S ₃ A ₃ M ₁	20,2	0	73,7	93,9	31,3
S ₃ A ₃ M ₂	0	0	33,8	33,8	11,26
S ₄ A ₄ M ₀	43,6	19,2	0	62,8	20,93
S ₄ A ₄ M ₁	91,1	86,8	0	177,9	59,3
S ₄ A ₄ M ₂	81,5	0	52,7	134,2	44,73
Total	488,6	302,9	207,2	998,7	332,86

Tabel lampiran 4b. Sidik ragam panjang tangkai jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*)

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Perlakuan	8534,128	12	711,177	,941 ^{tn}	,524
Galat	19640,900	26	755,419		
Total	28175,028	38			

Keterangan: tn= tidak nyata

Tabel lampiran 5a. Berat basah jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*)


Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata-rata
	I	II	III		
S ₁ A ₀ M ₀	27,88	13,39	0	41,27	13,75
S ₁ A ₁ M ₀	10,7	0	0	10,7	3,56
S ₁ A ₁ M ₁	0	0	6,37	6,37	2,12
S ₁ A ₁ M ₂	29,81	39,65	0	69,46	23,15
S ₂ A ₂ M ₀	35,1	0	0	35,1	11,7
S ₂ A ₂ M ₁	20,34	48,86	34,31	103,51	34,5
S ₂ A ₂ M ₂	28,14	25,18	0	53,32	17,77
S ₃ A ₃ M ₀	5,17	6,01	0	11,18	3,72
S ₃ A ₃ M ₁	15,57	0	18,31	33,88	11,29
S ₃ A ₃ M ₂	0	0	9,62	9,62	3,2
S ₄ A ₄ M ₀	38	4,34	0	42,34	14,11
S ₄ A ₄ M ₁	51,03	19,41	0	70,44	23,48
S ₄ A ₄ M ₂	40,21	0	17,28	57,49	19,16
Total	301,95	156,84	85,89	544,68	181,51

Tabel lampiran 5b. Sidik ragam berat basah jamur tiram cokelat (*Pleurotus cystidiosus*)

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Perlakuan	3358,677	12	279,890	1,149 ^{tn}	,367
Galat	6334,905	26	243,650		
Total	9693,582	38			

Keterangan: tn= tidak nyata

Lampiran 2. Skema Penelitian



Lampiran 3. Lay Out

S ₁ A ₁ M ₂ 1	S ₁ A ₁ M ₁ 3	S ₂ A ₂ M ₁ 3	S ₁ A ₁ M ₀ 1	S ₄ A ₄ M ₂ 1	S ₁ A ₀ M ₀ 2	S ₁ A ₁ M ₁ 1	S ₄ A ₄ M ₀ 3	S ₂ A ₂ M ₁ 1	S ₁ A ₁ M ₂ 3	S ₂ A ₂ M ₂ 1	S ₃ A ₃ M ₀ 2	S ₃ A ₃ M ₁ 1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

S ₁ A ₀ M ₀ 3	S ₂ A ₂ M ₀ 2	S ₁ A ₁ M ₀ 2	S ₁ A ₁ M ₁ 2	S ₂ A ₂ M ₂ 3	S ₃ A ₃ M ₂ 2	S ₂ A ₂ M ₀ 1	S ₄ A ₄ M ₂ 3	S ₃ A ₃ M ₁ 3	S ₄ A ₄ M ₁ 1	S ₄ A ₄ M ₂ 2	S ₃ A ₃ M ₁ 2	S ₃ A ₃ M ₀ 1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

S ₄ A ₄ M ₁ 2	S ₃ A ₃ M ₂ 3	S ₄ A ₄ M ₀ 2	S ₄ A ₄ M ₁ 3	S ₂ A ₂ M ₂ 2	S ₁ A ₁ M ₀ 3	S ₁ A ₁ M ₂ 2	S ₂ A ₂ M ₁ 2	S ₃ A ₃ M ₂ 1	S ₂ A ₂ M ₀ 3	S ₄ A ₄ M ₀ 1	S ₁ A ₀ M ₀ 1	S ₃ A ₃ M ₀ 3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



B. Alat dan Bahan

1. Alat



Terpal



Timbangan 3 kg



Baskom



Plastik 18x30



Gelas ukur



Drum



Tabung gas



LAF



Neraca Analitik



Aluminium foil



Spiritus



Pinset



Gunting



Thermometer



Baki



Ketas milimeter

2. Bahan



Serbuk gergaji kayu



Ampas kelapa

CaCO₃

Dedak padi



Molase



Bibit jamur tiram F2



Alkohol 96%



Tali rafia



Pipa paralon



Label



Karet gelang

C. Prosedur Kerja

1. Menimbang bahan




2. Pencampuran/ pengadukan bahan



3. Pembuatan Baglog



4. Sterilisais baglog



5. Penanaman bibit jamur F2 (Inokulasi)



6. Inkubasi



7. Penyiraman



8. Penimbangan



9. Pengukuran



D. Hasil

- a. Hasil terbaik pada waktu awal tumbuh miselium (HSI)



Hasil terbaik pada waktu awal tumbuh miselium (HSI) adalah S₃A₃M₁, S₄A₄M₁ dan S₄A₄M₂.

- b. Hasil terbaik pada waktu pemuhan miselium (*full colony*) (HSI)



Hasil terbaik pada waktu pemuhan miselium (*full colony*) (HSI) adalah S₃A₃M₀, S₄A₄M₁ dan S₄A₄M₂.

- c. Hasil terbaik pada lebar tudung dan panjang tangkai jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*)



Hasil terbaik pada lebar tudung dan panjang tangkai adalah S₄A₄M₁.

d. Hasil terbaik pada berat basah jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*)



Hasil terbaik pada berat basah jamur tiram coklat (*Pleurotus cystidiosus*) adalah S₂A₂M₁



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUSFIRAH, lahir di Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, pada tanggal 29 Agustus 1995. Penulis adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara yang lahir dari pasangan Ayahanda Alimuddin Tase dan Ibunda Nikmah Nuspin. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2001-2007 di SDN 248 Kampung Baru. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bajo Kab. Luwu dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Kamanre, Kab. Luwu dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di bangku kuliah pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi melalui jalur SBMPTN