

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA NY “R”
USIA KEHAMILAN TRIMESRTER III SAMPAI POST PARTUM MINGGU
KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK PUTING DI PUSKESMAS BARA-
BARAYA MAKASSAR TANGGAL 17 SEPTEMBER-04
NOVEMBER TAHUN 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan pada Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:
RISWIKA HALTITAH
70400115072**

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riswika Haltitah

Nim : 70400115072

Tempat,Tanggal Lahir : Sanuale, 08 Agustus 1996

Jurusan/Prodi : DIII Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma III

Alamat : BTN. Pesona Mutiara Pallangga P1/No.4

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ny
“R” Usia Kehamilan Trimester III Sampai Post Partum
Minggu Ke-IV Dengan Kelainan Bentuk Puting Di
Puskesmas Bara-baraya Makassar Tanggal 17 September-
04 November Tahun 2018.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, November 2018
Penyusun

Riswika Haltitah
NIM: 70400115072

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Riswika Haltitah
NIM : 70400115072
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ny "R" Usia
Kehamilan Trimester III Sampai Post Partum Minggu Ke-IV Dengan
Kelainan Bentuk Puting Di Puskesmas Bara-baraya Makassar
Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018.

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 14 November 2018

Pembimbing I



Firdayanti, S.SiT., M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 001

Pembimbing II



dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes
NIP: 19810623 201101 2 009

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III Sampai Post Partum Minggu Ke-IV Dengan Kelainan Bentuk Puting Di Puskesmas Bara-baraya Makassar Tanggal 17 September-04 November 2018”**. Yang disusun oleh **Riswika Haltitah, NIM: 70400115072**. Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 14 November 2018 M**, bertepatan dengan **Tanggal 06 Rabiul Awal 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 14 November 2018 M
06 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin. M. Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S. SiT., SKM., M. Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S. SiT., M. Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Sitti Rahma, M. Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Darmawansyih, M. Kes.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Siti Aisyah Kara, Ph. D	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin. M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil ‘Alaamiin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat Menyelesaikan laporan tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ny ”R” Usia Kehamilan Trimester III Sampai Post Partum Minggu Ke-IV Dengan Kelainan Bentuk Puting Di Puskesmas Bara-baraya Makassar Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018”** dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Sehingga penulis dapat mempersembahkan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai hadiah istimewa dan sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuanya yaitu bapak Alm.Kamaruddin Mas’ud dan ibu Halmiati yang tidak pernah bosan untuk memberikan doa serta dukungan moril maupun moral meskipun penulis mengetahui bahwa karya tulis ini tidak bisa membalas kedua orang tuanya namun setidaknya karya tulis ini bisa membuat orang tuanya menjadi bangga dan tersenyum bahagia.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibunda Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan
4. Ibunda Firdayanti, S.SiT., M.Keb selaku Sekertaris Jurusan Prodi Kebidanan sekaligus sebagai Pembimbing I yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Ibunda dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membimbingku dan memberi saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibunda dr. Darmawansyih, M.Kes selaku Penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibunda Prof. DR. Hj. Sitti Aisyah Kara, Ph.D selaku Penguji II Agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar Program Studi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.

9. Direktur Puskesmas Bara-baraya Makassar dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
10. Kakak-kakak sepupu saya yang telah banyak mendoakan Suryani S.Pd., M.Si, Nurul Aini, Hijrayani, S.KM, dan Rustam Efendi dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
11. Adik-adik saya Rika Helka, Reni Helmi, Anggara Karta, dan Riska Amanda yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
12. Kakak-kakak saya yang telah banyak membantu Nurfaidah, Nur haerati dan mendoakan penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
13. Kepada sahabatku A.Ulvia Ramadhani Firdaus, Salsa Putri Aulia dan Afifah Idelma Makmur yang selalu membantu, memberikan dukungan semangat dan mendoakan penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
14. Kepada seluruh teman-teman Kebidanan Angkatan 2015 serta adik-adik Kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan.

Ilmu merupakan penghias ibadah manusia kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri. Ketika ilmu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diamalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang benar maka akan sangat indah manfaat yang diraih.

Namun bila ilmu dipelajari dengan setengah-setengah dan dimanfaatkan semaunya tanpa tahu tujuannya benar atau tidak, maka ilmu itu akan merusak citra keindahan. Inilah yang sangat penting kita pahami agar tidak sembarangan

mempergunakan ilmu dalam kehidupan kita. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dipelajari dengan niat baik dan tulus untuk diamalkan di jalan Allah SWT melalui kehidupan umat manusia sebagai perantaranya.

Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Innamal a’malu bin niyyah*” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat), kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, November 2018

Penyusun,

Riswika Haltitah
NIM: 70400115072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penulisan.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anatomi Payudara dan Proses Laktasi	13
B. Tinjauan Khusus Tentang Tentang Kelainan Bentuk Puting	22
C. Tinjauan Agama Islam Tentang Penyakit dan Menyusui Pada Masa Nifas	43

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	50
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan	75

BAB III STUDI KASUS

A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.....	77
B. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 17 September 2018.....	91
C. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 19 September 2018.....	98
D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 22 September 2018.....	105
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 24 September 2018.....	112
F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 26 September 2018.....	119
G. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 28 September 2018.....	125
H. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 02 Oktober 2018.....	130
I. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 09 Oktober 2018.....	135
J. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan tanggal 04 November 2018.....	140

BAB IV PEMBAHASAN

A. Asuhan Masa Kehamilan	153
B. Asuhan Masa Nifas	169

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	172
B. Saran	174

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kunjungan Asuhan Masa Kehamilan	150
Tabel 3.2 Kunjungan Asuhan Masa Nifas	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bentuk-Bentuk Putting Susu	25
Gambar 2.2 Anatomi Payudara.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi (Kepala balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran II : Surat Izin atau Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Kepala Puskesmas Bara-Baraya Makassar
- Lampiran III : Surat Izin Pengambilan Data Awal di Puskesmas Bara-Baraya Makassar
- Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Puskesmas Bara-Baraya Makassar
- Lampiran V : Gambar Kunjungan
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, NOVEMBER 2018**

Riswika Haltitah, 70400115072

Pembimbing I : Firdayanti

Pembimbing II : Andi Sitti Rahma

“Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ny. “R” Usia Kehamilan Trimester III Sampai Post Partum Minggu Ke-IV Dengan Kelainan Bentuk Puting Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018”

Air Susu Ibu merupakan makanan pertama, utama, dan terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah. ASI mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir yang akhirnya bertujuan untuk menurunkan angka kematian pada bayi. Salah satu faktor yang berpengaruh pada ibu dalam pemberian ASI adalah bentuk puting payudara.

Laporan Tugas Akhir ini memaparkan pelaksanaan Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III Sampai Post Partum Minggu Ke-IV Dengan Kelainan Bentuk Puting Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018” dengan menggunakan pendekatan 7 langkah Hellen Varney dalam bentuk pendokumentasian SOAP.

Hasil dari Laporan Tugas Akhir ini pada Ny “R” dengan data subjektif, yaitu ibu mengatakan putingnya terbenam dan data objektif didapatkan bahwa puting payudara ibu mengkerut ke dalam, tampak berisi, tidak ada nyeri tekan serta tidak ada benjolan dan massa.

Kesimpulan dari Laporan Tugas Akhir ini yaitu telah dilakukannya asuhan pada masa kehamilan sampai akhir masa nifas. Asuhan yang diberikan berupa tindakan dengan menggunakan spoit, urutan, nipple pam, teknik hoffman serta perawatan payudara sehingga memberikan perubahan yang signifikan dalam bentuk puting payudara menjadi menonjol dan ASI keluar banyak serta bayi menyusui dengan baik . Tidak ada masalah dalam pemberian ASI dan tidak ada infeksi, masa nifas berjalan dengan normal, ibu tetap menyusui bayinya hingga sampai bayi berusia 6 bulan, serta memotivasi ibu untuk tetap memberikan ASI sampai berusia 2 tahun.

Daftar pustaka : 54 (2002-2018)

Kata Kunci : ASI, Puting Terbenam, Perawatan Payudara, Teknik Menyusui

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, NOVEMBER 2018

Riswika Haltitah, 70400115072
Supervisor I : Firdayanti
Supervisor II : Andi Sitti Rahma

“The Continuous Obstetric Care Management on Mrs. “R” from the Trimester III Pregnancy Age to the Week IV Post Partum with the Abnormal Shape of Nipple at Bara-Baraya Makassar Public Health Center, on September 17 – November 04, 2018”

Breast milk is the first, the foremost, and the best natural food for babies. Breast milk contains various nutrients required in the process of growth and development of newborns which ultimately aims to reduce mortality in infants. One of the factors influencing the mother in breastfeeding is the shape of the nipple.

This Final Project Report describes the implementation of Continuous Obstetric Care Management on Mrs. "R" from the Trimester III Pregnancy Age to the Week IV Post Partum with the Abnormal Shape of Nipple at Bara-Baraya Makassar Public Health Center, on September 17–November 04, 2018 using a 7-step approach by Hellen Varney in the form of SOAP documentation.

The results of this Final Project Report on Mrs. "R" with the subjective data revealed that the mother's nipples were immersed based on her statement, but as a matter of fact, her nipples were shrunk inward, appeared to be fleshy, no tenderness and no lumps and mass.

The conclusion of this Final Project Report is a care during the pregnancy until the end of the poerperium has been applied. The cares provided were in the form of actions using the syringe, sequence, nipple pam, hoffman techniques and breast care so as to provide significant changes in the form of nipples becoming protrude and the breast milk came out a lot and the baby was breastfeeding well. There were no problems in breastfeeding and no infections, the postpartum period went normally, the mother continued to breastfeed the baby until the baby was 6 months old, and motivated the mother to continue breastfeeding until the baby was 2 years old.

Bibliography : 54 (2002-2018)

Keywords : Breast Milk, Shrunk Inward Nipples, Breast Care, Breastfeeding Techniques



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air Susu Ibu merupakan makanan pertama, utama, dan terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah. ASI mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir yang akhirnya bertujuan untuk menurunkan angka kematian pada bayi. Tahun 2010, empat negara ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Laos dan Kamboja termasuk kelompok negara yang memiliki Angka Kematian Bayi sedang yaitu 20-49 per 1.000 kelahiran hidup (Sari dan Susi, 2015: 27).

Salah satu faktor fisik ibu dalam pemberian ASI adalah bentuk puting payudara. Bentuk payudara pada anak-anak, remaja, ibu menyusui, maupun lansia tentunya berbeda karena adanya perbedaan fungsi di tiap perkembangannya. Begitu juga dengan bentuk puting payudara yang tidak sama disemua ibu menyusui. Hal ini sesuai dengan pandangan Cadweel dan Maffei (2011) yang menyatakan bahwa bentuk puting payudara terdiri dari puting yang menonjol, rata atau masuk ke areola.

Terdapat masalah-masalah yang sering timbul selama menyusui dapat dimulai sejak sebelum persalinan, masa pasca persalinan dini (masa nifas/laktasi), masa pascapersalinan lanjut dan juga masalah menyusui dapat timbul pula karena keadaan-keadaan khusus. Masalah-masalah yang sering terjadi pada saat menyusui

yaitu salah satunya adalah puting susu yang tidak menonjol atau terbenam (Nugroho, 2013: 51).

Puting susu yang tidak menonjol atau datar merupakan puting susu yang kurang menguntungkan dan hal ini sebenarnya tidak selalu menjadi masalah (Dewi, 2013). Kenyataan tersebut dapat diantisipasi dengan dilakukannya perawatan payudara.

Perawatan payudara merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui nantinya, hal ini dikarenakan payudara merupakan organ esensial penghasil ASI yaitu makanan pokok bayi baru lahir sehingga perawatannya harus dilakukan sedini mungkin (Indrasari, 2016:1-2).

Sebagian besar para ibu hamil tidak melakukan perawatan payudara karena kurangnya pengetahuan dalam perawatan payudara itu sendiri, kurangnya informasi tentang perawatan payudara seperti puting susu tidak menonjol, atau datar, karena keadaan buah dada khususnya puting susu merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses laktasi, kurangnya kesadaran para ibu akan pentingnya perawatan payudara selama kehamilan, tidak adanya dukungan dari keluarga untuk melakukan perawatan payudara sejak masa kehamilan, dan belum diberikannya pendidikan kesehatan oleh petugas kesehatan tentang perawatan payudara selama kehamilan (Indrasari, 2016:2).

Berdasarkan laporan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2007) sepertiga wanita di dunia (38%) didapati tidak menyusui bayinya karena

terjadinya pembengkakan payudara, dan di Indonesia angka cakupan ASI Eksklusif mencapai 32,3% ibu yang memberikan ASI Eksklusif pada anak mereka. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2008-2009) menunjukkan bahwa 55% ibu menyusui mengalami mastitis dan puting susu lecet kemungkinan hal tersebut disebabkan karena kurangnya perawatan payudara selama kehamilan. ASI Eksklusif diberikan sampai 6 bulan dengan menerapkan hal-hal berikut Inisiasi menyusui dini selama satu jam setelah kelahiran bayi, ASI diberikan secara On demand atau sesuai kebutuhan bayi (Dewi dkk (2011) dalam Risnaeni (2015)).

Menurut *World Health Organisation* (WHO) merekomendasikan agar bayi baru lahir mendapat ASI eksklusif (tanpa tambahan apa-apa) selama enam bulan. Namun hanya 35,5% bayi berusia kurang dari 6 bulan di dunia mendapatkan ASI eksklusif, sedangkan di negara berkembang dan di Asia masing-masing sebesar 37% dan 41% (Kusumaningrum, 2016: 23-24).

WHO dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dalam "*Global Strategy for Child Feeding*" merekomendasikan 4 hal penting yang sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu : pertama, memberikan ASI segera dalam waktu 30 menit setelah dilahirkan, kedua memberikan hanya ASI saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, ketiga memberikan 27 makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan atau lebih, keempat yaitu meneruskan

pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih (Profil Dinkes Prov. Sulawesi, 2016: 26-27).

Data perempuan yang mengalami kelainan puting dan menyebabkan terjadinya bendungan ASI, infeksi, mastitis, bahkan sampai abses pada payudara di Indonesia berdasarkan penelitian yaitu terbanyak pada ibu-ibu bekerja sebanyak 16% dari ibu menyusui (Depkes RI, 2012). Efek yang ditimbulkan dari kelainan bentuk puting pada ibu nifas yaitu: puting susu nyeri, puting susu lecet, payudara bengkak, sindrom ASI kurang, ibu yang bekerja, ibu yang memiliki penyakit tertentu (HbsAg, HIV/AIDS, TBC, Diabetes) sehingga ibu nifas lebih mementingkan bayinya diberikan susu formula dan tidak memberikannya ASI eksklusif sehingga memiliki efek pada kondisi ibu dan bayinya.

Namun sebagian ibu mengganti Air Susu Ibu (ASI) dengan susu formula yang secara jelas ASI jauh lebih banyak kandungannya dan dibutuhkan oleh tubuh bayi untuk memenuhi semua asupan yang diperlukan bayi yang sudah tersedia di Air Susu Ibu (ASI). Hal ini merupakan bukti bahwa adanya perubahan sosial budaya dan pemahaman yang dapat berakibat terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi di Indonesia sebagai calon generasi selanjutnya. Peningkatan pemberian ASI perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan bagi bayi dan ibu, upaya tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara pemberian ASI secara dini (Kepmenkes, 2002).

Upaya peningkatan cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dilakukan dengan berbagai strategi, mulai dari penyusunan kerangka regulasi,

peningkatan kapasitas petugas dan promosi ASI eksklusif. Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan PERDA No.6 tentang ASI eksklusif kemudian pada tahun 2011 diterbitkan PERGUB No.68 tentang ASI eksklusif dan tahun 2012 diterbitkan pula Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (PP No 33 tahun 2012) (Profil Dinkes Prov. Sul-sel, 2016: 26-27).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medik Puskesmas Bara-Baraya pada bulan Januari–Desember 2017 jumlah keseluruhan ibu nifas yang tercatat yaitu 345 orang, diantaranya sebanyak 39 ibu mengalami kelainan bentuk puting. Walaupun angka kejadian kelainan bentuk puting tidak terlalu signifikan, namun ini tetap menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan, sebab kelainan bentuk puting pada ibu sangat mempengaruhi dalam pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus kelainan bentuk puting. Sehingga, penulis menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III sampai Post Partum Minggu Ke-IV dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018”.

B. Ruang Lingkup pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah meliputi Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Ny “R” Usia Kehamilan

Trimester III sampai Post Partum Minggu Ke-IV dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III sampai Post Partum Minggu Ke-IV dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018 dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dapat melaksanakan pengkajian dan analisis data pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III sampai Post Partum Minggu Ke-IV dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018.
- b. Dapat merumuskan diagnosa/masalah aktual pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III sampai Post Partum Minggu Ke-IV dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018.
- c. Dapat mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III sampai Post Partum Minggu Ke-IV dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018.

- d. Dapat merencanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III sampai Post Partum Minggu Ke-IV dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018.
- e. Dapat melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III sampai Post Partum Minggu Ke-IV dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018.
- f. Dapat mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III sampai Post Partum Minggu Ke-IV dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018.
- g. Dapat mendokumentasikan tindakan yang telah diberikan pada Ny “R” Usia Kehamilan Trimester III sampai Post Partum Minggu Ke-IV dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian di atas adapun manfaat penulisan pada kasus tersebut adalah:

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan ujian akhir dan menetapkan ilmu yang telah didapatkan pada jenjang pendidikan Program

Diploma III Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat bagi institusi

Sebagai bahan bacaan bagi peneliti berikutnya di bidang kesehatan, dalam proses peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya asuhan pada post natal care dan sebagai masukan serta pertimbangan dalam penelitian berikutnya terutama mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Program Diploma III Kebidanan dalam pelaksanaan Manajemen Asuhan Kebidanan.

3. Manfaat bagi ilmiah

Sebagai bahan acuan/pedoman bagi institusi jurusan Kebidanan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta sebagai pengalaman dan pembelajaran berharga yang dapat meningkatkan dan menambah wawasan, keterampilan dalam penerapan asuhan kebidanan tentang semua hal yang berhubungan dengan *postnatal care*.

E. Metode Penulisan

Dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini digunakan dasar teori yang dipadukan dengan praktek, sehingga dalam penulisan karya tulis ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Dengan membaca dan mempelajari buku-buku sebagai referensi, mengambil data dari internet yang ada kaitannya dengan kasus yang di bahas sehingga dapat dijadikan teori dasar yang digunakan dalam pembahasan Karya Tulis Ilmiah.

2. Studi Kasus

Penulis melaksanakan studi kasus dengan menggunakan 7 langkah varney yaitu melalui pengkajian data/pengumpulan data, merumuskan diagnosa/masalah aktual, maupun masalah potensial, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan dan mengevaluasi serta, mendokumentasi hasil asuhan kebidanan pada post partum dengan kelainan bentuk puting untuk memperoleh data yang akurat.

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan teknik:

a. Anamnese

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, suami, keluarga, bidan, dokter ataupun yang terlibat langsung dengan orang yang ada pada saat pendampingan klien di kamar persalinan guna mendapatkan data yang diperlukan untuk memberikan asuhan kebidanan pada klien tersebut.

b. Pemeriksaan Fisik

Melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis pada klien mulai dari kepala sampai kaki dengan melalui pemeriksaan inspeksi (observasi menggunakan mata), palpasi (menggunakan rabahan atau sentuhan), perkusi

(mengggunakan ketukan) dan auskultasi (mendengar memakai alat seperti stetoskop) dan melakukan pengkajian/pengamatan mengenai Psikososial meliputi status emosional, respon terhadap kondisi yang sedang diderita serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan, dan lingkungannya serta pengetahuan tentang nilai kesehatan dan sosial budaya yang ada di masyarakat.

3. Studi Dokumentasi

Membaca serta mempelajari status kesehatan yang berhubungan dengan keadaan klien yang bersumber dari tenaga kesehatan atau catatan, status, rekam medic pasien maupun dari sumber lain yang menunjang yaitu laboratorium.

4. Diskusi

Diskusi dengan tenaga kesehatan yaitu bidan, perawat atau dokter umum maupun dokter spesialis yang menangani langsung klien tersebut dan dosen pembimbing Karya Tulis Ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk Karya Tulis Ilmiah ini meliputi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yaitu di mulai dari Latar Belakang, Ruang Lingkup Pembahasan, Tujuan Penulisan(Tujuan Umum dan Tujuan Khusus), Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka Yaitu terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Anatomi Payudara Dan Proses Laktasi, Anatomi Payudara, Fisiologi Laktasi, Tujuan Asuhan Masa Nifas, Peran dan Tanggung Jawab Bidan dalam Masa Nifas, Tahapan Masa Nifas, Tanda Bahaya Masa Nifas, Kebijakan Program Nasional Masa Nifas dan Tinjauan Khusus Tentang Kelainan bentuk puting, Pengertian, Faktor Penyebab kelainan bentuk puting, Anatomi bentuk puting, Penanganan kelainan bentuk puting, Tinjauan Agama Islam Tentang Penyakit Dan Menyusui Pada Masa Nifas, Proses Manajemen Asuhan Kebidanan yaitu; Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan dan Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan serta Pendokumentasian Asuhan Kebidanan.

Bab III Studi Kasus Kemudian pada bab ini membahas mengenai studi kasus, yang akan menguraikan tentang langkah varney yang terdiri dari identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi, dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Bab IV Pembahasan Lalu di bab ini membandingkan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan dan praktek yang dilaksanakan di Puskesmas Bara-baraya dalam menangani kasus dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Tanggal 17 September-04 November Tahun 2018..

Bab V Penutup Pada bab ke V ini adalah kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan untuk semua temuan serta pengetahuan yang telah diperoleh dari hasil asuhan yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literature ilmiah serta buku atau referensi yang telah dijadikan sebagai dasar teori rujukan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anatomi Payudara Dan Proses Laktasi

1. Anatomi Payudara

Payudara (*mammae*, susu) adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, diatas otot dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara, yang beratnya kurang lebih 200 gram, saat hamil 600 gram dan saat menyusui 800 gram. (Khasanah Ayati Nurul, Sulistyawati Wiwit, 2017:31).

Secara vertikal payudara terletak diantara kosta II dan IV, secara horisontal mulai dari pinggir sternum sampai linea aksilaris medialis. Kelenjar susu berada di jaringan sub kutan, tepatnya diantara jaringan sub kutan superfisial dan profundus, yang menutupi muskulus pectoralis mayor (Kristiyansari, Weni, 2009:1).

Payudara terletak pada setiap sisi *sternum* dan meluas setinggi antara kosta kedua dan keenam. Payudara terletak pada *fascia superspialis* dinding rongga dada di atas *musculus pectoralis mayor* dan dibuat stabil oleh *ligamentum suspensorium*. Bentuknya seperti tonjolan $\frac{1}{2}$ bola dan punya ekor (*cauda*) dari jaringan yang meluas ke ketiak atau *axial* (*Cauda Axillaris Spence*). Memiliki ukuran berbeda-beda untuk setiap individu, bergantung pada

stadium perkembangan dan umur. Tidak jarang salah satu payudara ukurannya lebih agak lebih besar daripada payudara lainnya (Jannah Nurul, 2011:17-18).

Papilla mammae terletak di pusat *areola mammae* setinggi iga (*costa*) keempat. Merupakan tonjolan dengan panjang kira-kira 6 mm, tersusun atas jaringan erektil berpigmen dan merupakan bagian yang sangat peka. Permukaan *papilla mammae* berlubang-lubang berupa *ostium papillare* kecil-kecil yang merupakan muara *ductus lactifer* yang dilapisi oleh epitel (Jannah Nurul, 2011:18-19).

Areola merupakan lingkaran yang terdiri dari kulit yang longgar dan mengalami pigmentasi dan masing-masing payudara bergaris tengah kira-kira 2,5 cm. *Areola* berwarna merah muda bila kulitnya cerah, lebih gelap warnanya pada wanita yang berkulit coklat dan saat hamil warnanya jadi lebih gelap. *Areola* ini terletak kira-kira 20 *glandula sebacea*. Saat hamil, *areola* ini membesar, disebut *tuberculum montgomery* (Jannah Nurul, 2011:19).

Alveoli mengandung sel-sel yang mensekresi air susu. Tiap alveolus dilapisi oleh sel-sel yang mensekresi air susu disebut ACINI. Dikelilingi tiap *alveolus* terdapat sel mioepitel (sel keranjang/*basket cell*). Jika sel ini dirangsang oleh oksitosin, akan berkontraksi mengalirkan air susu ke dalam *ductus lactiferous*. Sedangkan tubulus laktiferus merupakan saluran kecil yang berhubungan dengan alveoli. Duktus laktiferus adalah saluran sentral yang merupakan muara *tubulus lactiferous* (Jannah Nurul, 2011:19-20).

Vaskularisasi merupakan suplai darah ke payudara berasal dari arteria *mammaria interna* arteria *mamae externa* dan arteria *intercostalis superior*. Drainase vena melalui pembuluh-pembuluh yang sesuai akan masuk ke dalam vena *mammaria interna* dan vena *axillaris*. Drainase limfatik ke dalam kelenjar *axillaris*, setengah dialirkan ke dalam *fisura portae hepar* dan kelenjar *mediastinum* tempat pembuluh limfatik dari masing-masing payudara berhubungan satu sama lain. Persarafan merupakan fungsi payudara dikendalikan oleh hormon. Kulitnya dipersarafi oleh cabang-cabang *nervus thoracalis*. Terdapat sejumlah saraf simpatis, terutama di sekitar *areola* dan *papilla* (Jannah Nurul, 2011:20).

2. Fisiologi Laktasi

Proses Laktasi dimulai dari pelepasan ASI berada di bawah kendali neuro-endokrin. Rangsangan sentuhan pada payudara (bayi menghisap) akan merangsang produksi oksitosin yang menyebabkan kontraksi sel-sel *myoepithel*. Proses ini disebut sebagai *reflex prolaktin* atau *milk production reflect* yang membuat ASI tersedia bagi bayi (Jannah Nurul, 2011:22).

Isapan bayi memicu pelepasan ASI dari *alveolus mammae* melalui duktus ke *sinus laktiferous*. Isapan merangsang produksi oksitosin oleh kelenjar *hypofisis posterior*. Oksitosin memasuki darah dan menyebabkan kontraksi sel-sel khusus (sel-sel *myoepithel*) yang akan mengelilingi *alveolus mammae* dan *ductus lactiferous*. Kontraksi sel-sel khusus ini mendorong ASI keluar dari

alveoli melalui duktus lactiferous menuju sinus lactiferous, tempat ASI akan disimpan (Jannah Nurul, 2011:22).

Pada saat bayi menghisap puting susu ibu, ASI dari sinus ini dinamakan *let down reflex* atau “pelepasan”. Pada akhirnya, *let down reflex* dapat dipacu tanpa rangsangan isapan. Pelepasan dapat terjadi bila ibu mendengar bayi menangis atau sekedar memikirkan tentang bayinya. Pelepasan penting sekali bagi pemberian ASI yang baik. Tanpa pelepasan, bayi dapat menghisap terus-menerus, tetapi hanya memperoleh sebagian dari ASI yang tersedia dan tersimpan di dalam payudara. Bila pelepasan gagal terjadi berulang-ulang dan payudara berulang-ulang tidak dikosongkan pada waktu pemberian ASI, refleksi ini akan berhenti berfungsi dan laktasi akan berhenti (Jannah Nurul, 2011:22-23).

3. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Di dalam proses masa nifas terjadi banyak perubahan-perubahan baik itu fisik maupun psikis/psikologis berupa organ reproduksi, terjadinya proses laktasi/menyusui, terbentuknya hubungan antara orang tua dan bayi (*bounding attachment*) dengan memberi dukungan terhadap ibu nifas. Maka dari itu perlu dilakukan suatu pendekatan antara ibu, bayi dan keluarga dalam Manajemen Asuhan Kebidanan. Berikut adalah tujuan Asuhan Masa Nifas yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis bagi ibu dan bayi.
- b. Melaksanakan skrining secara menyeluruh mulai dari mendeteksi masalah, mengobati/pencegahan, diagnosis dini, serta melakukan pengobatan terhadap komplikasi yang terjadi baik pada ibu maupun pada bayinya.
- c. Merujuk ibu ke Asuhan tenaga ahli atau spesialis bila diperlukan.
- d. Mendukung dan memperkuat keyakinan ibu serta memungkinkan ibu untuk mampu melaksanakan perannya dalam situasi keluarga dan social budaya serta adat istiadatnya.
- e. Mendorong pelaksanaan metode yang sehat tentang pemberian makanan anak serta peningkatan pengembangan hubungan yang baik antara ibu dengan anak.
- f. Memberikan Health Education pada ibu tentang Perawatan Payudara, Imunisasi Bayi, Manfaat ASI, Perawatan Bayi, Personal Hygiene, Gizi, KB, dan Hubungan Seks.
- g. Mengajarkan ibu untuk melaksanakan perawatan secara mandiri sampai masa nifas selesai serta memelihara bayi dengan baik, sehingga bayi dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal (Nurjanah Siti, Nunung dkk 2013:3).
- h. Memberikan dukungan terhadap ibu serta senantiasa mendampingiya selalu memberikan support agar ibu dapat melewati masa nifasnya dengan lancar.

4. Peran dan Tanggung Jawab Bidan dalam Masa Nifas

Adapun Peran dan Tanggung Jawab Bidan dalam Masa Nifas sebagai berikut

- a. Sebagai teman terdekat, sekaligus pendamping ibu nifas dalam menghadapi saat-saat kritis masa nifas.
- b. Sebagai pendidik dalam usaha pemberian pendidikan kesehatan terhadap ibu dan keluarga.
- c. Sebagai pelaksana asuhan kepada klien dalam hal tindakan perawatan, pemantauan, penanganan masalah rujukan, dan deteksi dini komplikasi masa nifas.

5. Tahapan Masa Nifas

Menurut Saleha, 2009 pada masa nifas ada tiga periode yang terdiri dari :

- a. Periode *immediate post partum* atau *Puerperium Dini* adalah masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya perdarahan karena atonia uteri. Oleh sebab itu, bidan harus dengan teratur melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lochea, tekanan darah, dan suhu.
- b. Periode *Intermedial* atau *Early Post partum* (24 jam-1 minggu). Di fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, tidak ada pendarahan, lochea tidak berbau busuk, tidak ada demam, ibu cukup

mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui bayinya dengan baik.

- c. Periode *late post partum* (1-5 minggu). Di periode ini bidan tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling KB.

6. Tanda Bahaya Masa Nifas

Menurut Maritalia Dewi, 2012 tanda bahaya masa nifas adalah suatu adanya tanda-tanda yang mengganggu sampai membahayakan keadaan ibu yang terjadi pada masa nifas.

Adapun tanda-tanda bahaya masa nifas sebagai berikut :

- a. Sakit kepala yang terus menerus, nyeri ulu hati, ada gangguan penglihatan.
- b. Pembengkakan pada muka dan tangan.
- c. Demam, pengeluaran dari vagina yang berbau busuk, perdarahan yang banyak secara tiba-tiba.
- d. Terasa nyeri pada bagian bawah perut atau punggung.
- e. Payudara terasa berat, sakit, bengkak, merah, panas dan puting pecah-pecah atau lecet.
- f. Adanya kesulitan menyusui bayinya.
- g. Terasa sakit atau panas pada saat buang air kecil.
- h. Sulit untuk buang air besar, wasir.
- i. Kaki terasa sakit, merah, lembek, bengkak dan mengkilat.
- j. Nafsu makan hilang dengan waktu yang lama.
- k. Merasa sangat lelah, nafas sampai terengah-engah.

1. Merasa sedih atau tidak mampu mengasuh bayinya sendiri.

7. Kebijakan Program Nasional Masa Nifas

Di dalam Kebijakan Program Nasional pada Masa Nifas yaitu ada sekitar 4 kali kunjungan masa nifas yang dilakukan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi pada masa nifas.

Adapun minimal 4 kali kunjungan masa nifas di bawah ini antara lain :

a. Kunjungan I (Pertama)

Kunjungan Pertama, 6 -8 jam setelah persalinan yang memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Mencegah perdarahan masa nifas akibat *atonia uteri*.
- 2) Mendeteksi atau merawat penyebab lain perdarahan, melakukan rujukan jika perdarahan berlanjut.
- 3) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena *atonia uteri*.
- 4) Memberikan Konseling tentang Pemberian ASI awal.
- 5) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir yang biasa disebut juga dengan *bounding attachment*.
- 6) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah *hypothermia*.
- 7) Mendampingi serta menolong ibu pada saat persalinan dan bayi baru lahir bagi petugas kesehatan yang menolong persalinan harus memantau ibu

minimal 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil.

b. Kunjungan II (Kedua)

Kunjungan Kedua, 6 hari setelah persalinan, yang bertujuan:

- 1) Memastikan involusio uteri berjalan normal, uterus berkontraksi baik, fundus dibawah umbilikus dan tidak ada perdarahan maupun bau abnormal.
- 2) Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi.
- 3) Memastikan mendapatkan cukup makanan, cairan dan istirahat yang cukup.
- 4) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar, tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda penyulit.
- 5) Memberikan konseling pada ibu tentang asuhan pada bayi mengenai perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari.

c. Kunjungan III (Ketiga)

Kunjungan ketiga, 2 minggu setelah persalinan, tujuannya sama dengan tujuan yang ada pada kunjungan kedua diatas (6 hari setelah persalinan).

d. Kunjungan IV (Keempat)

Kunjungan keempat, 6 minggu setelah persalinan, tujuannya adalah :

- 1) Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ibu alami selama masa nifas.

2) Memberikan konseling pada ibu tentang KB secara dini.

Tujuan tentang Kebijakan Program Nasional Masa Nifas tersebut adalah :

- a) Untuk menilai tentang kesehatan ibu dan kesehatan bayi baru lahir.
- b) Untuk mencegah adanya gangguan kesehatan ibu nifas dan bayinya.
- c) Untuk mendeteksi adanya masalah yang terjadi pada masa nifas.
- d) Untuk menangani semua masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu maupun bayinya pada masa nifas (Wulandari, Setyo Retno dkk, 2011:3-4).

B. Tinjauan Khusus Tentang Kelainan Bentuk Puting

1. Pengertian

Kelainan puting susu adalah keadaan puting susu tidak normal dimana puting susu yang normal memiliki ciri-ciri khas dengan bentuk yang silendris, menonjol keluar dari permukaan umum payudara ibu. Kelainan puting susu sangat mengganggu aktifitas laktasi.

Puting susu normal adalah puting susu yang terletak dari beberapa milimeter dari areola (daerah yang melingkari puting). Puting bentuk ini akan berubah mengeras dan tegang saat ada stimulasi. Bentuk puting susu pada wanita bervariasi ukurannya. Secara umum puting ini termasuk puting yang ideal untuk wanita guna untuk kelangsungan menyusui bayinya saat masa pasca persalinan.

Puting susu pendek atau datar adalah puting susu yang kurang menguntungkan seperti ini sebenarnya tidak selalu menjadi masalah. Secara

umum, ibu masih tetap dapat menyusui bayinya dan upaya selama antenatal umumnya kurang berguna, misalnya dengan memanipulasi *hoffman*, menarik-narik puting, ataupun bagaimana penggunaan *breast shell*. Tindakan yang paling efisien untuk memperbaiki keadaan ini adalah isapan langsung bayi yang kuat. Oleh karena itu, sebaiknya jangan dilakukan apa-apa, tunggu saja sampai bayi lahir (Dewi, 2013).

Puting susu panjang adalah puting susu yang terlalu menonjol keluar melewati ukuran normal. Sehingga proses menyusui menjadi terganggu sebab bayi sulit untuk menghisap dan menelan saat menyusui, dikarenakan puting susu yang panjang akan masuk ke dalam mulut bayi hingga mencapai tenggorokan dan akhirnya bayi akan tersedak saat menyusui.

Puting susu tenggelam atau terbenam adalah puting susu yang tidak dapat menonjol dan cenderung masuk ke dalam, sehingga ASI tidak dapat keluar dengan lancar, yang disebabkan saluran susu lebih pendek ke dalam (tied nipples), kurangnya perawatan, kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan payudara. Pada kasus seperti ini biasanya bayi kesulitan dan mungkin tidak mau untuk menyusui (Ambarwati, 2008).

Puting susu yang dimaksud diatas terbagi menjadi 2 yaitu (Ambarwati, 2008) :

1. Dimpled Putting

Yaitu yang terlihat menonjol sebagian namun masih dapat ditarik keluar meski tidak dapat bertahan lama.

2. Unilateral

Yaitu hanya satu sisi payudara yang memiliki puting yang tertarik kedalam.

Puting yang tertarik kedalam dibagi menjadi 3 grade yaitu:

a. Grade 1

Puting tertarik kedalam tapi mudah untuk ditarik dan bertahan cukup baik tanpa perlu tarikan. Sayangnya, tekanan lembut disekitar areola atau cubit lembut pada kulit dapat menyebabkan puting mundur kembali.

b. Grade 2


Puting yang tertarik kedalam dan masih bisa ditarik keluar namun tidak semudah grade 1. Setelah tarikan dilepas, puting akan mundur kembali.

c. Grade 3

Puting jenis ini posisinya sangat tertarik kedalam dan sulit untuk ditarik keluar apalagi mempertahankan posisinya. Yang paling sering adalah akibat pendeknya saluran ASI (duktus laktiferus). Kelainan ini merupakan bawaan sejak lahir. Puting tertarik kedalam juga bisa terjadi setelah menyusui. Penyebabnya bisa karena kulit payudara sekitar puting menjadi longgar sehingga membuat puting terlihat masuk kedalam.

Ada empat macam bentuk puting, yaitu bentuk normal, pendek/datar, panjang dan terbenam(*invirted*). Namun bentuk-bentuk puting ini tidak selalu berpengaruh pada proses penyusuan, karena pada dasarnya bayi menyusu pada areolla mammae ibu bukan pada puting (Chomaria, 2012: 99)

Gambar 2.1 Bentuk Bentuk Puting Susu



(Chomaria, 2012: 99)

Adapun yang mempengaruhi proses menyusui masa nifas pada bayi yaitu: ada tiga refleks yang penting dalam mekanisme hisapan bayi, adalah refleks mencari (rooting reflex), refleks menghisap (sucking reflex), dan refleks menelan (swallowing reflex).

a. Refleks Mencari (Rooting Reflex)

Refleks ini memungkinkan bayi baru lahir untuk menemukan puting susu apabila diletakkan di payudara dan menempelkan pada pipi atau daerah sekeliling mulut merupakan rangsangan yang menimbulkan refleks mencari pada bayi. Ini menyebabkan kepala bayi berputar menuju puting

susu yang menempel kemudian diikuti dengan membuka mulut sehingga puting susu ditarik ke dalam mulut.

b. Refleksi Menghisap (Sucking Reflex)

Refleksi ini timbul apabila langit-langit mulut bayi tersentuh, biasanya oleh puting. Supaya puting mencapai bagian belakang palatum, maka sebagian besar areola harus tertangkap mulut bayi. Dengan demikian, maka sinus lactiferus yang berada dibawah areola akan tertekan antara gusi, lidah, dan palatum, sehingga ASI terperas keluar.

c. Refleksi Menelan (Swallowing Reflex)

Refleksi ini timbul jika air susu keluar dari puting yang kemudian akan disusul dengan gerakan menghisap yang ditimbulkan oleh otot-otot pipi dan gusi dalam menekan areola sehingga pengeluaran air susu akan bertambah. Selain itu reflek ini juga dapat merangsang pembentukan rahang bayi.

Kemampuan laktasi setiap ibu berbeda-beda. Sebagian mempunyai kemampuan lebih besar dibandingkan yang lain. Pada masa hamil terjadi perubahan payudara yang membesar, ini disebabkan oleh berkembangnya lenjar payudara karena proliferasi sel-sel kelenjar pembuat air susu ibu. Proses proliferasi dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan plasenta, yaitu laktogen, prolaktin, kariogonadotropin, estrogen dan progesteron. Selain itu, perubahan tersebut juga disebabkan bertambah lancarnya peredaran darah pada payudara.

Setelah persalinan, kadar estrogen dan progesteron menurun dengan lepasnya plasenta, sedangkan prolaktin tetap tinggi sehingga tidak ada lagi hambatan terhadap prolaktin dan estrogen. Oleh karena itu, air susu ibu segera keluar. Biasanya, pengeluaran air susu dimulai pada hari kedua atau ketiga setelah kelahiran. Setelah persalinan, segera susukan bayi karena akan memacu lepasnya prolaktin dari hipofise sehingga pengeluaran air susu bertambah lancar. Dua hari pertama pasca persalinan, payudara kadang-kadang terasa penuh dan sedikit sakit. Keadaan yang disebut engorgement tersebut disebabkan oleh bertambahnya peredaran darah ke payudara serta mulainya laktasi yang sempurna.

2. Faktor Penyebab Kelainan Bentuk Puting

Menurut Indah Fedri, 2013 adapun beberapa faktor penyebab kelainan bentuk puting, antara lain:

- a. Adanya perlekatan yang menyebabkan saluran susu lebih pendek dari biasanya sehingga menarik puting susu kedalam.
- b. Kurangnya perawatan sejak dini pada payudara.
- c. Penyusuan yang tertunda.
- d. Penyusuan yang jarang dan dalam waktu singkat.
- e. Pemberian minum selain ASI.
- f. Ibu terlalu lelah dan tidak mau menyusui.


3. Anatomi bentuk puting

Payudara (mammas, susu) adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara, yang beratnya kurang lebih 200 gram, saat hamil 600 gram dan pada saat menyusui 800 gram beratnya (Khasanah Ayati Nurul, Sulistyawati Wiwit, 2017:31).

Pada payudara terdapat tiga bagian utama, yaitu :

1. Korpus (badan), yaitu bagian yang membesar.
2. Areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah.
3. Papilla atau puting, yaitu bagian yg menonjol di puncak payudara.

Gambar 2.2 Anatomi payudara



Sumber: <http://www.lusa.web.id>

Bagian bagian payudara, yaitu :

a. Korpus

Alveolus, yaitu unit terkecil yang memproduksi susu. Bagian dari alveolus adalah sel Aciner, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos dan pembuluh darah kumpulan dari alveolus sedangkan lobus yaitu beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobus tiap payudara. ASI disalurkan dari alveolus ke dalam saluran kecil (duktulus), kemudian beberapa duktulus bergabung membentuk saluran yang lebih besar (duktus laktiferus).

b. Areola

Sinus laktiferus, yaitu saluran di bawah areola yang besar melebar, akhirnya memusat ke dalam puting dan bermuara ke luar. Di dalam dinding alveolus maupun saluran-saluran terdapat otot polos yang bila berkontraksi dapat memompa ASI keluar.

c. Papilla

Bentuk puting ada empat, yaitu bentuk yang normal, pendek / datar, panjang dan terbenam (inverted).

4. Penanganan Kelainan Bentuk Puting

Menurut Indah Fedri, 2013 adapun cara penanganan puting tenggelam yaitu :

- a. Saat memasuki usia kehamilan 7 bulan biasakan diri menarik puting susu dengan jari tangan sampai menonjol.
- b. Adanya kemauan ibu untuk menyusui.

- c. Pijat areola ketika mandi selama 2 menit.
- d. Tarik puting susu dengan 4 jari dibawah payudara dan ibu jari diatas ketika akan menyusui.
- e. Gunakan bantuan dengan memakai pompa payudara untuk menarik payudara yang tenggalam.

Cara yang dapat digunakan untuk merangsang puting susu keluar yaitu sebagai berikut :

1) Nipple Pam

Nipple Pam perlu diletakkan diatas bagian puting susu dan tarik pam perlahan-lahan diikuti urutan untuk melembutkan puting. Keadaan ini perlu dilakukan setiap pagi sebelum menyusukan bayi.

2) Urutan

Mereka boleh merangsang kepada puting dengan memijit bagian areola setiap kali ketika mandi. Buat selama satu sampai dua menit. Keadaan ini boleh mengatasi masalah puting tenggelam secara perlahan-lahan dan wanita tidak perlu lagi bergantung pada nipplet.

3) Tehnik Hoffman

Letakan jempol dan telunjuk tangan diantara puting (saling berhadapan). Tekan kedua jari tersebut sambil menarik puting keluar. Putarkan searah jam, lakukan sebanyak lima kali sehari.

4) Trik Dengan Menggunakan Spoit

Trik sangat sederhana sekali karena alat yang digunakan bisa menggunakan alat spoit yang dibalik. Dengan cara memotong bagian alat suntik tempat dimana biasanya jarum bisa dimasukan kemudian pindahkan alat penghisapnya kebagian yang dipotong letakan ujung yang lain di puting, lalu gerakkan atau tarik alat penghisapnya (Suparyanto, 2011).

Adapun penanganan kelainan bentuk puting dengan cara melakukan perawatan payudara meliputi:

a. Masa Kehamilan

Pada kasus kelainan bentuk puting penanganan yang akan diberikan yaitu dengan tindakan perawatan payudara pada masa kehamilan pada kunjungan antenatal care dengan usia kehamilan telah memasuki 7 bulan (Indah Fedri, 2013).

1) Cara Merawat Payudara

Menurut Rahmawati, dkk (2009), berikut ini beberapa cara merawat payudara :

- a) Menjaga agar tangan dan puting susu selalu bersih untuk mencegah kotoran kuman masuk ke dalam mulut bayi.
- b) Mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum menyentuh puting susu dan sebelum menyusui bayi.
- c) Harus mencuci tangan sesudah buang air kecil atau besar atau menyentuh sesuatu yang kotor, membersihkan payudara dengan air bersih satu kali sehari.

- d) Licinkan kedua telapak tangan dengan minyak sayur/babyoil.
- e) Tidak boleh mengoles krim, minyak, alkohol atau sabun pada puting payudara dan memakai bra yang menggajal.
- f) Massage payudara/Breast care
- g) Letakkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara.
- h) Gerakan memutar, kesamping dan ke bawah sebanyak 10-15 kali. Tangan kiri memopang payudara kiri, tangan kanan mengurut payudara dari pangkal kearah puting sebanyak 10-15 kali.
- i) Ketuk-ketuk payudara dengan ruas jari tangan secara berulang-ulang lakukan hal yang sama pada payudara sebelah kanan.

2) Perawatan payudara selama masa kehamilan

Memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a) Memelihara kebersihan payudara.
- b) Melenturkan dan menguatkan puting susu.
- c) Mengeluarkan puting susu yang tertarik kedalam.
- d) Mempersiapkan produksi ASI.

Tehnik perawatannya sebagai berikut:

- a) Licinkan kedua telapak tangan dengan sedikit minyak .
- b) Kompres puting susu dengan kain/kapas yang diberi minyak selama beberapa saat agar kotoran mudah dibersihkan.
- c) Tarik kedua puting susu keluar sambil diputar ke kiri 20 kali dan ke kanan 20 kali.

- d) Pegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urutkan dari pangkal payudara ke arah puting sebanyak 30 kali.
- e) Pijat puting hingga keluar cairan, untuk memastikan bahwa saluran susu tidak tersumbat.
- f) Bersihkan puting susu dan sekitarnya dengan handuk kering dan bersih.
- g) Janganlah menggunakan BH yang menekan payudara, tapi gunakan BH yang menopang payudara (Bandiyah Siti, 2009: 41-42).

Jika puting susu datar tertarik ke dalam, cara merawatnya sebagai berikut:

- a) Letakkan kedua ibu jari diatas dan dibawah puting puting susu.
- b) Regangkan daerah areola kearah bawah sebanyak 20 kali.
- c) Letakkan kedua ibu jari disamping kiri dan disamping kanan puting susu.

Regangkan daerah areola dengan menggerakkan kedua ibu jari kearah kanan sebanyak 20 kali, lakukan 2 kali sehari jika usia kehamilan 3 bulan (Bandiyah Siti, 2009: 42-43).

b. Masa Persalinan

Adapun perlunya menyusui segera setelah bayi lahir, sehingga hal ini menjadi upaya memperlancar keluarnya susu ASI ibu yang melahirkan. Upaya ini dilakukan dengan IMD (Inisiasi Menyusui Dini).

Inisiasi Menyusui Dini atau disingkat sebagai IMD merupakan program yang gencar dianjurkan pemerintah. Program ini memang populer di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Menyusu dan bukan menyusui merupakan

gambaran bahwa 'IMD bukan program ibu menyusui bayi', tetapi bayi yang harus aktif menemukan sendiri puting susu ibu. Program ini dilakukan secara langsung meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi ini merayap untuk menemukan puting ibu untuk menyusui.(Anik Maryunani, 2012 :57).

Laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian, yaitu produksi ASI (prolaktin) dan pengertian ASI (oksitosin). Produksi ASI (prolaktin) dalam masa kehamilan hormon prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI belum keluar karena pengaruh hormon estrogen yang masih tinggi. Kadar estrogen dan progesteron akan menurun pada saat hari kedua atau ketiga pasca persalinan , sehingga terjadi sekresi ASI. Pada proses laktasi terdapat dua refleksi yang berperan, yaitu refleksi prolaktin dan refleksi aliran yang timbul akibat perangsangan puting susu dikarenakan hisapan bayi (Dewi Martalia, 2012 :71).

Akhir kehamilan hormon prolaktin memegang peranan untuk menghasilkan kolostrum, tetapi jumlah kolostrum terbatas dikarenakan aktivitas prolaktin dihambat oleh estrogen dan progesteron yang masih tinggi. Pasca persalinan, yaitu saat plasenta terlepas dan fungsi korpus luteum berkurang maka estrogen dan progesteron juga berkurang. Hisapan bayi akan merangsang puting susu dan kalang payudara, karena ujung-ujung saraf sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik.

Rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus melalui medulla spinalis hipotalamus dan akan menekan pengeluaran faktor penghambat sekresi prolaktin dan sebaliknya merangsang pengeluaran faktor pemacu sekresi prolaktin. Faktor

pemacu sekresi prolaktin akan merangsang hipofise anterior sehingga keluar prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk membuat air susu.

Kadar prolaktin pada ibu menyusui akan menjadi normal 3 bulan setelah melahirkan sampai penyapihan anak dan pada saat tersebut tidak akan ada peningkatan prolaktin walau ada hisapan bayi, namun pengeluaran air susu tetap berlangsung. Pada ibu nifas yang tidak menyusui, kadar prolaktin akan menjadi normal pada minggu ke 2-3. Bersamaan dengan pembentukan prolaktin oleh hipofise anterior, rangsangan yang berasal dari hisapan bayi dilanjutkan ke hipofise posterior (neurohipofise) yang kemudian dikeluarkan oksitosin. Melalui aliran darah, hormon ini menuju uterus sehingga menimbulkan kontraksi.

Kontraksi dari sel akan memeras air susu yang telah diproduksi keluar dari alveoli dan masuk ke sistem duktus dan selanjutnya mengalir melalui duktus lactiferus masuk ke mulut bayi. Faktor-faktor yang meningkatkan let down adalah melihat bayi, mendengarkan suara bayi, mencium bayi, memikirkan untuk menyusui bayi. Faktor-faktor yang menghambat refleks let down adalah stress, seperti: keadaan bigung/pikiran kacau, takut dan cemas. Refleks yang penting dalam mekanisme hisapan bayi yaitu refleks menangkap (*rooting reflex*), refleks menghisap (*sucking reflex*), refleks menelan (*swallowing reflex*).

Pertama refleks menangkap (*rooting reflex*), refleks ini timbul saat bayi baru lahir tersentuh pipinya dan bayi akan menoleh ke arah sentuhan. Bila bibir bayi dirangsang dengan papilla mammae atau jari, maka bayi akan membuka mulut

dan berusaha menangkap puting susu. Kedua refleks menghisap (*sucking reflex*), refleks ini timbul apabila langit-langit mulut bayi tersentuh oleh puting. Agar puting mencapai palatum, maka sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Dengan demikian sinus laktiferus yang berada dibawah areola, tertekan antara gusi, lidah dan palatum sehingga ASI keluar. Ketiga refleks menelan (*swallowing reflex*), refleks ini timbul apabila mulut bayi terisi oleh ASI, maka ia akan menelannya.

Pengeluaran ASI (Oksitosin), apabila bayi disusui, maka gerakan menghisap yang berirama akan menghasilkan rangsangan saraf yang terdapat pada glandula pituitari posterior sehingga mensekresi hormon oksitosin. Hal ini menyebabkan sel-sel mioepitel disekitar alveoli akan berkontraksi dan mendorong ASI masuk dalam pembuluh ampula. Pengeluaran oksitosin selain dipengaruhi oleh hisapan bayi, juga oleh reseptor yang terletak pada duktus. Bila duktus melebar, maka secara reflektoris oksitosin dikeluarkan oleh hipofisis (Dewi Martalia, 2012 :71-73).

c. Masa Nifas

Ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan pada masa nifas sesuai dengan yang dialami ibu saat proses menyusui segera setelah pasca persalinan yaitu:

Berikut cara jika payudara ibu terasa sakit karena terlalu penuh berisi ASI atau puting lecet yang dapat dilakukan untuk menanganinya yaitu memerah dengan tangan:

- 1) Keluarkan sedikit air susu kemudian oleskan sedikit air susu ke bagian puting secara melingkar.
- 2) Pegang payudara dibagian pangkal dengan kedua tangan.
- 3) Gerakkan tangan ke arah depan (mengurut ke arah puting susu).
- 4) Pijat daerah areola (warna hitam disekitar puting) dan diperah ke arah puting susu.
- 5) Kumpulkan ASI yang telah diperah dalam mangkok atau botol bersih.
(Nurjannah. dkk, 2013)

Jika yang terjadi adalah bendungan maka penanganan yang dilakukan yang paling penting adalah mencegah terjadinya payudara bengkak dengan cara :

- 1) Susukan bayi segera setelah lahir.
- 2) Susukan bayi tanpa di jadwal.
- 3) Keluarkan sedikit ASI sebelum menyusui agar payudara lebih lembek.
- 4) Keluarkan ASI dengan tangan atau pompa bila produksi ASI melebihi ASI.
- 5) Untuk mengurangi rasa sakit pada payudara berikan kompres dingin dan hangat dengan handuk secara bergantian kiri dan kanan.
- 6) Untuk memudahkan bayi menghisap atau menangkap puting susu berikan kompres sebelum menyusui.
- 7) Untuk mengurangi bendungan di vena dan pembuluh getah bening dalam payudara lakukan pengurutan yang dimulai dari puting ke arah korpus

mammae, ibu harus rileks, pijat leher dan punggung belakang (Rukiyah dan Yulianti, 2010).

Dalam hal itu perlu dilakukan masase payudara dan ASI diperas dengan tangan sebelum menyusui. Kompres dingin untuk mengurangi statis pembuluh dara vena dan rasa nyeri. Dapat dilakukan secara bergantian dengan kompres panas untuk melancarkan aliran darah payudara. Menyusui lebih sering dan lebih lama pada payudara bengkak untuk mencarkkan aliran ASI dan menurunkan tegangan payudara (Bahiyatun, 2009).

Selain itu asuhan pada ibu dengan bendungan ASI adalah:

a) Cara menyusui yang baik dan benar

Menurut Maryunani (2015), cara menyusui yang baik dan benar adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelum menyusui, keluarkan sedikit ASI untuk mengolesi puting ibu agar bayi mencium aromanya dan lebih berselera menyusu.
- 2) Susui bayi setiap kali ia menginginkannya dan selama yang ia mau.
- 3) Saat menyusui, letakkan bayi dalam pangkuan sedemikian rupa hingga wajah dan tubuhnya menghadap ke payudara ibu. Posisinya harus lurus searah dari telinga, hidung, dan badannya. Dagunya menempel di payudara ibu.
- 4) Duduklah dalam posisi yang nyaaman dan tegak, jangan membungkuk, kalau perlu sangga tubuh bayi dengan bantal. Ibu yang baru /saja menjalani persalinan dengan operasi sesar tak perlu khawatir karena posisi bayi berada di atas perut.

- 5) Jika bayi menyusui pada payudara kiri, letakkan kepalanya di siku lengan kiri ibu. Lengan kiri bayi bebas ke arah payudara. Begitupula sebaiknya.
- 6) Topanglah payudara dengan meletakkan ibu jari tangan ibu diatas puting dan keempat jari menyangga payudara.
- 7) Usai menyusui, bayi akan melepaskan isapannya. Kalau tidak lepaskan puting dengan memasukkan jari kelingking ibu ke mulut bayi melalui sudut mulut atau tekan dagu bayi agar bibir bawahnya terbuka. Jangan langsung menarik puting terlalu kuat selagi berada didalam mulut bayi karena akan membuatnya lecet.
- 8) Bila puting lecet, lakukan kompres dingin di payudara dan tetapkan menyusui bayi. Usai menyusui, usapkan tetesan ASI untuk pelumas dan perlindungan. Jika menggunakan obat dokter, seka(sapu) puting dengan air atau washlap basah yang lembut setiap kali akan menyusui. Menurut Prawihardjo (2010), yang mengatakan berikan parasetamol 500 mg per oral bagi ibu yang menyusui maupun tidak menyusui.

b) Cara Merawat Payudara

Menurut Rahmawati, dkk (2009), berikut ini beberapa cara merawat payudara :

- 1) Menjaga agar tangan dan puting susu selalu bersih untuk mencegah kotoran kuman masuk ke dalam mulut bayi.
- 2) Mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum menyentuh puting susu dan sebelum menyusui bayi.

- 3) Harus mencuci tangan sesudah buang air kecil atau besar atau menyentuh sesuatu yang kotor, membersihkan payudara dengan air bersih satu kali sehari.
- 4) Licinkan kedua telapak tangan dengan minyak sayur/babyoil.
- 5) Tidak boleh mengoles krim, minyak, alkohol atau sabun pada puting payudara. Cara memahami bra yang mengganjal.
- 6) Massage payudara/Breast care.
- 7) Letakkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara.
- 8) Gerakan memutar, kesamping dan ke bawah sebanyak 10-15 kali. Tangan kiri memopang payudara kiri, tangan kanan mengurut payudara dari pangkal kearah puting sebanyak 10-15 kali.
- 9) Ketuk-ketuk payudara dengan ruas jari tangan secara berulang-ulang lakukan hal yang sama pada payudara sebelah kanan.

Apabila yang terjadi mastitis rencana asuhan yang akan diberikan yaitu:
dengan tindakan:

- 1) Kompres air hangat dan lakukan pemijatan.
- 2) Rangsangan oksitosin, dimulai pada payudara yang tidak sakit yaitu stimulasi puting susu, pijat leher, punggung, dll.
- 3) Pemberian antibiotik: *flucloxacilin* atau *erythromycin* selama 7 sampai 10 hari.
- 4) Bila perlu bisa dengan dianjurkan istirahat total dan diberikan obat penghilang rasa nyeri (Walyani E.S & Purwoastuti.E, 2013 hal: 35).

c) Teknik Perawatan Payudara Selama Menyusui.

Adapun beberapa tujuannya yaitu:

- (1) Memelihara kebersihan payudara.
- (2) Memperbanyak atau memperlancar produksi ASI.

Tehnik perawatan payudara selama menyusui sebagai berikut:

Cara I:

Tempatkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara, kemudian urut kearah atas, terus ke samping, terus ke bawah dan melintang, sehingga tangan menyangga payudara, kemudian lepaskan tangan dari payudara.

Cara II:

Telapak tangan kiri menopng payudara kiri, dan jari-jari tangan kanan saling dirapatkan, kemudian sisi kelingking tangan kanan mengurut payudara dari pangkal kearah puting, demikian pula payudara kanan.

Cara III:

Telapak tangan menopang payudara seperti pada cara II, kemudian jari-jari tangan kanan dikepalkan, kemudian buku-buku jari tangan kanan mengurut payudara dari pangkal kearah puting. Rangsang payudara dengan menggunakan air hangat dan air dingin. Caranya siram atau kompres (Bandiyah Siti, 2009: 43-44).

Jika kasus yang ibu alami kelainan bentuk puting susu datar atau tenggelam/terbenam maka perlu dilakukan penanganan. Memang ada beberapa bentuk puting susu, ada normal, ada yang pendek, panjang, datar, atau terbenam.

Beberapa ibu yang merasa putingnya datar atau terlalu pendek menganggap ia tidak akan berhasil menyusui. Perlu diketahui bahwa bayi tidak menghisap dari puting tetapi memerah payudara dari areola, jadi yang penting adalah daerah belakang puting dapat masuk ke dalam mulut bayi dan anggaphlah bahwa puting itu hanya pengarah kemana bayi harus menghisap, sebab disitulah terkumpul akhir dari saluran ASI.

Memang dengan puting datar atau terbenam/tenggelam ini perlu mendapat bantuan agar bayi sudah dapat menyusu dari ibu sebelum terjadi pembengkakan payudara. Sebab bila sudah terjadi pembengkakan akan lebih sulit memasukkan payudara ke dalam mulut bayi(Maryunani Anik, 2012:184).

Adapun cara mengatasi puting datar atau terbenam/tenggelam sebagai berikut:

- (1) Sewaktu hamil 28 minggu, dianjurkan untuk menarik-narik puting susu keluar dengan bantuan '*baby oil*'.
- (2) Sebelum memberikan ASI, menarik puting susu keluar, atau puting ditarik keluar secara teratur hingga puting akan sedikit menonjol dan dapat diisapkan ke mulut bayi, puting akan lebih menonjol lagi.
- (3) Dengan menggunakan pompa puting, puting susu yang datar atau terbenam/tenggelam dapat dibantu agar menonjol dan dapat diisap oleh mulut bayi. Upaya ini dapat dimulai sejak kehamilan dan biasanya hanya perlu dibantu hingga bayi berusia 5-7 hari (Maryunani Anik, 2012:184-185).

C. Tinjauan Agama Islam Tentang Penyakit dan Menyusui Pada Masa Nifas

Berbagai penyakit yang diderita seseorang itu sebenarnya merupakan ujian dan cobaan dari Allah SWT, agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah SWT, sebagaimana diingatkan dalam QS. Al-Baqarah 2:156.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Terjemahnya :

(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah Kami kembali. kalimat ini dinamakan kalimat istirjaa (pernyataan kembali kepada Allah). Disunatkan menyebutnya waktu ditimpa marabahaya baik besar maupun kecil (Departemen RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya:2009).

Menyembuhkan berbagai penyakit itu bagi Allah bukanlah perkara sulit, disamping usaha berobat secara medis mintalah pertolongan kepada Allah. Tanpa izin dan kehendak Allah seseorang tidak mungkin sembuh dari berbagai penyakit yang dideritanya, walaupun dia mendatangi berbagai rumah sakit termahal didunia ini, dan menghabiskan biaya puluhan milyar sekalipun.

Al-Qur'an merupakan obat penyembuh bagi berbagai penyakit yang diderita manusia, baik penyakit medis, kejiwaan, maupun penyakit akibat gangguan jin dan sihir. Sebagaimana diingatkan dalam QS. Al-Israa/17: 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Terjemahnya :

dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian (Al-Israa 17:82).

Jika anda salah satu penyakit baik itu ringan ataupun berat mintalah pertolongan pada Allah untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Di samping berobat secara medis ataupun obat-obatan herbal mintalah pertolongan pada Allah dengan mengerjakan shalat malam atau tahajjud. Dalam shalat malam atau tahajjud itu bacalah ayat-ayat penyembuh (As-Syifa) yang kami sampaikan. Rasakan keajaiban dari pertolongan Allah yang menakjubkan Insya Allah. Dia yang menjadikan penyakit dan dia pula yang menyembuhkannya sebagaimana diingatkan Allah dalam QS. Asy-Syu'araa/26: 80


 ذَا مَرَضٍ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya :

dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku,

Berikut ini kami sampaikan beberapa ayat As-syifa (penyembuh) yang ada di dalam Al-Qur'an. Bacalah ayat-ayat tersebut di dalam shalat dengan memahami maknanya. Harapkan kesembuhan dan pertolongan Allah, betapapun berat penyakit seseorang dengan mudah Allah bisa menyembuhkannya.

Pada kasus ibu mengalami kelainan bentuk puting dianjurkan untuk selalu berserah diri kepada Allah karena hal ini merupakan suatu cobaan dan

senantiasa meminta pertolongan untuk kesembuhan dirinya dengan cara menerapkan setiap kali ingin menyusui bayinya ibu terlebih dahulu membaca Basmallah '*Bismillahirrahmanirrahim*', setelah itu mensalawati ataupun membacakan syahadat atau dzikir sambil menarik-narik puting. Hal ini diharapkan dapat menyembuhkan dan mengembalikan bentuk puting yang awalnya mengalami kelainan dapat berangsur-angsur kembali ke bentuk normal.

Anjuran ini dapat dilakukan setiap saat sebelum menyusui bayinya, karena bayi juga membutuhkan ASI untuk memenuhi kebutuhannya dan ASI sangat diperlukan bayi sebagai antibody agar bayi tidak mudah terserang penyakit.

Menurut Andi Sitti Rahma (2012), Air Susu Ibu mengandung antibody terhadap berbagai jenis virus antara lain poliovirus, cosakievirus, echovirus, influenza virus, reovirus, respiratory syncytisl virus (RSV), rotavirus, dan rhino virus, telah terbukti bahwa ASI menghambat pertumbuhan virus-virus tersebut. Jenis virus diatas adalah jenis virus yang sangat berbahaya apabila menyerang bayi maka dari itu ibu sangat ditekankan untuk menyusui bayinya agar bayi memiliki antibody yang kuat untuk sistem kekebalan tubuhnya.

Dalam Al-Qur'an terdapat anjuran menyusui yang disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya adalah QS. Al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Terjemahnya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah 2:233).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ibu wajib menyusui bayinya dengan dasar bunyi *wa al-wâlidât yurdi'n awlâdahunn*. Potongan ayat tersebut merupakan perintah. Menurut mazhab Mâlikî, aktivitas menyusui merupakan kewajiban ibu dalam kehidupan rumah tangga. Itu merupakan kewajibannya jika si ibu berstatus sebagai seorang istri atau jika si bayi menolak puting selain puting susu ibunya (Hanafi, 2012).

Berdasarkan bunyi kalimat selanjutnya *li man arâda an yutimma al-radâ'ah* (bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan), maka ayat ini bisa dipahami sebagai suatu anjuran bagi ibu untuk menyusui selama dua tahun penuh. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Artinya, ada pilihan bagi ibu untuk menyusui sendiri selama dua tahun atau tidak menyempurnakan penyusuannya (Hanafi, 2012).

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Namun dengan hal itu sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah yang wajib. Jika ibu dan bapak ingin mengurangi masa 0-2 tahun tersebut untuk menyusui anaknya hal tersebut dapat dilakukan karena hanya bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya saja. Tetapi hendaknya tidak berlebih dari 2 tahun karena 2 tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu 2 tahun itu adalah sebagai tolak ukur bila terjadinya perbedaan pendapat. misalnya, ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan (Quraisy Syihab, 2012:609).

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan karena QS.Al-Ahqaf [46]:15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama 9 bulan, penyusuannya selama 21 bulan, sedangkan jika dikandung hanya 6 bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan (Quraisy Syihab, 2012 :610). Tentu saja, ibu menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia.

Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberikan makan, pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara ba'in bukan raj'iy. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara raj'iy, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri sehingga, bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selam tuntutan imbalan itu dinilai wajar (Quraisy Syihab, 2012 :610).

Mengapa menjadi suatu kewajiban untuk ayah? Karena, anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu diatas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya (Quraisy Syihab, 2012 :610).

Tuntutan ini, anak ini mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya,

walaupun ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan para waris adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan.

Warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusunya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah para ibu yang menyusui. Ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak (Quraisy Syihab, 2012 :610).

Apabila keduanya yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan itu (Quraisy Syihab, 2012 :611).

Dan disini, pahami adanya tingkat penyusuan; pertama, tingkat sempurna yaitu 2 tahun atau 30 minggu kurang masa kandungan; kedua, masa cukup yaitu kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya.

Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya karena sakit maupun alasan yang dapat

menimbulkan kecaman misalnya karena ibumeminta baayaran yang tidak wajar, maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat diatas dengan pesannya, jika kamu, wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusunya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain berupa upah atau hadiah menurut yang patut (Quraisy Syihab, 2012 :611).

Firman-Nya: Tidak ada dosa bagi kamu, yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa karena, ketika itu, air susu yang dimilikinya akan mubazir dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, kecuali oleh ibu, tidak difungsikannya (Quraisy Syihab, 2012 :611).

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah suatu metode pendekatan pemecahan masalah yang digunakan oleh bidan dalam proses pemecahan masalah dalam pemberian pelayanan Asuhan kebidanan atau merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan oleh bidan serta merupakan metode yang terorganisasi melalui tindakan yang logikal dalam pemberian pelayanan.

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan ini akan dilakukan secara berkelanjutan mulai dari kehamilan sampai masa nifas. Asuhan ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk

puting susu yang ideal untuk menyusui, mengingat segera setelah bayi lahir maka bayi akan langsung menyusu pada ibunya.

Sehingga diharapkan asuhan selama nifas terkait menyusui,teknik menyusui, produksi ASI dapat dimaksimalkan. Diharapkan hal ini akan mencegah terjadinya Bendungan ASI, Mastitis, Abses yang akan mempengaruhi pemberian ASI.

a. Masa Kehamilan

Adapun Tahapan- tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan meliputi :

1) Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Merupakan langkah yang melakukan pengkajian dan pengumpulan data untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan sebelumnya, data laboratorium dan membandingkannya dengan hasil studi. Semua data dikumpulkan dari semua sumber yang berhubungan dengan kondisi pasien yaitu data subjektif dan data objektif.

Data subjektif dari klien meliputi biodatanya, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan dan nifas, spritual serta pemahaman dari pasien. Sedangkan data objektif yaitu data yang di dapatkan dengan cara melakukan pendokumentasian terhadap semua hasil pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan terkhusus yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi serta

pemeriksaan penunjang yaitu dari hasil pemeriksaan laboratorium, catatan baru atau yang sudah ada sebelumnya.

Data subjektif diambil dari hasil anamnese yang telah di dapat dari pasien pada pemeriksaan kehamilan di kunjungan ANC yaitu puting susunya mengalami kelainan sehingga pada masa nifas nanti bayinya sulit untuk dapat diberikan ASI serta bayi juga sulit untuk menghisap puting ibu.

Data objektif yaitu dilihat dari keadaan umum ibu, kesadaran ibu, pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan dan pemeriksaan fisik secara terfokus yaitu pada pemeriksaan payudara dilakukan inspeksi dan palpasi. Pada kasus kelainan bentuk puting dapat dilakukan pemeriksaan fisik pada daerah payudara puting susu terlihat tidak menonjol atau terbenam.

Puting susu akan ada yang tampak tenggelam atau terbenam, tidak terlihat, dan dapat juga terlihat, sehingga ada puting yang nantinya telah dilakukan penanganan dengan puting ditarik akan dapat bertahan dengan cukup baik. Adapun bentuk puting yang tertarik kedalam yang nantinya dilakukan penarikan puting akan kembali mundur dan tidak dapat bertahan lama dan ada pula bentuk puting yang sangat tertarik kedalam sehingga sulit ditarik keluar apalagi untuk mempertahankan posisinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa penanganan seperti: nipple pam, urutan, tehnik hoffman, dan trik menggunakan spoit.

2) Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi data secara benar terhadap diagnosis atau masalah kebutuhan pasien yang dapat ditemukan berdasarkan interpretasi yang benar terhadap data dasar. Selain itu, sudah ada tindakan perencanaan yang dibutuhkan terhadap masalah yang di hadapi.

Pada kasus kelainan bentuk puting dilakukan identifikasi diagnosa kebidanan yaitu pada data subjektif ibu mengalami kelainan bentuk pada putingnya sehingga akan mempengaruhi proses menyusui segera setelah melahirkan. Pada kasus kelainan bentuk puting ditetapkan berdasarkan pernyataan ibu terkait keadaan payudaranya dengan puting yang tidak menonjol dan terlihat jelas saat pemeriksaan fisik pada bagian payudara bahwa ibu mengalami kelainan bentuk pada putingnya.

Pada data objektif didapatkan puting payudara tampak mengalami kelainan bentuk, hiperpigmentasi areola mammae, puting susu tidak menonjol, pengeluaran ASI belum ada, tidak ada benjolan dan massa serta nyeri sedikit saat di tekan serta pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan dalam batas normal.

3) Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi yang cukup besar dan apabila memungkinkan dapat dilakukan proses pencegahan

atau penanganan lebih lanjut dalam kondisi tertentu pasien yang membutuhkan tindakan segera.

Pada kasus kelainan bentuk puting pada masa kehamilan jika tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan masalah pada pemberian ASI seperti bayi tidak dapat menyusui secara maksimal serta ASI yang tidak dikeluarkan akan menumpuk didalam payudara sehingga dapat menyebabkan bendungan ASI dan akan berlanjut menjadi mastitis, bahkan sampai terjadi abses payudara pada masa nifas.

4) Langkah IV. Evaluasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi dan menetapkan beberapa tindakan setelah diagnosis dan masalah ditegakkan. Kegiatan bidan pada langkah ini adalah konsultasi, kolaborasi dengan dokter umum atau dokter spesialis dan melakukan rujukan. Pada kasus ibu dengan kelainan bentuk puting untuk mengantisipasi bendungan dan infeksi dapat dilakukan pemberian perawatan payudara dan obat analgetik dan obat antibiotik bila perlu, memberikan anjuran kepada ibu untuk melakukan perawatan payudara dengan menarik puting untuk mempersiapkan proses menyusui bayi segera setelah lahir dan tetap menjaga kebersihan daerah payudara terutama puting.

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter serta dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Pada kasus kelainan bentuk puting tidak dilakukan tindakan segera tetapi perlu adanya kolaborasi dengan dokter untuk penanganannya.

5) Langkah V. Rencana Asuhan Kebidanan

Setelah beberapa tindakan yang dibutuhkan pasien ditetapkan, harus ada pula perencanaan secara menyeluruh terhadap masalah dan diagnosis yang ada. Maka proses perencanaan asuhan secara menyeluruh dilakukan juga identifikasi beberapa data yang tidak lengkap agar pelaksanaan secara menyeluruh dapat berhasil sesuai dengan rencana asuhan kebidanan.

Pada kasus ibu dengan kelainan bentuk puting rencana asuhan akan diberikan yaitu melakukan observasi terhadap keadaan umum, tanda-tanda vital, Pada kasus kelainan bentuk puting rencana asuhan yang akan diberikan adalah, memberikan edukasi dan tindakan tentang perawatan payudara.

Menurut Rahmawati, dkk (2009), berikut ini beberapa cara merawat payudara yaitu dengan menjaga agar tangan dan puting susu selalu bersih untuk mencegah kotoran kuman masuk ke dalam mulut bayi. Setiap kali mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum menyentuh puting susu dan sebelum menyusui bayi, harus mencuci tangan sesudah buang air kecil atau besar atau menyentuh sesuatu yang kotor, membersihkan payudara dengan air bersih satu kali sehari. Melicinkan kedua telapak tangan dengan minyak sayur/baby oil.

Pada perawatan payudara tidak boleh mengoles krim, minyak, alkohol atau sabun pada puting payudara dan memakai bra yang mengganjal, setelah

itu melakukan massage payudara/breast care, kemudian meletakkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara, setelah itu melakukan gerakan memutar, kesamping dan ke bawah sebanyak 10-15 kali dengan cara tangan kiri memopang payudara kiri, tangan kanan mengurut payudara dari pangkal kearah puting sebanyak 10-15 kali. Kemudian ketuk-ketuk payudara dengan ruas jari tangan secara berulang-ulang lakukan hal yang sama pada payudara sebelah kanan.

Perawatan payudara selama masa kehamilan memiliki beberapa tujuan yaitu memelihara kebersihan payudara, melenturkan dan menguatkan puting susu, mengeluarkan puting susu yang tertarik kedalam dan mempersiapkan produksi ASI.

Ada beberapa tehnik perawatannya dengan cara melicinkan kedua telapak tangan dengan sedikit minyak, lalu mengompres puting susu dengan kain/kapas yang diberi minyak selama beberapa saat agar kotoran mudah dibersihkan. Setelah itu, tarik kedua puting susu keluar sambil diputar ke kiri 20 kali dan ke kanan 20 kali.

Kemudian memegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urutkan dari pangkal payudara kearah puting sebanyak 30 kali, lakukan pijatan puting hingga keluar cairan, untuk memastikan bahwa saluran susu tidak tersumbat, membersihkan puting susu dan sekitarnya dengan handuk kering dan bersih. Tidak dianjurkan menggunakan BH yang menekan

payudara, tapi gunakan BH yang menopang payudara(Bandiyah Siti, 2009: 41-42).

Jika puting susu datar tertarik ke dalam, cara merawatnya sebagai berikut meletakkan kedua ibu jari diatas dan dibawah puting puting susu, meregangkan daerah areola kearah bawah sebanyak 20 kali dan meletakkan kedua ibu jari disamping kiri dan disamping kanan puting susu, lalu regangkan daerah areola dengan menggerakkan kedua ibu jari kearah kanan sebanyak 20 kali, lakukan 2 kali sehari jika usia kehamilan 3 bulan (Bandiyah Siti, 2009: 42-43).

6) Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan

Adapun pada langkah ini yang merupakan pelaksanaan dari semua rencana sebelumnya, baik terhadap masalah pasien ataupun diagnosis yang ditegakkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh bidan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya agar semua tindakan dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai harapan bersama.

Pada langkah ini melaksanakan rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Walaupun bidan tidak melakukan sendiri ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya.

Pada kasus ibu dengan kelainan bentuk puting disesuaikan dengan rencana tindakan yang dilakukan pada langkah kelima.

7) Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Merupakan tahap terakhir dalam manajemen kebidanan, yakni dengan melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan bidan. Evaluasi sebagai bagian dari proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pelayanan secara komprehensif dan selalu berubah sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien. Pada kasus ibu dengan kelainan bentuk puting melakukan evaluasi ulang dari semua asuhan yang telah diberikan yaitu puting telah tertarik sedikit keluar sehingga puting payudara mulai berangsur-angsur kembali mendekati bentuk normal puting payudara.

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dianggap efektif jika memang benar dalam pelaksanaannya (Mufdillah, dkk,2012).

Pada kasus kelainan bentuk puting dari asuhan yang diberikan secara rutin maka sedikit demi sedikit puting susu ibu tampak keluar walaupun sesekali masuk kembali.

b. Masa Persalinan

Adapun Tahapan- tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan yaitu:

1) Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Langkah ini melakukan pengkajian dan pengumpulan data untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan sebelumnya, data laboratorium dan membandingkannya dengan hasil studi. Semua data dikumpulkan dari semua sumber yang berhubungan dengan kondisi pasien yaitu data subjektif dan data objektif.

Data subjektif dari klien meliputi biodatanya, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan dan nifas, spritual serta pemahaman dari pasien. Sedangkan data objektif yaitu data yang di dapatkan dengan cara melakukan pendokumentasian terhadap semua hasil pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan terkhusus yaitu inspeksi dan palpasi terutama pada bagian puting payudara, maupun catatan baru atau yang sudah ada sebelumnya.

Data subjektif diambil dari hasil anamnese yang telah di dapat dari pasien pada pemeriksaan awal masuk ke ruang bersalin yaitu puting susunya sudah tampak menonjol sehingga pada saat bayinya lahir mudah diberikan ASI serta bayi tidak sulit untuk menghisap puting ibu.

Data objektif yaitu dilihat dari keadaan umum ibu, kesadaran ibu, pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan dan

pemeriksaan fisik secara terfokus yaitu pada pemeriksaan payudara dilakukan inspeksi dan palpasi. Pada kasus kelainan bentuk puting dapat dilakukan pemeriksaan fisik pada daerah payudara yaitu, puting susu terlihat menonjol dan tidak terbenam lagi.

Puting susu akan ada yang tampak tenggelam atau terbenam, tidak terlihat, dan dapat juga terlihat, sehingga ada puting yang nantinya telah dilakukan penanganan dengan puting ditarik akan dapat bertahan dengan cukup baik. Adapun bentuk puting yang tertarik kedalam yang nantinya dilakukan penarikan puting akan kembali mundur dan tidak dapat bertahan lama dan ada pula bentuk puting yang sangat tertarik kedalam sehingga sulit ditarik keluar apalagi untuk mempertahankan posisinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa penanganan seperti: nipple pam, urutan, tehnik hoffman, dan trik menggunakan spoit.

2) Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada kasus kelainan bentuk puting yang didapatkan pada Ny”R” di ruang ANC pada masa kehamilan dilakukan identifikasi diagnosa kebidanan yaitu pada data subjektif ibu mengalami kelainan bentuk pada puting saat itu dengan puting terbenam sehingga akan mempengaruhi proses menyusui segera setelah melahirkan. Tetapi pada saat ibu bersalin kelainan bentuk puting yang dialami oleh ibu sudah tampak menonjol ditetapkan berdasarkan pernyataan ibu terkait keadaan payudaranya dengan puting yang awalnya terbenam semasa kehamilan dan setelah dilakukan perawatan payudara

segera mungkin pada saat itu puting payudara ibu telah menonjol dan terlihat jelas saat pemeriksaan fisik pada bagian payudara dan ibu merasa senang dapat menyusui bayinya segera setelah lahir dengan cara IMD .

Pada data objektif didapatkan puting payudara tampak berisi, hiperpigmentasi areola mammae, puting susu tampak menonjol keluar, pengeluaran ASI ada sedikit, tidak ada benjolan dan massa serta nyeri sedikit saat di tekan serta pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan dalam batas normal.

3) Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi yang cukup besar dan apabila memungkinkan dapat dilakukan proses pencegahan atau penanganan lebih lanjut dalam kondisi tertentu pasien yang membutuhkan tindakan segera.

Pada kasus kelainan bentuk puting pada Ny”R” dengan puting terbenam yang didapatkan pada masa kehamilan kini telah menonjol setelah dilakukannya perawatan payudara dan telah dilakukan IMD segera setelah bayi lahir dan bayi menemukan puting susunya dan jika hal ini, tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan masalah pada pemberian ASI seperti bayi tidak dapat menyusui secara maksimal serta ASI yang tidak dikeluarkan akan menumpuk didalam payudara sehingga dapat menyebabkan bendungan ASI dan akan berlanjut menjadi mastitis, bahkan sampai terjadi abses payudara.

4) Langkah IV. Evaluasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi dan menetapkan beberapa tindakan setelah diagnosis dan masalah ditegakkan. Kegiatan bidan pada langkah ini adalah konsultasi, kolaborasi dengan dokter umum atau dokter spesialis dan melakukan rujukan. Pada kasus ibu dengan kelainan bentuk puting pada Ny”R” dengan puting terbenam saat ini puting payudaranya telah menonjol dan IMD segera setelah bayi lahir telah dilakukan untuk mengantisipasi hal dapat memungkinkan terjadi lainnya yaitu bendungan dan infeksi dapat dilakukan pemberian perawatan payudara dan obat analgetik dan obat antibiotik bila perlu, memberikan anjuran kepada ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara dengan menarik puting untuk lebih memudahkan proses menyusui bayinya dan tetap menjaga kebersihan daerah payudara terutama puting.

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter serta dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kasus kelainan bentuk puting tidak dilakukan tindakan segera tetapi perlu adanya kolaborasi dengan dokter untuk penanganannya.

5) Langkah V. Rencana Asuhan Kebidanan

Tindakan yang dibutuhkan pasien ditetapkan, harus ada pula perencanaan secara menyeluruh terhadap masalah dan diagnosis yang ada. Maka proses perencanaan asuhan secara menyeluruh dilakukan juga

identifikasi beberapa data yang tidak lengkap agar pelaksanaan secara menyeluruh dapat berhasil sesuai dengan rencana asuhan kebidanan.

Pada kasus kelainan bentuk puting dengan puting terbenam rencana asuhan akan diberikan yaitu melakukan observasi terhadap keadaan umum, tanda-tanda vital, Pada kasus kelainan bentuk puting rencana asuhan yang akan diberikan adalah, memberikan edukasi dan tindakan tentang IMD.

6) Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan

Adapun pada langkah ini yang merupakan pelaksanaan dari semua rencana sebelumnya, baik terhadap masalah pasien ataupun diagnosis yang ditegakkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh bidan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya agar semua tindakan dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai harapan bersama. Pada kasus ibu dengan kelainan bentuk puting disesuaikan dengan rencana tindakan yang dilakukan pada langkah kelima.

7) Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Merupakan tahap terakhir dalam manajemen kebidanan, yakni dengan melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan bidan. Evaluasi sebagai bagian dari proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pelayanan secara komperhensif dan selalu berubah sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien. Pada kasus ibu postnatal care dengan kelainan bentuk puting melakukan evaluasi ulang dari semua asuhan yang telah diberikan yaitu puting telah tertarik sedikit keluar dan telah

menonjol, ASI mulai sedikit keluar serta bayi dapat menghisap puting tanpa kesulitan dan dapat menyusui secara maksimal sehingga dari hisapan bayi saat dilakukan IMD dapat mempengaruhi puting payudara tetap menonjol keluar dan mulai berangsur-angsur kembali mendekati bentuk normal puting payudara.

c. Masa Nifas

Adapun Tahapan- tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan meliputi:

1) Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Merupakan langkah yang melakukan pengkajian dan pengumpulan data untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan sebelumnya, data laboratorium dan membandingkannya dengan hasil studi. Semua data dikumpulkan dari semua sumber yang berhubungan dengan kondisi pasien yaitu data subjektif dan data objektif.

Data subjektif dari klien meliputi biodatanya, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan dan nifas, spritual serta pemahaman dari pasien. Sedangkan data objektif yaitu data yang di dapatkan dengan cara melakukan pendokumentasian terhadap semua hasil pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan terkhusus yaitu inspeksi, palpasi, perkusi serta pemeriksaan penunjang yaitu dari hasil pemeriksaan laboratorium, catatan baru atau yang sudah ada sebelumnya.

Data subjektif diambil dari hasil anamnesa yang telah di dapat dari pasien yaitu puting susunya mengalami kelainan, bayinya sulit untuk di berikan ASI, bayinya gelisah dan rewel, pengeluaran ASI sudah ada, dikarenakan putingnya mengalami kelainan maka bayinya sulit untuk dapat diberikan ASI serta bayi juga sulit untuk menghisap puting ibu.

Data objektif yaitu di lihat dari keadaan umum ibu, kesadaran ibu, pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan dan pemeriksaan fisik secara terfokus yaitu pada pemeriksaan payudara dilakukan inspeksi dan palpasi. Pada kasus dengan kelainan bentuk puting dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan indera penglihatan serta pemeriksaan rabaan untuk memastikan kelainan bentuk yang terjadi pada daerah puting payudara, dalam pemeriksaan tersebut didapatkan puting susu yang terbenam sehingga dilakukan beberapa penanganan seperti: nipple pam, urutan, tehnik hoffman, dan trik menggunakan spoit.

2) Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi data secara benar terhadap diagnosis atau masalah kebutuhan pasien yang dapat ditemukan berdasarkan interpretasi yang benar terhadap data dasar. Selain itu, sudah ada tindakan perencanaan yang dibutuhkan terhadap masalah yang di hadapi.

Pada kasus kelainan bentuk puting dilakukan identifikasi diagnosa kebidanan yaitu pada data subjektif ibu merasa sulit untuk menyusui bayinya, bayinya rewel dikarenakan bayi sulit menghisap puting ibu yang disebabkan

oleh terjadinya kelainan pada bentuk puting ibu. Pada data objektif didapatkan payudara tampak penuh, hiperpigmentasi areola mammae, puting susu tidak menonjol, pengeluaran ASI sudah ada, tidak ada benjolan dan massa serta nyeri sedikit saat di tekan serta pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan.

Hal ini dapat terjadi karena adanya kelainan pada bentuk puting susu pada ibu sehingga dapat memungkinkan terjadinya penyempitan pada ductus laktiferus dan menyebabkan bayi untuk sulit menyusui serta penggunaan teknik menyusui bayi yang salah dapat menimbulkan masalah pada puting sehingga pengeluaran ASI tidak sempurna dan bayi tidak menyusui secara maksimal.

Diagnosis : Ibu dengan kelainan bentuk puting.

Masalah : Puting terbenam

3) Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi yang cukup besar dan apabila memungkinkan dapat dilakukan proses pencegahan atau penanganan lebih lanjut dalam kondisi tertentu pasien yang membutuhkan tindakan segera. Pada kasus dengan kelainan bentuk puting yang dapat timbul apabila tidak di tangani yaitu akan terjadi puting susu lecet, bendungan, mastitis dan abses payudara.

Puting susu lecet dapat disebabkan oleh teknik menyusui yang kurang tepat, pembengkakan payudara, iritasi dari bahan kimia misalnya sabun, moniliasis atau infeksi jamur (Saryono dan Dyah, 2012).

Bendungan air susu dapat terjadi pada hari ke-2 atau ke-3 ketika payudara telah memproduksi air susu. Bendungan disebabkan oleh pengeluaran air susu yang tidak lancar, karena bayi tidak cukup sering menyusui, produksi meningkat, terlambat menyusukan, hubungan dengan bayi yang kurang baik, dan dapat pula terjadi akibat pembatasan waktu menyusui. Bendungan ASI dapat terjadi karena adanya penyempitan duktus laktiferus pada payudara ibu dan dapat terjadi pula bila ibu memiliki kelainan puting susu.

Mastitis adalah peradangan pada payudara. Ada dua jenis mastitis yaitu non-infective mastitis (hanya karena pembendungan ASI/ *milk stasis*) dan *infective mastitis* (telah terinfeksi bakteri). Lecet pada puting dan trauma pada kulit juga dapat mengundang infeksi bakteri. Gejala yang ditemukan adalah payudara menjadi merah, bengkak, kadang disertai rasa nyeri dan panas, serta suhu tubuh meningkat. Dibagian dalam terasa ada massa padat dan dibagian luarnya, kulit menjadi merah.

Kejadian ini terjadi pada masa nifas 1-3 minggu setelah persalinan diakibatkan oleh sumbatan saluran ASI yang berlanjut (Riskani, 2012: 85-90).

4) Langkah IV. Evaluasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi dan menetapkan beberapa tindakan setelah diagnosis dan masalah ditegakkan. Kegiatan bidan pada

langkah ini adalah konsultasi, kolaborasi dengan dokter umum atau dokter spesialis dan melakukan rujukan. Pada kasus ibu postnatal care dengan kelainan bentuk puting untuk mengantisipasi bendungan dan infeksi dapat dilakukan pemberian perawatan payudara dan obat analgetik dan obat antibiotik bila perlu, memberikan anjuran kepada ibu untuk melakukan perawatan payudara dengan menarik puting sebelum menyusui bayinya dan tetap menjaga kebersihan daerah payudara terutama puting.

5) Langkah V. Rencana Asuhan Kebidanan

Setelah beberapa tindakan yang dibutuhkan pasien ditetapkan, harus ada pula perencanaan secara menyeluruh terhadap masalah dan diagnosis yang ada. Maka proses perencanaan asuhan secara menyeluruh dilakukan juga identifikasi beberapa data yang tidak lengkap agar pelaksanaan secara menyeluruh dapat berhasil sesuai dengan rencana asuhan kebidanan.

Pada kasus ibu postnatal care dengan kelainan bentuk puting rencana asuhan akan diberikan yaitu melakukan observasi terhadap keadaan umum, tanda-tanda vital, mengobservasi tanda infeksi, mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar yaitu dengan mengompresnya terlebih dahulu dengan air hangat kemudian air dingin lalu oleskan air susu di sekitar puting kemudian mulai menyusui bayi, serta mengajarkan tentang cara melakukan perawatan payudara, memberitahukan ibu untuk menjaga kebersihan area sekitar payudara, menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi

seimbang mengandung protein, karbohidrat, mineral, kalsium, dan vitamin serta mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter bila perlu.

Adapun rencana asuhan yang akan dilakukan sesuai masalah yang timbul dikarenakan kelainan puting yaitu:

Apabila payudara terasa sakit karena terlalu penuh berisi ASI atau puting susu lecet, anda dapat melakukan pemerahan payudara dengan tangan. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk menanganinya yaitu memerah dengan tangan. Keluarkan sedikit air susu kemudian oleskan sedikit air susu ke bagian puting secara melingkar, memegang payudara dibagian pangkal dengan kedua tangan. Lalu menggerakkan tangan ke arah depan (mengurut ke arah puting susu) setelah itu memijat daerah areola (warna hitam disekitar puting) dan diperah ke arah puting susu, kemudian kumpulkan ASI yang telah diperah dalam mangkuk atau botol bersih (Nurjannah. dkk, 2013).

Jika yang terjadi adalah bendungan maka penanganan yang dilakukan yang paling penting adalah mencegah terjadinya payudara bengkak dapat ditangani dengan menyusukan bayi segera setelah lahir, menyusui bayi tanpa dijadwalkan, mengeluarkan sedikit ASI sebelum menyusui agar payudara lebih lembek. Setelah itu, keluarkan ASI dengan tangan atau pompa bila produksi ASI melebihi ASI. Untuk mengurangi rasa sakit pada payudara berikan kompres dingin dan hangat dengan handuk secara bergantian kiri dan kanan.

Perawatan ini dilakukan untuk memudahkan bayi menghisap atau menangkap puting susu berikan kompres sebelum menyusui, untuk mengurangi bendungan di vena dan pembuluh getah bening dalam payudara lakukan pengurutan yang dimulai dari puting ke arah korpus mammae, ibu harus rileks, pijat leher dan punggung belakang (Rukiyah dan Yulianti, 2010).

Dalam hal itu perlu dilakukan masase payudara dan ASI diperas dengan tangan sebelum menyusui. Kompres dingin untuk mengurangi statis pembuluh dara vena dan rasa nyeri. Dapat dilakukan secara bergantian dengan kompres panas untuk melancarkan aliran darah payudara. Menyusui lebih sering dan lebih lama pada payudara bengkak untuk mencarkan aliran ASI dan menurunkan tegangan payudara (Bahiyatun, 2009).

Selain itu asuhan pada ibu dengan bendungan ASI Menurut Maryunani (2015), yaitu dengan cara menyusui yang baik dan benar saat sebelum menyusui, keluarkan sedikit ASI untuk mengolesi puting ibu agar bayi mencium aromanya dan lebih berselera menyusu. Susui bayi setiap kali ia menginginkannya dan selama yang ia mau. Pada saat menyusui, letakkan bayi dalam pangkuan sedemikian rupa hingga wajah dan tubuhnya menghadap ke payudara ibu.

Posisinya harus lurus searah dari telinga, hidung, badannya dan dagunya menempel di payudara ibu. Duduklah dalam posisi yang nyaman dan tegak, jangan membungkuk, kalau perlu sangga tubuh bayi dengan bantal. Ibu yang baru /saja menjalani persalinan dengan operasi sesar tak perlu khawatir karena

posisi bayi berada di atas perut. Jika bayi menyusui pada payudara kiri, letakkan kepalanya di siku lengan kiri ibu. Kemudian lengan kiri bayi bebas ke arah payudara begitupula sebaiknya, lalu topanglah payudara dengan meletakkan ibu jari tangan ibu diatas puting dan keempat jari menyangga payudara.

Usai menyusui, bayi akan melepaskan isapannya. Kalau tidak lepaskan puting dengan memasukkan jari kelingking ibu ke mulut bayi melalui sudut mulut atau tekan dagu bayi agar bibir bawahnya terbuka. Jangan langsung menarik puting terlalu kuat selagi berada didalam mulut bayi karena akan membuatnya lecet. Bila puting lecet, lakukan kopmpres dingin di payudara dan tetaplah menyusui bayi. Usai menyusui, usapkan tetesan ASI untuk pelumas dan perlindungan. Jika menggunakan obat dokter, seka(sapu) puting dengan air atau waslap basah yang lembut setiap kali akan menyusui.

Menurut Prawihardjo (2010), yang mengatakan berikan parasetamol 500 mg per oral bagi ibu yang menyusui maupun tidak menyusui.

Menurut Rahmawati, dkk (2009), berikut ini beberapa cara merawat payudara dengan terlebih dahulu menjaga agar tangan dan puting susu selalu bersih untuk mencegah kotoran kuman masuk ke dalam mulut bayi, mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum menyentuh puting susu dan sebelum menyusui bayi dan harus mencuci tangan sesudah buang air kecil atau besar atau menyentuh sesuatu yang kotor, membersihkan payudara dengan air bersih satu kali sehari. Licinkan kedua telapak tangan dengan minyak sayur/baby oil.

Pada perawatan payudara tidak boleh mengoles krim, minyak, alkohol atau sabun pada puting payudara kemudian memakai bra yang mengganjal, dapat dilakukan massage payudara/breast care dengan meletakkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara, lakukan gerakan memutar, kesamping dan kebawah sebanyak 10-15 kali dan tangan kiri memopang payudara kiri, tangan kanan mengurut payudara dari pangkal kearah puting sebanyak 10-15 kali, kemudian ketuk-ketuk payudara dengan ruas jari tangan secara berulang-ulang lakukan hal yang sama pada payudara sebelah kanan.

Apabila yang terjadi mastitis rencana asuhan yang akan diberikan yaitu dengan tindakan mengompres air hangat dan lakukan pemijatan, melakukan rangsangan oksitosin, dimulai pada payudara yang tidak sakit yaitu stimulasi puting susu, pijat leher, punggung, dll. Kemudian pemberian antibiotik: *flucloxacilin* atau *erythromycin* selama 7 sampai 10 hari. Bila perlu dianjurkan istirahat total dan diberikan obat penghilang rasa nyeri (Walyani E.S & Purwoastuti.E, 2013 hal: 35).

Teknik perawatan payudara selama menyusui memiliki beberapa tujuannya seperti memelihara kebersihan payudara, memperbanyak atau memperlancar produksi ASI.

Tehnik perawatan payudara selama menyusui ada 3 cara sebagai berikut:

Cara I : Tempatkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara, kemudian urut kearah atas, terus ke samping, terus ke bawah dan

melintang, sehingga tangan menyangga payudara, kemudian lepaskan tangan dari payudara.

Cara II : Telapak tangan kiri menopng payudara kiri, dan jari-jari tangan kanan saling dirapatkan, kemudian sisi kelingking tangan kanan mengurut payudara dari pangkal kearah puting, demikian pula payudara kanan.

Cara III : Telapak tangan menopang payudara seperti pada cara II, kemudian jari-jari tangan kanan dikepalkan, kemudian buku-buku jari tangan kanan mengurut payudara dari pangkal kearah puting. Rangsang payudara dengan menggunakan air hangat dan air dingin. Caranya siram atau kompres (Bandiyah Siti, 2009: 43-44).

Jika kasus yang ibu alami kelainan bentuk puting susu datar atau tenggelam/terbenam maka perlu dilakukan penanganan. Memang ada beberapa bentuk puting susu, ada normal, ada yang pendek, panjang, datar, atau terbenam. Beberapa ibu yang merasa putingnya datar atau terlalu pendek menganggap ia tidak akan berhasil menyusui. Perlu diketahui bahwa bayi tidak menghisap dari puting tetapi memerah payudara dari areola, jadi yang penting adalah daerah belakang puting dapat masuk ke dalam mulut bayi dan anggaphlah bahwa puting itu hanya pengarah kemana bayi harus menghisap, sebab disitulah terkumpul akhir dari saluran ASI.

Memang dengan puting datar atau terbenam/tenggelam ini perlu mendapat bantuan agar bayi sudah dapat menyusu dari ibu sebelum terjadi

pembengkakan payudara. Sebab bila sudah terjadi pembengkakan akan lebih sulit memasukkan payudara ke dalam mulut bayi (Maryunani Anik, 2012 : 184).

Adapun cara mengatasi puting datar atau terbenam/tenggelam meliputi: sewaktu hamil 28 minggu, dianjurkan untuk menarik-narik puting susu keluar dengan bantuan '*baby oil*' dan sebelum memberikan ASI, menarik puting susu keluar, atau puting ditarik keluar secara teratur hingga puting akan sedikit menonjol dan dapat diisapkan ke mulut bayi, puting akan lebih menonjol lagi dengan menggunakan pompa puting, puting susu yang datar atau terbenam atau tenggelam dapat dibantu agar menonjol dan dapat diisap oleh mulut bayi dan upaya ini dapat dimulai sejak kehamilan dan biasanya hanya perlu dibantu hingga bayi berusia 5-7 hari (Maryunani Anik, 2012 : 184-185).

6. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan

Adapun pada langkah ini yang merupakan pelaksanaan dari semua rencana sebelumnya, baik terhadap masalah pasien ataupun diagnosis yang ditegakkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh bidan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya agar semua tindakan dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai harapan bersama. Pada kasus ibu dengan kelainan bentuk puting disesuaikan dengan rencana tindakan yang dilakukan pada langkah kelima.

7. Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Merupakan tahap terakhir dalam manajemen kebidanan, yakni dengan melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan bidan. Evaluasi sebagai bagian dari proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pelayanan secara komperhensif dan selalu berubah sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien. Pada kasus ibu postnatal care dengan kelainan bentuk puting melakukan evaluasi ulang dari semua asuhan yang telah diberikan yaitu puting telah tertarik sedikit keluar, ASI mulai lancar keluar serta bayi dapat menghisap puting dan dapat menyusu secara maksimal puting payudara mulai berangsur-angsur kembali mendekati bentuk normal puting payudara.

E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan.

Manajemen asuhan kebidanan adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dengan , alur pola fikir dan bertindak bidan dalam pengambilan keputusan klinis untuk mengatasi semua masalah yang terjadi dalam proses manajemen asuhan. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan ini meliputi data sebagai berikut:

1. Data Subjektif, merupakan segala bentuk pernyataan,ucapan atau keluhan dari pasien yang merupakan langkah I Helen Varney.
2. Data Objektif, merupakan data yang diobservasi dari hasil pemeriksaan oleh bidan/tenaga kesehatan lain.
3. Assesment, merupakan kesimpulan apa yang dibuat dari data subjektif,

4. Objektif yang ada pada langkah II, III, IV Helen Varney.
5. Planning, yaitu suatu rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan analisis pada langkah V, VI, VII Helen Varney.

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA NY
“R” USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST PARTUM
MINGGU KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK PUTING
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER-04 NOVEMBER
TAHUN 2018

No. Register : 03-18-xx
Tanggal Kunjungan : 17 September 2018 , Jam 09.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 17 September 2018 , Jam 09.02 Wita
Nama Pengkaji : Riswika Haltitah

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”R” / Tn. “H”
Umur : 26 Tahun / 29 Tahun
Nikah/lamanya: 1 kali / ±4 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Muh.Yamin Baru

A. Keluhan Utama dan Riwayat Keluhan Utama

1. Keluhan utama

Ibu datang dengan keluhan kedua putingnya terbenam

2. Riwayat Keluhan Utama

Ibu mengeluh putingnya terbenam, payudaranya lebih berisi, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa atau benjolan sejak tanggal 17 September 2018 pukul 09.02 wita, ibu mengatakan anak yang pertama menyusui selama \pm 3 bulan dan digantikan dengan susu formula disebabkan ibu sulit untuk menyusui bayinya karena bentuk putingnya yang terbenam.

B. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas

1. Ini merupakan kehamilan kedua ibu dan tidak pernah keguguran.

2. HPHT: 27 Desember 2017

3. HTP: 04 Oktober 2018

4. Gestasi 37 minggu 3 hari

5. Ibu melahirkan anak pertama tahun 2014 secara spontan dengan BBL 2600, PBL 48 cm, jenis kelamin perempuan dan penolong persalinan adalah dukun.

6. Riwayat nifas yang lalu seperti involusio uteri, lochea, BAB dan BAK berjalan dengan normal. Namun pemberian ASI Eksklusif tidak berjalan dengan baik hanya diberikan sampai bayi berusia \pm 3 bulan dikarenakan puting susu ibu terbenam dan digantikan dengan susu formula.

C. Riwayat kesehatan/ penyakit yang lalu dan sekarang

1. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun
2. Ibu tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang serius
3. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan asma
4. Ibu tidak sedang menderita penyakit apapun
5. Ibu tidak pernah merokok, mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang
6. Ibu tidak memiliki alergi terhadap obat-obatan dan juga makanan

D. Riwayat Reproduksi

Menarche : 13 tahun
siklus : 28-30 hari
lamanya : 6-7
Disminorhea : Tidak ada

E. Riwayat Keluarga Berencana

Ibu pernah menjadi akseptor KB Suntik 3 bulan selama \pm 3 tahun.

F. Pola Kebiasaan Sehari-hari

1. Nutrisi

Selama hamil:

Ibu mengatakan makan 2-3 kali sehari, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan dan kadang-kadang makan buah, serta minum 7-8 gelas sehari dengan air putih, susu dan teh.

Selama nifas:

Ibu mengatakan makan 1-2 kali sehari, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan dan kadang-kadang makan buah, serta minum 7-8 gelas sehari dengan air putih, susu dan teh.

2. Personal *hygiene*

Selama hamil:

Ibu mandi 2x sehari, gosok gigi tiap kali selesai mandi, keramas 2-3x seminggu dan ganti baju 2x sehari.

Selama nifas:

Ibu mandi 2x sehari, gosok gigi tiap kali selesai mandi, ganti baju 2x sehari dan ganti pembalut tiap 2-3x sehari.

3. Eliminasi

Selama hamil:

BAB: ibu BAB 1-2x sehari, warna kuning kecoklatan, lunak dan tidak ada keluhan.

BAK: ibu BAK 5-6x sehari, warna urine kuning jernih, bau khas amoniak dan tidak ada nyeri saat BAK.

Selama nifas:

BAB: ibu BAB 1-2x sehari, warna kuning kecoklatan, lunak dan tidak ada keluhan.

BAK: ibu BAK 5-6x sehari, warna kuning jernih, bau khas amoniak dan tidak ada rasa nyeri saat BAK.

4. Istirahat

Selama hamil:

Ibu mengatakan tidur siang 2-4 jam dan tidur malam 8 jam.

Selama nifas:

Ibu mengatakan tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 5-6 jam.

5. Keadaan psikologis

Ibu mengatakan merasa bahagia dan sangat senang dengan kelahiran anaknya yang pertama dan dalam keadaan sehat.

6. Spiritual

Selama hamil:

Ibu mengatakan sering melewatkan sholat 5 waktu, ibu sesekali membaca Al-Qur'an.

Selama nifas:

Ibu mengetahui bahwa selama 40 hari masa nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dan setelah 40 hari ibu harus mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah.

G. Riwayat psikososial, ekonomi, dan spiritual

1. Suami maupun keluarga merasa senang dengan kelahiran anak pertamanya
2. Pengambil keputusan utama dalam keluarga adalah suami
3. Ibu mengerjakan urusan rumah tangga dibantu oleh keluarga
4. Ibu dan keluarga beragama islam dan taat menjalankan ibadah
5. Hubungan keluarga dan tetangga baik

6. Suami sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

H. Pemeriksaan fisik

1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis

2. Pemeriksaan tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 120/ 80 mmHg
- b. Nadi : 82x/ menit dengan teratur
- c. Suhu badan : 36,7 °C di bawah axilar
- d. Pernapasan : 20x/ menit

3. Pemeriksaan fisik (Head to Toe)

a. Kepala

Inspeksi : Kepala tampak bersih dan tidak ada ketombe

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan tidak ikterus

c. Wajah

Inspeksi : Tidak ada oedema dan cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak nyeri tekan

d. Hidung

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan dan tampak bersih

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

e. Mulut dan Gigi

Inspeksi : Tampak bersih, tidak ada peradangan pada mulut, dan tidak ada caries pada gigi.

f. Telinga

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran serumen dan tidak ada kelainan

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

g. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran tiroid, dan vena jugularis

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar limfe

h. Payudara

Inspeksi : Tampak simetris, puting susu terbenam, hiperpigmentasi pada *areola mammae*

Palpasi : Payudara tegang dan sedikit nyeri tekan, tidak ada massa atau benjolan

i. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra

Palpasi : Leopold I : TFU, 2 Jrbpx, 31 cm, bokong

Leopold II : PUKA

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

LP : 90 cm

TBJ : $T_{fu} \times L_p = 31 \text{ cm} \times 90 \text{ cm} = 2790 \text{ gram}$

Auskultasi : DJJ : Terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/menit.

j. Genitalia

Inspeksi : Tidak ada varices dan oedema.

k. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, jumlah jari tangan dan kaki lengkap dan tidak ada kelainan

Palpasi : Tidak ada oedema, nyeri tekan, dan varises.

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan (+)

LANGKAH II. Merumuskan Diagnosa/ Masalah Aktual

Diagnosa: Ny "R" dengan masalah puting terbenam

Masalah aktual: puting terbenam

Puting Terbenam

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan puting susunya terbenam dan tidak menonjol

b. Data Objektif

Pada pemeriksaan payudara, puting susu tampak terbenam dan mengkerut pada saat dilakukan pencubitan dengan lembut di belakang areola dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk puting payudara tidak menonjol keluar.

c. Analisa dan interpretasi data

Puting susu terbenam adalah puting susu yang tidak dapat menonjol dan cenderung masuk kedalam, sehingga ASI tidak dapat keluar dengan lancar. Pada kasus ini bayi kesulitan dan mungkin tidak mau menyusui. Puting susu terbenam adalah kelainan anatomis pada puting susu dimana puting susu tidak menonjol keluar (Ambarwati, 2008: 43-45).

LANGKAH III. Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial

Diagnosa potensial : Bendungan ASI

LANGKAH IV. Identifikasi Perlunya Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan

Tidak ada data yang mendukung perlunya dilakukan tindakan segera.

LANGKAH V. Rencana Asuhan Kebidanan

1. Tujuan

Puting susu ibu tidak terbenam, dapat memberikan ASI pada bayinya secara eksklusif dengan baik dan benar, terhindar dari bendungan ASI dan mastitis.

2. Kriteria keberhasilan

Puting susu ibu menonjol, ibu dapat memberikan ASI secara *on demand*, tidak teraba nyeri pada payudara ibu dan berat bayi bertambah.

3. Rencana asuhan

- a. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Rasional : Tangan yang kotor dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme, dimana apabila menyentuh pasien dapat terkontaminasi.

b. Observasi tanda-tanda vital

Rasional : Tanda-tanda vital dapat memberikan gambaran dalam menentukan tindakan selanjutnya.

c. Melakukan perawatan payudara

Teknik melakukan perawatan payudara sebagai berikut:

1. Licinkan kedua telapak tangan dengan sedikit minyak .
2. Kompres puting susu dengan kain/kapas yang diberi minyak selama beberapa saat agar kotoran mudah dibersihkan.
3. Tarik kedua puting susu keluar sambil diputar ke kiri 20 kali dan ke kanan 20 kali.
4. Pegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urutkan dari pangkal payudara kearah puting sebanyak 30 kali.
5. Pijat puting hingga keluar cairan, untuk memastikan bahwa saluran susu tidak tersumbat.
6. Bersihkan puting susu dan sekitarnya dengan handuk kering dan bersih. Janganlah menggunakan BH yang menekan payudara, tapi gunakan BH yang menopang payudara(Bandiyah Siti, 2009: 41-42).

Perawatan payudara untuk puting terbenam yaitu:

- 1) Letakkan kedua ibu jari diatas dan dibawah puting puting susu.
- 2) Regangkan daerah areola kearah bawah sebanyak 20 kali.
- 3) Letakkan kedua ibu jari disamping kiri dan disamping kanan puting susu.

Regangkan daerah areola dengan menggerakkan kedua ibu jari kearah kanan sebanyak 20 kali, lakukan 2 kali sehari jika usia kehamilan 3 bulan (Bandiyah Siti, 2009: 42-43).

Rasional : Perawatan payudara sangatlah baik untuk ibu yang memiliki puting susu terbenam yang diharapkan dapat mengubah puting sehingga menonjol.

- d. Ajarkan kepada ibu agar melakukan perawatan payudara minimal sekali atau dua kali sehari

Rasional : Perawatan payudara pada kehamilan bertujuan untuk mempersiapkan ibu agar dapat menyusui segera setelah bayi lahir.

- e. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi serta buah-buahan.

Rasional : Dengan mengkonsumsi sayuran hijau, makanan yang bergizi dan buah buahan akan dapat memperbanyak dan memperlancar ASI misalnya daun katub, bayam dan lain lain.

f. Berikan ibu motivasi dan dukungan spiritual

Rasional : Dengan memberikan ibu motivasi dan dukungan spiritual akan meningkatkan kemauan ibu agar memiliki puting yang normal dan dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya dengan baik.

g. Menasehati ibu tentang tuntunan agama mengenai pemberian ASI dan masa penyapihan yang baik

Rasional : Dengan diberikannya pengetahuan agama pada ibu tentang pemberian ASI, diharapkan ibu akan memberikan ASI pada bayinya secara *on demand* hingga bayinya berusia 2 tahun

h. Lakukan pendokumentasian

Rasional : Pencatatan yang baik dapat menjadi pegangan petugas jika terjadi sesuatu pada pasien.

LANGKAH VI. Implementasi Asuhan Kebidanan

Tanggal 17 September 2018, jam 09.28 wita

a. Menganjurkan ibu agar mencuci tangan terlebih dahulu

Hasil : Terlaksana

b. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami kelainan bentuk puting yaitu puting terbenam

Hasil : Ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang

c. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 37⁰C, pernapasan 22x/menit.

d. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

e. Melakukan perawatan payudara selama masa kehamilan

Hasil: Terlaksana

f. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau, makanan yang bergizi dan buah-buahan

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

g. Memberikan motivasi dan dukungan spiritual

Hasil: Ibu merasa termotivasi sehingga ingin sekali menyusui bayinya dengan baik segera setelah bayi lahir

h. Menasehati ibu tentang tuntunan agama mengenai pemberian ASI dan masa penyapihan yang baik

Hasil: Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan

i. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan pendokumentasian

LANGKAH VII. Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Tanggal 17 September 2018 , jam 09.35 wita

1. Puting susu ibu masih terbenam
2. Ibu tidak merasa nyeri lagi pada payudaranya
3. Ibu merasa lebih rileks dan segar
4. Ibu merasa senang dan ingin nantinya menyusui bayinya segera setelah lahir dengan memberikan ASI secara eksklusif

5. Tanda-tanda vital dalam batas normal
6. Ibu memahami ajaran islam tentang pemberian ASI dan masa penyapihan yang baik.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA
NY”R” USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST PARTUM
MINGGU KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK PUTING
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER-04 NOVEMBER
TAHUN 2018**

No. Register : 03-18-xx
 Tanggal Kunjungan : 17 September 2018 , Jam 09.00 Wita
 Tanggal Pengkajian : 17 September 2018 , Jam 09.02 Wita
 Nama Pengkaji : Riswika Haltitah

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”R” / Tn. “H”
 Umur : 26 Tahun / 29 Tahun
 Nikah/lamanya: 1 kali / ±4 tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMP / SMA
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
 Alamat : Jl. Muh.Yamin Baru

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan putingnya terbenam
2. Ibu mengeluh payudaranya lebih berisi

3. Ibu mengatakan tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa atau benjolan sejak tanggal 17 September 2018 pukul 09.02 wita
4. Ibu mengatakan anak yang pertama menyusui selama \pm 3 bulan dan digantikan dengan susu formula disebabkan ibu sulit untuk menyusui bayinya karena bentuk putingnya yang terbenam.

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah: 120/ 80 mmHg

Nadi : 82x/menit dengan teratur

Suhu : 36,7⁰C di bawah axilar

Pernapasan : 20x/ menit dengan teratur

4. Pemeriksaan fisik

- a. Kepala

Inspeksi : Kulit dan rambut bersih, tidak rontok

Palpasi : Tidak ada benjolan sekitar kepala, tidak ada nyeri tekan

- b. Wajah

Inspeksi : Tampak ibu lemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada oedema

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

c. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, tidak ada ikterus dan sklera putih

d. Mulut dan gigi

Inspeksi : Mulut tampak bersih, tidak ada peradangan pada mulut, tidak ada caries pada gigi

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

e. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

Palpasi : Tidak ada massa atau benjolan, tidak ada kelainan

f. Payudara

Inspeksi : Kedua puting payudara ibu tampak terbenam, puting susu terbenam, hiperpigmentasi *areola mammae*, payudara tampak berisi

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan ketika dilakukan palpasi, tidak ada massa atau benjolan

g. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra

Palpasi : Leopold I : TFU, 2 Jrbpx, 31 cm, bokong

Leopold II : PUKA

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

LP : 90 cm

TBJ : $T_{fu} \times L_p = 31 \text{ cm} \times 90 \text{ cm} = 2790 \text{ gram}$

Auskultasi : DJJ : Terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/menit.

h. Genetalia

Inspeksi : Tidak ada varices dan oedema.

i. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, jumlah jari tangan dan kaki lengkap dan tidak ada kelainan

Palpasi : Tidak ada edema, nyeri tekan, dan varises.

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan (+)

Assesment(A)

Ny "R" G2 P1 A0, Gestasi 37 minggu 3 hari, intra uterin, situs memanjang, tunggal, hidup, PUKA, presentase kepala, BDP, keadaan ibu dan janin baik dengan ibu kelainan bentuk puting

Planning (P)

Tanggal 17 September 2018, Jam 09.18 Wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami kelainan bentuk puting.

Hasil: Ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84x/menit, suhu 36,7⁰C, pernapasan 22x/menit.

3. Mengajarkan ibu untuk melakukan perawatan payudara minimal sekali atau dua kali sehari.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

4. Melakukan perawatan payudara selama masa kehamilan

Teknik melakukan perawatan payudara sebagai berikut:

- a. Licinkan kedua telapak tangan dengan sedikit minyak .
- b. Kompres puting susu dengan kain/kapas yang diberi minyak selama beberapa saat agar kotoran mudah dibersihkan.
- c. Lalu tarik kedua puting susu keluar sambil diputar ke kiri 20 kali dan ke kanan 20 kali.
- d. Kemudian pegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urutkan dari pangkal payudara kearah puting sebanyak 30 kali.
- e. Setelah itu pijat puting hingga keluar cairan, untuk memastikan bahwa saluran susu tidak tersumbat.
- f. Bersihkan puting susu dan sekitarnya dengan handuk kering dan bersih. Janganlah menggunakan BH yang menekan payudara, tapi gunakan BH yang menopang payudara (Bandiyah Siti, 2009: 41-42).

Perawatan payudara untuk puting terbenam yaitu:

- a. Letakkan kedua ibu jari diatas dan dibawah puting puting susu.
- b. Regangkan daerah areola kearah bawah sebanyak 20 kali.
- c. Kemudian letakkan kedua ibu jari disamping kiri dan disamping kanan puting susu.
- d. Regangkan daerah areola dengan menggerakkan kedua ibu jari kearah kanan sebanyak 20 kali, lakukan 2 kali sehari jika usia kehamilan 3 bulan (Bandiyah Siti, 2009: 42-43).

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan ibu dalam melakukan perawatan payudara dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu kemudian membacakan salawat atau dzikir sambil menarik-narik puting keluar.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienenya selama masa kehamilan dengan rajin mengganti pakaian dalam jika sudah lembab serta mencuci tangan dengan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

7. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:
 - a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas
 - b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit

c. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting

d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

8. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

10. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan pendokumentasian

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN
PADA NY “R” USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST
PARTUM MINGGU KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK
PUTING DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER-04 NOVEMBER
TAHUN 2018**

Kunjungan Rumah Antenatal Care 1 : 19 September 2018 , Jam 09.30 Wita

Nama Pengkaji : Riswika Haltitah

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama	: Ny”R”	/	Tn. “H”
Umur	: 26 Tahun	/	29 Tahun
Nikah/lamanya:	1 kali	/	±4 tahun
Suku	: Makassar	/	Makassar
Agama	: Islam	/	Islam
Pendidikan	: SMP	/	SMA
Pekerjaan	: IRT	/	Wiraswasta
Alamat	: Jl. Muh.Yamin Baru		

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan putingnya terbenam
2. Ibu mengeluh payudaranya lebih berisi
3. Ibu mengatakan tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa atau benjolan sejak tanggal 17 September 2018 pukul 09.02 wita

4. Ibu mengatakan anak yang pertama menyusui selama \pm 3 bulan dan digantikan dengan susu formula disebabkan ibu sulit untuk menyusui bayinya karena bentuk putingnya yang terbenam.

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah: 120/ 80 mmHg

Nadi : 84x/menit dengan teratur

Suhu : 37,5⁰C di bawah axilar

Pernapasan : 22x/ menit dengan teratur

4. Pemeriksaan fisik

- a. Kepala

Inspeksi : Kulit dan rambut bersih, tidak rontok

Palpasi : Tidak ada benjolan sekitar kepala, tidak ada nyeri tekan

- b. Wajah

Inspeksi : Tampak ibu lemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada oedema

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

c. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, tidak ada ikterus dan sklera putih

d. Mulut dan gigi

Inspeksi : Mulut tampak bersih, tidak ada peradangan pada mulut, tidak ada caries pada gigi

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

e. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

Palpasi : Tidak ada massa atau benjolan, tidak ada kelainan

f. Payudara

Inspeksi : Kedua puting payudara ibu tampak terbenam, puting susu terbenam, hiperpigmentasi *areola mammae*, payudara tampak berisi

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan ketika dilakukan palpasi, tidak ada massa atau benjolan

g. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra

Palpasi : Leopold I : TFU, 2 Jrbpx, 31 cm, bokong

Leopold II : PUKA

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

LP : 90 cm

TBJ : $T_{fu} \times L_p = 31 \text{ cm} \times 90 \text{ cm} = 2790 \text{ gram}$

Auskultasi : DJJ : Terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/menit.

h. Genetalia

Inspeksi : Tidak ada varices dan oedema.

i. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, jumlah jari tangan dan kaki lengkap dan tidak ada kelainan

Palpasi : Tidak ada edema, nyeri tekan, dan varises.

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan (+)

Assesment(A)

Ny "R" G2 P1 A0, Gestasi 37 minggu 5 hari, intra uterin, situs memanjang, tunggal, hidup, PUKA, presentase kepala, BDP, keadaan ibu dan janin baik dengan ibu kelainan bentuk puting

Planning (P)

Tanggal 19 September 2018, Jam 09.40 Wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami kelainan bentuk puting.

Hasil: Ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84x/menit, suhu 36,7⁰C, pernapasan 22x/menit.

3. Mengajarkan ibu untuk melakukan perawatan payudara minimal sekali atau dua kali sehari.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

4. Melakukan perawatan payudara selama masa kehamilan

Teknik melakukan perawatan payudara sebagai berikut:

- a. Licinkan kedua telapak tangan dengan sedikit minyak .
- b. Kompres puting susu dengan kain/kapas yang diberi minyak selama beberapa saat agar kotoran mudah dibersihkan.
- c. Lalu tarik kedua puting susu keluar sambil diputar ke kiri 20 kali dan ke kanan 20 kali.
- d. Kemudian pegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urutkan dari pangkal payudara kearah puting sebanyak 30 kali.
- e. Setelah itu pijat puting hingga keluar cairan, untuk memastikan bahwa saluran susu tidak tersumbat.
- f. Bersihkan puting susu dan sekitarnya dengan handuk kering dan bersih. Janganlah menggunakan BH yang menekan payudara, tapi gunakan BH yang menopang payudara (Bandiyah Siti, 2009: 41-42).

Perawatan payudara untuk puting terbenam yaitu:

- a. Letakkan kedua ibu jari diatas dan dibawah puting puting susu.
- b. Regangkan daerah areola kearah bawah sebanyak 20 kali.
- c. Kemudian letakkan kedua ibu jari disamping kiri dan disamping kanan puting susu.
- d. Regangkan daerah areola dengan menggerakkan kedua ibu jari kearah kanan sebanyak 20 kali, lakukan 2 kali sehari jika usia kehamilan 3 bulan (Bandiyah Siti, 2009: 42-43).

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan ibu dalam melakukan perawatan payudara dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu kemudian membacakan salawat atau dzikir sambil menarik-narik puting keluar.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienenya selama masa kehamilan dengan rajin mengganti pakaian dalam jika sudah lembab serta mencuci tangan dengan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

7. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:
 - a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas
 - b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah / hangat selama 5 menit

c. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting

d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

8. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

10. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan pendokumentasian

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA
NY”R”USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST PARTUM
MINGGU KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK PUTTING
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER-04 NOVEMBER
TAHUN 2018**

Kunjungan Rumah Antenatal Care 2 : 22 September 2018 , Jam 09.00 Wita

Nama Pengkaji : Riswika Haltitah

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama	: Ny”R”	/	Tn. “H”
Umur	: 26 Tahun	/	29 Tahun
Nikah/lamanya:	1 kali	/	±4 tahun
Suku	: Makassar	/	Makassar
Agama	: Islam	/	Islam
Pendidikan	: SMP	/	SMA
Pekerjaan	: IRT	/	Wiraswasta
Alamat	: Jl. Muh.Yamin Baru		

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan putingnya terbenam
2. Ibu mengeluh payudaranya lebih berisi,

3. Ibu mengatakan tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa atau benjolan sejak tanggal 17 September 2018 pukul 09.02 wita
4. Ibu mengatakan anak yang pertama menyusu selama \pm 3 bulan dan digantikan dengan susu formula disebabkan ibu sulit untuk menyusui bayinya karena bentuk putingnya yang terbenam.

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah: 110/ 70 mmHg

Nadi : 80x/menit dengan teratur

Suhu : 36,8⁰C di bawah axilar

Pernapasan : 22x/ menit dengan teratur

4. Pemeriksaan fisik

- a. Kepala

Inspeksi : Kulit dan rambut bersih, tidak rontok

Palpasi : Tidak ada benjolan sekitar kepala, tidak ada nyeri tekan

- b. Wajah

Inspeksi : Tampak ibu lemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada oedema

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

c. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, tidak ada ikterus dan sklera putih

d. Mulut dan gigi

Inspeksi : Mulut tampak bersih, tidak ada peradangan pada mulut, tidak ada caries pada gigi

e. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

Palpasi : Tidak ada massa atau benjolan, tidak ada kelainan

f. Payudara

Inspeksi : Kedua puting payudara ibu tampak terbenam, puting susu terbenam, hiperpigmentasi *areola mammae*, payudara tampak berisi

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan ketika dilakukan palpasi, tidak ada massa atau benjolan

g. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra

Palpasi : Leopold I : TFU, 2 Jrbpx, 31 cm, bokong

Leopold II : PUKA

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

LP : 90 cm

TBJ : Tfu x Lp = 31 cm x 90 cm = 2790 gram

Auskultasi : DJJ : Terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/menit.

h. Genetalia

Inspeksi : Tidak ada varices dan oedema.

i. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, jumlah jari tangan dan kaki lengkap dan tidak ada kelainan

Palpasi : Tidak ada edema, nyeri tekan, dan varises.

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan (+)

Assesment(A)

Ny "R" G2 P1 A0, Gestasi 37 minggu 6 hari, intra uterin, situs memanjang, tunggal, hidup, PUKA, presentase kepala, BDP, keadaan ibu dan janin baik dengan ibu kelainan bentuk puting

Planning (P)

Tanggal 22 September 2018, Jam 09.20 Wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa puting ibu mulai tampak menonjol keluar

Hasil: Ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang dan merasa lega

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84x/menit, suhu 36,7⁰C, pernapasan 22x/menit.

3. Mengajarkan ibu untuk melakukan perawatan payudara minimal sekali atau dua kali sehari.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

4. Melakukan perawatan payudara selama masa kehamilan

Teknik melakukan perawatan payudara sebagai berikut:

- a. Licinkan kedua telapak tangan dengan sedikit minyak .
- b. Kompres puting susu dengan kain/kapas yang diberi minyak selama beberapa saat agar kotoran mudah dibersihkan.
- c. Lalu tarik kedua puting susu keluar sambil diputar ke kiri 20 kali dan ke kanan 20 kali.
- d. Kemudian pegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urutkan dari pangkal payudara ke arah puting sebanyak 30 kali.
- e. Setelah itu pijat puting hingga keluar cairan, untuk memastikan bahwa saluran susu tidak tersumbat.
- f. Bersihkan puting susu dan sekitarnya dengan handuk kering dan bersih. Janganlah menggunakan BH yang menekan payudara, tapi gunakan BH yang menopang payudara (Bandiyah Siti, 2009: 41-42).

Perawatan payudara untuk puting terbenam yaitu:

- a. Letakkan kedua ibu jari diatas dan dibawah puting puting susu.
- b. Regangkan daerah areola ke arah bawah sebanyak 20 kali.
- c. Kemudian letakkan kedua ibu jari disamping kiri dan disamping kanan puting susu.

- d. Regangkan daerah areola dengan menggerakkan kedua ibu jari ke arah kanan sebanyak 20 kali, lakukan 2 kali sehari jika usia kehamilan 3 bulan (Bandiyah Siti, 2009: 42-43).

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan ibu dalam melakukan perawatan payudara dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu kemudian membacakan salawat atau dzikir sambil menarik-narik puting keluar.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienenya selama masa kehamilan dengan rajin mengganti pakaian dalam jika sudah lembab serta mencuci tangan dengan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

7. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:

- a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas
- b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah / hangat selama 5 menit
- c. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
- d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

- e. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

8. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

9. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan pendokumentasian

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN
PADA NY “R” USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST
PARTUM MINGGU KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK
PUTING DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER-04 NOVEMBER
TAHUN 2018**

No. Register : 03-18-xx
 Tanggal Kunjungan : 24 September 2018 , Jam 09.30 Wita
 Tanggal Pengkajian : 24 September 2018 , Jam 09.31 Wita
 Nama Pengkaji : Riswika Haltitah

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”R” / Tn. “H”
 Umur : 26 Tahun / 29 Tahun
 Nikah/lamanya: 1 kali / ±4 tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMP / SMA
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
 Alamat : Jl. Muh.Yamin Baru

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan putingnya terbenam
2. Ibu mengeluh payudaranya lebih berisi,
3. Ibu mengatakan tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa atau benjolan sejak tanggal 17 September 2018 pukul 09.02 wita
4. Ibu mengatakan anak yang pertama menyusui selama \pm 3 bulan dan digantikan dengan susu formula disebabkan ibu sulit untuk menyusui bayinya karena bentuk putingnya yang terbenam.

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah: 120/ 60 mmHg

Nadi : 84x/menit dengan teratur

Suhu : 37,5⁰C di bawah axilar

Pernapasan : 22x/menit dengan teratur

4. Pemeriksaan fisik

- a. Kepala

Kulit dan rambut bersih, tidak rontok, tidak ada benjolan sekitar kepala, serta tidak ada nyeri tekan

b. Wajah

Tampak ibu lemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada oedema dan tidak ada nyeri tekan

c. Mata

Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, tidak ada ikterus dan sklera putih

d. Mulut dan gigi

Mulut tampak bersih, tidak ada peradangan pada mulut, tidak ada caries pada gigi

e. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis, serta tidak ada massa atau benjolan, tidak ada kelainan

f. Payudara

Kedua puting payudara ibu tampak terbenam, puting susu terbenam, hiperpigmentasi *areola mammae*, payudara tampak berisi, tidak ada nyeri tekan ketika dilakukan palpasi, tidak ada massa atau benjolan

g. Abdomen

Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra, serta pada pemeriksaan palpasi didapatkan:

Leopold I : TFU, 2 Jrbpx, 31 cm, bokong

Leopold II : PUKA

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP, 4/5

LP : 90 cm

TBJ : $T_{fu} \times L_p = 31 \text{ cm} \times 90 \text{ cm} = 2790 \text{ gram}$

Auskultasi DJJ : Terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 132x/menit.

h. Genetalia

Tidak ada varices dan oedema, tidak ada kelainan

i. Ekstremitas

Simetris kiri dan kanan, jumlah jari tangan dan kaki lengkap dan tidak ada kelainan, tidak ada oedema, nyeri tekan, dan varises, refleks patella kiri dan kanan (+).

Assesment(A)

Ny "R" G2 P1 A0, Gestasi 38 minggu 1 hari, intra uterin, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik dengan ibu kelainan bentuk puting

Planning (P)

Tanggal 24 September 2018, Jam 09.41 Wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa puting ibu sudah menonjol

Hasil : Ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang dan merasa senang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84x/menit, suhu $36,7^{\circ}\text{C}$, pernapasan 22x/menit.

3. Mengajarkan ibu untuk melakukan perawatan payudara minimal sekali atau dua kali sehari.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

4. Melakukan perawatan payudara selama masa kehamilan

Teknik melakukan perawatan payudara sebagai berikut:

- a. Licinkan kedua telapak tangan dengan sedikit minyak .
- b. Kompres puting susu dengan kain/kapas yang diberi minyak selama beberapa saat agar kotoran mudah dibersihkan.
- c. Lalu tarik kedua puting susu keluar sambil diputar ke kiri 20 kali dan ke kanan 20 kali.
- d. Kemudian pegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urutkan dari pangkal payudara ke arah puting sebanyak 30 kali.
- e. Setelah itu pijat puting hingga keluar cairan, untuk memastikan bahwa saluran susu tidak tersumbat.
- f. Bersihkan puting susu dan sekitarnya dengan handuk kering dan bersih. Janganlah menggunakan BH yang menekan payudara, tapi gunakan BH yang menopang payudara (Bandiyah Siti, 2009: 41-42).

Perawatan payudara untuk puting terbenam yaitu:

- a. Letakkan kedua ibu jari diatas dan dibawah puting puting susu.
- b. Regangkan daerah areola ke arah bawah sebanyak 20 kali.
- c. Kemudian letakkan kedua ibu jari disamping kiri dan disamping kanan puting susu.

- d. Regangkan daerah areola dengan menggerakkan kedua ibu jari ke arah kanan sebanyak 20 kali, lakukan 2 kali sehari jika usia kehamilan 3 bulan (Bandiyah Siti, 2009: 42-43).

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan ibu dalam melakukan perawatan payudara dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu kemudian membacakan salawat atau dzikir sambil menarik-narik puting keluar.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienenya selama masa kehamilan dengan rajin mengganti pakaian dalam jika sudah lembab serta mencuci tangan dengan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

7. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:
 - a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas
 - b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit
 - c. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
 - d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

8. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Mengajukan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

10. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan pendokumentasian

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN
PADA NY “R” USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST
PARTUM MINGGU KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK
PUTING DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER-04 NOVEMBER
TAHUN 2018**

No. Register : 03-18-xx
Tanggal Partus : 26 September 2018 , Jam 11.30 Wita
Tanggal Pengkajian : 26 September 2018 , Jam 11.31 Wita
Nama Pengkaji : Riswika Haltitah

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”R” / Tn. “H”
Umur : 26 Tahun / 29 Tahun
Nikah/lamanya: 1 kali / ±4 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Muh.Yamin Baru

Subjektif (S)

1. Ibu melahirkan pada tanggal 26 September 2018, jam 11.30 wita, secara spontan dengan bayi berjenis kelamin laki-laki, berat badan lahir 2800 gram,

serta panjang badan lahir 49 cm dan ditolong oleh bidan, segera setelah bayi lahir dilakukan inisiasi menyusui dini \pm 1-2 jam di kamar bersalin Puskesmas Bara-baraya Makassar.

2. Ibu mengatakan payudaranya terasa berisi, puting telah menonjol, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa atau benjolan
3. Ibu mengatakan setelah dilakukan perawatan payudara selama satu minggu putingnya sudah menonjol
4. Ibu mengatakan senang bisa menyusui bayinya segera setelah lahir
5. Ibu mengatakan pengeluaran ASI sudah ada sedikit
6. Ibu mengatakan merasa lega dan nyaman dengan keadaannya

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah: 120/ 80 mmHg

Nadi : 80x/menit dengan teratur

Suhu : 36,7⁰C

Pernapasan : 22x/ menit dengan teratur

4. Pemeriksaan fisik
 - a. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan tidak ikterus

b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada oedema dan cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak nyeri tekan

c. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

Palpasi : Tidak ada massa atau benjolan, tidak ada kelainan

d. Payudara

Inspeksi : Kedua payudara ibu tampak berisi, puting susu menonjol, hiperpigmentasi *areola mammae*, tampak membesar

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

e. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra

Palpasi : TFU 1 jari bawah pusat, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

f. Genetalia

Inspeksi : Tampak pengeluaran lochea rubra, tampak luka jahitan, vagina tidak berbau amis dan tidak ada varices.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, jumlah jari tangan dan kaki lengkap dan tidak ada kelainan

Palpasi : Tidak ada edema, nyeri tekan, dan varises.

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan (+)

Assesment (A)

Ny "R" P2 A0 post partum hari pertama dengan kelainan bentuk puting

Planning (P)

Tanggal 26 September 2018, Jam 11.33 Wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa puting susu ibu sudah menonjol dan tidak terbenam lagi.

Hasil: Ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84x/menit, suhu 36,7⁰C, pernapasan 22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienenya dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

5. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:
 - a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas
 - b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit
 - c. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
 - d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

6. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara selama masa nifas

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

7. Melakukan perawatan payudara selama masa nifas

Hasi: Telah dilakukan dan ibu mengerti serta bersedia melakukannya

8. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

10. Menganjurkan ibu untuk rutin mengosongkan payudaranya dengan menggunakan pompa ASI serta menyusui bayinya setiap saat

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

11. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan pendokumentasian

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN
PADA NY “R” USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST
PARTUM MINGGU KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK
PUTING DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER-04 NOVEMBER
TAHUN 2018**

No. Register : 03-18-xx
Tanggal Partus : 26 September 2018 , Jam 11.30 Wita
Tanggal Pengkajian : 28 September 2018 , Jam 09.00 Wita
Nama Pengkaji : Riswika Haltitah

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”R” / Tn. “H”
Umur : 26 Tahun / 29 Tahun
Nikah/lamanya: 1 kali / ±4 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Muh.Yamin Baru

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya terasa berisi, puting telah menonjol, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa atau benjolan sejak tanggal 26 September 2018, Jam 11.31 wita.

2. Ibu mengatakan setelah dilakukan perawatan payudara selama satu minggu putingnya sudah menonjol
3. Ibu melahirkan pada tanggal 26 September 2018, Jam 11.30 wita
4. Ibu mengatakan senang bisa menyusui bayinya segera setelah lahir
5. Ibu mengatakan pengeluaran ASI masih sedikit
6. Ibu mengatakan merasa lega dan nyaman dengan keadaannya

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah: 120/ 70 mmHg

Nadi : 80x/menit dengan teratur

Suhu : 36,9⁰C

Pernapasan : 22x/ menit dengan teratur

4. Pemeriksaan fisik

- a. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan tidak ikterus

- b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada oedema dan cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak nyeri tekan

c. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

Palpasi : Tidak ada massa atau benjolan, tidak ada kelainan

d. Payudara

Inspeksi : Kedua payudara ibu tampak berisi, puting susu menonjol, hiperpigmentasi *areola mammae*, tampak membesar

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

e. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra

Palpasi : TFU 3 jari bawah pusat, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

f. Genetalia

Inspeksi : Tampak pengeluaran lochea rubra, tampak luka jahitan, vagina tidak berbau amis dan tidak ada varices.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, jumlah jari tangan dan kaki lengkap dan tidak ada kelainan

Palpasi : Tidak ada edema, nyeri tekan, dan varises.

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan (+)

Assesment (A)

Ny "R" P2 A0 post partum hari ketiga dengan kelainan bentuk puting

Planning (P)

Tanggal 28 September 2018, Jam 09.02 Wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa puting susu ibu sudah menonjol.

Hasil : Ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84x/menit, suhu 36,8⁰C, pernapasan 22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienenya dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

5. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:

- a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas

- b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah / hangat selama 5 menit
- c. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
- d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

- 6. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara selama masa nifas

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- 7. Melakukan perawatan payudara selama masa nifas

Hasi: Telah dilakukan dan ibu mengerti serta bersedia melakukannya

- 8. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- 9. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

- 10. Menganjurkan ibu untuk rutin mengosongkan payudaranya dengan menggunakan pompa ASI serta menyusui bayinya setiap saat

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

- 11. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan pendokumentasian

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA
NY”R” USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST PARTUM
MINGGU KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK PUTING
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER-04 NOVEMBER
TAHUN 2018**

Tanggal Kunjungan Kedua Nifas : 02 Oktober 2018 , Jam 09.00 Wita

Nama Pengkaji : Riswika Haltitah

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama	: Ny”R”	/	Tn. “H”
Umur	: 26 Tahun	/	29 Tahun
Nikah/lamanya:	1 kali	/	±4 tahun
Suku	: Makassar	/	Makassar
Agama	: Islam	/	Islam
Pendidikan	: SMP	/	SMA
Pekerjaan	: IRT	/	Wiraswasta
Alamat	: Jl. Muh.Yamin Baru		

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya terasa berisi, ASI sedikit puting telah menonjol, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa atau benjolan sejak tanggal 26 September 2018, Jam 11.31 wita.

2. Ibu mengatakan setelah dilakukan perawatan payudara selama satu minggu putingnya sudah menonjol
3. Ibu melahirkan pada tanggal 26 September 2018, Jam 11.30 wita
4. Ibu mengatakan senang bisa menyusui bayinya segera setelah lahir, pengeluaran ASI sudah lumayan banyak namun belum terlalu lancar
5. Ibu mengatakan keadaannya sudah sehat dan tidak ada keluhan

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah: 120/ 80 mmHg

Nadi : 82x/menit dengan teratur

Suhu : 36,5⁰C

Pernapasan : 22x/ menit dengan teratur

4. Pemeriksaan fisik

- a. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan tidak ikterus

- b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada oedema dan cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak nyeri tekan

c. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

Palpasi : Tidak ada massa atau benjolan, tidak ada kelainan

d. Payudara

Inspeksi : Kedua payudara ibu tampak berisi, puting susu menonjol, hiperpigmentasi *areola mammae*, tampak membesar

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

e. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra

Palpasi : TFU pertengahan pusat-symphysis, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

f. Genetalia

Inspeksi : Tampak pengeluaran lochea sanguilenta, tampak luka jahitan, vagina tidak berbau amis dan tidak ada varices.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, jumlah jari tangan dan kaki lengkap dan tidak ada kelainan

Palpasi : Tidak ada edema, nyeri tekan, dan varises.

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan (+)

Assesment (A)

Ny "R" P2 A0 post partum hari ketujuh dengan kelainan bentuk puting

Planning (P)

Tanggal 02 Oktober 2018, Jam 09.02 Wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa puting susu ibu telah menonjol.

Hasil: Ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang dan ibu merasa senang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 82x/menit, suhu 36,8⁰C, pernapasan 22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienenya dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

5. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:

- a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas

- b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah / hangat selama 5 menit
- c. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
- d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

- 6. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara selama masa nifas

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- 7. Melakukan perawatan payudara selama masa nifas

Hasi: Telah dilakukan dan ibu mengerti serta bersedia melakukannya

- 8. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- 9. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

- 10. Menganjurkan ibu untuk rutin mengosongkan payudaranya dengan menggunakan pompa ASI serta menyusui bayinya setiap saat

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

- 11. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan pendokumentasian

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA
NY”R” USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST PARTUM
MINGGU KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK PUTING
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER-04 NOVEMBER
TAHUN 2018**

Tanggal Kunjungan Ketiga Nifas : 09 Oktober 2018 , Jam 10.00 Wita
Nama Pengkaji : Riswika Haltitah

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”R” / Tn. “H”
Umur : 26 Tahun / 29 Tahun
Nikah/lamanya: 1 kali / ±4 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Muh.Yamin Baru

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya terasa berisi, puting telah menonjol, tidak ada nyeri tekan, ASI lancar dan tidak ada massa atau benjolan sejak tanggal 26 September 2018, Jam 11.31 wita.

2. Ibu mengatakan setelah dilakukan perawatan payudara selama satu minggu putingnya sudah menonjol pada masa kehamilan
3. Ibu mengatakan tetap melanjutkan perawatan payudaranya sampai saat ini
4. Ibu mengatakan senang bisa menyusui bayinya dan asinya banyak dan lancar serta dapat memberikan ASI Eksklusif selama ± 6 bulan tanpa makanan tambahan.
5. Ibu mengatakan kondisinya dan bayi sehat dan tidak ada keluhan

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah: 110/ 70 mmHg

Nadi : 80x/menit dengan teratur

Suhu : 36,5⁰C

Pernapasan : 24x/ menit dengan teratur

4. Pemeriksaan fisik

- a. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan tidak ikterus

- b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada oedema dan cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak nyeri tekan

c. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

Palpasi : Tidak ada massa atau benjolan, tidak ada kelainan

d. Payudara

Inspeksi : Kedua payudara ibu tampak berisi, puting susu menonjol, hiperpigmentasi *areola mammae*, tampak membesar

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

e. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra

Palpasi : TFU pertengahan pusat-symphysis, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

f. Genetalia

Inspeksi : Tampak pengeluaran lochea rubra, tampak luka jahitan, vagina tidak berbau amis dan tidak ada varices.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, jumlah jari tangan dan kaki lengkap dan tidak ada kelainan

Palpasi : Tidak ada edema, nyeri tekan, dan varises.

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan (+)

Assesment (A)

Ny "R" P2 A0 post partum minggu kedua dengan kelainan bentuk puting

Planning (P)

Tanggal 09 Oktober 2018, Jam 10.01 Wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa puting susu ibu sudah tidak terbenam lagi .

Hasil: Ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang dan ibu merasa senang dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pada anak keduanya

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: Tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 36,5⁰C, pernapasan 24x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienenya dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

5. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:

- a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas
- b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah / hangat selama 5 menit
- c. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
- d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

6. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara selama masa nifas

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

7. Melakukan perawatan payudara selama masa nifas

Hasi: Telah dilakukan dan ibu mengerti serta bersedia melakukannya

8. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

10. Menganjurkan ibu untuk rutin mengosongkan payudaranya dengan menggunakan pompa ASI serta menyusui bayinya setiap saat

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

11. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan pendokumentasian

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN
PADA NY “R” USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST
PARTUM MINGGU KE-IV DENGAN KELAINAN BENTUK
PUTING DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER-04 NOVEMBER
TAHUN 2018**

Tanggal Kunjungan Keempat Nifas : 04 November 2018 , Jam 08.20 Wita

Nama Pengkaji : Riswika Haltitah

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri/Suami

Nama	: Ny”R”	/	Tn. “H”
Umur	: 26 Tahun	/	29 Tahun
Nikah/lamanya:	1 kali	/	±4 tahun
Suku	: Makassar	/	Makassar
Agama	: Islam	/	Islam
Pendidikan	: SMP	/	SMA
Pekerjaan	: IRT	/	Wiraswasta
Alamat	: Jl. Muh.Yamin Baru		

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya terasa berisi, puting telah menonjol, tidak ada nyeri tekan, ASI banyak dan lancar keluar saat di pencet dan tidak ada massa atau benjolan sejak tanggal 26 September 2018, Jam 11.31 wita.

2. Ibu mengatakan setelah dilakukan perawatan payudara mulai dari masa kehamilan dan dilanjutkan pada masa nifas putingnya sudah menonjol
3. Ibu tetap melanjutkan perawatan payudaranya sampai sekarang
4. Ibu senang bisa menyusui bayinya dan putingnya tidak terbenam lagi
5. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dialami saat ini

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda- tanda vital

Tekanan darah: 120/ 70 mmHg

Nadi : 82x/menit dengan teratur

Suhu : 36,6⁰C

Pernapasan : 22x/ menit dengan teratur

4. Pemeriksaan fisik

- a. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda dan tidak ikterus

- b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada oedema dan cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak nyeri tekan

- c. Leher

Inspeksi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

Palpasi : Tidak ada massa atau benjolan, tidak ada kelainan

d. Payudara

Inspeksi : Kedua payudara ibu tampak berisi, puting susu menonjol, hiperpigmentasi *areola mammae*, tampak membesar

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan

e. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, linea nigra

Palpasi : TFU tidak teraba, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah

f. Genetalia

Inspeksi : Tampak pengeluaran lochea alba, tampak luka jahitan, vagina tidak berbau amis dan tidak ada varices.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, jumlah jari tangan dan kaki lengkap dan tidak ada kelainan

Palpasi : Tidak ada edema, nyeri tekan, dan varises.

Perkusi : Refleks patella kiri dan kanan (+)

Assesment (A)

Ny "R" P2 A0 post partum hari ke empat puluh dengan kelainan bentuk puting

Planning (P)

Tanggal 04 November 2018, Jam 08.21 Wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

Hasil :

Tekanan darah: 120/70 mmHg

Nadi : 82x/menit dengan teratur

Suhu : 36,6⁰C di bawah axilar

Pernapasan : 22x/menit

TFU : Tidak Teraba

Kontraksi uterus : Tidak ada

ASI : Lancar

2. Menyampaikan kondisi ibu bahwa keadaannya sudah membaik dan keadaan puting payudaranya sudah sembuh dan tampak menonjol.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu merasa senang

3. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan tanpa tambahan makanan pendamping ASI.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk senantiasa menjaga personal hygienenya dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui bayinya.

Hasil : Ibu bersedia dan akan melakukannya

5. Memberitahu ibu dan suami bahwa pada hari ke 40 masa nifas sudah boleh melakukan hubungan seksual

Hasil : Ibu dan suami sudah mengerti dan mengetahui bahwa sudah boleh melakukan hubungan seksual

6. Menjelaskan tentang Imunisasi Dasar Lengkap Wajib Diberikan Sebelum Bayi Berusia 1 Tahun

- a. Umur bayi <7 hari jenis imunisasi Hepatitis B (HB) 0 untuk mencegah penularan hepatitis B dan kerusakan hati
- b. Umur bayi 1 Bulan jenis imunisasi BCG Polio 1 untuk mencegah penularan tuberculosis dan polio
- c. Umur bayi 2 Bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 1 Polio 2 untuk mencegah polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, & pneumonia
- d. Umur bayi 3 Bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 2 Polio 3 untuk mencegah polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, & pneumonia
- e. Umur bayi 4 Bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 3 Polio 4 untuk mencegah polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, & pneumonia
- f. Umur bayi 9 Bulan jenis imunisasi Campak untuk mencegah campak

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan membawa bayinya sesuai dengan jadwal imunisasi yang didapatkan

7. Menjelaskan jenis-jenis kontrasepsi

a. Cara alami

Keluarga berencana secara alami dilakukan dengan menghindari hubungan seksual saat wanita sedang dalam masa paling subur. Mendeteksi masa subur dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti perhitungan kalender, memeriksa suhu tubuh, serta perubahan cairan vagina.

Keuntungan:

Tidak butuh biaya, alat, maupun obat apa pun.

Kerugian:

Membatasi hubungan seksual yang dilakukan secara spontan. Kesalahan perhitungan dapat mengakibatkan seperempat orang yang menerapkan cara ini mengalami kehamilan.

b. Pil KB

Merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan dan mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah ovulasi. Pil ini dikenal dalam dua jenis utama, dari yang mengandung progesteron saja dan pil kombinasi.

Keuntungan:

Sangat efektif. Tingkat kegagalan hanya 8%. Melancarkan haid dan mengurangi kram saat haid, dapat juga menghentikan haid, tergantung jenisnya.

Kerugian:

Tidak melindungi pengguna dari penyakit menular seksual. Dapat mendatangkan risiko seperti meningkatnya tekanan darah, pembekuan darah, bercak darah, dan payudara mengeras. Beberapa wanita dianjurkan tidak mengonsumsi pil KB, misalnya: yang memiliki riwayat penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara atau rahim, migrain, hingga tekanan darah tinggi.

c. Kondom

Kondom mencegah kehamilan dengan menghalangi masuknya sperma ke dalam tubuh wanita.

Keuntungan:

Tidak mahal. Terjangkau. Melindungi pengguna dari sebagian besar penyakit menular seksual. Mudah didapatkan.

Kerugian:

Tingkat kegagalan mencapai 15%, terutama jika kondom tidak digunakan dengan tepat. Sekali pakai.

d. Suntik KB

Terdapat dua jenis suntik KB. Suntik KB yang bekerja selama tiga bulan untuk mencegah kehamilan, dan suntik KB yang bekerja selama 1 bulan.

Keuntungan:

Lebih efektif dan praktis dari pil KB, dengan tingkat kegagalan 3%. Jika digunakan dengan benar, tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan lebih rendah yaitu kurang dari 1%.

Kerugian:

Suntik KB bulanan perlu memerlukan waktu kunjungan rutin per bulan ke dokter atau bidan. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Dapat menyebabkan efek samping seperti bercak darah. Beberapa wanita tidak dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi ini dalam beberapa kondisi, misalnya: memiliki riwayat migrain, diabetes, sirosis hati, maupun stroke dan serangan jantung. Selain itu, tidak disarankan juga untuk wanita yang ingin mempertahankan haid secara rutin.

e. Implan

Kontrasepsi ini berupa benda kecil seukuran dan berbentuk seperti batang korek api yang dimasukkan ke bagian bawah kulit, umumnya pada lengan bagian atas. Implan ini secara perlahan mengeluarkan hormon progestin yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun.

Keuntungan:

Sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%. Dapat bertahan hingga 3 tahun.

Kerugian:

Dapat menyebabkan efek samping seperti haid tidak teratur. Dapat menyebabkan memar dan bengkak di awal pemasangan. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual.

f. IUD (*Intrauterine Device*)

IUD adalah singkatan dari *intrauterine device*. IUD adalah plastik berbentuk huruf T yang diletakkan di dalam rahim yang berguna untuk menghadang sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada dua jenis utama

IUD:

Keuntungan:

Tidak memerlukan perawatan rumit dan tahan lama.

Kerugian:

Dapat lepas. Biaya mahal di awal.

g. Coitus interruptus

Kehamilan dapat dicegah secara alami dengan menarik penis keluar sebelum terjadi ejakulasi.

Keuntungan:

Tidak membutuhkan biaya, alat, ataupun hormon, Tingkat kegagalan 4%.

Kerugian:

Kadang tidak dapat dilakukan dengan tepat. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual.

Hasil. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan mendiskusikannya dengan suami tentang alat kontrasepsi yang akan dipilih

8. Mengajukan ibu untuk memilih salah satu jenis kontrasepsi yang digunakan

Hasil: Ibu memilih kontrasepsi suntik

9. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan pendokumentasian

TABEL 3.1: KUNJUNGAN ASUHAN MASA KEHAMILAN

No	Tanggal/Kunjungan	TTV	Keadaan Payudara dan Puting	Nyeri tekan pada Payudara	Tindakan	Hasil
1	17 September 2018/Pengkajian hari ke-1 di Ruang ANC Puskesmas Bara-baraya Makassar	TD : 120/80 MmHg S : 36,7°C N : 82 x/menit P : 20x/menit	Tampak berisi, membesar, puting terbenam	Tidak ada nyeri tekan	1. Menjelaskan tentang perawatan payudara 2. Melakukan perawatan payudara	1. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 2. Ibu mengerti dan bersedia melakukannya
2	19 September 2018/Pengkajian hari ke-3 ANC di Rumah Pasien	TD : 120/80 MmHg S : 37,5°C N : 84 x/menit P : 22x/menit	Tampak berisi, membesar, puting terbenam	Tidak ada nyeri tekan	Melakukan perawatan payudara	Telah dilakukan
3	22 September 2018/Pengkajian hari ke-6 ANC di Rumah Pasien	TD : 110/70 MmHg S : 36,8°C N : 80 x/menit P : 22x/menit	Tampak berisi, membesar, puting mulai tampak menonjol	Tidak ada nyeri tekan	Melakukan perawatan payudara	Telah dilakukan
4	24 September 2018/Pengkajian hari ke-8 di Ruang ANC Puskesmas Bara-baraya Makassar	TD : 120/60 MmHg S : 37,5°C N : 84 x/menit P : 22x/menit	Tampak berisi, membesar, puting menonjol	Tidak ada nyeri tekan	Melakukan perawatan payudara	Telah dilakukan

TABEL 3.2: KUNJUNGAN ASUHAN MASA NIFAS

No	Tanggal/kunjungan	TTV	Payudara/ASI	Cara Bayi Menyusu	Abdomen	Lochea
1	26 September 2018 /Postpartum hari ke-1	TD : 120/80 MmHg S : 36,7°C N : 80 x/menit P : 22x/menit	Puting susu menonjol, tampak membesar, ASI sedikit dan tidak ada nyeri tekan.	<ul style="list-style-type: none"> • Refleks mencari: Positif • Refleks menghisap: Baik • Refleks menelan: Positif 	Tampak stria alba, TFU 1 Jrbpst, teraba keras dan bundar, tidak ada nyeri tekan.	Rubra
2	28 September 2018/ Postpartum hari ke-3	TD : 120/70 MmHg S : 36,9°C N : 84 x/menit P : 22x/menit	Puting susu menonjol, tampak membesar, ASI sedikit dan tidak ada nyeri tekan.	<ul style="list-style-type: none"> • Refleks mencari: Positif • Refleks menghisap: Baik • Refleks menelan: Positif 	Tampak stria alba, TFU 3 Jrbpst, teraba keras dan bundar, tidak ada nyeri tekan.	Rubra
3	02 Oktober 2018/ Postpartum hari ke-7	TD : 120/80 MmHg S : 36,5°C N : 80 x/menit P : 22x/menit	Puting susu menonjol, tampak membesar, ASI belum terlalu lancar dan tidak ada nyeri tekan.	<ul style="list-style-type: none"> • Refleks mencari: Positif • Refleks menghisap: Baik dan kuat • Refleks menelan: Positif 	Tampak stria alba, TFU pertengahan pusat- simphysis, teraba keras dan bundar, tidak ada nyeri tekan.	Sanguilenta
4	09 Oktober 2018/ Postpartum hari ke-14	TD : 120/80 MmHg S : 36,5°C N : 80 x/menit P : 24x/menit	Puting susu menonjol, tampak membesar, ASI lancar dan tidak ada nyeri tekan.	<ul style="list-style-type: none"> • Refleks mencari: Positif • Refleks menghisap: Adekuat • Refleks menelan: Positif 	Tampak stria alba, TFU pertengahan pusat- simphysis, teraba keras dan bundar, tidak ada nyeri tekan.	Serosa

5	04 November 2018/ Postpartum hari ke- 40	TD : 120/80 MmHg S : 36,6°C N : 80 x/menit P : 22x/menit	Puting susu menonjol, tampak membesar, ASI lancar dan tidak ada nyeri tekan.	<ul style="list-style-type: none"> • Refleks mencari: Positif • Refleks menghisap: Adekuat • Refleks menelan: Positif 	Tampak stria alba, TFU tidak teraba, tidak ada nyeri tekan.	Alba
---	--	--	--	--	---	------

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan tentang manajemen asuhan kebidanan postnatal care pada Ny “R” dengan kelainan bentuk puting di Puskesmas Bara-baraya Makassar tahun 2018. Asuhan ini dilakukan sebanyak 4 kali asuhan di masa kehamilan dan sebanyak 5 kali di masa nifas.

Dalam hal ini, pembahasan akan diuraikan dalam bentuk narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Pembahasan ini dibagi menjadi 2 bagian sesuai dengan manajemen asuhan yang telah disusun bahwa asuhan ini berkelanjutan dari masa kehamilan sampai masa nifas hal ini didasarkan pada kasus untuk menilai keberhasilan asuhan jika puting susu yang terbentuk atau menonjol dapat memberikan kemudahan dalam menyusui bayi.

A. Asuhan Masa Kehamilan

1. Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik,

psikososial dan spritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik (Nurhayati, dkk, 2013). Pengkajian data dasar pada kasus kelainan bentuk puting dilakukan pada saat pengamatan pertama kali di ruangan *Antenatal Care*. Pengkajian meliputi anamnesis langsung kepada pasien. Pengkajian ini berupa identitas pasien, keluhan pasien, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas ibu, riwayat kesehatan, riwayat reproduksi, riwayat keluarga berencana, dan riwayat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pengkajian data objektif diperoleh melalui pemeriksaan umum, pemeriksaan tanda-anda vital dan pemeriksaan fisik. Pengkajian pada kasus ini dilanjutkan pada pendokumentasian asuhan kebidanan.

Tahap ini dilakukan identifikasi data dasar atau pengkajian data awal yang merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi Ny "R" baik keluarga, bidan maupun dokter yang ada di ruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga memudahkan pengkaji untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan apakah sesuai dengan permasalahan yang diangkat atau tidak. Data yang diambil dari studi kasus Ny "R" dengan kelainan bentuk puting selama pasien di Puskesmas Bara-baraya dan pada saat di rumah pasien meliputi:

Ibu mengeluh putingnya terbenam, payudaranya lebih berisi, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa atau benjolan sejak tanggal 17 September 2018 pukul 09.02 wita, ibu mengatakan anak yang pertama menyusu selama \pm 3 bulan dan digantikan dengan susu formula disebabkan ibu sulit untuk menyusui bayinya karena bentuk putingnya yang terbenam.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, dan pada pemeriksaan tanda-tanda vital: tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 82x/menit, suhu $36,7^{\circ}\text{C}$, penapasan 22x/menit, pada pemeriksaan fisik terfokus payudara ibu didapatkan hasil pemeriksaan puting tampak terbenam, payudara tampak berisi, periksa rabaan tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa/benjolan.

Puting susu ibu terbenam adalah puting yang akan tampak masuk ke dalam *areola* sebagian atau seluruhnya. Keadaan ini dapat disebabkan karena ada sesuatu yang menarik puting susu kearah dalam, misalnya tumor atau penyempitan saluran susu. Kelainan ini seharusnya sudah diketahui sejak dini, paling tidak pada saat kehamilan, sehingga dilakukan penanganan lebih lanjut (Wiji Rizki Natia, 2013:62).

Tanda dan gejala yang dialami pada ibu dengan kelainan bentuk puting terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu: tingkat I terdapat fibrosa dalam jumlah minimal dan puting dapat dengan mudah ditarik keluar dan akan tetap menonjol, untuk tingkat II terdapat fibrosa dalam jumlah sedang dibawah puting. Dapat ditarik keluar, tetapi akan kembali lagi ke dalam areola,

sedangkan tingkat III terdapat banyak pita-pita fibrosa dan sukar untuk menarik puting keluar (Pollard Maria, 2015:121).

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus kelainan bentuk puting. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas semua data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik (Nurhayati, dkk, 2013). Hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis Ny “R” puting terbenam dengan masalah aktual ibu tidak dapat menyusui bayinya segera setelah lahir sehingga dapat menyebabkan bendungan ASI.

Ibu mengatakan puting susunya terbenam. Pada pemeriksaan fisik yang telah dilakukan pada ibu tanggal 17 September 2018 pukul 09.02 wita, didapatkan putingnya terbenam, payudaranya lebih berisi, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa atau benjolan.

Puting susu ibu terbenam adalah puting susu yang tidak menonjol dan cenderung masuk ke dalam, sehingga ASI tidak dapat keluar dengan lancar. Pada kasus seperti ini bayi biasanya bayi kesulitan dan mungkin tidak mau menyusui (Ambrawati, 2008). Puting susu terbenam yang dialami oleh ibu

merupakan salah satu potensi yang memungkinkan terjadinya bendungan ASI, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan fisik (*head to toe*) sudah dapat dilakukan penanganan mengenai kasus yang dialami oleh pasien. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian data tidak ada perbedaan dengan tinjauan kepustakaan yang ditemukan pada kasus tersebut.

3. Langkah III: Identifikasi Diagnosis/Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Identifikasi diagnosis potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Mangkuji, dkk, 2014). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati pasien, bidan diharapkan bersiap-siap bila diagnosis/masalah potensial ini benar-benar terjadi dan dilakukan asuhan yang aman.

Puting susu ibu terbenam adalah puting yang akan tampak masuk ke dalam *areola* sebagian atau seluruhnya. Keadaan ini dapat disebabkan karena ada sesuatu yang menarik puting susu kearah dalam, misalnya tumor atau penyempitan saluran susu. Kelainan ini seharusnya sudah diketahui sejak dini, paling tidak pada saat kehamilan, sehingga dilakukan penanganan lebih lanjut (Wiji Rizki Natia, 2013:62).

Tanda dan gejala yang dialami pada ibu dengan kelainan bentuk puting terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu: tingkat I terdapat fibrosa dalam jumlah minimal dan puting dapat dengan mudah ditarik keluar dan akan tetap

menonjol, untuk tingkat II terdapat fibrosa dalam jumlah sedang dibawah puting. Dapat ditarik keluar, tetapi akan kembali lagi ke dalam areola, sedangkan tingkat III terdapat banyak pita-pita fibrosa dan sukar untuk menarik puting keluar (Pollard Maria, 2015:121).

Berdasarkan tanda dan gejala yang timbul pada kasus yang dialami oleh pasien dapat segera dilakukan penanganan secepat mungkin sesuai dengan kasus pasien untuk mencegah terjadinya masalah potensial yaitu bendungan ASI yang mempengaruhi proses pemberian ASI Eksklusif pada bayinya.

Bendungan ASI dapat disebabkan oleh pengeluaran susu yang tidak lancar, karena bayi tidak cukup sering menyusui, produksi meningkat, terlambat menyusukan, hubungan dengan bayi (*bounding attachment*) kurang baik, dan dapat pula karena adanya pembatasan waktu menyusui. *Engorgement* (Bendungan ASI) kebanyakan terjadi pada hari kedua sampai hari keempat postpartum. Terjadinya pembengkakan payudara dan secara palpasi teraba keras, kadang terasa nyeri serta seringkali disertai peningkatan suhu badan ibu. Bendungan ASI yang tidak disusukan secara adekuat akhirnya terjadi mastitis (Sutarni dan Pertiwi, 2014).

Dampak dari Bendungan Asi adalah Mastitis. Mastitis adalah peradangan pada payudara. Payudara menjadi merah, bengkak kadangkala diikuti rasa nyeri dan panas, suhu tubuh meningkat. Didalam terasa ada massa padat (lump), dan diluarnya kulit mencari merah. Kejadian masa nifas 1-3

minggu setelah persalinan diakibatkan oleh sumbatan aliran susu yang berlanjut. Dapat juga karena kebiasaan menekan payudara dengan jari atau karena tekanan baju. Dampak yang lain adalah abses payudara, bilamana penanganan mastitis tidak sempurna, maka infeksi akan makin berat sehingga terjadi abses. Ditandai dengan payudara lebih berwarna merah mengkilat dari sebelumnya saat baru terjadi radang, ibu merasa lebih sakit, benjolan lebih lunak karena berisi nanah. Jika sudah terjadi abses maka payudara tidak boleh disusukan (Indasari, 2017: 184).

Mastitis adalah peradangan pada payudara. Payudara menjadi warna merah dan disertai rasa nyeri dan panas, suhu tubuh meningkat. Keadaan ini disebabkan kurangnya ASI yang dihisap atau dikeluarkan atau penghisapan yang tidak efektif. Hal tersebut juga dapat terjadi karena faktor kebiasaan menekan payudara dengan jari atau karena tekanan baju/bra (Walyani dan Endang, 2015: 35).

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan Hasanah, Hardiyanti dan Susumaningrum (2017) menunjukkan 36 responden (63,2%) memiliki teknik menyusui dalam kategori cukup dan 26 responden (45,6%) mengalami resiko sedang terjadinya mastitis. Hasil uji chi square menggunakan CI = 95% menggunakan p value = 0,005 ($p \text{ value} < \alpha = 0,05$). Hal ini berarti terdapat hubungan antara teknik menyusui dengan resiko terjadinya mastitis.

Abses payudara merupakan kelanjutan dari mastitis. Gejala yang dirasakan ibu tampak lebih parah sakitnya, payudara lebih mengkilat, benjolan

lebih lunak karena berisi nanah, sehingga perlu tindakan insisi untuk mengeluarkan nanah tersebut. Hal ini disebabkan karena meluasnya peradangan pada payudara (Reni, 2014:118).

Kelainan bentuk puting salah satunya dapat berpotensi terjadinya bendungan ASI sehingga membuat ibu tidak mau menyusui bayinya karena akan merasa sakit pada payudaranya saat menyusui bayinya sehingga menyebabkan tidak tercukupinya nutrisi bayi yang ada dalam kandungan ASI.

Pada kasus Ny”R” telah dilakukan penanganan sehingga masalah potensial tidak muncul. Hal ini dapat terjadi karena penanganan yang dilakukan baik dan tepat sehingga kelainan bentuk puting ibu yang awalnya terbenam sudah membaik dan telah menonjol secara berangsur-angsur, sehingga pada langkah ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dengan kasus yang dialami oleh pasien.

Penatalaksanaan/penanganan yang baik dan tepat dari tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya masalah potensial yaitu dengan adanya pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara, teknik dan posisi menyusui yang baik serta penting untuk dilakukannya IMD, jika penanganan tidak dilakukan segera mungkin sesuai dengan kasus yang dialami oleh pasien serta tidak di tagani dengan baik dan tepat maka masalah potensial dapat terjadi.

4. Langkah IV: Tindakan Segera/Kolaborasi

Tindakan segera atau kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dokter spesialis yang ahli dibidangnya. Berdasarkan kasus ini, tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera.

5. Langkah V: Perencanaan Asuhan Kebidanan

Langkah ini merupakan lanjutan manajemen asuhan kebidanan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi secara segera. Dalam rencana tindakan harus selalu dimintai persetujuan pasien dan keluarga agar pemberian asuhan dapat berjalan dengan lancar. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus sesuai dengan alasan yang benar berdasarkan pengetahuan baik serta teori yang berkaitan dengan kasus, serta telah disepakati dengan keinginan atau kebutuhan pasien. Rencana asuhan disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan pencegahan masalah/diagnosa potensial. Dalam pembuatan rencana tindakan asuhan kebidanan terlebih dahulu menentukan tujuan tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien dan harus tepat sasaran untuk dapat mencapai target yang diinginkan dalam penerapan asuhan kebidanan sesuai dengan kasus (Nurhayati, dkk, 2013).

Sasaran/target dalam rencana asuhan pada kasus ini berfokus untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dengan penanganan yang cepat dan

tepat serta puting payudara ibu kembali normal secara berangsur-angsur. Bila diagnosis bendungan ASI ditegakkan rencana asuhan yang akan diberikan adalah memberitahu ibu hasil pemeriksaan, menjelaskan penyebab dan penanganannya, merekomendasikan untuk segera diintervensi.

Tempat pengambilan kasus yaitu di Puskesmas Bara-baraya Makassar, ibu nifas diberikan penjelasan mengenai pentingnya perawatan payudara, teknik menyusui yang baik dan benar dan menyusui bayinya secara teratur dengan selang waktu \pm 2-3 jam atau secara *on demand* dimasing-masing payudaranya secara bergantian dimulai dari kanan kemudian kiri untuk mencegah terjadinya bendungan ASI.

Rencana tindakan yang telah disusun yaitu menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami kelainan bentuk puting, mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* pada kedua payudaranya secara bergantian, memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti; menyanggah payudara dengan bra yang pas dan menyokong payudara, kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat dan kain dingin secara bergantian selama 5 menit, urut payudara dari arah pangkal menuju puting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak, mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara, mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar,

menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau, buah-buahan dan makanan yang bergizi seimbang serta jika memungkinkan minum susu.

Perawatan payudara merupakan upaya untuk merangsang sekresi hormon oksitosin untuk menghasilkan ASI sedini mungkin dan memegang peranan penting dalam menghadapi masalah menyusui. Teknik pijatan dan rangsangan pada puting susu yang dilakukan pada perawatan payudara merupakan latihan seperti efek hisapan bayi sebagai pemicu pengeluaran ASI (Sari, 2014: 6).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi Rosita dapat diketahui bahwa dari 34 responden hampir seluruhnya dari responden melakukan perawatan payudara sejumlah 26 orang (76,4%). Menurut peneliti bahwa responden ditempat penelitian sebagian besar melakukan perawatan payudara. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari dan mengerti tentang pentingnya perawatan payudara. Perawatan payudara ini dilakukan untuk mencegah tersumbatnya saluran susu dan memperlancar pengeluaran Asi sehingga kebutuhan Asi bayi dapat tercukupi (Rosita, 2017 : 3).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Kurniawati yaitu sebanyak 33 responden, responden yang melakukan cara menyusui kurang benar diantaranya 9 responden (81,8%) telah mengalami payudara bengkak dan 2 responden (18,2%) tidak mengalami payudara bengkak sedangkan responden yang melakukan cara menyusui dengan benar 20 responden (90,9%) tidak mengalami payudara bengkak dan 2 responden (9,1%) yang

mengalami payudara bengkak. Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang melakukan cara menyusui yang kurang benar lebih banyak yang mengalami payudara bengkak (Astuti dan Kurniawati, 2012).

Pembengkakan payudara terjadi karena menyusui yang tidak bertahap atau secara *on demand* sehingga sisa ASI terkumpul pada daerah duktus serta penyusuan yang tidak adekuat dan posisi perlekatan bayi pada payudara saat menyusu yang salah. Sehingga hal ini akan menyebabkan puting susu lecet dan ASI tidak keluar optimal sehingga terjadi pembendungan air susu pada payudara yang menyebabkan terjadinya pembengkakan payudara.

Penatalaksanaan yang dilakukan pada ibu dengan bendungan ASI menurut kemenkes RI, sanggah payudara ibu dengan bra yang pas, kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat dan kain dingin secara bergantian selama 5 menit, urut payudara dari arah pangkal menuju puting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak, susukan bayi 2-3 jam sekali sesuai keinginan bayi (*on demand feeding*) dan pastikan bahwa perlekatan bayi dan payudara ibu sudah benar, pada masa-masa awal atau bila bayi yang menyusui tidak mampu mengosongkan payudara, mungkin diperlukan pompa atau pengeluaran ASI secara manual dari payudara, letakkan kain dingin/kompres dingin dengan es dan kompres kain hangat secara bergantian pada payudara setelah menyusui atau setelah payudara dipompa, bila perlu berikan parasetamol 3x1 500 mg per oral untuk

mengurangi nyeri dan penurunan demam, lakukan evaluasi setelah 3 hari (Kemenkes RI, 2013: 227-228).

Stasis susu merupakan faktor awal mastitis. Langkah manajemen yang paling penting dan efektif untuk mengeluarkan susu yaitu: Ibu harus didorong untuk menyusui lebih sering mulai pada payudara yang sakit. Jika nyeri mengganggu proses menyusui, pemberian susu bisa dimulai pada payudara yang tidak mengalami bendungan ASI, kemudian beralih ke payudara yang terkena bendungan ASI segera setelah proses menyusui pada payudara yang satu selesai. Memposisikan bayi sesuai dengan posisi menyusui yang benar dapat membantu pengeluaran ASI. Memijat payudara selama menyusui dengan *baby oil* pada tangan juga bisa membantu untuk memudahkan pengeluaran ASI, dapat dilakukan oleh ibu atau keluarga yang dapat membantu dalam proses pemijatan, pertama-tama harus dimulai dari area yang tersumbat atau terkena bendungan payudara hingga menuju puting susu. Setelah menyusui, keluarkan susu dengan pompa dapat meningkatkan aliran ASI dan mempercepat penyembuhan bendungan ASI (Lisa dan Amir, 2014).

Durasi pemberian ASI mempunyai peranan terhadap terjadinya bendungan ASI karena durasi menyusui berkaitan dengan refleksi prolaktin yang merupakan hormon laktogenik yang penting untuk memulai dan mempertahankan sekresi ASI. Stimulasi isapan bayi akan mengirim pesan ke *hipotalamus* yang merangsang *hipofisis anterior* untuk melepas prolaktin, suatu hormon yang meningkatkan produksi ASI oleh sel-sel *alveolus* kelenjar

mamaria. Jumlah prolaktin yang disekresikan dan jumlah ASI yang diproduksi berkaitan dengan besarnya stimulasi isapan yaitu frekuensi, intensitas dan lama bayi menghisap (Sutarni dan Pertiwi, 2014).

Bendungan Payudara pada ibu nifas dapat terjadi jika air susu yang diproduksi oleh payudara tidak segera diberikan pada bayi atau tidak segera dikosongkan. Untuk mencegah terjadinya bendungan ASI pada ibu nifas yaitu dengan menyusui bayi secara teratur tanpa jadwal (*on demand*), tidak membatasi waktu pemberian ASI dan perawatan payudara secara teratur (Sutarni dan Pertiwi, 2014).

Seorang bidan harus mempunyai pengetahuan yang baik dan benar agar dapat melaksanakan pencegahan atau penanganan segera pada ibu post partum sesuai kebijakan dan prosedur tetap serta menyempurnakan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan khususnya pada ibu dengan kelainan bentuk puting yang dapat menyebabkan masalah potensial terjadinya bendungan ASI. Uraian tersebut tampak adanya persamaan antara teori dengan rencana tindakan yang dilakukan pada kasus Ny “R”.

6. Langkah VI: Implementasi

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman serta kepercayaan pada pasien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan oleh pasien serta kerjasama tim

kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan (Mangkuji, dkk, 2014).

Pada studi kasus Ny “R” dengan kelainan bentuk puting, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Pemantauan pertama yang dilakukan di Puskesmas Bara-baraya Makassar, mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand*, menjelaskan pada ibu cara mengatasi keluhannya seperti; menyanggah payudara dengan bra yang pas, urut payudara dari arah pangkal menuju puting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak, mengajarkan ibu cara melakukan perawatan payudara, mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau, buah-buahan dan makanan yang bergizi seimbang serta jika memungkinkan minum susu.

Tahap ini penulis melakukan asuhan kebidanan selama 4 hari pada masa kehamilan, dimana dilakukan 2 kali pada pemeriksaan *Antenatal Care* di Puskesmas Bara-baraya, kemudian 2 kali kunjungan dirumah pasien dan 5 hari pada masa nifas, dimana 2 hari di Puskesmas Bara-baraya dan 3 kali kunjungan dirumah pasien. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun sesuai kebutuhan klien, sehingga tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan kasus yang ada.

7. Langkah VII: Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidaknya dengan tindakan yang sudah diimplementasikan.

Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi ini menunjukkan masalah yang ditangani dapat teratasi tanpa adanya komplikasi. Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan selama 4 hari pada masa kehamilan, dimana dilakukan 2 kali pada pemeriksaan *Antenatal Care* di Puskesmas Bara-baraya, kemudian 2 kali kunjungan dirumah pasien dan 5 hari pada masa nifas, dimana 2 hari di Puskesmas Bara-baraya dan 3 kali kunjungan dirumah pasien. Ibu tidak mengalami komplikasi, kelainan bentuk puting telah teratasi yang ditandai dengan keadaan puting payudara ibu telah berangsur-angsur kembali normal dan bayi telah menyusui secara baik dengan teknik menyusui yang tepat, serta ibu rutin melakukan perawatan payudara minimal 2 kali sehari.

Keberhasilan asuhan ini juga ditandai dengan pemahaman ibu mengenai cara dan teknik menyusui yang baik dan benar, cara melakukan perawatan payudara serta menyusui bayinya secara *on demand*. Kondisi kesehatan ibu yang sudah membaik dimana kelainan bentuk puting yaitu

puting terbenam tidak menjadi bendungan payudara. Semua data hingga penatalaksanaan didokumentasikan oleh puskesmas dan peneliti.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses Manajemen Asuhan Kebidanan yang diterapkan pada Ny “R” dengan kelainan bentuk puting cukup berhasil dan efektif karena hasil yang telah dicapai dengan keberhasilan perawatan payudara pada pasien dengan kelainan bentuk puting yaitu puting terbenam dapat berangsur-angsur kembali normal.

B. Asuhan Masa Nifas

Asuhan selama masa nifas juga dilakukan dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan menggunakan pola pikir 7 langkah varney dalam bentuk SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment, Planning). Asuhan ini dimulai segera setelah persalinan yaitu pada hari pertama nifas pada tanggal tanggal 26 September 2018.

Peneliti mengikuti proses persalinan yang dijalani oleh ibu. Segera setelah bayi lahir pada jam 11.30 wita, penolong melakukan IMD dengan cara meletakkan bayi yang telah dikeringkan diatas perut ibu. Hasil yang didapatkan positif yaitu bayi mendapatkan puting susunya.

Ibu melahirkan pada tanggal 26 September 2018, jam 11.30 wita. Data yang didapatkan TFU 1 jari dibawah pusat, tampak pengeluaran lochea rubra pada jalan lahir ibu dan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan tekanan darah 120/ 80 mmHg, Nadi 80x/menit dengan teratur, Suhu 36,7⁰C, Pernapasan 22x/ menit dengan teratur.

Berdasarkan teori Maryunani, Setelah proses persalinan berakhir terjadi proses involusi uteri yang ditandai dengan penurunan tinggi fundus uteri yang terjadi

secara bertahap, uterus ibu yang baru melahirkan masih membesar, jika diraba dari luar tinggi fundus uteri kira – kira 1 jari bawah pusat. Pada hari ketiga, kira – kira 2 atau 3 jari bawah pusat. Hari kelima, pada pertengahan antara pusat dan simphysis. Hari kesembilan, kira – kira 1 jari di atas simphysis dan setelah hari kesepuluh, biasanya uterus tersebut dari luar tidak teraba lagi (Maryunani, 2009: 46). Menurut Astutik, *lochia rubra* berwarna kemerah-merahan berisi darah dan *vernix caseosa* yang keluar pada hari ke-2 sampai ke-3 pasca persalinan (Astutik, 2015: 59).

Kelainan bentuk puting salah satunya dapat berpotensi terjadinya bendungan ASI sehingga membuat ibu tidak mau menyusui bayinya karena akan merasa sakit pada payudaranya saat menyusui bayinya sehingga menyebabkan tidak tercukupinya nutrisi bayi yang ada dalam kandungan ASI.

Pada kasus Ny”R” telah dilakukan penanganan sehingga masalah potensial tidak muncul. Hal ini dapat terjadi karena penanganan yang dilakukan baik dan tepat sehingga kelainan bentuk puting ibu yang awalnya terbenam sudah membaik dan telah menonjol secara berangsur-angsur, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara teori dengan kasus yang dialami oleh pasien.

Penatalaksanaan/penanganan yang baik dan tepat dari tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya masalah potensial yaitu dengan adanya pendidikan kesehatan tentang perawatan payudara, teknik dan posisi menyusui yang baik serta penting untuk dilakukannya IMD, jika penanganan tidak dilakukan segera mungkin sesuai dengan kasus yang dialami oleh pasien serta tidak di tangani dengan baik dan tepat maka masalah potensial dapat terjadi.

Berdasarkan hal diatas bahwa perawatan payudara merupakan salah satu penanganan yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah potensial. Bahwa perawatan payudara merupakan upaya untuk merangsang sekresi hormon oksitosin untuk menghasilkan ASI sedini mungkin dan memegang peranan penting dalam menghadapi masalah menyusui. Teknik pijatan dan rangsangan pada puting susu yang dilakukan pada perawatan payudara merupakan latihan seperti efek hisapan bayi sebagai pemicu pengeluaran ASI (Sari, 2014: 6).

Efek hisapan bayi sebagai pemicu pengeluaran ASI yaitu dengan sedini mungkin, dilakukan segera setelah bayi lahir yaitu Inisiasi Menyusui Dini atau disingkat sebagai IMD merupakan program yang gencar dianjurkan pemerintah. Program ini memang populer di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Menyusu dan bukan menyusui merupakan gambaran bahwa 'IMD bukan program ibu menyusui bayi', tetapi bayi yang harus aktif menemukan sendiri puting susu ibu. Program ini dilakukan secara langsung meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi ini merayap untuk menemukan puting ibu untuk menyusu (Anik Maryunani, 2012 :57).

Kunjungan yang dilakukan dirumah ibu, asuhan yang diberikan mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* dan menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan, menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan bergizi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui kasus Ny “R” dengan kelainan bentuk puting di Puskesmas Bara-baraya Makassar tahun 2018, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny”R” dengan kelainan bentuk puting di Puskesmas Bara-baraya Makassar tahun 2018. Pada kasus Ny”R” didapatkan data dasar dengan hasil pada kedua payudara ibu tampak berisi, puting susu terbenam, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, tidak ada nyeri ketika dilakukan palpasi dan tidak ada massa atau benjolan.
2. Telah dilakukan perumusan diagnosa/masalah aktual pada Ny”R” di Puskesmas Bara-baraya Makassar tahun 2018 dengan pengumpulan baik dari data subjektif, data objektif dan pemeriksaan penunjang/laboratorium sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada Ny “R” dengan kelainan bentuk puting yaitu puting terbenam.
3. Telah dilakukan perumusan diagnosa/masalah potensial pada Ny”R” dengan kelainan bentuk puting di Puskesmas Bara-baraya Makassar tahun 2018 mengantisipasi terjadinya Bendungan ASI, Mastitis dan Abses Payudara dengan hasil tidak ada masalah potensial yang terjadi pada ibu karena diberikannya penanganan yang tepat.

4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny”R” dengan kelainan bentuk puting di Puskesmas Bara-baraya Makassar tahun 2018 dengan hasil bahwa pada kasus ini tidak dilakukan tindakan kolaborasi karena tidak adanya indikasi dan data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan tersebut.
5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny”R” dengan kelainan bentuk puting di Puskesmas Bara-baraya Makassar tahun 2018. Adapun Intervensi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan perawatan payudara selama masa kehamilan. Pada masa nifas yang dilakukan adalah menjelaskan serta mengajarkan teknik menyusui yang baik dan benar dan menyusui bayinya secara teratur dengan cara *on demand* dengan hasil merencanakan asuhan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial yang dapat terjadi.
6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny”R” dengan kelainan bentuk puting di Puskesmas Bara-baraya Makassar tahun 2018, yaitu tindakan asuhan pada masa kehamilan dilakukan sebanyak 4 kali asuhan dan pada masa nifas dilakukan sebanyak 5 kali asuhan dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Telah dilakukan evaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny”R” dengan kelainan bentuk puting di Puskesmas Bara-baraya Makassar tahun

2018, yaitu evaluasi dilakukan pada akhir asuhan, dimana pada akhir kehamilan didapatkan puting susu yang telah terbentuk/menonjol. Sedangkan pada persalinan keberhasilan dicapai dengan bayi dapat menemukan puting pada saat IMD. Hasil akhir evaluasi setelah kunjungan yaitu produksi ASI banyak, puting susu ibu tidak terbenam lagi dan ibu menyusui bayinya secara *on demand* dengan ASI eksklusif.

8. Telah merumuskan integrasi keIslaman pada Ny”R” dengan kelainan bentuk puting di Puskesmas Bara-baraya Makassar tahun 2018 dengan hasil yaitu menjelaskan kepada ibu pandangan islam tentang pemberian ASI agar ibu mau menyusui anaknya selama 2 tahun penuh.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus peneliti memberikan sedikit saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

1. Untuk Ibu
 - a. Mengajarkan kepada ibu agar mengkomsumsi makanan yang bergizi dan seimbang di samping selalu melakukan perawatan payudara untuk mencegah terjadinya bendungan ASI.
 - b. Mengajarkan agar setiap ibu postpartum selalu menyusui bayinya secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand* di kedua payudaranya mulai dari kanan kemudian kiri secara bergantian.
 - c. Mengajarkan ibu untuk melakukan setiap anjuran dan pendidikan kesehatan yang telah diberikan.

2. Untuk bidan

- a. Dalam melakukan tugas sebagai bidan yaitu memberikan tindakan perlu terlebih dahulu diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada pasien dan harus meminta persetujuan pasien.
- b. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan perlu membina hubungan yang baik antara pasien ataupun keluarga sehingga tercapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan rencana dan dapat berjalan lancar.

3. Untuk institusi

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan perlu adanya penerapan manajemen asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan, mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina serta mendidik tenaga bidan guna untuk menciptakan generasi penerus tenaga kesehatan yang berpotensi dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati. *Asuhan Kebidanan Nifas*, hal: 43-45. Yogyakarta: Mitra Cendika, 2008.
- Ambarwati. *Asuhan Kebidanan Nifas*. Yogyakarta: Mitra Cendika, 2008
- Ambarwati dan Wulandari. *Asuhan Kebidanan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Astuti, Kurniawati. Analisa *Hubungan Pengaruh Cara Menyusui Dengan Kejadian Payudara Bengkak Pada Ibu Post Partum*. Jurnal Kebidanan Vol. 3, No. 1, Juni 2012. Diakses Tanggal 14 September 2018 (link:<http://journal.stikeseub.ac.id/fjkeb/article/view>).
- Astutik, RY. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Jakarta: CV Trans Info Media. 2015.
- Astutik, Reni Yuli. *Payudara dan Laktasi*. Jakarta: Salemba Medika, 2014.
- Bahiyatun. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal*, Jakarta, EGC, 2009.
- Bandiyah Siti. *Kehamilan, Persalinan & Gangguan Kehamilan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2009.
- Cadwell, K., Maffei, C.T., *Buku Saku: Manajemen Laktasi*. Jakarta: EGC
- Chomaria, Nurul. *Panduan Terlengkap Pasca Melahirkan*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Departemen Agama RI 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV: Penerbit Bandung
- Dewi, Vivian Nani Lia. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas*: Salemba Medika, 2013.
- Evi Rosita, *Midwifery Journal Of Stikes Insan Cendekia Medika Jombang. Hubungan Perawatan Payudara Pada Ibu Nifas dengan Bendungan ASI*. Vol. 13, No.1, Maret 2017.
- Fedri, Indah. *Asuhan Kebidanan*, Jakarta: EGC, 2013.
- Hanafi, Yusuf. *Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian ASI Dalam Al-qur'an*. Vol. 2, No. 1, Juni 2012.

- Indrasari & Chotimah: *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Perawatan Payudara dengan Kejadian Bendungan ASI Di RB Sukoharjo* Journal On Medical Science, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Indrasari, Nelly. *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Dengan Pelaksanaan Perawatan Payudara*. Vol. XII, No. 1, April 2016.
- Jannah Nurul, *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Kemenkes RI. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Edisi pertama. 2013.
- Kusumaningrum, Andi Tri. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Pengeluaran ASI Pada Ibu Post Partum Hari Ke-3*. Vol. 08, No. 01, April 2016.
- Mangkuji, B, dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Soap*. Jakarta: EGC. 2014.
- Maritalia, Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta : Putaka Pelajar, 2012.
- Marmi. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas "Peurperium Care"*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Maryunani Anik, *Inisiasi Menyusui Dini, ASI Eksklusif dan Manajemen Laktasi*. Jakarta: TIM, 2012
- Maryunani, Anik. *Asuhan Ibu Nifas & Asuhan Ibu Menyusui*. Bogor: In Media, 2015.
- Mufdillah, dkk. *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Muha medika, 2012
- Norazizah, Yayuk, dan Luluk Hidayah. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Perawatan Payudara dengan Kejadian Puting Susu Tenggelam di BPM Ny. Sri Handayani Desa Welahan Jepara*. Jurnal Kesehatan dan Budaya Hikmah. Vol 4 no. 2, 2013.
- Nurhayati, dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika. 2013.
- Nurjannah, Nunung, ST dkk. *Asuhan Kebidanan PostPartum*,Bandung. PT. Refika Aditama, 2013
- Nurjanah, Siti Nunung. dkk. *Asuhan Kebidanan Post Partum Dilengkapi dengan Asuhan Kebidanan Post Sectio Caesarea*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

- Pollard Maria. *ASI Asuhan Berbasis Bukti*. Jakarta: EGC, 2015.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009.
- Prawihardjo, sarwono. *Ilmu Kandungan*. Jakarta: EGC 2010.
- Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar 2016.
- Rahma, Andi Sitti. *Fisiologi Laktasi*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Rahmawati, dkk. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba, 2009.
- Riskani, Ria. *Keajaiban ASI (Air Susu Ibu)*. Jakarta: Dunia sehat, 2012.
- Risnaeni. *Hubungan Teknik Menyusui Dengan Terjadinya Lecet Puting Susu Pada Ibu Nifas*. 2015.
- Roesli Utami, *Asi Eksklusif*. Jakarta: Trubus Agrundaya, 2002.
- Rukiyah, Aiyeyeh, Lia Yulianti & Media Liana *Asuhan Kebidanan III (Nifas)* Jakarta, Trans info Media. 2013.
- Saleha, Siti. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Sari, Luvita dan Susi Ernawati. *Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang Perawatan Payudara di Klinik Pratama Bina Sehat Kasihan, Bantul, Yogyakarta*. Vol. 03, No. 01, 2015.
- Sari Mustika Surya. *Hubungan Pengetahuan Ibu Post Partum Tentang Breast Care Dengan Kejadian Bendungan ASI Pada Ibu Post Partum*. Jurnal Keperawatan & Kebidanan – Stikes Dian Husada Mojokerto Vol. 6, No. 1 (2014). Diakses tanggal 14 September 2018 (link: <http%3A%2F%2Fjurnalonline.lppmdianhusada.ac.id%2Findex.php>).
- Saryono, Roischa Dyah. *Perawatan Payudara*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

- Siregar, M. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: EGC, 2004.
- Suparyanto. *Perawatan Payudara*. Jakarta: Salemba Medika 2011.
- Sutarni & Pertiwi H.W. *Hubungan Antara Postnatal Breast Care Dengan Terjadinya Bendungan ASI Di Bidan Praktek Swasta (BPS) Wilayah Kerja Puskesmas Wuryantoro Wonogiri*. Jurnal Kebidanan. Volume 6, Nomor 1. Juni 2014. Diakses Tanggal 02/07/2018 (link: <http://journal.stikesub.ac.id/index.php/jkeb/article/view/130/129>).
- Varney dkk. *Asuhan Kebidanan (Varney, s Kebidanan Midwefery)*. Jakarta: EGC, 2007.
- Walyani, Elisabet Siwi & Endang Purwoastuti. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Wiji Rizki Natia. *ASI dan Panduan Ibu Menyusui*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Wildan, Moh. Dan Hidayat, A. Aziz Alimul. *Dokumentasi Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Yang, Z, dkk. *Breastfeeding rates in China: a cross-sectional survey and estimate of benefits of improvement. Journal of National Institute for Nutrition and Health Published 30 October 2016*. Diakses Tanggal 02/07/2018 ([http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(16\)31974-2.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)31974-2.pdf)).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samat -Gowa Telp. (0411)841879 Fax. (0411) 8221400

Nomor : B1920 /FKIK/PP.00.9/09/2018
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 2 September 2018

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel.
di-

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar


Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Riswika Haltitah
NIM : 70400115072
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care Dengan Kelainan Bentuk Puting di Puskesmas Bara-Baraya Makassar.
Tempat Penelitian : Puskesmas Bara-Baraya
Dosen Pembimbing : 1. Firdayanti, S.SiT., M.Keb.
2. dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
an. **Dekan,**
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

- 1.Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
- 2.Masing-masing Pembimbing
- 3.Mahasiswa yang bersangkutan.
- 4.Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6019/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1876/FKIK/PP.00.9/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RISWIKA HALTITAH**
Nomor Pokok : 70400115072
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA NY "X" USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST PARTUM MINGGU KE IV DENGAN KELAINAN BENTUK PUTING DI PUSKESMAS BARA BARAYA MAKASSAR TAHUN 2018 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 September s/d 31 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 10 September 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 12 September 2018

K e p a d a

Nomor : 070/4111 -II/BKBP/IX/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 6019/S.01/PTSP/2018 Tanggal 10 September 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

NAMA : RISWIKHA HALTITAH
NIM/ Jurusan : 70400115072 / Kebidanan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3) / UIN Alauddin
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Samata Gowa
Judul : "MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA NY"X" USIA KEHAMILAN TRIMESTER III SAMPAI POST PARTUM MINGGU KE IV DENGAN KELAINAN BENTUK PUTING DI PUSKESMAS BARA BARAYA MAKASSAR TAHUN 2018 "

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak / Ibu , dalam rangka *Penyusunan Karya Tulis Ilmiah* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 September s/d 31 Oktober 2018

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
UB. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP

Pangkat : Pembina

NIP : 19621110 198603 1 042





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR,
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710
MAKASSAR



Nomor : 440 /313 /PSDK/VII/2018 Kepada Yth,
Lampiran : Ka. Puskesmas Bara Baraya
Perihal : Pengambilan data awal di -

Makassar

Sehubungan dengan surat dari Program studi Kebidanan ,Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan,UIN Makassar, tanggal 18 Juli 2018 ,No.Surat : B 2097/FKIK/PP.00.9/06/2018, perihal tersebut diatas,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Riswika haltitah
Nim : 70400115072
Judul : Manajemen asuhan kebidanan post natal Care pad any X dengan kelainan bentuk puting di puskesmas Bara Baraya

Akan melaksanakan kegiatan Pengambilan data awal, di puskesmas yang saudara pimpin..

Demikian disampaikan .Atas kerjasamanya ,diucapkan terimakasih banyak

Makassar, 19 Juli 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar



dr. Pi. An. H. S. Azikin.M.Kes
Nip.1960-09-14-198902 2 001



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710
MAKASSAR



Nomor : 440/ 78 /PSDK/IX/2018

Kepada Yth,

Lampiran :

Ka.Puskesmas Bara Baraya

Perihal : Penelitian

Di –

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik ,No. 070/3079 -II/BKBP/VI/2018 , tanggal 10 September 2018, perihal tersebut di atas,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : R. swika Haltitah
NIM : 70400115072

Jurusan : Kebidanan
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Judul : Manajemen asuhan kebidanan berkelanjutan pad any x usia kehamilan trisemester III sampai post partum minggu ke IV dengan kelainan bentuk puting di puskesmas Bara Baraya 2018

Akan melaksanakan Penelitian di wilayah kerja puskesmas saudara pada tanggal 12 September s.d 31 Oktober 2018 .

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih

Makassar, 14 September 2018
Kepala Dinas kesehatan
Kota Makassar



dr.Hj.A.Naisyah T Azikin.M.Kes
Nip.19601014198902 2 001



**DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
PUSKESMAS BARA-BARAYA**

Jl. Abubakar Lambogo, 143, Telp. (0411) 452035 Email pkm.barabaraya@yahoo.com

MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

No. 440 / 506 / Pusk/BRY/TU/XI/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Puskesmas Bara-Baraya menerangkan bahwa :

N a m a : RISWIKA HALTITAH
Nim/ Jur : 70400115072 / KEBIDANAN
Instansi : UIN Alauddin Makassar
J u d u l : ***“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA Ny. “R” USIA KEHAMILAN TRISEMESTER III SAMPAI POST PARTUM MINGGU KE IV DENGAN KELAINAN BENTUK PUTING DI PUSKESMAS BARA-BARAYA 2018”.***


Telah melaksanakan penelitian di Puskesmas Bara-Baraya terhitung mulai pada tanggal 18 September s/d 31 Oktober 2018

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Makassar, 19 November 2018

An. Kepala Puskesmas Bara-Baraya

Kasubag. Tata Usaha



Muhtar Raab, S. Kep.Ns.

Nip. 19740101199803101

Gambar Kunjungan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Riswika Haltitah
Nim : 70400115072
Tempat/Tanggal Lahir : Sanuale, 08 Agustus 1996
Suku/Bangsa : Bugis/Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : BTN. Pesona Mutiara Pallangga P1/No.4
Email : riswikahaltitah0896@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Kamaruddin Mas'ud
Ibu : Halmiati
Alamat : Soppeng

C. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2003 : TK Perwanida Marioritengnga Sanuale
2. Tahun 2003-2009 : SD Negeri 165 Asanae
3. Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 2 Marioriwawo
4. Tahun 2012-2015 : SMA Negeri 1 Pallangga
5. Tahun 2015-2018 : Jurusan Kebidanan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar