

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PATOLOGI
PADA NY “ N “ DENGAN KETUBAN PECAH DINI DISERTAI
GAWAT JANIN DI RSUD SYEKH YUSUF
TANGGAL 23 JUNI 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
OLEH:
MUTMAINNAH
NIM : 70400115037
ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutmainnah
Nim : 70400115037
Tempat/ tanggal lahir : Bonto paja, 03 November 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kebidanan
Fakultas/program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Pada Ny "N"
dengan Ketuban Pecah Dini disertai Gawat Janin di RSUD Syekh
Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 23 Juni Tahun 2018.

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, Juli 2018

Penyusun ,



MUTMAINNAH

70400115037

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : MUTMAINNAH
NIM : 70400115037
Judul : “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi pada Ny “N”
Dengan Ketuban Pecah Dini disertai Gawat Janin Di RSUD Syekh
Yusuf Gowa Tanggal 23 Juni Tahun 2018”

Karya Tulis Ilmiah ini telah di setujui untuk diajukan dalam seminar hasil Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing I


Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M.Keb

Pembimbing II


dr. Rini Fitriyani, M.Kes
NIP. 19800032008012021

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Pada Ny “N” Dengan Ketuban Pecah Dini disertai Gawat Janin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 23 Juni Tahun 2018, yang disusun oleh MUTMAINNAH NIM: 70400115037, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari senin 14 Agustus 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 14 Agustus 2018
02 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Sitti Saleha., S.SiT., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Anieq Mumtiah Alqautsar, SST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Darmawansyih., M.kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Hamzah Hasan, M.Ag	(.....)

Dekan/



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 195502031983121001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, semoga rahmat, hidayah, tercurah kepada kita semua sehingga segala aktivitas bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Shalawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabiyullah Muhammad Saw yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun proposal yang berjudul **“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI PADA NY “N” DENGAN KETUBAN PECAH DINI DISERTAI GAWAT JANIN DI RSUD SYEKH YUSUF KAB.GOWA”** .

Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Kebidanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun merupakan masukan dan penyempurnaan selanjutnya sangat dibutuhkan. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Untuk hal itu pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si, sebagai rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.sc, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Dekan I, pembantu Dekan II, dan pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, M.keb, selaku ketua jurusan Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah mengajarkan kami banyak hal.
4. Ibu Anieq Mumti'ah AlKautsar, S.SiT, M.keb, selaku pembimbing I Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb.
5. Ibu dr. Nadya M.kes, dan dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku pembimbing II Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar

kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb.

6. Ibu dr. Darmawansyih, M.Kes., selaku penguji I Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan banyak masukan dan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb
7. Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.Ag selaku penguji agama Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan masukan serta motivasi khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menimba ilmu di Jurusan Kebidanan.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Burhan Dg Tayang dan Ibunda Sittiara Dg Tarring yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan materi dan doa yang selalu beliau panjatkan setiap saat untuk penulis sehingga bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih juga untuk Tante Ramlah Dg Ngugi dan Om Kahar Dg Muang serta adik saya Syahrul Ramadhan Burhan yang selalu mendukung agar penulis cepat menyelesaikan KTI ini.

10. Sahabat-sahabat penulis yang telah menjadi tempat berbagi di kala suka maupun duka selama proses awal penyusunan KTI ini hingga selesai.
11. Kepada semua saudari seperjuanganku di Kebidanan UIN Alauddin Makassar Angkatan 2015 yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan motifasinya serta do'a kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya semoga menjadi ibadah dan amal jariyah. Amin

Samata-Gowa, 23Juni 2018

Penulis

MUTMAINNAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

70400115037

ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Penulisan.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Metode Penulisan.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan.....	13
B. Tinjauan Khusus Tentang Ketubaan Pecah Dini.....	38
C. Gawat janin dalam Persalinan.....	48
D. Tinjauan Asuhan Kebidanan Dengan Ketuban Pecah Dini disertai Gawat Janin.....	51
E. Tinjauan Islam Tentang Persalinan, Ketuban Pecah Dini, Gawat Janin.....	60

BAB III STUDI KASUS	66
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 Langkah Varney.....	66
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	121
BAB IV PEMBAHASAN	152
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar.....	152
B. Langkah II Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual	154
C. Langkah III Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial.....	155
D. Langkah IV Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi	156
E. Langkah V Rencana Asuhan Kebidanan.....	158
F. Langkah VI Implementasi Asuhan Kebidanan.....	159
G. Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	159
BAB V PENUTUP	161
A. Kesimpulan.....	161
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA	166

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Partograf
Lampiran II	: Surat Permohonan Izin Penelitian dan pengambilan data Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
Lampiran III	: Surat Permohonan Izin Penelitian dan pengambilan data Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
Lampiran IV	: Surat Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
Lampiran V	: Surat Izin Atau Rekomendasi Penelitian Dari Bupati Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur Rsud Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
Lampiran VI	: Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari RSUD Syekh Yusuf
Lampiran VII	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, 23 JUNI 2018

MUTMAINNAH, 70400115037

Pembimbing I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar

Pembimbing II : Nadyah dan Rini Fitriani

“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi pada Ny “N” dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai Gawat Janin Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018”.

Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan yang ditandai dengan pembukaan serviks 3 cm pada primipara atau 5 cm pada multipara. Sedangkan Gawat janin adalah jika denyut jantung janin (DJJ) kurang dari 120 permenit atau lebih dari 180 permenit dan air ketuban hijau kental. Gawat janin terjadi apabila janin tidak menerima cukup oksigen, sehingga mengalami *hipoksia*.

Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny “N” dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai Gawat Janin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “N” dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai Gawat Janin yakni tidak ditemukannya kendala dalam menangani masalah dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai Gawat Janin. Dalam penatalaksanaan masalah Ketuban Pecah Dini disertai Gawat Janin pada Ny “N” dilakukan pemasangan infus Ringer Laktat per IV 28 tetes permenit untuk mengganti cairan yang hilang selama persalinan, pemasangan misoprostol pervaginam 1/8 tablet untuk membantu pematangan serviks dan membantu kontraksi uterus dan pemberian injeksi cefotaxime 1 gram tiap 6-8 jam untuk mencegah terjadinya infeksi, pemasangan oksigen 6/8 l/menit sesuai instruksi dokter, serta dilakukannya pemantauan dan asuhan dari kala I sampai kala IV.

Kesimpulan dari studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yakni dari kala I terdapat sedikit kendala yaitu pada observasi DJJ 30 menit terakhir terjadi gawat janin dan segera dilakukan pemasangan oksigen dengan 6/8 l/menit dan pemasangan infus RL serta pemberian Misoprostol pervaginam. Serta kala II hingga kala IV semuanya berlangsung normal tanpa ada penyulit, tidak ditemukannya komplikasi atau masalah pada janin dan ibu, serta keadaan ibu dan bayi baik yang ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Kata Kunci : Ketuban Pecah Dini (KPD), Gawat Janin, 7 langkah varney.



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, JUNE 23, 2018

MUTMAINNAH, 70400115037

Supervisor I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar

Supervisor II : Nadyah and Rini Fitriani

“The Intranatal Pathology Obstetric Care Management on Mrs. “N” with Early Rupture of Membranes Accompanied by Fetal Distress at Syekh Yusuf Regional Public Hospital of Gowa Regency in 2018”

The Early Rupture of Membranes (ERM) is the rupture of the membranes prior to any signs of labor characterized by 3 cm cervical opening in primipara or 5 cm in multipara. Whereas the fetal distress is when the fetal heart rate (FHR) is less than 120 minutes or more than 180 minutes and the thick green amniotic fluid. Fetal distress occurs when the fetus does not receive enough oxygen, resulting in hypoxia.

This Scientific Paper is aimed at implementing the Obstetric Care Management on Mrs. "N" with the Early Rupture of Membranes (ERM) accompanied by Fetal Distress at Syekh Yusuf Regional Public Hospital of Gowa Regency in 2018 using a 7-step obstetric care management approach according to Helen Varney and the documentation in the form of SOAP.

The results of a case study conducted on Mrs. "N" with the Early Rupture of Membranes (ERM) accompanied by Fetal Distress were not found obstacles in dealing with problems with the Early Rupture of Membranes (ERM) accompanied by Fetal Distress. In the management of the Early Rupture of Membranes (ERM) accompanied by Fetal Distress on Mrs. "N", an infusion of Ringer Lactate per IV was carried out of 28 drops per minute to replace the lost fluid during the labor, installation of vaginal misoprostol 1/8 tablet to help ripen the cervix and provide uterine contractions and injection cefotaxime 1 gram every 6-8 hours to prevent infection, oxygen installation 6/8 of l/minute based on the doctor's instructions, as well as monitoring and caring from the first to the fourth stages.

The conclusions of the case study with Varney 7-step care management and documentation in the form of SOAP from the first stage were identified a slight obstacle, namely the DJJ observation of the last 30 minutes had fetal distress and oxygen installation was immediately carried out with 6/8 of l/minute and RL infusion and installation of vaginal misoprostol. The second to the fourth stages took place normally without any complications, no complications or problems in the fetus and the mother found, as well as the mother's and baby's conditions were good identified by the vital signs within normal limits.

Keywords: Early Rupture of Membranes (ERM), Fetal Distress, 7 Steps of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan (Icesmi Sukarni K dan Margareth ZH, 2013 : 251), yang ditandai dengan pembukaan serviks 3 cm pada primipara atau 5 cm pada multipara (Maryunani, 2013). Ketuban pecah dini merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang paling sering ditemui. Hal ini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. KPD terbagi menjadi KPD preterm yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu dan KPD yang memanjang yaitu KPD yang terjadi lebih dari 12 jam sebelum waktunya melahirkan (Kartika, 2013).

Persalinan KPD dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kelainan letak janin, kehamilan ganda, kelainan bawaan dari selaput ketuban, dan kelainan panggul (Heny Sepduwiana, 2013). Perubahan struktur, jumlah sel, dan katabolisme kolagen menyebabkan aktivitas kolagen berubah dan menyebabkan selaput ketuban pecah (M. Irsam dkk, 2014). Menurut Huda (2013) anemia merupakan faktor yang dominan yang menjadi penyebab KPD, sedangkan menurut Kadek (2013) adanya hubungan antara kadar hemoglobin dengan kejadian KPD. KPD juga merupakan salah satu alasan utama untuk dilakukan bedah caesar (Nita Norma dan Mustika Dwi, 2013 : 246).

Pada kasus KPD komplikasi yang dapat terjadi yaitu infeksi dalam persalinan, infeksi masa nifas, partus lama, meningkatnya tindakan *operatifobstetric* atau *secsio sesarea* (SC), atau akan mengarah ke morbiditas dan mortalitas ibu. Selain KPD dapat memberi dampak buruk bagi ibu, KPD juga dapat memberi resiko pada janin yaitu prematuritas (*sindrom distres* pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, *retinopati premturit*, perdarahan *intraventricular*, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risikocerebral *palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, *prolaps funiculli* / penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, prolaps uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah, *ensefalopati*, *cerebral palsy*, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (*sindrom deformitas* janin, *hipoplasia* paru, *deformitas ekstremitas* dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

Menurut Nugroho (2012) faktor predisposisi pada KPD adalah infeksi, keadaan sosial ekonomi, overdistensi uterus, servik inkompeten, kelainan letak janin, paritas, anemia, riwayat KPD sebelumnya, usia ibu dan riwayat hubungan seksual. KPD juga mungkin terjadi akibat kondisi serviks yang inkompeten. Serviks tidak mampu mempertahankan kehamilan sehingga selaput ketuban menonjol keluar dari serviks dan dapat ruptur. Selanjutnya, faktor presentasi dan letak janin juga diduga berperan dalam terjadinya ketuban pecah dini, hal

ini terjadi karena tekanan terhadap selaput ketuban menjadi tidak merata jika janin tidak dalam presentasi kepala (Maryunani, 2013).

Insiden KPD sekitar 2,7%- 17%, bergantung pada lama periode fase laten yang digunakan untuk menegakkan diagnosis KPD. Angka kejadian kasus KPD terjadi lebih tinggi pada wanita dengan serviks inkompeten, polihidramnion, malpresentasi janin, janin kembar dan adanya infeksi pada serviks atau vagina (Sudarmi, 2013). Komplikasi KPD yang paling sering terjadi pada ibu bersalin yaitu infeksi dalam persalinan, infeksi masa nifas, partus lama, perdarahan post partum, meningkatkan kasus bedah caesar, dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas maternal (Budi Rahayu dan Ayu Novita Sari, 2015).

Menurut laporan *World Health Organisation* (WHO) pada tahun 2016 di seluruh dunia setiap tahunnya lebih dari 585.000 ibu meninggal saat hamil atau bersalin. Salah satu penyebab kematian ibu tersebut adalah infeksi yang dapat disebabkan oleh KPD. Usia yang terlalu muda ternyata lebih 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20 sampai 35 tahun. KPD ternyata berhubungan dengan paritas ibu. KPD terjadi pada 37,59% multipara dan 31,17% pada grandemultipara. Sebagian besar kematian ibu terjadi di negara berkembang karena kurang mendapat akses pelayanan kesehatan, kekurangan fasilitas, terlambatnya pertolongan persalinan disertai keadaan sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah (Kartika 2013). Berdasarkan hasil studi dari *American College of*

Obstetricians and Gynecologists tahun 2016, KPD terjadi sebesar 8% dari seluruh kehamilan dan merupakan faktor utama yang menyebabkan *mortalitas* dan *morbiditasperinatal* (Revathi dkk, 2015).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu peringkat ketiga di ASEAN dan menjadi salah satu Negara yang menjalankan program Milleneum Development Goals (MDGs), yang memiliki target menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 20 per 1000 kelahiran hidup pada bayi pada tahun 2015, ini karena disebabkan oleh banyak hal, termasuk salah satunya adalah infeksi maternal yakni disebabkan oleh KPD (Kementerian Kesehatan, 2014). Tujuan milenium dalam target MDGs pada 2015 adalah AKI dapat diturunkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Namun berdasarkan data yang didapat, AKI pada tahun 2015 sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini sangat jauh dari target MDGs (Kementerian Kesehatan, 2015).

Kematian ibu di Indonesia tetap didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi. Dari lima penyebab ini ketuban pecah dini masuk ke dalam infeksi yang menduduki urutan ke tiga penyebab kematian ibu di Indonesia. Komplikasi yang menyebabkan kematian ibu adalah komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan atau periode setelah melahirkan. AKI di Indonesia (75-85%) berkaitan dengan satu atau gabungan tiga macam komplikasi seperti perdarahan, infeksi dan eklampsia. Hasil survey demografi dan kesehatan

Indonesia (SDKI) tahun 2015, AKI yaitu 305 per100.000 kelahiran hidup yang mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup. AKB sendiri menurut survei penduduk antar sensus (SUPAS) pada tahun 2015 yaitu 22 per 100.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan, 2016).

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016, AKI mencapai 153 orang per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB terbanyak (48%) terjadi pada bulan pertama atau masa neonatus dan penyebab terbanyak (44%) kematian neonatus adalah prematuritas. Seperti halnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, AKI yang didapatkan sebanyak 14 orang atau 111 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB yang dilaporkan sebanyak 87 kematian neonatal (7 per 1.000 kelahiran), 16 kematian bayi (1 per 1.000 kelahiran) yang terjadi pada tahun 2015 (Dinkes, 2016).

Sedangkan data yang diperoleh dari Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa menunjukkan jumlah persalinan pada periode 2015 yaitu 1.804 persalinan terdapat 27 (1,49%) kasus persalinan dengan ketuban pecah dini. Pada tahun 2016 yaitu 1.578 persalinan terdapat 16 (1,01%) kasus persalinan dengan ketuban pecah dini. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 2.642 persalinan terdapat 11 (0,41%) persalinan ketuban pecah dini (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf, 2017)

KPD merupakan salah satu permasalahan obstetrik yang dapat menyebabkan komplikasi pada ibu seperti infeksi intrauterin yang bisa menjadi

chorioamnionitis, plasenta abrupsi, dan juga sepsis. Infeksi pada ibu dapat terjadi pada kejadian ketuban pecah dini diakibatkan karena pecahnya selaput ketuban akan membuat bakteri mudah untuk memasuki uterus dan akan berkembang biak. Perkembangan bakteri ini akan lebih cepat terjadi pada lingkungan yang hangat dan basah. Kemungkinan untuk terjadi infeksi akan meningkat pada keadaan KPD yang lama, karena bakteri akan memiliki waktu yang lebih lama untuk bermultiplikasi. Tidak hanya membahayakan ibu, KPD juga dapat menimbulkan komplikasi pada bayi (Nazila Maghfiratul Abrar dkk, 2015).

Penyebab KPD belum dikatehui secara pasti, namun kemungkinan yang menjadi faktor predisposisi adalah infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban dari vagina atau serviks (Prawiroharjo, 2014 : 679). Selain itu fisiologi selaput ketuban yang abnormal, serviks inkompetensia, kelainan letak janin, usia wanita kurang dari 20 tahun dan di atas 35 tahun, faktor golongan darah, faktor multigraviditas/paritas, merokok, keadaan sosial ekonomi, perdarahan antepartum, riwayat abortus dan persalinan preterm sebelumnya, riwayat KPD sebelumnya, defisiensi gizi yaitu tembaga atau asam askorbat, ketegangan rahim yang berlebihan, kesempitan panggul, kelelahan dalam ibu bekerja, serta trauma yang didapat misalnya dalam hubungan seksual, pemeriksaan dalam dan amniosintesis (Lisda Handayani, 2017).

Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam penanganan KPD yaitu dengan memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin secara tepat, cepat dan

komprehensif, karena jika ibu bersalin dengan KPD tidak mendapat asuhan yang sesuai, maka resikonya akan berakibat pada ibu maupun janin. Dengan harapan setelah dilakukannya asuhan kebidanan yang cepat dan tepat maka kasus ibu bersalin dengan KPD dapat di tangani dengan baik, sehingga angka kematian ibu di Indonesia dapat di kurangi.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal care patologi pada ibu dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai gawat janin”.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah ini adalah “Manajemen asuhan kebidanan Intranatal care patologi dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai gawat janin”

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan manajemen asuhan Intranatal care patologi Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai gawat janin” dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi atau wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukannya pengumpulan data pada ibu bersalin dengan KPD disertai gawat janin.
- b. Dirumuskannya interpretasi data pada ibu bersalin dengan KPD disertai gawat janin.

- c. Diidentifikasinya diagnosis potensial pada ibu bersalin dengan KPD disertai gawat janin.
- d. Dilakukannya antisipasi penanganan segera pada ibu bersalin dengan KPD disertai gawat janin.
- e. Disusun rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD disertai gawat janin.
- f. Dilaksanakannya asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan pada ibu bersalin dengan KPD disertai gawat janin.
- g. Dievaluasinya asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu bersalin dengan KPD disertai gawat janin.
- h. Dilakukannya pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada kasus KPD disertai gawat janin.
- i. Didiskusikannya kesenjangan antara teori dengan kasus yang didapatkan dilahan.
- j. Diintegrasikannya nilai-nilai keislaman kepada pasien dengan kasus KPD disertai gawat janin.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir di jenjang pendidikan Program Diploma tiga Kebidanan UIN Alauddin Makassar.

2. Manfaat Instansi

Memberikan informasi dan masukan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang faktor yang berhubungan dengan KPD disertai infeksi jalan lahir.

4. Manfaat Bagi Institusi

Sebagai bahan ilmiah atau bahan bacaan untuk penulisan berikutnya

5. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat tentang faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya ketuban pecah dini pada ibu hamil, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kejadian ketuban pecah dini.

E. Metode Penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode :

1. Studi Kepustakaan

Mempelajari buku-buku literatur dan mengambil data-data dari internet, antara lain: membaca buku dari berbagai sumber yang berkaitan dengan KPD di sertai gawat janin, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah Varney yaitu: identifikasi dan analisa data dasar, identifikasi diagnosis atau masalah aktual, antisipasi diagnosa atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan. Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan tehnik :

a. Anamnesa atau Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien dan suami maupun keluarganya, bidan, dokter di kamar bersalin yang dapat membantu dan memberikan keterangan atau info yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan kebidanan.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi ,

- 1) *Inspeksi*, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, yang dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) *Palpasi*, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) *Perkusi* adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.

- 4) *Auskultasi* merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah, sedangkan lenek digunakan untuk mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial dilakukan meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami, serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium dan atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing, baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk melancarkan penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari BAB 1 sampai BAB IV, yaitu: pada BAB I terdiri dari pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Pada BAB II terdiri dari

tinjauan teori, akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang asuhan kebidanan dan persalinan, tinjauan khusus tentang KPD disertai infeksi jalan lahir dan gawat janin , tinjauan umum KPD disertai infeksi jalan lahir dan gawat janin menurut pandangan Islam, proses manajemen asuhan kebidanan, serta pendokumentasian asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP.

Selanjutnya, pada BAB III yaitu studi kasus yang akan menguraikan tentang 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosis/ masalah aktual, identifikasi diagnosis/ masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/ intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Pada BAB IV terdiri dari pembahasan yang akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan .

Terakhir yaitu BAB V, yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, yang memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan

1. Pengertian Persalinan

Persalinan adalah proses pergerakan keluarnya janin, plasenta, dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses ini berawal dari pembekuan dan dilatasi serviks akibat kontraksi uterus dengan frekuensi, durasi, dan kekuatan yang teratur. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Prawihardjo, 2014). Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37–42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Rohani, 2013).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persalinan normal adalah apabila bayi lahir dengan presentasi belakang kepala tanpa memakai alat-alat atau pertolongan istimewa serta tidak melukai ibu dan bayi, dan umumnya berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam.

2. Tujuan Asuhan Persalinan

Asuhan persalinan normal adalah asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir, serta upaya pencegahan komplikasi terutama pendarahan pasca persalinan, hipotermia, dan asfiksia bayi baru lahir. Sementara itu, fokus utamanya adalah mencegah terjadinya komplikasi. Hal ini merupakan suatu pergesaran paradigma dari sikap menunggu dan menangani komplikasi menjadi mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Pencegahan komplikasi selama persalinan dan setelah bayi lahir akan mengurangi kesakitan dan kematian ibu serta bayi baru lahir. Penyesuaian ini akan sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Hal ini dikarenakan sebagian besar persalinan di Indonesia masih terjadi di tingkat pelayanan kesehatan primer dengan penguasaan keterampilan dan pengetahuan petugas kesehatan di fasilitas pelayanan tersebut masih belum memadai.

Tujuan asuhan persalinan normal, yaitu mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal (Prawirohardjo, 2014). Pendekatan seperti ini berarti bahwa dalam asuhan persalinan normal harus ada alasan yang kuat dan bukti manfaat apabila akan melakukan intervensi terhadap jalannya proses persalinan yang fisiologis atau alamiah. Oleh sebab itu, deteksi dini dan pencegahan komplikasi

penting dilakukan. Hal tersebut dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir. Jika semua tenaga penolong persalinan dilatih agar mampu untuk mencegah atau mendeteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi, menerapkan asuhan persalinan secara tepat guna dan waktu, baik sebelum atau sesaat masalah terjadi dan segera melakukan rujukan saat kondisi ibu masih optimal, maka para ibu dan bayi lahir akan terhindar Dari ancaman kesakitan dan kematian. Selain hal tersebut, tujuan lain dari asuhan persalinan adalah:

- a. Meningkatkan sikap positif terhadap keramahan dan keamanan dalam memberikan pelayanan persalinan normal dan penanganan awal penyulit beserta rujukannya
- b. Memberikan pengetahuan dan keterampilan pelayanan persalinan normal dan penangan awal penyulit beserta rujukan yang berkualitas dan sesuai dengan prosedur standar.
- c. Mengidentifikasi praktik – praktik terbaik bagi penatalaksanaan persalinan dan kelahiran:
 - 1) Penolong yang terampil
 - 2) Kesiapan menghadapi persalinan, kelahiran dan kemungkinan komplikasinya
 - 3) Partograf
 - 4) Episiotomi terbatas hanya atas indikasi.

- 5) Mengidentifikasi tindakan tindakan yang merugikan dengan maksud menghilangkan tindak tersebut.

3. Penyebab Terjadinya Persalinan

Sebab-sebab mulainya persalinan belum diketahui dengan jelas, banyak faktor yang memegang peranan dan bekerja sama sehingga terjadi persalinan diantaranya:

a. Teori Penurunan Hormon

Satu sampai dua minggu sebelum persalinan terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron, progesteron mengakibatkan relaksasi otot-otot rahim, sedangkan estrogen meningkatkan kerentanan otot-otot Rahim. Selama kehamilan terjadi keseimbangan antara kadar estrogen dan progesteron, tetapi akhir kehamilan terjadi penurunan kadar progesteron sehingga timbul his.

b. Teori Distensi Rahim

Rahim yang menjadi besar dan meregang akan menyebabkan iskemik otot-otot rahim sehingga timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya.

c. Teori Iritasi Mekanik

Di belakang serviks terletak ganglion sevikalis, bila ganglion ini ditekan oleh kepala janin maka akan timbul kontraksi uterus.

d. Teori Plasenta menjadi tua

Akibat plasenta tua menyebabkan turunnya kadar progesteron yang mengakibatkan ketegangan pada pembuluh darah, hal ini menimbulkan kontraksi rahim..

e. Indikasi Partus

Partus dapat ditimbulkan dengan pemberian oksitosin drips, menurut tetesan perinfus dan pemberian gagang laminaria ke dalam kanalis servikalis dengan tujuan merangsang pleksus frankenhauser, sehingga timbul kontraksi dan melakukan pemecahan ketuban.

f. Teori Oxytocin

Pada akhir kehamilan kadar oxytocin bertambah oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot rahim.

g. Ketegangan otot-otot

Seperti halnya dengan kandung kencing dan lambung, bila dindingnya terenggang oleh karena isinya.

h. Pengaruh janin atau fetal cortisol

Hypofise dan kelenjar supraneral janin rupa-rupanya juga memegang peranan, oleh karena itu, pada anencephalus kehamilan sering lebih lama dari biasa.

i. Teori Prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua, disangka menjadi salah satu penyebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan menunjukkan

bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang diberikan secara intravena, intra dan ekstra amnion menimbulkan kontraksi myometrium pada setiap umur kehamilan. Hal ini juga disokong dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi baik dalam air ketuban maupun darah perifer pada ibu-ibu hamil sebelum melahirkan atau selama persalinan.

4. Tanda-tanda Mulainya Persalinan

Tanda-tanda persalinan dibagi menjadi dua fase, yaitu tanda bahwa persalinan sudah dekat dan tanda timbulnya persalinan (inpartu).

a. Tanda-tanda bahwa persalinan sudah dekat

1). Terjadi *Lightening*

Menjelang minggu 36 kehamilan, tanda pada primigravida adalah terjadinya penurunan fundus uteri karena pada kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul yang disebabkan; kontraksi *Braxton Hicks*, ketegangan dinding perut, ketegangan *ligamentum rotundum*, dan gaya berat janin dimana kepala kearah bawah. Maksudnya kepala bayi baru masuk ke pintu atas panggul sehingga menyebabkan ibu merasakan

- a) Ringan dibagian atas perut, dan rasa sesaknya berkurang
- b) Bagian bawah perut ibu terasa penuh dan mengganjal
- c) Kesulitan berjalan
- d) Sering buang air kecil (*follaksuria*).

Gambaran *lightening* pada primigavida menunjukkan hubungan normal antara ketiga P yaitu *power*, *passage* dan *passanger*. Sedangkan pada multipara gambarannya tidak begitu jelas, karena kepala janin baru masuk pintu atas panggul menjelang peralihan

2). Terjadinya his permulaan

Pada waktu umur kehamilan masih muda, yaitu sejak trimester pertama kehamilan uterus akan sering mengalami kontraksi ringan. Pada trimester kedua dapat dideteksi dengan pemeriksaan bimanual. Fenomena ini dikemukakan pertama kali oleh *Braxton Hicks* pada tahun 1872 sehingga disebut sebagai kontraksi *Braxton hicks*. Sampai bulan terakhir kehamilan biasanya kontraksi ini sangat jarang dan meningkat pada satu atau dua minggu sebelum persalinan. Kontraksi ini terjadi karena adanya perubahan keseimbangan *esterogen* dan *progesteron* sehingga terjadi peningkatan jumlah reseptor *oksitosin* dan *gap junction* diantara sel-sel myometrium.

Dengan semakin tuanya kehamilan, pengeluaran *esterogen* dan *progesterone* semakin berkurang, sehingga *oksitosin* dapat menimbulkan kontraksi yang lebih sering, yang dikenal sebagai his palsu, dengan sifat sebagai berikut :

- a) Rasa nyeri ringan di bagian bawah.
- b) Datangnya tidak teratur.
- c) Tidak ada perubahan pada *serviks* atau pembawa tanda

d) Tidak bertambah bila beraktivitas

b. Tanda-tanda timbulnya persalinan (inpartu)

1). Terjadinya his persalinan

His adalah kontraksi rahim yang dapat diraba menimbulkan rasa nyeri di perut serta dapat menimbulkan pembukaan *serviks* kontraksi rahim yang dimulai pada 2 *face maker* yang letaknya di dekat *cornu uteri*. His yang menimbulkan pembukaan *serviks* dengan kecepatan tertentu disebut his efektif. His efektif mempunyai sifat adanya dominan kontraksi uterus pada fundus uteri (*fundal dominance*), kondisi berlangsung secara sonkron dan harmonis, adanya intensitas kontraksi yang maksimal diantara dua kontraksi, irama teratur dan frekuensi yang kian sering, lama his berkisar 45-60 detik. Pengaruh his ini dapat menimbulkan di daerah uterus (meningkat), terjadi penurunan janin, terjadi penebalan pada dinding *corpus uteri*, terjadi peregangan dan penipisan pada istmus uteri, serta terjadinya pembukaan pada *kanalis servikalis*. His persalinan memiliki sifat sebagai berikut:

- a) Pinggang terasa sakit dan mulai menjalar ke depan.
- b) Teratur dengan interval yang makin pendek dan kekuatannya makin besar.
- c) Mempunyai pengaruh terhadap perubahan *serviks*

d) Penambahan aktivitas (seperti berjalan) maka his tersebut semakin meningkat.

2). Keluarnya lendir bercampur darah (*show*)

Lendir ini berasal dari pembukaan *kanalis servikalis*. Sedangkan pengeluaran darahnya disebabkan oleh robeknya pembuluh darah waktu serviks membuka.

3). Terkadang disertai ketuban pecah

Sebagian ibu hamil mengeluarkan air ketuban akibat pecahnya selaput ketuban menjeklang persalinan. Jika ketuban sudah pecah, maka ditargetkan persalinan dapat berlangsung 24 jam. Namun, apabila persalinan tidak tercapai, maka persalinan harus diakhiri dengan tindakan tertentu, misalnya *ekstraksi vakum* atau *section caesarea*.

4). Dilatasi dan *Effacement*

Dilatasi adalah terbukanya *kanalis servikalis* secara berangsur-angsur akibat pengaruh his. *Effacement* adalah pendataran atau pemendekan *kanalis servikalis* yang semula panjang 1-2 cm menjadi hilang sama sekali, sehingga tinggal hanya *ostium* yang tipis seperti kertas.

5. Tahap-Tahap dalam proses Persalinan

a. Kala 1 : Kala Pembukaan

Waktu untuk pembukaan serviks sampai menjadi pembukaan lengkap (10 cm). Dalam kala pembukaan dibagi menjadi 2 fase :

1) Fase Laten

Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan *serviks* secara bertahap. Pembukaan kurang dari 4 cm dan biasanya berlangsung kurang dari 8 jam

2) Fase Aktif

a) Frekuensi dan lama kontraksi terus umumnya meningkat (kontraksi adekuat/3kali atau lebih dalam 10 menit dan berlangsung selama 40 detik atau lebih)

b) *Serviks* membuka dari 4 ke 10, biasanya dengan kecepatan 1cm/lebih perjam hingga pembukaan lengkap(10 cm)

c) Terjadi penurunan bagian terbawah janin

d) Berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 fase, yaitu berdasarkan *kurva friedman*:

(1) Periode *akselerasi*, berlangsung selama 2 jam pembukaan menjadi 4 cm

(2) Periode *dilatasi* maksimal, berlangsung selama 2 jam pembukaan berlangsung cepat dari 4 menjadi 9 cm

(3) Periode *diselerasi*, berlangsung lambat dalam waktu 2 jam pembukaan 9cm menjadi 10cm/ lengkap.

b. Kala II : Kala Pengeluaran Janin

Waktu uterus dengan kekuatan his ditambah kekuatan mengejan mendorong janin hingga keluar. Pada Kala II ini memiliki ciri khas sebagai berikut:

- 1) His terkoordinir, kuat, cepat dan lebih lama kira-kiraaa 2-3 menit sekali.
- 2) Kepala janin telah turun masuk ruang panggul dan secara reflektoris menimbulkan rasa ingin mengejan
- 3) Tekanan pada rectum, dan ibu merasa ingin BAB
- 4) Anus membuka

Pada Waktu his kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka dan perineum meregang, dengan his dan mengejan yang dipimpin kepala akan lahir dan diikuti seluruh badan janin. Lama pada kala II ini pada primi dan multipara berbeda yaitu :

- a) Primipara kala II berlangsung 1,5 jam – 2 jam.
- b) Multipara kala II berlangsung 0,5 jam – 1 jam.

Ada 2 cara ibu mengejan pada kala II yaitu menurut dalam letak berbaring, merangkul kedua pahanya dengan kedua lengan sampai batas siku, kepala diangkat sedikit sehingga dagu mengenai dada, mulut

dikatup, tetapi badan miring ke arah dimana punggung janin berada dan hanya satu kaki yang dirangkul yaitu sebelah atas.

d. Kala III : Kala Uri

Yaitu waktu pelepasan dan pengeluaran uri (plasenta). Setelah bayi lahir kontraksi rahim berhenti sebentar, uterus teraba keras dengan fundus uteri sehingga padat dan berisi plasenta yang menjadi tebal 2 kali sebelumnya. Beberapa saat kemudian timbul his pengeluaran dan pelepasan uri, dalam waktu 1-5 menit plasenta terlepas terdorong ke dalam vagina dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan (*brand andow*), seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Dan pada pengeluaran plasenta biasanya disertai dengan pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc. Tanda Kala III terdiri dari 2 Fase:

1) Fase pelepasan uri

Mekanisme pelepasan uri terdiri atas :

a) *Schultze*

Data ini sebanyak 80% yang lepas terlebih dahulu di tengah kemudian terjadi reteroplaster hematoma yang menolak uri mula-mula di tengah kemudian seluruhnya, menurut cara ini perdarahan biasanya tidak ada sebelum uri lahir dan banyak setelah uri lahir.

b) *Duncehn*

(1) Lepasnya uri mulai dari pinggirnya, jadi terlebih dahulu dari pinggir (20%)

(2) Darah akan mengalir semua antara selaput ketuban.

c) *Serempak dari tengah dan pinggir plasenta*

2) Fase pengeluaran uri

Untuk mengetahui lepasnya uri yaitu :

a) *Kustner*

Meletakkan tangan dengan tekanan pada atau di atas simfisis, tali pusat diregangkan, bila plasenta masuk berarti belum lepas, bila tali pusat diam dan maju (memanjang) berarti plasenta sudah terlepas.

b) *Klien*

Sewaktu ada his kita dorong sedikit rahim, bila tali pusat kembali berarti belum lepas, bila diam/turun berarti sudah terlepas.

c) *Strastman*

Tegangkan tali pusat dan ketuk pada fundus, bila tali pusat bergetar berarti belum lepas, bila tidak bergetar berarti sudah terlepas

(1) Rahim menonjol di atas *symfisis*

(2) Tali pusat bertambah panjang

(3) Rahim bundar dan keras

(4) Keluar darah secara tiba – tiba.

d. Kala IV (Tahap Pengawasan)

Tahap ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap bahaya pendarahan. Pengawasan ini dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Dalam tahap ini ibu masih mengeluarkan darah dari vagina, tapi tidak banyak yang berasal dari pembuluh darah yang ada di dinding rahim tempat terlepasnya plasenta, dan setelah beberapa hari anda akan mengeluarkan cairan sedikit darah yang disebut lochia yang berasal dari sisa – sisa jaringan. Pada beberapa keadaan, pengeluaran darah setelah proses kelahiran menjadi banyak. Ini disebabkan beberapa faktor seperti lemahnya kontraksi atau tidak berkontraksi otot-otot rahim. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan sehingga jika pendarahan semakin hebat, dapat dilakukan tindakan secepatnya.

6. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan

a. *Passage* (Jalan Lahir)

Passage merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin, yang terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, *serviks*, dan vagina.

b. *Power* (HIS dan mengejan)

Kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan adalah his, kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligament

1) His (Kontraksi uterus)

His adalah gelombang kontraksi ritmis otot polos dinding uterus yang dimulai dari daerah fundus uteri dimana tubafalopi memasuki dinding uterus, awal gelombang tersebut didapat dari “*pacemaker*” yang terdapat dari dinding uterus daerah tersebut.

Pada waktu berkontraksi, otot-otot rahim menguncup sehingga menjadi menebal dan lebih pendek. *cafum uteri* menjadi lebih kecil serta mendorong janin dan kantong amnion kearah segmen bawah rahim dan *serviks*. His atau Kontraksi memiliki sifat *Involutir, intermiten*, terasa sakit, terkoordinasi serta kadang dipengaruhi oleh fisik, kimia, dan psikis.

a) Perubahan – perubahan akibat his yaitu:

(1) Pada uterus dan *serviks*: uterus terasa keras/padat karena kontraksi.

Tekanan *hidrostatik* air ketuban dan tekanan *intrauteri* naik serta menyebabkan servik menjadi mendatar (*affecement*) dan terbuka (*diltasi*).

(2) Pada ibu : rasa nyeri karena kurangnya aliran darah yang dapat menyebabkan perubahan fungsional pada sel normal (*iskemia*) rahim dan kontraksi uterus. Juga ada kenaikan nadi dan tekanan darah.

(3) Pada janin: pertukaran oksigen pada sirkulasi uteroplacenta kurang, maka timbul *hipkosis* janin. Denyut jantung janin melambat kurang jelas didengar karena adanya *iskemia fisiologis*, jika benar-benar

terjadi *hipkosis* janin yang agak lama, misalnya pada kontraksi *tetanic*, maka terjadi gawat janin *asfiksia* dengan denyut jantung janin di atas 160 per menit tidak teratur.

b). Pembagian his:

(1) His palsu atau pendahuluan

(a) His tidak kuat, tidak teratur

(b) Dilatasi servik tidak terjadi

(2) His Pembukaan kala I

(a) His pembukaan *servik* sampai terjadi pembukaaan lengkap yaitu 10 cm

(b) Mulai makin teratur dan sakit

(3) His pengeluaran atau his mengejan (Kala II)

(a) Sangat kuat, teratur, simteris, terkoordinasi dan lama

(b) His untuk mengeluarkan janin

(c) Koordinasi bersama antara his kontraksi otot perut, kontraksi *diafragma* dan *ligament*.

(4) His pelepasan uri (kala III)

Kontraksi sedang untuk melepaskan dan melahirkan plasenta

(5) His pengiring (kala IV)

Kontraksi lemah, masih sedikit nyeri (meriang) adanya pengecilan rahim dalam beberapa jam atau hari.

2) Mengejan

Dalam proses persalinan normal ada 3 komponen yang amat menentukan, yakni *passenger*(janin), *passage*(jalan lahir) dan *power* (konterksi). Agar proses peersalinan berjalan lancar, ketiga komponen tersebut harus sama-sama kondisi baik. Bayi yang ukurannya tidak terlalu besar pasti lebih mudah melalui jalan lahir normal, jalan lahir yang baik akan memudahkan bayi akan keluar, kekuatan ibu mengejan akan mendorong bayi cepat keluar.

Yang pegang kendali atau yang paling memudahkan dalam tahapan ini adalah proses mengejan ibu yang dilakukan dengan benar. Baik dari segi kekuatan maupun keteraturan. Ibu harus mengejan sekuat mungkin seiring dengan instruksi yang diberikan. Biasanya Ibu diminta menarik nafas panjang dalam beberapa kali saat kontraksi terjadi lalu buang secara perlahan. Ketika kontraksi mencapai puncaknya, doronglah janin dengan mengejan sekuat mungkin. Bila ibu mengikuti intruksi dengan baik, pecahnya pembuluh darah sekitar mata dan wajah bisa dihindari. Begitu juga resiko berkurangnya suplai oksigen kejanin. Jadi yang harus dilakukan:

- a) Mulai trimester dua sempatkan mengikuti senam hamil. Ini akan sangat membantu dalam melemaskan otot panggul, menguatkan nafas, mengejan dan sebagainya yang amat diperlukan saat persalinan tiba.

- b) Usahakan jangan tegang, tetapi tetapkan *rileks* dengan melemaskan seluruh otot tubuh. Ketegangan hanya akan menyulitkan disaat ibu harus mengejan.
- c) Jangan panik. Ikuti saja instruksi dengan baik. Kepanikan hanya akan membuat segalanya kacau karena dorongan jadi tidak teratur sementara tenaga terhambur sia-sia dan tidak efisien karena bayi akan lebih susah lahir.

Jika ibu tidak pintar mengejan maka ibu harus disesar. Meski sangat ingin, banyak ibu hamil yang tidak bisa menjalani persalinan normal hingga harus dibantu dengan operasi sesar. Ada beberapa alasan medis yang membuat ibu terpaksa menjalani operasi sesar yaitu karenakelainan *power* atau tenaganya. Sangat mungkin ibu hamil tidak memiliki cukup *power* untuk mengejan. Ini biasanya dialami oleh ibu-ibu hamil yang sakit jantung atau asma yang membuat kemampuan mengejanya sedemikian lemah. Bisa juga akibat pengaruh dari penyakit lain.

c. *Paseenger (penumpang)*

1) Janin

Selama janin dan plasenta berada dalam rahim belum tentu pertumbuhannya normal, adanya kelainan genetik dan kebiasaan ibu yang buruk dapat menjadikan pertumbuhannya tidak normal. Kelainan-kelainan yang bisa saja terjadi adalah sebagai berikut:

- a) Kelainan bentuk dan besar janin. Seperti sebagian besar tulang tengkorak dan otak tidak terbentuk (*anensefalus*), penumpukan cairan pada rongga otak (*hidrosefalus*), dan janin besar (*makrosomia*).
- b) Kelainan pada letak kepala, seperti persentasi puncak, presentasi muka, presentasi dahi dan kelainan letak belakang kepala dimana tidak memutarnya ubun-ubun kecil kearah jam 12, namun tetap berada dibelakang yaitu pada arah jam 6 (*oksiput*).
- c) Kelainan letak janin seperti letak sungsang, letak lintang, letak mengelak, presentasi rangkap (kepala tangan, kepala kaki, kepala tali pusat).
- d) Kepala janin merupakan bagian penting dalam proses persalinan dan memiliki ciri khas seperti:
- (1) Bentuk kepala oval, sehingga setelah bagian besar lahir, maka bagian lainnya lebih mudah lahir.
 - (2) Persendian kepala berbentuk *kogel*, sehingga dapat digerakkan kesegala arah dan memberikan kemungkinan untuk melakukan putaran paksi dalam.
 - (3) Letak persendian kepala sedikit kebelakang, sehingga kepala melakukan fleksi untuk putaran paksi dalam.

2) Plasenta

Plasenta adalah organ yang terbentuk dari jaringan pembuluh darah dan menghubungkan janin yang sedang berkembang dengan dinding rahim sehingga janin dapat menerima nutrisi, pertukaran gas melalui asupan darah ibu, pertahanan melawan infeksi, dan memproduksi hormon yang dapat menyokong kehamilan (*HCG*). Plasenta berbentuk bundar atau oval, dengan ukuran diameter 15-20cm, tebal 2-3cm, berat 500-600gram.

Pelepasan plasenta ini terjadi dalam *stratum spongiosum* yang sangat banyak lubang-lubangnya. Jadi secara singkat faktor yang sangat penting dalam pelepasan plasenta ialah *retraksi* dan kontraksi otot-otot rahim setelah anak lahir. Ditempat plasenta lepas terjadi pendarahan antara plasenta, desiduasalis dan arena hematoma, maka seolah-olah plasenta terangkat dari dasarnya oleh hematoma tersebut sehingga didaerah pelepasan terjadi perdarahan. Plasenta biasanya terlepas dalam 4-5 menit setelah anak lahir.

3) Air ketuban

Sebagai cairan pelindung dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, air ketuban berfungsi sebagai 'bantalan' untuk melindungi janin terhadap trauma dari luar. Tak hanya itu saja, air ketuban juga berfungsi melindungi janin dari infeksi, menstabilkan perubahan suhu. Dan menjadi sarana yang memungkinkan janin

bergerak bebas. Seiring dengan penambahan usia kehamilan, Tubuh janin juga mempengaruhi cairan ketuban. Saat usia kehamilan mulai memasuki 25 minggu, rata-rata air ketuban didalam rahim 239 ml, yang kemudian meningkat menjadi 984ml pada usia kehamilan 33 minggu.

Kelebihan air ketuban dapat berdampak pada kondisi janin. Untuk menjaga kestabilan air ketuban, bayi meminum air ketuban didalam tubuh ibunya dan kemudian mengeluarkannya dalam bentuk kencing. Jika terdapat volume air ketuban yang berlebih, diprediksi terdapat gangguan pencernaan atau gangguan pada saluran pembuangan sang bayi yang ditandai dengan kencingnya yang tidak normal.

Kekurangan cairan ketuban bisa disebabkan berbagai hal, di antaranya menurunkan fungsi plasenta akibat kehamilan yang melebihi waktu, ketuban yang bocor atau kelainan janin yang berhubungan dengan penyumbatan kandung kemih. Sedangkan Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban pada setiap saat sebelum permulaan persalinan tanpa memandang apakah pecahnya selaput ketuban terjadi pada kehamilan 24 atau 44 minggu.

7. Mekanisme Persalinan

Mekanisme persalinan mengacu pada serangkaian perubahan posisi dan sikap yang diambil janin selama perjalanannya melalui jalan lahir. Hubungan kepala dan tubuh janin dengan panggul ibu berubah saat janin turun melalui

panggul. Hal ini sangat penting sehingga diameter optimal tengkorak janin ada pada setiap kala penurunan.

a. Engagement(Penurunan kepala)

Penurunan kepala janin kedalam pelvis biasanya dimulai sebelum persalinan dimulai. Janin ibu primipara biasanya turun ke dalam pelvis selama minggu terakhir kehamilan sedangkan pada multigravida , tonus otot biasanya lebih lemah dan dengan demikian *engagement* tidak terjadi hingga persalinan benar-benar dimulai. Kepala biasanya masuk ke panggul pada posisi transversal atau pada beberapa posisi yang sedikit berbeda dari posisi ini sehingga memanfaatkan diameter terluas panggul. *Engagement* dikatakan terjadi ketika bagian terluas dari bagian persentasi janin berhasil masuk ke pintu atas panggul.

Kepala janin yang dapat di palpasi melalui abdomen sering digunakan untuk menggambarkan apakah engagement telah terjadi. Jika lebih dari dua perlima kepala janin dapat dipalpasi melalui abdomen, maka kepala belum *engaged*.

b. Penurunan

Selama kala satu persalinan, kontraksi dan retraksi otot uterus memberikan tekanan pada janin untuk turun. Proses ini dipercepat dengan pecah ketuban dan upaya ibu untuk mengejan.

c. Fleksi

Ketika kepala janin turun menuju rongga tengah panggul yang sempit, maka *fleksi* akan meningkat. Dengan majunya kepala biasanya *fleksi* juga bertambah. Pada pergerakan ini dagu dibawah lebih dekat ke arah dada janin sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Hal ini disebabkan karena adanya tahanan dari dinding *serviks*, dinding *pelvis*, dan lantai *pelvis*. *Fleksi* ini disebabkan karena janin didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari *serviks*, dinding panggul, atau dasar panggul.

d. Rotasi internal kepala

Rotasi internal kepala atau sering dikatakan putaran paksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai dibawah *simpisis*. Bila presentasi belakang kepala dimana bagian terendah janin adalah ubun-ubun kecil maka ubun-ubun kecil memutar ke depan sampai berada di bawah *simpisis*. Gerakan ini adalah upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir yaitu bentuk bidan tengah dan pintu bawah panggul. Rotasi paksi dalam terjadi bersamaan dengan majunya kepala. Rotasi ini terjadi setelah kepala melewati *hodge III* (setinggi *spina*) atau setelah didasar panggul. Pada pemeriksaan dalam, ubun-ubun kecil mengarah ke jam 12.

e. Ekstensi

Setelah rotasi internal selesai, *oksiput* berada di bawah *simfisis pubis* dan ubun-ubun besar berada dekat batas bawah *sacrum*. Kepala *fleski* yang sempurna kini mengalami *ekstensi*, dengan *oksiput* keluar dari bawah *simfisis pubis* dan mulai mendistensi vulva. Hal ini dikenal sebagai *crowning* kepala. Karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan atas, sehingga kepala menyesuaikan dengan cara *ekstensi* agar dapat melaluinya. Pada saat kepala janin mencapai dasar panggul tidak langsung terekstensi, akan tetapi terus didorong kebawah sehingga mendesak ke jaringan *perineum*. Gerakan *ekstensi* ini mengakibatkan bertambahnya penegangan pada *perineum* dan *introitus vagina*. Ubun-ubun kecil semakin banyak terlihat dan sebagai *hypomochlion* atau pusat pergerakan maka berangsur-angsur lahirnya ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Pada saat kepala sudah lahir seluruhnya, dagu bayi berada diatas anus ibu.

f. Restitusi

Restitusi adalah lepasnya putaran kepala janin, yang terjadi akibat rotasi internal. *Resitusi* adalah sedikit rotasi oksiput melalui seperdelapan lingkaran. Saat kepala dilahirkan, oksiput secara langsung berada di bagian depan. Segera setelah kepala keluar dari vulva, kepala mensejajarkan dirinya sendiri dengan bahu, yang memasuki panggul dalam posisi oblik (miring)

g. Rotasi eksternal(Putaran paksi luar)

Agar dapat dilahirkan, bahu harus berotasi ke bidang anterior-posterior, diameter terluas pada pintu bawah panggul. Saat ini terjadi, oksiput berotasi melalui seperdelapan lingkaran lebih lanjut ke posisi transversal. Gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin, bagian belakang kepala berhadapan dengan *tuber ishiadikum* kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Bila ubun-ubun kecil pada mulanya disebelah kiri, maka ubun-ubun kecil akan berputar ke arah kiri, bila pada mulanya ubun-ubun kecil disebelah kanan maka ubun-ubun kecil berputar ke kanan. Gerakan rotasi luar atau putaran paksi luar ini menjadikan diameter *biakromial* janin searah dengan diameter *antero-posterior* pintu bawah panggul, Dimana satu bahu di anterior dibelakang *simpisis* dan bahu yang satunya di bagian *posterior* dibelakang *perineum, sutura sagitalis*, kembali melintang.

h. Pelahiran bahu dan tubuh janin (Ekspulsi)

Ketika resistensi dan rotasi eksternal terjadi, bahu akan berada dalam bidang *anterior-posterior*. Bahu *anterior* berada dibawah *simpisis pubis* dan lahir pertama kali, dan bahu *posterior* lahir berikutnya. Setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai *hypomochlion* untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian setelah kedua bahu lahir di susul lahirlah *trochanter* (paha) *anterior* dan *posterior* sampai janin lahir seluruhnya. Meskipun proses ini dapat terjadi tanpa bantuan, sering kali "*traksi lateral*" dilakukan dengan

menarik kepala secara perlahan ke arah bawah untuk membantu melepaskan bahu *anterior* dari bawah *simfisis pubis*.

B. Tinjauan Khusus Tentang Ketuban Pecah Dini

1. Pengertian Ketuban Pecah Dini

Ketuban adalah kantong berisi cairan yang berada dalam rahim yang memiliki fungsi utama yakni melindungi bayi dari tekanan dan pukulan, melindungi dari infeksi, memberi makan bayi dan membantu perkembangan sistem paru-paru dan pencernaan, serta menjaga suhu tubuh. Sedangkan Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah pecahnya ketuban sebelum waktu melahirkan yang terjadi pada saat akhir kehamilan maupun jauh sebelumnya. KPD merupakan pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda-tanda persalinan mulai dan ditunggu satu jam belum terjadi inpartu. KPD merupakan salah satu faktor risiko terjadinya *sepsis neonatal*. *Sepsis neonatorum* sering di hubungkan dengan KPD karena infeksi dengan KPD saling mempengaruhi. Infeksi genetalian pada ibu hamil dapat menyebabkan KPD, demikian pula KPD dapat memudahkan infeksi *ascendens* pada bayi (Indrawan dan Danny, 2012).

KPD (*Premature Rupture of Membrane*) adalah robeknya membran fetus sebelum terjadinya proses persalinan setelah ≥ 37 minggu kehamilan. Sebagian KPD terjadi pada kehamilan aterm lebih dari 37 minggu sedangkan kurang dari 36 minggu tidak terlalu banyak. KPD dapat terjadi sebelum 37 minggu kehamilan dan bisa disebut dengan KPD prematur (*Preterm*

Premature Rupture of Membrane). Sedangkan Ketuban pecah selama persalinan secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang, keseimbangan antara *sintesis* dan *degradasi ekstraseluler matriks*, perubahan struktur, jumlah sel, dan *katabolisme kolagen* menyebabkan aktivitas *kolagen* berubah. Pecahnya selaput ketuban yang berfungsi melindungi atau menjadi pembatas dunia luar dan ruangan dalam rahim pecah dan mengeluarkan air ketuban menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan ruangan dalam rahim yang memudahkan terjadinya *infeksi asenden*. Semakin lama periode laten maka semakin besar kemungkinan infeksi dalam rahim, persalinan prematur dan selanjutnya meningkatkan kejadian kesakitan dan kematian ibu dan janin dalam rahim.

2. Faktor-faktor Penyebab Ketuban Pecah Dini

Penyebab KPD masih belum diketahui dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Beberapa laporan menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan erat dengan KPD, namun faktor-faktor mana yang lebih berperan sulit diketahui. Kemungkinan yang menjadi faktor predisposisi adalah infeksi. Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban maupun infeksi pada cairan ketuban bisa menyebabkan terjadinya Ketuban Pecah Dini (KPD) (Norma & Dwi, 2013).

Faktor predisposisi KPD adalah infeksi genetalia, serviks inkompeten, gemelli, preterm, dan *disproporsi sefalo pelvik* (icesmi sukarni dan margareth, 2013). KPD secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan

berulang. Selaput ketuban pecah karena di daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior menjadi rapuh. Perubahan struktur, jumlah sel, dan katabolisme kolagen menyebabkan aktivitas kolagen berubah dan menyebabkan selaput ketuban pecah (M. Irsam dkk, 2014).

KPD juga mungkin terjadi akibat kondisi serviks yang inkompeten. Serviks tidak mampu mempertahankan kehamilan sehingga selaput ketuban menonjol keluar dari serviks dan dapat ruptur. Selanjutnya, faktor presentasi dan letak janin juga diduga berperan dalam terjadinya KPD, hal ini terjadi karena tekanan terhadap selaput ketuban menjadi tidak merata jika janin tidak dalam presentasi kepala (Maryunani,2013). KPD diakibatkan oleh selaput ketuban yang tidak kuat sebagai akibat kurangnya jaringan ikat dan vaskularisasi (Lestar,2013). Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya ketuban pecah dini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *hipermotilitas* rahim yang sudah lama terjadi sebelum ketuban pecah. Mengundang penyakit *pielonefritis*, *sistitis*, *sevisitis*, dan *vaginitis* terdapat bersama-sama dengan *hepermotilitas* rahim ini.
- b. Selaput ketuban terlalu tipis (kelainan ketuban)
- c. Infeksi (*amnionitis* atau *koriamnionitis*)
- d. Faktor-faktor lain yang merupakan *predisposisi* ialah: *malposisi*, *multipara*, *disproporsi*, *cervic incometen*, dan lain-lain.
- e. KPD *artifisial* (*amniotomi*) dimana ketuban dipecahkan terlalu dini.

- f. Faktor golongan darah. Akibat golongan darah ibu dan anak yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelemahan bawaan termasuk kelemahan jaringan kulit ketuban.
- g. Faktor *disproporsi* antar kepala janin dan panggul ibu.
- h. Faktor *multi graviditas*, merokok dan perdarahan antepartum.
- i. *Defisiensi* gizi dari tembaga atau *asam askorbat* (Vitamin C)

KPD juga mungkin terjadi akibat kondisi *serviks* yang inkompeten. *Serviks* tidak mampu mempertahankan kehamilan sehingga selaput ketuban menonjol keluar dari *serviks* dan dapat ruptur. Selanjutnya, faktor presentasi dan letak janin juga diduga berperan dalam terjadinya ketuban pecah dini, hal ini terjadi karena tekanan terhadap selaput ketuban menjadi tidak merata jika janin tidak dalam presentasi kepala (Maryunani,2013).

Berbagai faktor risiko yang berhubungan dengan timbulnya KPD. Ras kulit hitam cenderung memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Pasien dengan status sosial ekonomi rendah, perokok, riwayat penyakit menular seksual, riwayat persalinan preterm sebelumnya, perdarahan pervaginam atau *distensi uteri* (misal *polihidramnion* dan *gemelli*) memiliki risiko tinggi. Tindakan prosedural seperti *amniosentesis* juga dapat memicu KPD. KPD dapat mempengaruhi keadaan ibu dan janin, pengaruh KPD pada ibu antara lain: infeksi *intranatal*, infeksi *puerperalis*, partus lama, perdarahan *post partum*, meningkatkan tindakan *operatif obstetric* serta *morbiditas* dan *mortalitas* maternal. Pada janin dapat terjadi *prematunitas*, *prolaps funiculli*,

hipoksia dan *asfiksia*, *morbiditas* dan *mortalitas* janin (Feryanto, 2012). Beberapa faktor risiko yang memicu terjadinya ketuban pecah dini ialah :

- a. Kehamilan multiple: kembar dua (50%) , kembar tiga (90 %).
- b. Riwayat persalinan preterm sebelumnya: risiko 2-4x
- c. Tindakan senggama: tidak berpengaruh kepada resiko, kecuali jika *hygiene* buruk, predisposisi terhadap infeksi.
- d. perdarahan pervaginam: trimester pertama (risiko 2x), trimester kedua/ketiga (20x)
- e. *Bakteriuria* : risiko 2x (prevalensi 7 %)
- f. PH vagina di atas 4,5 : risiko 32% (vs. 16%)
- g. *Servix* tipis / kurang dari 39 mm : risiko 25% (vs 7%)
- h. *Flora vagina abnormal* : risiko 2-3x
- i. *Fibronectin* > 50 mg/ml : risiko 83% (vs 19%)
- j. Kadar CRH (*corticotropin releasing hormone*) maternal tinggi misalnya pada stress psikologis yang dapat menjadi stimulasi persalinan preterm.

3. Tanda dan gejala Ketuban Pecah Dini

Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau manis dan tidak seperti bau *amoniak*, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes, dengan ciri pucat dan bergaris warna darah. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran. Tetapi bila ibu duduk atau berdiri, kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya “menganjal” atau

“menyumbat” kebocoran untuk sementara. (Nita Norma dan Mustika Dwi, 248:2013)

Menurut Rustam Mochtar (edisi 3: 2013) kadang-kadang agak sulit atau meragukan apakah ketuban benar sudah pecah atau belum, apalagi bila pembukaan *kanalis servikalis* belum ada atau kecil. Adapun cara menentukannya adalah dengan:

- a. Memeriksa adanya cairan yang berisi *mekonium*, *verniks kaseosa*, *rambut lanugo*, atau bila telah terinfeksi berbau.
- b. *Inspekulo*: lihat dan perhatikan apakah memang air ketuban keluar dari *kanalis servikalis* dan apakah ada bagian yang sudah pecah.
- c. Gunakan kertas lakmus
 - 1). Bila menjadi biru (basa) berarti air ketuban.
 - 2). Bila menjadi merah (asam) berarti air kemih (urin)
- d. Dilakukan tes valsava (pembuangan napas / ekspirasi paksa dengan menutup bibir dan hidung),

4. **Diagnosis Ketuban Pecah Dini**

Menegakkan diagnosa KPD secara tepat sangat penting. Karena diagnosa yang positif palsu berarti melakukan intervensi seperti melahirkan bayi terlalu awal atau melakukan *seksio* yang sebetulnya tidak ada indikasinya. Sebaliknya diagnosa yang negatif palsu mempunyai risiko infeksi yang akan mengancam kehidupan janin, ibu atau kedua'nya. Oleh

karena itu diperlukan diagnosa yang cepat dan tepat. Diagnosa KPD ditegakkan dengan cara:

a. Anamnesa

Penderita merasa basah pada vagina, atau mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba dari jalan lahir. Cairan berbau khas, dan perlu juga diperhatikan warna, keluaranya cairan tersebut his belum teratur atau belum ada, dan belum adaa pengeluaran lender darah (Norma-Dwi, 2013).

b. Inspeksi

Pengamatan dengan mata biasa akan tampak keluaranya cairan dari vagina, bila ketuban baru pecah dan jumlah air ketuban masih banyak, pemeriksaan ini akan lebih banyak. (Norma-Dwi, 2013)

c. Pemeriksaan dengan *Spekulum*

Pemeriksaan dengan *spekulum* pada KPD akan tampak keluar cairan dari *Orifisium Uteri Eksternum* (OUE), kalau belum juga tampak keluar, fundus uteri ditekan penderita diminta batuk, mengejan atau mengadakan *manuver valsava*, atau bagian terendah digoyangkan, akan tampak keluar cairan dari *ostium uteri* dan terkumpul pada *forniks anterior* (Norma-Dwi, 2013).

d. Pemeriksaan dalam didapat cairan di dalam vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada lagi.

Mengenai pemeriksaan dalam vagina perlu dipertimbangkan, pada kehamilan yang kurang bulan yang belum dalam persalinan tidak perlu diadakan pemeriksaan dalam. Karena pada waktu pemeriksaan dalam, jari pemeriksa akan mengakumulasi segmen bawah rahim dengan flora vagina yang normal. *Mikroorganisme* tersebut bisa dengan cepat menjadi *pathogen*. Pemeriksaan dalam vagina hanya dilakukan kalau KPD yang sudah dalam persalinan atau yang dilakukan induksi persalinan dan dibatasi sedikit mungkin (Norma-Dwi, 2013).

5. Prognosis atau komplikasi Ketuban Pecah Dini

Komplikasi paling sering terjadi pada KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu adalah *sindrom distress* pernapasan, yang terjadi pada 10-40% bayi baru lahir. Resiko infeksi meningkat pada kejadian KPD. Semua ibu hamil dengan KPD premature sebaiknya dievaluasi untuk kemungkinan terjadinya *korioamnionitis* (radang pada *korion* dan *amnion*). Selain itu kejadian *prolaps* atau keluarnya tali pusat dapat terjadi pada KPD (Norma-Dwi, 2013).

6. Penanganan Ketuban Pecah Dini


Ketuban pecah dini termasuk dalam kehamilan berisiko tinggi. Kesalahandalam mengelola KPD akan membawa akibat meningkatnya angka *morbiditas* dan *mortalitas* ibu maupun bayinya. Kebanyakan penulis sepakat mengambil 2 faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sikap atau tindakan terhadap penderita KPD yaitu umur kehamilan dan ada tidaknya tanda-tanda infeksi pada ibu (Norma-Dwi, 2013, 251).

Langkah yang harus diambil untuk penanganan KPD diantaranya (Prawirahardjo, 2014,679) adalah sebagai berikut:

- a. Pastikan diagnosis
- b. Tentukan umur kehamilan
- c. Evaluasi ada tidaknya infeksi maternal ataupun infeksi janin
- d. Apakah dalam keadaan inpartu, terdapat kegawatan janin

Rawat di rumah sakit, berikan anti biotik (*ampisilin* 4 x 500 mg atau *eritromisin* bila tidak tahan *ampisilin* dan *metronidazole* 2 x 500 mg selama 7 hari . Jika umur kehamilan <32-34 minggu, dirawat selama air ketuban masih keluar, atau sampai air ketuban tidak lagi keluar, jika usia kehamilan 32–37 minggu, belum inpartu, tidak ada infeksi, tes busa negatif beri *deksametason*, observasi tanda-tanda infeksi, dan kesejahteraan janin. Terminasi pada kehamilan 37 minggu. Jika usia kehamilan 32–37 minggu, sudah inpartu, tidak ada infeksi, berikan *tokolitik (salbutamol)*,*deksametason*, dan induksi sesudah 24 jam. Jika usia kehamilan 32–37 minggu, ada infeksi, beri antibiotik dan lakukan induksi, nilai tanda-tanda infeksi (suhu, *leukosit*, tanda-tanda infeksi *intrauterine*). Pada usia kehamilan 32–37 minggu berikan *steroid* untuk memacu kematangan paru janin, dan bila memungkinkan periksa kadar *lesitin* dan *spingomielin* tiap minggu. *Disis betametason* 12 mg sehari dosis tunggal selama 2 hari, *deksametason* 5 mg setiap 6 jam sebanyak 4 kali (Prawirohardjo:68, 2014).

Bagan Penatalaksanaan Persalinan Ketuban Pecah Dini



C. Gawat Janin dalam Persalinan

Gawat janin adalah jika denyut jantung janin (DJJ) kurang dari 120 permenit atau lebih dari 160 permenit dan air ketuban hijau kental. Gawat janin terjadi apabila janin tidak menerima cukup oksigen, sehingga mengalami *hipoksia*. Situasi ini dapat terjadi kronik (jangka waktu lama), atau akut selama persalinan menunjukkan *hipoksia* (kurang oksigen) pada janin. DJJ normal, dapat melambat sewaktu his, dan segera kembali normal setelah relaksasi. DJJ lambat (kurang dari 120 per menit), saat tidak ada his, menunjukkan adanya gawat janin. DJJ cepat (lebih dari 160 per menit) yang disertai *takikardi* ibu, dapat karena ibu demam, efek obat, *hipertensi* atau *amnionitis*. Jika denyut jantung ibu normal, denyut jantung yang cepat sebaiknya dianggap sebagai gawat jantung.

1. Penyebab gawat janin

- a. Partus lama
- b. *Infus oksitosin*
- c. Perdarahan
- d. Infeksi
- e. *Insufisiensi plasenta*
- f. Ibu diabetes
- g. Kehamilan pre Posterm atau prolapsus tali pusat

2. **Diagnosis gawat janin**

Diagnosis gawat janin saat persalinan didasarkan pada denyut jantung janin yang abnormal. Diagnosis lebih pasti jika disertai air ketuban hijau dan kental/sedikit.

3. **Penyebab gawat janin (DJJ) abnormal**

- a. Adanya *mekonium* pada cairan ketuban lebih sering terlihat saat janin mencapai maturitas dan dengan sendirinya bukan merupakan tanda-tanda gawat janin. Sedikit *mekonium* tanpa dibarengi dengan kelainan ada denyut jantung janin merupakan suatu peringatan untuk pengawasan lebih amnion yang berkurang dan merupakan indikasi perlunya persalinan yang lebih cepat dan penanganan *mekonium* pada saluran nafas atas neonatus untuk mencegah aspirasi *mekonium* lanjut.
- b. *Mekonium* kental merupakan tanda pengeluaran *mekonium* pada cairan
- c. Pada presentasi sungsang, *mekonium* dikeluarkan pada saat persalinan akibat kompresi abdomen janin pada persalinan. Hal ini bukan merupakan tanda kegawatan kecuali jika hal ini terjadi pada awal persalinan.

4. **Penanganan gawat janin**

- a. Umum
 - 1) Pasien dibaringkan miring ke kiri
 - 2) Berikan oksigen
 - 3) Hentikan *infuse oksitosin* (jika sedang diberikan).

b. Khusus :

Jika DJJ diketahu tidak normal, dengan atau tanpa kontaminasi *mekonium* pada cairan *amnion*, lakukan hal seperti berikut:

- 1) Jika sebab dari ibu diketahui (seperti demam, obat-obatan) mulailah penanganan yang sesuai.
- 2) Jika sebab dari ibu tidak diketahui dan denyut jantung janin tetap abnormal sepanjang paling sedikit 3 kontraksi, lakukan pemeriksaan dalam untuk mencari penyebab gawat janin:
 - a) Jika terdapat pendarahan dengan nyeri yang hilang timbul atau menetap, pikirkan kemungkinan *solusio plasenta*.
 - b) Jika terdapat tanda-tanda infeksi (demam, *secret*, vagina berbau tajam) berikan *antibiotic* untuk *amnionitis*
 - c) Jika tali pusat terletak di bawah bagian bawah janin atau dalam vagina, lakukan penanganan *prolaps* tali pusat.
 - d) Jika denyut jantung janin tetap abnormal atau jika terdapat tanda-tanda lain gawat janin (*meconium* kental pada cairan *amnion*), rencanakan persalinan.
 - e) Jika *servik* setelah berdilatasi dan kepala janin tidak lebih dari 1/5 diatas *simfisis pubis* atau bagian teratas tulang kepala janin pada stasion 0, lakukan persalinan dengan *ekstraksivakum*.

f) Jika *serviks* tidak berdilaktasi penuh dan kepala janin berada lebih dari 1/5 di atas *simfisi pubis* atau bagian teratas tulang kepala janin berada di atas stasion 0, lakukan persalinan dengan *seksio sesarea*.

D. Tinjauan Asuhan Kebidanan dengan ketuban pecah dini di sertai gawat janin

1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan–penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Varney, 2012).

Manajemen kebidanan adalah metode yang digunakan oleh bidan dalam menentukan dan mencari langkah–langkah pemecahan masalah serta melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasiennya dari gangguan kesehatan.

Langkah–langkah asuhan kebidanan menurut Varney (1997) yaitu:

a. Langkah I : Pengumpulan data dasar

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien yang meminta asuhan. Teknik pengumpulan data adadiga yaitu, Observasi, Wawancara dan Pemeriksaan. Secara garis besar diklasifikasikan sebagai data subyektif dan data obyektif.

Untuk memperoleh data dilakukan :

Anamnesa meliputi : melakukan tanya jawab kepada ibu untuk memperoleh data meliputi riwayat kesehatan, riwayat reproduksi, riwayataid, riwayat obstetrik, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi.

Berdasarkan anamnesa didapatkan data subjektif, yakni Ibu datang dengan keluhan nyeri perut tembus belakang yang disertai dengan pelepasan lendir, darah, dan air ketuban serta ada dorongan untuk meneran dengan umur kehamilan 39 minggu yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi umum, keadaan sosial ekonomi rendah, kurang gizi, anemia, perokok berat serta faktor umur. Pada kasus persalinan dengan kejadian KPD didapatkan data subjektif ibu datang dengan keluhan keluarnya air seperti urine dengan aroma air ketuban berbau amis yang memiliki ciri-ciri khas disertai nyeri perut semakin mules yang dapat dinilai bahwa hal tersebut mengarah ke ketuban pecah dini. Untuk menentukan kepastian air ketuban dengan dilakukan tes *lakmus*. Bukan hanya itu saja, akan tetapi bisa dilakukan dengan pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) yang merupakan suatu metode diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempelajari morfologi dan fungsi suatu organ.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis khususnya pada kasus ketuban pecah dini disertai gawat janin. Pada pemeriksaan USG jika didapatkan penurunan indeks cairan amnion tanpa adanya kecurigaan kelainan ginjal bisa jadi mengarah pada kemungkinan Ketuban Pecah Dini (KPD),

Data subjektif yang didapatkan pada ibu dengan KPD disertai gawat janin adalah ibu mengeluh sering buang air kecil dan adanya pengeluaran lendir, darah dan air dari jalan lahirnya. Serta gerakan janinnya melemah tidak seperti biasanya.

b. Langkah II : Interpretasi Diagnosa dan Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atau data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasi sehingga dapat menemukan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan masalah dan diagnosa keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis melainkan tetap membutuhkan penanganan.

Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina. Begitu juga pada saat pemeriksaan dalam, didapatkan cairan dan selaput ketuban sudah tidak ada lagi. Dan pada auskultasi DJJ didapatkan abnormal.

c. Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau Masalah Potensial

Pada langkah ini mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman serta bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila masalah atau diagnosa potensial ini benar-benar terjadi.

Pada kasus ketuban pecahsebelum waktunya bisa menimbulkan komplikasi infeksi maternal maupun neonatal, persalinan prematur, *hipoksia*, *deformitas janin*, partus lama, infeksi pada masa nifas, serta meningkatkan kejadian seksio caesarea. Hal ini terjadi karena kurangnya air ketuban bisa menekan pada tali pusat sehingga terjadi hipoksia pada janin, kompresi muka dan anggota badan janin, serta terbukanya jalan masuk infeksi sehingga hormon prostaglandin merangsang kontraksi uterus. Masalah lain yang bisa terjadi yaitu perdarahan postpartum yang disebabkan oleh lain hal seperti setelah bayi dan plasenta lahir terjadi perdarahan yang masih aktif.

d. Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera

Beberapa data yang menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data yang

menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pada pasien yang paling tepat.

Dalam persalinan dengan KPD di sertai gawat janin diperlukan kolaborasi dengan dokter kandungan untukantisipasi terjadinya komplikasi terhadap ibu yaitu dengan pemberian antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi intrapartum, pemberian *kortikosteroid* untuk pematangan paru dan penanganan perdarahan postpartum berupa pemasangan infus dan transfusi darah serta pemberian obat *oksitosik*. Dan jika didapatkan persalinan ketuban pecah dini yang disertai gawat janin maka perlu dilakukan evaluasi dengan hati-hati untuk menentukan waktu yang optimal untuk persalinan karena yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sikap atau tindakan dalam ketuban pecah dini adalah karena adanya gawat janin.

Selain kolaborasi dengan dokter kandungan dalam persalinan KPD disertai gawat janin juga perlu dilakukan kolaborasi dengan dokter anak. Untuk memberikan pertolongan pertama pada bayi baru lahir. Penyediaan O₂, *suction*, *infant warmer* dan persiapan incubator serta obat-obat.

e. Langkah V : Merencanakan Asuhan yang Komprehensif/Menyeluruh

Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnose atau masalah yang telah diidentifikasi atau antisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dilengkapi. Pada langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Suatu rencana asuhan harus sama-sama disetujui oleh bidan maupun pasien agar efektif, karena pada akhirnya pasien yang akan menentukan apakah tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu pada langkah ini diperlukan diskusi antara tenaga kesehatan dengan pasien mengenai semua rencana tindakan termasuk penegasan dan persetujuan.

Merencanakan pemantauan DJJ, nadi, dan his tiap 30 menit. Memastikan DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit), Nadi (60-100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat. Perencanaan asuhan persalinan normal sesuai dengan APN. Merencanakan penanganan bayi baru lahir dengan cara bebaskan jalan napas, mengeringkan bayi, mencegah *hipotermi* dan mencegah infeksi, serta penyediaan suction, O₂, Infant warmer dan incubator untuk persiapan kemungkinan akan terjadi pada bayi baru lahir yang asfiksia.

Jika didapatkan persalinan ibu inpartu dengan ketuban pecah dini yang disertai dengan infeksi jalan lahir dan gawat janin maka berikan antibiotik, batasi pemeriksaan dalam, lakukan observasi tanda indikasi dan

fetal distress. Akan tetapi jika ada kontraindikasi maka persalinan berakhir dengan *seksio caesarea*.

Demikian juga halnya jika didapatkan Jika DJJ abnormal maka lakukan observasi. Dan jika usia kehamilan aterm tanpa ada indikasi lakukan persalinan pervaginam, akan tetapi jika ada kelainan obstetrik dan terdapat kontraindikasi untuk tidak memungkinkan terjadinya persalinan pervaginam sehingga dilakukan dengan *seksio caesarea*.

d. Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Pada langkah ini rencana asuhan mneyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah ke-5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, bidan tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana). Dalam situasi ini bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi serta bertanggung terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut.

Memantau DJJ, nadi, dan his tiap 30 menit. Memastikan DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit), Nadi (60-100 kali per menit) dan his yang teratur dan adekuat. Melakukan asuhan persalinan normal sesuai dengan APN. Melakukan penanganan bayi baru lahir dengan cara bebaskan

jalan napas, mengeringkan bayi, mencegah hipotermi dan mencegah infeksi, serta melakukan pertolongan pertama pada bayi baru lahir seperti penyediaan suction, O₂, Infant warmer dan incubator.

e. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa.

Managemen kebidanan ini merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen untuk mengidentifikasi mengapa proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan berikutnya.

Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan persalinan pada ibu, kemungkinan akan terjadi perdarahan postpartum, partus lama, infeksi pada masa nifas. Begitu juga halnya dengan yang bisa terjadi pada bayinya yaitu kemungkinan terjadi hipotermi, asfiksia, kejang dan berat badan lahir rendah.

2. Pendokumentasian Managemen Kebidanan

Dokumentasi kebidanan adalah suatu sistem pencatatan atau pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan reproduksi dan semua kegiatan yang dilaksanakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan.

Dokumentasi SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh.

a. SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment, Planning)

1). Subjektif

- (a) Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis.
- (b) Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien (ekspresi mengenai kekhawatiran dan keluhannya).

2). Objektif

- (a) Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien
- (b) Hasil pemeriksaan laboratorium / pemeriksaan diagnostik lain
- (c) Informasi dari keluarga atau orang lain.

3). Assesment

- (a) Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) data subjektif dan objektif.
- (b) Diagnosis/masalah
- (c) Diagnosis/masalah potensial
- (d) Antisipasi diagnosis/masalah potensial/tindakan segera.

4). Planning

Pendokumentasian tindakan implementasi dan evaluasi, meliputi :
asuhan mandiri, kolaborasi, tes diagnostic/laboratorium, konseling dan tindakan lanjut (follow up).

E. Tinjauan Islam tentang persalinan, ketuban pecah dini, dan gawat janin

Menurut Wiwik setiawati (2015) Proses melahirkan merupakan bagian paling berat yang harus dihadapi oleh ibu yang tengah mengandung. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa dari seorang ibu ketika menjalani proses ini. Bahkan mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan sang buah hati.

Ayat yang harus dibaca selanjutnya ketika hendak ataupun dalam proses persalinan adalah QS. Fathir/35:11. Allah swt berfirman:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ
وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lohmahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”. (Kementerian Agama RI)

Dalam ayat ini, Allah swt menerangkan mengenai kejadian Adam yang diciptakan langsung dari tanah, kemudian keturunannya dijadikan dari mani yang pada hakikatnya juga berasal dari tanah, karena mani itu berasal dari makanan dan makanan yang berupa beras, sayur-sayuran dan lain-lain berasal dari tanah. Kemudian mereka dijadikan berpasangan-pasangan, terdiri

dari laki-laki dan wanita. Tidak seorang perempuan yang mengandung atau melahirkan kecuali semuanya diketahui oleh Allah swt, tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya. Oleh sebab itu, serahkan semua kepada Allah dan percayalah bahwa Allah swt selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya.

Banyaknya Angka Kematian Ibu akibat proses persalinan menunjukkan bagaimana perjuangan ibu selama proses persalinan. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ahqaf/46:15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnyasampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku” (Kementerian Agama RI)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu alasan kenapa Allahswt memberi wasiat pada manusia agar berbakti pada kedua orang tua adalah karena

proses persalinan yang dialami ibu merupakan suatu proses yang sangat berat. Pengaruh kontraksi rahim ketika bayi mau lahir, menyebabkan ibu merasakan sangat kesakitan, bahkan dalam keadaan tertentu, dapat menyebabkan kematian. Karena perjuangan ibu ketika melahirkan dan resiko

yang sangat berat yang ditanggung seorang ibu, Nabi cukup bijaksana dan memberi empati pada ibu yang meninggal karena melahirkan sebagai syahid, setara dengan perjuangan jihad di medan perang.

Dalam tafsir Al-Maraghi QS. Al-Ahqaf [46]:15, Allah swt memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua serta mengasihi mereka baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Allah swt menjadikan perbuatan berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama, sedangkan durhaka kepada mereka adalah dosa yang besar. Allah swt juga menyebutkan secara khusus tentang ibu, karena dialah yang lebih lemah kondisinya dan lebih pantas mendapat perhatian serta memiliki keutamaan yang lebih besar. Seorang ibu, ketika mengandung anaknya mengalami susah payah baik fisik maupun pikiran, dan ketika melahirkan pun mengalami rasa sakit (M. Quraish Shihab, 2002 : 1007).

Pada proses persalinan, tak hanya sekadar aurat, tapi juga menampakkan aurat mughallazhah dari perempuan. Tak pula hanya sekadar melihat, tapi juga ada tindakan menyentuh. Namun, dalam proses persalinan, hukum asal yang semula haram dipengaruhi kaidah fikih yang mengatakan, Ad-Dharuratu tubihul mahdzurat (Kondisi darurat bisa membolehkan perkara yang dilarang). Sehingga, melihat aurat mughallazhah perempuan yang semula haram bisa menjadi boleh, bahkan wajib jika benar-benar sangat dibutuhkan.

Jika seorang perempuan akan menjalani persalinan dengan dokter laki-laki, ia wajib didampingi agar keduanya tidak berkhawat. Jika melahirkan

dengan dokter perempuan, pendampingan hanya bersifat anjuran, namun tidak wajib secara syariat. Jika memang proses persalinan harus ditangani dokter laki-laki, dokter tersebut haruslah amanah dan menjaga adab kesopanan. Ia hanya diperbolehkan menangani apa yang menjadi "wilayah" kerjanya. Haram baginya untuk melihat atau menyentuh anggota tubuh lain yang tidak diperlukan. Di sinilah perlunya pendampingan dari suami atau keluarga pasien.

Yang menolong persalinan ibu adalah bidan, dokter, dan tenaga medis lainnya. Tapi mereka hanya perantara dari yang maha kuasa. Karena yang sebenarnya mengatur kehidupan adalah Allah SWT. Jadi, kita sebagai manusia harusnya perbanyak berdzikir dan berdoa agar kehidupan kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPERAWATAN IBU HAMIL DENGAN
KETUBAN PECAH DINI KEHAMILAN 27 MINGGU

Pengertian : Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan ketubanpecah dini pada usia kehamilan kurang dari 27 minggu

Tujuan:

1. Mencegah dan membatasi keluarnya air ketuban lebih banyak lagi
2. Mempertahankan kehamilan sampai janin bisa hidup diluar
3. Mencegah terjadinya komplikasi penyakit baik pasa ibu maupun janin.

1) Prosedur persiapan

Persiapan pasien:

- a. Keluarga diberitahu tentang maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan
- b. Lembar informasi

Persiapan alat:

- a. Lembar observasi
- b. Alat-alat yang diperlukan
- c. APD lengkap
- d. Dokumen rekam medis

2) Prosedur pelaksanaan:

- a. Ucapkan salam

- b. Lakukan identifikasi
- c. Lakukan cuci tangan
- d. Pakai APD
- e. Jelaskan pada pasien dan keluarga kondisi kehamilan dan janin saat ini
- f. Jelaskan kemungkinan resiko-resiko yang dapat terjadi pada ibu maupun janin.
- g. Batasi aktivitas (bedrest total)
- h. Anjurkan ibu untuk minum banyak
- i. Kolaborasi dengan dokter obgyn untuk terapi dan tindakan berikutnya
- j. Berikan dukungan moril pada ibu dan keluarga
- k. Lepas APD
- l. Lakukan cuci tangan
- m. Catat dan dokumentasikan pada rekam medis pasien

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI PADA
NY “N” DENGAN KETUBAN PECAH DINI (KPD) DISERTAI GAWAT
JANIN DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 23 JUNI 2018

KALA I

Nomor Register : 46xxxx
Tanggal masuk rumah sakit : 23 JUNI 2018, Jam: 08:20 wita
Tanggal pengkajian : 23 JUNI 2018, Jam: 08:30 wita
Tanggal partus : 23 JUNI 2018, Jam: 11:40 wita
Nama pengkaji : MUTMAINNAH

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas ibu/ suami

Nama : Ny “N”/ Tn “S”
Umur : 30 tahun/ 32 tahun
Nikah/ lamanya : 1x/ ± 10 tahun
Suku : Makassar/ Makassar
Agama : Islam/ Islam
Pendidikan : SMA/ SMA
Pekerjaan : IRT/ WIRASWASTA
Alamat : PAKKATTO

2. Anamnesa (data subjektif)

a. Alasan utama ibu masuk

Ibu masuk dengan keluhan terdapat pengeluaran air pervaginam jam 03:00 wita..

b. Riwayat keluhan utama

Air yang keluar sedikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga satu sarung basah, berwarna jernih dan tidak berbau. Ibu rujukan dari Puskesmas Bontomarannu kecamatan Bontomarannu dengan keluhan ada keluar cairan melalui vagina yang berwarna jernih pada tanggal 23 juni 2018, jam 03;00 wita (5 jam sebelum tiba di Rumah sakit), satu sarung basah akibat cairan yang keluar, dan ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang, riwayat pemeriksaan di Puskesmas yaitu belum ada kontraksi/ his, pembukaan 2 cm dan riwayat pemeriksaan tes lakmus di Puskesmas positif yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan pelepasan air yang keluar tersebut adalah air ketuban. Sebelum masuk ke kamar bersalin RSUD Syekh Yusuf, ibu sebelumnya berada di Poliklinik KIA RSUD Syekh Yusuf dan tindakan yang telah dilakukan di Poliklinik KIA yaitu pemeriksaan USG dan auskultasi denyut jantung janin menggunakan dopler didapatkan denyut jantung janin abnormal yaitu 166x permenit.

c. Riwayat menstruasi

1) Menarche : 13 tahun

2) Siklus : 28-30 hari

- 3) Lamanya : 5-7 hari
- 4) Banyaknya : 2-3x ganti pembalut per hari
- 5) Teratur/ tidak teratur : teratur
- 6) Sifat darah : encer
- 7) Disminore : tidak ada

d. Riwayat perkawinan

Ibu menikah 1x secara sah dengan Tn “S” pada tahun 2008, saat Ny “N”

Berusia 20 tahun dan Tn “S” berusia 22 tahun

e. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu

Tabel 3.1

Riwayat Kehamilan dan Persalinan yang Lalu

No	Tahun	Jenis partus	Jenis kelamin	BBL	PBL	Tempat partus	Penolong	Keadaan
1	2009	Persalinan pervaginam	Laki-laki	2,800 gram	50 cm	Puskesmas	Bidan	Baik
2	2014	Persalinan pervaginam	Perempuan	3000 gram	51 cm	Puskesmas	Bidan	Baik

a. Riwayat nifas yang lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresi setelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas, seperti keluar cairan yang berbau busuk, pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui

anak pertamanya secara eksklusif selama 6 bulan dan ditambah makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan keatas.

b. Riwayat kehamilan sekarang

1) Hari pertama haid terakhir tanggal 26 september 2017

2) Hari tafsiran persalinan tanggal 3 juli 2018

3) Umur kehamilan 38 minggu 4 hari

4) Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan

5) Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di BPS

Trimester I : 2x

Trimester II : 2x

Trimester III : 2x

6) Ibu telah mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 2 kali

TT I : tanggal 23 desember 2017 di PKM

TT II : tanggal 18 april 2018 di PKM

7) Keluhan-keluhan:

Trimester I : mual muntah di pagi hari

Trimester II : tidak ada keluhan

Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah

8) Penyuluhan

Ibu belum pernah mendapat penyuluhan selama kehamilannya

c. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu

- 1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes melitus, asma, dan hipertensi.
- 2) Tidak ada riwayat penyakit menular: tuberculosis, malaria, hepatitis dan penyakit menular seksual.
- 3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan.
- 4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di Rumah sakit maupun di Puskesmas.

d. Riwayat penyakit keluarga

Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes militus, asma dan penyakit keturunan lainnya.

e. Riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual

- 1) Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami.
- 2) Hubungan ibu dengan suami, keluarga, maupun tetangga baik.
- 3) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami.
- 4) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.

f. Riwayat KB

Sejak kelahiran anak kedua yaitu pada tahun 2014 ibu mulai menjadi akseptor KB depo progestin/ suntik 3 bulan dan berhenti pada bulan agustus tahun 2017 dengan alasan ingin hamil lagi.

g. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

- 1) Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan:

- a) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- b) Frekuensi : 3 kali sehari
- c) Kebutuhan minum : 6-8 gelas per hari

Selama inpartu:

- a) Ibu makan, tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum

2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

- a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amoniak.
- b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu:

- a) BAK : Ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok
- b) BAB : Ibu belum BAB (ibu terakhir BAB jam 02.00 di rumahnya)

3) Personal hygiene

Kebiasaan:

- a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b) Sikat gigi : 2 kali (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi
- c) Keramas : 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo
- d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu:

a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan

a) Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpatu

b) Ibu tidak pernah tidur

3. Pemeriksaan fisik (data objektif)

a. Pemeriksaan umum:

1) Keadaan umum ibu baik

2) Kesadaran komposmentis

3) Hari tafsiran persalinan tanggal 3 juli 2018 Usia gestasi 38 minggu 4 hari

4) Tanda-tanda vital:

Tekanan darah : 120/80 mmHg Suhu : 36,8 °C (axilla)

Nadi : 80x/ menit Pernapasan : 20x/ menit

5) Tinggi badan : 158 cm

6) Berat badan sebelum hamil : 47 kg

7) Berat badan sekarang : 60 kg

8) Lingkar lengan atas (lila) : 26 cm

b. Pemeriksaan fisik (*Head To Toe*)

1) Kepala

Inspeksi : kepala bersih, tidak ada ketombe, rambut hitam dan lurus

Palpasi : tidak ada massa, tidak mudah rontok dan tidak ada nyeri tekan

2) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada *oedema* pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak

Palpasi : tidak teraba adanya oedema

3) Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sklera putih (tidak ikterus)

4) Hidung

Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran secret.

Palpasi : tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak nampak adanya polip.

5) Mulut dan gigi

Inspeksi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada gigi yang tanggal, tidak ada stomatitis dan gusi tidak berdarah.

6) Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan peradangan

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.

7) Leher

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis

8) Payudara

Inspeksi : payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat areola dipencet, tidak ada nyeri tekan.

9) Abdomen

Inspeksi : nampak pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, nampak striae alba dan linea nigra, tidak ada bekas luka operasi dan otot perut kendur.

Palpasi :

Leopold I : 3 jari di bawah *processus xiphoideus* (tinggi fundus uteri 33 cm), teraba bokong

Leopold II : punggung kiri (puki)

Leopold III : kepala

Leopold IV : bergerak dalam panggul (4/5)

Lingkar perut : 92 cm

Tafsiran berat janin : 3.036 gram

Denyut jantung janin : Denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146 kali per menit

His : 2x dalam 10 menit durasi 30-35 detik

10) Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varises, nampak pelepasan lendir, darah bercampur dengan air ketuban.

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak oedema dan tidak ada nyeri tekan.

11) Anus

Inspeksi : tidak ada hemorroid

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

12) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : pergerakan aktif, tidak ada varises

Palpasi : tidak ada oedema

c. Pemeriksaan dalam

Vaginal toucher (VT) tanggal 23 juni 2018, jam 08:30 wita

1) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan

2) Portio : tebal/ lunak

3) Pembukaan : 5 cm

4) Air ketuban : jernih

5) Presentasi : ubun-ubun kecil kiri lintang

6) Penurunan : Hodge II

7) Penumbungan : tidak ada

8) Molase : tidak ada

9) Kesan panggul : normal

10) Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

d. Pemeriksaan inspekulo

Tanggal 23 juni 2018, jam 08:50 wita Hasil pemeriksaan inspekulo yaitu terdapat pengeluaran air ketuban yang keluar dari kanalis servikalis.

e. Pemeriksaan tes *valsava* (pembuangan napas/ekspirasi paksa dengan menutup bibir dan hidung)

Tanggal 23 juni 2018, jam 09:00 wita Hasil pemeriksaan tes *valsava* yaitu terdapat pengeluaran air ketuban

f. Pemeriksaan penunjang

1) Pemeriksaan USG

Tanggal 23 juni 2018, jam 08:20 wita oleh dokter A Sp.OG di Poliklinik KIA

- a) GIII PII A0, gravid tunggal, hidup
- b) Letak : kepala
- c) FHR : 0 kali per menit
- d) TBJ : ± 3.036 gram
- e) UK : 38 minggu 4 hari
- f) Plasenta di *posterofundal grade 1*
- g) Oligohidramnion

2) Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

Tanggal 23 juni 2018, jam 09:10 wita

- 1) WBC (*White Blood Cell*) : $.4 \times 10^3 / \mu\text{L}$

Leukosit (*White Blood Cell / WBC*) Leukosit merupakan komponen darah yang berperan dalam memerangi infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun proses metabolik toksin, dll. Nilai normal leukosit berkisar 4.000 - 10.000 sel/ul darah.

2) RBC (*Red Blood Cell*) : $3.21 \times 10^3 / \mu\text{L}$

Eritrosit (*Red Blood Cell / RBC*) Eritrosit atau sel darah merah merupakan komponen darah yang paling banyak, dan berfungsi sebagai pengangkut / pembawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan membawa kardondioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Nilai normal eritrosit pada pria berkisar 4,7 juta - 6,1 juta sel/ul darah, sedangkan pada wanita berkisar 4,2 juta - 5,4 juta sel/ul darah

3) HGB : 10,5g/dl

Hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transport oksigen dari paru paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan tubuh ke paru paru. Kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah berwarna merah.

Normal HGB :

- Bayi Baru lahir : 17 – 22g/dl
- Bayi usia 1 minggu : 15 – 20g/dl
- Bayi usia 1 bulan : 11 – 15g/dl
- Anak – anak : 11 – 13g/dl

- Wanita dewasa : 12 – 16g/dl
- Pria dewasa : 14 – 18g/dl
- Pria setelah setengah baya : 12,4 – 14,9g/dl
- Wanita setelah setengah baya : 11,7 – 13,8g/dl

4) HCT : 29.05%

Hematokrit merupakan ukuran yang menentukan banyaknya jumlah sel darah merah dalam 100 ml darah yang dinyatakan dalam persent (%).

Nilai normal hematokrit untuk pria berkisar 40,7% - 50,3% sedangkan untuk wanita berkisar 36,1% - 44,3%.

5) MCV (*Mean Corpuscular Volume*) : 90.3fL

MCV (*Mean Corpuscular Volume*) atau Volume Eritrosit Rata-rata (VER), yaitu volume rata-rata sebuah eritrosit yang dinyatakan dengan femtoliter (fl)

$$\text{MCV} = \frac{\text{Hematokrit} \times 10}{\text{Eritrosit}}$$

Nilai normal = 82-92 fl

6) MCH (*Mean Corpuscular Hemoglobin*) : 32.7pg

MCH (*Mean Corpuscular Hemoglobin*) atau Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata (HER), yaitu banyaknya hemoglobin per eritrosit disebut dengan pikogram (pg)

$$\text{MCH} = \frac{\text{Hemoglobin} \times 10}{\text{Eritrosit}}$$

Nilai normal = 27-31 pg

7) MCHC (*Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration*) : 36.2g/dL

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) atau Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (KHER), yaitu kadar hemoglobin yang didapat per eritrosit, dinyatakan dengan persen (%) (satuan yang lebih tepat adalah “gr/dl”)

$$\text{MCHC} = \frac{\text{Hemoglobin}}{\text{Hematokrit}} \times 100$$

Nilai normal = 32-37 %

8) Protein : negatif

Untuk mengetahui kadar protein dalam urin dan juga untuk mengetahui apakah pasien mengalami eklamsi. Normal ekskresi protein biasanya tidak melebihi 150mg/24 jam atau 10mg/dl urin. Lebih dari 10 mg/dl didefinisikan sebagai proteinuria.

9) Reduksi : negatif

Tujuan dari tes ini adalah untuk mendiagnostik ada atau tidaknya glukosa di dalam urine. Apa bila ada maka pasien mengalami penyakit diabetes militus. Normalnya yaitu

Pria

- Glukosa puasa : 80 – 100mg/dl
- Glukosa post prandial : 100 – 120mg/dl
- Glukosa sewaktu : < 150mg/dl

Wanita

- Glukosa puasa : 80 – 100mg/dl
- Glukosa post prandial : 100 – 120mg/dl
- Glukosa sewaktu : < 150mg/dl

10) HbsAg : negatif

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mendiagnosa infeksi virus Hepatitis B ataupun sebagai penanda awal infeksi penyakit ini.

Normalnya yaitu :

- Bayi Baru lahir : 17 – 22g/dl
- Bayi usia 1 minggu : 15 – 20g/dl
- Bayi usia 1 bulan : 11 – 15g/dl
- Anak – anak : 11 – 13g/dl
- Wanita dewasa : 12 – 16g/dl
- Pria dewasa : 14 – 18g/dl
- Pria setelah setengah baya : 12,4 – 14,9g/dl
- Wanita setelah setengah baya : 11,7 – 13,8g/dl

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

GIII PII A0, gestasi 38 minggu 4 hari, intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase aktif dengan KPD disertai gawat janin.

1. GIII PII A0

Dasar

Data subjektif : ibu mengatakan kehamilan yang ketiga dan sebelumnya tidak pernah keguguran,

Data objektif : nampak linea nigra, striae alba dan otot perut sudah kendor, terdapat denyut jantung janin, dan pada saat palpasi teraba bagian-bagian janin.

Analisa dan interpretasi data: Pada pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendur, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (Prawirohardjo, 2014 : 179).

2. Gestasi 38 minggu 4 hari

Dasar

Data subjektif : hari pertama haid terakhir tanggal 26 september 2017

Data objektif : pemeriksaan Leopold I, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah *processus xiphoides*, dan hari tafsiran persalinan tanggal 3 juli 2018 berdasarkan rumus Neagle.

Analisa dan interpretasi data: Dari hasil pemeriksaan, dilihat dengan menggunakan rumus Neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan (Prawirohardjo, 2014 : 279).

3. Intrauterin

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan janinnya bergerak dengan sangat kuat saat ini dan ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya

Data objektif : ibu tidak merasakan nyeri ketika dipalpasi, TFU sesuai umur kehamilan, pada palpasi Leopold teraba bagian-bagian kecil janin.

Analisa dan interpretasi data: Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intra uterin.

4. Tunggal

Dasar

Data subjektif : ibu mengatakan janinnya sering bergerak pada perut bagian kanannya, gerakannya sangat kuat dan selalu bergerak pada sebelah kiri saja.

Data objektif : Pada Leopold I, teraba bokong di fundus yang bulat dan lunak serta tidak melenting, pada Leopold II teraba punggung kiri, pada Leopold III teraba bagian bulat dan melenting (kepala), dan auskultasi hanya terdapat satu denyut jantung janin (DJJ) yaitu terdengar jelas, dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146 kali per menit.

Analisa dan interpretasi data: Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi

teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur dengan frekuensi 146 kali permenit.

5. Hidup

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan pergerakan janinnya biasanya 12 kali dalam sehari.

Data objektif : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, sangat kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146 kali per menit

Analisa dan interpretasi data: Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ), merupakan tanda bahwa janin hidup. Selain itu, tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu dan pembesaran uterus menandakan janin hidup..

6. Keadaan ibu dan janin

Dasar

Data subjektif : tidak ada keluhan-keluhan lain dan kecemasan yang dirasakan ibu selama kehamilan

Data objektif : keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tandatanda vital dalam batas normal, denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kiri bawah

perut ibu dengan frekuensi 146 kali per menit dan pemeriksaan *head to toe* konjungtiva merah muda, wajah dan tungkai tidak oedema, hemoglobin 10,5 g/dl menandakan ibu tidak anemia. onjungtiva merah muda, hemoglobin yang normal, tidak adanya oedema pada wajah dan tungkai menandakan ibu dalam keadaan baik.

Analisa dan interpretasi data: Tanda-tanda vital ibu dan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal konjungtiva merah muda.

7. Inpartu kala I fase aktif dengan KPD disertai Gawat Janin

Data subjektif : ibu mengatakan ada pengeluaran air hingga satu sarung basah sejak jam 03:00 wita..

Data objektif : pengeluaran air pervaginam yang berwarna jernih, ada *verniks caseosa* dan berbau amis, sudah ada kontraksi. Selain itu, ada pun hasil pemeriksaan lainnya antara lain:

a. Hasil pemeriksanan dalam jam 08:30 wita

- 1) Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- 2) Portio : tebal/ lunak
- 3) Pembukaan : 5 cm
- 4) Ketuban : pecah, jernih (merembes)
- 5) Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang
- 6) Penurunan : hodge 1I
- 7) Molase : tidak ada

8) Penumbungan : tidak ada

9) Kesan panggul : normal

10) Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

- b. Hasil pemeriksaan inspekulo yaitu terdapat pengeluaran air ketuban dari kanalis servikalis.
- c. Hasil pemeriksaan tes *valsava* (pembuangan napas/ekspirasi paksa dengan menutup bibir dan hidung) yaitu terdapat pengeluaran air ketuban.

Analisa dan interpretasi data:

- a. Adanya pelepasan air pervaginam, jernih, dan terdapat *vernix caseosa* dengan bau amis yang menandakan telah terjadi pelepasan air ketuban
- b. Pemeriksaan inspekulo membuktikan terdapat pengeluaran air ketuban dari kanalis servikalis
- c. Pemeriksaan tes *valsava* membuktikan bahwa terdapat pengeluaran air ketuban
- d. KPD adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya, dimana pada primipara pembukaan serviks kurang 3 cm, dan pada multipara kurang dari 5 cm
- e. Dilatasi serviks 1-3 cm merupakan kala I fase aktif

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial yang akan terjadi yaitu:

- 1. Pada ibu, yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya

tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal,

2. Pada janin, yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernafasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal

Data subjektif : ibu mengatakan terdapat pengeluaran air pervaginam hingga satu sarung basah pada jam 03:00 wita.

Data objektif : tampak pengeluaran lendir, darah dan air dari pervaginam, warna jernih, ada *vernix caseosa* dan bau amis. pergerakan janinnya semakin lemah
Analisa dan interpretasi data:

- a) KPD menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan ruang rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi pada jalan lahir
- b) KPD memberi pengaruh/ komplikasi kepada ibu dan janin yaitu pada ibu potensial terjadi infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum,

meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

**D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA /
KOLABORASI**

1. Pemasangan infus RL 28 tetes per men

Rasional : membantu mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan

2. Pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam setiap 6 jam maksimal 4 kali

Rasional : untuk pematangan serviks dan membantu kontraksi uterus

3. Injeksi antibiotik cefotaxime 1 gr/ IV 8 jam

Rasional : mencegah resiko terjadinya infeksi

4. Pemberian oksigen dengan kecepatan 6-8 /menit

Rasional : Menbantu mengembalikan denyut jantung janin menjadi normal

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Masalah aktual : KPD disertai gawat janin

2. Masalah potensial : potensial terjadi pada ibu yaitu infeksi *intrapartal/* dalam persalinan, infeksi *puerperalis/* masa nifas, *dry labour/* partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal, dan potensial terjadi pada janin yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan

neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, *cerebral palsy*, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal

3. Tujuan:

- a. Persalinan dapat berlangsung dengan normal, keadaan ibu dan janin baik.
- b. Mencegah terjadinya masalah potensial.

4. Kriteria

- a. Kala I untuk multipara tidak lebih dari 7 jam dan untuk primipara 12 jam
- b. Denyut jantung janin (DJJ) normal (120-160 kali per menit)
- c. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
 - 1) Tekanan darah normal
 - a) systole 100-120 mmHg
 - b) diastole 60-90 mmHg
 - 2) Suhu normal 36,5°C
 - 3) Nadi normal 60- 100x/ menit

4) Pernapasan normal 16-24x/ menit

d. Keadaan ibu dan janin baik

5. Rencana tindakan

a. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Rasional : agar ibu dan keluarga memahami tentang keadaannya dan memberi dukungan yang dapat mengurangi kecemasan dan siap menghadapi persalinan.

b. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit)

Rasional : observasi tanda-tanda vital untuk memantau keadaan ibu seperti memantau terjadinya demam yang merupakan tanda-tanda terjadinya infeksi pada ibu sehingga dapat mempermudah melakukan tindakan.

c. Observasi denyut jantung janin (DJJ) setiap 30 menit

Rasional : saat ada kontraksi, denyut jantung janin (DJJ) bisa berubah sesaat hingga apabila ada perubahan dapat diketahui dengan cepat dan dapat bertindak secara cepat dan tepat.

d. Observasi *vaginal toucher* (VT) kontrol tiap 2 jam/ 4 jam, atau jika ada indikasi

Rasional : untuk memantau kemajuan persalinan.

e. Observasi his setiap 30 menit

Rasional : karena kekuatan kontraksi uterus dapat berubah setiap saat sehingga mempengaruhi turunnya kepala dan dilatasi serviks

- f. Ajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, ibu menarik napas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi

Rasional : untuk mengurangi rasa sakit akibat kontraksi

- g. Anjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin

Rasional:

- 1) Kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhi kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar
- 2) Menghalangi penurunan kepala bayi dan memberi perasaan tidak nyaman pada ibu

- h. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infus RL 28 tetes per menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam, antibiotik cefotaxime 1 gram/ IV dan pemberian oksigen pada ibu 6-8 l/menit sesuai intruksi dokter

Rasional : pemberian infus membantu untuk mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan, pemasangan misoprostol dapat membantu pematangan serviks/ dilatasi serviks serta pemberian antibiotik dapat mencegah terjadinya infeksi serta oksigen untuk mengembalikan DJJ kembali normal.

- i. Berikan intake minum dan makan pada ibu

Rasional : agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran

- j. Menganjurkan kepada ibu untuk senang tiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti

Rasional : agar ibu berserah diri dan bertawakkal kepada sang pencipta

- k. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

Rasional : merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan memudahkan pengambilan keputusan klinik.

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juni 2018, jam 08:45 wita

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his tiap 1 jam pada kala I fase aktif dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan tiap 30 menit.

Tabel 3.2

Observasi TTV, DJJ dan His

N0	JAM	TD	N	S	pernafasan	DJJ	HIS
1	09:00	120/80	80	36,6 °C	20x/i	144	2x dalam 10 menit (30-35)
2	09:30		84		20x/i	148	3x dalam 10 menit (35-40)
3	10:00		84		20x/i	142	3x dalam 10 menit (35-40)
4	10:30		82		20x/i	148	4x dalam 10 menit (40-45)
5	11:00		84		20x/i	168	4x dalam 10 menit (45-50)

6	11:30	120/80	84	36,6 °C	20x/i	174	5x dalam 10 menit (50-55)
---	-------	--------	----	---------	-------	-----	---------------------------

3. Pemantauan DJJ terakhir di dapatkan DJJ abnormal

Hasil: 174x/ menit

4. Segera memasang oksigen untuk ibu dalam jumlah 6-8 l/menit, kemudian hentikan pemberian cairan infus RL.

Hasil: Terlaksana

5. Mengobservasi vagina *toucher* (VT) kontrol tanggal 23 juni 2018, jam 11:30 wita

- a. Vulva dan vagina : membuka
- b. Portio : melesap
- c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- d. Ketuban : kering
- e. Presentasi : ubun-ubun kecil didepan sympisis
- f. Penurunan : Hodge IV
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, darah, mekonium, dan air ketuban

6. menganjurkan teknik relaksasi kepada ibu yaitu menarik napas melalui hidung dan menghembuskan lewat mulut

7. Menganjurkan pada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin
8. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian oksigen dalam jumlah 6-8 l/menit, misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotik cefotaxime 1 gram/ IV sesuai intruksi dokter
9. Memberi makan dan minum jika tidak ada his
10. Menganjurkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti
11. Mencatat dalam partograf

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juni 2018, jam : 11.30 wita

1. Keadaan ibu baik dan janin dalam pengawasan yang ditandai dengan:
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
 - 1) Tekanan darah : 120/80 mmHg
 - 2) Suhu : 36,8 °C (axilla)
 - 3) Nadi : 80 kali per menit
 - 4) Pernapasan : 20 kali per menit
 - b. Denyut jantung janin (DJJ) 174 kali permenit dan pergerakan janinnya semakin lemah
2. Kala 1 fase aktif berlangsung ditandai dengan:
 - a. His yang adekuat 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik

- b. Pembukaan lengkap (10 cm) \pm 5 jam setelah *vaginal toucher* (VT) pertama dan penurunan kepala hodge IV
- c. Tidak ada tanda-tanda infeksi
- d. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan

KALA II

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : sakitnya bertambah kuat dan tembus ke belakang, ibu merasa ingin BAB, adanya dorongan kuat untuk meneran, serta adanya tekanan pada anus.

Data objektif : perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik, penurunan kepala 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap), penurunan hodge IV dan pelepasan lendir, darah, dan air ketuban.

Hasil pemeriksaan dalam, jam 11:30 wita:

1. Vulva dan vagina : membuka
2. Portio : melesap
3. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
4. Air ketuban : kering
5. Presentasi : ubun-ubun kecil depan symphysis
6. Penurunan : Hodge IV
7. Molase : 0
8. Penumbungan : tidak ada

9. Kesan panggul : normal

10. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Diagnosa : perlangsungan kala II

Masalah aktual : nyeri akibat kontraksi

Data subjektif : ada penekanan pada anus, ada dorongan kuat untuk meneran, sakitnya sering dan bertambah sakit.

Data objektif : perineum menonjol, vulva dan vagina membuka, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik, penurunan kepala 0/5, pembukaan 10 cm (lengkap), penurunan hodge IV dan pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Analisa dan interpretasi data: Nyeri merupakan hal yang fisiologis yang dirasakan oleh ibu akibat adanya kontraksi yang justru akan mempercepat proses persalinan, tekanan yang hebat pada dasar panggul dan bagian terendah janin, akan mempermudah penurunan kepala, kontraksi yang timbul disertai ibu mengedan yang berlangsung secara refleksi

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/

KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : perlangsungan kala II

Masalah aktual : tidak ada indikasi

Masalah potensial : tidak ada data penunjang

Tujuan:

1. Kala II berlangsung normal
2. Bayi lahir normal tanpa penyulit

Kriteria:

1. Kala II berlangsung selama \pm 10 menit tanpa ada penyulit
2. Bayi lahir spontan, segera menangis, bernapas tanpa bantuan, tidak bergerak dengan aktif, fleksi pada ekstremitas, dan seluruh badan berwarna merah muda.

Rencana tindakan: Tanggal 23 juni 2018, jam 11:25 wita

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorangan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

Rasional : untuk mengetahui apakah sudah dapat dilakukan pimpinan meneran

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partus set.

Rasional : mempersiapkan diri sebelumnya dapat mencegah diri dari infeksi nosokomial

3. Memakai celemek plastik.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Rasional : mencegah infeksi

5. Menggunakan sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakan kembali kedalam wadah partus set.

Rasional : mempersiapkan peralatan dalam keadaan siap pakai

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

9. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 per menit).

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin dan DJJ abnormal (160-190 per menit)

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin abnormal, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

Rasional : agar sedikit tidak khawatir dengan keadaan bayinya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman.

Rasional : dapat membantu memperlancar proses persalinan

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Rasional : memperlancar proses berlangsungnya persalinan

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

Rasional : untuk mempercepat penurunan kepala

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Rasional : untuk mengeringkan tubuh bayi

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.

Rasional : sebagai alas untuk menyokong perineum

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan Bahan

Rasional : mempersiapkan alat dalam keadaan siap pakai

18. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada kedua tangan.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenon (perasat untuk melindungi perineum dengan satu tangan, di bawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi

agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum)

Rasional : dengan menyokong yang baik, maka akan mengurangi trauma dan mencegah terjadinya ruptur perineum

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Rasional : membersihkan jalan nafas dari air ketuban dan lilitan tali pusat dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Rasional : menghilangkan torsi pada leher yang terjadi akibat putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal dan menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Rasional : membantu mengeluarkan bayi agar tidak terjadi robekan perineum

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Rasional : dengan tehnik sanggah susur akan membantu pengeluaran tubuh bayi seluruhnya dan mencegah agar bayi tidak jatuh

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung kearah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Rasional : membantu mengeluarkan bayi secara keseluruhan dan mencegah agar bayi tidak jatuh

25. Melakukan penilaian selintas :

- a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

- b. Apakah bayi bergerak aktif ?

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi ada penyulit atau tidak

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering. Membiarkan bayi di atas perut ibu.

Rasional : mencegah agar bayi tidak mengalami hipotermi

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juni 2018, jam 11:30 wita

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorangan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu:

a. Partus set

Partus set terdiri atas 2 klem kocher, ½ kocher, 1½ handscoon steril, kateter nelaton, penjepit tali pusat, kasaa steril, spoit 3 cc dan gunting tali pusat.

b. Hecting set

Hecting set terdiri atas nelvuder, catgut, jarum, pinset anatomi, pinset sirurgi, dan gunting benang

c. Obat dan bahan

Obat dan bahan terdiri atas cairan infus, oksitosin, lidokain, salep mata, vitamin K, hepatitis B dan betadin.

d. Diluar partus set

Adapun yang harus disiapkan diluar partus set yaitu air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi, larutan klorin 0,5%, tempat sampah, delee, lenek, perlak, handuk kering, tensimeter, stetoskop dan termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, kacamata, celemek, handscoon, alas kaki tertutup/ sepatu boot

3. Memakai celemek plastik.

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.
6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.
7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum.
8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.
 - a. Vulva dan vagina : membuka
 - b. Portio : melesap
 - c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
 - d. Air ketuban : kering
 - e. Presentasi : ubun-ubun kecil depan simpisis
 - f. Penurunan : Hodge IV
 - g. Molase : 0
 - h. Penumbungan : tidak ada
 - i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban
9. Mencilupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 x/menit).
11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin dalam pengawasan, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).
13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.
14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.
15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.
16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.
17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan
18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.
19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita

melakukan perasat stenon (perasat untuk melindungi perineum dengan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin.
21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.
22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.
23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.
24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)
25. Melakukan penilaian selintas :
 - a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?

b. Apakah bayi bergerak aktif ?

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juni 2018 , jam 11;40 wita

1. Kala II berlangsung normal tanpa ada penyulit

Bayi lahir spontan Tanggal 23 juni 2018 , jam 11;40 wita menangis kuat dan bernapas tanpa bantuan, bay tidak bergerak aktif, terdapat fleksi pada ekstremitas dan APGAR *score* 8/10.

2. Perdarahan \pm 150 cc

3. Terjadi ruptur tingkat II

KALA III

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : ibu lelah setelah melahirkan dan merasakan nyeri perut bagian bawah

Data objektif : bayi lahir spontan pada tanggal 23 Juni 2018, jam 11.40 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), tinggi fundus uteri setinggi pusat, perdarahan \pm 150 cc, kala II berlangsung selama \pm 10 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala III

Data subjektif : ibu nyeri perut bagian bawah, ibu senang dengan kelahiran bayinya

Data objektif : bayi lahir spontan tanggal 23 juni 2018, jam 11:40 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat masih nampak di vulva.

Analisa dan interpretasi data: Pada waktu kala III, volume uterus telah berkurang, dapat teraba tinggi fundus uteri setinggi pusat, pada saat kontraksi maka akan memperkecil permukaan uteri sehingga akan terasa sakit dan teraba keras dan bundar.

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : Kala III berlangsung normal, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), keadaan ibu dan bayi baik
2. kriteria : Lamanya kala III tidak lebih dari 30 menit, plasenta (selaput dan kotiledon) lahir lengkap, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) serta keadaan ibu dan bayi baik.

Rencana tindakan:

Tanggal 23 juni 2018 , jam 11;40 wita

- 1) Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

- 2) Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Rasional : mempercepat proses pengeluaran plasenta

- 3) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit secara intramuskuler (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Rasional : penyuntikan oksitosin membantu kontraksi uterus untuk pengeluaran plasenta

- 4) Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Rasional : untuk memudahkan memotong tali pusat

- 5) Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Rasional : agar bayi dapat dipisahkan dari plasenta

- 6) Mengikat tali pusat dengan benang desinfeksi tingkat tinggi pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.

Rasional : agar darah tidak keluar dari pusat bayi

- 7) Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Rasional : agar ibu dan bayi tidak hipotermi dan bisa melakukan kontak kulit

- 8) Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Rasional : agar dapat memudahkan proses peregangan tali pusat terkendali

- 9) Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi dan tangan lain meregangkan tali pusat.

Rasional : memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

- 10) Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Rasional : dorso kranial memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

- 11) Melakukan peregangan dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Rasional : memudahkan plasenta keluar sesuai dengan kurva jalan lahir sehingga tampak pada vulva

12) Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Rasional : mencegah robekan dan mencegah tertinggalnya selaput ketuban yang dapat menyebabkan perdarahan

13) Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Rasional : agar kontraksi baik dan mencegah perdarahan

14) Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukkan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Rasional : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dapat menyebabkan perdarahan

15) Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Rasional : penjahitan laserasi dapat mencegah terjadinya perdarahan

16) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Rasional : kontraksi uterus yang baik dapat mencegah perdarahan akibat atonia uteri

17) Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Rasional : untuk menjalin ikatan batin antara ibu dan bayi

18) Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral.

Rasional : agar bayi mendapat perlindungan dini terhadap komplikasi yg akan terjadi

19) Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral

Rasional : mengurangi resiko bayi terkena penyakit hepatitis

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juni 2018 , jam 11;40 wita

1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.
2. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.
3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin).
4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

5. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.
6. Mengikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian
7. melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.
8. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi
9. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva
10. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.
11. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorso kranial.
12. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregang tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.
13. Melakukan peregang dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).
14. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

15. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)
16. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.
17. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.
18. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.
19. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.
20. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.
21. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Evaluasi Tanggal 23 juni 2018 , jam 11;50 wita

1. Kala III berlangsung \pm 10 menit
2. Kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap Tanggal 23 juni 2018 , jam 11;50 wita

3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
4. Perdarahan kala III \pm 150 cc
5. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
6. Keadaan ibu dan bayi baik.

KALA IV

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah.

Data objektif : kala III berlangsung \pm 5 menit, plasenta lahir lengkap tanggal 23 juni 2018, Jam: 11:50 wita , tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan \pm 150 cc dan kandung kemih kosong.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Perlangsungan kala IV dengan kelelahan

Data subjektif : ibu merasa lelah setelah persalinannya

Data objektif : kala III berlangsung \pm 10 menit, plasenta lahir lengkap tanggal Tanggal 23 juni 2018 , jam 11:50 wita, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan \pm 100 cc dan kandung kemih kosong

Analisa dan interpretasi data: Setelah plasenta lahir lengkap, maka menunjukkan telah masuk ke kala pengawasan/ kala observasi post partum.

Kelelahan disebabkan oleh penggunaan energi dan cairan yang banyak saat persalinan.

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data yang menunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI

Tidak ada data yang menunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Tujuan : kala IV berlangsung dengan tidak terjadi perdarahan yang berlebihan, kesadaran composmentis, dan tanda-tanda vital dalam batas normal
2. Kriteria : tidak terjadi perdarahan, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), kandung kemih kosong dan tanda-tanda vital dalam batas normal

Rencana tindakan:

Tanggal 23 JUNI 2018 , jam 11;45 wita

- 1) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.

Rasional : mencegah terjadinya perdarahan pervaginam

- 2) Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

Rasional : agar kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

- 3) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 jam pada jam kedua pasca persalinan

Rasional : mengetahui jumlah darah yang keluar

- 4) Memeriksa tanda-tanda vital ibu, tinggi fundus uteri kontraksi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.

Rasional : tanda-tanda vital yang normal dan kandung kemih yang kosong menandakan kala IV berlangsung normal

- 5) Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

Rasional : agar bayi dalam keadaan aman dan nyaman

- 6) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

Rasional : larutan klorin 0,5% dapat membunuh bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi

- 7) Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi

- 8) Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi (DTT), membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

Rasional : agar ibu terhindar dari kuman

- 9) Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin makan dan minum

Rasional : dengan makan dan minum akan memberikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinannya

10) Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

Rasional : untuk membunuh kuman

11) Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.

Rasional : mencegah infeksi silang dan sebagai tindakan desinfeksi infeksi

12) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Rasional : dekontaminasi agar tidak terkontaminasi dengan bakteri

13) Melengkapi partograf

Rasional : sebagai catatan pemantauan persalinan

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juni 2018 , jam 11;50 wita

1. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.
2. Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
3. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan Jam (Wita)

Tabel 3.3

Observasi Jumlah Perdarahan

Jam	Jumlah perdarahan
12:05	100 cc
12:20	50 cc
12:35	30 cc
12:50	20 cc
13:20	10 cc
13:50	5 cc

Total ± 215 cc

1. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan.

Tabel 3.4

Observasi TTV, TFU Kontraksi dan Kandung Kemih

Jam	TD	N	S	Tinggi fundus uteri	Kontraksi	Kandung kemih
12:05	120/80	78	36,8 °C	Setinggi pusat	Baik	Kosong
12:20	120/80	80		Setinggi pusat	Baik	Urin ± 50 cc
12:35	120/80	78		Setinggi pusat	Baik	Urin ± 50 cc
12:50	120/80	82		Setinggi pusat	Baik	Urin ± 50 cc
13:30	120/80	80	36,6 °C	Setinggi pusat	Baik	Urin ± 100 Cc
13:50	120/80	82		Setinggi pusat	Baik	Kosong

2. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.
3. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (selama 10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.
4. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.
5. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.
6. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.
7. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.

8. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.
9. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
10. Melengkapi partograf.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 23 juni 2018 , jam 11;50 wita

1. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
2. Jumlah perdarahan \pm 215 cc
3. Kandung kemih kosong
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal
Tekanan darah : 120/80 mmHg Suhu : 36, 6°C (axilla)
Nadi : 80x/ menit Pernapasan : 20x/ menit
5. Ibu telah makan dan minum
6. Keadaan ibu dan bayi baik

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL

PATOLOGI PADA NY “N” DENGAN KETUBAN

PECAH DINI (KPD) DI SERTAI GAWAT JANIN

RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 23 JUNI 2018

No register : 46xxxx

Tanggal masuk : 23 juni 2018, jam 08: 20 wita

Tanggal pengkajian : 23 juni 2018, jam 08:30 wita

Tanggal partus : 23 juni 2018, jam 11: 40 wita

Nama pengkaji : MUTMAINNAH

Identitas istri/ suami

Nama : Ny “N”/ Tn “S”

Umur : 30 tahun/ 32 tahun

Nikah/ lamanya : 1x/ +10 tahun

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam/ Islam

Pendidikan : SMA/ SMA

Pekerjaan : IRT/ Wiraswasta

Alamat : Pakkatto

A. KALA I

DATA SUBJEKTIF

1. Anamnesa (data subjektif)

a. Alasan utama ibu masuk

Ibu masuk dengan keluhan terdapat pengeluaran air pervaginam.

b. Riwayat keluhan utama

Air yang keluar sedikit demi sedikit dan bertambah banyak hingga satu sarung basah, berwarna jernih dan tidak berbau. Ibu rujukan dari Puskesmas Bontomarannu kecamatan Bontomarannu dengan keluhan ada keluar cairan melalui vagina yang berwarna jernih pada tanggal 23 juni 2018 jam 03;00 wita (5 jam sebelum tiba di Rumah sakit), satu sarung basah akibat cairan yang keluar, dan ibu tidak merasakan mules atau nyeri perut tembus belakang, riwayat pemeriksaan di Puskesmas yaitu belum ada kontraksi/ his, pembukaan 2 cm dan riwayat pemeriksaan tes lakmus di Puskesmas positif yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru yang menandakan pelepasan air yang keluar tersebut adalah air ketuban. Sebelum masuk ke kamar bersalin RSUD Syekh Yusuf, ibu sebelumnya berada di Poliklinik KIA RSUD Syekh Yusuf dan tindakan yang telah dilakukan di Poliklinik KIA yaitu pemeriksaan USG.

c. Riwayat menstruasi

1) Menarche : 13 tahun

2) Siklus : 28-30 hari

- 3) Lamanya : 5-7 hari
 - 4) Banyaknya : 2-3x ganti pembalut per hari
 - 5) Teratur/ tidak teratur : teratur
 - 6) Sifat darah : encer
 - 7) Dismenore : tidak ada
- d. Riwayat perkawinan
- Ibu menikah 1x secara sah dengan Tn “S” pada tahun 2009, saat Ny “R” berusia 20 tahun dan Tn “S” berusia 22 tahun
- e. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu

Tabel 3.5

Riwayat Kehamilan dan Persalinan yang Lalu

No	Tahun	Jenis partus	Jenis kelamin	BBL	PBL	Tempat partus	Penolong	Keadaan
1	2009	Persalinan pervaginam	Laki-laki	2,800 gram	50 cm	Puskesmas	Bidan	Baik
2	2014	Persalinan pervaginam	Perempuan	3000 gram	51 cm	Puskesmas	Bidan	Baik

- a. Riwayat nifas yang lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresibsetelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas, seperti

keluar cairan yang berbau busuk, pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui anak pertamanya secara eksklusif selama 6 bulan dan ditambah makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan ke atas.

b. Riwayat kehamilan sekarang

- 1) Hari pertama haid terakhir tanggal 25 september 2017
- 2) Hari tafsiran persalinan tanggal 3 juli 2018
- 3) Umur kehamilan 38 minggu 4 hari
- 4) Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan
- 5) Ibu merasakan pergerakan janinnya berkurang dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang.
- 6) Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di BPS
 - Trimester I : 2x
 - Trimester II : 2x
 - Trimester III : 2x
- 7) Ibu telah mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 2 kali
 - TT I : 23 desember 2017 di PKM
 - TT II : 18 april 2018 di PKM

Keluhan-keluhan:

 - Trimester I : mual muntah di pagi hari
 - Trimester II : tidak ada keluhan
 - Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah

8) Penyuluhan

Ibu belum pernah mendapat penyuluhan selama kehamilannya

c. Riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu

- 1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes melitus, asma, dan hipertensi.
- 2) Tidak ada riwayat penyakit menular: tuberculosis, malaria, hepatitis dan penyakit menular seksual.
- 3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan.
- 4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah diopname di Rumah sakit maupun di Puskesmas.

d. Riwayat penyakit keluarga

- 1) Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, asma dan penyakit keturunan lainnya.

e. Riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual

- 1) Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami.
- 2) Hubungan ibu dengan suami, keluarga, maupun tetangga baik.
- 3) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami.
- 4) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.

f. Riwayat KB

Sejak kelahiran anak keduanya yaitu pada tahun 2014 ibu mulai menjadi akseptor KB depo progestin/ suntik 3 bulan dan berhenti pada bulan agustus tahun 2017 dengan alasan ingin hamil lagi.

g. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1) Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan :

- a) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- b) Frekuensi : 3 kali sehari
- c) Kebutuhan minum : 6-8 gelas per hari

Selama inpartu:

- a) Ibu makan, tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum

2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

- a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amoniak.
- b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu:

- a) BAK : Ibu BAK di tempat tidur karena telah terpasang popok
- b) BAB : Ibu belum BAB (BAB terakhir ibu pada jam 02.00 wita dirumahnya)

3) Personal hygiene

Kebiasaan:

- a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b) Sikat gigi : 2 kali (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi

c) Keramas : 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo

d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu:

a) Ibu belum mandi dan sikat gigi

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan : Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu : Ibu tidak pernah tidur

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Hari tafsiran persalinan tanggal 3 juli 2018
4. Usia gestasi 38 minggu 4 hari
5. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah : 120/80 mmHg Pernapasan : 20 kali per menit

Nadi : 80 kali per menit Suhu : 36,8 °C (axilla)

6. Tinggi badan : 158 cm
7. Berat badan sebelum hamil : 47 kg
8. Berat badan sekarang : 60 kg
9. Lingkar lengan atas (LILA) : 26 cm
10. Pemeriksaan fisik (*Head To Toe*)
 - a. Kepala : bersih, tidak ada ketombe, tidak rontok, rambut hitam dan lurus, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

- b. Wajah : tidak pucat, tidak ada *chloasma gravidarum*, tidak *oedema*, tidak ada nyeri tekan
- c. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih, kelopak mata tidak bengkak
- d. Hidung : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak pengeluaran secret, tidak *oedema*, tidak ada nyeri tekan, tidak ada polip
- e. Mulut dan gigi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada stomatitis, gusi tidak berdarah, dan tidak ada gigi yang tanggal
- f. Telinga : simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran serumen, tidak ada peradangan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
- g. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, kelenjar limfe dan vena jugularis
- h. Payudara : payudara simetris kiri dan kanan, puting susu bersih dan menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, terdapat pengeluaran kolostrum jika puting susu dipencet
- i. Abdomen : Leopold I : 3 jari di bawah *processus xiphoideus* (tinggi fundus uteri 33 cm), teraba bokong
- Leopold II : punggung kiri (puki)
- Leopold III : kepala
- Leopold IV : bergerak dalam panggul (4/5)
- LP : 92 cm

TBJ : 3.036 gram

Denyut jantung janin : terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146 kali per menit

His : 2x dalam 10 menit durasi 30-35 detik

- j. Ekstremitas atas : jari lengkap, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
- k. Ekstremitas bawah : tidak ada varises, pergerakan aktif, tidak ada benjolan, tidak oedema
- l. Genitalia dan anus : tidak ada varises, nampak pengeluaran lendir dan air ketuban, tidak ada oedema, tidak ada hemorroid

11. Pemeriksaan dalam

Vaginal Toucher (VT) tanggal 23 juni 2018 , jam 08:30 wita

- a. Vulva dan vagina : tidak ada kelainan
- b. Portio : tebal/ lunak
- c. Pembukaan : 5 cm
- d. Ketuban : jernih
- e. Presentase : ubun-ubun kecil kanan lintang
- f. Penurunan : Hodge II
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, darah dan air ketuban

12. Pemeriksaan inspekulo

Tanggal 23 juni 2018 , jam 08:50 wita

Hasil pemeriksaan inspekulo yaitu terdapat pengeluaran air ketuban yang keluar dari kanalis servikalis.

13. Pemeriksaan tes *valsava*

Tanggal 23 juni 2018 , jam 09:00 wita

Hasil pemeriksaan tes *valsava* (pembuangan napas/ekspirasi paksa dengan menutup bibir dan hidung) yaitu terdapat pengeluaran air ketuban

14. Pemeriksaan penunjang

1. Pemeriksaan USG

Tanggal 23 juni 2018 , jam 08:20 wita oleh dokter R Sp.OG di Poliklinik KIA

- 1) GIII PII A0 gravid tunggal, hidup
- 2) Letak : kepala
- 3) FHR : 0 bpm
- 4) TBJ : \pm 2.950 gram
- 5) UK : \pm minggu, TP: \pm
- 6) Plasenta di *posterofundal grade 1*
- 7) Oligohidramnion

2. Pemeriksaan laboratorium

Tanggal 23 juni 2018 , jam 09:10 wita

- 1) WBC (*White Blood Cell*) : $.4 \times 10^3 / \mu\text{L}$

Leukosit (*White Blood Cell / WBC*) Leukosit merupakan komponen darah yang berperan dalam memerangi infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun proses metabolik toksin, dll. Nilai normal leukosit berkisar 4.000 - 10.000 sel/ul darah.

2) RBC (*Red Blood Cell*) : $3.21 \times 10^3 / \mu\text{L}$

Eritrosit (*Red Blood Cell / RBC*) Eritrosit atau sel darah merah merupakan komponen darah yang paling banyak, dan berfungsi sebagai pengangkut / pembawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan membawa kardondioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Nilai normal eritrosit pada pria berkisar 4,7 juta - 6,1 juta sel/ul darah, sedangkan pada wanita berkisar 4,2 juta - 5,4 juta sel/ul darah

3) HGB : 10,5g/dl

Hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transport oksigen dari paru paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan tubuh ke paru paru. Kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah berwarna merah.

4) HCT : 29.05%

Hematokrit merupakan ukuran yang menentukan banyaknya jumlah sel darah merah dalam 100 ml darah yang dinyatakan dalam persent (%).

Nilai normal hematokrit untuk pria berkisar 40,7% - 50,3% sedangkan untuk wanita berkisar 36,1% - 44,3%.

5) MCV (*Mean Corpuscular Volume*) : 90.3fL

MCV (*Mean Corpuscular Volume*) atau Volume Eritrosit Rata-rata (VER), yaitu volume rata-rata sebuah eritrosit yang dinyatakan dengan femtoliter (fl)

$$\text{MCV} = \frac{\text{Hematokrit}}{\text{Eritrosit}} \times 10$$

Nilai normal = 82-92 fl

6) MCH (*Mean Corpuscular Hemoglobin*) : 32.7pg

MCH (*Mean Corpuscular Hemoglobin*) atau Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (HER), yaitu banyaknya hemoglobin per eritrosit disebut dengan pikogram (pg)

$$\text{MCH} = \frac{\text{Hemoglobin}}{\text{Eritrosit}} \times 10$$

Nilai normal = 27-31 pg

7) MCHC (*Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration*) : 36.2g/dL

MCHC (*Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration*) atau Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (KHER), yaitu kadar hemoglobin yang didapat per eritrosit, dinyatakan dengan persen (%) (satuan yang lebih tepat adalah "gr/dl")

$$\text{MCHC} = \frac{\text{Hemoglobin}}{\text{Hematokrit}} \times 100$$

Nilai normal = 32-37 %

8) Protein : negative

Untuk mengetahui kadar protein dalam urin dan juga untuk mengetahui apakah pasien mengalami eklamsi.

9) Reduksi : negatif

Tujuan dari tes ini adalah untuk mendiagnostik ada atau tidaknya glukosa di dalam urine. Apa bila ada maka pasien mengalami penyakit diabetes militus.

10) HbsAg : negative

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mendiagnosa infeksi virus Hepatitis B ataupun sebagai penanda awal infeksi penyakit ini.

ASSESSMENT

Diagnosa : GIII PII A0, gestasi 38 minggu 4 hari, intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin dalam pengawasan, inpartu kala I fase aktif dengan KPD. Masalah aktual : KPD. Masalah potensial : Pada ibu, yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, infeksi *puerperalis*/ masa nifas, *dry labour*/ partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal, sedangkan pada janin, yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati premturit, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, *prolaps funiculli* / penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, prolaps uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal

PLANNING (P)

Tanggal 23 juni 2018 , jam 08:30 wita

1. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Hasil : ibu telah mengetahui keadaannya sekarang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (djj) dan his tiap 1 jam pada kala I fase aktif dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan tiap 30 menit.

Tabel 3.6

Observasi TTV, DDJ dan His

N0	JAM	TD	N	S	pernafasan	DJJ	HIS
1	09:00	120/80	80	36,6 °C	20x/i	144	2x dalam 10 menit (30-35)
2	09:30		84		20x/i	148	3x dalam 10 menit (35-40)
3	10:00		84		20x/i	142	3x dalam 10 menit (35-40)
4	10:30		82		20x/i	148	4x dalam 10 menit (40-45)
5	11:00		84		20x/i	168	4x dalam 10 menit (45-50)
6	11:30	120/80	84	36,6 °C	20x/i	174	5x dalam 10 menit (50-55)

1. Pemantauan DJJ terakhir didapatkan DJJ abnormal

Hasil: 174x/ menit

2. Segera memasang oksigen untuk ibu dalam jumlah 6-8 l/menit, kemudian hentikan pemberian cairan infus RL.

Hasil: Terlaksana

3. Melakukan *vaginal toucher* (VT) kontrol, jam 11.30 wita

- a. Vulva dan vagina : membuka
- b. Portio : melesap
- c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
- d. Ketuban : kering
- e. Presentasi : ubun-ubun kecil didepan symphysis
- f. Penurunan : hodge IV
- g. Molase : tidak ada
- h. Penumbungan : tidak ada
- i. Kesan panggul : normal
- j. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

4. Mengajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, ibu menarik napas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi

Hasil : ibu telah melakukannya

5. menganjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin

Hasil : kandung kemih telah kosong

6. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian oksigen untuk ibu dalam jumlah 6-8 l/menit, kemudian hentikan pemberian cairan infus

RL., misoprostol 1/8 tab pervaginam dan antibiotik cefotaxime 1gr/ IV sesuai intruksi dokter

Hasil : oksigen telah dipasang pada jam 11.30 wita dan infuse RL telah dihentikan, misoprostol 1/8 tab telah berada didalam vagina ibu pada jam 08.35 wita, dan injeksi cefotaxime telah diberikan pada jam 08.40 wita

7. Memberi makan dan minum jika tidak ada his

Hasil : ibu telah diberi makan dan minum disela-sela his

8. Menganjurkan kepada ibu untuk senangtiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti

Hasil : ibu selalu beristighfar saat ibu merasakan sakit akibat kontraksi

9. Mencatat dalam partograf

Hasil : partograf telah dilengkapi

B. KALA II

DATA SUBJEKTIF

1. Sakitnya bertambah kuat dan tembus kebelakang
2. Ibu merasa ingin buang air besar
3. Adanya dorongan kuat untuk meneran
4. Adanya tekanan pada anus

DATA OBJEKTIF

1. Perineum menonjol
2. Vulva dan vagina membuka
3. His 5x dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik

4. Pembukaan 10 cm (lengkap)
5. Penurunan kepala hodge IV (0/5)
6. Pelepasan lendir, darah, mekonium dan air ketuban

ASSESSMENT

Perlangsungan kala II

PLANNING

Tanggal 23 juni 2018 , jam 11:30 wita

1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala dua (dorongan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

Hasil : tanda dan gejala kala II telah dirasakan

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukan alat suntik sekali pakai 3 ml ke dalam wadah partus set. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pertolongan persalinan yaitu :

- a. Partus set

Partus set terdiri atas 2 klem kocher, ½ kocher, 1½ handscoon steril, kateter nelaton, penjepit tali pusat, kasaa steril, spoit 3 cc dan gunting tali pusat.

- b. Hecting set

Hecting set terdiri atas nelvuder, catgut, jarum, pinset anatomi, pinset sirurgi, dan gunting benang

- c. Obat dan bahan

Obat dan bahan terdiri atas cairan infus, oksitosin, lidokain, salep mata, vitamin K, hepatitis B dan betadin.

d. Diluar partus set

Adapun yang harus disiapkan diluar partus set yaitu air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi, larutan klorin 0,5%, tempat sampah, delee, lenek, perlak, handuk kering, tensimeter, stetoskop dan termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri terdiri dari topi, masker, kacamata, celemek, handscoon, alas kaki tertutup/ sepatu boot

3. Memakai celemek plastik

Hasil : celemek telah dipakai

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Hasil : perhiasan telah disimpan dan tangan telah bersih

5. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Hasil : sarung tangan telah dipakai pada tangan kanan

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.

Hasil : oksitosin 1 ampul telah berada didalam wadah partus set

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang, dengan gerakan dari depan ke belakang dari vulva ke perineum.

Hasil : vulva dan perineum telah bersih

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Periksa dalam tanggal 23 Juni 2018, jam 11.30 wita

- a. Vulva dan vagina : membuka
 - b. Portio : melesap
 - c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
 - d. Air ketuban : kering
 - e. Presentasi : ubun-ubun kecil didepan symphysis
 - f. Penurunan : hodge IV
 - g. Molase : 0
 - h. Penumbungan : tidak ada
 - i. Kesan panggul : normal
 - j. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban
9. Mencelupkan handscoon ke dalam larutan klorin 0,5% dengan teknik terbalik, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

Hasil : sarung tangan telah direndam dalam larutan klorin 0,5 % secara terbalik

10. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai dan ternyata denyut jantung yang didapatkan diatas normal dengan frekuensi 174 kali per menit.

Hasil : denyut jantung janin terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 174 kali per menit.

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin dalam pengawasan, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman).

Hasil : ibu dalam posisi setengah duduk

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Hasil : telah dilakukan pimpinan meneran

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

Hasil : ibu tetap dalam posisi setengah duduk karena sakitnya yang bertambah sering

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Hasil : handuk bersih telah diletakkan diatas perut ibu

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu atau gunakan *underpad*.

Hasil : *underpad* telah terpasang dibawah bokong ibu

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

Hasil : alat telah lengkap

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan.

Hasil : sarung tangan telah dipakai pada kedua tangan

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu. Setelah itu kita melakukan perasat stenon (perasat untuk melindungi perineum dngan satu tangan, dibawah kain bersih dan kering, ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum).

Hasil : kepala telah lahir

20. Setelah kepala keluar, menyeka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin

Hasil : tidak terjadi lilitan tali pusat

21. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Hasil : kepala bayi telah melakukan putaran paksi luar

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental, menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul dibawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.

Hasil : kedua bahu telah lahir

23. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.

Hasil : lengan dan badan telah lahir

24. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah (selipkan jari telunjuk tangan kiri diantara kedua lutut janin)

Hasil : seluruh badan telah lahir

25. Melakukan penilaian selintas :

- a. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan?
- b. Apakah bayi bergerak aktif ?

Hasil : bayi lahir spontan tanggal 23 Juni 2018, jam 11:40 wita, dengan segera menangis dan bernapas tanpa bantuan, bergerak dengan tidak aktif, terdapat fleksi pada ekstremitas dan APGAR *score* 8/10.

26. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering serta membiarkan bayi di atas perut ibu

Hasil : ibu telah diselimuti dengan handuk bersih dan kering, serta telah berada di atas perut ibu

C. KALA III

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu lelah setelah melahirkan
2. ibu merasakan nyeri perut bagian bawah

DATA OBJEKTIF

1. Bayi lahir spontan tanggal 23 juni 2018, jam 11:40 wita
2. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
4. Perdarahan \pm 150 cc
5. Kala II berlangsung selama \pm 10 menit tanpa ada penyulit serta tali pusat masih nampak di vulva

ASSESSMENT

Perlangsungan kala III

PLANNING

Tanggal 23 juni 2018, jam 11:40 wita

1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Hasil : bayi tunggal

2. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Hasil : ibu bersedia untuk disuntik

3. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Hasil : oksitosin telah disuntikkan di 1/3 paha atas bagian distal lateral

4. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Hasil : tali pusat telah dijepit

5. Memotong dan mengikat tali pusat (dengan satu tangan mengangkat tali pusat yang telah dijepit, kemudian melakukan pengguntingan tali pusat sambil melindungi perut bayi diantara 2 klem

Hasil : tali pusat telah dipotong

6. Mengikat tali pusat dengan benang desinfeksi tingkat tinggi atau steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya atau menjepit tali pusat dengan penjepit tali pusat

7. Hasil : tali pusat telah dijepit

8. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Hasil : bayi telah diselimuti dengan kain hangat dan topi telah terpasang di kepala

9. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Hasil : klem telah dipindahkan

10. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

Hasil : satu tangan telah berada diatas perut ibu dan tangan lainnya meregangkan tali pusat

11. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati kearah dorso kranial.

Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangkan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Hasil : dorso kranial telah dilakukan

12. Melakukan peregangkan dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah

sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Hasil : plasenta telah terlepas dari tempat implantasinya

13. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Hasil : plasenta dan selaput ketuban telah lahir

14. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Hasil : kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar

15. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Hasil : plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 07 Juli 2017, jam 21.20 wita

16. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Hasil : terjadi ruptur tingkat II dan telah dijahit luar dan dalam sebanyak 6 jahitan secara jelujur

17. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Hasil : uterus berkontraksi baik (teraba keras dan bundar)

18. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Hasil : IMD telah dilakukan

19. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/ pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.

Hasil : berat bayi lahir 3000 gram, panjang bayi lahir 48 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 32 cm, lingkar perut 31 cm, APGAR *score* 8/10, dan telah disuntik vitamin K (IM) dipaha kiri anterolateral

20. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

Hasil : hepatitis B telah disuntikkan dipaha kanan anterolateral

D. KALA IV

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu lelah setelah selesai persalinannya
2. Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah

DATA OBJEKTIF

1. Ibu tampak lelah setelah menjalani persalinannya
2. Plasenta lahir lengkap tanggal 23 Juni 2018, jam 11:50 wita

3. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
4. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
5. Perdarahan \pm 150 cc
6. Kandung kemih kosong

ASSESSMENT

Perlangsungan kala IV dengan kelelahan

PLANNING

Tanggal 23 Juni 2018, jam 11:50 wita

1. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam.
2. Hasil : kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
3. Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.
4. Hasil : ibu telah melakukannya
5. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, setiap 15 menit selam 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam ke 2 pasca persalinan

Hasil:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 3.7

Observasi Perdarahan

Jam	Jumlah perdarahan
12:05	100 cc
12:20	50 cc
12:35	30 cc
12:50	20 cc
13:20	10 cc
13:50	5 cc

Total ± 215 cc

6. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pasca persalinan.

Tabel 3.8

Observasi TTV, TFU, Kontraksi dan Kandung Kemih

Jam	TD	N	S	Tinggi fundus uteri	Kontraksi	Kandung kemih
12:05	120/80	78	36,8 °C	Setinggi pusat	Baik	Kosong
12:20	120/80	80		Setinggi pusat	Baik	Urin ± 50 cc
12:35	120/80	78		Setinggi pusat	Baik	Urin ± 50 cc
12:50	120/80	82		Setinggi pusat	Baik	Urin ± 50 cc
13:20	120/80	80	36,6 °C	Setinggi pusat	Baik	Urin ± 100 Cc
13:50	120/80	82		Setinggi pusat	Baik	Kosong

7. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

Hasil : bayi bernapas dengan normal yaitu 50 kali per menit

8. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.

Hasil : alat sudah dilarutkan dalam larutan klorin 0,5 %, telah dicuci dan telah bersih

9. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.

Hasil : Sampah yang terkontaminasi telah dibuang ketempat sapah.

10. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi.

Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai
memakai pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu telah dalam keadaan bersih

11. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu
apabila ibu ingin minum.

Hasil : ibu telah nyaman dan telah makan dan minum

12. Bersihkan tempat persalinan dengan menggunakan lap bersih dan larutan
klorin 0,5%.

Hasil : tempat bersalin telah di bersihkan

13. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan
sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin
0,5.

Hasil : sarung tangan telah dicelupkan di didalam larutan klorin 0,5 % dalam
keadaan terbalik

14. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Hasil : kedua tangan telah bersih

15. Melengkapi partograf

Hasil : partograf telah dilengkapi

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesenjangan yang terjadi antara tinjauan pustaka dan studi kasus dalam penerapan proses asuhan kebidanan intranatal pada Ny “N” dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 23 Juni 2018. Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dari asuhan yang nyata dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari tujuh langkah.

A. Langkah Identifikasi data dasar

Dalam pengkajian yang dimulai dari pengumpulan data berupa anamnesa serta data-data yang dapat ditemukan saat melakukan anamnesa yang dapat mendukung terjadinya kasus tersebut. Setelah dilakukan anamnesa, dilakukan pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Selain pemeriksaan fisik, juga dilakukan pemeriksaan dalam untuk memantau kemajuan persalinan, khususnya untuk memastikan pecahnya selaput ketuban. Pemeriksaan yang lain yaitu pemeriksaan inspekulo dan pemeriksaan tes *valsava*. Tes *valsava* dilakukan dengan cara melakukan ekspirasi paksa dengan menutup mulut dan hidung yang akan menambah tekanan pada telinga dan tekanan pada bagian fundus, sehingga jika terjadi KPD, maka air ketuban akan keluar. Kemudian pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan USG untuk mendukung hasil pemeriksaan.

Dalam tahapan pengkajian, penulis tidak mendapat hambatan. Hal ini karena respon kooperatif ibu yang dapat menerima kehadiran penulis saat pengumpulan data sampai tindakan yang diberikan. Ibu menunjukkan sikap terbuka dan menerima anjuran serta saran yang diberikan oleh penulis maupun tenaga medis lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan. Pada kasus Ny “N”, didapatkan riwayat keluhan masuk Rumah Sakit ibu dirujuk oleh bidan dari Puskesmas berupa terdapat pengeluaran air ketuban dari jalan lahir pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 03:00 wita, dan belum ada kontraksi.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 2 cm, air ketuban merembes dan berwarna jernih. Selain itu, data yang didapatkan dari seorang bidan yang merujuk yaitu riwayat pemeriksaan tes lakmus di Puskesmas yaitu kertas lakmus berubah menjadi biru, yang menandakan pelepasan air yang keluar yaitu air ketuban. Tindakan yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf yakni pengumpulan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk Rumah Sakit, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu.

Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (*head to toe*), pemeriksaan dalam, pemantauan DJJ, pemeriksaan inspekulo dan pemeriksaan tes *valsava*. Terakhir yaitu

pemeriksaan penunjang yang terdiri dari Pemeriksaan USG, dan pemeriksaan laboratorium (sampel darah).

1. Meskipun terdapat perbedaan antara riwayat tindakan yang dilakukan di Puskesmas dengan tindakan yang dilakukan di Rumah Sakit, yaitu pemeriksaan tes lakmus yang dilakukan di Puskesmas dan pada umumnya pemeriksaan kertas lakmus di Rumah Sakit tidak dilakukan pada kasus KPD. Meskipun demikian, riwayat tindakan yang telah dilakukan di Puskesmas yang berbeda dengan tindakan yang dilakukan di Rumah Sakit, hal tersebut dapat saling membantu untuk pengumpulan data dalam menegakkan diagnosis. KPD merupakan pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm.
2. Sedangkan dikatakan gawat janin apabila denyut jantung janin (DJJ) kurang dari 100 permenit atau lebih dari 180 permenit dan air ketuban hijau kental dan terdapat mekonium pada pemeriksaan dalam. Pada langkah pertama, penulis tidak mendapatkan kesenjangan antara teori dan kasus yang terjadi dilapangan.

Penulis selalu memberikan dukungan religius kepada Ny "N" dengan cara menganjurkan ibu agar selalu mengingat Allah swt. Seperti berdzikir dan bersholawat.

B. Langkah II identifikasi diagnosa/ masalah aktual

Dalam menegakkan suatu diagnosa kebidanan, didukung dan ditunjang oleh beberapa data, dan dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah

dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahannya.

Pada kasus Ny”N”, telah dilakukan pengumpulan data subjektif, data Objektif, maupun data penunjang, sehingga berdasarkan data yang didapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa diagnosa atau masalah aktual yang dirumuskan yaitu KPD disertai gawat janin. Oleh karena itu, tidak terdapat kesenjangan antara teori dan data yang diperoleh.

Kasus Ny “N” merupakan kasus dalam pengawasan bidan, penulis selalu mendampingi pasien agar selalu tenang dan berserah diri kepada, serta senantiasa berdoa agar persalinannya dilancarkan.

C. Langkah III antisipasi diagnosa/ masalah potensial

Pada perumusan diagnosa/ masalah potensial akan dibahas tentang kemungkinan terjadi hal yang lebih fatal apabila apa yang menjadi masalah aktual tidak segera ditangani. Pada tinjauan pustaka, masalah potensial yang dapat terjadi yaitu infeksi *intrapartal/* dalam persalinan, infeksi *puerperalis/* masa nifas, *drylabour/* partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan *operatif obstetric* (khususnya SC), morbiditas dan mortalita maternal. Sedangkan pada janin yaitu prematuritas (*respiratory distress syndrome, hypothermia neonatal feeding problem, retinopathy*

of preterm, intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, brain disorder (and risk of cerebral palsy, hyperbilirubinemia, anemia, sepsis), prolaps funiculi/ penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder (kompresi tali pusat, *prolaps uteri, dry labour /* partus lama, APGAR score rendah, *ensefalopaty, cerebral palsy,* perdarahan *intracranial, renal failure, respiratory distress*), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marmi dkk, 2016 : 105-106).

Pada kasus ini, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi yang mungkin akan terjadi pada ibu karena sudah dilakukan penanganan ibu bersalin atas indikasi KPD dengan tindakan pemasangan infus, pemberian obat uterotonika dan pemberian obat antibiotik telah sesuai dengan teori, sehingga tidak ada diagnosa potensial terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus. Tetapi pada kasus KPD ini terjadi gawat janin yang mengharuskan mendapat pertolongan dengan pemberian oksigen untuk ibu.

Penulis menjelaskan tentang betapa pentingnya tehnik relaksasi jika kontraksi terjadi, yaitu dengan menghirup udara lewat hidung dan menghembuskannya lewat mulut seperti orang meniup-niup. Serta menganjurkan ibu untuk selalu mengingat Allah swt. Dan tetap berdoa agar ibu dan bayinya baik-baik saja.

D. Langkah IV identifikasi perlunya tindakan segera/ kolaborasi

Beberapa data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera yang harus dilakukan guna untuk menyelamatkan klien. Tindakan tersebut berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional (dokter obgyn). Pada tinjauan

pustaka, tindakan segera/ kolaborasi pada KPD dan gawat janin adalah mengkolaborasikan dengan dokter untuk pemasangan infus RL, pemasangan oksigen, pemberian uterotonika dan pemberian antibiotik. Menurut teori jika usia kehamilan 32 – 37 minggu, sudah inpartu, tidak ada infeksi, berikan *tokolitik (salbutamol)*, *deksametason*, dan induksi sesudah 24 jam. Sedangkan jika usia kehamilan 32 – 37 minggu ada infeksi, beri antibiotic dan lakukan induksi, serta nilai tanda – tanda infeksi (suhu, *leukosit*, tanda – tanda infeksi *intrauterine*) (Prawirohardjo:68,2014).

Pada studi Ny “N” tindakan segera yang dilakukan adalah kolaborasi dengan dokter dalam menangani persalinan dengan KPD disertai gawat janin yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit, pemasangan oksigen kepada ibu dalam jumlah 6-8 L/menit pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam, pemberian antibiotic cefotaxime 1 gr/ IV dan memantau keadaan ibu dan janin sampai persalinan berlangsung normal. Dalam kasus ini ada perbedaan yang ditemukan antara teori dan tindakan yang diberikan pada Ny “N” yang tetap mengacu pada tindakan yang rasional sesuai kebutuhan klien. Ini membuktikan bahwa antara teori dan tindakan yang dilakukan penulis mendapatkan perbedaan pemberian obat pada pasien dengan kasus KPD disertai gawat janin. Seperti halnya yang diketahui dalam teori pasien dengan KPD jika usia kehamilan 32 – 37 minggu, sudah inpartu, tidak ada infeksi, maka akan diberikan *tokolitik (salbutamol)*, *deksametason*. Sedangkan tindakan yang dilakukan yaitu dokter memberikan antibiotic cefotaxime yang terdapat infeksi pada kasus Ny”N”, ini karena cefotaxime antibiotic yang mempunyai daya bakterisid yang digunakan sebagai bagian pertama pada bakteri yang resisten terhadap penyembuhan

infeksi. Serta dokter memberikan pemasangan misoprostol. Ini membuktikan bahwa penanganan yang diberikan pada kasus ini terdapat perbedaan antara teori dengan tindakan.

Pada kasus Ny “N” dengan ketuban pecah dini disertai gawat janin ini, penulis selalu memberikan pencerahan-pencerahan keislaman, serta menganjurkan ibu untuk terus berdoa dan berserah diri kepada Allah swt. Agar ibu dan bayinya baik-baik saja serta persalinannya dilancarkan tanpa adanya hambatan lagi.

E. Langkah V rencana tindakan

Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Pada studi kasus Ny “N”, penulis merencanakan tindakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial yang akan terjadi, rencana tersebut yaitu pemasangan infus RL 28 tetes per menit, Memberikan oksigen kepada ibu dalam jumlah 6-8 L/menit, pemasangan cytotec 1/8 tab pervaginam, pemberian antibiotik cefotaxime 1 gr/ IV dan memantau keadaan ibu dan janin sampai persalinan berlangsung normal. Dalam rencana tindakan asuhan kebidanan pada kasus Ny “N”, tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada dilapangan.

Memastikan agar Ny “N” tetap tenang dan optimis dalam menghadapi persalinannya, serta selalu berdoa, berzdikir, dan bersholawat agar apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah swt.

F. Langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan

Semua rencana telah dilaksanakan seluruhnya dengan menyesuaikan kondisi, keadaan dan kebutuhan ibu, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2018 di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, penulis tidak menemukan hambatan, karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek.

Ny "N" beserta keluarganya senantiasa bersyukur terlebih lagi atas apa yang dialaminya sekarang, serta selalu melantunkan ayat-ayat suci al-quran kepada telinga bayinya yang baru lahir.

G. Langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan

Adapun evaluasi yang dimaksudkan untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang dilakukan berdasarkan tujuan kriteria yang diberikan kepada Ny "N" di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 23 Juni 2018 yaitu pada kala I berlangsung tidak lebih dari 7 jam, keadaan ibu baik dan tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu tetapi terjadi kegawatan pada bayi. Selanjutnya yaitu kala II juga berlangsung normal tanpa ada penyulit, bayi lahir spontan tanggal 23 Juni 2018, jam 11: 40 wita, menangis kuat, bernapas tanpa kesulitan, tidak bergerak aktif karena terjadi fleksi pada ekstremitas, serta seluruh badan berwarna merah muda. Pada kala III, tidak ada penyulit dan berlangsung normal, berlangsung \pm 10 menit, kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 23 Juni 2018, jam 11:50 wita, TFU setinggi pusat, perdarahan \pm 150 cc, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar),

serta keadaan ibu dan bayi baik. Terakhir yaitu kala IV atau kala pengawasan, pada kala IV kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), jumlah perdarahan \pm 215 cc, kandung kemih kosong dan keadaan ibu dan bayi baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari kala I sampai dengan kala IV, semuanya berlangsung hampir normal, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu namun terjadi kegawatan pada janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.

Setelah persalinan berlangsung hampir normal, Ny "N" sangat bersyukur dan bahagia dengan kelahiran bayinya. Senantiasa selalu berdzikir dan berdoa agar bayinya menjadi anak yang sholeh.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny “N” dengan ketuban pecah dini (KPD) disertai gawat janin di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 23 Juni 2018, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran-saran.

A. *Kesimpulan*

3. Terdapat beberapa pengertian tentang KPD, jika dilihat dari pembukaan serviks, maka KPD diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan serviks pada primipara kurang dari 3 cm dan pada multipara kurang dari 5 cm. Sedangkan jika dilihat dari kapan pecahnya ketuban, maka KPD dapat diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan dan ditunggu satu jam belum dimulainya tanda persalinan. Sedangkan dikatakan gawat janin apabila denyut jantung janin (DJJ) kurang dari 100 permenit atau lebih dari 180 permenit dan air ketuban hijau kental disertai adanya mekonium pada pemeriksaan dalam.
4. Setelah dilakukan pengkajian pada tanggal 23 Juni 2018, maka ditemukan bahwa tidak ada penyulit bagi ibu tetapi terjadi kegawatan pada janin dan keadaan ibu baik serta janin dalam masa pengawasan yang dilihat bahwa tanda-tanda vital dalam batas normal, tekanan darah: 120/80 mmHg, nadi: 80x/ menit, pernapasan: 20x/ menit, S: 36,8°C, dan pemantauan denyut

jantung janin dengan frekuensi 186x/ menit. Ibu melahirkan pada tanggal 23 Juni 2018 pukul 11:40 wita dengan berat bayi lahir 3000 gram, panjang bayi lahir 49 cm, lingkaran kepala 33 cm, lingkaran dada 32 cm, lingkaran perut 31 cm.

5. Pada pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny "N" mulai dari pengkajian sampai tahap akhir tidak ditemukan adanya hambatan karena adanya kerjasama antara klien dan petugas kesehatan sehingga semua tindakan dapat terlaksana dengan baik.
6. Pendokumentasian sangat penting dilaksanakan pada setiap tahap dari proses manajemen kebidanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Saran untuk bidan

- a. Bidan dalam memberikan asuhan harus sesuai kewenangannya, untuk itu manajemen asuhan kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang membantu seorang bidan dalam memecahkan masalah klien dalam berbagai situasi.
- b. Dalam melaksanakan asuhan kebidanan, bidan harus selalu menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi, guna mencegah terjadinya infeksi pada ibu, juga perlindungan bagi diri sendiri.
- c. Diharapkan seseorang bidan dalam melaksanakan tugasnya diperlukan adanya disiplin waktu dalam memberikan asuhan kepada klien.

2. Saran untuk Rumah sakit

Sebaiknya pihak RSUD Syekh Yusuf Gowa, lebih meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD disertai gawat janin secara optimal melalui penanganan yang cepat dan tepat.

3. Saran untuk institusi

Adapun saran untuk institusi yaitu :


- a. Menyediakan tenaga pengajar yang professional yang dapat membimbing mahasiswa dalam proses belajar mengajar.
- b. Perlu peningkatan pembelajaran di laboratorium khususnya penanganan KPD disertai gawat janin sehingga dapat melakukan suatu tindakan penanganan pada kasus tersebut karena praktek laboratorium sangatlah bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna untuk menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan professional.

4. Saran untuk klien

Adapun saran untuk klien yaitu:

- a. Setiap ibu hamil harus segera datang ke petugas kesehatan bila didapati adanya pengeluaran air yang banyak dari jalan lahir dengan bau amis/ bau khas.

- b. Diharapkan kepada ibu untuk segera ber KB.
- c. Perlunya dukungan dan keterlibatan suami atau anggota keluarga dalam masa nifas merupakan interaksi terus-menerus yang bersifat saling mencintai, pemenuhan keutuhan emosional dan saling membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agatha Maria dan otivi sithi Chandra Sani.2016. “*Hubungan Usia Kehamilan dan Parietas Ibu Bersalin dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini*” Pontianak, Jurnal Vokasi Kesehatan, Vol II, November 1 januari 2016
- Al-Qur’an dan Terjemahan. 2015. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Amru Sofyan. 2013. Rustam Mochtar Sinopsis Obstetri :*Obsterti Fisiologi, Obsterti Patologi*, Jilid 1, Jakarta, EGC
- Andriana Palimbo, Dwi Sogi Sri Redjeki, Arum Kartikasari. 2015. “*Gambaran Faktor Penyebab Terjadinya Asfiksia Neonatorium Pada Bayi Baru Lahir di Ruang Perinatologi RSUD DR. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN.*’ Banjarmasin, Dinamika Kesehatan, Vol 6, no.2, Desember 2015
- Anita Lockhart dan Lyndon Saputra. 2014.*Asuhan Kebidanan Masa Persalinan Fisiologis dan Patologi*, Tangerang Selatan, Binarupa alisara
- Budi Rahayu dan Ayu Novita Sani.2017 . “*Studi Deskriptif Penyebab Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) pada Ibu Bersalin*” Yogyakarta, JNKI, VOL 5, No.2 Tahun 2017
- Eka anisa Mordella dan Pamilih Eko Karyuni.2012.*Buku Ajar Ilmu Kebidanan*, Jakarta, EGC
- Eka Puspita Sari dan Kurnia Dwi Rimandini. 2014.*Asuhan Kebidanan Persalinan (Intranatal care)*, Jakarta Timur, Trans Info Medika
- Elisabethh Siwi Walyani dan Endang Purwoastuti. 2015. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*, Yogyakarta, Pustaka barupress
- Fadlon dan Ahmad Feriyanto. 2013.*Asuhan Kebidanan Patologis*, Jakarta, Salemba Medika
- Fifi Ria Ningsih Safari. 2017.“ *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Umum h. ABD Manan Simatopang Tahun 2016*”, Wahana Inovasi, Vol 6, no. 2
- Hapsari, Ririn. *Agenda 2030 2015*.jakarta : Rutgers WPF Indonesia, 2015. Diakses pada tanggal 02 april 2018.
- Ibnu Pranoto, Yani Widyastuti, Pesto Corry Sihotang, Mina Yumai Santi. 2013.*Patologi Kebidanan*, Yogyakarta, Fitrimaya
- Icesmi Sukarni dan Wahyu. 2013.*Buku Ajar Keperawatan Maternitas*, Yogyakarta, Nuha Medika

- Ina Kuswanti dan Fitria Melina. 2014.*Askeb II Persalinan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Johariyah dan Ema Wahyu Ningrum. 2012.*Buku Ajar Auhan Kebidanan Persalinan dan Bayi baru Lahir*, DKI Jakarta, Trans Info Media
- Lilin Turlina dan Faizatul Ummah. 2013. “*Perinataal Massage And Lateral Position to Prevent the Perinatal Tears On Primipara.*”
- M. Sholeh Kasim. 2010.”*Pemeriksaan Kekeruhan Air Ketuban*”, Semarang, Sari Pediatri, Vol II, No.5, Februari 2010
- Marmi, etno Murti Surya Ningsih. 2014.*Asuhan Kebidanan Patologi*, Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Nita Norma dan Mustika Dwi. 2013. *Asuhan Kebidanan Patologi ‘Teori dan Tinjauan Kasus’*, Yogyakarta, Nuha Medika
- Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, 2017.
- Rohani, Rini Saswita, dan Marisah. 2013.*Asuhan Kebidanan pada Masa Persalinan*, Jakarta, Salemba Medika
- Sarwono Pra Wirohardjo. 2014. *Ilmu Kebidanan*, Jakarta, Bina Pustaka Sarwono Prawiirhardjo
- Shihah, M. Quraish. 2002. “Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an”, Jakarta, Lentera Hati.
- Sitti Aisyah dan Aini Oktarina. 2012. “*Perbedaan Ketuban Pecah Dini Antara Primipara dan Multipara*”, Lamongan, Jurnal Midpra, Edisi 1/2017
- Taufan Nugroho. 2012.*Patologi Kebidanan*, Yogyakarta, Nuha Medika
- Yeyeh Rukiyah dan Lia Yulianti. 2013.*Asuhan Kebidanan 4 (Patologi)—Revisi*, Jakarta Timur, Trans Info Media



PARTOGRAF

DEPARTEMEN AGAMA




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : JL. Sultan Alauddin No.36 Samata – Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

PARTOGRAF

No. Register 46XXXXXX Nama Ibu My N Umur 30 thn G III P II A 0
 No. Puskesmas Tanggal 23 Juni 2018 Jam 08:30 wita Alamat Pakkatto
 Ketuban pecah Sejak jam 03:00 wita mules sejak jam 04:00 wita




Oksitosin U/L tetes/menit

08:30	0	09:30	0	10:30	0	11:30	0
-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Obat dan Cairan IV

Terpapang infusi RL 2l H₂O, pemberian misoprostol 1/8 perkedel dan pemberian oksigen 6 l/menit



Suhu °C

08:30	36,6 °C	09:30	36,6 °C	10:30		11:30	
-------	---------	-------	---------	-------	--	-------	--

Urin

Protein		Aseton		Volume	
---------	--	--------	--	--------	--



CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal: 23 Juni 2018

2. Nama bidan:

3. Tempat Persalinan :
 Rumah Ibu Puskesmas
 Polindes Rumah Sakit
 Klinik Swasta Lainnya :

4. Alamat tempat persalinan :

5. Catatan : rujuk, kala : I / II / III / IV

6. Alasan merujuk :

7. Tempat rujukan :

8. Pendamping pada saat merujuk :
 Bidan Teman
 Suami Dukun
 Keluarga Tidak ada

KALA I

9. Partogram melewati garis waspada : T

10. Masalah lain, sebutkan :

11. Penatalaksanaan masalah Tsb :

12. Hasilnya :

KALA II

13. Episiotomi :
 Ya, indikasi
 Tidak

14. Pendamping pada saat persalinan
 Suami Teman Tidak ada
 Keluarga Dukun

15. Gawat Janin :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a. meurangsang
 b. meningkatkan pemberian cairan ke
 c. 6 / menit

16. Distosia bahu :
 Ya, tindakan yang dilakukan
 a.
 b.
 c.
 Tidak

17. Masalah lain, sebutkan :

18. Penatalaksanaan masalah tersebut :

19. Hasilnya :

KALA III

20. Lama kala III : 1.20 menit

21. Pemberian Oksitosin 10 U im ?
 Ya, waktu : menit sesudah persalinan
 Tidak, alasan :

22. Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
 Ya, alasan :

23. Penegangan tali pusat terkendali ?
 Ya
 Tidak, alasan :

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	12:05	120/90	82x/1	36°C	spirt	baik	20 cc
	12:20	120/90	82x/1		spirt	baik	20 cc
	12:35	120/90	82x/1		spirt	baik	20 cc
	12:50	120/90	82x/1		spirt	baik	20 cc
2	13:20	120/90	82x/1	36°C	spirt	baik	20 cc
	13:50	120/90	82x/1		spirt	baik	20 cc

Masalah kala IV :

Penatalaksanaan masalah tersebut :

Hasilnya :

24. Masase fundus uteri? :
 Ya
 Tidak, alasan :

25. Plasenta lahir lengkap (intact) : Ya
 Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
 a.
 b.

26. Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.

27. Laserasi :
 Ya, dimana : hiperineum
 Tidak

28. Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
 Tindakan :
 Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 Tidak dijahit, alasan :

29. Atoni uteri :
 Ya, tindakan :
 a.
 b.
 c.
 Tidak

30. Jumlah perdarahan : 210 ml

31. Masalah lain, sebutkan :

32. Penatalaksanaan masalah tersebut :

33. Hasilnya :

BAYI BARU LAHIR :

34. Berat badan 3000 gram

35. Panjang 48 cm

36. Jenis kelamin 0/P

37. Penilaian bayi baru lahir : baik / ada penyulit

38. Bayi lahir :
 Normal, tindakan :
 mengeringkan
 menghangatkan
 rangsang taktil
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 Aspiksia ringan/pucat/biru/lemas, tindakan :
 mengeringkan bebaskan jalan napas
 rangsang taktil menghangatkan
 bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 lain, lain sebutkan :

Cacat bawaan, sebutkan :

Hipotermi, tindakan :
 a.
 b.
 c.

39. Pemberian ASI
 Ya, waktu : 1 jam setelah bayi lahir
 Tidak, alasan :

40. Masalah lain, sebutkan :

Hasilnya :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)864924 Fax.(0411) 864923 Samata-Gowa
Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp.(0411)841879 Fax.(0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : B. 1195/FKIK/PP.00.9/04/2018
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Gowa, 17 April 2018

Kepada Yth.
Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mutmainnah
NIM : 70400115037
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intanatal Care Patologi Pada Ny "X" Dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Jalan Lahir dan Gerak Janin.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam
An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 19810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

*Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)864924 Fax.(0411) 864923 Samata-Gowa
Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.(0411) 8221400 Samata-Gowa*

Nomor : B-1943 /FKIK/PP.00.9/ 05 /2018
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Gowa, 24 Mei 2018

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel
di-
Tempai

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswi Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Mutmainnah
NIM	: 70400115037
Judul	: Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Patologi Pada Ibu Dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Jalan Lahir dan Gawat Janin.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan izin untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal Karya Tulis Ilmiah .

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Nur Hilgayan, S.Kep., Ns., M.Kes.
Nip. 19810405 200604 2 003

Terbusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 2832/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2205/FKIK/PP.00.9/07/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUTMAINNAH**
Nomor Pokok : 70400115037
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PATOLOGI PADA IBU DENGAN KETUBAN PECAH DINI DISERTAI GAWAT JANIN DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Juli s/d 16 Agustus 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 16 Juli 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 16-07-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmduisulselprov.go.id> Email : p2t_provusulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Masjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 19 Juli 2018

K e p a d a

Nomor : 070/123/BKB.P/2018

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

T e m p a t

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 2832/S.01/PTSP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Mutmainnah**
Tempat/Tanggal Lahir : Bonto Pajja, 3 November 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Limbung

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PATOLOGI PADA IBUDENGAN KETUBAN PECAH DINI DISERTAI GAWAT JANIN DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA**"

Selama : 16 Juli s/d 16 Agustus 2018
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,

DRS. BAHARUDDIN.T

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal,-



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN STUDY KASUS

Nomor : 184/Diklat.RSUD-SY/VIII /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Mutmainnah
N i m : 70400115037
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Study Kasus di Ruang IGD Maternal RSUD. Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul "**Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Pada Ny " N " Dengan Ketuban Pecah Dini Disertai Gawat Janin Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa**" pada Tanggal 23 Juni 2018 S/D 23 Juni 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 08 Agustus 2018

An. Ketua Diklat
Koordinator bagian Penelitian



Dra. Hj. Rahmah Rauf, Bsc. MMRS
Nip. 19630710 198703 2 019



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : **MUTMAINNAH**

Nim : 70400115037

TTL : Bonto pajja, 03 november 1997

Suku : Makassar

Agama : Islam

Alamat : Palompong, Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng,
Kabupaten Gowa

Nama orang tua

Ayah : Burhan

Ibu : Sittiara

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003-2009 SD Inpres Tebbakang
2. Tahun 2009-2012 SMP Negeri 2 Bajeng
3. Tahun 2012-2015 SMA Negeri 2 Gowa
4. Tahun 2015-2018 UIN Alauddin Makassar