

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA  
KEBIDANAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SEMESTER IV TENTANG PENCEGAHAN  
RUPTUR PERINEUM  
TAHUN 2016**



Karya Tulis Ilmiah

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**OLEH:**

**AMA RIANY LAIN**

**70400113020**

**PRODI KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ama Riany Lain  
NIM : 70400113020  
Tempat/Tanggal Lahir : Kajang, 19 Juni 1995  
Jurusan/ Prodi : Kebidanan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 10 Agustus 2017

Penyusun

  
Ama Riany Lain  
Nim : 70400113020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH**

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tentang Pencegahan Ruptur Perineum Tahun 2016", yang disusun oleh Ama Riany Lain, NIM: 70400113020, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 25 Agustus 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Sabtu, 25 Agustus 2017 M  
3 Dzulhijjah 1438 H

**DEWAN PENGUI:**

- Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc (.....)
- Sekretaris : Firdayanti, S.SiT., M.Keb (.....)
- Pembimbing : dr. Raully Rahmahdani M.Kes (.....)
- Penguji I : Dr. Hj. Sitti Saleha S.SiT., SKM., M.Keb (.....)
- Penguji II : Dra. Hj. Hartini M.HI (.....)



**HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH**

Nama : Ama Riany Lain  
Nim : 70400113020  
Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN  
Alauddin Makassar Semester IV Tentang Pencegahan Ruptur  
Perineum Tahun 2016.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Karya  
Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 8 Agustus 2017

Pembimbing



dr. Raully Rahmadhani, M.Kes  
NIP: 19830707 200912 2 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan baik meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dan dengan keteguhan dan kesadaran Rasulullah yang berusaha menyelamatkan umatnya dari kesesatan, memberikan contoh yang baik untuk semua hamba Allah SWT, penulis panjatkan shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau.

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **“Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tentang Pencegahan Ruptur Perineum Tahun 2016”**. Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dijumpai dalam penulisan Karya Tulis ini, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap penyelesaian, namun berkat bimbingan, bantuan dan dorongan berbagai pihak sehingga Karya Tulis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga nilainya penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta Ahmad Yani Lain dan ibunda tercinta Darmin yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik dan membina penulis dengan

ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah serta do'a yang selalu terucap dalam shalatnya kepada penulis. Demikian juga kepada saudari-saudariku Ahmad Adzan Lain dan Ria Akriany Lain semoga kalian menjadi anak sukses dan membanggakan kesua orangtua, serta kepada seluruh keluargaku yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua.

Selesainya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.SI** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengerahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.
2. Bapak **Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc.** selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu **Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M.Keb** selaku Ketua Prodi Kebidanan sekaligus Penguji I, yang telah menuntun, mendidik dan mengajarkan kepada penulis berbagai disiplin ilmu dan juga senantiasa memberikan

saran dan motivasi dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

4. Ibu **dr. Rauly Rahmadhani, M.Kes**, selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
5. Ibu **Dra. Hj. Hartini, M.Hi**, selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
6. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar terkhusus pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menuntut ilmu dalam Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
7. Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Makassar/Walikota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
8. Kepada para sahabat, teman seperjuangan angkatan 013 prodi kebidanan terkhusus kelas A, adik-adik 014 prodi kebidanan yang telah meluangkan waktu menjadi responden penulis dan orang-orang disekitarku yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat dalam penyusunan KTI ini.

9. Kepada sahabat tercinta Riski Nurfadillah Rusli dan Andi Musyriha Ahdar serta sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, bantuan serta kebersamaannya selama ini dalam suka maupun duka, tanpa kalian tidak ada keceriaan yang berarti.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini oleh karena itu dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk perbaikan dan penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. Akhirnya penulis hanya bisa berdoa dan mengharapkan kiranya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mempunyai nilai ibadah disisi Allah SWT dan semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, Amin Ya Robbal Alamin.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Makassar, Agustus 2017

Penulis

**Ama Riany Lain**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI .....	
HALAMAN PERSETUJUAN KTI .....	
HALAMAN PENGESAHAN KTI .....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
ABSTRAK .....	
ABSTRACT .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
A. Tinjauan Teori tentang Tingkat Pengetahuan.....	
1. Pengertian Pengetahuan.....	
2. Tingkat Pengetahuan.....	
3. Jenis Pengetahuan.....	
4. Pengukuran Pengetahuan .....	

5.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengetahuan .....	
B.	Tinjauan Teori Tentang Persalinan.....	
1.	Pengertian Persalinan .....	
2.	Jenis Persalinan .....	
3.	Sebab-Sebab Terjadinya Persalinan .....	
4.	Tanda-Tanda Persalinan .....	
5.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan.....	
6.	Tahap-Tahap Persalinan .....	
C.	Tinjauan Teori Tentang Ruptur Perineum.....	
1.	Pengertian.....	
2.	Faktor Predisposisi .....	
3.	Klasifikasi Ruptur Perineum .....	
4.	Tingkat Robekan Perineum.....	
5.	Tanda dan Gejala Robekan Perineum.....	
6.	Pencegahan Ruptur Perineum .....	
7.	Komplikasi.....	
8.	Penanganan.....	
D.	Kerangka Teori.....	
1.	Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti.....	
2.	Kerangka Konsep.....	
3.	Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	

**BAB III METODE PENELITIAN.....**

A.	Jenis Penelitian.....	
B.	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	
C.	Populasi dan Sampel.....	
D.	Tekhnik Pengambilan Sampel.....	
E.	Instrumen Penelitian.....	
F.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	
G.	Penyajian Data .....	
H.	Etika Penelitian .....	

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....**

A.	Hasil Penelitian.....	
B.	Pembahasan.....	

**BAB V PENUTUP.....**

A.	Kesimpulan.....	
B.	Saran .....	

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tahun 2016 Tentang Defenisi dan Tingkat Ruptur Perineum .....87
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tahun 2016 Tentang Pencegahan terjadinya Ruptur Perineum.....88
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tahun 2016 Tentang Penanganan Ruptur Perineum..... 89
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tahun 2016 Tentang Pemijatan Perineum..... 89

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Master Tabel Penelitian
- Lampiran II : Lembar Kegiatan Konsultasi
- Lampiran III : Lembar Data dan Persetujuan Responden (*Informed Consent*)
- Lampiran IV : Lembar Kuesioner Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tentang Pencegahan Ruptur Perineum Tahun 2016.
- Lampiran V : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (Kepala UPT P2T, BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran VI : Surat Izin Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Lampiran VII : Surat Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- Lampiran IX : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama** : Ama Riany Lain  
**Nim** : 70400113020  
**Pembimbing** : Raully Rahmadhani  
**Judul** : **Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tentang Pencegahan Rupture Perineum tahun 2016**

---

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, lima besar penyebab kematian ibu adalah perdarahan, eklampsia, infeksi, abortus dan lain-lain. Persalinan dengan ruptur perineum apabila tidak ditangani secara efektif menyebabkan perdarahan dan infeksi menjadi lebih berat, serta pada jangka waktu panjang dapat mengganggu ketidaknyamanan ibu dalam hal hubungan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif, untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa kebidanan Semester IV UIN Alauddin Makassar tentang Pencegahan Rupture Perineum. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semester IV tahun 2016. Pengambilan sampel menggunakan metode total sampling sebanyak 62 responden yang dilaksanakan pada juli-agustus 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan baik mengenai definisi dan tingkatan ruptur perineum yaitu sebesar 90,32% (56 responden) mengenai pencegahan ruptur perineum mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 79,03% (49 responden), adapun mengenai penanganan ruptur perineum hampir semua responden memiliki tingkat pengetahuan yang kurang yaitu sebesar 96,77% (60 responden), begitupun mengenai pemijatan perineum, hampir semua responden memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 91,93% (57 responden).

Kesimpulannya bahwa mayoritas mahasiswa kebidanan Semester IV UIN Alauddin Makassar memiliki tingkat pengetahuan kurang mengenai pencegahan ruptur perineum. Saran penulis yaitu perlunya membangkitkan semangat belajar dari dalam diri mahasiswa dan pengajar serta pembimbing dilahan praktik untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa kebidanan.

Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Rupture Perineum

## ABSTRACT

**Name** : Ama Riany Lain  
**Nim** : 70400113020  
**Preceptor** : Raully Rahmadhani  
**Title** : **Description of Knowledge Level of Midwifery Student UIN Alauddin Makassar Semester IV About Prevention of Perineum Rupture 2016**

---

Based on Indonesia Demographic and Health Survey (SDKI) in 2012, the top five causes of maternal death are bleeding, eclampsia, infection, abortion and others. Labor with perineal rupture if not handled effectively causes bleeding and infection to become more severe, and in the long term may disrupt the discomfort of the mother in terms of sexual intercourse.

This research is descriptive survey research was to find out the level of knowledge of Semester IV midwifery students of UIN Alauddin Makassar concerning Prevention of Perineal Rupture. The population in this study were all students of the Department of Midwifery, Faculty of Medicine and Health Sciences, Alauddin State Islamic University, Makassar, in the fourth semester of 2016. Sampling used a total sampling method of 62 respondents conducted on July-August 2016.

The results showed that the majority of respondents had a good level of knowledge about the definition and level of perineal rupture which amounted to 90.32% (56 respondents) regarding the prevention of perineal rupture, the majority of respondents had a lack of knowledge of 79.03% (49 respondents), as for perineum rupture, almost all respondents have a lack of knowledge that is equal to 96.77% (60 respondents), as well as about perineal massage, almost all respondents have a low level of knowledge that is equal to 91.93% (57 respondents).

The conclusion is that the majority of Semester IV midwifery students at UIN Alauddin Makassar have less knowledge about the prevention of perineal rupture. The author's suggestion is the need to raise the spirit of learning from within students and instructors as well as mentors in the field of practice to increase the knowledge of midwifery students.

Keywords: Level of Knowledge, Perineum Rupture

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau hampir cukup bulan dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lahir lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, 1998). Proses persalinan terdiri dari beberapa tahap yaitu: kala I (pembukaan), kala II (pengeluaran janin), kala III (pengeluaran uri), kala IV (pengawasan 2 jam setelah kelahiran). Proses persalinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jalan lahir, janin, his serta mengejan, dan penolong. Faktor jalan lahir mempunyai peranan penting sebelum, selama maupun sesudah proses persalinan (Walyani dan Purwoastuti, 2015).

Pada persalinan pervaginam sering dijumpai ruptur atau robekan pada jalan lahir. Perineum adalah salah satu jalur yang dilalui pada saat proses persalinan yang dapat robek ketika melahirkan atau secara sengaja digunting untuk melebarkan jalan keluarnya bayi (episiotomi). Robekan perineum merupakan robekan yang terjadi hampir pada semua persalinan pertama yang tidak jarang juga terjadi pada persalinan berikutnya (Nurasiah, dkk, 2012).

Menurut Suwiyoga tahun 2004, akibat perawatan perineum yang tidak benar dapat mengakibatkan kondisi perineum yang terkena lokhea dan



lembab akan sangat menunjang perkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi pada perineum. Munculnya infeksi pada perineum dapat merambat pada saluran kandung kencing ataupun pada jalan lahir yang dapat berakibat pada munculnya komplikasi infeksi kandung kencing maupun infeksi pada jalan lahir (Verby dkk, 2017).

Persalinan dengan ruptur perineum apabila tidak ditangani secara efektif menyebabkan perdarahan dan infeksi menjadi lebih berat, serta pada jangka waktu panjang dapat mengganggu ketidaknyamanan ibu dalam hal hubungan seksual. (Mochtar, 2007; h. 111). Dampak dari terjadinya ruptur perineum pada ibu antara lain infeksi pada luka jahitan, dan dapat merambat pada saluran kandung kemih ataupun pada jalan lahir sehingga dapat berakibat pada munculnya komplikasi infeksi kandung kemih maupun infeksi pada jalan lahir. Selain itu juga dapat terjadi perdarahan karena terbukanya pembuluh darah yang tidak menutup sempurna. Penanganan komplikasi yang lambat dapat menyebabkan terjadinya kematian ibu postpartum mengingat kondisi ibu postpartum masih lemah (Manuaba, 2007).

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, lima besar penyebab kematian ibu adalah perdarahan, eklampsia, infeksi, abortus dan lain-lain. Komplikasi akibat robekan perineum atau ruptur perineum bervariasi mulai dari fistula, hematoma, infeksi, abses, nyeri perineum, dispareuni, inkontinensia ani dan perdarahan. Ruptur perineum merupakan penyebab kedua dari perdarahan post partum. Perdarahan post

partum menyumbang sebesar 40% sebagai penyebab kematian ibu. Tingginya angka kematian ibu hamil, nifas dan bersalin menunjukkan buruknya pelayanan kesehatan, komplikasi tidak hanya terjadi pada masa kehamilan dan bersalin, infeksi pada masa nifas juga menyumbang angka kematian ibu (Depkes RI 2012).

Sebesar 57,93% kematian maternal terjadi pada waktu nifas, pada waktu hamil sebesar 24,74% dan pada waktu persalinan sebesar 17,33%. Sementara berdasarkan kelompok umur, kejadian kematian maternal terbanyak adalah pada usia produktif (20-35 tahun) sebesar 66,96%, kemudian pada kelompok umur >35 tahun sebesar 26,67% dan pada kelompok umur <20 tahun sebesar 6,37% (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012). Beberapa faktor penyebab langsung kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan (42%), eklampsia/preeklamsia (13%), abortus (11%), infeksi (10%), partus lama/persalinan macet (9%), dan penyebab lain (15%). Sedangkan faktor tidak langsung penyebab kematian ibu karena faktor terlambat dan terlalu. Ini semua terkait dengan faktor akses, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun angka kematian ibu yang disebabkan infeksi hanya 10%, yang ditandai dengan rubor, dolor, calor, tumor, fungsiolesa. hal tersebut ikut menyumbangkan kenaikan angka kematian ibu di Indonesia (SDKI 2012).

Menurut WHO tahun 2008 angka kematian ibu (AKI) di dunia mencapai 358.000 orang ibu dengan penyumbang kematian terbanyak berasal

dari negara berkembang (WHO, 2012). Menurut WHO tahun 2011 Angka Kematian Ibu (AKI) di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia (29/100.000 kelahiran hidup), Thailand (48/100.000 KH), Vietnam (59/100.000 KH), serta Singapore (3/100.000 KH). Dibandingkan dengan negara-negara maju, angkanya sangat jauh berbeda seperti Australia (7/100.000 KH) dan Jepang (5/100.000 KH) (WHO, 2011).

Di Asia masalah robekan perineum cukup banyak dalam masyarakat, 50% dari kejadian robekan perineum di dunia terjadi di Asia. Prevalensi ibu bersalin yang mengalami robekan perineum di Indonesia pada golongan umur 25-30 tahun yaitu 24%, dan pada ibu umur 32-39 tahun sebesar 62% (Campion dalam Bascom, 2011). Salah satu aspek penting dalam mendeskripsikan kemajua tingkat pembangunan manusia dari sisi kesehatan masyarakat di suatu negara adalah angka kematian ibu. Kematian ibu menurut defnisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam priode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu di indonesia masih tinggi sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat tajam dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 walaupun angka ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan SDKI tahun 1991 yaitu sebesar 390 per 100.000

kelahiran hidup. Ini membuktikan AKI di Indonesia masih sangat tinggi bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Target Global MDGs (Millennium Development Goals) ke-5 adalah menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Mengacu dari kondisi saat ini, potensi untuk mencapai target MDGs ke-5 untuk menurunkan AKI adalah off track, artinya diperlukan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk mencapainya (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Salah satu faktor penting dalam upaya penurunan angka kematian tersebut adalah penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dekat dengan masyarakat (JNPK, 2007). Penyebab kematian ibu selama tahun 2010-2013 yaitu perdarahan dan penyebab lain-lain. Tingginya kematian ibu akibat penyebab lain-lain menuntut peran besar rumah sakit dalam menangani penyebab tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Asuhan kebidanan pada ibu bersalin merupakan salah satu kompetensi utama bidan, oleh karena itu seluruh bidan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan berkualitas dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tanggap terhadap masalah, serta mampu memenuhi kebutuhan ibu dan bayi (Nurasiah Ai, dkk, 2012).

Program DIII kebidanan adalah salah satu institusi yang menghasilkan bidan yang mempunyai visi yang didapat dari kompeten, unggul,

professional dan kompetitif di tingkat global. Dalam praktik di lapangan, model utama bidan adalah harus mampu melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman. Selain itu, bidan harus dapat memantau kemajuan persalinan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya partus lama (Nurjihan, 2013).

Oleh karena itu bagi calon tenaga kesehatan terutama mahasiswa institusi pendidikan kesehatan perlu dipersiapkan sedini mungkin untuk menguasai dan mengaplikasikan kemampuan mencegah ruptur perineum sebagai upaya preventif. Dengan harapan mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang pencegahan ruptur perineum sebagai bahan pengetahuan ketika menolong persalinan dan melakukan praktik klinik kebidanan. Sebagai salah satu sumber tenaga kesehatan di Indonesia, Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar patut untuk dapat merealisasikan pendidikan dan pengetahuan yang didapatkan selama kuliah dalam praktik klinik ataupun setelah memperoleh gelar dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar pada tanggal 29 juni 2016, jumlah mahasiswa adalah sebanyak 208, terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat I berjumlah 81 orang, tingkat II berjumlah 62 orang, dan tingkat III berjumlah 65 orang. Namun peneliti lebih terfokus pada tingkat II karena sebagai mahasiswa kebidanan yang telah mempelajari materi kuliah fisiologi kehamilan, persalinan dan nifas dan telah mengikuti praktik klinik keterampilan dasar serta praktik

klinik kebidanan Fisiologi atau PKK fisiologi dan sebagai calon tenaga kesehatan sangatlah penting bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana memberikan asuhan pada masa kehamilan, persalinan dan nifas fisiologi. Modal utama bidan di lapangan praktik adalah harus mampu melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman serta mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya perdarahan, kondisi darurat dan komplikasi.

Bidan sebagai salah satu ujung tombak pemberian pelayanan kesehatan khususnya kebidanan kepada masyarakat, senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dalam bentuk asuhan kebidanan. Peningkatan mutu pelayanan dalam bentuk asuhan kebidanan adalah dengan meningkatkan pengetahuan dari teori dan praktek serta keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan. Penyesuaian antara teori-teori dari kampus dan pembelajaran dari praktek klinik di lahan merupakan tantangan bagi mahasiswa kebidanan sebagai penyeimbang pengetahuan antara teori dan praktek. Ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan mahasiswa terhadap kesenjangan yang terjadi antara pembelajaran dikelas dan dilahan praktek.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada 10 mahasiswa Kebidanan UIN yang berada di dalam kampus secara acak di dapatkan hasil yaitu, hanya 4 mahasiswa yang tahu tentang pencegahan ruptur perineum dan 6 mahasiswa yang tidak tahu tentang pencegahan ruptur perineum. Berdasarkan uraian diatas, maka

penulis tertarik untuk membahas karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar semester IV Tentang Pencegahan Ruptur Perineum Tahun 2016.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tentang Pencegahan Ruptur Perineum Tahun 2016?

### ***C. Tujuan Penelitian***

#### 1. Tujuan umum

Untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tentang Pencegahan Ruptur Perineum.

#### 2. Tujuan khusus

a) Diketuainya tingkat pengetahuan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV tentang pengertian dan tingkat ruptur perineum.

b) Diketuainya pengetahuan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV tentang pencegahan terjadinya ruptur perineum.

c) Diketuainya pengetahuan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV tentang penanganan ruptur perineum.

- d) Diketuainya pengetahuan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV cara pemijatan perineum.

***D. Manfaat Penelitian***

1. Bagi institusi pendidikan

Untuk dapat dijadikan acuan (referensi) bagi penelitian lebih lanjut. Sekaligus sebagai bahan atau sumber bacaan di perpustakaan institusi pendidikan.

2. Ilmu pengetahuan


Dapat dijadikan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang ruptur perineum.

3. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian.



## BAB II



### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

##### 1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang di miliki. Pada waktu pengindraan oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran atau indera penglihatan (mata) (Suparyanto,2012). Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga (Notoatmodjo, 2011).

Menurut Notoatmodjo (2011), Dalam diri manusia terjadi proses proses yang berurutan yang di sebut dengan AIETA, yaitu :

- a. *Awareness* (kesadaran), di mana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).
- b. *Interest* (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Di sini sikap subjek sudah mulai timbul.

- c. *Evaluation* (menimbang-nimbang) terhadap baik atau tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- d. *Trial*, di mana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh stimulus.
- e. *Adaption*, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sementara tidak ada agama atau kebudayaan lain yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia. Salah satunya terdapat dalam Q.S. Az-Zumar (39:9)

Allah berfirman :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُ إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ  
 وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ سَاقِطًا  
 فَيَلْمُواكَ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ  
 قُلْ أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأَقْصَى الْأَعْيُنِ  
 وَأَنزَلْتَهُ فِي سَهَابٍ مُّبِينٍ  
 فَكَلِمَاتٌ نَّجِيهَاتٌ فَذَكَّرُوا  
 وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ سَاقِطًا  
 فَيَلْمُواكَ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ  
 قُلْ أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأَقْصَى الْأَعْيُنِ  
 وَأَنزَلْتَهُ فِي سَهَابٍ مُّبِينٍ  
 فَكَلِمَاتٌ نَّجِيهَاتٌ فَذَكَّرُوا

Terjemahannya:

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Allah Swt. Berfirman : "Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?'" (Az-Zumar: 9)"

Maksudnya, apakah orang yang demikian sama dengan orang yang

sebelumnya yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah? (Jawabannya tentu saja tidak sama). “Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Az-Zumar: 9) ”yakni sesungguhnya yang mengetahui perbedaan antara golongan ini dan golongan yang sebelumnya hanyalah orang yang mempunyai akal; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

## 2. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2011), pengetahuan mempunyai 6

tingkatan, yaitu:

### a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

### b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat mengintegrasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipahami.

### c. Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang ada.

3. Jenis Pengetahuan

Terdapat istilah *knowledge taxonomy* (taksonomi pengetahuan), yang mencakup:

- 1) Pengetahuan berdasarkan pengalaman
- 2) Pengetahuan berdasarkan konteks
- 3) Pengetahuan bersifat deklaratif
- 4) Pengetahuan yang bersifat procedural

Hubbel (2010) menjelaskan lebih lanjut bahwa pengetahuan berdasarkan pengalaman adalah untuk mengungkapkan jawaban dari

pertanyaan, menyapa sesuatu itu penting, pengetahuan kontekstual berfungsi untuk mengetahui kapan harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, dan pengetahuan procedural dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan dan keterampilan (Yaumi, 2012: 64-65)

#### 4. Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan membagikan koesioner atau angket yang menyangkan tentang isi materi yang di ukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pengetahuan. Sedangkan kualitas pengetahuan pada masing-masing tingkat pengetahuan dapat dilakukan dengan skoring yaitu :

- a. Baik : Bila subjek mampu menjawab dengan benar 76 - 100%
- b. Cukup : Bila subjek mampu menjawab dengan benar 60 – 75%
- c. Kurang : Bila subjek mampu menjawab dengan benar <60%

(Arikunto,2006: 344)

Pertanyaan tertulis dapat berupa tes pilihan ganda (*multiple choice test*) yang terdiri atas suatu keterangan (*stem*) atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Untuk melengkapi harus memilih dari beberapa kemungkinan jawaban, alternative (*options*) yang di sediakan.

#### 5. Faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di

antaranya:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia.

b. Media

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Jadi contoh dari media massa ini adalah televisi, radio, koran, dan majalah.

c. Informasi

Pengertian informasi menurut *Oxford English Dictionary*, adalah "*that of which one is apprised or told: intelligence, news*". Kamus lain menyatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Selain itu istilah informasi juga memiliki arti yang lain sebagaimana diartikan oleh RUU teknologi informasi yang mengartikannya sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program komputer, [basis data](#). Adanya perbedaan definisi informasi dikarenakan pada hakekatnya informasi tidak dapat diuraikan (*intangible*), sedangkan informasi itu dijumpai dalam

kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan melalui [komunikasi](#).

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun social. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbale balik ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional, serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

f. Usia

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia muda, individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan social, serta lebih banyak melakukan

persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua. Selain itu, orang usia muda akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan menurun sejalan dengan bertambahnya usia, khususnya pada beberapa kemampuan yang lain, seperti kosa kata dan pengetahuan umum. Beberapa teori berpendapat ternyata IQ seseorang akan menurun cukup cepat sejalan dengan bertambahnya usia (Budiman, 2013: 3-7).

Pada dasarnya menuntut ilmu itu (belajar) adalah seumur hidup, karena ilmu pengetahuan selalu berkembang. Selain belajar ilmu pengetahuan kita dianjurkan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Nabi sendiri pernah bersabda bahwa belajar itu sejak ayunan hingga liang lahat, kalau perlu ke negeri Cina sekalipun. (Hawari, 2004, 203). Keutamaan ilmu juga ditekankan dalam Q.S Al-

Mujadalah (58:11) Allah berfirman :

وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ حُلُمًا  
 وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ حُلُمًا  
 وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ حُلُمًا  
 وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ حُلُمًا  
 وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ حُلُمًا  
 وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ حُلُمًا  
 وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ حُلُمًا  
 وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ حُلُمًا  
 وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ حُلُمًا  
 وَمِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ حُلُمًا

Terjemahannya:

*Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu:  
 “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah*



*niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Menurut Quraish pada penggalan ayat “Dan apabila di katakan:”Berdirilah kamu“ ketempat yang lain, atau untuk duduk tempatmu buat orang yang lebih wajar, atau bangkitlah melakukan sesuatu seperti untuk shalat dan berjihad, maka berdiri dan bangkit-lah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu wahai yang memperkenankan tuntunan ini dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemudian di dunia dan di akhirat dan Allah terhadap apa-apa yang kamu kerjakan sekarang dan masa akan datang Maha Mengetahui.

Ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni lebih tinggi sekedar beriman. Tidak disebutnya kata meninggikan itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang didmilikinya itulah yang

berperanan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu.

Tentu saja yang di maksud dengan *alladzînaûtû al-'ilmu* yang diberi pengetahuan adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat di atas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal shaleh, dan yang kedua beriman dan beramal shaleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal pengajarannya kepada pihak lain secara lisan, atau tulisan maupun dengan keteladanan (Shihab, 2002).

Pengetahuan sebagai salah satu faktor pengukuran kecerdasan seseorang. Pengetahuan juga merupakan kunci kesuksesan, karena dengan ilmu dunia dan akhiran insya allah dapat di raih sebagaimana kata rasulullah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis,

هُمَا أَرَادَ مَنْ وَ بِالْعِلْمِ فَعَلَيْهِ الْآخِرَةُ أَرَادَ مَنْ وَ بِالْعِلْمِ فَعَلَيْهِ الدُّنْيَا أَرَادَ مَنْ

بِالْعِلْمِ فَعَلَيْهِ (الطبراني رواه)

Terjemahan:

*“Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu.” (HR. Thabrani).*

Dari hadis diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan ilmu dan amalan kita bisa memperoleh dunia bahkan akhirat. Memperoleh ilmu dan memperluas ilmu tidak akan membuat kita rugi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Persalinan**

### **1. Pengertian Persalinan**

Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan ( 37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam produk konsepsi di keluarkan sebagai akibat kontraksi teratur, progresif, sering dan kuat yang nampaknya tidak saling berhubungan bekerja dalam keharmonisan untuk melahirkan bayi (siwi walyani, dkk : 2015).

Persalinan adalah suatu proses yang dimulai dengan adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya dilatasi progresif dari serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta dan proses tersebut merupakan proses alamiah (Rohani, 2011). Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal. Kelahiran seorang bayi juga merupakan peristiwa sosial yang ibu dan keluarga menantikannya selama 9 bulan. Ketika persalinan dimulai, peranan ibu adalah untuk melahirkan bayinya (Ai Yeyeh Rukiah, Dkk, 2009).



kesengsaraan karena mengandungnya dan kesusahan serta kepayahan yang biasa dialami oleh wanita yang sedang hamil. “dan melahirkannya dengan susah payah (pula). (Al-Ahqaf: 15)” Yakni dengan penderitaan pula saat melahirkan bayinya lagi sangat susah dan masyaqqat. “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (Al-Ahqaf: 15)” Sahabat Ali r.a. menyimpulkan dalil dari ayat ini bahwa masa mengandung yang paling pendek ialah enam bulan. Ini merupakan kesimpulan yang kuat lagi benar dan disetujui oleh Usman r.a. dan sejumlah sahabat lainnya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu alasan kenapa Allah memberi perintah pada manusia agar berbakti pada kedua orang tua adalah karena proses persalinan yang dialami ibu merupakan suatu proses yang sangat berat. Pengaruh kontraksi rahim ketika bayi mau lahir, menyebabkan ibu merasakan sangat kesakitan, bahkan dalam keadaan tertentu, dapat menyebabkan kematian. Karena perjuangan ibu ketika melahirkan dan resiko yang sangat berat yang ditanggung seorang ibu, Nabi cukup bijaksana dan memberi empati pada ibu yang meninggal karena melahirkan sebagai syahid, setara dengan perjuangan jihad di medan perang.

## 2. Jenis Persalinan

- a. Berdasarkan bentuk persalinan, di bagi menjadi :
  - 1) Persalinan spontan  
Persalinan spontan adalah proses persalinan seluruhnya, berlangsung dengan kekuatan sendiri.
  - 2) Persalinan buatan  
Persalinan buatan adalah proses persalinan dengan bantuan tenaga dari luar.
  - 3) Persalinan anjuran  
Persalinan anjuran adalah persalinan yang bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan.
- b. Menurut usia kehamilan, jenis persalinan dibagi menjadi :
  - 1) Abortus  
Pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berat badan janin kurang dari 500 gram
  - 2) Partus immature  
Pengeluaran buah kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dan 28 minggu atau berat badan janin antara 500 gram dan kurang dari 1000 gram.
  - 3) Partus prematur  
Pengeluaran buah kehamilan antara usia kehamilan 28 minggu dan < 37 minggu atau berat badan janin antara 1000 gram dan kurang dari 2500 gram.
  - 4) Partus matur atau partus aterm  
Penegluaran buah kehamilan antara usia kehamilan 37 minggu dan 42 minggu atau berat badan janin lebih dari 2500 gram.
  - 5) Partus serotinus atau partus postmatur  
Penegluaran buah kehamilan lebih dari 42 minggu.
3. Sebab-sebab terjadinya persalinan  
Sebab terjadinya persalinan sampai saat ini masih merupakan teori teori yang kompleks. Faktor faktor humoral, pengaruh prostaglandin, stuktur uterus, sirkulasi uterus, pengaruh saraf dan nutrisi disebut sebagai

faktor yang mengakibatkan partus mulai. Perubahan-perubahan dalam biokimia dan biofisika telah banyak mengungkapkan mulai dan berlangsungnya partus, antara lain penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Seperti diketahui progesteron merupakan penenang bagi otot-otot uterus.

4. Tanda-tanda Persalinan

a. Tanda-tanda persalinan sudah dekat

1) *Lightening*

Pada minggu ke-36 pada primigravida terjadi penurunan fundus kebawah kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul yang

di sebabkan oleh:

- a) Kontraksi *braxton hicks*
- b) Ketegangan otot perut
- c) Ketegangan ligamentum rotundum
- d) Gaya berat janin kepala kearah bawah

2) Terjadi his permulaan

Makin tua usia kehamilan, pengeluaran progesteron dan estrogen, berkurang sehingga oksitosin dapat menimbulkan

kontraksi, yang sering disebut his palsu.

- a) Rasa nyeri ringan dibagian bawah
- b) Datangnya tidak teratur
- c) Tidak ada perubahan serviks
- d) Durasinya pendek
- e) Tidak bertambah jika beraktivitas

b. Tanda-tanda persalinan

1) Terjadi his persalinan

His persalinan mempunyai sifat:

- a) Pinggang terasa sakit, yang menjalar ke depan
- b) Sifatnya teratur, intervalnya makin pendek dan kekuatannya

makin besar

- c) Kontraksi uterus mengakibatkan perubahan uterus
- d) Makin beraktivitas (jalan), kekuatan makin bertambah

2) *Bloody show* (pengeluaran lendir disertai darah melalui vagina)

Dengan his permulaan, terjadi perubahan pada serviks yang menimbulkan pendataran dan pembukaan, lendir yang terdapat di kanalis servikalis lepas, kapiler pembuluh darah pecah, yang menjadikan perdarahan sedikit.

3) Penegluaran cairan

Terjadi akibat pecahnya ketuban atau selaput ketuban robek. Sebagian besar ketuban baru pecah menjelang pembukaan lengkap tetapi kadang pecah pada pembukaan kecil (Asrinah, 2016: 6).

5. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan

a. *Passage* ( jalan lahir), dibagi atas :

- 1) Bagian keras tulang tulang panggul (rangka panggul)
  - 2) Bagian lunak: otot otot, jaringan-jaringan, ligamen-legamen
- Ukuran-ukuran panggu;
- 1) Alat pengukur ukuran pangggul
    - a) Pita meter
    - b) Jangka panggul: martin, oseanser, collin, dan baudelokue
    - c) Pelvimetri klinis dengan perilaku dalam
    - d) Pelvimetri rongenologi
  - 2) Ukuran-ukuran panggul:
    - a) Distansia spinarum: jarak antara kedua spina iliaka anterior superior 24-26 cm
    - b) Distansia kristarium: jarak anatara kedua krista iliaka kanan dan kiri 28-30cm
    - c) Konjungta eksterna: 18-20 cm
    - d) Lingkaran panggul: 80-100 cm
    - e) Congjungata diagonalis: 12,5
    - f) Distasia tuberum: 10,5 cm
  - 3) Ukuran dalam panggul:
    - a) Pintu atas panggul merupakan suatu bidang yang dibentuk oleh promontorium, line innuminata, dan pinggir atas simpisis pubis.



b) Kongjungata vera dengan periksa dalam diperoleh

kongjungata diagonalis 10,5-11 cm

c) Kongjungata transversa: 12-13 cm

d) Kongjungata oblingua: 13 cm

e) Kongjungata obstetrika adalah jarak bagian tengah simpisis

ke promontorium

f) Ruang tengah panggul

g) Bidang terluas ukurannya 13 x 12,5 cm

h) Bidang tersempit ukurannya 11,5 x 11 cm

i) Jarak antara spina ischia 11 cm

j) Pintu bawah panggul (outlet)

k) Ukuran anterior-posterior 10-12

l) Ukuran melintang 10,5 cm

m) Arcus pubis membentuk sudut 90 derajat lebih, pada laki

laki kurang dari 80 derajat

b. *Power* (His dan mengejan)

Kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan adalah his,

kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari

ligamentum.

1) His (kontraksi uterus)

His adalah gelombang kontraksi ritmis otot polos dinding

uterus yang mulai dari daerah fundus uteri di mana tuba fallopi

memasuki dinding uterus, awal gelombang tersebut didapat dari

“*pacemaker*” yang terdapat dari dinding uterus daerah tersebut.

Pada waktu kontraksi, otot polos rahim bekerja

dengan baik dan sempurna memiliki sifat kontraksi simetris,

fundus dominan, relaksasi. Pada waktu kontraksi, otot-otot rahim

menguncup sehingga lebih pendek. Cavum menjadi lebih kecil

serta mendorong janin dan kantong amnion ke segmen bawah

rahim dan cervik. His memiliki sifat:

a) Involutir

- b) Intermitten
- c) Terasa sakit
- d) Terkoordinasi
- e) Serta kadang di pengaruhi oleh fisik, kimia, psikis.

Perubahan-perubahan akibat his:

- a) Pada uterus dan serviks: uterus teraba keras. Padat karena kontraksi. Tekanan hidrostatik air ketuban dan intrauteri naik serta menyebabkan serviks menjadi mendatar (*affacement*) dan terbuka (*dilatasi*).
- b) Pada ibu: rasa nyeri karena iskemia rahim dan kontraksi uterus. Juga ada kenaikan nadi dan tekanan darah.
- c) Pada janin: pertukaran oksigen pada sirkulasi uterus plasenta kurang, masih timbul hipoksia janin. Denyut jantung janin melambat kurang jelas didengar karena adanya iskemia fisiologis, jika benar benar terjadi hipoksia janin yang agak lama, misalnya pada kontraksi tetanik, maka terjadi gawat janin asfiksia dengan denyut jantung janin di atas 160 per menit, tidak teratur.

Pembagian dan sifatnya:

- a) His palsu atau pendahuluan
  - (1) His tidak kuat, tidak teratur
  - (2) Dilatasi servik tidak terjadi
- b) His pembukaan kala I
  - (1) His pembukaan serviks sampai terjadi pembukaan lengkap
  - (2) Mulai makin, teratur dan sakit
- c) His pengeluaran atau his mengejan ( kala II )
  - (1) Sangat kuat, teratur, simetris, terkoordinasi dan lama
  - (2) His untuk mengeluarkan janin
  - (3) Koordinasi bersama antara: his kontraksi otot perut, kontraksi diafragma dan ligamentum
- d) His pelepasan uri (kala III)
  - Kontraksi sedang untuk melepaskan dan melahirkan plasenta.
- e) His pengiring (kala IV)

Kontraksi lemah, masih sedikit nyeri( meriang) pengecilan rahim beberapa jam atau hari.

## 2) Mengejan

Dalam proses persalinan normal ada 3 komponen yang amat menentukan, yakni *passenger* (janin), *passage* (jalan lahir) dan *power* (kontraksi). Agar proses persalinan berjalan lancar, ketika komponen tersebut harus sama sama dalam kondisi baik. Bayi yang ukurannya tidak terlalu besar pasti lebih lebih mudah kondisi melalui jalan lahir normal, jalan lahir yang baik akan memudahkan bayi keluar, kekuatan ibu mengejan akan mendorong bayi cepat keluar.

Yang pegang kendali atau yang menentukan dalam tahapan ini adalah proses mengejan ibu yang dilakukan dengan benar, baik dari segi kekuatan maupun keteraturan. Ibu harus mengejan sekuat mungkin seiring dengan instruksi yang diberikan. Biasanya ibu diminta menarik nafas panjang dalam beberapa kali saat kontraksi terjadi lalu dibuang secara perlahan. Ketika kontraksi mencapai puncaknya, doronglah janin dengan mengejan sekuat mungkin. Bila ibu mengikuti instruksi dengan baik, pecahnya pembuluh darah disekitar mata dan wajah biar dihindari. Begitu juga resiko

berkurangnya suplai oksigen kejanin.

Yang harus di lakukan:

a) Mulai trimester dua sempatkan mengikuti senam hamil. Ini

akan sangat membantu dalam melemaskan otot otot panggul,

menguatkan nafas, mengejan dan sebagainya yang amat di perlukan saat persalinan tiba.

- b) Usahakan jangan tegang, tetapi tetaplah relaks dengan melemaskan seluruh otot tubuh. Ketegangan hanya akan menyulitkan disaat ibu harus mengejan.
- c) Jangan panik. Ikuti saja instruksi dengan baik. Kepanikan hanya akan membuat segalanya kacau karena dorongan jadi tidak teratur sementara tenaga terhambat sia-sia dan tidak efisien karena bayi malah jadi lebih susah lahir.

Harus disesar bila:

Meski sangat ingin, banyak ibu hamil yang tidak bisa menjalani persalinan normal hingga harus di bantu dengan operasi sesar. Ada beberapa alasan medis yang membuat ibu terpaksa menjalani operasi sesar.

Kelainan power Sangat mungkin terjadi pada ibu hamil yang memiliki cukup power untuk mengejan. Ini biasanya dialami oleh ibu ibu yang lemah jantung atau asma yang membuat kemampuan mengejanya sedemikian lemah. Bisa juga pengaruh dari penyakit yang lain.

c. *Passenger*

Passenger terdiri dari:

- 1) Janin

Selama janin dan plasenta berada dalam rahim belum tentu pertumbuhannya normal, adanya kelainan genetic dan kebiasaan ibu yang buruk dapat menjadikan pertumbuhannya tidak normal antara lain:

- a) Kelainan bentuk dan besar janin anesefalus, hidrosefalus, janin makrosmia
- b) Kelainan pada letak kepala: presentasi puncak, presentasi muka, presentasi dahi dan kelainan oksiput.
- c) Selain letak janin: letak sungsang, letak lintang, letak mengelak, presentasi rangkap ( kepala tangan, kepala kaki, kepala tali pusat).
- d) Kepala janin (bayi) merupakan bagian penting dalam proses persalinan dan memiliki ciri sebagai berikut.
- e) Bentuk kepala oval, sehingga setelah bagian besar lahir, maka bagian lainnya lebih mudah lahir.
- f) Persendian kepala terbetuk kogel, sehingga dapat digerakkan ke segala arah sehingga memberikan kemungkinan untuk melakukan putaranpaksi dalam.

Setelah persalinan kepala, badan janin akan tidak akan mengalami kesulitan. Pada beberapa kasus pada anak yang besar pada ibu diabetes melitus terjadi kemungkinan kegagalan persalinan bahu. Persalinan bahu yang berat cukup berbahaya karena dapat terjadi asfiksia. Persendian leher yang masih lemah dapat merusak pusat pusat vital janin yang berakibat fatal.

## 2) Plasenta

Plasenta berbentuk bundar atau oval, ukuran diameter 15-20 cm tebal 2-3 cm, berat 500-600 gram. Sebab-sebab terlepasnya plasenta adalah: Waktu bayi dilahirkan rahim sangat kecil dan

setelah bayi lahir uterus merupakan alat dengan dinding yang tebal sedangkan rongga rahim hampir tidak ada. Fundus uteri terdapat sedikit di bawah pusat, karena pengecilan rahim yang tiba-tiba ini tempat perlekatan plasenta jika sangat mengecil. Plasenta sendiri harus mengikuti pengecilan ini hingga menjadi dua kali setebal pada permulaan persalinan dan karena pengecilan tempat melekatnya plasenta dengan kuat, maka plasenta juga berlipat-lipat dan ada bagian-bagian yang terlepas dari dinding rahim karena tidak dapat mengikuti pengecilan dasarnya.

Pelepasan plasenta ini terjadi dalam stadium spongiosum yang sangat banyak lubang-lubangnya. Jadi secara singkat faktor yang sangat penting dalam pelepasan plasenta ialah retraksi dan kontraksi otot-otot rahim setelah anak lahir. Di tempat yang lepas terjadi perdarahan ialah antara plasenta dan desidua basalis dan karena hematoma membesar, maka seolah-olah plasenta terangkat dari dasarnya oleh hematoma tersebut sehingga didaerah pelepasan.

Plasenta biasanya terlepas dalam 4-5 menit setelah anak lahir, mungkin pelepasan setelah anak lahir. Juga selaput janin menebal dan berlipat-lipat karena pengecilan dinding rahim. Oleh kontraksi dan retraksi rahim terlepas dan sebagian karena tarikan waktu plasenta lahir.

### 3) Air ketuban

Sebagai pelindung dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, Air ketuban berfungsi sebagai 'baantalan' untuk melindungi janin terhadap trauma dari luar. Tak hanya itu saja, air ketuban juga berfungsi melindungi janin dari infeksi, menstabilkan perubahan suhu, dan menjadi sarana yang memungkinkan janin bergerak bebas.

Kelebihan air ketuban dapat berdampak pada kondisi janin. Untuk menjaga kestabilan air ketuban, bayi meminum air ketuban didalam tubuh ibunya dan kemudian mengeluarkannya dalam bentuk kencing. Jadi jika terdapat volume air ketuban yang berlebih, diprediksi terdapat gangguan pencernaan atau gangguan, pada saluran pembuangan sang bayi yang ditandai dengan kencingnya yang tidak normal.

Kekurangan cairan ketuban biasanya disebabkan berbagai hal, diantaranya menurunnya fungsi plasenta akibat kehamilan yang melebihi waktu, ketuban yang bocor atau kelainan janin yang berhubungan dengan penyumbatan kandung kemih. Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban pada setiap saat sebelum permulaan persalinan tanpa memandang apakah pecahnya selaput ketuban terjadi pada kehamilan 24 atau 44 minggu. (Siwi walyani, Elizabet, dkk, 2015).

6. Tahap-tahap persalinan

Menurut Prawirohardjo (1999: 182) Tahapan persalinan di bagi

menjadi 4 kala, yaitu:

a. Kala I Persalinan

Dimulai sejak adanya his yang teratur dan meningkat( frekuensi dan kekuatannya) yang menyebabkan pembukaan, sampai serviks membuka lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala I terdiri dari dua fase yaitu fasen laten dan fase aktif.

1) Fase laten

a) Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan pembukaan 1 sampai pembukaan 3 cm.

b) Pada umumnya berlangsung 8 jam.

2) Fase aktif, di bagi menjadi 3 fase, yaitu

a) Fase akselerasi

Dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.

b) Fase dilatasi maksimal

Dalam waktu 2 jam pembukaan serviks berlangsung cepat dan 4 cm menjadi 9 cm

c) Fase deselerasi

Pembukaan serviks menjadi lambat, dalam waktu 2 jam dari pembukaan 9 cm menjadi 10 cm.

Pada primipara, berlangsung selama 12 jam dan pada multipara sekitar 8 jam. Kecepatan pembukaan serviks 1 cm/jam (primipara) atau lebih dan 1 cm hingga 2 cm (multipara).

b. Kala II (dua) persalinan

Persalinan kala II dimulai ketika pembukaan serviks sudah

lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi.kala II juga di sebut sebagai kala pengeluaran bayi tanda pasti kala II(dua) di

tentukan melalui pemeriksaan dalam yang hasilnya adalah:

1) Pembukaan serviks telah lengkap (10 cm), atau

2) Terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina



Proses kala II berlangsung 2 jam pada primipara dan 1 jam pada multipara. Dalam kondisi yang normal pada kala II kepala janin sudah masuk dalam dasar panggul, maka pada saat his di rasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflek menimbulkan rasa mencedan. Wanita merasa adanya tekanan pada rektum dan seperti akan buang air besar. Kemudian perineum menonjol dan melebar dengan membukanya anus.

Labia mulai membuka dan tidak kemudian kepala janin tampak di vulva saat ada his. Jika dasar panggul sudah berelaksasi, kepala janin tidak masuk lagi diluar his. Dengan kekuatan his mencedan maksimal kepala dilahirkan dengan suboksiput dibawah simpisis, dahi, muka, dagu melewati perineum. Setelah ada his istirahat sebentar, maka akan mulai lagi untuk mengeluarkan anggota badan bayi.

c. Kala III (tiga) persalinan

Persalinan kala III dimulai segera setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta serta selaput ketuban yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir dan kepala spontan atau dengan tekanan dari fundus uteri (Prawirohardjo, 1999: 185).

d. Kala IV (empat) persalinan

Kala IV persalinan mulai setelah lahirnya plasenta 2 jam post partum (Nurasiah, Ai., dkk, 2012). Ada 7 pokok hal penting yang

harus dipertahankan :

- 1) Kontraksi uterus
- 2) Tidak ada perdarahan dari jalan lahir

- 3) Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap
- 4) Kandung kemih kosong
- 5) Luka perineum terawat
- 6) Bayi dalam keadaan baik
- 7) Ibu dalam keadaan baik

Tahapan ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap bahaya perdarahan. Pengawasan ini dilakukan selam kurang lebih dua jam. Dalam dua jam. Dalam tahap ini ibu masih mengeluarkan darah dari vagina, tapi tidak banyak, yang berasal dari pembuluh darah yang ada didinding rahim tempat terlepasnya plasenta, dan setelah beberapa hari anda akan mengeluarkan cairan sedikit darah yang disebut lokia yang berasal dari sisa-sisa jaraingan pada beberapa keadaan, pengeluaran darah setelah proses kelahiran menjadi banyak. Ini di sebabkan oleh faktor seperti lemahnya kontraksi atau tidak kontraksi otot otot rahim. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan sehingga jika perdarahan semakin hebat, dapat dilakukan tindakan secepatnya.

### **C. Tinjauan Umum tentang Rupture Perineum**

#### 1. Pengertian

- a. Rupture adalah robekan atau koyaknya jaringan secara paksa (Dorland, 1998)
- b. Perineum adalah bagian yang terletak antara vulva dan anus, panjangnya rata-rata 4 cm (Wiknjosastro, 2008).
- c. Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada saat bayi lahir baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan (Wiknjosastro, 2008).

Robekan perineum terjadi pada hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Robekan perineum

umumnya terjadi di garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat. Robekan ini dapat dihindarkan atau dikurangi dengan menjaga jangan sampai dasar panggul dilalui oleh kepala janin dengan cepat (wiknjosastro, 2008).

Robekan jalan lahir selalu memberikan perdarahan dalam jumlah yang bervariasi banyaknya. Perdarahan yang berasal dari jalan lahir selalu harus diperhatikan yaitu sumber dan jumlah perdarahan sehingga dapat diatasi. Sumber perdarahan dapat berasal dari perineum, vagina, serviks, dan robekan uterus (rupture uteri). Perdarahan dapat dalam bentuk hematoma dan robekan jalan lahir yang dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah vena (wiknjosastro, 2008).

## 2. Faktor Predisposisi

### a. Faktor Ibu

#### 1) Umur ibu

Umur dianggap penting karena ikut menentukan prognosis dalam persalinan, dianggap penting karena mengakibatkan kesakitan (komplikasi) baik pada ibu maupun janin. Umur reproduksi optimal bagi seorang ibu adalah antara 20-35 tahun. Pada umur kurang dari 20 tahun, organ-organ reproduksi belum berfungsi dengan sempurna sehingga bila terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah mengalami komplikasi. Selain itu, kekuatan otot-otot perineum dan otot-otot perut belum bekerja secara optimal sehingga sering terjadi persalinan lama atau macet yang memerlukan tindakan seperti bedah sesar. Faktor resiko untuk persalinan sulit pada ibu yang belum pernah

melahirkan pada kelompok umur ibu dibawah 20 tahun dan kelompok umur di atas 35 tahun adalah 3 kali lebih tinggi dari kelompok umur reproduksi sehat 20-35 tahun (anisah, 2011).

2) Paritas

Paritas adalah jumlah persalinan yang pernah di alami wanita. Paritas di bagi dalam beberapa bagian atau klasifikasi yaitu primipara adalah wanita yang pernah melahirkan sebanyak satu kali, multipara adalah wanita yang pernah melahirkan lebih dari satu kali sedangkan, grandemultipara adalah wanita yang pernah melahirkan lebih adari lima kali (palimbo dkk, 2011).

Paritas mempunyai pengaruh terhadap kejadian ruprut perineum. Pada ibu paritas satu memiliki resiko besar untuk mengalami robekan perineum dari pada ibu dengan paritas lebih dari satu. Hal ini dikarenakan jalan lahir yang belum pernah dilalui oleh kepala bayi sehingga otot-otot perineum belum meregang (wikjosastro, 2008).

3) Jarak kehamilan

Seorang wanita yang hamil dan melahirkan kembali dengan jarak yang pendek dari kehamilan sebelumnya, akan memberikan dampak yang buruk terhadap kondisi dan kesehatan ibu dan bayi. Hal ini disebabkan, karena bentuk dan fungsi organ reproduksi belum kembali dengan sempurna. Sehingga fungsinya akan terganggu bila terjadi kehamilan dan persalinan kembali. Jarak kehamilan minimal agar organ reproduksi dapat kembali dengan baik adalah 24 bulan.

Jarak antara dua persalinan yang terlalu dekat menyebabkan meningkatnya anemia yang dapat menyebabkan BBLR, kelahiran preterm dan lahir mati, yang mempengaruhi proses persalinan dari faktor bayi. Jarak kehamilan yang terlalu jauh berhubungan dengan bertambahnya umur. Hal ini akan terjadi proses degeneratif melemahnya kekuatan fungsi-fungsi otot uterus dan otot panggul yang sangat berpengaruh pada proses persalinan apabila terjadi kehamilan lagi. Kontraksi otot-otot uterus dan panggul yang melemah menyebabkan kekuatan his (*power*) pada proses persalinan tidak adekuat sehingga banyak terjadi partus lama/ tidak maju (kusumawati, 2012).

4) Partus presipitatus

Partus presipitatus adalah persalinan yang berakhir dengan kelahiran yang kurang dari tiga jam setelah awitan kontraksi uterus dianggap sebagai persalinan cepat. Bahayanya meliputi kelahiran pada lingkungan yang tidak tepat atau tidak steril dengan resiko trauma pada janin dan ibu.

Persalinan dan kelahiran presipitatus kemungkinan besar terjadi pada kondisi jika terdapat beberapa hambatan untuk kelahiran. Dengan penipisan serviks berdilatasi 3 cm atau lebih dan bagian presentasi engage serta posisinya benar, kemungkinan lebih sedikit bahaya jika persalinan dipimpin dengan benar di lingkungan yang tepat. Ibu dengan riwayat persalinan presipitatus harus masuk rumah sakit dengan usia sekitar 38

minggu untuk dilakukan induksi persalinan guna mengatasi masalah.

Persalinan cepat terjadi setelah sensitivitas atau penggunaan oksitosin yang berlebihan. Janin didorong cepat melalui jalan lahir dengan kontraksi uterus sering dan kuat. Hipoksia janin dan trauma yang disertai dengan kerusakan jaringan jalan lahir sangat mungkin terjadi. Masalah ini tidak akan terjadi pada persalinan yang dipimpin dengan baik (David, 2008).

5) Partus lama

Partus lama adalah bila persalinan berlangsung lebih dari 24 jam pada primigravida dan atau 18 jam bagi multigravida. Partus lama dapat menimbulkan masalah baik bagi ibu maupun janin, beratnya cedera makin meningkat dengan semakin lamanya proses persalinan seperti meningkatnya insiden atonia uteri, laserasi, perdarahan, infeksi dan lain-lain yang merupakan penyebab utama kematian ibu serta terjadinya fistula urogenital, ruptur uteri dan lain-lain yang dapat memperburuk masa nifas (oxorn, 2010).

6) Meneran

Secara fisiologi ibu akan merasakan dorongan untuk meneran bila pembukaan sudah lengkap dan reflek ferguson telah terjadi. Ibu harus didukung untuk meneran dengan benar pada saat ia merasakan dorongan dan memang ingin mengejan (Nendhi, 2008). Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam memimpin ibu

bersalin melakukan meneran untuk mencegah terjadinya ruptur perineum, diantaranya :

- (a) Menganjurkan ibu untuk meneran sesuai dengan dorongan alamiah selama kontraksi.
- (b) Tidak menganjurkan ibu untuk menahan nafas pada saat meneran.
- (c) Mungkin ibu akan merasa lebih mudah untuk meneran jika ibu berbaring miring setengah duduk, menarik lutut ke arah ibu dan menempelkan dagu ke dada.
- (d) Menganjurkan ibu untuk tidak mengangkat bokong saat meneran.
- (e) Tidak melakukan dorongan pada fundus untuk membantu kelahiran bayi. Dorongan ini dapat meningkatkan risiko distosia bahu dan ruptur uteri.
- (f) Pencegahan ruptur perineum dapat dilakukan saat bayi dilahirkan terutama saat kelahiran kepala dan bahu.

b. Faktor Janin

1) Berat badan bayi baru lahir

Berat badan janin dapat mengakibatkan terjadinya ruptur perineum yaitu berat badan janin lebih dari 3500 gram, karena risiko trauma partus melalui vagina seperti distosia bahu dan kerusakan jaringan lunak pada ibu (saputra, 2011). Pada janin yang mempunyai berat lebih dari 4000gram memiliki kesukaran yang di timbulkan dalam persalina karena besarnya kepala atau besarnya bahu. Bagian paling keras dan besar janin adalah kepala, sehingga besarnya kepala janin mempengaruhi berat badan janin. Oleh karena itu sebagian ukuran kepala di gunakan berat badan

janin kepala besar dan janin besar dapat menyebabkan laserasi perineum (yazidah, 2010).

## 2) Presentasi

Presentasi adalah letak hubungan sumbu memanjang janin dengan sumbu memanjang panggu ibu (Dorland, 1998). Presentasi digunakan untuk menentukan bagian yang berada di bagian bawah rahim yang dijumpai pada palpasi atau pada pemeriksaan dalam. Macam-macam presentasi dapat dibedakan menjadi presentasi belakang kepala, presentasi muka, presentasi dahi, dan presentasi bekong.

### a) Presentasi belakang kepala

Presentasi belakang kepala adalah presentasi yang terjadi pada persalinan normal.

### b) Presentasi muka (fase presentation)

Presentasi muka adalah letak kepala tengadah (defleksi), sehingga bagian kepala yang terletak paling rendah ialah muka. Letak ini merupakan letak deflek yang paling maksimal, jadi oksiput dan punggung berhubungan rapat

(mochtar dkk, 2013).

### c) Presentasi Dahi

Presentasi dahi adalah posisi kepala antara fleksi dan defleksi, dahi pada posisi terendah dan tetap paling depan.

Penempatan dahi, biasanya dengan sendirinya akan berubah menjadi letak muka atau letak belakang kepala (Mochtar, 2013). Proses lewatnya dahi melalui panggul lebih lambat, lebih berat, dan lebih traumatic pada ibu disbanding dengan



presentasi lain, robekan perineum tidak dapat dihindari dan dapat dihindari dan dapat meluas atas sampai fornice vagina atau rectum, karena besarnya diameter yang harus melewati pintu bawah panggul (oxorn, 2010).

d) Presentase Bokong

Persalinan pada bayi dengan presentasi bokong (sungsang) di mana bayi letaknya memanjang dengan bokong sebagai bagian yang terendah. Berdasarkan posisi janin, presentasi bokong dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu letak bokong murni yang mana bokong saja yang menjadi bagian depan, sedangkan kedua tungkai lurus ke atas.

Letak bokong kaki, di samping bokong teraba kaki disebut letak bokong kaki sempurna atau tidak sempurna jika disamping bokong teraba kedua kaki atau satu kaki saja. Letak lutut dan letak kaki, bergantung pada terabnya kedua kaki atau lutut atau hanya teraba satu kaki atau lutut disebut letak kaki atau letak lutut tidak sempurna (nurasih, 2008).

c. Faktor Persalinan Pervaginam

1) Vakum ekstraksi

Vakum ekstraksi adalah merupakan tindakan obstetric yang bertujuan untuk mempercepat kala pengeluaran dengan sinergi tenaga mendedan ibu dan ekstraksi pada bayi. Oleh karena itu, kerjasama dan kemampuan ibu untuk mengekspresikan bayinya merupakan faktor yang sangat penting dalam menghasilkan akumulasi tenaga dorongan dengan tarikan kea rah yang sama.

Tarikan pada kulit kepala bayi, dilakukan dengan membuat cengkraman yang dihasilkan dari aplikasi tekanan negative (vakum). Mangkuk logam atau silastik akan memegannng kulit kepala yang akibat tekanan vakum, menjadi caput artificial. Mangkuk dihubungkan dengan tuas penarik (yang dipegang oleh penolong persalinan) melalui seutas rantai (Sarwono, 2010). Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu adalah robekan pada serviks uteri dan robekan pada vagina dan rupture perineum (oxorn, 2010).

2) Ekstraksi cunan/forcep

Ekstraksi cunan/forsep adalah suatu persalinan buatan, janin dilahirkan dengan cunan yang dipasang di kepala janin (Wiknjosastro, 2007). Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu karena tindakan ekstraksi forsep antara lain ruptur uteri, robekan portio, vagina, ruptur perineum, syok, perdarahan post partum, pecahnya varices vagina (Oxorn, 2010).

3) Partus presipitatus

Partus presipitatus adalah persalinan yang berlangsung sangat cepat, berlangsung kurang dari 3 jam, dapat disebabkan oleh abnormalitas kontraksi uterus dan rahim yang terlalu kuat, atau pada keadaan yang sangat jarang dijumpai, tidak adanya rasa nyeri pada saat his sehingga ibu tidak menyadari adanya proses persalinan yang sangat kuat (Djuhadiyah, 2010).

d. Faktor Penolong Persalinan

Penolong persalinan adalah seseorang yang mampu dan berwenang dalam memberikan asuhan persalinan. Pimpinan persalinan yang salah merupakan salah satu penyebab terjadinya ruptur perineum, sehingga sangat diperlukan kerjasama dengan ibu dan penggunaan perasat manual yang tepat dapat mengatur ekspulsi kepala, bahu, dan seluruh tubuh bayi untuk mencegah laserasi (nendhi, 2008).

Perdarahan karena robekan jalan lahir banyak dijumpai pada pertolongan persalinan oleh dukun karena tanpa dijahit. Bidan diharapkan melaksanakan pertolongan persalinan di tengah masyarakat melalui bidan polindes, sehingga peran dukun makin berkurang. Bidan dengan pengetahuan medisnya dapat mengetahui hamil dengan risioko tinggi dan mengarahkan pertolongan pada kehamilan dengan risiko rendah yang mempunyai komplikasi ringan sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu maupun perinatal. Dengan demikian komplikasi robekan jalan lahir yang dapat menimbulkan pendarahan semakin berkurang (winkjosastro, 2008).

### 3. Klasifikasi Rupture Perineum

#### a. Rupture Perineum Spontan

Yaitu luka pada perineum yang terjadi karena sebab-sebab tertentu tanpa dilakukan tindakan perobekan atau disengaja. Luka ini terjadi pada saat persalinan dan biasanya tidak teratur. (oxorn, 2010)

#### b. Rupture Perineum Disengaja (Episiotomi)

Yaitu tindakan insisi pembedahan pada perineum, vagina, kulit perineum, mukosa vagina dan jaringan otot yang ada dibawahnya

(perineotomi) untuk memperlebar outlet, dilakukan sebelum kelahiran bayi dengan maksud agar kelahiran lebih mudah. Tujuan dari episiotomy adalah memperlebar rima pudenda sehingga mempendek kala II, memperoleh luka dengan lurus dan bersih sehingga lebih mudah dijahit dan penyembuhan lebih baik, dan membuat irisan sebelum otot dan fascia dasar panggul mengalami regangan yang berlebihan. Maka ini akan mengurangi insiden prolaps, sistokel dan rektokel dan menghindari robekan sampai rectum (yuni kusmiati 2010). Ada tiga pilihan untuk arah insisi (episiotomi) :

1) Episiotomi medialis

Yaitu insisi dari ujung terbawah introit vagina sampai batas atas otot sfingter ani, dengan menggunakan gunting mulai dari bagian tengah cincin himenalis menuju muskulus bubokavernosus, muskulus superfisial trasversa peninei dan membrane perinea. Bila kurang lebar disambung ke lateral.

2) Episiotomi mediolateral

Yaitu insisi dimulai dari garis tengah introitus vagina menuju ke arah samping menjauhi anus. Arah insisi dapat dilakukan ke arah kanan atau kiri tergantung kebiasaan operator.

3) Episiotomi lateral

Yaitu insisi dilakukan ke arah lateral mulai dari posisi jam tiga atau jam Sembilan ke arah lateral dengan menggunakan gunting mulai dari bagian tengah cincin himenalis menuju muskulus bubokavernosus, muskulus superficial transversa perinea dan membrane perinea. Bila kurang lebar disambung ke

lateral. Episiotomi dilakukan saat kepala bayi tampak dengan garis tengah 2-3 cm di luar his. Episiotomi yang dibuat terlalu cepat akan menyebabkan perdarahan banyak sedangkan bila dilakukan terlalu lambat tujuan episiotomy untuk mengurangi peregangan otot dasar panggul tidak terpenuhi (usu, 2011).



Gambar bentuk-bentuk episiotomy

Sumber: (Nurasiah, Ai, dkk. *ASUHAN PERSALINAN NORMAL BAGI BIDAN*, 2012.)

Indikasi dilakukannya episiotomi :

- a) Profilaktik : untuk melindungi integrasi dasar panggul
- b) Halangan kemajuan persalinan akibat perineum kaku:
  - (a) Jaringan perineum tebal dan sangat berotot
  - (b) Ada jaringan parut bekas operasi
  - (c) Ada bekas episiotomy yang sudah diperbaiki
- c) Untuk mengelakkan robekan yang tidak teratur, termasuk robekan yang melebar ke dalam rectum :
  - (1) Kalau perineum sempit, antara bagian belakang vagina dan bagian depan rectum hanya terdapat sedikit ruang
  - (2) Pada keadaan laserasi yang lebar tidak akan bisa dihindari
  - (3) Alas an fetal misalnya bayi yang preparture dan lemah, bayi-bayi yang besar, posisi abnormal (occipitoposterior, persentasi muka dan perentasi bokong), bayi harus


dilahirkan dengan cepat pada keadaan darurat gawat janin

dan dilatasi perineum tidak dapat ditunggu (oxorn, 2010).

#### 4. Tingkat Robekan Perineum

Menurut Eniyati, Ruptur perineum dibagi menjadi 4 Tingkat :

- a. Tingkat I: robekan mengenai mukosa vagina, komisura posterior dan kulit perineum.
- b. Tingkat II: robekan mengenai mukosa vagina, komisura posterior dan kulit perineum dan otot perineum.
- c. Tingkat III : robekan mengenai mukosa vagina, komisura posterior dan kulit perineum otot perineum dan otot sfingter ani.
- d. Tingkat IV : robekan mengenai mukosa vagina, komisura posterior dan kulit perineum otot perineum otot sfingter ani dan dinding depan rectum.



Gambar tingkat robekan perineum  
 Sumber: <https://rizkimarizayeni.wordpress.com/>

#### 5. Tanda dan gejala robekan perineum

Perdarahan dalam keadaan dimana plasenta telah lahir lengkap dan kontraksi rahim baik, dapat dipastikan bahwa perdarahan tersebut berasal dari perlukaan jalan lahir (Depkes, 2009). Tanda – tanda yang

mengancam terjadinya robekan perineum antara lain :

- a) Kulit perineum mulai melebar dan tegang
- b) Kulit perineum berwarna pucat dan mengkilap
- c) Ada perdarahan keluar dari lubang vulva, merupakan indikasi robekan pada mukosa vagina

d) Bila kulit perineum pada garis tengah mulai robek, diantara fourchette dan sfingter ani.

6. Pencegahan rupture perineum

Keluarnya bayi melalui jalan lahir umumnya menyebabkan robekan pada vagina dan perineum. Risiko yang ditimbulkan karena robekan jalan lahir adalah perdarahan yang dapat menjalar ke segmen bawah uterus. Risiko lain yang dapat terjadi karena robekan jalan lahir dan perdarahan yang hebat adalah ibu tidak berdaya, lemah, tekanan darah turun, anemia dan berat badan turun (Manuaba, 2008).

Upaya meminimalkan trauma perineum dapat menurunkan resiko tersebut. Menurut Baton, Helen dan Jennifer Hall (2014), Meminimalkan trauma perineum:

a. Asuhan Berpusat Pada Ibu

Salah satu faktor terpenting dalam membantu ibu untuk meminimalkan trauma terhadap perineumnya, mungkin adalah dengan mengembangkan suatu hubungan saling percaya. Penting sekali untuk mengembangkan suatu dialog dengannya sehingga ibu tahu bahwa anda melibatkannya dalam pengambilan keputusan mengenai asuhannya.

Menjalin kerjasama dengan ibu dan dapat mengatur kecepatan kelahiran bayi dan mencegah terjadinya laserasi. Kerjasama sangat bermanfaat saat kepala bayi pada diameter 5-6 cm tengah membuka vulva (*crowning*) karena pengendalian kecepatan dan pengaturan diameter kepala saat melewati introitus dan perineum dapat mengurangi kemungkinan robekan (JNPK-KR, 2008).

b. Massase Perineum

Massase perineum prapelahiran telah terbukti menurunkan kejadian robekan derajat dua dan tiga dan episiotomy (Beckmann & Garrett, 2006), terutama pada ibu yang berusia 30 tahun atau lebih (Shipman, dkk., 1997). Dalam suatu penelitian pengamatan terhadap penerimaan pemijatan perineum (Labrecque dkk., 2001), ibu dengan usia gestai 34-35 minggu dianjurkan untuk menjalani pemijatan perineum selama 5-10 menit setiap harinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik ini dipandang secara positif oleh beberapa ibu, dan sebagian besar mengatakan bahwa mereka akan melakukannya pada kehamilan berikutnya dan merekomendasikannya pada ibu hamil lainnya. Tidak ada bukti untuk mendukung diterapkannya pemijatan perineum oleh ahli-ahli kesehatan selama persalinan kala dua (NICE, 2007).

Massase perineum membantu ibu belajar untuk rileks selama persalinan dan memungkinkan jaringan menjadi lebih fleksibel dan dapat mencegah robek sama sekali. Dr. Robert Bradley, seorang DSOG dalam bukunya "*Husband Coached Childbirth*" menjelaskan bahwa massase perineum adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari terjadinya robekan pada perineum.

Persiapan Sebelum Peminjatan :

- 1) Persiapan untuk Ibu
  - a) Ruang yang tenang dan nyaman
  - b) Ruang yang aman
  - c) Ruang tidak terlalu terang
- 2) Persiapan untuk Pemijat
  - a) Tangan pemijat harus bersih dan bekerja secara hati – hati.



b) Selalu cepat tanggap terhadap Ibu jika mengalami rasa nyeri yang berlebihan.

c) Atur posisi Ibu dalam keadaan yang nyaman ketika melakukan pemijatan.

3) Alat

a) Minyak yang hangat seperti minyak gandum yang kaya vitamin E, minyak sayur atau sweet almond.

b) Jam atau petunjuk waktu untuk menghitung lamanya pemijatan.

c) Beberapa buah bantal untuk pengganjal Ibu.

d) Sarung tangan yang steril

e) Handuk kecil setelah pemijatan

Hasil penelitian Isti Kundarti, Finta dkk, 2014 dalam jurnal

“Pengaruh Pemijatan Perineum Pada Ibu Primigravida Terhadap Robekan Perineum Saat Persalinan” menunjukkan bahwa proporsi robekan perineum pada kelompok dipijat hanya 20%, sedangkan kelompok tidak dipijat 70%, perbedaan ini signifikan ( $p < 0,05$ ), RR = 2,66 (tanpa pijat perineum berisiko robekan perineum 2,66 kali lebih besar dibandingkan dengan yang dipijat perineum, sebaliknya ibu yang dipijat bisa mencegah terjadinya robekan perineum). Sebelum melakukan pemijatan, di ajarkan kepada ibu untuk mengambil Air panas diember dan diberi garam.

Kemudian menggunakan kain bersih yang sudah diseterika (agar steril) lalu air tersebut dimasukkan kedalam ember air panas yang ada garamnya tadi sedangkan uap di ember tersebut digunakan untuk menguapi vagina ibu. Ibu bisa duduk diatas ember tersebut agar uap air panas tersebut mengenai vagina ibu. Kemudian, kain yang

direndam di air panas diambil dan diperas lalu kompreskan pada daerah vagina dan perineum. Fungsi dari tindakan tersebut adalah untuk merangsang efek peregangan pada daerah perineum sehingga lebih elastis dan teregang. Namun ini tidak bisa diaplikasikan pada ibu yang mempunyai infeksi atau radang pada alat kelaminnya. Kemudian perineum mulai dipijat dengan teknik pemijatan sebagai berikut :

- 1) Cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir. Pastikan kuku tidak panjang agar tidak melukai darah perineum dan sekitarnya. Bila memungkinkan gunakan sarung tangan steril.
- 2) Jika ibu merasa takut cobalah untuk melakukan kompres air hangat pada daerah perineum selama 5 menit sampai 10 menit. sehingga otot perineum tidak tegang dan ibu merasa lebih rileks. Atur nafas dengan baik selama proses pijat perineum dilakukan.
- 3) Letakkan cermin besar tepat didepan ibu, untuk melihat daerah perineum dengan jelas.
- 4) Menganjurkan ibu berbaring dan memilih posisi yang nyaman, sesuai dengan yang ibu inginkan. Jika ibu melakukannya sendiri anjurkan untuk pilihlah posisi setengah duduk lalu menyangga punggung, leher, kepala, dan kedua kaki di bantal. Renggangkan kaki, kemudian meletakkan bantal di bawah setiap kaki.
- 5) Gunakan minyak zaitun, minyak vitamin E atau minyak essensial oil sweet almond hangat untuk melakukan pemijatan. Tidak direkomendasikan menggunakan baby oil, minyak mineral, jelly petroleum atau lotion tangan.

- 6) Menggunakan ibu jari (jika ibu mau melakukannya sendiri), menggunakan jari tengah dan telunjuk atau kedua jari telunjuk untuk memijat (bila dilakukan oleh pasangan). Berdiri dengan satu kaki menapak dilantai dan satu kaki diangkat diletakkan dikursi.
- 7) Sebelum memijat, anjurkan ibu untuk tarik nafas dalam dan rileks.
- 8) Masukkan ibu jari ke dalam liang vagina 3-4 cm (maks 7cm) dengan posisi ditekuk, dan jari lainnya diluar perineum.
- 9) Lakukan gerakan perlahan menekan dan meregangkan, kearah bawah dan kesamping. Pada awal-awal mungkin ibu akan merasakan agak panas (*slight burning*), namun perlahan akan menghilang dan terbiasa. Tahan selama 2 menit kebawah dan 2 menit kesamping.
- 10) Lakukan secara perlahan pijatan lembut kedepan dan kebelakang hingga melewati separuh dari vagina selama 3- 5 menit.
- 11) Dengan mempertahankan tekanan yang mantap, gerakan ibu jari atau telunjuk di dalam vagina lakukan pemijatan terus kedepan dan kebelakang, pijatan bolak-balik dan dengan bentuk huruf U dengan posisi jari tetap didalam secara berirama dan kebawah (*rectum*), selama 1-2 menit (20-30 kali).
- 12) Hindari memijat daerah uretra karena akan menyebabkan terjadinya infeksi dan iritasi. Hindari pula pemijatan terlalu keras karena akan menyebabkan terjadinya pembengkakan pada daerah perineum.
- 13) Setelah selesai kemudian melakukan kompres menggunakan air hangat/kain hangat kembali, untuk melancarkan peredaran darah

Hal-hal yang harus diperhatikan :

- 1) Sebelum melakukan pemijatan
  - a) Jangan memijat seandainya didaerah kemaluan ibu terdapat infeksi
  - b) Jangan memaksakan posisi pijat tertentu pada ibu
  - c) Jangan memaksa ibu untuk dipijat

- 2) Pada saat pemijatan
 

Hentikan pemijatan ketika kantung ketuban mulai pecah dan cairan ketuban mulai keluar. Atau, pada saat proses persalinan sudah dimulai.

c. Menahan Perineum

Ibu mengalami berbagai praktik selama persalinan kala dua, dengan tujuan melindungi perineum terhadap cedera perineum yang tidak diharapkan dan membantu kelahiran bahu. Uji coba HOOP (*Hands On Or Poised*) dirancang untuk membandingkan dua metode penatalaksanaan perineum selama persalinan kala dua (McCandlish dkk., 1998). “*Hands on*” mengharuskan bidan menggunakan satu tangan untuk memfleksikan kepala janin dan tangan untuk memfleksikan kepala janin dan tangan satunya lagi untuk menyokong atau “menahan” perineum—pelahiran bahu dibantu oleh fleksi lateral.

“*Hands poised*” mengharuskan bidan untuk membiarkan kepala dan bahu lahir dengan spontan, tanpa menyentuh perineum.

Hasil akhir primer uji coba ini adalah nyeri pasca-persalinan. Terdapat perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok dalam hal nyeri perineum yang dilaporkan oleh ibu pada hari kesepuluh pasca

persalinan, dengan lebih banyak ibu dari kelompok “*hands poised*” melaporkan nyeri dalam 24 jam sebelumnya.

Menurut JNPK (2011), laserasi spontan pada vagina atau perineum dapat terjadi saat kepala dan bahu dilahirkan. Kejadian laserasi akan meningkat jika bayi dilahirkan terlalu cepat dan tidak terkendali. Jalin kerjasama dengan ibu dan gunakan prasat manual yang tepat dapat mengatur kecepatan kelahiran bayi dan mencegah terjadinya laserasi. Kerjasama akan sangat bermanfaat saat kepala bayi berada pada diameter 5-6 cm tengah membuka vulva (*crowning*) karena pengendalian kecepatan dan pengaturan diameter kepala saat melewati introitus dan perineum dapat mengurangi kemungkinan terjadinya robekan.

Lindungi perineum dengan satu tangan (di bawah kain bersih dan kering), ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain dan tangan yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum. Melindungi perineum dan mengendalikan keluarnya kepala bayi secara bertahap dan hati-hati dapat mengurangi regangan berlebihan (robekan) pada vagina dan perineum.

d. Menghindari Episiotomi

Solusi sederhana untuk mencegah rupture perineum yaitu dengan menghindari tindakan episiotomi. Sebagai Paradigma pencegahan, episiotomi tidak lagi dilakukan secara rutin karena

dengan perasat khusus, penolong persalinan akan mengatur ekspulsi kepala, bahu dan seluruh tubuh bayi untuk mencegah laserasi atau hanya terjadi robekan minimal pada perineum. Masalah ini didukung dengan SK 786/Menkes/SK/VII/1999, tentang Pelaksanaan Asuhan Persalinan Normal (APN) (JNPK-KR, 2012).

Ini harus menjadi salah satu prioritas utama agar perineum ibu tetap utuh saat bersalin. Menghindari episiotomy, mengingat bahwa American Academy of Obstetri dan Ginekologi (ACOG) dan WHO-pun tidak mendukung penggunaan episiotomi secara rutin. sebagai penyedia layanan bidan penting untuk membantu menghindari episiotomy apa bila ibu tidak beresiko.

Melissa D, 2005, Dalam penelitiannya "*Perineal massage Effect on the incidence of episiotomy and laceration in a nulliparous population*" Dengan Studi prospektif, membandingkan 29 nullipara yang dipraktekkan pijat perineum dalam 6 minggu terakhir kehamilan dengan kelompok kontrol 26 nullipara. Di temukan hasil bahwa Episiotomi dan/ robekan perineum derajat kedua (atau lebih) terjadi pada 48% dari subyek eksperimental dan 77% dari kontrol. Chi kuadrat analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok ( $p < 0,05$ ).sehingga di simpulkan bahwa perineal massage bisa menjadi salah satu teknik yang akan mengurangi kebutuhan akan episiotomy.

Indikasi untuk melakukan episiotomi untuk mempercepat kelahiran bayi bila didapatkan (JNPK-KR, 2008) :

- a) Gawat janin dan bayi akan segera dilahirkan dengan tindakan
- b) Penyulit kelahiran pervaginam (sungsang, istosia bahu, ekstraksi cunam
- c) Janin prematur untuk melindungi kepala janin dari perineum yang ketat.
- d) Jaringan parut pada perineum atau vagina yang memperlambat kemajuan persalinan.
- e. Latihan Kegel

Ini juga efektif untuk membantu otot dasar panggul lebih kencang dan elastic. metode ini awalnya dikembangkan oleh Dr Arnold Kegel pada tahun 1948 untuk mengatasi inkontinensia pada wanita setelah melahirkan dengan memperkuat *pubococcygeus* atau otot "PC". Latihan-latihan ini dianjurkan untuk menghindari episiotomi. Perhatian khusus harus diberikan untuk mengkontraksikan hanya otot-otot PC bukan otot perut atau paha.

Melakukan latihan kegel:

- 1) Mengajarkan ibu mengosongkan kandung kemih.
- 2) Menyarankan ibu menghembuskan napas, sambil mengencangkan

otot panggul atau Dapat dilakukan dengan menahan urin saat

berkemih dan melepaskannya lagi (*Stop and Go*).

- 3) Tahan selama 10 hitungan. Bersantai untuk hitungan 10.
- 4) Mengajarkan ibu untuk melakukan 10 kali pengulangan tiga kali

sehari. Latihan kegel dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Banyak wanita melakukan latihan ini sebagai bagian dari rutinitas pijat perineum.

Selain senam kegel langkah lain yang dapat dianjurkan kepada ibu yaitu Yoga Prenatal Selama kehamilan. Latihan ini akan melatih

dasar panggul secara teratur dan membuat ibu merasa rileks. ini akan sangat bermanfaat untuk menghindari robekan pada perineum Anda.

f. Anjuran posisi meneran

Sebagai penolong persalinan harus membantu ibu untuk memilih posisi yang paling nyaman. Posisi meneran yang dianjurkan pada saat proses persalinan diantaranya adalah posisi duduk, setengah duduk, jongkok, berdiri, merangkak, dan berbaring miring ke kiri. Ibu dapat mengubah-ubah posisi secara teratur selama kala II karena hal ini dapat membantu kemajuan persalinan, mencari posisi meneran yang paling efektif dan menjaga sirkulasi utero-plasenter tetap baik. Keuntungan posisi duduk dan setengah duduk dapat memberikan rasa nyaman bagi ibu dan memberikan kemudahan baginya untuk beristirahat diantara kontraksi, dan gaya gravitasi mempercepat penurunan bagian terbawah janin sehingga berperan dalam kemajuan persalinan.

Sedangkan untuk posisi jongkok dan berdiri membantu mempercepat kemajuan kala II persalinan dan mengurangi rasa nyeri.

Beberapa ibu merasa bahwa merangkak atau berbaring miring ke kiri membuat mereka lebih nyaman dan efektif untuk meneran. Kedua posisi tersebut juga akan membantu perbaikan posisi *occiput* yang melintang untuk berputar menjadi posisi *occiput* anterior. Posisi merangkak dapat membantu ibu mengurangi rasa nyeri punggung saat persalinan. Posisi berbaring miring ke kiri memudahkan ibu untuk



beristirahat diantara kontraksi jika ibu kelelahan dan juga dapat mengurangi risiko terjadinya laserasi perineum (JNPK-KR, 2008).

Mengejan dengan menggunakan posisi telentang justru akan menekankan perineum dan menyempit outlet panggul sebanyak 30%.

Posisi persalinan sangat mempengaruhi kemungkinan terjadinya robekan pada jalan lahir. Dengan Posisi Jongkok, duduk, berlutut, merangkak, berdiri dapat mengurangi tekanan pada perineum karena dibantu oleh gaya gravitasi. Namun posisi terlentang litotomy membuat ruptur ataupun tindakan episiotomy tidak dapat dihindarkan lagi.

g. Perineal Support Untuk Menghindari Episiotomi (Kompres Panas/Dingin)

Penggunaan kompres hangat pada perineum selama pembukaan bahkan saat kepala *crowning* dapat membantu meningkatkan aliran darah dan melunakkan jaringan perineum serta peregangan jaringan dengan maksimal dan membantu ibu tetap santai. kompres dingin dapat mengurangi pembengkakan dan memberikan efek mati rasa untuk perineum.

h. Metode bersalin

1) *Waterbirth*

*Waterbirth* merupakan salah satu metode alternatif persalinan pervaginam, dimana ibu hamil aterm tanpa komplikasi bersalin dengan jalan berendam dalam air hangat (yang dilakukan pada bak mandi atau kolam) dengan tujuan mengurangi rasa nyeri

kontraksi dan memberi sensasi rasa nyaman. Dalam hal trauma perineum, dukungan air pada waktu kepala bayi akan menurunkan risiko robekan, dan dapat mengurangi keperluan akan tindakan episiotomi.

- 2) Mengurangi persalinan pervaginam operatif seperti penggunaan forsep dan vakum.
  - 3) Penggunaan oksitosin secara hati-hati. Penggunaan oksitosin yang berlebihan dapat mempercepat kala 2 sehingga tidak memberikan waktu bagi perineum untuk meregang secara maksimal.
  - 4) Menganjurkan ibu untuk tidak mengangkat bokong saat meneran
- i. Cara memimpin mengejan dan dorongan pada fundus uteri
- Setelah terjadi pembukaan lengkap, anjurkan ibu hanya meneran apabila ada dorongan kuat dan spontan untuk meneran. Sebaiknya tidak menganjurkan ibu untuk meneran berkepanjangan dan menahan nafas, anjurkan ibu beristirahat diantara kontraksi. Beritahukan pada ibu bahwa hanya dorongan alamiahnya yang mengisyaratkan ia untuk meneran dan kemudian beristirahat diantara kontraksi. Penolong persalinan hanya memberikan bimbingan tentang cara meneran yang efektif dan benar (JNPK-KR, 2008).

Kadang-kadang mengejan spontan pada wanita tidak terfokus, sehingga kemajuan hanya terjadi sedikit mengejan dengan mata terpejam kuat-kuat dan atau berteriak terus-menerus dan tidak ada kemajuan yang tampak setelah 20 atau 30 menit. Anjurkan ibu untuk mengubah posisi pada kala II, hal ini membantu ibu untuk focus dan mengejan lebih efektif. Menganjurkan ibu untuk tidak menutup

mata dan mengarahkan pandangannya pada vagina dan berfikir menekan bayi keluar. Tindakan-tindakan ini akan menghasilkan kemajuan tanpa terjadi gawat janin dan robekan pada perineum (Penny, Ruff Ancheta, 2005).

Sebagian besar daya dorong untuk melahirkan bayi, dihasilkan dari kontraksi uterus. Meneran hanya menambah daya kontraksi untuk mengeluarkan bayi. Pada saat persalinan hal yang tidak boleh dilakukan adalah menyuruh ibu meneran pada saat kepala telah lahir sampai *subocciput* dan melakukan dorongan pada fundus uteri karena kedua hal tersebut dapat meningkatkan risiko laserasi perineum, distosia bahu dan ruptur uteri (JNPK-KR, 2008).

Ibu dipimpin mengejan saat ada his atau kontraksi rahim, dan istirahat bila tidak ada his. Setelah *subocciput* di bawah simfisis, ibu dianjurkan untuk berhenti mengejan karena lahirnya kepala harus pelan-pelan agar perineum tidak robek. Pimpinan mengejan pada ibu bersalin yang tidak sesuai dengan munculnya his dan lahirnya kepala dapat mengakibatkan laserasi perineum hingga derajat III dan IV (JNPK-KR, 2008).

Dalam islam kita di anjurkan untuk memberikan pertolongan dalam hal kebaikan. Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan seperti menolong persalinan dengan baik, merupakan kebaikan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini tampak dalam Al-Quran penggalan surah al-maidah ayat 2 yang menyatakan bahwa:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ آثِمٍ وَالْعُدْوَنَ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ۚ

Terjemahannya :

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-maidah 5:2)*

Pelayanan akan dapat dikatakan baik apabila penyedia jasa dapat memberikan pelayanan secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan klien terhadap lembaga penyedia layanan jasa. Penyedia pelayanan kesehatan harus mengupayakan upaya preventif atau pencegahan untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul.

Upaya preventif atau pencegahan sama halnya dengan penjagaan diri pada waktu sehat. Upaya pencegahan di waktu sehat, lebih baik dari pada pengobatan pada waktu sakit. Allah SWT. Melarang manusia membiarkan dirinya binasa. Sunnah nabi pada riwayat para sahabat menunjukkan berbagai upaya untuk melakukan tindakan pencegahan penyakit seperti di nyatakan dalam Al-Quran.

Sebagai berikut :

□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□

وَمَا يَنْبَغِي لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْأَلُوا اللَّهَ عَن فَائِزَةٍ يُرَدُّونَ  
 وَأَن يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya:

*"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." ( Al-Baqarah;195).*

Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik yaitu, setiap kali kebatilan telah menguasai, maka kehidupan dan kemuliaan masyarakat berada dalam ancaman bahaya dan kebinasaan serta setiap pekerjaan yang membahayakan jiwa manusia, identik dengan sumber kebinasaan.

Dalam Praktik Klinik Kebidanan, semua tindakan yang dilakukan tenaga medis sangat banyak resiko yang dapat timbul. Bidan memiliki pekerjaan yang bisa membahayakan jiwa manusia dilihat dari banayknya resiko yang dapat timbul. Semua manusia dituntut untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Profesi bidan juga tak luput dari tuntutan tersebut, dimana bidan harus memberikan pelayanan yang baik sehingga tidak tidak membahayakan jiwa manusia yang bisa membawa kedalam kebinasaan.

Dalam hal ini bidan harus memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik saat persalinan, diantaranya

pelayanan memberikan asuhan untuk mencegah terjadinya ruptur perineum dan resiko lain. Upaya pencegahan juga telah diabdikan nabi dalam hadi berikut ini:

وفي رواية : عَطُوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ

Nabi bersabda yang Artinya:

*"Tutuplah bejana dan tempat minumu, sebab sesungguhnya dalam setahun ada satu malam waktu wabah penyakit diturunkan. Bila wabah itu lewat sedang makanan atau minuman terbuka, maka wabah tersebut akan masuk kedalamnya". (HR. Ahmad dan Muslim).*

Nabi juga bersabda yang Artinya "orang yang sakit jangan dibawa mendekati orang yang sehat". (HR. Bukhari dan muslim). Bila setiap orang diharuskan memelihara kesehatan, maka berusaha mencegah timbulnya penyakit merupakan keharusan pula, seperti halnya upaya memberikan sentuhan kekebalan (imunisasi), atau upaya mencegah terjadinya ruptur perineum. Pencegahan ruptur memberikan manfaat yang efektif terhadap kejadian perdarahan dan resiko.

#### 7. Komplikasi

Risiko komplikasi yang mungkin terjadi jika ruptur perineum

tidak segera diatasi, yaitu :

##### a. Perdarahan

Seorang wanita dapat meninggal karena perdarahan pasca persalinan dalam waktu satu jam setelah melahirkan. Penilaian dan penatalaksanaan yang cermat selama kala satu dan kala empat persalinan

sangat penting. Menilai kehilangan darah yaitu dengan cara memantau tanda vital, mengevaluasi asal perdarahan, serta memperkirakan jumlah perdarahan lanjutan dan menilai tonus otot (Depkes, 2008).

b. Fistula

Fistula dapat terjadi tanpa diketahui penyebabnya karena pada vagina menembus kandung kencing atau rectum. Jika kandung kencing luka, maka air kencing akan segera keluar melalui vagina. Fistula dapat menekan kandung kemih atau rectum yang lama antara kepala janin dan panggul, sehingga terjadi iskemia (Depkes, 2008).

c. Hematoma

Hematoma seperti telah dikatakannya bahwa dalam kehamilan pembuluh-pembuluh darah vena dapat mekar, baik yang berada dalam rongga panggul maupun yang diluar (genitalia eksternal). Dalam kehamilan, persalinan atau sesudah bersalin pembuluh darah ini dapat pecah, menyebabkan perdarahan dan hematoma vulva dan vagina bisa pula di sebabkan trauma, baik trauma di luar persalinan maupun trauma dalam persalinan. Bila tidak ada pemeriksaan yang teliti dapat terjadi misalnya perdarahan intraligamenter yang luas sehingga wanita menjadi anemia bahkan jatuh dalam syok (Mochtar, 2013).

d. Infeksi

Infeksi pada masa nifas adalah peradangan di sekitar alat genitalia pada kala nifas. Perlukaan pada persalinan merupakan tempat masuknya kuman ke dalam tubuh sehingga menimbulkan infeksi. Dengan ketentuan meningkatnya suhu tubuh melebihi 38°C

(Rosdiana, 2012). Infeksi nifas mencakup semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam alat-alat genital pada waktu persalinan dan nifas. Faktor pemicu infeksi bisa karena partus lama, terutama dengan ketuban pecah dini, tindakan bedah vaginal, yang menyebabkan perlukaan jalan lahir, tertinggalnya sisa plasenta, selaput ketuban, dan bekuan darah. Infeksi ditandai dengan kenaikan suhu sampai 38°C atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama postpartum (Wiknjosastro, 2008).

8. Penanganan

Penanganan rupture perineum diantaranya dapat dilakukan dengan cara melakukan penjahitan luka lapis demi lapis, robekan kecil pada perineum jarang memerlukan penjahitan karena trauma yang dialami ibu dapat lebih berbahaya dibanding robekan kecil. Biarkan robekan kecil tersebut tanpa penjahitan, luka akan segera sembuh tanpa efek yang merugikan terhadap pemulihan perineum.

Penjahitan harus dilaksanakan secara aseptik, karena infeksi pada luka episiotomy dapat mengakibatkan perdarahan postpartum dan infeksi nifas. Harus diupayakan tepi jaringan tersambung dengan tepat, sebab dapat mengakibatkan gangguan fungsi seksual (rasa nyeri) untuk waktu yang lama. Sebelum dilakukan penjahitan, berikan anastesi local menggunakan lidokain 1% tanpa epineprin (Yuni Kusmiyati, 2010). Prinsip yang harus diperhatikan dalam menangani rupture perineum adalah :



- a. Bila seorang ibu bersalin mengalami perdarahan ruptur perineum setelah anak lahir, segera memeriksa perdarahan tersebut berasal dari retensio plasenta atau plasenta tidak lahir lengkap.
- b. Bila plasenta telah lahir lengkap dan kontraksi uterus baik, dapat dipastikan bahwa perdarahan tersebut berasal dari perlukaan pada jalan lahir, selanjutnya dilakukan penjahitan (Yuni Kusmiyati, 2010).

Peralatan dan perlengkapan :

- (a) Alat perlindungan diri (celemek, masker, kaca mata, penutup kepala, sepatu/alas kaki.
- (b) Sarung tangan steril
- (c) Nelpoeder
- (d) Gunting benang
- (e) Benang (poliglokolik atau catgut kromik). Sebaiknya digunakan benang poliglikolik. Catgut kromik dapat juga digunakan, tetapi tidak ideal. (Saifuddin, 2004)
- (f) Pinset cirurgis
- (g) Jarum otot dan jarum kulit
- (h) Kom
- (i) Akuades
- (j) Lampu sorot/ senter
- (k) Lidokain 1% tanpa epineprin
- (l) Spoid 10ml
- (m) Bengkok / nierbekken
- (n) Waskom berisi larutan klorin 0,5%

- c. Prinsip melakukan penjahitan pada robekan perineum :

Reparasi mula-mula dari titik pangkal robekan setelah dalam atau proksimal kearah luar (distal). Jahitan dilakukan lapis demi lapis, dari dalam kemudian lapis luar.

1) Robekan perineum tingkat I :tidak perlu dijahit jika tidak ada perdarahan dan aposisi luka baik, namun jika terjadi perdarahan segera jahit dengan menggunakan benang catgut secara jelujur atau dengan cara angka delapan.

2) Robekan perineum tingkat II : untuk laserasi derajat I atau II jika ditemukan robekan tidak tara atau bergerigi harus diratakan terlebih dahulu sebelum dilakukan penjahitan. Pertama otot dijahit dengan catgut kemudian selaput lender. Vagina dijahit dengancara terputus-putus atau jelujur. Penjahitan mukosa vagina dimulai dari puncak robekan. Kulit perineum dijahit dengan benang catgut secara jelujur.

3) Robekan perineum tingkat III : memeriksa uterus dan memastiktikan bahwa uterus berkontraksi. Periksa vagina, perineum, dan serviks secara cermat. Untuk melihat spingter ani robek. Masukkan jari yang memakai sarung tangan kedalam anus. Angkat jari dengan hati-hati dan identifikasi sfingter. Periksa permukaan rectum dan perhatikan robekan dengan cermat. Ganti sarung tangan yang bersih, steril atau yang DTT. Masukkan sekitar 10ml larutan lignokain 0,5% kebawah mukosa vagina, kebah kulit perineum dan otot perinatal yang dalam. Pada akhir penyuntikan, tunggu selama dua menit kemudian jepit area

robekandengan forsep. Jika ibu dapat merasakan jepitan tersebut, tunggu dua menit lagi kemudian lakukan tes ulang. Jahit rectum dengan jahitan putus-putus menggunakan benang 3-0 atau 4-0 dengan jarak 0,5cm untuk menyatukan mukosa. Jika sfingter robek pegang setiap ujung sfingter dengan klem allis (sfingter akan beretraksi jika robek). Selubung fascia disekitar sfingter kuat dan tidak robek jika ditarik dengan klem. Jahit sfingter dengan dua atau tiga jahitan putus-putus menggunakan benang 2-0, periksa anus dengan jari yang memakai sarung tangan untuk memastikan penjahitan rectum dan sfingter dilakukan dengan benar. Selanjutnya, ganti sarung tangan yang bersih, steril ayau yang DTT. Jahit mukosa vagina, otot perineum dan kulit (saputra, 2012).

4) Robekan perineum tingkat IV: ujung-ujung otot sfingter ani yang terpisah karena robekan diklem dengan klem pean lurus, kemudian dijahit antara 2-3 jahitan catgut kromik sehingga bertemu kembali. Selanjutnya robekan dijahit lapis demi lapis seperti robekan perineum tingkat III (saputra, 2012).


#### ***D. Kerangka Konsep***

##### **1. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti**

Pada penelitian ini terdapat satu variabel yaitu variabel tunggal yang merupakan variabel yang terdiri dari beberapa varians, yang saling

mempengaruhi dan yang menjadi variabel tunggal adalah Pengetahuan mahasiswa kebidanan tentang pencegahan ruptur perineum.

## 2. Kerangka Konsep



Keterangan :



: Variabel Penelitian



: Penjabaran variable yang diteliti

## 3. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

Defenisi Operasional adalah defenisi yang membatasi ruang

lingkup dari variabel yang diamati atau yang diteliti.

### a. Defenisi & Tingkatan Ruptur perineum

Definisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang

berhubungan dengan segala sesuatu tentang definisi Rupture

Perineum dan segala sesuatu tentang Tingkatan Rupture perineum

berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria objektif :

- 1) Baik : bila nilai jawaban responden 76 - 100%
- 2) Cukup : bila nilai jawaban responden 60 – 75%
- 3) Kurang : bila nilai jawaban responden < 60%

b. Pencegahan Rupture Perineum

Pencegahan Rupture Perineum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan responden untuk menjawab

pertanyaan yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang

Pencegahan Rupture Perineum berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria objektif :

- 1) Baik : bila nilai jawaban responden 76 - 100%
- 2) Cukup : bila nilai jawaban responden 60 – 75%
- 3) Kurang : bila nilai jawaban responden < 60%

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi rupture perineum

Faktor-faktor yang mempengaruhi rupture perineum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan responden untuk

menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan segala sesuatu

tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi rupture perineum

berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria objektif :

- 1) Baik : bila nilai jawaban responden 76 - 100%
- 2) Cukup : bila nilai jawaban responden 60 – 75%
- 3) Kurang : bila nilai jawaban responden < 60%

d. Pemijatan Perineum

Definisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang

berhubungan dengan segala sesuatu tentang definisi Rupture

Perineum berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Kriteria objektif :

- 1) Baik : bila nilai jawaban responden 76 - 100%
- 2) Cukup : bila nilai jawaban responden 60 – 75%
- 3) Kurang : bila nilai jawaban responden < 60%



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian survei deskriptif. Dalam penelitian survei deskriptif, penelitian di arahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat (Notoatmojo, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar semester iv tahun 2016 tentang pencegahan ruptur perineum.

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### ***1. Lokasi penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Kebidanan yang bertempat di Jln. Sultan Alauddin Makassar No.36 Samata Kab. Gowa, Sulawesi Selatan 90221.

##### ***2. Waktu penelitian***

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2016.

#### ***C. Populasi dan sampel***

##### ***1. Populasi***

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah

semua mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semester iv tahun 2016 sebanyak 62 orang.

## 2. Sampel

### a. Pengertian Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiono, 2015).

### b. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel ini diambil secara *totaling sampling*. Total sampling adalah seluruh jumlah populasi yang akan diteliti di jadikan sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 62 orang, sampel ditentukan dengan menggunakan metode *total sampling*.

## ***D. Tehnik pengumpulan data***

Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dengan cara membagikan koesioner yang berisi beberapa jumlah pernyataan yang dibuat oleh peneliti sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mencatat seluruh jumlah mahasiswa di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semester iv dalam 1 tahun.

## ***E. Instrument penelitian***



Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau koesioner berupa daftar pernyataan tertulis yang dipersiapkan terlebih dahulu untuk mendapatkan data dan informasi dari responden. Koesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari responden mengenai pengetahuan mahasiswa di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semester iv tentang pencegahan ruptur perineum. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat para responden akan menyiapkan responden tertutup, yaitu jawaban dalam penelitian itu telah ditentukan oleh peneliti.

#### ***F. Teknik pengolahan data dan analisis data***

##### **1. Teknik pengolahan data**

Pengolahan data dilakukan secara manual dan menggunakan kalkulator. Data yang dikumpul melalui koesioner dengan daftar pertanyaan berbentuk *multiple choise* (pilihan ganda) dengan 3 (tiga) alternatif pilihan, selanjutnya diolah dengan rumus sebagai berikut :

$$S=R$$

Keterangan :

S = Skor yang diperoleh

R = Jawaban yang benar

##### **2. Analisa data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisa untuk mengetahui presentasi gambaran pengetahuan mahasiswa di jurusan Kebidanan

Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar semester iv tentang pencegahan ruptur perineum, dengan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P = Presentase yang dicari

f = Frekuensi variabel

n = Jumlah sampel

#### **G. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. *Editing*

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

##### 2. *Coding*

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) diberikan untuk jawaban yang salah.

##### 3. *Tabulating*

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk table deskriptif sederhana, bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

#### **H. Etika Penelitian**

Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek antara lain menjamin kerahasiaan identitas responden dan kemungkinan terjadi

ancaman terhadap responden. Sebelum pelaksanaan penelitian, kepada responden diberikan lembar persetujuan tentang kesediaan responden menjadi partisipan dalam penelitian ini, dengan terlebih dahulu membaca, mengerti dan memahami isi surat persetujuan tersebut. Apabila responden bersedia, maka responden dipersilahkan untuk menandatangani surat pernyataan lembaran persetujuan tersebut.

Tetapi jika responden tidak bersedia atau menolak untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini, maka tidak ada paksaan dan ancaman pada responden tersebut. Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi:

1. *Informed Consent*

*Informed consent* merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan.

*Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden.

2. Tanpa nama (*Anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UIN Alauddin Makassar pada tanggal 28 Juli sampai 18 Agustus 2016. Hasil penelitian mengenai mengenai gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar semester IV tentang pencegahan ruptur perineum Tahun 2016 dengan populasi sebanyak 62 orang dan menggunakan metode *total sampling*, maka diperoleh jumlah sampel adalah 62 orang.

Hasil dari penelitian tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tabel Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tentang Pencegahan Ruptur Perineum Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Tentang Defenisi dan Tingkat Ruptur Perineum.

**Tabel 4.1**

**Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV Tahun 2016 Tentang Defenisi dan Tingkat Ruptur Perineum**

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Presentase (%)
Baik	56	90,32
Cukup	-	-
Kurang	6	9.68
Jumlah	62	100

Sumber : Data Primer

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 62 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang defenisi dan tingkat ruptur perineum sebanyak 90,32% (56 orang), dan sebanyak 9.67% (6 orang) yang memiliki pengetahuan kurang.

2. Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan ruptur perineum

**Tabel 4.2**

**Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan  
UIN Alauddin Makassar Semester IV Tahun 2016 Tentang  
Pencegahan terjadinya Ruptur Perineum**

<b>Tingkat Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
<b>Baik</b>	13	20.96
<b>Cukup</b>	-	-
<b>Kurang</b>	49	79.03
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 62 responden, jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang pencegahan ruptur perineum sebanyak 79.03% (49 orang) dan sebanyak 20.96% (13 orang) yang memiliki pengetahuan baik.

3. Tingkat Pengetahuan mahasiswa tentang penanganan ruptur perineum

**Tabel 4.3**

**Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan  
UIN Alauddin Makassar Semester IV Tahun 2016 Tentang  
Penanganan Ruptur Perineum**

<b>Tingkat Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
----------------------------	------------------	-----------------------

<b>Baik</b>	2	3.23
<b>Cukup</b>	-	-
<b>Kurang</b>	60	96.77
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 62 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang penanganan ruptur perineum sebanyak 96.77% (60 orang) dan sebanyak 3.22% (2 orang) yang memiliki pengetahuan baik.

#### 4. Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang pemijatan perineum

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan**  
**UIN Alauddin Makassar Semester IV Tahun 2016**  
**Tentang Pemijatan Perineum**

<b>Tingkat Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
<b>Baik</b>	5	8.06
<b>Cukup</b>	-	-
<b>Kurang</b>	57	91.93
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 62 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang

pemijatan perineum sebanyak 91.93% (57 orang) dan sebanyak 8.06% (5 orang) yang memiliki pengetahuan baik.

## **B. PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar semester IV tentang pecegahan ruptur perineum yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh mahasiswa termasuk defenisi, tingkat ruptur, pencegahan, penanganan dan pemijatan perineum. Hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Distribusi tingkat pengetahuan mahasiswa tentang defenisi dan tingkat ruptur perineum.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 62 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang defenisi dan tingkat rupture perineum sebanyak 90.32% (59 orang) yang memiliki tingkat pengetahuan baik dan sebanyak 9.67% (6 orang) yang memiliki pengetahuan kurang. Hasil penelitian tentang defenisi dan tingkat rupture perineum dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mahasiswa dalam kategori baik dimana hanya 6 mahasiswa yang memiliki pengetahuan kurang.

Sebagaimana menurut Notoatmodjo tingkatan pengetahuan yang pertama yaitu tahu (*Know*), dimana Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang

paling rendah. Oleh karena itu, jika meyangkut materi mengenai definisi seseorang akan lebih cenderung menghafal ketimbang memahami.

Rupture perineum merupakan robekan atau perlukaan jalan lahir yang terjadi saat kelahiran bayi baik menggunakan alat ataupun tidak. Robekan yang terjadi bisa luka karena episiotomi, robekan perineum spontan derajat ringan sampai ruptur perineum totalis. Rupture perineum hampir semua terjadi pada persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Proses persalinan normal hampir 90% yang mengalami robekan perineum baik dengan atau tanpa spisiotomi (Retno, dkk 2016).

Di Asia masalah robekan perineum cukup banyak dalam masyarakat, 50% dari kejadian robekan perineum di dunia terjadi di Asia. Rupture perineum dialami oleh 85% wanita melahirkan pervaginam. Prevalensi ibu bersalin yang mengalami robekan perineum di Indonesia pada golongan umur 25-30 tahun yaitu 24%, dan pada ibu umur 32-39 tahun sebesar 62%. Ruptur perineum perlu mendapatkan perhatian karena dapat menyebabkan disfungsi organ reproduksi wanita, sebagai sumber perdarahan, dan sumber atau jalan keluar masuknya infeksi, yang kemudian dapat menyebabkan kematian karena perdarahan atau sepsis. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Retno tahun 2016 menyatakan bahwa kejadian ruptur perineum spontan di RSUD Tugurejo Semarang lebih banyak dialami oleh ibu primipara dan lebih banyak persalinan dengan jarak kelahiran serta lama persalinan kala II yang beresiko



sehingga rentan terjadinya rupture perineum spontan pada persalinan normal (Retno Suciana, 2016).

2. Distribusi tingkat pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan terjadinya rupture perineum

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 62 responden, jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang pencegahan ruptur perineum sebanyak 79.03% (49 orang) dan sebanyak 20.96% (13 orang) yang memiliki pengetahuan baik. Hasil penelitian tentang pencegahan rupture perineum dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa dalam kategori kurang karena dari 62 responden sebanyak 49 orang responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, tidak ada satupun mahasiswa yang memiliki pengetahuan baik dan hanya 13 orang memiliki pengetahuan baik. Dalam penelitian ini, pengetahuan responden dalam menjawab kuesioner yang telah dibagikan masih kurang.

Hal ini kemungkinan dikarenakan berbagai faktor pada saat mengisi kuesioner atau memang kurangnya pengetahuan responden tentang pencegahan rupture perineum. Dimana mahasiswa tingkat II ini, memiliki kegiatan dalam berorganisasi serta urusan dalam menyelesaikan berbagai studi atau pembelajaran yang tertunda. Bahkan tingkat pengetahuan yang kurang dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam menyerap pelajaran. Sehingga pengetahuan

tiap mahasiswa berbeda-beda dalam pemahaman dan menerapkan pelajaran yang telah didapat.

3. Distribusi tingkat pengetahuan mahasiswa tentang penanganan ruptur perineum

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 62 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang penanganan ruptur perineum sebanyak 96.77% (60 orang) dan sebanyak 3.22% (2 orang) yang memiliki pengetahuan baik. Dalam penelitian ini, kemampuan responden dalam menjawab kuesioner yang dibagikan masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat pengetahuan responden tentang penanganan ruptur perineum dan kurangnya perhatian saat menerima materi perkuliahan dari dosen, dikarenakan kegiatan mahasiswa di luar kegiatan belajar seperti mengikuti organisasi yang padat sampai malam dapat menyebabkan mahasiswa sering mengantuk dikelas serta kurangnya usaha responden untuk mencari materi di internet dan media lainnya diluar jadwal kuliah.

Sangat kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang penanganan ruptur perineum ataupun materi kebidanan lain mungkin juga disebabkan faktor acuhnya mahasiswa tentang suatu materi dan hanya mengandalkan pembelajaran saat menerima materi kuliah dari dosen yang bersangkutan sehingga tidak mengulang pembelajaran di rumah. Bahkan hal yang dapat menjadi faktor tingkat pengetahuan mahasiswa kurang dikarenakan mahasiswa lebih banyak menyia-nyaiakan waktunya hanya untuk

menonton TV, bermain HP, membaca novel, dan memilih kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan.

Adapun hal lain yang menjadi faktor tingkat pengetahuan mahasiswa kurang yaitu dengan motivasi belajar dimana dua hal ini saling mempengaruhi. Motivasi belajar sebagai penggerak dari dalam diri mahasiswa itu sendiri untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Motivasi tersebut tumbuh karena ada keinginan untuk bisa mengetahui dan memahami sesuatu dan mendorong serta mengarahkan minat belajar mahasiswa sehingga sungguh-sungguh untuk belajar dan termotivasi untuk mencapai prestasi.

4. Distribusi tingkat pengetahuan mahasiswa tentang pemijatan rupture perineum

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 62 responden, diketahui jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang pemijatan perineum sebanyak 91.93% (57 orang) dan sebanyak 8.06% (5 orang) yang memiliki pengetahuan baik. Dalam penelitian ini tingkat pengetahuan mahasiswa kurang. Dari hasil pengukuran tingkat pengetahuan mahasiswa tentang pemijatan perineum, peneliti menemukan bahwa tingkat pengetahuan responden sangat kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi dan kesadaran mahasiswa untuk membaca jurnal, buku, mengikuti seminar dan pelatihan di luar perkuliahan. Yang mana diharapkan sebagai calon tenaga kesehatan dan sebagai tenaga

kesehatan diharapkan untuk selalu memperbaharui pengetahuan yang dimiliki agar semakin terlaksana pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Menurut Walyani (2015), bahwa Bidan adalah orang yang diharapkan ibu sebagai pendamping persalinan yang dapat diandalkan serta mampu memberikan dukungan, bimbingan dan pertolongan persalinan. Asuhan yang sifatnya mendukung selama persalinan merupakan suatu standar pelayanan kebidanan. Asuhan yang mendukung berarti bersifat aktif dan ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Jika seorang bidan sedang sibuk, maka ia harus memastikan bahwa ada seorang pendukung yang hadir dan memantau wanita yang sedang dalam persalinan.

Mahasiswa kebidanan sebagai calon bidan yang akan bekerja ditengah-tengah masyarakat harus mengerti tentang peran fungsi mereka dan kompetensi yang harus dimiliki, sadar dengan perkembangan profesi bidan terutama dalam perkembangan pendidikan bidan, karena menjadi bidan yang professional harus melewati jenjang pendidikan. Hal lain yang harus dipahami oleh setiap bidan agar menjadi bidan profesional adalah dengan memiliki persepsi yang baik terhadap profesi bidan, sehingga mengetahui dan paham tentang perkembangan pendidikan bidan, perkembangan pelayanan kebidanan, peran fungsi dan kompetensi bidan, kode etik bidan dan standar pelayanan bidan.

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan sebagai provider dan lini terdepan pelayanan kesehatan yang dituntut memiliki kompetensi profesional dalam menyikapi tuntutan masyarakat

didalam pelayanan kebidanan. Kompetensi profesional bidan terkait dengan asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Karena, pengetahuan, keahlian dan kecakapan seorang bidan menjadi bagian yang menentukan dalam menekan angka kematian saat melahirkan. Bidan diharapkan mampu mendukung usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yakni melalui peningkatan kualitas kebidanan (Salim SRAS, dkk 2012).

Seperti yang dijelaskan tentang Pengetahuan merupakan hasil dari “Tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar, pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoatmodjo, 2007). Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar semester IV tentang pencegahan rupture perineum masih kurang. Dimana mahasiswa hanya sekedar tahu tapi tidak memahami khususnya tentang materi rupture perineum. Dimana memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat mengintegrasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan

contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipahami.

Sebagai seorang mahasiswa kebidanan yang nantinya akan menjadi seorang bidan yang terjun di tengah-tengah masyarakat. Maka seharusnya memanfaatkan waktu di bangku perkuliahan untuk menambah ilmu dan memperdalam materi-materi kebidanan sehingga menjadi bidan professional nantinya. Bidan yang terampil dan berkualitas perlu dimunculkan dengan pendidikan kebidanan yang berkualitas pula. Sehingga harapan ke depan, angka kematian ibu dan bayi dalam persalinan dapat ditekan seminimal mungkin (Walyani, 2015).

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kebidanan UIN Alauddin Makassar Semester IV tentang Pencegahan Rupture Perineum maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tingkat pengetahuan tentang defenisi dan tingkatan rupture perineum, dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan cukup yaitu dari 62 responden sebanyak 90,32% (56 orang) memiliki tingkat pengetahuan baik.
2. Tingkat pengetahuan tentang pencegahan rupture perineum, dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu dari 62 responden sebanyak 79,03% (49 orang) memiliki pengetahuan kurang.
3. Tingkat pengetahuan tentang penanganan rupture perineum, dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu dari 62 responden sebanyak 96,77% (60 orang) memiliki tingkat pengetahuan kurang.
4. Tingkat pengetahuan tentang pemijatan perineum, dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu dari 62 responden sebanyak 91,93% (57 orang) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada semua mahasiswa kebidanan UIN Alauddin Makassar khususnya mahasiswa semester IV untuk lebih giat belajar, lebih memperhatikan pelajaran yang dijelaskan oleh dosen, dan lebih aktif dalam mencari referensi bacaan tentang materi-materi kebidanan baik dari media buku di perpustakaan, internet maupun jurnal..
2. Diharapkan juga kepada semua dosen pembimbing khususnya di prodi kebidanan agar dapat membantu dan membimbing mahasiswa untuk lebih belajar dan aktif dalam setiap pelajaran yang diajarkan, serta dapat memberikan motivasi dan lebih meningkatkan program praktek dan lab skill didalam pembelajaran yang diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, AM, dkk, 2016. *Maternal Mortality a tertiary care hospital experience in Upper Egypt*. Egypt: Journal International Diakses pada tanggal 22 April, 2017
- Al-Quran & Terjemahannya*. Kementerian Agama RI. 2012. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- American College Of Nurse-Midwives. *Perineal Massage In Pregnancy*. Vol. 50, no. 1 (January/February 2005). <https://www.midwife.org/ACNM/files/-ccLibraryFiles/Filename/000000000656/Perineal%20Massage%20in%20Pregnancy.pdf> (diakses tanggal 25 juni 2016).
- Andriyani, Ari. *Pengaruh Masase Perineum Dan Supercrowning Dalam Pencegahan Ruptur Perineum P Ada Primipara Di Puskesmas Mergangsan Yogyakarta*. Jurnal Kebidanan ARIMBI, Vol. IV no.3 (April 2011).
- Anggraita, Dian, 2013. *Tingkat Pengetahuan Mahasiswa DIII Kebidanan Semester II Dengan Sikap Pencegaha Infeksi DI STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta Tahun 2013, Yogyakarta*.
- Aritonang, Juneris dan HasugianLasmaika. *Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pencegahan Robekan Perineum Pada Persalinan Kala Ii Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Empat Kabupaten Asahan Tahun 2015*. Jurnal Maternal dan Neonatal,12/05(2016), 35-42. Diakses tanggal 29 maret 2017.
- Asiyah, Nor. *Perbedaan Kejadian Ruptur Perineum Pada Posisi Mengejan Antara Telentang dan Kombinasi*. Jurnal ilmu keperawatan dan kebidanan, Vol. 4 no. 2 (2013).
- Asri, Dwi H dan Cristine Clervo P. *Asuhan Perslinan Normal Plus Contoh Askeb dan Patologi Persalinan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Asrinah, dkk. *Asuhan Kebidanan Masa Persalinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Baston, Helen dan Jennifer Hall. *Midifery Essential: Perasalinan, Vol. 3*. Jakarta: EGC, 2011.
- Bidan Kita. (2009). *Perineum Massage*, (online), (<http://www.bidankita.com/9index.php?option=comcontent&view=article&id=162:cegah-robekan-perineum-dengan-perineum-massage&catid=44:natural-childbirth&Itemid=56> diakses tanggal 21 mei 2016).
- Chapman, Vicky. *Asuhan Kebidanan Persalinan & Kelahiran*. Jakarta: EGC, 2006.




- Cunningham, F. Gary, dkk. *Ostetri Williams, Ed. 21, Vol. 1*. Jakarta: EGC, 2006.
- Divini, Verby, dkk, 2017. Hubungan Perawatan Luka Perineum Dengan Perilaku *Personal Hygiene* Ibu Post Partum Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Gmim Manado. E-Journal Keperawatan (e-Kp) Volume 5 Nomor 1, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado. Diakses tanggal : 28 agustus 2017
- Dorland, W. A. Newman. *Kamus Kedokteran Dorland, Ed. 31*. Jakarta: EGC, 2010.
- Eniyati dan Afifin Sholihah. *Asuhan Kebidanan pada Persalinan Patologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Eniyati dan Melisa Putri. *Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2012
- Hidayat, Aziz Alimul. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Salemba Medika. Jakarta: 2007.
- Hidayati, Riningsih dan Sultanah Zahariah. *Smart Midwifery The Journal of Midwifery: Pengaruh Pemijatan Perineum Terhadap Ruptur Perineum Pada Primigravida di BPS Ny. "R" Di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember*, Vol. 2 no. 2 (November-April 2014).
- Jaringan Nasional Pelatihan Klinik-Kesehatan Reproduksi, Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (JNPK-KR/POGI), dan JHPIEGO Corporation. *Asuhan Persalinan Normal Auhan Eenial Peralinan Buku Acuan*. Jakarta: Jaringan Nasional Pelatihan Klinik, 2007.
- Johnon, Ruth dan Wendy Taylor. *Buku Ajar Praktik Kebidanan*. Jakarta: EGC, 2004.
- Kundarti, Finta Isti, dkk. "Pengaruh Pemijatan Perineum Pada Ibu Primigravida Terhadap Robekan Perineum Saat Persalinan". *Gema Bidan Indonesia*, Vol. III no. 1 (Maret 2014).
- Kuswanti, Ina dan Fitria Melia. *ASKEB II Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Labracque, Michel, at. El. *British Journal of Obstertrics and Gynecology : Women's views on the practice of prenatal perineal massage*. Vol. 108, pp. 499-504. May 2001. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.2001.00111.x/epdf>. (aces on : 28 june 2016)
- Lailiyana, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jakarta: EGC, 2011.

- Liu, David T.Y. *Manual Persalinan Ed. 3*. Jakarta: EGC, 2007.
- Medforth, Janet, dkk. *Kebidanan Oxford dari Bidan untuk Bidan*. Jakarta: EGC, 2011.
- Meliono, Irmayanti, dkk. *MPKT Modul 1*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI. 2007.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/pengetahuan> di akses tanggal 1 juni 2016.
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional: *Millennium Development Goals*, Oktober 2008.
- Michael, M Beckmann<sup>1</sup> and Owen M Stock. *Antenatal Perineal Massage For Reducing Perineal Trauma*. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2013, Issue 4. Art. No.: CD005123. DOI:10.1002/14651858.CD005123. pub3. (30 November 2012).
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta: 2011.
- Nurasiah, Ai, dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*. Bandung : PT Refika Aditama, 2012.
- Oxorn, Harry dan William R. Forte. *Ilmu Kebidanan: Patologi & Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Priyantini, Mulyati dan Ely Eko Agustina. “Efektivitas Posisi Tangan Penolong Dalam Pencegahan Ruptur Perineum Spontan Pada Kala Ii Persalinan di RSIA “Bunda Arif” Purwokerto”. *Laporan hail penelitian*. Purwakerto : Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto, 2013.
- Prawirahardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Pt Bina Pustaka Sarwono Prawirahardjo, 2010.
- Raman, Savithri. *International Journal of Current Research and Academic Review: Effectiveness of Self Perineal Care and Aseptic Perineal care towards Healing of Episiotomy wounds among Postnatal Mothers*. Vol. 3 no. 8 (August-2015).
- Saifuddin, Abdul Bari, dkk. *Buku Panduan Prakti Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirahardjo, 2004.
- Salim SRAS. *Pengaruh karakteristik individu (pendidikan, masa kerja, pengalaman kerja, pelatihan) dan motivasi (tanggung jawab, pengakuan, pengembangan, kondisi kerja, imbalan) terhadap kompetensi bidan di RSIA Pemerintah Aceh*. Penelitian: universitas Utara. 2012.

- Savitri, Wewet dkk. *Pengaruh Pemijatan Perineum pada Primigravida terhadap Kejadian Ruptur Perineum saat Persalinan di Bidan Praktek Mandiri di Kota Bengkulu Tahun 2014*. Jurnal Kesehatan Andalas. 2015; 4(1). <http://jurnal.fk.unand.ac.id>. diakses tanggal 19 Maret 2016.
- Shafiyurrahman, Syaik Al-Mubarak. *shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung : Pustaka Ibnu Katsir, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suciana, Retno. *Hubungan Faktor Maternal dengan Kejadian Rupture Perineum Spontan di RSUD Tugurejo Semarang, 2016*.
- Sumarah, dkk. *Perawatan Ibu Bersalin (Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin)*. Yogyakarta: Penerbit Fitramaya, 2011.
- Survey demografi dan kesehatan Indonesia, 2012. Kematian ibu.
- Stamp, Georgina. *Perineal Massage In Labour And Prevention Of Perineal Trauma: Randomised Controlled Trial*. Vol. 322(7297): 1277-1280. 6 may 2001 [bmj.com](http://www.bmj.com). [http://www.cochrane.org/CD005123/PREG\\_antenatal-perineal-massage-for-reducing-perineal-trauma](http://www.cochrane.org/CD005123/PREG_antenatal-perineal-massage-for-reducing-perineal-trauma)
- Walyani, Elisabeth Siwi dan Th. Ending Purwoastuti. *Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: Pustakabarupres, 2015.
- Yuliaswati, Enny dan Kamidah. *Upaya Mencegah Robekan Perineum*. [https://www.academia.edu/28015146/Upaya\\_Mencegah\\_Robekan\\_Perineum.pdf](https://www.academia.edu/28015146/Upaya_Mencegah_Robekan_Perineum.pdf), diakses tanggal 25 maret 2017.



# LEMBAR KONSULTASI HASIL

No.	Konsultasi	Tanggal	Paraf Pembimbing
1.	konsul BAB IV	30/8/2017	
2.	konsul pembahasan	31/8/2017	
3.	konsul Hasil dan pembahasan pembahasan	3/9/2017	
4.	konsul BAB IV & V	8/8/2017	





**KUESIONER**

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR SEMESTER IV TENTANG  
PENCEGAHAN RUPTUR PERINEUM  
TAHUN 2016**

No. Responden:

Tanggal :

**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :

NIM :

Kelas :

Semester :



Makassar,

2016

TTD

( )

**PETUNJUK:**

Dibawah ini ada beberapa pertanyaan tentang pencegahan ruptur perineum. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang benar.

**A. Pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang defenisi dan tingkat ruptur perineum.**

1. Apakah anda mengetahui pengertian dari ruptur perineum ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Apakah anda mengetahui jumlah dan pembagian tingkatan Ruptur perineum?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Robekan yang terjadi pada saat bayi lahir baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan pada daerah diantara vulva dan anus disebut?
  - a. Ruptur uterus
  - b. Ruptur ovarium
  - c. *Ruptur perineum*
  - d. Ruptur otot vagina
4. Robekan yang meliputi mukosa vagina, otot dan kulit perineum dan otot perineum adalah ?
  - a. Robekan perineum tingkat I
  - b. *Robekan perineum tingka II*
  - c. Robekan perineum tingkat III
  - d. Robekan perineum tingkat IV
5. Robekan yang terjadi pada mukosa vagina, otot vagina dan kulit perineum serta otot sfingter ani eksterna dan mukosa rectum adalah robekan...
  - a. *Robekan perineum tingkat IV*
  - b. Robekan perineum tingkat III
  - c. Robekan perineum tingka II
  - d. Robekan perineum tingkat I

**B. Pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang pencegahan ruptur penineum**

6. Apakah anda tau cara pencegahan ruptur perineum

- a. Ya
  - b. Tidak
7. Pencegahan ruptur perineum yang dapat dilakukan ibu sendiri, adalah dengan...
- a. Melakukan penyokongan yang benar
  - b. Waterbirth
  - c. Tidak dilakukan episiotomi
  - d. *Pemijatan perineum*
8. Keterampilan bidan dalam mencegah terjadinya ruptur perineum saat persalinan adalah, kecuali...
- a. *Melakukan pemijatan perineum*
  - b. Menjurkan posisi yang benar saat mengejan
  - c. Melakukan penyokongan yang benar
  - d. Memimpin Perasalinan yang baik dan benar
9. Pelayanan bidan dalam mencegah ruptur perineum, dengan cara
- a. Menganjurkan ibu menahan nafa saat mengejan
  - b. Mengatur posisi ibu saat mengejan
  - c. *Menganjurkan ibu untuk tidak terburu-buru*
  - d. Menyarankan episiotomi
10. Pencegahan ruptur perineum yang dilakukan pada masa kehamilan, kecuali...
- a. Yoga prenatal
  - b. Pemijatan perineum
  - c. Senam kegel
  - d. *Olahraga Lari pagi*

### **C. Pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang penanganan**

#### **ruptur perineum**

11. Apakah anda mengetahui cara pencegahan ruptur perineum
  - a. Ya
  - b. Tidak
12. Penangana pada ruptur perineum ruptur tingkat I adalah
  - a. Di jahit dengan teknik jelujur walau tidak ada perdarahan
  - b. *Tidak dilakukan penjahitan jika tidak ada perdarahan*
  - c. Menjahit sampai otot vagina dengan teknik interuptus
  - d. Menjahit sampai otot perineum dengan teknik subcutikuler
13. Pernyataan salah dibawah ini mengenai penjahitan ruptur perineum, adalah
  - a. Penjahitan kulit dengan teknik subcutikuler
  - b. Penjahitan otot sfingter ani dengan teknik interuptus
  - c. Penjahitan otot perineum dengan teknik jelujur
  - d. *Penjahitan mukosa rektum dengan teknik jelujur*



14. Benang yang paling ideal yang digunakan untuk penjahitan ruptur perineum adalah benang..
- Dexon
  - Kromik
  - Poliglikolik*
  - Vikril
15. Prinsip yang harus diperhatikan dalam menangani ruptur perineum adalah, kecuali..
- Sesegera mungkin melakukan penjahitan jika ada darah perdarahan*
  - Penjahitan harus dilakukan secara aseptik
  - Jahitan dilakukan lapis demi lapis, dari dalam kemudian keluar
  - Memasukkan jari yang memakai sarung tangan kedalam anus untuk mematkan ruptur perineum tingkat III

**D. Pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang pemijatan**

**perineum.**

16. Apakah anda tau tentang penanganan jika terjadi ruptur perineum?
- Ya
  - Tidak
17. Pemijatan perineum adalah salah satu cara yang efektif untuk
- Mencegah kematian ibu
  - Mencegah kematian bayi
  - Mencegah robekan perineum*
  - Mencegah nyeri persalinan
18. Tujuan pemijatan perineum, yaitu:
- Meningkatkan elastisitas vagina
  - Meningkatan aliran darah ke daerah perineum*
  - Membantu mengencangkan perineum
  - Membantu mempersiapkan daerah vagina saat proses persalinan
19. Prosedur pemijatan di bawah ini yang salah adalah
- Masukkan ibu jari anda ke dalam perineum, sekitar 3-4 cm (maks 7cm) dengan posisi ditekuk, dan jari lainnya diluar perineum.
  - menekan dengan ibu jari. Lalu pijat perlahan dan dengan lembut bolak-balik ke bagian bawah vagina, lakukan selama 3-4 menit.
  - Melakukan kompres menggunakan kain hangat dan air dingin sebanyak 3 kali sebelum melakukan pemijatan untuk memperlancar peredaran darah*

- d. Dengan mempertahankan tekanan yang mantap, gerakan ibu jari atau telunjuk di dalam vagina dalam bentuk huruf U secara berirama dan kebawah (*rectum*), selama 1-2 menit (20-30 kali)
20. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan pemijatan perineum adalah
- a. *Memijat sampai ke daerah saluran kemih/ uretra agar menghindari robekan pada klitoris*
  - b. Tidak menggunakan baby oil, minyak mineral, jelly potroleum atau lotion tangan tetapi menggunakan minyak gandum yang kaya vit.E
  - c. Pemijatan dilakukan tidak terlalu keras
  - d. Tidak melakukan jika ada infeksi atau herpes vagina lesi aktif.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penulis

Nama : Ama Riany Lain  
TTL : Kajang, 19 Juni 1995  
NIM : 70400113020  
No. hp : 082334123465  
Nama Orang Tua:  
Ayah : H. Ahmad Yani Lain  
Ibu : Hj. Darmin

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001 – 2007 : SDN Center Mangalli
2. Tahun 2007 – 2010 : SMPN 1 Pallangga
3. Tahun 2010 – 2013 : SMK Pratidina Makassar
4. Tahun 2013 – 2017 : UIN Alauddin Makassar  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Prodi Kebidanan

**MASTER T/**  
**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISW**  
**TENTANG PENCEG/**  
**TAI**

No.	Nama	PENGERTIAN & TINGKAT PENGETAHUAN							PENCEGAHAN										
		1	2	3	4	5	SKOR	%	Klasifikasi			6	7	8	9	10	SKOR	%	Kl.
									K	C	B								
1	Nn. S	1	1	1	0	1	4	80			√	1	1	1	0	0	3	60	√
2	Nn. N	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	0	0	3	60	√
3	Nn. N	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	1	0	0	3	60	√
4	Nn. S	1	1	1	1	1	5	100			√	1	0	1	0	1	3	60	√
5	Nn. A	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	0	1	4	80	
6	Nn. S	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	0	0	3	60	√
7	Nn. M	1	1	1	0	1	4	80			√	1	1	1	0	0	3	60	√
8	Nn. H	1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	0	0	0	2	40	√
9	Nn. I	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	0	0	0	2	40	√
10	Nn. F	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	0	0	3	60	√
11	Nn. B	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	0	0	3	60	√
12	Nn. D	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	0	0	3	60	√
13	Nn. R	1	1	1	1	1	5	100			√	1	0	1	0	0	2	40	√
14	Nn. H	1	1	1	1	1	5	100			√	1	0	1	0	0	2	40	√
15	Nn. W	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	1	0	4	80	
16	Nn. E	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	1	0	4	80	
17	Nn. N	1	1	1	1	0	4	80			√	1	0	0	0	1	2	40	√
18	Nn. H	1	1	1	1	0	4	80			√	1	0	1	0	0	2	40	√
19	Nn. T	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	0	0	3	60	√
20	Nn. M	1	1	1	1	1	5	100			√	1	0	1	0	0	2	40	√

21	Nn. N	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	0	0	0	2	40	√
22	Nn. D	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	0	0	1	3	60	√
23	Nn. N	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	0	0	0	2	40	√
24	Nn. S	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	0	0	0	2	40	√
25	Nn. M	1	1	1	1	1	5	100			√	1	0	0	0	0	1	20	√
26	Nn. S	1	1	1	0	1	4	80			√	1	0	1	0	0	2	40	√
27	Nn. S	1	1	1	1	1	5	100			√	1	0	1	0	0	2	40	√
28	Nn. S	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	1	0	1	4	80	
29	Nn. E	1	1	1	1	0	4	80			√	1	0	1	0	0	2	40	√
30	Nn. A	1	1	1	0	1	4	80			√	1	1	1	0	1	4	80	
31	Nn. N	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	1	0	1	4	80	
32	Nn. G	1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	1	0	0	3	60	√
33	Nn. N	1	1	1	1	0	4	80			√	1	0	1	0	0	2	40	√
34	Nn. R	1	1	1	1	0	4	80			√	1	0	1	0	0	2	40	√
35	Nn. H	1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	1	0	1	4	80	
36	Nn. N	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	0	1	4	80	
37	Nn. R	1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	1	0	0	3	60	√
38	Nn. D	1	1	1	0	1	4	80			√	1	0	1	0	0	2	40	√
39	Nn. N	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	0	0	0	2	40	√
40	Nn. A	1	1	1	1	1	5	100			√	1	0	1	0	1	3	60	√
41	Nn. A	1	1	1	1	1	5	100			√	1	1	1	0	1	4	80	
42	Nn. R	1	1	1	0	1	4	80			√	1	1	1	0	1	4	80	
43	Nn. S	1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	1	0	1	4	80	
44	Nn. S	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	1	0	0	3	60	√
45	Nn. Y	1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	1	0	0	3	60	√
46	Nn. M	1	1	1	0	1	4	80			√	1	1	1	0	1	4	80	
47	Nn. R	1	1	0	1	0	3	60	√			1	0	0	0	0	1	20	√
48	Nn. S	1	1	1	1	1	5	100			√	1	0	1	0	0	2	40	√

49	Nn. Z	1	1	1	1	0	4	80		√	1	0	1	0	0	2	40	√
50	Nn. H	1	1	1	1	0	4	80		√	1	0	1	0	0	2	40	√
51	Nn. R	1	1	1	1	0	4	80		√	1	1	0	0	1	3	60	√
52	Nn. N	1	1	1	1	0	4	80		√	1	1	1	0	1	4	80	
53	Nn. N	1	1	1	1	0	4	80		√	1	0	1	0	0	2	40	√
54	Nn. R	1	1	1	0	1	4	80		√	1	1	1	0	0	3	60	√
55	Nn. M	1	1	1	0	1	4	80		√	1	0	1	0	0	2	40	√
56	Nn. S	1	1	1	0	1	4	80		√	1	0	1	0	0	2	40	√
57	Nn. R	1	1	1	0	1	4	80		√	1	0	1	1	0	3	60	√
58	Nn. I	1	1	1	1	1	5	100		√	1	0	0	0	1	2	40	√
59	Nn. E	1	1	1	1	0	4	80		√	1	1	1	0	0	3	60	√
60	Nn. I	1	1	1	1	0	4	80		√	1	1	0	0	0	2	40	√
61	Nn. N	1	1	1	0	1	4	80		√	1	1	0	0	1	3	60	√
62	Nn. M	1	1	1	1	1	5	100		√	1	0	1	0	0	2	40	√
JUMLAH									6	56								49

Sumber: hasil pengolahan data primer

#### Keterangan

1. 1 : Jawaban Benar
2. 0 : Jawaban Salah
3. K : Kurang
4. C : Cukup
5. B : Baik
6. % : Persentase

**ABEL PENELITIAN**  
**'A KEBIDANAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR SEMESTER IV**  
**AHAN RUPTUR PERINEUM**  
**HUN 2016**

asifikasi		PENANGANAN							PEMIJATAN											
		11	12	13	14	15	SKOR	%	Klasifikasi			16	17	18	19	20	SKOR	%	Klasifika	
									K	C	B								K	C
C	B	1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	1	0	0	3	60	√	
		1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	0	1	1	4	80		
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
	√	1	0	1	0	0	2	40	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	1	1	0	4	80		
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	1	3	60	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	1	0	0	1	3	60	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	0	1	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
	√	1	0	0	0	1	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
	√	1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	0	0	0	0	1	20	√	
		1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	0	0	0	2	40	√	

		1	0	0	1	1	3	60	√			1	1	1	0	1	4	80		
		1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	0	1	0	0	2	40	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	1	0	0	3	60	√	
		1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
	√	1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	1	3	60	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
	√	1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
	√	1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	0	0	0	1	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	0	1	0	3	60	√	
		1	0	1	1	0	3	60	√			1	1	0	1	0	3	60	√	
	√	1	1	1	0	1	4	80			√	1	1	0	0	0	2	40	√	
	√	1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	1	0	3	60	√	
		1	0	1	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
	√	1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
	√	1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
	√	1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
	√	1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	1	0	0	3	60	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	1	3	60	√	



		1	1	0	0	0	2	40	√			1	0	1	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	0	1	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
	√	1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	1	0	3	60	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	1	0	0	3	60	√			1	1	0	0	1	3	60	√	
		1	1	1	0	0	3	60	√			1	0	0	0	0	1	20	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	0	0	0	2	40	√	
		1	1	0	0	0	2	40	√			1	1	1	1	0	4	80		
		1	1	1	1	0	4	80			√	1	1	1	1	0	4	80		
		1	0	0	0	0	1	20	√			1	1	1	0	0	3	60	√	
		1	1	0	0	0	2	25	√			1	1	0	1	0	3	60	√	
	13								60			2								57





√
√
5



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R