

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI
PADA NY “E” DENGAN PERSALINAN SUNGSANG
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2018**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah satu syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan DIII Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan
(UIN) Alauddin Makassar**

Oleh :
NURUL INSANI M
NIM : 70400115030

**JURUSAN DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2018**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Insani M.

Nim : 70400115030

Tempat/tgl lahir : Sungguminasa, 17 Agustus 1997

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata – Gowa, 6 November 2018

Penulis,

Nurul Insani M.

NIM: 70400115030

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurul Insani. M

Nim : 70400115030

Judul : Manajemen Asuha Kebidanan Intranatal patologi pada Ny "E" dengan persalinan sungsang di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2018.


Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 06 November 2018
28 Safar 1440 H

Pembimbing I


Anieq Mumthiah Alkautsar, S.ST., M.Keb
NIP : 2016018903

Pembimbing II


dr. Raully Ramadhani, M.Kes
NIP : 19830707 200912 2 004

M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi Pada Ny “E” dengan Persalinan Sungsang di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 04 September Tahun 2018”, yang disusun oleh NURUL INSANI, M NIM : 70400115030, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa 06 November 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli Madya Kebidanan, Jurusan kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 06 November 2018 M
28 Safar 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Sitti Saleha., S.SiT.,SKM.,M.Keb (.....)

Pembimbing I: Anieq Mumthiah Alkautsar, S.ST.,M.Keb (.....)

PembimbingII: dr. Raully Ramadhani, M.Kes (.....)

Penguji I : dr. Andi Sitti Rahma,M.kes (.....)

Penguji II : Prof Dr Mukhtar Lutfih, M.Pd (.....)

Dekan
/ Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc
NIP : 195502031983121001



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, semoga rahmat, hidayah, tercurah kepada kita semua sehingga segala aktivitas bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Shalawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun proposal yang berjudul **“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI PADA NY “E” DENGAN PERSALINAN SUNGSANG DI RSUD SYEKH YUSUF KAB.GOWA”** .

Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Kebidanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun merupakan masukan dan penyempurnaan selanjutnya sangat dibutuhkan. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya. Untuk hal itu pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si, sebagai rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN

Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.sc, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Dekan I, pembantu Dekan II, dan pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Dr. Hj. SittiSaleha, S.SiT, M.keb, selaku ketua jurusan Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah mengajarkan kami banyak hal.
4. Ibu Anieq Mumthi'ah AlKautsar, S.SiT, M.keb, selaku pembimbing I Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb.
5. Ibu dr Raully Ramadhani M.Kes., selaku pembimbing II Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb.
6. Ibu dr. Andi Sitti Rahma, M.Kes., selaku penguji I Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan banyak masukan dan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar Amd. Keb
7. Bapak Prof Dr Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku penguji agama Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan masukan serta motivasi khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

8. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menimba ilmu di Jurusan Kebidanan.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Mustafa Dg Nai dan Ibunda Hj Marwiyah Rasyid Dg Bau yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan materi dan doa yang selalu beliau panjatkan setiap saat untuk penulis sehingga bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih juga untuk semua keluarga serta Hasrullah Rani yang selalu mendukung agar penulis cepat menyelesaikan KTI ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah menjadi tempat berbagi di kala suka maupun duka selama proses awal penyusunan KTI ini hingga selesai.
11. Kepada semua saudari seperjuanganku di Kebidanan UIN Alauddin Makassar Angkatan 2015 yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan motifasinya serta do'a kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya semoga menjadi ibadah dan amal jariyah. Amin

Samata-Gowa, November 2018

Penulis

NURUL INSANI M
NIM: 70400115030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Penulisan.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat penulisan	8
E. Metode Penulisan	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Tinjauan umum tentang Persalinan	
1. Pengertian Persalinan.....	12

2. Tujuan Asuhan Persalinan	15
3. Penyebab Terjadinya Persalinan	16
4. Tanda-tanda mulainya persalinan	17
5. Tahap-tahap dalam proses persalinan	19
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan	20
7. Mekanisme persalinan.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Persalinan Sungsang	
1. Pengertian Persalinan Sungsang	24
2. Etiologi persalinan Sungsang.....	24
3. Klasifikasi Persalinan Sungsang	25
4. Diagnosis Persalinan Sungsang	27
5. Prognosis Persalinan Sungsang.....	28
6. Komplikasi Persalinan Sungsang.....	28
7. Penatalaksanaan persalinan Pervaginam letak Sungsang	30
C. Tujuan Asuhan kebidanan Persalinan Sungsang	39
1. Pengertian Managemen asuhan Kebidanan	39
2. Langkah-langkah managemen kebidanan.....	39
D. Tinjauan Islam Tentang Persalinan.....	52

BAB III STUDI KASUS

KALA I

A. Langkah I Identifikasi Data Dasar	55
B. Langkah II identifikasiDiagonasa/MasalahAktual.....	66
C. Langkah III IdentifikasiDiagnosa/MasalahPotensial	72
D. Langkah IV IdentifikasiPerlunyaTindakanSegera/Kolaborasi	73
E. Langkah V RencanaTindakan.....	73
F. Langkah VI PelaksanaanTindakanAsuhanKebidanan	76
G. Langkah VII EvaluasiHasilAsuhankebidanan	79

KALA II

A. Langkah I Identifikasi Data Dasar	80
B. Langkah II identifikasiDiagonasa/MasalahAktual.....	81
C. Langkah III IdentifikasiDiagnosa/MasalahPotensial	83
D. Langkah IV IdentifikasiPerlunyaTindakanSegera/Kolaborasi	83
E. Langkah V RencanaTindakan.....	83
F. Langkah VI PelaksanaanTindakanAsuhanKebidanan	88
G. Langkah VII EvaluasiHasilAsuhankebidanan	92

KALA III

A. Langkah I Identifikasi Data Dasar	92
B. Langkah II identifikasiDiagonasa/MasalahAktual.....	93
C. Langkah III IdentifikasiDiagnosa/MasalahPotensial	94
D. Langkah IV IdentifikasiPerlunyaTindakanSegera/Kolaborasi	94
E. Langkah V RencanaTindakan.....	94
F. Langkah VI PelaksanaanTindakanAsuhanKebidanan	96
G. Langkah VII EvaluasiHasilAsuhankebidanan	97

KALA IV

A. Langkah I Identifikasi Data Dasar	97
B. Langkah II identifikasiDiagonasa/MasalahAktual.....	98
C. Langkah III IdentifikasiDiagnosa/MasalahPotensial	99
D. Langkah IV IdentifikasiPerlunyaTindakanSegera/Kolaborasi	100
E. Langkah V RencanaTindakan.....	100
F. Langkah VI PelaksanaanTindakanAsuhanKebidanan	103
G. Langkah VII EvaluasiHasilAsuhankebidanan	104

PENDOKUMENTASIAN SOAP

1. KUNJUNGAN NIFAS KE I.....	130
2. KUNJUNGAN NIFAS KE II	136
3. KUNJUNGAN BAYI KE I	139
4. KUNJUNGAN BAYI KE II.....	145
5. KUNJUNGAN NIFAS KE III.....	149

BAB IV PEMBAHASAN

1. Langkah I Identifikasi Data Dasar	152
2. Langkah II identifikasiDiagonasa/MasalahAktual.....	158
3. Langkah III IdentifikasiDiagnosa/MasalahPotensial	159
4. Langkah IV IdentifikasiPerlunyaTindakanSegera/Kolaborasi	160
5. Langkah V RencanaTindakan.....	160
6. Langkah VI PelaksanaanTindakanAsuhanKebidanan	161
7. Langkah VII EvaluasiHasilAsuhankebidanan	162

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	163
B. Saran	164

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Mengobservasi Denyut jantung janin,Nadi,dan His	77
Tabel 3.2 Penilaian Apgar Score.....	91
Tabel 3.3. Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan His.....	112
Tabel.3.4 Jumlah Apgar Score: 8/10.....	121
Tabel 3.5 Observasi Kontraksi Uterus dan Kandung Kemih.....	127
Tabel 3.6 Observasi TFU dan Perdarahan.....	127
Table 3.7 Observasi TTV.....	128
Tabel 3.8 Riwayat persalinan dan Nifas Lalu.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : klasifikasi persalinan sungsang	25
Gambar 2 : Melahirkan lengan belakang pada tehnik melahirkan bahu cara klasik.....	32
Gambar 3 : Melahirkan lengan depan pada tehnik melahirkan bahu cara klasik.	33
Gambar 4 : Pegangan “Femuro Pelvic” pada pertolongan persalinan sungsang pervaginam.....	34
Gambar 5 : (kiri) Melahirkan bahu depan dengan ekstraksi pada bokong dan bila perlu dibantu dengan telunjuk jari tangan kanan untuk mengeluarkan lengan depan.....	34
Gambar 6 : (kanan) Melahirkan lengan belakang (inset : mengait lengan atas dengan telunjuk jari tangan kiri penolong.....	35
Gambar 7 : sambil dilakukan traksi curam bawah, tubuh janin diputar 180 ⁰ Kearah yang berlawanan sehingga bahu depan menjadi bahu depan Dibawah arcus pubis dan dapat dilahirkan.....	35
Gambar 8 : Tubuh janin di putar kembali 180 ⁰ kearah yang berlawanan sehingga bahu belakang kembali menjadi bahu depan dibawah arcus pubis dan dapat dilahirkan.....	36
Gambar 9 : Tubuh janin di putar kembali 180 ⁰ kearah yang berlawanan sehingga bahu belakang kembali menjadi bahu depan dibawah arcus pubis dan dapat dilahirkan.	36
Gambar 10 : Cara persalinan sungsang dengan tehnik mauriceau.....	37
Gambar 11 : Jari tengah masuk ke dalam mulut bayi, jari telunjuk.....	37

DAFTAR SINGKATAN

- AKB : Angka Kematian Bayi
- AKI : Angka Kematian Ibu
- ANC : Antenatal Care adalah pengawasan pada ibu hamil sebelum melahirkan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.
- ASEAN : *Association South East Asian Nation*
- BBL : Bayi Baru Lahir
- DJJ : Denyut Jantung Janin
- HPHT : Haid Pertama Haid Terakhir
- HbSAG : Hepatitis B *Surface Antigen*
- IMD : Inisiasi Menyusui Dini dimana bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
- MDG's : *Milleneum Development Goals* atau tujuan pembangunan milenium adalah sebuah paradigma pembangunan global yang di deklarasikan konferensi tingkat tinggi millennium oleh 180 Negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.
- mmHg : *Milimeter Merkuri hydrargyrum*
- KB : Keluarga Berencana
- PAP : Pintu Atas Panggul

- PBP : Pintu Bawah Panggul
- PMS : Penyakit Menular Seksual
- SDKI : Survey Demografidankesehatan Indonesia
- SAR : Sigmen Atas Rahim
- SBR : Sigmen Bawah Rahim
- TFU : Tinggi Fundus Uteri
- TBJ : Taksiran Berat Janin
- TBC : *Tuberculosis* biasanya penyakit yang menyerang paru-paru
- TT : Tetanus Toksoid ialah penyakit untuk mencegah penyakit tetanus
- VT : *Vaginal Tousse* yakni pemeriksaan dalam melalui alat kelamin wanita.
- WHO : *World Healt Organization* Atau oraganisasi Kesehatan Dunia, adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai kordinator kesehatan internasional .

DAFTAR ISTILAH

Assesment	: Penilaian klinis
Anemia	: Suatu kondisi dimana jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal .
Asfiksia	: Keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur
Bloody Show	: Tanda menjelang persalinan berupa lender kental bercampur darah.
Corpus Uteri	: Bagian uterus/rahim yang utama dan terbesar.
Eklampsia	: Akibat yang ditimbulkan oleh preeklampsia yang ditandai dengan kejang dan bahkan koma .
Effecament	: pemendekan dan penipisan servik selama tahap pertama persalinan
Ekstensi	: Gerakan dimana ksiput berhimpit langsung pada margo inferior simpisis pubis
Ekspulsi	: Rotasi luar
His	: Kontraksi Uterus
Lennecc	: Stetoskop momokuler
Linea nigra	: Garis hitam yang terbentang di atas simfisis sampai ke pusat.

- Menarche : Menstruasi yang datang pertama kali pada seorang wanita yang menginjak usia remaja
- Medical Record : Rekam medic.
- Planning : Perencanaan
- Preeklampsia : Sebuah komplikasi pada kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi (hipertensi).
- Sectio Caesarea : Tindakan pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus dan dilakukan oleh spesialis beda obstetric dan ginekologi.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 2 : SK Ujian Seminar Hasil
- Lampiran 3 : Partograf
- Lampiran 4 : Surat Pengambilan data dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi (Kepala balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran 65 : Surat Izin atau Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Lampiran 7 : Surat Izin atau Rekomendasi Penelitian Bupati Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, 06 NOVEMBER 2018

Nama : Nurul Insani M.
Nim : 70400115030
Pembimbing I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar
Pembimbing II : Raully Ramadhani
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "E" dengan Persalinan Sungsang di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 04 September 2018

Persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi dari dalam uterus pada umur kehamilan 37- 42 minggu dengan ditandai adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya penipisan dan dilatasi serviks. Terjadi persalinan normal bukan berarti tidak ada komplikasi, tetapi melainkan banyak kemungkinan hal yang bisa terjadi salah satu komplikasinya adalah persalinan sungsang.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny "E" dengan persalinan sungsang di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018 sesuai Manajemen Asuhan Kebidanan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Penatalaksanaan Asuhan Persalinan Sungsang dengan bokong murni pada Ny "E" yaitu dilakukan dengan pemberian asuhan yang sesuai standar operasional prosedur serta melakukan upaya pencegahan komplikasi terutama terjadinya infeksi, perdarahan, robekan jalan lahir yang lebih besar, asfiksia pada bayi serta dilakukannya pemantauan dan Asuhan Manajemen Kebidanan dari kala I sampai kala IV.

Kesimpulan dari kasus yaitu diantaranya pendokumentasian dalam bentuk SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemantauan dan analisa data pada Ny "E" dengan persalinan sungsang di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2018 yakni dari kala I sampai kala IV, tidak ditemukannya komplikasi pada ibu dan bayi ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Kata kunci: Persalinan Sungsang , 7 Langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, NOVEMBER 06, 2018

Name : Nurul Insani M.
Student Reg. No. : 70400115030
Supervisor I : Anieq Mumthi'ah Alkautzar
Supervisor II : Rauly Ramadhani
Title : The Intranatal Obstetric Care Management on Mrs. "E" with Breech Labor at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital on September 04, 2018

Normal labor is the process of removing conception from the uterus at 37-42 weeks of gestation marked by the uterine contractions causing the thinning and dilation of the cervix. Normal labor does not mean no complications, rather many possibilities may occur which one of the complications is breech labor.

The study was a case study with an Intranatal Obstetric Care Management approach on Mrs. "E" with breech labor at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018 based on Varney's 7-step Obstetric Care Management and documentation in the form of SOAP.

The Care Management of Breech Labor with pure buttocks on Mrs. "E" was conducted by providing care in accordance with the standard operating procedures and performing efforts to prevent complications, particularly the occurrence of infection, bleeding, greater birth canal tears, asphyxia in the baby, and monitoring as well as caring the obstetric management from the first to the fourth stages.

The conclusions of the case included documentation in the form of SOAP applied for the obstetric problem solving process. The assessment was carried out in the form of monitoring and analyzing data on Mrs. "E" with breech labor at Syekh Yusuf Gowa Regional Public Hospital in 2018, from the first to the fourth stages, no complications found on the mother and the baby identified by the vital signs within the normal limits.

Keywords: Breech Labor, 7 Varney's Step



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan normal adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar yang terjadi pada kehamilan yang cukup bulan (37-42 minggu) dengan ditandai adanya kontraksi uterus yang menyebabkan penipisan, dilatasi serviks, dan mendorong janin keluar melalui jalan lahir dengan presentase belakang kepala tanpa alat atau bantuan (lahir spontan) serta tidak ada komplikasi pada ibu dan janin (Kuswanti, 2014).

Terjadinya kematian perinatal kemungkinan dapat disebabkan karena persalinan presentasi bokong sebesar 4-5 kali dibandingkan presentasi kepala. Sebab kematian perinatal pada persalinan presentasi bokong yang terpenting adalah prematuritas dan penanganan persalinan yang kurang sempurna dengan akibat hipoksia atau perdarahan di dalam tengkorak. Trauma lahir pada presentasi bokong banyak dihubungkan dengan usaha untuk mempercepat persalinan dengan tindakan-tindakan untuk mengatasi macetnya persalinan. Letak sungsang merupakan keadaan dimana janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong berada dibagian bawah *cavum uteri*. Tipe letak sungsang yaitu *frank breech* (50-70%) yaitu kedua tungkai fleksi, *complete breech* (5-10%) yaitu tungkai atas lurus keatas, tungkai bawah ekstensi, *Footling* (10-30%) yaitu satu atau kedua tungkai atas ekstansi, presentasi kaki letak sungsang terjadi pada 3-4%

dari seluruh persalinan. Kejadian letak sungsang berlangsung dengan bertambahnya usia kehamilan. Letak sungsang pada usia kehamilan 28 minggu sebesar 25%, pada kehamilan 32 minggu 7%, dan 1-5% pada kehamilan aterm (Devi Indryanti, 2017).

Penyebab kematian menunjukkan bahwa pelayanan obstetric dan neonatal darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi sangat penting dalam upaya penurunan kematian ibu. Mengingat komplikasi yang terjadi akibat persalinan sungsang, sebaiknya persalinan dalam letak sungsang dihindarkan, untuk itu diupayakan beberapa usaha untuk menghindari terjadinya persalinan dengan presentasi bokong adalah dengan cara *knee-chest position* untuk mengubah presentasi bokong menjadi presentasi kepala. Selain itu faktor penolong persalinan juga mempunyai peranan penting dalam penanganan persalinan dengan presentasi bokong walaupun sebagian besar perempuan bersalin di rumah, tenaga terlatih dapat membantu mengenali kegawatan medis dan membantu keluarga untuk mencari perawatan darurat.

Angka mortalitas akibat persalinan letak sungsang sebanyak 15 kasus (7%), morbiditas 10 kasus (4,6%) sedangkan kebanyakan kasus tidak dijelaskan hasil akhir dari bayi yang lahir sebanyak 189 kasus (88,33). Mortalitas kasar pada janin berkisar 10-20%. Sebab utama kematian bayi ialah prematuritas. Resiko untuk janin pada presentasi bokong lebih besar dibandingkan dengan presentasi kepala. Komplikasi pada ibu, persalinan sungsang dengan penyulit, terdapat

peningkatan resiko pada ibu, manipulasi manual di dalam jalan lahir akan meningkatkan risiko infeksi pada ibu, perasat-perasat intrauterine terutama pada segmen bawah rahim uterus yang menipis atau kelahiran *afteroming head* pada *serviks* yang belum membuka penuh dapat mengakibatkan *rupture uteri*. *Laserasi serviks* atau keduanya. Manipulasi seperti ini dapat memperluas episiotomy dan robekan perineum yang dalam (Matrica D.G Silinaung dkk, 2016).

Indonesia memiliki Angka kematian bayi pada persalinan letak sungsang lebih tinggi bila dibandingkan dengan letak kepala. Angka kematian *prenatal* dengan persalinan sungsang mempunyai presentase 16,8-38,5%. Berdasarkan data AKI di Sulawesi Selatan pada tahun 2015, terdapat 70 per 1000 kelahiran, angka ini menurun pada tahun 2012 yang mencapai 76 per 100 ribu kelahiran hidup.

Angka kematian Ibu (AKI) Dan angka kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator untuk mencerminkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta cerminan dari status kesehatan suatu Negara. Hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015, AKI yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup yang mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB sendiri menurut *survey* penduduk antar sensus (SUPAS) pada tahun 2015 yaitu 22 per 100.000 kelahiran hidup.

Indonesia masih tergolong tinggi di ASEAN (*Association South East Asian Nation*) dan menjadi salah satu negara yang menjalankan program *Milleneum Development Goal's* (MDG's) yang memiliki target menurunkan

angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 20 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Berdasarkan data yang di peroleh dari dinas kesehatan provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010, hasil Survey Demografi Kesehatan (SDKI) tahun 2012, Angka kematian Ibu (AKI) mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan kematian Bayi terbanyak (48%) terjadi pada bulan pertama atau masa neonatal, dan penyebab terbanyak (44%) kematian neonatus adalah prematuritas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, AKI dan AKB mengalami penurunan, yaitu AKI pada tahun 2012 sebanyak 12 orang atau 106,53 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2013 menurun menjadi 10 orang atau 80 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 sebanyak 3 orang atau 24 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2012 sebanyak 57 bayi atau 4,5 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2013 menurun menjadi 17 bayi atau 1 per 1000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2014 sebanyak 10 bayi atau 1 per 1000 kelahiran hidup (Dinkes Kabupaten Gowa, 2014:25-29).

Data yang diperoleh dari Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa menunjukkan jumlah persalinan pada periode 2015 yaitu 1.804 persalinan terdapat 80 (4,43%) kasus persalinan Sungsang. Pada tahun 2016 yaitu 1.578 persalinan terdapat 21 (1,33%) Orang kasus persalinan Sungsang. Tahun 2017 terdapat 2.642 persalinan terdapat 28 (1,05%) kasus

persalinan Sungsang Sedangkan Pada Tahun 2018 terdapat 1.020 persalinan dan terdapat 14 (1,37%) kasus persalinan Sungsang (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf, 2018) .

Kejadian persalinan sungsang di RSUD Syekh Yusuf tiap tahunnya menurun. Janin letak bokong berada pada resiko morbiditas dan mortalitas prenatal yang lebih tinggi tidak hanya akibat partus tetapi juga karena presentasi selain itu penyebab utama kematian ibu di Indonesia dan Negara-negara lainnya di dunia hampir sama diantaranya akibat perdarahan (25%), infeksi (14%), kelainan hipertensi dalam kehamilan (13%), letak sungsang (13%) serta akibat persalinan yang lama dan penyebab lainnya. Dalam persalinan terdapat beberapa presentasi di antaranya presentasi kepala 96,8%, letak sungsang 2,7%, letak lintang 0,3%, letak muka 0,05% dan letak dahi 0,01%. Letak sungsang terjadi pada 25% persalinan yang terjadi sebelum umur kehamilan 28 minggu, 7% persalinan sungsang terjadi pada umur kehamilan 32 minggu dan 1,3% persalinan sungsang yang terjadi pada kehamilan aterm (Matricia, 2014).

Letak sungsang adalah janin yang letaknya memanjang (membujur) dalam rahim dengan kepala berada di fundus dan bokong di bawah. Persalinan pada bayi dengan presentasi sungsang dimana bayi letaknya sesuai dengan sumbu badan ibu, kepala berada pada fundus uteri sedangkan bokong merupakan bagian terbawah atau di bagian pintu atas panggul. Pada letak sungsang berturut-turut lahir bagian-bagian yang makin lama makin besar, dimulai lahirnya bokong, bahu

kemudian kepala. Pada kehamilan belum cukup bulan, frekuensi letak sungsang lebih tinggi, sedangkan pada kehamilan cukup bulan sebagian besar janin ditemukan dalam presentasi kepala. Pada presentasi bokong baik ibu dan janin mengalami peningkatan resiko yang besar dibandingkan dengan presentase kepala. Peralinan letak sungsang dengan prematuritas memiliki morbiditas dan mortalitas lebih tinggi. (Norma. N dkk, 2013).

Letak sungsang tentunya dapat mempengaruhi proses persalinan. Jika yang terjadi adalah presentasi bokong murni, maka persalinan normal masih relatif mudah pada multipata. Sedangkan jika yang terjadi adalah presentasi kaki, pada saat ketuban pecah spontan mungkin saja tali pusat ikut keluar (prolapsus tali pusat), jika tidak segera dilakukan persalinan, janin mungkin tidak diselamatkan, untuk mencegahnya persalinan dapat dilakukan dengan cara seksio caesaria. Walaupun demikian terapi terbaik adalah pencegahan. Mencegah atau sekurang-kurangnya bersiap siaga adalah penting. Tindakan pencegahan tidak saja dilakukan sewaktu bersalin, namun sudah dimulai sejak ibu hamil dengan melakukan *antenatal care* yang baik. Penyebab letak sungsang antara lain disebabkan oleh prematuritas karena bentuk rahim relatife kurang lonjong, air ketuban masih banyak dan kepala relatif besar, hidramnion karena anak mudah bergerak, plasenta previa karena menghalangi turunnya kepala ke dalam pintu atas panggul, bentuk rahim abnormal, kelainan bentuk kepala anemsefalus (Lia Yulianti dkk, 2014:241).

Berdasarkan standar kompetensi bidan pada persalinan yaitu standar kompetensi ke-4 bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir serta memberikan dukungan moral kepada ibu dan keluarga untuk tetap berdoa dan bertawakkal kepada Allah SWT untuk kesembuhan ibu.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus dengan judul “Manajemen Asuhan kebidanan Intranatal dengan Persalinan Sungsang di RSUD Syekh Yusuf pada tahun 2018”.

B. Ruang Lingkup Penulisan.

Ruang Lingkup penulisan Karya Tulis Ilmiah ini Adalah Manajemen Asuhan kebidanan dengan persalinan Sungsang di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan Manajemen Asuhan kebidanan dengan persalinan sungsang di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi atau wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dapat melaksanakan pengkajian dan analisis data dasar pada ibu bersalin pada kasus persalinan sungsang
- b. Dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi diagnose/masalah actual pada ibu bersalin pada kasus persalinan sungsang
- c. Dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi diagnose/masalah potensial pada ibu bersalin pada kasus persalinan sungsang.
- d. Dapat melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi pada ibu bersalin pada kasus persalinan sungsang
- e. Dapat menyusun perencanaan asuhan kebidanan pada ibu bersalin sesuai dengan kasus persalinan sungsang
- f. Dapat melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin pada kasus persalinan sungsang
- g. Dapat mengevaluasi hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu bersalin pada kasus persalinan sungsang
- h. Dapat mendokumentasikan hasil temuan asuhan kebidanan yang dilaksanakan pada ibu bersalin pada kasus persalinan Sungsang

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademik

Memberikan Informasi dan masukan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Manfaat Instansi

Memberikan Informasi dan masukan Instansi yang terkait dalam meningkatkan Kualitas pelayanan.

3. Manfaat Bagi peneliti

Merupakan pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang faktor yang berhubungan dengan Persalinan Sungsang.

4. Manfaat bagi Institusi

Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu hasil penemuan dan kajian serta bahan acuan atau pedoman bagi institusi jurusan kebidanan untuk penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, yakni :

1. Studi Keperpustakaan

Penulis membaca dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan kasus persalinan preterm dalam pembahasan karya tulis ilmiah.

2. Studi Kasus

Melaksanakan studi kasus pada ibu bersalin dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengumpulan data, analisa dan perumusan diagnose/masalah actual dan potensial, perencanaan

tindakan, evaluasi dan pendokumentasian terhadap asuhan kebidanan pada ibu dengan persalinan sungsang.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber pada catatan medic klien, baik dari bidan, dokter, maupun data penunjang lainnya yang dapat menjadi kontribusi menyelesaikan penulisan.

4. Diskusi

Mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan, pembimbing dan institusi yang mengenai klien dengan persalinan sungsang demi kelancaran karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari BAB I yang membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan. Pada BAB II penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang persalinan, tinjauan umum tentang *persalinan sungsang*, dan tinjauan umum asuhan kebidanan persalinan sungsang.

BAB III, menguraikan 7 langkah *Varney* yaitu : langkah I identifikasi data dasar, langkah II identifikasi diagnosa/masalah aktual, langkah III identifikasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan *emergency* atau kolaborasi, langkah V intervensi atau rencana tindakan, langkah VI implementasi atau pelaksanaan

tindakan asuhan kebidanan, langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

BAB IV, pada bab ini menjelaskan makna hasil penelitian. Pembahasan membahas ada tidaknya kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada BAB V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Persalinan

1. Pengertian Persalinan

Ada beberapa pengertian persalinan, yaitu persalinan dapat didefinisikan secara medis sebagai kontraksi uterus yang teratur dan semakin kuat, menciptakan penipisan dan dilatasi serviks di sepanjang waktu, yang menimbulkan dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui jalan lahir melawan resistansi jaringan lunak, otot, dan struktur tulang panggul (Kennedy dkk, 2013:2). Sumber lain mengemukakan bahwa persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Kuswanti dan Melina, 2014:1)

Proses terjadinya persalinan karena adanya kontraksi uterus yang dirasakan oleh ibu. Kontraksi ini terjadi salah satu faktornya adalah akibat tuanya plasenta. Plasenta yang tua menyebabkan turunnya kadar progesteron yang mengakibatkan ketegangan pada pembuluh darah, hal ini menimbulkan kontraksi pada rahim (Indrayani dan Djami, 2013:48). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT telah dijelaskan dalam Q.S Al- Mu'minuun 12-14 tentang perkembangan manusia yakni :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
 ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
 فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik” (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahannya, 2005).

Dari ayat di atas menyatakan bahwa : *Dan sesungguhnya kami bersumpah bahwa kami telah menciptakan manusia, yakni jenis manusia yang kamu saksikan, bermula dari suatu saripati yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim ibu. Kemudian, kami ciptakan, yakni jadikan nuthfah itu ‘alaqah. Lalu kami ciptakan, yakni dijadikan ‘alaqah itu mudhghah yang merupakan sesuatu yang kecil sekerat daging, lalu kami ciptakan, yakni dijadikan mudghah itu tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami mewujudkannya, yakni tulang yang terbungkus daging itu menjadi-setelah kami meniupkan ruh ciptaan kami kepada-makhluk lain. Maka, maha banyak lagi maha keberkahan yang tercurah dari Allah. Pencipta yang terbaik. Kemudian, sesungguhnya kamu,*

wahai anak cucu Adam sekalian, *sesudah itu*, yakni sesudah melalui proses tersebut dan ketika kamu berada di pentas bumi ini dan melalui proses dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, tua, dan pikun, *benar-benar kamu akan mati*, baik pada masa pikun maupun sebelumnya. Kemudian setelah kamu mati dan dikuburkan, *sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan* dari *kubur* kamu untuk dimintai pertanggungjawaban, lalu masing-masing kami beri balasan dan ganjaran (Shihab Quraisy, 2012:336)

Selain itu, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu dalam kondisi berakal. Artinya, ia mampu membedakan mana hal yang harus dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Karena tempat kembali kita hanyalah kepada Allah SWT yang menciptakan kita. Semua hal yang kita lakukan semasa hidup akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Jadi, hendaknya kita menerapkan ajaran-ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Termasuk dalam masa kehamilan seperti memperbanyak dzikir kepada Allah SWT, membaca Al-Qur'an dimana di dalamnya banyak sekali kebaikan yang bisa kita peroleh, selain itu beribadah dan beramal juga merupakan syafaat yang baik untuk janin, menjadi doa agar ibu nyaman dalam menghadapi kehamilannya, dilancarkan persalinannya kelak, dan dapat menjadi obat segala macam penyakit yang hendak menyerang ibu dan bayinya nanti.

2. Tujuan Asuhan Persalinan

Salah satu hal penting dalam proses persalinan adalah asuhan inpartum yang bertujuan untuk meningkatkan jalan lahir yang aman bagi ibu dan bayi, meminimalkan resiko pada ibu dan bayi, dan meningkatkan hasil kesehatan yang baik dan pengalaman yang positif.

Tujuan dari asuhan persalinan normal adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perilaku coping ibu
- b. Memberikan lingkungan yang aman bagi ibu dan janin
- c. Mendukung ibu dan keluarganya melewati pengalaman persalinan dan melahirkan
- d. Memenuhi keinginan dan pilihan ibu selama persalinan ketika memungkinkan
- e. Memberikan tindakan rasa nyaman dan meredakan nyeri jika perlu
- f. Memberikan ketenangan dan informasi, yang disertai dengan perhatian terhadap kebutuhan budaya ibu dan keluarga
- g. Untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya (Eka Puspita, 2014)

3. Penyebab Terjadinya persalinan.

Beberapa teori yang menyatakan penyebab terjadinya proses persalinan, antara lain:

a. Teori penurunan kadar prostaglandin

Prostaglandin merupakan *hormone* penting untuk mempertahankan kehamilan. Hormon ini meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu, tapi pada akhir kehamilan terjadi penurunan kadar progesterone yang mengakibatkan peningkatan kontraksi uterus karena adanya sintesa prostaglandin di uterus.

b. Teori penurunan progesteron

Progesterone merupakan hormon penting dalam menjaga kehamilan tetap terjadi hingga masa persalinan. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta yang akan berkurang seiring terjadinya penebaran plasenta yang terjadi pada usia kehamilan 28 minggu, dimana terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu.

c. Teori rangsangan *estrogen*

Hormon *estrogen* merupakan hormone yang dominan saat hamil. Hormon ini memiliki dua fungsi yaitu meningkatkan sensitivitas otot rahim dan memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, rangsangan prostaglandin dan rangsangan mekanis.

d. Teori reseptor Oksitosin dan kontaksi *Braxton hicks*

Oksitosin adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar *hipofisis posterior*. Perubahan keseimbangan *estrogen* dan progesteron dapat mengubah *sensivitas* otot rahim sehingga terjadi *Braxton hicks*. Menurunnya kontrasepsi *progesteron* akibat tuanya kehamilan, menyebabkan *oksitosin* meningkat sehingga persalinan dapat dimulai.

4. Tanda-tanda mulainya persalinan

Adapun tanda-tanda permulaan persalinan, sebagai berikut :

a. *Lightening*

Menjelang minggu ke 36 kehamilan, tanda pada primigravida adalah terjadinya penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul yang disebabkan karena *Braxton hicks*, ketegangan dinding perut, ketegangan *ligamentum rotundum*, dan gaya berat janin dimana kepala kearah bawah. Masuknya bayi ke pintu atas panggul menyebabkan ibu merasakan seperti :

1. Sering buang air kecil (*follaksuria*)
2. Kesulitan berjalan
3. Bagian bawah ibu terasa penuh dan mengganjal
4. Ringan di bagian atas perut, dan rasa sesaknya berkurang

Berbeda dengan multipara yang gambarannya tidak begitu jelas kepala janin baru masuk pintu atas panggul menjelang persalinan.

b. Terjadinya his/kontraksi

Saat kehamilan trimester pertama uterus akan sering mengalami kontraksi ringan pada trimester kedua dapat dideteksi dengan pemeriksaan bimanual, serta saat trimester ketiga biasanya kontraksi ini sangat jarang dan meningkat pada satu atau dua minggu sebelum persalinan.

Hal itu terjadi karena adanya perubahan keseimbangan *estrogen* dan *progesteron* sehingga terjadi peningkatan jumlah reseptor *oksitosin* dan junction diantara sel-sel *myometrium*. Dengan semakin tuanya kehamilan, pengeluaran *estrogen* dan *progesterone* semakin berkurang, sehingga *oksitosin* dapat menimbulkan kontraksi yang lebih sering atau biasa disebut his palsu. Adapun cirri-ciri adanya his palsu yaitu :

Rasa nyeri ringan dibagian bawah

- 1) Datangnya tidak teratur
- 2) Tidak ada perubahan pada serviks
- 3) Durasinya pendek
- 4) Tidak bertambah bila beraktivitas

His yang menimbulkan pembukaan serviks dengan kecepatan tertentu disebut his efektif. Pengaruh his ini dapat menimbulkan desakan di daerah uterus, terjadi penurunan janin, terjadi penebalan pada dinding korpus uteri, terjadi peregangan dan penipisan pada istmus uteri, serta terjadinya pembukaan pada canalis servikalis (Eka Puspita 2014).

c. *Bloody show*

Keluarnya lender bercampur darah ini berasal dari pembukaan canalis servikalis, sedangkan terjadinya pengeluaran darah disebabkan oleh robeknya pembuluh darah ketika serviks membuka .

d. Dilatasi dan *effacement*

Dilatasi adalah terbukanya kanalis servikalis secara berangsur-angsur akibat pengaruh his. Effacement adalah pendataran atau pemendekan kanalis servikalis yang semula panjang 1-2cm menjadi hilang sama sekali, sehingga tinggal hanya ostium yang tipis seperti kertas.

5. Tahap-tahap dalam proses persalinan

Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 fase atau kala, yaitu :

a. Kala I

Kala I sebagai kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol sampai lengkap (10 cm). pada permulaan his kala pembukaan yang berlangsung tidak begitu kuat sehingga ibu masih bisa berjalan-jalan. Proses pembukaan serviks sebagai akibat his dibagi menjadi 2 fase, yaitu :

1) Fase Laten

Berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm.

2) Fase aktif

- a) Fase Akselerasi, dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.
- b) Fase Dilatasi Maksimal, dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.
- c) Fase Deselerasi, pembukaan menjadi lambat sekali dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap.

b. Kala II

Kala II sebagai kala pengeluaran. Kala ini dimulai dengan pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir.

c. Kala III

Setelah kala II, kontraksi uterus berhenti sekitar 5 – 10 menit. Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit.

d. Kala IV

Kala IV untuk melakukan observasi karena perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama.

6. Faktor yang mempengaruhi persalinan

Proses persalinan dapat berjalan normal jika dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ibu (*power, passage, psikologis*), faktor janin, plasenta, dan air ketuban (*passenger*), serta faktor penolong persalinan.

a. Tenaga (*Power*)

1) His / Kontraksi

His / Kontraksi uterus adalah kontraksi otot – otot uterus dalam persalinan.

2) Kekuatan mengedan ibu

Tenaga mengejan ini hanya dapat berhasil ketika kala I pembukaan sudah lengkap dan paling efektif sewaktu kontraksi Rahim / uterus.

b. Janin, plasenta, dan air ketuban (*passenger*)

1. Janin

Janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin.

2. Plasenta

Plasenta pun demikian harus melewati jalan lahir sehingga bisa dianggap bagian dari passenger yang menyertai janin.

3. Air ketuban

Amnion pada kehamilan aterm merupakan suatu membrane yang kuat dan ulet tetapi lentur. Amnion adalah jaringan yang menentukan hampir semua kekuatan regangan membrane janin yang mencegah rupture atau robekan.

c. Jalan Lahir (*passage*)

Passage merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin terdiri dari rongga panggul, dsar panggul, serviks, dan vagina.

7. Mekanisme Persalinan

Sebenarnya mekanisme persalinan mengadu pada bagaimana janin menyesuaikan dan meloloskan diri dari panggul ibu, yang meliputi:

a. Turunnya kepala janin

Kepala janin mengalami penurunan terus – menerus dalam jalan lahir sejak kehamilan trimester III, antara lain masuknya bagian terbesar janin kedalam pintu atas panggul (PAP) yang pada primigravida 38 minggu atau selambat – lambatnya awal kala II.

b. Fleksi

Setelah kepala janin berada dalam sikap *fleksi*, dan disertai dengan adanya his dan tahan dari dasar panggul yang makin besar, maka kepala janin makin turun dan semakin *fleksi* sehingga dagu janin menekan pada dada dan belakang kepala (*oksiput*) menjadi bagian bawah.

Terjadinya *fleksi* maksimal pada janin dapat menyesuaikan diri dengan ukuran panggul ibu terutama bidang sempit panggul yang ukuran panggul ibu terutama bidang sempit panggul yang ukur melintang 10 cm. untuk dapat melewatinya, maka kepala janin yang awalnya masuk dengan

ukuran diameter *oksipito frontalis* (11,5 cm) harus fleksi secara maksimal menjadi diameter Oksipito Bregmatik (9,5 cm)

c. Rotasi dalam / putaran paksi dalam

Makin turunnya kepala janin dalam jalan lahir, kepada janin akan berputar sedemikian rupa sehingga diameter terpanjang rongga panggul atau diameter anterior posterior kepala janin akan bersesuaian dengan diameter terkecil antero posterior pintu bawah panggul (PBP). Hal ini mungkin karena kepala janin tergerak spiral atau seperti sekrup sewaktu turun dalam jalan lahir. Bahu tidak berputar bersama – sama dengan kepala akan membentuk sudut 45. Keadaan ini disebut dengan putaran paksi dalam dan ubun – ubun kecil berada dibawah simpisis.

d. *Ekstensi*

Setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai didasar panggul, terjadilah ekstensi atau depleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada PBP mengarah kedepan dan ke atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya kalau tidak terjadi ekstensi maka kepala akan tertekan pada pertemuan dan menembusnya. Dengan ekstensi ini maka sub.oksiput bertindak sebagai hipomochlin (sumbu putar).Kenudian larilah berturut – turut sinsiput (puncak kepala), dahi, hidung, mulut, dan akhir dagu.

e. Rotasi luar / putaran paksi luar

Setelah ekstensi kemudian diikuti dengan putaran paksi luar yang pada hakikatnya kepala janin menyesuaikan kembali dengan sumbu panjang bahu, sehingga sumbu panjang bahu dengan sumbu panjang kepala janin berada pada satu garis lurus.

f. *Ekspulsi*

Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai dibawah symphysis dan hipomochilin untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu belakang menyusul dan selanjutnya seluruh tubuh bayi lahir searah dengan paksi jalan lahir (eka puspita,2014).

B. Tinjauan Khusus tentang persalinan Sungsang

1. Pengertian Persalinan Sungsang

Persalinan sungsang Adalah keadaan janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong di bagian bawah kavum uteri. Pada letak sungsang, berturut-turut lahir bagian-bagian yang makin lama makin besar dimulai dari lahirnya bokong, bahu, kemudian kepala (Icesmi Sukarni K dkk, 2013).

2. Etiologi persalinan sungsang

Beberapa faktor yang berkaitan dengan kejadian persalinan sungsang antara lain :

a. Relaksasi berlebih dinding abdomen akibat multiparitas

- b. Uterus abnormal (uterus arkuatus atau subseptus)
- c. Panggul sempit
- d. Tumor daerah panggul
- e. Pendulum dari dinding abdomen
- f. Plasenta previa
- g. Insersersi plasenta di fundus
- h. Gemeli (Kehamilan ganda)
- i. Janin sudah lama mati (Nita Norma D,dkk,2013)

3. Klasifikasi persalinan sungsang



Gambar 1 : klasifikasi persalinan sungsang

Sumber : Sarwono,2014;h. 589

- a. Bokong Murni (*Frank breech*)

Yaitu letak sungsang dimana kedua kaki terangkat ke atas sehingga ujung kaki setinggi bahu atau kepala janin.

b. Bokong sempurna (*complete breech*)

Yaitu letak sungsang dimana kedua kaki dan tangan menyilang sempurna dan di samping bokong dapat diraba kedua kaki.

c. Bokong tidak sempurna (*incomplete breech*)

Pada bagian terendah janin adalah bokong dan kaki atau lutut yang terbagi atas :

- 1) Terdapat kedua kaki disebut letak kaki sempurna. Bila hanya satu kaki disebut kaki tidak sempurna
- 2) Terdapat kedua lutut disebut lutut sempurna. Bila hanya satu lutut disebut lutut tidak sempurna.

Adapun posisi bokong berdasarkan sacrum,terdapat empat posisi yaitu :

- 1) Sacrum kiri depan (*left sacrum anterior*)
- 2) Sacrum kanan depan (*right sacrum anterior*)
- 3) Sacrum kiri belakang (*left sacrum posterior*)
- 4) Sacrum kanan belakang (*right sacrum posterior*). (Indrayani,S.ST

dkk,2013)

4. Diagnosis persalinan Sungsang

Untuk menegakan diagnose maka yang harus dilakukan oleh seorang bidan adalah dengan melakukan :

- a. *Anamnesis* : pergerakan anak teraba oleh ibu dibagian perut bawah, ibu sering merasa ada benda keras (kepala) yang mendesak tulang iga dan rasa nyeri pada daerah tulang iga karena kepala janin.
- b. *Palpasi* : teraba bagian keras, bundar, melintang pada fundus. Punggung dapat diraba pada salah satu sisi perut, bagian kecil pada sisi yang berlawanan, diatas simpisis teraba bagian yang kurang bundar dan lunak.
- c. *Auskultasi* : denyut jantung janin (DJJ) sepusat atau djj ditemukan paling jelas pada tempat yang lebih tinggi (sejajar atau lebih tinggi dai pusat) .
- d. *VT (Vagina toucher)* : terbagi 3 tonjolan tulang yaitu kedua tubera *ossis ischii* dan ujung *os sacrum*, anus, genetelia anak jika edema tidak terlalu besar dapat teraba
- e. Perbedaan antara letak sungsang dan kepala pada pemeriksaan dalam jika anus posisi terendah maka akan teraba lubang kecil, tidak ada lubang,tidak menghisap, keluar mekonium, jika presentasi kaki maka akan teraba tumit dengan sudut 90° , terasa jari-jari, pada presentasi lutut akan terasa patella dan poplitea. Pada presentasi mulut maka akan terasa ada hisapan di jari, teraba rahang dan lidah. Presentasi tangan siku: terasa jari panjang, tidak rata, patella(-).

- f. Untuk menentukan perbedaan tangan dan kaki: pada kaki ada *kalkaneus*, sehingga terdapat tonjolan tulang yaitu mata kaki dan *kalkaneus*. Pada tangan hanya ada mata di pergelangan tangan, kaki tidak dapat diluruskan terhadap tungkai, jari kaki, jauh lebih pendek dari telapak kaki (Ai Yeyeh Rukiyah, S.SiT.MK.M, dkk, 2013)

5. Prognosis/komplikasi persalinan sungsang.

a. Bagi Ibu

Kemungkinan robekan pada perineum lebih besar, juga karena dilakukan tindakan, selain itu ketuban lebih cepat pecah dan partus lebih lama, jadi mudah terkena infeksi.

b. Bagi bayi

Prognosa : tidak begitu baik, karena adanya gangguan darah plasenta setelah bokong lahir dan juga setelah perut lahir, tali pusat terjepit antara kepala dan panggul, anak bisa menderita asfeksia. Oleh karena itu selain tali pusat dan supaya janin hidup, janin harus di lahirkan dalam waktu 8 menit (Nita Norma D dkk, 2013).

6. Komplikasi Persalinan Sungsang

a. Komplikasi pada ibu :

- 1) Perdarahan
- 2) Robekan jalan lahir
- 3) Infeksi

b. Komplikasi pada bayi :

a) Sufokasi / aspirasi

Bila sebagian besar tubuh janin sudah lahir, terjadi pengecilan rongga uterus yang menyebabkan gangguan sirkulasi dan menimbulkan anoksia. Keadaan ini merangsang janin untuk bernafas dalam jalan lahir sehingga menyebabkan terjadinya aspirasi

b) Asfeksia

Selain hal diatas, anoksia juga disebabkan oleh tejepitnya tali pusat pada fase cepat

c) Trauma Intrakranial :

Terjadi sebagai akibat:

- a) Panggul sempit
- b) Dilatasi servik belum maksimal
- c) Persalinan kepala terlalu cepat (fase lambat kedua terlalu cepat)

d) Fraktura / Dislokasi:

Terjadi akibat persalinan sungsang secara operatif :

- a) Fraktura humerus
- b) Fraktura klavikula
- c) Fraktura femur
- d) Dislokasi bahu

e) Paralisa nervus

Brachialis yang menyebabkan paralisa lengan terjadi akibat tekanan pada pleksus brachialis oleh jari-jari penolong saat melakukan traksi dan juga akibat regangan pada leher saat membebaskan lengan.

c. Trauma persalinan

- 1) Dislokasi-fraktur persendian, tulang ekstremitas
- 2) Kerusakan alat vital : limpa,hati, paru-paru,jantung
- 3) Dislokasi fraktur persendian tulang leher : fraktur tulang dasar kepala; fraktur tulang kepala; kerusakan pada mata, hidung atau telinga; kerusakan pada jaringan otak (Padila,2015).

7. Penatalaksanaan Persalinan Pervaginam Dengan Letak Sungsang

Mekanisme persalinan sungsang hamper sama dengan letak kepala, hanya disini yang memasuki pintu atas panggul adalah bokong. Persalinan berlangsung agak lama, karena bokong dibandingkan dengan kepala lebih lembek, jadi kurang kuat menekan sehingga pembukaan agak lama.

Bokong masuk pintu atas panggul dengan garis pangkal paha melintang atau miring dengan turunya bokong. Terjadinya putaran sehingga didasar panggul garis pangkal paha letaknya menjadi muka belakang dengan trochanter depan sehingga *hypomocilion* (di bawah simpisis) terjadi latero fleksi tubuh janin (punggung) sehingga trochanter belakang melewati perineum. Setelah bokong lahir diikuti kedua kaki kemudian teradi sedikit

rotasi luar untuk memungkinkan bahu masuk pintu atas panggul dalam posisi melintang. Setelah bahu turun terjadi putaran paksi dari bahu sampai ukuran bisa cranial dalam ukuran muka belakang dari pintu bahwa panggul karena itu punggung berputar lagi kesamping.

Pada saat bahu akan lahir kepala dalam keadaan fleksi masuk dalam ukuran pintu atas panggul. Kepala ini mengadakan putaran paksi sedemikian rupa hingga kuduk terdapat di bawah symphysis dan dagu sebelah belakang. Berturut-turut lahir pada perineum dagu, mulut, hidung, dahi, dan belakang kepala.

Pertolongan dengan kelahiran spontan letak bokong murni Biasanya ditolong secara Bracht. Pada primigravida selalu didahului dengan *episiotomi*. Pada pertolongan secara *bracht* bokong diangkat keatas supaya badan janin searah dengan paksi jalan lahir, tidak dilakukan tarikan.

Teknik : Pertolongan dimulai setelah bokong anak lahir. Pada letak bokong ini dipegang dengan dua tangan sedemikian rupa hingga kedua ibu jari pada permukaan belakang pangkal paha dan empat jari lainnya pada permukaan bokong. Jika kaki sudah lahir seperti pada letak bokong kaki, letak lutut, letak kaki maka bokong dipegang sedemikian rupa sehingga ibu jari terletak pada lipat paha dan jari lainnya menggenggam bokong.

Bokong ini terus di bawa keatas ke arah perut ibu sampai kepala lahir, keuntungan pertolongan dari cara bracht ialah bahwa tangan sama sekali tidak

masuk ke dalam jalan lahir, yang mengecilkan kemungkinan infeksi jalan lahir.

Jika persalinan dari cara Bracht mengalami kegagalan, misalnya bila terjadi kemacetan baik pada saat melahirkan bahu atau kepala maka pertolongan dilakukan secara manual aid (*parcial breech extantion*).

Tahapan prosedur manual:

- 1) Tahap pertama : lahirnya bokong sampai pusat yang dilahirkan dengan : Kekuatan tenaga ibu sendiri.
- 2) Tahap kedua :
 - 1) *Klasik*
 - a) Kedua kaki janin dipegang dengan tangan kanan penolong pada pergelangan kakinya dan dielevasi ke atas sejauh mungkin sehingga perut janin mendekati perut ibu



Gambar 2 : Melahirkan lengan belakang pada tehnik melahirkan bahu cara klasik.
Sumber : Eniyati, 2013.h:101

- b) Bersamaan dengan itu tangan kiri penolong dimasukkan ke dalam jalan lahir dengan jari telunjuk menelusuri bahu janin sampai pada fossa cubiti kemudian lengan bawah dilahirkan dengan gerakan seolah-olah lengan bawah mengusap muka janin



Gambar 3 : Melahirkan lengan depan pada tehnik melahirkan bahu cara klasik.

Sumber : Eniyati,2013.h:101

- c) Untuk melahirkan lengan depan, pegangan pada pergelangan kaki janin diganti dengan tangan kanan penolong dan ditarik curam kebawah sehingga punggung janin mendekati punggung ibu dengan cara yang sama lengan dapat dilahirkan.
- 2) *Mueller*
- a) Badan janin dipegang secara femuro-pelvis dan sambil dilakukan traksi curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan di bawah simfisis dan lengan depan dilahirkan dengan mengait lengan di bawahnya.



Gambar 4 : Pegangan “Femuro Pelvic” pada pertolongan persalinan sungsang pervaginam.

Sumber : Eniyati, 2013.h:98

Setelah bahu dan lengan depan lahir, maka badan janin yang masih dipegang secara femuro-pelvis ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir.



Gambar 5 : (kiri) Melahirkan bahu depan dengan ekstraksi pada bokong dan bila perlu dibantu dengan telunjuk jari tangan kanan untuk mengeluarkan lengan depan.

Sumber : Eniyati,2013.h;103




Gambar 6 : (kanan) Melahirkan lengan belakang (inset : mengait lengan atas dengan telunjuk jari tangan kiri penolong.

Sumber : Eniyati,2013.h:103


3) *Lovset*

- a) Badan janin dipegang secara *femuro-pelvis* dan sambil dilakukan traksi curam ke bawah badan janin diputar setengah lingkaran, sehingga bahu belakang menjadi bahu depan.
- b) Sambil melakukan traksi, badan janin diputar kembali ke arah yang berlawanan setengah lingkaran demikian seterusnya bolak-balik sehingga bahu belakang tampak di bawah simfisis dan lengan




Gambar 7 : Sambil dilakukan traksi curam bawah, tubuh janin diputar 180° kearah yang berlawanan sehingga bahu depan menjadi bahu depan dibawah arcus pubis dan dapat dilahirkan.

Sumber : Eniyati,2013.h:99



Gambar 8 : Tubuh janin diputar kembali 180° kearah yang berlawanan sehingga bahu belakang kembali menjadi bahu depan dibawah arcus pubis dan dapat dilahirkan.

Sumber : Eniyati,2013.h: 100




Gambar 9 : Tubuh janin di putar kembali 180° kearah yang berlawanan sehingga bahu belakang kembali menjadi bahu depan dibawah arcus pubis dan dapat dilahirkan.

Sumber : Eniyati,2013.h:100

3) Tahap ketiga (Lahirnya Kepala)


1) *Mauriceau*



Gambar 10 : Cara persalinan sungsang dengan teknik mauriceau.

Sumber : Eniyati,2013.h:107

- a) Tangan penolong yang sesuai dengan muka janin dimasukkan ke dalam jalan lahir.
- b) Jari tengah dimasukkan ke dalam mulut dan jari telunjuk serta jari ke empat mencengkeram *fossa canina* sedangkan jari yang lain mencengkeram leher.



Gambar 11 : Jari tengah masuk ke dalam mulut bayi, jari telunjuk dan jari manis berada di *fossa canina*.

Sumber : Eniyati,2013.h: 107

- a. Badan anak diletakkan di atas lengan bawah penolong seolah-olah janin menunggang kuda. Jari telunjuk dan jari ke tiga penolong mencengkeram leher janin dari arah punggung.
- b. Kedua tangan penolong menarik kepala janin curam ke bawah sambil seorang asisten melakukan *fundal pressure*.
- c. Saat suboksiput tampak di bawah simfisis, kepala janin dielevasi ke atas dengan suboksiput sebagai hipomoklion sehingga berturut-turut lahir dagu, mulut, hidung, mata, dahi, ubun-ubun besar dan akhirnya seluruh kepala.

2) *Najouks*.

Satu tangan memegang leher janin dari depan, tangan lain memegang leher pada bahu, tarik janin ke bawah dengan bantuan dorongan dari atas *Sympisis*.

3) *Wigan martin, wincle*

Satu tangan dalam salah lahir dengan telunjuk dalam mulut janin sedang jari tengah dan ibu jari pada rahang bawah. Tangan lain menekan di atas simpisis atau fundus.

4) *Pregeu* terbalik.

Dilakukan pada ubun-ubun kecil terletak sebelah belakang, tangan lain memegang kaki lalu menarik janin kearah perut ibu dengan kuat.

C. Tinjauan Asuhan Kebidanan Persalinan Sungsang

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan–penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Varney, 2012).

Manajemen kebidanan adalah metode yang digunakan oleh bidan dalam menentukan dan mencari langkah–langkah pemecahan masalah serta melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasiennya dari gangguan kesehatan.

2. Langkah–Langkah Manajemen Kebidanan

Langkah–langkah asuhan kebidanan menurut Varney (1997) yaitu:

a. Langkah I : Pengumpulan data dasar

1) Biodata

Mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk menilai keadaan klien secara keseluruhan yang terdiri atas data istri dan suami, meliputi nama ibu dan suami, umur, pernikahan keberapa dan lamanya, suku, agama, pendidikan, pekerjaan dan alamat.

2) Alasan masuk dan keluhan utama

Alasan ibu datang ke tempat pelayanan kesehatan dan keluhan yang dirasakan ibu sekarang dalam kasus persalinan, keluhan yang sering di rasakan oleh ibu seperti nyeri perut tembus belakang serta pengeluaran lender, darah, atau air ketuban dari jalan lahir. Jika dalam persalinan sungsang keluhan utama yang sering dialami oleh ibu seperti merasakan ada tekanan pada fundus dan mengeluh merasakan sesak.

3) Riwayat kehamilan sekarang

Mengumpulkan semua data yang dibutuhkan mengenai riwayat kehamilan ibu yang sekarang, meliputi :

- a) Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) untuk menghitung usia kehamilan ibu berdasarkan siklus haid ibu
- b) Keluhan yang dialami ibu selama hamil, pada kasus persalinan sungsang yang sering dialami seperti nyeri perut, mengalami sesak karena adanya tekanan pada fundus, sering buang air kecil
- c) Pergerakan janin pertama kali pada kehamilan bokong pada sisi atas perut ibu

4) Riwayat kehamilan

a) Riwayat menstruasi

Data ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan dasar dari organ reproduksi pasien. Beberapa data yang harus kita peroleh dari riwayat menstruasi antara lain yaitu menarche (usia pertama kali mengalami menstruasi yang pada umumnya wanita Indonesia mengalami menarche pada usia sekitar 12 sampai 16 tahun), siklus menstruasi (jarak antara menstruasi yang dialami dengan menstruasi berikutnya dalam hitungan hari yang biasanya sekitar 21 sampai 34 hari), volume darah data ini menjelaskan seberapa banyak darah menstruasi yang dikeluarkan biasanya acuan yang digunakan berupa kriteria banyak atau sedikitnya, keluhan, beberapa wanita menyampaikan keluhan yang dirasakan ketika mengalami menstruasi dan dapat merujuk kepada diagnose tertentu.

(1) Gangguan kesehatan alat reproduksi

Data ini sangat penting untuk kita karena akan memberikan petunjuk bagi kita tentang organ reproduksi pasien. Ada beberapa penyakit organ reproduksi yang berkaitan erat dengan personal hygiene pasien atau kebiasaan lain yang tidak mendukung kesehatan reproduksinya.

(2) Riwayat kontrasepsi

Riwayat Kontrasepsi sangat diperlukan karena kontrasepsi hormonal.

b) Riwayat Obstetri

Informasi esensial tentang kehamilan terdahulu mencakup bulan dan tahun kehamilan tersebut berakhir, usia gestasi pada saat itu, tipe persalinan (spontan, forsep, ekstraksi vakum, atau bedah cesar), berat lahir, jenis kelamin, dan komplikasi lain. Dalam kasus ini data obstetric yang dikumpulkan berupa riwayat kehamilan dan persalinan lalu ibu, apakah ada riwayat hamil dan melahirkan sungsgang atau tidak.

c) Riwayat kesehatan

Data riwayat kesehatan ini dapat kita gunakan sebagai penanda akan adanya penyulit masa hamil, beberapa data yang penting tentang riwayat kesehatan pasien yang perlu diketahui adalah apakah pasien pernah atau sedang menderita penyakit seperti jantung, diabetes mellitus, ginjal, hipertensi atau hipotensi,dan lain-lain.

d) Riwayat keluarga

Informasi tentang keluarga pasien penting untuk mengidentifikasi wanita yang berisiko menderita penyakit genetik

yang dapat mempengaruhi hasil akhir kehamilan atau beresiko memiliki bayi yang menderita penyakit genetik. Dalam kasus ini data yang diperlukan adalah apakah ada salah satu keluarga yang juga pernah memiliki riwayat sosial yang perlu untuk diketahui seperti status perkawinan, sumber dukungan, respon ibu terhadap kehamilan ini, respon keluarga terhadap kehamilan ini, pengetahuan ibu tentang perawatan kehamilan, adat istiadat setempat yang berkaitan dengan masa kehamilan, perencanaan KB. Berdasarkan kasus ini data yang diperlukan meliputi respon keluarga mengenai kehamilan ibu sekarang ini terutama suami.

5) Pola kehidupan sehari-hari

Data pola kehidupan sehari-hari yang perlu untuk dikaji adalah pola makanan ibu, pola minum, pola istirahat, dan aktivitas sehari-hari.

6) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik digunakan untuk mengetahui kondisi pasien secara menyeluruh. Langkah-langkah pemeriksaan fisik sebaiknya dilakukan secara sistematis, meliputi :

- a) Keadaan umum pasien
- b) Kesadaran (komposmentis, semnolen, apatis, dan lainnya)

Persalinan sungsang.

7) Riwayat sosial

a) Pemeriksaan tanda-tanda vital

(1) Tekanan darah, dikatakan tinggi bila lebih dari 140/90 mmHg.

Bila tekanan darah meningkat, yaitu sistolik 30 mmHg atau lebih dan diastolic 15 mmHg atau lebih, kelainan ini dapat berlanjut menjadi preeklampsia dan eklampsia kalau tidak ditangani dengan cepat.

(2) Nadi, dalam keadaan santai denyut nadi ibu sekitar 60-100x/i menit. Denyut nadi akan meningkat melebihi 100x/I menit jika ibu dalam keadaan tegang. Ketakutan dan cemas, demam, gangguan jantung dan jika sedang his dalam proses persalinan.

(3) Pernapasan, untuk mengetahui fungsi system pernapasan Normalnya 16-24x/i menit.

(4) Suhu tubuh, normalnya adalah 36,5-37,5°C.

b) Pemeriksaan fisik khusus pada ibu bersalin

Inpeksi adalah memeriksa dengan cara melihat atau memandang meliputi :

(1) Mata

Bentuk simetris, konjungtiva normal merah muda, bila pucat menandakan anemia, sclera normal berwarna putih bila

kuning menandakan ibu mungkin terinfeksi hepatitis, bila merah kemungkinan ada konjungtivitis, kelopak mata yang bengkak kemungkinan adanya preeklampsia.

(2) Wajah

Tampak kloasma gravidarum sebagai akibat deposit pigmen yang berlebihan tidak sembab, bentuk simetris, bila tidak menunjukkan adanya kelumpuhan

(3) Leher

Normal tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan tidak ditemukan bendungan vena jugularis.

(4) Payudara

Normal bentuk simetris, hiperpigmentasi pada areola mammae, puting susu bersih dan menonjol, ada atau tidak pengeluaran ASI.

(5) Abdomen

Tidak ada bekas operasi terdapat linea nigra, striae dan pembesaran abdomen.

(6) Genetalia

Tidak oedema, tidak ada varises, dan kelainan lainnya.

(7) Ekstrimitas atas dan bawah

Normal tidak oedema dan tidak ada varises, bentuk simetris tidak ada kelainan. Palpasi adalah pemeriksaan dengan cara meraba meliputi :

Periksa raba adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menilai suatu keadaan pasien dan bisa digunakan pada kehamilan atau masa persalinan dengan cara meraba perut pasien pada posisi *dorsal recumbent*. Melalui palpasi dapat ditentukan usia kehamilan berdasarkan TFU (tinggi fundus), bagian-bagian janin dalam rahim, letak janin dalam rahim, sejauh mana bagian terendah janin masuk dalam panggul, ada atau tidaknya keseimbangan antara ukuran kepala janin dengan panggul, janin tunggal atau kembar, letak DJJ, dan perkiraan tafsiran berat badan janin dalam rahim.

Pada kehamilan bokong letak kepala berada di fundus, teraba satu punggung, bokong, dan bagian tekecil janin dan tafsiran berat janin normal.

Auskultasi atau periksa dengan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menilai kesejahteraan janin dalam kandungan dengan menggunakan stetoskop monokuler (lenec) atau dopler. Periksa dengar harus

dilakukan 1 menit penuh dan menilai denyut jantung janin dalam batas normal yaitu 120-160 kali per menit pada kehamilan bokong, denyut jantung terdapat pada

8) Pemeriksaan dalam

Beberapa hal yang dinilai pada pemeriksaan dalam adalah keadaan perineum dan vagina, porsio, keadaan serviks, keadaan ketuban, letak atau presentasi janin, penurunan bagian terendah janin, adanya penyusupan atau tidak, penumbungan, kesesuaian ukuran panggul dalam dengan bagian terendah janin, dan menilai pelepasan cairan seperti lender, darah, dan air ketuban. Pada kehamilan letak bokong hanya akan mendapatkan bagian terendah janin presentasi bokong.

b. Langkah II : Interpretasi Diagnosa dan Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atau data-data yang dikumpulkan. Data yang akurat diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Diagnose yang ditegakkan oleh bidan dalam lingkup praktik kebidanan harus memenuhi standar nomenklatur diagnose kebidanan, yaitu :

- 1) Diakui telah disahkan oleh profesi
- 2) Berhubungan langsung dengan praktik kebidanan
- 3) Memiliki ciri khas kebidanan
- 4) Dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan
- 5) Didukung oleh *Clinical Judgement* dalam lingkup praktik kebidanan

Berdasarkan kasus ini, maka kemungkinan interpretasi data yang timbul adalah gravid, usia gestasi, keadaan janin, intrauterine, presentasi bokong, bagian punggung, keadaan ibu dan janin baik, dengan berdasarkan data subjektif dan objektif.

c. Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa atau Masalah Potensial

Dari kumpulan diagnose dan masalah, identifikasi faktor-faktor potensial yang memerlukan antisipasi segera, maupun tindakan pencegahan untuk persalinan sungsang masalah-masalah yang bisa terjadi pada ibu yaitu partus macet. Dampak yang bisa ditimbulkan pada bayi baru lahir adalah bayi dapat memiliki gangguan sindrom gawat nafas, perdarahan gawat intracranial dan fraktur, dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan dengan persalinan normal. Bayi baru lahir dengan persalinan sungsang memiliki komplikasi Asfiksia pada bayi dapat disebabkan oleh : Kemacetan persalinan kepala (aspirasi air ketuban-lendir), Perdarahan atau edema jaringan otak.

d. Langkah IV : Melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi

Proses manajemen kebidanan dilakukan secara terus-menerus yang dapat menghasilkan data baru, dimana harus segera dinilai, data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan yang memerlukan tindakan segera, beberapa data yang memerlukan indikasi adanya situasi yang membutuhkan tindakan segera sambil menunggu intervensi dari dokter. Dalam situasi lain yang tidak darurat dapat membutuhkan konsultasi atau kolaborasi dokter. Melakukan pertolongan persalinan sungsgang harus dilakukan oleh tenaga ahli atau melakukan kolaborasi dengan spesialis kandungan untukantisipasi kegawatdaruratan seperti didapatkan temuan-temuan yang abnormal selama sebelum, sementara dan setelah proses persalinan. Dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan bayi, bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat, langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan, bidan juga dalam melakukan tindakan harus memberikan inform consent untuk persetujuan tindakan maupun penolakan tindakan.

e. Langkah V : Perencanaan tindakan/intervensi.

Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnose atau masalah yang telah diidentifikasi atau antisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dilengkapi. Pada

langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Suatu rencana asuhan harus sama-sama disetujui oleh bidan maupun pasien agar efektif, karena pada akhirnya pasien yang akan menentukan apakah tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu pada langkah ini diperlukan diskusi antara tenaga kesehatan dengan pasien mengenai semua rencana tindakan termasuk penegasan dan persetujuan. Melakukan pertolongan persalinan sungsang dengan cara teknik bracht yaitu :

- 1) Mencengkram bokong dengan kedua tangan ibu jari berada sejajar dengan panjang paha, kemudian jari yang lain memegang daerah panggul bayi. Jangan melakukan intervensi apapun ikuti terus proses lahirnya bayi
 - 2) Setelah perut dan sebagian dada lahir maka longgarkan tali pusat
 - 3) Saat angulus scapula inferior berada di bawah symphysis lakukan hiperlordosis kearah perut ini. Dengan demikian lahirlah dagu, mulut, hidung, mata, dahi dan seluruh bagian janin.
- f. Langkah VI : Pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan.

Implementasi dapat dikerjakan secara keseluruhan oleh bidan atau bekerjasama dengan tim kesehatan lain. Bidan harus bertanggungjawab terhadap tindakan secara langsung maupun tindakan

kolaborasi dan konsultasi . implementasi yang efisien aan meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien.

g. Langkah VII : Evaluasi

Langkah akhir dari manajemen kebidanan adalah evaluasi,namun sebenarnya evaluasi ini dilakukan pada setiap langkah manajemen kebidanan pada tahap evaluasi bidan harus mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang diberijan kepada pasien. Proses evaluasi yang dilakukan berupa penilaian keadaan umum, kesadaran tanda-tanda vital,kontraksi uterus dan menilai jumlah perdarahan.

Dari 7 proses piker di dokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu :

- 1) Proses Pikir langkah I di dokumentasikan dalam bentuk subjektif (S) dan Objektif (O).
- 2) Proses piker langkah II,III,IV di dokumentasikan dalam bentuk *Assesment* (A)
- 3) Proses piker langkah V,VI dan VII di dokumentasikan dalam bentuk *planning* (P) (Tresnawati,2013 :181-186)

D. Tinjauan Islam Tentang Persalinan.

Menurut Wiwik setiawati (2015) Proses melahirkan merupakan bagian paling berat yang harus dihadapi oleh ibu yang tengah mengandung. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa dari seorang ibu ketika menjalani proses ini. Bahkan mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan sang buah hati.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Ahqaf Ayat 46:15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
 أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
 فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang Engkau Ridhoi dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang berserah diri.” (Kementerian Agama RI, Al-Qura'an dan Terjamahannya, 2002).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus menghormati kedua orang tua kita terutama kepada ibu. Ibu yang sudah mengandung selama Sembilan bulan tidaklah mudah, banyak rintangan yang ia lalui bahkan dapat mengancam hidupnya. Bukan hanya mengandung saja, akan tetapi ia juga melahirkan kita dari

rahimnya itu sudah susah payah, apa lagi jika ibu mengalami komplikasi-komplikasi selama persalinannya yang dapat mengancam keselamatan dirinya dan bayinya.

Ayat di atas bagaikan menyatakan : sesungguhnya kami telah memerintah manusia, siapapun manusia itu, selama dia benar-benar manusia agar taat kepada kami sepanjang hidup mereka *dan Kami telah mendewasakan*, yakni memerintahkan dan berpesan, *kepada manusia* itu juga dengan wasiat yang baik, yaitu agar berbuat baik dan berbakti *terhadap kedua orangtuanya* siapa pun dan apa pun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orangtuanya.

Ini antara lain karena ayahnya terlibat dalam kejadiannya dan setelah sang ayah mencampakkan sperma ke dalam rahim *ibunya*, sang ibu *mengandungnya dengan susah payah*, sambil mengalami aneka kesulitan bermula dari mengidam, dengan aneka gangguan fisik dan psikis, dan *melahirkannya dengan susah payah setelah* berlalu masa kehamilan. Masa kandungan dalam perut ibu dan penyapihannya paling sempurna adalah tiga puluh bulan sehingga apabila ia, yakni sang anak, telah dewasa, yakni sempurna awal masa bagi kekuatan fisik dan psikisnya, ia berbakti kepada kedua orangtuanya dan kebaktiannya berlanjut sampai ia mencapai usia empat puluh tahun, yakni masa kesempurnaan kedewasaannya, dan sejak itu ia berdoa memohon agar pengabdianya kepada kedua orangtuanya semakin bertambah.

Dalam tafsir Al-Maraghi QS. Al-Ahqaf [46]:15, Allah SWT memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua serta mengasihi mereka baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Allah SWT menjadikan perbuatan berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama, sedangkan durhaka kepada mereka adalah dosa yang besar. Allah SWT juga menyebutkan secara khusus tentang ibu, karena dialah yang lebih lemah kondisinya dan lebih pantas mendapat perhatian serta memiliki keutamaan yang lebih besar. Seorang ibu, ketika mengandung anaknya mengalami susah payah baik fisik maupun pikiran, dan ketika melahirkanpun mengalami rasa sakit (M. Quraish Shihab, 2011 : 402).

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI
PADA NY “E” DENGAN PERSALINAN SUNGSANG
DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2018

KALA I

Nomor Register : 473xxx
Tanggal masuk rumah sakit : 4 September 2018 Jam: 09.25 Wita
Tanggal Partus : 4 September 2018 Jam: 12.10 Wita
Tanggal Pengkajian : 4 September 2018 Jam: 09.30 Wita
Nama pengkaji : Nurul Insani. M

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas ibu/ suami

Nama : Ny “E” / Tn “S”
Umur : 37thn / 37thn
Nikah/ lamanya : 1x / ±14thn
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Petani
Alamat : Kampili

Anamnesa (data subjektif)

a. Keluhan utama

Nyeri perut tembus belakang disertai dengan pelepasan lendir dan darah.

b. Riwayat keluhan utama

Ibu merasakan nyeri perut tembus ke belakang sejak tanggal 4 september 2018 Pukul 02.30 Wita, dan terdapat pengeluaran lendir sejak tanggal 4 September 2018 Pukul 05.30 Wita. Sifat nyeri yang di rasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan tidak ada pengeluaran air dari jalan lahir. Serta usaha klien untuk mengatasi keluhannya adalah dengan mengelus-ngelus perut dan pinggangnya serta menarik nafas.

c. Riwayat kesehatan yang lalu

Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit menular seperti Tbc, hepatitis, pms/hiv/aids serta tidak pernah menderita penyakit menurun seperti dm, hipertensi.

d. Riwayat kesehatan keluarga

Ibu mengataka dalam anggota keluarganya tidak ada yang menderita penyakit menular, tbc, hepatitis, asma, dan tidak ada yang menderita penyakit menurun seperti dm, dan hipertensi.

e. Riwayat Ginekologi

Ibu mengatakan tidak pernah mengalami keputihan yang berlebihan, perdarahan dan tidak pernah menjalani operasi kandungan yang lain.

f. Riwayat Kesehatan sekarang dan yang lalu

- 1) Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes melitus, asma, dan hipertensi.
- 2) Tidak ada riwayat penyakit menular: tuberculosis, malaria, hepatitis dan penyakit menular seksual.
- 3) Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan.
- 4) Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di Rumah sakit maupun di Puskesmas

g. Riwayat menstruasi

- 1) Menarche : 15 tahun
- 2) Siklus : 28-30 hari
- 3) Lamanya : 5-7 hari
- 4) Banyaknya : 2-3x ganti pembalut per hari
- 5) Teratur/ tidak teratur : teratur
- 6) Sifat darah : encer
- 7) Disminore : tidak ada

h. Riwayat perkawinan

Menikah : 1 kali

Lamanya : ±14thn

Umur pertama kali menikah : 23 tahun .

i. Riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu

No	Tahun	Jenis partus	Jenis kelamin	BBL	PBL	Tempat partus	Penolong	Keadaan
1	2009	Persalinan pervaginam	Laki-laki	2,800 gram	46 cm	Puskesmas	Bidan	Baik
2	2014	Persalinan pervaginam	Perempuan	3000 gram	48 cm	Puskesmas	Bidan	Baik

j. Riwayat nifas yang lalu

Ibu tidak mengeluh dalam merawat bayinya dan tidak mengalami depresi setelah persalinan, tidak ada tanda-tanda infeksi masa nifas, seperti keluar cairan yang berbau busuk, pengeluaran air susu ibu lancar dan ibu menyusui anak pertamanya secara eksklusif selama 6 bulan dan ditambah makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan keatas.

k. Riwayat kehamilan sekarang

- 1) Hari pertama haid terakhir tanggal 2 Desember 2017
- 2) Hari tafsiran persalinan tanggal 8 September 2018
- 3) Umur kehamilan 39 Minggu 3 hari
- 4) Menurut ibu kehamilannya \pm 9 bulan
- 5) Ibu merasakan pergerakan janinnya semakin lemah dirasakan pada perut sebelah kanan
- 6) Ibu memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali di Puskesmas

Trimester I : 2x

Trimester II : 2x

Trimester III : 2x

- 7) Ibu telah mendapat suntikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebanyak 2 kali

TT 4 : 16 maret 2018

Keluhan-keluhan:

Trimester I : mual muntah di pagi hari, nafsu makan berkurang

Trimester II : masih merasa sedikit mual tetapi tidak muntah dan nafsu makannya bertambah.

Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah.

- 8) Penyuluhan

Ibu belum pernah mendapat penyuluhan selama kehamilannya.

- l. Riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual

- 1) Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami.
- 2) Hubungan ibu dengan suami, keluarga, maupun tetangga baik.
- 3) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami.
- 4) Ibu rajin beribadah dan berdoa untuk kelancaran persalinannya.

- m. Riwayat KB

Ibu pernah menjadi akseptor kb Implant selama 4 tahun.

- n. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1) Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan:

- a) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- b) Frekuensi : 3 kali sehari
- c) Kebutuhan minum : 6-8 gelas per hari

2) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

- a) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amoniak.
- b) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

3) Personal hygiene

Kebiasaan:

- a) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b) Sikat gigi : 2 kali (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi
- c) Keramas : 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo
- d) Ganti pakaian : 2 kali sehari

4) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan

- Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

2. Pemeriksaan fisik (data objektif)

a. Pemeriksaan umum:

- 1) Keadaan umum ibu tampak cemas
- 2) Kesadaran komposmentis
- 3) Hari tafsiran persalinan tanggal 8 September 2018
- 4) Tanda-tanda vital:

Tekanan darah : 120/80 mmHg	Suhu : 36,8°C
Nadi : 80x/ menit	Pernapasan : 20x/ menit
- 5) Tinggi badan : 157 cm
- 6) Berat badan sebelum hamil : 50 kg
- 7) Berat badan sekarang : 57 kg
- 8) Lingkar lengan atas (lila) : 26 cm

b. Pemeriksaan fisik (*Head To Toe*)

1) Kepala

Inspeksi : kepala bersih, tidak ada ketombe, rambut hitam dan lurus

Palpasi : tidak ada massa, tidak mudah rontok dan tidak ada nyeri tekan

2) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada *oedema* pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak

Palpasi : tidak teraba adanya *oedema*

3) Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sclera putih (tidak ikterus)

4) Hidung

Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran secret.

Palpasi : tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak nampak adanya polip.

5) Mulut dan gigi

Inspeksi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada gigi yang tanggal, tidak ada stomatitis dan gusi tidak berdarah.

6) Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan peradangan

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.

7) Leher

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis

8) Payudara

Inspeksi : payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat areola dipencet, tidak ada nyeri tekan.

9) Abdomen

Inspeksi : tidak tampak bekas operasi, tampak linea nigra,, perut tampak membesar membujur.

Palpasi :

Leopold I : 3 jari di bawah *processus xiphoideus* (tinggi fundus uteri 31 cm), teraba keras, bulat dan melenting (kepala).

Leopold II : punggung kanan (Puka)

Leopold III : Bagian terbawah teraba lunak, kurang melenting (bokong)

Leopold IV : bokong sudah masuk PAP, divergen. 3/5

Lingkar perut : 89 cm

Tafsiran berat janin : 2759 gram

Auskultasi : terdengar bunyi denyut jantung janin pada perut sebelah kanan bagian atas pusat dengan menggunakan Doppler. Frekuensi 138x/i.

His : 3x dalam 10 menit dengan durasi (35"-40")

10) Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varises, nampak pelepasan lendir, darah, ketuban menonjol

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak oedema dan tidak ada nyeri tekan.

11) Anus

Inspeksi : tidak ada hemorroid

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

12) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : pergerakan aktif, tidak ada varises

Palpasi : tidak ada oedema

c. Pemeriksaan dalam

Vaginal toucher (VT) tanggal 4 september 2018 , jam 09:30 wita

Vulva dan Vagina : Normal

Portio : Tebal

Pembukaan : 6 cm

Ketuban : Utuh

Persentase : Bokong Murni

Penurunan : Hodge II

Molase : -

Penumbungan : Tidak ada

Kesan Panggul : Tidak ada

Pelepasan : Lendir darah

Pemeriksaan penunjang

1) Pemeriksaan USG

Tanggal 4 September 2018, jam wita oleh dokter A Sp. OG di Poliklinik KIA

a) GIII PII A0, gravid tunggal, hidup

b) Letak : bokong

2) Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

Tanggal 4 September 2018, jam 09.40 wita

a) WBC : $13.5 \times 10^3/\mu\text{L}$

b) HB : 12.8 g/dl

c) PLT : $320 \times 10^3/\mu\text{L}$

d) GDS : 147 mg/dl

e) HGB : 10,5g/dl

f) HCT : 39.0%

g) MCV : 87.4fL

h) MCH : 28.7pg

i) MCHC : 32.8g/dL

j) Protein : negatif

k) Reduksi : negatif

l) HbsAg : negatif

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

GIII PII A0, gestasi 39 minggu 3 hari, situs memanjang, puka, presentasi bokong, BDP, intra uterin, tunggal, hidup, keadaan ibu dan janin baik, inpartu kala I fase aktif dengan letak bokong murni .

1. GIII PII A0

Dasar

Data subjektif : ibu mengatakan kehamilan yang ketiga dan sebelumnya tidak pernah keguguran.

Data objektif : Keadaan Umum : Baik

Kesadaran : Composmentis

TTV : TD: 120/80 mmHg, N: 84x.i, S: 36,6°C, P: 20x/i

leopold I : Tfu 3 jari dibawah px (31cm), di fundus teraba keras, bulat dan melenting (kepala)

Leopold II : Puka

Leopold III : Bagian terbawah teraba lunak, kurang melenting, sudah masuk PAP

Leopold IV : Bokong sudah masuk PAP . 3/5

TBJ : 2759 gram

Analisa dan interpretasi data: Pada pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu dan otot perut sudah kendur, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (prawirohardjo, 2014 : 179).

2. Gestasi 39 minggu 3 hari

Dasar

Data subjektif : hari pertama haid terakhir 2 Desember 2017

Data objektif : pemeriksaan leopold I, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah *processus xiphoideus*, dan hari tafsiran persalinan tanggal berdasarkan rumus Neagle.

Analisa dan interpretasi data: Dari hasil pemeriksaan, dilihat dengan menggunakan rumus Neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan (Prawirohardjo, 2014 : 279).

3. Intrauterin

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan janinnya bergerak dengan sangat kuat saat ini dan ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya

Data objektif : ibu tidak merasakan nyeri ketika dipalpsi, TFU sesuai umur kehamilan, pada palpasi Leopold teraba bagian-bagian kecil janin.

Analisa dan interpretasi data: Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intra uterin.

4. Tunggal

Dasar

Data subjektif : Ibu mengatakan janinnya sering bergerak sebanyak 12 kali dalam sehari dan dominan terasa pada kuadran kiri bawah perut ibu. Ibu mengatakan gerakan bayinya selalu berada di satu sisi dan tidak pernah merasakan gerakan di dua sisi perut ibu.

Data objektif : Pada Leopold I, teraba bokong di fundus yang bulat, keras dan melenting (kepala), pada Leopold II teraba punggung kanan, pada Leopold III bagian terbawah teraba lunak, kurang melenting (bokong) dan Leopold IV bokong sudah masuk di PAP, dan auskultasi hanya terdapat satu denyut jantung janin (DJJ) yaitu terdengar jelas, dan semakin kuat pada kuadran

kanan setinggi pusat perut ibu dengan frekuensi 138 kali per menit, serta tinggi fundus uteri sesuai dengan umur kehamilan.

Analisa dan interpretasi data: Didalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, sangat kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu.

5. Hidup

Dasar

Data subjektif : ibu merasakan pergerakan janinnya biasanya 12 kali dalam sehari.

Data objektif : denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, sangat kuat dan teratur pada kuadran kanan setinggi pusat ibu dengan frekuensi 136 kali per menit

Analisa dan interpretasi data: Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ), merupakan tanda bahwa janin hidup. janin dalam keadaan abnormal, bunyi jantungnya tidak teratur dan frekuensinya antara 160-190 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh.

6. Keadaan ibu dan janin

Dasar

Data subjektif : Ibu merasakan cemas dengan janinnya, selama hamil ibu merasakan sesak di bagian dadanya.

Data objektif : keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan setinggi pusat perut ibu dengan frekuensi 138 kali per menit dan pemeriksaan *head to toe* konjungtiva merah muda, wajah dan tungkai tidak oedema, hemoglobin 12,8 g/dl menandakan ibu tidak anemia. Konjungtiva merah muda, hemoglobin yang normal, tidak adanya oedema pada wajah dan tungkai menandakan ibu dalam keadaan baik.

Analisa dan interpretasi data: Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal dan denyut jantung janin (DJJ) dalam batasan tidak normal menandakan keadaan ibu baik dan janin keadaan abnormal, konjungtiva merah muda, hemoglobin 12,8 g/dl.

7. Inpartu kala I fase aktif dengan Presentase Bokong Murni

Data subjektif : Ibu merasakan nyeri perut tembus ke belakang sejak 4 september 2018 Pukul 02.30 Wita, dan terdapat pengeluaran lendir sejak tanggal 4 september 2018 Pukul 02.30 Wita.

Data objektif : Tampak pengeluaran lendir sejak tanggal 4 september 2018 Pukul 02.30 Wita. Kontraksi uterus 3 x dalam 10 menit dengan durasi 30 detik sampai 35 detik. Selain itu, ada pun hasil pemeriksaan lainnya antara lain:

Hasil pemeriksanan dalam tanggal 4 september 2018 jam 09.30 wita

Vulva dan vagina : tidak ada kelainan

Portio : melesap

Pembukaan : 6 cm

Ketuban : Utuh

Presentasi : Bokong murni

Penurunan : hodge II

Molase : -

Penumbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir dan darah

Analisis dan interpretasi data

Nyeri perut yang terjadi karena terbukanya mulut rahim di sertai peregangan otot polos rahim yang menimbulkan nyeri karena adanya penekanan pada ujung syaraf sewaktu uterus berkontraksi. Kontraksi uterus yang terjadi secara teratur dan teraba portio lunak dan tipis serta pembukaan 6 cm merupakan inpartu kala I fase aktif yang dimulai dari pembukaan 4-10 cm (Widia, 2015 : 4).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial yang akan terjadi yaitu:

1. Pada ibu, yaitu infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, perdarahan, morbiditas dan mortalitas maternal.
2. Pada janin, yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, *enterecolitis necroticing*, gangguan otak dan risiko *cerebral palsy*, *hiperbilirubinemia*, anemia, sepsis, penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, *cerebral palsy*, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distres pernapasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal

Data subjektif : ibu mengatakan terdapat pengeluaran darah dan lender sejak jam 03.00 WITA.

Data objektif : tampak pengeluaran lendir, darah dan air dari pervaginam.

Analisa dan interpretasi data:

- a) Persalinan sungsang memberi pengaruh/ komplikasi keapada ibu dan janin yaitu pada ibu potensial terjadi infeksi *intrapartal*/ dalam persalinan, perdarahan, dan robekan jalan lahir yang lebih besar, morbiditas dan mortalitas maternal (Nita Norma dkk, 2013 : 114).

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI

Kolaborasi dengan dokter pemberian obat :

1. Tablet sulfas ferosus (SF) 2x1 untuk pembentukan sel darah merah, menjadi cadangan zat besi bagi janin, mengoptimalkan fungsi otot.
2. Asam mefenamat 3x1 untuk meredakan rasa sakit dan peradangan
3. Cefadroxil 500mg merupakan golongan antibiotic yang digunakan untuk mengatasi infeksi.
4. Jahit luka perineum derajat III.

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

1. Masalah aktual : Presentase Bokong Murni
2. Masalah potensial : potensial terjadi pada ibu yaitu infeksi *intrapartal/* dalam persalinan, perdarahan post partum, morbiditas dan mortalitas maternal, dan potensial terjadi pada janin yaitu infeksi pada bayi, asfiksia, , morbiditas dan mortalitas perinatal.
3. Tujuan:
 - a. Persalinan dapat berlangsung dengan normal, keadaan ibu dan janin baik.
 - b. Mencegah terjadinya masalah potensial.
4. Kriteria
 - a. Kala I untuk multipara tidak lebih dari 7 jam dan untuk primipara jam
 - b. Denyut jantung janin (DJJ) normal (120-160 kali per menit)

- c. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
- 1) Tekanan darah normal
 - a) systole 100-120 mmHg
 - b) diastole 60-90 mmHg
 - 2) Suhu normal 36,5 – 37,5 °C
 - 3) Nadi normal 60- 100x/ menit
 - 4) Pernapasan normal 16-24x/ menit
- d. Keadaan ibu dan janin baik
5. Rencana tindakan
- a. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga
Rasional : agar ibu dan keluarga memahami tentang keadaannya dan memberi dukungan yang dapat mengurangi kecemasan dan siap menghadapi persalinan.
 - b. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali suhu setiap 30 menit)
Rasional : observasi tanda-tanda vital untuk memantau keadaan ibu seperti memantau terjadinya demam yang merupakan tanda-tanda terjadinya infeksi pada ibu sehingga dapat mempermudah melakukan tindakan.
 - c. Observasi denyut jantung janin (DJJ) setiap 30 menit untuk mengetahui DJJ apakah dalam batas normal atau abnormal

Rasional : saat ada kontraksi, denyut jantung janin (DJJ) bisa berubah sesaat hingga apabila ada perubahan dapat diketahui dengan cepat dan dapat bertindak secara cepat dan tepat.

- d. Observasi *vaginal toucher* (VT) atau melakukan pemeriksaan dalam tiap 2 jam / 4 jam, atau jika ada indikasi .

Rasional : untuk memantau kemajuan persalinan.

- e. Observasi his setiap 30 menit

Rasional : karena kekuatan kontraksi uterus dapat berubah setiap saat sehingga mempengaruhi turunnya kepala dan dilatasi serviks

- f. Ajarkan teknik relaksasi dan pengaturan napas pada saat kontraksi, ibu menarik napas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut selama timbul kontraksi

Rasional : untuk mengurangi rasa sakit akibat kontraksi

- g. Anjurkan pengosongan kandung kemih sesering mungkin

Rasional :

- 1) Kandung kemih yang penuh dapat mempengaruhi kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar
- 2) Menghalangi penurunan bokong bayi dan memberi perasaan tidak nyaman pada ibu

h. Berikan intake minum dan makan pada ibu

Rasional : agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran

i. Menganjurkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti

Rasional : agar ibu berserah diri dan bertawakkal kepada sang pencipta

j. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

Rasional : merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan memudahkan pengambilan keputusan klinik.

k. Memimpin kala II dan Kala III persalinan secara lega artis, dan pemberian obat Methylergometrine .

Rasional : Methylergometrine berfungsi untuk mengatasi perdarahan setelah melahirkan . cara kerjanya adalah dengan meningkatkan kontraksi rahim.

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 4 September 2018, jam 09:30 wita

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
2. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit), denyut jantung janin (DJJ) dan his tiap 1 jam pada kala I fase aktif dan tiap 30 menit pada kala I fase aktif, kecuali jika ada indikasi, maka dilakukan tiap 30 menit.

Tabel 3.1. Mengobservasi Denyut jantung janin, Nadi, dan His

N0	JAM	TD	N	S	DJJ	HIS
1	10.00	120/80mmHg	80x/i	36,6 °C	138x/i	3x dalam 10 menit (35''-40'')
2	10.30		84x/i		138x/i	4x dalam 10 menit (40''-45'')
3	11.00		84x/i		140x/i	4x dalam 10 menit (40''-45'')
4	11.30		82x/i		140x/i	5x dalam 10 menit (50''-55'')
5	12.00	120/80 mmHg	84x/i		140x/i	5x dalam 10 menit (50''-55'')

Sumber : Data Primer 2018

3. Pemantauan DJJ terakhir di dapatkan DJJ abnormal

Hasil : 140x/ menit

4. Mengobservasi vagina *toucher* (VT) atau pemeriksaan dalam untuk mengontrol kemajuan persalinan tanggal 4 September 2018 , jam 12:00 wita

a. Vulva dan vagina : membuka

b. Portio : melesap

c. Pembukaan : 10 cm (lengkap)

d. Ketuban : jernih (merembes)

e. Presentasi : Bokong Murni

f. Penurunan : Hodge IV

g. Molase : -

h. Penumbungan : tidak ada

i. Kesan panggul : normal

- j. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban
5. menganjurkan teknik relaksasi kepada ibu yaitu menarik napas melalui hidung dan menghembuskan lewat mulut
 6. Menganjurkan pada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin
 7. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian oksigen dalam jumlah 6-8 l/menit,
 8. Memberi makan dan minum jika tidak ada his
 9. Menganjurkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti.
 10. Persiapan perlengkapan, bahan-bahan dan obat-obatan yang diperlukan untuk menolong persalinan serta tempat penerangan dan lingkungan BBL, meliputi:
 - a. Alat Perlindungan Diri (APD) : Penutup kepala, masker, kacamata, celemek, sepatu tertutup (sepatu *boot*)
 - b. Partus Set : *Handscoon* steril, 2 buah klem kocher, ½ kocher, 1 buah gunting episiotomy, 1 buah gunting tali pusat, 1 buah kateter nelaton, Kassa steril, pengisap lender, penjepit tali pusat.
 - c. On steril :2 buah handuk kering dan bersih, pakaian bersih ibu dan bayi meliputi baju, pembalut, sarung, celana dalam, pakaian bayi, popok, topi/tutup kepala, sarung tangan/kaki, kain selimut untuk membedong.

- d. Heacting set : 1 buah pinset sirurgik, 1 buah pinset antomi, nal pudet, 2 buah jarum (1 jarum circle dan 1 jarum V1 circle), gunting benang, benang cromic, 1 pasang sarung tangan stril.
- e. Obat-obatan esensial : Lidocain 1 ampul, oksytosin 10 IU 1 ampul.
- f. Peralatan lain : Larutan Clorin 0,5 ‰, air DTT, kantong plastic, tempat sampah kering dan basah, safety box, bengkok, was lap, dan tempat plasenta.

11. Mendokumentasikan hasil pemantauan Kala 1 dalam partograf

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 4 September 2018, jam : 12.00 wita

1. Keadaan ibu baik dan janin dalam pengawasan yang ditandai dengan:
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
 - 1) Tekanan darah : 120/80 mmHg
 - 2) Suhu : 36,8 °C (axilla)
 - 3) Nadi : 80 kali per menit
 - 4) Pernapasan : 20 kali per menit
 - b. DJJ 150 x/menit, yang terdengar jelas kuat dan teratur
2. Kala 1 fase aktif berlangsung ditandai dengan:
 - a. His yang adekuat 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik
 - b. Pembukaan lengkap (10 cm) \pm 5 jam setelah *vaginal toucher* (VT) pertama dan penurunan kepala hodge IV
 - c. Tidak ada tanda-tanda infeksi

d. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan

KALA II

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data subjektif :

1. Ibu mengatakan sakit yang dirasakan semakin kuat
2. Ibu mengatakan ingin BAB dan adanya tekanan pada anus
3. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk mencedan
4. Ibu mengatakan sakitnya bertambah kuat dan tembus kebelakang

Data objektif :

1. DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan Frekuensi DJJ 140x/i
2. Kontraksi uterus 5 x 10 menit, dengan durasi 50-55 detik
3. Tampak Perineum menonjol.
4. Vulva vagina dan sfingter ani membuka.
5. Meningkatnya pengeluaran lender bercampur dengan darah
6. Tampak rambut bayi pada vulva.

Hasil pemeriksaan dalam tanggal 4 September 2018, jam 12.00 wita

1. Vulva dan vagina : Normal
2. Portio : melesap
3. Pembukaan : 10 cm (lengkap)
4. Air ketuban : Jenih (Merembes)

5. Presentasi : Bokong
6. Penurunan : Hodge IV
7. Molase : -
8. Penumbungan : tidak ada
9. Kesan panggul : normal
10. Pelepasan : lendir, darah, dan air ketuban

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Diagnosa Aktual: Perlangsungan kala II

Data subjektif :

1. Ibu mengatakan sakit yang dirasakan semakin kuat
2. Ibu mengatakan ingin BAB dan adanya tekanan pada anus
3. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk mencedan
4. Ibu mengatakan sakitnya bertambah kuat dan tembus kebelakang

Data Objektif :

1. DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan Frekuensi Djj 140x/i
2. Kontraksi uterus 5 x 10 menit, dengan durasi 50-55 detik.
3. Tampak Perineum menonjol.
4. Vulva vagina dan sfingter ani membuka.
5. Meningkatnya pengeluaran lender bercampur dengan darah.
6. Tampak rambut bayi pada vulva

VT tanggal 4 september 2018 Jam 12.00 Wita

Keadaan vulva dan vagina : Normal
 Portio : Melesap
 Pembukaan : 10 cm
 Ketuban : Jernih
 Persentase : bokong
 Penurunan : Hodge IV
 Molase : -
 Penimbungan : Tidak ada
 Kesan panggul : Normal
 Pelepasan : Lendir, darah dan air ketuban

Analisa dan interpretasi data

- a. Dengan adanya His yang adekuat mengakibatkan segmen atas Rahim (SAR) berkontraksi mendorong janin turun ke segmen bawah Rahim (SBR), segmen bawah tertarik ke atas menjadi dilatasi relaksasi sehingga membuat suatu saluran jalan lahir (Prawihardjo, 2014:292).
- b. Serviks uteri berdilatasi sehingga membentuk suatu saluran yang akan dilewati bayi sampai mencapai dasar panggul (dilatasi sempurna). Hal ini mengakibatkan tekanan hebat pada otot dasar panggul dan bagian terendah janin menekan fleksus syaraf yang mengakibatkan rasa nyeri yang bertambah (Manuaba, 2008).

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang

**D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/
KOLABORASI**

Tidak ada data penunjang.

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Diagnosa aktual

Diagnose potensial

Tujuan : Kala II berlangsung dengan normal

Kriteria :

- a. Kala II berlangsung tidak lebih dari 1-2 jam.
- b. Bayi lahir dalam waktu 30,napas spontan dan segera menangis.
- c. Keadaan umum ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dala batas normal:
 - 1) Tekanan darah : (N:90/70-120/90 mmHg)
 - 2) Nadi : (N: 78-84×/menit)
 - 3) Suhu : (N: 36,5-37,5°C)
 - 4) Pernapasan : (N: 16-20×/menit)
- d. Jumlah darah tidak lebih dari 500 cc.

Kriteria:

1. Kala II berlangsung selama \pm 15 menit tanpa ada penyulit

2. Bayi lahir spontan, segera menangis, bernapas tanpa bantuandan bergerak dengan aktif

Rencana Tindakan

Tanggal 4 September 2018

1. Melihat adanya tanda dan gejalapersalinan kala dua (dorangan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan vagina membuka).

Rasional : untuk mengetahui apakah sudah dapat dilakukan pimpinan meneran

2. Memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan 1 ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partus set.

Rasional : mempersiapkan diri sebelumnya dapat mencegah diri dari infeksi nosokomial

3. Memakai celemek plastik.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

4. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Rasional : mencegah infeksi

5. Menggunakan sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakan kembali kedalam wadah partus set.

Rasional : mempersiapkan peralatan dalam keadaan siap pakai

7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva ke perineum.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

8. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah.

Rasional : untuk mengetahui pembukaan dan kemajuan persalinan

9. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

10. Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan denyut jantung janin (DJJ) dalam batas normal (120 – 160 per menit).

Rasional : untuk mengetahui keadaan janin

11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran.

Rasional : agar ibu tidak khawatir dengan keadaan bayinya dan mempersiapkan diri dalam proses persalinan

12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran (pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman.

Rasional : dapat membantu memperlancar proses persalinan

13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.

Rasional : memperlancar proses berlangsungnya persalinan

14. Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

Rasional : untuk mempercepat penurunan kepala

15. Meletakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 – 6 cm.

Rasional : untuk mengeringkan tubuh bayi

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu atau gunakan underped.

Rasional : sebagai alas untuk menyokong perineum

17. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan

Rasional : mempersiapkan alat dalam keadaan siap pakai

18. Memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada kedua tangan.

Rasional : mencegah terjadinya infeksi silang

19. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 – 6 cm, memasang handuk bersih pada perut ibu untuk mengeringkan bayi jika telah lahir dan kain kering dan bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu

Rasional : kain telah di letakkan.

20. Melakukan pertolongan persalinan sungsang dengan cara teknik bracht :

- a. Mencengkram bokong dengan kedua tangan ibu jari berada sejajar dengan panjang paha, kemudian jari yang lain memegang daerah panggul bayi. Jangan melakukan intervensi apapun ikuti terus proses lahirnya bayi
- b. Setelah perut dan sebagian dada lahir maka longgarkan tali pusat
- c. Saat *angulus scapula inferior* berada dibawah *sympisis* lakukan *hiperlordosis* kearah perut ini . Dengan demikian lahirlah dagu, mulut, hidung, mata, dahi, dan seluruh bagian janin.

Rasional : Bayi lahir spontan, segera menangis pada tanggal 4 september 2018, jam 12.10 WITA dengan JK : laki-laki ,
BB : 2900 gram, PB : 46 cm, Apgar Score : 8/10.

21. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/kain yang kering. Membiarkan bayi di atas perut ibu.

Rasional : mencegah agar bayi tidak mengalami hipotermi

22. Memeriksa fundus uteri

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal

23. Meminta izin pada ibu untuk di suntikkan oksitosin

Rasional : untuk memberitahu tindakan yang akan di lakukan

24. Menyuntikkan oksitosin 10 IU

Rasional : untuk membantu kontraksi uterus

25. Menjepit tali pusat

Rasional : untuk enetukan tali pusat yang akan di potong

26. Memotong tali pusat

Rasional : memotong tali pusat akan memutuskan hubungan bayi dan ibu dan membantu pernapasan dan system sirkulasi dan agar darah dari talipusat tidak mengalir

27. Meletakkan bayi di atas perut ibu untuk IMD dan kontak skin to skin dengan ibunya selama 1 jam

Rasional : untuk menjalin hubungan kasih antara ibu dan bayi

28. Beri topi pada bayi dan selimut dengan kain bersih dan kering

Rasional : untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tidak hipotermi

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 4 September 2018

1. Melihat adanya tanda dan gejala kala II (dorongan untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka).

2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan
3. Memakai celemek
4. Memastikan tangan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
5. Memakai handsoon
6. Menghisap oksitosin 1 ampul 10 IU dengan satu tangan
7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas savlon
8. Melakukan pemeriksaan dalam (VT) jam 12.05 WITA
Hasil: pembukaan sudah lengkap
9. Mencilupkan handscoon secara terbalik ke dalam larutan clorin 0,5 %
10. Mendengarkan DJJ jika tidak berkontraksi
11. Memberitahu kepada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu yang baik untuk meneran
13. Melakukan pimpinan meneran jika ada kontraksi
14. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman
15. Memasang handuk bersih di atas perut ibu jika terlihat kepala janin membuka vulva 5-6 cm
16. Meletakkan underpad di bawah bokong ibu
17. Membuka bak partus
18. Memakai handscoon steril pada kedua tangan

19. Memimpin persalinan dengan melakukan teknik bracht untuk melahirkan bokong murni .
20. Mencengkram bokong dengan kedua tangan ibu jari berada sejajar dengan panjang paha, kemudian jari yang lain memegang daerah panggul bayi. Jangan melakukan intervensi apapun ikuti terus proses lahirnya bayi.
21. Setelah perut dan sebagian dada lahir maka longgarkan tali pusat.
22. Saat angulus scapula inferior berada dibawa simpisis lakukan hiperlordosis kearah perut ibu dengan demikian lahirlah dagu,mulut,hidung,mata,dahi,dan seluruh bagian janin. Hasil : bayi lahir spontan, segera menangis pada tanggal 4 september 2018, jam 12.10 WITA dengan JK : laki-laki, BB : 2900 gram, PB : 46 cm, Apgar Score : 8/10
23. Meletakkan bayi di atas perut ibu lalu lakukan penilaian sepiantas dan melakukan penlaian *Apgar Score* di menit 1 dan menit ke 5.
Hasil : Bayi menangis kuat, tubuh kemerahan eksremitas biru,dan ada fleksi pada eksremitas.

Penilaian apgar score di lakukan oleh Nurul Insani

Tabel 3.2 Penilaian Apgar Score

Yang di nilai	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 2
<i>Appereance</i> (Warna Kulit)	Bayi biru, pucat	Tubuh kemerahan, eksremitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
<i>Pulse</i> (Denyut Jantung)	Tidak ada	<100x/i	>100x/i	2	2
<i>Grimeace</i> (Refleks)	Tidak ada	Merintih	Batuk bersin	2	2
<i>Activity</i> (Tonus otot)	Tidak ada	Fleeksi pada eksremitas	Bergerak aktif	1	2
<i>Respiration</i> (pernafasan)	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Menangis kuat	2	2

Jumlah *Apgar Score*: 8/10

Sumber : Data Primer 2018

24. Mengeringkan seluruh badan bayi dengan kain bersih dan kering
25. Memeriksa fundus uteri
26. Meminta izin pada ibu untuk disuntik oksitosin
27. Menyuntikkan oksitosin 10 IU
28. Menjepit tali pusat
29. Memotong tali pusat

30. Memeriksa robekan jalan lahir
31. Memberi topi pada bayi dan diselimuti kain hangat.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 4 september 2018

1. Kala II berlangsung selama 10 menit
2. Bayi lahir dalam waktu 30 menit, napas spontan dan segera menangis
3. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
4. TFU setinggi pusat
5. Ibu mengatakan nyeri perut
6. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya
7. Perdarahan \pm 300 cc
8. Plasenta belum terlepas.
9. Robekan jalan lahir derajat III.

KALA III

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data Subjektif :

1. Ibu mengatakan nyeri perut
2. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya

Data Objektif :

1. Bayi lahir spontan pada tanggal 4 September 2018, jam 12.10 WITA dengan
JK : laki-laki, BB : 2900 gram, PB : 46 cm

2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. TFU teraba 1 jrbpst
4. Perdarahan ± 300 cc
5. Nampak semburan darah tiba-tiba
6. Tampak tali pusat di depan vulva
7. Plasenta belum terlepas
8. Robekan jalan lahir derajat III.

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : Perlangsunan kala III

Diagnosa potensial : Potensial terjadinya retensio plasenta dan rest plasenta

Data Subjektif : ibu mengatakan nyeri perut

Data Objektif :

1. Bayi lahir spontan, segera menangis pada tanggal 4 September 2018, jam 12.10 WITA dengan JK : laki-laki, BB : 2900 gram, PB : 46 cm, Apgar Score 8/10
2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. TFU setinggi pusat
4. Perdarahan ± 300 cc
5. Tampak tali pusat di depan vulva

Analisa dan interpretasi data

- a. Dalam waktu 5-10 menit seluruh plasenta terlepas, terdorong kedalam vagina dan akan lahir spontan

- b. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda uterus menjadi bundar, uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim, tali pusat bertambah panjang dan terjadi perdarahan/adanya semburan darah tiba-tiba.

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Tidak ada data penunjang

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI

Tidak ada data penunjang

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala III

Diagnosa potensial : Potensial terjadinya retensio plasenta dan rest plasenta

Tujuan : kala III berlangsung normal

Kriteria :

1. Perdarahan kurang lebih 300 cc
2. Plasenta lahir ± 15 menit
3. Plasenta dan selaputnya lahir lengkap

Intervensi

Tanggal 4 September 2018

1. Memindahkan klem tali pusat hingga 5-6 cm dari depan vulva jika tali pusat bertambah panjang serta meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem

Rasional: proses peregangan tali pusat terkendali

2. Meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem

Rasional: proses peregangan tali pusat terkendali

3. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah *dorso cranial*.

Rasional: untuk memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

4. Meregangkan tali pusat ke arah atas dan ke bawah

Rasional: memudahkan plasenta keluar sesuai kurva jalan lahir hingga tampak di vulva

5. Menjemput plasenta dengan kedua tangan, jika plasenta sudah tampak di depan vulva lahirkan plasenta dengan searah jarum jam

Rasional: agar plasenta dan selaputnya lahir lengkap

6. Melahirkan plasenta dengan memutar searah jarum jam

Rasional: agar plasenta dan selaputnya lahir lengkap

7. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap

Rasional: adanya sisa plasenta dan selaput ketuban akan menyebabkan perdarahan

8. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Rasional: untuk mencegah terjadinya perdarahan aktif

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 4 September 2018

1. Memindahkan klem tali pusat hingga 5-6 cm dari depan vulva, jika tali pusat bertambah panjang serta meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem

Hasil : Klem telah dipindahkan

2. Meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem

3. Meregangkan tali pusat ke arah atas dan ke bawah saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial

Hasil : Dorso cranial telah dilakukan

4. Menjemput plasenta dengan kedua tangan jika plasenta sudah tampak di depan vulva.

Hasil : Plasenta telah tampak di vulva

5. Melahirkan plasenta dengan memutar searah jarum jam

Hasil : Plasenta lahir 12.25 WITA

6. Menjemput plasenta dengan kedua tangan jika plasenta sudah tampak di depan vulva

7. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap

Hasil : plasenta, selaput ketuban dan kotiledon lahir lengkap

8. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Hasil : Robekan jalan lahir derajat III.

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 4 September 2018, jam 12.10 WITA

1. Kala III \pm 10 menit
2. Plasenta dan selaputnya lahir lengkap
3. TFU 1 jrbpst
4. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
5. Perdarahan \pm 200 cc
6. Ibu mengatakan lelah setelah proses persalinan
7. Pemeriksaan TTV

TD	: 100/70 mmHg	S	: 36,5°C
N	: 84 x/menit	P	: 22x/menit

KALA IV

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

Data Subjektif : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

Data Objektif :

1. Kala III berlangsung \pm 10 menit
2. Plasenta lahir lengkap jam 12.25 WITA
3. TFU 1 jrbpst
4. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. Perdarahan \pm 200 cc
6. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg

N : 80 x/menit

S : 36,5⁰C

P : 22x/menit

B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : perlangsungan kala IV

Data Subjektif : Ibu mengatakan lelah setelah persalinan

Data Objektif :

1. Kala III berlangsung \pm 10 menit
2. Plasenta lahir lengkap jam 12.25 WITA
3. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg

N : 80 x/menit

S : 36,5⁰C

P : 22x/menit

Analisa dan interpretasi data :

1. Setelah plasenta dan selaput ketuban lahir menandakan bahwa telah masuk kala IV
2. Perdarahan yang terjadi saat kontraksi uterus baik, biasanya karena adanya robekan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan inspeksi pada vulva, vagina dan serviks dengan ciri warna darah yang merah segar.

C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Antisipasi terjadinya Robekan jalan Lahir yang lebih besar.

Data Subjektif : Ibu mengatakan lelah setelah melahirkan

Data Objektif : Plasenta lahir lengkap jam 12.25 WITA dengan perdarahan sebanyak ± 200 cc terjadi karena adanya robekan mengenai perineum sampai dengan otot sfingerani (robekan jalan lahir derajat III).

Analisa dan interpretasi data

Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah lebih dari 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000cc setelah persalinan abdominal. Diagnosis perdarahan postpartum dapat ditegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak, bergumpal dan pada palpasi fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih. Antisipasi terjadinya perdarahan postpartum

Data Subjektif : Ibu mengatakan lelah setelah melahirkan

Data Objektif : Plasenta lahir lengkap jam 12.25 WITA dengan perdarahan ± 200 cc

Analisa dan interpretasi data

Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah lebih dari 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000cc setelah persalinan abdominal. Diagnosis perdarahan postpartum dapat ditegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak, bergumpal dan pada palpasi fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih

D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI

Tidak ada indikasi untuk dilakukan tindakan segera

E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN

Diagnosa : Perlangsungan kala IV

Masalah aktual : Kelelahan

Tujuan : kala IV berlangsung normal

Kriteria :

1. TFU setinggi pusat
2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. Ibu merasa lelah setelah melahirkan
4. Pemeriksaan TTV

TD : 100/70 mmHg

N : 80 x/menit

S : 36,5⁰C

P : 22x/menit

Intervensi tanggal 4 September 2018

1. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik

Rasional : untuk memantau kontrakasi uterus

2. Membiarkan bayi melakukan IMD selama 1 jam

Rasional : untuk melakukan kontak skin to skin dengan ibunya.

3. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K

Rasional : untuk mengetahui apakah bayi lahir normal atau tidak

4. Memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah pemberian vitamin K

Rasional : memberikan hepatitis

5. Melakukan pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pertama kemudian 1 jam kedua 30 menit

Rasional : kontraksi uterus yang baik menandakan kala IV berlangsung normal.

6. Melakukan pemantauan tinggi fundus uteri dan jumlah perdarahan setiap 15 menit pertama kemudian 1 jam kedua 30 menit

Rasional: untuk mengetahui proses involusi uteri dan mengantisipasi jumlah perdarahan

7. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi

Rasional : agar ibu dan keluarga mengetahui bagaimana kontraksi uterus yang baik dan dapat melakukannya sendiri

8. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan mesase uterus dan menilai kontraksi

Rasional: agar ibu dan keluarga mengetahui bagaimana kontraksi uterus yang baik dan dapat melakukannya sendiri

9. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan aby dalam keadaan baik

Rasional: untuk mengetahui keadaan umum bayi

10. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi

Rasional : untuk mengetahui keadaan umum bayi

11. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit serta membuang bahan-bahan yang terkontaminasi

Rasional : untuk mencegah infeksi silang

12. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir dan air ketuban dengan air DTT

Rasional : untuk memberikan rasa nyaman pada ibu dan mencegah infeksi silang

13. Memastikan ibu merasa nyaman serta memberitahu keluarga untuk memberikan makan dan minum kepada ibu

Rasional : makan dan minum akan mengembalikan tenaga ibu yang telah terkuras selama proses persalinan sehingga ibu tidak merasa kelelahan

14. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan clorin 0,5 %

Rasional : untuk mencegah infeksi silang

15. Mencelupkan handscon kedalam larutan clorin 0,5 % secara terbalik

Rasional: untuk mencegah infeksi silang

16. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir

Rasional : agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri

17. Melengkapi partograf

F. LANGKAH VI PELAKSANAAN ASUHAN KEBIDANAN

Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Tanggal 4 September 2018, jam WITA

1. Memeriksa kontraksi uterus dan robekan jalan lahir
2. Membiarkan bayi tetap melakukan IMD selama 1 jam
3. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K

Hasil :

- a) BB : 2900 gram
 - b) PB : 46 cm
 - c) Salep mata dan vit.K telah diberikan
4. Memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah pemberian vitamin K
 5. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase dan menilai Kontraksi
 6. Melakukan pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pertama kemudian 1 jam kedua 30 menit
 7. Melakukan pemantauan tinggi fundus uteri dan jumlah perdarahan setiap 15
 8. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi
 9. Melakukan follow up luka robekan jalan lahir dan melihat apakah ada tanda-tanda infeksi .
 10. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bayi dalam keadaan baik

11. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi

Hasil : bayi bernapas dengan baik, yaitu 48 x/menit, serta suhu 36,3 °C

12. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit dan Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi

13. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir, air ketuban dengan air DTT

14. Memastikan ibu merasa nyaman serta memberitahu keluarga untuk memberikan makan dan minum kepada ibu

15. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan clorin 0,5 %

16. Membersihkan handscoon dengan larutan clorin 0,5 % secara terbalik

17. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir

18. Melengkapi partograf

G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 4 September 2018

1. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

2. Jumlah perdarahan ± 215 cc

3. Kandung kemih kosong

4. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : 120/80 mmHg Suhu : 36,6°C (axilla)

Nadi : 80x/ menit Pernapasan : 20x/ menit

5. Ibu telah makan dan minum

6. Keadaan ibu dan bayi baik.

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL PATOLOGI
PADA NY “E” DENGAN PERSALINAN SUNGSANG
DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2018

KALA I

Identitas ibu/ suami

Nama : Ny “E” / Tn “S”

Umur : 37thn / 37thn

Nikah/ lamanya : 1x / ±14thn

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Petani

Alamat : Kampili.

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan ini kehamilan yang ketiga dan tidak pernah keguguran sebelumnya
2. Ibu mengatakan haid pertama haid terakhir tanggal 2 Desember 2017
3. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil
4. Ibu mengatakan telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali di Puskesmas, 2x pada trimester I, 2x pada trimester II, dan 2x pada trimester III

5. Ibu mengatakan umur kehamilannya sekarang \pm 9 bulan Ibu mengatakan mengkonsumsi tablet Fe selama hamil
6. Ibu mengatakan nafsu makan baik dan tidak ada pantangan
7. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit serius
8. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, asma, diabetes militus, dan penyakit menular lainnya seperti *Tubercuolosis* (TBC), malaria, hepatitis, dan penyakit menular seksual (PMS).
9. Ibu mengatakan tidak pernah dirawat di Puskesmas dan di rumah sakit karena penyakit yang serius.
10. Ibu mengatakan nyeri perut tembus belakang sejak tanggal
11. Ibu mengatakan sakit yang dirasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering
12. Ibu mengatakan adanya pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 4 September 2018 Jam 02:30 WITA
13. Ibu mengatakan tidak ada pengeluaran air di jalan lahir

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Hari tafsiran persalinan tanggal 8 September 2018
4. Usia gestasi 39 minggu 3 hari
5. Tanda-tanda vital:
Tekanan darah : 120/80 mmHg Pernapasan : 20 kali per menit

Nadi : 80 kali per menit Suhu : 36,8 °C (axilla)

6. Tinggi badan : 157 cm

7. Berat badan sebelum hamil : 50 kg

8. Berat badan sekarang : 57 kg

9. Lingkar lengan atas (LILA) : 26 cm

d. Pemeriksaan fisik (*Head To Toe*)

a. Kepala

Inspeksi : kepala bersih, tidak ada ketombe, rambut hitam dan lurus

Palpasi : tidak ada massa, tidak mudah rontok dan tidak ada nyeri tekan

b. Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada *oedema* pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak

Palpasi : tidak teraba adanya *oedema*

c. Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sclera putih (tidak ikterus)

d. Hidung

Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, tidak ada pengeluaran secret.

Palpasi : tidak ada *oedema*, tidak ada nyeri tekan dan tidak nampak adanya polip.

e. Mulut dan gigi

Inspeksi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada karang gigi, tidak ada gigi yang tanggal, tidak ada stomatitis dan gusi tidak berdarah.

f. Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan peradangan

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.

g. Leher

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis

h. Payudara

Inspeksi : payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat areola dipencet, tidak ada nyeri tekan.

i. Abdomen

Inspeksi : tidak tampak bekas operasi, tampak linea nigra,, perut tampak membesar membujur.

Palpasi :

Leopold I : 3 jari di bawah *processus xiphoideus* (tinggi fundus uteri 31 cm), teraba keras, bulat dan melenting (kepala).

Leopold II : punggung kanan (Puka)

Leopold III : Bagian terbawah teraba lunak, kurang melenting (bokong)

Leopold IV : bokong sudah masuk PAP, divergen. 3/5

Lingkar perut : 89 cm

Tafsiran berat janin : 2759 gram

Auskultasi : terdengar bunyi denyut jantung janin pada perut sebelah kanan bagian atas pusat dengan menggunakan Doppler. Frekuensi 138x/i.

His : 3x dalam 10 menit dengan durasi (35"-40")

j. Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varises, nampak pelepasan lendir, darah, ketuban menonjol

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak oedema dan tidak ada nyeri tekan.

k. Anus

Inspeksi : tidak ada hemorroid

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

1. Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : pergerakan aktif, tidak ada varises

Palpasi : tidak ada oedema

m. Pemeriksaan dalam

Vaginal toucher (VT) tanggal 4 september 2018 , jam 09:30 wita

Vulva dan Vagina : Normal

Portio : Tebal

Pembukaan : 6 cm

Ketuban : Utuh

Persentase : Bokong

Penurunan : Hodge II

Molase : -

Penumbungan : Tidak ada

Kesan Panggul : Tidak ada

Pelepasan : Lendir dan darah

ASSESSMENT (A)

GIIPIIAO, gestasi 39 minggu 3 hari, puka, persentase bokong, situs memanjang, bergerak dalam panggul (BDP), Intrauterin, Tunggal, Hidup, Keadaan ibu dan janin baik, Inpartu Kala 1 fase aktif, antisipasi terjadinya infeksi jalan lahir.

PLANNING (P)

1. Menjelaskan pada ibu penyebab nyeri yang dirasakan yaitu adanya penekanan pada ujung-ujung syaraf dan ketegangan uterus saat berkontraksi

Hasil: Telah di jelaskan dan ibu mengerti

2. Mengajarkan ibu tehnik relaksasi dan pengaturan nafas pada saat berkontraksi dengan cara ibu menarik nafas panjang melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut

Hasil: Telah dijelaskan dan ibu mengerti

3. Mengajarkan ibu untuk miring ke kiri agar suplei oksigen ke janin menjadi lancar

Hasil: Ibu bersedia melakukannya yaitu dengan mengambil posisi miring ke kiri

4. Mengajarkan ibu untuk makan dan minum di sela-sela kontraksi agar ibu memiliki tenaga untuk mengedan

Hasil: ibu bersedia melakukan anjuran yang di berikan dan ibu makan dan minum di sela-sela kontraksi

5. Mengobservasi His, Nadi, Djj setiap 30 menit, dan mengobservasi VT setiap 2-4 jam atau jika ada indikasi

Hasil:

Tabel 3.3. Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung dan his.

Jam (Wita)	Djj x (Menit)	Nadi (X menit)	His
09.30	138x/ menit	80x/ menit	3Xdalam 10'' (35''-40'')
10.00	138x/ menit	80x/ menit	3Xdalam 10'' (35''-40'')
10.30	138x/ menit	82x/ menit	4Xdalam 10'' (40''-45'')
11.00	140x/menit	82x/ menit	4Xdalam 10'' (40''-45'')
11.30	140x/menit	82x/ menit	5Xdalam 10'' (50''-55'')
12.00	140x/ menit	82x/ menit	5Xdalam 10'' (50''-55'')

Sumber : Data Primer 2018

Melakukan pemeriksaan dalam (VT) ke II tanggal 4 September 2018 Jam
12.00 WITA

Keadaan vulva dan vagina : Normal

Portio : Melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : Jernih

Persentase : Bokong

Penurunan : Hodge IV

Molase : -

Penimbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

6. Memberi makan ibu kurma dan minum jika tidak ada his

Hasil : ibu telah memakan kurma

7. Menganjurkan kepada keluarga untuk memberikan dukungan serta doa

Hasil : ibu dan keluarga bersedia dan telah melakukannya

8. Menganjurkan masase punggung pada ibu dan keluarga

Hasil : ibu dan keluarga telah mengetahui cara masase punggung

9. Menganjurkan kepada ibu untuk senantiasa berdoa untuk kelancaran persalinannya dan untuk kesehatan ibu dan bayinya nanti

Hasil : ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT.

10. Menganjurkan ibu untuk memperbanyak istigfar

Hasil :ibu bersedia melakukannya dan telah beristigfar

11. Mencatat dalam partograf

Hasil: Partograf telah di isi

KALA II

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan sakit yang dirasakan semakin kuat
2. Ibu mengatakan ingin BAB dan adanya tekanan pada anus
3. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk mencedan

4. Ibu mengatakan sakitnya bertambah kuat dan tembus kebelakang.

DATA OBJEKTIF

1. Perineum Menonjol, vulva dan vagina membuka
2. Kontraksi Uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 50-55 detik
3. Penurunan bokong 0/5
4. Penurunan Hodge IV dan pelepasan lendir, darah dan air ketuban.

Hasil pemeriksaan dalam tanggal 4 September 2018 Jam 12.00 WITA

Keadaan vulva dan vagina : Normal

Portio : Melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : Jernih

Persentase : Bokong

Penurunan : Hodge IV

Molase : -

Penimbungan : tidak ada

Kesan panggul : normal

Pelepasan : lendir, darah, air ketuban

ASSESMENT

Diagnosa Aktual : Perlangsungan kala II

Diagnosa Potensial : Antisipasi terjadinya kala II lama, Perdarahan, infeksi jalan lahir.

PLANNING

Tanggal 4 September 2018 Jam 12.00 WITA

1. Melihat tanda dan gejala kala II (Adanya dorongan kuat untuk meneran, Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rectum dan vagina, Perineum menonjol, Vulva, vagina dan spingter ani membuka)

Hasil: Tampak dan gejala kala II

2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan

- a. Partus set

1. 2 klem kocher
2. ½ kocher
3. 1 ½ handscoon steril
4. Kateter nelaton
5. Penjepit tali pusat
6. Kassa steril
7. Spoit 3 cc
8. Gunting tali pusat

- b. Hecting set

1. Nelpuder
2. Catgut dan jarum
3. Pinset anatomi dan sirurgi
4. Gunting benang.

c. Obat dan bahan

1. Oksitosin
2. Lidokain
3. Salep mata
4. Vitamin K, hepatitis B, betadin.

d. Diluar partus set

1. Air desinfeksi tingkat tinggi dan kapas desinfeksi tingkat tinggi
2. Larutan klorin 0,5%
3. Tempat sampah
4. Delee dan lenek
5. Perlak dan handuk kering
6. Tensimeter dan stetoskop
7. Termometer.

e. Alat Pelindung Diri (APD)

1. Topi dan masker
2. Kacamata dan celemek
3. Handscoon
4. Alas kaki tertutup/ sepatu boot

3. Memakai celemek

Hasil : celemek telah di pakai

4. Melepas semua perhiasan yang dipakai di tangan, lalu mencuci tangan di bawah air mengalir dengan tehnik 7 langkah

Hasil : tangan telah di cuci

5. Menggunakan sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam.

Hasil : sarung tangan telah dipakai

6. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partus set.

Hasil : spoit telah di isi dengan oksitosin dan telah di letakkan kembali di wadah partus set.

7. Membersihkan vulva dan perenium mengusapnya secara hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas DTT

Hasil: Vulva dan perineum telah dibersihkan

8. Lakukan pemeriksaan dala untuk memastikan pembukaan lengkap

Hasil:

Pemeriksaan dalam pada tanggal 4 September 2018 Jam 12.00 WITA

Keadaan vulva dan vagina : Normal

Portio : Melesap

Pembukaan : 10 cm

Ketuban : Jernih

Persentase : Bokong

Penurunan : Hodge IV

- Molase : -
- Penimbangan : tidak ada
- Kesan panggul : normal
- Pelepasan : lendir, darah, air ketuban
9. Mendekontaminasi sarung tangan kotor kedalam larutan clorin 0,5 % dan membukanya secara terbalik, lalu rendam selama 10 menit.
- Hasil : sarung tangan telah dibuka secara terbalik dan didekontaminasi di larutan clorin 0,5 % selama 10 menit.
10. Memeriksa DJJ jika tidak ada kontraksi
- Hasil : DJJ terdengar jelas, kuat, dan teratur pada kuadran kanan perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 140 x/menit.
11. Beritahu ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin serta ibudalam keadaan baik.
- Hasil : ibu dan keluarga telah di beritahu
12. Minta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran (Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu keposisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman).
- Hasil : keluarga bersedia membantu
13. Lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran, diantaranya : bimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran, berikan dukungan dan semangat atas usaha ibu

untuk meneran, anjurkan ibu beristirahat diantara kontraksi dan anjurkan ibu untuk minum di sela-sela kontaksi.

Hasil : telah dilakukan pimpinan meneran, ibu beristirahat dan minum diantara kontraski, serta ibu telah diberi semangat.

14. Jika ibu tidak memiliki keinginan untuk meneran, anjurkan ibu untuk berjalan, jongkok, atau mengambil posisi yang dianggap nyaman.

Hasil : ibu telah memilih posisi yang nyaman yaitu dengan posisi miring kir

15. Jika bokong bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih diatas perut ibu.

Hasil : handuk bersih telah di letakkan diatas perut ibu

16. Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu

Hasil : telah dilakukan

17. Membuka partus set untuk memastikan kelengkapan alat dan bahan.

Hasil : alat dan bahan telah lengkap

18. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan

Hasil : sarung tangan steril telah dipakai

19. Setelah bokong bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lakukan penyokongan dengan melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering.

Hasil : telah dilakukan

20. Melakukan pertolongan persalinan sungsang dengan cara teknik bracht :

- a. Mencengkram bokong dengan kedua tangan ibu jari berada sejajar dengan panjang paha, kemudian jari yang lain memegang daerah panggul bayi. Jangan melakukan intervensi apapun ikuti terus proses lahirnya bayi
- b. Setelah perut dan sebagian dada lahir maka longgarkan tali pusat
- c. Saat angulus scapula inferior, berada dibawah simpisis lakukan hiperlordosis kearah perut ini . Dengan demikian lahirlah dagu, mulut, hidung, mata, dahi, dan seluruh bagian janin.

Hasil : Bayi lahir spontan, segera menangis pada tanggal 4 september 2018, jam 12.10 WITA dengan JK : laki-laki, BB : 2900 gram, PB : 46 cm, Apgar Score : 8/10.

21. Tunggu kepala sampai melakukan putaran paksi luar secara spontan.

Hasil : kepala telah melakukan putaran paksi luar secara spontan

22. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar secara spontan, lakukan pegangan secara biparietal, dengan menempatkan kedua tangan pada sisi muka bayi. Anjurkan ibu menerang pada kontraksi berikutnya, dengan lembut tarik bayi kebawah untuk mengeluarkan bahu depan, kemudian tarik keatas untuk mengeluarkan bahu belakang.

Hasil : pengangan biparietal telah dilakukan, dan kedua bahu telah lahir.

23. Setelah kedua bahu bayi lahir, geser tangan bawah kearah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah, Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas

Hasil: telah dilakukaan bahu dan lengan bayi telah lahir

24. Setelah bokong, bahu, dan kepala bayi lahir lakukan penelusuran di belakang tubuh bayi dan periksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak.

Hasil : telah dilakukan, bayi lahir spontan dan tidak ada lilitan tali pusat.

25. Lakukan penilaian sepintas, dengan menilai apakah bayi menangis kuat, bernafas tanpa kesulitan, bayi bergerak aktif dan bagaimana warna kulitnya.

Hasil:

- a. Bayi lahir segera menangis, bernafas tanpa kesulitan ?
- b. Bergerak aktif dan kulit tubuh kemerahan ?

Penilaian apgar score di lakukan oleh Nurul Insani

Tabel. 3.4 Jumlah *Apgar Score*: 8/10

Yang di nilai	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit	
<i>Appereance</i> (Warna Kulit)	Bayi biru, pucat	Tubuh kemerahan, eksremitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
<i>Pulse</i> (Denyut Jantung)	Tidak ada	<100x/i	>100x/i	2	2
<i>Grimeace</i> (Refleks)	Tidak ada	Merintih	Batuk bersin	2	2
<i>Activity</i> (Tonus otot)	Tidak ada	Fleeksi pada eksremitas	Bergerak aktif	1	2
<i>Respiration</i> (pernafasan)	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Menangis kuat	2	2

Sumber : Data Primer 2018

26. Bersihkan dan keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks caseosa. Ganti handuk yang basah dengan handuk kering dan biarkan bayi di atas perut ibu.

Hasil : bayi telah dibersihkan dan di keringkan

27. Memeriksa kembali uterus ibu untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.

Hasil : telah dilakukan dan tidak ada bayi lain lagi (tunggal)

28. Memberitahu ibu bahwa akan di suntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi baik.

Hasil : ibu telah di beritahu dan ibu bersedia di suntik

29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Hasil : oksitosin telah disuntikkan

30. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Dengan mendorong tali pusat kearah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Hasil : tali pusat telah diklem

31. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Hasil : tali pusat telah digunting

32. Meletakkan bayi di atas perut ibu untuk melakukan IMD dan kontak skin to skin dengan ibunya selama 1 jam

Hasil: telah di lakukan

33. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan bersih lalu pasang topi dikepala bayi.

Hasil : bayi dan ibu telah di selimuti dengan kain hangat dan bayi telah di pasangkan topi

KALA III

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu lelah setelah melahirkan
2. ibu merasakan nyeri perut bagian bawah

DATA OBJEKTIF

1. Bayi lahir spontan segera menangis.
2. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar
3. TFU setinggi pusat
4. Plasenta belum lahir
5. Kandung kemih kosong
6. Tampak tali pusat di depan vulva.

ASSESMENT

Masalah Diagnosa : Perlangsungan kala III

Potensial : Antisipasi terjadinya retinsio plasenta

PLANNING

1. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.

Hasil : klem telah di pindahkan

2. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

Hasil : telah dilakukan

3. Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus kearah belakang-atas (dorso cranial)

Hasil: telah di lakukan

4. Meregangkan tali pusat kea rah atas dan ke bawah

Hasil: telah di lakukan

5. Menjemput plasenta dengan kedua tangan jika plasenta sudah tampak di depan vulva

Hasil: plasenta tampak di depan vulva

6. Melahirkan plasenta dengan memutar searah jarum jam

Hasil: plasenta lahir jam 12.25 WITA

7. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap

Hasil: plasenta lahir lengkap

8. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Hasil: terdapat robekan jalan lahir derajat III. Menjahit robekan perineum derajat 3 harus dilakukan dengan teliti. Mula-mula dinding depan rectum yang robek dijahit, kemudian fascia perirektal ditutup, dan muskulus *sfringer ani aksternus* yang robek dijahit. Selanjutnya dilakukan penutupan robekan seperti pada robekan perineum derajat 2. Untuk mendapat hasil yang baik pada robekan perineum total perlu tindakan penanganan pasca pembedahan yang sempurna. Robekan derajat III yang total diperbaiki lapis demi lapis. Perbaikan pada robekan parial derajat III serupa dengan perbaikan pada robekan total, kecuali dinding *rectum* masih utuh dan perbaikan dimulai dengan mendapatkan kembali kedua *sfringer recti* yang robek.

D. KALA IV

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah, setelah melahirkan
2. Ibu mengatakan nyeri pada luka jahitan
3. Ibu mengatakan belum BAB setelah melahirkan dan sudah BAK

DATA OBJEKTIF

1. Kala III berlangsung ± 10 menit
2. Plasenta lahir lengkap Jam 12.25 WITA
3. TFU setinggi pusat
4. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar

5. Perdarahan ± 300 cc
6. Tanda-tanda vital dalam batas normal

TD : 100/80 mmHg S : 36° C

N : 80 x/menit P : 20 x/menit

ASSESSMENT

Diagnosa Masalah : Perlangsungan kala IV

Potensial : ibu merasa kelelahan

PLANNING

34. Memeriksa kontraksi uterus dan robekan jalan lahir

Hasil: Robekan Jalan lahir derajat III.

35. Membiarkan bayi melakukan IMD selama 1 jam

Hasil: Bayi tela IMD selama 1 jam

36. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K

Hasil:

BB : 2900 gram

PB : 46 cm

LK : 31 cm

LD : 30 cm

LP : 30 cm

Vitamin K telah di berikan 1/3 lateral paha kiri secara IM

37. Memberikan imunisasi hepatitis B 1 jam setelah pemberian vitamin K

Hasil: telah di berikan

38. Melakukan pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pada 1 jam pertama, dan tiap 30 menit pada jam ke 2

Tabel 3.5 Observasi Kontraksi Uterus dan Kandung Kemih

Waktu	Kontraksi uterus	Kandung kemih
09.40	Baik	Kosong
09.55	Baik	Kosong
10.10	Baik	Kosong
10.25	Baik	Kosong
10.55	Baik	Kosong
11.25	Baik	Kosong

Sumber : Data Primer 2018

39. Melakukan pemantauan tinggi fundus uteri dan perdarahan setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua.

Hasil:

Tabel 3.6 Observasi TFU dan Perdarahan

Waktu	Tinggi fundus uteri	Perdarahan
09.40	Setinggi pusat	±50 cc
09.55	Setinggi pusat	±50 cc
10.10	Setinggi pusat	±40 cc
10.25	Setinggi pusat	±40 cc
10.55	Setinggi pusat	±30 cc
11.25	Setinggi pusat	±30 cc

Sumber : Data Primer 2018

40. Mengajarkan ibu dan keluarga cara mesase uterus dan kontraksi

Hasil : ibu dan keluarga mengerti

41. Melakukan pemantauan tekanan darah dan nadi setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua, serta suhu 1 kali pada jam pertama dan 1 kali pada jam kedua.

Table 3.7 Observasi TTV

Waktu	Tekanan darah	Nadi	Suhu
09.40	120/80 mmHg	80x/i	36,5°C
09.55	120/80 mmHg	80x/i	
10.10	120/80 mmHg	80x/i	
10.25	120/80 mmHg	80x/i	
10.55	120/80 mmHg	80x/i	36,5°C
11.25	120/80 mmHg	80x/i	

Sumber : Data Primer 2018

42. Menilai pernafasan dan suhu tubuh bayi

Hasil : bayi bernafas baik yaitu 50x/I dan 36,5°C

43. Tempatkan semua peralatan bekas pakai kedalam larutan klorin 0.5 % untuk didekontaminasi (selama 10 menit). Cuci dan bilas setelah didekontaminasi.

Hasil : telah dilakukan, dan peralatan telah direndam dilarutan klorin untuk didekontaminasi.

44. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi kedalam tempat sampah yang sesuai.

Hasil : telah dilakukan

45. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. dan bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu telah dibersihkan, dan ibu telah memakai pakaian bersih dan kering

46. Pastikan ibu merasa aman dan nyaman. Bantu ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya, dan anjurkan keluarga untuk member ibu minuman dan makanan yang diinginkan.

Hasil : ibu telah merasa nyaman, ibu telah menyusui bayinya, dan ibu telah makan dan minum di bantu oleh keluarga

47. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0.5 %

Hasil : telah dilakukan

48. Celupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0.5 %, dan buka secara terbalik dengan bagian dalam ke luar, lalu rendam dalam larutan klorin 0.5 % selama 10 menit.

Hasil : telah dilakukan

49. Cuci kedua tangan dengan sabun dibawah air mengalir dengan menggunakan teknik cuci tangan 7 langkah.

Hasil : telah dilakukan dan tangan telah di cuci.

50. Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang)

Hasil : partograf telah di lengkapi.

KUNJUNGAN NIFAS KE I

Tempat : Ruangan Nifas

Tanggal : 4 September 2018

Jam : 15.10 WITA

IDENTITAS ISTRI/SUAMI :

Nama : Ny "E" / Tn "S"
 Umur : 37thn / 37thn
 Nikah/ lamanya : 1x / ±14thn
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SD / SMP
 Pekerjaan : IRT / Petani
 Alamat : Kampili.

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengeluh nyeri pada abdomen sejak 3 jam yang lalu
2. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, tanggal 4 September 2018 jam 12:10 WITA dengan jenis kelamin laki-laki
3. Haid pertama haid terakhir tanggal 02-Desember-2017
4. Ini merupakan kehamilan yang kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya
5. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD dibantu oleh bidan
6. Ibu belum BAB dan sudah BAK

7. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, asma, DM, jantung dan penyakit lainnya.
8. Riwayat persalinan dan nifas yang lalu.

Tabel 3.8 Riwayat persalinan dan nifas yang lalu

No	Tahun	Jenis partus	Jenis kelamin	BBL	PBL	Tempat partus	Penolong	Keadaan
1	2009	Persalinan pervaginam	Laki-laki	2,800 gram	46 cm	Puskesmas	Bidan	Baik
2	2014	Persalinan pervaginam	Perempuan	3000 gram	48 cm	Puskesmas	Bidan	Baik

Sumber : Data Primer 2018

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg Suhu : 36°C

Nadi : 80x/i Pernapasan : 24x/i

4. Pemeriksaan fisik

- a. Wajah : tidak pucat, tidak ada oedema dan tidak ada nyeri tekan
- b. Mata : simetris, sclera putih dan kongjungtiva merah muda
- c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjer tyroid dan limfe

- d. Payudara : simetris, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan dan pengeluaran Asi lancar
- e. Abdomen : tidak ada bekas operasi, Tinggi fundus uteri pertengahan simpisis dan pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, kandung kemih kosong
- f. Genetalia : terdapat jahitan pada perineum, terdapat pengeluaran lochia sanguelenta, masih memakai pembalut, tidak terdapat tanda-tanda infeksi
- g. Ekstrimitas : simetris, tdak ada oedema, tdak ada varices, tidak ada nyeri tekan.

ASSESSMENT (A)

Ny "E" PIIA0 postpartum hari pertama dengan nyeri pada abdomen

PLANNING (P)

1. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri abdomen yaitu pada saat hamil, Rahim membesar sesuai ukuran janin yang di kandung, saat bayi lahir perlahan-lahan Rahim akan menyusut dan mengecil..proses kembalinya terbentuk semua dari Rahim ini maka di sertai dengan rasa kram pada perut disebut dengan kontraksi, uterus yang segera mengecil dan pembuluh darah yang membuka saat lepasnya plasenta dapat segera menutup kembali sehingga tidak terjadi perdarahan yang banyak. Nyeri perut ini semakin terasa pada saat menyusui. Ibu cemas karena dengan adanya rangsangan hisapan bayi maka keluar hormone oksigen yang

membantu kontraksi uterus, gunakan gurita yang nyaman lakukan relaksasi nafa bila nyeri atau kram muncul

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh bidan

2. Mengajarkan ibu dan keluarga cara mesase uterus yaitu dengan cara meletakkan satu tangan di atas perut ibu lalu tekan dan putar secara terus menerus searah jarum jam sampai teraba perut ibu keras dan bundar.

Hasil: ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

3. Mengajarkan ibu mobilisasi dini agar memperlancar pengeluaran lochia, mengurangi infeksi, mempercepat infolusi uteri, memperlancar alat perkemihan serta meningkatkan kelancaran peredaran darah

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Mengajarkan ibu menyusui bayinya sesering mungkin agar produksi ASI lancar dan bayi mendapatkan asupan nutrisi maka bayi harus di susui minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Memberikan penjelasan tentang manfaat ASI,yaitu:
 - a. ASI kaya akan zat penting yang dibutuhkan bayi seperti DHA, A dengan B, lactobacillus, protein, vitamin, colostrum, lemak dan zat besi.
 - b. ASI memberikan kekebalan tubuh optimal untuk system imun
 - c. ASI sebagai untuk meningkatkan hubungan emosional ibu dan bayi
 - d. ASI tidak basi dan selalu segar serta higienis

6. Memberitahu ibu bahwa keadaan ibu dalam keadaan baik-baik saja

Hasil : ibu mengerti

7. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesring mungkin hingga minimal usia 6 bulan tanpa makanan tambahan apapun

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Memberikan HE tentang:

a. Nutrisi

Gizi yang dibutuhkan ibu yaitu makanan sehat dan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, kalsium seperti yang terkandung dalam nasi, daging, ikan, telur, tempe, tahu, buah-buahan, kacang-kacangan dan banyak mengkonsumsi air putih untuk memperbanyak produksi ASI

b. *Personal hygiene*

Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi minimal 2kali sehari, mengganti celana dalam tiap kali lembab atau basah dan rajin mengganti pembalut.

c. Istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat cukup yaitu tidur siang 2 jam, dan malam 6-8 jam

Hasil : ibu mengerti

9. Menganjurkan dan mengajarkan ibu untuk mempertahankan suhu tubuh bayi agar tidak mudah kehilangan suhu tubuh bayi seperti selalu membedong bayi sementara pakaikan pakaian yang bersih kering dan hangat

Hasil: ibu mengerti dan bayi di selimuti



KUNJUNGAN NIFAS KEDUA

Tempat : Rumah Ny E
 Tanggal : 18 September 2018
 Jam : 14.30 wita

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan melahirkan 2 minggu yang lalu pada tanggal 4 September 2018, jam : 12.10 wita di RSUD Syekh Yusuf
2. Ibu mengatakan Asi lancar
3. Ibu BAB 1 kali sehari dan BAK 5-6 kali sehari
4. Ibu mengatakan tidak ada nyeri perut dan sekarang darah nifas ibu berwarna kuning keputihan.

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/90 mmHg suhu : 37°C

Nadi : 82x/I pernapasan : 24x/i

4. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah : tidak pucat, tidak ada oedema dan tidak ada nyeri tekan
 - b. Mata : simetris, sklera putih, kongjungtiva merah muda
 - c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, limfe dan tyroid

- d. Payudara : simetris, puting susu menonjol, hyperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan dan asi sudah lancar
- e. Abdomen : tidak ada bekas operasi, tinggi fundus uteri tidak teraba, kandung kemih kosong
- f. Genetalia : terdapat bekas jahitan perineum, tampak pengeluaran lochia serosa, tidak ada edema dan tidak ada nyeri tekan
- g. Anus : tidak ada hemoroid
- h. Ekstrimitas : simetris, tidak ada oedema, tidak ada varices dan tidak ada nyeri tekan

ASSESMENT

PIIA0 Ny E hari ke 14

PLANNING

Tanggal 18 September 2018, jam : 14.30 wita

1. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu baik-baik saja

Hasil : ibu dan keluarga mengerti

2. Menganjurkan ibu untuk memberikan asi kepada bayinya sesering mungkin

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Menjelaskan HE tentang

- a. Nutrisi

Gizi yang dibutuhkan ibu yaitu makanan sehat dan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, kalsium seperti

yang terkandung dalam nasi, daging, ikan, telur, tempe, tahu, buah-buahan, kacang-kacangan dan banyak mengkonsumsi air putih untuk memperbanyak produksi ASI

b. Personal hygiene

Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi minimal 2 kali sehari, mengganti celana dalam tiap kali lembab atau basah dan rajin mengganti pembalut

c. Istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat cukup yaitu tidur siang 2 jam, dan malam 6-8 jam

Hasil : ibu mengerti

4. Menanyakan kembali kepada ibu mengenai alat kontrasepsi pilihannya

Hasil : ibu telah menjadi akseptor KB 3 bulan.

KUNJUNGAN BAYI KE I

Tempat: Kamar bersalin

Tanggal: 4 September 2018

Jam : 12.10 WITA

IDENTITAS BAYI

Nama : By Ny "E"

Tempat tanggal lahir : RSUD Syekh Yusuf Gowa

Umur : 0 hari

Anak ke : III

JK : Perempuan

IDENTITAS ISTRI/SUAMI

Nama : Ny "E" / Tn "S"

Umur : 37thn / 37thn

Nikah/ lamanya : 1x / ±14thn

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP

Pekerjaan : IRT / Petani

Alamat : Kampili

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu melahirkan di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tanggal 4 September 2018 jam 12.10 WITA
2. Haid pertama haid terakhir 02 Desember 2017
3. Usia kehamilan pada saat melahirkan ± 9 bulan
4. Ibu pertama kali menyusui bayinya sejak dilahirkan yaitu IMD dibantu oleh bidan
5. Persalinan dengan presentase bokong
6. Ini merupakan anak ketiga

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 39 minggu 3 hari
4. Penilaian sepintas segera lahir yaitu bayi dalam keadaan baik, menangis kuat, kulit berwarna kemerahan dengan ekstremitas biru dan bergerak aktif.

Apgar score

Yang di nilai	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 2
<i>Appereance</i> (Warna Kulit)	Bayi biru, pucat	Tubuh kemerahan, eksremitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
<i>Pulse</i> (Denyut Jantung)	Tidak ada	<100x/i	>100x/i	2	2
<i>Grimeace</i> (Refleks)	Tidak ada	merintih	Batuk bersin	2	2
<i>Activity</i> (Tonus otot)	Tidak ada	Fleeksi pada eksremitas	Bergerak aktif	1	2
<i>Respiration</i> (pernafasan)	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Menangis kuat	2	2
Jumlah <i>Apgar Score</i> : 8/10					

5. Pemeriksaan tanda-tanda vital

HR: 146Xi

P: 48X/i

S: 36,5°C

6. Pemeriksaan antropometri

BBL: 2900 gram

PBL: 46 cm

LK: 31 cm

LD: 30 cm

LP: 30 cm

LILA: 12 cm

7. Pemeriksaan fisik

- Kulit : warna tubuh kemerahan, tidak icterus
- Kepala : distribusi rambut di puncak kepala. Tidak ada massa
- Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis di tengah wajah dan simetris
- Mata : simetris, sklera tidak kterus, kongjungtiva merah muda muda, pupil bereaksi bila ada cahaya dan refleks mengedip ada
- Telinga : simetris, tidak ada serumen
- Hidung : simetris, tidak ada polip
- Mulut : bibir lembab, tidak pucat, gusi merah muda, refleks menghisap dan roothing ada
- Dada : simetris, frekuensi napas 41x/i frekuensi jantung 146x/i
- Payudara : simetris, terdapat 2 putting
- Abdomen : bundar, simetris, tali pusat sudah puput, abdomen lunak, tidak ada massa, bising usus ada
- Genetalia : scrotum membungkus testis, terdapat lubang penis, dan testis sudah turun.
- Anus : terdapat lubang anus
- Ekstrimitas : simetris, jari tangan dan kaki lengkap

ASSESSMENT (A)

By Ny "E" dengan BCB, SMK, PBK

PLANNING (P)

Tanggal 4 September 2018 Jam 12.10 WITA

1. Memberitahukan pada ibu hasil pemeriksaan bahwa bayinya dalam keadaan normal
Hasil: ibu mengerti
2. Melakukan pemotongan tali pusat
Hasil: Telah dilakukan
3. Membersihkan bayi mulai dari kepala kecuali telapak tangan bayi
Hasil: telah dilakukan
4. Meletakkan bayi diatas perut ibu dengan posisi tengkurap dan posisi kepala diantara kedua payudara ibu dan biarkan bayi melakukan IMD selama 1 jam yang berguna untuk bounding attachment/merekatkan tali kasih ibu dan bayi
Hasil: telah dilakukan
5. Selimuti bayi dan ibu saat melakukan IMD dengan kain bersih dan hangat
Hasil: telah di lakukan
6. Melakukan penyuntikan vitamin K
Hasil: telah dilakukan
7. Memberikan imunisasi HB0 pada 1/3 antero lateral paha kanan bayi secara IM 90° setelah 1 jam penyuntikan vitamin K
Hasil: telah dilakukan

8. Menjelaskan kepada ibu tanda-tanda bahaya pada BBL

- a. Pernafasan sulit
- b. Suhu tubuh $<36,5^{\circ}\text{C}$ atau lebih $<37,5^{\circ}\text{C}$
- c. Warna kulit kuning, biru dan pucat
- d. Bayi rewel, bayi gumoh dan muntah
- e. Tali pusat merah
- f. Bayi kejang
- g. Tidak BAB selama 3hari
- h. Tidak BAK selama 24 jam

Hasil: ibu mengerti

9. Menganjurkan ibu untuk menyusui sesering mungkin dan tidak ada makanan tambahan selain ASI sebelum usia 6 bulan

Hasil: ibu bersedia melakukannya.

KUNJUNGAN BAYI KE II

Tempat : Rumah Ny E
Tanggal : 10 September 2018
Jam : 12.30 wita

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu melahirkan pada tanggal 4 September 2018, jam 12.10 di RSUD Syekh Yusuf Gowa
2. Asi lancer
3. Bayi BAB 2-3 kali sehari, BAB 5-6 kali sehari
4. Ibu selalu membedong bayinya
5. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
6. Ibu mengatakan merasa sangat senang atas kelahiran bayinya
7. Bayi disusui 1-3 jam

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum bayi baik
2. Bayi berumur 6 hari
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - HR : 132x/i
 - Suhu : 36,6°C
 - Pernapasan : 22x/i
4. Pemeriksaan antropometri
 - Berat badan lahir : 2900 gram

Berat badan sekarang : 2900 gram

Panjang badan lahir : 46 cm

Panjang badan sekarang : 50 cm

Lila lahir : 12 cm

Lila sekarang : 12,5cm

5. Pemeriksaan fisik

- a. Kulit : warna tubuh kemerahan, tidak icterus
- b. Kepala : distribusi rambut di puncak kepala. Tidak ada massa
- c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis di tengah wajah dan simetris
- d. Mata : simetris, sklera tidak kterus, kongjungtiva merah muda muda, pupil bereaksi bila ada cahaya dan refleks mengedip ada
- e. Telinga : simetris, tidak ada serumen
- f. Hidung : simetris, tidak ada polip
- g. Mulut : bibir lembab, tidak pucat, gusi merah muda, refleks menghisap dan roothing ada
- h. Dada : simetris, frekuensi napas 41x/i frekuensi jantung 146x/i
- i. Payudara : simetris, terdapat 2 putting
- j. Abdomen : bundar, simetris, tali pusat sudah puput, abdomen lunak, tidak ada massa, bising usus ada
- k. Genetalia : scrotum membungkus testis, terdapat luban penis, dan testis sudah turun

l. Anus : terdapat lubang anus

m. Ekstremitas: simetris, jari tangan dan kaki lengkap

6. Pemeriksaan refleksi

a. Reflex marro (+) : ada respon saat menghisap

b. Reflex rooting (+): ada respon mencari puting

c. Reflex suching (+): ada respon ingin menghisap

d. Reflex grafis/pulmon (+): ada respon ketika ingin menggenggam

e. Reflex plantar (+) : ada respon ketika bagian di bawah di sentuh

7. Eliminasi

BAB (+)

BAK (+)

ASSESSMENT

Bayi Ny E umur 6 hari

PLANNING

Tanggal : 10 September 2018, jam : 12.30 WITA

1. Memberitahu ibu bahwa keadaan ibu dan bayi dalam keadaan baik

Hasil : ibu mengerti

2. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya minimal 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan apapun

Hasil : ibu bersedia

3. Menjelaskan kembali pada ibu mengenai pentingnya personal hygiene dan tetap melakukan perawatan bayi baru lahir

Hasil : ibu mengerti dan bersedia

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara agar Asi lancar

Hasil : ibu mengerti dan bersedia



KUNJUNGAN NIFAS KE III

Tempat : Rumah Ny E

Tanggal : 18 September 2018

Jam : 15.30 wita

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu melahirkan pada tanggal 4 September 2018 , jam 12.10 wita di RSUD Syekh Yusuf Gowa
2. Asi lancer
3. Bayi BAB 2-3 kali sehari, BAB 5-6 kali sehari
4. Ibu selalu membedong bayinya
5. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel
6. Bayi disusui 1-3 jam

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum bayi baik
2. Bayi berumur 14 hari
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - HR : 132x/i
 - Suhu : 36,6°C
 - Pernapasan : 22x/i
4. Pemeriksaan antropometri
 - Berat badan lahir : 2900 gram
 - Berat badan sekarang : 3000 gram

Panjang badan lahir : 47 cm
Panjang badan sekarang : 47,5 cm
Lila lahir : 12 cm
Lila sekarang : 12,5cm

5. Pemeriksaan fisik

- a. Kulit : warna tubuh kemerahan, tidak icterus
- b. Kepala : distribusi rambut di puncak kepala. Tidak ada massa
- c. Wajah : mata segaris dengan telinga, hidung digaris tengah, mulut garis di tengah wajah dan simetris
- d. Mata : simetris, sklera tidak kterus, kongjungtiva merah muda muda, pupil bereaksi bila ada cahaya dan refleks mengedip ada
- e. Telinga : simetris, tidak ada serumen
- f. Hidung : simetris, tidak ada polip
- g. Mulut : bibir lembab, tidak pucat, gusi merah muda, refleks menghisap dan roothing ada
- h. Dada : simetris, frekuensi napas 41x/i frekuensi jantung 146x/i
- i. Payudara : simetris, terdapat 2 putting
- j. Abdomen : bundar, simetris, tali pusat sudah puput, abdomen lunak, tidak ada massa, bising usus ada
- n. Genetalia : labia minora menutupi labia miyora
- o. Anus : terdapat lubang anus

p. Ekstrimitas : simetris, jari tangan dan kaki lengkap

ASSESSMENT

Bayi Ny E umur 14 hari

PLANNING

Tanggal :18 september 2018, jam : 15.30 WITA

1. Memberitahu ibu bahwa keadaan ibu dan bayi dalam keadaan baik

Hasil : ibu mengerti

2. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya minimal 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan apapun

Hasil : ibu bersedia

3. Menjelaskan kembali pada ibu mengenai pentingnya personal hygiene dan tetap melakukan perawatan bayi baru lahir

Hasil : ibu mengerti dan bersedia

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara agar Asi lancar

Hasil : ibu mengerti dan bersedia.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan pada Ny'E'' dengan persalinan Sungsang di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Asuhan ini dilakukan selama 2 minggu yang dimulai saat pasien masuk di Rumah Sakit sampai pindah ke ruangan nifas, di mana asuhan yang dilakukan berlanjut pada proses pengeluaran kehamilan yang mencakup kala I-IV persalinan.

Dalam hal ini, pembahasan akan di uraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney, yaitu mengumpulkan data dasar, memutuskan diagnose atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

KALA I

1. Langkah I Pengumpulan Data Dasar

Pada langkah 1 ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien secara lengkap. Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu : Observasi, Wawancara dan pemeriksaan. Secara garis besar diklasifikasikan sebagai data subjektif dan objektif. Maka dari itu dibutuhkan anamnesa terhadap klien seperti melakukantanya jawab kepada ibu untuk memperoleh data meliputi riwayat kesehatan, riwayat reproduksi, riwayat

haid, riwayat obstetrik, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi. Tindakan yang pertama kali dilakukan di RSUD Syekh Yusuf yakni pengumpulan data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk ke Rumah sakit, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Sementara itu, dilakukan pula pengumpulan data secara objektif yang terdiri dari pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (head to toe), dan pemeriksaan dalam.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “E” usia 37 tahun, GIIPIIA0, datang ke rumah sakit pada pukul 09.05 wita dengan keluhan nyeri pada perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, yang di sertai dengan adanya pelepasan lendir bercampur dengan darah sejak tanggal 4 September 2018 pukul 02.30 wita, dan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan bertambah kuat, pasien mengatakan selama hamil pergerakan janinnya kuat dan bergerak pada bagian sebelah kiri perut ibu, pasien mengatakan sering sesak karena tekanan pada fundusnya, pasien mengatakan melakukan kunjungan antenatal care (ANC) sebanyak 6x di Rsud Syekh Yusuf, pasien mengatakan haid pertama haid terakhir tanggal 2 Desember 2017, dan usia

kehamilannya sekarang sudah mencapai ± 9 bulan, pasien mengatakan selama hamil ia tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat.

Pasien tidak pernah mengalami trauma selama kehamilan yang sekarang maupun kehamilan yang lalu, pasien tidak pernah mengalami penyulit dan trauma selama persalinan dan nifas yang lalu, pasien tidak memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, asma jantung, diabetes dan penyakit menular lainnya, pasien tidak memiliki riwayat mengonsumsi obat-obatan selama hamil tanpa resep dari bidan/dokter, pasien mengatakan pernah menjadi akseptor kb implant selama 4 tahun, Pasien tidak pernah mengalami penyakit yang serius dan tidak pernah dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas, Selama hamil, nutrisi pasien terpenuhi dengan baik, istirahat cukup, aktivitas pasien tetap melakukan pekerjaan rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa tanda-tanda persalinan yaitu keluarnya lendir dari kanalis servikalis keluar disertai dengan sedikit darah. Perdarahan yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa kapiler terputus (Dewi Setiawati, 2013: 54). His pembukaan (Kala I) : menyebabkan pembukaan serviks, semakin kuat, teratur dan sakit. Uterus terasa keras atau padat karena kontraksi. Tekanan hidrostatik air ketuban dan tekanan intrauterin naik serta menyebabkan serviks menjadi mendatar (afacement) dan terbuka (dilatasi) (Widia, 2015: 23-24). Dilatasi serviks 4-10 cm merupakan fase aktif, (Nurul, 2017: 5-6).

Data objektif yang di dapatkan bahwa pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,7°C. Ekspresi wajah tampak cemas, tidak tenang dan meringis menahan sakit serta tidak ada edema dan pembengkakan pada wajah, kedua konjungtiva mata tidak anemis dan tidak ikterik, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis, payudara tampak simetris, hiperpigmentasi pada areola mammae. Pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu tinggi fundus uteri (TFU) 3 jari dibawah Prosesus Xipoides, 31 cm, teraba keras, bulat dan melenting (kepala) dan sesuai usia kehamilan 39 minggu 3 hari, punggung kanan, presentasi bokong, situs memanjang, bergerak dalam panggul (BDP) dengan penurunan bagian terbawah janin 3/5, pada auskultasi terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 138 x/menit, janin intrauterine, tunggal dan hidup.

Pada pemeriksaan dalam pertama tanggal 4 September 2017 pukul 09.05 wita yaitu, tidak ditemukan kelainan pada vulva dan vagina, keadaan portio lunak dan tipis, terdapat pembukaan 6 cm, ketuban masih utuh, presentase Bokong dapat teraba *tuber ischiadicum, os sacrum dan anus*, penurunan hodge III, tidak ada molase dan penumbungan, serta kesan panggul normal. Pemeriksaan dalam kedua tanggal 4 September pukul 12.05 wita di dapatkan hasil tidak ditemukan kelainan pada vulva dan vagina, keadaan portio tidak teraba, terdapat pembukaan 10 cm, ketuban sudah pecah dengan warna air ketuban jernih, presentase bokong,

penurunan hodge IV, tidak ada molase dan penumbungan, serta kesan panggul normal.

Hasil pemeriksaan usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 39 minggu 3 hari (Prawirohardjo, 2014 : 279). Pada pemeriksaan abdomen, tampak adanya linea nigra dan striae albayang menandakan kehamilan lebih dari satu, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu dari tanda tanda pasti kehamilan (prawirohardjo, 2014 : 179).

Pada pemeriksaan leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada saat uterus tidak sedang berkontraksi, dengan posisi ibu setengah duduk, lalu mulai melakukan pengukuran dengan menempelkan ujung pita dari tepi atas simfisis pubis dan puncak fundus uteri hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, dan untuk menentukan presentasi janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran, dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri bulat, keras dan melenting maka dapat dikatakan sebagai presentasi bokong karena kepala janin berada pada bagian fundus atau jika pada bagian fundus uteri teraba lunak, kurang melenting, dapat dikatakan presentasi kepala (Ai Nursiah, dkk, 2014 : 75-76).

Pengukuran tinggi fundus uteri merupakan salah satu pendukung diagnosis persalinan preterm. Jika pembesaran uterus lebih kecil dari dugaan usia kehamilan

normal, maka kemungkinan terjadi usia kehamilan lebih muda dari taksiran. Pada kasus Ny"E" didapatkan TFU 3 jari atas pusat. Pada pemeriksaan TBJ ditentukan dengan cara lingkaran perut dikalikan dengan tinggi fundus uteri. Pada persalinan preterm dengan berat janin kurang dari 2500 gram (Nurul Jannah, 2012). Pada kasus Ny"E" TBJ didapatkan 2.759 gram.

Pada kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Pada saat palpasi teraba satu kepala satu punggung, satu bokong, terdengar satu jantung janin pada satu titik serta pergerakan janin pada salah satu sisi perut ibu. Dirasakan pergerakan janin kuat ± 10 kali dalam sehari dan pada saat auskultasi didengarnya denyut jantung janin merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin dalam keadaan baik ditandai dengan DJJ terdengar jelas dan teratur dengan frekuensinya antara 120-160 x/menit serta dapat dilihat dari pembesaran perut ibu menandakan janin hidup dan bertumbuh (Prawirohardjo, 2014).

Pada persalinan kala I yang ditandai dengan adanya his atau kontraksi dimana mempunyai ciri seperti, pinggang terasa sakit yang menjalar kedepan, his yang bersifat teratur, interval semakin pendek dan kekuatannya semakin besar, mempunyai pengaruh terhadap perubahan serviks. Selain his, persalinan juga ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dari kanalis servikalis karena terjadi pembukaan dan pengeluaran darah dikarenakan kapiler pembuluh darah pecah. Persalinan juga dapat disebabkan oleh pengeluaran cairan ketuban yang sebagian besar baru pecah menjelang pembukaan lengkap dan tanda in partu, meliputi

adanya bloody show, peningkatan rasa sakit, perubahan bentuk serviks, pendataran serviks, pembukaan serviks (dilatasi), pengeluaran cairan yang banyak atau selaput ketuban yang pecah dengan sendirinya (Nurul jannah, 2017 : 3).

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kala I .Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

2. Langkah II merumuskan diagnose/masalah aktual.

Dalam menegakkan suatu diagnose kebidanan atau masalah kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan didukung oleh beberapa data baik data subjektif maupun data objektif yang diperoleh dan hasil pengkajian yang telah dilakukan.

Pada tinjauan pustaka dijelaskan bahwa kala I dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap (10cm), presentase bokong didapatkan dari anamnesa dimana gerakan janin lebih kuat pada perut bagian bawah dan perut bagian atas teraba keras (kepala), pada pemeriksaan : Leopold I teraba kepala pada fundus, Leopold II teraba bokong, auskultasi denyut jantung janin didapatkan pada daerah sedikit di atas umbilicus, sedangkan bila engagement denyut jantung janin terdengar dibawah umbilicus dan pada pemeriksaan dalam didapatkan presentasi bokong.

Pada kasus Ny “E” didapatkan anamnesa ibu mengatakan ini merupakan kehamilan ketiga dan tidak pernah keguguran, HPHT 2 Desember 2017, ibu mengeluh nyeri tembus belakang sejak 4 September 2018 jam 02.30 Wita, ibu

merasakan janinnya bergerak kuat perut bagian atas yang menekan tulang iga sehingga ibu merasa agak sesak, ibu tidak bisa tidur karena nyeri yang dirasakan, Leopold III Presentasi bokong dan hasil Vt didapatkan dilatasi serviks 10cm, ketuban jernih, presentasi bokong dan penurunan hodge IV, sehingga penulis merumuskan diagnose/masalah actual GIIPIIA0 usia kehamilan 39 minggu 3 hari, PU-KA, situs memanjang, presentasi bokong, divergen, tunggal, hidup, keadaan janin baik, inpartu kala II Fase aktif dengan masalah nyeri teratasi karena kontraksi. Oleh karena itu tidak terdapat kesenjangan antara teori dan data yang diperoleh.

3. Langkah III Mengidentifikasi Masalah Atau Diagnose Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen asuhan kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi jika memungkinkan dan mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa presentase sungsang setelah bokong lahir dapat terjadi penekanan pada tali pusat sehingga terjadi gangguan sirkulasi darah dan oksigen dari plasenta ke janin kekurangan oksigen dan dapat menyebabkan asfiksia, pada ibu akan mengalami perdarahan yang banyak, infeksi, partus macet, dan robekan jalan lahir yang lebih besar.

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny "E" di lahan praktek dapat diidentifikasi masalah potensial yaitu partus lama tidak terjadi, bayi tidak mengalami asfiksia. Dengan demikian tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada kasus Ny "E" ditemukan adanya kesenjangan.

4. Langkah IV : Melaksanakan Tindakan segera / Kolaborasi

Langkah keempat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan yang terjadi dalam kondisi darurat. Kondisi darurat dapat terjadi pada saat mengelola ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Kondisi darurat merupakan kondisi yang membutuhkan tindakan dengan segera untuk menangani diagnosis maupun masalah darurat yang terjadi apabila tidak segera dilakukan tindakan segera, selain diatas bisa juga berupa observasi/pemeriksaan.

Pada penjelasan diatas menunjukkan bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah/kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosis/masalah potensial pada langkah sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan darurat /segera yang harus dirumuskan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Dalam rumusan ini, termasuk tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri atau bersifat rujukan (Rita Yulifah, 2013 : 134).

Pada Studi kasus Ny "E" tidak ada tindakan segera yang perlu dilakukan karena dalam pemantauan persalinan tidak ada tindakan yang membutuhkan penanganan segera.

5. Langkah V . Merencanakan asuhan yang Komprehensif

Dalam membuat perencanaan penulis melakukan sesuai data yang diperoleh dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan ibu. Penetapan tujuan dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam suatu tindakan.

Pada tinjauan pustaka di jelaskan bahwa tindakan yang dilakukan pada presentasi bokong dapat berlangsung pervaginam dan ditolong oleh tenaga terlatih, mengikuti kemajuan persalinan , menolong persalinan dengan menyiapkan alat resusitasi, sikap menunggu sambil menyokong perineum, melakukan episiotomi dan melahirkan bokong murni secara bracht dengan cara:

- a. Mencengkram bokong dengan kedua tangan ibu, ibu jari berada sejajar dengan panjang paha, kemudian jari yang lain memegang daerah panggul bayi, jangan melakukan intervensi apapun ikuti terus proses lahirnya bayi.
- b. Setelah perut dan sebagian dada lahir maka longgarkan tali pusat.
- c. Saat angulus scapula inferior berada dibawah simpisis lakukan hiperlordosis kearah perut ibu dengan demikian lahirlah dagu,mulut,mata,dahi,dan seluruh bagian janin.

Pada kasus Ny “E” rencana yang dilakukan adalah asuhan saying ibu, menyiapkan alat partus,mengobservasi kemajuan persalinan, menyiapkan resusitasi, sikap menunggu sambil menyokong perineum dan melahirkan bokong secara teknik bracht. Berdasarkan uraian diatas ,pada tahap ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus pada Ny “E” di RSUD Syekh Yusuf Gowa

6. Langkah VI. Melaksanakan Asuhan Kebidanan

Pada Tinjauan pustaka dijelaskan rencana asuhan menyeluruh yang teknik direncanakan dan dilaksanakan secara efisien dan aman. Dengan menyesuaikan kondisi, keadaan dan kebutuhan ibu serta menjelaskan apa yang akan dilakukan

sehingga ibu dan keluarganya dapat membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan.

Semua Pada tinjauan kasus semua rencana asuhan kebidanan telah dilakukan di RSUD Syekh Yusuf tanggal 4 September 2018, secara garis besar penanganan yang dilakukan untuk menangani presentasi sungsang menunjukkan adanya kesamaan dengan tinjauan pustaka.

7. Langkah VII. Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang diberikan kepada klien dengan berpedoman pada tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya

Hasil evaluasi setelah penanganan pada presentasi bokong, adalah persalinan berlangsung normal, dimana kala II tidak lebih dari kriteria yang ditetapkan, ibu dapat melahirkan pervaginam, keadaan ibu baik, bayi lahir tanggal 4 September 2018 Pukul 12.10 Wita, presentasi bokong murni, jenis kelamin perempuan, BBL 2900 gram, PBL 46 cm, apgar score 8/10, menangis kuat, bernapas tanpa bantuan serta bergerak aktif, bernafas tanpa kesulitan, badan bayi kemerahan.

Dari hasil yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan asuhan kebidanan yang diterapkan tidak tercapai semua sehingga pada hasil evaluasi ini terjadi kesenjangan dimana hasil evaluasi dari asuhan yang diberikan tidak semuanya berhasil berdasarkan tujuan yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny “E” dengan Asuha Persalinan sungsang di RSUD Syekh Yusuf Gowa maka bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Asuhan kebidanan pada Ny “E” dengan Persalinan Sungsang dilakukan dengan teknik pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian dan analisa data dasar, pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, mulai dari anamnesis riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan keterangan tambahan yang menyangkut atau yang berhubungan dengan kondisi klien.
2. Diagnosa Ny “E” dengan Asuhan Persalinan Sungsang ditegakkan berdasarkan adanya keluhan yaitu nyeri pada perut bagian bawah yang menjalar kepinggang, yang disertai dengan adanya pelepasan lendir bercampur dengan darah, dan sifat nyeri yang dirasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan kuat, serta pada pemeriksaan dalam di dapatkan pembukaan serviks 6 cm.

3. Pada Ny “E” masalah yang mungkin muncul yaitu pada kala I kemungkinan terjadinya infeksi jalan lahir yang disebabkan karena adanya pembukaan serviks dan pemeriksaan dalam yang terlalu sering, pada kala II yaitu terjadinya kala II lama dimana garis pembukaan mendekati garis waspada, dan kemungkinan terjadinya distosia bahu, pada kala III persalinan kemungkinan masalah yang bisa terjadi yaitu terjadinya retensio plasenta, dan pada kala IV kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu kontraksi uterus yang kurang baik.
4. Pada Ny “E” diperlukan tindakan segera, kolaborasi atau rujukan apabila terjadi masalah dalam persalinan tersebut.
5. Rencana tindakan yang telah disusun pada Ny “E” bertujuan agar ibu mendapatkan penanganan yang bersih dan aman, sesuai dengan kondisinya dan mencegah terjadinya komplikasi serta mencegah terjadinya trauma berat pada ibu dan bayinya.
6. Tindakan yang dilakukan bertujuan agar rencana yang disusun tercapai dengan adanya kerjasama antara bidan dengan petugas lainnya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan pasien.
7. Tindakan evaluasi pada Ny “E” dengan Asuhan Persalinan Sungsang telah diberikan semaksimal mungkin dan sesuai standar pelayanan/rencana asuhan kebidanan serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi.

8. Pendokumentasian dilaksanakan pada tanggal 4 September 2018 di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Pengkajian dilakukan mulai dari pasien datang sampai proses persalinan dari Kala I-IV persalinan.

B. Saran

1. Untuk Klien

- a. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memlihkan keadaannya.
- b. Menganjurkan ibu mengetahui tentang apa-apa saja yang menjadi penghambat persalinan.

2. Untuk Bidan

- a. Bidan harus memperdalam ilmu mengenai hal-hal apa saja yang menjadi wewenangnya dan apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan dan tindakan apa saja yang harus melakukan penanganan segera maupun kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan
- b. Bidan harus lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang baik selama masa kehamilan, persalinan, maupun pada masa nifas agar ibu bisa merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan.

3. Untuk institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya pembelajaran tentang penerapan manajemen asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat proses tersebut sangat

bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan professional.



DAFTAR PUSTAKA

- Ai Yeyeh, Lia Yulianti ,dkk. *Asuhan Kebidanan 2 (Persalinan)*. Jakarta-Timur : Cv. Trans Info Media,2014.
- Banatua A.Putra, Edy Suparman : / *Jurnal e-Clinic (eCl)*. Gambaran Persalinan Letak Sungsang di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Juli – Desember 2016.
- Devi Yulianti,Wuri Praptiani,dkk. *Oxford Handbook Of Midwifery*. Jakarta : Perpustakaan Nasional,2014.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahan*. CV : Penerbit Diponegoro.
- Amru Sofian,Loi Indra. *Obstetri Fisiologi,Obstetri Patologi,Ed.3,jilid 1*. Jakarta : Perpustakaan Nasional,2013.
- Eniyati, Afifin Sholihah,. *Asuhan kebidanan pada persalinan patologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2013.
- Icesmi Sukarni K, Margareth ZH. *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*. Yogyakarta : Nuha Medika,2013.
- Indrayani, Maudy Emma Unaria Djami, dkk. *Asuhan Persalimam dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta : Cv. Trans Info Media,2013
- Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.2017
- Jannah, Nurul. *ASKEB II PersalinanBerbasisKompetensi*, Jakarta : ECG, 2017
- Kennedy, Besty B, Donna Jean Ruth, e. Jean Martin. *Managemen IntrapartuSm* Edisi 4. Jakarta : EGC,2013.
- Kuswanti,Ina dan Fitria Melina, *Askeb II Persalina*. Yogyakarta : Pustaka pelajar,2014.
- Lidia Widia :/ *Jurnal Kebidanan Dan Keperawata, Vol.13 No.1*. Hubungan antara paritas dengan Persalinan Letak Sungsang di RSUD dr H. Andi Abdurrahman Noor Tanah Bumbu 2015 .

- Matricia D.G.Silinaung, Juneke J. Kaeng : / *Jurnal e-Clinic (eCl)*. Karakteristik persalinan letak sungsang di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014.
- Macharey., Ulander., Heinonen., Kostev., Nuutila., Vaisanen., et al. 2015. *Induction of Labor in Breech Presentation of Term*. Diakses pada tanggal 07 Mei 2016.
- Nita Norma D, Mustika Dwi S. *Asuhan Kebidanan Patologi Teori dan Tinjauan Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Padila. *Asuhan Keperawatan Maternitas II*. Yogyakarta : Nuha Media,2015.
- Prawirahardjo,Sarwono. *Ilmu Kebidanan* Cetakan keempat. Jakarta : PT Bina Pustaka,2014.
- Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, 2018.
- Shihab,M.Quraish.*Pesan, kesan, dan keserasian Al-qur'an*(Tafsir Al Misbah). Jakarta: Lentera Hati,2012
- Sari, Eka puspita, kurnia dwi rimandini. *Asuhan Kebidanan pada Persalinan* Cetakan1. Jakarta : Trans Info Medika,2014.
- Teddy Kurniawan,S.Sn, Eka anisa Mardella,dkk. *Persalinan dan Melahirkan*. Jakarta : Perpustakaan Nasional,2013.
- Tresnawati, Frisca. *Asuhan Kebidanan*. Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya,2013.




DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus II : JL. Sultan Alauddin No.36 Samata – Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

PARTOGRAF

No. Register 473XXXX Nama Ibu : NY "E" Umur : 37 thn G. III P. II A. 0
 No. Puskesmas Tanggal : 4 September 2018 Jam : 09:25 wita Alamat : Kampili
 Ketuban pecah Sejak jam mules sejak jam 02:30 wita



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : **NURUL INSANI M.**
Nim : 70400115030
TTL : Sungguminasa, 17 Agustus 1997
Suku : Makassar
Agama : Islam
Alamat : Jln Poros Pallangga, Allattappampang. Kel.Mangalli, Kec.
Pallangga, Kab.Gowa

Nama orang tua

Ayah : Mustafa B.
Ibu : Hj Marwiyah Rasyid.

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2002-2003 TK Idhata Cambaya
2. Tahun 2003-2009 SD Inpres Tetebatu
3. Tahun 2009-2012 SMP Negeri 1 Pallangga
4. Tahun 2012-2015 SMA Negeri 1 Bajeng
5. Tahun 2015-2018 UIN Alauddin Makassar