

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA IBU
HAMIL TRIMESTER II DENGAN FLOUR ALBUS PATOLIGIS
TANGGAL 20 MARET - 9 APRIL 2017
DI RSUD HAJI MAKASSAR**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Seagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar Ahli Madya
Diploma III Kebidanan Di Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar**

Oleh:

**MEGAWATI
NIM: 70400114009**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 14 November 2017

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Megawati
ALAUDDIN
NIM: 70400114009
M A K A S S A R

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Megawati
Nim : 70400114009
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan antenatal care pada ibu hamil dengan
flour albus patologis di RSUD Haji Makassar.

Karya tulis ilmiah (KTI) initelah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil karya tulis ilmiah (KTI) jurusan kebidanan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas islam negeri alauddin Makassar.

Samata-gowa September 2017

Pembimbing 1



DR.Hj. Sitti Saleha.,S.SiT.,SKM.,MKeb

Pembimbing 2



Dr.Hj. Dewi Setiawati.Sp.OG.,M.Kes

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Trimester II Dengan Flour Albus Patologis Di RSUD Haji Makassar Tahun 2017" yang disusun oleh Megawati NIM: 70400114009, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari selasa, 14 November 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 15 November 2017 M

26 Shafar 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb.	(.....)
Pembimbing II	: dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.	(.....)
Penguji I	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.	(.....)
Penguji II	: Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.	(.....)


Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc.
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Trimester II Dengan Flour Albus Patologis Di Rsud Haji Makassar Tahun 2017”. Penulis menyadari karya tulis ini masih jauh kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan tugas akhir ini agar menjadi jauh baik lagi.

Maka itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a tak henti-hentinya
2. Bapak prof. Dr. H. Musafir pababbari, M.Si. Sebagai rector universitas islam negeri alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Army Nurdin M.Sc Sebagai dekan fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr.Hj.Sitti Saleha.,S.SiT.,SKM.,M.Keb selaku ketua jurusan prodi kebidanan pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya demi membimbing, membantu, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusun proposal studi kasus laporan tugas akhir ini.

5. Ibu dr. Hj. Dewi Setiawati Sp,Og,M.Kes selaku pembimbing II yang telah yang telah meluangkan waktunya demi membimbing, membantu, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusun proposal studi kasus laporan tugas akhir ini.
6. Ibu Firdayanti, S.SiT., M.Keb sebagai penguji 1 yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan karya tulis ilmiah ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Musyahid, M.Ag., Sebagai penguji II yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Dosen-dosen dan staf prodi kebidanan UIN-Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan kebidanan, menyelesaikan pendidikan hingga selesainya karya tulis ilmiah ini.
9. Direktur RSUD Haji Makassar beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Mahasisiwi seangkatan tahun 2014 jurusan kebidanan serta teman yang lain di luar sana yang telah memberikan dorongan berupa semangat dan memberikan saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, Amin.

Samata gowa, 14 November 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penulisan.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang flour albus	9
B. Tinjauan Khusus Tentang Flour Albus	20
C. Manajemen Asuhan Kebidanan	25

D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)	35
E. Tinjauan Islam Tentang Flour Albus	39
BAB III STUDI KASUS.....	47
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar	47
B. Langkah II :Meumuskan Diagnosa/masalah actual	52
C. Langkah III: Merumuskan diagnose/masalah potensial.....	55
D. Langkah IV :Tindakan segera atau kolaborasi.....	56
E. Langkah V :Rencana tindakan asuhan kebidanan.....	56
F. Implementasi VI Implementasi.....	60
G. LangkahVII Evaluasi Asuhan kebidanan.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	78
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar kegiatan konsul
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Pengambilan Dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran III : Surat Izin/Rekomendasi penelitian dari walikota Makassar/ kepala badan kesbang dan politik hubungab antar lembaga.
- Lampiran IV. : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RSUD Haji Makassar
- Lampiran V : Riwayat Hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Riwayat Persalinan Lalu..... 49



ABSTRAK

**Jurusan Kebidanan
Uin Alauddin Makassar
Karya Tulis Ilmiah, Oktober 2017**

Megawati, 70400114009

Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny “H” Trimester II Dengan Flour Albus Patologis Di RSUD Haji Makasar Tahun 2017

Keputihan adalah merupakan tanda dan gejala yang ditandai dengan keluarnya cairan dari alat kelamin wanita yang tidak berupa darah di luar kebiasaan, baik berbau ataupun tidak, serta disertai rasa gatal setempat. Penyebab keputihan dapat secara normal (fisiologis) maupun (patologis) yang dipengaruhi oleh hormon tertentu.

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan manajemen asuhan kebidanan ibu hamil pada Ny “H” dengan flour albus patologis di RSUD Haji Makassar sesuai dengan 7 langkah varnay dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “H” usia kehamilan 26 minggu dengan keputihan patologis tidak ditemukan hambatan pada saat penanganan kasus ini. Penanganan yang dilakukan pada Ny”H” yaitu menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene, hindari stress dan kelelahan serta anjurkan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi obat metronidasol untuk mencegah infeksi yg disebabkan oleh jamur dan bakteri.

Kesimpulan dari kasus yaitu 7 langkah varnay dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian berupa pemantauan dan analisa data pada Ny “H” dengan keputihan patologis di RSUD Haji Makassar selama 1 hari, serta kunjungan rumah sebanyak 3 kali maka didapatkan hasil yaitu keadaan umum ibu sudah baik,tekanan darah dalam batas normal, dan keputihan yang dialaminya sudah tidak berwarna kekuningan dan tidak ada tanda-tanda bahwa ibu akan mengalami peningkatan infeksi pada keputihannya. Dan telah dilakukan pengkajian pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “H” dan hasil tidak ditemukan kesenjangan antarateori dan kasus

Daftar Pustaka : 26 (2011-2016)

Kata Kunci : usia kehamilan 26 minggu, keputihan patologis

ABSTRACT

Midwifery Department
UIN Alauddin Makassar
Scientific Paper, October 2017

Megawati, 70400114009

Antenatal Care Midwifery Management on Mrs. "H" of Second Trimester with Pathological Flour Albus at Haji Regional Public Hospital of Makassar in 2017

Vaginal discharge is a sign and symptom marked by the discharge of fluid from the female genital which is not in the form of abnormal blood, either smelling or not, and accompanied by local itching. The cause of vaginal discharge can be normal (physiological) and abnormal (pathological) affected by certain hormones.

This scientific paper is aimed at implementing the maternal obstetric care management on Mrs. "H" with pathological flour albus at Haji Regional Public Hospital of Makassar in accordance with 7 steps of Varney and SOAP.

The result of a case study applied on Mrs. "H" at 26 weeks of gestational age with pathological vaginal discharge is found no obstacles during the treatment of the case. The treatment performed on Mrs. "H" is to encourage the mother to maintain personal hygiene, avoid stress and fatigue, and recommend consuming foods with balanced nutrition, collaborating with doctors for metronidazole drug therapy to prevent infections caused by fungi and bacteria.

The conclusion of the case is 7 steps of Varney and SOAP applied for the process of obstetric problem solving has been carried out in the forms of monitoring and data analysis on Mrs. "H" with pathological vaginal discharge at Haji Regional Public Hospital of Makassar for 1 day, and 3 times home visit; it is then obtained the results namely the general state of the mother is good, the blood pressure within normal limits, and the vaginal discharge experienced by her is not yellowish in color and there is no sign that the mother will experience an increase of infection on its vaginal discharge. In addition, there has been a documented study of all findings and actions that have been performed on Mrs. "H" and the results are not found a discrepancy between the theory and the case.

References : 26 (2011-2016)

Key words : 26 weeks of gestational age, phatological vaginal discharge



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputihan atau flour albus merupakan pengeluaran cairan pervagina yang bukan darah, keputihan yang disebabkan oleh infeksi biasanya disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan disekitar bibir vagina bagian luar. Yang sering menimbulkan keputihan ini antara lain bakteri, virus, jamur ,atau juga parasit. Infeksi ini dapat menjalar dan menimbulkan peradangan pada saluran kencing, sehingga dapat menimbulkan rasa pedih saat si penderita buang air kecil (Joseph, 2011:34).

Keputihan merupakan keadaan yang dapat terjadi dimana flour albus fisiologis dapat menjadi Fluor Albus yang patologis karena terinfeksi kuman penyakit atau jamur. Keputihan karena jamur lebih mudah menyerang ibu hamil dikarenakan pada masa kehamilan Ibu hamil sangat rentang terhadap infeksi, karena daya tahan ibu hamil menurun dan meningkatkan kebutuhan metabolisme, serta dikarenakan vagina menjadi kaya dengan kandungan glukosa yang disebut dengan glikogen, dan glikogen merupakan makanan yang baik tumbuhnya kuman.

vagina yang terinfeksi kuman penyakit seperti jamur, parasit, bakteri, virus maka keseimbangan ekosistem vagina terganggu, yang tadinya bakteri *doderlein* atau *lactobasillus* memakan glikogen yang dihasilkan oleh estrogen pada dinding vagina untuk pertumbuhannya dan menjadikan pH vagina menjadi asam, hal ini tidak dapat

terjadi Bila pH vagina basa. Keadaan pH vagina basa membuat kuman penyakit berkembang dan hidup subur di dalam vagina (Maharani, S, 2015).

Keputihan dalam kehamilan sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dan sering luput dari perhatian ibu maupun petugas kesehatan yang sering melakukan pemeriksaan kehamilan. Meskipun tidak semua keputihan dapat disebabkan oleh infeksi, beberapa keputihan dalam kehamilan yang dapat berbahaya karena dapat menyebabkan persalinan kurang bulan (prematunitas), ketuban pecah sebelum waktunya atau bayi dengan berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) (B,Pribakti,2010:90).

Oleh karena itu jika Keputihan fisiologis hanya dibiarkan akan berisiko menjadi keputihan yang patologis. Sehingga diperlukan perubahan Perilaku sehari-hari untuk menjaga organ intim tetap kering Dan tidak lembab Perempuan yang memiliki riwayat infeksi Yang ditandai dengan keputihan berkepanjangan mempunyai Dampak buruk untuk masa depan kesehatan reproduksinya. Sehingga dianjurkan untuk melakukan tindakan pencegahan dengan menjaga kebersihan genitalia dan melakukan pemeriksaan Khusus sehingga dapat diketahui secara dini penyebab leukorea (Khusaiyah,S, DKK.2015).

Antenatal care (ANC) adalah pengawasan sebelum persalinan terutama ditentukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.

Menurut studi Badan Kesehatan Dunia (WHO) masalah kesehatan reproduksi perempuan yang buruk telah mencapai 33% dari jumlah total beban penyakit yang diderita para perempuan di dunia salah satunya adalah keputihan.

Sekitar 75% wanita didunia pasti akan mengalami keputihan paling tidak sekali seumur hidup dan sebanyak 45% wanita mengalami keputihan dua kali atau lebih, sedangkan pada kaum wanita yang berada di Eropa angka keputihan sebesar 25%, dimana 40-50% akan mengalami kekambuhan (NCBI, 2013).

Menurut survey demografi kasus keputihan 200 kasus, tetapi hanya sekitar 95 kasus yang mengalami gejala keputihan dengan rasa gatal. Masalah keputihan ini sering kali tidak diperhatikan oleh wanita yang menderita penyakit ini, akan tetapi masalah keputihan ini jika tidak segera ditangani akan menyebabkan masalah yang serius (DEPKES RI, 2010)

Di Indonesia sebanyak 75% wanita pernah mengalami keputihan minimal satu kali dalam hidupnya dan 45% di antaranya mengalami keputihan dua kali atau lebih. Perawatan genetalia eksterna yang kurang tepat dapat menjadi pemicu terjadinya keputihan terutama keputihan yang bersifat patologis. Berdasarkan data statistik Indonesia tahun 2012 dari 43,3 juta jiwa remaja berusia 15-24 tahun di Indonesia berperilaku tidak sehat. Remaja putri Indonesia dari 23 juta jiwa berusia 15-24 tahun 83% pernah berhubungan seksual, yang artinya remaja berpeluang mengalami PMS yang merupakan salah satu penyebab keputihan (Sari, M, 2016).

Berdasarkan laporan data rumah sakit Haji tentang jumlah ibu hamil dengan kasus keputihan pada tahun 2014 sebanyak 10 kasus, tahun 2015 sebanyak 10 kasus, sedangkan tahun 2016 sebanyak 12 kasus, dan pada tahun 2017 bulan januari sampai maret sebanyak 5 kasus.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah meliputi manajemen asuhan kebidanan antenatal care pada Ny “ H ” dengan flour albus di RSUD haji Makassar.

C. Tujuan penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini, tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Terlaksananya manajemen asuhan kebidanan antenatal care dengan flour albus di RSUD Haji Makassar dengan menggunakan manajemen 7 langkah varney sesuai dengan kompetensi dan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dapat melaksanakan pengkajian pada pasien dengan flour albus di Rsud Haji Makassar.
- b. Dapat merumuskan diagnosa/masalah actual pada pasien dengan flour albus di Rsud Haji Makassar.
- c. Dapat menganalisis diagnosa/masalah potensial pada pasien dengan flour albus di Rsud Haji Makassar.
- d. Dapat melaksanakan tindakan segera/kolaborasi pada pasien dengan flour albus di Rsud Haji Makassar.
- e. Dapat memberikan/merumuskan rencana tindakan asuhan kebidanan secara langsung pada pasien dengan flour albus di Rsud.Haji Makassar.
- f. Dapat melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada pasien dengan flour albus.

- g. Dapat mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah di berikan kepada pasien dengan flour albus di RSUD Haji Makassar.
- h. Dapat mendokumentasikan semua hasil temuan dan tindakan asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan pada pasien dengan flour albus di RSUD Haji Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan ujian akhir dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada jenjang pendidikan Program Diploma III Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam penerapan proses manajemen asuhan kebidanan antenatal care dengan flour albus serta sebagai acuan bagi rekan-rekan mahasiswa kebidanan dalam penyusunan karya tulis ilmiah berikutnya yang relevan dengan karya tulis ilmiah ini.

4. Manfaat Terhadap Penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis serta tambahan yang sangat berharga dalam penerapan manajemen asuhan kebidanan antenatal care pada pasien dengan flour albus.

E. Metode Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ini, berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan praktek dengan pengalaman penulis memerlukan data yang objektif dan relevan dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisis dalam pemecahan masalah. Untuk itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Yaitu membaca dan mempelajari buku-buku /literature dan data internet yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sebagai dasar teori yang digunakan dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

2. Studi Kasus

Melakukan studi kasus dengan flour albus di RSUD Haji Makassar dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah actual dan potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, menyusun rencana tindakan asuhan kebidanan, melaksanakan tindakan, mengevaluasi tindakan serta mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan. Untuk memperoleh data yang akurat penulis menggunakan teknik antara lain:

a) Anamnesa

Penulisan melakukan Tanya jawab dengan klien suami dan keluarga yang terlihat langsung guna mendapatkan data yang diperlukan untuk memberikan asuhan kebidanan pada klien tersebut.

b) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dan pemeriksaan diagnostic lainnya.

c) Pengkajian Psikososial

Meliputi pengkajian status emosional social, pola interaksi ibu terhadap keluarganya, tetangga, petugas kesehatan, lingkungannya, dan pengetahuan tentang kesehatan, respon terhadap keadaan yang di alami.

d) Studi Dekomentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan bidan, dokter, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Studi ini disusun dengan 5 bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut;

Pada Bab 1 terdapat pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan Penulisan yang terbagi dalam 2 tujuan yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistmatika Penulisan.

Pada Bab II terdapat tinjauan pustaka yang mencakup Tinjauan umum tentang Flour Albus yang terdiri dari Pengertian flour albus, Patogenesis flour albus, Faktor Penyebab Flour Albus, Penatalaksanaan Keputihan, Cara Mencegah Keputihan, Klasifikasi flour albus, Perbedaan Flour Albus Dengan Air ketuban. Selanjutnya Tinjauan Khusus Tentang Flour Albus dalam kehamilan yang terdiri dari Dampak flour albus pada kehamilan, Cara pencegahan flour albus dalam kehamilan, Cara penanganan flour albus pada kehamilan dan Tinjauan Islam Tentang flour albus (Keputihan)

Pada Bab III Studi Kasus membahas tentang 7 Langkah varney yaitu langkah 1 Identifikasi data dasar, Langkah II Identifikasi diagnose/Masalah Aktual, Langkah III Identifikasi diagnose atau Masalah Potensial, Langkah IV Tindakan Segera atau Kolaborasi, Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan, Langkah VI Implementasi, Langkah VII Evaluasi asuhan kebidanan.

Pada Bab IV terdapat pembahasan dan pada bab V terdapat kesimpulan dan saran serta yang terakhir yaitu daftar pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang flour albus

1. Definisi Flour Albus

- a. Flour albus/Keputihan adalah merupakan tanda dan gejala yang ditandai dengan keluarnya cairan dari alat kelamin wanita yang tidak berupa darah di luar kebiasaan, baik berbau ataupun tidak, serta disertai rasa gatal setempat. Penyebab keputihan dapat secara normal (fisiologis) maupun (patologis) yang dipengaruhi oleh hormone tertentu. Cairannya berwarna putih, tidak berbau, dan jika dilakukan pemeriksaan laboratorium tidak menunjukkan ada kelainan. Hal ini dapat tampak pada perempuan yang terangsang pada waktu senggama atau saat masa subur (ovulasi).

Sedangkan Keputihan/Flour albus yang tidak normal (patologis) biasa disebabkan oleh infeksi/peradangan yang terjadi karena mencuci vagina dengan air kotor, pemeriksaan dalam yang tidak benar, pemakaian pembilas vagina yang berlebihan, pemeriksaan yang tidak higienis, dan adanya benda asing dalam vagina. Selain karena infeksi, keputihan dapat juga disebabkan oleh masalah hormonal, celana yang tidak menyerap keringat, dan penyakit menular seksual. Cairannya berwarna putih/hijau/kuning, berbau, sangat gatal dan disertai nyeri perut bagian bawah. Jika seseorang mengalami hal seperti itu, maka orang tersebut harus segera berobat ke dokter. Pengobatan akan disesuaikan dengan penyebabnya (Kusmiran,E,2011:21)

2. Patogenesis flour albus

Leokorea atau flour albus merupakan gejala dimana terjadinya pengeluaran cairan dari alat kelamin wanita yang tidak berupa darah. Dalam perkembangan, alat kelamin wanita mengalami perubahan mulai dari bayi hingga menopause. Flour albus merupakan keadaan yang dapat terjadi fisiologis dan dapat menjadi flour albus yang patologis karena terinfeksi kuman penyakit. Bila vagina terinfeksi kuman penyakit seperti jamur, parasit, bakteri dan virus maka keseimbangan ekosistem vagina akan terganggu, yang tadinya bakteri *doderlein* atau *lactobasillus* memakan glikogen yang dihasilkan oleh estrogen pada dinding vagina untuk pertumbuhannya dan menjadikan pH vagina menjadi asam, hal ini tidak dapat terjadi bila pH vagina basa. Keadaan pH vagina membuat kuman penyakit berkembang dan hidup subur di dalam vagina (Sibagariang, EE. 2010:62).

Lendir vagina umumnya semakin banyak selama kehamilan yang disebabkan oleh peningkatan suplai darah dan perubahan hormonal, yang kemudian menyebabkan peningkatan produksi lendir dari serviks dan perubahan keseimbangan pH pada lapisan vagina. Jika lendir vagina menyebabkan rasa gatal baik didalam atau diluar vagina, berwarna krem, abu-abu, kehijauan atau bernoda darah atau jika mengeluarkan bau tidak lazim, mungkin karena terkena infeksi yang harus dirawat sebelum memasuki proses persalinan. Sebagian besar infeksi vagina dapat disembukan, namun jika tidak dirawat dapat

ditularkan kejanin saat dia melewati jalan kelahiran dan ini dapat menyerang mata, mulut atau saluran pencernaan janin (Onggo,T,2012:193).

3. Faktor penyebab keputihan

a. Infeksi pada vagina

Infeksi dapat disebabkan oleh jamur (*Candida Albicans*), parasit (*Tricomonas vaginalis*), bakteri (*Gonorrhea/Chlamydia*), dan virus (*Human papilloma virus*).

Jenis infeksi yang terjadi pada vagina yakni, bacterial vaginosis, trikomonas, dan kandidiasis. Bacterial vaginosis merupakan gangguan vaginayang sering terjadi ditandai dengan keputihan dan bau tak sedap. Hal ini disebabkan oleh lactobacillus menurun, bakteri pathogen (penyebab infeksi) meningkat, dan pH vagina meningkat.

b. Faktor hygiene yang jelek

Kebersihan daerah vagina yang jelek dapat menyebabkan timbulnya keputihan. Hal ini terjadi karena kelembaban vagina yang meningkat sehingga bakteri pathogen penyebab infeksi mudah menyebar.

c. Pemakaian obat-obatan (antibiotic, kortikostiroid, dan pil KB) Dalam waktu lama.

Karena pemakaian obat-obatan khususnya antibiotic yang terlalu lama dapat menimbulkan system imunitas dalam tubuh. Sedangkan penggunaan KB mempengaruhi keseimbangan hormonal wanita. Biasanya pada wanita yang mengkonsumsi antibiotic timbul keputihan.

d. Stress

Otak mempengaruhi kerja semua organ tubuh, jadi jika reseptor otak mengalami stress maka hormonal didalam tubuh mengalami perubahan keseimbangan dan dapat menyebabkan timbulnya keputihan.

e. Alergi

Penyebab lain keputihan adalah alergi akibat benda-benda yang dimasukkan secara sengaja atau tidak sengaja ke dalam vagina, seperti tampon, obat atau alat kontrasepsi, rambut kemaluan, benang yang berasal dari selimut, celana, dan lainnya. Biasanya karena luka seperti tusukan, benturan, tekanan atau iritasi yang berlangsung lama. Karena keputihan, seorang ibu bahkan bisa kehilangan bayinya akibat keputihan pada kehamilan.

f. Infeksi

- 1) Keputihan akibat infeksi yang terjadi pada masa kehamilan akan meningkatkan risiko persalinan premature dan janinnya juga beresiko mengalami infeksi.
- 2) Namun jika keputihan disertai gatal-gatal dan berbau segera periksa ke dokter anda. Karena dengan kondisi ini kemungkinan terjadi adanya infeksi, jika tidak segera mendapatkan pengobatan dapat menyebabkan perlunakan dalam leher rahim dan akan timbul kontraksi sebelum waktunya.

- 3) Dari beberapa penelitian, Menyatakan bahwa persalina premature banyak disebabkan oleh ketuban pecah sebelum waktunya yang diakibatkan oleh infeksi keputihan yang tidak diobati.
- 4) Misalnya, pada infeksi clamidia dapat terjadi keguguran hingga persalinan sebelum waktunya (persalian premature). Infeksi virus herpes simpleks dapat menyebabkan radang pada otak bayi (ensefalitis). Infeksi jamur candida sp dapat meningkatkan resiko terjadinya ayan (epilepsy). Inveksi Virus HPV dapat menyebabkan terjadinya papiloma laring pada bayi yang menyebabkan gangguan pernafasan dan gangguan pencernaan bayi hingga kematian. Infeksi bakteri neisserea gonorrhoeae dapat menyebabkan infeksi pada mata bayi hingga terjadi kebutaan.(Setiawati,D, 2013: 247-248)

4. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan keputihan sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk menghindari komplikasi sekaligus untuk menyingkirkan adanya penyebab lain seperti kanker leher rahim yang memiliki gejala keputihan berupa sekret encer, bewarna merah muda, coklat, mengandung darah atau hitam serta berbau busuk.

Penatalaksanaan keputihan tergantung dari penyebab infeksi seperti jamur,bakteri atau parasit. Umumnya diberikan obat-obatan untuk mengatasi keluhan dan menghentikan proses infeksi sesuai dengan penyebabnya, obat-obatan yang digunakan dalam mengatasi keputihan biasanya berasal dari golongan flukonasol untuk mengatasi infeksi candida dan golongan metronidasol untuk mengatasi infeksi bakteri dan parasit. Sediaan obat dapat berupa sediaan

oral (tablet, kapsul), topical seperti krem yang dioleskan dan uvulva yang dimasukkan langsung ke dalam liang vagina. Untuk keputihan yang ditularkan melalui hubungan seksual, terapi juga diberikan kepada pasangan seksual dan dianjurkan untuk tidak berhubungan seksual selama masih dalam pengobatan (Sibagariang, 2010:66-67).

Penatalaksanaan yang diberikan:

- a) Jika Secret merah muda, serosa banyak dan tidak berbau, mungkin disebabkan oleh infeksi bakteri nonspesifik dan hipo estrogen. Therapi: diberikan estrogen oral/suppositoria/dianestrol.
- b) Jika secret putih, encer berbintik, banyak, bau apek disertai penyakit sistemik: BAK panas, priritis vulva, pseudotifa disebabkan oleh *candida albicans*.
Therapi: Medika mentosa nistatin 3 x 500.000 iu/hari Oral (7-10 hari) atau 2 x 100.000 iu/ hari pervaginam (14 hari).
- c) Kotrimokxazol.
- d) Gentian Violet 5%
- e) Mikonazole.
- f) Krim Hydrokortison 0,5
- g) Secret kuning kehijauan, berbusa, merah, sangat banyak gatal, barbau busuk, nyeri tekan divulva dan disekitarnya, eritema vagina dengan petekie disebabkan oleh trikomonas vaginalis.

Therapi: Metronidazole 3 x 250 mg (oral) dan pemakaian kondom saat berhubungan.

- h) Sekret kuning kental sangat banyak, panas, gatal, nyeri tekan, sakit saat miksi, didapat abses atau menjalar ke endometrium salpinks. Disebabkan oleh Neisseria Gonorrhoe.

Therapi: Penisilin prokain IM 4,8 juta iu didahului probenazid 1 gr (oral) ½ jam sebelumnya atau Ampicilli 3,5 gr oral atau tetrasiklin/eritromisin 4x 500 mg (10 hari) (Tresnawati,F,2012:64).

5. Cara mencegah keputihan

- a. Pola hidup sehat yaitu diet yang seimbang, olah raga rutin, istirahat cukup, hindari rokok dan alcohol serta hindari stress berkepanjangan.
- b. Setia kepada pasangan, hindari promiskuitas atau gunakan kondom untuk mencegah penularan penyakit menular seksual.
- c. Selalu menjaga kebersihan daerah pribadi dengan menjaganya agar tetap kering dan tidak lembab misalnya dengan menggunakan celana dengan bahan yang menyerap keringat, hindari pemakaian celana yang terlalu ketat. Biasakan untuk mengganti pembalut, *panty liner* pada waktunya untuk mencegah bakteri berkembang biak.
- d. Biasakan membasuh dengan cara yang benar tiap kali buang air yaitu dari arah depan ke belakang.

- e. Penggunaan cairan pembersih vagina sebaiknya tidak berlebihan karena dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi medis dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina.
- f. Hindari penggunaan bedak talcum, tissue, atau sabun dengan pewangi pada daerah vagina karena dapat menyebabkan iritasi.
- g. Hindari pemakaian barang-barang yang memudahkan penularan seperti meminjam perlengkapan mandi dsb. Sedapat mungkin tidak duduk diatas kloset di WC umum atau biasakan mengelap dudukan kloset sebelum menggunakannya (Sibagariang,EE,2010:67)

Bulu yang tumbuh di daerah kemaluan bisa menjadi sarang kuman bila dibiarkan terlalu panjang. Untuk menjaga kebersihan potonglah secara berkala bulu di sekitar kemaluan dengan gunting atau kamu bisa mencukurnya dengan hati-hati (NS,Sallika,2010:78).

6. Klasifikasi keputihan

Keputihan adalah keluarnya cairan selain darah dari liang vagina, keputihan ada dua jenis, yaitu keputihan fisiologis dan keputihan patologis. Keputihan fisiologis pada perempuan terjadi pada saat menjelang menstruasi, pertengahan siklus menstruasi, dan setelah menstruasi. Jumlahnya tidak terlalu banyak, berwarna jernih, putih (kadang meninggalkan warna kekuningan di celana dalam), tidak berbau, dan tidak disertai rasa gatal, nyeri, bengkak pada organ kelamin, panas dan perih pada saat buang kemih (air

kencing), dan nyeri perut bagian bawah. Umumnya keputihan fisiologis disebabkan oleh proses hormonal dalam tubuh.

Keputihan patologis ditandai dengan jumlah cairan yang dikeluarkan banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk. Perempuan yang mengalami keputihan patologis umumnya mempunyai keluhan-keluhan seperti gatal, nyeri, bengkak pada organ kelamin, panas dan pedih ketika buang air kemih (kencing), dan nyeri perut bagian bawah. Keputihan patologis kemungkinan disebabkan oleh infeksi atau peradangan yang mungkin disebabkan oleh penyakit menular seksual, gejala keganasan pada organ reproduksi adanya benda asing dalam uterus atau vagina. Keputihan juga disebabkan oleh bagaimana kita dalam merawat organ reproduksi kita, misalnya mencuci vagina dengan air kotor, pemakaian pembilas vagina yang berlebihan, penggunaan celana dalam dengan bahan yang tidak menyerap keringat, jarang mengganti celana dalam, menggunakan pembalut dalam waktu yang relative lama (Citrawati, MD, 2014:9).

Keluarnya cairan berwarna putih kekuningan atau berwarna putih kelabu dari saluran vagina, cairan ini dapat encer atau kental dan kadang-kadang berbusa. Mungkin gejala ini merupakan proses normal sebelum atau sesudah haid pada wanita tertentu.

Pada penderita tertentu, terdapat rasa gatal yang menyertainya. Biasanya keputihan yang normal tidak disertai dengan rasa gatal keputihan juga

dapat dialami oleh wanita yang terlalu lelah atau daya tahan tubuhnya lemah. Sebagian besar cairan tersebut berasal dari leher rahim, walaupun ada yang berasal dari vagina yang terinfeksi, atau alat kelamin luar.

Pada bayi perempuan yang baru lahir, dalam waktu satu hingga sepuluh hari, dari vaginanya dapat keluar cairan akibat pengaruh hormone yang dihasilkan oleh plasenta atau uri.

Gadis muda terkadang juga mengalami keputihan sesaat sebelum masa pubertas, biasanya gejala ini akan hilang dengan sendirinya (Joseph, HK, 2011:34-35).

Bagaimanapun evaluasi sebaiknya tetap dilakukan untuk menyingkirkan infeksi sebagai penyebab keluarnya cairan dari vagina tersebut. Cairan tersebut akan diambil untuk diperiksa menggunakan mikroskop. Apabila benar ditemukan adanya infeksi, dokter akan memberikan terapi anti kuman yang disesuaikan dengan kuman penyebabnya. Keputihan akibat infeksi yang tidak tuntas diobati dapat menyebabkan terjadinya perluasan dari infeksi dan menimbulkan beberapa penyakit lain seperti infeksi saluran kemih, radang panggul, dan lain-lain. Penyakit-penyakit tersebut dapat berdampak pada kesuburan dikemudian hari (Azhar,M,2013:28-29).

7. Penyebab keputihan

Dengan memperhatikan cairan yang keluar, terkadang dapat diketahui penyebab keputihan.

- a) Infeksi kencing nanah, misalnya menghasilkan cairan kental, bernanah dan berwarna kuning kehijauan
- b) Parasit *Trichomonas Vaginalis* menghasilkan banyak cairan, berupa cairan encer berwarna kuning kelabu
- c) Keputihan yang disertai bau busuk dapat disebabkan oleh kanker.
- d) Kelelahan yang sangat berat (Joseph, HK, 2011:35).

8. Perbedaan air ketuban dengan flour albus(keputihan)

Saat ketuban pecah dan air ketuban keluar dari kantungnya maka dapat diartikan bahwa waktu persalinan semakin dekat. Banyak wanita hamil tidak menyadari keluarnya air ketuban terutama bagi wanita yang baru mengalami kehamilan yaitu kehamilan pertama. Setiap wanita yang pernah mengalami pecahnya kantung ketuban masing-masing merasakan hal yang berbeda. Air ketuban dapat keluar sedikit demi sedikit dan dapat juga mengucur. Adapun pengalaman yang umumnya dirasakan saat kantung ketuban pecah dan air ketuban keluar adalah sebagai berikut:

- a) Air ketuban menetes sedikit demi sedikit dan mengalir kecil ke area paha dan terasa hangat
- b) Celana dalam yang tiba-tiba basah
- c) Ada perasaan seperti letupan dan basah di pakaian dalam ataupun celana
- d) Seperti darah menstruasi yang mengalir di area vagina
- e) Tidak merasakan apa-apa
- f) Mengucur banyak secara tiba-tiba.

Bedanya dengan keputihan jika cairan yang di keluarkan dari vagina berupa cairan yang berwarna putih susu, kuning, atau hijau, seperti lendir, kental/encer, dapat disertai bau atau tidak. Namun jumlahnya sedikit dan biasanya menyisakan bercak pada pakaian dalam itu adalah salah satu gejala dari keputihan.

B. Tinjauan Khusus Tentang Flour Albus dalam kehamilan

1. Dampak flour albus pada kehamilan

Keputihan dalam kehamilan muncul dikarenakan adanya peningkatan hormonal selama kehamilan. Dalam hal ini vagina akan mengeluarkan cairan berwarna putih seperti susu, encer dan tidak berbau. Cairan akan bertambah banyak seiring dengan bertambahnya usia kehamilan anda. Hal ini merupakan hal yang wajar, untuk itu kebersihan dan kelembaban disekitar area vagina harus tetap terjaga, juga pakailah pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan menyerap keringat. Namun jika keputihan disertai dengan gatal-gatal dan berbau segera periksa kedokter anda. Karena dengan kondisi ini kemungkinan terjadi adanya infeksi, jika tidak segera mendapatkan pengobatan dapat menyebabkan perlunakan dalam leher rahim dan akan timbul kontraksi sebelum waktunya.

Seorang wanita lebih rentan mengalami keputihan pada saat hamil karena pada saat hamil terjadi perubahan hormonal yang salah satu dampaknya adalah peningkatan jumlah produksi cairan dan penurunan keasaman vagina serta terjadi pula perubahan pada kondisi pencernaan. Semua ini berpengaruh terhadap peningkatan resiko terjadinya keputihan, khususnya yang disebabkan oleh infeeksi jamur. Selama belum terjadi persalinan dan selaput ketuban masih utuh, dimana

janin masih terlindungi oleh selaput ketuban dan air ketuban yang steril, umumnya tidak ada efek langsung infeksi vagina yang menyebabkan terjadinya keputihan pada janin. (Setiawati,D,2013:246)

Beberapa keputihan dalam kehamilan yang berbahaya karena dapat menyebabkan persalinan kurang bulan (prematunitas) ketuban pecah sebelum waktunya(KPD), atau bayi dengan berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram). (Pribakti,B,2010: 90)

a. Dampak dari keputihan pada ibu hamil bila tidak diatasi adalah:

- (1) merasa tidak nyaman
- (3) kanker rahim
- (4) kehamilan ektopik

b. Dampak keputihan pada janin adalah :

- 1) Kebutaan pada bayi
- 2) Kematian Janin
- 3) Berat badan bayi lahir rendah
- 4) Infeksi asendrem

c. Dampak keputihan pada Persalinan adalah :

- 1) Ketuban pecah dini
- 2) Persalinan kurang bulan (prematunitas)
- 3) Infeksi intrapartum (Maharani,S,2015).

2. Cara mengatasi Flour albus (keputihan) dalam kehamilan

a. Tanpa Obat

- 1) Menjaga agar daerah genitalia senantiasa bersih serta memperhatikan sabun yang digunakan sebaiknya sabun yang tidak berparfum.
- 2) Hindari mandi dengan merendam di tempat umum
- 3) Menggunakan celana dalam dari bahan katun, tidak menggunakan celana dalam yang ketat.
- 4) Menghindari beraktivitas yang terlalu lelah, panas dan keringat yang berlebih
- 5) Liburan untuk mengurangi stres karena stress merupakan suatu factor timbulnya keputihan.

b. Dengan obat

- 1) Konsultasi dengan dokter karena dokter akan memberikan obat-obatan sesuai dengan jenis keputihan yang dialami.
- 2) Keputihan sangat tidak mengenangkann, terlebih bagi wanita hamil.
- 3) Untuk keputihan normal tidak perlu dilakukan terapi khusus. Yang penting, bagaimana membersihkan organ intim secara benar dan teratur. Umumnya, cukup dengan sabun khusus vagina dan air bersih serta menjaga agar pakaian dalam tetap kering dan bersih.
- 4) Sedangkan keputihan yang tidak normal harus segera mendapatkan pengobatan media terapi.
- 5) Keputihan yang terjadi selama kehamilan, misalnya disebabkan oleh infeksi jamur *Candida Sp*, Pengobatan yang paling aman adalah

menggunakan obat local yang berbahan krim atau sejenis kapsul yang dimasukkan kedalam vagina.

- 6) Keputihann yang dialami wanita hamil aibat infeksi bakteri diberikan obat dalam bentuk kapsul atau tablet yang aman untuk dikonsumsi. Pada infeksi niceriagonorrhoeae, ada obat dalam bentuk kapsul yang dpat diminum. Sebaiknya, segera periksakan kandungan jika terjadi keputihan.
- 7) Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat khusus untuk mendapatkan gambaran alat kelamin secara lebih baik, sperti melakukan kolpokopi yang berupa optic untuk memperbesar gambaran leher rahim,liang senggama, dan bibir kemaluan.
- 8) Selain pengobatan medis, biasanya orang akan menggunakan daun sirih untuk mengurangi keputihan. Caaranya, dengan meminum air daun sirih yang telah direbus terlebih dahulu. Cara ini cukup aman bagi ibu hamil dan bayinya. Hanya saja karena belum ada penelitian mengenei dosis takaran yang aman bagi wanita hamil, sehingga hal ini kurang dapat dilakukan.

Dan yang terpenting bila suatu keputihan yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa (antibiotika dan anti jamur) harus dipikirkan keputihan tersebut yang disebabkan oleh suatu penyakit keganasan seperti kanker leher rahim. Ini biasanya ditandai dengan cairan banyak, seperti kanker leher rahim. Ini biasanya ditandai dengan cairan banyak, bau busuk, sering disertai darah tak segar. perlu dilakukan pemeriksaan

khusus untuk mendeteksi apakah merupakan gejala-gejala kanker atau bukan (Setiawati, D, 2013:250).

3. Cara penanganan flour albus pada kehamilan

Meningkatnya kadar hormone estrogen dan aliran darah ke vagina membuat ibu hamil kerap mengalami keputihan. Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut bisa dengan menjaga kebersihan vagina. Mengganti celana dalam lebih sering dari biasanya. Tidak menggunakan celana ketat, atau yang tidak menyerap keringat. (Fatmawati, S, 2010:23)

Mengingat pada wanita hamil terjadi kenaikan jumlah cairan plasma dalam tubuhnya, mengakibatkan sering buang air kecil, untuk itu diharapkan:

- a. Jangan memakai celana dalam dari bahan sintesis atau celana ketat.
- b. Pakailah selalu celana katun.
- c. Jangan memakai *panty liner* setiap hari.
- d. Sesudah mandi keringkan benar-benar daerah vulva dengan baik sebelum berpakaian/memakai celana dalam.
- e. Ceboklah dari depan kebelakang setiap berkemih atau buang air besar karena dapat membantu mengurangi kontaminasi mikroorganisme dari saluran kemih dan anus.
- f. Kurangi mengkonsumsi gula-gula, alcohol, cooklat atau kafein dalam diet sehari-hari.

- g. Jagan terbiasa melakukan irigasi/bilas vagina, memakai tampon, pewangi/spray vagina atau tissue berparfum (Wahdaniah 2011:92).

C. Proses Manajemen Asuhan kebidanan

Menurut Helen varney (1997), manajemen asuhn kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang di gunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan dan urutan logis dan perilaku yang di harapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan ilmiah,penemuan,dan keterampilan dalam tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien.

1. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Helen varney, proses manajemen kebidanan terdiri dari 7 (tujuh) langkah yaitu sebagai berikut:

a) Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pengumpulan data dasar secara komprehensif untuk evaluasi pasien. Data dasar ini termasuk kesehatan, hasil pemeriksaan fisik apabila perlu, tinjauan catatan saat ini atau catatan lama dari rumah sakit. Pada langkah pertama ini semua informasi akurat dan lengkap di kumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Anamnesa, meliputi Tanya jawab untuk memperoleh meliputi riwayat kesehatan ibu, riwayat kehamilan, riwayat obstetric, riwayat KB, riwayat penyakit yang lalu dan sekarang dan data biologis.

Pada anamnesis, dimana akan didapatkan data subjektif dari pasien seperti ibu akan mengeluhkan keluar lendir berwarna putih kekuningan dan berbau amis sejak 1 bulan yang lalu biasanya disertai dengan rasa gatal. Dan juga

Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu dikaji untuk mengetahui jumlah kehamilan, anak yang lahir hidup, persalinan yang aterm, persalinan yang premature, keguguran atau kegagalan kehamilan, persalinan dengan tindakan (dengan forceps, atau dengan SC).

Riwayat keluarga berencana dikaji untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai pilihan beberapa alat kontrasepsi, dapat memberikan penjelasan mengenai alat kontrasepsi tertentu yang sesuai dengan kondisi dan keinginan pasien, Pada kasus Flour Albus pasien belum pernah menggunakan alat kontrasepsi.

Riwayat haid atau menstruasi dikaji untuk mengetahui riwayat menstruasi antara lain adalah menarche, siklus menstruasi, lamanya menstruasi, banyaknya darah, keluhan utama yang dirasakan saat haid.

Riwayat penyakit dikaji untuk mengetahui penyakit ibu baik penyakit yang dulu maupun sekarang, Riwayat penyakit sekarang untuk mengetahui penyakit yang diderita saat ini, apakah pada keadaan klien dengan

Flour Albus menderita sakit flu, batuk atau demam. dikaji riwayat penyakit sistemik dikaji untuk mengetahui adanya penyakit sistemik pada klien diantaranya penyakit jantung, diabetes militus (DM), ginjal, hipertensi, hepatitis, dan riwayat penyakit keluarga dikaji untuk mengetahui adanya penyakit menurun dalam keluarga seperti asma, DM, hipertensi, jantung dan riwayat penyakit menurun seperti TBC dan hepatitis.

Pola kebiasaan sehari-hari dikaji untuk mengetahui kebiasaan sehari-hari dalam menjaga kebersihan dirinya dan pola makan sehari-hari apakah terpenuhi gizinya atau tidak, yaitu dibagi beberapa bagian : pertama dikaji Pola nutrisi Mengetahui seberapa banyak asupan nutrisi pada pasien dengan mengamati adakah penurunan berat badan atau tidak pada pasien, kedua pola eliminasi dikaji untuk mengetahui berapa kali klien BAK dan BAB, ketiga Mengkaji aktivitas sehari-hari pasien karena data ini memberikan gambaran tentang seberapa berat aktivitas yang biasa dilakukan pasien di rumah, ke empat Istirahat dikaji untuk mengetahui pola istirahat dan tidur pasien, berapa lama kebiasaan tidur siang dan tidur malam hari.

Ke lima Seksualitas Dikaji untuk mengetahui berapa kali klien melakukan hubungan seksual dalam seminggu dan ada atau tidaknya keluhan.

Ke enam dilakukan pengkajian Psikososial budaya untuk mengetahui bagaimana perasaan klien menghadapi gangguan reproduksi dengan keputihan sekarang ini pada kasus gangguan reproduksi Flour Albus ini biasanya di dapatkan data psikologisnya adalah pasien merasa cemas dan tidak nyaman

dengan keadaanya. Ke tujuh di kaji Penggunaan obat–obatan atau rokok dikaji untuk mengetahui apakah klien perokok atau pemakai obat–obatan atau tidak.

Pemeriksaan fisik meliputi: keadaan umum klien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara insfeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu, Klien yang mengalami keputihan patologis biasanya ditandai dengan pengeluaran cairan/lendir dalam jumlah yg banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk, kental dan biasanya disertai rasa gatal pada vagina. Pada pemeriksaan penunjang USG kehamilan dalam keadaan normal tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahaya yang dapat ditimbulkan oleh keputihan.

Adapun tanda-tanda dari keputihan patologis yaitu biasanya ditandai dengan pengeluaran cairan/lendir dalam jumlah yg banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk, kental dan biasanya disertai rasa gatal pada vagina, jika dibiarkan keputihan ini bisa berdampak buruk kepada persalinan dan janin.

Dari tanda-tanda diatas penyebab keputihan adalah karna pada kehamilan produksi lendir semakin banyak pada usia kehamilan tua (mendekati persalinan) yang disebabkan oleh peningkatan suplai darah selama kehamilan dan dikarenakan perubahan keseimbangan pH pada lapisan vagina, Faktor hygiene yang jelek, Pemakaian obat-obatan (antibiotic, kortikostiroid, dan pil KB) Dalam waktu lama, Stress, Alergi dan Infeksi

b) Langkah II : Identifikasi diagnose/masalah aktual

Dikembangkan dari data dasar: interpretasi dari data ke masalah atau diagnose khusus yang teridentifikasi. Kedua kata masalah maupun diagnose dipakai, karena beberapa masalah tidak dapat didefinisikan sebagai diagnose tetapi tetap perlu dipertimbangkan untuk membuat wacana yang menyeluruh untuk pasien.

Keputihan dalam kehamilan terbagi atas dua yaitu: keputihan fisiologis yaitu pada perempuan terjadi pada saat menjelang menstruasi, pertengahan siklus menstruasi, dan setelah menstruasi. Jumlahnya tidak terlalu banyak, berwarna jernih, putih (kadang meninggalkan warna kekuningan di celana dalam), tidak berbau, dan tidak disertai rasa gatal, nyeri, bengkak pada organ kelamin, panas dan perih pada saat buang kemih (air kencing), dan nyeri perut bagian bawah. Umumnya keputihan fisiologis disebabkan oleh proses hormonal dalam tubuh. Kedua Keputihan patologis ditandai dengan jumlah cairan yang dikeluarkan banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk. Perempuan yang mengalami keputihan patologis umumnya mempunyai keluhan-keluhan seperti gatal, dan nyeri.

Ibu dikatakan mengalami keputihan apabila termasuk dalam diagnosis yaitu dapat diduga apabila ibu mengeluh keluar lendir dalam jumlah yang banyak, kental, baik berbau ataupun tidak dan kemaluan terasa gatal.

Pada hal ini ibu dikatakan mengalami keputihan patologis apabila terjadi pengeluaran cairan/lendir yang dikeluarkan banyak, berwarna putih kekuningan, hijau, merah kecoklatan, putih seperti susu basi, berbau amis/busuk, biasanya disertai rasa gatal, dan pemeriksaan penunjang USG kehamilan untuk mendeteksi keadaan janin maupun keadaan ketuban.

c) Langkah III : Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnose potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan sambil mengamati klien, Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Karena telah terjadi keputihan pada kehamilan ibu maka perlu dilakukan antisipasi terjadinya keputihan yang patologis karena dapat menyebabkan dampak buruk pada kehamilan yaitu Karena telah terjadi keputihan pada kehamilan ibu maka perlu dilakukan antisipasi terjadinya keputihan yang patologis karena dapat menyebabkan dampak buruk pada kehamilan yaitu ibu akan merasa tidak nyaman karena lendir yang keluar yang disertai rasa gatal yang membuat ibu merasa terganggu, serta dapat menyebabkan kanker rahimsalah satu penyebab ibu hamil mengalami keputihan tidak normal adalah kanker leher rahim Kanker leher rahim terjadi karena pertumbuhan sel abnormal di leher rahim

dan dapat juga menyebabkan kehamilan ektopik. Salah satu penyebab kehamilan ektopik adalah infeksi yang disebabkan keputihan, infeksi yang ditularkan melalui seks bisa menimbulkan penyakit radang panggul, yang kebanyakan disebabkan oleh kuman chlamidia. salah satu yang perlu diwaspadai akibat infeksi ini adalah terjadi kehamilan ektopik. hanya saja, tidak semua keputihan akan menyebabkan kehamilan diluar kandungan,

Dampak keputihan pada janin yaitu bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yaitu Bakteri yang menjadi penyebab penyakit *Gonorrhoe* dapat menyebabkan infeksi mata pada bayi. Bakteri tersebut menyebar melalui plasenta bayi sehingga dapat menyebabkan kebutaan, serta kematian janin keputihan yang disebabkan oleh Infeksi virus HPV dapat memicu terjadinya papiloma laring pada bayi yang menyebabkan gangguan pernapasan dan gangguan pencernaan bayi hingga kematian. Dan dapat menyebabkan BBLR. Keputihan saat hamil juga bisa menyebabkan bayi terlahir dengan berat badan rendah. Bahaya keputihan saat hamil ini umumnya ditandai dengan rasa panas dan gatal yang tak tertahan di area kewanitaan. Penyebabnya adalah Bakteri *Trichomonas vaginalis*, bakteri yang ditularkan lewat hubungan suami-istri.

Dampak keputihan pada persalinan adalah ketuban pecah sebelum waktunya. Bahaya ini umumnya ditandai oleh keputihan yang mengeluarkan cairan kekuningan, aroma amis, dan rasa gatal yang tak tertahan, Jenis keputihan ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri vaginosis bakterialis, bakteri yang cukup berbahaya jika sampai ke rahim, serta persalinan kurang

bulankeputihan yang ditandai dengan munculnya cairan yang lebih kental, berbau amis dan rasa gatal yang memicu iritasi pada vulva. Keputihan pada ibu hamil jenis ini akan mengakibatkan nyeri saat bersenggama. Adapun penyebab keputihan adalah mikroorganisme yaitu candida albicans. Jika dibiarkan tanpa pengobatan akan menyebabkan kelahiran prematur. Dan infeksi intrapartum Infeksi intrapartum adalah infeksi yang terjadi dalam masa persalinan/in partu disebut juga korioamnionitis, karena infeksi ini melibatkan selaput janin

d) Langkah IV : Melaksanakan Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada langkah ini, bidan atau dokter mengidentifikasi perlunya segera melakukan konsultasi atau melakukan kolaborasi bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Pada kondisi ibu dengan keputihan, usia kehamilan 6 bln, dan tidak mengalami gangguan pada kehamilannya serta tanda-tanda vitalnya atau sesuatu hal yang mengharuskan kita melakukan tindakan segera sementara apabila keputihan yang dialaminya dalam jumlah banyak disertai gatal, berbau busuk, dan berbusa maka harus dilakukan tindakan sementara yaitu teraphi.

e) Langkah V : Menyusun Rencana Asuhan Menyeluruh

Membuat suatu rencana asuhan yang komprehensif, ditentukan oleh langkah seelumnya, adalah suatu perkembangan dari masalah atau diagnose yang sedang terjadi atau terantisipasi dan juga termasuk mengumpulkan informasi tambahan atau tertinggal untuk data dasar.

Suatu rencana asuhan yang komprehensif tidak saja mencakup apa yang ditentukan oleh kondisi pasien dan masalah yang terkait, tetapi juga mengaris bawahi bimbingan yang terantisipasi (*anticipatory guide*) untuk seperti apa yang diharapkan terjadi berikutnya.

Adapun penatalaksanaan pada ibu hamil dengan flour albus yaitu Penatalaksanaan keputihan dilakukan tergantung pada penyebabnya:

1. Lakukan konseling
2. Lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, penafasan dan suhu) serta melakukan pemeriksaan fisik terfokus.
3. Dilakukan pencegahan/penanganan secara dini dilakukan tergantung penyebabnya Umumnya obat-obatan untuk mengatasi penyebab dan mengurangi keluhan. Misalnya diberikan obat golongan flukonazol untuk mengatasi infeksi jamur dan golongan metronidazol untuk mengatasi infeksi bakteri dan parasit. Sediaan obat yang diberikan dapat berupa sediaan oral (berupa pil, tablet, kapsul), sediaan topikal seperti krim yang dioleskan, dan vula yang dimasukkan ke dalam liang vagina.
4. Jika keputihan yang di alami ibu semakin memburuk dan berpotensi pada saat menjelang persalinannya yaitu salah satu contohnya KPD maka segera rujuk ibu kerumah sakit.
5. Semua ibu yang mengalami keputihan pada masa kehamilannya dianjurkan untuk menjaga personal hygiene apalagi kehamilan tua ibu

akan selalu buang air kecil pada malam hari yang dapat memuat daerah genetalia lembab atau basah yang dapat memicu timbulnya bakteri penyebab dari timbulnya keputihan.

f) Langkah VI : Implementasi Asuhan kebidanan

Melakukan perencanaan asuhan menyeluruh perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (yaitu: memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen asuhan klien agar penanganan kasus keputihan patologis dapat berhasil diatasi dan memuaskan.

g) Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi langkah terakhir ini sebenarnya adalah merupakan pengecekan apakah rencana asuhan tersebut, yang meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnose . rencana tersebut dapat di anggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya dan dianggap tidak efektif jika memang tidak efektif. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian tidak.

Sekali lagi, dengan mengingat bahwa proses manajemen asuhan ini merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen untuk mengidentifikasi mengapa proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut

Beberapahal yang dievaluasi: apakah ibu sudah merasa keputihannya berkurang, yang dapat menyebabkan komplikasi pada persalinannya yang dapat menyebabkan KPD dan membahayakan bayinya.

D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Dokumentasi asuhan dalam pelayanan kebidanan adalah bagian dari kegiatan yang harus dikerjakan oleh perawat dan bidan setelah member asuhan kepada pasien. Dokumentasi merupakan suatu informasi lengkap meliputi status kesehatan pasien, kegiatan asuhan kebidanan serta respon pasien terhadap asuhan yang diterimanya. Dengan demikian dokumentasi kebidanan mempunyai porsi yang besar dari catatan klinis pasien yang menginformasikan faktor tertentu atau situasi yang terjadi selama asuhan dilaksanakan. Disamping itu catatan juga sebagai wahana komunikasi dan koordinasi antar profesi (interdesipliner) yang dapat dipergunakan untuk mengungkap suatu fakta actual untuk dipertanggung jawabkan.

Dokumentasi asuhan kebidanan merupakan bagian integral dari asuhan kebidanan yang dilaksanakan sesuai standar. Dengan demikian pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan standar dengan baik

merupakan suatu hal yang mutlak bagi setiap tenaga kebidanan agar mampu membuat dokumentasi kebidanan secara baik dan benar.

Manajemen kebidanan merupakan metode atau bentuk pendekatan yang digunakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan sehingga langkah-langkah dalam manajemen merupakan alur pikir bidan dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan klinis.

a) S (Subjektif)

Subjektif menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa sebagai langkah 1 varnay, subjektif (S) ini merupakan informasi yang diperoleh langsung dari klien. Informasi tersebut dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnose.

1. Catatan ini berhubungan masalah dengan sudut pandang pasien.
2. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sehingga kutipanlangsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnose (data primer).
3. Pada bayi atau anak kecil data subjektif ini dapat diperoleh dari orang tuanya (data sekunder).
4. Data subjektif menguatkan diagnose yang akan dibuat.
5. Tanda gejala subjektif yang diperoleh dari hasil bertanya dari pasien suami atau keluarga (identitas umum, keluhan, riwayatmenerche, riwayatperkawinan, riwayat kehamilan, riwayat

persalinan, riwayat KB, riwayat penyakit, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit keturunan, riwayat psikososial dan pola hidup).

6. Pada orang yang bisu dibagian data belakang “S” diberi tanda “0” atau “X” ini menandakan orang itu bisu. Data subjektif menguatkan diagnose yang akan dibuat.

b) O (Objektif)

Objektif menganjurkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan tes diagnose lain yang dirumuskan dalam data focus untuk mendukung assessment sebagai langkah 1 varney. Data yang diperoleh dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh bidan pada waktu pemeriksaan termasuk juga hasil pemeriksaan laboratorium, USG, dan lain-lain. apa yang dapat di observasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnose yang akan ditegakkan.

1. Data ini memberi bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnose.
2. Tanda gejala objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan (tanda KU, Vitalsign, fisik, khusus, kebidanan, pemeriksaan dalam, laboratorium dan pemeriksaan penunjang). Pemeriksaan dengan insfeksi, palpasi, auskultasi dan pekusi.

3. Data yang digolongkan dalam kategori ini, antara lain: data psikologik, hasilobservasi yang jujur, informasi kajian teknologi (hasil pemeriksaan laboratorium, RO, CTG, USG, dan lain-lain).
 4. Anda yang dapat memuaskan laporan dari keluarga yang masuk kategori ini.
 5. Apa yang dapat diobservasikan diobservasikan oleh bidan atau perawat akan menjadi komponen yang penting dari diagnose yang ditegakkan.
- c) A (Assesment)
- Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interprestasi data subjektif dan Objektif dalam suatu identifikasi: 1. Diagnosis/ masalah (diagnose adalah rumusan dari hasil pengkajian mengenai kondisi klien: hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Berdasarkan hasil analisa data yang dapat. Masalah segala sesuatu menyimpang sehingga keutuhan klien terganggu, kemungkinan mengganggu kehamilan atau kesehatan tetapi tidak masuk didalam diagnose. 2. Antisipasi diagnose atau masalah potensial. Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi atau kolaborasi atau rujukan sebagai langkah 2,3,dan 4 varnay.
1. Masalah atau diagnose yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif maupun objektif yang dikumpulkan dan disimpulkan.
 2. Karena keadaan pasien terus berubah dan selalu ada informasi baru baik subjektif maupun objektif dan sering diungkapkan secara terpisah-terpisah.

3. Sering menganalisis S penting !
4. Mengikuti perkembangan pasien dan menjamin segala perbuatan baru dapat diketahui dan dapat diikuti sehingga dapat diambil tindakan yang tepat.

d) P (Planning)

Menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan, tindakan dan evaluasi berdasarkan assessment sebagai langkah 5, 6, 7.

1. Membuat perencanaan tindakan saat itu atau yang akan datang untuk mengusahakan mencapai kondisi pasien sebaik mungkin atau menjaga atau mempertahankan kesejahteraan.
2. Proses ini termasuk kriteri tujuan terdiri dari kebutuhan pasien yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu.
3. Tindakan yang diambil harus membantu pasien mencapai kemajuan dalam kesejahteraannya yang pasalnya
4. Dan harus mendukung rencana dokter bila itu manajemen kolaborasi atau rujukan.

E. Tinjauan Umum Islam Tentang Keputihan

1. Perbedaan lendir dengan keputihan

Lendir (*ruthubah*) adalah yaitu lendir yang biasanya didapati pada wanita tidak keluar dari saluran kencing, tetapi dari saluran lain yang bersamung dengan rahim. *Rutubah* ini diproduksi oleh kelenjar disaluran rahim *ruthubah* ini menyerupai keringat, ingus dan ludah. Sedangkan

keputihan Secara medis keputihan disebut dengan “flour Albus” yaitu semacam cairan yang keluar dari vagina wanita. Keputihan ini ada dua jenis ada yang normal (fisiologis) dan ada yang tidak normal atau patologis, yang normal biasanya yaitu keluar menjelang menstruasi atau sesudah menstruasi ataupun masa subur, sedangkan keputihan penyakit (patologis) yang disebabkan oleh infeksi (bakteri, virus atau jamur) disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan di sekitar bibir vagina.

2. Apa keputihan sama dengan keluarnya madzi dan wadi

- a) Keputihan yaitu cairan yang biasa keluar ketika menjelang menstruasi, kelelahan ataupun masa subur dan keputihan dapat keluar jika disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh infeksi (bakteri, virus dan jamur) biasanya disertai dengan rasa gatal.
- b) Sedangkan madzi yaitu cairan yang berwarna putih bening dan lengket yang keluar saat melakukan pemanasan pra seks atau ketika memayangkan aktivitas seks. Keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat dan tidak pula terpancar serta tidak pula memicu perasaan lemas setelah keluar, bahkan kadang keluarnya tidak terasa.
- c) Wadi yaitu cairan putih kental keluar setelah kencing.

3. Unsur yang terdapat dalam cairan keputihan dan sperma

- a) Kencing: Masyhur sehingga tidak perlu dijelaskan, dan dia najis berdasarkan Al-Qur`an, Sunnah, dan ijma' diwajibkan untuk berwudhu

مِنْ سَمِعْتُهُ عُمَانُ قَالَ ذَكَرَهُ؛ وَيَغْسِلُ لِلصَّلَاةِ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلٍ

Artinya:

Dia berwudhu dengan sempurna dan dia cuci kemaluannya.” Kata

Utsman, ‘Aku dengar dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.’

- b) Wadi: Cairan tebal berwarna putih yang keluar setelah kencing atau setelah melakukan pekerjaan yang melelahkan, misalnya berolahraga berat. Wadi adalah najis berdasarkan kesepakatan para ulama sehingga dia wajib untuk dicuci. Dia juga merupakan pembatal wudhu sebagaimana kencing dan madzi.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

c) Madzi: Cairan tipis dan lengket, yang keluar ketika munculnya syahwat, baik ketika bermesraan dengan wanita, saat pendahuluan sebelum jima', atau melihat dan mengkhayal sesuatu yang mengarah kepada jima'. Keluarnya tidak terpancar dan tubuh tidak menjadi lelah setelah mengeluarkannya. Terkadang keluarnya tidak terasa. Dia juga najis berdasarkan kesepakatan para ulama berdasarkan hadits Ali yang akan datang dimana beliau memerintahkan untuk mencucinya dan berwudhu kembali.

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ ۚ

Terjemahan:

dan pakaianmu bersihkanlah.(Surah Al Mudatsir ayat 4)

d) Mani: Cairan tebal yang baunya seperti adonan tepung, keluar dengan terpancar sehingga terasa keluarnya, keluar ketika jima' atau ihtilam (mimpi jima') atau onani (wal 'iyadzu billah), dan tubuh akan terasa lelah setelah mengeluarkannya." Maka diwajibkan untuk mandi janabah.

الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ إِنَّمَا

Artinya:

“*Sesungguhnya (mandi) dengan air disebabkan karena keluarnya air (mani).*” (HR. Muslim no. 343)

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرْضًا
بِاللَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Dengan menyebut asma Allah aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadats besar junub fardu karena Allah SWT.

4. Keputihan memataalkan wudhu ?

Apakah setiap cairan atau lendir yang keluar ini membatalkan wudhu? Abu malik kamal dalam fiqbus sunnah linnisaa' berkata: masalah ini harus diperinci:

- a) Jika lendir yang dimaksud adalah yang keluar ketika bercumbu dengan suami, atau ketika hendak berjima' khususnya, maka lendir tersebut sebagaimana engkau telah ketahui, bahwa lendir itu membatalkan wudhu' dan diwajibkan mencuci kemaluan karenanya.
- b) Sedangkan jika yang dimaksud adalah lendir yang biasa keluar pada kebanyakan waktu bagi seorang wanita, terlebih ketika hamil, maka itu tidak membatalkan wudhu'. Hasil ini berdasarkan beberapa alasan:
 - 1) sudah maklum bahwa lendir seperti ini banyak terjadi pada kaum wanita, dan tidak diragukan bahwa hal itu terjadi pula pada wanita dizaman Nabi seperti wanita pada zaman kita sekarang ini. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan para wanita berwudhu' karenanya.
 - 2) sesungguhnya tempat keluar lendir tersebut bukanlah tempat keluar air kencing yang najis.

3) Berdasarkan beberapa hal diatas sesungguhnya lendir yang biasa keluar dari seorang wanita, terutama ketika capek, berjalan jauh atau ketika hamil, lendir tersebut bukanlah salah satu yang membatalkan wudhu', wallahu a'lam.

5. Status cairan keputihan najis atau bukan menurut pendapat ulama

1) Ibnu kudamah- ulama madzhab hambali

Menjelaskan dalam permasalahan keputihan yang keluar dari organ reproduksi wanita, ada dua pendapat:

- a) keputihan statusnya najis karena berasal dari kemaluan yang bukan unsur terciptanya seorang anak. Sebagaimana madzi.
- b) keputihan statusnya suci. Karena 'Aisyah pernah mengerik mani dari baju Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bekas jima'. Mengingat tidak ada seorang nabi pun yang mengalami mimpi basah. Sehingga makna air mani tersebut adalah cairan yang bercampur dengan cairan basah farji istri beliau. Karena jika kita menghukumi keputihan sebagai benda najis, seharusnya kita juga berpendapat najisnya mani wanita. Mengingat mani wanita juga keluar dari kemaluannya, sehingga bisa menjadi najis karena, ada keputihan dileher rahim.

- 2) Sementara al-Qadhi Abu Ya'la berpendapat, semua yang terkena cairan basah dari kemaluan ketika jima' statusnya najis. Karena tidak lepas dari madzi, sementara madzi hukumnya najis.

3) Ibnu Qudamah mengomentari, alasan al-Qodhi tidak benar. Karena syahwat ketika memuncak, akan keluar mani tanpa madzi, sebagaimana ketika mimpi basah.

4) Keterangan dari Imam an-Nawawi – ulama syafiiyah

Keputihan yang keluar dari farji bentuknya cairan putih. di perselisihkan sifatnya, antara disamakan dengan madzi dan al-irq (cairan kemaluan). Karena itu, ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Kemudian, penulis (as-Saerozi) dalam kitab al-Muhadzab ini dan kitab at-Tahbih, keputihan hukumnya najis. Ini juga pendapat yang dipilih al-Bandaniji. Sementara al-Baghawi dan ar-Rafii serta yang lainnya berpendapat bahwa yang benar adalah suci.

5) Kemudian, Syaikh Musthofa al-Adawi dai dari Mesir setelah membawakan perselisihan pendapat ulama dalam masalah ini, beliau mengatakan:

Dengan melihat lebih mendalam terhadap keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil tegas yang menunjukkan bahwa keputihan wanita hukumnya najis. Sementara hadis yang dibawakan Bukhari, yang ada pernyataan, “Dia harus berwudhu sempurna dan mencuci kemaluannya..” tidaklah menunjukkan dengan tegas bahwa mencuci kemaluan dalam kasus itu, disebabkan keputihan wanita. Namun bisa juga dipahami karena madzi. Sebagaimana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan al-Miqdad ketika dia bertanya tentang madzi, jawab Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ‘Dia harus berwudhu dan mencuci kemaluannya.’

Kemudian beliau menyimpulkan:

فعلى ذلك تبقى رطوبة فرج المرأة على الطهارة

Oleh karena itu, keputihan yang ada di organ reproduksi wanita, statusnya suci. (Jami' Ahkam an-Nisa, 1/66).

Disamping itu, cairan keputihan yang keluar dari organ reproduksi wanita, adalah hal yang wajar terjadi di masa silam. Meskipun demikian, kita tidak menjumpai adanya riwayat dari para sahabat wanita (shahabiyat) yang menanyakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Padahal umumnya mereka hanya memiliki satu pakaian. Jika ini najis, tentu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam akan mengingatkannya.

Sehingga kembali ke hukum asal, bahwa segala sesuatu hukum asalnya adalah suci.

BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA IBU
HAMIL TRIMESTER II DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS
DI RSUD HAJI MAKASSAR
TANGGAL 20 MARET 2017**

No Registes : 132xxx

Tanggal Masuk : 20 Maret 2017, Pukul 10.00 Wita

Tanggal Pengkajian : 20 Maret 2017, Pukul 10.30 Wita

Pengkaji : Megawati

A. LANGKAH 1 : IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas istri/suami

Nama : Ny "H"/ Tn "A"

Umur : 40 thn / 43 thn

Nikah/lamanya : 1x / 15 Tahun.

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMK

Alamat : Jln Hartaco Blok JA/18

2. Keluhan Utama

Ibu mengeluh keluar lendir berwarna kekuningan, dan berbau dari vaginanya dan gatal

3. Riwayat Keluhan utama

Keluar lendir pada vagina bewarna kekuningan, dan berbau dirasakan ibu sejak 3 hari yang lalu

4. Riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang

a) Riwayat Kesehatan Lalu

- Pasien: Tidak ada riwayat menderita penyakit serius seperti penyakit jantung, diabetes melitus (DM), hepatitis, TBC, dan asma
- Keluarga : keluarga tidak ada yang pernah menderita penyakit TBC, hepatitis, jantung dan asma.

b) Riwayat kesehatan sekarang

Sejak tiga hari yang lalu pasien mulai mengeluh keluar lendir berwarna putih kekuningan, berbau amis dan terasa gatal-gatal pada kemaluannya.

5. Riwayat Reproduksi

- a) Menarche : 14 tahun
- b) Siklus haid : 28 hari
- c) Lamanya haid : 05-07 hari
- d) Keluhan haid : Tidak ada

6. Riwayat kehamilan sekarang

- a. Ibu mengatakan ini adalah anak yang keempat dan pernah keguguran 1 kali
- b. HPHT : 19 September 2016
- c. HTP : 26 Juni 2017
- d. Usia Kehamilan : 26 Minggu
- e. Ibu telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali di RSUD Haji dan telah mendapat suntik TT lengkap.

7. Riwayat persalinan lalu.

Tabel.1

Anak Ke	Tahun lahir	Tempat persalinan	Jenis Persalinan	Penolong	BBL	Jenis kelamin (JK)	Keadaan
1	2012	PKM	Normal	Bidan	2. 800	L	Hidup
2	2014	RS	Normal	Bidan	3.000	P	Hidup
3	Meninggal	-	-	-	-		Meninggal

8. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB

9. Pola kebiasaan sehari-hari

a) Nutrisi

Pola makan ibu teratur dengan frekuensi 3 kali sehari dengan jenis makanan nasi, sayur, lauk pauk, dan buah. ibu minum 7-8 gelas/hari.

b) Eliminasi

Ibu BAK sebanyak 3-4 kali/hari, BAB sebanyak 1-2 kali/hari

c) Istirahat

Ibu tidur siang kurang lebih 2 jam/hari, dan tidur malam 7-8 jam/hari.

d) Personal hygiene

Ibu mandi 2 kali sehari memakai sabun, keramas tiap rambut kotor dengan menggunakan shampo, sikat gigi 2 kali dalam sehari, ganti pakaian 2-3 kali sehari, kebersihan Vulva setiap selesai BAB/BAK dibersihkan dengan air bersih dan ganti celana dalam 2 kali sehari.

Data Objektif

1. Keadaan umum : baik

Kesadaran : composmentis

Emosional : stabil

2. Tanda-Tanda Vital

a. TD : 120/80 mmhg

c. Suhu : 36,5 C

b. Nadi : 80 x/menit

d. Pernapasan : 20 x/menit

3. Pemeriksaan Fisik

a) Kepala

Inspeksi : Rambut bergelombang, hitam, tidak rontok.

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada benjolan.

b) Mata

Inspeksi : Konjungtiva merah muda, sclera putih.

c) Wajah

Inspeksi : Tidak ada chloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada edema

d) Payudara

Inspeksi : Puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi aerola
mammarum

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan

e) Abdomen

Inspeksi : Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba

Palpasi : - Leopold I : 29 cm, teraba bokong

- Leopold II : PU-KA

- Leopold III : Kepala

- Leopold IV : BAP

- TBJ : 80x29 : 2,320

- DJJ : 130 x/menit

f) Genitalia

Inspeksi : Tidak ada varices, Tampak pada pakaian dalam ibu lendir
berwarna kekuningan.

g) Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varices, jari-jari ekstremitas atas dan bawah lengkap

Palpasi : Tidak ada edema

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH AKTUAL

Diagnosa : GIV P1I A1, Usia kehamilan 26 Minggu dengan riwayat keputihan

Dasar : ibu mengatakan cairan pervaginam sejak 3 hari yang lalu warna putih kekuningan kental dan berbau disertai gatal.

1. PIV A1

Data Subjektif

Ibu mengatakan ini anak yang keempat

Ibu pernah keguguran

Ibu mengatakan keluar cairan dari vaginanya sejak tiga hari yang lalu warna putih kekuningan kental, berbau dan disertai gatal.

Data Objektif

Tidak ada luka bekas operasi

Tidak ada nyeri tekan

Tampak pengeluaran cairan kental berwarna putih kekuningan

Cairan yang keluar berwarna putih kekuningan, kental, dan meninggalkan bekas pada celana dalam disertai dengan bau dan gatal.

Analisa dan interpretasi data :

Lendir vagina umumnya semakin banyak selama kehamilan yang disebabkan oleh peningkatan suplai darah dan perubahan hormonal, yang

kemudian menyebabkan peningkatan produksi lendir dari serviks dan perubahan keseimbangan pH pada lapisan vagina (Onggo, T, 2012).

Bakteri atau jamur itu adalah satu penyebab yang sangat banyak terjadi pada penyakit apa saja. Termasuk dengan factor penyebab vagina gatal karena disebabkan adanya bakteri yang menempel. Hal ini bisa terjadi jika membersihkan vagina dengan cara yang tidak higienis.

2. Keputihan

Data subjektif :

Ibu mengatakan telah lama mengalami keputihan tetapi selama 1 minggu ini pada hari pertama sampai hari keempat ibu masih mengalami keputihan yang berwarna putih, kental, dan kadang disertai gatal. selanjutnya pada hari kelima sampai dengan hari ketujuh cairan yang keluar sudah tampak berwarna kekuningan, gatal, banyak, kental (menggumpal) dan berbau amis.

Data objektif

- a. Ibu dengan kehamilan 6 bulan (trimester II)
- b. Tampak pengeluaran cairan berwarna putih kekuningan, dan kental.
- c. Keputihan yang keluar kadang gatal dan berbau (amis)

Analisa dan interpretasi data :

- a. Keputihan atau flour albus merupakan pengeluaran cairan pervagina yang bukan darah, keputihan yang disebabkan oleh infeksi biasanya disertai dengan rasa gatal didalam vagina dan disekitar bibir vagina bagian luar.

yang sering menimbulkan keputihan ini antara lain bakteri, virus, jamur, atau juga parasit (Joseph, 2011:34)

- b. Keputihan banyak disebabkan oleh bakteri, yang dikenal dengan bacterial vaginosis yaitu merupakan gangguan vagina yang sering terjadi ditandai dengan keputihan, bau tak sedap dan disertai gatal,. Hal ini disebabkan oleh lactobasillus menurun, bakteri patogen (penyebab infeksi) meningkat, dan pH vagina meningkat (Setiawati, D, 2013: 247).

3. Gatal dan berbau dari vagina

Data subjektif :

Ibu merasa gatal dan merasa berbau dari lendir yang keluar dari vaginanya.

Data Objektif

- a. Ekspresi wajah ibu tampak merasa tidak nyaman
- b. Lendir yang keluar kental berwarna putih kekuningan, banyak dan berbau amis.

Analisa dan interpretasi data :

Keputihan yang ditandai dengan jumlah cairan yang dikeluarkan banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi. Perempuan yang mengalami keputihan seperti ini disebut dengan keputihan patologis umumnya mempunyai keluhan-keluhan seperti merasa tidak nyaman karena disertai gatal, dan berbau busuk/amis (Citrawati, MD, 2014:9).

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH POTENSIAL

1. Potensial terjadi infeksi vagina yang menyebabkan pengeluaran lendir berwarna putih kekuningan, berbau selama kehamilan.

Data subjektif

- a. Ibu sedang hamil, usia kehamilannya 6 bulan
- b. Adanya pengeluaran lendir kental berwarna putih kekuningan, disertai gatal dan berbau keluar dari vaginanya.

Data Objektif

- a. Lendir yang keluar kental dan banyak.
- b. Pengeluaran cairan berwarna putih kekuningan, berbau dan gatal pada vagina.

Analisa dan interpretasi data :

Lendir vagina umumnya semakin banyak selama kehamilan yang disebabkan oleh peningkatan suplai darah dan perubahan hormonal, yang kemudian menyebabkan peningkatan produksi lendir dari serviks dan perubahan keseimbangan pH pada lapisan vagina. jika lendir vagina menyebabkan rasa gatal baik didalam atau diluar vagina, berwarna krem, abu-abu, kehijauan atau bernoda darah atau jika mengeluarkan bau tidak lazim, mungkin karena terkena infeksi seperti bakteri virus dan jamur (Onggo,T,2012:193).

Tanda dari keputihan yang tidak normal dari vagina keluar lendir secara berlebihan dan disertai infeksi. Lendir yang keluar bisa berwarna keruh, kecoklatan, kekuningan, atau berwarna kehijauan. Warna ini biasanya bergantung pada jenis organisme penyebab infeksi atau radang yang terjadi pada organ reproduksi (suryasaputra dkk, 2013)

Kebersihan daerah vagina yang jelek juga dapat menyebabkan timbulnya keputihan. Hal ini terjadi karena kelembaban vagina yang meningkat sehingga bakteri patogen penyebab infeksi mudah menyebar (Setiawati,D, 2013: 247).

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan antibiotic (Metronidazole), dan cairan antiseptic vagina

E. LANGKAH V : RENCANA/INTERVENSI

Tujuan

1. Ibu dapat bersalin dengan aman dan terhindar dari keputihan yang dapat memicu terjadinya KPD.
2. Tidak terjadi peningkatan infeksi yang bisa berdampak bahaya pada kehamilan,persalinan dan bayinya nanti.

Kriteria

1. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan
 - Keadaan umum ibu baik
 - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal

- 1) Tekanan darah : 120/80 Mmhg
- 2) Nadi : 82 x/menit
- 3) Suhu : 36,5 C
- 4) Pernafasan : 20 x/menit

b. Pemeriksaan Leopold

Keadaan janin dalam keadaan baik, berusia 26 minggu.

Pemeriksaan dengan Palpasi

- 1) Leopold I : 29 cm, teraba bokong
- 2) Leopold II : PU-KA
- 3) Leopold III : Kepala
- 4) Leopold IV : BAP
- 5) DJJ : 136 x/menit

2. Tidak terjadi peningkatan infeksi pada vagina ibu

Tidak terdapat tanda-tanda infeksi : seperti perubahan warna cairan dari putih kekuningan berubah menjadi kuning kehijauan atau kecoklatan berbusa dan disertai nyeri tekan divulva dan disekitarnya dan berbau busuk

Rencana asuhan

- a. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Rasional: hal ini dapat mencegah terjadinya infeksi

- b. Melakukan Vagina Toilet dengan cara membersihkan organ intim wanita menggunakan kasa yang telah diberi betadine dengan cara gerakan

melingkar dibagian dalam vagina usahakan hati-hati agar tidak terjadi kontraksi dini pada kehamilan ibu.

Rasional : Vaginal toilet adalah salah satu cara untuk membersihkan vagina tanpa melakukan pap smear yaitu mencuci vagina secara mandiri atau dikerjakan sendiri

- c. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Rasional: Dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, ibu dapat mengerti tentang keadaannya dan dapat mengurangi kecemasan ibu.

- d. Jelaskan kepada ibu tentang terjadinya keputihan

Rasional: keputihan dalam kehamilan dapat terjadi ketika umur kehamilan semakin tua, dimana terjadi peningkatan suplai darah yang dapat memicu jumlah produksi lendir semakin meningkat, keputihan juga bisa terjadi ketika kebersihan daerah vagina tidak terjaga (personal hygiene yang jelek), dan apabila terlalu sering menggunakan penty liner (pembersih vagina) yang berlebih dan terlalu sering memakai celana dalam yang ketat yang dapat membuat daerah vagina menjadi lembab sehingga kuman dapat berkembang dengan baik.

- e. Anjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu : mengganti celana dalam 3 kali dalam sehari atau setiap kali basah, kotor dan merasa tidak nyaman, Hindari penggunaan bedak talcum, tissue, atau sabun dengan pewangi pada daerah vagina karena dapat

menyebabkan iritasi, dan Biasakan membasuh dengan cara yang benar tiap kali buang air yaitu dari arah depan ke belakang

Rasional: Kebersihan daerah vagina yang jelek dapat menyebabkan timbulnya keputihan. Hal ini terjadi karena kelembaban vagina yang meningkat sehingga bakteri pathogen penyebab infeksi mudah menyebar dan memudahkan terjadinya penumpukan bakteri.

- f. Anjurkan Ibu untuk menggunakan celana dalam yang longgar menyerap keringat dan tidak ketat.

Rasional: anjuran ini diberikan agar ibu lebih memerhatikan kebersihan daerah vaginanya, dengan cara menganjurkan ibu memakai celana dalam yang longgar untuk mempermudah sirkulasi udara masuk ke vagina dan mengganti pakaian dalam minimal 3 kali sehari untuk mencegah terjadinya penumpukan bakteri, peningkatan kelembapan dan untuk mencegah terjadinya infeksi dan berkembangnya kuman.

- g. Anjurkan Ibu tidak menggunakan cairan pembersih vagina

Rasional: Penggunaan cairan pembersih vagina sebaiknya tidak berlebihan karena dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi medis dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina

- h. Memberikan ibu obat antibiotic (Metrodinasol) dan cairan antiseptic vagina dan Anjurkan ibu untuk selalu ingat meminum dan memakai obat yang telah diberikan yaitu 2 kali sehari.

Rasional: Metronidasol adalah salah satu kandungan obat keputihan yang aman untuk ibu hamil pada kehamilan 26 minggu (trimester II) untuk mengobati infeksi.

- i. Anjurkan ibu untuk kontrol kembali setelah obat yang diberikan oleh dokter habis.

Rasional: melakukan control ulang untuk mengetahui kondisi ibu setelah diberikan obat antibiotic

F. LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

Tanggal 20 maret 2016

1. Menjelaskan kepada ibu tentang kondisinya saat ini agar ibu merasa tenang

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mengerti dengan keadaannya.

2. Menjelaskan kepada ibu bahwa keputihan yang dialaminya saat ini diakibatkan karena ibu kurang menjaga kebersihan di sekitar genitalianya.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan, dan ibu bersedia menjaga kebersihan dirinya.

3. Menganjurkan ibu untuk mengganti celana dalam sesering mungkin untuk mencegah kelembapan pada daerah genitalia yang dapat menyebabkan bertambah parahnya keputihan karena penumpukan bakteri pada daerah genitalia yang akan masuk ke daerah vagina dan portio.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran yang diberikan.

4. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang dibeikan dan bersedia untuk melakukannya.

5. Menganjurkan kepada ibu untuk membasuh vagina dengan cara yang benar yaitu dengan gerakan dari depan kebelakan, cuci dengan air bersih setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

6. Menganjurkan Ibu tidak terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina karena dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina

Hasil: ibu bersedia untuk melakukan konsultasi sebelum menggunakan cairan pembersih vagina.

7. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter obgyn untuk mendapatkan terapi dan pengobatan yang tepat untuk penyembuhan.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

G. LANGKAH VII: EVALUASI

Tanggal 20 maret 2017

1. Keadaan ibu
 - a. Keadaan umum ibu baik
 - b. Kesadaran composmentis

c. Tanda-tanda vital dalam batas normal

- 1) Tekanan darah : 110/70 MmHg
- 2) Nadi : 80 x/menit
- 3) Suhu : 36 C
- 4) Pernafasan : 20 x/menit

2. Keputihan yang berwarna putih kekuningan, kental dan berbau

Keputihan yang kental, putih kekuningan sudah teratasi: cairan yang keluar sudah tidak lagi berwarna kuning, cairan yang keluar sudah tidak banyak dan kental serta sudah tidak berbau amis, ibu merasa tidak khawatir lagi dengan keputihannya yang bisa berdampak bahaya pada persalinan dan bayinya.

3. Potensial terjadinya keputihan yang lebih berbahaya

Tidak ada tanda-tanda infeksi yang ditemukan keadaan lendir masih tetap sama tidak tampak kelainan.

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY “H”
TRIMESTER II DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGI
DI RSUD HAJI MAKASSAR
TANGGAL 20 MARET 2017**

No Register : 132xxx
Tanggal Masuk : 20 maret 2017, pukul 10.00 wita
Tanggal Pengkajian : 20 maret 2017 , pukul 10. 30 wita
Pengkaji : Megawati

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “H”/ Tn “A”

Umur : 40 thn / 43 thn

Nikah/lamanya : 1x / 15 Tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMK

Alamat : Jln. Hartaco Blok JA/18

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan keluar cairan kental, berwarna kekuningan, berbau dari vaginanya, disertai rasa gatal.
2. Ibu merasa gatal didaerah sekitar genitalianya.
3. Ibu mengatakan sudah 3 hari mengalami pengeluaran cairan tersebut.
4. Ibu tidak pernah menggunakan KB
5. Tidak ada riwayat, hipertensi, asma dan jantung, TBC, dan hepatitis.
6. Ibu haid pada umur 14 tahun, siklus tidak teratur, lamanya haid 04-06 hari
7. Ibu tidak ada riwayat alergi terhadap obat-obatan dan makanan
8. Ibu sedang hamil dengan usia kehamilan 6 bulan, GIV PII AI

Data objektif

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi ibu merasa tidak nyaman saat bergerak
4. Pengeluaran lendir berwarna kekuningan
5. Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 120/80 mmhg
 - Nadi : 82 x/menit
 - Suhu : 36 c
 - Pernafasan : 20 x/menit

6. Pemeriksaan laboratorium

Hb : 10, gr %

Assesment (A)

Ny H ,GIV PII AI, usia kehamilan 6 bulan dengan Flour albus patologis.

Planning (P)

Tanggal 20 maret 2016, jam 10.50 Wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan Menjelaskan kepada ibu tentang kondisinya saat ini agar ibu merasa tenang.
3. Menjelaskan kepada ibu bahwa keputihan yang dialaminya saat ini diakibatkan karena ibu kurang menjaga kebersihan di sekitar genitalianya.
4. Observasi tanda-tanda vital ibu
 - a. Tekanan darah : 110/ 70 mmhg
 - b. Nadi : 82 x/menit
 - c. Suhu : 36 C
 - d. Pernafasan : 20 x/menit
5. Menganjurkan ibu untuk mengganti celana dalam sesering mungkin untuk mencegah kelembapan pada daerah genitalia yang dapat menyebabkan bertambah parahnya keputihan karena penumpukan

bakteri pada daerah genitalia yang akan masuk ke daerah vagina dan portio.

6. Mengajarkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi.
7. Mengajarkan kepada ibu untuk membasuh vagina dengan cara yang benar yaitu dengan gerakan dari depan kebelakang, cuci dengan air bersih setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh
8. Mengajarkan Ibu tidak terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina karena dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina
9. Mengajarkan ibu untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter obgyn untuk mendapatkan terapi dan pengobatan yang tepat untuk penyembuhan.
10. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah untuk memantau perkembangan kesehatan ibu pada tanggal 22 Maret 2017 selama 3 hari (3 kali kunjungan) dalam 3 minggu , ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah dan ibu menjelaskan alamat rumahnya.

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY "H"
TRIMESTER II DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS
DI RSUD HAJI MAKASSAR
TANGGAL 26 MARET 2017

Hari/tanggal : Minggu, tanggal 26 maret 2017 jam 11.30 wita

Tempat : Rumah Ny "H"

Pengkaji : Megawati

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan keluar cairan kental berwarna kekuningan.
2. Ibu mengatakan sudah 3 hari mengalami pengeluaran cairan tersebut
3. Ibu mengatakan cairan yang keluar berbau dan kadang gatal pada vaginanya

Data objektif (O)

1. Ekspresi wajah ibu masih tampak merasa tidak nyaman dan merasa cemas dengan dampak yang bisa disebabkan oleh keputihan yang dialaminya
2. Keadaan umum ibu baik.
3. Keadaan kandungan ibu juga baik

TBJ: TFU 29 x LP 80 : 2, 320

4. Tanda-tanda vital

a. Tekanan darah : 110/70 mmhg

- b. Nadi : 82 x/menit
- c. Suhu : 36 C
- d. Pernafasan : 20 x/menit

Assesment (A)

Ny "H" GIV PII AI Gestasi 26 minggu Antenatal care pada minggu pertama pemeriksaan, antisipasi terjadinya peningkatan infeksi pada genitalia

Planning (P)

Tanggal 26 maret 2017 pukul 11.58

1. Kunjungan minggu pertama
 - a. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik: ibu mengerti dan merasa senang.
 - b. Mengobservasi tanda-tanda vital
 1. Tekanan darah : 110/70 mmhg
 2. Nadi : 82 x/menit
 3. Suhu : 36 C
 4. Pernapasan : 20 x/menit
2. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

3. Menjelaskan kepada ibu untuk tidak terlalu berfikir banyak (stess) dan tidak bekerja terlalu berat yang bisa menimbulkan kelelahan yang dapat memicu dengan mudah timbulnya keputihan usahakan untuk istirahat cukup : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia untuk tidak terlalu bekerja berat.
4. Menjelaskan kepada ibu untuk menghindari pemakaian bedak talcum, tissue, atau saubun dengan pewangi pada daerah vagina karena dapat menyebabkan iritasi : ibu bersedia menghindari hal-hal yang dilarang oleh bidan.
5. Menganjurkan kepada ibu untuk membiasakan membasuh dengan cara yang benar tiap kali buang air dengan arah dari depan kebelakan untuk menghindari infeksi, cuci dengan air bersih setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh : ibu bersedia melakukannya
6. Menganjurkan Ibu tidak terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina karena dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina: ibu bersedia untuk melakukan konsultasi sebelum menggunakan cairan pembersih vagina.
7. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi : ibu bersedia melakukannya ibu biasanya makan sayur-sayuran hijau, dan mengonsumsi buah-buahan, dan susu ibu hamil

8. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu memakai obat yang diberikan oleh dokter : ibu mengerti dan selalu mengingatnya.
9. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah untuk memantau kesehatan reproduksi ibu dan keadaan kandungannya yaitu pada tanggal 2 april 2017 : ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY "H"
TRIMESTER II DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGIS
DI RSUD HAJI MAKASSAR
TANGGAL 2 APRIL 2017**

Hari/tanggal : Minggu, tanggal 2 April 2017 jam 03.30 wita

Tempat : Rumah Ny "H"

Pengkaji : Megawati

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan cairan yang keluar masih masih berwarna putih kekuningan
2. Ibu mengatakan gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah jarang dialaminya (Berkurang)
3. Ibu mengatakan cairan yang keluar dulunya banyak sekarang sudah agak berkurang
4. Ibu mengatakan bau yang keluar dari keputihannya sudah tidak berbau amis tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Bau amis)

Data objektif (O)

1. Ekspresi wajah ibu masih tampak merasa tidak nyaman dan merasa cemas dengan dampak yang bisa disebabkan oleh keputihan yang dialaminya

2. Keadaan umum ibu baik

3. Keadaan kandungan ibu juga baik

TBJ: TFU 29 x LP 85 : 2, 465

DJJ : 136 x/menit

4. Tanda-tanda vital

a. Tekanan darah : 120/80 mmhg

b. Nadi : 80 x/menit

c. Suhu : 36,2 C

d. Pernafasan : 22 x/menit.

Assesment (A)

Ny "H" GIV PII AI Gestasi 26 minggu Antenatal care pada minggu kedua pemeriksaan, antisipasi terjadinya peningkatan infeksi pada genitalia.

Planning (P)

Tanggal 02 april 2017, jam 04. 20 wita

a. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik: ibu mengerti dan merasa senang.

- b. Menganjurkan ibu untuk melakukan pola hidup sehat yaitu istirahat yang cukup, usahakan olah raga dengan cara jalan-jalan pagi di sekitar area rumah: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya.
- c. Meyakinkan kepada ibu agar tidak terlalu stress memikirkan dampak dari keputihannya bahwa keputihan yang dialaminya tidak akan berdampak buruk terhadap persalinannya, dan bayinya akan baik-baik saja : ibu merasa cemas karna keputihanyang dialaminya masih berwarna putih kekuningan.
- d. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat.: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.
- e. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk membiasakan membasuh dengan cara yang benar tiap kali buang air dengan arah dari depan kebelakan untuk menghindari infeksi , cuci dengan air bersih setiap BAK/BAB dan mandi, biasakan mencuci tangan sebersih-bersihnya sebelum digunakan untuk membasuh : ibu bersedia melakukannya
- f. Menganjurkan Ibu tidak terlalu sering menggunakan cairan pembersih atau usahan ibu menghindari pemakaian cairan pembersih vagina karena banyak pembersih yang mengandung bahan kimia yang dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina: ibu bersedia untuk melakukan konsultasi sebelum menggunakan cairan pembersih vagina.

- g. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi : ibu bersedia melakukannyaibu biasanya makan sayur-sayuran hijau, dan mengkonsumsi buah-buahan, dan susu ibu hamil
- h. Mengingatkan kepada ibu untuk selalu memakai obat yang diberikan oleh dokter dan mengingatkan kepada ibu untuk control kembali jika obatnya telah habis: ibu mengerti dan selalu mengingatnya dan bersedia control kembali.
- i. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah untuk memantau kesehatan reproduksi ibu dan keadaan kandungannya yaitu pada tanggal 9 april 2017 : ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah.

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY "H"
TRIMESTER II DENGAN FLOUR ALBUS PATOLOGI
DI RSUD HAJI MAKASSAR
TANGGAL 9 APRIL 2017**

Hari/tanggal : Minggu, tanggal 9 April 2017 jam 09.00 Wita

Tempat : Rumah Ny "H"

Pengkaji : Megawati

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak terlalu berwarna kekuningan, (agak putih)
2. Gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah tidak terlalu dialaminya cuman 1 atau 2 kali saja ibu merasa gatal
3. Ibu mengatakan cairan yang keluar dulunya banyak sekarang agak berkurang
4. Ibu mengatakan bau yang keluar dari keputihannya sudah tidak berbau amis tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Bau amis)
5. Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak lagi kental (menggumpal)

Data objektif (O)

1. Ekspresi wajah ibu tampak ceria dan tidak cemas lagi dengan keadanya
2. Keadaan umum ibu baik
3. Keadaan kandungan ibu juga baik

TBJ: TFU 29 x LP 90 : 2, 610

DJJ : 138 x/menit

4. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 120/80 mmhg
 - b. Nadi : 82 x/menit
 - c. Suhu : 36 C
 - d. Pernapasan : 20 x/menit

Assesment (A)

Ny "H" GIV PII AI Gestasi 26 minggu Antenatal care pada minggu ketiga dengan keadaan umum baik

Plannning (P)

Tanggal 09 april 2017, jam 09.58 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan kandungannya dalam keadaan baik: ibu mengerti dan merasa senang.

2. Mengajukan ibu untuk melakukan pola hidup sehat yaitu istirahat yang cukup, usahakan olah raga dengan cara jalan-jalan pagi di sekitar area rumah karna umur kehamilan ibu sudah masuk 6 bulan penting untuk jalan-jalan pagi untuk lebih banyak bergerak : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya.
3. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menjaga kebersihan daerah genitalianya, usahakan agar tidak lembab (Tetap kering), mengganti pakaian dalam bila perlu 3x sehari dan memakai celana dalam yang menyerap keringat.dan bersih: ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.
4. Mengajukan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kebutuhan ibu terhadap protein dan kalsium benar-benar terpenuhi : ibu bersedia melakukannya ibu biasanya makan sayur-sayuran hijau, dan mengkonsumsi buah-buahan, dan susu ibu hamil
5. Mengajukan kepada ibu untuk selalu memeriksakan kehamilannya di RS: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan di RSUD Haji Makassar selama 1 hari di ruangan ANC dan dilanjutkan dengan kunjungan rumah selama 3 kali kunjungan di jalan Hartaco Blok JA/18 makassar.

Penulis akan menguraikan berdasarkan SOAP dan Langkah Varney. Bab ini penulis akan membandingkan antara tinjauan kasus pada Ny “H” Trimester II dengan flour albus patologis di RSUD Haji Makassar. Dengan teori tentang Flour albus.

Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dan alasan nyata dengan pendekatan manajemen kebidanan yang terdiri dari 7 langkah yaitu langkah I pengumpulan data/ analisa data dasar, langkah II Identifikasi/ masalah actual, langkah III Identifikasi diagnose/ masalah potensial, langkah IV Tindakan emergency/ Kolaborasi, langkah V rencana tindakan (merencanakan asuhan yang menyeluruh), langkah VI Implementasi (melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan), langkah VII evaluasi. Adapun penatalaksanaannya adalah sebagai berikut :

A. LANGKAH I. PENGUMPULAN DATA/ ANALISA DATA DASAR

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien yang terdiri dari data

subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Adapun yang termasuk data subjektif antara lain biodata, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat kesehatan ibu, riwayat KB, riwayat penyakit yang lalu dan sekarang dan data biologis, data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien, hasil laboratorium dan test diagnostic lain yang dirumuskan dalam data focus. Pada tahap pengumpulan data, penulis tidak menemukan masalah atau hambatan yang berarti karena baik dari keluarga pasien maupun dari pasien itu sendiri selalu terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan sehingga mempermudah dalam pengumpulan data.

Tahap ini dilakukan identifikasi data dasar (pengkajian) yang merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien mengenai Ny "H", baik suami atau keluarga maupun bidan dan dokter yang ada diruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga memudahkan untuk memperoleh data yang di inginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Data yang diambil dari studi kasus Ny "H" dengan Flour Albus Patologis selama di rumah sakit sampai dilakukan kunjungan Rumah.

Pada tanggal 20 maret 2017 pukul 10.00 wita ibu datang memeriksakan kehamilannya di RSUD Haji Makassar ruangan ANC, ibu datang dengan keluhan keluar caian kental, kuning, berbau dari vaginanya disertai gatal, HPHT tanggal

19 September 2016, taksiran persalinan tanggal 26 Juni 2017, Usia Kehamilan 26 Minggu, anak ke empat dan pernah keguguran 1 kali, ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali, suntik imunisasi TT lengkap, selama hamil ibu tidak pernah menderita riwayat penyakit serius, tidak ada riwayat alergi terhadap obat-obatan atau makanan, ibu tidak pernah menjadi akseptor kb, ibu haid pada umur 14 tahun, siklus 28 hari, lamanya 5-7 hari.

Pada data objektif di dapatkan tanda-tanda vital dalam keadaan normal, TD: 120/80, Nadi: 80 x/menit, Suhu: 36,5 C, Pernapasan: 20 x/menit. pada pemeriksaan fisik terfokus didapatkan abdomen Leopold I 29 cm, teraba bokong, 2 jari diatas pusat, Leopold II teraba Punggung Kanang, Leopold III teraba kepala, Leopold IV teraba BAP, DJJ: 130 x/menit. pada genitalia tidak ada varices, terlihat pada pakaian dalam ibu tampak lendir berwarna putih kekuningan.

Pada kunjungan pertama hari minggu tanggal 26 maret 2017, jam 11.30 wita di rumah ibu, ibu mengeluh keluar cairan kental berwarna kekuningan, sudah 3 hari ibu mengalami pengeluaran cairan kekuningan, cairan yang keluar berbau dan gatal pada vaginanya.

Pada kunjungan kedua hari minggu, tanggal 2 april 2017, jam 03.30 wita di rumah ibu, ibu mengeluh masih keluar cairan berwarna kekuningan, tetapi gatal yang dirasakan ibu selama keputihannya sudah jarang dialaminya (Berkurang), cairan yang keluar yang dulunya banyak sekarang sudah agak berkurang, bau

amis yang dialaminya kadang berbau amis kadang juga tidak tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Berbau amis)

Pada Kunjungan ketiga hari minggu 9 april 2017 jam 09.00 wita di rumah ibu. Pada kunjungan ketiga ini keluhan yang dirasakan ibu sudah berkurang ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak kekuningan, gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah tidak terlalu dialaminya cuman 1/2 kali saja ibu merasa gatal kadang juga tidak sama sekali, cairan yang keluar sudah berkurang, sudah tidak menggumpal, bau yang keluar kadang berbau amis kadang juga tidak berbau amis tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Berbau amis). Tidak didapatkan tanda-tanda peningkatan infeksi.

Berdasarkan tinjauan teoritis, etiologi yang mempengaruhi kejadian flour albus patologis dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor yaitu mulai dari adanya infeksi pada vagina yang disebabkan oleh bakteri, virus jamur dan parasit, keputihan juga bisa terjadi karna faktor higiene yang jelek dimana kebersihan vagina yang jelek dapat menyebabkan timbulnya keputihan hal ini terjadi karena kelembapan vagina yang meningkat sehingga bakteri patogen penyebab infeksi mudah menyebar, keputihan juga bisa muncul ketika memakai obat-obatan serta pil Kb dalam jangka waktu lama Karena pemakaian obat-obatan khususnya antibiotic yang terlalu lama dapat menimbulkan system imunitas dalam tubuh, Sedangkan penggunaan KB mempengaruhi keseimbangan hormonal wanita, Stress, alergi dan juga karena adanya infeksi (Setiawati, D,2013: 247-248).

Adapun uraian dari keputihan yang dapat ditandai dengan flour albus patologis jika disertai perubahan bau dan warna serta jumlah yang tidak normal . keluhan bisa disertai dengan gatal yang hebat, edema genital, disuria, nyeri perut bagian bawah atau sakit punggung bawah (monalisa 2012)

jumlah cairan yang dikeluarkan banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk. Perempuan yang mengalami keputihan patologis umumnya mempunyai keluhan-keluhan seperti gatal, nyeri, bengkak pada organ kelamin, panas dan pedih ketika buang air kemih (kencing), dan nyeri perut bagian bawah perut. Keputihan patologis kemungkinan disebabkan oleh infeksi atau peradangan yang mungkin disebabkan oleh penyakit menular seksual, gejala keganasan pada organ reproduksi adanya benda asing dalam uterus atau vagina. Keputihan juga disebabkan oleh bagaimana kita dalam merawat organ reproduksi kita, memakai pembilas vagina yang berlebihan, jarang mengganti celana dalam, menggunakan pembalut dalam waktu yang relative lama (Citrawati,MD,2014:9).

Flour albus yang tidak normal (patologis) yaitu biasa disebabkan oleh infeksi atau peradangan yang terjadi karena mencuci vagina dengan air kotor, melakukan pemeriksaan dalam yang tidak benar, pemakaian pembilas vagina yang berlebihan, pemeriksaan yang tidak higienis, dan adanya benda asing dalam vagina seperti tanpon, alat kontrasepsi, rambut kemaluan, benang yang berasal dari selimut, celana, dan lainnya. Biasanya karna luka seperti tusukan, benturan, tekanan atau iritasi yang berlangsung lama. Karena keputihan, seorang ibu bahkan

bisa kehilangan bayinya akibat keputihan pada kehamilan. Selain karena infeksi, keputihan dapat juga disebabkan oleh masalah hormonal, celana yang tidak menyerap keringat, dan penyakit menular seksual. Cairannya berwarna putih, hijau, kuning, berbau, sangat gatal, dan disertai nyeri perut bagian bawah. Jika seseorang mengalami hal seperti itu maka orang tersebut harus segera berobat ke dokter sebelum memasuki persalinannya. Pengobatan akan disesuaikan dengan penyebabnya (Kusmiran,E,2011:21).

Adapun uraian dari keputihan sehingga dapat terjadi selama masa kehamilan yaitu karena adanya peningkatan hormonal selama kehamilan. Dalam hal ini vagina akan mengeluarkan cairan berwarna putih seperti susu, encer dan tidak berbau. Cairan akan bertambah banyak seiring dengan bertambahnya usia kehamilan anda. Hal ini merupakan hal yang wajar, untuk itu kebersihan dan kelembaban disekitar area vagina harus tetap terjaga, juga pakailah pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan menyerap keringat. Namun jika keputihan disertai dengan gatal-gatal dan berbau segera periksa ke dokter anda. Karena dengan kondisi ini kemungkinan terjadi adanya infeksi, jika tidak segera mendapatkan pengobatan dapat menyebabkan perlunakan dalam leher rahim dan akan timbul kontraksi sebelum waktunya.

Seorang wanita lebih rentan mengalami keputihan pada saat hamil karena pada saat hamil terjadi perubahan hormonal yang salah satu dampaknya adalah peningkatan jumlah produksi cairan dan penurunan keasaman vagina serta terjadi pula perubahan pada kondisi pencernaan. Semua ini berpengaruh terhadap

peningkatan resiko terjadinya keputihan, khususnya yang disebabkan oleh infeksi jamur. Selama belum terjadi persalinan dan selaput ketuban masih utuh, dimana janin masih terlindungi oleh selaput ketuban dan air ketuban yang steril, umumnya tidak ada efek langsung infeksi vagina yang menyebabkan terjadinya keputihan pada janin. (Setiawati,D,2013:246)

Berdasarkan tinjauan teoritis dan studi kasus pada Ny “H” dengan flour albus patologis ditemukan banyak persamaan dengan tinjauan teoritis dan studi kasus sehingga tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan Ny “H” dengan flour albus patologis.

B. LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Masalah actual merupakan identifikasi diagnose kebidanan dan masalah berdasarkan interpersi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan (Nurhayati dkk,2013). Dalam menegakkan suatu diagnose atau masalah klien, harus berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif dari hasil pengkajian. Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnose kebidanan dan masalah keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnose tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan kebidanan.

Berdasarkan data yang diperoleh diagnose atau masalah actual pada Ny “H” adalah flour albus patologis, ibu dengan flour albus patologis dengan konsep teori adalah bahwa ibu dengan flour albus patologis adalah ditandai dengan jumlah

cairan yang dikeluarkan banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk. Perempuan yang mengalami keputihan patologis umumnya mempunyai keluhan-keluhan seperti gatal, nyeri, bengkak pada organ kelamin, panas dan pedih ketika buang air kemih (kencing), dan nyeri perut bagian bawah perut. Keputihan patologis kemungkinan disebabkan oleh infeksi atau peradangan yang mungkin disebabkan oleh penyakit menular seksual, gejala keganasan pada organ reproduksi adanya benda asing dalam uterus atau vagina. Keputihan juga disebabkan oleh bagaimana kita dalam merawat organ reproduksi kita, misalnya mencuci vagina dengan air kotor, pemakaian pembilas vagina yang berlebihan, penggunaan celana dalam dengan bahan yang tidak menyerap keringat, jarang mengganti celana dalam, menggunakan pembalut dalam waktu yang relative lama (Citrawati,MD,2014:9).

Ibu dengan riwayat keputihan Uk 26 minggu pada trimester II, dengan GIV PII AI adanya pengeluaran cairan kekuningan, menggumpal, berbau, dan disertai gatal adalah tanda dari keputihan patologis, menurut teori jumlah cairan yang dikeluarkan banyak, berwarna kuning, hijau, merah kecoklatan (karena bercampur darah), putih seperti susu basi, berbau amis/busuk. Perempuan yang mengalami keputihan mempunyai keluhan-keluhan seperti gatal, nyeri, bengkak pada organ kelamin adalah tanda dari keputihan patologis.

Menurut teori Seorang wanita akan lebih rentan mengalami keputihan pada saat hamil karena pada saat hamil terjadi perubahan hormonal yang salah satu dampaknya adalah peningkatan jumlah produksi cairan dan penurunan keasaman

vagina serta terjadi pula perubahan pada kondisi pencernaan. Semua ini berpengaruh terhadap peningkatan resiko terjadinya keputihan, khususnya yang disebabkan oleh infeksi jamur. Selama belum terjadi persalinan dan selaput ketuban masih utuh, dimana janin masih terlindungi oleh selaput ketuban dan air ketuban yang steril, umumnya tidak ada efek langsung infeksi vagina yang menyebabkan terjadinya keputihan pada janin. (Setiawati,D,2013:246).

Dalam tinjauan pustaka di jelaskan bahwa terjadinya keputihan patologis dapat disebabkan oleh beberapa factor yaitu mulai dari adanya infeksi pada vagina yang disebabkan oleh bakteri, virus jamur dan parasit, keputihan juga bisa terjadi karna faktor higiene yang jelek dimana kebersihan vagina yang jelek dapat menyebabkan timbulnya keputihan hal ini terjadi karena kelembapan vagina yang meningkat sehingga bakteri patogen penyebab infeksi mudah menyebar, keputihan juga bisa muncul ketika memakai obat-obatan serta pil Kb dalam jangka waktu lama Karena pemakaian obat-obatan khususnya antibiotic yang terlalu lama dapat menimbulkan system imunitas dalam tubuh, Sedangkan penggunaan KB mempengaruhi keseimbangan hormonal wanita, Stress, alergi dan juga karena adanya infeksi (Setiawati, D,2013: 247-248).

Keputihan/Flour albus yang tidak normal (patologis) biasa disebabkan oleh infeksi/peradangan yang terjadi karena mencuci vagina dengan air kotor, pemeriksaan dalam yang tidak benar, pemakaian pembilas vagina yang berlebihan, pemeriksaan yang tidak higienis, dan adanya benda asing dalam vagina. Selain karena infeksi, keputihan dapat juga disebabkan oleh masalah hormonal, celana

yang tidak menyerap keringat, dan penyakit menular seksual. Cairannya berwarna putih, hijau, kuning, berbau, sangat gatal, atau disertai nyeri perut bagian bawah. Jika seseorang mengalami hal seperti itu, maka orang tersebut harus segera berobat ke dokter. Pengobatan akan disesuaikan dengan penyebabnya (Kusmiran, E, 2011:21)

Menurut penelitian Fauziah (2016) flour albus patologis disebabkan oleh infeksi alat kelamin, benda asing atau penyakit lain dari organ reproduksi (Nurul, 2010), sedangkan Menurut penelitian Nurlan (2013) Faktor pemicu keputihan pada ibu hamil adalah status pendidikan, status nutrisi, rangsangan seksual, stress, dan usia kehamilan (semakin bertambah usia kehamilan maka kadar hormone estrogen dan progesterone akan terus meningkat) hal tersebut menyebabkan angka kejadian keputihan juga semakin meningkat. Karena ibu hamil cenderung akan mengalami keputihan lebih sering dari pada tidak sedang hamil ibu hamil sangat rentan terhadap infeksi karena daya tahan ibu hamil menurun dan meningkatkan kebutuhan metabolisme. (Maharani, S, dkk, 2015:143).

Menurut penelitian Pransiska (2013) Pola makan yang kurang sehat dengan terlalu banyaknya konsumsi makanan ataupun minuman cepat saji yang tidak memenuhi asupan nutrisi gizi seimbang juga dapat memicu terjadinya keputihan. Beban pekerjaan yang Terlalu berat ataupun kurangnya keseimbangan antara aktivitas bekerja dengan aktivitas beristirahat yang tidak seimbang akan memicu terjadinya stres. Stres yang terjadi akan memicu hormone stress yang berakibat

negatif. Pada Beberapa wanita beban stress yang terlalu berat akan Menyebabkan terjadinya keputihan (Khusaiyyah dkk, 2015).

Sedangkan studi kasus Ny “H” mengalami keputihan patologis, dimana keputihan patologis adalah keputihan yang biasanya akan diikuti dengan keluarnya lendir secara berlebihan, bau tidak sedap, menimbulkan gatal, berwarna putih kekuningan, hijau, merah kecoklatan (bercampur darah), dan putih seperti susu basi. Dan salah satu faktor terjadinya keputihan patologis dalam kehamilan adalah kurang menjaga kebersihan daerah genitalia sehingga dapat memudahkan kuman untuk berkembang, dan juga karna pengaruh kelembapan di dalam daerah vagina karena memakai celana yang ketat serta karena selama hamil mengakibatkan meningkatnya suplai darah dan perubahan hormonal, yang kemudian menyebabkan peningkatan produksi lendir ke vagina dari serviks dan perubahan keseimbangan pH pada lapisan vagina, serta penebalan dan melunaknya selaput lendir vagina. Sehingga pada kasus ini ditegakkan diagnosa bahwa ibu mengalami keputihan yang patologi.

C. LANGKAH III MERUMUSKAN DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Antisipasi adanya masalah potensial yang mungkin terjadi pada Ny “H” berdasarkan pengumpulan, pengamatan yang cermat dan observasi jika ada kondisi yang tidak normal apabila tidak mendapat

penanganan segera, akan membawa dampak yang berbahaya sehingga mengancam kondisi Ny “H”

Konsep dasar Keputihan patologis yang dilakukan di RSUD Haji Makassar 1 kali kunjungan dan 3 kali kunjungan rumah perlu diantisipasi terjadinya peningkatan infeksi yang dapat ditandai dengan perubahan warna cairan yang keluar yaitu dari keputihan berubah kekuningan dari kekuningan berubah kehijauan dan kecoklatan (bercampur darah) dengan cairan yang dikeluarkan sangat menggumpal dan berbau amis (Wahdaniah 2011: 90).

Adapun Masalah potensial yang harus diantisipasi pada saat kunjungan rumah yaitu potensial terjadinya peningkatan infeksi, dimana pada saat dirumah kita mengantisipasi peningkatan infeksi dimana peningkatan infeksi ini bisa terjadi karena mencuci vagina dengan air kotor (tidak terjamin kebersihannya), kurang memperhatikan kebersihan vaginanya, Pola makan yang kurang sehat dengan terlalu banyaknya konsumsi makanan ataupun minuman cepat saji yang tidak memenuhi asupan nutrisi gizi seimbang juga dapat memicu terjadinya keputihan. Beban pekerjaan yang Terlalu berat ataupun kurangnya keseimbangan antara aktivitas bekerja dengan aktivitas beristirahat yang tidak seimbang akan memicu terjadinya stres. Stres yang terjadi akan memicu hormone stress yang berakibat negatif. Pada Beberapa wanita beban stress yang terlalu berat akan Menyebabkan terjadinya keputihan (Khusaiyyah dkk, 2015).

Akibat kurangnya perawatan ibu terhadap kebersihan genitalianya sehingga ibu mengalami keputihan yang menunjang perkembangbiakan bakteri

yang menyebabkan timbulnya infeksi akibat dari kelembapan vagina yang meningkat sehingga vagina dapat mengeluarkan cairan yang berwarna putih kekuningan, kental (menggumpal) berbau, dan disertai gatal. karena telah terjadi keputihan pada kehamilan ibu maka perlu dilakukan antisipasi terjadinya peningkatan infeksi karena jika infeksi meningkat (keputihan patologis) dapat menyebabkan dampak buruk pada kehamilan yaitu ibu akan merasa tidak nyaman serta dapat menyebabkan kanker rahim dan kehamilan ektopik, serta pada persalinan dapat menyebabkan KPD, persalinan kurang bulan dan infeksi intra partum, sedangkan dampak keputihan pada janin yaitu dapat menyebabkan kebutaan pada bayi, kematian janin, BBLR, Dan infeksi asendrem (maharani S, 2015 : 138).

Keputihan patologis bisa membawa dampak bahaya pada kehamilan, persalinan dan bayinya jika tidak ditangani dengan baik. Meningkatnya kadar hormone estrogen dan aliran darah ke vagina membuat ibu hamil kerap mengalami keputihan. Untuk mengurangi ketidak nyamanan tersebut bisa dengan menjaga kebersihan vagina. Mengganti celana dalam lebih sering dari biasanya. Tidak menggunakan celana ketat, atau yang tidak menyerap keringat (Fatmawati, S, 2010:23).

Mengingat pada wanita hamil terjadi kenaikan jumlah cairan plasma dalam tubuhnya, mengakibatkan sering buang air kecil, untuk itu diharapkan Jangan memakai celana dalam dari bahan sintesis atau celana ketat Pakailah selalu celana katun, Jangan memakai *panty liner* setiap hari, sesudah mandi keringkan benar-

benar daerah vulva dengan baik sebelum berpakaian/memakai celana dalam, ceboklah dari depan kebelakang setiap berkemih atau buang air besar karena dapat membantu mengurangi kontaminasi mikroorganisme dari saluran kemih dan anus. Jagan terbiasa melakukan irigasi/bilas vagina, memakai tampon, pewangi/spray vagina atau tissue berparfum (Wahdaniah 2011:92).

Adapun penanganan yang bisa diberikan yaitu menggunakan media tanpa obat dan dengan obat yaitu Tanpa Obat Menjaga agar daerah genitalia senantiasa bersih serta memperhatikan sabun yang digunakan sebaiknya sabun yang tidak berparfum, Hindari mandi dengan merendam di tempat umum, Menggunakan celana dalam dari bahan katun, tidak menggunakan celana dalam yang ketat, Menghindari beraktivitas yang terlalu lelah, panas dan keringat yang berlebih, Liburan untuk mengurangi stres karena stress merupakan suatu factor timbulnya keputihan. Sedangkan dengan obat yaitu Konsultasi dengan dokter karena dokter akan memberikan obat-obatan sesuai dengan jenis keputihan yang dialami, Keputihan sangat tidak mengenangkann, terlebih bagi wanita hamil, Untuk keputihan normal tidak perlu dilakukan terapi khusus. Yang penting, bagaimana membersihkan organ intim secara benar dan teratur. Umumnya, cukup dengan sabun khusus vagina dan air bersih serta menjaga agar pakaian dalam tetap kering dan bersih.

Keputihan yang tidak normal harus segera mendapatkan pengobatan media terapi, Keputihan yang terjadi selama kehamilan, misalnya disebabkan oleh infeksi jamur *Candida Sp*, Pengobatan yang paling aman adalah menggunakan

obat local yang berbahan krim atau sejenis kapsul yang dimasukkan kedalam vagina, Keputihann yang dialami wanita hamil aibat infeksi bakteri diberikan obat dalam bentuk kapsul atau tablet yang aman untuk dikomsumsi. Pada infeksi niceriagonorrhoeae, ada obat dalam bentuk kapsul yang dpat diminum. Sebaiknya, segera periksakan kandungan jika terjadi keputihan, Selain pengobatan medis, biasanya orang akan menggunakan daun sirih untuk mengurangi keputihan. Caaranya, dengan meminum air daun sirih yang telah direbus terlebih dahulu. Cara ini cukup aman bagi ibu hamil dan bayinya. Hanya saja karena belum ada penelitian mengenei dosis takaran yang aman bagi wanita hamil, sehingga hal ini kurang dapat dilakukan.

Yang terpenting bila suatu keputihan yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa (antibiotika dan anti jamur) harus dipikirkan keputihan tersebut yang disebabkan oleh suatu penyakit keganasan seperti kanker leher rahim. Ini biasanya ditandai dengan cairan banyak, bau busuk, sering disertai darah tak segar. perlu dilakukan pemeriksaan khusus untuk mendeteksi apakah merupakan gejala-gejala kanker atau bukan (Setiawati, D, 2013:250).

Flour albus patologis menyebabkan rasa tidak nyaman, dan dalam jangka panjang akan menyebabkan beberapa penyakit serius termasuk infeksi panggul dan infertilitas. Tidak hanya bisa berakibat infertilitas, flour albus juga bisa menyebabkan ektopik kehamilan dan juga gejala awal kanker serviks (yulfitria F, 2016).

Penanganan keputihan tergantung dari penyebab infeksi seperti jamur, bakteri atau parasit. Umumnya diberikan obat-obatan untuk mengatasi keluhan dan menghentikan proses infeksi sesuai dengan penyebabnya, obat-obatan yang digunakan dalam mengatasi keputihan biasanya berasal dari golongan flukonazol untuk mengatasi infeksi candida dan golongan metronidasol untuk mengatasi infeksi bakteri dan parasit. Sediaan obat dapat berupa sediaan oral (tablet, kapsul), topical seperti krem yang dioleskan dan uvulva yang dimasukkan langsung ke dalam liang vagina. Untuk keputihan yang ditularkan melalui hubungan seksual, terapi juga diberikan kepada pasangan seksual dan dianjurkan untuk tidak berhubungan seksual selama masih dalam pengobatan (Sibagariang, 2010:66-67).

Menurut Ellya dkk untuk mencegah berulangnya keputihan yaitu dengan Pola hidup sehat, olah raga rutin, istirahat cukup, hindari rokok dan alcohol serta hindari stress berkepanjangan, Setia kepada pasangan, hindari promiskuitas atau gunakan kondom untuk mencegah penularan penyakit menular seksual, Selalu menjaga kebersihan daerah pribadi dengan menjaganya agar tetap kering dan tidak lembab misalnya dengan menggunakan celana dengan bahan yang menyerap keringat, hindari pemakaian celana yang terlalu ketat. Biasakan untuk mengganti pembalut, *panty liner* pada waktunya untuk mencegah bakteri berkembang biak, Penggunaan cairan pembersih vagina sebaiknya tidak berlebihan karena dapat mematikan flora normal vagina. Jika perlu, lakukan konsultasi medis dahulu sebelum menggunakan cairan pembersih vagina, Hindari penggunaan bedak talcum, atau sabun dengan pewangi pada daerah vagina karena dapat menyebabkan iritasi

dan Hindari pemakaian barang-barang yang memudahkan penularan seperti meminjam perlengkapan mandi dsb. Sedapat mungkin tidak duduk di atas kloset di WC umum atau biasakan mengelap dudukan kloset sebelum menggunakannya.

Menurut NS Sallika 2010 Bulu yang tumbuh di daerah kemaluan bisa menjadi sarang kuman bila dibiarkan terlalu panjang. Untuk menjaga kebersihan potonglah secara berkala bulu di sekitar kemaluan dengan gunting atau kamu bisa mencukurnya dengan hati-hati, Menurut koes (2014) untuk mencegah berulangnya keputihan yaitu dengan cara membiasakan untuk membilas vagina setiap kali selesai BAB dan BAK, dengan cara membasuh menggunakan air bersih dari arah depan kebelakang, perhatikan jenis kertas tissue yang digunakan untuk membersihkan daerah vagina (maharani, S, 2015 : 143).

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny “H” dilahan penelitian dapat diantisipasi masalah potensial yaitu potensial terjadinya peningkatan infeksi dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan manajemen kebidanan pada kasus ini ada kesamaan sehingga tidak ada diagnosa potensial terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

D. LANGKAH IV. TINDAKAN KOLABORASI

Menurut Mengkuji dkk (2012) perlunya tindakan segera dan kolaborasi dilakukan jika klien mengalami penyakit atau keluhan yang mengancam maka dilakukan tindakan segera atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menangani kasus keputihan patologis. Tidak ada yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan

kesehatan yang lebih professional sesuai dengan keadaan klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kasus antenatal care pada ibu hamil dengan flour albus patologis penulis melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan seperti antibiotic (Metronidazole), dan cairan antiseptic vagina, Adapun kegunaan dari obat antibiotic berfungsi mencegah terjadinya infeksi.

Umumnya diberikan obat-obatan untuk mengatasi keluhan dan menghentikan proses infeksi sesuai dengan penyebabnya, obat-obatan yang digunakan dalam mengatasi keputihan biasanya berasal dari golongan flukonasol untuk mengatasi infeksi candida dan golongan metronidasol untuk mengatasi infeksi bakteri dan parasit. Sediaan obat dapat berupa sediaan oral (tablet, kapsul), topical seperti krem yang dioleskan dan uvulva yang dimasukkan langsung ke dalam liang vagina. Untuk keputihan yang ditularkan melalui hubungan seksual, terapi juga diberikan kepada pasangan seksual dan dianjurkan untuk tidak berhubungan seksual selama masih dalam pengobatan (Sibagariang, 2010:66-67).

E. LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN (MERENCANAKAN ASUHAN YANG MENYELURUH)

Pada langkah ini direncanakan usaha yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnose yang telah dididentifikasi atau diantisipasi. Dalam konsep manajemen

kebidanan bahwa pelayanan yang diberikan harus disetujui oleh klien, oleh sebab itu harus didiskusikan kebenarannya bersama klien sesuai situasi dan kondisi serta tindakan harus dapat dianalisa secara teoritis.

Dalam membuat perencanaan ini ditemukan tujuan dan criteria yang akan dicapai dalam menerapkan asuhan kebidanan pada Ny “H” dengan flour albus patologis, ini tidak berbeda dengan teori dimana rencana asuhan kebidanan dikembangkan berdasar pada intervensi dan rasional sesuai dengan masalah actual dan potensial pada Ny “H” dengan flour albus patologis.

Pada kasus Ny “H” penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnose/masalah actual dan potensial yang dilakukan di RSUD Haji Makassar yaitu sebagai berikut :

a. Antenatal care

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
2. Jelaskan kepada ibu bagaimana cara mengetahui untuk membedakan cairan yang keluar dari vagina itu normal atau tidak normal
3. Lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk Observasi tanda-tanda vital ibu (Tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan) serta melakukan pemeriksaan fisik terfocus.
4. Melakukan pemeriksaan pada kehamilannya untuk mengetahui keadaan kandungannya dengan pemeriksaan Leopold
5. Anjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan bergizi seimbang

6. Anjurkan ibu untuk tidak terlalu bekerja berat, hindari stres, usahakan untuk olahraga dengan jalan-jalan santai dipagi hari.
7. Sampaikan kepada ibu tentang kondisi yang ia alami
8. Beritahu ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah sebanyak 3 kali, kunjungan pertama pada minggu pertama, kunjungan kedua pada minggu kedua, dan kunjungan ketiga pada minggu ketiga.

b. Keputihan

1. Anjurkan ibu untuk menjaga agar daerah genitalia senantiasa bersih Semua ibu yang mengalami keputihan pada masa kehamilannya dianjurkan untuk menjaga personal hygiene apalagi kehamilan tua ibu akan selalu buang air kecil pada malam hari yang dapat membuat daerah genitalia lembab atau basah yang dapat memicu timbulnya bakteri penyebab dari timbulnya keputihan. serta memperhatikan sabun yang digunakan sebaiknya sabun yang tidak berparfum, menghindari memakai pakaian dalam yang terlalu ketat, dan menghindari beraktifitas yang terlalu lelah, panas dan keringat yang berlebih serta stress.
2. Anjurkan ibu untuk menghindari pemakaian panty liner (cairan pembersih vagina) secara berlebihan karena dapat mematikan flora normal didalam tubuh.

3. Anjurkan ibu setiap Selesa mandi keringkan benar-benar daerah vulva dengan baik sebelum berpakaian/memakai celana dalam.
4. Menganjurkan kepada ibu usahakan untuk Cebok dari depan kebelakang setiap berkemih atau buang air besar karena dapat membantu mengurangi kontaminasi mikroorganismenya dari saluran kemih dan anus.
5. Anjurkan kepada keluarga Jika keputihan yang dialami ibu semakin memburuk dan berpotensi pada saat menjelang persalinannya yaitu salah satu contohnya KPD maka segera rujuk ibu kerumah sakit.
6. Penatalaksanaan pemberian antibiotic dan cairan antiseptic vagina

c. Potensial terjadinya infeksi

1. Ajarkan ibu untuk membasuh vagina setiap kali selesai BAB dan BAK, dengan cara membasuh menggunakan air bersih dari arah depan kebelakang.
2. Observasi adanya tanda-tanda peningkatan infeksi pada vagina dengan cara memerhatikan warna, kepadatan, dan jumlah cairan yang keluar dari vagina ibu. Dari data diatas, terdapat kesesuaian antara teori dan kasus.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan kepada Ny "H" untuk memantau keadaannya setelah pulang kerumah apakah keputihan yang dialaminya berkurang atau bertambah parah, melakukan pemeriksaan TTV, memeriksa keadaan cairan untuk melihat apakah ada tidaknya perubahan setelah diberikan obat antibiotic atau setelah diberikan asuhan melakukan pemeriksaan abdomen dengan melakukan palpasi Leopold, memantau DJJ (detak jantung janin)

dan TBJ (tafsiran berat janin), rencana asuhan yang diberikan yaitu anjurkan ibu untuk selalu mengingat kebersihan dirinya terutama genitalianya karena daerah genitalia adalah salah satu daerah yang sangat mudah untuk pertumbuhan kuman karena pengaruh kelembapan atau perubahan keasaman pH vagina yang meningkat, mengingatkan kepada ibu untuk memerhatikan makanan yang dikonsumsinya alangkah baiknya memakan makanan yg diolah sendiri dari pada memakan makanan yg siap saji tanpa memperhatikan kebersihannya, anjurkan ibu untuk olahraga pagi dengan istirahat yang cukup hindari bekerja berat yang dapat membuat ibu kelelahan dan hindari stress karena stress dapat memicu timbulnya keputihan akibat perubahan keseimbangan hormonal dalam tubuh, mengingatkan kepada ibu untuk tidak lupa meminum obat yang diberikan oleh dokter untuk mengurangi infeksi pada vagina

Berdasarkan tinjauan teoritis asuhan yang diberikan Pada Ny “H” trimester II dengan flour albus patologis adalah tindakan umum pada flour albus patologis. Secara umum untuk mempertahankan kebersihan tubuh ibu termasuk daerah vagina karena daerah vagina sangat rentan terhadap infeksi, karena daerah vagina mudah mengalami kelembapan apabila kebersihan genitalia tidak terjaga dengan baik dapat mempermudah pertumbuhan bakteri pathogen dalam vagina. Adapun prinsip-prinsip pencegahan infeksi adalah termasuk mencuci vagina dengan cara yang benar dari arah depan kebelakang dengan menggunakan air bersih setiap selesai BAB/BAK, hindari memakai pakaian dalam yang ketat, memakai cairan pembersih vagina yang dianjurkan oleh dokter, usahakan bulu kemaluan tidak terlalu lebat karena dapat memicu kelembapan dan sarang bagi kuman-kuman yang dapat menyebabkan

keputihan. Sebagai langkah awal jika ibu mengalami keputihan yang sudah sangat parah yg berwarna kecoklatan karna bercampur darah atau kehijauan segera bawa ibu ke RS untuk ditangani segera agar tidak berdampak bahaya pada kehamilan, persalinan dan bayinya.

Perubahan warna pada keputihan menjadi lebih berbahaya, mencerminkan kondisi ibu yang harus diwaspadai karena dapat berdampak pada kehamilan, persalinan dan bayinya, oleh karena itu harus dilakukan pemantauan dengan baik pada warna cairan setiap melakukan kunjungan rumah agar dapat diberikan obat antibiotik untuk penanganan sementara, mengingatkan kepada ibu untuk selalu menjaga kebersihan daerah genitalianya dan hindari apa saja yang dilarang oleh bidan untuk tidak melakukannya agar keputihan bisa diobati secara perlahan-lahan.

Menurut teori yang didapatkan pada buku *Kehamilan dan pemeriksaan kehamilan* Seorang wanita akan lebih rentan mengalami keputihan pada saat hamil karena pada saat hamil terjadi perubahan hormonal yang salah satu dampaknya adalah peningkatan jumlah produksi cairan dan penurunan keasaman vagina serta terjadi pula perubahan pada kondisi pencernaan. Semua ini berpengaruh terhadap peningkatan resiko terjadinya keputihan, khususnya yang disebabkan oleh infeksi jamur. Selama belum terjadi persalinan dan selaput ketuban masih utuh, dimana janin masih terlindungi oleh selaput ketuban dan air ketuban yang steril, umumnya tidak ada efek langsung infeksi vagina yang menyebabkan terjadinya keputihan pada janin. (Setiawati,D,2013:246)

Rencana tindakan sudah disusun berdasarkan diagnose /masalah actual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus dilahan praktek.

F. LANGKAH VI IMPLEMENTASI (MELAKSANAKAN PERENCANAAN DAN PENATALAKSANAAN)

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerja sama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan (Manguji dkk, 2012). Pada saat dilakukan tindakan pada ibu yang pertama dilakukan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan untuk pencegahan terjadinya infeksi.

Pada studi kasus Ny “H” dengan flour albus patologis semua tindakan yang telah ditencanakan seperti melakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk Observasi tanda-tanda vital ibu (Tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan) serta melakukan pemeriksaan fisik terfokus. Melakukan pemeriksaan pada kehamilannya untuk mengetahui keadaan kandungannya dengan pemeriksaan Leopold, menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan bergizi seimbang, menganjurkan ibu untuk tidak terlalu bekerja berat, hindari stres, usahakan untuk olahraga dengan jalan-jalan santai dipagi hari, Menganjurkan kepada ibu untuk mengganti pakaian dalam 3 kali sehari dan apabila sudah kotor dan lembab/basah.

Pada keputihannya asuhan yang diberikan selama kunjungan rumah yaitu menganjurkan ibu untuk menjaga agar daerah genitalia senantiasa bersih. Semua ibu yang mengalami keputihan pada masa kehamilannya dianjurkan untuk menjaga personal hygiene apalagi kehamilan tua ibu akan selalu buang air kecil pada malam hari yang dapat membuat daerah genitalia lembab atau basah yang dapat memicu timbulnya bakteri penyebab dari timbulnya keputihan. serta memperhatikan sabun yang digunakan sebaiknya sabun yang tidak berparfum, menghindari memakai pakaian dalam yang terlalu ketat, dan menghindari beraktifitas yang terlalu lelah, panas dan keringat yang berlebih serta stress, menganjurkan ibu untuk menghindari pemakaian panty liner (cairan pembersih vagina) terlalu berlebih karna dapat mematikan flora normal didalam tubuh, menganjurkan kepada keluarga Jika keputihan yang di alami ibu semakin memburuk dan berpotensi pada saat menjelang persalinannya yaitu salah satu contohnya KPD maka segera rujuk ibu kerumah sakit, dan melakukan pemberian antibiotic dan cairan antiseptic vagina.

Untuk mencegah terjadinya infeksi, memberikan ibu asuhan dengan Mengajarkan ibu untuk membilas vagina setiap kali selesai BAB dan BAK, dengan cara membasuh menggunakan air bersih dari arah depan ke belakang, dan Mengobservasi adanya tanda-tanda peningkatan infeksi pada vagina dengan cara memerhatikan warna, kepadatan, dan jumlah cairan yang keluar dari vagina ibu. Dari data diatas, terdapat kesesuaian antara teori dan kasus.

Pada kunjungan pertama pada Ny “H” setelah dilakukan pemeriksaan dan melakukan asuhan yang dianjurkan masih tampak tetap sama ibu masih mengeluh

keluar cairan kental berwarna putih kekuningan Ibu mengatakan sudah 3 hari mengalami pengeluaran cairan tersebut Ibu mengatakan cairan yang keluar berbau dan kadang gatal pada vaginanya.

Pada Kunjungan kedua sudah tampak ada perubahan keluhan yang dialami sudah agak berkurang sedikit-demi sedikit, yaitu cairan yang keluar masih kekuningan, tetapi rasa gatal yang dialaminya sudah berkurang, cairan yang keluar dulunya banyak sekarang sudah berkurang, dan bau pada keputihannya sudah tidak berbau amis tetapi jika ibu sangat merasa lelah kadang baunya kembali.

Pada kunjungan Ketiga sudah mengalami banyak perubahan cairan yang keluar sudah tidak tampak kekuningan, gatal yang dirasakan sudah jarang dialaminya, cairan yang keluar sudah berkurang (tidak menggumpal), bau amis yang dialaminya sudah menghilang, ibu sangat senang dengan perubahan yang dialaminya, ibu kembali merasa nyaman, tidak lagi merasa cemas dan stress kepada keputihan yang dialaminya.

Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Pada tahap pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny “H” dari tinjauan pustaka penulis melaksanakan tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan perencanaan yaitu melakukan kunjungan kepada ibu hamil dengan keputihan, sebanyak 3 kali kunjungan. kunjungan pertama pada minggu pertama, kunjungan ke dua pada minggu kedua, kunjungan ketiga pada minggu ketiga kehamilan dilakukan di rumah ibu.

Pada tahap ini penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan asuhan dari pembimbing dilahan praktek sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus.

G. LANGKAH VII. EVALUASI

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah akan benar-benar akan terpenuhi dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnose dan masalah rencana tersebut memang efektif jika memang benar dalam pelaksanaannya. Proses evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang diberikan kepada klien dengan berpedoman pada masalah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil evaluasi setelah asuhan kebidanan yang dilaksanakan selama 4 kali kunjungan dalam 3 minggu yaitu pada kunjungan pertama selama 3 jam yaitu tanggal 20 maret 2017 di RSUD Haji, kunjugan kedua 6 hari setelah pemeriksaan pertama di RSUD Haji pada tanggal 26 maret 2017 dirumah klien, kunjungan ketiga 1 minggu setelah kunjungan kedua yaitu tanggal 2 april 2017, kunjungan ke empat 1 minggu setelah kunjungan ketiga yaitu tanggal 9 april 2017 yang dilakukan dirumah klien

Pada kasus Ibu hamil dengan flour albus patologis Ny “H” pada hari pertama masalah yang dialami akan diatasi dengan mengajarkan ibu untuk menjaga agar daerah genetalia senantiasa bersih Semua ibu yang mengalami keputihan pada masa

kehamilannya dianjurkan untuk menjaga personal hygiene apalagi kehamilan tua ibu akan selalu buang air kecil pada malam hari yang dapat membuat daerah genitalia mudah lembab atau basah yang dapat memicu timbulnya bakteri penyebab dari timbulnya keputihan. serta memperhatikan sabun yang digunakan sebaiknya sabun yang tidak berparfum, menghindari memakai pakaian dalam yang terlalu ketat, dan menghindari beraktifitas yang terlalu lelah, panas dan keringat yang berlebih serta stress, pemberian obat oral seperti metrodinazol 3 x 1 dan krem, kemudian pada evaluasi kunjungan kedua keadaan ibu sudah mulai mengalami kemajuan ditandai dengan berkurangnya rasa gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah jarang dialaminya (Berkurang), cairan yang keluar dulunya banyak sekarang sudah agak berkurang, bau yang keluar dari keputihannya sudah tidak berbau amis tetapi jika ibu merasa sangat lelah kadang baunya kembali (Bau amis), kunjungan ketiga (kunjungan terakhir) keadaan ibu jauh lebih membaik ibu tidak lagi merasa gelisah dari sebelumnya karena Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak terlalu berwarna putih kekuningan, Gatal yang dirasakan ibu selama keputihan sudah tidak terlalu dialaminya cuman 1 atau 2 kali saja ibu merasa gatal, cairan yang keluar dulunya banyak sekarang agak berkurang, Ibu mengatakan bau yang keluar dari keputihannya sudah tidak berbau amis, Ibu mengatakan cairan yang keluar sudah tidak lagi kental (menggumpal), tanda-tanda vital dalam batas normal.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan pertama di RS sampai 3 minggu berikutnya yang dilakukan secara bertahap, maka ibu dengan keputihan patologis yang disebabkan oleh infeksi karena kurangnya perawatan pada daerah

genitalia dan tidak ada komplikasi yang terjadi sehingga semuanya berlangsung normal. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.



BAB V

PENUTUP

Setelah membahas dan menguraikan kasus Ny “H” antenatal care pada ibu hamil dengan flour albus patologis di RSUD Haji Makassar maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

1. Melaksanakan pengkajian pada Ny “H” melalui anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian data yang diperoleh di analisis menjadi data subjektif dan objektif
2. Mengidentifikasi diagnose atau masalah actual pada Ny “H” masa kehamilan dengan flour albus patologis dan diagnose atau masalah potensial adalahantisipasi terjadinya peningkatan infeksi
3. Dari diagnose / masalah pada Ny “H” diperlukan adanya kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obatan yaitu oral antibiotic, dan caian antiseptic vagina.
4. Merencanakan asuhan kebidanan pada Ny “H” pada masa kehamilan dengan flour albus patologis.
5. Melaksanakan asuhan kebidanan pada Ny “H” masa kehamilan dengan flour albus patologis
6. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan pada Ny “H” masa kehamilan dengan flour albus patologis bahwa masalah tersebut dapat diatasi.

7. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan pada Ny “H” masa Antenatal care pada ibu hamil dengan flour albus patologis dalam bentuk SOAP.
8. Mengintegrasikan menurut islam pada Ny “H” masa kehamilan dengan flour albus patologis dalam bentuk ayat suci Al-Qur’an dan terjemahan.

B. Saran

1. Untuk Klien

- a. Diharapkan pada setiap ibu hamil agar mengkomsumsi makanan yang bergizi karena makanan yang bergizi akan memenuhi kebutuhan energi.
- b. Diharapkan pada setiap ibu hamil agar senantiasa memperhatikan kebersihan dirinya terutama daerah genitalianya untuk mencegah terjadinya peningkatan infeksi pada vagina.
- c. Diperlukan keterlibatan suami / keluarga untuk memerhatikan kesehatan ibu dan bayinya, agar ibu tidak terlalu stress dan kelelahan.

2. Untuk bidan

- a. Sebagai petugas kesehatan khususnya seorang bidan diharapkan senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih professional berdasarkan manajemen kebidanan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan
- b. Diharapkan bidan dalam memberikan asuhan kepada klien menerapkan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan sebagai pertanggung jawaban apabila ada gugatan

c. Dalam pandangan islam dalam memberikan asuhan kepada klien harus menerapkan kaidah agama didalamnya agar klien dapat mengerti tentang pentingnya bersuci (dalam keadaan bersih).

3. Untuk tenaga kesehatan di RSUD Haji Makassar

Sebaiknya pihak RSUD Haji khususnya yang bertugas di Ruang ANC, Lebih meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil mengajarkan kepada ibu menjaga personal hygiene nya karena banyak sekali ibu hamil yang menganggap bahwa keputihan hanyalah gejala yang biasa saja, hanya sementara dan tidak berbahaya, dan menjelaskan kepada semua ibu hamil bahaya yang dapat ditimbulkan oleh keputihan.

4. Institusi

Menyediakan tenaga pengajar yang professional yang dapat membimbing mahasiswa dalam proses belajar mengajar.\

DAFTAR PUSTAKA

- Joseph & Nugroho, *Ginekologi Dan Obstetri (Obsgyn)*, Yogyakarta:Grahamedika, 2011.
- Rusmiati Dewi Dkk. "Potensi Anti Jamur Cabagge (*Brassica Oleracea* Var. *Capitata Alba*) Extrat Terhadap *Candida Alicans* Untuk Mengobati Tepung Albus "E-Jurnal Vol 9 Issue 6, 2016.
- Yuniarti Dkk. "Garddnerella Vaginalis Atcc Terhadap Metrodinasol Dan Pembuatan Daun Sirsak "Jurnal Eropa Farmasi" Vol. 3 No 3 Tahun 2016.
- Sari Merita Pety. "Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Kejadian Flour Albus Remaja Putrid Smkf X Kediri " Jurnal Wiyata Vol. 3 No 1 Tahun 2016.
- Khuzaiyyah Siti Dkk, "Karasteristik Wanita Denga Flour Albus " E-Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIK) Vol VII, NO 1, Maret 2016.
- Maharani Srinalesti Dan Debby Natalia ."Perawatan Organ Reproduksi Dan Kejadian Keputihan Pada Ibu Hamil " E.-Jurnal STIKES U' Budiayah Vol 8, No.2, Desember 2015.
- Manuaba Dkk.*Kesehatan Reproduksi Untuki Mahasiswa Bidan*,Jakarta:Buku Kedokteran EGC,2013.
- Purwaningsih,W & Fatmawati,S, *Asuhan Keperawata Maternitas*,Yogyakarta:Graha Medika,2010.
- Hasbullah,MA,*Tuntunan Praktis Dan Padat Bagi Ibu Hamil*,Bogor:Pustaka Ibnu Umar,2010.
- Manuaba,SD,*Buku Ajar Ginekologi Untuk Mahasiswa Kebisanan*,Jakarta:Buku Kedokteran EGC,2012.
- Porwoastuti,E&Wahyuni,SE. *Ilmu Obstetric & Ginekologi Social Untuk Kebidanan*.Yogyakarta: PT Pustaka Baru,2015.
- Setiawati,D,*Kehamilandan Pemeriksaan Kehamilan*,Alauddin,2013.
- Tresnawati,F,*Asuhan Kebidanan*,Jakarta:PT. Prestasi Pustakaraya,2012.
- Azhar,M,*Panduankesehatan Wanaita*,Solo:AS-SALAM GROUP,2013.


Citrawati,MD,*System Reproduksi Manusia*.Yogyakarta:Graha Ilmu.2014

B,Pribakti,*Kiat Mendapatkan Bayi Normal*,Jakarta:CV Sagung Seto.2010

NS Sallika,*Serba Serbi Kesehatan Perempuan*,Jakarta Selatan:Kawah Media,2010.

Ongga TP,*Kitab Kehamilan Dan Persalinan*,Yogyakarta: Mitra Buku,2012.

Sibagariang,EE,*kesehatan reproduksi wanita*,Jakarta: Trans info media,2010.



RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PENULIS

1. Nama : **MEGAWATI**
2. NIM : 70400114009
3. Tempat/Tanggal Lahir : Padangloang, 29 januari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Samata
7. Nama orang tua
 - a. Ayah : Jamaludding
 - b. Ibu : Nurhayati

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD : SD Negeri 28 Pangi Pangi Tahun 2008
2. Tamat SMP : SMP Negeri 2 Bulukumba Tahun 2011
3. Tamat SMA : SMA Negeri 10 Rilau Ale Tahun 2014
4. Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan