

**PERBEDAAN KONDISI LUKA SEBELUM DAN SETELAH PERAWATAN
DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK MODERN DRESSING
PADA PENDERITA ULKUS DIABETIKUM
DI KLINIK GRIYA AFIAT MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ANDI SYAHPUTRA

NIM: 70300114004

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Perbedaan Kondisi Luka Sebelum Dan Setelah Perawatan Dengan Menggunakan Tehnik Modern Dressing Pada Penderita Ulkus Diabetikum Di Klinik Griya Afiat Makassar", yang disusun oleh Andi Syahputra, NIM: 70300114004, Mahasiswa Jurusan Keperawatan, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis 15 November 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan.

Makassar, 15 November 2018 M
07 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Huriati, S.Kep, Ns, M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.i	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Maria Ulfah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIM 19930204400121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGATAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis	6
D. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif.....	6
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Diabetes Mellitus.....	16
B. Tinjauan Umum Perawatan Luka dengan Modern Dressing.....	36
C. Tinjauan Agama Terhadap Penyakit Diabetes Melitus	53
D. Kerangka Konsep	55

E. Kerangka Kerja	56
-------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	58
--------------------------	----

B. Tempat dan Waktu Penelitian	58
--------------------------------------	----

C. Populasi dan Sampel	59
------------------------------	----

D. Teknik Sampling.....	59
-------------------------	----

E. Teknik Pengumpulan Data	60
----------------------------------	----

F. Instrumen Penelitian	60
-------------------------------	----

G. Pengelolah Data	60
--------------------------	----

H. Analisa Data.....	61
----------------------	----

I. Etika Penelitian.....	62
--------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
--	----

B. Hasil Penelitian	64
---------------------------	----

C. Pembahasan	67
---------------------	----

D. Keterbatasan Penelitian.....	98
---------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
---------------------	----

B. Saran	99
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang masih tercurah kepada penulis, sehingga skripsi ini yang berjudul “**PERBEDAAN KONDISI LUKA SEBELUM DAN SETELAH PERAWATAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK MODERN DRESSING PADA PENDERITA ULKUS DIABETIKUM DI KLINIK GRIYA AFIAT MAKASSAR**” dapat terselesaikan, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua ku yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita Ayahanda **Darsono Malaka** & Ibunda **Nur Mala** atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Untuk segenap keluarga besar khususnya saudara kandung **Andi Ulil Syafitra** yang telah memberikan kasih sayang, arahan, serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si** beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**, para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan kepada penyusun selama mengikuti

pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Ketua Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak selaku pembimbing I **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** dan Ibu **Maria Ulfa Ashar S.Kep., Ns., M.Kep** selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Ibu **Huriati S.Kep., Ns., M.Kes** selaku penguji bidang kompetensi keilmuan dan Bapak **Muhsin Mahfudz M.Thi** selaku penguji integrasi keislaman, yang bersedia memberikan waktu dan memberikan masukan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak **Saldi Yusuf, S.Kep., Ns., MHS, ETN** selaku Kepala Klinik Griya Afiat beserta seluruh staf yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian hingga selesai.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membimbing dalam mendidik penulis selama pendidikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Keperawatan Angkatan 2014 (SIL14) atas kebersamaannya bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka dalam proses menggapai cita.
9. Kepada kakanda senior **Abdul Haris Haery, S.Kep.Ns** yang senantiasa selalu meluangkan waktunya membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Saudari **Anis Astari Arman** yang selalu memberikan motivasi dan selalu ada meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
11. Kepada Adnan, Himan, Ika, Rita, Nung, Aspi, Devi, Tyas, Asmi, dan Nurul sahabat seperjuangan dalam menggapai gelar sarjana bersama-sama. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya selama ini kepada penulis.

12. Kepada Coppeng Squad terimah kasih telah memberikan motivasi dan dukungannya selama ini dan telah menyediakan tempat berkumpul.
13. Kepada HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual dalam mencapai tujuan insan cita pencipta, pengabdian dan bernafaskan islam.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Gowa, November 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Penulis
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Andi Syahputra
NIM : 70300114004
Tempat, Tanggalahir : Selayar, 25 Maret 1997
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok D3 No.11
Judul : Perbedaan Kondisi Luka Sebelum dan Setelah Perawatan
Dengan Menggunakan Teknik Modern Dressing Pada
Penderita Ulkus Diabetikum Di Klinik Griya Afia
Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Gowa, November, 2018
Penyusun,

ANDI SYAHPUTRA
NIM : 70300114004

ABSTRAK

Nama : Andi Syahputra
Nim : 70300114004
Judu : Perbedaan Kondisi Luka Sebelum dan Setelah Perawatan
Dengan Menggunakan Teknik Modern Dressing Pada Penderita Ulkus Diabetikum Di Klinik Griya Afiat Makassar.

Ulkus diabetik adalah salah satu bentuk komplikasi kronik Diabetesmellitus berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang dapat disertai adanya kematian jaringan setempat. Kerusakan jaringan kulit yang dimulai dari epidermis, dermis, jaringan subkutan dan dapat menyebar ke jaringan yang lebih dalam, seperti tulang dan otot. Penatalaksanaan yang dapat dilakukan untuk menangani ulkus diabetikum terdiri dari penatalaksanaan farmakologi dan non farmakologi. Salah satu intervensi yang dapat diberikan untuk menangani masalah ulkus diabetikum secara non farmakologi yaitu dengan melakukan perawatan modern dressing. Tujuan penelitian ini adalah untuk diketahuinya perbedaan kondisi luka sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum. Desain penelitian ini yaitu *pre eksperiment* dengan pendekatan *one group pre and post test design*. Sampel pada penelitian berjumlah 15 responden dengan menggunakan teknik *Acidental Sampling*. Pengambilan data yang dilakukan di klinik griya afiat dengan menggunakan lembar observasi BWAT (*Bates Jensen Wound Assesment Tool*) pada tanggal 29 agustus 2018 sampai 29 september 2018. Analisa data yang digunakan yaitu *Uji Wilcoxon*. Berdasarkan hasil penelitian pada kondisi luka sebelum dan sesudah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum didapatkan hasil rerata 35,00 menjadi 31,00. Dari hasil p-value perhitungan *uji wilcoxon* yang berarti memiliki makna H1 diterima ada perbedaan kondisi luka sebelum dan sesudah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum di Klinik Griya. Rekomendasi bagi penelitian ini adalah dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun tenaga perawat untuk dapat menggunakan modern dressing sebagai perawatan luka modern.

Kata Kunci : Kondisi luka, Modern Dressing, Ulkus Diabetikum.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	6
Tabel 1.2	Kajian Pustaka.....	12
Tabel 2.1	Dasar Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah	21
Tabel 2.2	Stadium Luka Diabetes	31
Tabel 2.3	Penilaian Instrumen BWAT	40
Tabel 2.4	Jenis Balutan Luka.....	50
Tabel 3.1	Desain Penelitian	58
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Modern Dressing Berdasarkan Umur Di Klinik Griya Afiat Makassar	65
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Modern Dressing Berdasarkan Jenis Kelamin Di Klinik Griya Afiat Makassar	66
Tabel 4.3	Distribusi Rata-Rata Penyembuhan Luka Ulkus Diabetik Sebelum Rawat Luka Modern Dressing Di Klinik Griya Afiat Makassar	67
Tabel 4.4	Distribusi Tingkat Luka Ulkus Sebelum Rawat Luka Modern Dressing Di Klinik Griya Afiat Makassar	67
Tabel 4.5	Distribusi Rata-Rata Penyembuhan Luka Ulkus Diabetik Setelah Rawat Luka Modern Dressing Di Klinik Griya Afiat Makassar	71
Tabel 4.6	Distribusi Tingkat Luka Ulkus Setelah Rawat Luka Modern Dressing Di Klinik Griya Afiat Makassar	71
Tabel 4.7	Distribusi Proses Penyembuhan Luka Ulkus Diabetik Di Klinik Griya Afiat Makassar	76
Tabel 4.8	Distribusi Perbedaan Proses Penyembuhan Luka Ulkus Diabetik Sebelum dan Setelah Rawat Luka Modern Dressing Di Klinik Griya Afiat Makassar	77

DAFTAR BAGAN

2.1 Terjadinya Luka Diabetes	29
2.2 Kerangka Konsep	56
2.3 Kerangka Kerja	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Standar Operasional Prosedur (SOP).....
Lampiran II	Lembar Permohonan Menjadi Responden.....
Lampiran III	Lembar Persetujuan Responden.....
Lampiran IV	Lembar Instrumen (Observasi).....
Lampiran V	Dokumentasi Penelitian.....
Lampiran VI	Master Tabel.....
Lampiran VII	Uji SPSS.....
Lampiran VIII	Surat Izin Penelitian.....
Lampiran IX	Surat Keterangan Telah Meneliti.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik menahun yang diakibatkan oleh pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif sehingga dapat mengakibatkan terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah (Kemenkes, 2014).

Menurut *American Diabetes Association* (ADA) (2005), Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Hiperglikemia kronik pada diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ tubuh, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah (Soegondo, 2009)

World Health Organization (WHO) memperkirakan tahun 2025 penderita diabetes usia 20 tahun adalah 300 juta orang dan akan mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun 2000 yaitu 150 juta orang (Sudoyo, 2009).

Menurut *International Diabetes Federation* (2015), kasus DM sebesar 8,3% dari seluruh penduduk dunia dan mengalami peningkatan 378 juta kasus. Indonesia merupakan negara ke 7 penderita DM terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Mexico dengan 8,5 juta penderita pada

kategori dewasa. Data Riskesdas RI (2013), diperoleh data bahwa proporsi penyebab kematian akibat diabetes mellitus pada usia 45 sampai 54 tahun di daerah perkotaan menduduki ranking kedua yaitu 14,7% dan daerah pedesaan menduduki rangking ke enam yaitu 5,8%. Sedangkan menurut Sulisyowati (2015) memaparkan bahwa, untuk pravalensi dengan penderita ulkus kaki diabetik sekitar 15% dengan resiko amputasi 30%. Angka mortalitas 32%, dan di indonesia ulkus kaki diabetik merupakan penyebab paling besar untuk dilakukan perawatan dirumah sakit sebesar 80%. Kewaspadaan terhadap persoalan kesehatan kaki diabetes di indonesia juga masih sangat kurang. Sarana pelayanan kaki diabetik yang masih terbatas dan kurangnya tenaga kesehatan terlatih tentang pelayanan kaki diabetik menyebabkan pelayanan kaki pada pasien diabetes di indonesia masih kurang diperhatikan (PERKENI, 2011).

Berdasarkan riskesdas 2013, pravalensi diabetes mellitus di provinsi sulawesi selatan yang terdiagnosis atau berdasarkan gejala pada usia ≥ 15 tahun sebanyak 3,4% dan jumlah tersebut termasuk dalam peringkat ke-3 tertinggi diantara provinsi yang ada di indonesia (kemenkes, 2013). Menurut laporan pemberantasan penyakit tidak menular dinas kesehatan provinsi sulawesi selatan, penyakit diabetes mellitus menempati urutan ke-2 penyakit terbanyak di wilayah sulawesi selatan yakni sebesar 16,99% setelah penyakit kardiovaskular (Dinas Kesehatan Prov.SulSel, 2015).

Di kota Makassar, peningkatan kasus diabetes mellitus menempati urutan ke-2. kabupaten dengan pravalensi yang di diagnosis tertinggi sebesar 2,5% dan di diagnosis dokter atau berdasarkan gejala sebesar 5,3% di antara beberapa provinsi yang ada disulawesi selatan (Dinas kesehatan Prov SulSel, 2015).

Berdasarkan data dari survailans penyakit tidak menular, kasus baru diabetes mellitus dikota makassar tahun 2015 yaitu 21.018 kasus. Adapun kematian akibat DM terdapat 811 kasus (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2015). Selain menyebabkan kematian, penyakit diabetes mellitus dapat meyebabkan munculnya beberapa komplikasi penyakit pada penderita seperti ulkus diabetikum.

Griya afiat makassar merupakan klinik perawatan luka diabetes yang terletak di Sungguminasa kabupaten Gowa, menurut data yang didapatkan dari Griya Afiat pada tahun 2015 jumlah pasien sebanyak 509 orang dimana laki-laki berjumlah 193 orang dan perempuan berjumlah 316 orang dan pada tahun 2016 jumlah pasien sebanyak 723 orang dimana laki-laki berjumlah 325 orang dan perempuan 398 orang sedangkan pada tahun 2017 jumlah pasien 1022 orang dengan presentase laki-laki 385 orang dan perempuan 637 orang. Dari data keseluruhan untuk tiga tahun terakhir terdapat pasien ulkus diabetik yang melakukan perawatan di Griya Afiat sebayak 2254 orang dimana laki-laki 903 orang dan perempuan 1351 orang. sehingga dapat disimpulkan bahwa Griya Afiat dapat dijadikan lokasi untuk penelitian perbedaan kondisi luka sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum (Griya Afiat, 2018).

Kadar gula darah yang tinggi secara berkepanjangan pada penderita DM dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi jika tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Komplikasi yang sering terjadi antara lain, kelainan vaskuler, retinopati, nefropati, neuropati dan ulkus kaki diabetik. Ulkus kaki diabetikum tergolong luka kronik yang sulit sembuh. Kerusakan jaringan yang

terjadi pada ulkus kaki diabetik diakibatkan oleh gangguan neurologis (neuropati) dan vaskuler pada tungkai (Smeltzer & Bare, 2008).

Ulkus diabetikum merupakan adanya luka atau rusaknya barier kulit sampai ke seluruh lapisan dari dermis dan proses penyembuhannya cenderung lambat. Ulkus pada kulit dapat mengakibatkan hilangnya epidermis hingga dermis dan bahkan lemak subkutan (Angale, 2013).

Komplikasi jangka panjang dari diabetes mellitus salah satunya adalah ulkus diabetik (15%) dan merupakan penyebab terbanyak (85%) terjadinya amputasi pada pasien diabetes mellitus (ADA, 2015). Adanya luka terbuka pada kulit akan memudahkan invasi dari bakteri, beberapa penelitian menunjukkan sekitar 40-80% ulkus diabetik mengalami infeksi (Richard *et al.*, 2011). Infeksi ulkus diabetik jika tidak ditangani dengan serius akan menyebar secara cepat dan masuk ke jaringan yang lebih dalam (Scott, 2013). Infeksi yang berat pada jaringan lunak dan tulang seringkali berakhir pada tindakan amputasi (McCallum & Tagoe, 2012). Beberapa penelitian menunjukkan, sekitar 13-40% pasien ulkus diabetik memerlukan tindakan amputasi (Khanolkar *et al.* 2008). Kondisi pasien pasca amputasi pun tidak sepenuhnya baik, sekitar 14,3% pasien akan meninggal dunia setelah satu tahun diamputasi dan sekitar 37% pasien akan meninggal dunia setelah 3 tahun tindakan amputasi (Waspadji, 2014).

Pengobatan diabetes memerlukan waktu yang lama karena diabetes merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur hidup dan sangat kompleks tidak hanya membutuhkan pengobatan tetapi juga perubahan gaya hidup sehingga seringkali pasien tidak patuh dan cenderung menjadi putus asa

dengan program terapi yang lama, kompleks dan tidak menghasilkan kesembuhan (Aini, 2011).

Allah SWT berfirman dalam Q.S Az-Zumar/39:53 yang berbunyi:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya :

“Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Firman Allah pula surah An-Najm/53:39 yang berbunyi:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahnya :

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Perawatan luka mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga perawat dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang adekuat terkait dengan proses perawatan luka yang dimulai dari pengkajian yang komprehensif, perencanaan yang tepat, tindakan dan evaluasi hasil yang ditentukan selama perawatan serta dokumentasi hasil yang sistematis (Agustina 2009). Lingkungan yang lembab akan memberikan dukungan pergerakan sel epitel dan memfasilitasi penutupan luka. Perawatan luka dengan menggunakan prinsip moisture balance ini dikenal sebagai metode *modern dressing* dan memakai alat ganti balut yang lebih modern, dimana disebutkan dalam beberapa literature lebih efektif untuk proses penyembuhan luka. Perawatan luka yang tertutup dengan *modern dressing* memiliki tingkat penyembuhan lebih cepat

dibandingkan luka yang tertutup dengan kasa. *Modern dressing* mampu untuk mempertahankan lingkungan lembab yang seimbang dengan permukaan luka, metode perawatan luka ini telah mulai berkembang di Indonesia (Broussard dan Power, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran kondisi luka sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi luka sebelum perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum?
2. Bagaimana kondisi luka setelah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum?
3. Apakah ada perbedaan kondisi luka sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum?

C. Hipotesis

Ho : Tidak ada perbedaan kondisi luka sebelum dan sesudah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum.

H1 : Ada perbedaan kondisi luka sebelum dan sesudah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1.1 Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

Variabel	Definisi	Alat Ukur	Kriteria .	Skala Ukur
----------	----------	-----------	------------	------------

	Oprasional		Objektif	
Independen				
Modern Dressing	<i>Modern dressing</i> merupakan metode perawatan luka modern yang memperhatikan tiga tahap, yakni mencuci luka, membuang jaringan mati dan memilih balutan	SOP Modern Dressing	Setiap responden diberikan perawatan modern dressing dari awal sampai akhir	Nominal
Dependen				
Ulkus Diabetikum	Ulkus diabetikum merupakan salah satu komplikasi penyakit diabetes, yang merupakan luka terbuka pada lapisan kulit epidermis, dermis, dan hypodermis yang biasanya terjadi di telapak kaki.	Skala BWAT (<i>Bates Jensen Wound Assesment Tool</i>) (Harris, 2009 dimodifikasi oleh Handayani 2010).	13 item pengkajian, meliputi : a. Ukuran 0 = Sembuh, luka terselesaikan panjang x lebar 1 = < 4 cm 2 = 4 s/d < 16 cm ² 3 = 16 s/d < 80 cm ² 4 = 36 s/d < 80 cm ² 5 = > 80 cm ² b. Kedalaman 0= sembuh, luka terselesaikan 1. Eritema atau kemerahan 2. Leserasi lapisan epidermis dan atau dermis 3. Seluruh lapisan kulit hilang, kerusakan atau nekrosis subkutan, tidak mencapai fasia, tertutup jaringan	Numerik

granulasi

4. Tertutup jaringan

nekrosis

5. Seluruh lapisan kulit

hilang dengan

dekstruksi luas,

kerusakan jaringan

otot, tulang

c. Tepi Luka

0 = Sembuh, luka

terselesaikan

1. Samar, tidak terlihat
dengan jelas

2. Batas tepi terlihat,
menyatu dengan dasar
luka

3. Jelas, tidak menyatu
dengan dasar luka

4. Jelas, tidak menyatu
dengan dasar luka,
tebal

5. Jelas, fibrotik, perut
tebal/hiperkeratonik

d. Terowongan/Gua

0 = Sembuh, luka

terselesaikan

1. Tidak ada gua

2. Gua < 2 cm diarea
manapun

3. Gua 2 – 4 cm seluas
< 50% pinggir luka.

4. Gua 2 – 4 cm seluas
> 50% pinggir luka.


5. Gua > 4 cm diarea
manapun.

e. Tipe Jaringan Nekrotik

1. Tidak ada jaringan nekrotik
2. Putih/abu-abu jaringan tidak dapat teramati dan atau jaringan nekrotik kekuningan yang mudah dilepas.
3. Jaringan nekrotik kekuningan yang melekat tapi mudah dilepas.
4. Melekat, lembut, eskar hitam.
5. Melekat kuat, keras, eskar hitam.

f. Jumlah Jaringan Nekrotik

1. Tidak jaringan nekrotik.
2. $< 25\%$ permukaan luka tertutup jaringan nekrotik.
3. 25% permukaan Luka tertutup jaringan nekrotik.
4. $> 50\%$ dan $< 75\%$ permukaan luka tertutup jaringan nekrotik.
5. 75% s/d 100% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik.



g. Tipe Eksudat

1. Tidak ada eksudat
2. Bloody
3. Serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink).
4. Serosa (encer, berair, jernih).
5. purulen (encer atau kental, keruh, kecoklatan/kekuningan, dengan atau tanpa bau).

h. Jumlah Eksudat

1. Tidak ada, luka kering.
2. Moist, luka tampak lembab tapi eksudat tidak teramati.
3. Sedikit : Permukaan luka moist, eksudat membasahi < 25% balutan
4. Modert : Eksudat terdapat > 25% dan < 75% dari balutan yang digunakan
5. Banyak : Permukaan luka dipenuhi dengan eksudat dan eksudat membasahi > 75% balutan yang digunakan

i. Warna Kulit

1. Pink atau warna kulit

normal setiap bagian luka.

2. Merah terang jika disentuh

3. Putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi.

4. Merah gelap atau ungu dan atau tidak pucat.

5. Hitam atau hiperpigmentasi.

j. Edema Perifer/Tepi Jaringan

1. Tidak ada pembengkakan atau edema.

2. Tidak ada pitting edema sepanjang <4 cm sekitar luka.

3. Tidak ada pitting edema sepanjang ≥ 4 cm sekitar luka.

4. Pitting edema sepanjang <4 cm disekitar luka

5. Krepitus dan atau pitting edema sepanjang > 4cm disekitar luka.

k. Indurasi Jaringan

Perifer

1. Tidak ada indurasi

2. Indurasi <2 cm sekitar luka.

3. Indurasi 2-4 cm
seluas < 50% sekitar
luka.

4. Indurasi 2- 4 cm
seluas \geq 50% sekitar
luka

5. Indurasi > 4 cm
dimana saja pada luka.

1. Jaringan Granulasi

1. Kulit utuh atau luka
pada sebagian kulit.

2. Terang, merah
seperti daging 75% s/d
100% luka terisi
granulasi, atau jaringan
tumbuh.

3. Terang, merah
seperti daging, <75%
dan > 25% luka terisi
granulasi.

4. Pink, dan atau pucat,
merah kehitaman dan
atau luka < 25% terisi
granulasi.

5. Tidak ada jaringan
granulasi.

m. Epitalisasi

1. 100% luka tertutup,
permukaan utuh.

2. 75 s/d 100%
epitalisasi

3. 50 s/d 75%
epitalisasi.

4. 25% s/d 50%
epitalisasi.

5. < 25% epitalisasi

E. Kajian Pustaka

1.2 Kajian Pustaka

Nama penulis	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan riset	Persamaan dengan riset
Ningtyas, 2013	Analisis Kualitas Hidup Pasien Diabetes Millitus tipe II di RSUD Bangil Pasuruan.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik observasional	Terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan, status sosial ekonomi berdasarkan pendapatan, lama menderita dan dan komplikasi DM dengan kualitas hidup pasien DM tipe II. Namun tidak ada hubungan yang signifikan antara usia, jenis kelamin, dan status sosial.	Penelitian sebelumnya ini mengetahui gambaran serta hubungan antara komplikasi diabetes millitus (ulkus diabetikum) dengan kualitas hidup pasien. Sedangkan peneliti ini ingin mengetahui gambaran kondisi luka sebelum dan setelah perawatan teknik <i>modern dressing</i> pada penderita ulkus diabetikum	Persamaan penelitian ini sama membahas ulkus diabetikum.
Utami, 2014	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Dengan Ulkus	Penelitian ini menggunakan metode desain <i>Cross Secsional</i>	Penelitian ini diketahui adanya hubungan yang bermakna faktor-faktor yang	Penelitian sebelumnya ini mengetahui gambaran serta hubungan antara faktor yang mempengaruhi	Persamaan penelitian ini sama membahas ulkus diabetikum.

	Diabetikum		mempengaruhi kualitas hidup dengan ulkus pada pasien diabetikum. Sedangkan peneliti ini ingin mengetahui gambaran kondisi luka sebelum dan setelah perawatan teknik <i>modern dressing</i> pada penderita ulkus diabetikum		
Mairiyani, 2015	Hubungan Stadium Ulkus Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien DM Tipe II.	Penelitian ini menggunakan metode desain <i>deskriptif korelasi</i>	Hasil penelitian ini diketahui stadium ulkus diabetikum sebagian besar responden mengalami stadium 3 sebanyak 13 orang. Kualitas hidup pasien ulkus DM tipe 2 secara umum dikategorikan kurang sebagian besar memiliki dimensi fisik kurang, dimensi psikologi kurang, dimensi lingkungan	Peneliti sebelumnya peneliti menghubungkan kejadian ulkus diabetikum dengan kualitas hidup dengan membaginya menjadi baik dan buruk, adapun pada penelitian ini ingin mengetahui gambaran kondisi luka sebelum dan setelah perawatan teknik <i>modern dressing</i> pada penderita ulkus diabetikum.	Persamaan penelitian ini sama membahas ulkus diabetikum.

Hidayat, 2017	Pengaruh Perawatan Luka Dengan <i>Modern Dressing</i> Terhadap Kualitas Hidup Pasien Ulkus Diabetikum	Penelitian ini menggunakan metode <i>pra-Exsperimrntal desain one-group pra-test post design</i>	kurang. Terdapat perbedaan yang bermakna antara kualitas hidup sebelum dan setelah dilakukan perawatan luka. Setelah dilakukan perawatan luka terdapat peningkatan kualitas hidup yang signifikan.	Penelitian sebelumnya peneliti ingin mengetahui gambaran kualitas hidup pasien dengan ulkus setelah mendapatkan intervensi berupa perawatan luka modern dressing.	Persamaan penelitian ini sama membahas ulkus diabetikum dan modern dressing.
------------------	---	--	---	---	--

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk diketahuinya perbedaan kondisi luka sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan tehknik modern dressing pada pendrita ulkus diabetikum.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk diketahuinya gambaran kondisi luka sebelum perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada pendrita ulkus diabetikum.

b. Untuk diketahuinya gambaran kondisi luka setelah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada pendrita ulkus diabetikum.

c. Untuk diketahuinya perbedaan kondisi luka sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada pendrita ulkus diabetikum.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Istitusi

Sebagai referensi perpustakaan institusi dan merupakan masukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang perbedaan perbedaan kondisi luka sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan tehknik modern dressing pada pendrita ulkus diabetikum.

2. Bagi Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan institusi dan merupakan masukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang perbedaan kondisi luka sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan tehknik modern dressing pada pendrita ulkus diabetikum.

3. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan bahan masukan bagi masyarakat tentang perbedaan kondisi luka sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan tehknik modern dressing pada pendrita ulkus diabetikum.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. *Tinjauan Umum Tentang Diabetes Mellitus*

1. Definisi Diabetes Mellitus

Beberapa pengertian diabetes mellitus antara lain :

- a. Menurut *WHO (World Health Organisation)*, (2011), Diabetes Mellitus merupakan suatu penyakit metabolik dengan berbagai etiologi, memiliki karakteristik hiperglikemiakronik dan gangguan metabolisme dari karbohidrat, lemak, protein sebagai hasil dari ketidakfungsian insulin (resistensi insulin), menurunnya fungsi Pankreasmaupun keduanya.
- b. Menurut *ADA (American Diabetes Assosiation)*, (2014), adalah sekelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang berhubungan dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat adanya defisiensi sekresi insulin, penurunan efektivitas insulin maupun keduanya.

- c. Menurut Miharja (2009), Diabetes adalah suatu penyakit dimana tubuh tidak dapat menghasilkan insulin (hormon pengatur gula darah) atau insulin yang dihasilkan tidak mencukupi atau insulin tidak bekerja dengan baik.

2. Etiologi

- a. *Diabetes mellitus* tipe I/ IDDM (*Insulin Dependent Diabetes Mellitus*).
Diabetes mellitus ini disebabkan akibat kekurangan atau tidak ada sama sekali sekresi insulin dalam darah yang terjadi karena kerusakan dari sel beta pankreas (Arisanti, 2013).
- b. *Diabetes Mellitus* tipe II / NIDDM (*Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus*).
Diabetes mellitus ini disebabkan oleh insulin yang ada tapi tidak dapat bekerja dengan baik, kadar insulin dapat normal, rendah bahkan meningkat tapi fungsi insulin untuk metabolisme glukosa tidak ada/ kurang akibat glukosa dalam darah tetap tinggi sehingga terjadi hiperglikemia dan biasanya dapat diketahui diabetes mellitus setelah usia 30 tahun keatas (Arisanti, 2013).
- c. Menurut Ferawati (2014) penyebab lain dari diabetes mellitus adalah :
 - 1) Usia
 - 2) Gaya hidup dan stress
 - 3) Pola makan yang salah
 - 4) Jenis kelamin

3. Patofisiologi

Pengolahan bahan makanan dimulai dari mulut kemudian kelambung dan selanjutnya ke usus. Di dalam saluran pencernaan, makanan dipecah menjadi bahan dasar dari makanan. Karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak. Ketiga zat makanan tersebut diserap oleh usus kemudian masuk kedalam pembuluh darah dan diedarkan keseluruh tubuh untuk dipergunakan oleh organ-organ di dalam tubuh sebagai bahan bakar. Supaya dapat berfungsi sebagai bahan bakar, zat makanan tersebut harus masuk kedalam sel supaya dapat diolah. Didaalam sel, zat makanan terutama glukosa dibakar melalui proses kimiawi yang rumit yang menghasilkan energi, proses ini disebut metabolisme. Dalam proses metabolisme itu insulin memegang peranan penting yaitu bertugas memasukkan glukosa kedalam sel, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan bakar, insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas (Price & Wilson 2006).

a. Diabetes tipe I

Pada diabetes tipe I terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemia puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Disamping itu glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial (sesudah makan). Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang

tersaring keluar, akibatnya glukosa tersebut muncul dalam urin (Glukosuria). Ketika glukosa yang berlebih dieksresikan dalam urin, ekskresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini dinamakan diuresis osmotik. Sebagai akibat dari kehilangan cairan yang berlebihan, pasien akan mengalami peningkatan dalam berkemih (poliuria) dan rasa haus (polidipsia). Defisiensi insulin juga mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami peningkatan selera makan (polifagia) akibat menurunnya simpanan kalori. Gejala lainnya mencakup kelelahan dan kelemahan. Proses ini akan terjadi tanpa hambatan dan lebih lanjut turut menimbulkan hiperglikemia. Disamping itu akan terjadi pemecahan lemak yang mengakibatkan peningkatan produksi badan keton yang merupakan produk samping pemecahan lemak. Badan keton merupakan asam yang mengganggu keseimbangan asam basa tubuh apabila terjadi jumlahnya berlebihan. Ketoasidosis diabetik yang diakibatkannya dapat menyebabkan tanda-tanda dan gejala seperti nyeri abdominal, mual, muntah, hiperventilasi, napas berbau aseton dan bila tidak ditangani akan menimbulkan perubahan kesadaran, koma bahkan kematian (Smeltzer, 2008).

b. Diabetes tipe II

Pada Diabetes tipe II terdapat dua masalah yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus

pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadilah suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe II disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat dan progresif maka awitan diabetes tipe dapat berjalan tanpa terdeteksi. Jika gejalanya dialami pasien, gejala tersebut sering bersifat ringan dan dapat mencakup kelelahan, iritabilitas, poliuria, polidipsia, luka yang lama sembuh, infeksi vagina ataupun pandangan yang kabur (jika kadar glukosanya sangat tinggi) (Smeltzer, 2008).

Penyakit Diabetes membuat gangguan/komplikasi melalui kerusakan pada pembuluh darah di seluruh tubuh, disebut angiopati diabetik. Penyakit ini berjalan kronis dan terbagi dua yaitu gangguan pada pembuluh darah besar (makrovaskular) disebut makroangiopati, dan pada pembuluh darah halus (mikrovaskular) disebut mikroangiopati. Ulkus Diabetikum terdiri dari kavitas sentral biasanya lebih besar dibanding pintu masuknya, dikelilingi kalus keras dan tebal. Awalnya proses pembentukan ulkus berhubungan dengan hiperglikemia yang berefek terhadap saraf perifer, kolagen, keratin dan suplai vaskuler. Dengan adanya tekanan mekanik terbentuk keratin keras pada daerah kaki yang mengalami beban terbesar. Neuropati sensoris perifer memungkinkan terjadinya trauma berulang mengakibatkan terjadinya kerusakan jaringan di bawah area kalus.

Selanjutnya terbentuk kavitas yang membesar dan akhirnya ruptur sampai permukaan kulit menimbulkan ulkus. Adanya iskemia dan penyembuhan luka abnormal menghalangi resolusi. Mikroorganisme yang masuk mengadakan kolonisasi di daerah ini. Drainase yang inadkuat menimbulkan *closed space infection*. Akhirnya sebagai konsekuensi sistem imun yang abnormal, bakteri sulit dibersihkan dan infeksi menyebar ke jaringan sekitarnya (Brunner & Suddart, 2002).

4. Klasifikasi

- a. Type I / IDDM (*Insulin Dependent Diabetes Melitus*): (5%-10% dari kasus yang terdiagnosa).
- b. Type II /NIDDM (*Non Insulin Dependent Diabetes Melitus*) : (90%-95% dari kasus yang terdiagnosa).

5. Diagnosis

Diagnosis sebaiknya ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa secara enzimatik dengan bahan darah plasma vena, sedangkan untuk tujuan pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler.

Tabel 2.1 Dasar pemeriksaan kadar glukosa darah

Jenis Pemeriksaan Gula darah	Bukan DM	Belum Pasti DM	DM
Kadar glukosa darah sewaktu (mg/dl)	< 100	100 – 199	≥ 200
	< 90	90 – 199	≥ 200

Kadar glukosa darah puasa (mg/dl)	< 100	100 – 125	≥ 126
	< 90	90 – 99	≥ 100

Sumber Smeltzer, 2008.

6. Tanda Dan Gejala

- a. Keluhan berdasarkan “Trias”
 - 1) Banyak minum (*polidipsi*)
 - 2) Banyak kencing (*poliuria*)
 - 3) Banyak makan (*polifagia*)
- b. Kadar gula darah waktu puasa > 120 mg/dl
- c. Kadar gula darah dua jam setelah makan > 200 mg/dl
- d. Kadar gula darah acak > 200 mg/dl
- e. Kelainan kulit : gatal – gatal, bisul
 - 1) Kesemutan, neuropati
 - 2) Kelemahan tubuh
 - 3) Impotensi pada pria
 - 4) Mata kabur

7. Komplikasi Diabetes Mellitus

- a. Gangguan serius

- 1) Kehilangan kesadaran
 - 2) Tekanan darah tinggi
 - 3) Gangguan penglihatan (retinopati)
 - 4) Infeksi kulit berat, luka atau harus amputasi.
- b. Gangguan yang harus di perhatikan yaitu koma *diabetes*, gangguantoleransi glukosa, diabetes sekunder.
- c. *Hyperglikemik hyperosmolar non ketotik koma (HHNK)*.

8. Penatalaksanaan Diabetes Mellitus

- a. Rajin minum obat dan suntik insulin
- b. Berolahraga
- c. Mengontrol kadar gula darah
- d. Bila gemuk turunkan berat badan
- e. Melakukan diet *diabetes melitus*

Adapun pilar penatalaksanaan *diabetes melitus* yang penting yaitu :

- a. Edukasi
- b. Terapi gizi medis
- c. Latihan jasmani
- d. Intervensi farmakologis:
- e. Pengobatan dengan obat obat hipoglikemia oral (OHO)
- f. Pengobatan dengan insulin

9. Ulkus Diabetikum

- a. Definisi

Ulkus diabetikum merupakan adanya luka atau rusaknya barier kulit sampai ke seluruh lapisan dari dermis dan proses

penyembuhannya cenderung lambat. Ulkus pada kulit dapat mengakibatkan hilangnya epidermis hingga dermis dan bahkan lemak subkutan (Angale, 2013).

Ulkus diabetik adalah salah satu bentuk komplikasi kronik Diabetesmellitus berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang dapat disertai adanyakematian jaringan setempat. Ulkus diabetik merupakan suatu kondisikerusakan jaringan kulit yang dimulai dari epidermis, dermis, jaringansubkutan dan dapat menyebar ke jaringan yang lebih dalam, seperti tulang danotot. Ulkus diabetik merupakan luka terbuka pada permukaan kulit karenaadanya komplikasi makroangiopati sehingga terjadi vaskuler insusifiensi danneuropati, yang lebih lanjut terdapat luka pada penderita yang sering tidakdirasakan, dan dapat berkembang menjadi infeksi disebabkan oleh bakteriaerob maupun anaerob. Pasien diabetes sangat beresiko terhadap kejadianluka di kaki dan merupakan jenis luka kronis yang sangat sulitpenyembuhannya. Tingkat keparahan kerusakan jaringan luka diabetesmelitus sangat dipengaruhi oleh deteksi dini dan penatalaksanaan luka yangtepat sehingga bertujuan meminimalkan kerusakan jaringan yang lebih dalam (Price, 2006).

b. Etiologi ulkus diabetikum

Menurut Benbow etiologi ulkus diabetik biasanya memiliki banyak komponen meliputi neuropati sensori perifer, trauma, deformitas, iskemia, pembentukan kalus, infeksi, dan edema. Sedangkan menurut Oguejiofor, Oli, dan Odenigbo selain disebabkan

oleh neuroati perifer (sensorik, motorik, otonom) dan penyakit pembuluh darah perifer (makro dan mikro angiopati) faktor lain yang berkontribusi terhadap kejadian ulkus kaki adalah deformitas kaki (yang dihubungkan dengan peningkatan tekanan pada plantar), *gender* laki-laki, usia tua, kontrol gula darah yang buruk, hiperglikemia yang berkepanjangan dan kurangnya perawatan kaki (Tandra, 2009).

c. Patogenesis ulkus diabetikum

Salah satu akibat komplikasi kronik atau jangka panjang Diabetesmellitus adalah ulkus diabetika. Ulkus diabetika disebabkan adanya tiga faktoryang sering disebut Trias yaitu: Iskemik, Neuropati, dan Infeksi. Padapenderita DM apabila kadar glukosa darah tidak terkendali akan terjadikomplikasi kronik yaitu neuropati, menimbulkan perubahan jaringan syarafkarena adanya penimbunan sorbitol dan fruktosa sehingga mengakibatkanakson menghilang, penurunan kecepatan induksi, parastesia, menurunnyareflek otot, atrofi otot, keringat berlebihan, kulit kering dan hilang rasa,apabila diabetisi tidak hati-hati dapat terjadi trauma yang akan menjadi ulkus diabetika (Noer, 2009).

Iskemik merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekurangan darah dalam jaringan, sehingga jaringan kekurangan oksigen. Hal ini disebabkan adanya proses makroangiopati pada pembuluh darah sehingga sirkulasi jaringan menurun yang ditandai oleh hilang atau berkurangnya denyut nadi pada arteri dorsalis pedis, tibialis dan poplitea, kaki menjadi atrofi, dingin dan kuku

menebal. Kelainan selanjutnya terjadi nekrosis jaringan sehingga timbul ulkus yang biasanya dimulai dari ujung kaki atau tungkai (Noer, 2009).

Aterosklerosis merupakan sebuah kondisi dimana arteri menebal dan menyempit karena penumpukan lemak pada bagian dalam pembuluh darah. Menebalnya arteri di kaki dapat mempengaruhi otot-otot kaki karena berkurangnya suplai darah, sehingga mengakibatkan kesemutan, rasa tidak nyaman, dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan kematian jaringan yang akan berkembang menjadi ulkus diabetika. Proses angiopati pada penderita Diabetes mellitus berupa penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah perifer, sering terjadi pada tungkai bawah terutama kaki, akibat perfusi jaringan bagian distal dari tungkai menjadi berkurang kemudian timbul ulkus diabetika (Noer, 2009).

Pada penderita DM yang tidak terkontrol akan menyebabkan penebalan tunika intima (hiperplasia membran basalis arteri) pada pembuluh darah besar dan pembuluh kapiler bahkan dapat terjadi kebocoran albumin keluar kapiler sehingga mengganggu distribusi darah ke jaringan dan timbul nekrosis jaringan yang mengakibatkan ulkus diabetika. Eritrosit pada penderita DM yang tidak terkontrol akan meningkatkan HbA1C yang menyebabkan deformabilitas eritrosit dan pelepasan oksigen di jaringan oleh eritrosit terganggu, sehingga terjadi penyumbatan yang mengganggu sirkulasi jaringan dan kekurangan oksigen mengakibatkan kematian jaringan yang


selanjutnya timbul ulkus diabetika. Peningkatan kadar fibrinogen dan bertambahnya reaktivitas trombosit menyebabkan tingginya agregasi sel darah merah sehingga sirkulasi darah menjadi lambat dan memudahkan terbentuknya trombosit pada dinding pembuluh darah yang akan mengganggu sirkulasi darah (Noer, 2009).

Penderita Diabetes mellitus biasanya kadar kolesterol total, LDL, trigliserida plasma tinggi. Buruknya sirkulasi ke sebagian besar jaringan akan menyebabkan hipoksia dan cedera jaringan, merangsang reaksi peradangan yang akan merangsang terjadinya aterosklerosis. Perubahan/inflamasi pada dinding pembuluh darah, akan terjadi penumpukan lemak pada lumen pembuluh darah, konsentrasi HDL (*highdensity-lipoprotein*) sebagai pembersih plak biasanya rendah. Adanya faktor risiko lain yaitu hipertensi akan meningkatkan kerentanan terhadap aterosklerosis. Konsekuensi adanya aterosklerosis yaitu sirkulasi jaringan menurun sehingga kaki menjadi atrofi, dingin dan kuku menebal. Kelainan selanjutnya terjadi nekrosis jaringan sehingga timbul ulkus yang biasanya dimulai dari ujung kaki atau tungkai. Pada penderita DM apabila kadar glukosa darah tidak terkendali menyebabkan abnormalitas leukosit sehingga fungsi khemotoksis di lokasi radang terganggu, demikian pula fungsi fagositosis dan bakterisid menurun sehingga bila ada infeksi mikroorganisme sukar untuk dimusnahkan oleh sistem phagositosis-bakterisid intra selluler (Noer, 2009).

Pada penderita ulkus diabetik, 50 % akan mengalami infeksi akibat adanya glukosa darah yang tinggi, yang merupakan media pertumbuhan bakteri yang subur. Bakteri penyebab infeksi pada ulkus diabetika yaitu kuman aerob *Staphylokokus* atau *Streptokokus* serta kuman anaerob yaitu *Clostridium perfringens*, *Clostridium novy*, dan *Clostridium septikum*. Hampir 2/3 pasien dengan ulkus kaki diabetik memberikan komplikasi osteomielitis. Osteomielitis yang tidak terdeteksi akan mempersulit penyembuhan ulkus. Oleh sebab itu setiap terjadi ulkus perlu dipikirkan kemungkinan adanya osteomielitis. Diagnosis osteomielitis tidak mudah ditegakkan. Secara klinis bila ulkus sudah berlangsung >2 minggu, ulkus luas dan dalam serta lokasi ulkus pada tulang yang menonjol harus dicurigai adanya osteomielitis. Spesifisitas dan sensitivitas pemeriksaan rontgen tulang hanya 66% dan 60%, terlebih bila pemeriksaan dilakukan sebelum 10–21 hari gambaran kelainan tulang belum jelas. Seandainya terjadi gangguan tulang hal ini masih sering sulit dibedakan antara gambaran osteomielitis atau artropati neuropati. Pemeriksaan radiologi perlu dilakukan karena di samping dapat mendeteksi adanya osteomielitis juga dapat memberikan informasi adanya osteolisis, fraktur dan dislokasi, gas gangren, deformitas kaki. Uji *probe to bone* menggunakan *probe* logam steril dapat membantu menegakkan osteomielitis karena memiliki nilai prediksi positif sebesar 89%. Untuk lebih memastikan osteomielitis pemeriksaan MRI sangat membantu karena memiliki sensitivitas dan spesifisitas lebih dari 90%.

Namun diagnosis pasti osteomielitis tetap didasarkan pada pemeriksaan kultur tulang (Noer, 2009).

Bagan 2.1 Terjadinya luka diabetes (Gitarja, 2008)



d. Klasifikasi ulkus diabetik

Menurut Wagner, stadium luka diabetes melitus dibagi menjadi 3 yaitu:

1) *Superficial Ulcer*

Stadium 0: tidak terdapat lesi, kulit dalam keadaan baik tapi dalam bentuk tulang kaki yang menonjol.

Stadium 1: hilangnya lapisan kulit hingga dermis dan kadang-kadang nampak luka menonjol.

2) *Deep Ulcer*

Stadium 2: lesi terbuka dengan penetrasi ke tulang atau tendon (dengangoa).

Stadium 3: penetrasi hingga dalam, osteomilitis, plantar abses atau infeksi hingga tendon.

3) *Gangren*

Stadium 4: ganggrein sebagian, menyebar hingga sebagian dari jari kaki, kulit sekitarnya selulitis, gangren lembab/kering.

Stadium 5: seluruh kaki dalam kondisi nekrotik dan gangren.

Menurut *University of Texas* (UT sistem), stadium luka diabetes mellitus tersaji dalam tabel berikut ini (Firman, 2009).

Tabel 2.2 Stadium luka diabetes menurut *University of Texas (UT System)* (2009)

Tahapan	Derajat			
	0	1	2	3
A	Pre atau post lesi ulkus, epitelisasi	Luka superficial, Tidak termasuk tendon, tulang, dan fascia	Luka menyebar ke tendon dan fascia	Luka menyebar ke tulang dan ke persendian
B	Infeksi	Infeksi	Infeksi	Infeksi
C	Iskemia	Iskemia	Iskemia	Iskemia
D	Infeksi dan Iskemia	Infeksi dan Iskemia	Infeksi dan Iskemia	Infeksi dan Iskemia

Keterangan :

- Derajat 0 (resiko rendah) : tanpa neuropati sensori
- Derajat 1 (resiko moderat) : neuropati sensori
- Derajat 2 (resiko tinggi) : neuropati sensori, penyakit vaskuler perifer atau deformatis kaki.
- Derajat 3 (resiko sangat tinggi) : Ulkus kaki/amputasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi berdasarkan *UT system* lebih baik dibandingkan menurut Wagner dalam menilai prediksi apa yang akan terjadi seperti peningkatan stadium luka, penilaian derajat luka yang dihubungkan dengan resiko terjadinya amputasi dan lamanya penyembuhan luka (Firman, 2009).

Kemudahan yang ingin diperkenalkan untuk menilai derajat keseriusan luka adalah menilai warna dasar luka. Sistem ini diperkenalkan dengan sebutan RYB (*Red, Yellow, Black*) atau merah, kuning dan hitam (Arisanti, 2013), yaitu:

1) *Red* / Merah

Merupakan luka bersih, dengan banyak vaskularisasi, karena mudah berdarah. Tujuan perawatan luka dengan warna dasar merah adalah mempertahankan lingkungan luka dalam keadaan lembab dan mencegah terjadinya trauma dan perdarahan.

2) *Yellow* / Kuning

Luka dengan warna dasar kuning atau kuning kehijauan adalah jaringan nekrosis. Tujuan perawatannya adalah dengan meningkatkan sistem autolisis debridement agar luka berwarna merah, *absorb eksudate*, menghilangkan bau tidak sedap dan mengurangi kejadian infeksi.

3) *Black* / Hitam

Luka dengan warna dasar hitam adalah jaringan nekrosis, merupakan jaringan avaskularisasi. Tujuan perawatannya adalah sama dengan warna dasar kuning yaitu warna dasar luka menjadi merah.

e. Tanda Dan Gejala

Tanda dan gejala ulkus diabetika (Arisanti, 2013) yaitu :

1) Sering kesemutan.

2) Nyeri kaki saat istirahat.

- 3) Sensasi rasa berkurang.
 - 4) Kerusakan Jaringan (nekrosis).
 - 5) Penurunan denyut nadi arteri dorsalis pedis, tibialis dan poplitea.
 - 6) Kaki menjadi atrofi, dingin dan kuku menebal.
 - 7) Kulit kering.
- f. Diagnosis Ulkus diabetik

Diagnosis ulkus diabetik menurut Tarwoto (2012) meliputi :

- 1) Pemeriksaan Fisik : inspeksi kaki untuk mengamati terdapat luka atau ulkus pada kulit atau jaringan tubuh pada kaki, pemeriksaan sensasi vibrasi/rasa berkurang atau hilang, palpasi denyut nadi arteri dorsalis pedis menurun atau hilang. Pemeriksaan Doppler ultrasound adalah penggunaan alat untuk memeriksa aliran darah arteri maupun vena. Pemeriksaan ini untuk mengidentifikasi tingkat gangguan pada pembuluh darah arteri maupun vena. Dengan pemeriksaan yang akurat dapat membantu proses perawatan yang tepat. Pemeriksaan ini sering disebut dengan Ankle Brachial Pressure Index. Pada kondisi normal, tekanan sistolik pada kaki sama dengan di tangan atau lebih tinggi sedikit. Pada kondisi terjadi gangguan di area kaki, vena ataupun arteri, akan menghasilkan tekanan sistolik yang berbeda. Hasil pemeriksaan yang akurat dapat membantu diagnostic ke arah gangguan vena atau arteri sehingga manajemen perawatan juga berbeda.

2) Pemeriksaan Penunjang : X-ray, EMG dan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah ulkus diabetik menjadi infeksi dan menentukan penyebabnya.

g. Penatalaksanaan ulkus diabetik

Frykberg, et al (2006) menyatakan tujuan utama penatalaksanaan ulkus diabetik adalah mencapai penutupan luka secepatnya. Mengatasi ulkus kaki diabetik dan menurunkan kejadian berulang dapat menurunkan kemungkinan amputasi pada ekstremitas bagian bawah pasien DM (Tarwoto, 2012).

Asosiasi penyembuhan luka mendefinisikan luka kronik adalah luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan sesuai dengan yang seharusnya dalam mencapai integritas anatomi dan fungsinya, terjadi pemanjangan proses inflamasi dan kegagalan dalam reepitelisasi dan memungkinkan kerusakan lebih jauh dan infeksi. Frykberg, et al. (2006) menyatakan area penting dalam manajemen ulkus kaki diabetik meliputi manajemen komorbiditas, evaluasi status vaskuler dan tindakan yang tepat pengkajian gaya hidup/faktor psikologi, pengkajian dan evaluasi ulser, manajemen dasar luka dan menurunkan tekanan (Tarwoto, 2012).

1) Manajemen komorbiditas

DM merupakan penyakit multi organ, semua komorbiditas yang mempengaruhi penyembuhan luka harus dikaji dan dimanajemen, multidisiplin untuk mencapai tujuan yang optimal pada ulkus kaki diabetik. Beberapa komorbiditas yang

mempengaruhi penyembuhan luka meliputi hiperglikemia dan penyakit vaskuler (Tarwoto, 2012).

2) Evaluasi status vaskuler

Perfusi arteri memegang peranan penting dalam penyembuhan luka dan harus dikaji pada pasien dengan ulkus, selama sirkulasi terganggu akan mengalami kegagalan penyembuhan dan berisiko amputasi. Adanya insufisiensi vaskuler dapat berupa edema, karakteristik kulit yang terganggu (tidak ada rambut, penyakit kuku, penurunan kelembaban), penyembuhan lambat, ekstremitas dingin, penurunan pulsasi perifer (Tarwoto, 2012).

3) Pengkajian gaya hidup/faktor psikososial

Gaya hidup dan faktor psikologi dapat mempengaruhi penyembuhan luka. Contoh, merokok, alkohol, penyalahgunaan obat, kebiasaan makan, obesitas, malnutrisi dan tingkat mobilisasi dan aktivitas. Selain itu depresi dan penyakit mental juga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan (Arisanti, 2013).

4) Pengkajian dan evaluasi ulkus

Pentingnya evaluasi secara menyeluruh tidak dapat dikesampingkan. Penemuan hasil pengkajian yang spesifik akan mempengaruhi secara langsung tindakan yang akan dilakukan. Evaluasi awal dan deskripsi yang detail menjadi penekanan meliputi lokasi, ukuran, kedalaman, bentuk, inflamasi, edema, eksudat (kualitas dan kuantitas), tindakan terdahulu, durasi, kalus, maserasi, eritema dan kualitas dasar luka (Arisanti, 2013).

B. Tinjauan Umum Perawatan Luka dengan Modern Dressing

1. Perawatan Luka

a. Definisi Luka

Luka adalah kerusakan hubungan antar jaringan-jaringan pada kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain (Agung, 2005). Selain itu, menurut Koiner dan Taylan (2001), Luka adalah terganggunya integritas normal dari kulit dan jaringan di bawahnya yang terjadi secara tiba-tiba atau disengaja, tertutup atau terbuka, bersih atau terkontaminasi, superficial atau dalam.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengertian luka seperti Klasifikasi Luka yang diklasifikasikan dalam beberapa bagian antara lain: Tindakan terhadap Luka yaitu Luka disengaja dan Luka tidak disengaja; Integritas Luka dibagi atas Luka tertutup dan Luka terbuka; berdasarkan Mekanisme Luka dibagi atas *Luka insisi (Incised wounds)*, terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Luka bersih (aseptik) secara umum tertutup oleh sutura setelah seluruh pembuluh darah yang luka diikat (*Ligasi*). *Luka memar (Contusion Wound)*, terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak. *Luka lecet (Abraded Wound)*, terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tidak tajam. *Luka tusuk (Punctured Wound)*, terjadi akibat adanya benda, seperti peluru atau pisau yang masuk kedalam kulit dengan diameter yang kecil. *Luka gores (Lacerated Wound)*, terjadi akibat benda yang tajam seperti oleh kaca

atau oleh kawat. *Luka tembus (Penetrating Wound)*, yaitu luka yang menembus organ tubuh biasanya pada bagian awal luka masuk diameternya kecil tetapi pada bagian ujung biasanya lukanya akan melebar. *Luka Bakar* adalah kerusakan jaringan kulit yang disebabkan oleh sesuatu yang panas (bersifat membakar) yang menimbulkan panas berlebihan (Ismail, 2008).

Faktor yang mempengaruhi luka yaitu berdasarkan usia menyatakan bahwa anak dan dewasa penyembuhan lebih cepat daripada orang tua. Orang tua lebih sering terkena penyakit kronis, penurunan fungsi hati dapat mengganggu sintesis dari faktor pembekuan darah; berdasarkan nutrisi menyatakan penyembuhan menempatkan penambahan pemakaian pada tubuh. Klien memerlukan diet kaya protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan A, dan mineral seperti Fe, Zn. Klien kurang nutrisi memerlukan waktu untuk memperbaiki status nutrisi mereka setelah pembedahan jika mungkin. Klien yang gemuk meningkatkan resiko infeksi luka dan penyembuhan lama karena supply darah jaringan adipose tidak adekuat, berdasarkan infeksi menyatakan infeksi luka menghambat penyembuhan (Ismail, 2008).

Iskemia merupakan suatu keadaan dimana terdapat penurunan suplai darah pada bagian tubuh akibat dari obstruksi dari aliran darah. Hal ini dapat terjadi akibat dari balutan pada luka terlalu ketat. Dapat juga terjadi akibat faktor internal yaitu adanya obstruksi pada pembuluh darah itu sendiri, diabetes dengan hambatan terhadap sekresi

insulin akan mengakibatkan peningkatan gula darah, nutrisi tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibat hal tersebut juga akan terjadi penurunan protein-kalori tubuh keadaan luka menyatakan bahwa keadaan khusus dari luka mempengaruhi kecepatan dan efektifitas penyembuhan luka. Beberapa luka dapat gagal untuk menyatu. Beberapa diantaranya adalah penggunaan obat anti inflamasi (seperti steroid dan aspirin), dimana heparin dan anti neoplastmik mempengaruhi penyembuhan luka. Penggunaan antibiotik yang lama dapat membuat seseorang rentan terhadap infeksi luka seperti steroid akan menurunkan mekanisme peradangan normal dan tubuh terhadap cedera, antikoagulan dapat mengakibatkan perdarahan, antibiotik dapat efektif diberikan segera sebelum pembedahan untuk bakteri penyebab kontaminasi yang spesifik. Jika diberikan setelah luka pembedahan tertutup, tidak akan efektif akibat koagulasi intravaskular (Ismail, 2008).

b. Stadium Luka Diabetes

Pengkajian mengenai stadium luka dilakukan untuk menentukan pelaksanaan berikutnya yang tepat pada pasien. Ulkus diabetikum merupakan luka kronis yang tidak gampang sembuh diakibatkan karena terganggunya penyembuhan luka oleh faktor sistemik, lokal, dan lainnya (Arisanti, 2013).

Stadium luka diabetes dibedakan berdasarkan empat tingkatan, yaitu:

a) Stadium I : luka kemerahan dan tidak merusak epidermis

- b) Stadium II : luka memisahkan epidermis dan dermis
- c) Stadium III : luka hingga sebagian hypodermis, berbentuk *cavity* (rongga)
- d) Stadium IV : luka hingga hipodermis hilang, mengenai tulang, otot, dan tendon

Selain pengkajian stadium luka, pengkajian dari warna dasar luka juga sangat mendukung dalam proses penyembuhan ulkus diabetikum (Irma, 2013). Warna dasar luka memperlihatkan gambaran fisik kondisi luka yang real. Penilaian warna dasar luka didasarkan pada :

- 1) Warna merah merupakan ciri dari jaringan granulasi dan granulasi baik.
 - 2) Warna kuning merupakan jaringan mati *slough* (lunak) dengan vaskularisasi buruk.
 - 3) Warna hitam nekrotik (keras)/ *eschar* dan vaskularisasi buruk
 - 4) Warna pink merupakan jaringan epitel halus.
- c. Pengkajian Luka dengan BWAT (*Bates-jensen wound assesment tool*)

1) Pengertian BWAT

BWAT (*Bates-Jensen Wound Assesment Tool*) atau pada asalnya dikenal dengan nama PSST (*Pressure Sore Status Tool*) merupakan skala yang dikembangkan dan digunakan untuk mengkaji kondisi luka ulkus diabetik. Skala ini sudah teruji validasi dan rehabilitasinya, sehingga alat ini sudah biasa digunakan dirumah sakit atau klinik kesehatan. Nilai yang dihasilkan dari skala ini

menggambarkan status keparahan luka. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan maka menggambarkan pula status luka pasien yang semakin parah (Pillen *et al*, 2009).

BWAT terdiri dari 13 item pengkajian didalamnya, yaitu : *Size, Depth, Edges, Undermining, Necrotic Tissue Type, Necrotic Tissue Amount, Exudate Type, Exudate Amount, Skin Color Surrounding Wound, Peripheral Tissue Edema, Pheriperal Tissue Incharation, Granulation Tissue*, dan *Epithelialisation*. Ke 13 item tersebut digunakan sebagai pengkajian luka ulkus diabetik pada pasien. Setiap item diatas mempunyai nilai yang menggambarkan status luka tekan pasien (Pillen *et al*, 2009).

2) Penilaian Instrumen BWAT

Tabel 2.3 Penilaian Instrumen BWAT

No	Item	Pengkajian	Tgl/Skor	Tgl/Skor	Tgl/Skor
1	Ukuran	*0 = Sembuh, luka terselesaikan panjang x lebar 1 = < 4 cm 2 = 4 s/d < 16 cm ² 3 = 16 s/d < 64 cm ² 4 = 36 s/d < 80 cm ² 5 = > 80 cm ²			
2	Kedalaman	*0= sembuh, luka terselesaikan 1. Eritema atau kemerahan 2. Leserasi lapisan epedermis dan atau			

		<p>dermis</p> <p>3. Seluruh lapisan kulit hilang, kerusakan atau nekrosis subkutan, tidak mencapai fascia, tertutup jaringan granulasi</p> <p>4. Tertutup jaringan nekrosis</p> <p>5. Seluruh lapisan kulit hilang dengan dekstruksi luas, kerusakan jaringan otot, tulang</p>			
3	Tepi Luka	<p>*0 = Sembuh, luka terselesaikan</p> <p>1. Samar, tidak terlihat dengan jelas</p> <p>2. Batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar luka</p> <p>3. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka</p> <p>4. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal</p> <p>5. Jelas, fibrotik, perut tebal/hiperkeratonik</p>			
4	Terowongan/Gua	<p>*0= Sembuh, luka terselesaikan</p> <p>1. Tidak ada gua</p> <p>2. Gua < 2 cm diarea manapun</p> <p>3. Gua 2 – 4 cm seluas < 50% pinggir luka.</p> <p>4. Gua 2 – 4 cm seluas > 50% pinggir luka.</p> <p>5. Gua > 4 cm diarea manapun.</p>			

5	Tipe Jaringan Nekrotik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada jaringan nekrotik 2. Putih/abu-abu jaringan tidak dapat teramati dan atau jaringan nekrotik kekuningan yang mudah dilepas. 3. Jaringan nekrotik kekuningan yang melekat tapi mudah dilepas. 4. Melekat, lembut, eskar hitam. 5. Melekat kuat, keras, eskar hitam. 			
6	Jumlah jaringan nekrotik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak jaringan nekrotik. 2. < 25% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik. 3. 25 % permukaan Luka tertutup jaringan nekrotik. 4. > 50% dan < 75% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik. 5. 75% s/d 100% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik. 			
7	Tipe Eksudat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada eksudat 2. Bloody 3. Serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink). 4. Serosa (encer, berair, jernih). 5. purulen (encer atau kental, keruh, 			


		kecoklatan/kekuningan, dengan atau tanpa bau).			
8	Jumlah Eksudat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada, luka kering. 2. Moist, luka tampak lembab tapi eksudat tidak teramati. 3. Sedikit : Permukaan luka moist, eksudat membasahi < 25% balutan 4. Modert : Eksudat terdapat > 25% dan < 75% dari balutan yang digunakan 5. Banyak : Permukaan luka dipenuhi dengan eksudat dan eksudat membasahi > 75% balutan yang digunakan 			
9	Warna Kulit Sekitar Luka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pink atau warna kulit normal setiap bagian luka. 2. Merah terang jika disentuh 3. Putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi. 4. Merah gelap atau ungu dan atau tidak pucat. 5. Hitam atau hiperpigmentasi. 			
10	Edema Perifer/Tapi Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pembengkakan atau edema. 2. Tidak ada pitting edema sepanjang <4 cm sekitar luka. 			

		<p>3. Tidak ada pitting edema sepanjang ≥ 4 cm sekitar luka.</p> <p>4. Pitting edema sepanjang < 4 cm disekitar luka</p> <p>5. Krepitus dan atau pitting edema sepanjang > 4cm disekitar luka.</p>			
11	Indurasi Jaringan Perifer	<p>1. Tidak ada indurasi</p> <p>2. Indurasi < 2 cm sekitar luka.</p> <p>3. Indurasi 2-4 cm seluas $< 50\%$ sekitar luka.</p> <p>4. Indurasi 2- 4 cm seluas $\geq 50\%$ sekitar luka</p> <p>5. Indurasi > 4 cm dimana saja pada luka.</p>			
12	Jaringan Granulasi	<p>1. Kulit utuh atau luka pada sebagian kulit.</p> <p>2. Terang, merah seperti daging 75% s/d 100% luka terisi granulasi, atau jaringan tumbuh.</p> <p>3. Terang, merah seperti daging, $< 75\%$ dan $> 25\%$ luka terisi granulasi.</p> <p>4. Pink, dan atau pucat, merah kehitaman dan atau luka $< 25\%$ terisi granulasi.</p> <p>5. Tidak ada jaringan granulasi.</p>			
13	Epitalisasi	<p>1. 100% luka tertutup, permukaan utuh.</p> <p>2. 75 s/d 100% epitalisasi</p> <p>3. 50 s/d 75% epitalisasi.</p>			

		4. 25% s/d 50% epitalisasi. 5. < 25% epitalisasi			
	Total Skor				

(Sumber: Harris 2009 modifikasi Handayani, 2010)

Keterangan :



Apabila ulkus dikatakan sembuh (healed), maka item 1,2,3,4 diberi nilai 0. Item nomer 5-13 memiliki skor terendah bernilai 1, sehingga total skor terendah adalah 9. Apabila luka dinyatakan mengalami regenerasi (*wound regeneration*), maka total skor terendah pada ke-13 item bernilai 13 dengan masing-masing item diberi nilai 1. Apabila luka tidak bergenerasi (*wound degeneration*), total skor tertinggi pada ke-13 item bernilai 65 dengan masing-masing item diberi 5. Misal: pasien datang dengan luka rabas atau lecet, maka item 1,2,3,4 diberi nilai 0, dan item 5-13 diberi poin 1, maka total skor yang diperoleh adalah 9, luka dinyatakan mengalami penyembuhan.

2. *Modern Dressing*

a. Definisi *modern dressing*

Modern dressing adalah suatu balutan modern yang sedang berkembang pesat dalam *wound care*, dimana disebutkan dalam beberapa literatur lebih efektif bila dibandingkan dengan metode

konvensional (Rukmana, 2008). Luka dapat memproduksi eksudat mulai dari jumlah sedikit, sedang, hingga banyak. Luka dengan eksudat banyak dapat menyebabkan maserasi pada kulit sekitar luka dan luka dengan eksudat sedikit atau tidak ada eksudat dapat menjadi kering (Gitaraja, 2008).

Luka menyebabkan disintegrasi dan *discontinuitas* dari jaringan kulit sehingga kulit kehilangan yang fungsinya untuk memproteksi jaringan di bawahnya menjadi terganggu (Gitaraja, 2008). Tujuan utama dari *modern dressing* adalah menggunakan prinsip *moisture balance* ini mengkondisikan luka dalam keadaan lembab karena lingkungan yang lembab akan mempercepat proses penyembuhan luka (Rukmana, 2008).

Manajemen dalam *modern dressing* antara lain adalah pemilihan bahan *topical therapy* yang di dasarkan pada pertimbangan biaya (*cost*), kenyamanan (*comfort*), keamanan (*safety*). Oleh karena itu, tingkat kemandirian dan profesional perawat akan tampak pada pemilihan *topical therapy* saat melaksanakan *modern dressing* (Suryo, 2009).

b. Manfaat *modern dressing*

Menurut Haimowitz, dkk (1997), ada beberapa keuntungan prinsip *moisture* dalam perawatan luka antara lain adalah untuk mencegah luka menjadi kering dan keras, meningkatkan laju epitelisasi, mencegah pembentukan jaringan eschar, meningkatkan pembentukan jaringan dermis, mengontrol inflamasi dan memberikan

tampilan yang lebih kosmetis, mempercepat proses *autolysis debridement*, dapat menurunkan kejadian infeksi, *cost effective*, dapat mempertahankan gradien voltase normal, mempertahankan aktifitas neutrofil, menurunkan nyeri, memberikan keuntungan psikologis dan mudah digunakan.

c. Jenis-jenis balutan dan terapi alternative *modern dressing*

Jenis-jenis balutan *modern dressing* dan terapi alternative yang dapat digunakan untuk merawat dan melindungi luka adalah :

1) Film Dressing

Bentuk Semi-permeable primary atau secondary dressings, clear polyurethane yang disertai perekat *adhesive*, *conformable*, anti robek atau tergores, tidak menyerap eksudat, dapat digunakan sebagai bantalan untuk pencegahan luka dekubitus, pelindung sekitar luka terhadap maserasi, berfungsi sebagai pembalut luka pada daerah yang sulit, pembalut/penutup pada daerah yang diberi terapi salep, sebagai pembalut sekunder, transparan, bisa melihat perkembangan luka, dapat *breathable*, tidak tembus bakteri dan air, pasien bisa mandi, memiliki indikasi: luka dengan epitelisasi, *low exudate*, luka insisi. Jenis modern dressing ini memiliki kontraindikasi berupa luka terinfeksi, eksudat banyak. Contoh: Tegaderm, Op-site, Mefilm.

2) Hydrocolloid

Memiliki kandungan *pectin*, *gelatin*, *carboxymethylcellulose* dan *elastomers*. Memiliki fungsi *autolysis*

untuk mengangkat jaringan nekrotik atau slough. Bersifat *occlusive* yaitu *hypoxic environment* untuk *mensupport angiogenesis, waterproof*, digunakan untuk luka dengan eksudat minimal sampai sedang, dapat menjaga kestabilan kelembaban luka dan sekitar luka, menjaga dari kontaminasi air dan bakteri, bisa digunakan untuk balutan primer dan balutan sekunder, dapat diaplikasikan 5 – 7 hari serta memiliki indikasi: luka dengan epitelisasi, eksudat minimal dan kontraindikasi: luka yang terinfeksi atau luka grade III-IV. Contoh: Duoderm extra thin, Hydrocoll, Comfeel.

3) Alginate

Terbuat dari rumput laut, membentuk gel diatas permukaan luka, mudah diangkat dan dibersihkan, bisa menyebabkan nyeri, membantu untuk mengangkat jaringan mati, tersedia dalam bentuk lembaran dan pita, kandungan calsium dapat membantu menghentikan perdarahan. Alginate digunakan pada fase pembersihan luka dalam maupun permukaan, dengan cairan banyak, maupun terkontaminasi karena dapat mengatur eksudat luka dan melindungi terhadap kekeringan dengan membentuk gel serta dapat menyerap luka > 20 kali bobotnya. Bersifat tidak lengket pada luka, tidak sakit saat mengganti balutan, dapat diaplikasikan selama 7 hari serta memiliki indikasi dapat dipakai pada luka dengan eksudat sedang sampai dengan berat seperti luka decubitus, ulkus diabetik, luka operasi, luka bakar derajat I dan

II, luka donor kulit. Dengan kontraindikasi tidak bisa digunakan pada luka dengan jaringan nekrotik dan kering. Contoh : Kaltostat, Sorbalgon, Sorbsan.

4) Foam Dressing

Digunakan untuk menyerap eksudat luka sedang dan sedikit banyak, tidak lengket pada luka, menjaga kelembaban luka, menjaga kontaminasi serta penetrasi bakteri dan air, balutan dapat diganti tanpa adanya trauma atau sakit, dapat digunakan sebagai balutan primer / sekunder, dapat diaplikasikan 5-7 hari, bersifat *non-adherent wound contact layer*, tingkat absorpsi yang tinggi, semi-permeable dengan indikasi pemakaian luka dengan eksudat sedang sampai dengan berat. Dressing ini memiliki kontraindikasi tidak bisa digunakan pada luka dengan eksudat minimal, jaringan nekrotik hitam. Contoh: Cutinova, Lyofoam, Tielle, Allevyn, Versiva.

d. Implementasi

Dalam melakukan implementasi untuk merawat luka diperlukan beberapa pertimbangan sesuai dengan keadaan dan kondisi luka yang ada setelah dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Untuk luka dengan eksudat & jaringan nekrotik (*sloughy wound*) dipakai dengan tujuan untuk melunakkan dan mengangkat jaringan mati (*slough tissue*), sel-sel mati terakumulasi dalam eksudat, berfungsi untuk merangsang granulasi dengan mengkaji kedalaman luka dan

jumlah eksudat terlebih dahulu. Balutan yang dapat dipakai antara lain: hydrogels, hydrocolloids, alginates dan hydrofibre dressing.

Untuk luka nekrotik, dipakai bertujuan untuk melunakan dan mengangkat jaringan nekrotik (*eschar*), memberikan lingkungan yang kondusif untuk autolysis. Diperlukan pengkajian kedalaman luka dan jumlah eksudat. Balutan yang dapat dipakai berupa hydrogels, hydrocolloid dressing.

Pada luka terinfeksi, balutan ini digunakan bertujuan untuk mengurangi eksudat, bau dan mempercepat penyembuhan luka. Perlu dilakukan identifikasi tanda-tanda klinis dari infeksi pada luka, kebiasaan *wound culture–systemic antibiotic* serta pengontrolan eksudat dan bau. Umumnya balutan diganti tiap hari. Balutan yang digunakan pada jenis luka ini yaitu hydrogel, hydrofibre, alginate, metronidazole gel (0,75%), carbon dressings, silver dressing.

Pada luka granulasi, balutan modern digunakan untuk meningkatkan proses granulasi, melindungi jaringan yang baru, jaga kelembaban luka, kedalaman luka dan jumlah eksudat, bersifat *moist wound surface – non-adherent dressing, treatment overgranulasi*. Balutan yang umum dipakai yaitu hydrocolloids, foams, dan alginates. Untuk luka epitelisasi, balutan digunakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk “*re-surfacing*”, dan umumnya balutan tidak terlalu sering diganti. Balutan yang digunakan seperti transparent films, hydrocolloids.

Selain itu, tidak jarang juga dilakukan metode pemakaian balutan dengan balutan kombinasi. Dimana balutan tidak hanya dipakai satu jenis modern dressing saja, tetapi menggabungkan beberapa jenis balutan sesuai dengan kebutuhan perawatan luka. Adapun balutan luka sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jenis Balutan Luka

Tujuan	Tindakan
Rehidrasi	Hydrogel + film atau hanya hydrocolloid
Debridement (deslough)	Hydrogel + film/foam Atau hanya hydrocolloid Atau alginate + film/foam Atau hydrofibre + film/foam
Manage eksudat sedang sampai berat	Extra absorbent foam Atau extra absorbent alginate + foam Atau hydrofibre + foam
e. P e milihan balutan luka	Atau cavity filler plus foam

Balutan luka (wound dressings) secara khusus telah mengalami perkembangan yang sangat pesat selama hampir dua dekade ini. Revolusi dalam perawatan luka ini dimulai dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Professor G.D Winter pada tahun 1962 yang dipublikasikan dalam *jurnal Nature* tentang keadaan lingkungan yang optimal untuk penyembuhan luka. Menurut Gitaraja (2002),

alasan dari teori perawatan luka dengan suasana lembab ini antara lain adalah untuk mempercepat fibrinolisis dimana fibrin yang terbentuk pada luka kronis dapat dihilangkan lebih cepat oleh netrofil dan sel endotel dalam suasana lembab. Selain itu, mempercepat angiogenesis dimana dalam keadaan hipoksia pada perawatan luka tertutup akan merangsang lebih pembentukan pembuluh darah dengan lebih cepat. Selanjutnya menurunkan resiko infeksi dengan hasil kejadian infeksi ternyata relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan perawatan kering. Alasan lain yaitu mempercepat pembentukan *growth factor* karena *growth factor* berperan pada proses penyembuhan luka untuk membentuk *stratum corneum* dan *angiogenesis*, dimana produksi komponen tersebut lebih cepat terbentuk dalam lingkungan yang lembab. Dan alasan lain yaitu mempercepat terjadinya pembentukan sel aktif, dimana pada keadaan lembab, invasi netrofil yang diikuti oleh makrofag, monosit dan limfosit ke daerah luka berfungsi lebih dini.

Pada dasarnya prinsip pemilihan balutan yang akan digunakan untuk membalut luka harus memenuhi kaidah-kaidah seperti kapasitas balutan untuk dapat menyerap cairan yang dikeluarkan oleh luka (*absorbing*), kemampuan balutan untuk mengangkat jaringan nekrotik dan mengurangi resiko terjadinya kontaminasi mikroorganisme (*non viable tissue removal*), meningkatkan kemampuan rehidrasi luka (*wound rehydration*), melindungi dari kehilangan panas tubuh akibat penguapan, dan kemampuan atau potensi sebagai sarana pengangkut

atau pendistribusian antibiotic ke seluruh bagian luka (Hartmann, 1999; Ovington, 1999).

f. Evaluasi dan monitoring luka

Dalam mengevaluasi dan memonitoring luka, perlu diperhatikan tentang dimensi luka seperti ukuran, kedalaman luka, panjang luka, dan lebar luka. Jika memungkinkan dilakukan juga evaluasi dengan photography untuk dapat membandingkan perkembangan luka sesudah dan sebelum dilakukan perawatan. Selain itu, dapat juga menggunakan *wound assessment charts*, dimana menggunakan grafik, meningkatkan frekuensi pengkajian pada luka dan merencanakan perawatan/ tindakan selanjutnya pada luka.

g. Dokumentasi perawatan luka

Dokumentasi perawatan luka sangat perlu dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui potential masalah dari luka, dapat memberikan informasi yang adekuat sehubungan dengan luka, dapat merencanakan perawatan luka selanjutnya yang akan dilakukan dan dapat mengkaji perkembangan terapi atau masalah lain yang timbul akibat dari luka. Dokumentasi diharapkan dapat bersifat factual dan tidak subjektif.

C. *Tinjauan Agama terhadap penyakit diabetes mellitus*

Islam dalam ajarannya telah memberikan cara menghindari penyakit diabetes melitus (DM), misalnya dalam mengontrol kadar glukosa dalam darah dengan berolah raga, mengatur pola makan dan gaya hidup sederhana atau tidak berlebihan.

Ajaran Islam sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk dikaitkan dengan masalah kesehatan. Khusus penyakit DM, maka ajaran Islam mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup seimbang dan jangan berlebihan (sederhana). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah QS.Thaha/81

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Terjemahnya :

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia”

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan dengan tidak berlebihan dalam segala sesuatu termasuk dalam urusan makanan. Hal itu bisa dikaitkan dengan faktor penyebab DM, antara lain karena pola makan yang tidak baik, kegemukan, stres yang berdampak pada kerusakan ginjal dan pankreas yang sebenarnya berfungsi untuk memproduksi insulin sebagai penetral gula dalam darah.

Islam juga menekankan pentingnya bersabar dalam menghadapi penyakit, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari Muslim no 2571


مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَىٰ مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحَطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَّهَا

Artinya :

“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggururkan bersamanya dosa- dosanya seperti pohon yang menggururkan daun- daunnya”.

Ini merupakan janji Allah, tidak pernah kita menemui manusia yang selalu merasa kesulitan dan kesedihan, semua pasti ada akhir dan ujungnya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, susah-senang, lapar-kenyang, kaya-miskin, sakit-sehat. Salah satu hikmah Allah menciptakan sakit agar kita bisa merasakan nikmatnya sehat. sebagaimana orang yang makan, ia tidak bisa menikmati kenyang yang begitu nikmatnya apabila ia tidak merasakan lapar, jika ia merasa agak kenyang atau kenyang maka selezat apapun makanan tidak bisa ia nikmati. Begitu juga dengan nikmat kesehatan, kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat setelah merasa sakit sehingga kita senantiasa bersyukur, merasa senang dan tidak pernah melalaikan lagi nikmat kesehatan serta selalu menggunakan nikmat kesehatan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat (Shihab, 2009).

D. Kerangka konsep



Keterangan :




: Variabel yang diteliti




: Variabel Independen



: Variabel Dependen



: Variabel yang tidak diteliti




: Variabel perancu

Bagan 2.1 Kerangka Konsep

E. Kerangka Kerja

Kerangka kerja penelitian ini dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:



Bagan 2.2 Kerangka Kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain penelitian *pre eksperiment* dengan rancangan penelitian *one group pre and post test design*. Penelitian dengan *one group pre and post test design* merupakan penelitian yang menggunakan satu kelompok subyek, pengukuran dilakukan sebelum diberikan intervensi dan setelah diberikan intervensi (Suyanto, 2011).

Tabel 3.1 Desain Penelitian

<i>Pretest</i>	Intervensi	<i>Posttest</i>
01	X	02

Keterangan:

O₁ : Gambaran kondisi luka sebelum diberikan intervensi modern dressing.

X : Intervensi pemberian metode modern dressing

O₂: Gambaran kondisi luka sesudah diberikan intervensi modern dressing.

B. Tempat & Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Klinik Griya Afiat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2018.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan seluruh subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti (Hidayat, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien ulkus diabetikum di Klinik Griya Afiat.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2009). Metode penelitian ini yaitu *non probability* dengan pendekatan *Accidental Sampling* dengan berdasarkan pada pasien ulkus diabetikum yang ada pada saat penelitian. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan, akan dilakukan sampel minimal yaitu sebanyak 15 Orang.

D. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada (Hidayat, 2009). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel secara *accidental sampling*, dengan kriteria :

1. Kriteria Inklusif

- a. Pasien ulkus diabetikum
- b. Tengah menjalani terapi penyembuhan dengan dressing yang di ujikan
- c. Mendapatkan perawatan secara berkala
- d. Bersedia menjadi responden

2. Kriteria Eksklusif
 - a. Pasien yang alergi terhadap bahan penyembuhan luka baik dengan *modern dressing*.
 - b. Pasien tidak kooperatif

E. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui kuesioner. Responden yang bersedia mengisi lembar kuesioner diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada pertanyaan yang tidak dipahami. Selesai pengisian kuesioner, peneliti memeriksa kelengkapan data dan jika ada data yang kurang, dapat langsung dilengkapi. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisa.

2. Data sekunder

Data yang pengumpulannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti, tetapi dari pihak lain, dalam hal ini peneliti mengambil data dari Klinik Griya Afiat.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah lembar observasi gambaran luka dari peneliti sebelumnya. Agar data-data yang diperoleh lebih otentik, maka peneliti melakukan pencatatan atas apa yang dilihat secara langsung atau dari hasil pengamatan sendiri.

G. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara manual yaitu dengan mengisi lembar Observasi yang disediakan. Pengolahan data tersebut kemudian dioalah menggunakan program SPSS dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Editing

Proses editing dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, kesalahan pengisian data konsistensi dari setiap jawaban.

b. Koding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengelolaan data, semua jawaban atau data, kesalahan pengisian data konsistensi dari setiap jawaban (pengkodean).

c. Tabulasi

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Analisis Data

a. Analisis univariat

Dilakukan secara deskriptif pada masing-masing variabel dengan analisis pada distribusi frekuensi.

b. Analisis Bivariat

Analisa *Bivariat*, dilakukan terhadap dua variable yang di duga berhubungan atau berkolerasi. Data yang diperoleh dalam bentuk ordinal terlebih dahulu dianalisa dengan menggunakan uji normalitas

jika distribusi data normal maka menggunakan uji statistik yaitu uji *Paired t-test*. Sedangkan jika data distribusi data tidak normal maka menggunakan Uji statistik *Wilcoxon*, Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kondisi luka sebelum dan sesudah dan setelah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum.

H. Etika Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan etika penelitian menurut Notoadmojo, 2010:

1. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Informasi dari responden dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Kerahasiaannya dijamin dengan tidak mencantumkan identitas responden pada lembar kuesioner serta informasi akan disimpan dan tidak dapat diakses oleh orang lain, selanjutnya lembar pengisian data disimpan sampai proses pendidikan selesai. Informasi yang telah didapatkan oleh peneliti tidak disebarkan ke orang lain dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja.

2. *Beneficence* (manfaat)


Prinsip ini mengharuskan peneliti untuk memperkecil resiko dan memaksimalkan manfaat baik manfaat untuk kepentingan manusia secara individu atau masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki resiko sangat rendah karena penelitian ini hanya diberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dan tidak dilakukan perlakuan ataupun uji coba.

3. *Justice*

Dalam penelitian, peneliti harus adil terhadap responden. Semua responden diberikan intervensi yang sama tanpa membeda-bedakan. Responden akan diberi penjelasan kemudian mengisi lembar observasi dan lembar kuesioner yang sama.

4. *Non maleficence*

Perinsip ini adalah kewajiban untuk tidak membahayakan responden penelitian. Responden berhak memutuskan dengan sukarela dengan apakah ikut ambil bagian dalam penelitian tanpa resiko yang merugikan. Pada penelitian ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Griya afiat makassar merupakan klinik perawatan luka diabetes yang terletak di jl. Syekh yusuf, somba opu, kabupaten gowa. Griya afiat didirikan pada tahun 2008. Klinik Griya afiat sudah menangani berbagai jenis seperti diantaranya luka kaki diabetes, luka arteri, luka vena, luka kangker, luka bakar, luka oprasi, luka sectio caesar, luka decubitus dan klinik griya afiat juga memberikan pelayanan home care. Misi dari klinik griya afiat yaitu memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif dan terpadu.

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang mengenai perbedaan kondisi luka sebelum dan setelah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum di klinik Griya Afiat Makassar, dengan jumlah responden sebanyak 15 orang. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan sejak tanggal 27 Agustus – 27 September 2018 dengan cara melakukan observasi terhadap proses perkembangan luka ulkus diabetik dan dilakukan perawatan luka secara 3 kali pertemuan. Data yang telah terkumpul dilakukan *editing, coding, entry, cleaning* dan analisis uji statistik, sehingga diperoleh pengaruh metode modern dressing terhadap proses penyembuhan luka ulkus diabetik.

Hasil penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data umum mengenai karakteristik pasien ulkus diabetik yang terdiri dari umur, jenis kelamin. Data khusus terdiri dari kondisi dan tingkat luka ulkus kaki diabetik pasien

sebelum dan setelah dilakukan metode modern dressing terhadap perawatan luka ulkus diabetik.

Analisis yang digunakan mencakup analisis univariat untuk mengetahui sebaran frekuensi karakteristik responden meliputi: Umur dan jenis kelamin sedangkan analisis bivariat dengan menggunakan *Uji Wilcoxon*.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden berdasarkan umur

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden modern dressing di Klinik Griya Afiat maka dapat digambarkan distribusi responden berdasarkan umur.

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Modern Dressing Berdasarkan Umur di Klinik Griya Afiat.

Umur	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
45-50 Tahun	4	26,6
51-55 Tahun	7	46,6
56-60 Tahun	3	20
60 >	1	6,66
Total	15	100.0

(Data Primer, 2018)

Distribusi frekuensi responden menurut umur seperti yang tersaji dalam tabel distribusi diatas menunjukkan bahwa paling banyak adalah responden dengan umur antara 51-55 tahun yaitu sebanyak 7 orang (46,6%),

sedangkan responden dengan umur 45-50 tahun sebanyak 4 orang (26,6%), umur 56-60 tahun ada 3 orang (20%) dan umur 60 > hanya 1 orang (6.66%).

b. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden modern dressing di Klinik Griya Afiat maka dapat digambarkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Modern Dressing Berdasarkan jenis kelamin di Klinik Griya Afiat.

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Pria	6	40
Wanita	9	60
Total	15	100.0

(Data Primer, 2018).

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan bahwa laki-laki sebanyak 6 orang responden (40%) dan perempuan sebanyak 9 orang responden (60%).

Pengukuran luka menggunakan skala ukur perubahan status luka (BWAT) dengan nilai 1-9 bermakna jaringan luka sembuh, nilai 9-13 bermakna jaringan mengalami penyembuhan, nilai 13-59 bermakna mengalami regenerasi, dan nilai >60 bermakna luka mengalami degenerasi, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

a. Perbedaan kondisi luka ulkus diabetik sebelum rawat luka modern dressing di klinik Griya Afiat.

Tabel 4.3
Distribusi Rata-Rata Penyembuhan Luka Ulkus Diabetik
Sebelum Rawat Luka Modern Dressing
Di Klinik Griya Afiat (n=15)

Proses Penyembuhan Luka (Hari)	Median	Modus	Standart Devisiasi
Data pretest	35,00	30	9,848

Tabel 4.4
Distribusi Tingkat Luka Ulkus sebelum rawat luka modern
dressing di Klinik Griya Afiat.

No	Parameter	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ukuran* (Panjang x Lebar)		
	1. P x L < 4 cm	8	53,3
	2. P x L < 16 cm	4	26,7
	3. P x L 16 < 36 cm	0	0
	4. P x L 36 < 80 cm	1	6,7
	5. P x L > 80 cm	2	13,3
	TOTAL	15	100
2	Kedalaman*		
	1. Stage 1	2	13,3
	2. Stage 2	10	66,7
	3. Stage 3	3	20,0
	4. Stage 4	0	0
	5. necrosis wound	0	0
	TOTAL	15	100
3	Tepi Luka*		
	1. Samar, tidak jelas terlihat	0	0
	2. Batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar luka	2	13,3
	3. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka	10	66,7
	4. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal	3	20,0
	5. Jelas, fibrotic, parut tebal/ hyperkeratonic	0	0

		0	0
	TOTAL	15	100
4	Terowongan/Goa*		
	1. Tidak ada goa	4	26,7
	2. Goa < 2 cm diarea manapun	4	26,7
	3. Goa 2 – 4 cm seluas < 50% pinggir luka.	3	20,0
	4. Goa 2 – 4 cm seluas > 50% pinggir luka.	0	0
	5. Goa > 4 cm diarea manapun.	4	26,7
	TOTAL	15	100
5	Tipe Jaringan Nekrotik*		
	1. Tidak ada	3	20,0
	2. Putih atau abu-abu jaringan mati dan atau slough yang tidak lengket (mudah dihilangkan)	3	20,0
	3. Slough mudah dihilangkan		60,0
	4. Lengket, lembut dan ada jaringan parut palsu berwarna hitam (black eschar)	9	0
	5. Lengket berbatas tegas, keras dan ada black eschar	0	0
	TOTAL	15	100
6	Jumlah Jaringan Nekrotik*		
	1. Tidak tampak	4	26,7
	2. < 25% dari dasar luka	6	40,0
	3. 25% dari dasar luka hingga 50%	4	26,7
	4. >50% hingga <75% dari dasar luka	1	6,7
	5. 75% hingga 100% dari dasar luka	0	0
	TOTAL	15	100
7	Tipe Eksudat*		
	1. Tidak ada eksudat	0	0
	2. Bloody	4	26,7
	3. Serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink).	6	40,0
	4. Serosa (encer, berair, jernih).	2	13,3
	5. purulen (encer atau kental, keruh, kecoklatan/kekuningan, dengan atau tanpa bau).	3	20,0

	TOTAL	15	100
8	Jumlah Eksudat*		
	1. kering	0	0
	2. moist	0	0
	3. sedikit	7	46,7
	4. sedang	4	26,7
	5. banyak	4	26,7
	TOTAL	15	100
9	Warna Kulit Sekitar Luka*		
	1. Pink atau warna kulit normal setiap bagian luka.	2	13,3
	2. Merah terang jika disentuh	1	6,7
	3. Putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi.	5	33,3
	4. Merah gelap atau ungu dan atau tidak pucat.	7	46,7
	5. Hitam atau hiperpigmentasi	0	0
	TOTAL	15	100
10	Edema Perifer/Tepi Jaringan		
	1. Tidak ada pembengkakan atau edema.	3	20,0
	2. Tidak ada pitting edema sepanjang <4 cm sekitar luka.	5	33,3
	3. Tidak ada pitting edema sepanjang ≥ 4 cm sekitar luka.	2	13,3
	4. Pitting edema sepanjang <4 cm disekitar luka	5	33,3
	5. Krepitus dan atau pitting edema sepanjang >4cm disekitar luka.	0	0
	TOTAL	15	100
11	Pengerasan Jaringan Tepi*		
	1. Tidak ada	3	20,0
	2. Pengerasan <2 cm disebagian kecil sekitar luka	9	60,0
	3. Pengerasan 2-4 cm menyebar <50% ditepi luka	3	20,0
	4. Pengerasan 2-4 cm penyebar >50% ditepi luka	0	0
	5. Pengerasan > 4 cm diseluruh tepi luka		

		0	0
	TOTAL	15	100
12	Jaringan Granulasi*		
	1. Kulit utuh atau stage 1	0	0
	2. Terang 100% jaringan granulasi	0	0
	3. Terang 50% jaringan granulasi	7	46,7
	4. Granulasi 25%	6	40,0
	5. Tidak ada jaringan granulasi	2	13,3
	TOTAL	15	100
13	Epitelisasi*		
	1. 100% epiteliasi	0	0
	2. 75 s/d 100% epitalisasi	0	0
	3. 50 s/d 75% epitalisasi.	3	20,0
	4. 25% s/d 50 epitalisasi.	5	33,3
	5. < 25% epitalisasi.	7	46,7
	TOTAL	15	100

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pengkajian luka ulkus kaki diabetik pada 15 pasien ulkus diabetik dengan menggunakan 13 item BWAT sebelum dilakukan tindakan perawatan luka modern dressing memiliki hasil yang berbeda-beda. Item ukuran luka ditunjukkan bahwa jumlah pasien ulkus diabetik paling banyak yaitu 8 orang (53,3%) berada pada skor 1. Item kedalaman, didapatkan bahwa sebanyak 10 orang (66,7%) laserasi lapisan epidermis dan atau dermis. Tepi luka jelas, tidak menyatu dengan dasar luka berjumlah 10 orang (66,7%). Tidak memiliki Goa atau terowongan berjumlah 4 orang (26,7%) adapun Goa < 2 cm di area manapun berjumlah 4 orang (26,7%)

dan Goa > 4cm diarea manapun berjumlah 4 orang (26,7%) dari total keseluruhan pasien ulkus diabetik.

Tipe jaringan nekrotik pada ulkus kaki diabetik di dapatkan separuh pasien ulkus diabetik (60,0%) memiliki slough mudah dihilangkan. Jumlah jaringan nekrotik < 25% dari dasar luka sejumlah 6 (40,0%). Tipe eksudat pada ulkus kaki diabetik adalah serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink) sebanyak 6 orang (40,0%). Jumlah eksudat sedikit dialami oleh 7 orang (46,7%).

Warna kulit disekitar luka mengalami merah gelap atau ungu dan atau tidak pucat sebanyak 7 orang (46,7%). Edema jaringan juga muncul sepanjang <4 cm disekitar luka sebanyak 5 orang (33,3%) dan tidak ada pitting edema <4 cm disekitar luka sebanyak 5 orang (33,3). Pengerasan jaringan <2 cm disebagian kecil sekitar luka sebanyak 9 orang (60,0%). Luka ulkus kaki diabetik mengalami 50% granulasi sebanyak 7 orang (46,7%) dan jaringan epitel <25% pada ulkus kaki diabetik sebanyak 7 orang (46,7%).

- b. Perbedaan kondisi luka ulkus diabetik setelah rawat luka modern dressing di Klinik Griya Afiat.**

Tabel 4.5
Distribusi Rata-Rata Proses Penyembuhan Luka Ulkus
Diabetik Setelah Rawat Luka Modern
Dressing di Klinik Griya Afiat (n=15)

Proses Penyembuhan Luka (Hari)	Median	Modus	Standart Devisiasi
Data post tast	31,00	23	9,546

Tabel 4.6
Distribusi Tingkat Luka Ulkus setelah rawat luka modern dressing
di Klinik Griya Afiat.

No	Parameter	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ukuran* (Panjang x Lebar)		
	1. P x L < 4 cm	8	53,3
	2. P x L < 16 cm	4	26,7
	3. P x L 16 < 36 cm	0	0
	4. P x L 36 < 80 cm	1	6,7
	5. P x L > 80 cm	2	13,3
	TOTAL	15	100
2	Kedalaman*		
	1. Stage 1	3	20,0
	2. Stage 2	9	60,0
	3. Stage 3	3	20,0
	4. Stage 4	0	0
	5. necrosis wound	0	0
	TOTAL	15	100
3	Tepi Luka*		
	1. Samar, tidak jelas terlihat	0	0
	2. Batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar luka	3	20,0
	3. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka	10	66,7
	4. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal	2	13,3
	5. Jelas, fibrotic, parut tebal/ hyperkeratonic		

		0	0
	TOTAL	15	100
4	Terowongan/Goa*		
	1. Tidak ada goa	5	33,3
	2. Goa < 2 cm diarea manapun	4	26,7
	3. Goa 2 – 4 cm seluas < 50% pinggir luka.	1	6,7
	4. Goa 2 – 4 cm seluas > 50% pinggir luka.	1	6,7
	5. Goa > 4 cm diarea manapun.	4	26,7
	TOTAL	15	100
5	Tipe Jaringan Nekrotik*		
	1. Tidak ada	4	26,7
	2. Putih atau abu-abu jaringan mati dan atau slough yang tidak lengket (mudah dihilangkan)	7	46,7
	3. Slough mudah dihilangkan	4	26,7
	4. Lengket, lembut dan ada jaringan parut palsu berwarna hitam (black eschar)	0	0
	5. Lengket berbatas tegas, keras dan ada black eschar	0	0
	TOTAL	15	100
6	Jumlah Jaringan Nekrotik*		
	1. Tidak tampak	4	26,7
	2. < 25% dari dasar luka	7	46,7
	3. 25% dari dasar luka hingga 50%	4	26,7
	4. >50% hingga <75% dari dasar luka	0	0
	5. 75% hingga 100% dari dasar luka	0	0
	TOTAL	15	100
7	Tipe Eksudat*		
	1. Tidak ada eksudat	0	0
	2. Bloody	7	46,7
	3. Serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink).	2	13,3
	4. Serosa (encer, berair, jernih).	4	26,7
	5. purulen (encer atau kental, keruh, kecoklatan/kekuningan, dengan atau tanpa bau).	2	13,3
	TOTAL	15	100

8	Jumlah Eksudat*		
	1. kering	1	6,7
	2. moist	0	0
	3. sedikit	7	46,7
	4. sedang	6	40,0
	5. banyak	1	6,7
	TOTAL	15	100
9	Warna Kulit Sekitar Luka*		
	1. Pink atau warna kulit normal setiap bagian luka.	3	20,0
	2. Merah terang jika disentuh	2	13,3
	3. Putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi.	4	26,7
	4. Merah gelap atau ungu dan atau tidak pucat.	6	40,0
	5. Hitam atau hiperpigmentasi	0	0
	TOTAL	15	100
10	Edema Perifer/Tepi Jaringan		
	1. Tidak ada pembengkakan atau edema.	4	26,7
	2. Tidak ada pitting edema sepanjang <4 cm sekitar luka.	4	26,7
	3. Tidak ada pitting edema sepanjang \geq 4 cm sekitar luka.	2	13,3
	4. Pitting edema sepanjang <4 cm disekitar luka	5	33,3
	5. Krepitus dan atau pitting edema sepanjang > 4cm disekitar luka.	0	0
	TOTAL	15	100
11	Pengerasan Jaringan Tepi*		
	1. Tidak ada	6	40,0
	2. Pengerasan <2 cm disebagian kecil sekitar luka	7	46,7
	3. Pengerasan 2-4 cm menyebar <50% ditepi luka	2	13,3
	4. Pengerasan 2-4 cm penyebar >50% ditepi luka	0	0
	5. Pengerasan > 4 cm diseluruh tepi luka	0	0
	TOTAL	15	100
12	Jaringan Granulasi*		
	1. Kulit utuh atau stage 1	0	0
	2. Terang 100% jaringan granulasi	0	0

	3. Terang 50% jaringan granulasi	12	80,0
	4. Granulasi 25%	1	6,7
	5. Tidak ada jaringan granulasi	2	13,3
	TOTAL	15	100
13	Epitelisasi*		
	1. 100% epiteliasi	0	0
	2. 75 s/d 100% epitalisasi	0	0
	3. 50 s/d 75% epitalisasi.	4	26,7
	4. 25% s/d 50 epitalisasi.	8	53,3
	5. < 25% epitalisasi.	3	20,0
	TOTAL	15	100

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat perubahan proses penyembuhan luka kaki diabetik pada masing-masing item BWAT setelah dilakukan tindakan perawatan modern dressing setiap 3 kali pertemuan. Item ukuran luka, luka ulkus kaki diabetik masih belum mengalami perubahan dan masih paling banyak yaitu 8 orang (53,3%) berada pada skor 1. Item kedalaman luka awalnya sebanyak 10 orang (66,7%) kedalaman lukanya berada skor 2 yaitu leserasi lapisan epidermis dan atau dermis menurun menjadi 9 orang (60,0%), dan pada skor 1 yang awalnya sebanyak 2 orang bertambah menjadi 3 orang (20%). Tepi luka nampak mengalami perubahan pada skor 2 yaitu batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar luka sebanyak 2 orang bertambah menjadi 3 orang (20,0%) dan pada skor 4 jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal sebanyak 3 orang berkurang menjadi

2 orang (13,3%). Terowongan Goa pada skor 1 yaitu tidak ada goa berjumlah 4 bertambah menjadi 5 orang

Tipe jaringan Nekrotik pada ulkus kaki diabetik dengan skor 3 slough mudah dihilangkan berkurang menjadi 4 orang 26,7% dan meningkat pada skor 2 yaitu putih atau abu-abu jaringan mati dan atau slough yang tidak lengket (mudah dihilangkan) menjadi 7 orang (46,7%), Skor 1 yaitu tidak ada jaringan nekrotik bertambah menjadi 4 orang (26,7%). Jumlah pasien ulkus diabetik dengan jaringan nekrotik kurang dari 25% bertambah dari 6 orang menjadi 7 orang (46,7%) dan Pada skor 4 jaringan nekrotik diatas 50% - 70% berkurang dari 1 orang menjadi 0. Tipe eksudat skor 2 bloody bertambah dari 4 orang menjadi 7 orang 46,7%, skor 3 serosangueneous berkurang dari 6 orang menjadi 2 orang (13,3%), dan pada skor 4 bertambah dari 2 orang menjadi 4 orang (26,7%), dan tipe eksudat skor 5 perulen berkurang dari 3 orang menjadi 2 orang (13,3%).

Jumlah eksudat pada skor 4 sedang bertambah dari 4 orang menjadi menjadi 6 orang (40,0%), pada skor 5 banyak berkurang dari 4 orang menjadi 1 orang (6,7%), dan pada skor 1 kering bertambah menjadi 1 orang (6,7%). Warna kulit sekitar luka dengan skor 4 merah gelap atau ungu dan atau tidak pucat berkurang dari 7 orang menjadi 6 orang (40,0%), pada skor 3 putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi berkurang dari 5 orang menjadi 4 orang (26,7%), pada skor 2 merah terang jika disentuh bertambah dari 1 orang menjadi 2 orang (13,3%), dan pada skor 1 pink atau warna kulit

normal setiap bagian luka bertambah dari 2 orang menjadi 3 orang (20,0%). Edema jaringan perifer tidak mengalami pembengkakan bertambah dari 3 orang menjadi 4 orang (26,7%), pada skor 2 tidak ada pitting edema sepanjang <4 cm sekitar luka berkurang dari 5 orang menjadi 4 orang (26,7).

Jaringan granulasi skor 3 terang 50% jaringan granulasi bertambah dari 7 orang menjadi 12 orang (80%), skor 4 granulasi berkurang dari 6 orang menjadi 1 orang (6,7%). Luka mulai nampak jaringan epitel skor 3 50% sd 65% bertambah dari 3 orang menjadi 4 orang (26,7%), pada skor 4 25% sd 50% bertambah dari 5 orang menjadi 8 orang (53,3%) dan pada skor 5 < 25% berkurang dari 7 orang menjadi 3 orang.

2. Analisis Bivariat

a) Pengaruh metode rawat luka modern dressing terhadap penyembuhan luka ulkus diabetik pada pasien diabetes mellitus di Klinik Griya Afiat.

- 1) Perbedaan kondisi luka ulkus diabetik sebelum dan sesudah rawat luka modern dressing di Klinik Griya Afiat.

Tabel 4.7
Distribusi Proses penyembuhan luka ulkus diabetik di Klinik Griya Afiat (n=15)

Kode Responden	Pretest		Posttest		Difference (Δ)
	Nilai	Kategorik	Nilai	Kategorik	
1	35	Regenerasi Luka	29	Regenerasi Luka	-6
2	33	Regenerasi Luka	33	Regenerasi Luka	0
3	53	Regenerasi Luka	47	Regenerasi Luka	-6

4	35	Regenerasi Luka	31	Regenerasi Luka	-4
5	31	Regenerasi Luka	29	Regenerasi Luka	-2
6	32	Regenerasi Luka	30	Regenerasi Luka	-2
7	21	Regenerasi Luka	21	Regenerasi Luka	0
8	27	Regenerasi Luka	23	Regenerasi Luka	-4
9	54	Regenerasi Luka	50	Regenerasi Luka	-4
10	41	Regenerasi Luka	40	Regenerasi Luka	-1
11	29	Regenerasi Luka	23	Regenerasi Luka	-6
12	50	Regenerasi Luka	48	Regenerasi Luka	-2
13	30	Regenerasi Luka	30	Regenerasi Luka	0
14	44	Regenerasi Luka	39	Regenerasi Luka	-5
15	42	Regenerasi Luka	41	Regenerasi Luka	-1
Total	557		517		-40
Rerata	35,00		31,00		-2.66

Berdasarkan Tabel 4.4 dan 4.6 dapat disimpulkan bahwa seluruh pasien ulkus diabetik mengalami penurunan rerata penyembuhan luka ulkus diabetik tetapi tetap dalam makna regenerasi. Tabel menunjukkan penurunan rerata penyembuhan luka sebanyak -2.66 dari nilai rerata pretest 35,00 dan nilai rerata posttest 31,00.

- 2) Perbedaan proses penyembuhan luka ulkus diabetik sebelum dan setelah rawat luka modern dressing di Klinik Griya Afiat.

Tabel 4.8
Distribusi Perbedaan Proses Penyembuhan Luka Ulkus Diabetik
Sebelum dan Setelah Rawat Luka Modern Dressing
di Klinik Griya Afiat (n=15)

Proses Penyembuhan Luka (Hari)	Median	SD	P value
Pretest	35,00	9,848	0,005
Posttest	31,00	9,546	

Sumber: Data Primer Terolah (2018)

Hasil p-value perhitungan *uji wilcoxon* didapatkan nilai 0,005 ($p < 0,05$) yang berarti disimpulkan bahwa memiliki makna H_1 diterima ada perbedaan kondisi luka sebelum dan sesudah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum di Klinik Griya.

C. Pembahasan

1) Karakteristik pasien ulkus diabetik di Klinik Griya Afiat

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 60% pasien ulkus diabetik berjenis kelamin wanita. Hal ini sesuai dengan penelitian Ferawati (2014), yang menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan berisiko terhadap terjadinya ulkus diabetikum. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan hormonal pada perempuan yang memasuki masa menopause. Hasil penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Purwati (2013) yang menyatakan bahwa terdapat 64,7% responden berjenis kelamin perempuan yang menderita diabetes mellitus dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Menurut peneliti, sesuai dengan

penelitian yang didapatkan bahwa jenis kelamin salah satu faktor terjadinya ulkus diabetikum khususnya pada wanita.

Usia merupakan faktor resiko kedua yang menjadi penyebab terjadinya ulkus kaki diabetik. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa usia pasien ulkus diabetik adalah pada umur 51-55 tahun sebanyak 7 orang 46,6%, dengan usia minimal 49 tahun dan maksimal 77 tahun. Rentang usia tersebut masuk dalam kategorik usia lanjut awal. Usia lanjut berisiko terhadap terjadinya ulkus diabetikum. Pada usia lanjut fungsi tubuh secara fisiologi menurun, hal ini disebabkan karena penurunan sekresi atau retensi insulin, sehingga kemampuan fungsi tubuh terhadap pengendalian glukosa darah yang tinggi kurang optimal (Ferawati, 2014). Pasien ulkus diabetik yang datang untuk mendapatkan perawatan luka di Klinik Griya Afiat memiliki rata-rata usia 47-77 tahun, tidak menutup kemungkinan bahwa usia lanjut menjadi penyebab komplikasi dari penyakit diabetes mellitus ulkus diabetik.

2) Kondisi luka ulkus diabetik sebelum menggunakan modern dressing di Klinik Griya Afiat.

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil bahwa ukuran luka ulkus kaki diabetik pada pasien ulkus diabetik sebelum dilakukan perawatan luka dengan menggunakan modern dressing, didapatkan nilai rerata luka ulkus kaki diabetik adalah 35,00. Rerata luka ulkus kaki diabetik tersebut didapatkan melalui penjumlahan 15 responden yang masing-masing responden terdiri dari 13 parameter luka ulkus diabetik, dan hasil yang didapat beragam terbukti

dengan luka terluas lebih dari >80 cm berjumlah 2 pasien, luas luka antara 36-80 cm berjumlah 1 pasien, luas luka dibawah 16 cm berjumlah 4 pasien, dan luas luka dibawah 4 cm berjumlah 8 pasien. Pada pasien diabetes mellitus apabila kadar glukosa darah tidak terkontrol akan terjadi komplikasi kronik yaitu neuropati, menimbulkan perubahan jaringan syaraf karena adanya penimbunan sorbitol dan fruktosa sehingga mengakibatkan akson menghilang, penurunan kecepatan induksi, parastesia, menurunnya reflek otot, atrofi otot, keringat berlebihan, kulit kering dan hilang rasa . apabila pasien diabetes mellitus tidak hati-hati dapat terjadi trauma yang akan menyebabkan lesi dan menjadi ulkus kaki diabetes (Waspadji, 2009). Menurut peneliti bahwa ukuran luas kaki yang didapatkan pada pasien ulkus diabetik berbeda-beda di dapatkan setiap orang. Penyebab tersebut bisa didapatkan mulai dari penggunaan alas kaki yang kurang tepat, terkena benda tajam saat beraktifitas dan ada juga yang tertusuk paku dan beling, luka lecet dan sebagainya. Luka yang didapatkan pasien ulkus diabetik tidak dirasakan atau tidak disadari karena penurunan sensasi rasa pada luka akibat kadar gula yang tinggi dan terkena infeksi.

Tingkat kedalaman luka terbanyak adalah laserasi lapisan epidermis dan atau dermis dengan jumlah pasien 10 orang, sedangkan seluruh lapisan kulit hilang, kerusakan atau necrosis subkutan, tidak mencapai fascia, tertutup jaringan granulasi berjumlah 3 orang dan eritema atau kemerahan berjumlah 2 orang. Menurut Clayton & Tom (2009), gangguan sistem imunitas pada pasien diabetes menyebabkan luka mudah terinfeksi dan jika terkontaminasi bakteri

akan menjadi gangren sehingga semakin sulit perawatannya dan berisiko amputasi. Kondisi kedalaman luka yang semakin parah disebabkan karena gangguan sistem imun dan infeksi bakteri pada luka.

Kondisi tepi luka pada pasien ulkus diabetik memiliki batas tepi yang jelas, tidak menyatu dengan dasar luka berjumlah 10 orang, kondisi luka tebal berjumlah 3 orang, dan batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar luka berjumlah 2 orang. Kondisi tepi luka yang nampak jelas tersebut merupakan bukti luka tidak mengalami proses penyembuhan luka yang baik. Menurut peneliti, luka yang mengalami penyembuhan akan nampak samar dan terlihat jelas dan sudah mulai membaik, maka dapat dikatakan bahwa proses penyembuhan luka seluruh pasien ulkus diabetik masih kurang membaik.

Luka ulkus kaki diabetik pada pasien ulkus diabetik yang memiliki goa diatas 4 cm di area manapun berjumlah 4 orang, goa 2-4 cm seluas dibawah 50% pinggir luka berjumlah 3 orang, goa dibawah 2 cm di area manapun berjumlah 4 orang, dan yang tidak memiliki goa berjumlah 4 orang. Kondisi luka yang memiliki goa akan memperlambat penyembuhan luka, karena goa akan menjadi tempat nanah atau eksudat sehingga proses penyembuhan luka lama menutup. Peneliti melakukan pengukuran goa terhadap responden pasien ulkus diabetik menggunakan mistar dan mengidentifikasi sejauh mana kedalaman luka sehingga perawatan luka dapat optimal diberikan.

Jaringan nekrotik pada ulkus kaki diabetik yang memiliki slough mudah dihilangkan berjumlah 9 orang, jaringan nekrotik putih atau abu-abu

jaringan mati mudah dihilangkan atau slough yang tidak lengket berjumlah 3 orang dan yang tidak memiliki jaringan nekrotik sebanyak 3 orang. Jumlah jaringan nekrotik dibawah 25% berjumlah 6 orang. Eksudat pada luka yang berjenis Serosangueneous encer, merah, berair, merah pucat atau pink berjumlah 6 orang pada balutan dialami 7 orang. Menurut waspadji (2009), kontrol luka merupakan bentuk upaya perawatan luka. Prinsip terpenting yang harus diketahui adalah luka memerlukan kondisi optimal atau kondusif. Setelah dilakukan debridemen yang baik dan adekuat, maka jaringan nekrotik akan berkurang dan dengan sendirinya produksi pus dari ulkus juga akan berkurang. Menurut peneliti, apabila jaringan nekrotik tidak dibersihkan maka akan menghambat proses penyembuhan luka dan proses pambuhan akan berlangsung maksimal apabila pengangkatan jaringan nekrotik berhasil.

Pengkajian warna kulit luka didapatkan 7 orang mengalami merah gelap atau ungu dan atau tidak pucat, 5 orang putih atau abu-abu pucat atau hipopigmentasi, 1 orang merah jika disentuh dan 2 orang pink atau warna kulit normal setiap bagian luka. Pengkajian edema jaringan dengan dilakukan penekanan (pitting) selama lebih dari 3 detik, didapatkan bahwa luka memiliki pitting edema dibawah 2 cm disebagian kecil sekitar luka berjumlah 9 orang, pengerasan 2-4 cm menyebar dibawah 50% ditepi luka berjumlah 3 orang dan pasien tidak mengalami pengerasan jaringan tepi berjumlah 3 orang. Pengkajian tersebut dilakukan untuk untuk mengetahui status vaskularisasi pada jaringan luka ulkus kaki diabetik. Menurut Gitarja (2008), menilai status vaskular erat

kaitannya dengan pengangkutan oksigen yang adekuat keseluruh jaringan. Pengkajian tersebut meliputi perlakuan palpasi, capillary refill, akril, dan saturasi oksigen. Menurut peneliti, kondisi luka ulkus diabetik yang dialami sebagian pasien memiliki vaskularisasi yang kurang baik.

Pengkajian terhadap keberadaan jaringan granulasi untuk melihat proses penyembuhan luka. Pada penelitian ini didapatkan bahwa 7 orang memiliki granulasi terang 50%, 6 orang memiliki granulasi 25%, dan 2 orang yang tidak memiliki granulasi. Pada pasien ulkus diabetik yang belum mengalami dibawah 25% epitelisasi sebanyak 7 orang, pasien ulkus yang mengalami epitelisasi 25%-75% sebanyak 5 orang, dan pasien ulkus yang mengalami epitelisasi 50%-75% sebanyak 3 orang. Jaringan granulasi merupakan jaringan penghubung yang baru terbentuk dan pembuluh darah kecil yang berasal dari permukaan luka dalam proses penyembuhan luka. Menurut pendapat peneliti bahwa luka pada sebagian pasien ulkus diabetik sedikit membaik akan tetapi ada juga beberapa pasien masih belum membaik karena proses granulasi belum berjalan secara optimal, maka epitelisasi luka juga belum masih terbentuk.

3) Kondisi luka ulkus diabetik setelah menggunakan modern dressing di Klinik Griya Afiat.

Ukuran luka ulkus kaki diabetik setelah dilakukan perlakuan perawatan modern dressing sebanyak 3 kali pertemuan, maka didapatkan hasil bahwa perubahan ukuran pada luka menjadi berkurang dengan rerata 31,00.

Pada hasil penelitian dengan luas luka ulkus kaki diabetik belum mengalami perubahan luka terluas lebih dari di >80 cm berjumlah 2 pasien, luas luka antara 36-80 cm berjumlah 1 pasien, luas luka dibawah 16 cm berjumlah 4 pasien, dan luas luka dibawah 4 cm berjumlah 8 pasien.

Pengkajian pada tingkat kedalaman luka mengalami perubahan yang lebih baik, dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa sebelum dilakukan modern dressing leserasi lapisan dermis dan atau dermis berjumlah 10 orang dan berkurang menjadi 9 orang, eritema atau kemerahan bertambah dari 2 orang menjadi 3 orang. Menurut peneliti, kedalaman ulkus diabetik dapat diidentifikasi bahwa mengalami penurunan stage dan ada yang bertambah, yang membuktikan bahwa kondisi luka ulkus diabetik mengalami perkembangan.

Pengkajian pada tepi luka ulkus kaki diabetik didapatkan bahwa sebagian pasien ulkus diabetik mengalami perubahan sebelum diberikan perlakuan tepi luka jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal berjumlah 3 orang dan berkurang menjadi 2 orang, dan batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar luka bertambah dari 2 orang menjadi 3 orang. Kondisi tepi luka yang mulai tampak membaik membuktikan bahwa mengalami proses perbaikan sebelum dilakukan perawatan luka modern dressing.

Pengkajian pada goa atau terowongan pada ulkus diabetikum didapatkan hasil sebelum diberikan perlakuan goa 2-4 cm seluas dibawah 50% pinggir luka berjumlah 3 orang dan setelah diberikan perlakuan berkurang menjadi 1 orang, dan pasien ulkus diabetik yang tidak memiliki ulkus diabetik

bertambah dari 4 orang menjadi 5 orang. Dapat dilihat ada beberapa pasien sudah tidak memiliki goa, meski kondisi luka pada pasien ulkus diabetik masih memiliki goa pada luka ulkus diabetik tetapi goa terawat dibuktikan berkurangnya push di dalam goa.

Jaringan nekrotik pada luka ulkus diabetik mengalami pengurangan sebelum diberikan perlakuan jumlah slough mudah dihilangkan berjumlah 9 orang dan berkurang menjadi 4 orang, jaringan nekrotik putih abu-abu jaringan mati dan atau slough yang tidak lengket mudah dihilangkan berjumlah 3 orang dan bertambah menjadi 7 orang. Dan yang tidak memiliki jaringan nekrotik bertambah dari 3 orang menjadi 4 orang.

Pengkajian jumlah jaringan nekrotik pada ulkus diabetik di dapatkan hasil bahwa jumlah jaringan nekrotik dibawah 25% dari dasar luka berjumlah 7 orang dan berkurang menjadi 6 orang, jumlah jaringan diatas 50-75% dari dasar luka berjumlah 1 orang dan berkurang menjadi tidak ada. Berdasarkan jumlah jaringan nekrotik dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa teknik yang dilakukan saat perawatan luka berjalan dengan baik, sehingga nampak hasil perawatan luka setiap kali pasien ulkus diabetik diberikan perlakuan.

Teknik debridment yang baik akan mempengaruhi sebuah kondisi luka baik dari produksi pus pada luka. Berdasarkan penelitian ini bahwa luka mengalami pengurangan jumlah pus sebelum diberikan perlakuan. Tipe eksudat bloody bertambah dari 4 orang menjadi 7 orang, Tipe eksudat serosangueneous berkurang dari 6 orang menjadi 2 orang, tipe eksudat serosa bertambah dari 2

orang menjadi 4 orang, tipe eksudat perulen berkurang dari 3 orang menjadi 1 orang. Apabila dibandingkan dengan sebelum diberikan perawatan modern jumlah eksudat dan mengalami perubahan.

Pengkajian warna kulit sekitar luka merah gelap atau ungu dan atau tidak pucat berjumlah 7 berkurang menjadi 6 orang, putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi berjumlah 5 orang berkurang menjadi 4 orang, warna kulit luka merah terang jika disentuh berjumlah 1 orang dan bertambah menjadi 2 orang, dan warna pink atau warna kulit normal setiap bagian luka bertambah dari 2 orang menjadi 3 orang. Pada pengkajian pitting edema pada pengkajian pitting edema yang tidak ada pitting edema sepanjang dibawah 4 cm sekitar luka mengalami perubahan dari 5 orang menjadi 4 orang dan yang tidak memiliki pembengkakan atau edema bertambah dari 3 menjadi 4 orang. Sedangkan pada pengerasan jaringan perifer dibawah 2 cm disebagian kecil sekitar luka berjumlah 9 orang berkurang menjadi 7 orang, pengerasan 2-4 cm menyebar di bawah 50% ditepi luka berjumlah 3 orang dan mengalami penurunan menjadi 2 orang, dan yang tidak memiliki pengerasan jaringan bertambah dari 3 orang menjadi 6 orang. Kondisi dari warna kulit sekitar luka, pitting edema dan pengerasan jaringan membuktikan luka ulkus diabetik memiliki vaskularisasi yang baik dibandingkan sebelum diberikan perawatan modern dressing.

Pengkajian terakhir dilakukan pada jaringan granulasi dan epitelisasi luka kaki diabetik. Pada penelitian ini, didapatkan hasil 80% pasien ulkus

diabetik yang memiliki granulasi terang 50% dari sebelumnya hanya 46,7%. Granulasi 25% berkurang dari 6 orang menjadi 1 orang. Sedangkan pada pengkajian epitelisasi, didapatkan bahwa 50-75% epitelisasi bertambah dari 3 orang menjadi 4 orang, epitel 25-50% juga bertambah dari 5 orang menjadi 8 orang, sedangkan epitel dibawah 25% berkurang dari 7 orang menjadi 3 orang.

Peneliti beranggapan bahwa jaringan granulasi yang muncul sebagai jaringan penghubung dalam proses penyembuhan luka merupakan proses alami. Yang terjadi apabila kondisi luka membaik dengan ditandai luka lembab, vaskularisasi baik, dan tidak ada jaringan nekrotik, maka jaringan granulasi akan tumbuh dan terbentuk jaringan epitel pada luka. Menurut suriadi (2007), pada fase inflamasi terjadi proses granulasi dan kontraksi, fase ditandai dengan pembentukan jaringan granulasi dalam luka. Pada fase ini makrobag dan lymposit masih ikut berperan, tipe sel predominan mengalami proliferasi dan migrasi termasuk sel epitel, fibroblast dan sel endothelial. Hasil penelitian ini, kondisi luka pasien ulkus diabetikum terlihat adanya regenerasi jaringan granulasi dan epitel dan mengalami perubahan.

4) Kondisi sebelum dan setelah perawatandengan menggunakan modern dressing pada penderita luka ulkus diabetikum di Klinik Griya Afiat.

Berdasarkan hasil pengkajian menggunakan 13 parameter BWAT (*Bates Jensen Wound Tools*) pada tabel 4.4 dan tabel 4.6, serta tabel perubahan parameter setiap responden yang terlampir pada lampiran, dilakukan pembahasan sebagai berikut. Ukuran luka pada setiap responden belum terdapat

mengalami perubahan dan masih tetap skor yang sama. Fase penyembuhan luka terbagi dalam tiga fase yaitu, fase *Inflamasi*, *proliferasi* dan penyudahan yang merupakan perupaan kembali jaringan (*remodelling*). Darwis (1998) dalam Mariyunani (2013) proses penyembuhan luka merupakan suatu proses yang kompleks karena berbagai kegiatan bioseluler dan biokimia yang saling berkesinambungan. Proses penyembuhan luka yang sebenarnya adalah suatu proses yang terjadi secara normal. Artinya, tubuh yang sehat mempunyai kemampuan alami untuk melindungi dan memulihkan dirinya. Peningkatan aliran darah ke daerah yang rusak, membersihkan sel dan benda asing merupakan perkembangan awal dari proses penyembuhan luka (Mariyunani, 2015). Peneliti menyimpulkan bahwa proses penyembuhan luka pada pasien luka ulkus diabetik belum mengalami perubahan dan masih dalam proses perbaikan.

Kedalaman luka pada responden 8 dari skor 2 berubah menjadi 1 yang dimana dari leserasi lapisan epidermis dan atau dermis menjadi eritema atau kemerahan. Kedalaman luka akan membentuk jaringan baru dapat dilihat jika kedalaman luka nampak kotor akan mengalami infeksi akibat dari pertumbuhan bakteri. Jika kedalaman luka pasien ulkus diabetik terdapat sinus atau terdapat luka dalam yang sampai berlubang maka perawat akan melakukan irigasi dengan NaCl sampai kedalaman luka, jika luka tidak dibersihkan dengan baik terdapat kuman yang memperlambat proses penyembuhan luka. Menurut (Gitarja, 2008) pencucian bertujuan untuk membuang jaringan nekrosis, cairan

luka yang berlebihan, sisa balutan yang digunakan dan sisa metabolik tubuh pada cairan luka. Mencuci dapat meningkatkan, memperbaiki dan mempercepat penyembuhan luka serta menghindari terjadinya infeksi.

Tepi luka pada responden 8 pada skor 3 berubah menjadi skor 2, responden 12 pada skor 4 berubah menjadi 3. Kondisi tepi luka yang mengalami penebalan merupakan luka yang belum mengalami proses penyembuhan, tetapi tepi luka yang mengalami samar dan tipis menunjukkan proses penyembuhan luka. Menurut Gabriel *et al* (2009), sitokain mengatur proliferasi sel, migrasi, sintesis matriks, deposit dan degradasi respon radang dalam perbaikan. Sitokain termasuk PDGF, TGF dan EGF secara bersama membentuk suatu patogenik, netrofil kemudian magrofag. Berdasarkan teori tersebut, proses fagositosis oleh magrofak terjadi pada luka dengan melakukan proses pembersihan jaringan sekitar luka yang mengalami penebalan, sehingga terbentuk jaringan tipis dan samar yang merangsang munculnya jaringan fibroblast dan berfungsi membentuk benang fibrin sebagai awal dari proses angiogenesis.

Terowongan atau goa pada responden 1 pada skor 3 berubah menjadi 2, responden 8 pada skor 2 menjadi 1, dan responden 10 pada skor 3 bertambah menjadi 4. Keberadaan terowongan atau goa akan memperlambat proses penyembuhan luka, karena kondisi luka yang memiliki terowongan atau goa akan menimbulkan eksudat di dalam goa. Perawat mengukur goa pada luka menggunakan kapas lidi dan dimasukkan sepanjang terowongan kemudian

diberi tanda pada kapas lidi terhadap luas terowongan. Menurut Gitarja (2008), kapas lidi steril dimasukkan kedalam luka dengan hati-hati untuk menilai ada tidaknya goa/saluran sinus dan mengukurnya searah jarum jam. Kondisi terowongan yang penuh dengan eksudat sangat tergantung dari cara perawatan melakukan perbesihan luka dengan menggunakan larutan NaCl 0,9%. Jika luka yang telah dibebaskan dari eksudat dibawah terowongan, maka perawat melakukan penekanan pada luka sebelum akhirnya dilakukan dressing atau pembalutan, agar luka mengalami proses perlekatan dan diharapkan terowongan tidak ada lagi.

Tipe jaringan nekrotik pada responden 1,4,5,14,15 berubah dari skor 3 menjadi skor 2. Jumlah jaringan nekrotik pada responden 1 berubah dari skor 2 menjadi skor 1, responden 3 berubah dari skor 3 menjadi skor 2, responden 9 pada skor 4 berubah menjadi skor 3, responden 10 pada skor 2 bertambah menjadi skor 3, responden 14 pada skor 3 berubah menjadi skor 2. Jaringan nekrotik dan jumlah nekrotik harus terus dilakukan proses evaluasi karena akan mempengaruhi pembentukan jaringan granulasi. Menurut Morison (2004), adanya jaringan nekrotik dan krusta yang berlebihan di tempat luka dapat memperlambat penyembuhan dan meningkatkan risiko terjadinya infeksi klinis. Demikian juga adanya segala bentuk benda asing. Gitarja (2008) menambahkan bahwa jaringan nekrotik dapat menghalangi proses penyembuhan luka dengan menyediakan tempat untuk bakteri. Untuk membantu penyembuhan, maka tindakan debridement sangat dibutuhkan. Debridement dapat dilakukan dengan

beberapa metode seperti *mechanical*, *surgical*, *enzimatic*, *autolysis* dan *biochemical*. cara yang paling efektif dalam membuat dasar luka menjadi baik adalah dengan metode autolisis debridmen (Gitarja, 2008). Suriadi (2007) menyatakan bahwa, autolisis debridmen adalah suatu cara peluruhan jaringan nekrotik yang dilakukan oleh tubuh sendiri dengan syarat utama dilakukan luka harus dalam keadaan lembab.

Perawatan melakukan kombinasi pada proses debridemen yang dilakukan, yaitu melakukan normal debridemen dengan cara memotong atau membuang jaringan nekrotik disekitar luka yang menghitam dan jaringan nekrotik kuning yang berada pada bagian dalam luka, kemudian menjaga kelembapan luka dengan cara melakukan pembalutan yang mengandung hidroaktif gel dan salep metcovazin sehingga membantu proses peluruhan jaringan nekrotik pada saat rawat luka berikutnya. Menurut Gitarja (2008), hidroaktif gel mampu melakukan proses peluruhan jaringan nekrotik oleh tubuh sendiri. Hidrogel banyak mengandung air, yang kemudian akan membuat suasana luka yang tadinya kering karena jaringan nekrotik menjadi lembab. *Metcovazin* berfungsi untuk *support autolysis debridement* (meluruhkan jaringan nekrosis) menghindari trauma saat membuka balutan, mengurangi bau tidak sedap, mempertahankan suasana lembab dan granulasi.

Tipe eksudat pada responden 1,5,6 pada skor 3 berubah menjadi pada skor 2, responden 3 pada skor 5 berubah menjadi skor 4 responden 10 pada skor 3 berubah menjadi skor 4. Jumlah eksudat pada responden 3,9,14 pada skor 5

berubah menjadi skor 4, pada responden 4 pada skor 4 berubah menjadi skor 3, pada responden 11 pada skor 3 berubah menjadi skor 1. Menurut peneliti eksudat yang berlebihan akan memperlambat respon penyembuhan luka. Menurut morison (2004), terdapat suatu keseimbangan yang sangat halus antara kebutuhan akan lingkungan luka yang lembab, dan kebutuhan untuk mengeluarkan eksudat berlebihan yang dapat mengakibatkan terlepasnya jaringan. Eksotosin dan sel-sel debris yang berada dalam eksudat dapat memperlambat penyembuhan akibat respon inflamasi yang berlangsung terus menerus. Menurut peneliti kondisi luka yang mengalami banyak eksudat akan mengalami inflamasi dan tidak terbentuknya fibrogen pada luka sehingga pementukan jaringan baru akan lama muncul.

Warna kulit sekitar pada responden 1 pada skor 3 berubah menjadi skor 2, pada responden 10 pada skor 4 berubah menjadi skor 3, responden 11 pada skor 3 berubah menjadi skor 1. Edema perifer pada tepi jaringan pada responden 6 dari skor 2 berubah menjadi skor 1. Pengerasan jaringan perifer pada responden 1,4,8 dari skor 2 berubah menjadi skor 1, responden 3 dari skor 3 berubah menjadi skor 2. Luka yang terinfeksi seringkali ditandai dengan adanya eritema yang makin luas, edema, cairan berubah perulen, nyeri, peningkatan temperatur tubuh dan bau yang khas serta jumlah leukosit yang meningkat (Gitarja, 2008). Kondisi luka yang mengalami perawatan luka mengalami pengurangan dan mengalami proses penyembuhan.

Jaringan granulasi pada responden 1,3,9,12,14 dari skor 4 berubah menjadi skor 3. Menurut peneliti jaringan granulasi yang mengalami pertumbuhan yang baik akan mengalami fase inflamasi. Menurut suriadi (2007), pada fase inflamasi terjadi proses granulasi dan kontraksi, fase ditandai dengan pembentukan jaringan granulasi dalam luka. pada fase ini makrofag dan limfosit masih ikut berperan, tipe sel predominan mengalami proliferasi dan migrasi termasuk sel epitel, fibroblast dan sel endothelial. Proses ini tergantung pada metabolik, konsentrasi oksigen dan faktor pertumbuhan.

Epitelisasi pada responden 3,4,9,14 dari skor 5 berubah menjadi skor 4, responden 11 dari skor 4 berubah menjadi skor 3. Setelah dilakukan tindakan modern dressing didapatkan kondisi luka pada pasien ulkus diabetik mengalami epitelisasi yang mulai membaik. Epitelisasi merupakan salah satu bentuk dari jaringan baru pada fase proliferasi dan fibroblast. Menurut suriadi (2007), pada fase proliferasi fibroblast merupakan elemen utama dalam proses perbaikan dan berperan dalam produksi struktur protein yang digunakan dalam rekonstruksi jaringan. Pada fase ini terjadi angiogenesis dimana kapiler baru serta jaringan baru dimulai tumbuh. Angiogenesis terjadi bersamaan dengan fibroplasia. Berdasarkan ke 13 parameter BWAT diatas, maka penelliti dapat menyimpulkan bahwa 15 responden mengalami proses penyembuhan luka ulkus diabetik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan perawatan luka modern dressing di dapatkan status penilaian luka sebelum dan sesudah

dilakukan perakuan pada 15 pasien yang mengalami luka ulkus kaki diabetik, status penilaian luka sebelum dan sesudah tersebut dilakukan pengolahan data untuk mengetahui apakah memiliki pengaruh perawatan luka modern dressing terhadap proses penyembuhan luka ulkus diabetikum. Hasil rerata penilaian sebelum dilakukan perawatan luka modern dressing adalah 35,00, dan sesudah dilakukan perawatan luka modern dressing selama 3 kali pertemuan di dapatkan hasil rerata 31,00 dapat dikatakan mengalami penurunan rerata nilai penyembuhan luka.

Berdasarkan hasil uji menggunakan *uji wilcoxon* didapatkan nilai *p-value* 0,005 ($p < 0,05$) yang berarti bahwa ada perbedaan kondisi luka sebelum dan sesudah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum di Klinik Griya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Usiska, (2015) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang sangat bermakna didapatkan antara metode rawat luka modern dengan terapi hiperabik terhadap proses penyembuhan luka ulkus diabetik pada pasien diabetes mellitus di jember wound center (JWC) rumah sakit jember.

Hasil penelitian ini juga didukung pada penelitian (Maria, 2014) menjelaskan bahwa proses penyembuhan luka dengan teknik balutan wet-dry dan Moist Wound Healing dengan Hydrocolloid Dressing pada penyembuhan ulkus diabetik. Didapatkan hasil penyembuhan luka cepat sebanyak 60% (9 responden), 33% (5 responden) dengan proses penyembuhan luka dalam

waktu yang sedang, dan yang mengalami proses penyembuhan luka yang lambat ada 7% (1 responden)

Berdasarkan asumsi peneliti dari hasil penelitian ini yang mengungkapkan bahwa pasien mengalami perubahan kondisi luka dari sebelum diberikan intervensi dan mengalami perubahan setelah diberikan intervensi modern dressing di klinik griya afiat.

Peroses penyembuhan luka terdapat tiga proses yaitu fase infalamasi, proliferasi, dan fase maturasi / remodeling (Maryunani, 2015).

1. Fase inflamasi

Fase inflamasi berlangsung selama 5-10 menit dan setelah itu akan terjadi vasodilatasi. Fase ini merupakan respon vaskuler dan seluler yang terjadi akibat perlukaan yang menyebabkan rusaknya jaringan lunak. Dalam fase ini pendarahan akan di hentikan dan area luka akan dibersihkan dari benda asing, sel-sel mati dan bakteri untuk mempersiapkan proses penyembuhan. Pada fase ini akan berperan pletelet yang berfungsi hemostasis, dan lekosit serta makrofag yang mengambil fungsi fagositosis. Tercapainya fase inflamasi dapat di tandai dengan adanya eritema, hangat pada kulit, edema dan rasa sakit yang berlangsung sampai hari ke-3 atau hari ke-4.

2. Fase proliferasi atau epitelisasi

Fase ini merupakan lanjutan dari fase inflamasi. Dalam fase proliferasi terjadi perbaikan dan penyembuhan luka yang ditandai dengan proliferasi sel. Yang berperan penting dalam fase ini adalah fibroblas yang bertanggung jawab pada persiapan menghasilkan produk struktur protein yang akan digunakan selama proses rekonstruksi jaringan. Selama proses ini berlangsung, terjadi proses granulasi dimana sejumlah sel dan pembuluh darah baru tertanam di dalam jaringan baru. Selanjutnya dalam fase ini juga terjadi proses epitelisasi, dimana fibroblas mengeluarkan *keratinocyte growth factor* (KGF) yang berperan dalam stimulasi mitosis sel epidermal.

3. Fase maturasi atau remodelling

Fase ini dimulai pada minggu ke-3 setelah terjadi luka dan berakhir sampai kurang lebih 12 bulan. Dalam fase ini terjadi penyempurnaan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang lebih kuat dan bermutu. Sintesa kolagen yang telah dimulai pada fase proliferasi akan dilanjutkan pada fase maturasi. Kecuali pembentukan kolagen juga akan terjadi pemecahan kolagen oleh enzim kolagenase. Penyembuhan akan tercapai secara optimal jika terjadi keseimbangan antara kolagen yang di produksi dengan kolagen yang dipecahkan. Kelebihan kolagen pada fase ini akan menyebabkan terjadinya penebalan jaringan parut atau *hypertrophic scar*. Sedangkan produksi kolagen yang terlalu

sedikit juga dapat mengakibatkan turunnya kekuatan jaringan parut sehingga luka akan selalu terbuka.

Dalam penelitian ini yang didapatkan bahwa pasien ulkus diabetik belum mengalami penyembuhan luka yang membaik secara total, akan tetapi proses penyembuhan kondisi luka pada penelitian ini sudah mengalami perubahan secara peralihan setelah diberikan perawatan modern dressing di klinik Griya Afiat.

Berbagai penyakit yang diderita seseorang itu sebenarnya merupakan ujian dan cobaan dari Allah SWT, agar mereka bertaubat dan kembali pada Allah SWT, sebagai di ingatkan dalam QS.surah Al-Insan/76:29

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya ulkus diabetik ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya”.

Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa menyembuhkan suatu berbagai penyakit itu bagi Allah bukanlah perkara sulit, disamping usaha berobat secara medis mintalah pertolongan kepada Allah. Tanpa izin dan kehendak Allah seseorang tidak mungkin akan sembuh dari penyakit dideritanya.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada pasien ulkus diabetik sebanyak 15 responden di klinik griya afiat selama sebulan didapatkan hasil mengalami perubahan kondisi luka setelah diberikan modern dressing dan

masih dalam tahap regenerasi, yang dimana kondisi luka pasien ulkus diabetik belum mengalami perubahan secara total dan penyembuhan lukanya masih Fase proliferasi atau epitelisasi fase ini merupakan lanjutan dari fase inflamasi.


Dalam penelitian (Usiska, 2015) menjelaskan bahwa proses pengaruh rawat luka modern dengan terapi hiperbarik terhadap penyembuhan luka ulkus diabetik di jember center (JWC) rumah sakit paru jember selama tiga bulan didapatkan hasil perubahan luka ulkus diabetik yang optimal.

Menurut peneliti bahwa proses penyembuhan luka ulkus diabetik dengan menggunakan perawatan luka modern dressing akan maksimal jika dilakukan secara rutin oleh pasien agar mendapatkan hasil yang optimal.

D. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dan belum sempurna, antara lain:

1. Pada penelitian yang dilakukan di klinik griya afiat pada pasien ulkus diabetik hanya didapatkan 15 reponden dan ada beberapa pasien yang drop-out dikarenakan hanya satu kali saja yang datang datang di klinik.
2. Pada penelitian ini peneliti belum mengukur kadar gula darah pasien ulkus diabetikum yang datang di klinik.
3. Pada penelitian ini adanya penentuan jangka waktu yang membuat peneliti belum bisa mendapatkan hasil secara optimal penyembuhan luka ulkus diabetik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian pada kondisi luka sebelum perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum didapatkan hasil rerata 35,00.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada kondisi luka sesudah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum didapatkan hasil rerata 31,00.
3. Berdasarkan hasil penelitian pada kondisi luka sebelum dan sesudah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum didapatkan hasil rerata 35,00 menjadi 31,00. Hasil p-value perhitungan *uji wilcoxon* didapatkan nilai 0,005 ($p < 0,05$) yang berarti disimpulkan bahwa berarti memiliki makna H1 diterima ada perbedaan kondisi luka sebelum dan sesudah perawatan dengan menggunakan teknik modern dressing pada penderita ulkus diabetikum di Klinik Griya.

B. Saran

1. Bagi Institusi
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pemahaman dan memberikan gambaran di institusi pendidikan mengenai manfaat modern dressing terhadap penyembuhan ulkus diabetikum.
2. Bagi Penelitian

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai *evidence based* dan tambahan informasi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut

3. Bagi Masyarakat

Bagi penderita ulkus diabetikum diharapkan dapat menggunakan perawatan modern dressing sebagai salah satu upaya dalam proses pengobatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya,

Agale, S. V., 2013. *Chronic Leg Ulcers: Epidemiology, Aetiopathogenesis, and Management*. Ulcers, pp. 1-9.

Ahmad. 2010. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung. Rosda Karya.

American Diabetes Association, 2015. *Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus*. *Diabetes Care*.38:8-16.

Agustina, Tri. 2009. *Gambaran Sikap Pasien Diabetes Mellitus di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Moewardi Surakarta Terhadap Kunjungan Ulang Konsultasi Gizi*. Surakarta : Karya Tulis Ilmiah.

ADA (American Diabetes Association). 2014. *Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus*. *Diabetes Care*.

Arisanty, I.P. 2013. *Konsep Dasar Manajemen Perawatan Luka*. Jakarta. EGC.

Agung, M. & Hendri, W. 2005. *Pengaruh kadar albumin serum terhadap lamanya penyembuhan luka operasi*. *DEXA MEDIA 1*.

Aru W, Sudoyo. 2009. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, jilid II, edisi V*. Jakarta. Interna Publishing.

Alimul Hidayat, Aziz. 2009. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.

Aini, Nur dkk. 2011. *Upaya Meningkatkan Perilaku Pasien Dalam Tatalaksana Diabetes Mellitus dengan Pendekatan Teori Model Behavioral System Doroty E. Johnson*. *Jurnal Ners* Vol. 6 No. 1 April 2011 : 1-10.

Broussard, K. C., & Powers, J. G. 2013. *Wound Dressings: Selecting the Most Appropriate Type*. *Vanderbilt Division of Dermatology*, 451-456.

Brunner & Suddarth, 2002, *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, alih bahasa: Waluyo Agung., Yasmin Asih., Juli., Kuncara., I.made karya, EGC, Jakarta*.

- Clayton & Tom. 2009. *A Review Of The Pathophysiology ; Classification And Treatment Of Foot Ulcer In Diabetic Patient.* ([Http://www.clinical_Diabetes_Mellitus./artichel.htm](http://www.clinical_Diabetes_Mellitus./artichel.htm), diakses pada tanggal 13 april 2014).
- Dinkes Prov SulSel. 2015. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014*, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
- Dinkes Kota Makassar, 2015. *Profil Kesehatan Kota Makassar Tahun 2015*. Dinas Kesehatan. Kota Makassar.
- Ferawati, I. 2014. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Terjadinya ulkus Diabetikum Pada Pasien DM Tipe 2 Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwakerto.* Universitas Jendral Sudirman. Skripsi. In <http://keperawatan.unsoed.ac.id/sites/default/foles/skripsi>. Diperoleh Pada tanggal 17 Januari 2015.
- Firman. 2009. *Stadium Luka Kaki Diabetes.* In <http://www.patient.co.uk>. Diakses pada November 2013.
- Gitarja, W. S. 2008. *Perawatan Luka Diabetes.* Bogor: Wocare Publishing.
- Gabriel, A., Mussman, J., Rosenberg, L.Z., Torre, J.L. 2009. *Wound Healing Growth Factors.* ([Http://www.dermaclose.com/documen-items/education-training/wound-treatment/wound-healing.pdf](http://www.dermaclose.com/documen-items/education-training/wound-treatment/wound-healing.pdf), diakses tanggal 07 september 2014.)
- Haimowitz, J.E., Margolis, D.M. 1997. *Moist wound healing.* In: *Krasner D, Kane, D. chronic wound care, second edition.* Wayne, PA: Health Management Publications, Inc.
- Hasnah. 2009. *Pencegahan Penyakit Diabetes Mellitus Tipe 2.* Fik Keperawatan Uin. Makassar.
- Huda, Nuh. 2010. *Pengaruh Hiperbarik Oksigen (HBO) Terhadap Perfusi Perifer Luka Gangren pada Penderita DM di RSAL Dr. Ramelan Surabaya.* Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- IDF, 2015. *IDF Diabetes Atlas, Seventh Ed.ed.*
- Ismail. 2009. *Luka bakar dan perawatannya .* Jakarta: Balai Pustaka.
- Kemenkes R.I. 2014. *Buletin Jendela Data Dan Pusat Informasi Diabetes.* Jakarta.

- Kemenkes, 2013. *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013*. Lap. Nas2013 1-134. <https://doi.org/10.1186/14752875-1-134> Desember 2013.
- Khanolkar, M.P, Bain, S.C. & Stephens, J. W. 2008. *The Diabetic Foot*. Q J Med, Volume 101, pp. 685-695.
- McCallum, R & Tagoe, M. 2012. *Transmetatarsal Amputation A Case Series And Review Of The Literature*. Journal Of Aging Research. Pp. 1-6.
- Maryunani, A. 2015. *Perawatan Luka Modern (Modren Woundcare)*. Jakarta: IN MEDIA.
- Maria. 2014. [http://www.Pengaruh_Perawatan Luka Teknik Balutan Wet Dry dan Moist Wound Healing dengan Hydrocolloid Dressing Pada Penyembuhan Ulkus Diabetik.com](http://www.Pengaruh_Perawatan_Luka_Teknik_Balutan_Wet_Dry_dan_Moist_Wound_Healing_dengan_Hydrocolloid_Dressing_Pada_Penyembuhan_Ulkus_Diabetik.com), diperoleh tanggal 4 Juli 2014.
- Mihardja, L. 2009. *Faktor yang berhubungan dengan pengendalian gula darah pada penderita diabetes melitus di perkotaan Indonesia*. Majalah Kedokteran Indonesia Vol.59, No. 9, hlm. 418 - 424.
- Morison, M. J. 2004. *Manajemen Luka*. Penerbit Buku Kedokteran. Jakarta : EGC.
- Noer, p. 2009. *Ilmu Penyakit Endokrin dan Metabolik, Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, Jilid I*. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
- Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Edisi revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Unsiska, Yolanda Septiane. 2015. *Pengaruh Metode Rawat Luka Modern Dengan Terapi Hiperbarik Terhadap Proses Penyembuhan Luka Ulkus Diabetik Pada Pasien Diabetes Mellitus Di Jember Wound Center (J W C) Rumah Sakit Jember Wound Care*.
- Purwati. 2013. *Analisis Faktor-faktor Resiko Terjadinya Ulkus Kaki Diabetik Pada pasien Diabetes Mellitus di RSUD dr. Moewardi. FIK:UI*. ([Http://www.lib.ac.id/file?file=digital/20334094okti%20sri/20purwati.pdf](http://www.lib.ac.id/file?file=digital/20334094okti%20sri/20purwati.pdf), diakses tanggal 13 april 2014).
- Price, S. A. dan Wilson, L. M. 2006. *Patofisiologi : Konsep Klinis Proses - Proses Penyakit, Edisi 6, Volume 1*. Jakarta: EGC.
- Richard, J.L., Sotto, A & Lavigne, J. 2011. *New Insights In Diabetic Foot Infection*. World J Diabetes. 2(2), pp. 24-32.

- Rukmana, A.W. 2008. *Ulkus Diabetikum*. Available from URL: <http://abhique.blogspot.com/htm>. pada tanggal 11 Juli 2013.
- Soegondo S., 2009. *Buku Ajar Penyakit Dalam: Insulin : Farmakoterapi pada Pengendalian Glikemia Diabetes Melitus Tipe 2, Jilid III, Edisi 4*. Jakarta. FK UI pp. 1884.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G. 2001. *Buku Ajar Keperawatan Medikal-Bedah Brunner & Suddarth. Vol. 2. E/8*. EGC. Jakarta.
- Scott, G. 2013. *The Diabetic Foot Examination A Positive Step In The Prevention Of Diabetic Foot Ulcers And Amputation*. Osteopathic Family Physician. Issue 5, pp. 73-78.
- Semer, N.B. 2013. *Panduan HELP Untuk Dasar-Dasar Perawatan luka*. Global HELP Organization. UCLA.
- Smeltzer, Suzanne C & Brenda G Bare. 2008. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Ed.8. Vol. 2. Jakarta: EGC.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al-Misbah Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suryo, J. 2009. *Rahasia herbal penyembuh diabetes*. Yogyakarta : B First.
- Suriadi. 2007. *Manajemen Luka*. STIKEP Muhammadiyah. Pontianak.
- Suyanto. 2011. *Metodologi dan Aplikasi Penelitian Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Tandra, H. 2008. *Segala Sesuatu Yang Harus Anda Diketahui Tentang Diabetes (Tanya Jawab Lengkap Dengan Ahlinya)*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Tarwoto. 2012. *Penatalaksanaan Diabetes Melitus*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Waspadji, Suryono. 2009. Kaki Diabetik, dalam Sudoyo, aru. 2009. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam ed Vjilid III*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Waspadji, S. 2014. Ilmu Penyakit Dalam. Keenam Penyunt. Jakarta: InternaPublishing, pp. 2367-2394.
- WHO, 2011. Diabetes Melitus. Diakses pada 15 September 2013. http://www.who.int/topics/diabetes_melitus/en/.

L


A

M

P

I

R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

A

N

Lampiran 1

No	Pengkajian	Inisial Responden	Pre Test	Post Test	Diference
1	Ukuran* Panjang x lebar				
	0= sembuh, luka terselesaikan 1= < 4 cm 2= 4 s/d < 16 cm ² 3= 16 s/d < 36 cm ² 4= 36 s/d < 80 cm ² 5= > 80 cm ²	R1	1	1	0
		R2	2	2	0
		R3	5	5	0
		R4	2	2	0
		R5	1	1	0
		R6	1	1	0
		R7	1	1	0
		R8	1	1	0
		R9	5	5	0
		R10	2	2	0
		R11	1	1	0
		R12	4	4	0
		R13	1	1	0
		R14	1	1	0
		R15	2	2	0
2	Kedalaman*				
	0= sembuh, luka terselesaikan 1. Eritema atau kemerahan 2. Laserasi lapis epidermis dan atau dermis 3. Seluruh lapisan kulit hilang, kerusakan atau nekrosis subkutan, tidak mencapai fasia, tertutup jaringan granula 4. Tertutup jaringan granulas 5. Seluruh lapisan kulit hilang dengan distruksi luas, kerusakan jaringan otot, tulang.	R1	2	2	0
		R2	1	1	0
		R3	3	3	0
		R4	2	2	0
		R5	2	2	0
		R6	2	2	0
		R7	1	1	0
		R8	2	1	-1
		R9	3	3	0
		R10	2	2	0
		R11	2	2	0
		R12	3	3	0
		R13	2	2	0
		R14	2	2	0
		R15	2	2	0
3	Tepi Luka*				
	0= sembuh, luka terselesaikan 1. Samar, tidak terlihat dengan jelas 2. Batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar luka 3. Jelas, tidak menyatu	R1	3	3	0
		R2	2	2	0
		R3	4	4	0
		R4	3	3	0
		R5	3	3	0
		R6	3	3	0

	dengan dasar luka	R7	2	2	0
	4. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal	R8	3	2	0
	5. Jelas, fibrotik, perut tebal/hiperkeratonik	R9	4	4	0
		R10	3	3	0
		R11	3	3	0
		R12	4	3	-1
		R13	3	3	0
		R14	3	3	0
		R15	3	3	0
4	Terowongan/Gula*				
	0= sembuh, luka terselesaikan	R1	3	2	-1
	1. Tidak ada gua	R2	1	1	0
	2. Gua < 2 cm diare manapun	R3	5	5	0
	3. Gua 2-4 cm seluas < 50% pinggir luka	R4	1	1	0
	4. Gua 2-4 cm seluas > 50% pinggir luka	R5	2	2	0
	5. Gua 4 cm diarea manapun	R6	2	2	0
		R7	1	1	0
		R8	2	1	-1
		R9	5	5	0
		R10	4	3	-1
		R11	2	2	0
		R12	5	5	0
		R13	1	1	0
		R14	5	5	0
		R15	3	3	0
5	Tipe Jaringan Nekrotik				
	1. Tidak ada jaringan nekrotik	R1	3	2	-1
	2. Putih/abu-abu jaringan tidak dapat teramati dan atau jaringan nekrotik kekuningan yang mudah dilepas	R2	1	1	0
		R3	3	3	0
		R4	3	2	-1
		R5	3	2	-1
		R6	3	3	0
	3. Jaringan nekrotik kekuningan yang melekat tapi mudah dilepas	R7	1	1	0
		R8	1	1	0
		R9	3	3	0
	4. Melekat, lembut, eskar hitam	R10	2	2	0
		R11	2	1	-1
		R12	3	3	0
	5. Melekat kuat, keras, eskar hitam	R13	2	2	0
		R14	3	2	-1
		R15	3	2	-1
6	Jumlah Jaringan Nekrotik				
	1. Tidak ada jaringan	R1	2	1	-1

	nekrotik	R2	1	1	0
	2. < 25% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik	R3	3	2	-1
	3. 25% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik	R4	2	2	0
	4. > 50% dan < 75% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik	R5	2	2	0
		R6	2	2	0
		R7	1	1	0
		R8	1	1	0
	5. 75% s/d 100% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik	R9	4	3	-1
		R10	3	2	-1
		R11	1	1	0
		R12	3	3	0
		R13	2	2	0
		R14	3	2	-1
		R15	3	3	0
7	Tipe Eksudat				
	1. Tidak ada eksudat	R1	3	2	-1
	2. Bloody	R2	2	2	0
	3. Serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink)	R3	5	4	-1
		R4	3	3	0
		R5	3	2	-1
	4. Serosa (encer, berair, jernih)	R6	3	2	-1
		R7	2	2	0
		R8	2	2	0
	5. Purulen (encer atau kental, keruh, kecoklatan/kekuningan, dengan atau tanpa bau)	R9	5	5	0
		R10	4	3	-1
		R11	2	2	0
		R12	5	5	0
		R13	3	3	0
		R14	4	4	0
		R15	4	4	0
8	Jumlah Eksudat				
	1. Tidak ada luka kering	R1	3	3	0
	2. Moist, luka tampak lembab, eksudat tidak nampak	R2	3	3	0
		R3	5	4	-1
		R4	4	3	-1
	3. Sedikit : permukaan luka moist, eksudat membasahi < 25% balutan	R5	4	4	0
		R6	3	3	0
		R7	3	3	0
		R8	3	3	0
	4. Moderat : eksudat terdapat >25% dan 75%	R9	5	4	-1
		R10	4	4	0

	dari balutan yang digunakan	R11	3	1	-2
		R12	5	5	0
	5. Banyak : permukaan luka dipenuhi dengan eksudat dan eksudat membasahi > 75% balutan yang digunakan	R13	3	3	0
		R14	5	4	-1
		R15	4	4	0
9	Warna kulit sekitar luka				
	1. Pink atau warna kulit normal setiap bagian luka	R1	3	2	-1
		R2	4	4	0
	2. Merah terang jika desentuh	R3	4	4	0
		R4	3	3	0
	3. Putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi	R5	1	1	0
		R6	3	3	0
	4. Merah gelap atau ungu dan tidak pucat	R7	1	1	0
		R8	2	2	0
	5. Hitam atau hiperpigmentasi	R9	4	4	0
		R10	4	3	-1
		R11	3	1	-2
		R12	4	4	0
		R13	3	3	0
		R14	4	4	0
		R15	4	4	0
10	Edema perifer tepi jaringan				
	1. Tidak ada pembengkakan atau edema	R1	2	2	0
		R2	4	4	0
	2. Tidak ada pitting edema sepanjang < 4 cm sekitar luka	R3	4	4	0
		R4	2	2	0
		R5	2	2	0
	3. Tidak ada pitting edema ≥ 4 cm sekitar luka	R6	2	1	-1
		R7	1	1	0
	4. Pitting edema sepanjang < 4 cm disekitar luka	R8	2	2	0
		R9	4	4	0
	5. Krepitus dan atau pitting edema sepanjang > 4cm disekitar luka	R10	4	4	0
		R11	1	1	0
		R12	3	3	0
		R13	1	1	0
		R14	3	3	0
		R15	4	4	0
11	Indurasi jaringan perifer				
	1. Tidak ada pengerasan	R1	2	1	-1
	2. pengerasan < 2 cm sekitar luka	R2	2	2	0
		R3	3	2	-1
	3. pengerasan 2-4 cm seluas	R4	2	1	-1

	< 50% sekitar luka	R5	1	1	0
	4. pengerasan 2-4 cm seluas	R6	1	1	0
	≥50% sekitar luka	R7	1	1	0
	5. pengerasan > 4 cm	R8	2	1	-1
	dimana saja pada luka	R9	3	3	0
		R10	2	2	0
		R11	2	2	0
		R12	2	2	0
		R13	2	2	0
		R14	2	2	0
		R15	3	3	0
12	Jaringan granulasi				
	1. kulit utuh atau stage 1	R1	4	3	-1
	2. terang 100% jaringan granulasi	R2	5	5	0
	3. terang 50% jaringan granulasi	R3	4	3	-1
	4. granulasi 25%	R4	3	3	0
	5. tidak ada jaringan granulasi	R5	4	4	0
		R6	3	3	0
		R7	3	3	0
		R8	3	3	0
		R9	4	3	-1
		R10	5	5	0
		R11	3	3	0
		R12	4	3	-1
		R13	3	3	0
		R14	4	3	-1
		R15	3	3	0
13	Epitelisasi				
	1. 100% eeepitelisasi	R1	4	4	0
	2. 75 s/d 100% epitelisasi	R2	5	5	0
	3. 50 s/d 75% epitelisasi	R3	5	4	-1
	4. 25s/d 50% epitelisasi	R4	5	4	-1
	5. < 25% epitelisasi	R5	3	3	0
		R6	4	4	0
		R7	3	3	0
		R8	3	3	0
		R9	5	4	-1
		R10	5	5	0
		R11	4	3	-1
		R12	5	5	0
		R13	4	4	0
		R14	5	4	-1

		R15	4	4	0
--	--	-----	---	---	---

Lampiran 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR *MODERN DRESSING*

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) perawatan luka diabetes melitus menggunakan teknik *Modern dressing*

Prosedur Pelaksanaan

Tahap Pra Interaksi

1. Melakukan verifikasi program terapi
2. Mencuci tangan
3. Memakai sarung tangan bersih
4. Menempatkan alat ke dekat pasien

Tahap Orientasi

1. Mengucapkan salam dan menyapa klien
2. Menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan pada klien
3. Menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan
4. Memberi kesempatan bertanya pada klien sebelum tindakan

Tahap Kerja

1. Jelaskan prosedur dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan
2. Melakukan komunikasi terapeutik sebelum selama dan sesudah dilakukan perawatan
3. Mencuci tangan sebelum melakukan tindakan

4. Mencuci tangan dengan *alcohol jell* saat mengganti sarung tangan
5. Gunakan sarung tangan dan lakukan pergantian sarung tangan saat mencuci, mengkaji, dan membalut luka (Sekurangnya 3 kali)
6. Membuka balutan dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya perdarahan atau trauma pada luka
7. Lakukan pencucian luka dengan menggunakan sabun, bilas dengan cairan non toksit lalu keringkan
8. Bersihkan tepi luka dan kulit sekitar luka
9. Lakukan pengkajian luka dengan seksama sesuai prosedur dan format pengkajian luka
10. Bila terdapat jaringan nekrosis (berwarna kuning atau hitam), lakukan *debridement* (dengan gunting atau pisau)
11. Berikan topical terapi yang sesuai berdasarkan warna luka, banyak eksudat dan ada tidaknya infeksi.
12. Balut luka secara tertutup (*Moisture Balance*) pada beberapa jenis topical tidak memerlukan kasa lagi sebagai balutan kedua misalnya hydrocolloid dan poliurathane foam
13. berikan tambahan *padding/gause* bila eksudat sangat banyak/plester/elastis verban (Sesuaikan dengan kondisi)
14. Tutup dengan perekat
15. Kaji pergerakan dan rasa nyaman klien setelah dibalut

□ **Tahap Terminasi**

1. bersihkan dan rapikan alat
2. Berikan informasi kapan mengganti balutan
3. Ajarkan tindakan *emergency* yang diperlukan dalam merawat luka sebelum waktu control
4. Dokumentasi tindakan yang telah dilakukan

2. Alat dan bahan perawatan luka diabetes melitus menggunakan teknik konvensional

Alat dan bahan

1. Set ganti balut
2. Gunting jaringan
3. Pinset anatomis,
4. Nierbekken,
5. Gunting verban
6. Sarung tangan
7. Cairan pencuci
8. Topikal terapi (Seusai kondisi luka)
9. Perekat elastis
10. Status Pasien
11. Verband/*Haft*
12. Pen

3. panduan observasi

Hari/tanggal	Aspek yang diamati	Chek list	Keterangan
	Kondisi luka sebelum dilakukan intervensi		
	<input type="checkbox"/> Tahap Pra Interaksi 1. Melakukan verifikasi program terapi		

	2. Mencuci tangan		
	3. Memakai sarung tangan bersih		
	4. Menempatkan alat ke dekat pasien		
	<input type="checkbox"/> Tahap Orientasi		
	1. Mengucapkan salam dan menyapa klien		
	2. Menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan pada klien		
	3. Menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan		
	4. Memberi kesempatan bertanya pada klien sebelum tindakan		
	<input type="checkbox"/> Tahap Kerja		
	1. Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan yang dilakukan		

	<p>2. Mengatur posisi klien sehingga luka dapat terlihat dan terjangkau oleh perawat</p>		
	<p>3. Mencuci tangan sebelum melakukan tindakan</p>		
	<p>4. Mencuci tangan dengan <i>alcohol jell</i> saat mengganti sarung tangan</p>		
	<p>5. Gunakan sarung tangan dan lakukan pergantian sarung tangan saat mencuci, mengkaji, dan membalut luka (Sekurangnya 3 kali)</p>		
	<p>6. Membuka balutan dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya perdarahan atau trauma pada luka</p>		
	<p>7. Lakukan pencucian luka dengan menggunakan sabun, bilas dengan cairan non toksit lalu keringkan</p>		

	8. Bersihkan tepi luka dan kulit sekitar luka		
	9. Lakukan pengkajian luka dengan seksama sesuai prosedur dan format pengkajian luka		
	10. Bila terdapat jaringan nekrosis (berwarna kuning atau hitam), lakukan debridement (dengan gunting atau pisau)		
	11. Berikan topical terapi yang sesuai berdasarkan warna luka, banyak eksudat dan ada tidaknya infeksi.		
	12. Balut luka secara tertutup (Moisture Balance) pada beberapa jenis topical tidak memerlukan kasa		

	<p>lagi sebagai balutan kedua misalnya hydrocolloid dan poliurathane foam</p>		
	<p>13. Berikan tambahan padding/gause bila eksudat sangat banyak/plester/elastis verban (Sesuaikan dengan kondisi)</p>		
	<p>14. Tutup dengan perekat</p>		
	<p>15. Kaji pergerakan dan rasa nyaman klien setelah dibalut</p>		
	<p><input type="checkbox"/> Tahap Terminasi</p> <p>1. Bersihkan dan rapikan alat</p>		
	<p>2. Berikan informasi kapan penggantian balutan</p>		
	<p>3. Ajarkan tindakan emergency yang diperlukan dalam merawat luka sebelum</p>		

	waktu control kering streil secukupnya		
	4. Dokumentasi tindakan yang telah dilakukan		



Lampiran 3

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Saudara/(i)

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Andi Syahputra

Nim : 70300114004

Alamat: BTN. Pao-Pao Permai Blok D3 No.11

Akan mengadakan penelitian dengan judul **“Perbedaan Kondisi Luka Sebelum Dan Setelah Perawatan Dengan Menggunakan Teknik Modern Dressing Pada Penderita Ulkus Diabetikum Di Klinik Griya Afiat Makassar”**.

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Saudara (i) untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. Data tersebut akan dijamin kerahasiaannya.

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon kepada Saudara (i) untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah saya sediakan. Atas partisipasi dan kebijakan Saudara (i) saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

(Andi Syahputra)

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca penjelasan penelitian ini dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka saya mengetahui manfaat dan tujuan penelitian ini, saya mengerti bahwa peneliti menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak saya sebagai responden.

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berdampak negative bagi saya. Saya mengerti bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini sangat besar manfaatnya bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Persetujuan yang saya tanda tangani menyatakan bahwa saya berpartisipasi dalam penelitian ini.

Makassar, 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
(Responden)

Lembar Observasi

INSTRUKSI PENGGUNAAN

Pedoman Umum :

Isilah lembar peringkat yang terlampir untuk menilai proses penyembuhan luka setelah membaca definisi dan metode penilaian yang dijelaskan di bawah ini. Evaluasi setiap minggu dan setiap kali ada perubahan yang terjadi pada luka. Lakukan penilaian menurut setiap item dengan memilih respon yang paling tepat yang menggambarkan kondisi luka dan berilah skor dalam kolom skor item, sesuai tanggal pengisian. Bila anda telah mengisi kondisi luka pada semua item, tentukan skor total dengan menambakkanseluruh skor ke-13 item. Semakin tinggi skor total maka kondisi luka akan semakin parah. Letakkan skor total pada Continuum Status luka untuk menentukan kemajuan ukuran.

Intruksi Khusus :

1. **Ukuran** : Gunakan penggaris untuk mengukur aspek terpanjang dan terlebar permukaan luka dalam sentimeter, panjang x lebar
2. **Kedalaman** : Pilih kedalaman, ketebalan, yang paling tepat untuk luka menggunakan deskripsi tambahan sebagai berikut:
 - 1 = struktur pendukung meliputi tendon, sambungan sendi
 - 2 = lapisan jaringan yang tidak tervisualisasi akibat nekrosis
 - 3 = lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan yang berbatasan
 - 4 = superfisial, abrasi, lubang yang dangkal atau lepuhan. Rata dengan, &/ atau elevasi diatas permukaan kulit (mis. hiperlasia)
 - 5 = kerusakan jaringan tapi tidak ada keretakan dipermukaan kulit
3. **Tepi** : Gunakan panduan ini:

Tidak jelas, samar = dapat dengan jelas membedakan garis luka;

Menyatu = menyatu dengan dasar luka, tidak ada sisi atau dinding datar

Tidak menyatu = ada sisi atau dinding; dasar luka lebih dalam dari tepi

Tidak menyatu = lembut terasa keras dan lentur saat disentuh

dengan dasar luka,

menebal

Hiperkeratosis = pembentukan jaringan kalus disekitar luka & di tepi

Fibrosis, bekas luka = keras, kaku saat disentuh

4. **Goa** : Penilaian dengan cara memasukkan kapas lidi dibawah tepi luka; masukkan sejauh yang bisa tanpa menggunakan kekuatan yang berlebihan; naikkan ujung kapas lidi sehingga dapat dirasakan pada permukaan kulit; tandai permukaan dengan pena; ukur jarak kaki tanda pada kulit ketepi luka. Lanjutkan proses sekitar luka. Kemudian gunakan penggaris metrik transparan dengan membagi menjadi 4 kuadran pada bagian luka (25%) untuk membantu menentukan persentase dari luka

5. **Jenis jaringan nekrotik** : Pilihan jenis jaringan nekrotik yang dominan pada luka menurut warna, konsistensi dan kelengketan menggunakan panduan ini:

Jaringan yang berwarna = terlihat terlebih dahulu pada luka yang terbuka;
putih/abu-abu *non-viable* permukaan kulit berwarna putih atau abu-abu

Tidak melekat, kelupasan = substansi mucinous yang tipis; tersebar berwarna kuning sepanjang luka; mudah sekali terpisah dari jaringan luka

Melekat dengan longgar, = gumpalan debris yang tebal, tersebut; melekat

kelupasan berwarna dijaringan luka

kuning atau putih

Melekat, lunak, eschar = jaringan yang lembab; melekat kuat pada
warna hitam jaringan ditengah atau dasar luka berkerak

Melekat dengan kuat, = jaringan yang keras, kuat; melekat kuat pada
Eschar bewarna hitam/
Keras dasr dan tepi luka (seperti scar yang keras)

6. Jumlah jaringan nekrotik : Gunakan penggaris metrik transparan dengan membagi 4 kuadran untuk membantu menentukan persentase dari luka.

7. Jenis Eksudat : Beberapa pembalutan drainase luka tertutup gel atau cairan yang terperangkap. Sebelum mengkaji tipe eksudat, bersihkan luka dengan cairan normal saline atau air secara perlahan-lahan. Memilih jenis eksudat yang dominan pada luka menurut warna dan konsistensi, menggunakan panduan ini :

Berdarah = tipis, merah terang

Serosanguinosa = tipis, cairan merah pucat sampai merah muda

Serosa = tipis, encer, bening

Perulen = tipis atau tebal, berwarna coklat buram sampai kuning
disertai bau

Perulen kotor = tipis, kuning buram sampai kehijauan dengan bau yang
sangat menyengat

8. Jumlah eksudat : Gunakan penggaris metrik transparan dengan membagi menjadi 4 kuadran untuk menentukan persen eksudat pada balutan luka. Gunakan panduan ini:

Tidak ada = jaringan luka kering

Sangat sedikit	= jaringan luka lembab, tidak ada takaran eksudat
Sedikit	= jaringan luka basah, kelembaban menyebar rata pada luka; drainase melibatkan >25% balutan
Sedang	= jaringan luka tersaturasi; drainase dapat atau tidak dapat tersebar merata dalam luka; drainase melibatkan >25% sampai \leq 75% balutan
Banyak	= jaringan luka dimandikan dengan cairan; drainase terlihat dengan bebas; dapat atau tidak dapat tersebar merata dalam luka; drainase melibatkan >75% balutan

9. **Warna kulit sekitar luka** : kaji jaringan sepanjang 4 cm dari tepi luka. Orang berkulit hitam menunjukkan warna “merah terang” dan “merah gelap” sebagai warna kulit etnik normal yang dalam atau warna ungu. Ketika penyembuhan terjadi pada orang berkulit gelap, maka kulit yang baru berwarna merah muda dan tidak pernah menjadi gelap
10. **Edema jaringan perifer & indurasi** : kaji jaringan sepanjang 4 cm dari tepi luka. *Non-pitting* edema terlihat seperti kulit yang berkilau dengan tegang. Identifikasi *pitting* edema dengan menekan jari tangan dengan kuat ke jaringan dan tunggu selama 5 detik, pada saat pelepasan tekanan, jaringan gagal kembali ke posisi sebelumnya dan terlihat cekungan. Krepitus merupakan akumulasi udara/gas dalam jaringan. Gunakan petunjuk pengukuran metrik yang transparan untuk menentukan sejauh mana edema meluas melebihi luka
11. **Jaringan granulasi** : jaringan granulasi adalah pertumbuhan pembuluh darah kecil dan jaringan penyambung untuk mengisi penuh luka yang dalam. Jaringan akan sehat apabila terang, berwarna merah seperti daging, berkilau dan

bergranulasi dengan penampilan beludru. Vaskularisasi yang buruk akan terlihat seperti merah muda pucat atau pucat ke pudar, warna merah kehitaman.

- 12. Epitalisasi** : Epitalisasi jaringan adalah proses pengembalian permukaan epidermal dan terlihat kulit berwarna merah muda atau merah. Pada luka dengan ketebalan sebagian epitelisasi dapat terjadi sepanjang dasar luka seperti dari tepi luka. Pada luka dengan ketebalan penuh epitelisasi hanya terjadi pada tepi luka. Gunakan penggaris metrik yang transparan dengan membagi menjadi 4 kuadran untuk menentukan persentase luka yang terlibat dan mengukur jarak jaringan epitel yang meluas ke dalam luka.



Lembar Observasi Luka Ulkus Diabetikum

Skala BWAT (*Bates-Jensen Wound Assesment Tool*)

Inisial Responden :

Hari & Tgl :

Umur :

Jenis Kelamin :

No	Item	Pengkajian	Hari 1	Hari 3	Hari 6
			Tgl/Skor	Tgl/Skor	Tgl/Skor
1	Ukuran	*0 = Sembuh, luka terselesaikan panjang x lebar 1 = < 4 cm 2 = 4 s/d < 16 cm ² 3 = 16 s/d < cm ² 4 = 36 s/d < 80 cm ² 5 = > 80 cm ²			
2	Kedalaman	*0= sembuh, luka terselesaikan 1. Eritema atau kemerahan 2. Leserasi lapisan epidermis dan atau dermis 3. Seluruh lapisan kulit hilang, kerusakan atau nekrosis subkutan, tidak mencapai fasia, tertutup jaringan granulasi 4. Tertutup jaringan nekrosis 5. Seluruh lapisan kulit hilang dengan dekstruksi luas, kerusakan jaringan otot, tulang			
3	Tepi Luka	*0 = Sembuh, luka terselesaikan 1. Samar, tidak terlihat dengan jelas 2. Batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar luka 3. Jelas, tidak menyatu			


		dengan dasar luka 4. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal 5. Jelas, fibrotik, perut tebal/hiperkeratonik			
4	Terowongan/Gua	*0= Sembuh, luka terselesaikan 1. Tidak ada gua 2. Gua < 2 cm di area manapun 3. Gua 2 – 4 cm seluas < 50% pinggir luka. 4. Gua 2 – 4 cm seluas > 50% pinggir luka. 5. Gua > 4 cm di area manapun.			
5	Tipe Jaringan Nekrotik	1. Tidak ada jaringan nekrotik 2. Putih/abu-abu jaringan tidak dapat teramati dan atau jaringan nekrotik kekuningan yang mudah dilepas. 3. Jaringan nekrotik kekuningan yang melekat tapi mudah dilepas. 4. Melekat, lembut, eskar hitam. 5. Melekat kuat, keras, eskar hitam.			
6	Jumlah jaringan nekrotik	1. Tidak jaringan nekrotik. 2. < 25% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik. 3. 25 % permukaan Luka tertutup jaringan nekrotik. 4. > 50% dan < 75% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik. 5. 75% s/d 100% permukaan luka tertutup jaringan nekrotik.			
7	Tipe Eksudat	1. Tidak ada eksudat 2. Bloody 3. Serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink). 4. Serosa (encer, berair,			

		jernih). 5. purulen (encer atau kental, keruh, kecoklatan/kekuningan, dengan atau tanpa bau).			
8	Jumlah Eksudat	1. Tidak ada, luka kering. 2. Moist, luka tampak lembab tapi eksudat tidak teramati. 3. Sedikit : Permukaan luka moist, eksudat membasahi < 25% balutan 4. Modert : Eksudat terdapat > 25% dan < 75% dari balutan yang digunakan 5. Banyak : Permukaan luka dipenuhi dengan eksudat dan eksudat membasahi > 75% balutan yang digunakan			
9	Warna Kulit Sekitar Luka	1. Pink atau warna kulit normal setiap bagian luka. 2. Merah terang jika disentuh 3. Putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi. 4. Merah gelap atau ungu dan atau tidak pucat. 5. Hitam atau hiperpigmentasi.			
10	Edema Perifer/Tapi Jaringan	1. Tidak ada pembengkakan atau edema. 2. Tidak ada pitting edema sepanjang <4 cm sekitar luka. 3. Tidak ada pitting edema sepanjang \geq 4 cm sekitar luka. 4. Pitting edema sepanjang <4 cm disekitar luka 5. Krepitus dan atau pitting edema sepanjang > 4cm disekitar luka.			
11	Indurasi Jaringan	1. Tidak ada indurasi 2. Indurasi <2 cm sekitar			

	Perifer	luka. 3. Indurasi 2-4 cm seluas < 50% sekitar luka. 4. Indurasi 2- 4 cm seluas \geq 50% sekitar luka 5. Indurasi > 4 cm dimana saja pada luka.			
12	Jaringan Granulasi	1. Kulit utuh atau luka pada sebagian kulit. 2. Terang, merah seperti daging 75% s/d 100% luka terisi granulasi, atau jaringan tumbuh. 3. Terang, merah seperti daging, <75% dan > 25% luka terisi granulasi. 4. Pink, dan atau pucat, merah kehitaman dan atau luka < 25% terisi granulasi. 5. Tidak ada jaringan granulasi.			
13	Epitalisasi	1. 100% luka tertutup, permukaan utuh. 2. 75 s/d 100% epitalisasi 3. 50 s/d 75% epitalisasi. 4. 25% s/d 50% epitalisasi. 5. < 25% epitalisasi			
	Total Skor				

(Sumber: Harris 2009 modifikasi Handayani, 2010)

Keterangan :



Intepretasi Hasil :

Lampiran Dokumentasi

- ❖ Gambaran Kondisi Luka Sebelum Di berikan perawatan luka dengan menggunakan teknik modern dressing



- ❖ Gambaran Kondisi Luka Sesudah Di berikan perawatan luka dengan menggunakan teknik modern dressing



Resp	Inisial	Umur	JK	Post Test													Total Frekuensi
				I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	
1	S	55	1	1	2	3	2	2	2	2	3	2	2	1	3	4	29
2	S	53	2	2	1	2	1	1	1	2	3	4	4	2	5	5	33
3	S	77	1	5	3	4	5	3	2	4	4	4	4	2	3	4	47
4	M	58	1	2	2	3	1	2	2	3	3	3	2	1	3	4	31
5	T	52	2	1	2	3	2	2	2	2	4	1	2	1	4	3	29
6	N	50	2	1	2	3	2	3	2	2	3	3	1	1	3	4	30
7	S	54	2	1	1	2	1	1	1	2	3	1	1	1	3	3	21
8	H	56	1	1	1	2	1	1	1	2	3	2	2	1	3	3	23
9	W	57	1	5	3	4	5	3	3	5	4	4	4	3	3	4	50
10	R	47	2	2	2	3	4	2	3	4	4	3	4	2	5	5	43
11	H	49	2	1	2	3	2	1	1	2	1	1	1	2	3	3	23
12	A	49	2	4	3	3	5	3	3	5	5	4	3	2	3	5	48
13	S	52	2	1	2	3	1	2	2	3	3	3	1	2	3	4	30
14	J	53	1	1	2	3	5	2	2	4	4	4	3	2	3	4	39
15	N	55	2	2	2	3	3	2	3	4	4	4	4	3	3	4	41
				30	30	44	40	30	30	46	51	43	38	26	50	59	

Resp	Inisial	Umur	JK	Pre Test													Total Frekuensi
				I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	
1	S	55	1	1	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	4	4	35
2	S	53	2	2	1	2	1	1	1	2	3	4	4	2	5	5	33
3	S	77	1	5	3	4	5	3	3	5	5	4	4	3	4	5	53
4	M	58	1	2	2	3	1	3	2	3	4	3	2	2	3	5	35
5	T	52	2	1	2	3	2	3	2	3	4	1	2	1	4	3	31
6	N	50	2	1	2	3	2	3	2	3	3	3	2	1	3	4	32
7	S	54	2	1	1	2	1	1	1	2	3	1	1	1	3	3	21
8	H	56	1	1	2	3	2	1	1	2	3	2	2	2	3	3	27
9	W	57	1	5	3	4	5	3	4	5	5	4	4	3	4	5	54
10	R	47	2	2	2	3	3	2	2	3	4	4	4	2	5	5	41
11	H	49	2	1	2	3	2	2	1	2	3	3	1	2	3	4	29
12	A	49	2	4	3	4	5	3	3	5	5	4	3	2	4	5	50
13	S	52	2	1	2	3	1	2	2	3	3	3	1	2	3	4	30
14	J	53	1	1	2	3	5	3	3	4	5	4	3	2	4	5	44
15	N	55	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	42
				30	31	46	41	36	32	49	57	47	39	30	55	64	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Umur	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Jenis Kelamin	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Ukuran Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Ukuran Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Kedalaman Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Kedalaman Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Tepi Luka Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Tepi Luka Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Goa Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Goa Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Jaringan Nekrotik Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Jaringan Nekrotik Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Jumlah Jaringan Nekrotik Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Jumlah Jaringan Nekrotik Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Tipe Eksudat Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Tipe Eksudat Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Jumlah Eksudat Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Jumlah Eksudat Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Warna Kulit Luka Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Warna Kulit Luka Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Edema Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Edema Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Pengerasan Jaringan Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Pengerasan Jaringan Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Jaringan Granulasi Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Jaringan Granulasi Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Epitalisasi Pre Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%
Epitalisasi Post Test	15	100,0%	0	0,0%	15	100,0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Umur	Mean	54,47	1,802	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	50,60	
		Upper Bound	58,33	
	5% Trimmed Mean	53,63		
	Median	53,00		
	Variance	48,695		
	Std. Deviation	6,978		
	Minimum	47		
	Maximum	77		
	Range	30		
	Interquartile Range	6		
	Skewness	2,580	,580	
	Kurtosis	8,437	1,121	
	Jenis Kelamin	Mean	1,60	,131
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	1,32	
		Upper Bound	1,88	
5% Trimmed Mean		1,61		
Median		2,00		
Variance		,257		
Std. Deviation		,507		
Minimum		1		
Maximum		2		
Range		1		
Interquartile Range		1		
Skewness		-,455	,580	
Kurtosis		-2,094	1,121	
Ukuran Pre Test		Mean	2,00	,378
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1,19	
		Upper Bound	2,81	
	5% Trimmed Mean	1,89		
	Median	1,00		
	Variance	2,143		
	Std. Deviation	1,464		
	Minimum	1		
	Maximum	5		
	Range	4		
	Interquartile Range	1		
	Skewness	1,419	,580	
	Kurtosis	,682	1,121	
	Ukuran Post Test	Mean	2,00	,378

		Lower Bound	1,19	
	95% Confidence Interval for Mean	Upper Bound	2,81	
	5% Trimmed Mean		1,89	
	Median		1,00	
	Variance		2,143	
	Std. Deviation		1,464	
	Minimum		1	
	Maximum		5	
	Range		4	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		1,419	,580
	Kurtosis		,682	1,121
	Mean		2,07	,153
		Lower Bound	1,74	
	95% Confidence Interval for Mean	Upper Bound	2,40	
	5% Trimmed Mean		2,07	
	Median		2,00	
	Variance		,352	
Kedalaman Pre Test	Std. Deviation		,594	
	Minimum		1	
	Maximum		3	
	Range		2	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		,004	,580
	Kurtosis		,537	1,121
	Mean		2,00	,169
		Lower Bound	1,64	
	95% Confidence Interval for Mean	Upper Bound	2,36	
	5% Trimmed Mean		2,00	
	Median		2,00	
	Variance		,429	
Kedalaman Post Test	Std. Deviation		,655	
	Minimum		1	
	Maximum		3	
	Range		2	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		,000	,580

Tepi Luka Pre Test	Kurtosis		-,179	1,121
	Mean		3,07	,153
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2,74	
		Upper Bound	3,40	
	5% Trimmed Mean		3,07	
	Median		3,00	
	Variance		,352	
	Std. Deviation		,594	
	Minimum		2	
	Maximum		4	
	Range		2	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		,004	,580
	Kurtosis		,537	1,121
Mean		2,93	,153	
Tepi Luka Post Test	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2,60	
		Upper Bound	3,26	
	5% Trimmed Mean		2,93	
	Median		3,00	
	Variance		,352	
	Std. Deviation		,594	
	Minimum		2	
	Maximum		4	
	Range		2	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		-,004	,580
	Kurtosis		,537	1,121
	Mean		2,73	,408
	Goa Pre Test	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1,86
Upper Bound			3,61	
5% Trimmed Mean			2,70	
Median			2,00	
Variance			2,495	
Std. Deviation			1,580	
Minimum		1		
Maximum		5		
Range		4		

	Maximum		3	
	Range		2	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		,000	,580
	Kurtosis		-1,077	1,121
	Mean		2,13	,236
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1,63	
		Upper Bound	2,64	
	5% Trimmed Mean		2,09	
	Median		2,00	
	Variance		,838	
Jumlah Jaringan Nekrotik Pre Test	Std. Deviation		,915	
	Minimum		1	
	Maximum		4	
	Range		3	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		,351	,580
	Kurtosis		-,484	1,121
	Mean		2,00	,195
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1,58	
		Upper Bound	2,42	
	5% Trimmed Mean		2,00	
	Median		2,00	
	Variance		,571	
Jumlah Jaringan Nekrotik Post Test	Std. Deviation		,756	
	Minimum		1	
	Maximum		3	
	Range		2	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		,000	,580
	Kurtosis		-1,077	1,121
	Mean		3,27	,284
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2,66	
		Upper Bound	3,88	
Tipe Eksudat Pre Test	5% Trimmed Mean		3,24	
	Median		3,00	
	Variance		1,210	

	Std. Deviation		1,100	
	Minimum		2	
	Maximum		5	
	Range		3	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		,506	,580
	Kurtosis		-,916	1,121
	Mean		3,07	,300
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2,42	
		Upper Bound	3,71	
	5% Trimmed Mean		3,02	
	Median		3,00	
	Variance		1,352	
Tipe Eksudat Post Test	Std. Deviation		1,163	
	Minimum		2	
	Maximum		5	
	Range		3	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		,483	,580
	Kurtosis		-1,364	1,121
	Mean		3,80	,223
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	3,32	
		Upper Bound	4,28	
	5% Trimmed Mean		3,78	
	Median		4,00	
	Variance		,743	
Jumlah Eksudat Pre Test	Std. Deviation		,862	
	Minimum		3	
	Maximum		5	
	Range		2	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		,433	,580
	Kurtosis		-1,545	1,121
	Mean		3,40	,235
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2,90	
Jumlah Eksudat Post Test		Upper Bound	3,90	
	5% Trimmed Mean		3,44	

	Median		3,00	
	Variance		,829	
	Std. Deviation		,910	
	Minimum		1	
	Maximum		5	
	Range		4	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		-,970	,580
	Kurtosis		2,744	1,121
	Mean		3,13	,274
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2,55	
		Upper Bound	3,72	
	5% Trimmed Mean		3,20	
	Median		3,00	
	Variance		1,124	
Warna Kulit Luka Pre Test	Std. Deviation		1,060	
	Minimum		1	
	Maximum		4	
	Range		3	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		-1,130	,580
	Kurtosis		,323	1,121
	Mean		2,87	,307
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2,21	
		Upper Bound	3,52	
	5% Trimmed Mean		2,91	
	Median		3,00	
	Variance		1,410	
Warna Kulit Luka Post Test	Std. Deviation		1,187	
	Minimum		1	
	Maximum		4	
	Range		3	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		-,595	,580
	Kurtosis		-1,145	1,121
	Mean		2,60	,306
Edema Pre Test	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1,94	

		Upper Bound	3,26	
	5% Trimmed Mean		2,61	
	Median		2,00	
	Variance		1,400	
	Std. Deviation		1,183	
	Minimum		1	
	Maximum		4	
	Range		3	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		,024	,580
	Kurtosis		-1,551	1,121
	Mean		2,53	,322
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1,84	
		Upper Bound	3,22	
	5% Trimmed Mean		2,54	
	Median		2,00	
	Variance		1,552	
Edema Post Test	Std. Deviation		1,246	
	Minimum		1	
	Maximum		4	
	Range		3	
	Interquartile Range		3	
	Skewness		,041	,580
	Kurtosis		-1,687	1,121
	Mean		2,00	,169
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1,64	
		Upper Bound	2,36	
	5% Trimmed Mean		2,00	
	Median		2,00	
	Variance		,429	
Pengerasan Jaringan Pre Test	Std. Deviation		,655	
	Minimum		1	
	Maximum		3	
	Range		2	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		,000	,580
	Kurtosis		-,179	1,121

Pengerasan Jaringan Post Test	Mean		1,73	,182	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1,34		
		Upper Bound	2,12		
	5% Trimmed Mean		1,70		
	Median		2,00		
	Variance		,495		
	Std. Deviation		,704		
	Minimum		1		
	Maximum		3		
	Range		2		
	Interquartile Range		1		
	Skewness		,433	,580	
	Kurtosis		-,669	1,121	
	Jaringan Granulasi Pre Test	Mean		3,67	,187
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	3,27	
Upper Bound			4,07		
5% Trimmed Mean			3,63		
Median			4,00		
Variance			,524		
Std. Deviation			,724		
Minimum			3		
Maximum			5		
Range			2		
Interquartile Range			1		
Skewness			,628	,580	
Kurtosis			-,654	1,121	
Jaringan Granulasi Post Test		Mean		3,33	,187
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2,93	
	Upper Bound		3,73		
	5% Trimmed Mean		3,26		
	Median		3,00		
	Variance		,524		
	Std. Deviation		,724		
	Minimum		3		
	Maximum		5		
	Range		2		
	Interquartile Range		0		

Test Statistics^a

	Ukuran Post Test - Ukuran Pre Test	Kedalaman Post Test - Kedalaman Pre Test	Tepi Luka Post Test - Tepi Luka Pre Test	Goa Post Test - Goa Pre Test	Jaringan nekrotik Post Test - Jaringan nekrotik Pre Test	Jumlah Jaringan nekrotik Post Test - Jumlah Jaringan nekrotik Pre Test	Tipe Eksudat Post Test - Tipe Eksudat Pre Test	Jumlah Eksudat Post Test - Jumlah Eksudat Pre Test	Warna Kulit Luka Post Test - Warna Kulit Luka Pre Test	Edema Post Test - Edema Pre Test	Pengerasan Jaringan Post Test - Pengerasan Jaringan Pre Test	Jaringan Granulasi Post Test - Jaringan Granulasi Pre Test	Epitalisasi Post Test - Epitalisasi Pre Test
Z	,000 ^b	-1,000 ^c	-1,414 ^c	-,577 ^c	-2,449 ^c	-1,000 ^c	-1,342 ^c	-2,121 ^c	-1,633 ^c	-1,000 ^c	-2,000 ^c	-2,236 ^c	-2,236 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000	,317	,157	,564	,014	,317	,180	,034	,102	,317	,046	,025	,025

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

c. Based on positive ranks.

Epitalisasi Post Test	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	3,54	
		Upper Bound	4,32	
	5% Trimmed Mean		3,93	
	Median		4,00	
	Variance		,495	
	Std. Deviation		,704	
	Minimum		3	
	Maximum		5	
	Range		2	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		,092	,580
	Kurtosis		-,669	1,121

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a	Shapiro-Wilk
--	---------------------------------	--------------

	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Umur	,240	15	,020	,727	15	,000
Jenis Kelamin	,385	15	,000	,630	15	,000
Ukuran Pre Test	,300	15	,001	,701	15	,000
Ukuran Post Test	,300	15	,001	,701	15	,000
Kedalaman Pre Test	,345	15	,000	,763	15	,001
Kedalaman Post Test	,300	15	,001	,799	15	,004
Tepi Luka Pre Test	,345	15	,000	,763	15	,001
Tepi Luka Post Test	,345	15	,000	,763	15	,001
Goa Pre Test	,212	15	,068	,834	15	,010
Goa Post Test	,255	15	,010	,805	15	,004
Jaringan Nekrotik Pre Test	,366	15	,000	,705	15	,000
Jaringan Nekrotik Post Test	,233	15	,027	,823	15	,007
Jumlah Jaringan Nekrotik Pre Test	,225	15	,040	,881	15	,050
Jumlah Jaringan Nekrotik Post Test	,233	15	,027	,823	15	,007
Tipe Eksudat Pre Test	,262	15	,007	,851	15	,018
Tipe Eksudat Post Test	,287	15	,002	,804	15	,004
Jumlah Eksudat Pre Test	,290	15	,001	,771	15	,002
Jumlah Eksudat Post Test	,264	15	,006	,826	15	,008
Warna Kulit Luka Pre Test	,260	15	,007	,774	15	,002
Warna Kulit Luka Post Test	,230	15	,032	,819	15	,006
Edema Pre Test	,227	15	,036	,842	15	,014
Edema Post Test	,214	15	,064	,831	15	,010
Pengerasan Jaringan Pre Test	,300	15	,001	,799	15	,004
Pengerasan Jaringan Post Test	,251	15	,012	,798	15	,003
Jaringan Granulasi Pre Test	,288	15	,002	,783	15	,002
Jaringan Granulasi Post Test	,477	15	,000	,514	15	,000
Epitalisasi Pre Test	,287	15	,002	,783	15	,002
Epitalisasi Post Test	,271	15	,004	,815	15	,006

a. Lilliefors Significance Correction

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Gambaran Luka Sesudah - Gambaran Luka	Negative Ranks	11 ^a	6,77	74,50
Sebelum	Positive Ranks	1 ^b	3,50	3,50

	Ties	3 ^c	
	Total	15	

- a. Gambaran Luka Sesudah < Gambaran Luka Sebelum
- b. Gambaran Luka Sesudah > Gambaran Luka Sebelum
- c. Gambaran Luka Sesudah = Gambaran Luka Sebelum

Test Statistics^a

	Gambaran Luka Sesudah - Gambaran Luka Sebelum
Z	-2,804 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,005

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on positive ranks.

Statistics

		Gambaran Luka Sebelum	Gambaran Luka Sesudah
N	Valid	15	15
	Missing	0	0
Mean		37,13	34,47
Median		35,00	31,00
Mode		35	23 ^a
Std. Deviation		9,848	9,546
Minimum		21	21
Maximum		54	50

- a. Multiple modes exist. The smallest value is shown



Andi Syahputra adalah anak pertama dari dua bersaudara. Lahir dari buah cinta dan kasih sayang antara Ayahanda **Darsono Malaka** dengan Ibunda **Nur Mala** pada tanggal 25 Maret 1997 bertempat di Selayar. Riwayat pendidikan, penulis menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 2008 di SD Inpres Pao-pao kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tamat pada tahun 2011 di Mts Madani Alauddin. Kemudian melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Kejuruan dan Alhambdulillah tamat pada tahun 2014 di MA Madani Alauddin. Pada tahun yang sama pula penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Angkatan 2014 di Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sampai sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R