

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
DENGAN KASUS MOLAHIDATIDOSA
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2016**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Prodi Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh :

ST.SYAHRIANI RAUF
NIM : 70400113013

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia adalah duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Oktober 2018

Penulis

ST. SYAHRIANI RAUF

NIM : 70400113013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : St. Syahriani Rauf
Nim : 70400113013
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Dengan Kasus
Molahidatidosa Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun 2016.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 09 Oktober 2018

Pembimbing



Firdavanti, S.Si.T., M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 0001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE DENGAN KASUS MOLAHIDATIDOSA DIRSUD SYEKH YUSUF TAHUN 2016", yang disusun oleh St.Syahrhani Rauf, NIM: 70400113013, mahasiswa jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian karya tulis ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat 17 februari 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata 09 Oktober 2018
29 Muharram 1440 AH

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Hj. Siti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb	(.....)
Penguji I	: Wati, S.ST	(.....)
Penguji II	: Dr. Ahmad Musyahid, M.A	(.....)

Mengesahui :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 194312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur panjatkan atas kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Kasus Molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2016”.

Salam serta shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, yang senantiasa menjadi suri tauladan dan membawa ajaran yang begitu sempurna. Sang penyebar kebaikan dimuka bumi ini dengan kesabaran, usaha dan ketaatan beliau kepada Allah SWT, sehingga beliau bisa membawa umat Islam ke masa yang penuh dengan cahaya ini, beliau yang tidak pernah meninggalkan umatnya bahkan sampai ajal menjemput beliau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini mengakui banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Namun penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan menyelesaikan penyusunan Karya Tulis ini tepat pada waktunya.

Selesainya Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua saya yang senantiasa mendoakan, memberi semangat dan mendukung setiap langkah yang saya tempuh disetiap proses, mulai dari pertama hingga selesainya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.SI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas kedokteran Dan ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. Ibu Hj. Sitti Saleha, S.SiT, S. KM, M.Keb selaku ketua jurusan prodi kebidanan yang kerelahan dan keikhlasanya memberikan banyak motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Amd.Keb.
5. Ibu Firdayanti, S.Si.T, M.Keb selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dan telah ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu Wati S.ST selaku penguji yang telah senantiasa memberikan masukan beserta dukunganya dalam menyelesaikan Karya Tuliah Ilmiah ini.

7. Bapak Dr. Ahmad Musyahid M.Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungannya terutama dibidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah dengan sabar mengajarkan banyak hal, memperluas wawasan penulis, memperkenalkan dunia perkuliahan dan menjalani pendidikan di jurusan kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini.
9. Kepada Badan Koordinasi penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan rekomendasi penelitian kepada peneliti.
10. Kepada Rumah sakit syeck yusuf gowa yang telah memberikan izin kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
11. Untuk wanitaku Nurhikma yang senantiasa menemani setiap langkah ku, selalu memberikan semangat dan motivasi untukku, selalu ada dibelakang untuk mendorongku disaat saya tertinggal dibelakang dan menarik ku naik ketika saya terjatuh. Terima kasih kawan.

Penyusun menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penyusun berharap semoga dapat membantu dan bermanfaat walaupun kecilnya pada dunia ilmu pengetahuan khusus-Nya Kebidanan ang-013 dan tenaga kesehatan lainnya.

Samata-Gowa, 08 Oktober 2018

Penyusun


ST.SYAHRIANI RAUF
70400113013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	III
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI.....	VIII
LAMPIRAN.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang lingkup pembahasan	2
C. Tujuan penulisan.....	4
D. Manfaat penulisan.....	5
E. Metode penulisan.....	6
F. Sistematika penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Perdarahan Hamil Muda.....	8
1. Pengertian	8
2. Etiologi	8
3. Diagnosa perdarahan pada hamil muda	9
B. Tinjauan khusus pada molahidatidosa.....	10
1. Pengertian molahidatidosa	10

2. Faktor resiko molahidatidosa	11
3. Patofisiologi molahidatidosa	13
4. Klasifikasi molahidatidosa	15
5. Gambaran klinik molahidatidosa.....	15
6. Progonis molahidatidosa.....	17
7. Pengananan molahidatidosa	18
8. Komplikasi molahidatidosa.....	21
C. Tinjauan islam terhadap asuhan kebidanan pada Kehamilan molahidatidosa	22
D. Teori Manajemen Kebidanan.....	31
1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan	31
2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan.....	33
BAB III STUDI KASUS.....	37
Langkah I. Identifikasi Data dasar	37
Langkah II. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual	42
Langkah III. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial	46
Langkah IV. Tindakan Segera/ Kolaborasi	46
Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan	46
Langkah VI. Tindakan Asuhan Kebidanan	48
Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan	49
Pendokumentasian	51
BAB IV PEMBAHASAN	63
Langkah I. Identifikasi Data dasar	63
Langkah II. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual	70

Langkah III. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial	72
Langkah IV. Tindakan Segera/ Kolaborasi	75
Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan	77
Langkah VI. Tindakan Asuhan Kebidanan	81
Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan	85
Pendokumentasian	88
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar Kegiatan Konsultasi.....	96
Lampiran II	: Surat Permohonan Pengambilan Data Awal Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala RSUD Syekh Yusuf Gowa'	100
Lampiran III	: Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)	101
Lampiran IV	: Surat Izin Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Kepala Balitbangda Provins Sulawesi Selatan)	102
Lampiran IV	: Surat Izin Dari Gubernur Sulawesi Selatan Atau Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)	102
Lampiran V	: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Ke RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.....	103
Lampiran VI	: Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa	104
Lampiran VII	: Daftar Riwayat Hidup.....	105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Angka kematian maternal di Indonesia masih sangat tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup sehingga menempatkan Indonesia pada tempat kedua jumlah kematian maternal diantara negara-negara ASEAN lainnya. Terlepas dari berbagai strategi yang digunakan untuk menurunkan angka kematian maternal tiap tahunnya. Penurunan angka tersebut relatif masih sangat rendah. Laporan kependudukan Indonesia pada tahun 2004 memperlihatkan kematian maternal di Indonesia yang cukup tinggi (International Classification of Diseases, 2012).

Sepuluh tahun setelah konferensi internasional kependudukan dan pembangunan International Classification of Diseases Cairo (ICPD), angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi dan belum dapat diturunkan secara signifikan, serta jauh dari target ICPD yaitu dibawah 125/100.000 kelahiran hidup tahun 2010 dan 75 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015. Departemen kesehatan menargetkan tahun angka kematian ibu turun menjadi 2017 per 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi sampai saat ini belum ada hasil yang signifikan terhadap penurunan angka kematian ibu (International Classification of Diseases, 2012).

Menurut *World Health Organization* (WHO), sebanyak 99 persen kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi dinegara-

negara berkembang. Rasio kematian ibu dinegara-negara berkembang merupakan yang tertinggi dengan 450 kematian ibu per 100 ribu kelahiran bayi hidup jika dibandingkan dengan rasio kematian ibu disembilan negara maju dan 51 negara persemakmur (WHO, 2014)

Provinsi dengan kasus kematian ibu melahirkan tertinggi adalah provinsi Papua, yaitu sebesar 730/100.000 kelahiran hidup, diikuti provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 370/100.000 kelahiran hidup, provinsi Maluku sebesar 330/100.000 kelahiran hidup. Jumlah ini tidak terlalu banyak berubah sejak masa orde baru. Jumlah kematian ibu maternal yang dilaporkan pada tahun 2011 di Sulawesi Selatan sebesar 101,56/100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi 92,89/100.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013).

Pada umumnya setiap kelahiran berakhir dengan lahirnya bayi yang sempurna tetapi dalam kenyataannya tak selamanya kehamilan dapat berlangsung sukses. Pada keadaan tertentu buah kehamilan ada yang mengalami gangguan dalam proses pertumbuhan dan akhirnya gugur. Kehamilan yang (*villi korionik*) abnormal yang menggantung seperti anggur disebut dengan istilah *mola hidatidosa* (Enny, 2009).

Data yang diperoleh dari Medical Record RSUD Syekh Yusuf menunjukkan bahwa 2,865 kehamilan pada bulan januari sampai desember 2015 tercatat 17 kasus mola hidatidosa. Penanganan kejadian mola hidatidosa rata-rata dilakukan di Rumah Sakit rujukan seperti RSUD Syekh Yusuf. Di

mana kasus yang tidak bisa ditangani di puskesmas dan unit pelayanan lainnya merujuk ke Rumah Sakit (Medical Record RSUD Syekh Yusuf, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis bermaksud memberikan sumbangsih pemikiran tentang asuhan yang dapat diberikan pada kasus molahidatidosa sehingga terjadinya kematian ibu dapat dicegah. Penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Kasus Molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf”.

B. *Perumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimana asuhan kebidanan antenatal dengan kasus molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan menurut Varney”.

C. *Tujuan studi kasus*

1. Tujuan umum

Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan kasus molahidatidosa dengan menggunakan penerapan manajemen 7 langkah Varney.

2. Tujuan khusus

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan analisis data dasar pada kasus molahidatidosa di RSUD syekh Yusuf.

- b. Melaksanakan perumusan diagnosa / masalah aktual pada kasus ibu hamil dengan molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf.
- c. Melaksanakan perumusan diagnosa / masalah potensial pada kasus ibu hamil dengan molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf.
- d. Melaksanakan pengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada kasus ibu hamil dengan molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf.
- e. Melaksanakan rencana tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan kasus ibu hamil dengan molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf.
- f. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan kasus molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf.
- g. Melaksanakan evaluasi tindakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan kasus molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf.
- h. Melaksanakan pendokumentasian semua temuan dan tindakan dalam asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan pada ibu hamil dengan kasus molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf.

D. Manfaat penulisan

Adapun manfaat dari penulisan pada kasus tersebut di atas adalah :

1. Merupakan bahan pembelajaran, sumber pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menangani kehamilan molahidatidosa.
2. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada akademik kebidanan UIN Alauddin makassar.

3. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi petugas kesehatan , utamanya yang ada didalam menangani kasus kehamilan molahidatidosa.
4. Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang kehamilan molahidatidosa.

E. *Metode Penelitian*

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1. Studi Pustaka

Penulis membaca dan mempelajari buku-buku serta literature yang berhubungan dengan kasus kehamilan molahidatidosa.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengumpulan data, analisa dan perumusan diagnosa/masalah Actual, perencanaan tindakan, evaluasi dan pendokumentasian. Untuk memperoleh data dalam pengkajian, penulis menggunakan teknik.

a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga, bidan dan dokter yang berada di kamar bersalin yang berhubungan dengan kasus yang di hadapi pasien.

b. Observasi

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung.

c. Pemeriksaan fisik

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan sistematis agar didapatkan data yang akurat.

3. Studi dokumentasi

Penulis memperoleh informasi berdasarkan catatan medik klien, baik dari bidan, dokter maupun data penunjang lainnya.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan tenaga kesehatan, pembimbing dan institusi demi kelancaran penulisan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika penulisan

Dalam karya tulis ini dapat dilihat secara garis besar tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Ruang lingkup pembahasan
- C. Tujuan penulisan
- D. Manfaat penulisan
- E. Metode penulisan

F. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perdarahan Hamil Muda

1. Pengertian
2. Etiologi
3. Diagnosa perdarahan pada hamil muda.

B. Tinjauan khusus pada molahidatidosa

1. Pengertian molahidatidosa
2. Faktor resiko molahidatidosa
3. Patofisiologi molahidatidosa
4. Klasifikasi molahidatidosa
5. Gambaran klinik molahidatidosa
6. Prognosis molahidatidosa
7. Pengananan molahidatidosa
8. Komplikasi molahidatidosa

C. Tinjauan islam tentang terjadinya kehamilan pada mola hidatidosa

D. Teori Manajemen Kebidanan

1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan
2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perdarahan Hamil Muda

1. Pengertian

Perdarahan hamil muda adalah pada saat perdarahan yang melalui jalan lahir yang terjadi sebelum umur kehamilan 16 – 28 minggu (menurut beberapa buku sumber yang berbeda yaitu minimal 16 minggu dan maksimal 28 minggu).

Perdarahan uterus merupakan tanda yang paling utama dan dapat beragam mulai dari bercak darah sampai perdarahan yang profus. Perdarahan dapat terjadi saat sebelum abortus, atau yang lebih sering, terjadi secara intermitten berminggu-minggu atau berbulan-bulan (Gary, 2006).

2. Etiologi

Perdarahan hamil muda dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa kondisi. Beberapa penyebab utama perdarahan hamil muda hanya tiga yang paling sering terjadi yaitu :

- a. Abortus
- b. Mola hidatidosa
- c. Kehamilan ektopik

3. Diagnosa perdarahan pada hamil muda (*Early bleeding in pregnancy*)

Untuk mempermudah mendiagnosa tentang perdarahan hamil muda.

Maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Gejala	Perdarahan pada kehamilan muda
Diagnosis	<p>Anamnesis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riwayat kehamilan • Gejala kehamilan muda • Riwayat perdarahan • Gejala tanda komplikasi <p>Pemeriksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi umum pasien (pucat, anemis, sesak nafas, syok, demam, lemah, stabil) • Fisik (cloasma gravidarum, linea nigra, hiperpigmentasi areola mammae, tinggi fundus, nyeri tekan perut bawah, perut tegang, cairan bebas intraabdomen) • Ginekologi (sekret vagina, fflour albus, mukopus, keunguan portio, besar uterus, perlunakan serviks atau korpus, ballotement, nyeri goyang porsio, massa adneksa). <p>Pemeriksaan tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultrasonografi (USG) • Uji Kehamilan • Kuldosentesis • Patologi Anatomi

Fasilitas Pelayanan	Kategori Molahidatidosa
Polindes	Dugaan berdasarkan gejala klinik Diagnosis bila ada ekspulsi jaringan mola Rujuk
Puskesmas	Diagnosis Evakuasi bila abortus mola Rujuk untuk terapi atau pemantauan lanjut
Rumah Sakit	Diagnosis Evaluasi medik Antisipasi komplikasi Evakuasi Sitostatika pemantauan

Sumber : (Saifuddin , 2009)

B. Tinjauan khusus pada Molahidatidosa

1. Pengertian

Molahidatidosa adalah jonjot-jonjot karoin (chorionic villi) yang tumbuh berganda berupa gelembung-gelembung kecil yang mengandung banyak cairan sehingga menyerupai buah anggur, atau mata ikan. Karena itu disebut juga hamil atau mata ikan. Kelainan ini merupakan neoplasma yang jinak (benigna) (Nugraheny , 2010)

Molahidatidosa adalah kehamilan di mana setelah terjadi fertilisasi tidak berkembang menjadi embrio, tetapi terjadi proliferasi tropoblast dan ditemukan villi korialis yang mengalami perubahan degenerasi hidropik

dan stoma yang hipo vaskuler atau avaskuler, janin biasanya meninggal akan tetapi villus-villus yang membesar dan edematus itu hidup dan tumbuh terus, gambaran yang diberikan adalah sebagai gugus buah anggur (Nugroho , 2010).

Molahidatidosa adalah suatu kehamilan di mana hasil konsepsi tidak berkembang menjadi embrio, tetapi terjadi proliferasi dari villi koriales disertai dengan degenerasi hidropik (Fadlun , 2011).

2. Faktor risiko

Penyebab molahidatidosa tidak diketahui secara pasti, namun faktor penyebabnya adalah :

a. Umur

Molahidatidosa banyak ditemukan pada wanita hamil yang berusia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun.

b. Etnik

Lebih banyak ditemukan m ongoloid dari pada kasus.

c. Genetik

Wanita dengan *balanced tranlocation* merupakan risiko paling tinggi.

d. Gizi

Molahidatidosa banyak ditemukan pada mereka yang kekurangan protein,β-carotene, dan vitamin A.

e. Penggunaan kontrasepsi oral.

Penggunaan kontrasepsi oral dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko terjadinya kehamilan *mola hidatidosa*.

f. Paritas tinggi

Ibu dengan paritas tinggi, memiliki kemungkinan terjadinya abnormalitas pada kehamilan berikutnya, sehingga ada kemungkinan kehamilan berkembang menjadi *mola hidatidosa*.

g. Keadaan sosial-ekonomi yang rendah

Keadaan sosial ekonomi akan mempengaruhi terhadap pemenuhan gizi ibu yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembentukan ovum abnormal yang mengarah pada pembentukkan mola hidatidosa (Norwitz, 2010).

h. Imunoselektif dari tropoblast.

Imunoselektif dari tropoblast, yaitu dengan kematian fetus, pembuluh darah pada stroma villi menjadi jarang dan stroma villi menjadi sembab dan akhirnya terjadi hyperplasia sel-sel trofoblast.

i. Infeksi virus dan faktor kromosom yang belum jelas.

Infeksi mikroba dapat mengenai semua orang termasuk wanita hamil. Masuk atau adanya mikroba dalam tubuh manusia tidak selalu akan menimbulkan penyakit. Hal ini sangat tergantung dari jumlah mikroba yang masuk virulensinya serta daya tahan tubuh.

3. Patofisiologi

Uterus adalah organ yang tebal, berotot, berbentuk buah pear, terletak dalam rongga panggul kecil diantara kandung kemih dan anus, ototnya disebut miometrium dan selaput lendir yang melapisi bagian dalamnya disebut endometrium. Peritonium menutupi sebagian besar permukaan luar uterus, letak uterus sedikit anteflexi pada bagian lehernya dan anteversi (meliuk agak memutar ke depan) dengan fundusnya terletak diatas kandung kencing. Bagian bawah bersambung dengan vagina dan bagian atasnya tube uterin masuk ke dalamnya. Ligamentum latum uteri dibentuk oleh dua lapisan peritoneum, di setiap sisi uterus terdapat ovarium dan tuba uterina. Panjang 5-8 cm dengan berat 60-80 gram (Verrals, Silvia, 2003). Uterus terbagi atas 3 bagian yaitu :a. Fundus : bagian lambung di atas muara uterina,b. Badan uterus : melebar dari fundus ke serviks,c. Isthmus : terletak antara badan dan serviks.

Untuk menahan ovum yang telah dibuahi selama perkembangan sebutir ovum, sesudah keluar dari ovarium diantarkan melalui tuba uterin ke uterus (pembuahan ovum secara normal terjadi dalam tuba uterin) sewaktu hamil yang secara normal berlangsung selama 40 minggu, uterus bertambah besar, tapi dindingnya menjadi lebih tipis tetapi lebih kuat dan membesar sampai keluar pelvis, masuk ke dalam rongga abdomen pada masa fetus.

Pada umumnya setiap kehamilan berakhir dengan lahirkan bayi yang sempurna. Tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sering kali perkembangan kehamilan mendapat gangguan. Demikian pula dengan penyakit trofoblast, pada hakekatnya merupakan kegagalan reproduksi. Di sini kehamilan tidak berkembang menjadi janin yang sempurna, melainkan berkembang menjadi keadaan patologik yang terjadi pada minggu-minggu pertama kehamilan, berupa degenerasi hidrifik dari jonjot karion, sehingga menyerupai gelembung yang disebut “Molahidatidosa”. Pada umumnya penderita “Molahidatidosa akan menjadi baik kembali, tetapi ada diantaranya yang kemudian mengalami degenerasi keganasan yang berupa karsinoma (Wiknjosastro, 2002).

Ada beberapa teori yang dianjurkan untuk menerangkan patogenesis dari penyakit trofoblast :

- Teori *missed Abortion* : mudah mati pada kehamilan 3-5 minggu karena itu terjadi gangguan peredaran darah sehingga terjadi penimbunan cairan masenkim dari villi dan akhirnya terbentuklah gelembung-gelembung.
- Teori *neoplasma dari Park* : sel-sel trofoblast adalah abnormal dan memiliki fungsi yang abnormal dimana terjadi reabsorpsi cairan yang berlebihan ke dalam villi sehingga timbul gelembung.
- Studi dari *Hertig* : mola hidatidosa semata-mata akibat akumulasi cairan yang menyertai degenerasi awal atau tidak adanya embrio komplit pada

minggu ketiga dan kelima. adanya sirkulasi maternal yang terus menerus dan tidak adanya fetus menyebabkan trofoblast berproliferasi dan melakukan fungsinya selama pembentukan cairan (Nugroho , 2010).

4. Klasifikasi

Mola hidatidosa dapat terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Molahidatidosa komplet (Klasik), yaitu penyimpanan pertumbuhan perkembangan kehamilan yang tidak disertai janin dan seluruh vili korialis mengalami perubahan hidropik.
2. Molahidatidosa inkomplet (Parsial), yaitu sebagian pertumbuhan dan perkembangan vili korialis berjalan dengan normal sehingga janin dapat tumbuh dan berkembang bahkan sampai aterm (Nugroho, 2010).

5. Gambaran klinik

a. Tanda dan gejala.

Tanda dan gejala kehamilan molahidatidosa antara lain :

1. Amenorea dan tanda-tanda kehamilan Perdarahan pervaginam berulang.
2. Darah cenderung berwarna coklat. Pada keadaan lanjut kadang keluar gelembung mola.
3. Mual dan muntah lebih sering terjadi dan durasinya lebih lama.
4. Pembesaran uterus lebih besar dari usia kehamilan.

5. Tidak terabanya bagian janin pada palpasi dan tidak terdengarnya DJJ sekalipun uterus sudah membesar setinggi pusat atau lebih.
6. Preeklampsia atau eklampsia yang terjadi sebelum kehamilan 24 minggu.
7. Sesak nafas
8. Tidak ada aktivitas janin
9. Kadar hormon korionik gonadotropin (HCG) tinggi dalam darah dan air kencing ibu (Sukarni, 2013).

b. Diagnosis

Diagnosis yang dapat ditegakkan berdasarkan :

- 1) Gejala hamil muda yang sangat menonjol.
 - a). Emesis gravidarum/hiperemesis gravidarum.
 - b). Terdapat komplikasi.
 - (a). Tirotoksikosis (2-5%)
 - (b). Hipertensi/preeklamsia
 - (c). Anemia akibat perdarahan.
- 2) pemeriksaan palpasi
 - a). Uterus
 - (a). Lebih besar dari usia kehamilan (50%- 60%).
 - (b). Besarnya sama dengan usia kehamilan (20–25 %)
 - (c). Lebih kecil dari pada usia kehamilan (5-10%)

b). Palpasi lunak seluruhnya

(a). Tidak ada teraba janin.

(b). Terdapat bentuk asimetris. Bagian menonjol agak padat.

3) Pemeriksaan USG

a) Sudah dipastikan mola hidatidosa tampak seperti tv rusak.

b) Tidak terdapat janin.

c) Akan ada kelihatan bayangan badai salju.

d) Tampak sebagaian plasenta normal dan kemungkinan dapat tampak janin.

4). Genitalia eksternal : pemeriksaan genitalia eksternal dilakukan inspekulo menggunakan speculum terlihat adanya pengeluaran darah pervaginam dan terlihat gelembung-gelembung mola seperti buah anggur (Esti, 2010)

3. Diagnosis Diferensial

a) Abortus.

b) Kehamilan ganda.

c) Kehamilan dengan mioma uteri.

d) Hidramnion.

6. Prognosis

Risiko kematian/kesakitan pada penderita mola hidatidosa meningkat karena *perdarahan*, *Perforasi uterus*, *pre-eklamsia berat* atau *infeksi*. Akan tetapi, kematian karena mola hidatidosa sudah jarang sekali (Sastrawinata, 2009).

Sebagian besar penderita mola hidatidosa akan kembali pada saat kuretase. Bila hamil lagi, umumnya berjalan normal. Mola hidatidosa berulang dapat terjadi, tetapi jarang. Walaupun demikian 15-20 % dari penderita pasca mola hidatidosa dapat mengalami degenerasi keganasan menjadi tumor trofoblast gestasional, baik berupa mola insatif, koriokarsinoma, maupun placentar site trofoblast (Duff, 2004).

keganasan ini biasanya terjadi pada satu tahun pertama setelah terjadi mola yang terbanyak adalah enam bulan pertama. Mola hidatidosa parsial lebih jarang terjadi keganasan (Sastrawinata, 2009).

7. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan mola hidatidosa dapat di bagi 3 yaitu penanganan umum , penilaian klinik, dan penanganan khusus (Saifuddin, 2006).

<p>Penanganan umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan diagnosa dini 2. Melakukan pemeriksaan USG, jika fasilitas pemeriksaan USG terbatas maka dapat dilakukan : <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi klinik <ol style="list-style-type: none"> 1. Riwayat haid terakhir dan kehamilan 2. Perdarahan tidak teratur atau spotting 3. Pembesaran abnormal uterus 4. Perlunakan serviks dan korpus uterus b. Kajian uji kehamilan dengan pengenceran urin c. Pastikan tidak ada janin (Ballotement) atau denyut jantung janin 3. Lakukan pengosongan jaringan mola dengan segera 4. Antisipasi Komplikasi (perdarahan hebat dan perforasi uterus) 5. Lakukan pengamatan lanjut hingga minimal 1 tahun pascaeвакуasi)
<p>Penilaian Klinik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mola ditandai dengan adanya pembesaran uterus dan peningkatan kadar hCG, jika itu terjadi maka lakukan pengukuran kuantatif kadar spesifik, bila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan tersebut, pengukiran dapat dilakukan dengan uji kehamilan berbasis tera imunologik (Hemaglutinasi atau aglutinasi lateks) dimana kadar hormon tersebut diukur secara semikuantitatif melalui pengenceran urin. 2. Gejala klinik mirip dengan

	<p>kehamilan muda dan abortus imminens , tetapi gejala mual dan muntah lebih hebat, sering disertai gejala seperti preeklamsia. Pemeriksaan dengan USG akan menunjukkan gambaran seperti sarang tawon tanpa disertai adanya janin.</p> <p>3. Diagnosis pasti adalah dengan melihat jaringan mola, baik melalui ekspulsi spontan maupun biopsi. (siapkan tindakan darurat apabila terjadi perdarahan pascabiopsi).</p>
<p>Penanganan Khusus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera lakukan evakuasi jaringan mola dan semestara proses evakuasi berlangsung, berikan infus 10 IU oksitosia dalam 500 ml NS atau RL dengan kecepatan 40-60 tetes/menit (sebagai tindakan preventif terhadap perdarahan hebat dan efektifitas kontraksi terhadap pengosongan uterus secara cepat) 2. Pengosongan dengan Aspirasi Vakum lebih amam dari Kuretase tajam, Bila sumber vakum adalah tabung manual, siapkan peralatan AVM minimal 3 set agar dapat digunakan secara bergantian hingga pengosongan kavum uteri selesai. 3. Kenali dan tangani komplikasi penyerta seperti tiritoksikosis atau krisis tiroid baik sebelum, selama dan setelah prosedur evakuasi. 4. Anemia sedang cukup diberikan sulfas ferosus 600 mg/hari, untuk anemia berat lakukan transfusi. 5. Kadar Hcg diatas 100.000 IU/L praevakuasi dianggap sebagai risiko tinggi untuk perubahan ke arah ganas, pertimbangan untuk

	<p>memberikan methatrexale (MTX) 3-5 mg/kg BB atau 25 mg IM dosis tunggal.</p> <p>6. Lakukan pemantauan kadar hCG hingga minimal 1 tahun pascaevakuasi. Kadar yang menetap atau meninggi setelah 8 minggu pascaevakuasi menunjukkan masih terdapat trofoblas aktif (di luar uterus atau invasif) : berikan kemoterapi MTX dan pantau β-hCG serta besar uterus secara klinik dan USG tiap 2 minggu.</p> <p>7. Selama pemantauan, pasien dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi hormonal (apabila masih ingin anak) atau tubektomi apabila ingin menghentikan fertilitas.</p>
--	---

8. Komplikasi

Menurut Taufan nugroho (2010) komplikasi yang mungkin terjadi pada kehamilan mola, yaitu :

- a) Perdarahan yang hebat sampai syok, kalau tidak segera ditolong dapat berakibat fatal.
- b) Perdarahan berulang-ulang yang dapat menyebabkan Anemis.
- c) Infeksi sekunder
- d) Perforasi uterus.
- e) Krisis tiroid
- f) Keganasan (PTG), akan menjadi mola destruens atau koriokarsinoma

C. Tinjauan Islam Tentang Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan Molahidatidosa

Islam adalah agama yang begitu memperhatikan kehidupan umatnya. Berbagai aspek diatur di dalamnya di mana semuanya dituangkan dalam Al-Qur'an dan dilengkapi dengan Al-Hadits. Mulai dari konsepsi sampai meninggalkan seorang insan semua telah diatur oleh Allah SWT.

Sikap dan perilaku setiap ibu hamil pasti ada perubahan perilaku pada si ibu ini semua dipengaruhi oleh perubahan hormonal. Saat memutuskan untuk hamil suami dan istri harus benar-benar siap dengan segala perubahan yang akan terjadi nanti pada si ibu baik perubahan fisik dan perilaku, agar suami maupun istri siap menghadapinya. Jangan sampai perubahan ini membuat pasangan jadi tidak harmonis.

Tahapan perkembangan janin, setelah terjadi pembuahan yang ditakdirkan oleh Allah SWT hingga berproses menjadi seorang anak, mulailah sang ibu mengalami perubahan-perubahan dirahimnya. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dalam satu hadits shahih bersabda :

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya salah seorang diantara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari (dalam bentuk mani) lalu menjadi segumpal daging selama itu pula (selama 40 hari), lalu menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetapkan baginya empat hal : rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya”. [Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu’anh]

Hadits di atas menjelaskan bahwa pada kehamilan antara 8-10 pekan (sekitar 56-70 hari) pembuluh darah janin mulai terbentuk. Dengan alat-alat modern seperti alat perekam jantung bayi (elektrokardiografi/EKG untuk bayi) dan ultrasonografi (USG) dapat diketahui sedini mungkin, apakah jantung bayi sudah berdenyut atau belum. Umumnya denyut jantung bayi dapat diketahui dan dicatat pada pekan ke 12 (lebih kurang 84 hari). Tetapi dengan alat sederhana, baru terdengar pada kehamilan 20 pekan (kira-kira 140 hari). Dibuktikan bahwa kira-kira pada kehamilan 10 pekan (kira-kira 70 hari) sudah mulai terbentuk sistem jantung dan pembuluh darah.

Sejak umur kehamilan 8 pekan (kira-kira 56 hari) mulai terbentuk hidung, telinga, dan jari-jari dengan kepala membungkuk ke dada. Setelah 12 pekan (84 hari) telinga lebih jelas, tetapi mata masih melekat. Leher sudah

mulai terbentuk, alat kelamin sudah terbentuk tetapi belum begitu nampak. Baru setelah 16 pekan (112 hari) alat kelamin luar terbentuk, sehingga dapat dikenali dan kulit janin berwarna merah tipis sekali. Pada umumnya plasenta atau ari-ari sudah terbentuk lengkap pada 16 pekan.

Menginjak kehamilan 24 pekan (168 hari), kelopak mata sudah terpisah. Ditandai dengan adanya alis dan bulu mata. Maha luas ilmu Allah Azza wa Jalla dalam segala penciptaanNya.

Apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits tersebut memang benar adanya. Manusia baru membuktikannya pada abad ini. Padahal kebenaran ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sudah disampaikan puluhan abad lalu; sebagai bukti, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia dari segumpal darah (alaqah) 40 hari, setelah terbentuknya air mani. Hal ini bisa diketahui oleh ahli medis, bahwa kurang lebih umur 56-70 hari pembuluh darah janin mulai terbentuk. Kemudian ada gerakan-gerakan. Gerakan inilah yang mungkin terdeteksi oleh alat-alat kedokteran modern sebagai denyut jantung janin. Namun berdasarkan dhohir hadits, bahwa ruh ditiupkan pada saat janin berumur lebih dari 120 hari. Wallahu a'lam.

Kehamilan ini adalah kehamilan abnormal. Pada kehamilan biasa, embrio tumbuh terus menjadi janin dan kemudian dapat dilahirkan sebagai bayi. Adapun pada kehamilan anggur ini, perkembangan sel ovum bukan menjadi embrio. Tetapi menjadi bentuk seperti anggur. Biasanya tidak ada tanda-tanda

kehidupan pada janin. Kehamilan anggur ini bisa berkembang menjadi tumor ganas. Kelainan bentuk rahim juga dapat menghalangi berkembangnya janin secara sempurna.

Kehamilan merupakan hal yang diinginkan oleh banyak wanita yang telah berkeluarga. Karena kehamilan merupakan kabar bahwa mereka mendapatkan keturunan. Namun, banyak wanita tidak mengetahui tanda-tanda awal kehamilan sehingga mereka kadang tidak mengetahui bahwa mereka telah hamil. berkaitan dengan cara melakukan diagnosa bagi tanda-tanda kehamilan, Al-Qur'an hanya mengemukakan beban yang ditanggung oleh ibu hamil yang setiap saat bertambah berat karena bertambah beratnya kandungan. Hal ini diisyaratkan di dalam Q.S Al-A'raf (7) :189, sebagai berikut :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَلَاحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝۱۸۹﴾

Terjemahnya :

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan darinya Dia menciptakan pasangan agar dia merasa tenang kepadanya. Maka, setelah dicampurinya, ia mengandung yang ringan, dan itu berlanjut dengannya. Lalu, tatkala ia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah, Tuhan mereka berdua: ‘Demi, jika Engkau menganugerahi kami yang sempurna,

tentulah kami termasuk orang-orang bersyukur. ‘Maka, tatkala Allah menganugerahi keduanya yang sempurna, maka keduanya menjadikan bagi-Nya sekutu terhadap apa yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya. Maka, Mahatinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.’”

Ayat ini menjelaskan bahwa tanda-tanda kehamilan adalah adanya perubahan beban yang di alami oleh seorang perempuan karena adanya kandungan janin di dalam perutnya. Kandungan yang setiap saat bertambah besar yang menyebabkan beban yang ditanggung ibu hamil.

Ayat di atas mengandung nilai tanggung jawab yang berat bagi ibu yang hamil dan nilai kepasrahan terhadap takdir Allah SWT. Sehingga menyadarkan untuk senantiasa berdoa kepada-Nya agar kelak melahirkan anak yang sempurna.

Ayat ini mengandung makna yakni tidak menghiraukannya, boleh jadi karena yang mengandung pada periode awal kehamilannya belum mengetahui bahwa ia hamil atau karena kehamilan tersebut sedemikian ringan sehingga tidak mengganggu aktivitasnya. Ada juga yang membaca ayat ini dengan farrat bihi, yakni sang ibu meragukannya, apakah ia mengandung atau tidak, dan apakah akan lahir dengan sempurna atau cacat. Kedua makna itu benar adanya.

Doa ibu bapak kepada Allah untuk dianugerahi anak yang saleh, sempurna, dan tanpa cacat adalah gambaran dari gejolak hati setiap orangtua, baik doa itu mereka ucapkan maupun hanya terlintas dalam hati. Betapa tidak, anak yang dikandung adalah harapan orangtua bahkan bagian dari diri mereka. Keduanya

menginginkan untuk anaknya apa yang lebih baik dari perolehan dirinya sendiri.

Doa tersebut adalah gambaran pertama dari cinta orangtua terhadap anaknya.

Adapun salah satu faktor resiko terjadinya *mola hidatidosa* yaitu hamil anggur.

Sebagaimana dalam surah Al- Hajj, Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ
ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا
نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن
يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ

زُوجٍ بَهِيحٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya :

“Hai manusia seandainya kamu dalam keraguan tentang kebangkitan maka :sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah,kemudian dari nuthfah, kemudian ‘alaqah,kemudian mudhgah yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian agar kamu mencapai masa terkuat kamu, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan diantara kamu ada yang dikembalikan sampai keumur yang rendah hingga akhirnya dia tidak mengetahui sesuatupun yang dahulu telah diketahuinya. Dan engkau melihat bumi kering kerontang, maka apabila telah kami turunkan air diatasnya dia bergerak dan mengembang danmenumbuhkan berbagai jenis yang indah.”(Q.S Al-hajj : 5)

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari setetes mani atau sperma laki-laki yang bertemu dengan ovum atau sel telur dalam rahim seorang perempuan. Setelah beberapa lama menjadi segumpal darah yang kemudian menjadi segumpal darah yang kemudian menjadi segumpal daging. Gumpalan daging ini ada menjadi daging yang sempurna wujudnya dan ada yang cacat contohnya adalah kehamilan aggur atau mola hidatidaosa, dimana janin tidak tumbuh dengan sempurna karena hanya mengandung gelembung-gelembung cairan layaknya seperti buah anggur, hal ini juga secara tidak langsung dapat menyebabkan keadaan kritis pada ibu sampai akhirnya terjadi kematian hukum.

Ayat diatas melanjutkan setelah perhentian diatas untuk menunjukkan lebih banyak lagi bukti-bukti kekuasaan-Nya dengan mengatakan bahwa kami tetapkan bagi mudhghah yang tidak sempurna kejadiannya itu untuk gugur dan kami tetapkan dalam rahim bagi mudhghah yang sempurna kejadiannya untuk berlanjut proses kejadiannya sesuai apa yang kami kehendaki samai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kelahirannya antara enam dan sembilan bulan lebih, kemudian kami keluarkan masing-masing kamu dari perut ibu kamu masing-masing sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu kami pelihara agar kamu mencapai masa terkuat kamu, yakni masa puncak kedewasaan dan kekuatan fisik, mental dan pikiran.

Ada juga yang memahami kata turab/tanah disini dalam arti sperma sebelum pertemuannya dengan indung telur. Mereka memahami demikian atas dasar bahwa asal-usul sperma adalah dari makanan manusia-baik tumbuhan maupun hewan-yang bersumber dari tanah. Jika dipahami demikian, keseluruhan tahap yang disebut pada ulama bahwa kata tanah dipahami sebagai berbicara tentang reproduksi manusia, bukan seperti pendapat banyak ulama bahwa kata tanah dipahami sebagai berbicara tentang asal kejadian leluhur manusia yakni Adam as.

Kata nuthfah dalam bahasa Arab berarti setes yang dapat membahasi. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria yang mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedang yang berhasil bertemu dengan indung telur wanita hanya satu saja. Itulah yang dimaksud dengan nuthfah. Ada juga yang memahami kata nuthfah dalam arti hasil pertemuan sperma dan ovum.

Kata tersebut dipahami dalam arti segumpal darah, tetapi setelah kemajuan ilmu pengetahuan serta maraknya penelitian, para embriolog enggan menafsirkannya dalam arti tersebut. Mereka lebih cenderung memahaminya dalam arti sesuatu yang bergantung atau berdempet didinding rahim. Menurut mereka, setelah terjadi pembuahan (nuthfah yang berada dalam rahim) terjadi proses dimana hasil pembuahan itu menghasilkan zat baru, yang kemudian

terbelah menjadi dua, lalu yang dua menjadi empat, empat menjadi delapan, demikian seterusnya berkelipatan dua, dan dalam proses itu, ia bergerak menuju ke dinding rahim danakhirnya bergantung atau berdempet disana. Nah, inilah yang dimanai alaqah oleh al-Qur'an. Dalam periode ini kata para pakar embriologi-sama sekali belum ditemukan unsur dasar dan, karena itu, tidak tepat menurut mereka mengartikan alaqah atau alaq arti segumpal darah.

Walaupun redaksi ayat diatas ditunjukkan kepada jamak, karena ayat ini menggambarkan keadaan setiap yang lahir, kata tersebut dipahami dalam arti masing-masing kamu lahir dalam bentuk anak kecil/bayi. Penggunaan bentuk tunggal ini juga mengisyaratkan bahwa ketika lahirnya semua thift, yang dalam hal ini berarti bayi, dalam keadaan sama, mereka semua suci,menghandalkan orang lain,belum memiliki berahi dan keinginan yang berbeda-beda.

D. Teori Manajemen Kebidanan

1. Pengertian manajemen kebidanan

Pengertian manajemen sering dikenal orang dengan definisi “proses melaksanakan pekerjaan melalui orang lain”. Dalam pelayanan kebidanan, manajemen adalah proses pelaksanaan pemberian pelayanan kebidanan kepada klien dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi ibu dan anak, kepuasan pelanggan dan kepuasan bidan tentu sebagai *provide* (Erna, 2008)

Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat (Depkes RI).

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasi pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan – penemuan, keterampilan dalam rangkaian/tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien (Varney).

2. Langkah – langkah dalam manajemen kebidanan

a. Langkah 1: Pengumpulan data dasar

Pada langkah pertama ini, dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap seperti : Riwayat kesehatan, pemeriksaan

fisik sesuai kebutuhan, peninjauan catatan terbaru, atau catatan sebelumnya, dan data laboratorium.

Pada pengkajian didapatkan data subjektif adanya pengeluaran darah sebelum usia kehamilan 28 minggu. Pada data objektif pemeriksaan fisik didapatkan usia kehamilan tidak sesuai dengan pembesaran perut, tidak teraba bagian-bagian janin serta adanya pengeluaran darah.

Diagnosis kehamilan molahidatidosa ditegakkan pada gambaran USG (*Ultrasonografi*) : ditemukan tidak terlihat rangka janin, terlihat gelembung-gelembung mola seperti buah anggur gambaran seperti sarang tawon, seperti badai salju (obstetri patologi : 2012).

b. Langkah 2: Interpretasi data dasar

Langkah awal dari perumusan masalah/diagnosa kebidanan adalah pengelolaan/analisis data yaitu menggabungkan dan menghubungkan data satu dengan data lainnya sehingga tergambar fakta.

Diagnosis yang dapat ditegakkan berdasarkan gejala hamil muda yang sangat menonjol seperti emesis gravidarum/hiperemesis gravidarum, terdapat komplikasi seperti tirotoksikosis, hipertensi/preeklamsia, serta anemia akibat perdarahan. Kemudian

pemeriksaan palpasi teraba lunak seluruhnya, tidak teraba janin, terdapat bentuk simetris, bagian menonjol agak padat.

c. Langkah 3: Identifikasi diagnosis dan masalah potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis/masalah potensial ini benar benar terjadi. Langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman.

Pada kehamilan molahidatidosa, masalah-masalah yang akan terjadi pada ibu yaitu : Dapat mengalami syok, kalau tidak segera ditolong dapat berakibat fatal, perdarahan berulang-ulang yang dapat menyebabkan anemis, infeksi sekunder, perforasi uterus, krisis tiroid serta keganasan, akan menjadi mola destruens atau koriokarsinoma.

d. Langkah 4: Identifikasi kebutuhan segera/kolaborasi

Kebutuhan adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh klien dan belum teridentifikasi dalam diagnosis dan masalah yang didapatkan dengan melakukan analisis data. Pada langkah ini, bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Setelah itu mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter

dan/untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Pada kehamilan molahidatidosa tindakan segera yang dilakukan adalah memperbaiki keadaan umum klien, melakukan pemasangan infus dan melakukan transfusi darah.

e. Langkah 5: Intervensi (Perencanaan)

Melakukan perencanaan secara menyeluruh yang rasional terhadap masalah sesuai dengan langkah sebelumnya (Muslihatun, 2010). Rencana asuhan yang akan diberikan disetujui oleh pasien agar pasien dapat menentukan apakah tindakan yang telah direncanakan bersedia untuk di laksanakan atau tidak. Rencana asuhan pada ibu yaitu : Memperbaiki keadaan umum ibu, Bila mola sudah keluar spontan makan dilakukan kuret atau kuret isap, Selanjutnya bila canalis servikalis belum terbuka memasang laminaria dan 12 jam kemudian melakukan kuret, Setelah itu memasang infuse, selanjutnya memberikan obat-obatan antibiotik uretronika dan memperbaiki keadaan umum ibu, tunggu sampai 7-8 hari setelah kerokan pertama, melakukan kerokan kedua untuk membersihkan sisa-sisa jaringan.

f. Langkah 6: Pelaksanaan rencana asuhan (implementasi)

Pada langkah ini dilakukan pelaksanaan asuhan langsung secara efisien dan aman. Pada langkah keenam ini, rencana asuhan

menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman.

Memperbaiki keadaan umum ibu, Bila mola sudah keluar spontan maka dilakukan kuret atau kerut isap, Selanjutnya bila canalis servikalis belum terbuka memasang lamaminaria dan 12 jam kemudian melakukan kuret, Setelah itu memasang infuse, selanjutnya memberikan obat-obatan antibiotik uretronika dan memperbaiki keadaan umum ibu, tunggu sampai 7-8 hari setelah kerokan pertama, melakukan kerokan kedua untuk membersihkan sisa-sisa jaringan.

g. Langkah 7: Evaluasi

Langkah terakhir dalam manajemen kebidanan, yaitu melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Setelah dilakukan asuhan, hasilnya mola hidatidosa sudah teratasi, anemia ringan sudah teratasi, kemudian kecemasan ibu sudah teratasi.

Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan pada ibu: masalah/komplikasi yang terjadi pada ibu dapat teratasi dan ibu dalam keadaan umum baik.

h. Pendokumentasian asuhan SOAP

Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berpikir yang sistematis, didokumentasikan dalam bentuk

SOAP. S (Subjektif), adalah hasil pengumpulan data pasien yang diperoleh melalui anamnesis. Data yang di peroleh melalui wawancara. O (Objektif), adalah data yang mendapat hasil observasi melalui pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium). A (Assesment), Berdasarkan data yang terkumpul kemudian di buat kesimpulan yang meliputi diagnosis ,antisipasi atau masalah potensial tentang Kehamilan Molahidatidosa. P (Planning), merupakan rencana tindakan yang akan di berikan termasuk asuhan mandiri, Kolaborasi serta konseling untuk tindak lanjut.

SOAP adalah catatan yang bersifat sederhana, jelas, logis dan tertulis. Seorang bidan hendaknya menggunakan SOAP setiap kali ia bertemu dengan pasiennya. Selama masa antepartum, seorang bidan dapat menuliskan satu catatan SOAP untuk setiap kali kunjungan; sementara dalam masa intrapartum, seorang bidan boleh menuliskan lebih darisatu catatan untuk satu pasien dalam satu hari. Selain itu juga, seorangbidan harus melihat catatan-catatan SOAP terdahulu bilamana ia merawat seorang klien untuk mengevaluasi kondisinya sekarang (Rita, 2014).

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA Ny “N” DENGAN MOLAHIDATIDOSA
DIRSUD SYEKH YUSUF

No.Register : 113/16
Tanggal kunjungan : 12 Mei 2016 Pukul 08.00 Wita
Tanggal pengkajian : 12 Mei 2016 Pukul 08.00 Wita
Nama pengkaji : St.Syahrani Rauf

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “N” / Tn “A”
Umur : 25 Tahun / 26 Tahun
Nikah : 1 x / ± 4 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA /SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl.Syamsuddin Tunru No.58

B. Data biologis

Keluhan Utama

Ibu datang Pukul 08.00 wita dengan keluhan ibu merasakan ada pengeluaran darah banyak seperti ati ayam disertai dengan ada gelembung sejak tanggal 11 Mei 2016.

C. Riwayat kesehatan lalu

1. Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi dan diabetes melitus.
2. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit menular.
3. Ibu mengatakan tidak pernah minum alkohol dan merokok.
4. Ibu mengatakan tidak pernah menjalani operasi.
5. Ibu mengatakan tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dan jamu selama hamil.

D. Riwayat reproduksi

1. Menarche : umur 14 tahun
2. Siklus : 28-30 hari
3. Lama : 6-7 hari
4. Disminorhoe : tidak ada nyeri pada saat haid.

E. Riwayat kehamilan sekarang.

1. Ibu mengatakan kehamilan kedua dan tidak pernah mengalami keguguran.
2. Ibu mengatakan haid terakhir tanggal 16 Februari 2016

3. Ibu mengatakan usia kehamilannya 3 bulan lebih
4. Ibu merasakan pusing penglihatannya berkunang-kunang.
5. Ibu mengatakan sering muntah-muntah yang berlebihan.
6. Ibu mengatakan sering gelisah.

F. Riwayat persalinan yang lalu

Ibu mengatakan melahirkan anak pertamanya pada tahun 2014 di Rumah Bersalin Mattiro Baji dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 3,200 gram dan panjang badan 49 cm.

G. Riwayat keluarga berencana

Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi suntik.

H. Pemeriksaan

1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum : lemah
- b. Kesadaran : compos mentis.
- c. Status emosional : gelisah dan lemas
- d. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 90/70 mmHg

Suhu tubuh : 36,7°C

Denyut nadi : 80 x/menit

Pernapasan : 22 x/menit

- e. Tinggi badan : 164 cm

f. Berat badan :

- a) Sebelum hamil : 54 kg
- b) Setelah hamil : 57 kg
- c) Kenaikan : 3 kg
- d) Lila : 25 cm

2. Pemeriksaan fisik.

- a. Rambut : hitam, bersih, tidak mudah dicabut.
- b. Telinga : pendengaran baik, bersih, simetris kiri/kanan.
- c. Mata
 - a) Konjungtiva : pucat
 - b) Sclera : tidak ikterus
- d. Mulut dan gigi : lidah tidak ada stomatitis, gigi tidak ada yang lubang dan caries.
- e. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan pembesaran vena jugularis.
- f. Dada :
 - a) Bentuk : simetris kanan dan kiri.
 - b) Jantung : terdengar lup dup teratur
 - c) Paru-paru : tidak ada bunyi ronchi wheezing
 - d) Payudara : membesar, putting susu menonjol
 - e) Pengeluaran : tidak ada pengeluaran

g. Abdomen :

a) Inspeksi : Tampak linea nigra, striae Alba, tonus otot perut tidak terlalu tegang dan tidak terdapat bekas luka operasi.

b) Palpasi : Pemeriksaan Leopold

Leopold I : setinggi pusat, 20 cm

Leopold II : tidak teraba bagian janin

Leopold III : tidak dilakukan

Leopold IV : tidak dilakukan

TBJ : Tfu-12 x 155

: 20 – 12x 155 = 1240 gram

c) Auskultasi : tidak ada Djj yang terdengar.

h. Genitalia eksternal : pemeriksaan genitalia eksternal

dilakukan inspekulo menggunakan speculum terlihat adanya pengeluaran darah pervaginam dan terlihat gelembung-gelembung mola seperti buah anggur

i. Ekstremitas

a) Atas : simetris kanan/kiri, tidak ada oedema, tidak ada kelainan, berfungsi dengan baik, kuku jari tidak pucat

b) Bawah : simetris kanan/kiri, tidak ada kelainan, berfungsi dengan baik, kuku jari tidak pucat, tidak ada varices, reflek patella (+) kanan kiri

3. Pemeriksaan penunjang

1) Laboratorium

HB : 8 gr%

Protein urine : tidak dilakukan

2) Pemeriksaan kadar Beta HCG darah 450,000 mIU/ml

3) USG : Terlihat seperti tv rusak, adanya bayangan badai salju dan tidak terdapat janin.

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : GIPIA0, Usia kehamilan 12 minggu 2 hari,
Tinggi fundus uteri setinggi pusat, tidak teraba bagian janin.

Masalah Aktual : Anemia sedang dan Molahidatidoso.

1. GII PI A0

Dasar

DS : Ibu mengatakan kehamilan kedua dan tidak pernah mengalami keguguran sebelumnya.

DO:

- a. Tonus otot perut tidak terlalu tegang
- b. Tampak pembesaran perut tidak sesuai usia kehamilan.
- c. Pemeriksaan USG oleh dr "M"

Hasil : Terlihat seperti tv rusak, adanya bayangan badai salju dan tidak terdapat janin

Analisis dan interpretasi data:

Pada multigravida tonus otot tidak terlalu tegang karena sudah pernah mengalami peregangan sebelumnya.

Pembesaran perut tidak sesuai umur kehamilan, tinggi fundus uteri setinggi pusat dan tidak terdapat bagian janin disertai teraba ballotement lunak.

Molohidatidosa adalah suatu kehamilan yang berkembang tidak wajar dimana tidak ditemukan janin dan hampir seluruhnya villi korealis mengalami perubahan hidropobik.

2. Gestasi 12– 14 Minggu

Dasar

DS : a. Ibu mengatakan haid terakhirnya pada tanggal 16 Februari 2016

b. Ibu mengatakan umur kehamilannya sudah 3 bulan lebih

DO : a. HPHT : 16 Februari 2016 : 1 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Maret : 4 3

April : 4 2

b. tanggal kunjungan : 12 Mei 2016 : 1 5

ALAUDDIN
M A K A S S A R

+

10 Mgg 16 Hari = 86 hari atau 12 mgg 2 hari

Analisa dan interpretasi data :

Berdasarkan rumus naegele dari HPHT ibu tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal pengkajian 12 Mei 2016 maka gestasi 86 hari atau 12 minggu 2 hari.

3. Anemia sedang

Dasar

DS: a. Ibu merasakan pusing dan penglihatannya berkunang-kunang.

DO: a. KU ibu tampak lemah.

b. Konjungtiva agak pucat.

c. Pemeriksaan Laboratorium : Hb 8 gr %.

Analisa dan interpretasi :

Dalam kehamilan terjadi peningkatan volume plasma. Peningkatan volume plasma diikuti haemoglobin berkurang. Darah akan menjadi kurang kental sehingga mengurangi beban kerja jantung dan membuat perkusi jaringan plasenta lebih mudah. Perubahan ini akan mengakibatkan terjadinya anemia.

Anemia adalah keadaan ketika kadar hemoglobin, hematokrit dan jumlah eritrosit turun dibawah nilai normal. Pada penderita anemia , kondisi ini sering disebut kurang darah karena kadar sel darah merah (hemoglobin atau HB) dibawah nilai normal. Penyebabnya bisa karena kekurangan gizi untuk pembentukan darah, misalnya zat besi, asam folat, dan vitamin B12

3. Molahidatidosa

Dasar

DS : a. Ibu mengatakan adanya pengeluaran darah banyak seperti ati ayam disertai ada gelembung pada tanggal 11 Mei 2016.

DO :

- a. Tampak pembesaran perut tidak sesuai umur kehamilan.
- b. Palpasi abdomen TFU setinggi pusat, tidak teraba bagian janin, balloment teraba lunak.
- c. USG : Terlihat seperti tv rusak, adanya bayangan badai salju dan tidak terdapat janin.
- d. Pada pemeriksaan dengan speculum terdapat pengeluaran darah pervaginam dan terlihat gelembung-gelembung mola seperti buah anggur.

Analisa dan interpretasi data :

Molahidatidosa adalah kehamilan di mana setelah terjadi fertilisasi tidak berkembang menjadi embrio, tetapi terjadi proliferasi tropoblast dan ditemukan villi korialis yang mengalami perubahan degenerasi hidropik dan stoma yang hipovaskuler atau avaskuler, janin biasanya meninggal akan tetapi villus-villus yang membesar dan edematus itu hidup dan tumbuh terus, gambaran yang diberikan adalah sebagai gugus buah anggur.

Molahidatidosa ditandai dengan adanya pembesaran perut tidak sesuai dengan umur kehamilan, pada palpasi abdomen tidak teraba bagian janin, DJJ tidak terdengar.

LANGKAH III : ANTISIPASI MASALAH POTENSIAL

Antisipasi potensial terjadinya anemia berat dan choriocarcinoma

Analisa dan intrepretasi data :

Anemia sedang yang berlangsung terus menerus dapat meningkat menjadi anemia berat jika tidak segera di obati .

Analisa dan interpretasi data :

Kehamilan dengan molahidatidosa dapat berlanjut menjadi choriocarsinoma dimana sel-sel trofoblast dengan villi korealis akan menyusup ke dalam miometrium kemudian tidak jarang mengadakan perfosi pada dinding uterus menyebabkan perdarahan intra abdomen.

Hampir 20 % molahidatidosa akan berlanjut menjadi neoplasia

LANGKAH IV : TINDAKAN EMERGENCY / KOLABORASI

Tidak ada yang menunjang untuk dilakukan tindakan emergency.

LANGKAH V : RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Diagnosa : G2P1A0, Usia kehamilan 12 minggu 2 hari, Tinggi fundus uteri setinggi pusat, tidak teraba bagian janin dengan molahidatidosa.

Diagnosa / Masalah potensial : a. potensial terjadi korio karsinoma
b. Potensial terjadi anemia berat

Tujuan : a. Molahidatidosa tidak ada / teratasi
b. perbaiki keadaan umum
c. Anemia teratasi

Kriteria : Jaringan mola telah dikeluarkan
Tidak ada lagi pengeluaran darah
Ku ibu baik

Hb dalam batas normal (>11 gr%)

Rencana asuhan :

1. Observasi Keadaan umum dan tanda-tanda vital.

Rasional : Dengan observasi KU dan TTV memudahkan dalam pelaksanaan tindakan selanjutnya.

2. Melakukan pemasangan cairan infus.

Rasional : untuk memperbaiki keadaan umum ibu.

3. Beri support mental kepada ibu.

Rasional : dengan memberikan support mental maka pasien lebih optimal dalam menghadapi penyakitnya dan lebih berserah diri pada Allah swt

4. Beritahu kepada ibu dan keluarga tentang tindakan yang dilakukan kepada ibu dan Meminta persetujuan (*informed consent*) kepada keluarga untuk melakukan kuretase.

Rasional : sebagai bukti tertulis persetujuan untuk pelaksanaan tindakan pada klien

5. Melakukan kolaborasi dengan dokter Obgyen untuk pemberian terapi dan penanganan selanjutnya :

a.. Skin test untuk pemberian cefotaxim 1 gr/24 jam.

Rasional : Untuk mengecek ibu alergi terhadap obat tersebut.

b.Pemberian cefotaxim 1 gr/24 jam.

Rasional : obat untuk antibiotik

c. Pemberian Cytrostol 200mg/6jam per oral.

Rasional : untuk penggugur kandungan

d. Pemberian kombinasi 120 mg zat besi dan 500 mg asam folat peroral.

Hasil : untuk mengobati perdarahan pasca persalinan

6. Menganjurkan ibu berpuasa untuk persiapan kuretase mulai jam 12.00 wita setelah makan siang hingga pelaksanaan kuretase.

Rasional : untuk mempermudah proses kuretase.

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 12 Mei 2016, pukul 08.20 wita

1. Mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital

Hasil : keadaan umum ibu lemah.

-TTV : Tekanan darah : 110/70 mmHg

Suhu : 36,5 °C

Nadi : 80 x/menit

Pernapasan : 22 x/menit

2. Melakukan pemasangan cairan infus.

Hasil : Terpasang infus RL 28 tetes/menit

3. Memberikan dukungan support mental kepada ibu atas rasa gelisah, sedih dan kehilangan yang dialami sekarang, dengan menenangkan hati ibu dan berkata-kata penyemangat.

Hasil : Dengan memberikan support mental maka pasien lebih optimal dalam menghadapi penyakitnya dan lebih berserah diri pada Allah swt

4. Memberikan informasi kepada ibu dan keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan kepada ibu yaitu tindakan kuretase oleh dokter Obgyen untuk

membersihkan rahim ibu. Kuretase dilakukan pada tanggal 12 Mei 2016 jam 16.00 wita .

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan paham tentang tindakan kuretasi yang akan dilakukan kepada ibu.

5. Melakukan kolaborasi dengan dokter Obgyen untuk pemberian terapi dan penanganan selanjutnya.

Hasil :

- a. Skin test untuk pemberian cefotaxim 1 gr/24 jam telah diberikan, hasil ibu tidak ada alergi.
- b. Pemberian cefotaxim 1 gr/24 jam sudah diberikan.
- c. Pemberian Cytrostol 200mg/6jam per oral sudah diberikan, hasil bersedia meminumnya.
- d. Pemberian kombinasi 120 mg zat besi dan 500 mg asam folat peroral.

6. Menganjurkan ibu berpuasa untuk persiapan kuretase mulai jam

12.00 wita setelah makan siang hingga pelaksanaan kuretase.

Hasil : Ibu bersedia untuk berpuasa.

LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 12 Mei 2016, Pukul : 12.30 wita

1. Keadaan ibu sudah baik.
2. Ibu masih merasakan ada pengeluaran darah.
3. Ibu sedang berpuasa.

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE**PADA Ny "N" DENGAN MOLAHIDATIDOSA****DI RSUD SYEKH YUSUF**

No Register : 113/16
Tanggal kunjungan : 12 Mei 2016 Pukul 08.00 Wita
Tanggal pengkajian : 12 Mei 2016 Pukul 08.00 Wita
Nama pengkaji : St.Syahrhani Rauf

DATA SUBJEKTIF (S)**A. Identitas istri/suami**

Nama : Ny "N" / Tn "A"
Umur : 25 Tahun / 26 Tahun
Nikah : 1 x / ± 4 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl.Syamsuddin Tunru No.58

B. Keluhan utama

1. Ibu merasakan ada pengeluaran darah banyak seperti ati ayam disertai dengan ada gelembung sejak tanggal 11 Mei 2016.
2. Ibu merasakan pusing penglihatannya kunang-kunang.

3. Ibu merasakan sering muntah-muntah yang berlebihan.
4. Ibu merasakan sering gelisah.
5. Ibu mengatakan hamil anak kedua dengan tidak pernah mengalami keguguran.
6. Ibu mengatakan usia kehamilannya sudah 3 bulan lebih.
7. Ibu mengatakan melahirkan anak pertamanya pada tahun 2014 di Rumah Bersalin Mattiro Baji dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 3,200 gram dan panjang badan 49 cm.
8. Ibu tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, penyakit menular, tidak pernah menjalani operasi, tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dan jamu.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu lemah
2. kesadaran compomentis
3. HPHT : 16 Februari 2016
4. HTP : 23 November 2016
5. Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah : 90/70 mmHg
 - Nadi : 80 x/i
 - Pernapasan : 22 x/i
 - Suhu : 36,7 °C
6. Tinggi badan : 164 cm

7. Berat badan :

- a) Sebelum hamil : 54 kg
- b) Setelah hamil : 57 kg
- c) Kenaikan : 3 kg

8. Lila : 25 cm

9. Pemeriksaan fisik

- a. Rambut : hitam, bersih, tidak mudah dicabut
- b. Telinga : pendengaran baik, bersih, simetris kanan/kiri
- c. Mata :
 - a) Konjungtiva : pucat b) Sclera : tidak ikterus
- d. Mulut dan gigi : lidah tidak ada stomatitis, gigi tidak ada yang lubang dan caries.
- e. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan pembesaran vena jugularis.
- f. Dada :
 - a) Bentuk : simetris kanan dan kiri.
 - b) Jantung : terdengar lup dup teratur
 - c) Paru-paru : tidak ada bunyi ronchi wheezing
 - d) Payudara : membesar, puting susu menonjol
 - f) Pengeluaran : tidak ada pengeluaran

g. Abdomen :

a) Inspeksi : Tampak linea nigra, striae Alba, tonus otot perut tidak terlalu tegang dan tidak terdapat bekas luka operasi.

b) Palpasi : Pemeriksaan Leopold

Leopold I : setinggi pusat, 20 cm

Leopold II : tidak teraba bagian janin

Leopold III : tidak dilakukan

Leopold IV : tidak dilakukan

TBJ : Tfu-12 x 155

: $20 - 12 \times 155 = 1240$ gram

c) Auskultasi : tidak ada Djj yang terdengar.

h. Genitalia eksternal : dilakukan pemeriksaan genitalia eksterna menggunakan speculum terlihat adanya pengeluaran darah pervaginam dan terlihat gelembung-gelembung mola seperti buah anggur

i. Ekstremitas

a) Atas : simetris kanan/kiri, tidak ada oedema, tidak ada kelainan, berfungsi dengan baik, kuku jari tidak pucat

b) Bawah : simetris kanan/kiri, tidak ada kelainan, berfungsi dengan baik, kuku jari tidak pucat, tidak ada varices, reflek patella (+) kanan kiri

10. Pemeriksaan penunjang

a) Laboratorium

HB : 8 gr%

Protein urine : tidak dilakukan

b) Pemeriksaan kadar Beta HCG darah 450.000 mIU/ml

c) Foto toraks ada gambaran emboli udara

d) USG : Terlihat seperti tv rusak, adanya bayangan badai salju dan tidak terdapat janin.

ASSESSMENT (A)

Masalah Aktual : Ny "N" Umur 25 tahun, G2P1A0, Usia kehamilan 12 minggu 2 hari, Tinggi fundus uteri setinggi pusat, tidak teraba bagian janin dengan molahidatidosa.

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya potensial terjadinya anemia dan chorikarsinoma.

PLANNING (P)

Tanggal 12 Mei 2016, pukul 08.20 wita

1. Mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital

Hasil : keadaan umum ibu lemah.

-TTV : Tekanan darah : 110/70 mmHg

Suhu : 36,5 °C

Nadi : 80 x/menit Pernapasan : 22 x/menit

2. Melakukan pemasangan cairan infus.

Hasil : Terpasang infus RL 28 tetes/menit

3. Memberikan dukungan support mental kepada ibu atas rasa gelisah, sedih dan kehilangan yang dialami sekarang, dengan menenangkan hati ibu dan berkata-kata penyemangat.

Hasil : Dengan memberikan support mental maka pasien lebih optimal dalam menghadapi penyakitnya dan lebih berserah diri pada Allah Swt

4. Memberikan informasi kepada ibu dan keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan kepada ibu yaitu tindakan kuretase oleh dokter Obgyen untuk membersihkan rahim ibu. Kuretasi akan dilakukan pada tanggal 12 Mei 2016 jam 16.00 wita

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan paham tentang tindakan kuretasi yang akan dilakukan kepada ibu.

5. Melakukan kolaborasi dengan dokter Obgyen untuk pemberian terapi dan penanganan selanjutnya.

Hasil :

- a. Skin test untuk pemberian cefotaxim 1 gr/24 jam telah diberikan, hasil ibu tidak ada alergi.
- b. Pemberian cefotaxim 1 gr/24 jam sudah diberikan.
- c. Pemberian Cytrostol 200mg/6jam per oral sudah diberikan, hasil bersedia meminumnya.
- d. Pemberian kombinasi 120 mg zat besi dan 500 mg asam folat peroral.

6. Menganjurkan ibu berpuasa untuk persiapan kuretase mulai jam

12.00 wita setelah makan siang hingga pelaksanaan kuretase.

Hasil : Ibu bersedia untuk berpuasa.



PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA Ny "N" DENGAN MOLAHIDATIDOSA
DI RSUD SYEKH YUSUF

No register : 113/16
Tanggal kunjungan : 12 Mei 2016 Pukul 08.00 Wita
Tanggal pengkajian : 12 Mei 2006 Pukul 08.00 Wita

A. Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih pusing.
2. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran darah dari jalan lahir.
3. Ibu mengatakan telah meminum obat penambah darah (SF).
4. Ibu mengatakan mengerti tentang penjelasan yang diberikan mengenai kondisinya.

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu tampak lemah.
2. Ekspresi wajah tampak cemas.
3. Tampak pengeluaran darah berwarna merah kecoklatan dan bergelembung.
4. Tanda-tanda Vital

TD : 110/80 mmHg (Normalnya : 90-130/70-90 mmHg)

N : 80 kali permenit (Normalnya : 60-90x/menit)

S : 36,7° (Normalnya 36,5°-37,5° C)

P : 20 kali/menit (Normalnya : 16-20x/menit)

5. Pemeriksaan laboratorium Hb : 8 gr%

C. Assesment (A)

Masalah Aktual : Ny “N” Umur 25 tahun, GIIPIA0, Usia kehamilan 12 minggu 2 hari, Tinggi fundus uteri setinggi pusat, tidak teraba bagian janin dengan molahidatidosa.

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya potensial terjadinya choriocarcinoma

D. Planning (P)

Tanggal 12 Mei 2016 , jam 12.30 Wita

1. Member penjelasan pada ibu tentang kondisinya .

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan.

2. Memberikan support mental dan spiritual pada ibu agar lebih optimal dalam menghadapi penyakitnya dan lebih berserah diri kepada tuhan.

Hasil : ibu senang dengan support yang telah diberikan.

3. Melakukan informed consent pada ibu dan ditandatangani oleh suaminya.

Hasil : Ibu mengerti

4. Pelaksanaan tindakan kuret oleh dr. “N” jam 16.00 Wita.

Hasil : Ibu bersedia untuk dilaksanakan kuret.

Pengeluaran jaringan ± 500 cc.

5. Mengobservasi tanda-tanda vital, jam 17.00 Wita.

Hasil : TD : 110/80 mmHg (Normalnya:90-130/70-90 mmHg)
N : 80 kali permenit (Normalnya : 60-90x/menit)
S : 36,7° (Normalnya 36,5°-37,5° C)
P : 20 kali/menit (Normalnya : 16-20x/menit)

6. Mengobservasi pemberian cairan infuse RL (28 tetes/menit).

Hasil : semua tindakan telah dilakukan.

7. Member He (*Health Educatin*) tentang pentingnya personal hygiene.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya.

8. Mengobservasi pengeluaran darah dari vagina.

Hasil : Darah yang keluar dari vagina sedikit warnanya coklat tua.

9. Penatalaksanaan pemberian obat :

a) Injeksi katorolac 1 ampul/8 jam/IV

b) Injeksi ranitidine 1 gr/12 jam/IV

c) Asam Mefenamat 3 × 1

d) Cefadroxil 3 × 1

e) Metilergometrin 3 × 1

f) Sf 1 × 1

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA Ny “N” DENGAN MOLAHIDATIDOSA
DI RSUD SYEKH YUSUF

No register : 113/16
Tanggal pengkajian : 12 Mei 2016 Pukul 16.00 Wita

Data subjektif (S)

1. Ibu mengatakan pengeluaran darah dari jalan lahir mulai berkurang.
2. Ibu mengatakan sudah merasa lebih baik.
3. Ibu mengatakan belum BAB dan BAK sudah lancar.
4. Ibu mengatakan telah dikuret tanggal 12 Mei 2016, jam 16.00 Wita.

A. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran komposmentis.
3. Ekspresi wajah tampak senang.
4. Tanda-tanda vital :
 - TD : 110/70 mmHg (Normalnya : 90-130/70-90 mmHg)
 - N : 78 kali permenit (Normalnya : 60-90x/menit)
 - S : 36,9° (Normalnya 36,5°-37,5° C)
 - P : 18 kali/menit (Normalnya : 16-20x/menit)

5. Tidak ada oedema pada wajah.
6. Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterus.
7. Pemberian obat-obatan dilanjutkan dengan instruksi dari dokter :
 - a) Injeksi katorolac 1 ampul/8 jam/IV
 - b) Injeksi ranitidine 1 gr/12 jam/IV
 - c) Asam Mefenamat 3×1
 - d) Cefadroxil 3×1
 - e) Metilergometrin 3×1
 - f) Sf 1×1

1. Palpasi abdomen TFU 1 jari diatas simfisis.

B. Assesment (A)

Ibu post kuret hari pertama dengan nyeri perut bagian bawah.

C. Planning (P)

Tanggal 12 Mei 2016, jam 17.00 Wita.

1. Memberi penjelasan kepada ibu tentang kondisinya.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

2. Memberi motivasi pada ibu untuk memenuhi sendiri kebutuhannya.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaksanakannya.

3. Memberi penjelasan tentang pentingnya pergerakan (mobilisasi dini) dan relaksasi dalam proses penyembuhan.

Hasil ; Ibu mengerti.

4. Memberi HE (*Health Education*) tentang pentingnya personal hygiene

Hasil : Ibu mengerti.

5. Mengobservasi tanda-tanda infeksi.

Hasil : Tidak ada tanda-tanda infeksi seperti panas, bengkak, merah, dan nyeri.

6. Memberi dukungan moril pada ibu bahwa perlahan ibu mulai pulih.

Hasil : Ibu senang dengan dukungan yang diberikan.

7. Follow up pemberian cairan infuse, jam 17.40 Wita mengganti cairan infuse yakni RL 28 tetes/menit.

Hasil : memberitahu pada ibu bahwa cairan infuse telah diganti.

8. Menganjurkan kepada ibu mengganti pembalut bila sudah merasa lembab dan basah serta menjaga kebersihan daerah vulva.

Hasil : ibu bersedia mengganti pembalut dan menjaga kebersihan vulva.

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesenjangan antara hasil studi pada pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan pada klien Ny “N” dengan kasus Molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 12 Mei 2016. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi agar tindakan direncanakan berdasarkan rasional yang relevan yang dapat di analisa secara teoritis untuk memudahkan memahami kesenjangan dan kesesuaian yang terjadi pada kasus ini.

A. Langkah I

Langkah I dilakukan dengan cara pengumpulan data dasar, yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai keadaan pasien secara lengkap untuk membuat kesimpulan tentang normalnya kehamilan tersebut.

Berdasarkan teori menyebutkan bahwa tanda dan gejala molahidatidosa yaitu: terjadi perdarahan pervaginam pada usia kehamilan ke 16-28 minggu, perdarahan uterus merupakan tanda yang paling utama dan dapat beragam mulai dari bercak darah sampai perdarahan yang profus. Perdarahan dapat terjadi saat sebelum abortus, atau yang lebih sering, terjadi secara intermitten berminggu-minggu atau berbulan-bulan (Gary, 2006).

Sedangkan pada kasus Ny “N” didapatkan ibu masuk tanggal 12 Mei 2016 jam 08.00 wita di ruang ANC dengan keluhan ibu merasakan ada pengeluaran

darah banyak seperti hati ayam disertai dengan ada gelembung sejak tanggal 11 Mei 2016.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Sarah dkk, 2015) yang menyebutkan bahwa perdarahan ini biasanya terjadi pada bulan pertama sampai ketujuh dengan rata-rata 12-14 minggu. Perdarahan biasanya bersifat perdarahan biasa intermiten, bercak-bercak sedikit, atau sekaligus banyak sehingga pasien menderita anemia bahkan sampai menyebabkan syok dan kematian.

Perdarahan yang terjadi pada ibu hamil dapat disebabkan karena hamil anggur. Hamil anggur memang langka terjadi akan tetapi hamil yang disebabkan karena sel telur yang dibuahi tidak mengandung DNA dan tidak menjadi janin ini dapat terjadi pada kehamilan. Bahkan hamil anggur ini sama seperti adanya kehamilan, biasanya ditandai dengan adanya perdarahan yang terjadi pada ibu hamil.

Serta adapula Perdarahan uterus abnormal yang bervariasi dari spotting sampai perdarahan hebat merupakan gejala yang paling khas dari kehamilan molahidatidosa dan pertama kali terlihat antara minggu keenam dan kedelapan setelah amenore. Sekret berdarah yang kontinyu atau intermitten dapat berkaitan dengan keluarnya vasikel-vasikel yang menyerupai buah anggur (Intan, 2016). Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan.

Data Subjektif yang didapatkan Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang kedua dan tidak pernah mengalami keguguran, haid terakhir pada tanggal 16

Februari 2016, ibu mengatakan usia kehamilannya <3 bulan, ibu merasa penglihatan berkunang-kunang, mengeluh sering muntah-muntah berlebihan, dan sering gelisah.

Hal ini sesuai dengan dengan teori yang menyebutkan bahwa jumlah sel darah merah yang rendah menyebabkan berkurang pengiriman oksigen ke setiap jaringan dalam tubuh, anemia dapat mengakibatkan berbagai tanda dan gejala sesuai dengan keluhan ibu mengatakan penglihatannya berkunang-kunang, sering muntah-muntah, nafsu makan menurun dan sering merasakan pusing. Keluhan anemia yang paling dijumpai dimasyarakat adalah lebih dikenal dengan 5L, yaitu : lesu, lemah, letih, lelah dan lalai. Disamping itu penderita kekurangan zat besi akan menurunkan daya tahan tubuh yang mengakibatkan mudah terkena infeksi (Kasdu, Dini dkk, 2004).

Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan adapun gejala klinik dari molahidatidosa yaitu: Amenorea, yang ditandai masalah dihipofisis menyebabkan gangguan pada hormon hipotalamus yang nantinya mempengaruhi kelenjar pituitari, yang selanjutnya mengirimkan sinyal keindung telur untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron sehingga seorang wanita tidak mendapatkan menstruasi (Budiana, 2005).

Selain itu mengeluh sering muntah-muntah dengan kata lain Hiperemesis gravidarum, ditandai dengan adanya nausea dan vomiting yang berat. Pasien biasanya mengeluh mual muntah hebat. Hal ini diakibatkan proliferasi trofoblas yang berlebihan dan akibatnya memproduksi terus menerus beta-hCG yang

menyebabkan peningkatan beta-hCG hiperemesis gravidarum tampak pada 15-25 % pasien molahidatidosa. Walaupun hal itu sulit untuk dibedakan dengan kehamilan biasa. 10% pasien mola dengan mual dan muntah cukup berat membutuhkan pelayanan di rumah sakit (Widayana, 2005)

Perdarahan pervaginam ini biasa intermitten, sedikit-sedikit atau sekaligus banyak sehingga menyebabkan syok atau kematian karena perdarahan ini, maka umumnya molahidatidosa masuk Rumah Sakit dalam keadaan anemia. Perdarahan uterus abnormal yang bervariasi dari spotting sampai perdarahan hebat merupakan gejala yang paling khas dari kehamilan molahidatidosa dan pertama kali terlihat antara minggu keenam dan kedelapan setelah amenore. Sekret berdarah yang intermitten dapat berkaitan dengan keluarnya vasikel-vasikel yang menyerupai buah anggur (Intan, 2016)

Tanda gejala yang lain pada kehamilan molahidatidosa yaitu Pembesaran uterus berkembang cepat lebih daripada usia kehamilan normal. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan trofoblastik yang berlebihan, volume vesikuler villi yang besar rasa tidak enak pada uterus akibat rengangan miometrium yang berlebihan (Fitri, 2015)

Merujuk pada hasil penelitian (Syafii dkk, 2006) yang mengatakan jumlah paritas ditemukan paling banyak penderita molahidatidosa pada multipara sebanyak 15 kasus, sedangkan pada primipara sebanyak 3 kasus. Hal tersebut menyebutkan bahwa wanita dengan multipara memiliki resiko menderita molahidatidosa lebih tinggi dibandingkan pada primipara

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian lain memperlihatkan bahwa kasus molahidatidosa terbanyak pada kelompok umur 20-29 tahun dengan jumlah penderita 17 orang (43,6%). Usia ibu diidentifikasi sebagai resiko tinggi pada molahidatidosa. Pada penelitian tersebut didapatkan median usia 33 kasus molahidatidosa 22 tahun dengan usai termuda 18 tahun dan usia tertua 40 tahun. Melaporkan kelompok umur yang terbanyak menderita molahidatidosa ialah 25-29 tahun yaitu sebanyak 17 kasus (20,73%) (Sarah dkk, 2015).

Molahidatidosa juga sering didapatkan pada wanita usia reproduktif. Faktor resiko molahidatidosa akan lebih tinggi pada usia kurang dari 20 tahun dan di atas 35 tahun, gizi buruk, riwayat obstetrik, etnik dan genetik (Jaffar dkk, 2011) sedangkan pada Usia gestasi makin tinggi maka kehamilannya semakin berisiko. Usia kehamilan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : Usia 1-2 bulan, 2-5 bulan, dan >5 bulan (Jaffar dkk, 2011). Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kesenjangan antara praktek dan teori yang dilakukan.

Pada pemeriksaan fisik Ny "N" didapatkan keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, ibu merasa gelisah, tanda-tanda vital dibawah batas normal dengan Tekanan Darah : 90/70 mmHg, Suhu : 36,7°C, Denyut Nadi : 80 x/menit, Pernapasan : 22 x/menit, pada pemeriksaan mata tampak konjungtiva pucat, pada pemeriksaan abdomen dilakukan pemeriksaan leopard didapatkan Leopold I setinggi pusat, tidak teraba bagian janin, dan tidak terdengarnya denyut jantung janin, pada pemeriksaan genetalia eksternal dilakukan inspekulo

menggunakan speculum terlihat adanya pengeluaran darah pervaginam dan terlihat gelembung-gelembung mola seperti buah anggur.

Teori mengatakan bahwa pada gejala hamil muda yaitu emesis gravidarum/hiperemesis gravidarum serta dapat pula terjadi komplikasi tirotoksikosis (2-5%), hipertensi/preeklamsia dan anemia akibat perdarahan.

Berdasarkan dari penelitian (Rita, 2015) mengatakan gejala klinik molahidatidosa terjadi pada waktu kehamilan 18 minggu pertama oleh karena pada minggu-minggu tersebut umumnya terjadi perdarahan pervaginam yang tidak disertai rasa nyeri, dan diagnosa pasti mulai dapat ditegakkan bila gelembung-gelembung mola telah lahir.

Hal ini juga sesuai dengan teori bahwa tampak pemeriksaan palpasi pembesaran uterus lebih besar dari usia kehamilan, Tidak ada teraba janin, serta Sudah dipastikan molahidatidosa tampak seperti tv rusak, Tidak terdapat janin dan akan ada kelihatan bayangan badai salju. (Esti, 2010).

Sedangkan sesuai dengan teori mengatakan diagnosis yang paling tepat bila kita telah melihat keluarnya gelembung mola. Namun, bila kita menunggu sampai gelembung umumnya disertai perdarahan yang banyak dan keadaan umum pasien menurun terbaik ialah bila dapat mendiagnosis mola sebelum keluar.

Pada pemeriksaan penunjang didapatkan kadar Hemoglobin 8 gr%, kadar beta hCG darah 450.000 mUI/ml dan disertai foto toraks terdapat ada gambaran emboli udara, dan USG terlihat seperti tv rusak, adanya bayangan badai salju dan tidak terdapat janin.

Merujuk dari penelitian (Syafii dkk,2006) yang mengatakan bahwa kadar molahidatidosa terdapat 11 kasus penderita dengan kadar Hb <11 gr/dl hal tersebut merupakan kasus terbanyak sedangkan penderita dengan kadar Hb >11 gr/dl sebanyak 7 kasus, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita molahidatidosa pada trimester I 10 (23,3%) dengan kadar beta hCG rendah 3 (7,0%), normal 4(9,3%), dan tinggi 3 (7,0%). Di trismester II 33 (76,7%) dengan beta hCG rendah 8(18,6%), normal 13 (39,5%), tinggi 12 (27,95) (Syafii dkk, 2006).

Sedangkan hasil penelitian lainnya memperlihatkan bahwa kasus molahidatidosa terbanyak mempunyai kadar Hb <10 gr% dengan jumlah penderita 21 orang (53,8%), dan diikuti oleh kadar Hb >10 gr% dengan jumlah penderita 18 orang (46,2%) (Sarah dkk, 2015).

Serta ada pula pada penderita dengan molahidatidosa berdasarkan penelitian martaadisubrata didapatkan 79 kasus (83%) dengan nilai HB 7 g/dL(Sarah dkk, 2015).

Sesuai dengan teori (Esti, 2010) mengatakan bahwa pemeriksaan USG sudah jelas dipastikan molahidatidosa jika tampak seperti tv rusak, tidak terdapat janin, akan ada kelihatan bayangan badai salju.

Sedangkan hasil dari penelitian lain mengatakan gambaran molahidatidosa pada kehamilan trimester II umumnya spesifik. Kavum uteri tampak berisi massa ekogenik dengan bagian-bagian kistik vesikuler berdiameter 5-10 mm. Gambaran

tersebut dapat dibayangkan seperti gambaran sarangtawon dan badai salju (Muzayyanah, 2002).

Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapatnya kesenjangan antara praktek dan teori.

B. Langkah II

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik.

Dalam pengkajian data dapat ditemukan diagnosa dan masalah kebidanan berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang didukung oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah dilakukan.

Berdasarkan data subjektif dan data objektif pada kasus Ny "N" dirumuskan diagnosa atau masalah aktual dengan kehamilan molahidatidosa.

Sesuai dengan teori mengatakan bahwa diagnosis molahidatidosa dapat ditetapkan pada awal kehamilan dengan keluhan perdarahan pervaginam, yang disertai dengan gelembung air yang tampak seperti anggur, ukuran uterus tidak sesuai dengan usia kehamilan (Syafii dkk, 2006).

Pada kasus Ny "N" didapatkan diagnosa GIIPIA0, usia kehamilan 12 minggu 2 hari dengan molahidatidosa ditegaskan sesuai dengan data subjektif dan data

objektif yang ditemukan dan ditunjang dengan hasil pemeriksaan USG yaitu terlihat seperti tv rusak, adanya bayangan badai salju dan tidak terdapat janin.

Menurut teori, diagnosa kebidanan yang dapat ditegakkan pada ibu hamil dengan molahidatidosa yaitu Ny "N", GIPIA0, usia kehamilan 12 minggu 2 hari, tinggi fundus uteri setinggi pusat dan tidak teraba bagian janin, dengan dasar data subjektif, objektif, dan penunjang (Saifuddin, 2006).

Menurut (Nugraheny, 2010) mengatakan bahwa Molahidatidosa adalah jonjot-jonjot karoin (chorionic villi) yang tumbuh berganda berupa gelembung-gelembung kecil yang mengandung banyak cairan sehingga menyerupai buah anggur, atau mata ikan. Karena itu disebut juga hamil atau mata ikan. Kelainan ini merupakan neoplasma yang jinak (benigna)

Berdasarkan hasil penelitian lain jumlah paritas ditemukan paling banyak penderita molahidatidosa pada multipara sebanyak 15 kasus, sedangkan pada primipara sebanyak 3 kasus. Hal tersebut menyebutkan bahwa wanita dengan multipara memiliki resiko menderita molahidatidosa lebih tinggi dibandingkan pada primipara. (Syafii dkk, 2006).

Molahidatidosa semata-mata akibat akumulasi cairan yang menyertai degenerasi awal atau tidak adanya embrio komplit pada minggu ketiga dan kelima. adanya sirkulasi maternal yang terus menerus dan tidak adanya fetus menyebabkan trofoblast berproliferasi dan melakukan fungsinya selama pembentukan cairan (Nugroho, 2010).

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek yang dilakukan.

C. Langkah III

Dalam merumuskan Diagnosa/masalah potensial pada ibu hamil dengan molahidatidosa adalah terjadinya perdarahaan hebat yang dapat menyebabkan syok, kalau tidak segera ditolong dapat berakibat fatal, perdarahan yang berulang-ulang yang dapat menyebabkan anemis, infeksi sekunder, perforasi uterus, kritis tiroid serta potensial terjadi tumor ganas dari trofoblast yang disebut juga koriokarsinoma (Nugroho, 2010).

Perdarahan tersebut masih membutuhkan terapi segera untuk memulihkan dan mempertahankan perkusi di organ-organ vital walaupun jumlah darah yang diganti umumnya tidak mengatasi difisit hemoglobin akibat perdarahan secara tuntas (Arisman, 2007).

Anemia adalah pengurangan jumlah sel darah merah, kuantitas hemoglobin, dan volume pada sel darah merah (hematokrit) per 100 ml darah (Darmawansyih, 2011:21).

Anemia adalah keadaan ketika kadar hemoglobin, hematokrit dan jumlah eritrosit turun dibawah nilai normal. Pada penderita anemia, kondisi ini sering disebut kurang darah karena kadar sel darah merah (hemoglobin atau HB) dibawah nilai normal. Penyebabnya bisa karena kekurangan gizi untuk pembentukan darah, misalnya zat besi, asam folat, dan vitamin B12 (Mangkuji, dkk., 2012:45).

Pada kasus Ny “N” didapatkan ibu mengalami anemia sedang sesuai dengan teori dikatakan anemia, jika Hemoglobin ibu berada kurang dari batas normal berdasarkan menurut WHO yaitu : Ringan : Hb 9 g/dl – 10 g/dl, Sedang : HB 8 g/dl – 9 g/dl, Berat : HB < 7 g/dl. Sedangkan departemen kesehatan menetapkan derajat anemia sebagai berikut: *Ringan : Hb 8 g/dl - < 11 g/dl, Sedang: HB 5 g/dl - < 8 g/dl, Berat : HB < 5 g/dl .*

Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

Menurut (Budiana, 2009) Koriokarsinoma merupakan keganasan yang berasal dari tropoblas plasenta, bersifat sangat agresif dengan kemampuan yang menyebar secara hematogen. Kariokarsinoma dapat berasal dari tropoblas previllus saat implantasi atau dari permukaan villus plasenta, molahidatidosa merupakan asal tersering dari koriokarsinoma.

Sedangkan pada kasus Ny “N” tidak ditemukan tumor ganas atau koriokarsinoma karena penanganan kehamilan molahidatidosa segera dilakukan.

Perdarahan uterus abnormal merupakan gejala tersering dari koriokarsinoma. Keluhan ini biasanya terjadi setelah kehamilan mola, bisa terjadi setelah abortus, setelah kehamilan normal, atau setelah kehamilan ektopik, terkadang juga lesi pada uterus terbatas pada miometrium dan bersifat asimptomatik (Budiana, 2009)

Berdasarkan penelitian lain telah didapatkan bahwa insidensi molahidatidosa kehamilan masih cukup tinggi yaitu 2,2%-5,7%, kematian disebabkan karena perdarahan, infeksi, eklamsi, payah jantung dan tiroktosis. Molahidatidosa

juga memiliki potensi untuk menjadi ganas (Mola invasif dan koriokarsinoma) (Fitri, 2015).

Merujuk dengan hasil penelitian lain komplikasi yang ditimbulkan, serta penyulit seperti preeklampsia, tirotoksikosis, dan emboli paru, mengakibatkan diagnosa molahidatidosa harus ditegakkan sedini mungkin dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor predisposisi. Masalah dari molahidatidosa yaitu 20 % dapat mengalami berkembang menjadi tumor trofoblas getasional (Sarah dkk, 2015)

Serta sesuai pula hasil penelitian lain faktor-faktor resiko untuk koriokarsinoma adalah riwayat mengalami molahidatidosa komplit, etnis, dan kehamilan pada usia tua. Risiko mengalami molahidatidosa komplit meningkat 2 kali pada wanita berusia lebih dari 35 tahun 7,5 kali pada wanita lebih dari 40 tahun. Sebesar 8-20% molahidatidosa berkembang menjadi ganas dengan menginvasi organ sekitar dan bermetastasis ke lokasi yang jauh seperti paru-paru dan otak (Teresa, 2011)

Ternyata pada kasus tidak ditemukan, Karena jaringan molahidatidosa segera dikeluarkan dengan kuretase dan hasil pemeriksaan patologi anatomi tidak didapatkan tanda keganasan.

D. Langkah IV

Tindakan ini dilakukan jika ditemukan adanya potensial dengan tujuan agar dapat mengantisipasi masalah yang mungkin muncul sehubungan keadaan yang dialaminya (Nugraheny, 2010).

Kenapa penting dilakukan kolaborasi untuk mengantisipasi bila terjadi keadaan gawat darurat dan harus segera ditangani pada saat itu juga.

Berdasarkan penerapan asuhan terhadap kasus Ny “N” tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera atau kolaborasi.

Sedangkan sesuai dengan teori menyebutkan bahwa komplikasi yang bakal terjadi yaitu Perdarahan yang hebat sampai syok hemoragik adalah suatu syok yang disebabkan oleh perdarahan yang banyak yang dapat disebabkan oleh perdarahan pada kehamilan muda, misalnya abortus, kehamilan ektopik, dan penyakit trofoblas (molahidatidosa) : perdarahan antepartum seperti previa, solusio plasenta, dan ruptur uteri, juga disebabkan oleh perdarahan pascapersalinan seperti atonia dan laserasi serviks/vagina. Gejala klinik syok hemoragik bergantung pada jumlah perdarahan yang terjadi mulai dari yang ringan sampai berat dan pada syok yang ringan gejala-gejala dan tanda tidak jelas, tetapi adanya syok yang ringan dapat diketahui dengan “tilt test” yaitu bila pasien didudukkan terjadi hipotensi dan takikardia, sedangkan dalam keadaan berbaring tekanan darah dan frekuensi nadi masih normal (Saifuddin dkk, 2010).

Perdarahan pervaginam ini biasa intermitten, sedikit-sedikit atau sekaligus banyak sehingga menyebabkan anemis, syok atau kematian karena perdarahan ini,

maka umumnya molahidatidosa masuk Rumah Sakit dalam keadaan anemia. Perdarahan uterus abnormal yang bervariasi dari spotting sampai perdarahan hebat merupakan gejala yang paling khas dari kehamilan molahidatidosa dan pertama kali terlihat antara minggu keenam dan kedelapan setelah amenore. Sekret berdarah yang intermitten dapat berkaitan dengan keluarnya vasikel-vasikel yang menyerupai buah anggur (Intan, 2016)

Perforasi uterus akan terjadi pada saat dilakukan kuretase dengan uterus dalam posisi hiperretrofleksi. Jika terjadi peristiwa seperti ini perlu segera lakukan laparotomi dan tergantung dari luas dan bentuk perforasi. Dengan adanya dugaan atau kepastian terjadinya perforasi, laparotomi harus segera dilakukan untuk selanjutnya mengambil tindakan-tindakan seperlunya guna mengatasi komplikasi.

Keganasan (PTG), akan menjadi mola destruens atau koriokarsinoma Menurut (Budiana, 2009) Koriokarsinoma merupakan keganasan yang berasal dari tropoblas plasenta, bersifat sangat agresif dengan kemampuan yang menyebar secara hematogen. Kariokarsinoma dapat berasal dari tropoblas previllus saat implantasi atau dari permukaan villus plasenta, molahidatidosa merupakan asal tersering dari koriokarsinoma, infeksi sekunder dan kritis tiroid yang bakal menjadi komplikasi dari molahidatidosa.

Sehubungan keadaan yang dialami ibu tidak ada yang mengancam jiwa maka tidak dilakukan tindakan segera atau kolaborasi sesuai dengan pemeriksaan fisik Ny "N" didapatkan keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, ibu merasa gelisah, tanda-tanda vital dibawah batas normal dengan Tekanan Darah

:90/70 mmHg, Suhu : 36,7°C, Denyut Nadi : 80 x/menit, Pernapasan : 22 x/menit, pada pemeriksaan mata tampak konjungtiva pucat, pada pemeriksaan abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold I setinggi pusat, tidak teraba bagian janin, dan tidak terdengarnya denyut jantung janin, pada pemeriksaan genitalia eksternal dilakukan inspeksi menggunakan speculum terlihat adanya pengeluaran darah pervaginam dan terlihat gelembung-gelembung mola seperti buah anggur. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan kadar Hemoglobin 8 gr%, kadar beta hCG darah 450.000 mUI/ml dan disertai foto toraks terdapat gambaran emboli udara, dan USG terlihat seperti tv rusak, adanya bayangan badai salju dan tidak terdapat janin.

Anemia teratasi karena dilakukannya penanganan dengan cara pemasangan infus RL dan pemberian terapi obat anti anemia.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

E. Langkah V

Berdasarkan teori yang ada bahwa setelah menentukan diagnosa/masalah klien dilanjutkan dengan perencanaan asuhan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah/memenuhi kebutuhan klien.

Teori penanganan mola hidatidosa yaitu : Observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, perbaikan keadaan umum yang termasuk usaha ini misalnya pemberian transfusi darah untuk memperbaiki syok atau mengurangi penyulit seperti preeklampsia dan tirotoksikosa. Preeklampsia diobati seperti pada

kehamilan biasa sedang tirotoksikosa di obati sesuai dengan protokol bagian penyakit dalam, antara lain dengan inderal(Wiknjosastro dkk, 2007)

Sedangkan Pada saat pemeriksaan fisik Ny “N” didapatkan keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, ibu merasa gelisah, tanda-tanda vital dibawah batas normal dengan Tekanan Darah : 90/70 mmHg, Suhu : 36,7°C, Denyut Nadi : 80 x/menit, Pernapasan : 22 x/menit. Sedangkan menurut teori mengatakan bahwa Tanda-tanda vital normal : Tekanan darah normal yaitu 120/80 MmHg. Ukuran tekanan darah dibagi menjadi dua yaitu sistolik dan Diastolik. Sistolik mengacu pada tekanan dalam arteri saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh batas normal 110-130 mmHg. sedangkan diastolik, mengacu pada tekanan di dalam arteri saat jantung beristirahat dan mengisi dengan darah. Pada bayi tekanan darah lebih rendah daripada orang dewasa batas normal 70-90 mmHg. Nadi normal untuk orang dewasa sehat berkisar 60-100 denyut per menit. Denyut nadi dapat meningkat dengan olahraga, penyakit, cedera, dan emosi. Pemeriksaan tanda vital Denyut nadi yang biasa dilakukan pada arteri radial pada pergelangan tangan, pada siku (arteri brakialis), di leher terhadap arteri karotis, di belakang lutut (arteri poplitea), atau di kaki dorsalis pedis atau arteri tibialis posterior, Denyut nadi biasanya diukur dengan menggunakan stetoskop atau secara langsung menggunakan jari dengan menekan nadi penderita selama 60 detik (atau selama 15 detik dan kemudian kalikan dengan empat untuk menghitung denyut per menit), Pernapasan tingkat respirasi adalah jumlah pernapasan seseorang per menit. Tingkat biasanya diukur ketika seseorang

beristirahat dengan menghitung berapa kali dada meningkat selama satu menit. pernafasan dapat meningkat karena demam atau karena penyakit dan kondisi medis lainnya. Ketika memeriksa pernapasan penting juga diperhatikan apakah seseorang memiliki kesulitan bernapas. Pernafasan normal untuk orang dewasa sehat antara 12-20 kali per menit. Suhu Suhu tubuh normal seseorang bervariasi tergantung pada jenis kelamin, aktivitas baru-baru ini, makanan atau konsumsi cairan, dan pada wanita, tahap siklus menstruasi. Suhu tubuh normal dapat berkisar antara 36,5 derajat C - 37,2 derajat C atau setara dengan 97,8 derajat F - 99 derajat F (Tresnawati, 2012).

Pemasangan cairan intravena (infus) diberikan pada tahap awal untuk persiapan mengantisipasi kalau kemudian penambahan cairan dibutuhkan. Pemberian cairan infus intravena selanjutnya baik jenis cairan, banyaknya cairan yang diberikan, dan kecepatan pemberian cairan harus sesuai dengan diagnosis kasus. Misalnya, pemberian cairan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang pada syok hipovolemik seperti pada perdarahan berbeda dengan pemberian cairan pada syok septik. Pada umumnya dipilih cairan isotonik, misalnya NaCl 0,9% atau RL (Wiknjosastro dkk, 2007)

Pada Ny "N" dilakukan pemasangan infus RL 28 tetes/menit dengan. Dilakukannya pemasangan infus untuk mengatasi jika terjadi syok yang disebabkan oleh perdarahan yang berulang-ulang.

Berikan support mental kepada ibu dengan memberikan support mental maka pasien lebih optimis dalam menghadapi penyakitnya dan lebih berserah diri pada allah swt.

Beritahu kepada ibu dan keluarga tentang tindakan yang dilakukan kepada ibu dan Meminta persetujuan (*informed consent*) kepada keluarga untuk melakukan kuretase, sebagai bukti tertulis persetujuan untuk pelaksanaan tindakan pada klien.

Melakukan kolaborasi dengan dokter Obgyen untuk pemberian terapi dan penanganan selanjutnya : a.Skin test untuk pemberian cefotaxim 1 gr/24 jam. Untuk mengecek ibu alergi terhadap obat tersebut, b.Pemberian cefotaxim 1 gr/24 jam. obat untuk antibiotik, c.Pemberian Cytrostol 200mg/6jam per oral, untuk penggugur kandungan, d.Pemberian kombinasi 120 mg zat besi dan 500 mg asam folat peroral, untuk mengobati perdarahan pasca persalinan.

Menganjurkan ibu berpuasa untuk persiapan kuretase mulai jam 12.00 wita setelah makan siang hingga pelaksanaan kuretase, untuk mempermudah proses kuretase.

Pengeluaran jaringan mola : a.Vakum kuretase, Setelah keadaan umum diperbaiki dilakukan vakum kuretase tanpa pembiuasan. Untuk perbaiki kontraksi diberikan pula uterotonika. Vakum kuretase dilanjutkan dengan sendok kuret biasa yang tumpul. Tindakan kuret cukup dilakukan satu kali saja, asal bersih. Kuret kedua hanya dilakukan bila ada indikasi. Sebelum tindakan kuret sebaiknya disediakan darah untuk menjaga kemungkinan perdarahan yang banyak, (Wiknjosastro dkk, 2007).

Kuretase telah dilakukan pada pukul 16.30 wita, Hasil kuretase terdapat jaringan gelembung mola ± 500 gram. Dengan perdarahan ± 250 cc. Kemudian di berikan injeksi Myotonic 1mg/IV setelah kuretase.

Dari praktek yang telah dilaksanakan diRSUD Syekh Yusuf Gowa dibandingkan dengan teori yang telah ada, tidak terdapat kesenjangan dalam merencanakan tindakan asuhan kebidanan pada kasus molahidatidosa.

F. Langkah VI

Berdasarkan teori yang ada bahwa pelaksanaan rencana tindakan asuhan kebidanan dilakukan secara efektif dan aman dimana pelaksanaan rencana tindakan asuhan adalah bidan dan berkolaborasi dengan dokter.

Implementasi pada kasus Ny "N" yaitu : Observasi Keadaan umum dan tanda-tanda vital didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, Tanda-tanda vital : Tekanan Darah: 120/80 mmHg, Suhu: 36,7 °C, Nadi: 80x/i, Pernapasan: 22 x/i, Observasi tetesan cairan infus pada Ny "N" terpasang infus RL 28 tetes/menit.

Sedangkan menurut teori mengatakan bahwa Tanda-tanda vital normal : Tekanan darah normal yaitu 120/80 MmHg. Ukuran tekanan darah dibagi menjadi dua yaitu sistolik dan Diastolik. Sistolik mengacu pada tekanan dalam arteri saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh batas normal 110-130 mmHg. sedangkan diastolik, mengacu pada tekanan di dalam arteri saat jantung beristirahat dan mengisi dengan darah. Pada bayi tekanan darah lebih rendah daripada orang dewasa batas normal 70-90 mmHg. Nadi normal untuk orang

dewasa sehat berkisar 60-100 denyut per menit. Denyut nadi dapat meningkat dengan olahraga, penyakit, cedera, dan emosi. Pemeriksaan tanda vital Denyut nadi yang biasa dilakukan pada arteri radial pada pergelangan tangan, pada siku (arteri brakialis), di leher terhadap arteri karotis, di belakang lutut (arteri poplitea), atau di kaki dorsalis pedis atau arteri tibialis posterior, Denyut nadi biasanya diukur dengan menggunakan stetoskop atau secara langsung menggunakan jari dengan menekan nadi penderita selama 60 detik (atau selama 15 detik dan kemudian kalikan dengan empat untuk menghitung denyut per menit), Pernapasan tingkat respirasi adalah jumlah pernapasan seseorang per menit. Tingkat biasanya diukur ketika seseorang beristirahat dengan menghitung berapa kali dada meningkat selama satu menit. pernafasan dapat meningkat karena demam atau karena penyakit dan kondisi medis lainnya. Ketika memeriksa pernapasan penting juga diperhatikan apakah seseorang memiliki kesulitan bernapas. Pernafasan normal untuk orang dewasa sehat antara 12-20 kali per menit. Suhu Suhu tubuh normal seseorang bervariasi tergantung pada jenis kelamin, aktivitas baru-baru ini, makanan atau konsumsi cairan, dan pada wanita, tahap siklus menstruasi. Suhu tubuh normal dapat berkisar antara 36,5 derajat C - 37,2 derajat C atau setara dengan 97,8 derajat F - 99 derajat F (Tresnawati, 2012).

Melakukan persiapan peralatan kuretase pada pukul 16.00 wita yaitu : Spekulum, Sonde uterus, Abortus tang, Detalator hegar, Cunam portio, Sendok kerokan (kuret), Handscon steril, Kassa steril, Bengkok, Betadine, Kom kecil, Lampu sorot. Hasil : Peralatan kuretase telah tersedia.

Melakukan observasi perdarahan pervaginam pada pukul 16.20 wita

Hasil : ibu telah mengetahui hasil perdarahan pervaginam yaitu darah sedikit sedikit berwarna kecoklatan.

Sesuai dengan teori mengatakan pada pemeriksaan Genitalia eksternal : pemeriksaan genitalia eksternal dilakukan inspekulo menggunakan speculum terlihat adanya pengeluaran darah pervaginam dan terlihat gelembung-gelembung mola seperti buah anggur (Esti, 2010)

Memberi informasi kepada ibu dan keluarga pada pukul 16.25 wita bahwa kuretase akan segera dilakukan, kemudian membawa ibu ke ruang nifas dan menyiapkan perlengkapan ibu antara lain kain bersih, pembalut, celana dalam, dan baju bersih. Hasil : ibu dan keluarga telah mengerti informasi yang diberikan.

Melakukan kolaborasi dengan dokter obgyen untuk melakukan kuretase pada pukul 16.30 wita. Hasil : kuretase telah dilakukan pada pukul 16.30 wita, Hasil kuretase terdapat jaringan gelembung mola ± 500 gram. Dengan perdarahan ± 250 cc. Kemudian di berikan injeksi Myotonic 1mg/IV setelah kuretase.

Sedangkan menurut teori (Saifuddin, 2006) : Segera lakukan evakuasi jaringan mola dan semestara proses evakuasi berlangsung, berikan infus 10 IU oksitosia dalam 500 ml NS atau RL dengan kecepatan 40-60 tetes/menit (sebagai tindakan preventif terhadap perdarahan hebat dan efektifitas kontraksi terhadap pengosongan uterus secara cepat), Pengosongan dengan Aspirasi Vakum lebih aman dari Kuretase tajam, Bila sumber vakum adalah tabung manual, siapkan peralatan AVM minimal 3 set agar dapat digunakan secara bergantian hingga

pengosongan kavum uteri selesai, Kenali dan tangani komplikasi penyerta seperti tiritoksikosis atau krisis tiroid baik sebelum, selama dan setelah prosedur evakuasi, Anemia sedang cukup diberikan sulfas ferosus 600 mg/hari, untuk anemia berat lakukan transfusi, Kadar Hcg diatas 100.000 IU/L praevakuasi dianggap sebagai risiko tinggi untuk perubahan ke arah ganas, pertimbangan untuk memberikan methatrexale (MTX) 3-5 mg/kg BB atau 25 mg IM dosis tunggal.

Selama pemantauan, pasien dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi hormonal (apabila masih ingin anak) atau tubektomi apabila ingin menghentikan fertilitas.

Menyiapkan hasil kuretase pada pukul 17.00 wita untuk diperiksa di laboratorium patologi anatomi. Hasil : kuretase telah siap untuk diperiksa dilaboratorium patologi anatomi.

Membersihkan dan merapikan ibu. Hasil : ibu sudah bersih dari darah dan telah diganti pakaiannya dengan baju bersih.

Observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital pasien post kuretase pada pukul 17.10 wita. Hasil : pemeriksaan KU dan tanda-tanda vital pasien post kuretase, Keadaan Umum ibu baik, Kesadaran Composmentis, tanda-tanda vital : Tekanan Darah : 120/80 mmHg, Suhu : 36,5 °C, Nadi : 80x/i, Pernapasan: 22 x/i.

Melakukan kolaborasi dengan dokter obgyen pukul 17.20 wita untuk Pemberian injeksi renxon 1 gr/IV untuk mengobati dan mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, veroscan untuk anemia pada kehamilan dan laktasi, berhubungan dengan kehilangan darah atau menopause, myotonik untuk

mencegah dan mengobati perdarahan pasca persalinan dan abortus, termasuk perdarahan uterus karena sectio caesaria dan perdarahan uterus setelah plasenta lepas, atoni uterus, subinvolusi uterus pada puerperium, lochiomatra, clindamycin untuk obat antibiotik dan paracetamol untuk meredakan rasa sakit atau nyeri.

Dari praktek yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa tidak terdapat kesenjangan dengan teori yang ada dalam pelaksanaan rencana tindakan asuhan kebidanan dimana pada studi kasus ini semua perencanaan asuhan yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan aman yang berlangsung selama 2-8 hari dengan kuretase kedua. Pelaksanaan asuhan disini adalah bidan dan berkolaborasi dokter.

G. Langkah VII

Pada langkah VII ini, penulis dapat mengevaluasi tindakan asuhan yang telah diberikan dengan hasil yaitu sebagian masalah dapat diatasi yang berarti pelaksanaan rencana tindakan asuhan kebidanan tersebut efektif dan sebagian lagi belum dapat diatasi sehingga harus dipikirkan lagi cara yang lebih efektif.

Sedangkan pada kasus Ny "N" didapatkan evaluasi yaitu : keadaan umum ibu baik di tandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik yang didapatkan pada Ny "N" Post kuret hari pertama keadaan umum ibu baik, Kesadaran Composmentis, Tanda-tanda vital : Tekanan Darah : 130/70 mmHg , Suhu : 36,6 °C, Nadi : 80x/menit, Pernapasan: 20 x/menit.

Tetapi ibu masih merasakan adanya pengeluaran darah, pada pemeriksaan fisik ada pengeluaran pervaginam darah encer warna merah kehitaman.

Terapi profilaksis dengan sitostatika diberikan pada kasus mola dengan resiko tinggi akan terjadinya keganasan misalnya umur tua dan paritas tinggi yang menolak untuk dilakukan histerektomi atau kasus mola dengan hasil histopatologi yang mencurigakan. Biasanya diberikan methothexate atau actinomycin D. ada beberapa ahli yang tidak menyutui terapi profikalasis ini dengan alasan bahwa jumlah kasus mola yang terjadi ganas tidak banyak dan sitostika merupakan obat berbahaya. Goldstein berpendapat bahwa pemberian sitostatika profilaksis dapat menghindarkan keganasan dengan metastatis, serta mengurangi koriokarsinoma di uterus sebanyak 3 kali(Wiknjosastro, 2007)

Pemeriksaan tidak lanjut, Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya kemungkinan keganasan setelah molahidatidosa. Lama pengawasan berkisar antara satu atau dua tahun. Untuk tidak mengacaukan pemeriksaan selama periode ibu pasien dianjurkan untuk tidak hamil dulu dengan menggunakan kondom, diafragma, atau pil anti hamil. Mengenai pemberian pil anti hamil ini ada dua pendapat yang saling bertentangan. Satu pihak mengatakan bahwa pil kombinasi disamping dapat menghindarkan kehamilan juga dapat menahan LH dari hipofisis sehingga tidak terjadi reaksi silang dengan HCG. Pihak lain menentangnya justru karena estrogen dapat mengaktifkan sel-sel trofoblas. Bagshawe beranggapan bila pil anti hamil diberikan sebelum kadar HCG jadi normal dan kemudian wanita itu mendapatkan koriokarsinoma, maka biasanya resisten sitostatika. Kapan penderita mola dapat dianggap sehat kembali? Sampai sekarang belum ada kesepakatan. Curry mengatakan sehat bila HCG dua kali

berturut-turut normal. Adapun mengatakan bila sudah mengatakan anak yang normal. Selama pengawasan, secara berkala dilakukan pemeriksaan ginekologi, kadar HCG dan radiologic. Cara yang paling peka untuk menentukan adanya keganasan dinin ialah pemeriksaan HCG yang menetap untuk beberapa lama, apalagi kalau meninggi. Hal ini menunjukkan masih sel-sel trofoblas yang aktif. Cara yang umum dipakai sekarang ialah radioimmunoassay terhadap HCG B-sub unit (Wiknjosastro dkk, 2007).

Teori (Saifuddin, 2006) mengatakan Lakukan pemantauan kadar hCG hingga minimal 1 tahun pascaeвакуasi. Kadar yang menetap atau meninggi setelah 8 minggu pascaeвакуasi menunjukkan masih terdapat trofoblas aktif (di luar uterus atau invasif) : berikan kemoterapi MTX dan pantau β -hCG serta besar uterus secara klinik dan USG tiap 2 minggu.

Evaluasi yang dilakukan pada kasus Ny "N" umur 25 tahun GIIPIA0 usia kehamilan 12 minggu 2 hari dengan molahidatidosa yaitu dengan perawatan di Rumah Sakit selama 2 hari. Hari pertama merupakan pelaksanaan kuretase, hari kedua ibu sudah diperbolehkan rawat jalan, ibu merespon setiap tindakan yang diberikan dengan baik dan ibu pulang dengan kondisi sehat. Ibu datang ke ruangan ANC untuk kontrol ulang 7 hari setelah pelaksanaan kuretase pertama. Secara keseluruhan, dari langkah pengumpulan data sampai evaluasi asuhan kebidanan menurut manajemen varney, semua asuhan yang dibrikan berlangsung lancar sehingga memperoleh hasil yang baik, efektif dan efisien.

H. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari S (Subjektif) menggambarkan pendokumentasian pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I Varney, sesuai pada kasus Ny “N” didapatkan bahwa ibu masuk tanggal 12 Mei 2016 jam 08.00 Wita mengatakan adanya pengeluaran darah banyak seperti ati ayam disertai ada gelembung sejak tanggal 11 Mei 2016

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang kedua dan tidak pernah mengalami keguguran, haid terakhir ibu tanggal 16 Februari 2016, ibu mengatakan usia kehamilannya 3 bulan lebih, penglihatan ibu berkunang-kunang, ibu mengeluh sering muntah-muntah berlebihan, dan sering gelisah.

O (Objektif), menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnostic lain yang dirumuskan dalam data focus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney.

Berdasarkan pada kasus Ny “N” didapatkan keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, ibu gelisah, tanda-tanda vital dalam batas normal, pada pemeriksaan Leopold didapatkan Leopold I setinggi pusat, tidak teraba bagian janin, dan tidak terdapat DJJ, pada pemeriksaan genitalia eksternal terlihat adanya pengeluaran darah pervaginam dan terlihat gelembung-gelembung mola seperti buah anggur.

A (Assesment), menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi, diagnosis/masalah,

antisipasi diagnosis/masalah potensial, perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 Varney.

Berdasarkan pada kasus Ny “N” assessment ditegakkan yaitu GIIPIA0, umur kehamilan 12 minggu 2 hari, tinggi fundus uteri setinggi pusat, tidak teraba bagian janin dengan molahidatidosa.

P (Planning), menggambarkan pendokumentasian dan tindakan (Implementasi) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan assessment sebagai langkah 5, 6, dan 7 Varney.

Berdasarkan pada kasus Ny “N” telah dilakukan implementasi sesuai dengan teori dengan molahidatidosa tindakan yang diberikan yaitu segera lakukan pemasangan Infus RL 500 ml 28 tetes/menit drips 10 IU oksitosin dan lakukan transfusi darah, menyiapkan peralatan kuretase, lakukan pengosongan mola, dan berikan methatrexale 3-5 mg/kgBB atau 2,5 mg IM.

Evaluasi yang dilakukan pada kasus Ny “N” umur 25 tahun GIIPIA0 usia kehamilan 12 minggu 2 hari dengan molahidatidosa yaitu dengan perawatan di Rumah Sakit selama 1 hari. Hari pertama merupakan pelaksanaan kuretase, hari kedua ibu sudah diperbolehkan rawat jalan, ibu merespon setiap tindakan yang diberikan dengan baik dan ibu pulang dengan kondisi sehat. Ibu datang ke ruangan ANC untuk kontrol ulang 7 hari setelah pelaksanaan kuretase pertama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil studi kasus yang dilaksanakan dibandingkan dengan teori yang ada, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang merupakan gambaran dan informasi tentang molahidatidosa.

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny “N” dengan kasus molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2016.
2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnose/masalah aktual pada Ny “R” dengan molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2016.
3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnose/masalah potensial pada Ny “R” dengan molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2016. Masalah potensial yaituantisipasi terjadinya anemia berat dan choriocarcinoma.
4. Telah dilakukan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “R” dengan molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2016. Kolaborasi dilakukan dengan pemberian infus RL 28 tetes/menit untuk memperbaiki keadaan umum ibu.
5. Telah dilakukan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2016. Intervensi dilakukan dengan kolaborasi dengan dokter obgyen untuk pemberian terapi dan penanganan.

6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2016. Kuretase telah dilakukan pada pukul 16.30 wita, hasil kuretase terdapat jaringan mola \pm 500 gram. Dengan perdarahan \pm 250 cc, kemudian diberikan injeksi Myotonic 1mg/IV setelah kuretase.
7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2016. Kondisi ibu baik, tanda-tanda vital ibu berada dibatas normal, terapi post kuretase injeksi Renxon 1gr/IV obat oral : a.Veroscan 1x1(x), b. Myotonik 3x1(x),c. Clindamicyn 2x300 mg(x), d. Paracetamol 3x500 mg (xv). Ibu sudah diperbolehkan pulang dengan kondisi baik pada ibu bersedia datang kembali untuk menjalani kuretase kedua pada tanggal 18 Mei 2016.

B. Saran

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya kehamilan molahidatidosa yang dapat berdampak buruk baik pada ibu maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, adapun penulis sarankan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah kejadiann molahidatidosa maka perlu peningkatan kualitas pelayanan ANC dan pertolongan persalinan yang cepat dan tepat, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan masalah lain yang dapat timbul.
2. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam melaksanakan asuhan diperlukan kerja sama yang baik dengan pasien, keluarga pasien, dokter serta bidan yang terlibat dalam penanganan kasus klien.

3. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-penyulit yang dapat terjadi pada kehamilan serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Ary Widayana dkk. *Diagnosis dan Penatalaksanaan Hiperemesis Gravidarum*, 2005.
- Ambarwati E.R dan Wulandari D. *Asuhan Kebidanan (Nifas)*, Cetakan : Mitra Cendikia, Yogyakarta, 2008, Halaman 24.
- Gary Cuningham F. *Penyakit dan Kelainan pada Plasenta dan Selaput Janin. Obstetri williams*. Cetakan I. EGC, Jakarta, 2006, Halaman 259-262.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Darmawansyah. *Farmakologi Kebidanan*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Fadlun dan Ahmad feryanto. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Cetakan I. Salemba Medika, Jakarta, 2011, Halaman 47.
- Fitri Dyna. *Faktor risiko molahidatidosa/ Risk factors Hydatidiform mole*. Cetakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.
- Icesmi Sukarni . *Kehamilan Persalinan dan Nifas*. Cetakan I. Nuha Medika, Jakarta, 2013, Halaman 178-183.
- Intan Parulian. *Strategi Dalam Penanggulangan Pencegahan Anemia Pada Kehamilan*. Volume 3. Nomor 3. Januari-Juli, 2016.
- I Gusti Ngurah, dkk. *Penyakit Trofoblas Gestasional*. Volume 47. Nomor 3. September, 2016.
- I Nyoman Gede Budiana. *Koriokarsinoma Pasca Abortus*, 2009
- Kurniawati D. *Obgynacea*. Cetakan : Tosca Entreprisc, Yogyakarta, 2009, Halaman 112-117.
- M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Edisi baru. Cetakan I, Muharram 1430/Januari 2009.

- Morgan G. *Obstetri & Ginekologi*. Edisi : 2. Cetakan I. EGC, Jakarta, 2009, Halaman 187-200.
- Manuaba I. Buku ajar *Ginekologi Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta : EGC, 2009, Halaman 70-82.
- Margareth ZH. *Kehamilan Persalinan dan Nifas*. Cetakan I. Nuha medika, Jakarta, 2013.
- Mangkuji, dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah SOAP*. Jakarta: EGC, 2013.
- Nugroho, Taufan. *Kasus Emergency Kebidanan untuk Kebidanan dan Keperawatan*. Cetakan I. Nuha Medika, Yogyakarta, 2010, Halaman 107-115.
- Nugraheny Esti . *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta : Cetakan I. Pustaka Rihama, 2010, Halaman 60-65.
- Norwitz E.R. *Obstetrics dan Gynaecology at a Glance*. Cetakan I. Wiley Blackwell, Jakarta, 2010, Halaman 95-104.
- Nugroho, Taufan, *OBSGYN*. Cetakan : Nuha Medika, Jogjakarta, 2010
- Rita Arrianty, *The Protocol Of Hydatidiform Mole*. 2005.
- Sastrawinata. *Ilmu Kesehatan Reproduksi, Obstetri Patologi*. Jakarta : EGC, 2009, Halaman 207-215.
- Saifuddin, Abdul Bari, dkk. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal*. Edisi : 1. Cetakan V. Jakarta : PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009, Halaman 158-159.
- Sujiyatini, dkk. *Asuhan Patologi Kebidanan*. Cetakan I : Nuha Medika, Yogyakarta, 2009, Halaman 3-8.
- Syafii, dkk. *Indonesian Journal of Clinical Pathologi and Medical Laboratory*, vol. 13, No.1, Nov. 2006 : 1-3.
- Tiara V. Papatungan, dkk. *Jurnal e-Clinic(eCI)*. Volume 4. nomor 1. Januari-Juni, 2016.
- Teresa L. Wargasetia, dkk. *Aspek Perdarahan pada kehamilan*. 2006

Sarah Damongilala, dkk. *Jurnal e-Clinic (eCI)*. Volume 3. Nomor 2. Mei-Agustus, 2015

Walsh L,V. *Buku Ajar Kebidanan Komunitas*. Jakarta : EGC ,2007

Wiknjosastro Hanifa, dkk. *Ilmu kebidanan*, Edisi : III, Cetakan IX. Jakarta, 2007

Yulaikhah Lily. *Kehamilan seri asuhan kebidanan*, jakarta : EGC, 2008



LEMBAR KEGIATAN KONSULTASI

Nama : St.Syahriani Rauf H
Nim : 70400113013
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care dengan kasus Molahidatidosa di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2016.
Pembimbing : Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.

No.	Hari/Tgl	Materi Konsultasi	Saran/Perbaikan	Paraf
1.	Jumat 05-02-2016	Konsul Judul	ACC Judul, lanjutkan konsul kasus	
2.	Kamis 17-06-2016	Konsul Kasus	ACC Kasus	
3.	Senin 21-08-2016	Konsul BAB I	Perbaikan penulisan	
4.	Selasa 24-06-2016	Konsul Bab I dan BAB II	Tambahan materi	
5.	Rabu 27-06-2016	Konsul BAB I dan BAB II	Perbaikan penulisan	

6.	Jumat 30-06-2016	Konsul BAB II	Tambahan Materi	
7.	Rabu 12-07-2016	Konsul BAB II	Tambahan materi pada perdarahan hamil muda,perbaikan diteori manajemen kebidanan,daftar pustaka	
8.	Kamis 28-07-2016	Konsul perbaikan proposal	Perbaikan asuhan kebidanan langkah IV	
9.	Kamis 07-09-2016	Konsul BAB III	Manajemen asuhan kebidanan berdasarkan teori	
10.	Kamis 08-09-2016	Konsul BAB III	Karakteristik berdasarkan teori	
11.	Selasa 09-09-2016	Konsul BAB III	Penyebab terjadinya molahidatidosa	
12.	Rabu 14-09-2016	Konsul BAB III	Tambahan materi BAB II untuk pembahasan	

13.	Selasa 15-09-2016	Konsul BAB III	ACC	
14.	Jumat 08-11-2016	Konsul BAB IV	Perbaiki kasus	
15.	Rabu 16-11-2016	Konsul kasus	Langkah 1 sampai langkah 5	
16.	Kamis 17-11-2016	Konsul kasus	Hubungan antara bab III	
17.	Jumat 18-11-2016	Konsul BAB IV	Lengkapi BAB IV	
18.	Selasa 22-11-2016	Konsul BAB IV	Lengkapi pembahasan	
19.	Rabu 23-11-2016	Konsul BAB IV	Perbaiki Bab IV	
20.	Kamis 28-11-2016	Konsul BAB IV	Lengkapi pembahasan	

21.	Selasa 24-01-2016	Konsul BAB V	Perbaiki penulisan	
22.	Rabu 08-02-2017	Konsul BAB V dan daftar pustaka	Penambahan	
24.	Kamis 09-02-2016	Konsul BAB V dan daftar pustaka	ACC	

RIWAYAT HIDUP



A.

Nama lengkap : St. Syahriani Rauf H
NIM : 70400113013
JenisKelamin : Perempuan
Tempat/TglLahir : Ujung Pandang, 08 Juni 1995
Agama : Islam
Alamat : Jl.Sultan Alauddin Lr.6 no.54 Makassar
No. Hp : 082349872454
Email : syahrianirauf@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 : SD Negeri Pa'baeng-baeng I, Sul-Sel.
2. Tahun 2007-2010 : MTS Hj.Haniah, Maros, Sul-Sel.
3. Tahun 2010-2013 : SMK PGRI Keperawatan Minasate'ne, Pangkep, Sul-Sel.
4. Tahun 2013-2016 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sul-Sel.