

**PENGARUH NAUNGAN YANG BERBEDA TERHADAP
JUMLAH STOMATA DAN UKURAN PORUS
STOMATA PADA DAUN KANGKUNG AIR
(*Ipomoea aquatica* Forsk)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
USMAN
NIM. 60300111066
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USMAN
NIM : 60300111066
Tempat/Tgl. Lahir : Pallengu/14 Februari 1991
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. Mustafa Dg Bunga No 2
Judul : Pengaruh Naungan Yang Berbeda Terhadap Jumlah Stomata dan Ukuran Porus Stomata Pada Daun Kangkung Air (*Ipomoea aquatica* Forsk)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar , 8 September 2015
24 Dzulkaidah 1436 H

ALAUDDIN
M A K A S S A R
Penyusun

USMAN

NIM: 60300111066

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Naungan Yang Berbeda Terhadap Jumlah Stomata dan Ukuran Porus Stomata Pada Daun Kangkung Air (*Ipomoea aquatica* Forsk)”, yang disusun oleh Usman, NIM: 60300111066, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 8 September 2015

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag (.....)

Sekretaris : Fatmawati Nur S.Si., M.Si (.....)

Munaqisy I : Hartono S.Si., M.Biotech (.....)

Munaqisy II : Nurlailah Mappanganro S.p., M.p (.....)

Munaqisy III : Dr. Sohra M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. Mufammad Khalifah Mustami M.Pd (.....)

Pembimbing II : Baiq Farhatul Wahida S.Si., M.Si (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205199303100

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alaamiin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah, Tuhan Semesta Alam, karena atas rahmat dan petunjuk-Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Naungan Yang Berbeda Terhadap Jumlah Stomata dan Ukuran Porus Stomata Pada Daun Kangkung Air (*Ipomoea aquatica* Forsk.) ini dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi. Selama menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Khalifah Mustami M.Pd dan Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan dengan segala ketulusan dan kesabaran.
2. Fatmawati Nur S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan Biologi Sains
3. Hartono, S.Si., M.Biotech, dan Nurlailah Mappanganro S.P., M.P selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan arahan dan saran-saran perbaikan.
4. Fatmawati Nur S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah mencurahkan perhatian dan waktunya selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Seluruh dosen dan staff Jurusan Biologi Sains yang telah mendidik dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
6. Ibu, Bapak serta seluruh keluarga yang tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, do'a dan kesabarannya.

7. Teman-teman seperjuangan: Riska Putri Merdekawati, Suriyani, Nurlia T dan seluruh teman-teman yang lainnya yang tak dapat disebutkan satu-persatu atas kekompakan, semangat, suka dan duka selama ini

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak dalam proses penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tulisan ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 8 September 2015
24 Dzulkaidah 1436 H

USMAN
Nim: 60300111066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup penelitian	6
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu	7-8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEOROTIS	9-12
A. Tinjauan Umum Kangkung Air (<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk)	9
B. Manfaat dan Komposisi Kangkung Air (<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk)	12
C. Syarat Tumbuh	13-14
D. Stomata	14-22
E. Naungan	22-28
F. Integrasi Keilmuan	28-29
G. Hipotesis	30
H. Kerangka Pikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Variabel Penelitian	31
D. Rancangan Penelitian	31-32
E. Devinisi Operasional Penelitian	32-33
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Intrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	33
H. Prosedur Kerja	33-34
I. Pembuatan Preparat	35
J. Analisis Data	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36-46
B. Pembahasan	46-55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

KEPUSTAKAAN	57-60
-------------------	-------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	62-83
-------------------------	-------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
----------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Kandungan mineral makro daun dan batang kangkung air segar dan kukus mg/100g	13
Tabel 3.1 : Rancangan acak lengkap.....	32
Table 4.1: Jumlah Stomata Pada Setiap Perlakuan	36
Tabel 4.2: Analisis Sidik Ragam.....	36
Tabel 4.3: Jumlah Stomata Pada Permukaan Bawah Daun	37
Tabel 4.4: Analisis Sidik Ragam	37
Tabel 4.5: Nilai BNT 0,05 Pada Setiap Perlakuan	38
Tabel 4.6: Ukuran Panjang Porus Stomata Pada Setiap Perlakuan	39
Tabel 4.7: Analisis Sidik Ragam	40
Tabel 4.8: Nilai BNT 0,05 Pada Setiap Perlakuan	40
Tabel 4.9: Ukuran Lebar Porus Stomata Permukaan Atas Daun (Mikron)	40
Tabel 4.10: Analisis Sidik Ragam	41
Tabel 4.11: Nilai BNT 0,05 Pada Setiap Perlakuan	41
Tabel 4.12: Ukuran Panjang Porus Stomata Permukaan Bawah Daun (Mikron)	43
Tabel 4.13: Analisis Sidik Ragam	43
Tabel 4.14: Nilai BNT 0,05 Pada Setiap Perlakuan	44
Tabel 4.15: Ukuran Lebar Porus Stomata Permukaan Bawah Daun (Mikron)	44
Tabel 4.16: Analisis Sidik Ragam	44
Tabel 4.17: Nilai BNT 0,05 Pada Setiap Perlakuan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Morfologi Kangkung Air (<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk)	12
Gambar 3.1: Cara Mengukur Porus Stomata	34
Gambar 4.1: Stomata Permukaan Atas dan Bawah Daun	38
Gambar 4.2: Histogram Jumlah Stomata Pada Permukaan Atas dan Bawah daun .	39
Gambar 4.3: Ukuran Porus Stomata Permukaan Atas Daun	42
Gambar 4.4: Histogram Panjang dan Lebar Porus Stomata Pada Permukaan Atas Atas Daun	42
Gambar 4.5: Ukuran Porus Stomata Permukaan Atas Daun.....	45
Gambar 4.6: Histogram Panjang dan Lebar Porus Stomata Pada Permukaan Atas Atas Daun	46



ABSTRAK

Nama : Usman
NIM : 60300111066
Judul Skripsi : **Pengaruh Naungan yang Berbeda Terhadap Jumlah Stomata dan Ukuran Porus Stomata pada Daun Kangkung Air (*Ipomoea aquatica* Forsk)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek perbedaan naungan yang berbeda terhadap jumlah stomata dan panjang serta lebar porus stomata daun tanaman kangkung air. Penelitian dilaksanakan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) (3 perlakuan dengan 3 kali ulangan pada masing-masing perlakuan). Perlakuan meliputi naungan 1 lapis, naungan 2 lapis dan kontrol (tanpa naungan). Parameter yang diamati adalah jumlah stomata dan panjang serta lebar porus stomata daun. Data dianalisis dengan analisis sidik ragam. Setelah tanaman umur 60 hari dilakukan pembuatan preparat dengan metode replika/cetakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naungan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap jumlah stomata permukaan atas daun namun berpengaruh pada permukaan bawah daun. Naungan juga berpengaruh terhadap ukuran panjang dan lebar porus stomata permukaan atas daun dan permukaan bawah daun.

Kata kunci : *Naungan, Jumlah Stomata, Panjang dan Lebar Porus*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Usman
NIM : 60300111066
Thesis title : **The effect of different shade on the number and size of stomata on the leaf stomata porous water spinach (*Ipomoea aquatica* Forsk)**

This study was to determine the effect of different shade difference to the number of stomata and the length and width of leaf stomata porous water spinach plants. The experiment was conducted using a completely randomized design (CRD) (3 treatments with 3 repetitions for each treatment). Treatment includes auspices of 1 ply, 2 ply and shade control (without shade). Parameters measured were the number of stomata and the length and width of leaf stomata porous. Data were analyzed by analysis of variance. After the plant life of 60 days be making preparations with a replica method / mold. The results showed that different shade does not affect the number of stomata on the leaf surface but affects the lower surface of leaves. Shade also affects the length and width of porous stomata on the leaf surface and the lower surface of leaves.

Keywords: Shade, the number of stomata, the length and width of the porous

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Setiap organisme, hidup dalam lingkungannya masing-masing. Begitu juga jumlah dan kualitas organisme penghuni di setiap habitat tidak sama. Faktor-faktor yang ada dalam lingkungan selain berinteraksi dengan organisme, juga berinteraksi sesama faktor tersebut, sehingga sulit untuk memisahkan dan mengubahnya tanpa mempengaruhi bagian lain dari lingkungan itu. Oleh karena itu untuk dapat memahami struktur dan kegiatannya perlu di lakukan penggolongan faktor-faktor lingkungan tersebut. Penggolongan itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan abiotik (suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, air, tanah, dan api) dan lingkungan abiotik (makhluk- makhluk hidup di luar lingkungan abiotik) (Irwan, 2010: 108-109).

Organisme hidup bereaksi terhadap lingkungan, artinya mereka tanggap terhadap rangsangan. Tumbuhan misalnya, biasanya menjalani perubahan pada bentuk luar serta dalam dan selama proses hidupnya bila terkena perubahan suhu, kekurangan air atau mineral tanah, sinar matahari yang kuat, atau perubahan dalam panjang hari (Tjitrosomo, 1983: 187).

Dalam jangka pendek, individu tumbuhan memperlihatkan respon struktural dan fisiologis terhadap stimulus (rangsangan) lingkungan. Sebagai satu contoh bagaimana tumbuhan berespon secara struktural terhadap lingkungan jauh melebihi

respon hewan terhadap lingkungannya. Tumbuhan memiliki adaptasi evolusioner dalam bentuk respons fisiologis terhadap perubahan jangka pendek. Misalnya, jika daun pada tumbuhan mengalami kekurangan air, daun-daun tersebut akan menutup stomata, yang merupakan lubang kecil (pori) dipermukaan daun tersebut (Campbell *et al*, 1999 : 292).

Daun pada umumnya berbentuk tipis melebar warnanya hijau dan duduknya pada batang menghadap ke atas. Bentuk daun umumnya tipis, datar, di perkuat oleh tulang daun, dan memiliki permukaan luas untuk menerima cahaya. Daun berfungsi untuk transfortasi dan menangkap cahaya untuk fotosintesis, yaitu perubahan energi matahari menjadi energi kimia. Pada tumbuhan dikotil, daun terdiri atas tangkai (*petiola*) dan helai daun (*lamina*). Jaringan penyusun daun meliputi epidermis, mesofil (parenkhim), dan berkas pembuluh. Epidermis terdapat di permukaan atas dan di permukaan bawah daun. Pada epidermis terdapat stomata (mulut daun), yaitu celah yang di batasi oleh sel penutup (Nasaruddin, 2010: 224-225).

Evolusi daun telah mengembangkan suatu struktur yang akan menahan kekerasan lingkungan namun juga efektif dalam penyerapan cahaya dan cepat dalam pengambilan CO₂ untuk fotosintesis. Kebanyakan daun tanaman budidaya mempunyai permukaan luar yang luas dan datar, lapisan pelindung permukaan atas dan bawah, banyak stomata per satuan luas, permukaan dalam yang luas dan rongga udara yang saling berhubungan, sejumlah besar kloroplas dalam setiap sel, dan hubungan yang erat antara ikatan pembuluh dan sel-sel fotosintesis. Sehelai daun yang ideal untuk pertukaran gas dan penangkapan cahaya hanyalah setebal satu sel, tetapi kekerasan lingkungan alami menuntut beberapa lapisan sel dan pelindung

permukaan agar dapat lestari. Sebagian besar pertukaran gas dalam daun terjadi melalui stomata (Gardner, *et al*, 2008: 20).

Organ utama tumbuhan tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas, dimana fotosintesis berlangsung tepatnya pada bagian stroma. Meskipun seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian besar energi dihasilkan di daun (Pertamawati, 2010: 32).

Stomata merupakan celah dalam epidermis yang dibatasi oleh dua sel epidermis yang khusus, yakni sel penutup. Stomata terdapat pada semua bagian tumbuhan di atas tanah, tetapi paling banyak ditemukan pada daun. Jumlah stomata beragam pada daun tumbuhan yang sama dan juga pada daerah daun yang sama. Pada daun, stomata ditemukan di kedua permukaan daun atau pada satu mata saja, biasanya pada permukaan bawah. Sel penutup dapat terletak sama tinggi dengan sel epidermis lainnya, atau dapat lebih tinggi atau rendah dari permukaan daun (Hidayat, 1995: 68).

Pengaruh cahaya di yakini mempunyai pengaruh tak langsung melalui penurunan konsentrasi CO₂ oleh fotosintesis. Tapi baru-baru ini, sejumlah kajian memperlihatkan bahwa cahaya memiliki pengaruh kuat terhadap stomata, lepas dari peranannya dalam fotosintesis. Diduga, cahaya bekerja di sel mesofil, yang lalu mengirim pesan kepada sel penjaga. Atau, penerima cahaya terhadap di sel penjaga itu sendiri (Salisbury dan Ross, 1995: 84).

Umumnya tumbuhan dapat beradaptasi terhadap kondisi naungan, tetapi tentu saja ada batas genetik yang menentukan daya adaptasinya. Adaptasi tumbuhan cocok-

ternaung ke kondisi cahaya matahari langsung lebih sulit terjadi, karena tumbuhan ini sangat sensitif terhadap cahaya yang berlebihan (Lakitan, 2011: 164).

Tumbuhan harus menyesuaikan diri dengan keadaan habitatnya agar dapat hidup. Penyesuaian diri terhadap lingkungan mengakibatkan adanya sifat khas baik secara struktural maupun fungsional yang memberikan peluang agar berhasil dalam lingkungan tertentu. Secara anatomi organ yang menyusun tanaman dapat digunakan untuk mengenal adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Sifat ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan tertentu dapat dihubungkan dengan sifat strukturalnya (Imaningsih, 2006: 15).

Lingkungan bersifat dinamis dalam arti berubah-ubah menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa gula. Perubahan dan perbedaan yang terjadi baik secara mutlak maupun relatif dari faktor-faktor lingkungan terhadap tumbuh-tumbuhan akan berbeda-beda menurut waktu, tempat dan keadaan tumbuhan itu sendiri. Kehidupan sebetulnya adalah proses pertukaran energi antara organisme dan lingkungan. Melalui tumbuhan hijau energi sinar matahari di ikat dan di ubah menjadi energi kimia dalam bentuk keadaan lingkungannya (Irwan, 2010: 109).

Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan merupakan bentuk ketetapan-ketetapan dan petunjuk Allah kepada makhluk-Nya, seperti tersirat dalam QS surah As sajadah/32 : 7:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ

Terjemahnya : “ Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya” (QS. As-Sajadah/32 : 7).

Semua yang diciptakan Allah sudah dengan proporsi yang sangat tepat. Semua makhluk hidup mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi makanannya

serta bagaimana cara untuk mempertahankan hidup. Demikian juga dengan tumbuhan, tumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsi yang dijalankannya. Tumbuhan sebagai makhluk-Nya juga diciptakan dengan proporsional, seperti akar yang memiliki kemampuan menyerap air dan unsur hara serta daun yang menjadi tempat fotosintesis. Selain itu tumbuhan juga diciptakan memiliki sistem adaptasi agar dapat menghadapi lingkungan yang kurang mendukung bagi kehidupannya (Chodjim, 2000 dalam Rofiah, 2010: 3). Dalam ayat diatas yang menerangkan bahwa tumbuhan di ciptakan dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut Kusumo dan Soenarjono (1992, 83-85) kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) termasuk tanaman yang sanggup melakukan adaptasi yang baik pada kondisi tanah atau lingkungan dengan kisaran toleransi yang luas, artinya kangkung air dapat hidup dengan baik sejak ketinggian tempat pada dataran medium 800 m di atas permukaan air laut hingga ke daerah tepi pantai. Kangkung air lebih menyukai tanah yang sangat lembab namun agak berlempung. Tanah dengan bahan organik yang banyak menjadi habitat yang baik baginya.

Tanaman kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) termasuk dengan tumbuhan family *Convolvulacea*. Ini adalah tanaman tropis semi-akuatik tumbuh sebagai sayuran daun. Kangkung air (*Ipomoea aquatic* Forsk) umumnya disebut *water spinach* atau kangkung air dan sangat invasif, membentuk kumpulan di atas permukaan badan air seperti danau, kolam, kanal dan parit (Igwenyi, 2011: 594). Kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) adalah tanaman yang sering tumbuh liar di persawahan atau ditempat yang memiliki ketersediaan air yang banyak (tergenang). Literatur mengenai respon cahaya rendah (pengaruh penaungan) pada tanaman kangkung air belum diketahui.

Berdasarkan adaptasinya terhadap cahaya ada jenis-jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh atau disebut peka naungan. Selain itu ada pula tumbuhan yang tahan naungan (Tjitrosomo, 1983: 188). Beberapa peneliti memiliki bukti bahwa kepadatan stomata berubah dalam menanggapi perubahan atmosfer tingkat karbon dioksida. Stomata juga dapat bervariasi dalam menanggapi dengan jumlah curah hujan tahunan di lokasi yang berbeda (Aparadh, 2012: 11).

Pendekatan secara anatomi penting dilakukan guna mendukung pendekatan fisiologi maupun morfologi dalam menentukan genotip yang peka maupun yang mampu beradaptasi pada kondisi naungan. Hal tersebut yang melatar belakangi dilakukannya penelitian dengan judul “Pengaruh Naungan Yang Berbeda Terhadap Jumlah Stomata dan Ukuran Porus Stomata Pada Daun Kangkung Air (*Ipomoea aquatica* Forsk).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh naungan yang berbeda terhadap jumlah stomata dan ukuran porus stomata pada daun kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) yang diberikan naungan yang berbeda untuk melihat jumlah stomata dan ukuran porus daun.
2. Perhitungan jumlah stomata di lakukan dengan menghitung manual menggunakan mikroskop binokuler.

3. Pengukuran porus stomata di lakukan dengan metode *measurements* (satuan pengukuran) menggunakan mikroskop Primo Star yang suda tersambung dengan komputer.

D. Kajian Pustaka

Hasil penelitian Paishal (2005) menunjukkan bahwa aplikasi naungan berpengaruh nyata menghambat pertumbuhan vegetatif tanaman seledri (*Apium graveolens* L), kecuali pada panjang akar, yaitu pada tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, dan jumlah rumpun. Perlakuan naungan juga menurunkan hasil produksi tanaman seledri, yaitu pada jumlah tanaman yang hidup, bobot akar, bobot yang dapat dipasarkan per panel dan bobot yang dapat dipasarkan per tanaman. Tanaman tanpa naungan memiliki pertumbuhan vegetatif yang lebih baik dibandingkan tanaman dengan aplikasi naungan. Tanaman tanpa naungan juga mempunyai hasil produksi yang lebih baik dibandingkan tanaman dengan naungan. Aplikasi naungan meningkatkan kandungan klorofil a, b dan total pada daun.

Penelitian Hariyadi, *et al* (2012) menunjukkan bahwa Petek lebih menunjukkan konsistensi toleran pada perlakuan naungan 50% melalui penurunan ketebalan daun yang lebih tinggi, penurunan luas daun total yang lebih rendah, penurunan kerapatan stomata yang lebih rendah, serta bobot 100 biji yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Jayawijaya. Variabel jumlah polong per tanaman, jumlah polong berisi per tanaman, bobot 100 biji serta hasil per tanaman tidak berkorelasi terhadap variabel ketebalan daun, luas daun total maupun jumlah kerapatan stomata.

Hasil penelitian Afa dan Sudarsono (2010) pemberian naungan mengurangi pertumbuhan dan hasil biomassa tanaman kolesom, meskipun hanya berpengaruh

nyata terhadap diameter tajuk pada 28 hari setelah tanam dan bobot total biomassa pada 40 hari setelah tanam. Tanaman kolesom tanpa naungan memiliki daun yang lebih tebal serta jumlah dan kerapatan stomata lebih besar di permukaan bawah daun.

Hasil penelitian Haryanti (2010), menunjukkan bahwa naungan yang berbeda dapat menurunkan jumlah stomata dan berpengaruh terhadap lebar porus stomata permukaan atas daun, namun tidak berpengaruh terhadap panjang porus stomata permukaan atas dan bawah serta lebar porus permukaan bawah daun *Zephyranthes Rosea* Lindl.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh naungan yang berbeda terhadap jumlah stomata dan ukuran porus stomata daun kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk).

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan informasi mengenai pengaruh naungan yang berbeda terhadap jumlah stomata dan ukuran porus stomata daun kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk).

2. Bagi penelitian selanjutnya

Memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar bagi tahap penelitian lebih lanjut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kangkung Air (*Ipomoea aquatica* Forsk)

Kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) merupakan jenis sayuran yang sangat populer bagi rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa yang hidup di daerah tropis. Di beberapa negara temperata seringkali sebagian penduduknya terdiri dari orang-orang yang berasal dari negara tropis yang juga biasa mengenal kangkung. Tanaman kangkung berasal dari bagian benua Asia yang beriklim tropis, asal mula dari India dan Cina. Banyak ditanam di daerah Asia Tenggara terutama Malaysia, Burma, Indonesia, atau Cina Selatan, juga ditanam di Australia dan Afrika. Kangkung air atau akuatik merupakan tanaman pertanian yang sangat merakyat. kangkung air memproduksi hasil yang optimum di dataran rendah yang bersifat basah di iklim tropis terutama di negara-negara yang letaknya tidak jauh dari garis khatulistiwa (Dibyantoro, 1996: 1).

Menurut Furukawa (1993) dalam Khamwan (2003) kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) merupakan sayuran air berkembang cepat di Asia tenggara. Hal ini membutuhkan hanya dua minggu budidaya pada suhu yang tepat setelah tanam. Setelah pemenggalan kepala batang utama, tunas baru tumbuh dari setiap nodul batang, membuat panen terus-menerus.

Perbanyakkan kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) atau biasa disebut dengan kangkung bentuk air yaitu tanaman baru dibentuk dari batang yang terapung atau bagian batang yang sengaja dibenamkan pada lumpur atau tanah basah.

Pemotongan dari bagian pucuk sepanjang 25-30 cm dan 6-8 buku-buku batang. Bagian ini yang dimasukkan ke dalam tanah basah separuh bagian dari panjangnya. Jarak antar tanaman 30 x 20 cm. Jenis pertanaman kangkung air harus diatur dengan irigasi yang baik (Dibyantoro, 1996: 1).

Kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) merupakan tanaman menetap yang dapat tumbuh lebih dari satu tahun. Batang tanaman berbentuk bulat panjang, berbuku-buku, banyak mengandung air (*herbaceous*) dan berlubang-lubang. Batang tanaman kangkung tumbuh merambat atau menjalar dan percabangannya banyak. Tanaman kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dan cabang-cabang akarnya menyebar ke semua arah, dapat menembus tanah sampai kedalaman 50-100 cm, dan melebar secara mendatar pada radius 100 – 150 cm atau lebih, terutama pada jenis kangkung air. Tangkai daun melekat pada buku-buku batang dan di ketiak daunnya terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi percabangan baru. Bentuk daun umumnya seperti jantung hati, ujung daun runcing ataupun tumpul, permukaan daun sebelah atas berwarna hijau tua, dan permukaan daun bawah berwarna hijau muda (Rukmana, 1994: 16).

Kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) mereproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Musim berbunga berlangsung dari akhir Oktober sampai awal April di India, dan musim berbunga puncak diamati dari Desember-Januari. Pembentukan biji terjadi selama periode ini. Sebagian besar tanaman muda tumbuh sepanjang margin air, yang ia diasumsikan berasal dari perkecambahan biji. Cara utama reproduksi adalah melalui fragmentasi vegetatif. Cabang-cabang, dengan akar di setiap node, tumbuh menjadi tanaman independen ketika dipisahkan dan dibawa oleh air. Kangkung air membutuhkan iklim basah dan hangat untuk berkembang. Tumbuh

baik sebagai tanaman hanya ketika suhu rata-rata di atas sekitar 25⁰C. Kangkung air tumbuh di kolam dengan tanah liat-liat (pH 6,8) dan tanah lempung (pH 7,2-7,8) di India (Patnaik, 1976, *dalam* Harwood dan Sytsma, 2003: 7).

Dua jenis budaya yang digunakan dalam membudidayakan kangkung air yaitu kering dan basah. Dalam kedua kasus ini, jumlah besar bahan organik (kompos dan pupuk kandang) dan air yang digunakan untuk keuntungan. Dalam budaya kering, tanaman diberi jarak 5 inci terpisah di bedeng. Kangkung dimulai dari stek. Tanaman yang sering ditanam di tempat bedeng pembibitan untuk tanam kemudian ke ladang yang luas. Mengambil stek dari tanaman di tempat bedeng pembibitan adalah metode biasa. Panen mungkin mulai 6 minggu setelah tanam. Di mana budaya basah diizinkan, panjang stek 12 inci ditanam di lumpur dan tetap lembab. Sebagai tanaman tumbuh yang merambat, area basah (sawah) di banjir dengan kedalaman 6 inci dan aliran lambat air melalui lapangan dipertahankan mirip dengan metode untuk selada air. Tanaman melakukan transisi ke tahap berbunga dengan hari pendek di musim dingin (Stepens, 2003: 1-2).

Adapun klasifikasi tanaman kangkung air yaitu sebagai berikut:

Regnum : Plantae
Divisio : Spermatophyta
Subdivisio : Angiospermae
Classis : Dicotylodoneae
Ordo : Convolvulales
Familia : Convolvulaceae
Genus : Ipomoea
Spesies : *Ipomoea aquatica* Forsk (Steenis, 1975: 354).

Adapun morfologi tanaman kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) dapat di lihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 : morfologi kangkung air
(Sumber: Stephens, 2003).

B. Manfaat dan Komposisi Tanaman Kangkung Air (*Ipomoea aquatica* Forsk)

Akar, batang, dan daun kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) dapat dijadikan obat ketombe, mimisan, sariawan, pusing-pusing sebelah, ambeien, cacar air, frambusia (patek), bisul, sembelit, susah tidur, melancarkan air seni, urat saraf lemah (*neurasthenia*), mengurangi haid, dan wasir (Usman, *et all*, 2012).

Kandungan gizi yang terdapat dalam tanaman kangkung air dapat diketahui dengan cara analisis proksimat terhadap bagian tanaman yang dikonsumsi, yaitu bagian daun dan batang. Karakter kimia yang dianalisis adalah kadar air, kadar abu, lemak, protein, karbohidrat dan serat kasar. Komposisi kimia daun dan batang kangkung air segar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Kandungan mineral makro daun dan batang kangkung air segar dan kukus mg/100g

Jenis Mineral	Kangkung Air segar	Kangkung Air kukus
	Daun	Batang
Besi (Fe)	19,00	16,00
Seng (Zn)	1,1154	1,0905
Tembaga (Cu)	0,9420	0,9802
Selenium (Se),ppb	<0,001	<0,001

Sumber : Adrian, 2012: 52

C. Syarat Tumbuh

Menurut Rukmana (1994: 21) sumber daya dan ekosistem di wilayah Indonesia sangat bervariasi, terutama kondisi jumlah curah hujan dan temperatur udara.jumlah curah hujan berkisar antara 500-5.000 mm per tahun, sedangkan temperatur udara di pengaruhi oleh ketinggian tempat. Setiap naik 100 meter tinggi tempat, maka temperatur udara turun 10C. dipermukaan laut temperatur rata-rata 28⁰C, dan di daratan tinggi (pegunungan) ± 2.000 meter dari permukaan laut (dpl) sekitar 18⁰C. Kangkung mempunyai daya adaptasi cukup luas terhadap kondisi iklim dan tanah di daerah tropis, sehingga dapa ditanam (di kembangkan) di berbagai daerah atau wilayah di Indonesia. Prasyarat tumbuh yang harus diperhatikan dalam perencanaan budidaya kangkung adalah sebagai berikut:

1. Syarat Iklim

Kangkung dapat tumbuh dan bereproduksi dengan baik di dataran rendah sampai dataran tinggi (pegunungan) ± 2.000 m dpl dan di utamakan lokasi lahannya terbuka dan mendapat sinar matahari yang cukup.di tempat yang terlindung (ternaungi), tanaman kangkung akan tumbuh memanjang (tinggi) namun kurus-kurus.

2. Syarat Tanah

Kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) membutuhkan tanah yang banyak mengandung air dan lumpur, misalnya di rawa-rawa, persawahan, atau di kolam-kolam. Pada tanah yang kurang air (kekeringan), tanaman kangkung air pertumbuhannya akan kerdil, lambat, dan rasanya menjadi liat (kelat).

D. Stomata

Stomata berasal dari kata Yunani, *Stoma* yang mempunyai arti lubang atau porus. ESAU mengartikannya sebagai sel-sel penutup dan porus yang ada di antaranya. Jadi stomata adalah porus atau lubang-lubang yang terdapat pada epidermis yang masing-masing dibatasi oleh dua buah “*guard cell*” atau sel-sel penutup. *Guard cell* adalah sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. *Guard cell* dapat mengatur besarnya lubang-lubang yang ada diantaranya (Sutrian, 2004: 136).

Stoma berfungsi sebagai organ respirasi. Stoma mengambil CO_2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Kemudian stoma akan mengeluarkan O_2 sebagai hasil fotosintesis. Stoma ibarat hidung kita dimana stoma mengambil CO_2 dari udara dan mengeluarkan O_2 , sedangkan hidung mengambil O_2 dan mengeluarkan CO_2 . Stoma terletak di epidermis bawah. Selain stoma, tumbuhan tingkat tinggi juga bernafas melalui lentisel yang terletak pada batang (Najib, 2009: 20).

Stomata merupakan organ fotosintesis yang berfungsi secara fisiologis terutama untuk transpirasi dan respirasi selama proses fotosintesis. Oleh karena itu, aktivitas fotosintesis sangat bergantung antara lain pada pembukaan dan penutupan stomata. Selain melalui stomata, transpirasi juga dapat berlangsung melalui kutikula.

Namun, transpirasi melalui stomata lebih banyak daripada melalui kutikula epidermis (Palit, 2008: 9).

Stomata merupakan alat istimewa pada tumbuhan, yang merupakan modifikasi beberapa sel epidermis daun, baik epidermis permukaan atas maupun bawah daun. Struktur stomata sangat bervariasi pada antar tumbuhan, terutama bila dibandingkan untuk antar tumbuhan yang lingkungan hidupnya cukup kontras. Melalui stoma tumbuhan menunjukkan kemampuan adaptifnya terhadap perubahan dan stress dari lingkungannya. Tumbuhan darat banyak mengeluarkan air melalui stomata, terutama pada siang hari yang terik. Melalui alat yang sama, tumbuhan juga melepaskan gas-gas seperti CO_2 dan O_2 , terutama pada siang hari, kecuali pada tumbuhan gurun. Sebaliknya, melalui stomata tumbuhan juga menyerap CO_2 dan O_2 (Suyitno, 2006: 2).

Stomata muncul di akhir pengembangan daun, bahkan setelah jenis sel epidermis lainnya seperti trikoma. Stomata muncul sesuai dengan mode organ pertumbuhan yaitu dalam mode terpolarisasi dalam daun yang lebih rendah pada tumbuhan vascular, gymnosperma dan monokotil, dan di mode mosaik pada daun dikotil. Stomata hanya terdiri dari sepasang sel penjaga, sedangkan kompleks stomata termasuk sel epidermis yang berhubungan dengan pasangan sel penjaga. Sel-sel epidermal yang terkait dengan kompleks stomata di sebut aksesori sel. Mereka berbeda dari lainnya, baik dari sel epidermis dalam ukuran, bentuk dan penempatan teratur sekitar stomata. Sel anak berhubungan dengan sel penjaga ketika salah satu jenis sel rusak. Hubungan tersebut terjadi antara sel-sel epidermis atau epidermis dan anak sel (Croxdale, 2001: 1).

Kesinambungan epidermis terputus-putus oleh suatu lubang-lubang atau porus yang berukuran sangat kecil. Bagian tersebut adalah ruang antar sel yang dibatasi oleh dua sel yang bentuknya khas berbeda dengan sel disekelilingnya yang disebut sel penjaga/sel penutup. Sel penjaga ini umumnya berbentuk seperti ginjal tapi pada suku *Graminae* berbentuk halter. Sel penjaga bersama dengan lubangnya disebut sebagai stoma. Sel-sel epidermis yang berdekatan dengan sel penjaga sering menunjukkan perbedaan bentuk maupun susunan dengan sel-sel epidermis lainnya disebut sel tetangga. Stoma terdapat hampir pada semua bagian tubuh tumbuhan, tetapi jumlah terbanyak ditemukan pada daun dan batang yang masih muda. Pada daun yang berfotosintesa stoma terdapat baik pada permukaan atas maupun bagian bawah saja. Berdasarkan lokasi pada permukaan daun maka ada beberapa tipe stomata yaitu:

- a. *Amphistomatik* yaitu jika stoma berada pada kedua permukaan daun.
 - b. *Epistomatik* yaitu jika stoma hanya terdapat pada permukaan atas daun.
 - c. *Hipostomatik* yaitu jika stoma hanya terdapat di permukaan bawah daun
- (Wahidah, 2011: 59).

Bila diamati letak sel-sel penutup pada epidermis ada yang tepat pada permukaan epidermis ada pula yang berada di atas atau dibawah permukaan epidermis. Perbedaan letak sel-sel penutup ini sering di gunakan sebagai dasar untuk menentukan macam-macam stoma seperti berikut ini:

- a. Tipe *phaneropore* : jika sel-sel penutup terletak pada permukaan daun misalnya ditemukan pada tumbuhan hidrofita (tumbuhan di air).
- b. *Kriptopore* : jika sel-sel penutup terletak/tenggelam dibawah permukaan. Biasanya terdapat pada tumbuhan yang dapat hidup di daerah kering (*Xerofita*).

Sedangkan berdasarkan jumlah sel tetangganya maka stoma dibedakan menjadi beberapa tipe. Misalnya pada dikotil sebagai berikut:

- a. *Anomositik* : jumlah sel tetangga yang mengelilingi sel penjaga.
- b. *Animositik* : jumlah sel tetangga tiga.
- c. *Diasitik* : jumlah sel tetangga dua
- d. *Parasitik* : poros panjang sel penjaga sejajar dengan sel tetangga.
- e. *Aktinositik* : jumlah sel tetangga empat atau lebih
- f. *Siklositik* : jumlah sel tetangga empat atau lebih, sel-selnya tersusun melingkar seperti cincin (Wahidah, 2011 : 60-61).

Di sebelah setiap sel penjaga, biasanya terdapat satu atau beberapa sel epidermis lain yang berubah bentuk, yang di sebut sel pelengkap. Jumlah dan susunannya di tentukan oleh suku tumbuhannya (walaupun berbagai jenis bias di temui pada satu daun). Air menguap dalam daun, dari dinding sel parenkima palisade dan parenkima bunga karang, yang secara bersama di sebut mesofil, ke dalam ruang antarsel yang sinambung dengan udara di luar, saat stomata membuka. Karbondioksida mengikuti lintas difusi sebaliknya. Sebagian besar dinding sel mesofil berhubunga langsung dengan atmosfer daun bagian dalam, walaupun hal tersebut jarang bias di lihat pada sel palisade dalam gambar atau fotomikrograf irisan melintang daun. Susunan ini akan lebih jelas bila di buat irisan palisade yang sejajar dengan permukaan daun, serta akan sangat jelas terlihat pada mikrograf electron payar (Salisbury dan Ross, 1995: 78).

Stomata mulai berkembang menjelang aktifitas meristematik pada epidermis selesai, dan terus berkembang selama beberapa waktu, disaat daun memanjang dan meluas karena pembesaran sel. Pada daun yang bertulang sejajar, dan dengan stomata

tersusun dalam deretan memanjang, pembentukan stomata mulai di ujung dan melanjut ke arah dasar daun atau basipetal. Pada daun bertulang jala, seperti pada kebanyakan dikotil, terdapat stomata dalam taraf perkembangan yang berbeda-beda (Hidayat, 1995: 70).

Pada permulaannya sel-sel protoderm melangsungkan pembelahan-pembelahan yang terjadi beberapa kali. Dari hasil-hasil pembelahan ini sel-sel tertentu akan membentuk stomata. Sel-sel tersebut akan membelah dalam dua bagian yang biasanya tidak sama, yang masing-masing mempunyai dinding sel baru yang terbentuk secara antiklinal. Dari dua bagian sel yang tidak sama besar selanjutnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Sel yang berbentuk kecil

Sel ini akan tumbuh lebih dahulu, berbentuk bulat dan kemudian jorong, sel ini merupakan sel induk dari sel-sel penutup. Sel-sel induk dari sel penutup ini kemudian akan membelah lagi menjadi dua buah sel yang simetris yang dalam hal ini dinding-dinding selnya yang baru terletak longifudinal. Sedang dua sel anak yang terjadi bentuknya adalah seperti ginjal, sampai pada tahapan ini berarti telah terbentuk sepasang sel penutup. Selanjutnya dinding sel yang telah terbentuk karena mengalami perkembangan, dengan sendirinya akan mengalami pula retakan. Dengan demikian terjadilah porus diantara kedua sel penutup tersebut.

b. Sel yang besar

Sel yang besar karena pertumbuhan dan perkembangannya akan melangsungkan pula pembelahan-pembelahan. Selanjutnya terbentuk sel-sel yang dalam perkembangannya akan mengitari sel-sel penutup yang telah terjadi. Diantara sel-sel

yang mengitari ini, karena letaknya berdekatan dengan sel-sel penutup tersebut, sel-sel itu merupakan sel-sel tetangga (“*Subsidiary cells*”) (Sutrian, 2004: 143-144).

Sel tetangga atau sel lainnya didekat stoma dapat dibentuk oleh sel prazat yang sama seperti stoma. Selain itu, dapat juga dari sel yang secara ontogenik tidak berhubungan langsung dengan sel induk dari sel penutup. Atas dasar tersebut dapat di bedakan tiga tipe sel penutup:

- a. *Perigen* : sel penjaga dan sel tetangga berasal dari meristemoid yang sama.
- b. *Mesogen* : sel penjaga dan sel tetangga berasal dari meristemoid yang berbeda.
- c. *Mesoperigen* : salah satu sel tetangga atau lebih mempunyai asal yang sama dengan sel tetangga, sedang yang lain tidak (Wahidah, 2011: 63).

Perubahan bentuk dan gerakan pada sel-sel penutup ini tentu ada yang mendorongnya yaitu pengaruh-pengaruh dari luar, seperti pengaruh temperatur, air radiasi dan zat kimia. Se, ubungan dengan adanya dorongan-dorongan (yang bersifat pengaruh) itu maka terdapatlah beberapa istilah sebagai sebutan atas adanya dorongan-dorongan tersebut antara lain:

- a. Gerak-gerak yang dilakukan sel penutup- gerak nasti;
- b. Pengaruh gerak adalah temperature - gerak termonasti
- c. Pengaruh gerak adalah air- hidronasti
- d. Pengaruh gerak adalah cahaya-fotonasti
- e. Pengaruh gerak adalah zat-zat kimia- khemonasti (Sutrian, 2004: 146).

Secara umum, stoma tersusun atas dua sel penutup dan beberapa sel tetangga yang mengelilinginya. Pada sebelah dalam sel penutup terdapat rongga atau ruang stomata. Ruang ini berhubung-hubungan dengan ruang-ruang antar sel mesofil daun. Pada saat penyerapan gas, gas-gas dari atmosfer masuk ke ruang stomata melalui

stomata secara difusi sederhana. Gas-gas didorong oleh adanya gradien tekanan gas secara partial, atau ada beda potensial kimia gas antara atmosfer dan ruang stoma. Pada siang hari dimana stomata umumnya membuka (kecuali tumbuhan gurun), melalui stomata masuk gas-gas CO_2 , karena tekanan partial CO_2 atmosfer lebih besar dibanding tekanan partial pada ruang antar sel dan stoma. Seiring dengan itu, O_2 dari fotosintesis mengalir keluar karena tekanan partial O_2 di ruang antar sel lebih besar daripada atmosfer, selain gas H_2O yang merupakan sisa metabolisme. Karenanya kontrol laju hilangnya air selain mengatur tingkat konduktivitas stoma, juga mengendalikan laju respirasinya (Suyitno, 2006: 4).

Secara umum, stomata membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Hal ini mencegah tumbuhan kehilangan air yang tidak perlu ketika hari terlalu gelap untuk melakukan fotosintesis. Paling tidak ada tiga faktor yang menjelaskan mengenai pembukaan stomata pada pagi hari. Pertama, cahaya itu sendiri merangsang sel penjaga untuk mengakumulasi kalium dan menjadi bengkak. Respon ini dipicu oleh pencahayaan reseptor cahaya biru pada sel penjaga, yang barangkali dibangun di dalam membran plasma. Aktivasi reseptor cahaya biru ini merangsang aktivitas pompa proton pada membran plasma sel penjaga dengan menggunakan ATP, yang pada gilirannya, mengawali pengambilan K^+ . Cahaya bisa juga merangsang pembukaan stomata dengan cara mendorong fotosintesis dalam kloroplas sel penjaga, untuk menyediakan ATP agar terjadi transport aktif ion hydrogen. Faktor kedua yang menyebabkan pembukaan stomata adalah kehilangan CO_2 di dalam ruangan udara pada daun, yang terjadi ketika fotosintesis dimulai di mesofil. Faktor ketiga dalam pembukaan stomata adalah suatu jam internal yang terletak di dalam sel penjaga (Campbell, *at all*, 1999: 331).

Stomata menutup bila selisih kandungan uap air di udara dan di ruang antar sel melebihi titik kritis gradien yang besar cenderung mendorong gerakan pembukaan dan penutupan dalam selang waktu sekitar 30 menit. Hal itu mungkin disebabkan oleh karena gradien uap yang tajam mendorong penutupan stomata, sehingga CO_2 berkurang dan stomata akhirnya membuka. Respon paling cepat terhadap kelembapan yang rendah terjadi pada saat tingkat cahaya rendah. Potensial air di daun juga sangat berpengaruh pada pembukaan dan penutupan stomata. Bila potensial air menurun, stomata menutup. Pengaruh ini dapat dilawan oleh tingkat CO_2 rendah dan cahaya terang. (Salisbury dan Ross, 1995: 84).

Banyak faktor mempengaruhi aktivitas buka-tutupnya stoma. Kondisi lingkungan tersebut antara lain seperti konsentrasi CO_2 , suhu, kelembaban udara, intensitas pencahayaan, dan kecepatan angin. Pada umumnya stoma membuka pada siang hari, kecuali tumbuhan gurun. Membukanya stomata pada malam hari untuk tumbuhan gurun merupakan bentuk adaptasi fisiologis untuk mengurangi resiko hilangnya air berlebihan (Suyitno, 2006: 5).

Tegangan turgor yang bertambah dalam sel-sel penutup di karenakan air di sekitar sel-sel penutup terhisap didalamnya, menyebabkan terbukanya stomata. Adapun tertariknya air kedalam sel-sel penutup adalah karena konsentrasi gula dalam cairan sel penutup menjadi naik, dan permeabilitas plasma terhadap air bertambah, yang kesemuanya dikarenakan oleh aktifitas enzim amilase, diastase dan fosforilase serta oleh naiknya pH cairan sel penutup. Adapun aktifitas enzim serta kenaikan pH itu dikarenakan dalam sel-sel penutup berlangsung proses-proses fotosintesis, sebagian CO_2 akan diasimilir selanjutnya dengan pengaruh cahaya matahari akan berlangsung asimilasi, yang dalam proses ini memungkinkan naiknya pH cairan sel,

yang pada proses ini pula (fotosintesis) dalam sel-sel penutup akan terbentuk gula (Sutrian, 2004: 149).

Meskipun stomata telah di kenal untuk menanggapi CO₂ hampir 90 tahun, mekanisme respon ini dan perannya dalam menentukan konduktansi stomata masih di perdebatkan sampai saat ini. Selama sebagian besar kontroversi ini telah di asumsikan bahwa sel penjaga merasakan konsentrasi CO₂ dalam daun, yaitu pada ruang-ruang antar, bukan di luar daun. Lebih spesifik, kebanyakan studi menganggap bahwa sel penjaga menanggapi hanya untuk konsentrasi CO₂ di hitung sebagai “*interiseluler*” (Mott, 1987: 200).

E. Naungan

Di atas tingkat radiasi tertentu yang di sebut keadaan jenuh cahaya, peningkatan cahaya tidak lagi meningkatkan fotosintesis. Antara keadaan gelap dan jenuh terhadap tingkat radiasi dengan fotosintesis persis seimbang dengan respirasi, ini dinamakan titik kompensasi cahaya. Titik ini beragam menurut spesies, tingkat radiasi selama pertumbuhan, suhu saat pengukuran, dan konsentrasi CO₂, tapi pada daun yang tumbuh di bawah matahari biasanya sekitar 2% dari cahaya matahari penuh. Perbedaan titik kompensasi cahaya terutama di sebabkan oleh perbedaan laju respirasi gelap. Bila respirasi lambat, daun memerlukan lebih sedikit cahaya untuk berfotosintesis untuk mengimbangi CO₂ yang di lepaskan, sehingga titik kompensasi cahaya menjadi rendah pula (Salisbury dan Ross, 1995: 74).

Naungan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap radiasi matahari yang diterima oleh tanaman, baik intensitas maupun kualitasnya, sehingga akan sangat berpengaruh dalam aktifitas tanaman (Suryawati, *et all*, 2007: 153).

Fiksasi CO₂ maksimum terjadi sekitar tengah hari, yaitu pada saat intensitas cahaya mencapai puncaknya. Penghalangan cahaya matahari oleh para-para atau naungan akan mengurangi laju fotosintesis. Radiasi sinar matahari dapat memberikan efek tertentu pada tumbuhan bila cahaya tersebut diabsorpsi. Secara fisiologis cahaya mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung melalui fotosintesis dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan dan perkembangan tanaman akibat respon metabolik yang langsung (Fitter dan Hay, 1991 dalam Haryanti, 2010: 22) .

Banyak spesies memerlukan naungan pada awal pertumbuhannya, walaupun dengan bertambahnya umur naungan dapat dikurangi secara bertahap. Beberapa spesies yang berbeda mungkin tidak memerlukan naungan dan yang lain mungkin memerlukan naungan mulai awal pertumbuhannya. Pengaturan naungan sangat penting untuk menghasilkan semai-semai yang berkualitas. Naungan berhubungan erat dengan temperatur dan evaporasi. Oleh karena adanya naungan, evaporasi dari semai dapat dikurangi. Beberapa spesies lain menunjukkan perilaku yang berbeda. Beberapa spesies dapat hidup dengan mudah dalam intensitas cahaya yang tinggi tetapi beberapa spesies tidak (Suhardi *et all*, 1995 dalam Irwanto, 2006: 4).

Ada perbedaan tanggapan terhadap peningkatan intensitas cahaya antara tumbuhan yang cocok untuk kondisi ternaung (*shade plants* dan *indoor plants*) dengan tumbuhan yang biasa tumbuh pada kondisi tidak ternaung. Perbedaan tersebut adalah :

1. Tumbuhan cocok-ternaung menunjukkan laju fotosintesis yang sangat rendah pada intensitas cahaya tinggi di banding tumbuhan cocok-terbuka.

2. Laju fotosintesis tumbuhan cocok-ternaung mencapai titik jenuh pada intensitas cahaya yang lebih rendah di banding tumbuhan cocok-terbuka.
3. Laju fotosintesis tumbuhan cocok-ternaung lebih tinggi di banding tumbuhan cocok-terbuka pada intensitas cahaya yang sangat rendah.
4. Titik kompensasi cahaya untuk tumbuhan cocok-ternaung lebih rendah disbanding tumbuhan cocok-terbuka. Perbedaan-perbedaan di atas yang menyebabkan tumbuhan cocok-ternaung dapat bertahan hidup pada kondisi ternaungi (intensitas cahaya yang sangat rendah) di mana tumbuhan cocok-terbuka tidak dapat bertahan hidup (Lakitan, 2011 :161-162).

Respon *Alocasia* khas bagi banyak spesies asli habitat di bawah naungan (tumbuhan ternaung), termasuk sebagian besar tanaman di dalam rumah. Pertama, spesies tersebut mempunyai laju fotosintesis yang jauh lebih rendah pada cahaya matahari yang terang di dibandingkan dengan tanaman budidaya atau tumbuhan lain yang tumbuh di daerah terbuka. Kedua, respon fotosintesisnya mencapai jenuh pada tingkat radiasi yang jauh lebih rendah di dibandingkan dengan spesies lainnya. Ketiga, mereka biasanya berfotosintesis pada laju yang lebih tinggi di dibandingkan dengan spesies lainnya. Keempat, titik kompensasi cahayanya sangat rendah. Sifat tersebut menyebabkan mereka tumbuh sangat lambat pada habitat aslinya yang ternaungi, mereka bertahan hidup saat spesies lain yang mempunyai titik kompensasi cahaya lebih tinggi tidak mampu berfotosintesis dan akan mati. Hal yang sangat rumit yang terjadi di lantai hutan ialah kerlip cahaya matahari yang menembus tajuk pohon dan dapat menyinari daun terlindung selama sepersekian detik ketika angin menerpa daun sampai beberapa menit (Salisbury dan Ross, 1995: 74-75).

Upaya penerapan teknologi naungan tertutup dibidang usaha produksi hasil pertanian adalah sebagai bentuk penciptaan lingkungan fisik tanaman (iklim mikro) agar sesuai dengan kebutuhan hidup tanaman dan dapat memberikan hasil produksi yang optimal. Dampak perlakuan naungan tertutup dalam aplikasi ini yaitu:

1. Suhu udara di dalam naungan ($21-34^{\circ}\text{C}$) adalah mendekati suhu udara yang di persyaratkan, sedang suhu udara di luar naungan ($20-39^{\circ}\text{C}$).
2. Suhu tanah dalam naungan ($20-42^{\circ}\text{C}$) sedang di luar ruangan ($20-50^{\circ}\text{C}$).
3. Kelembaban udara harian dalam naungan berkisar antara 50-90%, sedang di luar naungan 42-90%.
4. Laju fotosintesa di dalam naungan lebih tinggi daripada fotosintesa di luar naungan.
5. Kecepatan angin di dalam naungan lebih rendah daripada di luar naungan, hal ini berdampak positif terhadap penyerbukan, dan pembukaan stomata (Sudaryono, 2004: 61).

Pada pohon, semak, dan beberapa tumbuhan herba, sebagian daunnya berkembang di bawah naungan daun lainnya dan selama perkembangannya memperoleh cirri sangat menyerupai daun tumbuhan naungan yang sesungguhnya. Daun tersebut di namakan daun naungan, lawan dari daun matahari yang berkembang pada cahaya terang. Pada tumbuhan dikotil, daun naungan berukuran lebih besar tapi lebih tipis di bandingkan dengan daun matahari. Daun matahari menjadi lebih tebal daripada daun naungan karena membentuk tambahan sel palisade yang lebih kurang panjang atau membentuk tambahan lapisan sel palisade. Berdasarkan bobot, daun naungan umumnya juga mempunyai klorofil lebih banyak, khususnya klorofil *b*, terutama karena tiap kloroplas mempunyai lebih banyak grana di bandingkan dengan

pada daun matahari. Di lain pihak, kloroplas daun naungan mempunyai protein stroma total lebih sedikit, termasuk rubisko, dan mungkin juga protein pengangkut electron tilakoid lebih sedikit daripada daun matahari. Jadi daun naungan menggunakan lebih banyak energi untuk menghasilkan pigmen permanen-cahaya yang memungkinkannya mampu menggunakan semua cahaya dalam jumlah terbatas yang mengenainya. Apalagi kloroplas di daun yang sangat ternaungi menjadi tersusun secara fototaksis (di dalam sel) dalam pola yang memaksimumkan penyerapan cahaya (Salisbury dan Ross, 1995: 76).

Perbedaan berat basah dan berat kering daun mungkin disebabkan karena adanya perbedaan luas daun yang disebabkan karena pemberian intensitas cahaya matahari, dimana pada pemberian intensitas cahaya matahari tinggi, akan menyebabkan daunnya tanaman lebih luas, sedang pada intensitas cahaya matahari rendah akan menyebabkan daun tumbuhannya lebih sempit. Kemungkinan lain yang menyebabkan perbedaan berat basah dan berat kering daun ini diduga ada hubungannya dengan jumlah daun yang terbentuk, sehingga akan berbeda pula berat basah dan berat kering daunnya (Parman, 2010: 34).

Produksi biomasa tanaman termasuk bagian yang bernilai ekonomis (bagian yang dipanen) tersusun sebagian besar dari hasil fotosintesis. Sementara radiasi matahari, sebagai sumber utama cahaya bagi tanaman, menjadi salah satu syarat utama kelangsungan proses fotosintesis. Pengaruh dari radiasi matahari pada pertumbuhan tanaman dapat dilihat sangat jelas pada tanaman yang tumbuh dibawah naungan. Pertumbuhan tanaman di bawah naungan semakin terhambat bila tingkat naungan semakin tinggi. Apabila semua faktor pertumbuhan tidak terbatas, tingkat

pertumbuhan tanaman atau produksi biomasa tanaman pada akhirnya akan dibatasi oleh tingkat energi radiasi matahari yang tersedia (Sitompul, 2002: 79).

Aplikasi naungan dimaksudkan untuk memodifikasi lingkungan mikro tanaman, karena akan mengubah kuantitas dan kualitas faktor lingkungan yang ada antara lain radiasi matahari, suhu, dan kelembaban. Tanaman beradaptasi terhadap naungan melalui dua cara yaitu peningkatan luas daun untuk meminimalkan penggunaan metabolit dan pengurangan jumlah cahaya yang ditransmisikan dan direfleksikan (Paishal, 2005: 17).

Naungan memberikan manfaat untuk mengatur intensitas penyinaran matahari, tinggi rendahnya suhu, kelembaban udara dan menahan angin. Selain itu juga unsure hara tercukupi karena mendapatkan penyinaran yang cukup, sehingga aktifitas fotosintesis akan berjalan dengan optimal dan menyebabkan asimilat yang dibutuhkan oleh tanaman dapat memenuhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Pada siang hari naungan juga berperan untuk mengurangi tingginya suhu maksimum dengan cara menahan cahaya matahari yang diterima tanaman dan pada malam hari naungan mengurangi turunnya suhu minimum dengan cara menghambat radiasi panas dari bumi ke atmosfer (Nurshanti, 2011: 14).

Tangkai daun dikotil juga tanggap terhadap arah dan intensitas cahaya dengan membengkok, menyebabkan helai daun bergerak ke tempat yang kurang ternaungi. Faktor tersebut memungkinkan terjadinya penambatan CO₂ neto pada tingkat yang rendah dengan kebutuhan energi minimum untuk menghasilkan dan memelihara perangkat fotosintesis. Meskipun demikian, daun matahari dan daun naungan dari spesies yang sama sering berselisih sampai lima kali lipat dalam kapasitas fotosintesis. Daun dewasa memperlihatkan daya adaptasi yang sangat rendah

terhadap naungan atau cahaya matahari, tapi adaptasi beberapa tumbuhan secara keseluruhan cukup tinggi terhadap kedua keadaan tersebut selama perkembangannya, terutama adaptasi adaptasi terhadap naungan. Tentu terdapat keterbatasan adaptasi karena faktor genetic. Beberapa tumbuhan nampak cenderung termasuk tumbuhan naungan (misalnya *Alocasa*), lainnya cenderung termasuk tumbuhan cahaya (misalnya bunga matahari, *Helantius annus*), tapi sebagian besar dapat termasuk keduanya (*fakultatif*), tumbuhan naungan atau tumbuhan matahari. Jadi titik kompensasi cahayanya menurun (terutama di sebabkan respirasinya yang jauh lebih lambat), fotosintesisnya jauh lebih lambat, dan menjadi jenuh pada tingkat cahaya yang lebih rendah. Tumbuhan tersebut lambat laun mengembangkan kemampuan untuk tumbuh di bawah naungan, tapi pertumbuhannya lambat. Adaptasi yang sebaliknya dari kondisi naungan ke cahaya lebih tidak lazim. Tumbuhan naungan biasanya tidak dapat di pindahkan ke cahaya matahari langsung tanpa menghambat fotosintesis dan kematian daun dewasa dalam beberapa hari (Salisbury dan Ross, 1995: 76-77).

F. Integrasi Keilmuan

Allah SWT berfirman dalam surah As syu'araa ayat 7 :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۚ

Terjemahnya : Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

Menurut Quthb, (2003: 325) bahwa mukjizat mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang baik hidup di bumi dan dijadikannya berpasang-pasangan (jantan dan betina). Kadangkala keduanya terpisah seperti yang terjadi pada sebagian golongan

tumbuh-tumbuhan, dan kadangkala terhimpun menjadi satu seperti yang terjadi pada sebagian besar tumbuh-tumbuhan, di mana unsur-unsur jantan dan betina menyatu dalam satu tunas. Mukjizat ini terjadi berulang-ulang di bumi di sekitar tempat tinggal manusia pada setiap waktu.

Dalam tafsir di atas dijelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan dijadikan berpasangan (jantan dan betina) yang terhimpun menjadi satu atau dalam satu tunas, dimana kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) merupakan tanaman yang merambat dengan satu tunas dan unsur-unsur jantan dan betina menyatu dalam satu batang. Dalam perkembangbiakan tumbuhan ini dapat melalui penanaman stek batang.

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi....”

Sebetulnya perkara itu tidak butuh kepada lebih daripada suatu perhatian. Sesungguhnya metode Al Qur'an dalam mendidik adalah menyatukan antara hati dan fenomena-fenomena alam semesta. Ia menggugah indra yang keras dan pikiran yang bodoh serta hati yang terkunci agar menyaksikan dan memperhatikan keindahan dan keistimewaan ciptaan Allah yang tersebar disekitar manusia pada setiap zaman dan tempat. Itu semua dimaksudkan agar alam semesta yang hidup ini berpadu dengan hati yang hidup pula. Allah mengawasinya dan ia pun merasakan keberadaan-Nya dalam setiap waktu baik di siang maupun malam hari. Ia merasakan bahwa dirinya hanyalah salah satu dari hamba-hamba-Nya, selalu berhubungan dengan makhluk-makhluk-Nya dan selalu terikat dengan hokum yang mengatur mereka semua. Ia memiliki peran khusus dalam alam semesta ini, khususnya di muka bumi ini, di mana Allah telah menjadikannya khalifah di atasnya

“...Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”

Tumbuh-tumbuhan itu mulia dengan segala kehidupan yang ada didalamnya yang bersumber dari Allah yang maha mulia. Ungkapan ini mengisyaratkan kepada jiwa untuk menerima dan merespon ciptaan Allah dengan sikap yang memuliakan, memperhatikan, dan memperhitungkannya, bukan menghinakan, melalaikan, dan meremehkannya.


Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang Allah ciptakan dengan berbagai maksud dan tujuan tertentu. Tumbuh-tumbuhan yang baik hidup di bumi dan dijadikannya berpasang-pasangan (jantan dan betina), sebagai contoh yaitu tumbuhan kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) yang dapat berkembangbiak dengan cara stek.

Ungkapan Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik, seperti dengan kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) yang memiliki manfaat di antaranya yaitu di jadikan sebagai sayuran yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu menurut penelitian Nurjannah DKK (2014), kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) dalam bentuk segar mengandung kadar air yang tinggi (90,00%), protein rendah (2,35%), lemak rendah (0,55%), karbohidrat (6,02%) dan abu (1,09%) serta abu tidak larut asam sebesar 0,10%. Ekstrak kasar kangkung air terdeteksi senyawa alkaloid, steroid, fenol hidrokuinon dan karbohidrat. Ekstrak kasar tersebut memiliki aktivitas antioksidan dengan IC₅₀ 290,95 ppm terdapat pada ekstrak kasar daun dengan pelarut metanol.

G. Hipotesis

Pemberian naungan yang berbeda dapat mempengaruhi jumlah stomata dan ukuran porus stomata daun kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk).

H. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimental. Penelitian dilaksanakan di dalam dan diluar laboratorium, Laboratorium Botani Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Balai Karantina Pertanian Makassar pada rentang waktu bulan Mei-Juli 2015.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimental. Sebab pada penelitian ini menggunakan pengontrolan variabel, pemberian perlakuan dan menggunakan pengujian hasil.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Variabel bebas dari penelitian ini adalah naungan.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat dari penelitian ini jumlah stomata dan ukuran porus stomata daun kangkung air.

D. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yakni naungan, dengan tiga perlakuan yaitu naungan satu lapis (A), naungan 2

lapis (B) dan tanpa naungan (C). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali sehingga terdapat sembilan unit percobaan. Masing-masing unit percobaan terdiri atas satu pot yang berisi 3 batang (stek) tanaman kangkung air yang digunakan dalam percobaan. Jenis naungan yang digunakan adalah paranet berwarna putih. Unit percobaan yang mendapatkan naungan diletakkan di bawah naungan buatan.

Tabel 3.1 : Rancangan acak lengkap

No.	Perlakuan	Ulangan	Per. dlm ulangan	Hasil acakan
1	A	1	A1	A1
2	B		B1	C3
3	C		C1	C2
4	A	2	A2	B3
6	C		C2	B2
7	A	3	A3	B1
8	B		B3	A3
9	C		C3	A2

1	2	3
A1	C1	B1
C3	B3	A3
C2	B2	A2

Ket : A : Kangkung Air di bawah naungan 1 lapis (sedang)
 B : Kangkung Air di bawah naungan 2 lapis (teduh)
 C : Kontrol (panas)

E. Defenisi Operasional Variabel

1. Naungan merupakan bahan yang terbuat dari plastik berwarna putih untuk menghalangi sinar matahari. Dengan memakai naungan 1 lapis, dan naungan 2 lapis.
2. Stomata merupakan stomata yang terdapat pada permukaan atas dan bawah daun kangkung air yang di naungi dan tidak dinaungi.
3. Jumlah stomata yaitu semua stomata yang terdapat pada daun kangkung air dengan penghitungan manual di bawah mikroskop.

4. Ukuran porus stomata merupakan stomata yang terdapat pada daun kangkung air yang meliputi panjang dan lebar porus stomata.
5. Kangkung air adalah tanaman yang di tanam dalam pot.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode pengamatan langsung di bawah mikroskop.

G. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah plastik, kutek, selotip, gunting, mikroskop binokuler, mikroskop Primo Star, komputer, gelas benda

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah daun kangkung air dan label.

H. Prosedur Kerja

1. Penyiapan batang stek

Stek kangkung air yang digunakan berasal dari batang tua bagian tengah, memiliki tiga ruas dengan satu ruas ditanam di dalam tanah. Sebelum ditanam, pangkal batang bagian bawah dipotong miring. Stek kangkung air yang digunakan harus seragam meliputi bagian batang yang diambil, tinggi dan diameter batang stek.

2. Persiapan media tanam


Media tanam yang digunakan adalah tanah. Media tanam kemudian dimasukkan ke dalam pot ukuran diameter 40 cm x 50 cm. Penanaman Stek kangkung air ditanam sebanyak lima stek per pot dan ditempatkan di ruang terbuka. Kangkung air yang mendapatkan perlakuan naungan dipindahkan ke bawah naungan buatan setelah tanam.

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman kangkung air yang dilakukan yaitu penyiraman dengan frekuensi satu kali dalam satu hari. Penyiraman ini dilakukan jika tidak turun hujan.

4. Pengamatan

Pengamatan stomata dilakukan pada saat tanaman berumur 2 bulan dengan mengamati epidermis bawah dan atas daun kangkung air. Pembuatan preparat untuk pengamatan stomata dilakukan dengan metode replika (Haryanti, 2010) yaitu permukaan bawah daun diolesi kutek dan dibiarkan mengering. Kemudian kutek dikelupas menggunakan isolasi dan diletakan di atas gelas benda. Untuk pengamatan jumlah stomata, preparat diamati dibawah mikroskop binokuler dengan perbesaran 40 kali. Anatomi yang diamati adalah jumlah stomata. Pengukuran porus stomata dilakukan menggunakan aplikasi *measurements* (satuan pengukuran) dari mikroskop Primo Star yang tersambung dengan komputer dengan cara sebagai berikut:



Gambar 3.1 Cara Mengukur Porus Stomata. Sumber : Usman (2015)

5. Pembuatan Preparat

Menurut Haryanti (2010), metode pembuatan preparat untuk melihat stomata adalah metode replika yaitu:

1. Daun- daun yang sudah diambil permukaan atas dan bawahnya dibersihkan ditiup atau dengan tissue untuk menghilangkan debu atau kotoran.
2. Olesi dengan kutek, dibiarkan 10 menit, supaya kering
3. Olesan yang sudah kering ditemplel isolasi dan diratakan
4. Isolasi dikelupas/diambil pelan-pelan, lalu tempelkan pada gelas benda
5. Diratakan dan diberi label pada sebelah kiri dengan keterangan jenis tanamannya.
6. Pengamatan jumlah stomata per bidang pandang menggunakan mikroskop dengan perbesaran yang sama (40 x 10)
7. Cara penghitungan stomata dengan menghitung secara manual.
8. Pengukuran porus stomata dilakukan dengan mikroskop Primor Star yang tersambung dengan komputer. Mula-mula preparat diletakkan pada meja benda, dicari bayangannya. Setelah gambar stomata muncul pada komputer menggunakan metode *measurements* (satuan pengukuran) selanjutnya ditarik garis lurus pada bagian panjang dan lebar porus stomata. Ukuran porus stomata akan tampil di samping stomata yang telah di ukur.

I. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisis sidik ragam. Apabila ada pengaruh nyata pada perlakuan maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan taraf kepercayaan 5%.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di dapatkan hasil jumlah stomata pada permukaan daun kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk). Adapun jumlah stomata pada daun kangkung air yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah Stomata

a. Permukaan Atas

Table 4.1: Jumlah Stomata Pada Setiap Perlakuan

No.	Perlakuan	Ulangan			Total	Rata-rata
		1	2	3		
1	A	189	186	186	561	187
2	B	170	165	166	501	167
3	C	166	191	192	549	183
Jumlah		525	542	544	1611	537

Keterangan: A: Naungan 1 lapis (Sedang)

B: Naungan 2 lapis (Teduh)

C: Kontrol (Panas)

Setelah dilakukan uji Anova (analisis sidik ragam) pada taraf signifikan 5 % hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah stomata pada daun. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2: Analisis Sidik Ragam

sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	672	336	0.75	5.14325285
galat	6	454	448		
total	8	1126			

Karena hasil analisis sidik ragam tidak menunjukkan perbedaan nyata karena F hitung < F tabel, maka tidak dilakukan uji lanjut BNT. Oleh karena tidak ada perbedaan pada perlakuan yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pada naungan tersebut, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b. Permukaan Bawah

Tabel 4.3: Jumlah Stomata Pada Permukaan Bawah Daun

No	Perlakuan	Ulangan			Total	Rata-rata
		1	2	3		
1	A	390	385	386	1161	387
2	B	201	205	206	612	204
3	C	400	401	402	1203	401
Jumlah		991	991	994	2976	992

Keterangan: A: Naungan 1 lapis (Sedang)

B: Naungan 2 lapis (Teduh)

C: Kontrol (Panas)

Setelah dilakukan analisis sidik ragam pada taraf signifikan 5 % hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh terhadap jumlah stomata pada daun. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4: Analisis Sidik Ragam

sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	72494	36247	7249.4	5.14325285
galat	6	30	5		
total	8	72524			

Karena hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya perbedaan nyata pada perlakuan karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dilakukan uji lanjut BNT untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar perlakuan. Adanya perbedaan pada setiap perlakuan maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh pada naungan tersebut. Oleh karena adanya pengaruh dari naungan maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.


Adapun hasil uji lanjut BNT yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5: Nilai BNT 0,05 Pada Setiap Perlakuan

Perlakuan	Rata-rata	Nilai BNT 0,05
A	387ab	388,295
B	204a	205,295
C	401ab	402,295

Keterangan : Angka yang di ikuti huruf yang sama berarti Tidak berbeda nyata menurut BNT 5%

Berikut adalah beberapa gambar jumlah stomata/bidang pandang pada permukaan atas dan bawah daun kangkung air pada beberapa perlakuan:




Gambar 4.1 : Stomata Permukaan Atas dan Bawah Daun perbesaran 40 x 10

Keterangan : A : Stomata naungan 1 lapis (Sedang)

B : Stomata naungan 2 lapis (Teduh)

C : Stomata tanpa naungan/kontrol (Panas)

Jumlah stomata pada permukaan atas dan bawah daun kangkung air dapat dilihat pada gambar histogram berikut ini:



Gambar 4.2 : Histogram jumlah stomata pada permukaan atas dan bawah daun kangkung air

2. Ukuran Porus Stomata

a. Permukaan Atas Daun

1. Panjang Porus Stomata

Tabel 4.6 Ukuran panjang porus stomata pada setiap perlakuan (mikron)

No.	Perlakuan	Ulangan			Total	Rata-rata
		1	2	3		
1	A	20.55	22.22	19.56	62.33	20.77
2	B	16.88	19.01	25.55	61.44	20.48
3	C	22.06	16.68	22.13	60.87	20.29
Jumlah		59.49	57.91	67.24	184.64	61.54

Keterangan: A: Naungan 1 lapis (Sedang)

B: Naungan 2 lapis (Teduh)

C: Kontrol (Panas)

Setelah di lakukan analisis sidik ragam pada taraf signifikan 5 % hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh terhadap jumlah stomata pada daun. Hasil analisis dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 : Analisis Sidik Ragam

sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	0.00029	5682.5	529.824	5.14325285
galat	6	64.3519	10.725		
total	8	64.3522			

Karena hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya perbedaan nyata pada perlakuan karena $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka di lakukan uji lanjut BNT untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar perlakuan. Adanya perbedaan pada setiap perlakuan maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh pada naungan tersebut. Oleh karena adanya pengaruh dari naungan maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Adapun hasil uji lanjut BNT yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8: Nilai BNT 0,05 pada setiap perlakuan

Perlakuan	Rata-rata	Nilai BNT 0,05
A	20,77ab	22,065
B	20,48ab	21,775
C	20,29a	21,585

Keterangan: Angka yang di ikuti huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata menurut BNT 5%

2. Lebar Porus Stomata

Adapun ukuran lebar porus stomata pada permukaan atas daun kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9: Ukuran Lebar porus stomata permukaan atas daun (mikron)

No.	Perlakuan	Ulangan			Total	Rata-rata
		1	2	3		
1	A	3.96	3.16	5.07	12.19	4.06
2	B	4.67	4.86	6.85	16.38	5.46
3	C	3.73	2.84	4.47	11.04	3.68
JUMLAH		12.36	10.86	16.39	39.61	13.2

Keterangan: A: Naungan 1 lapis (Sedang)

B: Naungan 2 lapis (Teduh)

C: Kontrol (Panas)

Setelah di lakukan analisis sidik ragam pada taraf signifikan 5 % hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh terhadap jumlah stomata pada daun.

Adapun hasil analisis dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10: Analisis Sidik Ragam

sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	0.0906	269.4	143.5	5.14325285
galat	6	11.264	1.877		
total	8	11.354			

Karena hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya perbedaan nyata secara statistik, maka di lakukan uji lanjut BNT untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar perlakuan. Adanya perbedaan pada setiap perlakuan maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh pada naungan tersebut. Oleh karena adanya pengaruh dari naungan, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.


Adapun hasil uji lanjut BNT yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.11: Nilai BNT 0,05 pada setiap perlakuan

Perlakuan	Rata-rata	Nilai BNT 0,05
A	4,06ab	5,355
B	5,46ab	6,755
C	3,68a	4,975

Keterangan: Angka yang di ikuti huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata menurut BNT 5%

Berikut adalah gambar ukuran panjang dan lebar porus stomata pada permukaan atas daun kangkung air pada beberapa naungan:




Gambar 4.3 : ukuran porus stomata permukaan atas daun perbesaran 40 x 10

Keterangan : A : Stomata naungan 1 lapis (Sedang)

B : Stomata naungan 2 lapis (Teduh)

C : Stomata tanpa naungan/kontrol (Panas)

Ukuran porus stomata pada permukaan atas daun kangkung air dapat dilihat pada gambar histogram berikut ini:



Gambar 4.4 : Histogram panjang dan lebar porus stomata pada permukaan atas daun kangkung air

b. *Permukaan Bawah Daun*

1. Panjang Porus Stomata

Tabel 4.12: Ukuran Panjang Porus Stomata Permukaan Bawah Daun (mikron)

No.	Perlakuan	Ulangan			Total	Rata-rata
		1	2	3		
1	A	23.24	22.43	24.59	70.26	23.42
2	B	18.6	22.94	18.16	59.7	19.9
3	C	19.9	25.68	21.93	67.51	22.5
Jumlah		61.74	71.05	64.68	197.47	65.82

Keterangan: A: Naungan 1 lapis (Sedang)

B: Naungan 2 lapis (Teduh)

C: Kontrol (Panas)

Setelah di lakukan analisis sidik ragam pada taraf signifikan 5 % hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh terhadap panjang porus stomata permukaan bawah daun.

Adapun hasil analisis sidik ragam dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13: Analisis Sidik Ragam

sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	0.0139	6529.1	731.79	5.143253
galat	6	53.532	8.922		
total	8	53.546			

Karena hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya perbedaan nyata secara statistik, maka di lakukan uji lanjut BNT untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar perlakuan. Adanya perbedaan pada setiap perlakuan maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh pada naungan tersebut. Oleh karena adanya pengaruh dari naungan maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Adapun hasil uji lanjut BNT yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.14: Nilai BNT 0,05 pada setiap perlakuan

Perlakuan	Rata-rata	Nilai BNT 0,05
A	4,06ab	5,355
B	5,46ab	6,755
C	3,68a	4,975

Keterangan: Angka yang di ikuti huruf yang sama berarti Tidak berbeda nyata menurut BNT 5%

2. Lebar Porus

Tabel 4.15: Ukuran Lebar Porus Stomata Permukaan Bawah Daun (mikron)

No.	perlakuan	ulangan			Total	rata-rata
		1	2	3		
1	A	6.6	4.55	5.22	16.37	5.45
2	B	5.5	6.17	7.03	18.7	6.23
3	C	5.01	5	6.06	16.07	5.35
JUMLAH		17.11	15.72	18.31	51.14	17.03

Keterangan: A: Naungan 1 lapis (Sedang)

B: Naungan 2 lapis (Teduh)

C: Kontrol (Panas)

Setelah di lakukan analisis sidik ragam pada taraf signifikan 5 % hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh terhadap jumlah stomata pada daun.

Adapun hasil analisis sidik ragam dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16: Analisis Sidik Ragam

sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	0.0143	437.96	480.277	5.14325285
galat	6	5.4713	0.9119		
total	8	5.4856			

Karena hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya perbedaan nyata secara statistik, maka di lakukan uji lanjut BNT untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar perlakuan. Adanya perbedaan pada setiap perlakuan maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh pada naungan tersebut. Oleh karena adanya pengaruh dari naungan maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.


Adapun hasil uji lanjut BNT yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.17: Nilai BNT 0,05 pada setiap perlakuan

Perlakuan	Rata-rata	Nilai BNT 0,05
A	5,45ab	6,745
B	6,23ab	7,525
C	5,35a	6,645

Keterangan: Angka yang di ikuti huruf yang sama berarti Tidak berbeda nyata menurut BNT 5%

Berikut adalah gambar ukuran panjang dan lebar porus stomata pada permukaan bawah daun kangkung air pada beberapa naungan:




Gambar 4.5 : Ukuran Porus Stomata Permukaan Bawah Daun Perbesaran 40 x 10

Keterangan : A : Stomata naungan 1 lapis (Sedang)

B : Stomata naungan 2 lapis (Teduh)

C : Stomata tanpa naungan/kontrol (Panas)

Ukuran panjang dan lebar porus stomata pada permukaan atas daun dapat dilihat pada gambar histogram dibawah ini:



Gambar 4.6 : Histogram ukuran panjang dan lebar porus stomata permukaan bawah daun setelah perlakuan

B. Pembahasan

1. Jumlah Stomata

a. Permukaan Atas Daun

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada daun kangkung diperoleh hasil bahwa stomata di temukan pada permukaan atas dan bawah daun kangkung air. Jumlah stomata berbeda-beda pada setiap perlakuan. Jumlah stomata pada permukaan atas daun menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan hasil analisis ragam. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel ($0,75 < 5.14325285$) yang berarti tidak ada perbedaan pada setiap perlakuan.

Pada permukaan daun terdapat banyak stomata, yang memungkinkan terjadinya difusi CO_2 secara maksimum ke dalam daun pada saat stomata terbuka. Sel-sel pengawal yang mengelilingi stomata mengendalikan pembukaan dan penutupan stomata. Penutupan stomata penting untuk mencegah kehilangan air pada

waktu persediaan air terbatas, tetapi sekaligus membatasi pengambilan CO₂ untuk fotosintesis. Kebanyakan spesies tanaman budidaya di tanam di tempat yang mendapat radiasi matahari penuh akan memiliki stomata pada kedua permukaan daun (Gardner *et al*, 2008: 20-22).

Rata-rata jumlah stomata pada daerah sedang yaitu 187, daerah teduh 167 dan kontrol 183. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, stomata pada permukaan atas daun menunjukkan tidak berbeda nyata. Di duga karena daun bagian atas digunakan untuk menangkap cahaya untuk fotosintesis, sehingga jarang ditemukan stomata pada bagian atas daun. Stomata merupakan organ respirasi pada tumbuhan fungsinya untuk mengambil CO₂ dan sekaligus mengeluarkan O₂ karena selalu terbuka maka lebih banyak berada di bawah daun untuk mengurangi evaporasi tanaman. Selain itu bagian atas daun lebih tebal dan biasanya tertutup lapisan lilin untuk menahan panas matahari. Apabila stomata lebih banyak dipermukaan atas daun (pada tumbuhan darat) maka akan terjadi penguapan yang berlebih yang dapat mengakibatkan daun menjadi kering/layu. Menurut Gardner *et al*, (2008: 20) permukaan luar daun yang luas dan datar memungkinkannya menangkap cahaya semaksimal mungkin per satuan volume dan meminimalkan jarak yang harus ditempuh oleh CO₂ dari permukaan daun ke kloroplas, yaitu jarak sekitar 0,1 mm pada daun-daun kebanyakan tanaman budidaya. Epidermis bertindak sebagai penghalang pertukaran gas terutama karena sel-sel epidermis tertutup oleh suatu lapisan berlilin yang di sebut kutikula. Kutikula dan epidermis keduanya hampir transparan dan dengan mudah memungkinkan cahaya tampak menembus daun. Kutikula menghambat pertukaran gas antara daun dan atmosfer, ini penting untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan.

Menurut Salisbury dan Ross (1995: 59), berbagai spesies yang hidup di iklim kering mempunyai daun tebal dengan nisbah permukaan terhadap volume yang cukup rendah, kutikula tebal, dan di sertai laju transpirasi rendah. Spesies seperti ini di golongan sebagai sukulen. Mereka biasanya tidak mempunyai lapisan sel palisade yang telah berkembang sempurna, dan sebagian besar sel fotosintesis daun dan batang adalah mesofil bunga karang. Sel-selnya mempunyai vakuola yang cukup besar di bandingkan dengan lapisan tipis sitoplasma. Terdapat sel seludang berkas tapi tidak jelas.

2. Permukaan Bawah

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa jumlah stomata pada permukaan bawah daun menunjukkan berbeda nyata berdasarkan hasil analisis ragam. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu $7249.4 > 5.14325285$.

Jumlah stomata per bidang permukaan bawah daun bervariasi diantara tanaman kangkung air. Pada daerah sedang rata-rata jumlah stomata daun yaitu 387, daerah teduh yaitu 204 dan daerah panas yaitu 401. Berdasarkan hasil uji BNT 5% dapat diketahui bahwa daerah teduh lebih berpengaruh terhadap jumlah stomata permukaan bawah daun. Dengan demikian stomata daun akan semakin meningkat (banyak) apabila berada pada daerah sedang (intensitas cahaya sedang), sebaliknya stomata daun akan semakin sedikit apabila berada pada daerah teduh (intensitas cahaya rendah). Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Mulyani (2006: 142) bahwa jumlah stomata per mm^2 berbeda pada setiap tumbuhan percobaan dengan daun *iris* yang tumbuh di bawah intensitas sinar yang berbeda menunjukkan bahwa kekerapan stomata menurun dengan menurunnya intensitas sinar. Hal yang sama dilaporkan oleh (Grant dan Vatnick, 2004: 4) bahwa stomata biasanya berada

pada sisi bawah daun, yang dibuka atau ditutup di bawah kendali sepasang sel berbentuk ginjal yang disebut sel penjaga. Ketika terbuka, stomata memungkinkan CO₂ masuk ke daun untuk sintesis glukosa, dan juga memungkinkan untuk air, dan oksigen bebas untuk keluar. Selain membuka dan menutup stomata, tanaman mungkin melakukan kontrol atas pertukaran gasnya dengan memvariasikan kepadatan stomata daun baru ketika mereka diproduksi (seperti pada musim semi atau musim panas).

Naungan dapat menyebabkan terjadinya perubahan terhadap radiasi matahari yang terima oleh tanaman, sehingga akan sangat berpengaruh dalam berbagai aktifitas tanaman, sebagaimana diketahui bahwa jumlah stomata yang banyak yaitu pada permukaan bawah daun. Haryanti (2010: 45) menyatakan bahwa adanya naungan antara fase daerah minimal dan fase daerah maksimal penerimaan cahaya dalam kloroplas berbeda pada daun tanaman naungan dan tempat panas, sehingga jumlah atau distribusi stomata pada daun semakin meningkat. Secara fisiologis cahaya mempunyai pengaruh langsung yaitu melalui fotosintesis maupun tidak langsung yaitu melalui pertumbuhan dan perkembangan tanaman akibat respon metabolik yang berlangsung. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan dan pola induksi stomata berbeda pada permukaan bawah daun.

Semakin banyak stomata per satuan luas berarti lebih banyak CO₂ dapat diambil, dan lebih banyak air dapat dilepaskan. Dengan demikian, lebih tinggi kepadatan stomata dapat sangat memperkuat potensi untuk kontrol perilaku atas tingkat kehilangan air dan serapan CO₂. Umumnya, tanaman fotosintesis apparatusnya hanya dirancang untuk berfungsi dengan baik pada rentang agak sempit terhadap suhu. Ketika dipanaskan, sitokrom, pigmen, dan membran penting untuk

fosforilasi dan fiksasi karbon cepat denaturasi (yakni, mereka memasak). Untuk menghindari hal ini, tanaman dapat membuka stomata dan menguap untuk menurunkan suhu daun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa daun di bawah sinar matahari harus memiliki kepadatan stomata tinggi daripada daun di tempat teduh (Grant dan Vatnick, 2004: 4).

3. Ukuran Porus Stomata

Pengamatan ukuran porus stomata dilakukan pada foto hasil metode replika menggunakan mikroskop mikroskop Primo Star dengan perbesaran 40 x 10, diukur menggunakan aplikasi *measurment* (satuan pengukuran). Ukuran porus stomata meliputi panjang dan lebar.

a. Permukaan Atas Daun

1. Panjang Porus Stomata

Berdasarkan analisis sidk ragam terhadap panjang porus stomata pada naungan yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata. Panjang porus menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel ($529,824 > 5,14325285$).

Rata-rata panjang porus stomata pada daerah sedang yaitu 20,77 μm , teduh yaitu 20,48 μm , dan kontrol yaitu 20,29 μm . Berdasarkan hasil uji lanjut BNT 0,05 dapat diketahui bahwa panjang porus stomata yang paling berbeda nyata adalah pada daerah panas (kontrol). Di duga panjang porus stomata berbeda pada setiap perlakuan karena intensitas cahaya tinggi yang berpengaruh pada dinding porus stomata. Menurut Lakitan (2007: 58), sel penjaga pada tanaman dikotil umumnya berbentuk seperti sepasang ginjal. Keunikan dari sel penjaga ini adalah bahwa serat halus selulosa (*cellulose microfibril*) pada dinding selnya tersusun melingkari sel penjaga,

pola susunan yang demikian disebut sebagai miselasi radial (*radial micellation*). Karena serat selulosa ini relatif tidak elastis, maka jika sel penjaga menyerap air, maka sel ini tidak dapat memperbesar diameternya, tetapi dapat memanjang. Karena sepasang sel penjaga ini melekat satu sama lain pada kedua ujungnya, maka jika keduanya memanjang (akibat menyerap air) maka keduanya akan melengkung kearah luar. Kejadian ini akan menyebabkan celah stomata terbuka.

Selain itu juga telah diketahui sejak lama bahwa ketebalan dinding sel penjaga berbeda antara sisi yang bersebelahan dengan celah stomata dan sisi yang jauh dari celah stomata. Dinding sel pada sisi stomata lebih tebal dibanding sisi yang jauh dari celah stomata. Keunikan ini juga memberikan kontribusi terhadap pelengkungan sel penjaga saat tekanan turgornya meningkat. Akan tetapi sebagian ahli berpendapat bahwa kontribusi miselasi radial lebih besar dibanding beda ketebalan dinding sel terhadap pelengkungan sel penjaga (Lakitan, 1993: 58).

2. Lebar Porus Stomata

Berdasarkan analisis sidk ragam terhadap panjang porus stomata pada naungan yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata. Panjang porus menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel ($143,5 > 5.14325285$).

Rata-rata panjang porus stomata pada daerah sedang yaitu $4,06 \mu\text{m}$, teduh yaitu $4,46 \mu\text{m}$, dan kontrol yaitu $3,68 \mu\text{m}$. Berdasarkan hasil uji lanjut BNT 0,05 dapat diketahui bahwa lebar porus stomata yang paling berpengaruh nyata adalah pada daerah panas (kontrol). Hal ini di duga karena adanya intensitas cahaya yang diterima oleh daun sehingga berpengaruh terhadap anatomi daun. Menurut Haryanti (2010, 48) adanya cahaya yang diserap kloroplas yang mengadakan fotosintesis,

turgor sel penutup, suhu yang makin naik dan energi yang dapat melenturkan dinding porus bagian tengah dari stomata permukaan atas daun. Dikatakan mikrofibril selulose sel penutup lebih lentur pada bagian tengah. Adanya pelebaran porus stomata ini sangat erat hubungannya dengan transpirasi tumbuhan tersebut dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Pada daerah panas stomata harus mengurangi lebarnya guna mengurangi penguapan air, sebaliknya pada daerah teduh stomata lebih membuka. Hormon yang berpengaruh pada buka tutupnya stomata adalah ABA, sedang unsur hara yang berperan didalamnya adalah kalium.

Setelah melihat peranan ion kalium dalam pembukaan stomata dan ABA dalam penutupan stomata, dapat di simpulkan bahwa ada dua *feedback loop* yang mengendalikan membuka dan menutupnya stomata. *Feedback loop* yang pertama adalah jika CO₂ di rongga substomatal menurun, maka ion kalium akan masuk ke sel penjaga sehingga stomata membuka. Dengan demikian, CO₂ dari udara luar dapat masuk ke rongga sub-stomatal dan kebutuhan CO₂ untuk fotosintesis terpenuhi. *Feedback loop* yang kedua adalah jika tumbuhan mengalami kekurangan air, maka ABA akan di kirim masuk ke sel penjaga. Sebagai akibatnya stomata akan menutup. Dengan demikian, kehilangan air melalui proses transpirasi dapat di hindari. Kedua *feedback loop* ini berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan CO₂ untuk fotosintesis dan mencegah kehilangan air berlebihan dari jaringan tumbuhan (Lakitan, 2011: 61-61).

Tanaman yang tumbuh pada lingkungan berintensitas cahaya rendah memiliki akar yang lebih kecil, jumlahnya sedikit dan tersusun dari sel yang berdinding tipis. Hal ini terjadi akibat terhambatnya translokasi hasil fotosintesis dari akar. Ruas batang tanaman lebih panjang tersusun dari sel-sel berdinding tipis, ruang antar sel

lebih besar, jaringan pengangkut dan penguat lebih sedikit. Daun berukuran lebih besar, lebih tipis dan ukuran stomata lebih besar, sel epidermis tipis, tetapi jumlah daun lebih sedikit, ruang antar sel lebih banyak. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat menurunkan laju fotosintesis hal ini disebabkan adanya fotooksidasi klorofil yang berlangsung cepat, sehingga merusak klorofil. Intensitas cahaya yang terlalu rendah akan membatasi fotosintesis dan menyebabkan cadangan makanan cenderung lebih banyak dipakai daripada disimpan. Pada intensitas cahaya yang tinggi kelembaban udara berkurang, sehingga proses transpirasi berlangsung lebih cepat (Treshow, 1970 dalam Haryanti, 2010: 20).

b. Permukaan Bawah Daun

1. Panjang Porus Stomata

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan ketiga perlakuan naungan pada permukaan bawah daun berbeda nyata terhadap panjang porus stomata. Pada tabel analisis sidik ragam menunjukkan bahwa F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel ($731,79 > 5,14325285$) yang berarti ada beda nyata pada setiap perlakuan.

Rata-rata panjang porus stomata pada daerah sedang yaitu $4,06 \mu\text{m}$, teduh yaitu $5,46 \mu\text{m}$, dan kontrol yaitu $3,68 \mu\text{m}$. Berdasarkan hasil uji lanjut BNT 0,05 dapat diketahui bahwa panjang porus stomata yang paling berpengaruh nyata adalah pada daerah panas (kontrol). Hal ini diduga terjadi karena perbedaan naungan pengaruhnya dalam hal menambah kelenturan dinding porus stomata. Menurut Campbell *at all*, (1999: 330) bahwa sel penjaga mengontrol diameter stomata dengan cara mengubah bentuk, yang akan melebarkan dan menyempitkan celah diantara kedua sel tersebut. Ketika sel penjaga mengambalir melalui osmosis, sel penjaga

akan membengkak dan semakin dalam keadaan turgit. Pada sebagian besar tumbuhan dikotil dinding sel-sel penjaga mempunyai ketebalan yang tidak seragam, serta mikrofibril selulosa yang diorientasikan dari suatu arah sehingga sel-sel penjaga itu menutup ke arah atas ketika mereka dalam keadaan turgit. Hal ini meningkatkan ukuran celah antar sel. Ketika sel kehilangan air dan menjadi lembek serta mengkerut, sel-sel tersebut akan mengecil bersamaan kemudian menutup ruangan di antaranya. Mikrofibril selulosa pada dinding menahan peregangan dan tekanan dengan arah paralel dengan mikrofibril tersebut. Dengan demikian orientasi radial mikrofibril itu menyebabkan sel-sel itu meningkatkan panjangnya lebih dari lebarnya ketika turgor meningkat.

2. Lebar Porus Stomata

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan ketiga perlakuan naungan pada permukaan bawah daun berbeda nyata terhadap lebar porus stomata. Pada tabel analisis sidik ragam menunjukkan bahwa F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel ($480,28 > 5,14325285$) yang berarti ada beda nyata pada setiap perlakuan. Rata-rata panjang porus stomata pada daerah sedang yaitu $5,45 \mu\text{m}$, teduh yaitu $6,23 \mu\text{m}$, dan kontrol yaitu $5,35 \mu\text{m}$. Berdasarkan hasil uji lanjut BNT 0,05 dapat diketahui bahwa lebar porus stomata yang paling berpengaruh nyata adalah pada daerah panas (kontrol). Berdasarkan hasil uji lanjut BNT 0,05 dapat diketahui bahwa lebar porus stomata yang paling berbeda nyata (berpengaruh) adalah pada daerah teduh. Ukuran lebar porus stomata pada daerah teduh lebih lebar dibandingkan pada daerah sedang dan kontrol. Hal ini diduga karena adanya intensitas cahaya rendah yang diterima oleh daun sehingga berpengaruh terhadap anatomi daun. Menurut Salisbury dan Ross (1995: 80) pada sebagian besar tumbuhan, konsentrasi CO_2 yang rendah di daun,

membuat stomata membuka. Jika udara bebas- CO_2 di hembuskan melalui daun sekalipun pada malam hari maka stomata yang terbuka sedikit akan membuka lebih lebar. Sebaliknya, konsentrasi CO_2 yang tinggi di daun menyebabkan stomata menutup sebagian.

Cahaya diketahui berperan merangsang masuknya ion kalium ke sel penjaga dan jika tumbuhan tersebut kemudian ditempatkan dalam gelap, maka ion kalium akan kembali keluar dari sel penjaga. Akan tetapi stomata akan membuka walaupun dalam gelap jika ditempatkan dalam udara bebas CO_2 . Cahaya merah dan biru diketahui efektif dalam merangsang pembukaan stomata, tetapi jika dibandingkan antara kedua panjang gelombang cahaya merah. Pada intensitas rendah, dimana cahaya merah tidak menunjukkan pengaruh, cahaya biru telah dapat mempengaruhi pembukaan stomata (Lakitan, 1993: 60).

Menurut Buckley (2005: 276) stomata daun mengatur konduktansi difusi daun, dengan demikian mempengaruhi kehilangan air dan mendapatkan karbon. Kebanyakan tanggapan stomata yaitu menangkak, dikarenakan perubahan keseimbangan antara pasokan air dan permintaan evaporasi. Misalnya mengurangi kelembaban atmosfer bergeser keseimbangan hidrolik terhadap permintaan yang mengurangi status air daun, namun stomata merespon dengan mengurangi lubang mereka, yang membatasi kehilangan air dan meringankan potensi penurunan status air. Kecenderungan yang sama membalikkan pergeseran penawaran dan permintaan jelas dalam respon stomata terhadap variabel hidrolik yang terkait, termasuk xylem resisten hidrolik dan status air di tempat lain dalam rangkaian tanah, tanaman dan atmosfer. Kecenderungan ini umum, serta banyak bukti empiris yang konkrit

menunjukkan bahwa sel penjaga stomata merespon dengan umpan balik negatif untuk ukuran lokal potensial air daun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu naungan yang berbeda mempengaruhi jumlah stomata permukaan bawah daun, tetapi tidak mempengaruhi jumlah stomata permukaan atas daun. Rata-rata jumlah stomata permukaan bawah daun pada daerah sedang yaitu 387, teduh 204, dan kontrol 401, sedangkan rata-rata jumlah stomata permukaan atas daun pada daerah sedang yaitu 187, teduh 167, dan kontrol 183. Naungan yang berbeda juga mempengaruhi ukuran panjang dan lebar porus stomata permukaan atas dan permukaan bawah daun. Rata-rata ukuran panjang porus stomata permukaan atas daun pada daerah sedang yaitu 20,77 μm , teduh 20,48 μm , dan kontrol 20,29 μm , sedangkan rata-rata ukuran panjang porus permukaan bawah daun pada daerah sedang yaitu 23,42 μm , teduh 19,9 μm , dan kontrol 22,5 μm . rata-rata ukuran lebar porus stomata permukaan atas daun pada daerah sedang yaitu 4,06 μm , teduh 5,46 μm , dan kontrol 3,68 μm . Sedangkan rata-rata lebar porus stomata permukaan atas daun pada daerah sedang yaitu 5,45 μm , teduh 6,23 μm , dan kontrol 5,35 μm .

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini yaitu diharapkan apabila ada penelitian berikutnya tentang pengamatan jumlah stomata, sebaiknya menggunakan mikroskop trinokuler agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian. *Deskripsi Mikroskopis dan Kandungan Mineral Tanaman Kangkung Air (Ipomoea aquatica Forsk.)*. Departemen teknologi hasil perairan, Fakultas perikanan dan ilmu kelautan, Institut pertanian bogor, Bogor, 2012.
- Anggraeni, Dinastuti, K, *et al.* *Anatomi Batang dan Stomata Tomat (lycopersicum esculentum) yang Dikecambahkan Dibawah Pengaruh Medan Magnet 0,2mt*. Jurusan Biologi FMIPA, Seminar Nasional Sains & Teknologi V Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013.
- Afa, L.O., Sudarsono, W.A. *Pengaruh Naungan Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kolesom (talinum triangule (jacq.) Willd)*, Fakultas Sains dan Tekhnologi, Jurusan Agronomi dan Hortikultur, Universitas Agricultural Bogor, Bogor, 2010.
- Buckley, T.N. Transley review. *The Control Of Stomata By Water Balance*. New Phytologist. Biology Departement, The Australia National University. Australia, 2005.
- Campbell, Reece dan Mitchell. *Biologi Jilid 2*. Erlangga: Jakarta. 2003.
- Croxdale, Judith. *Encyclopedia of Life Scieeces*. University of Wiscronsin, Madison, Wisconsin. USA. 2001.
- Dibyantoro, A.L.H. *Rampai – rampai Kangkung*. Balai penelitian tanaman sayuran, Pusat penelitian dan pengembangan hortikultura, Badan penelitian dan pengembangan pertanian, Lembang. 1996.
- Gardner, Franklin, P, DKK. *Fisiologi Tanaman Budidaya*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008.
- Grant, Bruce W, and Vatnick, I. *Environmental Correlates of Leaf Stomata Density*, Biology: Widener University, 2004,
- Hariyadi, A.B *et al.* *Pengaruh Naungan Terhadap Karakter Morfologi Daun Serta Hasil Dua Varietas Tanaman Kedelai*. Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Mandalo Darat. Vol 1 No. 3. (2012).
- Haryanti, S. *Pengaruh Naungan yang Berbeda terhadap Jumlah Stomata dan Ukuran Porus Stomata Daun Zephyranthes Rosea Lindl*, Laboratorium Biologi Struktur dan Fungsi Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Hidayat, E.B., *Anatomi Tumbuhan Berbiji*, Institut Teknologi Bandung, Bandung. 1995.

Igwenyi, I.O. *Chemical Compositions of Ipomoea aquatica (green kangkong)*. International Journal of Pharma and Bio Sciences. Department of Biochemistry, Ebonyi State University, Abakaliki Ebonyi State, Vol 2/issue/4. Nigeria. 2011.

Imaningsih, W. *Studi Banding Sifat Ketahanan Struktural Terhadap Kekeringan Antara Varietas Padi Sawah dan Padi Gogo Berdasarkan Struktur Anatomi Daun*. Bioscientiae vol. 3 no. 1: 47-58. 2006.

Irwan, Z.D. *Prinsip-prinsip Ekologi*. Ekologi, Lingkungan dan Pelestariannya. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Irwanto. *Pengaruh Perbedaan Naungan Terhadap Pertumbuhan Semai Shorea sp Di persemaian*. Pascasarjana UGM Jurusan ilmu-ilmu pertanian. Yogyakarta: Program studi ilmu kehutanan. 2006.

Janne J. Palit. *Teknik penghitungan jumlah stomata beberapa kultivar kelapa*, Buletin Teknik Pertanian Vol. 13 No. 1, Laboratorium Ekofisiologi Balitka, Manado, 2008.

Kesumawati, E, DKK. *Pengaruh naungan dan varietas terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman stroberi (Fragaria sp.) di dataran rendah*, Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.

Kusumo S. dan H. Soenarjono. *Petunjuk bertanam sayuran*. Proyek pembangunan penelitian pertanian nusa tenggara. Badan Litbang Pertanian. DEPTAN. 1992.

Khamwan, K, DKK. *Genetic Transformation of Water Spinach (Ipomoea aquatica Forsk)*, Plant Biotechnology 20 (4) . 3003.

Lakitan, Benyamin. *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*. PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Marsusi, Revi. *PUAP Kalimantan Barat*, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat. 2010.

Mulyani, Sri, E.S. *Anatomi Tumbuhan*. Yogyakarta: Kanisus, 2006.

Mott, Keith A. *Do Stomata Respond to CO₂ Concentrations Other Than Intercellular?*. Plant Physiol. Biology Departement UMC 45, Utah State University, Logan, Utah 84322-4500. 1987.

Nasaruddin. *Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan*. Yayasan Forest Indonesia dan Fakultas Pertanian UNHAS. 2010.

Najib, Ahmad. Bahan kuliah. *Anatomi Morfologi Fisiologi Tumbuhan*. Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, Makassar. 2009.

Nurjanah. *Aktivitas Antioksidan dan Komponen Bioaktif Kangkung Air (Ipomoea aquatica Forsk)*. Departemen Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian: Bogor. 2014.

Nurshanti, D.F. *Pengaruh Beberapa Tingkat Naungan Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Seledri (Apium graveolens L.)* di Polibag. AgronobiS, Vol.3, No.5, Fakultas Pertanian Universitas Baturaja. 2011.

Paishal, R. *Pengaruh naungan dan pupuk daun terhadap Pertumbuhan dan produksi tanaman seledri (Apium graveolens l) dengan teknologi Hidroponik sistem terapung*, program studi hortikultura, Fakultas pertanian, Institut pertanian bogor, 2005.

Palit, Janne J. *teknik penghitungan jumlah stomata beberapa kultivar kelapa*. Buletin Teknik Pertanian Vol. 13 No. 1. 1Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan pada Balai Penelitian Kelapa dan Palma Lain, Manado, 2008.

Parman, Sarjana. *Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Produksi Umbi Tanaman Lobak (Raphanus Sativus L)* . Buletin Anatomi dan Fisiologi Vol. XVIII, No. 2. Laboratorium Biologi Struktur dan Fungsi Tumbuhan Jurusan Biologi F. MIPA UNDIP. 2010.

Pertamawati. *Pengaruh fotosintesis terhadap Pertumbuhan tanaman kentang (solanum tuberosum l.) Dalam lingkungan Fotoautotrof secara invitro*. Pusat TFM - BPP Teknologi. 2010.

Pratiwi M.C. *Pemanfaatan kangkung air (ipomoea aquatica) dan lumpur aktif pabrik tekstil dalam pengolahan limbah cair tahu*, Skripsi, departemen manajemen sumberdaya perairan fakultas perikanan dan ilmu kelautan institut pertanian bogor, bogor, 2010.

Quttbh, Sayyid. *Tafsir Fi Shilalil Qur'an*, Surah As Syu'araa, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani.2003.

Rosman, R, DKK. *Pengaruh naungan dan pupuk fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi nilam (pogostemon cablin Benth.)*, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Fakultas Pertanian Universitas Djuanda, Bogor, (1998).

Rofiah, Ai. *Kajian aspek anatomi daun beberapa varietas kedelai (glycine max l.) Pada kondisi cekaman kekeringan*. Jurusan biologi fakultas sains dan teknologi universitas islam negeri malang (UIN), malang: maulana malik ibrahim, 2010.

Rukmana, R. *Seri Budidaya Kangkung*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta. 1994.

Salisbury, F.B. dan Ross, C.W., *Fisiologi Tumbuhan Jilid 1*, ITB Press, Bandung. 1995.

----- . *Fisiologi Tumbuhan Jilid 2* , ITB Press, Bandung. 1995.

Sitompul, S.M.. *Bahan Ajar. Radiasi dalam sistem agroforestri*, Program Studi Agronomi, Fak. Pertanian, Univ. Brawijaya Malang. 2002.

Sudaryono. *Pengaruh Naungan Terhadap Iklim Mikro Pada Budidaya Tanaman Tembakau Rakyat*. Peneliti pusat pengkajian penerapan teknologi lingkungan badan pengkajian dan penerapan teknologi. 2004.

Suryawati, S, DKK. *Respon tanaman sambiloto (Andrograpis paniculata NESS) akibat naungan dan selang penyiraman air*, jurusan budidaya tanaman, Fakultas Pertanian Unijoyo, 2007.

Sutrian, Yayan Drs. *Pengantar Anatomi Tumbuh-Tumbuhan Tentang Sel dan Jaringan*. PT Rineka Cipta: Jakarta, 2004.

Suyitno, Al, MA. *pertukaran zat dan proses hilangnya air*. Biologi FMIPA UNY : Yogyakarta, 2006.

Steenis, Van, C.G.G.J. *Flora*. Untuk sekolah di Indonesia. Jakarta pusat. PT Pradnya Paramita. 1975.

Stephens, James M. Kangkong -*Ipomoea aquatica Forsk*, also *Ipomoea reptans Poir* University of Florida: IFAS Extension. 2003

Tjitrosomo, S.S., *Botani Umum I*. Angkasa Press: Bandung. 1983.

Usman,F,H. DKK. *Identifikasi jenis-jenis tumbuhan berkhasiat obat di jalan parith .husin 2 kecamatan Pontianak tenggara*, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Potianak, 2012.

Zubaidi, A, dan Farida, N. *Pertumbuhan bibit gaharu pada beberapa jenis naungan*, Laboratorium Lapangan dan Rumah Kaca, Fakultas Pertanian Universitas, Mataram, 2008.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1: Analisis Sidik Ragam

Tabel 1.1: Permukaan Atas Daun

no.	perlakuan	ulangan			total	rata-rata
		1	2	3		
1	A	189	186	186	561	187
2	B	170	165	166	501	167
3	C	166	191	192	549	183
JUMLAH		525	542	544	1611	537

sidik ragam					
sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	672	336	0,75	5,14325285
galat	6	454	448		
total	8	1126			

Ulangan	3
perlakuan	3
faktor a	1
faktor b	1
faktor c	1
fk	288369
jum kuadrat total	289495
jumlah kuadrat perlakuan	867123
jumlah kuadrat ulangan	865325

Tabel 1.2: Jumlah Stomata Permukaan Bawah Daun

no	perlakuan	ulangan			total	rata-rata
		1	2	3		
1	A	390	385	386	1161	387
2	B	201	205	206	612	204
3	C	400	401	402	1203	401
JUMLAH		991	991	994	2976	992

sidik ragam					
sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	72494	36247	7249,4	5,14325285
galat	6	30	5		
total	8	72524			

Ulangan	3
perlakuan	3
faktor a	1
faktor b	1
faktor c	1
fk	984064
jumlah kuadrat total	1056588
jumlah kuadrat perlakuan	3169674
jumlah kuadrat ulangan	2952198

Tabel 1.3: Ukuran Panjang Porus Permukaan Atas Daun

no.	perlakuan	ulangan			total panjang porus	rata-rata
		1	2	3		
1	A	20,55	22,22	19,56	62,33	20,77
2	B	16,88	19,01	25,55	61,44	20,48
3	C	22,06	16,68	22,13	60,87	22,97
JUMLAH		59,49	57,91	67,24	184,64	64,22

sidik ragam					
sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	0,000285868	5682,5297	529,8236562	5,14325285
galat	6	64,35193635	10,72532273		
total	8	64,35222222			

permukaan atas	
Ulangan	3
perlakuan	3
faktor a	1
faktor b	1
faktor c	1
fk	3787,992178
jum kuadrat total	3852,3444
jumlah kuadrat perlakuan	11365,0594
jumlah kuadrat ulangan	11413,8458

Tabel 1.4: Ukuran Lebar Porus Permukaan Atas Daun

no.	perlakuan	ulangan			total lebar porus	rata-rata
		1	2	3		
1	A	3,96	3,16	5,07	12,19	5,1
2	B	4,67	4,86	6,85	16,38	5,46
3	C	3,73	2,84	4,47	11,04	3,68
JUMLAH		12,36	10,86	16,39	39,61	14,24

permukaan atas daun	
Ulangan	3
perlakuan	3
faktor a	1
faktor b	1
faktor c	1
fk	174,3280111
jum kuadrat total	185,6825
jumlah kuadrat perlakuan	538,7821
jumlah kuadrat ulangan	539,3413

sidik ragam

sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	0,090622652	269,39105	143,4983571	5,14325285
galat	6	11,26386624	1,877311039		
total	8	11,35448889			

Tabel 1.5: Ukuran Panjang Porus Permukaan Bawah Daun

no.	perlakuan	ulangan			total panjang porus	rata-rata
		1	2	3		
1	A	23,24	22,43	24,59	70,26	23,42
2	B	18,6	22,94	18,16	59,7	19,9
3	C	19,9	25,68	21,93	67,51	22,5
JUMLAH		61,74	71,05	64,68	197,47	65,82

Permukaan bawah	
Ulangan	3
perlakuan	3
faktor a	1
faktor b	1
faktor c	1
fk	4332,711211
jum kuadrat total	4386,2571
jumlah kuadrat perlakuan	13058,1577
jumlah kuadrat ulangan	13043,4325

sidik ragam

sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	0,013853697	6529,07885	731,7949516	5,14325285
galat	6	53,53203519	8,922005865		
total	8	53,54588889			

Tabel 1.6: Ukuran Lebar Porus Permukaan Bawah Daun

no.	perlakuan	ulangan			total	rata-rata
		1	2	3		
1	A	6.6	4.55	5.22	16.37	5.43
2	B	5.5	6.17	7.03	18.7	6.24
3	C	5.01	5	6.06	16.07	5.36
JUMLAH		17.11	15.72	18.31	51.14	17.03

permukaan bawah	
Ulangan	3
perlakuan	3
faktor a	1
faktor b	1
faktor c	1
fk	290.5888444
jum kuadrat total	296.0744
jumlah kuadrat perlakuan	875.9118
jumlah kuadrat ulangan	875.1266

sidik ragam

sk	db	jk	kt	F hitung	F tabel
perlakuan	2	0.014265	437.956	480.28	5.1433
galat	6	5.47129	0.91188		
total	8	5.485556			

Lampiran 2 : Uji Lanjut BNT

a. Jumlah stomata permukaan bawah daun

1. Menghitung nilai kritis menggunakan rumus berikut:

$$BNTa = t(\alpha, v) \cdot \frac{\sqrt{2 (KT Galat)}}{r}$$

Untuk mencari nilai $t(\alpha, v)$ dapat melihatnya pada tabel Sebaran t-student pada taraf nyata α dengan derajat bebas v . Untuk menentukan nilai $t(\alpha, v)$, berdasarkan nilai taraf nyata α yang dipilih ($\alpha = 5\%$), dan nilai derajat bebas (db) galat (db galat = 6). Berikut saya lampirkan sebagian dari tabel tersebut:

Tabel Distribusi t

		α atau $\alpha/2$				
		0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
db	1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656
	2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
	3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
	4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
	5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
	6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
	7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
	8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
	9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
	10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169

Pada tabel Sebaran t-student di atas, panah yang vertikal berasal dari angka 0,05 yang menunjukkan $\alpha = 5\%$. Sedangkan panah horizontal berasal dari angka 6 yang menunjukkan nilai derajat bebas (db) galat = 6. Dari pertemuan kedua panah tersebut didapatkanlah nilai $t(0,05; 6) = 1,943$.

Selanjutnya menghitung nilai kritis BNT dengan rumus berikut. KT galat = 5 dan r (kelompok) = 3.

$$BNTa = (0,05.6) = \sqrt{\frac{2(5)}{3}}$$

$$= 1,943 \cdot \sqrt{\frac{2(5)}{3}}$$

$$= 1,295$$

2. Menentukan pengaruh antar perlakuan. Menyusun rata-rata perlakuan yang terkecil hingga terbesar. Pertama-tama menjumlahkan nilai kritis BNT5% = 1,295 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama, yaitu $204 + 1,295 = 205,295$ dan beri huruf "a" dari nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama (204) hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 205,295. Dalam hal ini huruf "a" diberi dari nilai rata-rata perlakuan 204 hingga 401.

Perlakuan	Rata-rata
B	204 ^a
A	387 ^a
C	401 ^a
BNT 5 %	1,295

3. Selanjutnya menjumlahkan lagi nilai kritis BNT5% = 1,295 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua, yaitu $387 + 1,295 = 388,295$ dan beri huruf "b" dari nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua (387) hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 388,295. Dalam hal ini huruf "b" diberikan dari nilai rata-rata perlakuan 387 hingga 401.

Perlakuan	Rata-rata
B	204 ^a
A	387 ^{ab}
C	401 ^{ab}
BNT 5 %	1,295

4. Menentukan perlakuan yang paling berpengaruh. Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pengaruhnya menurut BNT5%. Untuk menentukan perlakuan mana yang paling berpengaruh yaitu dengan

melihat perlakuan dengan rata-rata tertinggi, yaitu perlakuan C. Perlakuan C (kontrol) dan B di ikuti huruf yang berbeda, artinya perlakuan B berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Jadi perlakuan B yang berpengaruh nyata terhadap jumlah stomata pada permukaan bawah daun.

b. Ukuran Panjang Porus Stomata Permukaan Atas

1. Menghitung nilai kritis menggunakan rumus berikut:

$$BNTa = t(\alpha, v) \cdot \frac{\sqrt{2(KT Galat)}}{r}$$

Untuk mencari nilai $t(\alpha, v)$ dapat melihatnya pada tabel Sebaran t-student pada taraf nyata α dengan derajat bebas v . Untuk menentukan nilai $t(\alpha, v)$, berdasarkan nilai taraf nyata α yang dipilih ($\alpha = 5\%$), dan nilai derajat bebas (db) galat (db galat = 6). Berikut saya lampirkan sebagian dari tabel tersebut:

Tabel Distribusi t

		α atau $\alpha/2$				
		0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
db	1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656
	2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
	3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
	4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
	5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
	6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
	7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
	8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
	9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
	10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169

Pada tabel Sebaran t-student di atas, panah yang vertikal berasal dari angka 0,05 yang menunjukkan $\alpha = 5\%$. Sedangkan panah horizontal berasal dari angka 6 yang menunjukkan nilai derajat bebas (db) galat = 6. Dari pertemuan kedua panah tersebut didapatkanlah nilai $t(0,05; 6) = 1,943$.

Selanjutnya menghitung nilai kritis BNT dengan rumus berikut. $KT \text{ galat} = 10,725$ dan $r \text{ (kelompok)} = 3$.

$$\begin{aligned} BNTa &= (0,05.6) = \sqrt{\frac{2(5)}{3}} \\ &= 1,943 \cdot \sqrt{\frac{2(10,725)}{3}} \\ &= 1,295 \end{aligned}$$

- Menentukan pengaruh antar perlakuan. Menyusun rata-rata perlakuan yang terkecil hingga terbesar. Pertama-tama menjumlahkan nilai kritis $BNT5\% = 1,295$ dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama, yaitu $20,29 + 1,295 = 21,585$ dan beri huruf "a" dari nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama (20,29) hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 21,585. Dalam hal ini huruf "a" diberi dari nilai rata-rata perlakuan 20,48 hingga 20,77.

Perlakuan	Rata-rata
C	20,29 ^a
B	20,48 ^a
A	20,77 ^a
BNT 5 %	1,295

- Selanjutnya menjumlahkan lagi nilai kritis $BNT5\% = 1,295$ dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua, yaitu $20,48 + 1,295 = 21,775$ dan beri huruf "b" dari nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua (20,48) hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 21,775. Dalam hal ini huruf "b" diberikan dari nilai rata-rata perlakuan 20,48 hingga 20,77.

Perlakuan	Rata-rata
C	20,29 ^a
B	20,48 ^{ab}
A	20,77 ^{ab}
BNT 5 %	1,295

4. Menentukan perlakuan yang paling berpengaruh. Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pengaruhnya menurut BNT5%. Dari hasil pengujian di atas, perlakuan B dan A sama-sama diikuti huruf “ab” artinya perlakuan B dan A tidak berbeda nyata pengaruhnya menurut BNT 5%. Perlakuan C menunjukkan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Jadi perlakuan C berpengaruh nyata terhadap ukuran panjang porus stomata pada permukaan atas daun.

c. Ukuran Lebar Porus Stomata Permukaan Atas

1. Menghitung nilai kritis menggunakan rumus berikut:

$$BNTa = t(\alpha, v) \cdot \frac{\sqrt{2 (KT Galat)}}{r}$$

Untuk mencari nilai $t(\alpha, v)$ dapat melihatnya pada tabel Sebaran t-student pada taraf nyata α dengan derajat bebas v . Untuk menentukan nilai $t(\alpha, v)$, berdasarkan nilai taraf nyata α yang dipilih ($\alpha = 5\%$), dan nilai derajat bebas (db) galat (db galat = 6). Berikut lampiran sebagian dari tabel tersebut:

Tabel Distribusi t

		α atau $\alpha/2$				
		0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
db	1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656
	2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
	3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
	4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
	5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
	6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
	7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
	8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
	9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
	10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169

Pada tabel Sebaran t-student di atas, panah yang vertikal berasal dari angka 0,05 yang menunjukkan $\alpha = 5\%$. Sedangkan panah horizontal berasal dari angka 6 yang

menunjukkan nilai derajat bebas (db) galat = 6. Dari pertemuan kedua panah tersebut didapatkanlah nilai $t(0,05; 6) = 1,943$.

Selanjutnya menghitung nilai kritis BNT dengan rumus berikut. $KT \text{ galat} = 1,877$ dan $r \text{ (kelompok)} = 3$.

$$BNTa = (0,05.6) = \sqrt{\frac{2(5)}{3}}$$

$$= 1,943. \sqrt{\frac{2(1,877)}{3}}$$

$$= 1,295$$

- Menentukan pengaruh antar perlakuan. Menyusun rata-rata perlakuan yang terkecil hingga terbesar. Pertama-tama menjumlahkan nilai kritis $BNT5\% = 1,295$ dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama, yaitu $3,68 + 1,295 = 4,975$ dan beri huruf “a” dari nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 4,975. Dalam hal ini huruf “a” diberi dari nilai rata-rata perlakuan 4,06 sampai 5,46.

Perlakuan	Rata-rata
C	3,68 ^a
A	4,06 ^a
B	5,46 ^a
BNT 5 %	1,295

- Selanjutnya menjumlahkan lagi nilai kritis $BNT5\% = 1,295$ dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua, yaitu $4,06 + 1,295 = 5,355$ dan beri huruf “b” dari nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 5,355. Dalam hal ini huruf “b” diberikan dari nilai rata-rata perlakuan 4,06 hingga 5,46.

Perlakuan	Rata-rata
C	3,68 ^a
A	4,06 ^{ab}
B	5,46 ^{ab}
BNT 5 %	1,295

4. Menentukan perlakuan yang paling berpengaruh. Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pengaruhnya menurut BNT 5%. Dari hasil pengujian di atas, perlakuan A dan B sama-sama diikuti huruf “^{ab}” artinya perlakuan A dan B tidak berbeda nyata pengaruhnya menurut BNT 5%. Perlakuan C dan perlakuan lainnya berbeda nyata, artinya perlakuan C yang paling berpengaruh nyata terhadap ukuran panjang porus stomata pada permukaan atas daun.

d. Ukuran Panjang Porus Stomata Permukaan Atas

1. Menghitung nilai kritis menggunakan rumus berikut:

$$BNTa = t(\alpha, v) \cdot \frac{\sqrt{2 (KT Galat)}}{r}$$

Untuk mencari nilai $t(\alpha, v)$ dapat melihatnya pada tabel Sebaran t-student pada taraf nyata α dengan derajat bebas v . Untuk menentukan nilai $t(\alpha, v)$, berdasarkan nilai taraf nyata α yang dipilih ($\alpha = 5\%$), dan nilai derajat bebas (db) galat (db galat = 6).

Berikut lampiran sebagian dari tabel tersebut

Tabel Distribusi t

		α atau $\alpha/2$				
		0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
db	1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656
	2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
	3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
	4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
	5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
	6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
	7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
	8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
	9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
	10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169

Pada tabel Sebaran t-student di atas, panah yang vertikal berasal dari angka 0,05 yang menunjukkan $\alpha = 5\%$. Sedangkan panah horizontal berasal dari angka 6 yang menunjukkan nilai derajat bebas (db) galat = 6. Dari pertemuan kedua panah tersebut didapatkanlah nilai $t(0,05; 6) = 1,943$.

Selanjutnya menghitung nilai kritis BNT dengan rumus berikut. $KT \text{ galat} = 8,922$ dan $r \text{ (kelompok)} = 3$.

$$\begin{aligned} BNTa &= (0,05.6) = \sqrt{\frac{2(5)}{3}} \\ &= 1,943. \sqrt{\frac{2(8,922)}{3}} \\ &= 1,295 \end{aligned}$$

- Menentukan pengaruh antar perlakuan. Menyusun rata-rata perlakuan yang terkecil hingga terbesar. Pertama-tama menjumlahkan nilai kritis $BNT5\% = 1,295$ dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama, yaitu $19,9 + 1,295 = 21,195$ dan beri huruf "a" dari nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 21,195. Dalam hal ini huruf "a" diberi dari nilai rata-rata perlakuan 22,5 hingga 23,42.

Perlakuan	Rata-rata
B	19,9 ^a
C	22,5 ^a
A	23,42 ^a
BNT 5 %	1,295

- Selanjutnya menjumlahkan lagi nilai kritis $BNT5\% = 1,295$ dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua, yaitu $22,5 + 1,295 = 23,795$ dan beri huruf "b" dari nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang

kurang dari atau sama dengan nilai 23,795. Dalam hal ini huruf “b” diberikan dari nilai rata-rata perlakuan 22,5 hingga 23,42.

Perlakuan	Rata-rata
B	19,9 ^a
C	22,5 ^{ab}
A	23,42 ^{ab}
BNT 5 %	1,295

4. Menentukan perlakuan yang paling berpengaruh. Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pengaruhnya menurut BNT5%. Dari hasil pengujian di atas, perlakuan C dan A sama-sama diikuti huruf “ab” artinya perlakuan C dan A tidak berbeda nyata pengaruhnya menurut BNT 5%. Perlakuan B berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, artinya perlakuan B yang berpengaruh nyata terhadap ukuran panjang porus stomata pada permukaan atas daun.

e. Ukuran Lebar Porus Stomata Permukaan Atas

1. Menghitung nilai kritis menggunakan rumus berikut:

$$BNT_{\alpha} = t(\alpha, v) \cdot \frac{\sqrt{2 (KT Galat)}}{r}$$

Untuk mencari nilai $t(\alpha, v)$ anda dapat melihatnya pada tabel Sebaran t-student pada taraf nyata α dengan derajat bebas v . Untuk menentukan nilai $t(\alpha, v)$, berdasarkan nilai taraf nyata α yang dipilih ($\alpha = 5\%$), dan nilai derajat bebas (db) galat (db galat =

- 6). Berikut lampiran sebagian dari tabel tersebut:

Tabel Distribusi t

		α atau $\alpha/2$				
		0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
db	1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656
	2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
	3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
	4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
	5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
	6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
	7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
	8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
	9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
	10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169

Pada tabel Sebaran t-student di atas, panah yang vertikal berasal dari angka 0,05 yang menunjukkan $\alpha = 5\%$. Sedangkan panah horizontal berasal dari angka 6 yang menunjukkan nilai derajat bebas (db) galat = 6. Dari pertemuan kedua panah tersebut didapatkanlah nilai t (0,05; 6) = 1,943.

Selanjutnya menghitung nilai kritis BNT dengan rumus berikut. KT galat = 0,9119 dan r (kelompok) = 3.

$$BNT_{\alpha} = (0,05,6) = \sqrt{\frac{2(5)}{3}}$$

$$= 1,943 \cdot \sqrt{\frac{2(0,9119)}{3}}$$

$$= 1,295$$

- Menentukan pengaruh antar perlakuan. Menyusun rata-rata perlakuan yang terkecil hingga terbesar. Pertama-tama menjumlahkan nilai kritis BNT5% = 1,295 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama, yaitu $5,35 + 1,295 = 6,645$ dan beri huruf "a" dari nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 6,645. Dalam hal ini huruf "a" diberi dari nilai rata-rata perlakuan 6,23 hingga 5,35.

Perlakuan	Rata-rata
C	5,35 ^a
A	5,45 ^a
B	6,23 ^a
BNT 5 %	1,295


6. Selanjutnya menjumlahkan lagi nilai kritis BNT5% = 1,295 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua, yaitu $5,45 + 1,295 = 6,745$ dan beri huruf “b” dari nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 6,745. Dalam hal ini huruf “b” diberikan dari nilai rata-rata perlakuan 5,45 hingga 6,23.

Perlakuan	Rata-rata
C	5,35 ^a
A	5,45 ^{ab}
B	6,23 ^{ab}
BNT 5 %	1,295

7. Menentukan perlakuan yang paling berpengaruh. Perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pengaruhnya menurut BNT5%. Dari hasil pengujian di atas, perlakuan A dan B sama-sama diikuti huruf “ab” artinya perlakuan A dan B tidak berbeda nyata pengaruhnya menurut BNT 5%. Perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Artinya perlakuan C berpengaruh nyata terhadap ukuran panjang porus stomata pada permukaan atas daun.

Lampiran 3: Gambar stomata/bidang pandang

1. Stomata Permukaan Atas Daun




Keterangan: A= Kangkung air pada naungan 1 lapis (Sedang)

B= Kangkung air pada naungan 2 lapis (Teduh)

C= Kangkung air tanpa naungan (Kontrol/Panas)

2. Stomata Permukaan Bawah Daun




Keterangan: A= Kangkung air pada naungan 1 lapis (Sedang)

B= Kangkung air pada naungan 2 lapis (Teduh)

C= Kangkung air tanpa naungan (Kontrol/Panas)

Lampiran 4: Ukuran Porus Stomata Daun

1. Kangkung air pada naungan 1 lapis (Sedang)




Keterangan: A= Ulangan 1

B= Ulangan 2

C= Ulangan 3

2. Kangkung air pada naungan 2 lapis (Teduh)




Keterangan: A= Ulangan 1

B= Ulangan 2

C= Ulangan 3

3. Kangkung air tanpa naungan (Kontrol/Panas)



Keterangan: A= Ulangan 1
B= Ulangan 2
C= Ulangan 3

Lampiran 5 Penanaman Kangkung Air (*Ipomoea aquatica* Forsk)

1. Penanaman stek kangkung air



2. Kangkung air umur 1 bulan

a. Naungan 1 lapis (sedang)



b. Naungan 2 lapis (Teduh)



c. Kontrol (Panas)



Lampiran 6 Pembuatan Preparat

a. Mengoleskan kutek pada daun



c. menempelkan selotip



b. menempelkan selotip preparat



d. menempelkan selotip pada kaca



Foto-foto Waktu Pengamatan Dibalai Karantina Pertanian Makassar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Jenepono, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Februari 1991 dan merupakan anak kelima dari 5 bersaudara pasangan Bapak Gassing dan Ibu Jumaintan. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SDN Lassang-lassang no. 7 (tahun 1997 - 2003), selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTs Al Falah Arungkeke (tahun 2003 - 2006) dan M.A Al Falah Arungkeke (tahun 2006-2009). Selanjutnya, pada tahun 2011 melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML), penulis resmi diterima menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama di UIN dan menempuh perkuliahan di Jurusan Biologi Sains, penulis juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan antara lain LDK Al-Uswah (tahun 2012-2013), Remaja Masjid Al Mubarak (2012-2013) sebagai ketua akademik, dan HMJ Biologi (Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi) (tahun 2013-2014) sebagai Kordinator Akhlak dan Moral. Penulis juga berpartisipasi aktif menjadi asisten praktikum beberapa mata kuliah, antara lain: matakuliah Genetika dan Biologi Molekuler (tahun 2014) dan Biologi Terapan dan Bioteknologi (tahun 2014).

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana, penulis telah melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Naungan Yang Berbeda Terhadap Jumlah Stomata Dan Ukuran Porus Stomata Pada Daun Kangkung Air (*Ipomoea aquatica* Forsk.)" dibawah bimbingan Dr. Muhammad Khalifah Mustami M.Pd dan Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si.