



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Juli 2014

Penyusun,

Vivi Meylani Putri
NIM. 70100110116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Gel Ekstrak Etanol Daun Alpukat (*Persea americana* Mill.) sebagai Obat Luka Sayat pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesainya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Anwar Alim dan Ibunda Syamsinar, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, kandaku Achsan Sulfiat, S. Pd, Alia Sriwahyuni, S.

KM, Yocang Mallombasi, S.Pd, M. Pd, Arti Dwi Putri, S, KM, adindaku Yan Safitri, Guruh Balang Raya, Annisa Putri Bintang, Guntur Gagairate Anwar dan Ananta Putra Dampang Tiro, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan doa'nya.

2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.
4. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fatmawaty M., SKM.,M.Kes.
5. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum (Perencanaan dan Keuangan) Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt. sekaligus selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
6. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Drs. Wahyuddin G, M.Ag.
7. Nursalam Hamzah, S.Si.,M.Si.,Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Surya Ningsi, S.Si.,M.Si.,Apt selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dra. Hj. Fatimah Irfan, M.Ag. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.

9. Haeria, S.Si., M.Si selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan serta meluangkan waktu dan fikirannya dalam mengarahkan penulis.
10. Afrisusnawati Rauf, S. Si., M. Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi.
11. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini.
12. Teman-teman angkatan 2010 Corrigenia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua kebersamaan selama ini.
13. Kakanda angkatan 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 dan adinda angkatan 2011, 2012 dan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Besar harapan saya kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar, 20 November 2014

Penyusun,

VIVI MEYLANI PUTRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang Masalah</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	4
C. <i>Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	5
1. Definisi Operasional.....	5
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. <i>Kajian Pustaka</i>	5
E. <i>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</i>	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7
A. <i>Kulit</i>	7
B. <i>Luka Sayat</i>	17

	C. <i>Alpukat</i>	26
	D. <i>Ekstraksi</i>	28
	E. <i>Sediaan Gel</i>	31
	F. <i>Uraian Hewan Coba</i>	33
	G. <i>Tinjauan dalam Agama Islam</i>	34
BAB III	PROSEDUR PENELITIAN.....	38
	A. <i>Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian</i>	38
	B. <i>Pendekatan Penelitian</i>	38
	C. <i>Sampel</i>	38
	D. <i>Metode Pengumpulan Data</i>	39
	1. <i>Penyiapan Ekstrak Daun Alpukat</i>	39
	a. <i>Pengolahan Sampel</i>	39
	b. <i>Ekstraksi Sampel</i>	39
	2. <i>Pembuatan Sediaan Gel</i>	40
	a. <i>Rancangan Formula Gel</i>	40
	b. <i>Pembuatan Gel</i>	40
	3. <i>Penyiapan Hewan Uji</i>	40
	4. <i>Metode Perlakuan pada Kelinci</i>	41
	5. <i>Pemberian Luka</i>	41
	E. <i>Instrumen Penelitian</i>	42
	F. <i>Teknik Pengolahan dan Analisis Data</i>	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43

BAB V PENUTUP.....	49
A. <i>Kesimpulan</i>	49
B. <i>Saran</i>	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
I	Ekstraksi Daun Alpukat (<i>Persea Americana</i> Miller.).....	52
II	Pembuatan Gel Ekstrak Daun Alpukat(<i>Persea Americana</i> Miller.).....	53
III	Pengujian Pada kelinci (<i>Oryctolagus cuniculus</i>).....	54
IV	Perubahan Panjang Luka Sayat.....	55
V	Presentase Perubahan Panjang Luka Sayat.....	56
VI	Perhitungan RAL (Rancangan Acak Lengkap), Hubungan antara Formula dan Kecepatan Penutupan luka.....	58
VII	Daun Alpukat (<i>Persea americana</i> Mill.).....	61
VIII	Dokumentasi Penelitian.....	61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Rancangan formula gel ekstrak etanol daun alpukat (<i>Persea americana</i> Mill.) dengan variasi konsentrasi ekstrak.....	39
2	Rata-rata persentase penyembuhan luka sayat.....	42
3	Perubahan Panjang Luka Sayat.....	55
4	Presentase Perubahan Panjang Luka Sayat.....	56
5	Hubungan antara Formula dan Kecepatan Penyembuhan Luka.....	68
6	Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel.....	59
7	RAL, BNT Hubungan antara formula dan kecepatan mulai penutupan luka	60

DAFTAR GAMBAR

Tabel		Halaman
1	Struktur kulit.	7
2	Rute penetrasi obat (1. Rute transepidermal; 2&3. Rute transappendageal)	17
3	Daun Alpukat (<i>Persea americana</i> Mill.).....	61
4	Alat Rotavapor	61
5	Ekstrak Etanol Daun Alpukat (<i>Persea americana</i> Mill.) Kering.....	61
6	Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Alpukat (<i>Persea americana</i> Mill.) dengan Variasi Konsentrasi dan Kontrol Negatif.....	62
7	Kelinci (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) Setelah Dilukai.....	63
8	Kelinci (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) Setelah Penyembuhan.....	63

ABSTRAK

Nama Penulis : Vivi Meylani Putri
NIM : 70100110116
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Gel Ekstrak Etanol Daun Alpukat (*Persea americana* Mill.) Sebagai Obat Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)

Telah dilakukan penelitian terhadap aktivitas penyembuhan luka sayat ekstrak etanol daun alpukat (*Persea americana* Mill.) dalam bentuk sediaan gel yang diujikan pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Tujuan penelitian ini mengetahui aktivitas penyembuhan luka sayat dari ekstrak etanol daun alpukat (*Persea americana* Mill.) yang didapatkan melalui metode maserasi dan dibuat dalam sediaan gel dengan tiga variasi konsentrasi yaitu 1%, 3%, dan 5%. Basis gel dipakai sebagai kontrol negatif yaitu karbopol serta gel Bioplacenton[®] dipakai sebagai kontrol positif, diaplikasikan pada luka sayat di punggung kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) yang telah disayat dengan panjang 3 cm.

Hasil penelitian menunjukkan nilai persentase rata-rata penyembuhan gel dengan kandungan ekstrak 1% sebesar 63,33%, gel dengan kandungan ekstrak 3% sebesar 64,32%, dan gel dengan kandungan ekstrak 5% sebesar 65,10%. Dari hasil uji statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dapat disimpulkan bahwa gel yang memberikan efek penyembuhan luka sayat paling baik adalah sediaan gel ekstrak etanol daun alpukat (*Persea americana* Mill.) kandungan ekstrak 5%.

Kata kunci: Daun alpukat (*Persea americana* L.), luka sayat, kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)

ABSTRACT

Author Name : Vivi Meylani Putri
NIM : 70100110116
Thesis title : Activity Test of Slice Wound Healing by Ethanol Extract of Avocado Leaf (*Persea americana* Mill.) in Gel Preparation form to Rabbits *Oryctolagus cuniculus*.

Researched on slice wound healing activity of ethanol extract of avocado leaf (*Persea americana* Mill.) in gel preparation forms were tested on rabbits (*Oryctolagus cuniculus*). The goal is to be aware of the healing activity of slice wound from the ethanol extract of avocado leaf (*Persea americana* Mill.) which was extracted by using maceration method and prepared into gel with three variants of concentration, they are 1%, 3%, and 5%. The gel base was used as negative control is carbopol, while Bioplacenton[®] gel was used as positive controls, were applied to the back skin of rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) and sliced 3 cm.

The results showed that average value of slice wound healing activity by gel containing 1% extract was 63,33%, gel containing 3% extract was 64,32%, and gel containing 5% extract was 65,10%. From the results of statistical tests Completely Randomized Design (CRD) and the Smallest Real Differences Test (LSD) can be concluded that the gel gave the most optimum activity of slice wound healing is the preparation of ethanol extract gel of avocado leaf (*Persea americana* Mill.) content extract 1%.

Keywords: Avocado leaf (*Persea americana* Mill.), slice wound, rabbit (*Oryctolagus cuniculus*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terbesar dan terberat dari tubuh. Kulit berfungsi sebagai penahan dua arah, membantu menyimpan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi komponen-komponen tubuh bagian dalam, dan sekaligus mencegah masuknya organisme-organisme infeksius dan zat-zat beracun ke dalam tubuh. Kulit juga melindungi struktur-struktur internal dari kerusakan mekanis, seperti trauma eksternal dan kerusakan yang diakibatkan sumber-sumber yang kurang jelas (misalnya: radiasi ultraviolet) (Benediktus, 2009: 265). Kulit membangun sebuah barier yang memisahkan organ-organ internal dengan lingkungan luar, dan turut berpartisipasi dalam banyak fungsi tubuh yang vital. Salah satu fungsi kulit yang sangat berperan adalah sebagai perlindungan yang sangat efektif terhadap invasi bakteri dan benda asing lainnya. Adanya gangguan terhadap kulit akan mempengaruhi fungsi kulit itu sendiri. Hilangnya atau rusaknya sebagian jaringan kulit yang dapat disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitn hewan disebut luka (Puspongoro, 1997: 72).

Luka yang terjadi dapat berupa kerusakan epidermis saja, mengenai epidermis dan sebagian dermis bahkan menembus kulit melampaui dermis hingga mencapai jaringan subkutan, otot, bahkan tulang tergantung faktor penyebab terjadinya luka. Dalamnya luka akan mempengaruhi kerusakan atau gangguan integritas kulit dan kematian sel-sel (Judd, 2007: 13)

Luka yang terjadi pada seseorang merupakan sebuah musibah yang merupakan ujian dari Allah swt. terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi dengan segala rahmat-Nya, Allah swt. menurunkan penyakit sekaligus obatnya yang merupakan rahmat dan keutamaan-Nya terhadap makhluk ciptaan-Nya (Basyier, 2011: 53).

Diriwayatkan pula dari musnad Imam Ahmad dari sahabat Usamah bin Suraik , bahwasanya Nabi bersabda

نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَصْنَعْ دَاءً إِلَّا وَصَّنَعَ لَهُ شِفَاءً خَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ
الْفَرَمُ

Artinya:

Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i menshahihkan hadits ini dalam kitabnya Al-Jami’ Ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain, 4/486)

Dari Ibnu Mas’ud , bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.” (HR. Ahmad 4/278, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri

menshahihkan hadits ini dalam Zawa'id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas Zadul Ma'ad, 4/12-13)

Luka ditangani dengan menghentikan perdarahan, mencegah infeksi karena kulit terbuka yang kemungkinan mudah ditumbuhi mikroorganisme dan memberi kesempatan sisa-sisa epitel untuk berpoliferasi dan menutup permukaan luka. Untuk mengobati luka, masyarakat biasanya menggunakan obat sintetik dan obat yang berasal dari alam. Obat yang berasal dari alam diperoleh dari tanaman-tanaman yang berkhasiat seperti getah pisang (*Musa paradisiaca*), Lidah buaya (*Aloe vera*), dan Jarak pagar (*Jathropa curcas*). Selain itu ditemukan pula satu tanaman dapat digunakan sebagai penyembuh luka berdasarkan kandungan senyawanya yaitu daun alpukat (Tenripadang, 2012: 1-4).

Tanaman alpukat yang terkenal dengan nama alpukat (*Persea americana* Mill.) sangat banyak ditemukan di Indonesia. Walau bukan tanaman asli Indonesia, tetapi keberadaannya tidak asing lagi bagi masyarakat. Tanaman alpukat dapat kita jumpai pada daerah beriklim tropis.

Buah alpukat adalah buah yang sangat akrab dan familiar bagi orang Indonesia. Namun, tidaklah banyak yang tahu bahwa salah satu bagian dari pohon alpukat, yaitu daunnya, memiliki khasiat luar biasa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan berbagai kandungan kimia yang dikandungnya. (Wahid, 2001: 15)

Hasil penapisan fitokimia daun alpukat (*Persea Americana* Mill) menunjukkan adanya golongan senyawa flavonoid, tanin katekat, kuinon, saponin, dan steroid/triterpenoid (Maryati, 2007: 1). Flavonoid dalam tubuh manusia berfungsi sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk mencegah kanker. Manfaat flavonoid antara lain adalah untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C,

anti inflamasi, mencegah keropos tulang, dan sebagai antibiotik. Flavonoid dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri dan virus (Hasbi, 2012: 31). Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu integritas membran sel bakteri. Daun alpukat juga mengandung senyawa tanin yang diketahui memiliki kemampuan sebagai astringen, menghentikan perdarahan dan mencegah infeksi selama menyembuhkan luka internal. Penelitian Claus dan Tyler pada tahun 1965 menyebutkan bahwa tanin mempunyai daya antiseptik yaitu mencegah kerusakan yang disebabkan bakteri atau jamur (Oktiarni, t.h: 2). Sedangkan saponin mempunyai kemampuan sebagai pembersih dan mampu memicu pembentukan kolagen yang merupakan suatu protein yang berperan dalam penyembuhan luka dengan membantu pembentukan sel-sel epitel.

Melihat dari beberapa kandungan daun alpukat (*Persea Americana* Mill) tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji kebenaran efek penyembuhan luka sayat dengan ekstrak daun alpukat (*Persea Americana* Mill) menggunakan hewan uji kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efek ekstrak daun alpukat (*Persea americana* Mill) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) ?
2. Bagaimana tinjauan Islam mengenai pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.
- b. Daun alpukat (*Persea americana* Mill) mengandung flavonoid, quersetin, dan tanin berfungsi sebagai penyembuh luka sayat.
- c. Luka sayat adalah luka yang terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Misal yang terjadi akibat pembedahan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan pada penelitian ini adalah Fitokimia dan Farmakologi.

D. Kajian Pustaka

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabelnya, dimana belum ada penelitian yang melihat pengaruh daun alpukat pada penyembuhan luka sayat.

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti mengenai penyembuhan luka sayat :

1. Perez Wahyu Purnasari, Dina Fatmawati, Iwang Yusuf (Universitas Islam Sultan Agung) dalam judul penelitiannya “Pengaruh Lendir Bekicot (*Achatina fulica*) terhadap Jumlah Sel Fibroblas pada Penyembuhan Luka Sayat”, hasil penelitiannya, Pemberian Lendir bekicot (*Achatina fulica*) memiliki pengaruh yang bermakna terhadap jumlah fibroblas pada penyembuhan luka sayat.

2. Hartono, Elda Arini (Universitas Kristen Maranatha, 2012) berjudul “Efek Ekstrak Etanol Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) Dalam Mempercepat Durasi Penyembuhan Luka Sayat Pada Mencit Swiss Webster Jantan”. Hasilnya, pemberian daun binahong dapat mempercepat durasi penyembuhan luka sayat pada mencit Swiss Webster jantan.
3. Eka Mulya Muthalib (Program Studi Farmasi, FMIPA UNSRAT Manado, 2013) Formulasi Salep Ekstrak Etanol Daun Tapak Kuda (*Ipomoea escaprae*) Dan Uji Efektivitasnya Terhadap Luka Terbuka Pada Punggung Kelinci. Hasilnya, pembuatan salep ekstrak etanol daun Tapak Kuda dapat memberikan efek daya penyembuhan luka terbuka pada punggung kelinci dan efek yang paling baik ditujukan pada salep ekstrak etanol daun Tapak Kuda dengan konsentrasi 20% dan diikuti dengan salep ekstrak etanol daun Tapak Kuda 10% dan 15 %.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui efek ekstrak daun alpukat (*Persea americana* Mill.) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).
- b. Mengetahui tinjauan Islam mengenai pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah dibidang farmakologi tentang pengaruh daun alpukat (*Persea americana* Mill.) terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

BAB II


TINJAUAN TEORITIS

A. Kulit

Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16 % berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7–3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5–1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus dan kulit bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu dan bokong (Perdanakusuma, 2007: 1).

1. Anatomi Kulit

Secara embriologis kulit berasal dari dua lapis yang berbeda, lapisan luar adalah epidermis yang merupakan lapisan epitel berasal dari ektoderm sedangkan lapisan dalam yang berasal dari mesoderm adalah dermis atau korium yang merupakan suatu lapisan jaringan ikat (Perdanakusuma, 2007: 1).



Gambar II. 1. Struktur kulit. (Benediktus. Kulit, Rambut dan Kuku. *Kulit-rambut-kuku-gooser-yohan*)

a. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar.

Lapisan epidermis tebalnya relatif, bervariasi dari 75-150 μ m, kecuali pada telapak tangan dan kaki lebih tebal (Pediatri, 2001: 1). Epidermis tersusun atas lapisan-lapisan yang berupa sel-sel kulit dan lapisan malpigi. Pada bagian epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan urat saraf. Pada bagian dermis, terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah dan limfa, indra, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Di bawah dermis terdapat lapisan lemak yang bertugas menghalangi pengaruh perubahan suhu di luar tubuh.

Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler. Terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung sel melanosit, langerhans dan merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh, paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Ketebalan epidermis hanya sekitar 5 % dari seluruh ketebalan kulit. Terjadi regenerasi setiap 4-6 minggu. Epidermis terdiri atas lima lapisan (dari lapisan yang paling atas sampai yang terdalam) :

1) Stratum Korneum

Terdiri dari sel keratinosit yang bisa mengelupas dan berganti. Stratum korneum adalah lapisan teratas, terdiri dari 25 sampai 30 lapisan sisik tidak hidup yang sangat terkeratinisasi dan semakin gepeng saat mendekati permukaan kulit. (Epidermis tipis yang melapisi seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan telapak kaki, tersusun hanya dari lapisan basalis dan korneum) (Slonane, 2004: 86).

- a) Permukaan terbuka dari stratum korneum mengalami proses pergantian ulang yang konstan pada lapisan atau deskuamasi.
- b) Ada pembaharuan yang konstan pada sel yang terdeskuamasi melalui pembelahan sel di lapisan basalis. Sel tersebut bergerak ke atas, ke arah permukaan,

mengalami keratinisasi, dan kemudian mati. Dengan demikian, seluruh permukaan tubuh terbuka oleh lembaran sel epidermis mati.

c) Keseluruhan lapisan oleh lembaran epidermis akan diganti dari dasar ke atas setiap 15 sampai 30 hari (Slonane, 2004: 86)

2) Stratum Lusidum

Berupa garis translusen, biasanya terdapat pada kulit tebal telapak kaki dan telapak tangan. Tidak tampak pada kulit tipis.

3) Stratum Granulosum

Ditandai oleh 3-5 lapis sel polygonal gepeng yang intinya ditengah dan sitoplasma terisi oleh granula basofilik kasar yang dinamakan granula keratohialin yang mengandung protein kaya akan histidin. Terdapat sel langerhans.

4) Stratum Spinosum

Lapisan sel spina atau tanduk, disebut demikian karena sel-sel tersebut disatukan oleh tonjolan yang menyerupai spina. Spina adalah bagian penghubung intraseluler yang disebut desmosom (Slonane, 2004: 84)

5) Stratum Basale (Stratum Germinativum)

Terdapat aktifitas mitosis yang hebat dan bertanggung jawab dalam pembaharuan sel epidermis secara konstan. Epidermis diperbaharui setiap 28 hari untuk migrasi ke permukaan, hal ini tergantung letak, usia dan faktor lain. Merupakan satu lapis sel yang mengandung melanosit.

Fungsi Epidermis : Proteksi barrier, organisasi sel, sintesis vitamin D dan sitokin, pembelahan dan mobilisasi sel, pigmentasi (melanosit) dan pengenalan alergen (sel Langerhans).

b. Lapisan Dermis yaitu lapisan jaringan ikat bagian bawah.

Merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai “*True Skin*”. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm (Perdanakusuma, 2007: 2).

Dermis terdiri dari dua lapisan yaitu lapisan papiler yang tipis mengandung jaringan ikat jarang. Dan lapisan retikuler yang tebal terdiri dari jaringan ikat padat, papilaris tepat di bawah epidermis dan tersusun dari sel-sel fibroblast (pembentukan jaringan ikat) yang menghasilkan suatu kolagen (protein serat lipofil yang tegas dan kurang elastis). Retikularis sendiri terletak di bawah papilaris yang menghasilkan kolagen dan berkas-berkas elastik dengan susunan berbentuk anyaman. Disusun dari pembuluh darah, saluran limfe, serabut saraf, kelenjar keringat, dan akar rambut (Smeltzer, 2002: 1825)

Fungsi Dermis : struktur penunjang, mechanical strength, suplai nutrisi, menahan shearing forces dan respon inflamasi (Perdanakusuma, 2007: 2-3).

c. Lapisan Hipodermis atau kulit bawah (Subkutis), berupa lapisan lemak

Lapisan subkutan terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat jarang dan jaringan lemak. Merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi.

Fungsi Subkutis / hipodermis : melekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, kontrol bentuk tubuh dan mechanical shock absorber (Perdanakusuma, 2007: 2-3).

2. Fisiologi Kulit

Secara umum, beberapa fungsi dari kulit pada tubuh Menurut Slonane (2004: 89) antara lain :

a. Kulit berperan dalam termoregulasi.

Panas tubuh dihasilkan dari aktivitas metabolik dan pergerakan otot. Panas seperti ini harus dikeluarkan, atau suhu tubuh akan naik di atas batas normal. Pada lingkungan bersuhu dingin, panas harus dipertahankan, atau suhu tubuh akan turun di bawah batas normal.

- 1) Pengeluaran panas di kulit berlangsung melalui proses evaporasi air yang disekresi oleh kelenjar keringat dan juga melalui proses perspirasi tak kasat mata (difusi molekul air melalui kulit).
- 2) Pada cuaca panas dan lembab, keringat sangat banyak keluar, tetapi tingkat evaporasi sangat rendah, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman. Dengan demikian, berkeringat sebagai salah satu mekanisme pendinginan hanya akan efisien pada tingkat kelembaban yang lebih rendah.
- 3) Pengeluaran keringat dikendalikan melalui system saraf, yang merespons pemanasan atau pendinginan darah secara berlebihan.
 - Retensi panas adalah salah satu fungsi dari kulit dan jaringan adipose dalam lapisan subkutan. Lemak merupakan insulator panas untuk tubuh dan derajat insulasi bergantung pada jumlah jaringan adiposa.
 - Pembuluh darah dalam papilla dermal juga dikendalikan oleh sistem saraf.

- 4) Jika pembuluh darah berdilatasi, aliran darah ke permukaan kulit.
 - 5) Pembuluh darah berkonstriksi untuk menurunkan aliran darah ke permukaan kulit dalam upaya mempertahankan panas tubuh sentral.
- b. Kulit sebagai indra peraba.

Rasa sentuhan yang disebabkan oleh rangsangan pada ujung saraf dalam kulit, berbeda-beda menurut ujung saraf yang dirangsang. Perasaan panas, dingin, sakit, semua ini perasaan yang berlainan. Didalam kulit terdapat tempat-tempat tertentu, yaitu tempat perabaan, beberapa sensitif (peka terhadap dingin, beberapa terhadap panas, dan lain lagi terhadap sakit) (Pearce, 2005: 243).

- c. Tempat penyimpanan.

Kulit dan jaringan dibawahnya bekerja sebagai tempat penyimpanan air, jaringan adiposa dibawah kulit merupakan tempat penyimpanan lemak yang utama pada tubuh (Pearce, 2005: 243).

- d. Pelindung

Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar. Selain itu, kulit merupakan suatu kelenjar holokrin yang besar (Tranggono, 2007: 11).

e. Kulit berperan penting dalam fotobiogenesis vitamin D.

Bila kulit terkena sinar matahari, sinar ultraviolet memasuki epidermis dan mengubah 7-dehidrokolesterol menjadi menjadi vitamin D. namun kelebihan sinar ultraviolet dapat merusak dan aspek penting kulit. Fungsi protektif kulit adalah kesanggupan meningkatkan produksi melanin bila terkena cahaya matahari terlalu lama dan dengan demikian mengurangi kemungkinan akibat buruk sinar matahari (Fawcett, 2002: 495)

3. Absorpsi obat melalui kulit

Mekanisme kerja obat terjadi ketika bertemu dengan reseptor yang sesuai dengan senyawa komponen dalam obat itu. Absorpsi obat melalui kulit merupakan upaya untuk menghantarkan senyawa dalam obat untuk bertemu dengan reseptornya yang ada di kulit tanpa harus melewati saluran gastrointestinal (peroral). Absorpsi bahan dari luar kulit menuju hingga ke bawah kulit yang tercakup dalam aliran darah, disebut absorpsi perkutan. Umumnya, absorpsi perkutan dari bahan obat ada pada preparat dermatologi, seperti cairan, gel, salep, krim, dan pasta, yang tidak hanya tergantung pada sifat kimia fisika dari bahan obat apa saja, tapi juga pada sifat apabila dimasukkan ke dalam bahan pembawa dalam sediaan farmasetik.

Perlu dipahami bahwa bahan pembawa dalam sediaan farmasetik tidak dapat lebih jauh menembus kulit atau pembawa bahan obat melalui kulit, terhadap kadar dan tingkat penembus kulit, pembawa tidak mempengaruhi laju dan derajat penetrasi zat obat, dan derajat serta laju penetrasi variasi dengan berbedanya obat dan pembawa. Oleh karena itu, untuk absorpsi obat perkutan dan tingkat efikasi terapi yang dihasilkan, maka setiap kombinasi pembawa dalam suatu sediaan obat, harus diuji dan terbukti secara saintifik sendiri-sendiri (Ansel, 2008: 490).

Melalui penelitian yang terus mengalami kemajuan, maka muncul adanya hipotesis yang menganggap bahwa obat dapat mengalami penetrasi melewati kulit yang utuh setelah pemakaian topikal melalui dinding folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar lemak, atau antar sel dari selaput tanduk. Seharusnya bahan obat yang dipakai mudah memasuki kulit yang rusak atau pecah, akan tetapi penetrasi semacam itu bukan merupakan proses absorpsi perkutan yang benar (Ansel, 2008: 491). Penetrasi obat umumnya melalui lapisan epidermis. Komponen lemak menjadi faktor utama tinggi rendahnya penetrasi obat melalui kulit.

Kulit yang utuh, akan memudahkan penetrasi obat melalui lapisan epidermis di mana hal ini merupakan jalur yang lebih baik dari pada melalui folikel rambut atau kelenjar keringat. Ini disebabkan luas permukaan yang lebih rendah jika dibanding kulit yang tidak mengandung elemen anatomi. Lebih lanjut, selaput yang menutupi lapisan tanduk umumnya tidak terus menerus dan tidak mempunyai daya tahan terhadap penetrasi, karena pada susunan dari bermacam-macam selaput dengan proporsi dan keringat yang diproduksi dan derajat daya pelepasnya melalui pencucian atau penguapan keringat (Ansel, 2008:492).

Absorpsi obat yang terjadi melalui kulit disandarkan pada prinsip difusi pasif, yaitu proses pergerakan suatu substansi dari daerah satu ke daerah lain dengan mengalami penurunan tingkat gradien yang diikuti Bergeraknya molekul. Prinsip tersebut bertentangan dengan difusi aktif yang menyatakan bahwa terjadinya pergerakan substansi didasari dari adanya tekanan yang berbeda dari kadar tinggi ke kadar rendah. Terjadinya difusi pasif ini, menurut Martin (1971), didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Konsentrasi obat, di mana semakin besar konsentrasi substansi obat, maka proses difusi dapat berjalan semakin baik.
- b. Koefisien partisi, dapat dilihat pada perbandingan konsentrasi dalam dua fase, menyatakan makin besar koefisien partisi, difusi obat makin cepat.
- c. Koefisien difusi, berdasarkan pada tingkat keluasan membran yang akan semakin mendukung laju difusi obat.
- d. Viskositas, besaran nilainya berbanding lurus dengan koefisien difusi dan berbanding terbalik dengan laju difusi.
- e. Ketebalan membran, yang berdampak pada perlambatan laju difusi bila tingkat ketebalan membran semakin besar.

Stratum korneum dengan ketebalan 10-15 mikrometer menjadi salah satu ornamen dalam proses absorpsi perkutan bagi obat, di mana dengan ketebalan ada lapisan datarnya tersebut dapat mengeringkan sebagian demi sebagian jaringan mati yang membentuk permukaan kulit paling luar. Pada lapisan stratum korneum sendiri, terdiri dari kurang lebih 40% protein dan 40% air, dengan sisanya berupa lemak (trigliserida, asam lemak bebas, kolesterol dan fosfat lemak). Kandungan lemak ini dipatkan dalam fase ekstraseluler yang akan membentuk membran dan mengelilingi sel.


Komponen lemak dipandang sebagai faktor utama yang bertanggung jawab secara langsung terhadap rendahnya penetrasi obat melalui stratum korneum. Molekul obat yang melalui stratum korneum dapat terus masuk melalui jaringan epidermis yang lebih dalam dan masuk ke dalam dermis. Apabila obat mencapai lapisan pembuluh kulit, maka obat tersebut siap untuk diabsorpsi ke dalam sirkulasi umum.

Sebagai jaringan keratin, stratum korneum bekerja sebagai membran buatan yang semi permeabel, lalu membuat molekul obat harus mengalami penetrasi secara difusi pasif. Sehingga jumlah molekul obat yang pindah menyeberangi lapisan kulit tergantung pada konsentrasi, kelarutan, dan koefisien partisi baik minyak atau air. Bahan-bahan yang mempunyai sifat larut dalam keduanya, minyak dan air, merupakan bahan yang baik untuk melakukan difusi melalui stratum korneum, sebagaimana absorpsi melalui epidermis dan lapisan-lapisan kulit lainnya (Ansel, 2008: 492).

Beberapa perintang yang dikemukakan di atas, terdapat hampir di setiap lapisan kulit. Tenripadang (2012) dalam catatannya membagi proses penetrasi obat perkutan dalam dua cara, antara lain:

- a. Rute *transepidermal*, yang merupakan rute penetrasi obat dengan proses difusi melalui stratum korneum dengan dua jalur berkelanjutan. Pertama, jalur *transseluler* yang akan melewati protein dalam sel dan daerah yang kaya akan lipid. Lalu jalur *intraseluler* yang masuk melalui ruang antar sel. Penetrasi *transepidermal* berlangsung melalui dua tahap, yaitu pelepasan obat, dan difusi epidermis - dermis. Pelepasan zat obat yang dibantu pembawa menuju stratum korneum dipengaruhi koefisien partisi obat dalam pembawa dan stratum korneum. Sementara proses difusi dari epidermis dan dermis dibantu aliran darah dalam dermis.
- b. Rute *transappendageal*, merupakan jalur masuknya obat melalui folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebacea, disebabkan adanya pori-pori yang nantinya memungkinkan obat berpenetrasi. Penetrasi obat jalur *transappendageal* lebih kecil dari pada penetrasi jalur *transepidermal*.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi absorpsi kulit terhadap obat percutan, berupa faktor dari sistem di dalam tubuh, faktor lingkungan di luar tubuh, dan faktor obat percutan yang dipakai. Obat yang digunakan akan menentukan daya absorpsi percutan. Hal ini disebabkan karena setiap obat percutan memiliki perbedaan dalam cara, waktu, tempat pemakaian, dan jenisnya. Perbedaan tersebut dapat berupa intensitas pemakaian, keasaman, konsentrasi bahan aktif sediaan, dan jenis pembawa dalam sediaan. Tempat penerapan obat juga cukup berpengaruh, baik dari perbedaan struktur kulit, luas tempat penerapan, usia kulit pemakai.



Gambar II. 2. Rute penetrasi obat (1. Rute transepidermal; 2&3. Rute transappendageal) (Daniels, *Strategies for Skin Penetration Enhancement*)

B. Luka Sayat

Secara umum luka didefinisikan sebagai suatu proses hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang terintegrasi pada epitel dalam kulit. Keadaan ini disebabkan trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik atau gigitan hewan (Brown, 2004: 9).

Luka insisi yang bersih melalui epidermis, dermis dan jaringan subkutis akan sembuh dengan serangkaian tahapan yang timbul bergantian selama waktu tertentu. Segera setelah terjadinya luka, luka terisi darah yang membeku. Segera setelah itu, timbul timbul peradangan akut dan epitelium menutupi luka. Jaringan parut akan terbentuk lebih lambat dan di “remodelling” untuk menghubungkan erat sisi-sisi luka. Walaupun jaringan ini akan dibicarakan secara terpisah, namun perlu diketahui bahwa ia dinamis dan semuanya mulai terbentuk dalam beberapa menit setelah timbulnya luka (Sabiston, 1992: 146).

1. Klasifikasi Luka

Luka adalah suatu irisan atau robekan pada kulit. Semua luka berdarah selalu terasa sakit, dan mudah menjadi terinfeksi. Beberapa diantaranya menyebabkan retak tulang atau perdarahan. Luka-luka itu juga dapat menyebabkan terjadinya syok. Luka dapat dibersihkan dengan baik kemudian ditutup dengan pembalut atau kain bersih (Heru, 1995: 159)

Luka dapat terjadi pada trauma, pembedahan, neuropatik, vaskuler, penekanan dan keganasan. (Perdanakusuma, 2007: 4)

Luka diklasifikasikan dalam 2 bagian :

a. Luka akut : merupakan luka trauma yang biasanya segera mendapat penanganan dan biasanya dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi komplikasi. Kriteria luka akut adalah luka baru, mendadak dan penyembuhannya sesuai dengan waktu yang diperkirakan Contoh : Luka sayat, luka bakar, luka tusuk, *crush injury*. Luka operasi dapat dianggap sebagai luka akut yang dibuat oleh ahli bedah. Contoh : luka jahit, *skin grafting*.

b. Luka kronik : luka yang berlangsung lama atau sering timbul kembali (rekuren) dimana terjadi gangguan pada proses penyembuhan yang biasanya disebabkan oleh masalah multifaktor dari penderita. Pada luka kronik luka gagal sembuh pada waktu yang diperkirakan, tidak berespon baik terhadap terapi dan punya tendensi untuk timbul kembali. Contoh : Ulkus dekubitus, ulkus diabetik, ulkus venous, luka bakar, dll (Perdanakusuma, 2007: 4-5)

Luka sering digambarkan berdasarkan bagaimana cara mendapatkan luka itu dan menunjukkan derajat luka

a. Berdasarkan tingkat kontaminasi

1). *Clean Wounds* (Luka bersih), yaitu luka bedah tak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan (inflamasi) dan infeksi pada sistem pernafasan, pencernaan, genital dan urinari tidak terjadi. Luka bersih biasanya menghasilkan luka yang tertutup, jika diperlukan dimasukkan drainase tertutup (misal; Jackson – Pratt). Kemungkinan terja dinya infeksi luka sekitar 1% - 5%.

2). *Clean-contaminated Wounds* (Luka bersih terkontaminasi), merupakan luka pembedahan dimana saluran respirasi, pencernaan, genital atau perkemihan dalam kondisi terkontrol, kontaminasi tidak selalu terjadi, kemungkinan timbulnya infeksi luka adalah 3% - 11%.

3). *Contaminated Wounds* (Luka terkontaminasi), termasuk luka terbuka, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna; pada kategori ini juga termasuk insisi akut inflamasi nonpurulen. Kemungkinan infeksi luka 10% - 17%.

4). *Dirty or Infected Wounds* (Luka kotor atau infeksi), yaitu terdapatnya mikroorganisme pada luka (Kozier& Erb. 2009: 796).

b. Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka :

1). Stadium I : Luka Superfisial (*Non-Blanching Erythema*) : yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit.

2). Stadium II : Luka "*Partial Thickness*" : yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal.

3). Stadium III : Luka "*Full Thickness*" : yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fascia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya.

4). Stadium IV : Luka "*Full Thickness*" yang telah mencapai lapisan otot, tendon dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas.

c. Berdasarkan terjadinya luka

1). Luka insisi (*Incised wounds*), terjadi karena teriris oleh instrument yang tajam. Misal yang terjadi akibat pembedahan. Luka bersih (aseptik) biasanya tertutup oleh sutura seterah seluruh pembuluh darah yang luka diikat (Ligasi).

2). Luka memar (*Contusion Wound*), terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak.

3). Luka lecet (*Abraded Wound*), terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tidak tajam.

4). Luka tusuk (*Punctured Wound*), terjadi akibat adanya benda, seperti peluru atau pisau yang masuk kedalam kulit dengan diameter yang kecil.

5). Luka gores (*Lacerated Wound*), terjadi akibat benda yang tajam seperti oleh kaca atau oleh kawat

6). Luka tembus (*Penetrating Wound*), yaitu luka yang menembus organ tubuh biasanya pada bagian awal luka masuk diameternya kecil tetapi pada bagian ujung biasanya lukanya akan melebar.

2. Fase Penyembuhan Luka

Penyembuhan luka adalah respon tubuh terhadap berbagai cedera dengan proses pemulihan yang kompleks dan dinamis yang menghasilkan pemulihan anatomi dan fungsi secara terus menerus.(Joyce M. Black, 2001). Penyembuhan luka terkait dengan regenerasi sel sampai fungsi organ tubuh kembali pulih, ditunjukkan dengan tanda-tanda dan respon yang berurutan dimana sel secara bersama-sama berinteraksi, melakukan tugas dan berfungsi secara normal. Idealnya luka yang sembuh kembali normal secara struktur anatomi, fungsi dan penampilan (Tarigan, 2007: 5).

Meningkatnya jumlah fibroblas di dermal menunjukkan kemampuan penyembuhan. Proses penyembuhan luka dapat terhambat oleh adanya stres oksigen reaktif (ROS) yang dihasilkan oleh mikroba atau neutrofil di daerah luka, melalui mekanisme yang menyebabkan kerusakan DNA. Fakta ini memperkuat pendapat bahwa keberadaan antioksidan lokal di daerah luka menjadi faktor penting yang turut mendorong percepatan proses penyembuhan (Bastone EB, 2000: 45).

Proses dasar biokimia dan seluler yang sama terjadi dalam penyembuhan semua cedera jaringan lunak, baik luka ulseratif kronik, seperti dekubitus dan ulkus tungkai; luka traumatis, misalnya laserasi, abrasi, dan luka bakar; atau akibat tindakan bedah.

Proses fisiologis penyembuhan luka menurut Morison (1995: 1) membagi ke dalam 4 fase utama :

1. Respon inflamasi akut terhadap cedera: mencakup hemostatis, pelepasan histamin dan mediator lain dari sel-sel yang rusak dan migrasi sel darah putih (leukost polimorfonuklear dan makrofag) ke tempat yang rusak tersebut.
2. Fase destruktif: Pembersihan jaringan yang mati dan yang mengalami devitalisasi oleh leukosit polimorfonuklear dan makrofag.
3. Fase proliferaatif: yaitu saat pembuluh darah baru yang diperkuat oleh jaringan ikat, menginfiltrasi luka.
4. Fase maturasi: mencakup re-epitelisasi, kontraksi luka dan reorganisasi jaringan ikat.

Dalam kenyataannya, fase-fase penyembuhan tersebut saling tumpang tindih dan durasi dari setiap fase serta waktu untuk penyembuhan yang sempurna bergantung pada beberapa faktor.

Peristiwa seluler dan biokimia di dalam setiap fase secara lebih terinci diperjelas tiap implikasi praktis untuk penatalaksanaan luka setiap tingkat sebagai berikut :

1. Respon inflamasi akut terhadap cedera

Hemostatis: vasokonstriksi sementara dari pembuluh darah yang rusak terjadi pada saat sumbatan trombosit dibentuk dan diperkuat juga oleh serabut fibrin untuk membentuk sebuah bekuan.

Respon jaringan yang rusak: jaringan yang rusak dan sel mast melepaskan histamin dan mediator lain, sehingga menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah sekeliling yang masih utuh serta meningkatnya penyediaan darah ke daerah

tersebut, sehingga menjadi merah dan hangat. Permeabilitas kapiler-kapiler darah meningkat dan cairan yang kaya akan protein mengalir ke dalam spasi interstisial, menyebabkan edema lokal dan mungkin hilangnya fungsi di atas sendi tersebut. Leukosit polimorfonuklear (polimorf) dan makrofag mengadakan migrasi ke luar dari kapiler dan masuk ke dalam daerah yang rusak sebagai reaksi terhadap agen kemotaktik yang dipicu oleh adanya cedera. Fase ini terjadi selama 0-3 hari.

Implikasi untuk penatalaksanaan luka pada respon inflamasi ini :

Fase ini merupakan bagian yang esensial dari proses penyembuhan dan tidak ada upaya yang dapat menghentikan proses ini, kecuali jika proses ini terjadi pada kompartemen tertutup dimana struktur-struktur penting mungkin tertekan (mis., luka bakar pada leher). Meski demikian, jika hal tersebut diperpanjang oleh adanya jaringan yang mengalami devitalisasi secara terus-menerus, adanya benda asing, pengelupasan jaringan yang luas, trauma kambuhan, atau oleh penggunaan yang tidak bijaksana preparat topikal untuk luka, seperti antiseptik, antibiotik, atau krim asam, sehingga penyembuhan diperlambat dan kekuatan regangan luka menjadi tetap rendah. Sejumlah besar sel tertarik ke tempat tersebut untuk bersaing mendapatkan gizi yang tersedia. Inflamasi yang terlalu banyak dapat menyebabkan granulasi yang berlebihan pada fase III dan dapat menyebabkan jaringan paut hipertrofik. Ketidaknyamanan karena edema dan denyutan pada tempat luka juga menjadi berkepanjangan.

2. Fase destruktif

Pembersihan terhadap jaringan mati atau yang mengalami devitalisasi dan bakteri oleh polimorf dan makrofag. Polimorf menelan dan menghancurkan bakteri. Tingkat aktivitas polimorf yang tinggi hidupnya singkat saja dan penyembuhan dapat

berjalan terus tanpa keberadaan sel tersebut. Meski demikian, penyembuhan terhenti bila makrofag mengalami deaktivasi. Sel-sel tersebut tidak hanya mampu menghancurkan bakteri dan mengeluarkan jaringan yang mengalami devitalisasi serta fibrin yang berlebihan, tetapi juga mampu merangsang pembentukan fibroblas, yang melakukan sintesa struktur protein kolagen dan menghasilkan sebuah faktor yang dapat merangsang angiogenesis (fase III). Fase ini mulai terjadi 1-6 hari.

Implikasi untuk penatalaksanaan luka pada fase ini :

Polimorf dan makrofag mudah dipengaruhi oleh turunnya suhu pada tempat luka, sebagaimana yang dapat terjadi bilamana sebuah luka yang basah dibiarkan tetap terbuka, pada saat aktivitas mereka dapat turun sampai nol. Aktivitas mereka juga dapat dihambat oleh agen kimia, hipoksia, dan juga perluasan limbah metabolik yang disebabkan karena buruknya perfusi jaringan.

3. Fase poliferatif

Menurut Schwartz (2000: 134) Fase penyembuhan luka yang ditandai oleh sintesis kolagen. Sintesis kolagen dimulai dalam 24 jam setelah cedera, namun tidak akan mencapai puncak hingga 5 hari kemudian. Setelah 7 hari, sintesis kolagen akan berkurang secara perlahan-lahan. Remodeling luka mengacu pada keseimbangan antara sintesis kolagen dan degradasi kolagen. Pada saat serabut-serabut baru dibentuk dengan kepadatan pengerutan yang makin bertambah. Proses ini akan meningkatkan kekuatan potensial dari jaringan parut). Fase ini terjadi selama 3-24 hari.

Implikasi untuk penatalaksanaan luka pada fase ini :

Gelung kapiler baru jumlahnya sangat banyak dan rapuh serta mudah sekali rusak karena penanganan yang kasar, misalnya menarik balutan yang melekat.

Vitamin C penting untuk sintesis kolagen. Tanpa Vitamin C, sintesis kolagen berhenti, kapiler darah baru rusak dan mengalami perdarahan, serta penyembuhan luka terhenti. Faktor sistemik lain yang dapat memperlambat penyembuhan pada stadium ini termasuk defisiensi besi, hipoproteinemia, serta hipoksia. Fase proliferasi terus berlangsung secara lebih lambat seiring dengan bertambahnya usia.

4. fase maturasi

Epitelisasi, kontraksi, dan reorganisasi jaringan ikat: Dalam setiap cedera yang mengakibatkan hilangnya kulit, sel epitel pada pinggir luka dan dari sisa-sisa folikel rambut, serta glandula sebacea dan glandula sudorifera, membelah dan mulai bermigrasi di atas jaringan granula baru. Karena jaringan tersebut hanya dapat bergerak di atas jaringan yang hidup, maka mitosis berhenti, akibat inhibisi kontak. Kontraksi luka disebabkan karena miofibroblas kontraktif yang membantu menyatukan tepi-tepi luka. Terdapat suatu penurunan progresif dalam vaskularitas jaringan parut, yang berubah dalam penampilannya dari merah kehitaman menjadi putih. Serabut-serabut kolagen mengadakan reorganisasi dan kekuatan regangan luka meningkat. Durasi fase ini terjadi 24 sampai 365 hari.

Implikasi untuk penatalaksanaan luka pada fase maturasi :

Luka masih sangat rentan terhadap trauma mekanis (hanya 50% kekuatan regangan normal dari kulit diperoleh kembali dalam tiga bulan pertama). Epitelisasi terjadi sampai tiga kali lebih cepat di lingkungan yang lembab (di bawah balutan oklusif atau balutan semipermeabel) daripada di lingkungan yang kering. Kontraksi luka biasanya merupakan suatu fenomena yang sangat membantu, yakni menurunkan daerah permukaan luka dan meninggalkan jaringan parut yang relatif kecil, tetapi kontraksi berlanjut dengan buruk pada daerah tertentu, seperti di atas tibia, dan dapat

menyebabkan distrofi penampilan pada cedera wajah. Kadang, jaringan fibrosa pada dermis menjadi sangat hipertrofi, kemerahan, dan menonjol, yang pada kasus ekstrim menyebabkan jaringan parut keloid tidak sedap dipandang.

C. Alpukat

1. Taksonomi dan Morfologi

Kedudukan tanaman obat dalam sistematika (taksonomi) diklasifikasikan sebagai berikut (Rukmana, 1997: 17) :

Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Bangsa	: Ranunculales
Suku	: Lauraceae
Marga	: <i>Persea</i>
Jenis	: <i>Persea americana</i> Mill
Sinonim	: <i>Persea gratissima</i> Gaertn

Alpukat bisa tumbuh pada ketinggian 200-1.000 m dpl di daerah tropis dan subtropik. Pohon alpukat dapat tumbuh dengan ketinggian sampai 20 m, bahkan lebih. Daunnya tebal seperti kulit. Tangkainya memiliki ukuran panjang 1,5-5 cm. daunnya berbentuk oval dengan ujung daun dan pangkal daun runcing. Tepi daunnya rata. Ukuran panjang daun alpukat bisa mencapai 10-20 cm, sedangkan lebarnya 3-10 cm.

Daun alpukat yang sudah tua berwarna hijau halus, sedangkan yang muda berwarna kemerahan dan berambut. Warna buah alpukat ialah hijau atau hijau kekuningan berbintik ungu. Buah itu berbentuk oval yang ukuran panjangnya bias

mencapai 5-20 cm. bila sudah matang, daging buah alpukat lunak dan berwarna hijau kekuningan.

2. Nama Daerah

Di Indonesia, alpukat banyak dikenal dengan berbagai nama diantaranya, alpuket atau alpukat (Jawa Barat), alpokat (Jawa Timur/Jawa Tengah), buah pokat/jambo pokat (Batak), advokat/pookat (Lampung), dan apuket/jambu wolanda (Sunda).

3. Kandungan dan Manfaat Daun Alpukat

Kandungan Daun alpukat

Berbagai kandungan daun alpukat adalah sebagai berikut :

- 1) Daun alpukat mengandung polifenol, quersetin, dan gula alcohol.
- 2) Alpukat juga mengandung betakaroten, klorofil, vitamin E, dan vitamin B kompleks yang berlimpah dalam alpukat.
- 3) Daun alpukat mengandung zat kimia yang sangat berguna bagi manusia, yaitu vitamin E sebesar 3,4 mg/100 g.
- 4) Daun alpukat juga terbukti mengandung asam lemak tidak jenuh, yaitu asam oleat tunggal yang bersifat antioksidan kuat.
- 5) Daun alpukat banyak mengandung mineral kalium, tetapi kadar natriumnya sangat rendah.
- 6) Daun alpukat mengandung serat.
- 7) Daun alpukat mengandung daya simpan cukup lama, yaitu sekitar 10 hari pada suhu kamar. Tetapi, bila disimpan pada suhu rendah 40°C bisa sampai 20 hari.
- 8) Daun alpukat mengandung saponin, alkaloida, flavonoid, dan tanin.

- 9) Daun alpukat juga mengandung zat besi dan tembaga yang sangat berguna bagi pencegahan anemia dan pembentukan sel darah merah.
- 10) Daun alpukat mengandung zat gizi dan senyawa fitokimiawi.
- 11) Daun alpukat juga banyak mengandung kalium dan zat *filantik* yang berfungsi ampuh untuk melancarkan air seni dan menghancurkan batu ginjal.
- 12) Daun alpukat juga mengandung zat mineral, damar, dan tanin.
- 13) Daun alpukat terbukti mengandung banyak protein yang bisa menyejukkan badan bila sarinya diminum (Wahid, 2011: 115-117).

D. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Departemen Kesehatan RI, 1997: 9). Sementara ekstraksi adalah suatu proses penyarian senyawa kimia yang terdapat didalam bahan alam atau berasal dari dalam sel dengan menggunakan pelarut dan metode yang tepat.

Pada prinsipnya ekstraksi adalah melarutkan dan menarik senyawa dengan menggunakan pelarut yang tepat. Ada tiga tahapan proses pada waktu ekstraksi yaitu:

1. Penetrasi pelarut kedalam sel tanaman dan pengembangan sel
2. Disolusi pelarut ke dalam sel tanaman dan pengembangan sel
3. Difusi bahan yang terekstraksi ke luar sel

Proses diatas diharapkan terjadinya kesetimbangan antara linarut dan pelarut. Kecepatan untuk mencapai kesetimbangan umumnya tergantung pada suhu, pH, ukuran partikel dan gerakan partikel. Prinsip yang utama adalah yang berkaitan

dengan kelarutan, yaitu senyawa polar lebih mudah larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar akan mudah larut dalam pelarut nonpolar.

Menurut Ditjen POM (2000), beberapa metode ekstraksi:

a. Cara Dingin

1) Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar).

2) Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (*exhaustive extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Proses perkolasi terdiri dari tahapan pengembang bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

b. Cara panas

1) Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

2) Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

3) Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C.

4) Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit).

5) Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dan temperatur sampai titik didih air, yakni 30 menit pada suhu 90-100°C.

1. Maserasi

Maserasi dilakukan dengan cara memasukkan 10 bagian simplisia dengan derajat yang cocok ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan penyari 75 bagian, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari, terlindung dari cahaya sambil diaduk sekali-kali setiap hari lalu diperas dan ampasnya dimaserasi kembali dengan cairan penyari. Penyarian diakhiri setelah pelarut tidak berwarna lagi, lalu dipindahkan ke dalam bejana tertutup, dibiarkan pada tempat yang tidak bercahaya. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif yang akan larut, karena adanya perbedaan konsentrasi larutan zat aktif didalam sel dan diluar sel maka larutan terpekat didesak keluar. Proses ini berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan didalam dan diluar sel. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, metanol, etanol-air atau pelarut lainnya. Remaserasi berarti dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya.

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana yang mudah diusahakan.

2. Pelarut

Dalam memilih pelarut yang akan dipakai harus diperhatikan sifat kandungan kimia (metabolit sekunder) yang akan diekstraksi. Sifat yang penting adalah sifat kepolaran, dapat dilihat dari gugus polar senyawa tersebut yaitu gugus OH, COOH. Senyawa polar lebih mudah larut dalam pelarut polar, dan senyawa non polar akan lebih mudah larut dalam pelarut non polar.

Etanol adalah penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun non polar. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap baik suhu rendah maupun pada suhu mendidih (78°C), mudah terbakar, serta larut dalam air, dan semua pelarut organik.

Etanol digunakan sebagai penyari karena lebih selektif daripada air, sukar ditumbuhi mikroba dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorbs baik, bercampur dengan air pada segala perbandingan, memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut, dan tidak memerlukan panas tinggi untuk pemekatan. Penggunaan etanol sebagai penyari biasanya dicampur dengan pelarut air, terutama campuran dengan air (Voight, 1995: 969)

E. Sediaan Gel

1. Definisi Gel

Gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan saling diresapi cairan (Ansel, 1989: 390).

Idealnya pemilihan bahan pembentuk gel (*gelling agent*) pada sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain. Penambahan

gelling agent dalam gel perlu dipertimbangkan yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube selama pemakaian. Beberapa gel terutama polisakarida alami peka pada derajat mikrobial. Penambahan bahan pengawet perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel dalam kaitannya dengan mikrobial.

1. Uraian Bahan

Formulasi sediaan gel farmasetika melibatkan beberapa bahan untuk mendukung pembuatannya. Komposisi yang utama adalah bahan yang digunakan untuk membentuk basis gel, baik dari partikel anorganik atau organik. Berikut uraian bahan yang digunakan pada sediaan gel umumnya:

a. Karbopol

Karbopol adalah polimer asam akrilat yang berupa hasil silang dengan salah satu *allyl* sukrosa atau *allyl* eter dari pentaeritritol. Karbopol digunakan dalam sediaan cair dan semisolid sebagai *rheologi modifiers*, termasuk krim, gel, lotion, dan salep yang digunakan untuk sediaan mata, rektal, topikal dan vaginal. Karbopol warna putih, halus seperti benang, asam, dan higroskopik yang sedikit berbau. Konsentrasi karbopol sebagai bahan pembentuk gel 0,5% – 2,0% (Rowe, 2009: 110).

Karbopol mengembang jika didispersikan dalam air dengan adanya zat-zat alkali seperti trietanolamin atau diisopropanolamin untuk membentuk sediaan semipadat (Lachman, 2007: 1119).

b. Gliserin

Gliserin digunakan pada formulasi sediaan topikal dan kosmetik, yang umumnya sebagai humektan dan emolien. Gliserin juga digunakan pada sediaan gel yang encer maupun tidak. Gliserin mempunyai rumus molekul $C_3H_8O_3$ dengan berat

molekul 92,09. Konsentrasi gliserin sebagai humektan adalah sekitar 30% (Rowe *et al*, 2009: 283).

c. Trietanolamin

Senyawa ini tidak berwarna atau kuning pucat, kental dan sedikit berasa ammonia. Trietanolamin (TEA) mempunyai rumus molekul $C_6H_{15}NO_3$ dengan berat molekul yaitu 149,19. Umumnya digunakan pada formulasi sediaan topikal sebagai bahan pemberi basa (Rowe, 2009: 754).

d. Metil paraben

Rumus molekulnya $C_8H_8O_3$ dengan berat molekul 152,15. Serbuk kristal tidak berwarna, hampir atau tidak berbau dan rasa agak membakar.

Metil paraben digunakan sebagai pengawet antimikroba pada sediaan kosmetik, makanan, dan sediaan farmasetika. Biasa digunakan sendiri atau dikombinasi dengan paraben lainnya. Konsentrasi metil paraben sebagai pengawet pada sediaan topikal 0,02% – 0,3% (Rowe, 2009: 442).

Metil paraben digunakan dalam preparat cair dan preparat setengah padat untuk mencegah pertumbuhan jamur (Ansel, 1989: 145).

F. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Hewan coba

Kelinci merupakan hewan mamalia yang termasuk dalam ordo lagomorpha. Hewan pengerat ini memiliki dua pasang gigi seri, berbeda dengan tikus dan hamster yang hanya memiliki sepasang gigi seri (Priyatna, 2011: 20)

Klasifikasi kelinci menurut Rudy Hustamin (2006) :

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata
 Kelas : Mammalia
 Bangsa : Logomorpha
 Suku : Leporidae
 Marga : *Oryctolagus*
 Jenis : *Oryctolagus cuniculus*

2. Morfologi Kelinci

Kelinci tumbuh dengan cepat, dan dapat mencapai bobot badan 2 kg atau lebih pada umur 8 minggu, dengan efisiensi penggunaan pakan yang baik pada ransum dengan jumlah hijauan yang tinggi (Pemprov Lampung, 2011: 1)

Makanan bagi kelinci yaitu daun-daunan/hijauan. Jenis daun-daunan atau hijauan yang biasa diberikan untuk kelinci yaitu rumput setaria, limbah sayuran, seperti kol, sawi, kangkung daun kacang, daun turi, daun ketela rambat. Jumlah hijauan yang diberikan kepada kelinci bergantung pada berat badan kelinci. Misalnya, yang berat badannya 2-3 kg dapat diberikan 1 kg hijauan setiap harinya, sebab masih ada jenis makanan tambahan lain (Mulyono, 2001: 32). Namun, sebelum diberikan kepada kelinci harus dilayukan terlebih dahulu. Pelayuan ini bertujuan mengurangi kadar air yang terdapat didalamnya. Jika tidak dilayukan, urine kelinci bisa berbau menyengat, perutnya kembung, mencret, gatal-gatal dan *scabies*, bahkan bisa menyebabkan kematian akibat keracunan (Hustamin, 2006: 59)

G. Tinjauan dalam Agama Islam

Dalam kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan telah banyak dilakukan. Satu diantaranya menjelaskan khasiat tumbuh-

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa Allah Swt. menciptakan buah-buahan untuk kita memanfaatkan sebagai sumber rezeki dan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Kita juga harus menggunakan akal sehat kita untuk berfikir bahwa kita tidak boleh memanfaatkan ciptaan Allah Swt. untuk hal yang dilarang oleh agama. Salah satunya dengan membuat minuman yang memabukkan yang menimbulkan lebih banyak mudharat daripada manfaatnya.

Kemudian dalam QS Al An‘Aam/6:99, Allah Swt. berfirman :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
 خَضِرًا حَظِيرًا وَمِمَّا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نَخْلًا مِنْ طَلْعِهَا تَعْبُقُونَ بُرُوقًا أَلَيْسَ
 ذَٰلِكَ بِآيَةٍ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْحِكْمَ لِيَذَرُوا الْبِرِّ وَالْإِيمَانَ يَتَذَكَّرُوا أَلَيْسَ
 بِالْحِكْمِ عِلْمًا كَبِيرًا

Terjemahannya :

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (Departemen agama, 2008 : 140)

Ayat ini merupakan salah satu bukti dari kemahakuasaan Allah Swt. Yang menegaskan bahwa *Dan Dia* juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni Allah, mengeluarkan, yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air

itu, segala macam *tumbuh-tumbuhan*, maka *Kami keluarkan darinya*, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, *tanaman yang menghijau*.


Atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah.

Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil untuk kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makanan organik yang dibentuknya.

Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahaesaan Allah. Zat hemoglobin yang diperlukan untuk pernapasan manusia dan sejumlah besar jenis hewan, berkaitan erat sekali dengan zat hijau daun. Atom karbon, oksigen, hydrogen dan nitrogen mengandung atom magnesium dalam molekul klorofil. Di dunia kedokteran, ditemukan bahwa klorofil, ketika diasimilasi oleh tubuh manusia, bercampur dengan sel-sel manusia. Percampuran itu kemudian memberikan tenaga dan kekuatan melawan bermacam bakteri penyakit.

Pada akhir ayat ini mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan (botanik) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya. Ayat ini ditutup dengan *liqaumin yu'minuun/bagi kaum yang beriman*, ia ditutup demikian sebagai isyarat bahwa ayat-ayat ini atau tanda-tanda itu hanya bermanfaat untuk yang beriman.

Pada penelitian ini, memanfaatkan ciptaan Allah Swt. yaitu tumbuh-tumbuhan sebagai obat yaitu ekstrak daun alpukat (*Persea americana* Mill) untuk mengobati luka sayat pada hewan coba yaitu kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).



BAB III
PROSEDUR PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui adanya aktivitas penyembuhan luka sayat dari daun alpukat (*Persea americana* Mill.) menggunakan hewan coba kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

2. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi pengambilan sampel di daerah Manipi, Sinjai Barat, Sulawesi Selatan.
- b. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biofarmasi dan Laboratorium Fitokimia, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode eksperimental laboratorium.

C. Sampel

Sampel yang digunakan adalah daun alpukat (*Persea americana* Mill.) dan kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

D. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyiapan Ekstrak Daun Alpukat

a. Pengolahan sampel

Cuci bersih daun alpukat (*Persea americana* Mill.) (sample basah) kemudian keringkan dengan cara dijemur pada tempat yang terlindung dari sinar matahari lalu potong kecil-kecil. Setelah kering, serbuk halus simplisia dan timbang sebanyak 1 kg.

b. Ekstraksi Sampel

Masukkan 1 kg serbuk daun alpukat (*Persea americana* Mill.) kedalam bejana maserasi lalu rendam dengan etanol 96% sampai terbasahi semua. Kocok sampai benar-benar tercampur, kurang lebih 30 menit dan diamkan 24 jam sampai mengendap. Setelah satu malam, ambil lapisan atas campuran etanol dengan zat aktif. Ampas diekstraksi kembali dengan penyari etanol 96% yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus dilakukan hingga cairan penyari tampak bening. Lanjutkan pada proses evaporasi. Hasil evaporasi diuapkan, sehingga didapatkan ekstrak daun alpukat (*Persea americana* Mill.) 100%. Ekstrak etanol daun alpukat (*Persea americana* Mill.) kemudian ditimbang dengan neraca analitik. Larutan ekstrak daun alpukat (*Persea americana* Mill.) yang telah didapat dibuat menjadi tiga bagian dengan konsentrasi berturut-turut 1%, 3% dan 5%. Masing-masing konsentrasi dibuat dalam bentuk sediaan gel.

2. Pembuatan Sediaan Gel

a. Rancangan formula gel

Bahan	Kegunaan	Formula / konsentrasi (%)		
		I	II	III
Ekstrak	Bahan Aktif	1	3	5
Karbopol	Basis Gel	0,5	0,5	0,5
Metil paraben	Pengawet	0,2	0,2	0,2
Gliserin	Humektan	30	30	30
TEA	Pengalkali	1	1	1
Air	Pembawa	ad 50	ad 50	ad 50

Tabel III. 1 : Rancangan formula gel ekstrak etanol daun alpukat (*Persea americana* Mill.) dengan variasi konsentrasi ekstrak.

b. Pembuatan Gel

Sediaan gel dengan basis karbopol dikerjakan dengan cara karbopol dikembangkan dalam 10 bagian air suling di lumpang, didiamkan hingga mengembang selama 1 x 24 jam. Kemudian ditambahkan TEA lalu dihomogenkan. Selanjutnya ditambahkan berturut-turut metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan air suling panas suhu 75°C , diaduk hingga homogen. Ekstrak dicampurkan gliserin, dimasukkan ke dalam basis, dihomogenkan. Ditambahkan sisa air ke dalam basis, dan dihomogenkan kembali.

3. Penyiapan Hewan Uji

Sebelum penelitian dilaksanakan, hewan uji diadaptasikan terlebih dahulu selama 7 hari. Hewan yang digunakan adalah kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Disiapkan 10 kelinci. Kelinci dibagi menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 2 ekor. 1 kelompok kontrol positif, 1 kelompok negatif, 3 kelompok perlakuan.

Kriteria inklusi meliputi: Kelinci, jenis kelamin jantan, umur 2-3 tahun, berat badan 1,5-2 kg, sehat dan sehat selama kelinci diberi luka sayat pada daerah

punggung sepanjang 3 cm dengan kedalaman ± 2 mm. Kriteria eksklusi meliputi: Kelinci sakit selama masa adaptasi, sakit selama perlakuan berlangsung, mati selama perlakuan berlangsung.

4. Metode Perlakuan pada Kelinci

Kelinci diadaptasikan selama 7 hari di laboratorium dan diberi pakan standar. Pengelompokan dilakukan dengan acak sederhana, 10 ekor kelinci dibagi dalam 5 kelompok. Kelompok I diberi pakan standar dan diberikan sediaan gel ekstrak etanol daun alpukat 1% sebanyak 1g dioleskan sekali setiap 24 jam. Kelompok II diberi pakan standar dan diberikan sediaan gel ekstrak etanol daun alpukat 3% sebanyak 1 gr dioleskan sekali setiap 24 jam. Kelompok III diberi pakan standar dan diberikan sediaan gel ekstrak etanol daun alpukat 5% sebanyak 1g dioleskan sekali setiap 24 jam. Kelompok IV kontrol positif, diberi pakan standar dan dioleskan 1g Bioplasenton[®] sekali setiap 24 jam. Kandungan Bioplasenton[®] berupa ekstrak plasenta dan neomisin sulfat, sangat efektif dalam perawatan luka. Ekstrak plasenta adalah stimulator biogenik yang berperan mempercepat regenerasi sel dan penyembuhan luka. Sedang neomisin sulfat sebagai antibiotik yang membunuh berbagai mikroba. Kelompok V kontrol negatif, diberi pakan standar dan dioleskan 1g sediaan gel karbopol sekali setiap 24 jam. Diamati perubahan yang terjadi pada luka sayat.

5. Pemberian Luka

Sejumlah 10 kelinci yang telah disiapkan, dianastesi menggunakan cairan eter, kemudian dicukur bulu kelinci secukupnya pada daerah punggung. Setiap kelinci diberikan sayatan pada punggungnya masing-masing yang telah dicukur bulunya. Cara pemberian sayatan pada kelinci, pertama-tama pasang alas bagian

bawah tubuh kelinci kemudian cuci tangan, gunakan sarung tangan, kemudian desinfeksi area kulit yang akan diberikan sayatan menggunakan pisau bedah steril, lakukan sayatan sepanjang 3 cm dengan kedalaman luka ± 2 mm dari permukaan kulit punggung kelinci.

E. Instrumen Penelitian

1. Alat Penelitian

Alat yang digunakan antara lain adalah alat-alat gelas (pyrex[®]), autoklaf, bejana maserasi, *blender* (maspion[®]), cawan porselin, jangka sorong (tricle brand[®]), oven, pinset, rotavapor (heidolf[®]), sendok besi, timbangan analitik (precisa[®]), dan *water bath*.

2. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan adalah alkohol, aluminium foil, aquadest, daun alpukat (*Persea americana* Mill.), etanol 96%, gel Bioplacenton[®], gliserin, hewan uji kelinci (*Oryctolagus cuniculus*), karbopol 940, kasa steril, kertas saring *whatman*, metil paraben, petroleum eter, plester, propilen glikol, sarung tangan, trietanolamin.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Pengamatan dari segi perubahan yang terjadi pada luka dan perubahan dari ukuran luka pada area yang telah diberi perlakuan.

2. Analisis Data

Analisis data menggunakan uji data statistik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Efek penyembuhan luka sayat gel ekstrak etanol daun alpukat (*Persea americana* Mill.) pada beberapa konsentrasi dengan pengamatan hari pemberian luka hingga menutupnya luka disajikan dalam tabel berikut :

No.	Sediaan Perlakuan	Rata-rata persentase penyembuhan luka
1	Bioplacenton [®]	66,89%
2	Gel III (5%)	65,10%
3	Gel II (3%)	64,32%
4	Gel I (1%)	63,33%
5	Karbopol	51,29%

Tabel IV. 1. Rata-rata persentase penyembuhan luka sayat

B. Pembahasan

Luka adalah hilangnya atau rusaknya sebagian jaringan kulit yang dapat disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan hewan (Pusponegoro, 1997: 72).

Pengobatan luka umumnya dilakukan dengan mencegah terjadinya infeksi agar penyembuhan secara fisiologi dapat berlangsung lebih cepat, yakni dengan memberikan suatu senyawa antibiotik baik secara oral dan/atau topikal. Perbaikan sel dapat dipercepat dengan memberikan suatu senyawa yang nantinya merangsang pembentukan fibroblast, sel endotel dan sel keratinosit (DiPiro, 2006: 1980).

Sampel yang digunakan adalah daun alpukat (*Persea americana* Mill.) yang berdasarkan kandungan senyawanya memiliki potensi sebagai obat penyembuh luka. Daun alpukat (*Persea americana* Mill.) mengandung senyawa flavanoid, tannin katekat, kuinon, saponin, dan steroid/terpenoid (Maryati, 2007: 1).

Pada penelitian ini menggunakan zat aktif ekstrak daun alpukat (*Persea americana* Mill.) yang diekstraksi menggunakan penyari etanol 96%. Etanol merupakan penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar dan nonpolar (Voight, 1995: 969). Etanol 96% yang tidak banyak mengandung air dapat memberikan hasil ekstrak yang lebih murni.

Proses ekstraksi yang digunakan adalah maserasi, dimana hasil maserat yang didapatkan nantinya dibebaskan dengan proses penguapan penyari dalam alat rotavapor (*rotary evaporation*). Setelah di rotavapor, ekstrak lalu dimasukkan ke dalam eksikator yang berisi silika gel untuk mendapatkan senyawa yang lebih murni.

Ekstrak kental daun alpukat (*Persea americana* Mill.) kemudian dibuat dalam bentuk sediaan gel. Sediaan gel ini dipilih karena karakternya yang mudah merata jika dioles pada kulit, memberi sensasi dingin, tidak menimbulkan bekas dikulit, dan mudah digunakan.

Beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan gel adalah karbopol sebagai basis atau bahan pembentuk gel, metil paraben sebagai pengawet, gliserin sebagai humektan, trietanolamin sebagai pemberi sifat alkalis dan air suling sebagai medium pendispersi.

Pemilihan karbopol sebagai basis gel karena karbopol memiliki beberapa kelebihan yaitu bersifat hidrofil, sehingga mudah terdispersi dalam air dan dengan

konsentrasi 0,5-2,0% mempunyai kekentalan yang cukup sebagai basis gel (Rowe et al, 2009: 110) serta pengaplikasian pada permukaan luka membantu percepatan penyembuhan luka karena sifatnya yang mengikat air. System koloid hidrofilik lebih mudah dibuat dan lebih stabil (Ansel, 1989: 392). Karbopol akan mengembang jika dispersikan dalam air dengan adanya zat-zat alkali seperti trietanolamin atau diisopropanolamin untuk membentuk sediaan semipadat (Lachman et al, 2007: 1119).

Karakteristik sediaan gel yang didapatkan, secara organoleptis berwarna hijau jernih dengan bau khas ekstrak daun alpukat (*Persea americana* Mill.). sediaan gel ini tetap stabil dalam penyimpanan.

Pengujian efek penyembuhan luka sayat gel ekstrak etanol daun alpukat (*Persea americana* Mill.) dilakukan pada hewan kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Hewan yang dipakai untuk pengujian adalah hewan sehat, karena hewan sehat yang diharap produksi yang optimal dan layak digunakan dalam pengujian (Sulastri, 2009: 16). Kelinci umumnya tidak berbahaya bila didekati dan dipegang lembut disamping kulit kelinci yang sangat sensitive sehingga banyak digunakan sebagai salah satu hewan pengujian. Efisiensi penggunaan kelinci jantan dan betina dimaksudkan karena pada pengujian hanya sebatas sistem diluar tubuh hewan uji (topikal) sehingga pengamatan yang dilakukan tidak terganggu system hormonal hewan yang berbeda menurut jenis kelaminnya.

Variasi konsentrasi zat aktif pada sediaan gel I sebanyak 1%, gel II sebanyak 3%, dan gel III sebanyak 5% dilakukan untuk mengetahui konsentrasi optimum aktivitas penyembuhan terhadap luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

Pada penelitian ini digunakan kontrol positif yaitu gel Bioplacenton[®] agar dapat mengetahui kesetaraan efektifitas gel dalam menentukan konsentrasi optimum

ekstrak menyembuhkan luka yang umum digunakan sebagai obat luka. Disamping itu, juga digunakan basis gel sebagai kontrol (pembanding) negatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang memberikan efek penyembuhan luka sayat adalah zat aktif ekstrak etanol daun alpukat (*Persea americana* Mill.).

Kandungan gel Bioplacenton[®] berupa ekstrak plasenta dan neomisin sulfat, sangat efektif dalam perawatan luka. Ekstrak plasenta adalah stimulator biogenik yang berperan mempercepat regenerasi sel dan penyembuhan luka. Sedang neomisin sulfat sebagai antibiotik yang membunuh berbagai mikroba. Luka dengan fungsi fisiologis kulit dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi karena luka mengakibatkan kulit terbuka maka sangat mudah ditumbuhi mikroorganisme.

Penutupan luka terjadi mulai dari pembentukan jaringan granular yang terdiri dari sel-sel fibroblast, serat kolagen yang dihasilkan oleh sel fibroblast, deposit sel-sel radang, kapiler baru, hasil angiogenesis. Penciutan luka terjadi akibat kontraksi serat-serat kolagen yang mempertautkan tepi luka, selanjutnya terjadi epitelisasi akibat proses migrasi dan proses mitosis sel-sel stratum basal dan keratinosit lain yang terpapar luka (sel-sel kelenjar sebaceous, kelenjar keringat, dan akar rambut) ke tengah luka.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh rata-rata persentase penyembuhan luka yaitu bahwa ketiga gel ini memberikan efek penutupan luka yang berbeda-beda. Efek penyembuhan luka sayat yaitu konsentrasi 1%, ini ditandai terjadinya penyembuhan (penutupan luka) 100% pada hari ke-18, untuk konsentrasi 3% penutupan luka 100% terjadi pada hari ke-17, untuk konsentrasi 5% penutupan luka 100% terjadi pada hari ke-16, untuk kontrol positif Bioplacenton[®] terjadi pada

hari ke-13, sementara untuk kontrol negative karbopol terjadi penutupan luka pada hari ke-22.

Hasil analisis statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL), uji efek gel ekstrak etanol daun Alpukat (*Persea americana* Mill.) terhadap luka pada kelinci (*Oryctoagus cuniculus*) menggunakan konsentrasi ekstrak 1%, 3%, 5%, kontrol positif dan kontrol negative, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecepatan penutupan luka dari tiap perlakuan, dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dari uji BNT diketahui efek bioplacenton[®] sangat berbeda nyata dengan gel I (1%), gel II (3%), gel III (5%), dan kontrol negatif. Kemudian gel III (5%) memiliki efek yang sangat berbeda nyata dengan gel I (1%), gel II (3%) dan kontrol negatif. Sementara gel II (3%) memiliki efek yang tidak berbeda nyata dengan gel III (5%). Dan kontrol negatif memiliki efek yang sangat berbeda nyata terhadap semua perlakuan. Maka, ekstrak 5% pada gel III adalah konsentrasi optimum penyembuhan luka.

Pada penelitian ini sebaiknya dilakukan lebih hati-hati khususnya untuk pemberian alkohol saat mengganti perban untuk menutupi luka pada kelinci.

Efek penyembuhan luka sayat gel ekstrak daun alpukat, menunjukkan bahwa kemampuan penyembuhan luka adalah efek dari senyawa yang dikandungnya. Hasil penapisan fitokimia daun alpukat (*Persea americana* Mill.) menunjukkan adanya golongan senyawa flavonoid, tanin katekat, kuinon, saponin, dan steroid/triterpenoid (Maryati, 2007: 1). Manfaat flavonoid antara lain untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, anti inflamasi, mencegah keropos tulang dan antibiotik. Flavonoid dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri dan virus (Hasbi, 2012: 31). Senyawa tanin sebagai astringen, menghentikan perdarahan dan mencegah infeksi

selama menyembuhkan luka internal. Saponin sebagai pembersih dan mampu memicu pembentukan kolagen yang merupakan suatu protein yang berperan dalam penyembuhan luka dengan membantu pembentukan sel-sel epitel.

Umat manusia sebagai khalifah diperintahkan oleh Allah Swt untuk memperhatikan bumi dan seisinya serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, tidak terkecuali tumbuhan. Tumbuhan atau herba mempunyai banyak manfaat karena dapat digunakan sebagai penunjang bagi kehidupan manusia. Tumbuhan bahkan merupakan bahan pangan, sandang dan papan. Karenanya, manusia diperintahkan untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari berbagai macam tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang berbagai macam jenisnya juga digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit.

Seperti halnya dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa daun alpukat (*Persea americana* Mill.) dapat dimanfaatkan untuk mengobati luka sayat. Pemanfaatan daun alpukat (*Persea americana* Mill.) yang sebagaimana mestinya, salah satunya sebagai obat luka sayat adalah tidak lain sebagai bentuk kesyukuran terhadap ciptaan Allah Swt itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Sediaan gel ekstrak etanol daun Alpukat (*Persea americana* Mill.) dapat menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).
2. Konsentrasi optimum ekstrak etanol daun Alpukat (*Persea americana* Mill.) yang dapat menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) adalah sebesar 5%.
3. Agama Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa memanfaatkan dan mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat dengan sebaik mungkin.

B. Saran

1. Disarankan dilakukan penelitian lanjutan ekstrak daun alpukat (*Persea americana* Mill.) pada luka dengan tingkatan yang lebih tinggi.
2. Disarankan dilakukan penelitian lanjutan dengan pembuatan sediaan ekstrak etanol daun alpukat (*Persea americana* Mill.) untuk memperoleh nilai estetika yg lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel, Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Bastone EB, Freer TJ, McNamara JR. *Epidemiology of dental trauma: A Review of the Literature*. Aust Dent J 2000; 45(1): 2–5.
- Basyier, Abu Umar. *Kedokteran Nabi. Antara realitas dan Kebohongan*. Surabaya: Penerbit Syafa Republika. 2011.
- Benediktus, Yohan, D. Lyrawati. *Kulit, Rambut dan Kuku*. kulit-rambut-kuku-goeser-yohan. Pdf. 2009.
- Brown DL. *Wound*. In: Brown DL, Borschel GH, editors. *Michigan Manual of Plastic Surgery 1st ed*. Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins. 2004.
- Daniels, Rolf. *Strategies for Skin Penetration Enhancement*. www.scf-Online.com. (13 februari 2014, pukul 10.07 WITA)
- Departemen Agama. *Al Hikmah. Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro. 2008.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Farmakope Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI. 1979
- Fawcett & Bloom. *Buku Ajar Histologi Edisi 12*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG. 2002
- Hasbi, Safwan. *Uji sensitivitas Perasan Daun Alpukat (Persea americana miller) Terhadap Pseudomonas sp Metode In Vitro*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh. Akademi Analisis Kesehatan. 2012.
- Heru, Adi S. *Kader Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. 1995
- Hustamin, Rudy. *Panduan Memelihara Kelinci Hias*. Jakarta: Penerbit Agro Media Pustaka. 2006
- Lachman, L., Lieberman HA & Kaning JL. *Teori dan Praktek Farmasi Industri Edisi Ketiga*. Jakarta: UI Press. 2007

- Maryati, Sri. *Telaah Kandungan Kimia Daun Alpukat (Persea Americana Mill)*. Bandung: Department of Pharmacy. 2007
- Morison, Moya J. *Seri Pedoman Praktis Manajemen Luka*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 1995
- Mulyono, S. *Beternak Kelinci dan Manfaatnya*. Bogor: Ganeca exact. 2001
- Oktiarni, Dwita. Manaf, Syalfinaf. Suripno. *Pengujian Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn.) terhadap penyembuhan Luka Bakar pada Mencit (Mus Musculus)*. Bengkulu: Kimia FMIPA Gedung T Universitas Bengkulu
- Pearce, Evelyn C. *Anatomi dan Fisiologis untuk Paramedis*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia. 2005
- Pediatri, Dewi. *Patofisiologi Infeksi Bakteri pada Kulit*. Bandung: Ilmu Kesehatan Anak FK-UNPAD/RSUP Hasan Sadikin. 2001
- Perdanakusuma, David S. *Plastic Surgery Departement*. Surabaya-Indonesia. Airlangga University School Of Medicine-Dr. Soetomo General Hospital. 2007.
- Priyatna, Nuning. *Beternak dan Bisnis Kelinci Pedaging*. Jakarta: AgroMedia Pustaka. 2011
- Pusponegoro AD, Bisono. *Luka, Trauma, Syok Dan Bencana Alam*. In: Sjamsuhidajat R, De Jong W, editor. *Buku Ajar Ilmu Bedah edisi revisi*. Jakarta: EGC Penerbit Buku Kedokteran. 1997.
- Rowe, Raymond C., Paul JS, Marian EQ. *Handbook of Pharmaceutical Exipients Sixth Edition*. The Pharmaceutical Press. USA. 2009.
- Rukmana, H. Rahmat. *Budidaya dan Pemanfaatan Alpukat*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- Sabiston, David C. *Buku Ajar Bedah Bagian 1*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. 1992
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 7 dan vol. 8. Jakarta. Lentera Hati. 2002

- Slonane, Ethel. *Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula*. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2004
- Smeltzer, S, Bare BG. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth edisi 8 volume 3*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran. 2002.
- Sulastri, Feny. *Uji Toksisitas Akut yang Diukur dengan Penentuan LD₅₀ Ekstrak Daun Pegagan Terhadap Mencit BALB/C*. Semarang. 2009.
- Tarigan, R dan Pemila, Uke. *Perawatan luka. Moist Wound Healing*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2007
- Tenripadang, Diza. *Uji Efek Penyembuhan Luka Sayat pada Kelinci Menggunakan Jarak Pagar dalam Bentuk Sediaan Gel*. Makassar: UIN alauddin Makassar. 2012.
- Tranggono, Retno Iswari. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007
- Voight, Rudolf. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995
- Wahid, Abdul. *Dahsyatnya Khasiat Daun-Daun Obat di sekitar Pekaranganmu*. Jogjakarta: Penerbit Laksana. 2011

RIWAYAT HIDUP



Vivi Meylani Putri, akrab disapa Vivi. Lahir pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 1991 di kota Sinjai. Saya merupakan anak kelima dari 10 bersaudara buah hati pasangan Anwar Alim dan Syamsinar. Sejak kecil, saya memiliki hobby melukis dan bernyanyi.


Mengawali jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 4 tahun 1998. Lulus pada tahun 2003. Pada tahun yang sama, saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai. Tahun 2006, saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sinjai hingga tahun 2009,


Melalui jalur SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) di tahun 2010, saya memilih jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sebagai konsentrasi studi kuliah.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ekstraksi Daun Alpukat (*Persea americana* Mill.)



Lampiran 2. Pembuatan Gel Ekstrak Daun Alpukat

Lampiran 3. Pengujian Pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)

Lampiran 5. Presentase Perubahan Panjang Luka Sayat

Tabel 4. Presentase Perubahan Panjang Luka Sayat

Hari ke	Gel 1%		Gel 3%		Gel 5%		Kontrol (+)		Kontrol (-)	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.33	6.7	16.7	20	13.3	10	10	10	3.3	6.67
3	10	17	20	23.3	16.7	13.33	16.7	16.7	6.7	10
4	23.3	20	20	23.33	33.3	16.67	20	20	17	13.3
5	33.3	27	26.7	33.3	40	33.3	26.7	23.3	20	16.7
6	33.3	33	33.3	50	46.7	36.67	33.3	30	33	23.3
7	33.3	47	50	50	46.7	43.33	43.3	46.7	50	43.3
8	50	50	53.3	50	46.7	43.33	43.3	46.7	50	46.7
9	53.3	57	53.3	50	50	46.67	66.7	60	50	48.3
10	56.7	60	53.3	56.7	53.3	50	66.7	66.7	53	50
11	63.3	67	50	66.7	56.7	53.33	66.7	70	53	50

Hari Ke	Gel 1%		Gel 3%		Gel 5%		Kontrol (+)		Kontrol (-)	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
12	73.3	70	56.7	73.3	60	56.67	73.3	86.7	53	50
13	83.3	83	73.3	83.3	63.3	63.33	100	100	57	50
14	83.3	87	80	86.7	73.3	70	100	100	67	53.3
15	86.7	90	86.7	90	100	76.67	100	100	67	60
16	93.3	97	93.3	96.7	100	83.33	100	100	73	70
17	100	97	100	100	100	93.33	100	100	77	73.3
18	100	100	100	100	100	100	100	100	77	73.3
19	100	100	100	100	100	100	100	100	83	76.7
20	100	100	100	100	100	100	100	100	87	83.3
21	100	100	100	100	100	100	100	100	93	93.3
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Lampiran 6. Perhitungan RAL (Rancangan Acak Lengkap), Hubungan antara Formula dan Kecepatan Penutupan luka.

Tabel 5. Hubungan antara Formula dan Kecepatan Penyembuhan Luka

formula	Hari ke-n luka tertutup 100%		Jumlah	Rata-rata
	1	2		
1%	13	13	26	13
3%	15	18	33	16.5
5%	17	17	34	17
Kontrol (+)	17	18	35	17.5
Kontrol (-)	22	22	44	22.0
Jumlah	84	88	172	Y

Perhitungan Anova

$$\begin{aligned} \text{Faktor Koreksi} &: \frac{(\sum Y)^2}{a \times b} \\ &: \frac{(172)^2}{1 \times 5} \\ &: \mathbf{2958.4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total} &: (13)^2 + (13)^2 + (15)^2 + (18)^2 + (17)^2 + (17)^2 + (18)^2 + (22)^2 + (22)^2 - \text{FK} \\ &: 3046 - 2958.4 \\ &: \mathbf{87.6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Perlakuan} &: \frac{(26)^2 + (33)^2 + (34)^2 + (35)^2 + (44)^2}{5} - \text{FK} \\ &: 3041 - 2958.4 \\ &: \mathbf{82.6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat} &: \text{JK Total} - \text{JK Perlakuan} \\ &: 87.6 - 82.6 \\ &: \mathbf{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{db Total} &: r \times t - 1 \\ &: 2 \times 5 - 1 \\ &: \mathbf{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{db Perlakuan} &: t - 1 \\
 &: 5 - 1 \\
 &: 4 \\
 \text{Galat} &: \text{db Total} - \text{db Perlakuan} \\
 &: 9 - 4 \\
 &: 5 \\
 \text{KT Perlakuan} &: \frac{J_u \quad k \quad p}{d \quad b \quad p} \\
 &: \frac{82,6}{4} \\
 &: 20,65 \\
 \text{KT Galat} &: \frac{5}{5} \\
 &: 1 \\
 \text{F-Hitung} &: \frac{K \quad P}{K \quad G} \\
 &: \frac{20,65}{1} \\
 &: 20,65
 \end{aligned}$$

Tabel 6. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel

Sumber Keragaman (SK)	Jumlah Kuadrat (JK)	Derajat Bebas (db)	Kuadrat Tengah (KT)	F-Hitung	F-Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	82,6	4	20,65	20,65**	2,33	3,25
Galat	5	5	1			
Total	72,4	14				

$$\text{Koefisien Keseragaman} : \frac{\sqrt{K}}{\bar{Y}} \times 100\%$$

$$\frac{\sqrt{1}}{17,2} \times 100\%$$

$$: \frac{1}{17,74} \times 100\%$$

$$: 5,8 \%$$

Perhitungan Nilai BNT 0,05

$$\begin{aligned}
 \text{BNT} &= t \ ; \text{dbG} \sqrt{\frac{2K}{r}} \\
 &= t(0,05) ; 5 \sqrt{\frac{2 \times 1}{2}} \\
 &= 2,015 \sqrt{\frac{2}{2}} \\
 &= 2,015 \times 1 \\
 &= 2,015
 \end{aligned}$$

Perhitungan Nilai BNT 0,01

$$\begin{aligned}
 \text{BNT} &= t(0,01) ; 5 \sqrt{\frac{2K}{r}} \\
 &= 3,364 \sqrt{\frac{2}{2}} \\
 &= 3,364 \times 1 \\
 &= 3,364
 \end{aligned}$$

Tabel 7. RAL, BNT Hubungan antara formula dan kecepatan mulai penutupan luka

Perlakuan	Rata-rata	Kontrol (+)	Gel 5%	Gel 3%	Gel 1%	Kontrol (-)
		13	16,5	17	17,5	22
Kontrol (+)	13	0				
Gel 5%	16,5	3,5**	0			
Gel 3%	17	4**	0,5(n)	0		
Gel 1%	17,5	4,5**	1(n)	0,5 (n)	0	
Kontrol (-)	22	9**	5,5**	5**	4,5**	0

Keterangan * = Signifikan (Berbeda nyata)
 ** = Sangat Signifikan (Sangat berbeda nyata)
 (n) = Non Signifikan

Lampiran 7. Daun Alpukat (*Persea americana* Mill.)



Gambar 3. Daun Alpukat (*Persea americana* Mill.)


Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian



Gambar 4. Alat Rotavapor



Gambar 5. Ekstrak Etanol Daun Alpukat (*Persea americana* Mill.) Kering



Gambar 6. Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Alpukat (*Persea americana* Mill.) dengan Variasi Konsentrasi dan Kontrol Negatif

ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 7. Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) Setelah Dilukai



Gambar 8. Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) Setelah Penyembuhan

ALAUDDIN
M A K A S S A R