

**UJI ORGANOLEPTIK PERENDAMAN TELUR ASIN dengan
MENGUNAKAN EKSTRAK JERUK PURUT**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana (S1) Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

REZKIYANTI ISNANI

60700114019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

1. Yang menyatakan dibawah ini:

Nama : REZKIYANTI ISNANI

Nim : 60700114019

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli
- b. Apabila sebagian atau keseluruhnya dalam karya skripsi ini terutama Bab Hasil dan Pembahasan tidak asli atau plagiat, maka bersedia dikenakan sanksi akademik yang berlaku.

2. Demikianlah surat pernyataan ini yang dibuat untuk dapat digunakan seperlunya

Samata, Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Penyusun
ALAUDDIN
M A K A S S A R

REZKIYANTI ISNANI

Nim: 60700114019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Uji Organoleptik Perendaman Telur Asin dengan Menggunakan Ekstrak Jeruk Purut (*Citrus hystrix*)", yang disusun oleh **Rezkiyanti Isnani, NIM: 60700114019**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 8 Dzul-Hijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan.

Samata- Gowa, Agustus 2018 M
Dzul-hijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si.** (.....)

Sekretaris : **Astati, S.Pt., M.Si.** (.....)

Munaqisy I : **Khaifah Asgaf, S.TP., M.Si.** (.....)

Munaqisy II : **Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.** (.....)

Pembimbing I : **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.** (.....)

Pembimbing II: **Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P.** (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205199303 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas berkat dan bimbingannya serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Uji Organoleptik Perendaman Telur Asin dengan Menggunakan Ekstrak Jeruk Purut**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda tercinta **H. Alimuddin, S.Pd.,M.M** dan Ibunda tercinta **Hj. Suraedah, S.Pd., M.M** karena mereka saya bisa sampai ketahap ini yang pastinya tidak lepas dari doa dan dukungan tanpa pamrih, penuh

kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini. Satu hal yang memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi karna saya adalah satu-satunya harapan mereka yang bisa membahagiakan mereka kelak dihari tua, Amin.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Dr. Wasilah, S.T, M.T** Selaku wakil dekan 1 bidang akademik Fakultas Sains, **Dr. M. Thahir Maloko, M.Th.I** Selaku wakil dekan 2 bidang administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan **Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si** selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. **Bapak Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dan ibu **Astati, S.Pt., M. Si** selaku sekretaris jurusan Ilmu Peternakan.
4. **Ibunda Khaerani Kiramang S.Pt., MP.** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan **Ibunda Hj. Irmawaty S.Pt., M.P** selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbinganya selama ini dan banyak meluangkan

waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.

5. **Ibunda Khaifa Asgaf, Sp dan Bapak ,Dr. M. Thahir Maloko, M.Th.I** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
7. **Ibu Drh. Aminah Hajah M.Si, Bapak Muh. Arsan Jamili S.Pt., M.Si** dan, **Ibu Hikmawati S.Pt** selaku Laboran Jurusan Ilmu Peternakan yang telah memberikan ilmunya selama menjadi asisten laboratorium sampai dengan proses selesainya penelitian.
8. Kak **Andi Afriana, S.E** selaku Staf Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari proposal hingga skripsi.
9. Sahabat saya **Eka Fitriani, Mukhlisani, Nurul Nadyah Putri, Isra Nurfadilah Haris, Hilmiati dan Nurbaya** yang selama ini telah hadir dalam suka dan duka mulai dari awal perkuliahan sampai proses selesainya skripsi ini.
10. Buat teman-teman Ilmu Peternakan Angkatan 2014 terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawa yang selama ini terjalin.
11. Senior dan Adik-adik di jurusan Ilmu Peternakan.
12. Keluarga yang selama ini telah membantu dalam penyelesaian skripsi

13. Sahabat saya **Iin Handayani, Musdalifah, Rifka Magfirah, Fandy, Andi Imam Dwi Resky, Andi Fajar dan Firman Maulana Al-irfan**, terima kasih juga atas kebersamaan dan semangatnya selama ini.
14. Bapak Kepala Desa, Ibu Desa dan teman-teman **KKN Angkatan 57 Desa Sicini Kecamatan. Parigi, Kab. Gowa** terima kasih yang selalu memberi semangat selama ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, Agustus 2018

Rezkiyanti Isnani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Hal.
SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRAC	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Defenisi Operasional	4
F. Hipotesis	4
G. Ruang Lingkup.....	4
H. Kajian Terdahulu.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Al-Qur'an	7
B. Telur Bebek.....	10
C. Kandungan Gizi Telur	17
D. Pengawetan	18
E. Jeruk Purut	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Tempat	26
B. Alat dan Bahan Penelitian	26
C. Jenis Penelitian	26
D. Metode Penelitian	26
E. Prosedur Penelitian.....	27
F. Parameter yang diukur.....	30
G. Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Uji Organoleptik.....	34
1. Aroma	34
2. Kemasiran	36
3. Rasa.....	37
4. Warna	39

BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	45
RIWAYAT HIDUP.....	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Hal
1.	Telur Bebek.....	10
2.	Struktur Telur.....	13
3.	Jeruk Purut	22
4.	Pohon Jeruk Purut.....	23
5.	Diagram Alir Pembuatan Telur Asin.....	29



DAFTAR TABEL

No.	Teks	Hal
1.	Mutu Telur Asin.....	21
2.	Uji Organoleptik Telur Asin Berdasarkan Aroma	34
3.	Uji Organoleptik Telur Asin Berdasarkan Kemasiran.....	36
4.	Uji Organoleptik Telur Asin Berdasarkan Rasa.....	37
5.	Uji Organoleptik Telur Asin Berdasarkan Warna.....	39



ABSTRAK

Nama : Rezkiyanti Isnani
Nim : 60700114019
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Uji Organoleptik Perendaman Telur Asin dengan Menggunakan Ekstrak Jeruk Purut (*Citrus hystrix*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas telur melalui uji organoleptik telur bebek yang diasinkan dengan penambahan ekstrak jeruk purut (*Citrus hystrix*). Dilaksanakan pada 27 Juni sampai dengan 9 Juli 2018, bertempat di laboratorium teknologi hasil ternak (THT) jurusan ilmu peternakan fakultas sains dan teknologi. Penelitian ini menggunakan telur segar yang berumur dibawah 7 hari. Metode Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Setiap ulangan menggunakan 5 buah telur bebek. Perlakuan yang digunakan yaitu dengan menggunakan konsentrasi larutan ekstrak jeruk purut 0%, 10%, 20% dan 30% serta lama simpan 10 hari. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang berpengaruh nyata ($p < 0,05$) terhadap aroma, kemasiran, rasa, dan warna.

Kata kunci : Jeruk purut (*Citrus hystrix*), telur itik.

ABSTRACT

Name : Rezkiyanti Isnani
Nim : 60700114019
Jurusan : Ilmu Peternakan
Title : Uji Organoleptik Perendaman Telur Asin dengan Menggunakan Ekstrak Jeruk Purut (*Citrus hystrix*)

This study aims to determine the quality of eggs through organoleptic tests of duck eggs which are marinated with the addition of kaffir lime extract (*Citrus hystrix*). Conducted on June 27 to July 9, 2018, held at the livestock technology laboratory (ENT) majoring in science and technology faculties of science and technology. This study uses fresh eggs that are under 7 days old. This research method was carried out using a completely randomized design (CRD) 4 treatments and 5 replications. Each test uses 5 duck eggs. The treatment used is by using a concentration of lime solution of 0%, 10%, 20% and 30% and a shelf life of 10 days. The results of the study concluded that there was no significant effect ($p < 0,05$) on aroma, taste, taste, and color.

Keywords: *kaffir lime (citrus hystrix), duck egg.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telur merupakan suatu produk utama yang dihasilkan unggas, bahan pangan yang sempurna, karena mengandung zat-zat gizi yang lengkap bagi pertumbuhan makhluk hidup baru. Kegunaan yang paling umum adalah untuk lauk pauk sebagai pengganti ikan, sebagai campuran pembuatan martabak dan campuran pembuatan kue di mana memiliki rasa yang enak serta mudah di dapat. Telur umumnya akan mengalami kerusakan setelah disimpan lebih dari dua minggu diruang terbuka, baik kerusakan secara fisik, kimiawi maupun biologis yang disebabkan mikroorganisme.

Telur asin merupakan teknologi hasil peternakan yang peminatnya cukup banyak. Sebagian besar telur asin dibuat dari telur bebek. Dimana telur merupakan salah satu pengolahan telur dengan penambahan garam untuk memperpanjang daya siman telur. Penambahan garam dalam jumlah tertentu mempengaruhi rasa asin pada telur yang diasinkan. Semakin banyak yang dicampurkan semakin panjang juga daya simpannya, namun telur akan semakin terasa asin.

Pengawetan merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kualitas telur, menjaga telur bebek supaya tidak rusak dan memperpanjang masa simpan telur bebek. Pengawetan telur bebek yang paling sederhana yaitu dengan cara pengasinan atau diolah menjadi telur asin, dengan melakukan perendaman dengan penambahan ekstrak jeruk purut sebagai cita rasa.

Jeruk purut (*Citrus histrix DC*) merupakan tanaman yang dikenal masyarakat memiliki kegunaan. Hampir setiap dari bagian jeruk purut dapat di manfaatkan mulai dari daun kulit buah dan dan rantingnya. Umumnya jeruk dapat digunakan sebagai *flavour* alami pada berbagai produk makanan dan minuman. Minyak atsiri yang dihasilkan oleh jeruk purut telah diketahui memiliki kemampuan antibakteri karena kandungan senyawa yang dimilikinya. Minyak atsiri kulit jeruk purut memiliki bobot jenis 0,8766 g/cm³, indeks bias 1,4730, angka asam 0,8275, dan kadar minyak 2,13%. Minyak atsiri adalah zat cair yang mudah menguap bercampur dengan persenyawa komposisi padat yang berbeda dalam hal komposisi dan titik cairnya, kelarutan dalam pelarut organik dan kelarutan dalam air yang di peroleh air di bagian tanaman, kulit, buah, maupun biji (Agusta, 2000).

Jeruk purut memiliki banyak manfaat diantaranya adalah air perasan daging buah jeruk purut dapat digunakan sebagai obat batuk, obat kulit, dan antiseptik. Selain itu buah jeruk purut digunakan untuk menghilangkan bau amis pada ikan, pengharum tepung tawar, dan pencuci rambut, jeruk purut memiliki rasa yang kecut dan sedikit asam, namun ternyata dibalik rasanya tersebut terkandung banyak nutrisi yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Buah ini mengandung serat, gula, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, kalori, zat besi, sodium, dan juga kalsium. Dengan melihat semua kandungan tersebut, buah ini dapat digolongkan sebagai buah bergizi.(Mifta, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian tentang bagaimana pengguna ekstrak jeruk purut terhadap kualitas telur asin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana kualitas telur asin melalui uji organoleptik telur bebek yang diasinkan dengan ekstrak jeruk purut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kualitas telur asin melalui uji organoleptik telur bebek yang diasinkan dengan ekstrak jeruk purut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk menunjang penelitian lain dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengendalian mutu dan keamanan pangan dibidang peternakan khususnya cara penggunaan jeruk purut sebagai bahawan pengawet telur.
2. Menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan bagi perusahaan peternakan telur bebek sehingga dapat menerapkan perendaman jeruk purut sebagai bahan pengawet guna dapat memperpanjang daya simpan telur jika tidak terjual.
3. Pemerintah dapat mengembangkan dan melakukan penyuluhan kepada para peternak, masyarakat atau pedagang telur sehingga memeperpanjang masa penyimpanan telur.

E. Defenisi Operasional

1. Ekstrak jeruk purut merupakan bahan yang diperoleh dari proses ekstraksi. Yang digunakan sebagai pelarut serta menghasilkan minyak atsiri, dan bermanfaat sebagai penyedap rasa.
2. Telur asin adalah telur segar yang diolah dalam keadaan utuh dan diawetkan, sekaligus diasinkan dengan menggunakan bahan utama garam.
3. Kualitas telur asin adalah kualitas telur yang baik, dimana keadaan telur asin ditandai dengan putih telurnya berwarna putih cerah, tingkat keasinannya meskipun tinggi masih bisa di tolerir oleh lidah, bagian kuningnya berwarna kuning tua berstektur seperti paasir dan aroma bagian putih maupun kuning segar khas telur asin.

F. Hipotesis

Diduga pemanfaatan ekstrak jeruk purut mempertahankan kualitas telur bebek.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi uji organoleptik peredaman telur asin dengan menambahkan ekstrak jeruk purut.

H. Kajian Terdahulu

Menurut (Ristanto, 2013) Uji Organoleptik dan Mikrobiologi Telur Asin Menggunakan Perendaman Lumpur Sawah dengan tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sifat organoleptik telur bebek yang diasinkan dengan lumpur sawah dan telur bebek yang diasinkan dengan serbuk batu bata merah. 2) Untuk mengetahui populasi bakteri. Metode penelitian ini adalah eksperimen

dengan rancangan acak lengkap (RAL) pola 1 faktor yaitu media untuk perendaman telur asin. Populasi dalam penelitian ini adalah telur bebek di daerah Janti, Polanharjo, Klaten, dengan jumlah sampel 20 telur. Teknik pengambilan data yang digunakan metode eksperimen dan angket. Parameter penelitian ini adalah uji organoleptik dan mikrobiologi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis uji organoleptik dan uji populasi bakteri. Berdasarkan dari analisis uji organoleptik telur dengan perendaman lumpur sawah diperoleh hasil warna putih telur putih, kuning telur kemerahan, aroma agak amis, rasa asin, tekstur agak kenyal dan agak masir. Perendaman telur asin dengan menggunakan serbuk batu bata merah diperoleh hasil warna putih telur putih, kuning telur kemerahan, aroma sedikit amis, rasa asin, tekstur kenyal dan masir, yang berarti bahwa ada perbedaan sifat organoleptik telur asin dengan menggunakan perendaman lumpur sawah dan serbuk batu bata merah, yaitu aroma dan tekstur telur asin. Analisis uji populasi bakteri telur asin dengan perendaman lumpur sawah diperoleh jumlah bakteri lebih banyak dibandingkan dengan perendaman menggunakan serbuk batu bata merah. Jumlah bakteri pada telur dengan perendaman lumpur sawah 292.500 bakteri/gram sedangkan telur dengan perendaman serbuk batu bata merah jumlah bakteri 14.000 bakteri/gram.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 1) Organoleptik telur asin hasil perendaman lumpur sawah dan serbuk batu bata merah hampir sama yaitu warna putih telur putih, kuning telur kemerahan dan rasa asin, kecuali aroma dan tekstur. Aroma telur asin hasil perendaman lumpur sawah agak amis sedangkan telur asin hasil perendaman serbuk batu bata merah sedikit amis. Tekstur telur sawah hasil

perendaman lumpur sawah agak kenyal dan agak masir sedangkan telur asin hasil perendaman serbuk batu bata merah kenyal dan masir. 2) Telur asin hasil perendaman lumpur sawah mengandung lebih banyak mengandung bakteri yaitu 292.500 bakteri/gram, dibandingkan telur asin hasil serbuk batu bata merah sebesar 14.000 bakteri/gram.

Menurut (Sariati, 2017), Isolasi Ekstrak Kulit Jeruk Purut (*Citrus hystrix*) dengan Metode Maserasi. Diketahui bahwa Tanaman jeruk purut (*Citrus hystrix*) adalah tanaman tropis yang banyak memiliki manfaat salah satunya sebagai penghasil minyak atsiri. *Limonena* merupakan salah satu senyawa hasil isolasi dari kulit jeruk purut (*Citrus hystrix*). Rendemen minyak atsiri yang diperoleh dari kulit jeruk purut (*Citrus hystrix*) melalui metode maserasi kemudian disaring dan dilakukan destilasi sederhana (alat vacum evaporator). Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri yang terkandung dalam kulit jeruk purut (*Citrus hystrix*) dapat dimaserasi selama 6 jam. Minyak atsiri yang didapat dari minyak atsiri untuk 50 gram kulit jeruk purut (*Citrus hystrix*) adalah 1.528 gram dengan rendemen 6.112 %.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Ilmu Alquran

Ternak ayam merupakan ternak penghasil telur. Telur merupakan produk asal hewan yang memiliki kandungan zat gizi yang lengkap. Dari telur terteslah ciptaan baru yang sepadan, secara biologis sebelum ditetaskan telur berada di dalam sistem reproduksi selama 24 jam dalam sehari. Dalam penciptaan telur dijelaskan dalam QS al-Imran/3:27 sebagai berikut:

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُهُمْ مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Engkau masukkan malam kedalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas) (Kementrian Agama, RI; 2012).

Dalam "Tafsir Al-Misbah" Allah mendatangkan sesuatu yang memiliki sifat hidup dari sesuatu yang tidak memilikinya dan mendatangkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Siklus kehidupan dan kematian merupakan rahasia keajaiban alam dan rahasia kehidupan. Ciri utama siklus ini adalah bahwa zat-zat hidrogen, karbondioksida, nitrogen dan garam yang nonorganik di bumi, berubah menjadi zat-zat organik yang merupakan bahan kehidupan pada hewan dan tumbuh-tumbuhan, berkat bantuan 7 : matahari. Begitulah, Sang Pencipta Yang

Maha Kuasa mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan di setiap saat.

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah menggilirkan peredaran waktu siang dan malam selama 24 jam dimana 12 jam untuk siang dan 12 jam untuk malam. Dalam edaran waktu tersebut segala hal dapat terjadi dari siang ke malam dan dari malam ke siang hari, seperti peristiwa pembentukan telur didalam sistem reproduksi yang normalnya anak ayam terbentuk kurang dari 24-26 jam. Ditinjau dari segi ilmiah terdapat telur yang tidak bernyawa kemudian menetas menjadi seekor anak ayam yang hidup.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memasukkan malam kedalam siang seperti halnya pada saat ternak ayam masih dalam bentuk telur didalam alat reproduksi yang dalam keadaan gelap kemudian menetas dan menjadi keadaan terang yang penuh dengan cahaya, semua itu dapat terjadi sebagai bukti kekuasaan Allah supaya kita bersyukur dan tidak ada yang tidak mungkin selama Allah mengkehendaknya.

Kebutuhan gizi masyarakat dapat dipenuhi, maka proses pengembangan pengendalian mutu dan keamanan pangan, mengenai produk pengelolaan telur harus memperhatikan unsur nutrisi yang ada di dalam telur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan proses pengawetan dengan memanfaatkan bahan alam salah satunya adalah dengan kulit buah. Hal ini dijelaskan dalam QS an - Nahl/16: 11 yaitu :

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Kementrian Agama, RI; 2012).

Ayat ini menyebut beberapa manfaat atau populer dalam masyarakat arab tempat dimana turunnya al-Qur'an dengan menyatakan bahwa Dia, yakni Allah swt., menumbuhkan bagi kamu dengannya, yakni dengan air hujan itu, tanaman-tanaman, dari yang mulai cepat layu sampai dengan yang paling panjang dan dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan Zaitun yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik, dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu dijadikan makanan yang halal atau minuman yang haram, dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan, selain yang disebut itu. Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu benar-benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tanda itu berguna bagi kaum yang memikirkan. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda.

Ayat ini menunjuk buah kurma dengan nama *an-nakhil* yang digunakan untuk menunjuk pohon dan buahnya secara keseluruhan, berbeda dengan *al-a'nab* yang menunjuk kepada kepada buah anggur saja. Hal ini menurut *Al-Biq'a'i*, untuk

mengisyaratkan bahwa terdapat banyak sekali manfaat pada pohon kurma, bahkan hanya pada buahnya, berbeda dengan anggur yang manfaatnya selain buahnya hanya sedikit.

B. Telur Bebek

Telur sebagai salah satu produk peternakan unggas yang bergizi tinggi dan sangat dibutuhkan oleh tubuh, karena merupakan sumber protein, asam lemak vitamin dan mineral. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat. Selain itu telur mudah diperoleh dan harganya relative murah. Ada bermacam- macam jenis telur unggas yang dikonsumsi, diantaranya telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh (Lukito dkk, 2012).



Gambar 1. Telur bebek

Telur merupakan salah satu bahan makanan yang bernilai gizi tinggi bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Telur merupakan bahan pangan asal

hewan yang mempunyai daya pengawet alamiah yang paling baik, karena memiliki suatu pelindung kimia dan fisis terhadap infasi mikroba. Mekanisme ini sebenarnya dibuat untuk melindungi embrio unggas sehingga terjamin pertumbuhannya sampai telur menjadi anak unggas (Astawan, 2008).

Telur unggas yang paling banyak di konsumsi salah satunya adalah telur bebek. Telur bebek sebagai bahan pangan yang cukup sempurna mengandung zat gizi tinggi yang mudah di cerna, kaya protein lemak dan zat- zat gizi lain yang dibutuhkan tubuh. Kandungan protein dalam telur bebek sangat tinggi. Yakni 13,1 gram per 100 gram dibandingkan dengan telur ayam 12,8 gram. Telur bebek memiliki sifat yang mudah rusak, baik kerusakan alami, kimiawi, maupun akibat serangan mikroorganisme melalui pori- pori cangkang telur (Warisno, 2005).


Telur bebek rata-rata lebih berat dibandingkan dengan telur ayam (telur ayam antara 55-60 gram sedangkan telur bebek antara 65-70 gram). Kulit telur bebek lebih tebal dibandingkan dengan telur ayam, jumlah porinya juga lebih sedikit dengan membran dalam yang lebih tebal pula. Hal ini memungkinkan lebih lambat berlangsungnya proses dehidrasi sehingga telur bebek dapat bertahan lebih lama dalam penyimpanan. Daya simpan telur bebek kira-kira 20% lebih lama dibandingkan dengan daya simpan telur ayam dalam kondisi lingkungan yang sama (Suprapti, 2002).

1. Struktur Telur

Struktur telur terdiri atas sel yang hidup, yang dikelilingi oleh kuning telur sebagai cadangan makanan terbesar. Kedua komponen ini dikelilingi oleh putih telur yang mempunyai kandungan air yang tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan tekanan osmose antara kuning dan putih telur. Telur mempunyai struktur yang sangat khas, dan mengandung zat gizi yang cukup untuk pertumbuhan sel telur yang sudah dibuahi menjadi seekor anak. Bagian-bagian utama telur adalah putih telur (*albumen*); kuning telur (*yolk*), dan kulit telur (*egg shell*) (Hintono, 1997).

Secara lebih terinci struktur telur dapat dibagi menjadi 9 bagian, yaitu:

1. Kulit telur dengan permukaan yang agak berbintik-bintik
2. Membran kulit luar dan dalam yang tipis, terpisah pada ujung yang tumpul dan membentuk ruang udara
3. Putih telur bagian luar yang tipis dan berupa cairan
4. Putih telur yang kental dan kokoh berbentuk kantung albumen
5. Putih telur bagian dalam yang tipis dan berupa cairan
6. Struktur keruh berserat yang terlihat pada kedua ujung kuning telur, yang dikenal sebagai khalaza dan berfungsi memantapkan posisi kuning telur
7. Lapisan tipis yang mengelilingi kuning telur, dan disebut *membranfitelin*
8. Benih atau *blastodisc* yang terlihat sebagai bintik kecil pada permukaan
9. Kuning telur, yang terbagi menjadi kuning telur berwarna putih berbentuk vas, bermula dari benih ke pusat kuning telur, dan kuning telur yang berlapis yang merupakan bagian terbesar (Buckle dkk, 1987).



Gambar 2 Struktur Telur

2. Kulit Telur (*egg shell*)

Kulit telur terdiri atas 94 – 97 % kalsium karbonat, sedangkan sisanya berupa bahan organik dan pigmen. Di seluruh bagian kulit telur terdapat banyak pori-pori dengan ukuran yang berbeda-beda. Umumnya pada setiap cm² kulit telur terdapat 7500 buah pori-pori dengan penyebaran yang berbeda-beda. Pori-pori telur ayam mempunyai ukuran lebar sekitar 9 - 38 mikron dan panjang sekitar 14 - 54 mikron (Sirait, 1986).

Kulit telur merupakan bahan alami yang dapat melindungi telur dari masuknya bakteri, tetapi karena kulit telur berpori maka hal ini tidak menjamin bahwa telur akan bebas dari kontaminasi bakteri. Adanya membran pada telur (*shell membran*), empat lapis putih telur (*the four layers of the white*) dan membran kuning telur (*yolk membrane*) atau disebut pula dengan *vitelline* dapat mencegah bakteri menembus kuning telur yang merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan bakteri (Hintono, 1997).

Menurut (Sudaryani, 2003) menyatakan bahwa kulit telur terdiri atas 4 bagian utama pembentuk kulit, yaitu kutikula, lapisan bunga karang, lapisan mamila dan lapisan membrana.

- a. Kutikula merupakan lapisan paling luar yang menyelubungi seluruh permukaan kulit telur. Lapisan ini sangat tipis, berkisar antara 3 - 10 mikron. Bahan atau zat yang membentuk lapisan ini adalah zat protein kreatin yaitu mucin. Permukaan kulit terlihat agak berbintik-bintik. Lapisan kutikula yang melapisi permukaan telur ini, tanpa ada pori-pori yang terbuka tapi sifatnya bisa dilalui gas, sehingga keluarnya uap air dan gas CO₂ dari isi telur masih bisa terjadi.
- b. Lapisan Bunga Karang atau *calcareus* merupakan bagian terbesar dari lapisan kulit telur, letaknya di bawah kutikula. Lapisan ini terdiri atas protein serabut yang berbentuk anyaman dan lapisan kapur yang terdiri atas senyawa kalsium karbonat (CaCO₃) dan kalsium fosfat (Ca₃(PO₄)₂), magnesium karbonat (MgCO₃) dan magnesium fosfat (Mg₃(PO₄)₂). Apabila lapisan ini dihilangkan bagian kapurnya (caranya dengan menambahkan asam kuat), maka akan terlihat suatu bentuk anyaman seperti bunga karang, sehingga lapisan ini disebut lapisan bunga karang.
- c. Lapisan Mamila merupakan lapisan ketiga dari kulit telur yang terdiri atas lapisan berbonggol-bonggol berbentuk kerucut dengan penampang bulat atau lonjong. Lapisan ini sangat tipis, tebalnya kurang lebih sepertiga dari lapisan seluruh kulit dan terdiri atas bagian protein anyaman dan mineral.

- d. Lapisan membrana merupakan bagian lapisan kulit telur yang terdalam, terdiri atas dua lapisan selaput yang berbentuk seperti kertas perkamen.

Lapisan ini menyelubungi seluruh isi telur, tebalnya sekitar 65 mikron yang terbuat dari keratin. Semakin ke arah bagian yang tumpul semakin menebal. Lapisan membrana yang melekat pada lapisan mamilla lebih tebal bila dibandingkan dengan lapisan membrana dibawahnya yang berhubungan dengan putih telur. Segera setelah dikeluarkan oleh induknya, telur mengalami pendinginan dan kehilangan gas serta air yang menyebabkan pengkerutan. Pada saat ini, terjadi pemisahan kedua lapisan membrana sehingga terbentuk ruang udara. Sesaat setelah ditelurkan, besarnya ruang udara kira-kira 1/8 inci dan terus bertambah besar seiring dengan semakin lamanya waktu penyimpanan yang menyebabkan kehilangan air dan CO₂ (Sudaryani, 2003).

3. Putih Telur (*albumen*)

Putih telur terdiri atas empat lapisan. Lapisan luar terdiri atas cairan kental yang banyak mengandung serat-serat musin. Lapisan tengah merupakan anyaman musin setengah padat. Lapisan ketiga merupakan cairan yang lebih encer, sedangkan *khalazifera* berbentuk serat-serat musin yang terjalin seperti anyaman tali dan membatasi antara putih dan kuning telur, berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Putih telur bersifat lebih alkalis dengan pH sekitar 7,6. Komponen utama dari putih telur adalah protein, sedangkan lemak terdapat dalam jumlah kecil. Protein putih telur utama terdiri atas *ovalbumin*, *conalbumin*, *ovomuroid*, *lizozime*, dan *globulin*. Senyawa antimikroba yang terdapat pada telur adalah *lizozime*, *conalbumin*, dan

ovoinhibitor yang berfungsi untuk membantu memperlambat proses kerusakan telur (Yuwanta, T.2010).

Putih telur tersusun atas 86,8 % air, 11,3 % protein, 0,08 % lemak, 1 % karbohidrat, dan 0,8 % abu (Romanof, 1963). Kadar air yang tinggi pada putih telur akan mempermudah garam larut pada putih telur bila dibandingkan dengan kuning telur ketika telur diasin. Sirait (1986) menyatakan bahwa karena banyak mengandung air, maka selama penyimpanan putih telur merupakan bagian yang paling mudah rusak (Yuwanta, 2010).

4. Kuning Telur (*yolk*)

Kuning telur merupakan bagian yang terpenting pada telur, karena kuning telur mengandung zat yang bergizi tinggi untuk menunjang kehidupan embrio. Bentuk kuning telur hampir bulat, terletak ditengah-tengah dan berwarna jingga atau kuning. Pigmen pemberi warna kuning terdiri atas *kriptoxantin*, *xantofil*, *karoten* dan *lutein*. Kecerahan pada kuning telur merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan kualitas telur. Penilaian warna kuning dapat dilakukan secara visual dengan membandingkan warna kuning telur dengan alat *yolk color fan* yang memiliki skala *Roche* yaitu standar warna 1-15 dari warna pucat sampai warna pekat atau orange tua. Warna kuning telur sangat erat kaitannya dengan vitamin A yang terdapat didalam pakan sehingga semakin besar krotan yang akan terdeposisi dalam kuning yang akhirnya akan mempengaruhi warna kuning telur. Karotenoid berupa xantophyl akan memberi warna kuning telur semakin berwarna jingga kemerahan (Sudaryani, 2003).

Kuning telur terbungkus oleh selaput tipis, kuat dan elastis yaitu “membran vitelin” dengan ketebalan sekitar 24 mikron, terbuat dari protein musindan keratin. Di samping itu, kuning telur tersusun dari lapisan-lapisan putih dan kuning, biasanya berjumlah 6 lapisan berselang-seling dengan lapisan kuning yang lebih lebar. Pada bagian pusat kuning telur terdapat bagian yang berwarna putih yang disebut “*latebra*” dengan diameter sekitar 6 mm dan jumlahnya 0.6 % dari seluruh kuning telur. pH kuning telur sekitar 6.0, lebih asam bila dibandingkan dengan putih telur. Pada kuning telur yang baru ditetaskan, dapat terlihat dengan jelas membran vitelin, benih/blastodisc dan membran khalaza (Sudaryani, 2003).

C. Kandungan Gizi Telur

Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan (diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak). Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain. Masa kadaluwarsa telur asin bisa mencapai 30 hari (Apriadjie, 2008).

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Selain itu telur mudah diperoleh dan harganya murah. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat, dan lain sebagainya. Telur terdiri dari protein 13 %, lemak 12 %, serta vitamin, dan mineral. Nilai tertinggi telur terdapat pada bagian kuningnya. Kuning telur mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan serta mineral seperti : besi, fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin B

kompleks. Sebagian protein (50%) dan semua lemak terdapat pada kuning telur (Mietha, 2008).

Adapun putih telur yang jumlahnya sekitar 60 % dari seluruh bulatan telur mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat. Hampir semua lemak dalam sebutir telur itik terdapat pada bagian kuningnya, mencapai 35 persen, sedangkan di bagian putihnya tidak ada sama sekali. Lemak pada telur terdiri dari trigliserida (lemak netral), fosfolipida (umumnya berupa lesitin), dan kolesterol. Fungsi trigliserida dan fosfolipida bagi tubuh adalah sebagai sumber energi, satu gram lemak menghasilkan 9 kilokalori energi. Lemak dalam telur berbentuk emulsi (bergabung dengan air), sehingga menjadi lebih mudah dicerna, baik oleh bayi, anak-anak, maupun golongan lanjut usia. Kelemahan telur yaitu memiliki sifat mudah rusak, baik kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan akibat serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur. Oleh sebab itu usaha pengawetan sangat penting untuk mempertahankan kualitas telur (Winarno, 2008).

D. Pengawetan

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan pengawetan. Pengawetan merupakan cara untuk mempertahankan kualitas telur, menjaga telur bebek supaya tidak rusak dan memperpanjang masa simpan telur bebek. Pengawetan telur bebek yang paling sederhana yaitu dengan cara pengasinan atau diolah menjadi telur asin (Lukito dkk, 2012)

Pengasinan merupakan salah untuk upaya mengawetkan telur bebek, mengurangi bau amis dan menciptakan bau khas. Proses pengasinan telur yang umum dilakukan masyarakat dengan menggunakan garam dapur sebagai bahan

pengawetnya. Garam merupakan factor utama dalam proses pengasinan telur yang berfungsi sebagai bahan pengawet untuk mencegah pembusukan telur, sehingga meningkatkan daya simpannya (Prihantari, 2010).

Telur asin adalah telur segar yang diolah dalam keadaan utuh, diawetkan sekaligus diasinkan dengan menggunakan garam, dimana garam kandungan dapat menghambat perkembangan mikroorganisme sehingga telur dapat disimpan lebih lama. Syarat telur yang diasinkan adalah telur yang masih segar dan baru, sudah dibersihkan, kulit telur masih utuh tidak retak, dan sebelum pengasinan telur harus diampelas untuk memudahkan proses pengasinan (Warisno, 2005).

Telur yang akan diawetkan harus mempunyai mutu awal yang baik yaitu masih masuk ke dalam kualitas AA. Ciri-ciri yang masuk dalam kualitas AA adalah kulit telur bersih, tidak retak, bentuk normal, kedalaman kantung udara 0,3 cm atau kurang, putih telur pekat dan jernih, kuning telur terletak di pusat dengan baik, kuning telur jernih dan bebas dari noda (Romanoff, 1963).

Berdasarkan metode pengolahannya, ada dua metode yang digunakan yaitu perendaman dengan menggunakan larutan garam jenuh dan pembalutan dengan mencampur garam, serbuk bata merah atau abu gosok. Pembuatan telur asin dengan menggunakan metode perendaman dalam larutan garam jenuh sangat mudah dan praktis. Keunggulan pembuatan telur asin dengan perendaman adalah prosesnya singkat, sedangkan dengan cara pembalutan prosesnya rumit. Garam dapur mengandung 91.62% NaCl, dan sisanya adalah Ca, Mg, dan Fe dalam bentuk garam klorida (Warisno, 2005).

Garam mempunyai sifat higroskopis sehingga dapat menyebabkan plasmolisis dan dehidrasi pada sel bakteri, menghambat kerja enzim proteolitik, mengurangi daya larut oksigen serta menurunkan daya aktivitas air (Frazier dan Westhoff, 1983). Garam yang digunakan dalam proses pengawetan telur membutuhkan konsentrasi lebih besar dari 15% (Sukendra, 1976).

Pengasinan telur adalah salah satu cara pengawetan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Tujuan dari proses pengasinan ini adalah untuk mencegah kerusakan dan kebusukan telur serta memberi citarasa khas dari telur (Sirait, 1986). Selain itu juga pengasinan banyak menghasilkan keuntungan antara lain mudah untuk dilakukan, biayanya mudah murah, praktis, serta dapat meningkatkan kesukaan konsumen (Sarwono, 1994).

Menurut (Harimurti, 1992) menyatakan bahwa metode pembuatan telur asin yaitu:

1. Perendaman dengan larutan garam jenuh
 - a. Buat larutan garam jenuh, caranya dengan garam dilarutkan ke dalam air hingga ada garam tersisa yang tidak larut dalam air.
 - b. Pilih telur yang baik
 - c. Telur dicuci bersih , selanjutnya masukkan kedalam larutan garam
 - d. Telur diangkat dari larutan garam setelah 10-12 hari perendaman, makin lama perendaman telur yang dihasilkan semakin tinggi kadar garamnya sehingga rasanya semakin asin.
2. Membalut telur dengan adonan garam dan batu bata merah atau abu

- a. Buat adonan garam dan abu atau bata merah dengan perbandingan 1:2
- b. Telur dipilih selanjutnya dicuci hingga bersih
- c. Telur dibalut dengan adonan abu atau bata merah
- d. Susun telur yang telah dibalut di dalam ember
- e. Setelah 10 hari telur dibersihkan dan dicuci.

Proses pembuatan telur asin dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun kebanyakan pembuat telur asin lebih memilih dengan cara direndam atau dibalut dalam adonan garam dicampur dengan serbuk batu merah dan abu gosok. cara tersebut bertujuan untuk membuat telur bebek menjadi telur terasa asin. Tetapi ada juga yang mencoba membuat telur asin dengan ditambahkan rasa jahe, rasa jeruk, bahkan rasa cabai kedalam adonan pasta pengasinannya, sehingga rasa telur tersebut tidak hanya asin, melainkan berpadu dengan rasa lain yang telah ditambahkan kedalam adonan pasta pengasinan tersebut (Harimurti, 1992).

Mutu telur asin menurut (Badan Standar Nasional Indonesia, 1996) meliputi bau warna, kenampakan kadar garam, cemaran mikroba *Salmonella* dan *Staphylococcus aureus*. Syarat mutu telur asin berdasarkan telur asin berdasarkan SNI 01-4277-1996 (Badan Standar Nasional Indonesia) dapat dilihat pada table.

Tabel 1 Mutu telur asin menurut Badan Standar Nasional

Jenis uji	Satuan	Persyaratan
1. Keadaan		
Bau	-	Normal
Warna	-	Normal
Kenampakan	-	Normal
2. Garam	b/b %	2,0
3. Cemaran mikroba		
<i>Salmonella</i>	Koloni/ 25 g	

<i>Staphylococcus</i>	Koloni / g	Negatif <10
-----------------------	------------	-------------

Sumber: Badan Standar Nasional, 1996.

Beberapa keunggulan telur asin yang dapat diperoleh dari pembuatan telur asin adalah telur yang diasinkan bersifat stabil, dapat disimpan tanpa mengalami kerusakan selama 3 minggu dan dengan pengasinan rasa amis pada telur akan berkurang, tidak berbau busuk dan rasanya enak (Badan Standar Nasional Indonesia, 1996).

E. Jeruk purut (*Citrus hystrix* DC)

Jeruk purut (*Citrus hystrix* DC) merupakan salah satu keanekaragaman flora di Indonesia. Jeruk purut oleh masyarakat Indonesia dimanfaatkan sebagai penyedap masakan dan aroma terapi. Penelitian mengenai jeruk purut masih terbatas dilakukan dibandingkan ketersediaan jeruk purut di alam yang melimpah, daun jeruk purut mengandung senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin dan saponin (Rahmi, 2013).



Gambar.3 Jeruk Purut

Menurut Rahmi (2013) menyatakan bahwa deskripsi dan klasifikasi jeruk purut yaitu sebagai berikut:

Kingdom : *Plantae*
Sub kingdom : *Tracheobionta*
Sub divisi : *Spermathophyta*
Divisi : *Magnoliophyta*
Kelas : *Magnoliopsida*
Sub kelas : *Rosidae*
Ordo : *Spimdales*
Famili : *Rutaceae*
Genus : *Citus*
Spesies : *Citrus hystrix DC*



Gambar 4 Pohon Jeruk Purut

Pohon jeruk purut berukuran rendah atau perdu namun dalam pohon jeruk purut bisa tumbuh sampai 12 meter. Batang yang tua berwarna hijau tua berbentuk bulat, polos atau berbintik. Tata letak tajuk tanaman tidak beraturan dan cabanya rapat. Dahan dan rantingnya bersudut tajam, berwarna hijau tua berbintik dan berduri di ketiak daunnya. Duri- durinya pendek, kaku, hitam, ujungnya coklat dan panjangnya 0,2 cm – 1 cm. Letak daun jeruk purut berpencar atau tersebar dan bertangkai agak panjang serta bersayap panjang. Buah jeruk purut berbentuk bulat sampai bundar, ukurannya relatif kecil dibanding lainnya. Kulit jeruk purut tidak rata atau tidak halus, rasanya asam dan berbau sedap (AAK, 1992).

Jeruk purut adalah jenis buah jeruk yang bentuknya berbeda sangat unik. Keunikan ini juga diimbangi dengan manfaat dan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Jeruk purut bentuknya lebih mengerucut dengan permukaan kulit buah yang lebih kasar. Buah ini juga bukan buah yang bisa dikonsumsi secara langsung seperti jenis jeruk lainnya, sehingga sering diolah terlebih dahulu menjadi bagian dari kuliner, seperti sayur dan juga sambal (AAK, 1992).

Meskipun jeruk purut memiliki rasa yang kecut dan sedikit asam, namun ternyata dibalik rasanya tersebut terkandung banyak nutrisi yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Buah ini mengandung serat, gula, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, kalori, zat besi, sodium, dan juga kalsium. Dengan melihat semua kandungan tersebut, buah ini dapat digolongkan sebagai buah bergizi yang perlu Anda konsumsi (Miftahendrawati, 2014).

Kulit buah jeruk purut mengandung komponen utama *β-pinen* (21,44%), *sitronelal* (20,91%), *limonene* (12,59%) dan *terpinen -4- ol* (11,93%). Minyak

atsiri pada jeruk mampu menghambat pertumbuhan *Streptococcus muants* pada konsentrasi 25%). Kulit buah jeruk purut mengandung komponen utama β -pinen (21,44%) *monoterpene* senyawa organik ditemukan dalam tanaman, β -pinen merupakan cairan yang tidak berwarna, larut dalam alkohol, tapi tidak larut dalam air. *Sitronelal* (20,91%) Kandungan *sitronellal* yang tinggi menjadi salah satu kelebihan minyak daun jeruk purut di bidang industri, khususnya industri parfum dan kosmetik. *Limonene* (12,59%) adalah satu cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan diklasifikasikan sebagai senyawa siklis terpena. Umumnya, *isomer* dari *limonena* memiliki bau yang kuat dari jeruk dan digunakan sebagai pelarut dan *Terpine n -4- ol* (11,93%) (Herawaty, 2005).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 9 Juli 2018, di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Terpadu, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat-alat seperti baskom, toples, timbangan analitik, amplas, kompor, periuk, pisau, belender, plastik, dan label.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu telur bebek sebanyak 60 butir, air, garam dan jeruk purut.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 3 butir telur sehingga terdapat 60 butir telur dengan perlakuan sebagai berikut:

P_0 = Kadar jeruk purut 0 % + garam + air, lama perendaman 10 hari.

P_1 = Kadar jeruk purut 10 % + air + garam, lama perendaman 10 hari

P_2 = Konsentrasi jeruk purut 20 % + air + garam, lama perendaman 10 hari

P_3 = Konsentrasi jeruk purut 30 % + air + garam, lama perendaman 10 hari

E. *Prosedur Penelitian*

1. Tahap Persiapan

Persiapan yang dilakukan sebelum penelitian yaitu, dipersiapkan telur bebek sebanyak 60 butir yang peroleh dari salah satu penjual telur bebek petelur yang berada di Gowa. Jeruk purut yang belum matang diperoleh dari rumah tangga dan di pasar.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Pemilihan Telur

Pemilihan telur merupakan suatu pilihan dengan cara direndam agar telur yang dipakai dalam penelitian dalam kondisi yang baik. Dimana pemilihan dilakukan karena biasanya rata-rata dalam 1 rak telur ada yang mengalami kerusakan. Setelah memilih itu telur harus dicuci sampai bersih.

b. Pengamplasan

Pengamplasan merupakan pekerjaan yang dilakukan setelah memilih telur. Amplas seluruh permukaan telur secara merata agar pori – porinya terbuka. Pada saat mengamplas jangan terlalu lama sebab kulit telur akan semakin tipis sehingga akan semakin mudah retak atau pecah.

c. Pembuatan Larutan

Pembuatan larutan garam dengan menambahkan air 4.900 ml + 750 garam dengan kadar yang berbeda. Dilakukan pencampuran ekstrak jeruk purut (P0) control, (P1) 10%, (P2) 20% dan (P1) 30%. Cara pembuatan ekstrak jeruk purut tersebut adalah dengan membelah dua jeruk purut lalu

membuang biji, kemudian di belender dengan air, lalu dijadikan ekstrak jeruk purut. Kemudian ekstrak inilah yang akan dicampurkan kedalam larutan garam jenuh yang sudah dingin, lalu diaduk rata.

Ekstrak jeruk purut

$$\frac{10}{100} \times 1050 = 105 \text{ gr}$$

$$\frac{20}{100} \times 1050 = 210 \text{ gr}$$

$$\frac{30}{100} \times 1050 = 315 \text{ gr}$$

d. Perendaman

Perendaman dalam perlakuan pembuatan telur asin menggunakan ekstrak jeruk purut, agar bau amis telur hilang dan memiliki cita rasa yang khas.

Perendaman dilakukan dalam 10 hari, dengan tujuan agar proses osmosis garam dalam larutan, diharapkan sudah masuk ke kuning telur.


e. Panen

Panen adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan pada tahap akhir proses pembuatan telur asin setelah direndam selama 10 hari. Setelah itu perebusan dilakukan dengan metode kukus selama 30 menit. Kemudian telur diangkat dan dinginkan ± 15 menit. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam plastik. Selanjutnya di berikan kepada panelis.

f. Pengukuran

Uji organoleptik terhadap warna, aroma, rasa, tekstur. Dilakukan dengan menggunakan panelis sebanyak 20 orang.

3. Diagram alir uji organoleptik perendaman telur bebek dengan ekstrak jeruk purut.



Gamabar 1 Diagram alir pembuatan telur asin

F. Parameter yang Diukur

Adapun parameter yang diukur pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aroma

Aroma merupakan faktor yang berperan penting dalam pengujian produk, dimana aroma dapat memberikan kualitas pada produk dengan menggunakan indra penciuman yaitu bau yang terkandung dalam produk tersebut.

Uji organoleptik




Keterangan:

1. Tidak harum
2. Kurang harum
3. Cukup harum
4. Harum
5. Sangat harum

2. Rasa

Cita rasa merupakan salah satu faktor yang penting dalam produk pangan. Dengan rasa masyarakat dapat membuat produk dengan banyak keanekaragaman produk dan rasa menjadi faktor untuk menentukan kualitas produk.

Uji organoleptik




Keterangan:

1. Tidak asin
 2. Kurang asin
 3. Cukup asin
 4. asin
 5. Sangat asin
3. Warna Yolk

Warna penting bagi banyak makanan bersama sama dengan bau, rasa, aroma dan tekstur. Warna memegang peran penting dalam keterterimaan makanan. Selain itu, warna dapat memberi petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan.

Uji organoleptik




Keterangan:

1. Tidak kuning
2. Kurang kuning
3. Cukup kuning
4. kuning
5. Sangat kuning

4. Kemasiran

Kemasiran merupakan parameter yang sangat penting dalam menjaga mutu telur. Kemasiran telur asin adalah karakter yang krusial bagi daya terima konsumen. Kesan kemasiran pada produk secara keseluruhan melibatkan beberapa aspek diantaranya mudah atau tidaknya gigi berpenetrasi awal ke dalam produk, mudah atau tidaknya di kunyah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan dalam jumlah residu yang tertinggal setelah dikunyah.

Uji organoleptik



Keterangan:

1. Tidak berpasir
2. Kurang berpasir
3. Cukup berpasir
4. Berpasir
5. Sangat berpasir

G. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisa sidik ragam. Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji wilayah berganda Duncan untuk melihat perbedaan terhadap setiap sampel perlakuan. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).

Menurut Steel dan Torrie (1991), model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut :

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

$$i = 1, 2, \dots, t$$

$$j = 1, 2, \dots, t$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke- i -ke- j .

μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke- i

ϵ_{ij} = Galat

i = P_0, P_1, P_2, P_3 (perlakuan)

j = 1,2,3,4,5 (ulangan)

Adapun bagan analisis ragam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Sumber keragaman	Jumlah Kuadrat	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	F Hitung
				0,05/0,01
Perlakuan	JKP	Dbp-1	JKP/dbp	KTP/KTG
Galat	JK	Dbt-dbp	JKG/dbG	

Bila hasil sidik ragam menunjukkan perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT (Steel and Torrie 1991).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Organoleptik

Pengujian organoleptik telur asin dilakukan terhadap 20 orang panelis. Parameter yang diuji yaitu aroma, kemasiran, rasa dan warna yolc. Hasil uji organoleptik telur asin.

1. Aroma

Hasil Penelitian perendaman ekstrak jeruk purut yang berbeda terhadap rata-rata nilai aroma pada telur asin menggunakan ekstrak jeruk purut selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 Nilai rata-rata Uji Organoleptik telur asin berdasarkan aroma

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
Kontrol	2	2	2	2	2	10	2
Jeruk purut 10 %	3	3	3	2	2	13	2,6
Jeruk purut 20 %	4	5	3	2	4	17	3,6
Jeruk purut 30 %	2	2	2	4	5	15	3
Total	11	12	10	10	12	55	11,2
Rata-rata	2,75	3	2,5	2,5	3,25		4,75

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak jeruk purut 20% berdasarkan aroma lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian ekstrak jeruk purut dengan konsentrasi 30% dan yang paling rendah pemberian ekstrak jeruk

purut dengan konsentrasi 10%. Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian ekstrak jeruk purut terhadap aroma.

Hasil analisis ragam (Lampiran 1) menunjukkan bahwa perendaman dengan ekstrak jeruk purut terhadap aroma tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$), secara rata-rata terlihat adanya kecenderungan peningkatan terhadap penambahan ekstrak jeruk purut, ini disebabkan karena jeruk yang digunakan jeruk purut segar. Hal ini sesuai dengan pendapat Herawaty (2005) bahwa jeruk purut mengandung minyak atsiri seperti dari isomer dari limonene memiliki bau yang kuat dari jeruk. Aroma memiliki fungsi yang penting dalam produk pangan, karena sebelum mengkonsumsi biasanya terlebih dahulu aroma makanan tercium oleh indra hidung, apabila aroma pada produk terlalu menyengat atau kerkesan hambar akan membuat konsumen tidak tertarik mengkonsumsi (Lesmayanti, 2014).

Hal tersebut sesuai pendapat Koswara (2009) yang menyatakan bahwa konsentrasi garam memberikan pengaruh terhadap karakteristik aroma telur. Telur bebek sangat cocok untuk diasinkan, karena aroma amis dari telur akan berkurang dengan pegasinan, selain itu pori-pori telur bebek lebih besar dibandingkan dengan telur ayam (Koswara, 2009).

2. Kemasiran

Hasil Penelitian perendaman ekstrak jeruk purut yang berbeda terhadap rata-rata nilai kemasiran pada telur asin menggunakan ekstrak jeruk purut selama penelitian dilihat pada tabel 2

Tabel 2 Nilai rata-rata Uji Organoleptik telur asin berdasarkan kemasiran

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
Kontrol	2	3	2	4	3	14	2,8
Jeruk purut 10 %	4	3	3	2	3	15	3
Jeruk purut 20 %	3	2	2	4	3	15	3
Jeruk purut 30 %	4	2	4	4	5	19	3,8
Total	13	10	11	14	14	63	12,4
Rata-rata	3,25	2,5	2,75	3,5	3,5		3,8

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak jeruk purut 30% berdasarkan kemasiran lebih tinggi dan jika dibandingkan dengan pemberian ekstrak jeruk purut dengan konsentrasi 10% dan 20%. Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian ekstrak jeruk purut terhadap kemasiran.

Hasil analisis ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa metode pemberian ekstrak jeruk purut tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap kemasiran, tetapi secara rata-rata terlihat adanya kecenderungan peningkatan terhadap penambahan ekstrak jeruk purut, disebabkan kurangnya garam yang di berikan pada proses perendaman, sehingga tidak berpasir. Lama perendaman telur dalam pembuatan telur asin dengan waktu perendaman selama 10 hari dalam toples keadaan tertutup

dengan menggunakan metode larutan. Hal ini disebabkan karena pengampelasan pori-pori cangkang telur yang belum sempurna sehingga kandungan kadar garam dan air pada perendaman belum meresap sempurna sampai ke bagian kuning telur.

Menurut Chi (1998) menyatakan bahwa terjadinya proses kuning telur memiliki tekstur yang masir yang dipengaruhi oleh adanya proses garam yang masuk bersama air (larutan garam) ke dalam granul-granul yang berada dalam kuning telur karena kemampuan NaCl yang dapat mengikat air pada protein kuning telur, sehingga kandungan air tersebut akan keluar dan mengalami dehidrasi pada kuning telur serta muncul tekstur berpasir.

3. Rasa

Hasil Penelitian perendaman ekstrak jeruk purut yang berbeda terhadap rata-rata nilai rasa pada telur asin menggunakan ekstrak jeruk purut selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Nilai rata-rata Uji Organoleptik telur asin berdasarkan rasa

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
Kontrol	3	5	4	4	4	20	4
Jeruk purut 10 %	4	3	3	3	4	17	3,4
Jeruk purut 20 %	4	3	3	5	3	18	3,6
Jeruk purut 30 %	4	4	4	5	4	21	4,2
Total	15	15	14	17	15	76	15,2
Rata-rata	3,75	3,75	3,5	4,25	3,75		4,75

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak jeruk purut 0% berdasarkan aroma lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian ekstrak jeruk

purut dengan konsentrasi 30% dan jika 20% dibandingkan dengan 10% menunjukkan rata-rata lebih rendah dibandingkan yang lainnya disebabkan kurangnya ekstrak jeruk purut jika dibandingkan dengan garam yang di berikan pada proses perendaman, sehingga tidak ada rasa jeruk purut namun rasa asin sedikit terasa. Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian ekstrak jeruk purut terhadap rasa.

Hasil analisis ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa metode perendaman tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap rasa pada telur asin, tetapi secara rata-rata terlihat adanya kecenderungan peningkatan terhadap penambahan ekstrak jeruk purut. Hal ini disebabkan karena kadar garam dan jeruk purut yang kurang pada saat pembuatan ekstrak jeruk purut sehingga kadar garam tidak terlalu menyerap, selain itu pengamplasan pori-pori cangkang juga menjadi pendukung terjadinya perbedaan rasa asin pada telur asin. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya pengaruh terhadap tingkat keasinan telur adalah karena rendahnya kadar NaCl pada perlakuan sehingga kriteria rasa asin yang dihasilkan masih kurang baik pada kuning telur maupun putih (Budiman dkk, 2012)

Menurut Harry (2004) menyatakan bahwa garam berfungsi sebagai pencipta rasa asin dan sekaligus sebagai bahan pengawet dan mengurangi kelarutan oksigen, menghambat kerja enzim reteolik dan menyerap air dalam telur. Rasa masir dari kuning telur juga dipengaruhi oleh besaran minyak yang keluar, kekuatan gel dari kuning telur dan diameter granula kuning telur, semakin tinggi nilai ketiga kriteria mutu tersebut rasa masir kuning telur dihasilkan semakin tinggi (Novia dkk, 2011).

4. Warna yolk

Hasil Penelitian perendaman ekstrak jeruk purut yang berbeda terhadap rata-rata nilai warna yolk pada telur asin menggunakan ekstrak jeruk purut selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Nilai rata-rata Uji Organoleptik telur asin berdasarkan warna yolk

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
Kontrol P0	3	4	3	5	5	20	4
Jeruk purut 10 % (P1)	4	3	3	4	3	17	3,4
Jeruk purut 20 % (P2)	5	3	3	4	4	19	3,8
Jeruk purut 30 % (P3)	4	4	4	4	4	20	4
Total	16	14	4,25	4	15,2	3,8	15,2
Rata-rata	4	3,5	3,25	4,25	4		4,75

Tabel 4 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak jeruk purut 30% berdasarkan warna lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian ekstrak jeruk purut dengan konsentrasi 20%, dan paling rendah dengan konsentrasi 10%. Hal ini disebabkan zat warna jeruk purut terdapat B-pinen merupakan cairan yang tidak berwarna sehingga tidak ada warna khas dari jeruk purut pada telur asin. Analisis ragam dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian ekstrak jeruk purut terhadap warna yolk.

Hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa pemberian ekstrak jeruk purut tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap warna pada telur asin,

tetapi secara rata-rata terlihat adanya kecenderungan peningkatan terhadap penambahan ekstrak jeruk purut. Hal ini disebabkan jeruk purut mengandung zat hijau daun atau klorofil akan tetapi klorofil yang terdapat pada jeruk purut tidak memiliki pengaruh dengan telur asin karena warna yolc telur asin berwarna kuning sedangkan klorofil berwarna hijau, jadi dari kolerasi warna tidak berpengaruh, serta jeruk purut mengandung β -pinen merupakan cairan yang tidak berwarna, larut dalam alkohol, tapi tidak larut dalam air. Kuning telur sebelum mengalami proses pengasinan adalah kuning, warna akan berubah menjadi kuning kecoklatan, coklat tua, *orange* atau kuning cerah setelah melalui proses pengasinan (Oktavani, 2012).

Menurut (Winarti, 2004), penambahan ekstrak apapun yang mampu memberikan rasa pada telur asin yang dicampurkan pada garam hanya akan mempengaruhi rasa pada telur asin tetapi tidak mempengaruhi warna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa pemberian ekstrak jeruk purut terhadap kualitas aroma tidak berpengaruh nyata ($P < 0,5$) begitupun pada kemasiran, rasa dan warna yolk tidak berpengaruh nyata ($P < 0,5$).

B. Saran


Sebaiknya pada penelitian selanjutnya perlu penambahan konsentrasi garam dan penambahan ekstrak jeruk purut, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap aroma, kemasiran, rasa dan warna yolk. Selain itu sebaiknya dari pihak jurusan ilmu peternakan menentukan panelis yang berpengalaman untuk meniliasi kualitas telur asin.

DAFTAR PUSTAKA

- AAK, 1992, *Bertanam Pohon Buah-buahan 2*, Penerbit Kanisius; Jogjakarta
- Agusta A, 2000, *Minyak Atsiri Tumbuhan Tropika Indonesia*, 2, 113, Penerbit ITB, Bandung
- Astawan, M.W dan Astawan, M. 1998, *Teknologi Pengolahan Pangan Hewani Tepat Guna*. CV. Akamedia Presindo, Jakarta
- Astawan, 2008. *Sehat Dengan Hidangan Hewani*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Apriadjie WH. 2008 *Telur Asin, Tapi Berkalsium Tinggi*.
- Badan Standar Nasional 2006. SNI 01-2346-2006: *Petunjuk Pengujian Orhanoleptik dan atau Uji Sensori*. Jakarta: Badan Standarsasi Nasional Indonesia.
- Buckle, K.A. R. A. Edward, G. H. Fleet dan M. Wooton. 1987. *Ilmu Pangan*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Budiman, A., A. Hintono dan Kusrahayu 2012. Pengaruh Lama Penyaringan Telur Asin Setelah Perebusan Terhadap Kadar NaCl, Tingkat Keasinan dan Tingkat Kekenyalan. *Animal Agriculture Journal*, 1(2):219-227
- Harimurti. 1992. *Pengolahan Telur, PAU Pangan dan Gizi*, Universitas Gadjah Mada
- Herawaty, G. 2005. Karakteristik *Simplisia dan Analisis Komponen Minyak Atsiri dari Kulit Jeruk Purut (Cytrux hystrix DC) Kering* *Jurnal Penelitian Bidang Ilmu Pertanian* vol 3 (1): 15 – 17. Farmasi FMIPA-USU. Medan
- Hintono, A. 1997. *Kualitas Telur yang Disimpan dalam Kemasan Atmosfer Termodifikasi*. *Jurnal Sainteks*. Vol. IV no.3 Juni 1997.
- Lesmayanti, S dan E. S Rohaeni. 2014. *Pengaruh Lama Pemeraman Telur Asin Terhadap Tingkat Kekuasaan Konsumen*. Prosiding Seminar Nasional @Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi. 695-601
- Lukointo, G.A., A. Suwarastuti dan A. Hintono 2008. *Pengaruh Berbagai Metode Pengasinan Terhadap Kadar NaCl, Kekenyalan dan Tingkat Kesukaan Konsumen pada Telur Puyuh Asin*. *Jurnal Animal Agriculture*, 1 (1):829-838

- Kementrian Agama RI, 2012. Jakarta. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Koswara, S. 2009. Teknologi *Pengolahan Telur (teori dan praktek)*. Universitas Muhammadiyah, Semarang.
- Mietha, 2008. Kandungan gizi telur, <http://mietha.wordpress.com/2008/11/26/telur.Makanan.BerlimpahGizi>. Diakses 12 Desember 2016.
- Mifta Hendrawati. 2014. *Efek Antibakteri Ekstrak Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix) Terhadap Bakteri Streptococcus muatans*. Skripsi. Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Ni Kadek Sariati. 2017. *Isolasi Ekstrak Jeruk Purut (Citrus Hystix) dengan Metode Maserai*. Universitas Pendidikan Ganesha
- Novia, D., S. Melia dan N.Z Ayuza. 2011. Kajian Suhu Pengovenan Terhadap Kadar Protein dan Nilai Organoleptik Telur Asin. *Jurnal Peternakan*, 8(2) 70-76
- Prihantari, Dkk. 2010. *Pengaruh Lama Perendaman Abu Pelapah Kelapa terhadap Sifat Fisik, Organoleptik, Daya Simpan dan Kadar Kalsium Telur Asin*. Yogyakarta: Poltekes Yogyakarta Press.
- Rahmi Unzila, Yunazar Manjang, dan Adlis Santoni. 2013. *Profil Fitokimia Metabolit Sekunder dan Uji Aktivitas Antioksidan Tanaman Jeruk Purut (Citrus hystix DC) dan Jeruk Bali (Citrus maxima)(Burm.f.)Merr*. *Jurnal Kimia Unad* (ISSN No. 2303-3401). Vol 2, No. 2, Hal : 112
- Romanoff, A.L & A.J. Romanoff. 1963. *The Avian Egg*. New York John Willey and Sons Inc.
- Sarwono, B. 1994. *Pengawetan dan Pemanfaatan Telur*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Setyo Ristanto, 2013. *Uji Organoleptik dan Mikrobiologi Telur Asin Menggunakan Perendaman Lumpur Sawah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sirait, C.H. 1986. *Telur dan Pengolahannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Sukenda L. 1976. Pengaruh Cuaca Pengasinan Telur Bebek (*Muscovy sp*) dengan Menggunakan Adonan Campuran Garam dan Bata Terhadap Mutu Telur Asin Selama Penyimpanan

- Sudaryani, T. 2003. *Kualitas Telur*. Penebar Swadaya. Cetakan ke-4. Jakarta
- Steel, R. G. D. Dan Torrie. Prinsip dan Prosedur Statistika. Jakarta. PT. Gramedia
- Suprpati, M. L. 2002. *Pengawetan Telur*. Yogyakarta: Kanisius.
- Warisno 2005. *Membuat Telur Asin Aneka Rasa*. Agro Media Pustaka, Jakarta.
- Winarno, F. G. 2008. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama
- Yuwanta, T. 2010. *Telur dan Kualitas Telur*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.





**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1. Hasil Perhitungan Uji Organoleptik parameter pemberian ekstrak jeruk purut berdasarkan aroma

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
Kontrol	2	2	2	2	2	10	2
Jeruk purut 10 %	3	3	3	2	2	13	2,6
Jeruk purut 20 %	4	5	3	2	4	17	3,6
Jeruk purut 30 %	2	2	2	4	5	15	3
Total	11	12	10	10	12	55	11,2
Rata-rata	2,75	3	2,5	2,5	3,25		4,75

Perhitungan

$$1. \text{ Faktor Koreksi} = \frac{(55)^2}{20}$$

$$= 156,8$$

$$2. \text{ JK Total} = (2)^2 + (2)^2 + \dots + (5)^2 - \text{FK}$$

$$= 18,2$$

$$3. \text{ JK Perlakuan} = \frac{(10)^2 + (13)^2 + (18)^2 + (15)^2 - \text{FK}}{4}$$

$$= 6,8$$

$$4. \text{ JK Galat} = 18,2 - 6,8$$

$$= 11,4$$

$$5. \text{ KT Perlakuan} = \frac{6,8}{3}$$

$$= 2,266667$$

$$6. \text{ KT Galat} = \frac{11,4}{16}$$

$$= 0,9$$

$$7. \text{ F Hitung} = \frac{2,266667}{0,375}$$

$$= 2,518519$$

Tabel Sidik Ragam

SK	Db	jk	kt	F Hitung	F Tabel		
					0,05	0,01	
Perlakuan	3	6,8	2,26667	2,518519	tn	3,238872	5,292214
Galat	16	14,4	0,9				
Total	19	21,2					

Lampiran 2. Hasil Perhitungan Uji Organoleptik parameter pemberian ekstrak jeruk purut berdasarkan kemasiran

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
Kontrol	2	3	2	4	3	14	2,8
Jeruk purut 10 %	4	3	3	2	3	15	3
Jeruk purut 20 %	3	2	2	4	3	15	3
Jeruk purut 30 %	4	2	4	4	5	19	3,8
Total	13	10	11	14	14	63	12,4
Rata-rata ⁶	3,25	2,5	2,75	3,5	3,5		3,8

Perhitungan

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Faktor Koreksi} &= \frac{(63)^2}{20} \\
 &= 192,2 \\
 2. \text{ JK Total} &= (2)^2 + (3)^2 + \dots + (5)^2 - \text{FK} \\
 &= 9,8 \\
 3. \text{ JK Perlakuan} &= \frac{(14)^2 + (15)^2 + (15)^2 + (19)^2 - \text{FK}}{4} \\
 &= 3,4 \\
 4. \text{ JK Galat} &= 9,8 - 3,4 \\
 &= 6,4 \\
 5. \text{ KT Perlakuan} &= \frac{3,4}{3} \\
 &= 1,13
 \end{aligned}$$

$$6. \text{ KT Galat} = \frac{6,4}{16}$$

$$= 0,7$$

$$7. \text{ F Hitung} = \frac{1,13}{0,4}$$

$$= 1,462$$

Tabel Sidik Ragam

SK	Db	Jk	kt	F Hitung	F Tabel		
					0,05	0,01	
Perlakuan	3	3,4	1,13333	1,462366	tn	3,238872	5,292214
Galat	16	12,4	0,775				
Total	19	15,8					

Lampiran 3. Hasil Perhitungan Uji Organoleptik parameter pemberian ekstrak jeruk purut berdasarkan rasa

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
Kontrol	3	5	4	4	4	20	4
Jeruk purut 10 %	4	3	3	3	4	17	3,4
Jeruk purut 20 %	4	3	3	5	3	18	3,6
Jeruk purut 30 %	4	4	4	5	4	21	4,2
Total	15	15	14	17	15	76	15,2
Rata-rata	3,75	3,75	3,5	4,25	3,75		4,75

Perhitungan

$$1. \text{ Faktor Koreksi} = \frac{(76)^2}{20}$$

$$= 288,8$$

$$2. \text{ JK Total} = (3)^2 + (5)^2 + \dots + (4)^2 - \text{FK}$$

$$= -12,8$$

$$3. \text{ JK Perlakuan} = \frac{(20)^2 + (17)^2 + (18)^2 + (21)^2 - \text{FK}}{4}$$

M A K A S S A R

$$4. \text{ JK Galat} = -12,8 - 2$$

$$= 14,8$$

$$5. \text{ KT Perlakuan} = \frac{2}{3}$$

$$= 0,5$$

$$\begin{aligned}
 6. \text{ KT Galat} &= 14,8 \\
 &\underline{\hspace{1cm}} \\
 &16 \\
 &= 0,925
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \text{ F Hitung} &= 0,5 \\
 &\underline{\hspace{1cm}} \\
 &0,925 \\
 &= 1,481481
 \end{aligned}$$

Tabel Sidik Ragam

SK	db	jk	kt	F Hitung	F Tabel		
					0,05	0,01	
Perlakuan	3	2	0,6666	1,481481	tn	3,23887	5,29221
Galat	16	7,2	0,45			2	4
Total	19	9,2					

Lampiran 4. Hasil Perhitungan Uji Organoleptik parameter pemberian ekstrak jeruk purut berdasarkan warna yolok

Perlakuan	Ulangan					Total	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
Kontrol P0	3	4	3	5	5	20	4
Jeruk purut 10 % (P1)	4	3	3	4	3	17	3,4
Jeruk purut 20 % (P2)	5	3	3	4	4	19	3,8
Jeruk purut 30 % (P3)	4	4	4	4	4	20	4
Total	16	14	4,25	4	15,2	76	15,2
Rata-rata ⁶	4	3,5	3,25	4,25	4		4,75

Perhitungan

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Faktor Koreksi} &= \frac{(76)^2}{20} \\
 &= 288.8 \\
 2. \text{ JK Total} &= (3)^2 + (4)^2 + \dots + (4)^2 - \text{FK} \\
 &= 12.8 \\
 3. \text{ JK Perlakuan} &= \frac{(20)^2 + (17)^2 + (19)^2 + (20)^2 - \text{FK}}{4} \\
 &= 1.2 \\
 4. \text{ JK Galat} &= 12.8 - 1.2 = 14 \\
 5. \text{ KT Perlakuan} &= \frac{1.2}{3} \\
 &= 0.4
 \end{aligned}$$

$$6. \text{ KT Galat} = \frac{14}{16} = 0,5$$

$$7. \text{ F Hitung} = \frac{0,4}{0,375} = 0,8$$

Tabel Sidik Ragam

SK	db	Jk	kt	F Hitung	F Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	3	1,2	0,4	0,8	3,238872	5,292214
Galat	16	8	0,5			
Total	19	9,2				

LAMPIRAN 5

Proses alat dan bahan



Gambar 1 Alat



Gambar 2. Bahan penelitian

LAMPIRAN 6

Proses pemilihan telur



Gambar 3 Proses pemilihan telur



Gambar 4 Proses pencucian telur



Gambar 5 proses pengeringan telur



Gambar 6 Proses pengamplasan telur

LAMPIRAN 7

Proses penambahan ekstrak jeruk purut



Gambar 7 proses biji jeruk purut di buang



Gambar 8 proses jeruk purut di belender



Gambar 9 proses pencampuran ekstrak jeruk purut



Gambar 10 pembagian ekstrak jeruk purut ke dalam toples

LAMPIRAN 8

Proses perendaman menggunakan ekstrak jeruk purut



Gambar 11 proses perendaman selama 10 hari

LAMPIRAN 9

Proses setelah perendaman selama 10 hari



Gambar 12 proses telur asin dikukus



Gambar 13 proses setelah dikukus, telur asin didinginkan selama 15 menit



Gambar 14 proses uji organoleptik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rezkiyanti Isnani dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 20 Mei 1996. Anak ke dua dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan H. Alimuddin, S.Pd. .M.M. dan Hj. Suraedah, S.Pd,. M.M. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2008 di SDN 13 Salemba, Bulukumba. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMPN) 3 Bulukumba dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu Peneliti melanjutkan ke SMA Negeri 1 Ujung Loe hingga lulus pada tahun 2014. Peneliti melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi pada program studi Ilmu Peternakan melalui jalur SPAN-PTAIN. Berkat kerja keras dan kegigihannya peneliti akan menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR