

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM PADA NY “H”
DENGAN *REST PLACENTA* DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2017**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH

MEYLINDA OCTAVIANA

NIM: 70400114027

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meylinda Octaviana
NIM : 70400114027
Tempat/Tgl Lahir : Takalar, 11 Mei 1996
Jur/Prodi/Program : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Sawi No. 106 B Pari'Risi Takalar
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny "H"
dengan *Rest Placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun
2017.

Dengan penuh kesedaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 15 Desember 2017

Penyusun

MEYLINDA OCTAVIANA
70400114027

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Meylinda Octaviana

NIM : 70400114027

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny "H" dengan

Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

 **ALAUDDIN**
M A K A S S A R 

Dr. Hj. Sitti Salcha, S.SiT, S. KM, M.Keb
NIP: 19760126 200604 2 001

dr. Rini Fitriani, M.Kes
NIP: 1980008 200801 2 021

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum pada Ny "H" dengan Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017", yang disusun oleh **Meylinda Octaviana** NIM: 70400114027, Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jum'at 15 Desember 2017 M, 26 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 3 Januari 2018 M

15 Rabiul Akhir 1439 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** (.....)

Sekretaris : **Anieq Mumthi'ah Alkautzar, S.ST., M.Keb.** (.....)

Pembimbing I : **Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb.** (.....)

Pembimbing II : **dr. Rini Fitriani, M.Kes.** (.....)

Penguji I : **dr. Nadyah, M.Kes.** (.....)

Penguji II : **Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum.** (.....)

Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP: 195502031983121001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk hidayah-Nya, sehingga penulis dapat Menyelesaikan laporan tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum pada Ny “H” dengan Rest Placenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”** dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Sehingga penulis dapat mempersembahkan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai hadiah terindah dan sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuanya yaitu bapak Kamaruddin dan ibu Andi Reni Agustina yang tidak pernah bosan untuk memberikan doa serta dukungan moril maupun moral meskipun penulis mengetahui bahwa karya tulis ini tidak bisa membalas kedua orang tuanya namun setidaknya karya tulis ini bisa membuat orang tuanya menjadi bangga dan tersenyum bahagia.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibunda Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT.,S.KM.,M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan dan selaku pembimbing I yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat serta membimbing dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
4. Ibunda Firdayanti, S.SiT.,M.keb selaku sekretaris jurusan prodi kebidanan
5. Ibunda dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberi saran-saran serta masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibunda dr. Nadyah, M.Kes selaku penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum selaku penguji agama yang selalu menyempatkan waktunya dan senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan KTI ini.
8. Kepada seluruh Dosen dan staf Pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar.
9. Kepada seluruh staf RSUD Syekh Yusuf Gowa yang senantiasa membimbing dalam proses penelitian ini.

10. Kepada rekan-rekan angkatan 2014 yang selalu memberi dukungan dan saran dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini.

Ilmu merupakan penghias ibadah manusia kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri. Ketika ilmu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diamalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang benar maka akan sangat indah manfaat yang diraih.

Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Innamal a’malu bin niyyah*” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat), kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun KTI ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikanya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, 15 Desember 2017

Penyusun,

MEYLINDA OCTAVIANA
NIM: 70400114027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	4
C. Tujuan penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	6
E. Metode Penulisan	7
BAB II TINJAUAN TEORI	10
A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perdarahan Post Partum	21
C. Tinjauan Khusus Tentang <i>Rest</i> Plasenta	29
D. Tinjauan Islam Terhadap Masa Nifas	33

E.	Proses Manajemen Asuhan Masa Nifas.....	36
F.	Pendokumentasian Asuhan Kebidanan.....	43
BAB III STUDI KASUS		45
	Langkah I Identifikasi Data Dasar.....	45
	Langkah II Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual.....	52
	Langkah III Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial.....	54
	Langkah IV Tindakan Segera / Kolaborasi	55
	Langkah V Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan / Intervensi	56
	Langkah VI Implementasi Asuhan Kebidanan.....	60
	Langkah VII Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	64
	Pendokumentasian Asuhan Kebidanan.....	66
BAB IV PEMBAHASAN		101
BAB V PENUTUP		116
A.	Kesimpulan.....	116
B.	Saran	118
DAFTAR PUSTAKA		120

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Frekuensi Kunjungan Masa Nifas	20
Tabel 2 : Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas yang Lalu.....	48
Tabel 3 : Tabel Kunjungan	96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Kepala Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Cq. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sul-Sel.
Lampiran II	Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kepada Bupati Gowa.
Lampiran III	Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Bupati Gowa kepada Direktur RSUD Syekh Yusuf.
Lampiran IV	Surat keterangan selesai penelitian dari RSUD Syekh Yusuf Gowa
Lampiran V	Riwayat hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, 15 DESEMBER 2017

Meylinda Octaviana, 70400114027

Pembimbing I : Sitti Saleha

Pembimbing II : Rini Fitriani

**“Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum pada Ny “H” Dengan
Rest Placenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017”**

Rest Placenta adalah keadaan di mana suatu bagian dari plasenta (satu atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif.

Karya Tulis Ilmiah ini memaparkan aplikasi Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum pada Ny “H” dengan *Rest Placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017 sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Diagnosis *Rest Placenta* ditegakkan dengan data subjektif perdarahan yang terjadi pasca bersalin yakni pada hari ke 16 postpartum, data objektif berupa terdapat pengeluaran darah pada saat dilakukan vaginal *touch* serta pada pemeriksaan USG tampak bekuan darah pada cavum uteri dengan kesan sangat mungkin rest plasenta. Asuhan yang dilakukan adalah pemberian cairan infus beserta drips oksitosin untuk penanganan perdarahan, melakukan pemeriksaan darah di laboratorium, melakukan pemberian obat berupa analgetik, antibiotik, penambah darah dan anti perdarahan, melakukan USG untuk memastikan diagnosis, melakukan transfusi darah untuk menormalkan kadar Hb, kemudian melakukan tindakan kuretase sebagai tindakan untuk mengatasi rest plasenta.

Kesimpulan dari studi ini adalah data subjektif dan objektif mendukung ditegakkannya diagnosis *rest placenta* dan pada pemantauan lanjutan tidak ditemukannya komplikasi. Hal lainnya adalah bahwa dukungan keluarga dan peningkatan pemahaman ibu tentang panduan agama (islam) merupakan materi edukasi yang penting untuk disampaikan bidan pada ibu dalam masa nifas terutama untuk proses pemulihan organ-organ reproduksi ibu pasca bersalin.

Daftar Pustaka : 35 (1998-2017)

**Kata kunci : Masa Nifas, Perdarahan Postpartum, *Rest Placenta*,
Tujuh Langkah Varney**

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, DECEMBER 15, 2017

Meylinda Octaviana, 70400114027

Supervisor I : Sitti Saleha

Supervisor II : Rini Fitriani

“Postpartum Midwifery Care Management on Mrs. “H” with Rest Placenta at RSUD Syekh Yusuf Gowa in 2017”

Rest Placenta is a condition in which a part of the placenta (one or more lobes) is left behind, so the uterus cannot effectively be contracted.

This Scientific Paper describes the application of Postpartum Midwifery Care Management on Mrs. "H" with Rest Placenta in RSUD Syekh Yusuf Gowa in 2017 in accordance with 7 steps of Varney and SOAP.

The diagnosis of rest placenta is established by subjective data of postpartum hemorrhage on the 16th day of postpartum, the objective data in the form of blood discharge at the time of vaginal touch and on ultrasound examination seen blood clots in the uterine cavity with a very possible impression of placental rest. The cares applied are administering the intravenous fluids along with oxytocin drips for bleeding treatment, performing blood tests in the laboratory, administering analgesic drugs, antibiotics, blood enhancer and anti-bleeding, performing ultrasonography to confirm the diagnosis, transfusing blood to normalize Hb levels, curettage action as a way to overcome the rest of the placenta.

The conclusions of this study are subjective and objective data support the establishment of placental rest diagnosis and on follow-up monitoring of no complications. Another thing is that family support and improved understanding of mothers on religious guidance (Islam) is an important educational material to be delivered by midwives to mothers in the postpartum period, particularly for the recovery process of reproductive organs of post-maternal mothers.

References : 35 (1998-2017)

Keywords : Postpartum Period, Postpartum Bleeding, Placenta Rest, Seven Step of Varney



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa pengertian dari *rest placenta*, diantaranya ada yang berpendapat bahwa *rest placenta* adalah suatu bagian dari plasenta, satu atau lebih lobus tertinggal dalam uterus (Nadyah, 2013: 90). Sumber lain berpendapat *rest placenta* merupakan keadaan di mana suatu bagian dari plasenta (satu atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan. Hal ini secara tidak langsung dapat menambah Angka Kesakitan dan Kematian Ibu (AKI) (Nurjanah dkk, 2013: 151).

Kematian ibu atau kematian maternal adalah kematian seseorang ibu sewaktu hamil atau dalam waktu 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak bergantung pada tempat atau usai kehamilan. Indikator yang umum digunakan dalam kematian ibu adalah Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Ratio*) yaitu jumlah kematian ibu dalam 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mencerminkan resiko obstetrik yang dihadapi oleh seorang ibu sewaktu ia hamil (Prawirohardjo, 2014: 53).

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) AKI di dunia masih tinggi dan Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN dengan jumlah kematian ibu yang cukup tinggi. AKI di dunia tahun 2015 yaitu 216 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara dimana salah satunya Indonesia yaitu 126 per 100.000 kelahiran hidup (WHO World Health Statistic, 2017).

Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, AKI di Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Tujuan MDGs (*Millennium Development Goals*) pada 2015 adalah AKI dapat diturunkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, berdasarkan data yang didapatkan AKI pada tahun 2015 sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini masih cukup jauh dari target MDGs. (Profil Kesehatan Indonesia, 2015: 104).

Menurut Profil Kesehatan Sulawesi Selatan, pada tahun 2014 dilaporkan jumlah kematian ibu berkisar 138 orang atau 93.20 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2015 jumlah kematian ibu meningkat menjadi 149 orang atau 99,38 per 100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2016: 8).

Menurut Profil Kesehatan Kabupaten Gowa terdapat jumlah AKI pada tahun 2014 sebanyak 3 orang atau 24 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 14 orang atau 111 per 100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Kabupaten Gowa, 2016: 29).

Menurut data yang diperoleh dari rekam medik RSUD Syekh Yusuf sebagai rumah sakit rujukan di kabupaten Gowa menunjukkan jumlah ibu nifas pada tahun 2016 sebanyak 3887 dengan jumlah kejadian *rest placenta* sebanyak 13 orang dan pada Januari hingga April 2017 terdapat 993 ibu nifas dengan jumlah kejadian *rest placenta* sebanyak 8 orang (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa).

Diperkirakan dari setiap ibu yang meninggal dalam kehamilan, persalinan, atau nifas, 16 – 17 ibu menderita komplikasi yang mempengaruhi kesehatan mereka, umumnya menetap. Penyebab utama kematian ibu telah diuraikan di atas,

yaitu perdarahan, infeksi, hipertensi dalam kehamilan, partus macet dan aborsi. Kesakitan ibu terdiri atas komplikasi ringan sampai berat berupa komplikasi permanen atau menahun yang bisa terjadi sesudah masa nifas (Prawirohardjo, 2014: 54).

Kematian ibu dibagi menjadi kematian langsung dan tidak langsung. Kematian ibu langsung adalah sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas dan segala intervensi atau penanganan tidak tepat dari komplikasi tersebut. Kematian ibu tidak langsung merupakan akibat dari penyakit yang sudah ada atau penyakit yang timbul sewaktu kehamilan yang berpengaruh terhadap kehamilan, misalnya malaria, anemia, HIV/AIDS dan penyakit kardiovaskular (Prawirohardjo, 2014: 54).

WHO memperkirakan sekitar 10 % kelahiran hidup mengalami komplikasi perdarahan pascapersalinan. Komplikasi paling sering dari perdarahan pascapersalinan adalah anemia. Perdarahan yang bertanggung jawab atas sekitar 28 % kematian ibu, seiring tidak dapat diperkirakan dan terjadi tiba-tiba. Sebagian besar perdarahan terjadi pascapersalinan, baik karena atonia uteri maupun sisa plasenta. Hal ini menunjukkan penanganan kala III yang kurang optimal, begitu pun penanganan *rest placenta* akan meningkatkan resiko sisa plasenta tertinggal di dalam uterus, sehingga dapat mengakibatkan perdarahan pascapersalinan baik perdarahan pascapersalinan primer maupun sekunder (Prawirohardjo, 2014: 54). Perdarahan post partum sekunder merupakan penyebab penting dari angka kesakitan dan kematian ibu (Pradipta dan Yeni, 2011).

Pada proses kala III didahului dengan tahap pelepasan/separasi plasenta akan ditandai oleh perdarahan pervaginam atau plasenta sudah sebagian lepas

tetapi tidak keluar pervaginam, sampai akhirnya tahap ekspulsi, plasenta lahir (Prawirohardjo, 2014: 527). Perdarahan yang terjadi pada masa nifas terkhususnya yang diakibatkan karena sisa plasenta harus benar-benar diberi asuhan yang optimal, agar dapat memulihkan kembali kondisi ibu akibat perdarahan yang terjadi, namun harus sesuai dengan wewenang masing-masing tenaga kesehatan terkhususnya bidan. Maka dari itu penulis tertarik menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017.

B. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah meliputi: Manajemen Asuhan Kebidanan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu dengan *Rest placenta* di RSUDSyekh Yusuf Gowa tahun 2017.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu dengan *Rest Placenta* di RSUDSyekh Yusuf Gowa tahun 2017 dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan sesuai wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

a. Dapat melaksanakan pengkajian dan analisis data ibu pascapersalinan pada Ny “H” dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

- b. Dapat merumuskan diagnosa/masalah aktual ibu pascapersalinan pada Ny “H” dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- c. Dapat merumuskan diagnosa/masalah potensial ibu pascapersalinan pada Ny “H” dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- d. Dapat mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi ibu pascapersalinan pada Ny “H” dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- e. Dapat menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan ibu pascapersalinan pada Ny “H” dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- f. Dapat melaksanakan tindakan asuhan yang disusun pada ibu pascapersalinan pada Ny “H” dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- g. Dapat mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan/evaluasi kepada ibu pascapersalinan pada Ny “H” dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.
- h. Dapat mendokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan kepada Ny “H” pascapersalinan pada Ibu dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2017.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan pada kasus tersebut di atas adalah :

1. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

2. Manfaat Institusi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pembaca mengenai asuhan kebidanan ibu pascapersalinan khususnya perdarahan pascapersalinan akibat *rest placenta*.

3. Manfaat Ilmiah

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan serta dapat menjadi bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena dengan penulisan ini penulis dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan baru tentang perdarahan masa nifas akibat *rest placenta*.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang perdarahan pada masa nifas akibat *rest placenta*.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan masa nifas khususnya perdarahan masa nifas akibat *rest placenta*.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/ masalah aktual, identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan emergensi/ kolaborasi, rencana asuhan/ intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan beberapa teknik:

a. Anamnesa

Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusidan auskultasi.

- 1) Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
- 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah, sedangkan lenek digunakan untuk mendengar denyut jantung janin (DJJ).

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.


3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan, bidan, perawat, petugas laboratorium

dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

1. Pengertian Masa Nifas

Masa nifas atau *puerperium* adalah masa yang dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. Pelayanan pasca persalinan harus terselenggara pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi, yang meliputi upaya pencegahan, deteksi dini dan pengobatan komplikasi dan penyakit yang mungkin terjadi, serta penyediaan pelayanan pemberian ASI, cara menjarangkan kehamilan, imunisasi dan nutrisi bagi ibu (Prawirohardjo, 2014: 356).

Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu (Marmi, 2017: 11).

2. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Pada masa nifas ini terjadi perubahan-perubahan fisik ataupun psikis berupa organ reproduksi, terjadinya proses laktasi, terbentuknya hubungan antara orang tua dan bayi dengan memberi dukungan. Atas dasar tersebut perlu dilakukan suatu pendekatan antara ibu dan keluarga dalam manajemen kebidanan. Adapun tujuan asuhan masa nifas adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik fisik maupun psikis.

- b. Melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi, baik pada ibu maupun bayi.
- c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayi dan perawatan bayi sehat.
- d. Memberikan pelayanan KB.
- e. Untuk mendapatkan kesehatan emosi.
- f. Memperlancar pembentukan air susu ibu (ASI).
- g. Mengajarkan ibu untuk melaksanakan perawatan mandiri sampai masa nifas selesai dan memelihara bayi dengan baik, sehingga bayi dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal (Nurjanah dkk, 2013: 3).

3. Tahapan Masa Nifas

Masa nifas dibagi dalam 3 tahap, yaitu *puerperium* dini (*immediate puerperium*), *puerperium* intermedial (*early puerperium*) dan *remote puerperium* (*later puerperium*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Puerperium* dini (*immediate puerperium*), yaitu pemulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan (waktu 0-24 jam post partum). Dalam agama Islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari.

- b. *Puerperium* intermedial (*early puerperium*), suatu masa di mana pemulihan dari organ-organ reproduksi secara menyeluruh selama kurang lebih 6-8 minggu.
- c. *Remote puerperium* (*later puerperium*), waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan yang sempurna secara bertahap terutama jika selama masa kehamilan dan persalinan ibu mengalami komplikasi, waktu untuk sehat bisa berminggu-minggu, bulan bahkan tahun (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 2).

4. Perubahan Fisiologi pada Masa Nifas

Pada masa nifas, organ reproduksi interna dan eksterna akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan ini terjadi secara berangsur-angsur dan berlangsung selama lebih kurang tiga bulan. Selain organ reproduksi, beberapa perubahan fisiologi yang terjadi selama masa nifas akan dibahas berikut ini.

a. Uterus

Segera setelah lahirnya plasenta, pada uterus yang berkontraksi posisi fundus uteri berada kurang lebih pertengahan antara umbilikus dan simfisis, atau sedikit lebih tinggi. Dua hari kemudian, kurang lebih sama dan kemudian mengerut, sehingga dalam dua minggu telah turun masuk ke dalam rongga pelvis dan tidak dapat diraba lagi dari luar (Saleha, 2009: 54). Uterus secara berangsur-angsur akan menjadi kecil (involusi) sehingga akhirnya kembali seperti sebelum hamil.

- 1) Bayi lahir fundus uteri setinggi pusat dengan berat uterus 1000 gr.
- 2) Akhir kala III persalinan tinggi fundus uteri teraba 2 jari bawah pusat dengan berat uterus 750 gr.
- 3) Satu minggu post partum tinggi fundus uteri teraba pertengahan pusat simfisis dengan berat uterus 500 gr.
- 4) Dua minggu post partum tinggi fundus uteri tidak teraba di atas simfisis dengan berat uterus 350 gr.
- 5) Enam minggu post partum fundus uteri bertambah kecil dengan berat uterus 50 gr (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 65).

b. Serviks

Segera setelah persalinan bentuk serviks akan menganga seperti corong. Hal ini disebabkan oleh korpus uteri yang berkontraksi sedangkan serviks tidak berkontraksi. Warna serviks berubah menjadi merah kehitaman karena mengandung banyak pembuluh darah dengan konsistensi lunak.

Segera setelah janin dilahirkan, serviks masih dapat dilewati oleh tangan pemeriksa. Setelah 2 jam persalinan serviks hanya dapat dilewati oleh 2-3 jari dan setelah 1 minggu persalinan hanya dapat dilewati oleh 1 jari (Maritalia, 2012: 19).

c. Vulva dan Vagina

Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi dan dalam

beberapa hari pertama sesudah proses tersebut kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu vulva dan vagian kembali kepada keadaan tidak hamil dan *rugae* dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali sementara labia menjadi lebih menonjol (Tresnawati, 2012: 205).

d. *Lochea*

Lochea merupakan cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina dalam masa nifas. Berikut macam-macam *lochea* antara lain:

1) *Lochea rubra (cruenta)*

Berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks kaseosa, lanugo, sisa darah dan mekonium, selama 3 hari post partum.

2) *Lochea sanguinolenta*

Berwarna kecokelatan berisi darah dan lendir, hari ke 4 – 7 post partum.

3) *Lochea serosa*

Berwarna kuning, berisi cairan lebih sedikit darah dan lebih banyak serum, juga terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta, pada hari ke 7 – 14 post partum.

4) *Lochea Alba*

Cairan putih berisi leukosit, berisi selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati setelah 2 minggu sampai 6 minggu post partum (Nurjannah dkk, 2013: 57).

e. Payudara (*Mammae*)

Perubahan pada payudara dapat meliputi:

- 1) Penurunan kadar progesteron secara cepat dengan peningkatan hormon prolaktin setelah persalinan.
- 2) Kolostrum sudah ada saat persalinan produksi ASI terjadi pada hari ke-2 atau hari ke-3 setelah persalinan.
- 3) Payudara menjadi besar dan keras sebagai tanda mulanya proses laktasi (Tresnawati, 2012: 205-206).

f. Tanda-tanda Vital

Tanda-tanda vital yang berubah selama masa nifas adalah:

1) Suhu tubuh

Setelah proses persalinan, suhu tubuh dapat meningkat sekitar $0,5^{\circ}\text{C}$ dari keadaan normal ($36,5^{\circ}\text{C}$ – $37,5^{\circ}\text{C}$), namun tidak lebih dari 38°C . Hal ini disebabkan karena meningkatnya metabolisme tubuh pada saat proses persalinan. Setelah 12 jam post partum, suhu tubuh yang meningkat tadi akan kembali seperti keadaan semula. Bila suhu tubuh tidak kembali ke keadaan normal atau semakin meningkat, maka perlu dicurigai terhadap kemungkinan terjadinya infeksi.

2) Nadi

Denyut nadi normal berkisar antara 60 – 80 kali per menit. Setelah proses persalinan biasanya denyut nadi akan lebih cepat.

3) Tekanan Darah

Tekanan darah biasanya tidak berubah, kemungkinan tekanan darah akan rendah setelah ibu melahirkan akibat perdarahan.

4) Pernapasan

Keadaan pernapasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu nadi tidak normal, pernapasan juga akan mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran napas (Tresnawati, 2012: 208).

g. Sistem Peredaran Darah (*Cardio Vascular*)

Perubahan hormon selama hamil dapat menyebabkan terjadinya hemodilusi sehingga kadar Hemoglobin (Hb) wanita hamil biasanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan wanita tidak hamil. Selain itu, terdapat hubungan antara sirkulasi darah ibu dengan sirkulasi janin melalui plasenta. Setelah janin dilahirkan, hubungan sirkulasi darah tersebut akan terputus sehingga volume darah ibu relatif akan meningkat. Keadaan ini terjadi secara cepat dan mengakibatkan beban kerja jantung sedikit meningkat. Namun hal tersebut segera diatasi oleh sistem homeostatis tubuh dengan mekanisme kompensasi berupa timbulnya hemokonsentrasi sehingga volume darah akan kembali normal. Biasanya ini terjadi sekitar 1 sampai 2 minggu setelah melahirkan (Maritalia, 2012: 26).

h. Sistem Pencernaan

Buang air besar (BAB) biasanya mengalami perubahan pada 1 – 3 hari pertama post partum. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan tonus otot selama proses persalinan. Selain itu, enema sebelum melahirkan, kurang asupan nutrisi dan dehidrasi serta dugaan ibu terhadap timbulnya rasa nyeri di sekitar anus/perineum setiap kali akan BAB juga mempengaruhi defekasi secara spontan. Faktor-faktor tersebut sering menyebabkan timbulnya konstipasi pada ibu nifas dalam minggu pertama. Kebiasaan defekasi yang teratur perlu dilatih kembali setelah tonus otot kembali normal (Maritalia, 2012: 27).

i. Sistem Perkemihan

Perubahan hormonal pada masa hamil yaitu kadar steroid yang tinggi menyebabkan peningkatan fungsi ginjal. Begitu sebaliknya, pada pasca persalinan kadar steroid menurun sehingga menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal kembali normal dalam waktu satu bulan setelah wanita melahirkan (Nurjannah dkk, 2013: 62).

j. Sistem Integumen

Perubahan kulit selama kehamilan berupa hiperpigmentasi pada wajah (*cloasma gravidarum*), leher, payudara, dinding perut dan beberapa lipatan sendi karena pengaruh hormon, akan menghilang selama masa nifas (Maritalia, 2012: 29).

k. Sistem Muskuloskeletal

Setelah proses persalinan selesai, dinding perut akan menjadi longgar, kendur dan melebar selama beberapa minggu atau bahkan sampai beberapa bulan akibat peregangan yang begitu lama selama hamil (Maritalia, 2012: 29).

5. Peran dan Tanggung Jawab Bidan dalam Masa Nifas

Bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian asuhan post partum. Asuhan kebidanan pada masa nifas merupakan hal yang sangat penting, karena periode ini merupakan masa kritis bagi ibu maupun bayinya. Adapun peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas antara lain:

- a. Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas.
- b. Sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga.
- c. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman.
- d. Membuat kebijakan, perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak serta mampu melakukan kegiatan administrasi.
- e. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan.
- f. Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman.

- g. Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, mengidentifikasi, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta melaksanakannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas.
- h. Memberikan asuhan secara profesional (Marmi, 2017: 12).

6. Kebijakan Program Nasional

Kebijakan program nasional yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai masa nifas merekomendasikan paling sedikit empat kali melakukan kunjungan pada masa nifas, dengan tujuan untuk:

- a. Menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi.
- b. Melakukan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu nifas dan bayinya.
- c. Mendeteksi adanya komplikasi atau masalah yang terjadi pada masa nifas.
- d. Menangani komplikasi atau masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu nifas maupun bayinya (Marmi, 2017: 13).

Berikut ini merupakan aturan waktu dan bentuk asuhan yang wajib diberikan sewaktu melakukan kunjungan masa nifas:

Tabel 1. Frekuensi Kunjungan Masa Nifas

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6 – 8 jam setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. b. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan c. Memberikan konseling pada ibu atau anggota keluarga cara mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. d. Pemberian ASI awal dan melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. e. Menjaga bayi agar tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. f. Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama setelah kelahiran, atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil.
2	6 hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan involusi uteri berjalan normal. b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal. c. Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan istirahat. d. Memastikan ibu menyusui dengan baik. e. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari.
3	2 minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama seperti di atas (6 hari setelah persalinan).
4	6 minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau bayi alami. b. Memberikan konseling untuk KB secara dini

Sumber: Saifuddin dkk, 2014: N-23

B. Tinjauan Umum Tentang Perdarahan Post Partum

1. Pengertian Perdarahan Post Partum

Perdarahan Post Partum (PPP) adalah perdarahan yang masif yang berasal dari tempat implantasi plasenta, robekan pada jalan lahir dan jaringan sekitarnya dan merupakan salah satu penyebab kematian ibu di samping perdarahan karena hamil ektopik dan abortus (Prawirohardjo, 2014: 522). Kebanyakan dari kasus perdarahan post partum disebabkan oleh atonia uteri dimana terjadinya kegagalan uterus dalam berkontraksi (Beckmann dkk, 2010:133).

Perdarahan Post Partum (PPP) adalah perdarahan lebih dari 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir. Kondisi dalam persalinan menyebabkan kesulitan untuk menentukan jumlah perdarahan yang terjadi, maka batasan jumlah perdarahan disebutkan sebagai perdarahan yang lebih dari normal yang telah menyebabkan perubahan tanda vital, antara lain pasien mengeluh lemah, berkeringat dingin, menggigil, tekanan darah sistolik < 90 mmHg, denyut nadi > 100 x/menit, kadar Hb < 8 g/dL (Nugroho, 2012: 222).

Pada praktisnya tidak perlu mengukur jumlah perdarahan sampai sebanyak itu sebab menghentikan perdarahan lebih dini akan memberikan prognosis lebih baik. Pada umumnya bila terdapat perdarahan yang lebih dari normal, apalagi telah menyebabkan perubahan tanda vital (seperti kesadaran menurun, pucat, linglung, berkeringat dingin, sesak napas, serta tensi >90 mmHg dan nadi

>100/menit), maka penanganan harus segera dilakukan (Prawirohardjo, 2014: 523).

Perdarahan post partum sering bersifat akut dan merupakan sebab utama kematian maternal. Pendekatan risiko diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya komplikasi. Upaya untuk penanganan perdarahan post partum ditujukan pada 3 hal yakni pencegahan, penghentian perdarahan dan mengatasi syok (Azza, 2011). Pada perdarahan post partum yang tidak ditangani dapat mengakibatkan syok dan menurunnya kesadaran akibat banyaknya darah yang keluar. Hal ini menyebabkan gangguan sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan dapat menyebabkan *hipovolemia* berat. Bila hal ini terus terjadi maka akan menyebabkan ibu tidak terselamatkan (Satriyandari dan Hariyati, 2017).

2. Jenis Perdarahan Post partum

Perdarahan post partum atau post partum *hemorrhage* terbagi atas 2 yakni perdarahan post partum primer dan sekunder.

a. Perdarahan post partum primer

Perdarahan post partum primer adalah mencakup semua kejadian perdarahan selama 24 jam setelah kelahiran (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 182).

Penyebab:

- 1) Atonia uteri, yang terjadi karena plasenta atau selaput ketuban tertahan.

- 2) Trauma genital, yang meliputi penyebab spontan dan trauma akibat penatalaksanaan atau gangguan, misalnya kelahiran yang menggunakan peralatan termasuk *sectio caesaria* dan episiotomi.
- 3) Koagulasi *Intravascular Diseminata*.
- 4) Inversi Uterus (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 182).

b. Perdarahan post partum sekunder

Perdarahan post partum sekunder adalah mencakup semua kejadian PPH yang terjadi antara 24 jam setelah kelahiran bayi dan 6 minggu masa post partum.

Penyebab:

- 1) Fragmen plasenta atau selaput ketuban tertahan.
- 2) Pelepasan jaringan mati setelah persalinan macet (dapat terjadi di serviks, vagina, kandung kemih, rektum).
- 3) Terbukanya luka pada uterus (setelah *sectio caesaria*, ruptur uterus) (Marmi, 2017: 162).

3. Penyebab Perdarahan Post Partum

a. Atonia Uteri

Atonia uteri adalah kegagalan serabut-serabut otot miometrium uterus untuk berkontraksi dan memendek. Hal ini merupakan penyebab perdarahan post partum yang paling penting dan biasa terjadi segera setelah bayi lahir hingga 4 jam setelah persalinan. Atonia uteri dapat menyebabkan perdarahan hebat dan dapat mengarah pada terjadinya syok hipovolemik (Nugroho,

2012: 229). Atonia uteri juga merupakan penyebab utama dari perdarahan post partum primer (Ara dkk, 2014: 1126).

Predisposisi atonia uteri diantaranya:

- 1) Grandemultipara.
- 2) Uterus yang terlalu regang (hidramnion, hamil ganda, anak besar (BB >4000 gr)).
- 3) Kelainan uterus (uterus *bicornis*, mioma uteri, bekas operasi).
- 4) Plasenta previa dan solusio plasenta (perdarahan antepartum).
- 5) Partus lama (*exhausted mother*).
- 6) Partus *precipitatus*.
- 7) Hipertensi dalam kehamilan (*Gestosis*).
- 8) Infeksi uterus.
- 9) Anemia berat.
- 10) Penggunaan oksitosin yang berlebihan dalam persalinan (induksi partus).
- 11) Riwayat perdarahan pasca persalinan sebelumnya atau riwayat plasenta seperti manual plasenta.
- 12) Pimpinan kala III yang salah, dengan memijit-mijit dan mendorong-dorong uterus sebelum plasenta terlepas.
- 13) IUFD yang sudah lama, penyakit hati, emboli air ketuban (koagulopati).
- 14) Tindakan operatif dengan anastesi umum yang terlalu dalam (Nurjanah dkk, 2013: 147).

Gejala klinis atonia uteri:

- 1) Uterus tidak berkontraksi dan lembek.
- 2) Perdarahan segera setelah anak lahir (perdarahan pasca persalinan primer). Gejala dan tanda yang kadang-kadang ada: syok (tekanan darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, ekstremitas dingin, gelisah, mual, dan lain-lain) (Nurjanah dkk, 2013: 150).

b. Robekan Jalan Lahir

Pada umumnya robekan jalan lahir terjadi pada persalinan dengan trauma. Pertolongan persalinan yang semakin manipulatif dan traumatik akan memudahkan robekan jalan lahir dan karena itu dihindarkan memimpin persalinan pada saat pembukaan serviks belum lengkap. Robekan jalan lahir biasanya akibat episiotomi, robekan spontan perineum, trauma forseps atau vakum ekstraksi, atau karena versi ekstraksi.

Robekan yang terjadi bisa ringan (lecet atau laserasi), luka episiotomi, robekan perineum spontan derajat ringan sampai ruptur perinei totalis (sfingter ani terputus), robekan pada dinding vagina, forniks uteri, serviks, daerah sekitar klitoris dan uretra dan bahkan yang terberat ruptur uteri (Prawirohardjo, 2014: 526).

1) Robekan serviks

Persalinan selalu mengakibatkan robekan serviks, sehingga serviks seorang multipara berbeda dari yang belum pernah melahirkan pervaginam. Robekan serviks yang luas

menimbulkan perdarahan dan dapat menjalar ke segmen bawah uterus. Apabila terjadi perdarahan yang tidak berhenti meskipun plasenta sudah lahir lengkap dan uterus sudah berkontraksi dengan baik, perlu dipikirkan perlukaan jalan lahir, khususnya robekan serviks uteri.

2) Perlukaan vagina

Perlukaan vagina yang tidak berhubungan dengan luka perineum tidak sering dijumpai. Mungkin ditemukan setelah persalinan biasa, tetapi lebih sering terjadi sebagai akibat ekstraksi dengan cunam, terlebih apabila kepala janin harus diputar. Robekan terdapat pada dinding lateral dan baru terlihat pada pemeriksaan *speculum*.

3) Robekan perineum

Robekan perineum terjadi pada hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Robekan perineum umumnya terjadi di garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin lahir terlalu cepat, sudut arkus pubis lebih kecil daripada biasa, kepala janin melewati pintu panggul bawah dengan ukuran yang lebih besar daripada *sirkumferensia suboksipito bregmatika* (Nurjanah dkk, 2013: 147).

Gejala klinis robekan jalan lahir:

1) Gejala dan tanda yang selalu ada:

- a) Perdarahan segera.

- b) Darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir.
 - c) Uterus berkontraksi baik.
 - d) Plasenta baik.
- 2) Gejala dan tanda yang kadang-kadang ada:
- a) Pucat.
 - b) Lemah.
 - c) Menggigil (Nurjanah dkk, 2013: 150).
- c. Retensio plasenta

Retensio plasenta adalah belum lahirnya plasenta $\frac{1}{2}$ jam setelah anak lahir. Tidak semua retensio plasenta menyebabkan terjadinya perdarahan. Apabila terjadi perdarahan, maka plasenta dilepaskan secara manual terlebih dahulu, tetapi jika tidak terjadi pengeluaran darah harus dilakukan rujukan untuk dilakukan histerektomi (Nurjanah dkk, 2013: 151).

Gejala klinis retensio plasenta:

- 1) Gejala dan tanda yang selalu ada:
- a) Plasenta belum lahir setelah 30 menit.
 - b) Perdarahan segera.
 - c) Uterus berkontraksi baik.
- 2) Gejala dan tanda yang kadang-kadang ada:
- a) Tali pusat putus akibat traksi berlebihan.
 - b) Inversio uteri akibat tarikan.
 - c) Perdarahan lanjutan (Nurjanah dkk, 2013: 151).

d. Tertinggalnya sebagian plasenta (sisa plasenta)

Keadaan di mana suatu bagian dari plasenta (satu atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan. Tetapi mungkin saja pada beberapa keadaan tidak ada perdarahan dengan sisa plasenta (Nurjanah dkk, 2013: 151).

Gejala klinis sisa plasenta:

- 1) Gejala dan tanda yang selalu ada
 - a) Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah) tidak lengkap.
 - b) Perdarahan segera.
- 2) Gejala dan tanda kadang-kadang ada:
 - a) Uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang (Nurjanah dkk, 2013: 151).

e. Inversio Uterus

Inversio uterus adalah keadaan di mana lapisan dalam uterus (endometrium) turun dan keluar lewat ostium uteri eksternum, yang dapat bersifat komplit dan inkomplit. Secara patologi, inversio uteri dapat terjadi pada kasus pertolongan persalinan kala III fase aktif khususnya bila dilakukan tarikan tali pusat terkendali pada saat masih belum ada kontraksi uterus.

Faktor-faktor yang memungkinkan hal itu terjadi adalah adanya atonia uteri, serviks yang masih terbuka lebar dan adanya kekuatan yang menarik fundus ke bawah (misalnya karena plasenta

akreta, inkreta dan perkreta, yang tali pusatnya ditarik keras dari bawah) atau ada tekanan pada fundus uteri dari atas (*manuver Crede*) (Prawirohardjo, 2014: 527).

Faktor yang berhubungan dengan inversio uteri:

- 1) Riwayat inversio uteri pada persalinan sebelumnya.
- 2) Implantasi plasenta di bagian fundus uteri.
- 3) Atonia uteri.
- 4) Penatalaksanaan kala III aktif yang salah (Nurjannah dkk, 2013:150).

Gejala klinis inversio uterus:

- 1) Gejala dan tanda yang selalu ada:
 - a) Uterus tidak teraba.
 - b) Lumen vagina terisi massa.
 - c) Tampak tali pusat (jika plasenta belum lahir).
 - d) Perdarahan segera.
 - e) Nyeri sedikit atau berat.
- 2) Gejala dan tanda yang kadang-kadang ada:
 - a) Syok *neurogenic*.
 - b) Pucat dan linglung (Nurjannah, 2013: 151).

C. Tinjauan Khusus Tentang Rest placenta

1. Pengertian *rest placenta*

Rest placenta adalah suatu bagian dari plasenta, satu atau lebih lobus tertinggal dalam uterus (Nadyah, 2013: 90).

Keadaan di mana suatu bagian dari plasenta (satu atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan. Tetapi mungkin saja pada beberapa keadaan tidak ada perdarahan dengan sisa plasenta (Nurjanah dkk, 2013: 151).

2. Tanda dan gejala klinik rets plasenta

- a. Perdarahan pasca partus berkepanjangan (perpanjangan perdarahan *lochea*).
- b. Perdarahan pasca partus sekunder.
- c. Pengeluaran *lochea* dapat berbau akibat infeksi *rest placenta* (Nadyah, 2013: 90).
- d. Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah) tidak lengkap.
- e. Terkadang uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang (Nurjannah dkk, 2013: 151).

3. Komplikasi *rest placenta*

- a. Merupakan sumber infeksi dan perdarahan potensial.
- b. Terjadi plasenta polip.
- c. Degenerasi koriokarsinoma.
- d. Dapat menimbulkan gangguan pembekuan darah (Nadyah, 2013: 90).

4. Penatalaksanaan *rest placenta*

- a. Pasang infus profilaksis.
- b. Berikan antibiotik dan uterotonika.

- c. Raba bagian dalam uterus untuk mengetahui adanya bagian plasenta, kemudian eksplorasi uterus secara manual. Jaringan melekat dengan kuat, mungkin merupakan plasenta akreta, untuk pelepasan plasenta yang melekat kuat dapat mengakibatkan perdarahan berat atau perforasi uterus, yang biasanya membutuhkan tindakan histerektomi.
- d. Keluarkan bagian plasenta dengan tangan (manual plasenta), forsep ovum atau kuret lebar.
- e. Bila kadar Hb <8 gr% lakukan transfusi darah dan jika Hb >8 gr% beri sulfas ferosus 600 mg / hari selama 10 hari.

Jika plasenta telah lepas dan perdarahan masih berlanjut kaji status pembekuan darah dengan menggunakan uji pembekuan darah sederhana. Kegagalan terbentuknya bekuan darah yang lunak yang mudah hancur menunjukkan adanya kemungkinan koagulasi (Nadyah, 2013: 91).

5. Standar Prosedur Operasional Penatalaksanaan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa :

- a. Cuci tangan sebelum kontak dengan pasien.
- b. Lakukan persetujuan tindakan medik / *informed consent* dengan suami atau keluarga pasien. Persiapan alat tindakan gawat darurat harus selalu tersedia dan siap pakai, meliputi alat infus, obat-obat uterotonika, obat-obat penenang syok dan lain-lain.

- c. Pemeriksaan keadaan umum pasien dan segera atasi apabila dalam keadaan syok (pucat, berkeringat banyak, pingsan, tekanan sistolik < 90 mmHg, nadi >112 x / menit).
- d. Lakukan anamnesa secara singkat dan tepat.
- e. Segera siapkan pemeriksaan darah lengkap dan persiapan transfusi darah .
- f. Tentukan segera penyebab perdarahan untuk mempercepat penanganan yang tepat.
- g. Segera konsultasikan dengan dokter konsulen tentang keadaan pasien, diagnosa dan penanganannya.
- h. Apabila sudah dipastikan bahwa penyebab dari perdarahan post partum karena sisa plasenta, maka lakukan:
 - 1) Bila syok teratasi, kontraksi uterus baik. Jika pada pemeriksaan dalam teraba jaringan sisa plasenta, segera lakukan eksplorasi kavum uteri untuk mengeluarkan bekuan darah dan jaringan.
 - 2) Perkuat kontraksi dengan uterotonika.
 - 3) Berikan antibiotik spektrum luas dan *robortia*.
 - 4) Melakukan pemeriksaan USG (*Ultrasonography*).
 - 5) Lakukan kuretase apabila hasil pemeriksaan USG terdapat jaringan sisa plasenta.
 - 6) Cuci tangan setelah kontak dengan pasien.
 - 7) Catat semua tindakan dalam rekam medik.

D. Tinjauan Umum tentang Masa Nifas Menurut Pandangan Islam

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena melahirkan. Para ulama bahkan mengelompokkan darah yang keluar karena keguguran termasuk nifas juga. Jadi bila seorang wanita melahirkan bayi yang meninggal di dalam kandungan dan setelah itu keluar darah itu termasuk darah nifas.

Umumnya para ulama mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk sebuah nifas bagi seorang wanita paling cepat adalah hanya sekali keluar. Bila seorang wanita melahirkan dan darah berhenti begitu bayi lahir maka selesailah nifasnya (Sarwat, 2010: 208).

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2:222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ آلِ مَحِيضٍ ۖ قُلْ ۖ هُوَ أَذًى ۖ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ ۚ فِي آلِ مَحِيضٍ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ آلَ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ ۲۲۲

Terjemahan:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya. 2008: 35).

Hal itu di dasari oleh sabda Rasulullah saw ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ

Artinya :

Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan (HR. Jama'ah).

Haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, juga terhadap pria. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit sering kali melilit perunya akibat rahim berkontraksi. *Oleh sebab itu*-lanjut ayat di atas *-hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita*, dalam arti tidak bersetubuh, *pada waktu mereka mengalami haid*; atau pada tempat haid itu keluar. Ini berarti boleh mendekati asal bukan pada tempat haid, yakni bukan pada tempat gangguan itu. Nabi mengizinkan untuk bercumbu pada bagian atas, tidak di bagian bawah (Shihab, 2009:583).

Ada dua bacaan yang diperkenalkan dalam Q.S. Al Baqarah/2:222, (يَطْهَرْنَ) *yathhurna* dan (يُطَهَّرْنَ) *yatathahharna*; yang pertama berarti suci, yakni berhenti haidnya; dan yang kedua berarti *amat suci*, yakni mandi setelah haidnya berhenti. Tentu saja, yang kedua lebih ketat daripada yang pertama, dan agaknya ini lebih baik dan memang lebih suci. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai juga orang-orang yang bersungguh-sungguh menyucikan diri* (Shihab, 2009:584).

Bertaubat adalah menyucikan diri dari kotoran batin, sedangkan menyucikan diri dari kotoran lahir adalah mandi atau berwudhu. Demikianlah penyucian jasmani dan ruhani digabung oleh penutup ayat ini, sekaligus memberi isyarat bahwa hubungan seks baru dapat dibenarkan jika haid telah berhenti dan istri telah mandi. Dinyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menggauli istri dari tempat yang diperintah-Nya (Shihab, 2009:584).

Dalam keadaan nifas, seseorang wanita haram melakukan shalat, masuk ke masjid kecuali darurat, membaca Al-Qur'an, kecuali untuk belajar dan mengajar saja. Dan tidak sah ia melakukan i'tikaf. Ia juga haram melakukan puasa. Seandainya ia berpuasa maka puasanya tidak berlaku. Ia wajib mengqada hari-hari puasanya di saat masa nifas apabila jatuh pada bulan Ramadhan (asy-Syarbashi, 2007:36).

Berdasarkan hadist Ummu Salamah :

كَانَتْ التُّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya:

“Dari Ummu Salamah r.a berkata: para wanita yang mendapat nifas, di masa Rasulullah duduk selama empat puluh hari empat puluh malam (Sarwat, 2010: 208).

Imam At-Tirmizi berkata setelah menjelaskan hadis ini bahwa para ahli ilmu dikalangan sahabat nabi, para tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya sepakat bahwa wanita yang mendapat nifas harus meninggalkan shalat selama 40 hari. Bila demikian ia harus mandi dan shalat, namun bila selama 40 hari darah masih tetap keluar kebanyakan ahli ilmu berkata bahwa dia tidak boleh meninggalkan shalatnya (asy-Syarbashi, 2007:36).

Dari penjelasan di atas 40 hari yang ditetapkan dalam masa nifas yakni bertujuan untuk memulihkan diri termasuk organ-organ reproduksi dari pasca persalinan. Dan bagi wanita nifas dilarang untuk bersetubuh dengan suaminya agar terhindar dari resiko perdarahan yang kemungkinan dapat berlanjut dan terhindar dari efek buruk bagi kesehatan wanita.

E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan Masa Nifas

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah suatu pendekatan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang terfokus pada klien (Walyani dan Purwoastuti, 2015:185).

Menurut Helen Varney, proses manajemen kebidanan terdiri dari 7 langkah yang berurutan, yaitu:

a. Pengkajian

Pada langkah pengkajian, bidan mengumpulkan semua informasi akurat dan lengkap dari beberapa sumber yang berkaitan dengan kondisi klien dengan cara wawancara dengan klien, suami, keluarga dan dari catatan/dokumentasi pasien untuk memperoleh data subjektif. Sementara itu data objektif dilakukan dengan melakukan observasi dan pemeriksaan (Yulifah dan Surachmindari, 2014: 128).

Pengkajian data dibagi menjadi:

1) Data Subjektif

Data subjektif diperoleh dengan cara melakukan anamnesa. Bagian penting dari anamnesa adalah data subjektif pasien ibu nifas yang meliputi:

- a) Biodata/identitas pasien dan suami pasien yang mencakup nama, umur, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
- b) Keluhan utama, untuk mengetahui masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan masa nifas.
- c) Riwayat kesehatan (kesehatan yang lalu, kesehatan sekarang dan kesehatan keluarga) yang meliputi riwayat penyakit jantung, DM, hipertensi, asma, serta penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS dan lain-lain.
- d) Riwayat perkawinan, yang perlu dikaji adalah berapa kali menikah, status menikah sah atau tidak, karena bila melahirkan tanpa status yang jelas akan berkaitan dengan psikologisnya sehingga akan mempengaruhi proses nifas.
- e) Riwayat obstetri (riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu). Berapa kali ibu hamil, apakah pernah abortus, jumlah anak, cara persalinan yang lalu, penolong persalinan, keadaan nifas yang lalu.
- f) Riwayat KB untuk mengetahui apakah pasien pernah ikut KB dengan kontrasepsi jenis apa, berapa lama, adakah keluhan selama menggunakan kontrasepsi serta rencana KB setelah masa nifas ini dan beralih ke kontrasepsi jenis apa.

- g) Kehidupan sosial budaya, untuk mengetahui pasien dan keluarga yang menganut adat istiadat yang akan menguntungkan atau merugikan pasien, khususnya pada masa nifas seperti pada kebiasaan pantangan terhadap makanan.
 - h) Data psikososial, untuk mengetahui respon ibu dan keluarga terhadap bayinya.
 - i) Data pengetahuan, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan ibu tentang perawatan setelah melahirkan sehingga akan menguntungkan selama masa nifas.
 - j) Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari meliputi nutrisi, eliminasi istirahat, personal *hygiene*, dan aktivitas (Wulandari dan Handayani, 2011: 169-173).
- 2) Data Objektif

Data objektif dapat diperoleh melalui pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi.

Pemeriksaan fisik meliputi: pemeriksaan keadaan umum pasien, kesadaran pasien, tanda vital, kepala dan wajah (kepala, muka, hidung dan telinga), gigi dan mulut, (bibir, gigi dan gusi), leher, dada dan payudara, abdomen, ekstremitas (ekstremitas atas dan bawah), genetalia (vagina, kelenjar *bartholini*, pengeluaran pervaginam, perineum dan anus).

Sedangkan pemeriksaan penunjang dapat diperoleh melalui pemeriksaan laboratorium (kadar Hb, hematokrit, leukosit, golongan darah), USG, *rontgen* dan sebagainya (Walyani dan Purwoastuti, 2015:186).

3) Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan identifikasi terhadap diagnosa, masalah dan kebutuhan pasien pada ibu nifas berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan (Walyani dan Purwoastuti, 2015:186).

Pada langkah ini mencakup menentukan keadaan normal pasien, membedakan antara ketidaknyamanan dan kemungkinan komplikasi, identifikasi tanda dan gejala kemungkinan komplikasi, identifikasi kebutuhan pasien. Interpretasi data meliputi diagnosa kebidanan, masalah dan kebutuhan.

a) Diagnosa kebidanan

Diagnosa yang ditegakkan oleh profesi (bidan) dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur (tata nama) diagnosa kebidanan, yaitu:

- (1) Diakui dan telah disahkan oleh profesi.
- (2) Berhubungan langsung dengan praktisi kebidanan.
- (3) Memiliki ciri khas kebidanan.
- (4) Didukung oleh *clinical judgement* dalam praktik kebidanan.

(5) Dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 187).

Berdasarkan kasus ini diagnosa yang dapat ditegakkan Ny “H” PIII A0 umur 30 tahun post partum dengan *rest placenta*.

b) Masalah

Masalah dirumuskan bila bidan menentukan kesenjangan yang terjadi pada respon ibu terhadap masa nifas. Masalah itu terjadi belum termasuk dalam rumusan diagnosa yang ada, tetapi masalah tersebut membutuhkan penanganan bidan, maka masalah dirumuskan setelah diagnosa. Permasalahan yang muncul merupakan pernyataan dari pasien, ditunjang data dasar baik subjektif maupun objektif (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 187).

4) Diagnosa/ Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/ masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah ini penting sekali dalam melakukan tindakan yang aman (Yulifah dan Surachmindari, 2014: 133).

Pada kasus *rest placenta* diagnosa atau masalah potensialnya adalah anemia yang kemungkinan akan terjadi akibat perdarahan yang diakibatkan *rest placenta*.

5) Kebutuhan Tindakan Segera

Pada tahap ini bidan mengidentifikasi perlunya tindakan segera, baik tindakan intervensi, tindakan konsultasi, kolaborasi dengan dokter, atau rujukan berdasarkan kondisi klien.

Langkah kelima mencerminkan kesinambungan dari proses penatalaksanaan kebidanan dalam kondisi emergensi, berdasarkan hasil analisa data bahwa klien membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayinya (Suryani, 2011: 102).

Pada kasus *rest placenta* tindakan segera yang dapat dilakukan yakni memperbaiki kondisi ibu misalnya dalam hal pemasangan infus sambil menghentikan perdarahan dan dilakukan juga kolaborasi dengan dokter obgin dalam hal pengambilan tindakan yang tepat.

6) Rencana Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Penyusunan rencana asuhan sebaiknya melibatkan

pasien dalam *informed consent* (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 188).

Pada kasus *rest placenta* kita dapat merencanakan beberapa tindakan yang telah di konsultasikan terlebih dahulu bersama dokter obgin yakni melakukan eksplorasi pada daerah vagina hingga merencanakan tindakan kuretase namun sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan USG.

7) Implementasi

Pada langkah ini dilakukan pelaksanaan asuhan langsung secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan oleh bidan atau bersama kolaborasi dokter dan tim lain. Walau bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memiliki tanggung jawab dalam memastikan apakah semua rencana asuhan benar-benar terlaksana (Yulifah dan Surachmindari, 2014: 135).

8) Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang telah diberikan. Evaluasi didasarkan pada harapan pasien yang diidentifikasi saat merencanakan asuhan kebidanan. Untuk mengetahui keberhasilan asuhan, bidan mempunyai pertimbangan tertentu antara lain: tujuan asuhan kebidanan; efektivitas tindakan untuk mengatasi masalah; dan hasil asuhan kebidanan (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 189).

F. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu:

1. Subjektif (S)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui anamnesa dengan klien.

2. Objektif (O)

Merupakan ringkasan dari langkah II dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh melalui inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan dari hasil pemeriksaan penunjang.

3. Assesment (A)

Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien.

4. Planning (P)

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana *planning* ini dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien

yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien (Sudarti dan Fauziah, 2010: 39-41).



BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM PADA NY “H”

DENGAN *REST PLACENTA* DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 7 s/d 12 APRIL 2017

No. Register : 42.70.xx
Tanggal Masuk RS : Jum’at 7 April 2017, Pukul 22.30 wita
Tanggal Partus : Rabu 22 Maret 2017, Pukul 16.00 wita
Tanggal pengkajian : Jum’at 7 April 2017, Pukul 22.30 wita
Pengkaji : Meylinda Octaviana

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “H” / Tn “H”
Umur : 30 tahun / 30 tahun
Nikah / Lamanya : 1 kali / 7 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Pa’bundukang

B. Data Biologis / Fisiologis

1. Keluhan utama

- a. Ibu mengeluh keluar darah yang menggumpal dari jalan lahir sejak tanggal 7 April 2017.

2. Riwayat keluhan utama

- a. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir setelah melahirkan lalu berhenti pada hari ke enam masa nifas, kemudian kembali keluar sedikit darah dari jalan lahir hingga pada hari ke 16 masa nifas terdapat pengeluaran darah yang banyak dan bergumpal.
- b. Ibu mengatakan merasa pusing.

C. Riwayat Kesehatan yang lalu

1. Tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun.
2. Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, paru-paru, diabetes melitus (DM) dan hipertensi.
3. Tidak ada riwayat alergi terhadap makanan dan obat-obatan tertentu.
4. Tidak ada riwayat ketergantungan obat-obat terlarang dan alkohol.

D. Riwayat Reproduksi

1. Riwayat haid

- a. *Menarche* : 13 tahun
- b. Siklus haid : 28 - 30 hari
- c. Lamanya haid : 5 - 6 hari
- d. *Disminorhoe* : Tidak ada

2. Riwayat persalinan sekarang

a. Kala I :

- 1) Ibu merasakan sakit perut tembus belakang pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 10.00 wita
- 2) Masuk ke puskesmas pada tanggal 22 Maret 2017 14.20 wita
- 3) Kala I berlangsung selama \pm 1 jam 25 menit

b. Kala II

- 1) Melahirkan tanggal 22 Maret 2017 pukul 16.00 wita
- 2) Jenis persalinan Normal
- 3) Bayi normal, jenis kelamin : laki-laki, BBL 3000 gram, PBL 49 cm, selaput ketuban dan plasenta belum lahir

c. Kala III

- 1) Kala III berlangsung selama \pm 30 menit
- 2) Pukul 16.17 wita dilakukan penyuntikan oksitosin ulang 10 IU / IM
- 3) Pukul 16.37 wita plasenta lahir
- 4) Perdarahan \pm 500 cc

d. Kala IV

- 1) Pukul 16.52 wita TFU setinggi pusat dan perdarahan \pm 100 cc
- 2) Pukul 17.07 wita TFU setinggi pusat dan perdarahan \pm 70 cc
- 3) Pukul 17.22 wita TFU 1 jari di bawah pusat dan perdarahan \pm 50 cc
- 4) Pukul 17.37 wita TFU 1 jari di bawah pusat dan perdarahan \pm 25 cc
- 5) Pukul 18.07 wita TFU 1 jari di bawah pusat dan perdarahan \pm 10 cc
- 6) Pukul 18.37 wita TFU 1 jari di bawah pusat dan perdarahan \pm 10 cc

e. Riwayat kesehatan lalu

- 1) Tidak ada riwayat operasi / operasi
- 2) Tidak ada riwayat PMS
- 3) Tidak ada riwayat alergi obat-obatan.

f. Riwayat KB

Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan sejak kelahiran anak pertama pada tahun 2011, kemudian berhenti pada tahun 2015 lalu berlanjut setelah kelahiran anak kedua pada tahun 2015 selama 1 tahun. Ibu berencana menggunakan KB suntik 3 bulan kembali setelah kelahiran anak ketiga nya.

3. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu.

Kehamilan		Persalinan				Nifas		
Anak ke (Gravid)	Tahun lahir	JK	BBL	Proses	Tempat	Penolong	Kondisi	ASI
I	2011	♂	Lupa	Normal	RS	Bidan	Hidup	±9 bln
II	2015	♂	3000 gr	Normal	Pustu	Bidan	Hidup	±1 thn
III	2017	♂	3000 gr	Normal	Puskesmas	Bidan	Hidup	Sekarang

Sumber: Data Primer, 2017

E. Riwayat Psikososial

1. Ibu merasa cemas dengan keadaannya sekarang
2. Keluarga selalu memberikan dukungan kepada ibu.

F. Riwayat Sosial Ekonomi

1. Hubungan ibu dan keluarga terjaga baik dan keluarga selalu memberi dukungan dengan keadaan ibu sekarang.
2. Hubungan ibu dengan lingkungan sekitar baik.
3. Tulang punggung dan pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.

G. Riwayat Spiritual

1. Ibu dan keluarga beribadah kepada Allah swt.
2. Ibu dan keluarga selalu berdoa kepada Allah swt agar diberi keselamatan dan kesehatan.

H. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Kebutuhan Nutrisi
 - a. Menu makanan sehari-hari nasi dan lauk pauk.
 - b. Frekuensi makan 3 kali sehari.
 - c. Nafsu makan baik.
 - d. Kebutuhan minum ± 3 liter
2. Kebutuhan Eliminasi
 - a. Buang Air Kecil (BAK)
 - 1) Warna kuning jernih
 - 2) Berbau amoniak
 - b. Buang Air Besar (BAB)
 - 1) Frekuensi 1 kali sehari
 - 2) Konsistensi padat
3. Personal *Hygiene*
 - a. Mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun mandi

- b. Sikat gigi 2 kali sehari
- c. Keramas 3 kali seminggu
- d. Mengganti pakaian setiap habis mandi.

I. Pemeriksaan Fisik

1. Pemeriksaan secara umum

- a. Ibu tampak lemah, kesadaran komposmentis
- b. Tanda-tanda Vital (TTV)
 - 1) Tekanan darah (TD) : 110/90 mmHg
 - 2) Nadi (N) : 82 x/i
 - 3) Pernapasan (P) : 22 x/i
 - 4) Suhu badan(S) : 36,6 °C

2. Pemeriksaan khusus

- a. Kepala : Rambut bersih, lurus, ada rontok, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan.
- b. Wajah : Tidak ada *oedema*
- c. Mata : Konjungtiva pucat dan sklera putih
- d. Telinga : Tidak ada serumen
- e. Hidung : Tidak ada polip
- f. Mulut dan gigi : Bibir pucat, tidak ada sariawan, mulut dan gigi bersih
- g. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.
- h. Dada : Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan, terdapat pengeluaran ASI.

- i. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra, tinggi fundus uteri tidak teraba, tidak ada nyeri tekan.
- j. Ekstremitas : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varises dan tidak ada oedema.
- k. Genetalia : Tidak ada varises, tidak ada kelainan pada vulva, tampak sedikit pengeluaran darah dari vagina.

Pemeriksaan *Vagina Toucher* (VT) tanggal 7 April 2017, pukul 22.45 wita oleh bidan "D".

- 1) Keadaan vulva dan vagina : Tidak ada kelainan
- 2) OUE / OUI : Tertutup
- 3) Pelepasan : Darah menempel pada *handscoon*

3. Pemeriksaan penunjang

a. Pemeriksaan laboratorium tanggal 7 April 2017

- 1) Hemoglobin : 8,5 gr/dL
- 2) Leukosit : 8.500 / mm³
- 3) Eritrosit : 3,57 juta/mm³
- 4) Hematokrit : 28,0 %
- 5) Trombosit : 387.000 / mm³

b. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) I, tanggal 08 April 2017 pukul 10.00 wita

Hasil USG : Tampak bekuan darah di kavum uteri

c. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) II, tanggal 10 April 2017 pukul 10.00 wita

Hasil USG :

- 1) Uterus anteflexi, ukuran agak besar.

- 2) Tampak sedikit material solid ireguler di dinding anterior kavum endometri.
- 3) Kesan sangat mungkin *rest placenta*.

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : P_{III} Ao, Post partum hari ke 16, *Rest placenta*.

Masalah aktual : Anemia sedang.

A. P_{III} Ao

1. Data Subjektif

- a. Ibu mengatakan ini merupakan persalinannya yang ketiga.
- b. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 22 Maret 2017.

2. Data Objektif

- a. Tampak linea nigra dan striae alba.

3. Analisis dan interpretasi data

Pada pemeriksaan kulit abdomen tampak adanya linea nigra dan striae alba yang menandakan kehamilan lebih dari satu (Prawirohardjo, 2014: 179).

B. Post partum hari ke 16

1. Data Subjektif

Ibu melahirkan pada tanggal 22 Maret 2017

2. Data Objektif

- a. Keadaan umum ibu lemah
- b. TFU tidak teraba

3. Analisa dan Interpretasi Data:

- a. Dari hari partus tanggal 22 Maret 2017 sampai tanggal pengkajian 07 April 2017 menandakan ibu post partum hari ke 16.

- b. Tinggi fundus uteri yang normal pada ibu post partum hari ke 16 sudah tidak teraba di atas simfisis dan berat uterus \pm 500 gram. Hal ini merupakan keadaan fisiologis menurut masa involusio uteri (Saleha, 2013: 55).

C. *Rest placenta*

1. Data subjektif

Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir setelah melahirkan lalu berhenti pada hari ke enam masa nifas, kemudian kembali keluar sedikit darah dari jalan lahir hingga pada hari ke 16 masa nifas terdapat pengeluaran darah yang banyak dan bergumpal.

2. Data objektif

- a. Tampak pengeluaran darah dari jalan lahir.
- b. Hasil pemeriksaan VT tanggal 7 April 2017, pukul 22.45 wita oleh bidan "D"
 - 1) Keadaan vulva dan vagina : Tidak ada kelainan
 - 2) OUE / OUI : Tertutup
 - 3) Pelepasan : Darah yang menempel pada *handscoon*

3. Analisis dan interpretasi data

Rest placenta merupakan keadaan di mana suatu bagian dari plasenta (satu atau lebih lobus) tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan (Nurjanah dkk, 2013: 149).

D. Anemia Sedang

1. Data subjektif

Ibu mengatakan merasa pusing.

2. Data objektif

- a. Ibu merasa lemas.
- b. Pada pemeriksaan fisik terdapat konjungtiva anemis.
- c. Pada pemeriksaan laboratorium Hb : 8,5 gr/dL.

3. Analisa dan interpretasi data

Bagi wanita, anemia didefinisikan sebagai kadar hemoglobin kurang dari 12,0gr/dL. Karena jumlah sel darah merah yang rendah menyebabkan berkurangnya pengiriman oksigen ke setiap jaringan dalam tubuh, sehingga menyebabkan berbagai tanda dan gejala. Seperti pada anemia sedang pasien akan merasa lelah, lemah, penurunan energi, sesak nafas dan wajah tampak pucat (Proverawati, 2011: 1-22).

Menurut Manuaba derajat anemia berdasarkan hemoglobin dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Hb 11 gr/dL : Tidak anemia
- b. Hb 9 – 10 gr/dL : Anemia ringan
- c. Hb 7 – 8 gr/dL : Anemia sedang
- d. Hb <7 gr/dL : Anemia berat (Manuaba dkk, 2010: 239)

LANGKAH III: IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH POTENSIAL

A. Antisipasi terjadi anemia berat

1. Data subjektif

- a. Ibu merasa pusing dan lemas.

2. Data objektif

- a. Keadaan umum ibu lemah
- b. Konjungtiva dan wajah terlihat pucat.
- c. Hb 8,5 gr/dL
- d. TTV
 - 1) Tekanan darah : 110/90 mmHg
 - 2) Suhu : 36,6 °C
 - 3) Nadi : 82x/ menit
 - 4) Pernapasan : 22x/menit

3. Analisis dan interpretasi data

Menurut Manuaba derajat anemia berdasarkan kadar hemoglobin yaitu <7gr/dL digolongkan dalam anemia berat (Manuaba dkk, 2010: 239). Adapun tanda dan gejala dari anemia berat yakni perubahan warna tinja, denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, frekuensi pernapasan cepat, kulit pucat atau dingin (Proverawati, 2011: 22).

LANGKAH IV: TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

A. Eksplorasi vagina

Rasional :

Eksplorasi vagina merupakan tindakan untuk membersihkan sisa-sisa plasenta yang tertinggal atau sisa jaringan plasenta yang melekat.

B. Melakukan pemeriksaan darah

Rasional :

Pemeriksaan darah dilakukan guna untuk mengetahui eritrosit, leukosit, kadar Hb dan trombosit pada darah ibu.

C. Kolaborasi dengan dokter untuk tindakan selanjutnya

1. Penatalaksanaan pemberian cairan infus *ringer laktat* (RL), drips oksitosin 10 IU unit dalam 500 cc, dengan 28 tetes/menit.
2. Rencana USG pada tanggal 8 April 2017.

D. Penataklasaan pemberian obat

1. Analgetik (Asam Mefenamat 3x1).
2. Penambah darah (SF 1x1).
3. Anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1)

LANGKAH V: RENCANA/INTERVENSI

A. Diagnosa : PIII Ao, post partum hari ke 16 dan *rest placenta*

B. Masalah aktual : Anemia sedang

C. Masalah potensial : Antisipasi terjadinya anemia berat

D. Tujuan:

1. *Rest placenta* dapat teratasi
2. Anemia sedang dapat teratasi
3. Keadaan ibu baik
4. Anemia berat tidak terjadi

E. Kriteria:

1. Perdarahan pervaginam berhenti dan sisa plasenta di kavum uteri bersih
2. Kadar Hb normal yakni >11 gr/dL
3. Konjungtiva tidak anemis
4. Ibu tidak merasa lemas dan pusing
5. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
 - a. Tekanan darah : *Sistole* 90-120 mmHg, *diastole* 60-90 mmHg

- b. Nadi : 60-90 kali/ menit
- c. Suhu : 36,5-37,5°C
- d. Pernapasan : 16-24 kali/ menit

F. Rencana tindakan :

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Rasional: Dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu, ibu dapat mengerti tentang keadaannya dan dapat mengurangi kecemasan ibu.

2. Eksplorasi vagina

Rasional : Eksplorasi vagina merupakan tindakan untuk membersihkan sisa-sisa plasenta atau sisa jaringan plasenta yang masih melekat atau tertinggal.

3. Observasi tanda-tanda vital setiap 1 jam

Rasional: Tanda-tanda vital merupakan indikator dari keadaan umum klien dan menentukan intervensi selanjutnya.

4. Beri informasi kepada klien tentang penyebab perdarahan

Rasional: Agar ibu mengerti tentang keadaannya sekarang dan dapat mengurangi kecemasan ibu.

5. Berikan *health education* (HE) kepada ibu tentang:

- a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu.

b. *Personal hygiene*

Menjaga *personal hygiene* dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setiap habis mandi, mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau kotor, serta mengganti pembalut setiap kali terasa lembab atau penuh.

c. Istirahat

Ibu sebaiknya istirahat untuk mengembalikan tenaga yang telah terkuras.

Rasional : Agar ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang diberikan.

6. Berikan obat analgetik dan vitamin sesuai dengan instruksi dari dokter

Rasional : pengobatan dilakukan untuk proses penyembuhan ibu.

7. *Informed consent* untuk tindakan USG

Rasional: Sebagai pernyataan persetujuan dari ibu/keluarga untuk tindakan dan sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan bidan dalam melakukan tindakan.

8. Jelaskan pada ibu /keluarga tentang pentingnya dilakukan USG pada tanggal 8 dan tanggal 10 April 2017

Rasional: Pentingnya dilakukan USG pada ibu untuk memastikan atau menegakkan diagnosa, agar ibu mendapat tindakan yang tepat.

9. *Informed consent* untuk tindakan transfusi darah

Rasional : Sebagai pernyataan persetujuan dari ibu/keluarga untuk tindakan dan sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan bidan dalam melakukan tindakan.

10. Lakukan transfusi darah

Rasional : transfusi darah dilakukan untuk meningkatkan atau menormalkan

kadar hemoglobin dalam darah.

11. *Informed consent* untuk tindakan kuretase

Rasional : Sebagai pernyataan persetujuan dari ibu/keluarga untuk tindakan dan sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan bidan dalam melakukan tindakan.

12. Persiapan pelaksanaan tindakan kuretase

Rasional:Kuretase dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa jaringan dalam kavum uteri yang menyebabkan perdarahan post partum.

13. Bantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien

Rasional:Mengatur posisi yang diinginkan akan memberikan rasa nyaman pada ibu.

14. Beri kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya.

Rasional:Dengan mengungkapkan perasaannya dan mendengarkan keluhannya klien akan merasa diperhatikan sehingga ia akan lebih tenang .

15. Beri dorongan spiritual kepada ibu

Rasional:Dengan dorongan spiritual memberikan ketenangan hati bahwa segala tindakan yang diberikan untuk proses penyembuhan dan tetap berdoa kepada yang maha kuasa.

16. Libatkan orang terdekat klien selama perawatan

Rasional:Klien akan merasa nyaman dan aman bila didampingi oleh orang terdekatnya khususnya suami.

17. Bekerja secara septik dan antiseptik selama melakukan perawatan pada klien.

Rasional:Untuk mencegah infeksi silang/kontaminasi dengan benda-benda

tidak steril.

LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

A. Pelaksanaan tanggal 07 April – 12 April 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya.

Hasil: ibu memahami dan mengerti dengan keadaanya.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

a. Tekanan darah : 100/90 mmHg

b. Suhu : 36,6⁰C

c. Nadi : 82x/ menit

d. Pernapasan : 22x/menit

3. Mengeksplorasi vagina

Hasil : eksplorasi telah dilakukan akan tetapi sisa plasenta belum keluar.

4. Memberikan informasi kepada klien tentang penyebab pendarahan

Hasil: klien mengerti dengan apa yang diinformasikan.

5. Melanjutkan penatalaksanaan pemberian cairan intravena melalui infus yaitu RL + 10 IU oksitosin.

Hasil : Telah diberikan.

6. Menjelaskan pada klien/keluarga tentang pentingnya dilakukan USG jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan USG pada tanggal 08 April 2017.

Hasil : Ibu/keluarga mengerti dan setuju, maka akan dilakukan tindakan USG.

7. Menjelaskan pada klien/keluarga tentang pentingnya dilakukan kuret jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 11 April

2017, pukul 09.00 wita.

Hasil: Ibu/keluarga mengerti dan setuju, maka akan dilakukan tindakan kuretase.

8. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu bahwa perdarahan yang dialami dapat segera teratasi dengan perawatan dan pengobatan. Serta memberi dukungan pada ibu agar ibu lebih sabar menghadapi cobaan dari Allah swt.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang.

9. Berikan *health education* (HE) kepada ibu tentang:

- a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu.

- b. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setiap habis mandi, mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau kotor, serta mengganti pembalut setiap kali terasa lembab atau penuh.

- c. Istirahat

Ibu sebaiknya istirahat untuk mengembalikan tenaga yang telah terkuras.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

10. Memberikan obat sesuai instruksi dokter

Hasil :

- a. Analgetik (Asam Mefenamat 3x1).

- b. Penambah darah (SF 1x1).
- c. Anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1)

11. Melakukan transfusi darah

Hasil : Transfusi darah 1 kantung tanggal 11 April 2017 pukul 00.00 wita

12. Kolaborasi dengan dokter untuk melakukan USG

Hasil :

- a. Pemeriksaan USG I tanggal 08 April 2017: Tampak bekuan darah di kavum uteri.
- b. Pemeriksaan USG II tanggal 10 April 2017 :
 - 1) Uterus anteflexi, ukuran agak besar.
 - 2) Tampak sedikit material solid ireguler di dinding anterior kavum endometri.
 - 3) Kesan sangat mungkin *rest placenta*.

13. Menganjurkan ibu untuk istirahat sebelum dikuret

Hasil: Ibu mengerti dan melakukannya.

14. Melakukan persiapan pelaksanaan tindakan kuretase yakni berupa persiapan alat, penolong dan persiapan pasien.

- a. Persiapan alat kuret
 - 1) *Handscoon* 2 pasang
 - 2) Kain kasa secukupnya
 - 3) Duk steril 1 buah
 - 4) Kateter 1 buah
 - 5) Spekulum anterior dan posterior
 - 6) Tampontang

- 7) Tenakulum
- 8) Sonde uterus
- 9) Abortus tang
- 10) Kuret tajam dan kuret tumpul
- 11) Kapas DTT
- 12) Larutan betadin

b. Persiapan penolong

- 1) Masker
- 2) Celemek
- 3) Kacamata
- 4) Tutup kepala
- 5) Sepatu boot

c. Persiapan alat dan bahan lain :

- 1) Tempat darah
- 2) Tempat sampah
- 3) Larutan klorin
- 4) Lampu sorot
- 5) Tabung oksigen

d. Persiapan pasien

Hasil: Persiapan kuret telah dilaksanakan

15. Membantu klien mengatur posisi yang nyaman sesuai kebutuhan klien

Hasil: Ibu merasa nyaman dengan posisinya sekarang.

16. Memberi kesempatan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya

Hasil: Ibu merasa tenang telah mengungkapkan perasaannya.

17. Memberikan dorongan spiritual kepada ibu

Hasil: Ibu mengerti dan tampak mulai berdoa.

18. Melibatkan orang terdekat klien selama perawatan

Hasil: Klien didampingi oleh suami.

19. Mengajarkan pada ibu untuk meningkatkan kebersihan diri dengan mengganti *doek* atau pembalut setiap kali basah.

Hasil: Ibu mengerti dan melakukannya.

20. Bekerja secara septic selama melakukan perawatan pada klien

Hasil : Bekerja secara septic telah dilakukan.

LANGKAH VII : EVALUASI

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Anemia sedang telah teratasi dengan tindakan transfusi darah
 - a. Ibu merasa lebih segar dan ibu merasa pusingnya berkurang
 - b. Konjungtiva ibu berwarna merah muda
 - c. Hasil pemeriksaan laboratorium Hb 10,2 gr/dL.
4. *Rest placenta* teratasi
 - a. Telah dilakukan tindakan kuretase.
 - b. Perdarahan pervaginam berhenti.
5. Keadaan ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal
 - a. Tekanan darah : 110/ 70 mmHg
 - b. Pernapasan : 20x/ menit
 - c. Nadi : 80 x/ menit
 - d. Suhu : 36,8 °C

6. Anemia berat tidak terjadi ditandai dengan
 - a. Hemoglobin (Hb) 10,1 gr/dL



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
HARI KE 16 PADA NY “H” DENGAN *REST PLACENTA*
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 7 APRIL 2017**

No. Register : 42.70.xx
Tanggal Masuk RS : Jum’at 7 April 2017, Pukul 22.30 wita
Tanggal Partus : Rabu 22 Maret 2017, Pukul 16.00 wita
Tanggal pengkajian : Jum’at 7 April 2017, Pukul 22.30 wita
Pengkaji : Meylinda Octaviana

Identitas Isteri / Suami

Nama : Ny “H” / Tn “H”
Umur : 30 tahun / 30 tahun
Nikah / Lamanya : 1 kali / 7 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Pa’bundukang

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bersalin pada tanggal 22 Maret 2017.
2. Ibu mengatakan ini persalinannya yang ketiga.
3. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir setelah melahirkan lalu berhenti pada hari ke enam masa nifas, kemudian kembali keluar sedikit darah dari

jalan lahir hingga pada hari ke 16 masa nifas terdapat pengeluaran darah yang banyak dan bergumpal.

4. Ibu mengatakan merasa lelah dan pusing.
5. Keluhan yang dirasakan sangat mengganggu aktivitas sehingga ibu takut bergerak banyak.

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu lemah
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/90 mmHg
 - b. Suhu : 36,6 °C
 - c. Nadi : 82 x/ menit
 - d. Pernapasan : 22 x/menit
4. Pemeriksaan fisik (*from head to toe*)
 - a. Kepala : Rambut bersih, lurus, ada rontok, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan.
 - b. Wajah : Tidak ada *oedema*
 - c. Mata : Konjungtiva pucat dan sklera putih
 - d. Telinga : Tidak ada serumen
 - e. Hidung : Tidak ada polip
 - f. Mulut dan gigi : Bibir pucat, tidak ada sariawan, mulut dan gigi bersih
 - g. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.

- h. Dada : Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan, terdapat pengeluaran ASI.
- i. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra, tinggi fundus uteri tidak teraba, tidak ada nyeri tekan.
- j. Ekstremitas : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varises dan tidak ada *oedema*.
- k. Genetalia : Tidak ada varises, tidak ada kelainan pada vulva, tampak sedikit pengeluaran darah dari vagina.

Pemeriksaan *Vagina Toucher* (VT) tanggal 7 April 2017, pukul 22.45 wita oleh bidan "D".

- 1) Keadaan vulva dan vagina : Tidak ada kelainan.
- 2) OUE / OUI : Tertutup
- 3) Pelepasan : Darah menempel pada *handscoon*

5. Pemeriksaan Laboratorium tanggal 7 April 2017, pukul 22.49 wita

- a. Hemoglobin : 8,5 gr/dL
- b. Leukosit : 8.500 / mm³
- c. Eritrosit : 3,57 juta/mm³
- d. Hematokrit : 28,0 %
- e. Trombosit : 387.000 / mm³

C. ASSESSMENT (A)

Diagnosa : Post Partum hari ke 16 dengan *Rest Placenta* dan Anemia Sedang .

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya anemia berat.

D. PLANNING (P)

Tanggal 07 April 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: ibu mengerti tentang apa yang disampaikan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil:

- a. Tekanan darah : 110/90 mmHg
- b. Pernapasan : 22x/menit
- c. Nadi : 82x/menit
- d. Suhu : 36,6 °C

3. Mengeksplorasi vagina

Hasil : Eksplorasi telah dilakukan tetapi sisa plasenta belum keluar.

4. Melanjutkan penatalaksanaan pemberian cairan intravena melalui infus yakni RL + 10 IU oksitosin 28 tetes/menit

Hasil : Telah diberikan.

5. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu bahwa perdarahan yang ibu alami dapat segera di atasi dengan perawatan dan pengobatan. Serta

memberikan dukungan pada ibu agar lebih sabar menghadapi cobaan dari Allah swt.

Hasil : Ibu terlihat lebih tenang.

6. Berikan *health education* (HE) kepada ibu tentang:

a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu.

b. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setiap habis mandi, mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau kotor, serta mengganti pembalut setiap kali terasa lembab atau penuh.

c. Istirahat

Ibu sebaiknya istirahat untuk mengembalikan tenaga yang telah terkuras.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Memberikan obat sesuai instruksi dokter

Hasil :

a. Analgetik (Asam Mefenamat 3 x 1)

b. Penambah darah (SF 1 x 1)

c. Anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1)

8. Kolaborasi dengan dokter untuk USG

Hasil : rencana USG akan dilakukan pada tanggal 08 April 2017

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
HARI KE 17 PADA NY “H” DENGAN *REST PLACENTA*
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 8 APRIL 2017

No. Register : 42.70.xx
Tanggal Masuk RS : Jum'at 7 April 2017, Pukul 22.30 wita
Tanggal Partus : Rabu 22 Maret 2017, Pukul 16.00 wita
Tanggal pengkajian : Sabtu 8 April 2017, Pukul 10.00 wita
Pengkaji : Meylinda Octaviana

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bersalin pada tanggal 22 Maret 2017
2. Ibu mengatakan ini persalinannya yang ketiga
3. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir setelah melahirkan lalu berhenti pada hari ke enam masa nifas, kemudian kembali keluar sedikit darah dari jalan lahir hingga pada hari ke 16 masa nifas terdapat pengeluaran darah yang banyak dan bergumpal.
4. Ibu mengatakan merasa lelah dan pusing
5. Ibu mengeluh nyeri pada tangan daerah infus.

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu lemah
2. Kesadaran komposmentis

3. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
- b. Suhu : 36,5⁰C
- c. Nadi : 84x/ menit
- d. Pernapasan : 22x/menit

4. Pemeriksaan fisik (*from head to toe*)

- a. Kepala : Rambut bersih, lurus, ada rontok, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan.
- b. Wajah : Tidak ada *oedema*
- c. Mata : Konjungtiva pucat dan sklera putih
- d. Telinga : Tidak ada serumen
- e. Hidung : Tidak ada polip
- f. Mulut dan gigi : Bibir pucat, tidak ada sariawan, mulut dan gigi bersih
- g. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.
- h. Dada : Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan, terdapat pengeluaran ASI.
- i. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra, tinggi fundus uteri tidak teraba, tidak ada nyeri tekan.
- j. Ekstremitas : Tangan kanan pada daerah pemasangan infus tampak bengkak dan berwarna merah, tungkai simetris kiri dan kanan, tidak ada varises dan tidak ada *oedema*.

k. Genetalia : Tidak ada varises, tidak ada kelainan pada vulva, tampak sedikit pengeluaran darah dari vagina.

5. Pemeriksaan penunjang

USG :Tampak bekuan darah di kavum uteri

C. ASSESMENT (A)

Diagnosa : Post partum hari ke 17 dengan *Rest* placenta dan Anemia sedang

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya anemia berat.

D. PLANNING (P)

Tanggal 08 April 2017, pukul 10.00 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: ibu mengerti tentang apa yang disampaikan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil:

a. Tekanan darah : 110/80 mmHg

b. Pernapasan : 22x/menit

c. Nadi : 84x/menit

d. Suhu : 36,5⁰C

3. Aff infus pada tangan kanan yang mengalami bengkak dan kemerahan

Hasil : Aff infus telah dilakukan

4. Memasang infus ulang pada tangan kiri dan melanjutkan penatalaksanaan pemberian cairan intravena melalui infus yakni RL + 10 IU oksitosin 28

tetes/menit.

Hasil : Pemasangan infus ulang telah dilakukan dan pemberian cairan intravena telah diberikan.

5. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu bahwa perdarahan yang ibu alami dapat segera di atasi dengan perawatan dan pengobatan. Serta memberikan dukungan pada ibu agar lebih sabar menghadapi cobaan dari Allah swt.

Hasil : Ibu terlihat lebih tenang.

6. Berikan *health education* (HE) kepada ibu tentang:

- a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu.

- b. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setiap habis mandi, mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau kotor, serta mengganti pembalut setiap kali terasa lembab atau penuh.

- c. Istirahat

Ibu sebaiknya istirahat untuk mengembalikan tenaga yang telah terkuras.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Memberikan obat sesuai instruksi dokter

Hasil :

- a. Analgetik (Asam Mefenamat 3 x 1)
- b. Penambah darah (SF 1 x 1)

- c. Anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1)
- 8. Kolaborasi dengan dokter untuk USG

Hasil : USG tanggal 08 April 2017 terdapat bekuan darah di kavum uteri, dan rencana USG ulang pada tanggal 10 April 2017.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM

HARI KE 18 PADA NY “H” DENGAN *REST PLACENTA*

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 9 APRIL 2017

No. Register : 42.70.xx
Tanggal Masuk RS : Jum'at 7 April 2017, Pukul 22.30 wita
Tanggal Partus : Rabu 22 Maret 2017, Pukul 16.00 wita
Tanggal pengkajian : Minggu 9 April 2017, Pukul 10.00 wita
Pengkaji : Meylinda Octaviana

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bersalin pada tanggal 22 Maret 2017
2. Ibu mengatakan ini persalinannya yang ketiga
3. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir setelah melahirkan lalu berhenti pada hari ke enam masa nifas, kemudian kembali keluar sedikit darah dari jalan lahir hingga pada hari ke 16 masa nifas terdapat pengeluaran darah yang banyak dan bergumpal.
4. Ibu mengatakan merasa lelah dan pusing
5. Ibu mengatakan telah di USG pada tanggal 08 April 2017

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu lemah
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Suhu : 36,5 °C

c. Nadi : 84 x/ menit

d. Pernapasan : 20x/menit

4. Pemeriksaan fisik (*from head to toe*)

a. Kepala : Rambut bersih, lurus, ada rontok, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan.

b. Wajah : Tidak ada *oedema*

c. Mata : Konjungtiva pucat dan sklera putih

d. Telinga : Tidak ada serumen

e. Hidung : Tidak ada polip

f. Mulut dan gigi : Bibir pucat, tidak ada sariawan, mulut dan gigi bersih

g. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.

h. Dada : Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan, terdapat pengeluaran ASI.

i. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra, tinggi fundus uteri tidak teraba, tidak ada nyeri tekan.

j. Ekstremitas : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varises dan tidak ada *oedema*.

k. Genetalia : Tidak ada varises, tidak ada kelainan pada vulva, tampak sedikit pengeluaran darah dari vagina.

5. Pemeriksaan penunjang

USG tanggal 08 April 2017 :Tampak bekuan darah di kavum uteri

C. ASSESMENT (A)

Diagnosa : Post partum hari ke 18 dengan *Rest* placenta dan Anemia sedang

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya anemia berat

D. PLANNING (P)

Tanggal 09 April 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: Ibu mengerti tentang apa yang disampaikan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil:

- a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
- b. Pernapasan : 20x/menit
- c. Nadi : 84x/menit
- d. Suhu : 36,5 °C

3. Melanjutkan penatalaksanaan pemberian cairan intravena melalui infus yakni RL + 10 IU oksitosin 28 tetes/menit

Hasil : Telah diberikan.

4. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu bahwa perdarahan yang ibu alami dapat segera di atasi dengan perawatan dan pengobatan. Serta memberikan dukungan pada ibu agar lebih sabar menghadapi cobaan dari Allah swt.

Hasil : Ibu terlihat lebih tenang.

5. Berikan *health education* (HE) kepada ibu tentang:

a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu.

b. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setiap habis mandi, mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau kotor, serta mengganti pembalut setiap kali terasa lembab atau penuh.

c. Istirahat

Ibu sebaiknya istirahat untuk mengembalikan tenaga yang telah terkuras.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Memberikan obat sesuai instruksi dokter

Hasil :

a. Analgetik (Asam Mefenamat 3 x 1)

b. Penambah darah (SF 1 x 1)

c. Anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1)

7. Kolaborasi dengan dokter untuk USG

Hasil : USG tanggal 08 April 2017 terdapat bekuan darah di kavum uteri, dan rencana USG ulang pada tanggal 10 April 2017.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
HARI KE 19 PADA NY “H” DENGAN *REST PLACENTA*
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 10 APRIL 2017

No. Register : 42.70.xx
Tanggal Masuk RS : Jum'at 7 April 2017, Pukul 22.30 wita
Tanggal Partus : Rabu 22 Maret 2017, Pukul 16.00 wita
Tanggal pengkajian : Senin 10 April 2017, Pukul 10.00 wita
Pengkaji : Meylinda Octaviana

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bersalin pada tanggal 22 Maret 2017
2. Ibu mengatakan ini persalinannya yang ketiga
3. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir setelah melahirkan lalu berhenti pada hari ke enam masa nifas, kemudian kembali keluar sedikit darah dari jalan lahir hingga pada hari ke 16 masa nifas terdapat pengeluaran darah yang banyak dan bergumpal.
4. Ibu mengatakan merasa lelah dan pusing
5. Ibu mengatakan telah di USG pada tanggal 08 April 2017

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu lemah
2. Kesadaran komposmentis

3. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 100/70 mmHg
- b. Suhu : 36,5 °C
- c. Nadi : 82x/ menit
- d. Pernapasan : 22x/menit

4. Pemeriksaan fisik (*from head to toe*)

- a. Kepala : Rambut bersih, lurus, ada rontok, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan.
- b. Wajah : Tidak ada *oedema*
- c. Mata : Konjungtiva pucat dan sklera putih
- d. Telinga : Tidak ada serumen
- e. Hidung : Tidak ada polip
- f. Mulut dan gigi : Bibir pucat, tidak ada sariawan, mulut dan gigi bersih
- g. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.
- h. Dada : Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan, terdapat pengeluaran ASI.
- i. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra, tinggi fundus uteri tidak teraba, tidak ada nyeri tekan.
- j. Ekstremitas : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varises dan tidak ada *oedema*.
- k. Genetalia : Tidak ada varises, tidak ada kelainan pada vulva,

tampak sedikit pengeluaran darah dari vagina.

5. Pemeriksaan penunjang

USG tanggal 08 April 2017 :Tampak bekuan darah di kavum uteri

USG tanggal 10 April 2017 :

- a. Uterus anteflexi, ukuran agak besar
- b. Tampak sedikit material solid ireguler di dinding anterior kavum endometri
- c. Kesan sangat mungkin *rest placenta*

C. ASSESMENT (A)

Diagnosa : Post partum hari ke 19 dengan *Rest placenta* dan Anemia sedang

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya anemia berat

D. PLANNING (P)

Tanggal 10 April 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: ibu mengerti tentang apa yang disampaikan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil:

- a. Tekanan darah : 100/70 mmHg
- b. Pernapasan : 22x/menit
- c. Nadi : 82x/menit
- d. Suhu : 36,5 °C

3. Melanjutkan penatalaksanaan pemberian cairan intravena melalui infus yakni RL + 10 IU oksitosin 28 tetes/menit

Hasil : Telah diberikan.

4. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu bahwa perdarahan yang ibu alami dapat segera di atasi dengan perawatan dan pengobatan. Serta memberikan dukungan pada ibu agar lebih sabar menghadapi cobaan dari Allah swt.

Hasil : Ibu terlihat lebih tenang.

5. Berikan *health education* (HE) kepada ibu tentang:

- a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu.

- b. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setiap habis mandi, mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau kotor, serta mengganti pembalut setiap kali terasa lembab atau penuh.

- c. Istirahat

Ibu sebaiknya istirahat untuk mengembalikan tenaga yang telah terkuras.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Memberikan obat sesuai instruksi dokter

Hasil :

- a. Analgetik (Asam Mefenamat 3 x 1)
- b. Penambah darah (SF 1 x 1)

c. Anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1)

7. Kolaborasi dengan dokter untuk USG

Hasil : USG tanggal 10 April 2017

a. Uterus anteflexi, ukuran agak besar

b. Tampak sedikit material solid ireguler di dinding anterior kavum endometri

c. Kesan sangat mungkin *rest placenta*

8. Memberitahu pada ibu akan dilakukannya transfusi darah 1 bag sesuai anjuran dokter untuk memperbaiki keadaan ibu untuk tindakan selanjutnya

Hasil : ibu bersedia dilakukannya transfusi darah

9. Memberitahu ibu untuk rencana kuretase pada tanggal 11 April 2017

Hasil : Ibu bersedia untuk rencana tindakan kuretase.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
HARI KE 20 PADA NY “H” DENGAN *REST PLACENTA*
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 11 APRIL 2017**

No. Register : 42.70.xx
Tanggal Masuk RS : Jum'at 7 April 2017, Pukul 22.30 wita
Tanggal Partus : Rabu 22 Maret 2017, Pukul 16.00 wita
Tanggal pengkajian : Selasa 11 April 2017, Pukul 00.00 wita
Pengkaji : Meylinda Octaviana

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bersalin pada tanggal 22 Maret 2017
2. Ibu mengatakan ini persalinannya yang ketiga
3. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir setelah melahirkan lalu berhenti pada hari ke enam masa nifas, kemudian kembali keluar sedikit darah dari jalan lahir hingga pada hari ke 16 masa nifas terdapat pengeluaran darah yang banyak dan bergumpal.
4. Ibu mengatakan merasa lelah dan pusing
5. Ibu mengatakan telah di USG pada tanggal 08 April 2017 dan pada tanggal 10 April 2017

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu lemah
2. Kesadaran komposmentis

3. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
- b. Suhu : 36,6 °C
- c. Nadi : 80 x/ menit
- d. Pernapasan : 20 x/menit

4. Pemeriksaan fisik (*from head to toe*)

- a. Kepala : Rambut bersih, lurus, ada rontok, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan.
- b. Wajah : Tidak ada *oedema*
- c. Mata : Konjungtiva pucat dan sklera putih
- d. Telinga : Tidak ada serumen
- e. Hidung : Tidak ada polip
- f. Mulut dan gigi : Bibir pucat, tidak ada sariawan, mulut dan gigi bersih
- g. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.
- h. Dada : Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan, terdapat pengeluaran ASI.
- i. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra, tinggi fundus uteri tidak teraba, tidak ada nyeri tekan.
- j. Ekstremitas : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varises dan tidak ada *oedema*.

k. Genetalia : Tidak ada varises, tidak ada kelainan pada vulva,
tampak sedikit pengeluaran darah dari vagina.

5. Pemeriksaan penunjang

USG tanggal 08 April 2017 :Tampak bekuan darah di kavum uteri

USG tanggal 10 April 2017 :

- a. Uterus anteflexi, ukuran agak besar
- b. Tampak sedikit material solid ireguler di dinding anterior kavum endometri
- c. Kesan sangat mungkin *rest placenta*

C. ASSESMENT (A)

Diagnosa : Post partum hari ke 20 dengan *Rest placenta* dan Anemia sedang

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya anemia berat

D. PLANNING (P)

Tanggal 11 April 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: ibu mengerti tentang apa yang disampaikan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil:

- a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
- b. Pernapasan : 20 x/menit
- c. Nadi : 80 x/menit
- d. Suhu : 36,6 °C

3. Melanjutkan penatalaksanaan pemberian cairan intravena melalui infus yakni RL + 10 IU oksitosin 28 tetes/menit

Hasil : Telah diberikan.

4. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu bahwa perdarahan yang ibu alami dapat segera di atasi dengan perawatan dan pengobatan. Serta memberikan dukungan pada ibu agar lebih sabar menghadapi cobaan dari Allah swt.

Hasil : Ibu terlihat lebih tenang.

5. Berikan *health education* (HE) kepada ibu tentang:

- a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu.

- b. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setiap habis mandi, mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau kotor, serta mengganti pembalut setiap kali terasa lembab atau penuh.

- c. Istirahat

Ibu sebaiknya istirahat untuk mengembalikan tenaga yang telah terkuras.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Melakukan transfusi darah 1 *bag*

Hasil : Transfusi darah telah dilakukan pada pukul 00.00 wita dan selesai pada pukul 01.30 wita

7. Memberikan obat sesuai instruksi dokter

Hasil :

- a. Analgetik (Asam Mefenamat 3 x 1)
- b. Penambah darah (SF 1 x 1)
- c. Anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1)
- d. Ceftriaxone / 12 jam IV

8. Melakukan pemeriksaan kadar Hb pasca transfusi darah

Hasil : Pukul 07.30 wita kadar Hb pasca transfusi 10,2 gr/dL

9. Melakukan *informed consent* untuk tindakan kuretase

Hasil : Ibu dan suami bersedia untuk dilakukannya tindakan kuretase

10. Melakukan persiapan pelaksanaan tindakan kuretase yakni berupa persiapan alat, penolong dan persiapan pasien

- a. Persiapan alat kuret
 - 1) *Handscoon* 2 pasang
 - 2) Kain kasa secukupnya
 - 3) Duk steril 1 buah
 - 4) Kateter 1 buah
 - 5) *Speculum* anterior dan posterior
 - 6) Tampontang
 - 7) Tenakulum
 - 8) Sonde uterus
 - 9) Abortus tang
 - 10) Kuret tajam dan kuret tumpul
 - 11) Kapas deteksi tingkat tinggi (DTT)

12) Larutan betadin

b. Persiapan penolong

- 1) Masker
- 2) Celemek
- 3) Kacamata
- 4) Tutup kepala
- 5) Sepatu boot

c. Persiapan alat dan bahan lain

- 1) Tempat darah
- 2) Tempat sampah
- 3) Larutan klorin
- 4) Lampu sorot
- 5) Tabung oksigen

d. Persiapan pasien

- 1) klien dianjurkan untuk istirahat dan berpuasa.
- 2) Membantu klien mengatur posisi yang nyaman
- 3) Memberi dorongan spiritual kepada ibu

11. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk tindakan kuretase pada pukul 09.00 wita.

Hasil : Tindakan kuretase telah dilakukan.

12. Melakukan pemantauan keadaan umum dan tanda vital ibu sampai ibu sadar betul

Hasil : Pemantauan keadaan umum dan tanda vital telah dilakukan.

13. Melakukan cek Hb 2 jam post kuretase

Hasil : Kadar Hb 2 jam post kuretase ibu : 10,1 gr/dL



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTPARTUM
HARI KE 21 PADA NY “H” DENGAN *REST PLACENTA*
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 12 APRIL 2017**

No. Register : 42.70.xx
Tanggal Masuk RS : Jum'at 7 April 2017, Pukul 22.30 wita
Tanggal Partus : Rabu 22 Maret 2017, Pukul 16.00 wita
Tanggal pengkajian : Rabu 12 April 2017, Pukul 06.00 wita
Pengkaji : Meylinda Octaviana

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan bersalin pada tanggal 22 Maret 2017
2. Ibu mengatakan ini persalinannya yang ketiga
3. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir setelah melahirkan lalu berhenti pada hari ke enam masa nifas, kemudian kembali keluar sedikit darah dari jalan lahir hingga pada hari ke 16 masa nifas terdapat pengeluaran darah yang banyak dan bergumpal.
4. Ibu mengatakan merasa lelah dan pusing
5. Ibu mengatakan telah di transfusi darah dan telah di kuretase kemarin

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis

3. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
- b. Suhu : 36,8 °C
- c. Nadi : 80 x/ menit
- d. Pernapasan : 20 x/menit

4. Pemeriksaan fisik (*from head to toe*)

- a. Kepala : Rambut bersih, lurus, ada rontok, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan.
- b. Wajah : Tidak ada *oedema*
- c. Mata : Konjungtiva merah muda dan sklera berwarna putih
- d. Telinga : Tidak ada serumen
- e. Hidung : Tidak ada polip
- f. Mulut dan gigi : Bibir merah muda, tidak ada sariawan, mulut dan gigi bersih
- g. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.
- h. Dada : Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, hiperpigmentasi pada *areola mammae*, tidak ada massa, benjolan dan nyeri tekan, terdapat pengeluaran ASI.
- i. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra, tinggi fundus uteri tidak teraba, tidak ada nyeri tekan.
- j. Ekstremitas : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varises dan tidak ada *oedema*.

k. Genetalia : Tidak ada varises, tidak ada kelainan pada vulva,
tidak ada pengeluaran darah.

5. Pemeriksaan penunjang

Hb post kuret : 10,1 gr/dL

C. ASSESMENT (A)

Diagnosa : Post partum hari ke 21 dengan Post kuretase *rest placenta*

Masalah potensial : -

D. PLANNING (P)

Tanggal 12 April 2017

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: Ibu mengerti tentang apa yang disampaikan

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil:

a. Tekanan darah : 110/70 mmHg

b. Pernapasan : 20 x/menit

c. Nadi : 80 x/menit

d. Suhu : 36,8 °C

3. Memberikan dukungan emosional dan spiritual pada ibu bahwa perdarahan yang ibu alami telah teratasi dengan perawatan dan pengobatan. Serta memberikan dukungan pada ibu agar lebih sabar menghadapi cobaan dari Allah swt.

Hasil : Ibu terlihat lebih tenang.

4. Berikan *health education* (HE) kepada ibu tentang:

a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu.

b. Personal *hygiene*

Menjaga personal *hygiene* dengan mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian setiap habis mandi, mengganti pakaian dalam setiap kali lembab atau kotor, serta mengganti pembalut setiap kali terasa lembab atau penuh.

c. Istirahat

Ibu sebaiknya istirahat untuk mengembalikan tenaga yang telah terkuras.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Memberikan obat sesuai instruksi dokter

Hasil :

a. Analgetik (Asam Mefenamat 3 x 1)

b. Penambah darah (SF 1 x 1)

c. Anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1)

6. Menganjurkan ibu untuk ber KB dan menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi seperti : AKDR/IUD, AKBK/Implant, suntikan, minipil, pil, kondom, senggama dan kontrasepsi mantap.

Hasil : Ibu mengerti dan berencana menggunakan KB suntik 3 bulan

TABEL KUNJUNGAN

Tanggal kunjungan	TTV	Hb	Genetalia	Intervensi	Rasional
Jum'at 7 April 2017	TD: 110/90 mmHg N: 82 x/i P: 22 x/i S: 36,6 °C	8,5 gr/dL	Tampak sedikit pengeluaran darah dari jalan lahir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kepada ibu hasil pemeriksaan dan menjelaskan pada ibu penyebab perdarahan yang ibu alami. 2. Memberikan dukungan emosional dan spritual pada ibu bahwa perdarahan yang ibu alami dapat segera teratasi dengan perawatan dan pengobatan. Serta memberikan dukungan pada ibu agar ibu lebih sabar menghadapi cobaan dari Allah Swt. 3. Melakukan pemasangan infus 4. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur, dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu. 5. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene seperti mengeringkan daerah genetalia setiap kali BAK, mengganti pakaian dalam ketika basah atau lembab dan mengganti pembalut setiap kali terasa lembab atau penuh. 6. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup 7. Meminta ibu untuk teratur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu mengerti penyebab perdarahan yang ibu alami. 2. Ibu merasa lebih tenang dan senantiasa berdoa kepada Allah Swt untuk kesembuhan dirinya. 3. Terpasang infus dengan cairan RL+ 10 IU oksitosin 28 tetes / menit pada tangan kiri 4. Ibu masih sedikit kurang nafsu makan. 5. Ibu bersedia dan ibu selalu mengeringkan daerah genetalia setiap kali BAK, mengganti pakaian dalam ketika basah atau lembab dan mengganti pembalut setiap kali BAK. 6. Ibu masih sedikit merasa gelisah dan susah beistirahat. 7. Ibu bersedia mengkonsumsi obat secara teratur

				<p>mengonsumsi obat yang diberikan sesuai anjuran dokter seperti analgetik (Asam Mefenamat 3 x 1), penambah darah (SF 1 x 1) dan anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1).</p> <p>8. Memberitahu pada ibu tentang rencana USG pada tanggal 8 April 2017.</p>	<p>sesuai jadwal.</p> <p>8. Ibu bersedia dilakukan USG pada tanggal 8 April 2017.</p>
<p>Sabtu</p> <p>8 April 2017</p>	<p>TD: 110/80 mmHg</p> <p>N: 84 x/i</p> <p>P: 22 x/i</p> <p>S: 36,5 °C</p>	-	<p>Tampak sedikit pengeluaran darah dari jalan lahir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap memberikan dukungan emosional dan spritual pada ibu 2. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi nutrisi dengan gizi seimbang berupa karbohidrat seperti nasi dan roti, protein seperti ikan, telur, dan daging, vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran serta kalsium seperti susu. 3. Menganjurkann ibu untuk tetap mempertahankan infus 4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygiene. 5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. 6. Menganjurkan ibu untuk teratur mengonsumsi obat yang diberikan sesuai anjuran dokter seperti analgetik (Asam Mefenamat 3 x 1), penambah darah (SF 1 x 1) dan anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1). 7. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG pada pukul 10.00 wita. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu merasa lebih tenang dan senantiasa berdoa kepada Allah Swt untuk kesembuhan dirinya. 2. Ibu telah mengonsumsi beberapa makanan 3. Infus masih terpasang pada tangan kiri. 4. Ibu bersedia dan ibu selalu mengganti pembalut setiap kali BAK. 5. Ibu masih sedikit merasa gelisah dan susah beistirahat. 6. Ibu bersedia mengonsumsi obat secara teratur sesuai dengan jadwal. 7. Ibu telah melakukan USG pada pukul 10.00 dengan hasil terdapat bekuan darah pada Cavum uteri dan akan dilakukan USG ulang pada tanggal 10 April 2017.

<p>Minggu</p> <p>9 April 2017</p>	<p>TD: 110/70 mmHg</p> <p>N: 84 x/i</p> <p>P: 20 x/i</p> <p>S: 36,5 °C</p>	<p>-</p>	<p>Tampak sedikit pengeluaran darah dari jalan lahir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan emosional dan spritual pada ibu 2. Menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. 3. Tetap mempertahankan infus 4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygiene. 5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. 6. Menganjurkan ibu untuk teratur mengkonsumsi obat yang diberikan sesuai anjuran dokter 7. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG ulang pada tanggal 10 April 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu merasa lebih tenang dan senantiasa tetap berdoa kepada Allah Swt untuk kesembuhan dirinya. 2. Ibu telah mengkonsumsi beberapa makanan yang telah disiapkan dan beberapa jenis buah 3. Infus masih terpasang pada tangan kiri. 4. Ibu bersedia dan ibu selalu mengganti pembalut setiap kali BAK. 5. Kegelisahan ibu mulai berkurang dan telah mendapatkan istirahat yang cukup 6. Ibu bersedia mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan jadwal. 7. Ibu bersedia untuk melakukan USG ulang pada tanggal 10 April 2017
<p>Senin</p> <p>10 April 2017</p>	<p>TD: 110/80 mmHg</p> <p>N: 82 x/i</p> <p>P: 22 x/i</p> <p>S: 36,5 °C</p>	<p>-</p>	<p>Masih terdapat sedikit pengeluaran darah dari jalan lahir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan emosional dan spritual pada ibu 2. Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang 3. Menganjurkan ibu untuk tetap mempertahankan infus 4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygiene. 5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup 6. Menganjurkan ibu untuk teratur mengkonsumsi obat yang diberikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu merasa lebih tenang dan senantiasa tetap berdoa kepada Allah Swt untuk kesembuhan dirinya. 2. Ibu telah mengkonsumsi beberapa makanan yang telah disiapkan dan beberapa jenis buah 3. Infus masih terpasang pada tangan kiri. 4. Ibu bersedia dan ibu selalu mengganti pembalut setiap kali BAK. 5. Ibu telah beristirahat dengan cukup. 6. Ibu bersedia mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan jadwal.

				<p>sesuai anjuran dokter</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG pada pukul 10.30 wita 8. Menyampaikan pada ibu bahwa akan dilakukan transfusi darah 1 kantong sesuai anjuran dokter 9. Menyampaikan rencana dan meminta ibu untuk melakukan kuretase pada tanggal 11 April 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Ibu telah melakukan USG dengan hasil sedikit pembesaran pada uterus, terdapat material solid ireguler pada Cavum endometrium dan kesan rest plasenta 8. Ibu bersedia untuk melakukan transfusi darah. 9. Ibu bersedia untuk melakukan kuretase pada tanggal 11 april 2017
<p>Selasa 11 April 2017</p>	<p>TD: 110/70 mmHg N: 80 x/i P: 20 x/i S: 36,6 °C</p>	<p>10,2 gr/dL</p>	<p>Masih terdapat sedikit pengeluaran darah dari jalan lahir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap memberikan dukungan emosional dan spritual pada ibu 2. Meminta ibu untuk tetap mempertahankan infus 3. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygiene. 4. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. 5. Melakukan tranfusi darah 1 kantong. 6. Menganjurkan ibu untuk teratur mengkonsumsi obat yang diberikan sesuai anjuran dokter seperti analgetik (Asam Mefenamat 3 x 1), penambah darah (SF 1 x 1) dan anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1) serta Ceftriaxone / 12 jam secara IV 7. Melakukan Kolaborasi dengan dokter untuk tindakan kuretase 8. Meminta ibu untuk tetap memperhatikan pola makan dengan makan makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu merasa lebih tenang dan senantiasa tetap berdo'a kepada Allah Swt untuk kesembuhan dirinya. 2. Infus masih terpasang pada tangan kiri. 3. Ibu bersedia dan ibu selalu mengganti pembalut setiap kali BAK. 4. Ibu telah beristirahat dengan cukup. 5. Telah dilakukan transfusi pada pukul 00.00 wita – 01.30 wita. 6. Ibu bersedia mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan jadwal dan telah dilakukan pemberian obat secara IV. 7. Telah dilakukan kuretase pada pukul 09.00 wita. 8. Ibu telah mengkonsumsi beberapa makanan

				bergizi seimbang.	yang telah disiapkan dan beberapa potong buah
Rabu 12 April 2017	TD: 110/70 mmHg N: 80 x/i P: 20 x/i S: 36,8°C	10,1 gr/dL	Tidak ada pengeluaran darah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan emosional dan spritual pada ibu. 2. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi. 3. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygiene. 4. Menganjurkan ibu untuk teratur mengonsumsi obat yang diberikan sesuai anjuran dokter seperti analgetik (Asam Mefenamat 3 x 1), penambah darah (SF 1 x 1) dan anti perdarahan (Metilergometrin 3 x 1). 5. Menjelaskan bebrapa jenis KB dan menyarankan Ibu untuk ber-KB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu merasa lebih tenang dan senantiasa tetap berdoa kepada Allah Swt untuk kesembuhan dirinya setelah menjalani kuretase 2. Ibu telah mengonsumsi beberapa makanan yang telah disiapkan dan beberapa jenis buah. 3. Ibu bersedia dan ibu selalu mengeringkan daerah genetalia setiap kali BAK dan mengganti pakaian dalam ketika lembab atau basah. 4. Ibu bersedia mengonsumsi obat secara teratur sesuai dengan jadwal. 5. Ibu menegrti dengan jenis KB dan berencana dan berencana menggunakan KB suntik 3 bulan

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa selama 5 hari asuhan di ruangan IRD dan *Postnatal Care* (PNC) serta dilakukan pemantauan dimulai tanggal 07 April 2017 sampai dengan 12 April 2017.

Penulis akan menguraikan berdasarkan SOAP dan 7 langkah Varney. Pada bab ini, penulis akan membandingkan antara tinjauan kasus pada Ny”H” dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan teori tentang penanganan *Rest placenta*.

Pembahasan ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan tujuh langkah, yaitu pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Langkah-langkah Penatalaksanaan Menurut Varney Yaitu:

1. Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan langkah mengumpulkan semua data yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien secara keseluruhan. Bidan dapat melakukan pengkajian dengan efektif,

maka harus menggunakan format pengkajian yang terstandar agar pernyataan yang diajukan lebih terarah dan relevan.

Tahap ini dilakukan dengan menggunakan data subjektif dan data objektif. Data subjektif dapat diperoleh dengan cara melakukan anamnesa. Anamnesa adalah pengkajian dalam rangka mendapatkan data pasien dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baik secara langsung pada pasien ibu nifas maupun kepada keluarga pasien.

Bagian penting dari anamnesa adalah data subjektif pasien ibu nifas terkait dengan keluhan, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat obstetri (riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu), riwayat persalinan sekarang, riwayat dan perencanaan keluarga berencana, riwayat kesehatan (kesehatan sekarang, kesehatan yang lalu, kesehatan keluarga), pola kebiasaan (pola makan dan minum, pola eliminasi, pola aktivitas dan istirahat, *personal hygiene*), data pengetahuan, psikososial, sprititual dan budaya.

Data objektif dapat diperoleh melalui pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan keadaan umum pasien, kesadaran pasien, tanda vital, kepala dan wajah (kepala, muka, hidung dan telinga), gigi dan mulut (bibir, gigi, dan gusi), leher, dada dan payudara, abdomen, ekstremitas (ekstremitas atas dan bawah), genetalia (vagina, kelenjar bartholini, pengeluaran pervaginam, perineum dan anus).

Sedangkan pemeriksaan penunjang dapat diperoleh melalui pemeriksaan laboratorium (kadar Hb, hematokrit, leukosit, golongan darah), USG, rontgen dan sebagainya (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 185).

Ny "H", usia 30 tahun, PIIIA0, telah melahirkan pada tanggal 22 Maret 2017 dan kemudian datang ke RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tanggal 07 April 2017 sebagai pasien rujukan dari Puskesmas Pa'benteng Gowa dengan keluhan ada pengeluaran darah yang banyak dan menggumpal pada postpartum hari ke 16.

Pada 07 April 2017 ditemukan keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis dengan tekanan darah 110/90 mmHg, suhu 36,6 °C, nadi 82 x / menit, pernapasan 22 x / menit. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva pucat, bibir pucat dan pada pemeriksaan genetalia tampak sedikit pengeluaran darah pada vagina. Pada pemeriksaan *Vagina Touch* (VT) ditemukan keadaan vulva dan vagina normal, OUE/OUI: tertutup dan pelepasan: terdapat darah yang menempel pada *handscoon*. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan Hb: 8,5 gr/dL, leukosit: 8.500 /mm³, eritrosit: 3,57 juta/mm³, hematokrit: 28,0 % dan trombosit: 387.000 /mm³, serta di

Pada tanggal 08 April 2017 ibu mengeluh nyeri pada tangan daerah infus dan pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, dengan tekanan darah 110/90 mmHg, suhu 36,6 °C, nadi 82 x / menit, pernapasan 22 x / menit. Pada pemeriksaan fisik

ditemukan konjungtiva pucat, bibir tampak pucat, pada tangan kanan daerah pemasangan infus tampak bengkak dan berwarna merah serta pada pemeriksaan genetalia tampak sedikit pengeluaran darah pada vagina, dan dilakukan kolaborasi dengan dokter obgin untuk pemeriksaan USG dan ditemukan tampak bekuan darah di kavum uteri.

Pada tanggal 09 April 2017 keluhan yang dirasakan ibu sama pada keluhan yang dirasakan pada tanggal 7 April 2017 dan pemeriksaan yang dilakukan terdapat keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, dengan tekanan darah 110/80 mmHg, suhu 36,5 °C, nadi 84 x / menit, pernapasan 22 x / menit. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva pucat, bibir tampak pucat, pada pemeriksaan genetalia tampak sedikit pengeluaran darah pada vagina.

Pada tanggal 10 April 2017 keluhan yang dirasakan ibu sama pada keluhan yang dirasakan pada hari sebelumnya dan pemeriksaan yang dilakukan keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, dengan tekanan darah 100/70 mmHg, suhu 36,5 °C, nadi 82 x / menit, pernapasan 22 x / menit. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva pucat, bibir tampak pucat, pada pemeriksaan genetalia tampak sedikit pengeluaran darah pada vagina, dan dilakukan kolaborasi dengan dokter obgin dengan hasil USG didapatkan uterus anteflexi, ukuran agak besar, tampak sedikit material solid

ireguler di dinding anterior kavum endometri dan kesan sangat mungkin *rest placenta*.

Pada tanggal 11 April 2017 keluhan yang dirasakan ibu sama pada keluhan yang dirasakan pada hari sebelumnya dan pemeriksaan yang dilakukan keadaan umum ibu lemah, kesadaran komposmentis, dengan tekanan darah 100/70 mmHg, suhu 36,5 °C, nadi 82 x / menit, pernapasan 22 x / menit. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva pucat, bibir tampak pucat, pada pemeriksaan genitalia tampak sedikit pengeluaran darah dari vagina.

Pada tanggal 12 April 2017 ibu sudah tidak merasa lelah dan pusing, serta ibu telah di transfusi darah dan telah di kuretase pada tanggal 11 April 2017. Pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 36,8 °C, nadi 80 x / menit, pernapasan 20 x / menit, serta pada pemeriksaan fisik terdapat konjungtiva merah muda, bibir lembab, dan tampak sedikit pengeluaran darah dari vagina serta pemeriksaan Hb post kuretase 10,1 gr/dL.

Dalam tinjauan pustaka *rest placenta* adalah suatu bagian dari plasenta, satu atau lebih lobus tertinggal dalam uterus. Dikemukakan gejala atau tanda dari *rest placenta* berupa perdarahan postpartum sekunder yakni perdarahan yang terjadi lewat dari 24 jam pasca melahirkan, perdarahan pasca partus yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus *rest placenta*. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

2. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Diagnosis kebidanan adalah diagnosis yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnosis kebidanan (Yulifah dan Surachmindari, 2014: 131).

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah. Keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien.

Hasil pengkajian data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis *rest placenta* dan anemia sedang. Adapun keluhan ibu yaitu keluar darah bergumpal dari jalan lahir setelah melahirkan lalu berhenti pada hari ke 6 masa nifas, kemudian kembali keluar sedikit darah dari jalan lahir hingga pada hari ke 16 masa nifas terdapat pengeluaran darah yang

banyak dan bergumpal, serta ibu merasa pusing, kemudian pada pemeriksaan laboratorium ditemukan Hb 8,5 gr/dL. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa *rest placenta* ditandai dengan tanda dan gejala yaitu perdarahan sekunder atau perdarahan pasca partus berkepanjangan dan anemia sedang ditandai dengan kadar Hb 8,5 gr/dL.

Adapun diagnosa atau masalah aktual yang diidentifikasi pada Ny “H” yaitu PIII A0, postpartum hari ke 16, *rest placenta* dan anemia sedang. Demikian penerapan tinjauan pustaka dan kasus pada Ny “H” secara garis besar tampak adanya persamaan antara teori dengan diagnosis aktual yang ditegaskan sehingga memudahkan memberikan tindakan selanjutnya.

3. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi (Mangkuji dkk, 2013). Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman (Yulifah dan Surachmindari, 2014: 133).

Kondisi pasien saat ini dengan perdarahan pervaginam, lemah dan pusing. Pemeriksaan dalam tidak ada kelainan, OUE/OUI tertutup dan ada pelepasan darah yang menempel pada *handscoon* dan pada pemeriksaan laboratorium kadar Hb 8,5gr/dL, pasien berpotensi terjadi anemia berat jika

tidak segera ditangani. Pasien dengan *rest placenta* harus segera diberi tahu. Sikap dan empati yang ditunjukkan oleh bidan dan dokter akan memberi pengaruh psikologis pada ibu dan keluarga.

Anemia normal pada wanita yakni 11,5 gr/dL, adapun kriteria umum bagi wanita yang mengalami anemia yakni jika kadar hemoglobin <10 gr/dL (Khalafallah dan Denis, 2012). Menurut Jannah adapun kriteria anemia pada laki-laki dewasa dengan kadar Hb <13g/dl, wanita dewasa yang tidak hamil dengan kadar Hb <12 g/dl, wanita hamil dengan kadar Hb <11g/dl, anak umur 6-14 tahun dengan kadar Hb <12 g/dl dan anak umur 6 bulan-6 tahun dengan kadar Hb <11 g/dl. Berdasarkan kadar Hb pembagian anemia pada ibu hamil yaitu: anemia ringan Hb 9-10 gr%, anemia sedang Hb 7-8 gr%, anemia berat Hb < 7 gr% (Jannah,2012: 190).

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa pada kasus Ny "H" dengan diagnosa *rest placenta* dan anemia sedang, masalah potensial yang dapat terjadi adalah anemia berat. Data yang mendukung yaitu pada pemeriksaan dalam terdapat pengeluaran darah yang menempel pada *handscoon* dan pemeriksaan laboratorium terdapat kadar Hb 8,5 gr/dL.

Pada kasus Ny "H" dengan diagnosa *rest placenta* masalah potensial yang dapat terjadi adalah anemia berat. Hal ini menunjukkan adanya

persamaan dan tidak di temukan adanya kesenjangan antara kasus Ny “H” dengan teori.

4. Tindakan Segera/ Kolaborasi

Pada langkah ini beberapa data menunjukkan situasi emergensi, di mana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu. Beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Tindakan tersebut mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan megevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan (Nurhayati dkk, 2013: 143).

Tindakan segera dan kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya, dalam kasus ini, tindakan segera dan kolaborasi yang dilakukan yaitu *Vaginal Touch* (VT), pemeriksaan laboratorium, USG, transfusi darah, pemberian obat dan kuretase.

Kuretase adalah cara membersihkan hasil konsepsi memakai alat kuretase (sendok kerokan) (Setiyaningrum dan Sugiarti, 2017: 208). Sebelum melakukan kuretase, penolong harus melakukan pemeriksaan dalam untuk menentukan letak uterus, keadaan serviks dan besarnya uterus. Gunanya untuk mencegah terjadinya bahaya kecelakaan misalnya perforasi (Mochtar,1998:41).

Pada Ny ”H” dilakukan tindakan dengan melanjutkan penatalaksanaan cairan infus RL + 10 IU oksitosin dengan 28 tetes/menit, penatalaksanaan

pemberian obat sesuai instruksi dokter, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel darah guna pemeriksaan laboratorium, rencana USG pada tanggal 08 April 2017, kemudian dilanjutkan dengan tindakan transfusi darah dan dilakukan tindakan kuretase pada tanggal 11 April 2017 pukul 09.00 wita.

Pada kasus *rest placenta* memerlukan tindakan segera yaitu kolaborasi atau berkonsultasi dengan dokter, dengan demikian ada kesamaan antara tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus dilahan praktek dan ini berarti tidak ada kesenjangan.

5. Rencana Tindakan Asuhan

Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen kebidanan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Suatu rencana tindakan harus disetujui pasien dan bidan agar menjadi efektif. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus merefleksikan alasan yang benar berlandaskan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru, serta telah divalidasi dengan keinginan atau kebutuhan pasien. Rencana asuhan disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan pencegahan masalah/diagnosa potensial. Membuat rencana tindakan asuhan kebidanan hendaknya menentukan tujuan tindakan yang akan dilakukan yang berisi sasaran/target dan hasil yang akan dicapai dalam penerapan asuhan kebidanan pada kasus kematian janin dalam rahim (Nurhayati dkk, 2013).

Dalam membuat perencanaan ini ditemukan tujuan dan kriteria yang akan dicapai dalam menerapkan asuhan kebidanan Ibu Nifas pada Ny "H" dengan *rest placenta* tidak berbeda dengan teori dimana rencana asuhan

kebidanan dikembangkan berdasarkan pada intervensi dan rasional sesuai dengan masalah aktual dan potensial pada ibu nifas dengan *rest placenta*.

Pada kasus Ibu nifas Ny "H" penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial yang dilakukan di Rumah Sakit berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Pada langkah ini, informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi yaitu sebagai berikut: cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan klien, mendengar keluhan, menjelaskan keadaan yang dialami, memberikan motivasi, menganjurkan agar melakukan pemeriksaan secara teratur, menganjurkan untuk beristirahat yang teratur, pemeriksaan laboratorium, memberikan informasi tentang perubahan fisik dan psikologis.

Observasi tanda-tanda vital, kaji adanya tanda infeksi dan anemia, memberikan *health education*, mendiskusikan pada ibu dan keluarga tentang perencanaan USG, transfusi darah dan kuretase, menjelaskan pada ibu pentingnya dilakukan USG, transfusi darah dan kuretase dan jika klien setuju maka akan dilakukan tindakan USG pada tanggal 08 April 2017, transfusi darah pada tanggal 11 April 2017 dan kuretase pada tanggal 11 April 2017, memberikan dukungan psikologis dan spiritual.

Melakukan persiapan pelaksanaan USG, transfusi darah dan tindakan kuretase yakni berupa persiapan alat kuret (*handscoon* 2 pasang, kasa secukupnya, duk steril satu buah, kateter 1 buah, *speculum* anterior dan posterior, tampon tang, kuret tajam dan kuret tumpul, kapas DTT, larutan betadin), persiapan penolong (penutup kepala, kacamata, masker, celemek dan sepatu tertutup), dan persiapan pasien yaitu pasien dianjurkan untuk istirahat

dan berpuasa, kolaborasi dengan dokter pemberin obat analgetik dan obat penambah darah.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan pemantauan selama dirawat di rumah sakit untuk memantau keadaan klien apakah pengeluaran darahnya berhenti atau tidak. Rencana asuhan yang diberikan yaitu memantau tanda-tanda vital, memberikan *Health education* yaitu menganjurkan ibu menjaga kebersihan dan mengomsumsi makanan yang bergizi, mengingatkan pada ibu untuk teratur mengomsumsi obatnya.

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Rencana tindakan asuhan sudah disusun berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktik.

6. Implementasi Asuhan Kebidanan

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan pasien serta kerjasama dengan tim kesehatan atau dokter dengan demikian bidan harus bertanggung jawab atas terlaksananya rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut

(Mangkuji dkk, 2013). Pada saat dilakukan tindakan pada klien, yang pertama dilakukan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan untuk pencegahan terjadinya infeksi.

Pada studi kasus Ny "H" dengan *rest placenta* dan anemia sedang, semua tindakan yang telah direncanakan seperti penanganan perdarahan yaitu tindakan pertama yakni memberikan cairan infus RL + 10 IU oksitosin 28 tetes/menit, Memberikan obat analgetik, anti perdarahan dan penambah darah telah diberikan (cefadroxil, asam mefenamat, metilergometrin dan SF), dilakukan tindakan pengambilan sampel darah guna pemeriksaan laboratorium, dilakukan tindakan, dilakukan tindakan transfusi darah dan dilakukan tindakan kuretase dapat dilaksanakan seuruhnya dengan baik dan tidak menemukan hambatan yang berat karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari klien dan keluarga, serta sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tindakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan pasien.

7. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Pada langkah ketujuh ini merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan di mana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini

penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan. Pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi (Mangkuji, 2013).

Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan yang dilaksanakan selama 5 hari yakni pada tanggal 07 April 2017 hingga tanggal 12 April 2017 adalah sebagai berikut. Pada pelaksanaan evaluasi pada tanggal pada Ny "H" yaitu *rest placenta* teratasi dengan tindakan kuretase dan ditandai dengan perdarahan pervaginam berhenti, keadaan umum ibu membaik, kemudian setelah post kuretase keadaan ibu sudah mengalami kemajuan dan membaik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal. Anemia sedang teratasi dengan tindakan transfusi darah dan ditandai dengan hasil pemeriksaan kadar Hb yakni 10,2 gr/dL, serta potensial terjadinya anemia berat tidak terjadi di mana hasil pemeriksaan kadar Hb 10,2 gr/dL.

Berdasarkan studi Manajemen Asuhan Kebidanan Postpartum pada Ny "H" dengan *Rest placenta* tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus NY "H" secara garis besar tidak ditemukan adanya kesenjangan.

PENDOKUMENTASIAN

Pada hari pertama ibu datang sebagai pasien rujukan dari Puskesmas Pa'benteng Gowa pada tanggal 07 April 2017 di IRD RSUD Syekh Yusuf Gowa di lakukan pengumpulan data mulai dari riwayat kehamilan sekarang dan kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat kesehatan, riwayat sosial ekonomi, riwayat psikososial, riwayat spiritual, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Ibu mengatakan keluar darah dari jalan lahir setelah melahirkan lalu berhenti pada hari ke 6 masa nifas, kemudian kembali keluar sedikit darah dari jalan lahir hingga pada hari ke 16 masa nifas terdapat pengeluaran darah yang banyak dan bergumpal.

Di lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan laboratorium Hb 8,5 gr/dL, terdapat pengeluaran darah yang menempel pada *handscoon* saat dilakukan *Vagina Touch* (VT) dan hasil pemeriksaan USG kesan sangat mungkin *rest placenta*. Pada kasus Ny "H" hasil pengkajian menunjukkan diagnosis *Rest placenta*.

Pada hari ke 2 hingga hari ke 4 ibu di rawat di Rumah sakit dan di lakukan kuretase pada tanggal 11 April 2017 pukul 09.00 wita, selanjutnya pemantauan 2 jam pasca kuret untuk memantau keadaan klien, hasil yaitu pada masalah yang dialami klien teratasi dengan pengeluaran sisa-sisa jaringan melalui kuretase, dan keadaan ibu membaik ditandai dengan tanda-tanda vital normal, ibu tampak lebih tenang dan pada hasil pemeriksaan laboratorium terdapat kadar Hb 10,2 gr/dL.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui kasus Ny “H” dengan *rest placenta* postpartum hari ke 16 di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 07 April – 12 April 2017, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. KESIMPULAN

1. Telah dilaksanakan pengkajian dan analisis data ibu nifas pada Ny “H” dengan *Rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017. Hasil dari analisa data didapatkan Ny “H”, Usia 30 tahun, PIIIA0 dengan keluhan perdarahan yang menggumpal pada tanggal 7 April 2017.
2. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa/masalah aktual pada Ny “H” di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017 dengan pengumpulan baik dari data subjektif, data objektif, dan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan USG sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada Ny “H” dengan *rest placenta* dan anemia sedang.
3. Telah dirumuskan diagnosa/masalah potensial Ny “H” dengan *rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2017. Hasil dari analisa dan interpretasi data aktual Ny “H” berpotensi mengalami anemia berat.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “H” dengan *rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan hasil yaitu

dilakukan kolaborasi dengan dokter untuk meresepkan obat-obat yang sewaktu-waktu diperlukan oleh ibu dengan *rest placenta* dan anemia sedang, antisipasi bila terjadi infeksi.

5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “H” dengan *rest placenta* di RSUD Syekh Yusuf GowaTahun 2017 dengan hasil yaitu perencanaan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial seperti penanganan *rest placenta* dan anemia sedang, *health education* tentang personal hygiene dan asupan nutrisi ibu.
6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah disusun pada Ny “H” dengan *rest placenta* dan anemia sedang di RSUD Syekh Yusuf GowaTahun 2017 dengan hasil yaitu semua perencanaan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Telah mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada Ny “H” dengan *rest placenta* dan anemia sedang di RSUD Syekh Yusuf GowaTahun 2017 dengan hasil yaitu seluruh asuhan telah diberikan dan tidak ada hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan teori.
8. Telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada Ny “H” dengan *rest placenta* dan anemia sedang di RSUD Syekh Yusuf GowaTahun 2017 dalam bentuk SOAP.

B. SARAN

1. Saran untuk klien

- a. Menganjurkan kepada ibu agar banyak beristirahat.
- b. Menganjurkan kepada ibu untuk mengomsumsi makanan dengan gizi seimbang.
- c. Menganjurkan kepada ibu untuk mengomsumsi obat secara teratur sesuai instruksi dokter.
- d. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan organ genetaliannya.
- e. Menganjurkan kepada ibu untuk mobilisasi dini.

2. Saran untuk bidan

- a. Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional sehingga dapat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI). Oleh karena itu bidan harus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, melalui program pendidikan, pelatihan-pelatihan, seminar agar menjadi bidan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan (IPTEK).
- b. Bidan harus memberikan asuhan sesuai wewenang untuk itu manajemen kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang mendasari bagi bidan untuk memecahkan masalah klien dan berbagai kasus.
- c. Seorang bidan hendaknya menganggap bahwa semua ibu hamil mempunyai resiko untuk komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu, oleh karena itu bidan diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya

tanda-tanda bahaya masa nifas dan menganjurkan ibu dan keluarga segera ke pelayanan kesehatan bila mengalami hal tersebut.

3. Saran untuk institusi kebidanan

- a. Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang professional untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Untuk pelayanan yang lebih berkualitas sesuai dengan kemajuan teknologi, sebaiknya bidan yang sudah bertugas diberi kesempatan untuk melanjutkan atau semacam pelatihan-pelatihan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ara, Bilqees, dkk. *Atoniac Uterus Risk Factors And Management As A Cause Of Primary Postpartum Hemorrhage*. The professional Medical Journal. 2014; 21(6): 1122-1127. Diakses Tanggal 12 Juni 2017 Pukul 00.07 WITA.
- Asy-Syarbashi. 2007. *Yas'alunaka 6: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dari Kehidupan*. Jakarta: Lontara.
- Azza, Awatiful. *Pendekatan Evidence Based Practice: "Metode Sayeba" pada Penanganan Postpartum Hemorrhage dengan Indikasi Atonia Uteri*. The Indonesian Journal of Health Science. Volume 1, Nomor 2, Juni 2011. Diakses Tanggal 16 Juni 2017 Pukul 20.00 WITA.
- Beckmann, Charles R B, dkk. 2010. *Obstetrics and Gynecology Sixth Edition*. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Departemen Agama. RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 2013.
- Khalafallah, Alhossain A, and Amanda, E Dennis. *Iron Deficiency Anemia in Pregnancy and Postpartum: Pathophysiology and Effect of Oral versus Intravenous Iron Therapy*. Journal of Pregnancy. Volume 2012. Article ID 630519. Diakses tanggal 21 November 2017 pukul 14.42 WITA.
- Maritalia, Dewi. 2012. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manuaba, Ida Ayu Chandranita, dkk. 2010. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandunga, dan KB*. Jakarta: EGC.
- Marmi. 2017. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas "Purperium Care"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mochtar, Rustam. 1998. *Sinopsis Obstetri: Obstetri Operatif, Obstetri Sosial*. Jakarta: EGC.
- Nadyah. 2013. *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak Dan Maternal (Panduan Praktis Untuk Mahasiswa Kebidanan)*. Gowa: Alauddin University Press.
- Nugroho, Taufan. 2012. *OBSGYN (Obstetri dan Ginekologi) Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nurjanah, Siti Nunung, dkk. 2013. *Asuhan Kebidanan Postpartum*. Bandung: PT Refika Aditama.


- Profil Kesehatan Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Diakses Tanggal 06 Juni pukul 20.20 WITA.
- Profil Kesehatan Sulawesi Selatan. Makassar: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2016. Diakses Tanggal 22 September 2017 Pukul 03.15 WITA.
- Profil Kesehatan Kabupaten Gowa: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2016. Diakses Tanggal 22 September 2017 Pukul 04.30 WITA.
- Pradipta, Bram dan Yeni, Cut Meurah. *Late Post Partum Hemorrhage-Causes and Defining Aspects: Care Series in Zainoel Abidin General Hospital, Banda Aceh, Indonesia*. Proceedings Of The Annual International Conference Syiah Kuala University. Volume 1, Number 1, 2011. Diakses tanggal 11 Juni 2017 pukul 23.15 WITA.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Edisi Keempat.
- Proverawati, Atikah. 2011. *Anemia dan Anemia Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Suryani, Evi Sri. 2011. *Buku Ajar Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sudarti dan Afroh Fauziah. 2010. *Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Saifuddin, Abdul Bari, dkk. 2014. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Saleha, Sitti. 2009. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Saleha, Sitti. 2013. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sarwat, Ahmad. 2010. *Fiqih Thaharah*. Jakarta: DU Center Press.
- Satriyandari, Yekti dan Hariyati, Nena Riski. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Perdarahan Postpartum*. Journal of Health Studies. Volume 1, Nomor 1, Maret 2017. Diakses tanggal 29 November 2017 pukul 00.54 WITA.
- Setiyaningrum, Erna dan Sugiarti. *Buku Ajar Kegawat daruratan Maternitas pada Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tresnawati, Frisca. 2012. *Asuhan Kebidanan Jilid 1 Panduan Lengkap Menjadi Bidan Profesional*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.

World Health Statistic. *Monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals*. 2017. Diakses Tanggal 07 Juni 2017 Pukul 02.51 WITA.

Wulandari, Setyo Retno dan Sri Handayani. 2011. *Asuhan Kebidanan Ibu Masa Nifas*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Walyani, Elisabeth Siwi, dan Th Endang Purwoastuti. 2015. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas & Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yulifah, Rita dan Surachmindari. 2014. *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.



Nomor : B- WA⁰/FKIK/PP.00.9/06/2017
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 13 Juni 2017

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel.
di-

Jl. Bougenville No. 5 Panakkukang Makassar

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberi rekomendasi mahasiswa yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Meylinda Octaviana
NIM : 70400114027
Program Studi : Kebidanan
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Dengan Rest Plasenta di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2017.
Tempat Penelitian : RSUD Syekh Yusuf Gowa
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.
2. dr. Rini Fitriani, M.Kes.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dr. dr. H. Andi Army Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203 198312 1 001

Tembusan :

1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).
2. Masing-masing Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9649/S.01P/P2T/07/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.1240A/FKIK/PP.00.9/06/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MEYLINDA OCTAVIANA**
Nomor Pokok : 70400114027
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU DENGAN REST PLASENTA DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2017 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Juli s/d 07 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 07 Juli 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal,



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 11 Juli 2017

Kepada

Yth. Direktur RSUD Syekh Yusuf

Di-

Tempat

Nomor : 070/ *gp* /BKB.P/2017
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 9849/S.01.P/P2T/07/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MEYLINDA OCTAVIANA**
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 11 Mei 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Jl. Sawi 106 B Takalar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU DENGAN REST PLASENTA DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2017**"

Selama : 07 Juli 2017 s/d 07 Agustus 2017
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,

DRS. BAHARUDDIN.T
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Kadis Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
4. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKHYUSUF
JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Telp. (0411) 866 536, Sungguminasa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :244/Diklat.RSUD-SY/ X /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini , Menerangkan bahwa :

N a m a : Meylinda Octaviana
N i m : 70400114027
Institusi : Akbid UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Nifas (PNC) Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul " *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny " H " Dengan Rest Plasenta Di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun 2017* " pada tanggal 07 Juli 2017 S/D 07 Agustus 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungguminasa, 31 Oktober 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

An. Ketua Diklat
Koordinator Bagian Penelitian

Dra. Hj. Ramlah Rauf, Bsc. MMRS

Nip. 19630710 198703 2 019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Meylinda Octaviana
Tempat/Tgl.Lahir : Takalar, 11 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sawi No. 106 B Pari'Risi Takalar
No. HP : 0823 89822750
Email : meylindaoctaviana@outlook.com

B. Riwayat Pendidikan

- TK Bhayangkari Takalar pada tahun 2001 sampai 2002.
- SDN 1 Centre Pattallassang pada tahun 2002 sampai tahun 2008.
- SMPN 2 Takalar pada tahun 2008 sampai tahun 2011.
- SMAN 1 Takalar pada tahun 2011 sampai tahun 2014.
- Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan DIII Kebidanan pada tahun 2014 sampai tahun 2018.

C. Pengalaman Organisasi

- Anggota OSIS SMAN 1 Takalar pada tahun 2012 – 2013.
- Sekretaris PIK-KRR SMAN 1 Takalar pada tahun 2012.
- Bendahara Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar pada tahun 2016.